

1.2.126

[REDACTED]

2012/12/12

1.2.126

CJ

MICHAELIS ETTMULLERI

PHILOS. ET MEDICINÆ DOCTORIS,
IN ILL. LIPSIENSI ACADEMIA PROFESSORIS,

OPERA OMNIA

IN QUINQUE TOMOS DISTRIBUTA.

EDITIO NOVISSIMA VENETA.

LUGDUNENSI, FRANCOFURTENSI ET NEAPOLITANA
emendator, & Locupletior cum integro Textu

SCHROEDERI, MORELLI, ET LUDOVICI,

ACCESSERUNT NOTE, CONSILIA, &c.

NICOLAI CYRILLI

In Regia Universitate Neapolitana Prim. Med. Pract. Profess. &c.


TOMUS SECUNDUS.



VENETIIS, MDCCXXXIV.

Sumptibus Jo: Gabrielis Hertz.

CUM PRIVILEGIO EXCELLENTISSIMI SENATUS.



VIXXXCXXIV. MDCCXXIV.

Printed by J. G. & J. S. at the Press of the University of Cambridge.

1.2.126



H O C T O M O II.

Comprehenduntur

PRAXEOS MEDICÆ PROLEGOMENA.

PRAXEOS MEDICÆ LIBER I. DE MORBIS FUNCTIONES
VITALES, SEU NATURALES LÆDENTIBUS.

PRAXEOS MEDICÆ LIBER II. DE MORBIS FUNCTIONES
ANIMALES LÆDENTIBUS.

S E R I E S

LIBRORUM, SECTIONUM, CAPITUM ARTICULORUM, &c.

In hoc Secundo Volumine contentorum,

P R A X I S M E D I C A .

Praxeos Medicæ Prolegomena.

CAP. I. De Facultatibus Medicamentorum.	3.
CAP. II. De Constitutione Corporis Vitali, ejusque Lectionibus in genere.	8.
CAP. III. Monita Practica de Facultate Vitali.	11.
ART. I. De Motu Sanguinis Circulatorio.	11.
ART. II. De Motu Sanguinis Intestinali & inde orta Cacoehymia.	13.
MEMBR. I. De Cacoehymia Acida.	16.
MEMBR. II. De Cacoehymia Alcalina.	18.
MEMBR. III. De Cacoehymia Pituitosa & Serosa.	19.

MEMBR. IV. De Succorum Cacoehymicorum Evacuantibus Universalibus.	21.
I. De Vomitoriis.	21.
II. De Purgantibus per Aluum.	31.
III. De Diureticis.	46.
IV. De Sudoriferis.	49.
CAP. IV. Monita Practica de Facultate Animal.	52.
CAP. V. De Antibus Practicis.	58.

P R A X E O S M E D I C A E

L I B E R P R I M U S.

*De Morbis Functiones Vitales, seu Naturales
Iegentibus.*

S E C T I O I.

DE APPETITU Animalis & Fame laesa :

59.
CAP. I. De Anorexia, seu Fame imminuta. 60.
CAP. II. De Appetitu depravato. 72.
ART. I. De Fastidio, seu Aversatione deter-
minata. 72.
ART. II. De Pica & Malacia. 72.
ART. III. De Fastidio Alimentorum. 80.
CAP. III. De Appetitu nimio. 80.
ART. UN. De Appetentia Canina & Bulimo. 80.

S E C T I O II.

- D**E SITI laesa. 85.
CAP. I. De Siti nimia. 86.
CAP. II. De Siti defectu. 93.
CAP. III. De Siti depravata. 94.

S E C T I O III.

- D**E ALIMENTORUM Masticatione la-
sa. 95.
CAP. I. De Spasmo Cynico, & Tortura Oris. 95.
CAP. II. De Maxillarum vitio. 97.
ART. UN. De Dentium Stridore. 98.
CAP. III. De Dentium vitio. 98.
ART. I. De Dentium defectu. 98.
ART. II. De Dentium Carie, Furore, & Ver-
mibus. 102.
ART. III. De Lapide Dentali, & Dentium Nigre-
dine. 102.
ART. IV. De Dentium Vacillatione. 104.
ART. V. De Dentium Stupore. 107.
ART. VI. De Dentium Algore. 108.

S E C T I O IV.

- D**E DEGLUTITIONE laesa. 107

S E C T I O V.

- D**E CHYLIFICATIONE laesa. 111.
CAP. I. De Chylific. imminuta, absoluta, &
depravata. 114.
CAP. II. De Flatibus in Stomacho & Intestinis. 127.

S E C T I O VI.

- D**E ASSUMPTORUM in Stomacho Retentio-
nis laesione. 135
CAP. I. De Vomitu & Nausea. 135.
CAP. II. De Vomitu Cruento. 149.

S E C T I O VII.

- D**E DOLORIBUS Ventriculi. 155.
CAP. I. De Angustia, & Anxietatibus Prae-
cordiorum. 155.
CAP. III. De Cardialgia. 157.
CAP. III. De Ardore Ventriculi. 170.

S E C T I O VIII.

- D**E FÆCVM Separatione laesa. 171.

S E C T I O IX.

- D**E FÆCVM Expulsionem laesa. 175.
CAP. I. De Facum Expulsionem diminuta. 177.
ART. I. De Alvi Retentione. 177.
ART. II. De Passione Iliaca. 188.
CAP. II. De Facum Expulsionem aucta. 203.
ART. I. De Diarrhoea. 203.
ART. II. De Cholera. 220.
ART. III. De Lienteria. 229.
ART. IV. De Colica. 233.
CAP. III. De Facum Expulsionem depravata. 236.
ART. I. De Dysenteria. 236.
ART. II. De Tenesmo. 263.
ART. III. De Fluxu Hepatico. 266.
ART. IV. De Haemorrhoidibus. 269.
ART. V. De Ani Pruritu. 287.

S E C T I O X.

- D**E CONTENTIS Intestinorum Præternatu-
ralibus. 287.
CAP. UN. De Vermibus Intestinorum. 287.

S E C T I O XI.

- D**E VARIIS Intestinorum Doloribus. 291.
CAP. UN. De Passione Colica. 291.

S E C T I O XII.

- D**E SITV Intestinorum mutata. 323.
CAP. I. De Hernia. 324.
CAP. II. De Ani Procidencia. 333.

S E C T I O XIII.

- D**E CHYLI Distributione laesa. 335.
CAP. UN. De Obstructionibus Abdominis &
Morborum Chronicorum ortu. 338.

S E C T I O XIV.

D E RESPIRATIONIS Viriis.	357.
CAP. I. de Inspiratione laesa.	360.
ART. UN. de Suffocatione.	360.
MEMBR. I. de Strangulationis, Submersi, & ineptè Deglutitiis.	360.
MEMBR. II. de Suffocatione ex Gas variarum verum.	362.
MEMBR. III. de Suffocatione Convulsiva.	365.
CAP. II. de Respiratione depravata.	367.
RRT. I. de Asthmate.	367.
ART. II. de Singultu.	397.
ART. III. de Incubo.	404.
CAP. III. de Expiratione laesa.	409.
ART. I. de Stermuntatione.	409.
ART. II. de Viriis Vocis.	413.
MEMBR. I. de Aponia.	413.
MEMBR. II. de Rancedine.	415.
D/SSERTATIO De Voce.	419.
ART. I. Quid & quodplex sit Vox.	419.
ART. II. De Organo, Formatione, & Causa Vocis.	421.
ART. III. De Vocis humanæ Tonis.	423.
ART. IV. Ad Vocem pertinentia Phænomena exponuntur.	429.
ART. V. De Vocis Morbis.	433.
ART. III. de Tussi.	435.
ART. IV. de Catarrho Suffocationis.	458.

S E C T I O XV.

D E SANGVINIS Fermentatione laesa.	470.
CAP. I. de Febribus in genere.	475.
CAP. II. de Febribus Intermitentibus.	502.
CAP. III. de Febribus Continuis.	517.
ART. I. de Febribus Epheemeris.	557.
ART. II. de Febribus Acutis Primariis.	559.
De Frigidæ in Febribus usui.	575.
CAP. IV. de Febribus Acutis Symptomaticis.	599.
CAP. V. de Febribus Lentis.	600.
ART. I. de Febribus Lymphaticis Glandularum Conglobatarum, & in specie de Febribus Catarrhalibus.	601.
ART. II. de Febribus Lymphaticis Glandularum Conglobatarum.	608.
MEMBR. I. de Febribus Lentis Primariis.	608.
MEMBR. II. de Febre Epiala.	612.
MEMBR. III. de Febribus Syncopalibus.	612.
MEMBR. IV. de Febribus Lentis Secundariis, & Symptomaticis.	613.
MEMBR. V. de Febribus Hæcticis.	616.
CAP. VI. de Febribus Malignis.	627.
CAP. VII. de Morbo Castrensi.	667.
CAP. VIII. de Febribus Petechialibus.	668.
CAP. IX. de Febre Purpurata.	677.
CAP. X. de Variolis & Morbillis.	679.
CAP. XI. de Febre Scarlatina.	701.
CAP. XII. de Peste & Febribus Pestilentialibus.	702.
Symptomata Pestiis.	722.

S E C T I O XVI.

D E CORDIS & Arteriarum Pulsu laeso.	733.
CAP. I. de Cordis Palpitatione & Tremore.	738.
CAP. II. de Palpitatione Arteriarum.	751.
CAP. III. de Lipothymia, Syncope, & Virium prostratione.	751.

S E C T I O XVII.

D E NUTRITIONE laesa.	763.
CAP. I. de Nutritione partium diminuta.	766.
ART. I. de Atrophia, Tabæ & Macie.	766.
ART. II. de Pthibis.	770.
ART. III. de Aridura Partium.	794.
CAP. II. de Nutritione aucta.	798.
ART. UN. de Corpulentia nimia.	798.
CAP. III. de Nutritione depravata.	803.
ART. I. de Cachexia in genere.	803.
ART. II. de Leucophlegmatia & Anasarca.	816.
ART. III. de Hydropse Universalis.	818.
ART. IV. de Hæmo Flavæ, Nigræ, & Albæ.	851.
ART. V. de Lue Venerea.	872.
Lue Venerea Symptomata.	891.
ART. VI. de Malo Hypochondriaco & Scorbuto.	907.
Scorbuti Symptomata.	951.
ART. VII. de Affectionibus Cutaneis.	977.
MEMBR. I. de Scabie.	977.
MEMBR. II. de Pruritu.	984.
MEMBR. III. de Lepra.	985.
MEMBR. IV. de Elephantiasi Arabum.	988.
MEMBR. V. de Serpigne & Liebene.	989.
MEMBR. VI. de Phlegmonis.	990.
MEMBR. VII. de Sudaminibus.	991.
MEMBR. VIII. de Sironibus.	991.
MEMBR. IX. de Varis.	992.
MEMBR. X. de Lentiginibus.	993.
MEMBR. XI. de Epheledibus.	994.
MEMBR. XII. de Maculis Hepaticis.	995.
MEMBR. XIII. de Gutta Rosacea.	996.
MEMBR. XIV. de Cutis Nigredine.	997.
MEMBR. XV. de Porrigine.	998.
ART. VII. de Capillorum vitiiis.	999.
MEMBR. I. de Calvitie.	999.
MEMBR. II. de Capillorum Defluvio.	999.
MEMBR. III. de Alopecia.	1000.
MEMBR. IV. de Capillorum Tinea.	1000.
MEMBR. V. de Plica Polymia.	1000.

S E C T I O XVIII.

D E SANGVINIS ex partibus Refluxu laeso.	999.
CAP. I. de Sanguinis Stagnatione.	1001.
ART. I. de Inflammatione in genere.	1001.
ART. II. de Inflammatione Faucium, & in specie de Angina.	1011.
MEMBR. I. de Aphthis.	1029.
MEMBR. II.	

MEMBR. II. de <i>Uvula exulcerata.</i>	1030.
MEMBR. III. de <i>Uvula Prolapsu.</i>	1031.
ART. III. de <i>Inflammatione Stomachi ejusque Abscessu.</i>	1031.
ART. IV. de <i>Inflammatione Intestinorum.</i>	1034.
ART. V. de <i>Inflammatione Ani.</i>	1036.
ART. VI. de <i>Mesenterii Inflammatione & Abscessu.</i>	1038.
ART. VII. de <i>Inflammatione Pancreatis.</i>	1042.
ART. VIII. de <i>Omenti Tumoribus.</i>	1043.
ART. IX. de <i>Pleuritide & Peripneumonia.</i>	1044.
ART. X. de <i>Hepatis Inflammatione & Abscessu.</i>	1067.
ART. XI. de <i>Inflammatione Lienis.</i>	1074.
ART. XII. de <i>Renum Inflammatione & Exulceratione.</i>	1075.
ART. XIII. de <i>Inflammatione & Ulcere Vesicæ Urinariæ.</i>	1079.
ART. XIV. de <i>Prostatitis.</i>	1084.
ART. XV. de <i>Ocularum Inflammatione Vera & Falsa.</i>	1087.
ART. XVI. de <i>Aurium Inflammatione & Ulcere.</i>	1101.
CAP. II. de <i>Sanguinis Extravasatione in peculiarem Corporis cavitatem.</i>	1104.
ART. UN. de <i>Empyemate.</i>	1104.
CAP. III. de <i>Sanguinis extra Vasa effluxu.</i>	1118.
ART. I. de <i>Hæmorrhagia in genere.</i>	1118.
ART. II. de <i>Hæmorrhagia Nasium.</i>	1131.
ART. III. de <i>Gingivarum Hæmorrhagia.</i>	1137.
ART. IV. de <i>Sputo Sanguinis.</i>	1138.

S E C T I O XIX.

DE MOTUS Sanguinis ad Viscera lesa.	1147.
CAP. I. de <i>Lienis Affectionibus.</i>	1147.
ART. I. de <i>Lienis Intemperie.</i>	1149.
ART. II. de <i>Lienis Tumore, & Scirrhus.</i>	1151.
ART. III. de <i>Fermenti Splenetici Lesione.</i>	1151.
CAP. II. de <i>Hepatis Lesionibus.</i>	1151.

S E C T I O XX.

DE SERI Secretione & Excretionem lesa.	1153.
CAP. I. de <i>lesâ Urina in Renibus Secretione.</i>	1156.

ART. I. & II. de <i>Urinæ Secretione imminuta & abolita.</i>	1156.
MEMBR. I. de <i>Ischuria Renali.</i>	1157.
MEMBR. II. de <i>Calculo Renum.</i>	1167.
ART. III. de <i>Urinæ Secretione aucta.</i>	1197.
MEMBR. UN. de <i>Diabete.</i>	1197.
ART. IV. de <i>Urinæ Secretione depravata.</i>	1203.
MEMBR. I. de <i>Urinæ Pingui & Oleaginosa.</i>	1203.
MEMBR. II. de <i>Mictu Cruento.</i>	1204.
CAP. II. de <i>Urinæ per Vesicam Excretionem lesa.</i>	1210.
ART. I. de <i>Urinæ Excretionem abolita.</i>	1211.
MEMBR. I. de <i>Ischuria Vesicali.</i>	1211.
MEMBR. II. de <i>Calculo Vesicæ.</i>	1218.
ART. II. de <i>Urinæ Excretionem aucta.</i>	1222.
MEMBR. UN. de <i>Urinæ Incontinentia.</i>	1222.
ART. III. de <i>Urinæ Excretionem depravata.</i>	1228.
MEMBR. I. de <i>Stranguria.</i>	1228.
MEMBR. II. de <i>Dysuria.</i>	1234.

S E C T I O XXI.

DE LYMPHÆ Separatione & Motu lesis.	1239.
CAP. I. de <i>Lymphæ vitiosa Generatione.</i>	1242.
CAP. II. de <i>Lymphæ vitiosa Distributione.</i>	1242.
ART. I. de <i>Affectibus Catarrhalibus.</i>	1242.
ART. II. de <i>Coryza.</i>	1262.
ART. III. de <i>Tussi, Rancedine &c.</i>	1267.
ART. IV. de <i>Epiphora.</i>	1268.
CAP. III. de <i>Lymphæ Motu impedito.</i>	1268.
ART. I. de <i>Hydropibus Particularibus in genere.</i>	1269.
ART. II. de <i>Ascite Particulari.</i>	1271.
ART. III. de <i>Hydrocephalo.</i>	1278.
ART. IV. de <i>Hydrope Pectoris.</i>	1281.

S E C T I O XXII.

DE SANGUINIS ad Circumferentiam Motu lesi.	1283.
CAP. I. de <i>Sudore nimio.</i>	1285.
CAP. II. de <i>Sudore depravato.</i>	1286.
CAP. III. de <i>Sudore deficiente.</i>	1286.

P R A X E O S M E D I C A E

L I B E R S E C U N D U S.

De Morbis Functiones

Animales ledentibus.

S E C T I O I.

DE SENSUS & Motus laesionibus. 1287.

CAP. I. De Facultatis Animalis Affectibus in genere. 1287.

CAP. II. De Facultatis Animalis Affectibus in specie, seu Morbis Capitis. 1294.

ART. I. De Vigilis nimis. 1294.

ART. II. De Somno nimis. 1303.

MEMBR. I. De Caro. 1305.

MEMBR. II. De Comate Somnolente & Vigili, seu Cataphora. 1306.

MEMBR. III. De Lethargo. 1307.

MEMBR. IV. De Noctambulis. 1307.

MEMBR. V. De Catalepsi. 1319.

S E C T I O II.

DE SENSUUM Externorum laesionibus. 1323.

CAP. I. De Visu laesionibus. 1325.

ART. I. De Visu abolito. 1327.

MEMBR. I. De impedito Radiorum per Pupillam ingressu. 1327.

I. De Palpebrarum Paraly. 1327.

II. De Ungue seu Panno Oculi. 1328.

MEMBR. II. De Tunica Cornea vitit. 1333.

I. De Nubecula, Albagine, & Sanguillatione. 1333.

II. De Hyppo. 1337.

III. De Phlyctenis seu Oculorum Pusulis. 1337.

MEMBR. III. De Humeris Aquei vitit. 1338.

I. De Cataracta & Glaucoma. 1338.

DISSERTATIO De Cataracta & Glaucoma. 1346.

ART. I. Quid sit Cataracta & Glaucoma. 1346.

ART. II. Antiquorum de utroque Morbo sententia. 1346.

ART. III. Recentiorum quorundam de Cataracta opinio. 1346.

ART. IV. Observationes novam de Cataracta sententiam confirmantes. 1347.

ART. V. Recentiorum Argumenta ex Caulis & Phenomenis Cataractae desumpta. 1347.

ART. VI. Pro Antiquorum Opinatione pugnantium Argumenta solvuntur. 1347.

ART. VII. Praecipuum Argumentum ex usu Crystalini desumptum expenditur. 1350.

ART. VIII. Nostra de Cataracta & Glaucoma opinio. 1351.

ART. IX. Differentiae, Causae, Signa & Curatio Cataractae & Glaucomatis. 1354.

MEMBR. IV. De Vitio Nervi Optici. 1353.

I. De Gutta Serena. 1353.

ART. II. De Visu imminuto, & in specie de Nyctalopia. 1359.

CAP. II. De Auditus laesionibus. 1364.

ART. I. De Auditu imminuto & abolito, seu de Surditate. 1361.

ART. II. De Auditu depravato, seu de Sonitu & Tinnitu Aurium. 1368.

CAP. III. De laeso Tactu. 1372.

ART. I. De Stupore. 1373.

ART. II. De Dolore. 1373.

ART. III. De Artuum Doloribus Lancinantibus & Lacerantibus. 1384.

ART. IV. De Odontalgia. 1386.

ART. V. De Dolore Oculorum. 1393.

ART. VI. De Aurium Dolore. 1395.

ART. VII. De Cephalalgia. 1399.

ART. VIII. De Arthritis. 1423.

CAP. IV. De laesionibus Gustus. 1440.

ART. I. De Gustu imminuto & depravato. 1441.

ART. II. De Aponia. 1442.

ART. III. De loquela amissa. 1444.

CAP. V. De laesione Olfactus. 1446.

ART. I. De Olfactu imminuto aut abolito. 1447.

ART. II. De Polypos Navium. 1449.

ART. III. De Otorrhea depravato & Ozana. 1455.

S E C T I O III.

DE SENSUUM Internorum & Motuum Animalium laesione. 1454.

CAP. I. De Vertigine. 1455.

CAP. II. De Convulsionibus & Motibus Convulsivis. 1469.

ART. I. De Convulsione Clinica & Epilepsia. 1470.

ART. II. De Convulsione Tonica. 1497.

ART. III. De Tremore. 1501.

CAP. III. De Spirituum Animalium Motu & Infusu abolito. 1505.

ART. I. De Apoplexia. 1505.

ART. II. De Paraplexia. 1533.

ART. III. De Paraly. 1539.

CAP. IV. De Operationum Rationalium laesionibus. 1555.

ART. I. De Ratiocinatione imminuta & abolita, & inde nata Memoria laesione & Stupiditate. 1556.

THESIS. Fatuus & Amens ab ipso Ortu legendi & scribendi Artem addicere nequit. 1559.

ART. II. De Delirio in genere. 1567.

ART. III. De Delirio à Causis Internis. 1570.

MEMBR. I. De Phrenitide. 1570.

MEMBR. II. De Delirio Melancholico. 1579.

MEMBR. III. De Mania. 1602.

ART. IV. De Delirio à Causa Externa. 1612.

MEMBR. I. De Rabie. 1613.

De Rabie & Hydrophobia. 1622.

MEMBR. II. De Tarantismo. 1631.

MEMBR. III. De Amore Infans. 1632.

MEMBR. IV. De Philtis. 1633.

MICHA-





I. N. 7.

MICHAELIS ET TMÜLLERI,

PHILOSOPHÆ ET MEDICINÆ DOCTORIS,

Facultatis Med. Adsefforis, & P. P.

COLLEGIUM PRACTICUM,

S E U

PRAXIS MEDICA.

PROLOGUS GENERALIS.



Un placet vobis mecum vobiscum
exercere in Praxi, non possum
non facere, qui facilem me
præbeam, atque orator Divi-
no Numine, ad eam me accio-
gam. Quod hanc itaque attinet:
dividitur vel in *Praxem seu Ordi-
nariam*, vel *Extraordinariam*.
Praxis seu Ordinaria, quam hoc
loco pertractabimus, adhuc est
manca, & in quampluribus mu-
tata, idque duabus ex causis:

I. Est *Defectus* sufficientium *Experimentorum* in Macro-
& Micro-cosmo, super quæ solida Theoria, hoc est ali-
quid, minus sensibus obviatorum phenomenis, ex illis sensi-
bus nobilioribus observatis, eorumque fendi modis, appli-
catio & fendi ratio fundari possit. Ob id tam studiose ho-
die excolitur Chymia & Anatomia, ut ibidem ex observa-
tione Microcosmi melior Corporis humani operationum no-
ticia, partim per Anatomiam, partim per Chymiam detecta,
etiam obtineri queat. Ex his Pathologia colligenda.

II. Causa est *Defectus generosorum & generosorum Remo-
diorum* in Praxi, tam Universalium, quam generosorum
speculorum, quæ nempe in se efficacia sunt, & sine flo-
machi labore pharmaceutico, sponte sua vim medicamen-
tosam exerant. Unde qui supra vulgatum & ordinariam
Praxin in Medicina excellenter Præfici, hoc vel ope so-
lidioris Theoriæ, vel ratione generosorum Remodiorum,
præstiterunt. In quibus ultimis sublimiores Chymiatrici,
ac hæc antequam BASILIUS VALENTINUS, PA-
RACELSUS, HELMONTIUS, POTERIUS, &c. excel-
luerant.

Hinc in Praxi Vulgari, ratione priora, Theoriæ nempe,
defecta vis circa Radicem morbosam, sed potius circa epus
Praxid, versari datur: Ratione posteriori interdum animus
Empiricus melius, maxime industrii & eruditio Medi-
ci, curare observatur, & tam sæpe affectus in se curabiles
incurabiles inferuntur catalogo.

Ita: Praxio Vulgarem vis circa Radicem morbosam,
operandam minus cognitam, à priori hæc usus imperfec-
tissimè, occupari, sed vel circa Causam occasionalem, vel
circa Productum morbosum tantum, hoc vel corrigendo vel
insensu unde sæpius à posteriori, rarior à priori, curare
solumus. Rem exemplo declarabo. Spina digitum iossa ca-
nat, vel interit vitium Fermentum, spinæ iossa læ-

dens, morbum producit, ut ibi cæternè Tumor, Inflamma-
tio, Abscessus in Chirurgia; hic verò internè affectus Chro-
nici frequentius ex digestionis partu cupidum, vel publica
vel privata, læsi, Ac uti verò ex sermone peregrino, aut
sanguinem aut spiritum inquinante, profectum. Hinc
si Spina naturæ remouetur, omnia evanescent symptoma-
ta, qui verò vel Anodynis, vel Discretantibus, vel Matri-
cibus, negotium traditæ, Naturæ quidem motum imi-
tantur, & eam adjuvant; sed à posteriori saltem, quem à
priori, spinæ nempe evulsionem, commodius levare potui-
ssent. Sic in Maligna Febre Contagium insensibile est, quod
morbum inferit; hoc vel sublatum, vel appropriato remedio
destructo, cessat Febris; Contagium est leve, quod in Lux
Venerea peccat, & sermone digestiva bebetur; hoc subla-
to, facile omnia curantur, quæ difficillimè & tardissimè
per Sudores aut Salivationes aliis curantur. Sic Ferme-
tum aut Spina est exilis, quod circa usum ac tantillum efflu-
vium acris, nares inguiter vellicans, impetuosum Sten-
tationis spasmodum facit; his sublati, vel per appropriata
corrodis, cessant effectus; qui per Opium à posteriori sal-
tem palliantur. Sanè frequentissimè in Praxi occurrit, ut
nonnulli à posteriori Productis morbois ac Symptomatis oc-
curratur, à priori verò Causa seu Spina intrada relinquitur;
idque vel ob Causam generis ignorantiam, vel appropi-
atam Remedii defectum, Medicis ignorantibus optimè se
agere opinantibus, scitotibus verò tacite ingemiscuntibus,
& inos defectus adhuc deplorantibus.

Per *Extraordinariam* Praxin intelligo eam, quæ rariè in-
stauratur & observatur, eaque differt à Vulgari seu Ordi-
naria duobus modis:

I. Ratione Remodiorum.

II. Ratione Modi.

Illo, dum administrantur Remedia, tam vulgaria quam
sublimiora & generosa, Ariana dicitur, plus in recessu habenti-
bus, legitima tamen methodo, quibus pasci citò, turdè, &
incunde curatur; Hoc, dom Praxin per Curas Magicae, Tran-
splantatorias & Amuleta, indicitur. Hinc in tali-
bus medicandi rationibus, nec Venesectionibus, nec Forci-
culis & Vesicatoriis, nec Purgantibus, tantopere opus ha-
bemus, quia sola data Vomitoria, & Diuretica ac sudore-
fera, applicata cum appropriatis, utramque faciunt paginam.

Ut ergo reformetur Praxi Ordinaria, & Theoria magis
perficienda per repetita Experimenta & Observationes Ana-
tomicas & Chymicas, & hinc Remedii vel appropriatis
Particularibus, vel generosis Universalibus, adeoque pluri-

mis scopis satisficientibus, sedulo opera danda erit. De utraque Praxi hic agemus, Extraordinariam tamen, tanquam sublimiorem, ad hanc reservabimus, & Appendicis loco in aliquibus Lectionibus prosequemur.

Ad Ordinariam pergo, in qua non levis varietas est, tam ratione Methodi, quam ratione Remediorum; hanc igitur, quantum possibile, correctam jam dabo: lo qua circa quævis Affectionem præternaturalem ordine pertrahendum, quoniam Capita observanda veniant, quibus consideratis, totus Morbus lenocetur.

I. *Caput Historia Morbi* est, ubi emarratur, Invasio & Modus, affectusque Accidentia, ubi sic omnia Diagnosis ejusdem, & omnia signa diagnosticantur & evanescunt.

II. *Subsistam* seu *Pars agilis*: ubi distinguendum est inter *Subsistam Invasivam* & *Radicationis*. *Subsistam Invasivam* est illud quod maxime & primario afficitur: *Subsistam Radicationis* vocatur proprie locus foveeque Morbi, & quod maxime sollicitandum est. Cuius & morbum. Dabo exemplum: Multi laborant Vertigine, idque ob stomachi vitium ubi *Subsistam Invasivam* est Caput, vel Cerebrum; *Radicationis* vero Stomachus.

III. Caput erit *Cernis* & *Evolutio Causarum*: tam Remotæ quam Proximæ, tam Materialis quam Formalis, seu considerentur tam in se, quam respectu alterationis præternaturalis, quam corporis, quolibet partibus inducant. Sub his Causis Nonnaturales, Naturales & Præternaturales complectentur, item Characteres hereditarii, & Contagia extrinsecus.

IV. *Prognosis*, quæ in unoquoque affectu determinanda, vel rite instituta est.

V. Est *Methodus Moderni* seu *Cursus Affectus*, quæ complectitur tam Methodum Moderni Generalis (suum generalis debent præcongnita esse, antequam ad specialia sua progressus) eum speciem cum cæteris Practicis, eum jam in specie pertrahendi sunt Affectus, & Remedia, simplicia & Composita, nunc Universalia, nunc specifica, interna & externa, una cum Causis, Historiis & Observationibus Practicis.

Theoria autem & Praxis Medica in antecessum præsupponenda: ubique observandum est, ut super fundamenta Chymica & Mechanica, adeoque Experimenta, Theoria & Praxis Medica fundatur, ac res difficili & obscura in Theoriam gratiam dilucidetur, ita ut in Functionibus Naturalibus primatum obtineant Experimenta Chymica, in Animalibus vero Mechanica aut Mechanico-Mathematica. Nam Corpus nostrum est Machina Hydraulico-pneumatica, cujus moventur liquor spirituales per Chymiam explicanda: siquidem Natura semper & ubique geometrizatur, jam vero, si quis de cum laude Praxin aggredi, inque ea feliciter progredi velit, ante omnia quatuor præsuppono necessario a vobis præcongnita:

I. Ut exacte callentis vobis cognitam ac perspicuam habeatis Naturam *Subsistam* Medicinæ naturaliter constituti, ac bene sciat, quomodo hanc naturalem Corporis humani operationes & functiones, uti de præternaturalem hanc sum: *Naturale enim seu relictum est norma, ad quam examinatur & emendatur præternaturale seu curvum*. Uno verbo; rectitudo Physiologiam & Pathologiam, adeoque cognita sit vobis Theoria secundum varietatem Theum & Hypotheseum, tam Veterum quam Recentiorum.

II. Requiro, ut exacte sitis versati in *Materia Medica* secundum omnia tria Regna.

III. Tertium est, ut cognita sit vobis *Pharmacologia*, i. e. præparaciones Medicamentorum, & artificiosæ compositiones: Nisi enim cognitis habeatis simplicium vires, & componendi rationem seu Methodum præscribendi Formulas, certum est, quod in multis habeatis impedimentum in Praxin.

IV. Nec sine cominodo præsupponitur cognitio *Methodi Generalis*, vul. *Specialis* hac eo melius superstruatur.

Pergo ad rem, & quidem duabus aut tribus Lectionibus tractabo Prolegomena, seu ea, quæ erunt fundamentalia in omni Praxi: attentè percipiatur, quia continent fundamentum duendum.

PRAXEOS MEDICÆ PROLEGOMENA. CAPUT I.

De Facultatibus Medicamentorum.

Cum totius Corporis Œconomia, tam naturalis, quam præternaturalis morboſa, à Modernis per Principia Mechanica, secundum particularum minutissimarum, ex quibus omnes ejus partes, tam continentes quam contentæ, constent, figuram, magnitudinem, situm & inde nam tam texturam, eorumque motum & quietem explicentur, hæcque Hypothesis per Experimenta Chymica optime illustratur; ob id etiam Medicamentorum Facultates, secundum quas certam vim habent alterandi Corpus, & inde ad eorum eorumque effectus, optime ex istis Principiis materialibus deducuntur.

Adeoquò simplicium quorumcumque in tribus Regnis vires & proprietates non ex supposito potius, quam demonstratis, Elementorum manifestis quorundam Quatuordecim primis, multo minus ex ignorantis hæcenus Occurris præparatibus determinandæ sunt; sed ex specifica eorum virtutibus, ex singulari nempe particularum materialium textura lo unoquoque subiecto definiendæ erunt, quæ ipsæ ex Semine primam formam nascuntur originem, adeoque texturæ talis materialis incitus quasi nucleum medicamentosus *Craſis seminalis* ob id vocari solet.

Ut rem exemplo declarem: Cochlearia Scorbuto cum curat, non quatenus præsupponitur calida, sed ex specifica textura particularum ejus minutissimarum; dum nempe hæc constituit concretum adtæ aere, subtile, penetrans, quod acidum vitiosum in scorbuto peccat fuit miscela corrigat, destruat, & in aliam quasi naturam transmutat, cuius texturæ nucleum seu specifica Craſis in illis volatilibus & aeribus particulis, seu, ut alii vocantur, sale volatili acri, præcisè consistit: reliquo corpore seu effectu nihil virtutis medicamentosæ antiscorbutoſæ obtineat. Sicut etiam Creta Soda seu ardori Ventriculi succurrit: non quatenus frigida,

sed quatenus minore particulæ ita sunt conformata & contexta, ut quæcumque acida, quæ attingunt, mox imbibant, & ita cum acido in stomacho nostro concretum invicem efficiant; quo fit, ut vitiosa ista effervescentia, quæ ab acido antea habet, remittatur, & consequenter Soda cesset.

Textura talis minutissimarum particularum in concretis, eorumque seminalis Craſis, cum eisdem à priori definiti adhuc nequeat, ob id secundum particularum quorundam in concreto magis prædominantium, in specie per particularum salinarum, *Acidi nempe & Alkali seu Urinæ*, proprietates circumferri solet: Quia

I. Dicitur Salioſæ particulæ pro materialium textura primam obtinent inter alias, nempe pingues seu sulphureas, Aquas, Terreas particulæ, utut hæc ipsæ omnes probabilissimè ex Aqua sola primam habeant originem.

II. Quia ex his effectus, complures materiales deducti possunt.

III. Quia aliis in omnibus tam Naturæ quam Artis operibus mirabiles planè ac simul potentes eo exhibent; Et

IV. Ipsa Simplicia & Particularia Remedia saporum variorum sensu, proximè ex Salinis principis derivandorum, cum tot Differentiis Medicamentorum erroris indicibus in nobis subinde exhibent.

Habemus enim *Acidi & Alkali* in Vegetabilibus Salina principia: illa in Acerosis Fructibus, Succis, Lignis, &c. Hæc in Antiscorbutoſis, Volnerariis, &c. In Animalis Regno præ cæteris sal alcali volatile, copioso oleo temperatum (sub quo occultum est Acidum) luxurians. In Mineralibus vero imprimis Acidum dominatur, nunc erudum, nunc pinguedinis tegmine sulphureum, quod vel fixum, adeoque temperatius & nobilius, ut in metallicis, vel volatilius & acrius, ut in reliquis.

Cæterum sub generali isto Acidi & Alkali conceptu specialium horum in unaquaque specie, &, ut dixi, Seminalis differentia attendenda est, secundum quam specifica & sibi proprias qualitates seu doses obtinent: hinc v. g. sal Alkali Armoracia speciem est Antypochondriacum: sal vo-

latile oleosum in Chelidonio majori specficum Anti-Ictericum: Acidum Spiritus Salis est speciale Diureticum: Acidum Spiritus Niri est specficum Carminativum, &c. (A.)

Quoad speciales, ac Simplicium & inde parorum Remedium vires, ex quae *Calida* dicuntur, ut Piper, Sinapi, aliique, operantur, vel quatenus immutatio sensus afficiunt, utque Linguam, & ea eam partem quorundam acrimonia fringunt, quae dilatae fibras & nervulos ita fibrose, ac si essent igitur corpulenta, ut hoc per Spiritum Niri illustrari possit: vel quatenus mediato tales particule Massam Sanguineam dissolvunt, fermentationem ejus ratione salis volatilis oleo interdere, & ita ejusdem incalcescentiam, & consequenter Caloris in partibus sensum augere valent; qualia sunt Salia volatilia oleosa, imprimis Olea deffilata, aut Spiritus inflammabiles, quia salbus Sanguinis insigniter dissolvunt, ejus resolutionem promovent, & ita Sanguinis incalcescentiam augent.

Frigida e contra sunt, quae vel nullam talem impressionem mediam in partes feniles faciunt, vel eam ab aliis particulis commotis exaltatam siliunt: quia ratione Saturnus frigidus, & inflammationis acre dicitur: vel quatenus Massam Sanguineam plus minus inspillando, aut fermentationem ejus infensorem coecondo, conceptum ejus calorem ita infringunt; uti interno usu sunt Acida, & imprimis Nitrata.

Sicca sunt ea, quae substantiam humidam corporis, vel roslam nutritivam, vel ferream distributivam velut imbibunt, ut Calcinata omnia, v. gr. Corium Cervi usum: aut eandem dispergunt, & resolvunt, ut Evacuancia omnia, imprimis Sudorifica.

Humida e contra erunt, quae vel substantiam talem suggerunt, ut probe nutritiva temperata, Passulae, Amygdalae dulces, item pulsatilla, Cerevisia, &c. vel illorum absorptionem siliunt, ut blanda Anodyna, & quaecunque evacuationes inhibentia.

Invenit haecula salia persuasio, quod quamplurima Simplicia seu Aperiata ad Viscerum, Hepatis, Lienis, Mesenterii, &c. Obstructiones, utut ferè semper Imaginarias, commendentur: cum tamen talia, v. g. Abinthium, Centaurium minus, Filix, Salia fixa & volatilia, Spiritus Salis Ammoniaci, Martialis, & Acidulae, &c. profit saltem, quatenus vitiosos & praternaturales in corpore succos acres, salios, in specie acidos, & inde vitiatam Sanguinis crasin, indeque derivata praternaturalia vicia Bilis, Lymphae, Succu pancreatici, digestionum errore subnata, corrigunt, emendant, & in statum naturalem reducant, nunc Acidum nimum laetando, nunc idem nultum corrigendo, nunc Bilem laetrem Sale volatili acuendo, nunc acriorem oleo temperando &c. siquidem ab horum succorum amertia, iadeque naca vitiosus effervescentia in primis visis, & inde in Salis Sanguinis fermentatione naturali, non autem a solis Obstructionibus, Morbi in specie Chronici oriuntur; unde talia Aperiencia putata propriè Alterantia appellanda erunt.

Alterantia autem ista in genere bino modo prodesse observantur.

I. Quatenus *Aridum visiosum* in corpore, in specie circa primas vias, destruant, illud vel *absorbendo*, ut Martialis, Terrea, Calcinata; vel ista sui miscela in salum tertium *transmutando*, ut Alcalin, tam sua quam volatilia, vel illud *temperando*, ut Oleosa seu pinguis, tam volatilia quam fixa: quae inter primi generis etiam *inspersio*, & respectu effervescentia ab Acido induit. Praecipuum appellari solent.

II. Quatenus *Alcali visiosum* in corpore, imprimis Bilem & Massam Sanguineam corrigunt & emendant, illud vel *acutius simili Alkali*; vel *temperando* Acida, item Oleosis seu pinguis: Nam & haec duo, Acidum & Alkali, ex quorum conjunctione compositum tertium emergit, ut in Macrocolino, ita & in Microcolino, primariam merent considerationem.

Præter Alterantia haec Generalia, quae universales vel acida vel amara, &c. corrigunt, ad Alterantia Specialia, quae specialem causam morboles peccantem nocendi rationem corrigunt, vel alterant, *Spiritus seu Aperiencia* dicta, respiciendum; scilicet Abinthium Febribus Tertianis in specie, China Chinæ Quartanis, Myrrha Menstruis deficietibus, &c. medentur, utut sub generali amara generaliter Sale volatili oleo, Acidi peccantis destruetivo, polere dicantur.

Præter duo haecaria, Acidum & Urinosum, corrigent.

Tom. II.

tia, sunt Medicamenta temperata nulla salium facultate excedentia, indeque sapore dulci aut plane nullo, aut blanda oleositate vel mucilaginositate se nobis exhibentia, ut sunt Passulae, Glycyrrhiza, Amygdalae dulces, Semina frigida, mucilago feminis Cydoniorum, Sulphur commune, Gummi Arabicum, Lac, Pinguedines animalium, &c. Haec ipsa interne acce quodcumque, in specie salium dum abundant, dicuntur *Temperantia*: dum quia inservit, dicuntur *Desaffinitia*: dum fauces leniunt, & recrementis tunc effluendis quasi vias lubricant, dicuntur *Exspellantia*: dum extra imposita acre dolorosum mitigant, & ita fibrarum ex dolore spasmodico seu crispatione remitti faciunt, *Anodyna*: dum eodem modo moderato ab acido coagulatos succos blande fundunt, *Emollientia*: dum acrimoniam temperant, & temperando utrumque acre, horum amicam unionem in salum tertium, adeoque plus promovent, *Maturantia* seu *Suppurantia* dicuntur.

Emollientibus contrariis videntur *Adstringentia* dicta, quae ratione texturae stypticæ quoddammodo astringunt, in specie ex terreo cum acido plus minus compositae, operantur, & vel fluida quoddammodo incassando aut coagulando siliunt, vel fibras partium sal additione stringunt, & ita angustant, ut Alumen, Terrae metallice cum acidis, Animalium partes calcinatae, Plantago, Gallie, Acacia nostras, &c.

Ad illa Alterantia pertinent etiam *Febrifuga* dicta, quae Febribus intermittentibus in specie medentur & operari videntur, quatenus fermentum acidum febrile abundant, figunt, alterant, & destruant: qualia sunt Alcalia, & his cognata, tam volatilia, ut Spiritus Salis Ammoniaci, Abinthium, Centaurium minus, Carduus benedictus; quam fixa, ut Antimonium diaphoreticum, Mater perlarum calcinata, Sal fixum Abinthii, &c. Quinimo pertinent etiam ad ista, ea, quae *Menses pellere* dicuntur; & vel acida simpliciter absorbendo, ut Martialis; vel substantia sua volatili Sanguini certam fermenta vim turgescientiam conciliando, ut Volatilia, Myrrha, Crocus, Rosmarinus, Spiritus & Sales volatiles, &c. operationes suas exercent.

Ad Alterantia ista etiam *Vulneraria* pertinent, quae acidum praternaturale & vitiosum, minus quidem in Vulneribus, acius in Ulceribus, blando fuso & temperato nicali delent, & ita consolidationem, remoto acido corruptivo fermento, promovent; siue externe applicentur locis affectis, siue interne propinentur, ut in Romacho, nimio delecto acido, & chylis certo modo alteratis, scilicet farinatio: ut Caneri fluviales, eorumque Lapilli, Saturnus, Plantago, &c.

Cæterum, dum Aperiencia dicta ex vulgato sensu rejecimus, non removenda erunt *Incidentia* seu *Attenuantia*, & exterio usui *Rosacea* dicta, quae acrimonia sua salina, nunc salia temperata, ut Tartarus vitriolatus, Sal Ammoniacum, &c. nunc acida, ut Spiritus Salis dulcis, Spiritus viridis Aëris, Oxymelque; nunc alcalina, ut Ammoracia, Aromatica, Abinthium, Spiritus Salis Ammoniaci, &c. viriditas incident, aculeis suis penetrant, & ita coagulata plus minus, aut indurata mollia & fluxilia faciunt, quae inter extero & interno usu Gummatum imprimis eminent.

Experientia etiam compertum est, præter specficam vim & crasin, quae mediante certis humorum & causarum morbosorum viis medentur Remedia Alterantia, eorundem quodam certis quibusdam Visceribus aut partibus magis amica aut inimica exillere: quia ratione Aromatica omnia Cerebro & Nervis, Amara Hepati, Acida Stomacho, Terebinthinata Renibus, &c. amica: e contra Cathartides Vesicæ, Cepacea Oculis, Vitriolaceae Pulmonibus, Mercurialia Nervis inimicissima esse solent: non quod talia proprio impetu co ferantur, sed quod per corpus communi circulo cum sanguine aut sero & lymphâ circumrapta, vel certis in partibus & locis ratione determinatæ figurations minimorum promptius se insinuant, & ita certas alterationes, sibi insensibiles, distis in locis inducunt; vel certas morbosas causas quibusdam partibus in specie hostiles singulariter corrigant: quia ratione Cinnabaris Antimonii specficum Cephalicum, item Antiepilepticum dicitur, quatenus speciale illud acidum, quod Cerebrum afficit, & in Nervis convulsiones infert, præ aliis remediis optime tollit: Foeniculum appropriatum Ophthalmicum dicitur, quatenus vel causis morbosus Oculis præsertim insensua

A 2

tol-

(A) Seminales ha differetia, quas notandas esse A. ait in Acidum & Alkali concepit, si succum facere velimus, erunt insignite Occulta Antigororum Qualitates; i. e. oculum tempe non minus Antiquis quam Recentioribus est, quid faciat Acidum Spiritus Niri potius Carminativum, quam Diureticum, & Acidum Spiritus Salis potius Diureticum, quam Carminativum &c. Invenit enim ista particularum tractata quon nemini transire possit, jure inter Occultas Qualitates enumeranda: adeoque Specifica Remediorum virtus, quam sepe ostendit A. aliud non erit, quam Occulta Remediorum Qualitas.

tolle & mitigat, vel homines Oculorum claros & perspicuos conservat specifice suo sale volatili blando.

Porro ad Alterantia modo dicta vel maxime etiam pertinent Aromatica, quæ odore plius minus forti, aut penetrante, & sapore acri plius minus amaricante, erasum suum in Sale volatili nicotin constitutum habent, quod in eorum Oleo distillato, totius crassi integrum possident, patet, ratione cuius cum activa sit penetrantia, adeoque Sanguinis fermentativum motum stimulat, Sal volatile nicotin Sanguinis, & consequenter Bilis augent, Calida vulgo de Siccis constituntur, ut Galanga, Caryophylli, Mentha, Rofmarinus, Callorrum, Terebinthina, &c. Ratione huius Salis volatilis oleo temperat hæc ipsa Aromatica omnem acrimoniam, cruditates viscidas resolvunt, adeoque cruditates acide & inde congeffis sordibus in intestinis & stomacho, indeque enatis flatibus, & acido in materia viscida orindis, optime conducunt: ob id etiam Aromatica omnia Stomachica, item *Carmenaria* seu Flatuum diffusiva esse solent.

Nervi porro & Cerebri, & inde compositis membranis partibus, quibus acidum quodcumque inimicissimum esse solet, optime profunt, quas fovet & recreant, adeoque eorum affectibus specifice succurrunt: ob id *Nervina*, ac *Cephala*, ac *Uterina*, esse solent Aromatica, *Menstruaque* simul impendendi dicata.

Quin & cum ipsius Sal volatile oleolum apertissimum sit, quod volatilizando & fermentando abeat in Spiritus volatiles, eodem modo analogos spiritibus nostris vitalibus & animalibus, eandem vie eorum confortativa, ac, ut vulgo vocant, *Cardialis*, proximè emanat, hinc spiritus & Aquæ confortantes: Aquæ vitæ, Aquæ apoplectice, &c. ex talibus ordinariè componuntur.

Porro ultra Alterantia sunt & generalia Remedia Evacuantia, quæ inter, præter Purgantia, sunt Diuretica, & Sudorifica: *Diuretica* sunt variæ ac multiplicitate, quæ nunc ad Renes delata eos albugunt, & impedimenta Urinæ excretionis remouent, ut Salia volatilia quæcumque, & nunc urinarius serum acciunt, ut Raphanacea, & ea Infectis pecia remedia, ut Cantharides; nunc fermentum Renum specifice alcalina virtute acciunt, ut Nitrofa volatilia; quæ inter primariè modo dicta Infecta etiam emittent.

Sudorifica verò sunt, quæ acida absorbendo Sanguini fluant, & maiorem dissolutionem conciliant, ac ita Serri uberiori & faciliore secretionem, & cum eo sordium imbutarum excretionem promouent, adeoque alcalinum plius minus sunt nature, tam volatilia, ut spiritus & Sal volatile Cornu Cervi, Sanguinis humani, Succus & Extractum Cardui benedicti, &c. quam fixa, ut Antimonium diaphoreticum, Sal Cardui benedicti, Cornu Cervi sine igne, &c.

Aur, quæ suo modo hic pertinent, *Alaxaphorica*, utiq; hæc sunt duplicitate: partim *Sudorifica*, & ita Contagia maligna efficiunt; partim *Alterantia*, & Venæ in sua crassi inveterantia & contiguitate; ut v.g. Nitrum invertit virulentiam Antimonii & Arsenici, ipsum Antimonium huius, in specie cum Nitro paratum, invertit virulentiam canis malignæ in Febribus Malignis.

Atque hæc ferè sunt generaliora Remediorum Particularium in Præi vulgaris capita. Quibus merito præcedenda erunt *Univerfalia*, & quæ pluribus Indicationibus simul satisfaciunt, adeoque pluribus in casibus applicari possunt, Remedia; quæ non esse impossibilia, præter eaperientiam PARACELSI, HELMONTII, BÜTTLE-RI, de quibus scripsit HELMONTII, item RODEN *Tract. Elæv. Arteris* vitæ, aliorumque, vel Opium suo modo probabile reddit, quibus ferè in morbis legitimo usui salutare, & quod quæcumque ferè urgentia symptomata mitigat, utiq; palliativè potius spirituum & humorum effluens motus sopiendo, quam eradicando affectus tollat.

Talia Universalia, aut ad talium naturam proximè accedentia, sunt ex Regno Vegetabili & Animalis, præter Opium citè paratum, in specie Salia volatilia oleosa, quodcumque acro causæ peccant in nobis mitigantia, & ita noxia inde inducunt corrigentia, ob id à SYLVIO deò decantata: hinc Sulphura mineralia & metallicorum: Etatè unilil ratione universaliter Acidum & Urinosum, pectus temperantia, & vi singulari anodyna quæcumque in morbo urgentia tollentia, quæ inter speciatim recensentur *Sulphura Vitalia fixa*, seu *Oleum Luli veneris* HELMONTII, & cum eo paratus *Mercurius Diaphoreticus* seu *Aurum Horizontale*, item *Tinctura Solaris* legitima, item *Sulphura Antimonialia* tam fixa, quam ex his paratæ *Tinctio*.

re Antimonii VALENTINI, & similis alia plius minis Universalia,

CAPUT II.

De Constitutione Corporis Humani Vitali, ejusque lesionibus in genere.

Medicina Optimum est Corpus humanum vivens, quatenus sanabile: Illud quidem materiale: Hoc formale. Ut Corpus hoc rectè consideretur, attendendum est tam ad ipsam Structuram Corporis materiale, quam ad ejus Actum vitale formale; Illa nempe structura Corporis humani, se habet instar artificiosissime Machinæ hydraulico-pneumaticæ; Hic se habet instar Principii moventis spirituum, & dictam Machinam dirigentis.

In Structura huius Machinæ materiali duplex Partium differentia imprimis consideranda est; nempe dum Partes quædam sunt Nervæ, seu, ut alias vocantur, *Spermatica*; aliz verò sunt *Sanguinea*. Ilic sunt nihil aliud, nisi mirabilis Fibrarum textura, quæ prima partium flamma constituit, & primitus in Ovo ea ejus colloquutione delineatur, & elongatur: His Fibris postmodum per coaguli modum sanguis hinc inde adhaerescit, unde Parenchymata sanguinea calentes; quæ duæ Partes corpi sitæ & nexa invicem coherentes, materiale Corpus Structuram constituunt.

Constant autem materialiter dictæ Partes non ea quatuor illis vulgaribus Elementis, ex quibus Corpora naturalia quæcumque constare aut componi videntur; cum talis quatenus in nemine adhuc evidenti ulla ratione, nec ulla certa vel saltem probabili experientia, sit confirmatus: sicut hoc eleganter docet BOYLE in *Cleympha Scriptis*.

Evidentissimum quidem Aquæ, Terræ, & Aëris, nemo negat; cum hæc sunt maxime portiones globum nostrum componentes, ac receptacula sen diversiora reliquorum variorum corporum: sed ad materialiter unâ cum igne omnia componant Milla? dubitatur merito: utat de Aquæ leorim considerata res certissima sit, tam Mifloram revera ingredi compositionem: ut taceam THALETIS sententiam, omnia ex sola Aqua materialiter constare, assentientis, quam hypothese jam optimè confirmavit & illustravit HELMONTIUS in suis scriptis, speciatim *Compendium de Miflorum Elementarium Elementum*: merito quoque ipsa magis illustravit DAVID van der BECKE *Tractat. Mediat. & Experimentum circa rerum naturalium Principia*.

Ignem quod attinet; Modernorum persuadent experientia, ignem nostrum usumalem (nam de celesti in corpore solari concentrato & inde in univerfali Mundi machinam, imprimis ipsos Planetas, ut & Tellurem, sub nomine radiorum & luminis evibrat, non sumus scilicet, aut minus periuadeant, eundem itidem ea sulphure resoluendo constare.) nil aliud esse, quæ dissolutionem coeponem ditorum Sulphureorum, i. e. in recessu Pinguum Acidorum, in sal particulas immediatè minimas, saltem inprimis mediante Aëre, cuius dissolutionis effectus duò insepatabiles sunt, Calor & Lumen; sicuti hoc sufficienter explicavit BECKIUS *Tract. supra citat. pag. 61*.

Viget Ignis imprimis in *Flamma*, quæ est effusio & dissolutio Fumi; Fumus verò est Flamma infusilla, coactis particulis ulterius resistentibus, elevatæ per motum Aëris, à calore paratæ: hinc Flamma quæcumque eructula abut in *Fumum*, Fumus condensatus in *Faustum*, & ita Flamma, Fumus, Fuligo, Fuliginis Oleum, Acidum pingue, sunt unum idemque corpus, per vario resolutionis aut condensationis statu, diversimodè modificatæ.

Cum verò videmus, omnia corpora fieri seu generari, nutrirî & corrumpi, successivè & insensibiliter, adeoque per minimas particulas ita ut ex minimorum horum corpusculorum syncris sit unione certa, discreti fæse separatione, metallici fæse transpositione, varia fæse, intereant, & alterentur diversimodè corpora; porus multivaria tales particulas, eæ Principia Corporum materialia ac Elementa affirmamus de quæ videtur BOYLE *Tractat. de Originis Formarum & Qualitatum*.

Cum verò omnes hæc particule sint materialitæ, adeoque quantæ, necessariò proprietates suas quantitativæ & mechanicas, adeoque determinatissimæ figuræ ac magnitudinis, certum ad se adinvenit & seum habent unde per variarum talium particularum mediante motu unionem & texturam diversâ necessariò sunt Corpora, multipliciter

horum affectiones. Particulæ tales per mutuum texturam constituunt mediantem tota corpora Milla; qui tamen motus non vagus, sed determinatus est, tam in materiae compositione, quam eius varia conformatione; adeo ut nonnisi in seminum determinata, ex istis particulis motu fermentativo à seminibus alteratis, varia efformetur Corpora.

Particulæ tales, quæ immediatè Corpora constituunt, & in quæ etiam eadem immediatè resolvuntur, numero quæmariorum pro explicandis Corporum phaenomenis commodè dependuntur, nempe sunt:

1. Salina, nempe Acida & Alcalina, & ex his duobus exitu esse falsæ.
2. Pinguia.
3. Aquosa; &
4. Terrea.

Quæ quidem sunt proxima Corporum Principia naturalia, non tamen minima Elementa, sed huius respectu potius principia sunt, ex aliis particulis simplicioribus prius contentis unde & sub resolutione in alias successivè facientur particulas, plurimum Aquas; ita ut quæ plurimas, quæ maxime videntur compositas, primo ex Aqua per multiplicem particulam Aquarum mutationem mechanica, in alias particulas modò dictas, vi seminali scilicet oriri, & tandem ultimò destructa seminum potestate tandem in Aquas redire soleant.

Sub generali enim Acidi & Alkali nomine innumerabiles Salium, tamquam particulam magis activam, diversitas comprehenditur, cum tam Usuina quam Acida mille modis pro varietate concretorum, in quibus existunt, secundum proprietates mechanicas differant; unde & tam variis modis inter se & cum aliis combinari, ac diversi spiritus diversissimè falsa falsa exiit oriri possunt, pro quorum omnium varietate speciales quædam operationes naturales explicandæ sunt in Corporibus.

Imprimis *Fermentationes* & *Effervescencias* dependent à salium activitate: est scilicet *Fermentatio* motus intestinus particulam mixturam, ortus à mixtura salium, Acidi & Alkali, resolutum in se invicem activitate, qua omnes relique missum componentes particulæ variè inter se permiscetur & agitantur, usque dum sequatur aut ultimè talis mixti resolutio, aut nova ejusdem alteratio, à salium illorum nova unione, aut saltem conternporatione, dependens. Idem plane est *Effervescencia*, nisi quod in hac puriora, adeoque accretoria existant falsa, unde & fortiori invicem colliduntur motu.

Ex talibus particulis, in specie Salinis & Sulphureis, etiam sanguis & Chylus, succi corporis nostri primogeni, consistunt, unde & consequenter totum Corpus materialiter, ex istis esse compositum: id quod confirmat resolutio ejus Mechanico-chemica.

Quod si plures tales particule coeant in unam massam, constituant *Partes Similares*, ex quarum coagmentatione *Dissimilares* exiunt: Sicut hæc ipsæ Fibra & Vasa apparent & connexa, ac inde in debitam conformationem imper huius fibrarum *Organica* Partes, certis functionibus mechanice exequendis destinatae, constituunt. Ita ut ratione materię ex qua, Partes vel Similares vel Dissimilares dicuntur; ratione verò superinductæ conformationis mechanice, secundum quam eas instrumenta certis usibus inferunt, *Organicæ* appellari solent, in quibus Organis Fibrae, harumque mechanica restura fundamentum constituunt: de quibus vid. GLISSONII *Anatomie Hepatis in Prolegomenis*.

Textura ista particulam mixturam, componens Partes Similares, constituit reverà eorundem *Temperamentum Elementale*; sicut eadem particulae texturam liquidam sanguinis componentes, quasi Crasin constituunt: unde *Temperamentum Vitale*, quod aliis in Calido & Humido consistere dicitur, in totum Corpus pro varia sanguinis materialii miscela variam derivatur.

Constituunt hæc ipsa simpliciter Corporis Machinam; jam necesse est, considerare ejus *Aditusque Vitalem*: nempe dum Machinam hæc in motu est diversimodè, dicitur *Vivere*, ut ita vitæ formaliter in huius Machinæ motu seu actione consistat: Quod si motus isti omnes penitus cessent, ita ne irrevocabiles sint, *Mortua* esse dicitur: Quod si redit & debet omnes istos motus peragat, ad quod se apta nata est, *Sana* dicitur; nam *Sanitas* est Vitæ integritas: ita verò perversè aut vitiosè, & quasi erroneè mo-

veatur, dicitur *Agrari*; nam *Morbus* est Vitæ labefactio.

Principium istud internum, quod actu & movet hanc Machinam animalem, & Vitale ab effectu appellatur, quod alias etiam speciali nomine Anima dicitur (B), non est aliquis substantia immaterialis; quia

1. In quibusdam est divisibile,
2. Quia aliis est indefectibile; &
3. Quia in non-rationalibus est plane inintelligibile.

Sed est reverà esse materiale toti viventi coexistentem, & propter aditum varietatem omnibus partibus ac argutis intempe perentis, simulque ob earundem celeritatem, vehementiam & duritiam summe activum & mobile.

Hæc & ipsa attributa non conveniunt præterquam subtilissimæ cuidam & volatillissimæ ac mobilissimæ materię, ubi id in schola Medica, analogicè licet, *Spiritus* appellatur: nempe nil aliud hoc nomine intelligitur, quam sanguis, aut succus huic analogus in aliis Brutis seu Animalibus, in subtilissimam substantiam resolutus, & easdem volatillissimus in præcediis, tam per continuam ejus fermentationem, quam non intermillam adris inspirationem; unde vitæ pro totius Machinæ actione una cum sanguine distribuitur.

Resolutus talis sanguis, & in substantiam spirituosam volatillissimus, propter crasin ejus salinum volatillum oleum, & quasi micro-sulphureum, fieri vix potest, quin cum insigni ejus localiscentia & mitigatione contingat, & fiat quasi quædam ejus accensio; vid. WILLISIUS in *Responsum Epist. ad Higiamum de affluibus hysterici & hypochondriaci*; videtur etiam HELMONTIUS *Tractatu de Jola Tabernaculum*, &c. *Tractatu de Blat Humanum*, item *Tractatu de Spiritu vitæ*.

Sanguinis ita attenuati & resoluti, & quodammodo accensæ, subtilissimæ porciones, & quasi flammæ sunt isti *Spiritus*, qui & ob id à quibusdam, luminosi seu lucidi dicuntur, cum in sua natura plures lucis proprietates possident, qui dum in sanguinis massa micant & gliscunt, *Flammæ* dicuntur; dum verò in Cerebro & Nervis liberiori lumine radiant, *Animales* appellantur: sicut hi ipsi, dum Ovæ focundant per focundum congressu, *Genitales* dici solent. Et hoc est, quod alii Animæ brutales substantiam bipartitam faciunt, nempe igneam seu flammam, & Lucidam; vid. WILLISIUS de *Animali Bruto*, CORNELIUS *van der LINDEN*, de *Animali humilis vitali*, & KOLHANS de *Spiritu animali*, BARTHOLINIUS de *Luce Animalium*, HORSTIUS de *Flammula Cordis*, SCHYL in *Prof. super Carcassum de Hæmicis*.

Pro natura tamen sanguinis, cum materię ex qua, substantia hæc spirituosæ, reverà naturæ salinæ volatilis oleosæ, seu salinæ sulphureæ esse videtur, quæ per fermentationem & adris resolutionem in sanguinem volatillissimam, & celerissima agitatione à præexistente jam in sinistro Cordis ventriculo simili substantia accensa, instat oculis Flammæ coruscant, totum corpus calefacit, & à putredinis corruptione conservat: Uno nomine, habet se instar subtilissimi & redissimissimi Spiritus Vini calefacti insigniter, & quodammodo accensæ.

Spiritus horum subtilissimæ & quasi radiosa textura lucida necessitatè mutam adhesionem requirit, quæ abrupta, & in quodam loco intercepta, non sine periculo evanescit; hinc in suspensis discontinuis habet texturæ spirituosæ in causa est, quod in momento omnis facultas principis Cerebri pereat; hinc & syncopeatibus repentè corpus frigidum, & quasi mortuum jacet.

Denique horum Spirituum, accensione quasi quadam genitorum, calor per totam Machinam se diffusit, pro operationum quarumcunque facilitatione. Non ergo *Vita Animalis* præcisè consistit in Calido seu Calore, cum quæ plurima sint frigida, & ipsa Animalia calida suas habent vicissitudines secundum magis & minus; Etque Calorem consequens quoddam necessarium Vitæ in Animalibus calidis. Huiusmodi ergo *Spiritus* volatiles reverà sunt idem cum eo, quod alii *Animam*, alii *Spiritus infusæ & infusus*, alii *Calidum insensum*, alii *Animam animalem*, alii *Flammulam vitalem*, alii alio nomine insigni verunt.

Fundamentum ergo *Vitæ* consistit in sanguine (vel succo huic analogo in aliis Animalibus non sanguineis) utpote ex cuius perva continua spirituum & concatenata est reparatio vel regeneratio: Huius ergo legitima crasis, & inde orienda debita fermentatio ac spirituositas & incandescencia, & ipsi

(B) *Partes hæc manifestissime, minime loqui Auctorem de Anima rationali immateriali, sed de substantia corporis tenuissima, & mobilissima, quæ vulgè à Medicis Spiritus Animalis vel Vitalis appellatur.*

& Spirituum inde pendens hypofthesis plus vel minus diffipabilis, radix est Vitæ sanæ vel ægræ, longæ vel brevæ, &c.

Hæc omnia Homo cum Brutis habet communia, ipsi soli propria est *Animæ Rationalis*, subleatior revera spiritualis, immortalis & inalterabilis, cum Corpore Hominis animalis nihil habens commercii, & ab œconomia animalis, ejusque functionibus planè exclusa, solas Intellectus & Voluntatis operationes immateriales seu inorganicas, sibi quæ proprias peragunt. Ex unione tamen ejus cum Corpore animalis *Sanctum* præsupponit ministeria & exercitia in intelligendo, ut occasione certarum Spirituum animalium motuum sibi format conceptus & phantasmata, unde in intelligendo pro harum exhibentibus aliunde & ipsi aberrat; sicut econtra pro Voluntatis imperio certum Spiritibus istis animalibus motum pro voluntariis motu interdum imperare valet.

C A P U T III.

MONITA PRACTICA

De Facultate Vitali.

In legitima Methodo inspicuendi Praxin, ante omnia in Corpore humano per fundamenta obfervanda imprimis differentias fundamentalis duarum *Facultatum*, totum corpus gubernantium & conservantium, nempe *Vitalis* seu *Naturalis*, & *Animalis*, harumque fundamenta. *Genesius* autem ad Animalem refertur; *Vitalis* in sanguine & spiritu *Vitali*, & inde derivatis reliquis fucis, & *Visceribus* sanguinis alterationi dicata, consistit. In his fundata est *Facultas Vitalis*, quæ conservat Corpus in Esse vitali; Hæc verò Animalis in spiritu Animalis, Cerebro ac Cerebello, & inde nato systemate nervolo & partibus nervis, radicata est. Ratione prioris ad duo instrumenta Naturæ mechanica, Acidum & Urinolum, tam in sanguine, quam Chylis, ac inde derivatis fucis, Bile, Succo pancreatico, Lymphæ, &c. respiciendum, ut horum dyscrasia, anomalie, variis motus, &c. ritè cognoscatur, & maturè emendetur: ratione posterioris ad multiplices Nervorum distributiones, & varias partium cum his connexiones, indeque natos consensus varios, probe attendendum, & hinc natis malis dolorosis ac convulsivis maturè occurrendum.

Ut res pateat clariùs, in *Sanguine* & inde derivatis fucis, &c. duplex considerandus motus, nempe vel integram Massæ sanguineæ *Circulatio*, vel particularum ejus minutissimarum *Interfusio* seu *Fermentatio*. Ab his duobus dependet proximè Vita Hominis, ita ut uno intercepto periret alter.

A R T I C U L U S I.

De Motu Sanguinis Circulatorio.

Quod attinet *Motum Sanguinis Circulatorium* seu *Naturalem*, attendendum omnino Practico Medico est, ut conservetur in equali tenore, præcaveaturque omnis ejus flagratio, vel quod impedimentum huic sanguinis affert. Præstatum id mediante Pharmacia & Chirurgia: Mediante Pharmacia per sudorifera sanguinem colligescientia, quasi attenuantia, & ita velociorem quidem, æqualem tamen motum per vasa conciliantia. Chirurgia sanguinis emissiones fuscis, quibus immixtus quantum, & lacinus, ut in vasa sinis repletis liberior sanguinis fluxus fiat. Id autem quam optime fit per sectiones tam Arteriarum quam Venarum, tam valvularum majorum quam minorum, per Scarificationes & Cunicularum impositiones, ac per Hirudines. *Effusio* sanguinis evacuationis primariæ est immensioe ad vasa quæ vitem, & ita indicatur imprimis à Plethora ad valga (ad vires enim illa non datur) tam vera quam apparente, quæ sui immutationem postulat: *Secundariæ*, sanguinis missionis effectus est sanguinis liberum circulum promovere, quod Veteribus *Phlogistis* dicitur, five sanguis flagret in toto, five in parte, ubi inflammationem parit, ac in toto corpore flagrans, affectum suffocatorium infert.

Huc etiam *Revisio*, *Aversio*, *Derivatio*, &c. pertinet, i quæ non videntur legibus Circulationis obstruere, utut plures pateat, modò rectè explicentur. (Ex hypothesi autem Veterum explicare *Aversionem*, *Reversionem*, & *Derivationem*, est impossibile: Sciant enim sanguis Circulo, impossibile est rationem dare *Reversionis* & *Aversionis*, quia impossibile est, sanguinem in aliquam partem fluentem, ex Corde per alium locum evacuando: recedere: v.g. impossibile est, ut sanguis, qui ascendit ad Oculum inilammatum per partes circulus, possit per Venam scdam Pedis, aut Brachii revelli, ut eò non fiat. Ut ergo pateat, quid de his hypothesibus habendum, dicendum, quod Venæ sectio si fiat, fiat evacuando & sanguinem immutandum) (C). Immutatio ergo sanguine, in specie si sit Plethora, tam simpliciter talis, quam secundum quid, & scda Vena, movetur sanguis omnis faciliùs, largius, & promptius, quoniam majus occupat spatium in depletis novissimè vasis. Unde & ille, qui flagrans subsistit in vasitis loco inflammationis, inflata Plethora, non adeo vehementer amplius silitur, quin potius ad motum immutatum redintegrandum nonnihil disponitur.

Nihilominus tamen queritur: an *delectus Venarum* in *Phlogistis* sit habendus? Resp. quid respectu unius membri nullus respectus habendus; si enim Vena secanda in Brachio, perinde est, five *Plethica* five *Mediana* secetur, quia amnes oriuntur ex uno trunco: Respectu autem diversorum membrorum maxime selectus habendus: Scitatur enim in *œconomia Microcosmi* duplex regio, *inferior*, & *superior*, respectu Cordis tanquam centri, quod mittit sanguinem respectu Arteriæ descendens in inferiores, & respectu Arteriæ ascendens in superiores regionem. Cor est terminus, à quo movetur sanguis; & illæ regiones, superior & inferior, sunt terminus ad quem movetur sanguis. Si ergo malum quoddam est in regione superiori, & ratione hujus Venæ sectio influenda, ac ego feci Venam in inferiore regione, verbi gratia Pedem, tunc dicitur certo sensu *Revisio Universalis*. Nam exiit hoc habemus commodi, quod dum in regione inferiori evacuas sanguinem, hic ipse propter minus obstruendum promptius movebitur inferiora versus, quam superiora, dum scilicet ex Corde erumpit in Arteriam magnam: dum enim illa inflammatione in parte superiore rami Arteriæ magnæ ascendens suet infarsus, tunc in ramo Arteriæ descendens ab amplius spariunt sanguis & Corde erumpens portis inferiora quam superiora versus propellitur, & ita revolvitur, seu ad inferiora retrahitur.

Porrò, quando sanguis in quadam regione flagrans dat inflammationem, si secatur Vena in regione eadem, in loco vicino, ubi pars affecta seu morbofa est, dicitur *Aversio seu Revisio Particularis*; sicut si sanguis evacuetur in contrario, dicitur *Revisio Universalis*: sic v.g. in Ophthalmia si sanguis evacuetur in Pedem, est *Universalis*; dum evacuetur in Brachio, est *Particularis* *Revisio seu Aversio*: dum omne sanguis superiora versus vergens, scdo insimul in loco vicino inferiore evacuetur, etque nihil aliud, quam sanguis flagrans per locum proximam evacuato. Et hæc *Aversio seu Revisio* particularis non habet locum, nisi sum prægressa fuerit *Revisio universalis*.

Tertium denique, quando secatur Vena loco affecto proxima, dicitur *Derivatio*, in qua Derivatio debet incidere in Venæ, per quas alias languis flagrans naturaliter solet fluere: v.g. pono Anguinem: In ea si Vena non in Collis, ubi sanguis flagrat, sed in Pedem locatur, dicitur *Revisio Universalis*; in Brachio quocunque, tanquam in loco eisdem regionis, si instituitur, *Revisio Particularis seu Aversio* audit; si sub Liogua Ranzine, tanquam loco affecto proximo, dicitur *Derivatio*; quoniam per has linguas in facibus flagrans naturaliter debet refluere, & hæc est *Derivatio*. Potnam ulterius inflammationem Uteri: in hac *Revisio* gratia instituitur Venæ sectio in Brachio, sed in regione seposita: *Aversio* gratis in eodem, sed remoto loco, nempe in Pedem; & *Derivatio* gratis in labii Vulvæ: scilicet apponuntur Hirudines, qui modus *hæc* & *hæc* si frequens effo falet, & AMATO LUSITANO in frequenti usu fuit.

Queritur: an hæc *Revisio*, *Aversio* & *Derivatio* adhas habeant locum ob Circulationem sanguinis? Affirmatur: verum non sensu Veterum, sed alio: de quibus Venæ sectionibus, prout Circulationi sanguinis applicari debent, vid. HIG.

M O.

(C) Quod hoc parentibus claudendi operis contradiçit in qua mox docetur A. in editioe Francofurtensi non legitur: unde patet à quopiam Venæ Sectionis opere in Vetera editioe illud quomododam ex quamparissima alia) intrinsec. Apertis quoque contradiçit rationi; nam juxta Mechanicam leges ostendit patet, quomodo constaret Sanguinis circulationem, Venarum sectionis in Sanguine missum habere passu & abest, ad Reversionem, Aversionem & Derivationem meliendam ex parte docet in sequentibus Auctore.

MORUS in *Disquis. anat. Corp. Hum. pag. 130.* Hoc negotium sane plus habet in recessu, quam æstimatione, quod demonstrabo per exempla, & rationes: Quod attinet exempla *Reversiois*, *Derivationis*, &c. seligo in **FORESTI** lib. 28. c. 67, quoniam *Reversiois* efficaciam in Muliere monstrat. Mulieri enim cum actu fluere Menies animam, aperta ei Venæ in Brachio fuit, unde subito Menstruum fuit restitutum: sed post ordinario tempore, quo ei Venæ facta fuit in Brachio, sensationem cum aliquo dolore percepit, insignem palpitationem in Brachio palpitatio fuit, quo tempore & Menstruum fluxus recurrit, & illa palpitatione non cessavit, nisi Venæ aperta fuerit. *Secundum exemplum* habet **LINDANUS**, expertus *Prædictus*, in *Collegio sue Prædis Medicis in Hannoveram*, ubi refert exemplum Chirurgi Amstelodamensis, qui laboravit Ophthalmia Oculi dextri, ad quoniam vocatus Medicus senior, tondit Venam in Brachio dextro, unde magis magisque Inflammatio fuit aucta: ratio, quia sanguis in motu fursum jam erat impeditus, unde facta apertura in parte superiori promptius adhuc superiora versus moveatur sanguis propter motum vacui adeoque Inflammatio aucta, itat enim duo rami, unus distribuitur in Brachium, alter ascendit in Caput: Videns hoc Medicus sequens die, in Brachio sinistro Venam fecavit, & exinde sinistri Oculi, intra illius, fuit etiam inflammatus: hoc videns ipse tertio die repetit Venæ sectionem in Brachio dextro, & mox ægra omnino in dextro Oculo reddita fuit cæca, unde deinde fecavit Venam in Brachio sinistro, exinde istius Oculi auxit inflammationem: His ita factis **TULPIUS** peritus vocatus statim iussit Venæ sectionem fieri in Pede, unde sensum Oculi ab Inflammatione fuerant liberati. *Tertium* dicit **GABELCHOVERUS** in *Com. 4. Ob. 92.* qui refert, quod Mulier suis Menibus Mensium applicari passiva fuit Cocurbitulas cum scarificatione in regione dorso superioris: interdiu Menes varia accidentia intraverunt, quæ, cum de veritate ægram, nec cessarent, usque ægra quod Menes in statum naturalem fuerit restituta. Revera Reversio, Derivatio, &c. adhuc certis circumscripturæ regulis: Ratio, quia non eodem amplius cum Veteribus, qui putarunt, omnem sanguinem in unum locum fluere sed omnes hæc sanguinis derivationes vel Reversiones tantum operantur, quantum evacuat sanguis, & quatenus, immutatio, sanguis consociatur liberis circulis, & sub specie, quo extra corpus effluit, dum in vasis inanis liberis est Cordo afflue, loco afflue levatur. Verum ita juvat levamen tonda, quando Venæ acta aperta, & actu sanguis effluit, quasi enim eam eodem claudat, etiam sanguis densus æqualiter per sua vasa circulari: tamen eo ipso, quo loco inactionis apponitur liberis influit sanguis, eo quod immutatio fuit sanguinis quantitas, minus fultis in loco Inflammationis, quia etiam vasa nonnulla sunt per ramos vasis facilius meretur quæ in omnino in loco Inflammationis flagant. Unde quando reversionis, primario eadem evacuat sanguinem: (1.) dum fluit, adhuc ipsi suctionem motum ad regionem contrariam conciliamus: (2.) dum densum etiam est vas, propter inanità & immutata valis, minus incrementum Inflammationis impeditur, & certum levamen ægro conciliamus. Res est facili, modo diligantur due regiones corporis. Ad hunc aliam Ventilatorum referendū est alii alius Venæ sectionis secundarii, dum nempe per accidens mediet Partu difficili, Urine suppletioni, Catui ab alto, &c.

Venæ sectio ergo Evacuatio ubique institui potest, in Ventilatoria autem certis eligatur locis,

ARTICULUS II.

De Motu Sanguinis intestino, & inde orta Carcymia.

MORUS Sanguinis, & inde naturam succorum *Fermentativorum*, præsupponit duo Salia, nempe volatilia, indigenter activa, nempe Acidum & Urinolum seu Alkali. Hæc in Massa sanguinea insinuantur Motum Intestinum seu Fermentativum, dum interat temperantur & collapsum motu per particulas sulphureas pingues, dissolvunt per aquas, sequitur per interpositionem particularem terrearum. Hæc particula Salina in fine fundamentum illius Motus, ita ut rationem Principii activi obtineant, relique verò passivi: Origo & fundamentum harum particularem, & inde dependentis Motus Fermentativi sanguinis, est ex Semine, unde oritur Crasis sanguinis materialis feminilis, quæ uti,

in quolibet Homine variis, ita exin varietas est Motus Fermentativi sanguinis, unde etiam varietas Idiosyncrasie, quæ maximas turbas dat in Praei. Propterea enim variis Crasis feminilis, sic variis Motus Fermentativus, qui in pugna tenore per legitimum usum seu rerum non-naturalium confertur, sicut per illegitimum usum harum læditur sanguinis Crasis, & consequenter vitatur Sals, indeque nascitur *Carcymia*, i. e. particularem diducum salinarum mæstie seu degeneracionis a Crasi naturali, anomalie, & varietate inde nascitur Effervescencie, quarum fundamentum consistit in his duobus Salibus, sed à statu naturali corruptis: ita ut in genere *Carcymia* fit vel *Acida*, in qua Acidum vitiosum est, vel *Alcalina*, in qua vel Urinolum vitiosum: quæ materiæ à Medico cognoscantur & emendantur.

Instrumenta Curacionis defumantur ex triplici fonte:

1. Pharmacocotico.
2. Chirurgico.
3. Dietetico.

Quoad Remedia, quæ ex fonte *Pharmacocotico* defumantur, non levis inter ea intercedit differentia: triples enim ex eodem fonte Curacionis eaduntur, qui eadem quidem habet scopum præsum, sed non eadem incedit via.

Primum Curacionis modus fit per Generalia, nimirum in genere laxando & alterando. Talei Methodum imprimis habuit **SYLVIVS** in *san. Praxi*, quem citavit *titius* *Artem Medicæ* summatim commendat, quia *facillime* est *ex perspicuo*: ubi enim qui altius in Medicina progressus fuerit, statim videbit, quid in recta habeat ejus Praxis.

Secundus Curacionis modus fit per Particularia & Specifica, dum nimirum præmissis præmittendis adhibetur Approprata, quorum usus facile quædam radii morbi demittitur: v. g. suppono aliquem laborare Dysenteria magis; hic præmissis alioque purgante Rhabarbario, Carum valde infunditur (1.) per Adstringentia, (2.) per Lac, &c. quo temperantur, (3.) per Consolida, & elique Quercus Universalis. Potius autem adhibetur Specifica, quæ sunt, Priapus Cervi, Hepatris preparatus, Crocor leporum, (imprimis Leporis nense Martini in iuga capci) & Ospre preparatum, & Similia, sociatis imprimis etiam Opacis. Qui modus curandi nupsum in Praxi observatur, hodie tamen colitur.

Tertius Curacionis modus fit per Aranea seu Panacea, not. *Remedia Polyphagia dicta*. Hæc sunt, quando Medicus nobili aliquo remedio illustratur, eo præmissis præmissis quævis ferat morbos curare tentat: *Apud* **HELMONTIVS** *Prædis*, *Prædis*, *Prædis*, *Prædis*, *Prædis* enim remedia sunt præmissa, quævis tota læpe Phlegma copiose non puratur.

Per dantur in his præmissis Curacionis modi per Aranea, consistit in eo, quod ita tantum detur Causa Materialis, & Occasionalis quævis: hinc

1. *Quidam Aranea respiciunt Causam Formalem* morborum, nimirum spiritum, cujus motum, & ergatum nōgere ac inhibere tentant. Enimvero Panacea seu Aranea imaginem habemus in Opio, Sani quædam *Aranea* (nisi exsiccantur cariosa læpe, & hella) quæ non curant passim, Opium viti adhibetur, aliisque remediis locatum.

2. *Quidam Aranea quodvis Acce*, præmissis in primis viis hærent, ac irritant spiritum, costringere possunt, adeoque dæo ejusmodi corrodere Acris in primis viis orti, dantur præ Panacea. Hojæ Panacea etiam velligium suggerit, quibus stylis vel velligium alioquin, quo præmissis præmittendis plurimos morbos felicissimè, maximoque cum lucro, curantur.

Pro bono autem intelligentia præsuppono, Causam Materialis in genere esse duplicem:

1. *Efficientem seu Formalem*, quæ est spiritus immensus formis: Nam à quocunque sunt actiones sine in statu suo, ab eodem & sunt actiones morbosæ in statu ægre: Et à quo sunt actiones naturales in corpore nostro, ab eodem & sunt actiones præternaturales.

2. *Materialis seu Causalem*, cujus præmissis occasione spiritus in hujusmodi actiones perveras abducitur, uti sunt sapor & Odor, seu Fermentum peregrinum (q. vocatur quia ut habet) à quo vel immediatè, ut in Conjugis, vel mediatè, mediastibus scilicet Humoribus, spiritus in adu effluatur: v. g. laborat quæ Feber Quartana atroci perverit causam aliquam irritantem (quæ est acidum sui generis huiusmodi) huius si ea inferat Diarrhea superveniat (quæ exemplum nuper mihi in Praei obicit), cessat proxiimum: non quidem placet (si enim paulo post plurimum recidiva) sed ad quoddam tempus. Fuit hæc Causa Materialis Acidum aliud in glandula colledum, irritans spiritum, jam qui per Universalis carnis, respiciunt saltem Causam

mot-

morbi Materialem & Occasionalem in genere, tamque ut removeant, contendant, reliqua Naturæ morborum curatrici relinquunt.

Cacoehia autem *Causa* hæc *Occasionalis* juxta HIPPOCRATEM in Intemperantia, hoc est in eo, quod Humores, vel spiritibus debet assimilari neque; vis enim *irritativa* in *textura viscerum particularum minimorum*, qua spiritibus irritati morbum producit. *Textura* hujus *Humorum materialis nucleum constituit Acidum & Urinosum*, in *statu naturali volatilis ascribitur*, à qua etiam qualitates dependent & variant. Acidum temperat ab Oleo & desinitur ab Alkali, Alkali tamen passivè se habet, informat enim ab Acido; Acidum autem activè se habet. Jam qui per Universalia coram, niji magis opor habent, quam ut corrigant illud Acidum, ne data porta quantò oculis eliminent. Obstat quia: At multa dicuntur de Bile, de Sale ejus volatili urino, à cujus turgentia multi quoque oriuntur Morbi, quæ per Acidum alterantur, Reddè, concedo id quidem: Verum, Biliis reverà est aliquid salium volatile oleolum & quando enim Biliis peccat, reverà semper peccat salium ejus volatile oleolum, quod hincbitur Acidis, Antimonialibus aut Vitriolicis, est corrigendum: sic dicunt in Erysipellate Bilem peccare, sed falsò, nam Acidum volatile peccat.

Reverà enim *Cacoehia* oritur *proximi à vitiis Acidis vel Alkali*; quæ Salia, si pro subiecto habent materiam aqueam vel serosam, oriuntur *Cacoehia Serosa*, vel *Catarrhi*; vel si materiam viscidam, tenacem & crassam, *Diarrhæia* seu *Clystia* vocatur. Unde vulgata aliàs quadruplex *Cacoehia*, *Biliofa*, *Melancholica*, *Pituitosa*, & *Serosa*, cum dictis facile conciliari potest. Nam quod Veteres vocarunt *Cacoehiam Biliofam*, hoc Moderni per Sal volatile oleolum à sanguine & Bile, à statu naturali declinavit, explicant: Veterum verò *Cacoehiam Melancholicam* jam explicant per Acidum vitiosum; quæ dum hærent in mucoviscido, exhibent Veterum *Cacoehiam Pituitosam*: dum verò diluuntur à subiecto seroso seu aquo, constituunt illorum *Cacoehiam Serosam*.

Origo ergo omnis *Cacoehia* est ex vicio Salium, à semina Crasi successivè degeneratio. Remota autem origo *Cacoehia* est simpliciter ex Digestionibus læsis, speciatim ex errore Digestionis primæ: his læsis, iudicatur Crasi omnium succorum, nōde *Cacoehia*; si vitiis statuatur Digestionis tres, si vti quatuor, si vti sex.

Tribus autem modis fit: vel ob Digestionem *viscila*, *Transmutata*, & *Transmissa*, uti distinguuntur ab HELMONTIO. Ob *viscila*, si recrementa vitiosa emittenda & expurganda retineantur in corpore, in partibus & partium cunilis: Ob *Transmutata*, si ipsæ Digestiones aberrant, vel vitiò fermenti, vel obiectorum fermentandum, ut non ritè sunt, digerenda variè mutantur, & in multiplices fordes abeant: Ob *Transmissa* *Cacoehiam* oritur, si recrementa Digestionum ex una transierint in aliam, ex prima in secundam, &c. Unde hic habenda ratio primæ Digestionis in Stomacho.

Transmutata omnis *Cacoehia* est *Cacoehia*, ut aded verum illud vulgare fit: *Cacoehia est mater Cacoehia*, & hæc consequenter *Cuckia*: nampe Digestio prima in Stomacho est fundamentum omnium Digestionum. Ex his causis oriuntur *Cacoehia Acida* & *Urinosæ*.

In specie peccant hæc Salia & (r.) quidem *sal volatile urinosum*, quod cum Sulphore Bilem constituit nimia quantitate, nimia acrimonia, interdum nimia oleositate & pinguedine, interdum singulari & anomalo viro, pro diversis ita ferunt Non-naturalium: v.g. per vapores rem explicabo: Inter Plantas Anticorbuticæ Cochlearia, Abinthium, Fumaria, &c. omnia habent Sal volatile in se, & tamen etiam in specifice Sale volatili est differentia: Similiratione & nostri Corporis Sal volatile variis modis potest variari secundum sapores, & divites ac variis modis variare fermentationem. Causæ, quæ vicio hujus Salis dant occasionem, sunt impermixta Alimenta Aromatica, item Alimenta Acra & penetrantia, quæ parriam agent, partim acris reddunt hoc ipsum sal volatile Massæ sanguineæ: Accedunt Vigiliæ, Exercitia, Iracundia, & similes affectus, qui nunc transpirant & acris reddunt, alio modo disponunt hoc ipsum sal volatile, & inde totam Massam sanguineam. (2.) Ecce tria *alibi vitiis sunt*, quando hoc est nimis excessivum, i.e. copiosum, aut quando est nimia acidum, aut quando vitiosum, i.e. sapore rancido, aut viscosè salo, aut aluminoso assesto, aut alio simili inquinatum. Ubi est nimis copiosum est inquinatum, Massæ sanguineæ spissificæ, & tardè circulantur: Ubi est vitiosum, variæ itur in effervescencia sanguinis emittuntur anomalæ, quæ Scorbucis & Hystricis fami-

liar. Causæ sunt variæ, Assumpta imprimis Acida, plus minus talia, item Aer frigidus inspiratus, qui Acido occulto videtur imprægnatus, Tristitia, Moror, Caræ, deficiens Motus, & similia augent partim, partim acris reddunt Acidum.

Hæc duo, *Acidum*, & *Urinosum*, reddè vocantur *dæ pugiles* à SWALVE *Ter de sale acido & urino*, qui continua pugna fatigant Massam sanguineam, ut fit in Fermentatione, quando aequalibus & proportionatis viribus concutitur, tandem consistit sanguis in aliquali motu & Fermentatione naturali; simul ac vero alterum deficit aut læbetur, fit vitiosa Fermentatio, & tota Massæ sanguineæ status turbatur.

Queritur: quæ *causæ acris* sunt? Resp. duobus modis: Nempe vitia hæc.

1. Alterando.

2. Vitiatis succos evacuando.

Alteratio sunt vel Generalia, vel specialia seu specifika: *Evacuatio* sunt etiam topica, vel Generalia, pluribus in casibus usitia, vel specialia, ad certam causam morbosam eliminandam determinata.

Alteratio Generalis tota, quæ Acidum vitiosum & Alkali vitiosum corrigunt, indeque naturæ præternaturalem Effectuentiam solvant, eorum amertiam in debitam harmoniam restituant, &c. ex quibus interdum evadunt Absorbentia, Precipitantia aliis dicta. *Alteratio specifika* sunt, quæ hoc Alkali, hoc Acidum, certa ratione degenerant, transmutant.

Unde qui potest per specia curant, bi respiciunt quidem ad Causam Materialem, non tamen per generalem v.g. Acidum, Dulcia, vel Amari aliquid &c. conceptum, sed per specia, quibus hoc vel illud Acidum in specie corrigunt: Sic v.g. in Pleuritide peccat Acidum, in Soda peccat Acidum, in Stranguria, exulceratione Renum, Podagra, Nephritide, Dysenteria, &c. etiam peccat aliud Acidum. Hæc distinctio non sunt usum Acidum, sed distinctio curantur. Sub quolibet affectu Acidum peccant quædam habet saporem, secundum quem nunc hanc, nunc istum morbum producit; nunc coagulatur sanguis, ut in Pleuritide, nunc Urinam inquinat, & lacit franguntur: Sic Dens Apri & Lacti piscis specialiter destruit Acidum in Pleuritide, licet generaliter per omnia Alkalia fixa converteatur: Lappi Cancrorum, Acidum aliis quodcumque corrumpit, destruit Acidum in Stranguria, &c. Hinc illa, quæ maxime hanc vel istam causam corrigunt, dicuntur *specifika*, vel *Appropriata*. Acidum enim, sicut variat secundum sapores diversos, ita specialiter sapores, aut specia horum salium vitia, nobis à priori incognoscibilia, Remedia Alterantia specifika seu Appropriata, per experientiam cogita, requirunt: Ita v.g. dum in scorbuto peccat Acidum vitiosum, non quatenus Alkali conveniunt, sed Appropriata tantum, quæ scilicet præter hoc, quod Acidum corrosivum corrigunt, etiam specifika Acidum in scorbuto corruptum, emendant: Ita lo iudicium non quatenus Amara conveniunt, sed specio illud amarissimum, Chelidonium majus, quod tamen superat Absorbentia quod ipsum præter Alkali naturam generalem, specifiem vim habet, specifikum in iudicio peccantem saporem corrigendi.

Ex hinc est, quod HIPPOCRATES, quem omnes ad hoc laudant, in de vitiis mod. (est Traditus cedro dicens) in eo totus fit, ut rejiciat Qualitates Elementares, tam ex Theoria Medicorum, quam ex Praxi, & omni conatu le monstrat Chymicum, dum defendit totis viribus, quod peccet Amarum, Dulce, Salium, Insipidum, & sex-certa alia, & quod etiam his saporibus morbofa per Medicamenta, specifios quoque sapores habentia, fit occurrentem. Igitur attendant hic Authores sapores illos, quos corrigere tentant.

Modus hic est optimus curandi, in Praxi Medica primario considerandus, & in quovis speciali casu evolvendus, in quo ipso diu experientia Chymicum, canorum manu-dictis, sunt consideranda. Hæc enim Appropriata maximum habent usum, ubi Generalia non satisfaciunt, & citò & tutè id præstat: sed expertum requirit Medicum.

MEMBRUM I.

De Cacoehia Acida.

Quod Generalia verò, quæ Acidum corrigunt, contraria Alkalica nimis Volatilia sunt, nunc fixa, tam in quanto quam in quali, vis reverà talia, quæ Acidum destruant, seu Alkalibus similia Terra, Absorbentia, v.g. ex Regis Vegetabilis omnia salia urino, vel cineritia, Abs-

fusili, Tartari, Cardui benedicti, Centaurii minoris, &c. destruantur Acidum, & coctando in liquis mutant; item omnia Aromata, & Aromaticas, qualia Abundantia, Mentha, Foeniculum, &c. Oleosa, & Pinguis, quae abundant, & quae hebetant aculeos Acidi, siue sint essentia, siue, quod melius; destillata, ut omnes Spiritus Inflammabiles, Spiritus Vini, Nalturii, Cochlearis; &c. Olea destillata, Caryophyllorum, Macis, &c. quo & Camphora pertinet. Ex Regno Animalis Acidum destruentia sunt: Spiritus & omnia volatilia, quae abundantissime ex Animalium partibus eliciuntur; ut Cornu Cervi, Crani humani, Viperarum, Spiritus Urinae, vel Salis Ammoniaci, Straginis humani: item partes Animalium minus dure, ut Cornua, Ossa, Ungulae, Lapilli Cancrorum, Maxilla Lucii piscis, Dens Apri, Ebor, Os Sepiae, Unicornu, Cornu Corsi, &c. & sine igitur, Testis Cochlearum, reliquae Cochylia, & producta Marina, quae potenter corrigunt Acidum, ita ut eorum atracha plane mutetur, & ex eis emergat sapor, utriusque. Ex Regno Minerali destruantur Acidum Sulphura Mineralium fixa, ut Antimonium diaphoreticum, quicunque Torrea fixa & Lapides, ut Creta, Terra sigillata, Corallia, Hematites, Ostracoda, Silices calciscentes, & coacta Metallica, istud absorbendo, & calciscentes: Marsi pumario, & omnia Mineralia, promississime id absorbent, & deliquescent. Post Martem emittit in tueris, saccharum, ferum, & omnia ferreusina, quae atracha Acidi saporum dulcem Cochlearium acquirunt: Aurum & Solaria comedia, habent potentissimam vim, consumacissima absorbendi Acidum, praesertim Acidum vinosum, quale est Acidum Podagricum, & ita Podagrum compescunt; specialiter quoque absorbent Acidum tartareum in corpore. Adquirunt vero haec Acidum, quaecumque Assumpta talia, vel iussu Digestio prima: in specie Panis, Vinum, &c. quae habent Acidum gravissimum nobis, maximum stomacho, unde Acidum nativum per pacem vite praesentem sustentatur, & per Vinum in recta via conservatur; si excedatur, Acidum praeternaturale fit, & sic concutit viam Digestionis primae: Acidum nam uigens possidet Dulcia, v.g. Saccharata, Mellis, &c. quae omnia, ut prima fronte dulcia, & Acidis quasi contraria videntur, in recessu tamen habent Acidum egrum, Spiritum nempe inflammacium & corrosivum, qui per distillationem est tortura, vel per fermentationem facile excitatur. Excipiuntur tamen ab his Passulae.

Per corrigendo autem Acido in genere, sufficiunt sequentes Formulae.

℞. Lapill. Cancr. prop. ℥℥.
Corall. rub. prop. ℥℥.
C. C. affi. prop. an. ℥℥.
Sal. Tart.

Affusio, vel Card. bened. an. gr. xv. vel xvj.

Olei destillat. Cameli,

Caryophyll. an. gut. xij.

Lead. epist. form. gr. v. vel vi. ad viij.

M. i. Pulvis pro 4. vel 6. doibus, S.

Pulvis Praecipitans pro aliquot vicibus.

℞. Lapill. Cancr. prop. ℥℥.

Unicoru. suffi.

Corall. rub. prop.

C. C. affi. prop. an. ℥℥.

Salis Alkash. ℥℥.

Nat. anichas. ℥℥.

M. i. Pulv. S. ad usum.

℞. Lapill. Cancr. prop. ℥℥.

Os. Sepia ℥℥.

Corall. rubr. prop.

Creta prop. an. ℥℥.

Salis Alkash. ℥℥.

Nat. anichas. ℥℥.

M. i. Pulv. S.

Pulvis Praecipitans.

℞. C. C. affi. prop. vel apud. prepar. ℥℥.

Corall. rub. prop.

Cryhall. prepar.

Terra sigillat. vel Salis Alkash. an. ℥℥.

M. S.

Pulvis praecipitans.

Uspetur ante evacuationem, ubi peccat materia acida.

℞. Salis Alkash.

Lapill. Cancr. prop. an. ℥℥.

Tom. II.

M. i. Pulv. pro duabus doibus, S.
Potio deliricus Acidum.

℞. Agar Card. bened.

Fumicil. an. ℥℥.

Spiritus Salis Ammoniaci ℥℥.

Lapill. Cancr. prop.

Corall. rub. prop. an. gr. xv.

Salis Ammon. gr. ℥℥.

Olei destillat. Caryophyll. gutt. vi.

Syr. Marshy ℥℥.

M. S.

Potio praecipitans bene agitando.

Haec sunt ingredientia talia, in genere Acidum corrigunt. Prae ceteris tamen omnibus Mars in corrigendo Acido, in primis viis peccante, primum obtinet.

Ex Volatilibus pro corrigendo, & destruyendo Acido austero hypochondrico, & hysterico talia sit Formula.

℞. Agar Marshan.

Marshy vel Rosimar. an. ℥℥. ad ℥℥.

Vin. Mart. ℥℥. vel ℥℥. ad ℥℥.

℞. Calor. ℥℥.

Spiritus Sal. Ammoniaci vel huius loco Ligu. C.

C. Jucida. ℥℥. ad ℥℥.

Syr. Fumar. ℥℥. vel ℥℥. ad ℥℥.

M. i. Pulv.

De qua capitula supra Cochlear.

Nonnumquam adduntur Corall. rub. prop. & Lapill. Cancr. prop. an. gr. xv. ad xxiv. vel ℥℥. item Olei destillat. Caryophyll. gutt. ℥℥. vel vi.

MEMBRUM II.

De Cacochymia alcalina.

Quod attinet Cacochymiam Alcalinam, hanc, & Alcali acris fuerit, quaecumque Acidum, Alcali destruentia, & in tertium salium coactum, tam fixissimum, ut Acetum, Succus Citri, Berberum, Cydonium, &c. quam Mineralium, spiritus eorum acidi, simplicis & compositi, Spiritus Vatrioli, Salis, Nigrosi imprimis, ut Nitrum probe deputatum, Nitrum Vitrialeum seu Arcanum duplicatum Myalichii, Tartarus vitriolatus, Hepaticum rubrum, item spiritus Niri cum spiritu Vini dulcificatus, qui mire convenit in Cacochymia Alcalina, duplex est causa, partim quod destruat acrimoniam salinam, partim quod fixat eius mobilitatem volatilem, quod miris in effervescencia praeternaturali erumpere possit; nem sulphura mineralia, & metallica cum Nitro fixata, ut sunt, sulphur commune, omnia Antimonialia cum Nitro sub spiritu Nitri fixata, Antimonium diaphoreticum, Benzaphonium minerale, &c. adeo sunt decantata, quae optime acrimoniam, & oleositatem volatilem temperant, indeque inflammabilitatem faciem vigunt quasi & corrigunt, hincque anodyna sunt, & medusae sudore haec fixata & correcta per poros eruantur. Nitrata quidem ratione assendi in omnibus Nitratis corrigunt oleositas, & nimia fixant, ne veniat effervescencia. Opata quoque non sunt negligenda, quae obortas hinc nimias effervescencias, palliative quidem, potenter tamen, domant, & refringunt, simulque commodos sapidos feroces spiritus compescunt; vel si Cacochymia Urinosa Oleosa, corrigunt per spiritum, & salia volatilia, ut Salis Ammoniaci, Cornu Cervi, &c.

Acidum augmentum, & ardens omnia Acidum assumpta, in specie Acetum destillatum, Spiritus Vatrioli, & Salis. Sal volatile oleosum, & inde raram bilem, augmentatum in corpore similiter quaecumque salia volatilia, tam acra, quam oleosa, & hinc omnia Aromaticas, & spirituosas, ut Aqua Cinnamomi, Spiritus Cochlearis, Spiritus Cornu Cervi, &c. item remedia Amara, qualia in Ichtero & Febribus intermittentibus usitata, ut acris reddant sal volatile oleosum: v. gr. ex Abinthio, Centauro minor, Chelidonio maris, Mentha, Olea destillata aromata &c.

In specie pro corrigendo Sale volatili acris seu bilioso, indeque nata phlogosi, alvi fluore bilioso, fixi, &c. v. g. in Febribus ardentibus.

℞. Niri antimoniat. ℥℥.

Arcas. dest. ℥℥. vel ℥℥.

Benzard. minor. ℥℥.

M. i. Pulvis.

Div. in 3. pul. seq. S.

Pulvis refrigerans pro tribus vicibus.

℞. M.

℞. Nitri antimoniati. vel Arseni. dupl. ʒ℥.

Beznard. miser. ʒ℥.
M. pro duabus dosibus.

℞. Nitri antimoniati. ʒ℥.

Arcan. dupl. gr. xv. vel ʒ℥.

M. f. Pulvis.

Item.

℞. Ebor. fusc igne.

Pulv. Symp. rub. an. ʒ℥.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. par. equal.

℞. Pulv. Symp. rub. ʒ℥.

Lapill. Cancr. prop. ʒ℥.

M. div. in 2. vel 3. par. 5.

Pulvis digestivus: dosi una mane, alteram vespere.
Usurpetur ante evacuationem, ubi peccat Sal volatile oleosum.

Item pro eodem scopo:

℞. Aqua Acori.

Rubi Mai an. ʒ℥.

Succ. Citeri rec. vel Cydon. rec. ʒ℥.

Antimoni diaph. ʒ℥. vel ʒ℥. ad ʒ℥.

Beznard. miser. ʒ℥. ad ʒ℥.

Syr. Rubi Lili vel aceti. Citeri ʒ℥. ad ʒ℥.

Spir. Nitri dulc. q. l. ad gratiam.

M. f. Potio, D. 5.

Potio refrigerans, & alterans pro aliquot vicibus.
Usurpetur pro aliquot dosibus, pro dosi cochl. ij.

℞. Aqua Rubi Mai ʒ℥.

Succ. spinel. ʒ℥.

Antimoni diaph. ʒ℥.

Syr. Rubi Id. ʒ℥.

Spir. Nitri dulc. q. l. pro grato sapore.

M. D. 5.

Potio refrigerans & alterans pro aliquot vicibus.

Utraque vero, *Acida*, *acempe*, & *Alcalina visiosa*, temperata, & quasi obducendo corrigunt, remedia Sulphurea, Pinguis, & Oleosa, ex omnibus tribus Regnis, quae quasi cathedra creberrantur, tam volatilia quam fixa. In *Aqua Vegetabilis* temperata sunt imprimis Emulsiones ex Seminibus oleosis, v.g. Amygdali dulcibus, Pinea, Filicis, Scamillebus quatuor frigidis malis, & minoribus, Papaveris albi, &c. Haec siquidem oleositas hanc temperant omne Acre, Acidum & Urinofum, in corpore: quod etiam faciunt Olea destillata Vegetabilium, sed cautius usurpentur ob oleositatem, quae valde insistant: Mucilagines, & Gummi Arabicum, Tragacantha, Saccharum, Glycyrrhiza, Althaea: Malva, & omnia ejusmodi Emulsionaria, Olea sicculeata, Rapae: item Opista, sed palliando, Ex Animalis Regni Lac, Serum lactis, item Gelatina Animalium, &c. Praeter ceteris, Sulphura Mineralium, & hinc Metallica fixa, sunt adeo nobilia, cum non solum temperant aciem Acidum Acre in corpore, & hinc Cacochymiam: sed etiam simul vel Aeschyria praedita sunt, adeoque haec Sulphura fixa in tanto pretio apud Practicos habentur, quatenus ad Universalium Remedium classis propius accedant, id quod Sulphura Antimonialia, ex quae his paratæ Tincturae item, Tincturae Solis, &c. sufficienter confirmant. Pertinet hac quoque Aqua Caloris vitae.

MEMBRUM III.

De Cacochymia pituitosa, & serosa.

Tertio quoque radicanter salia peccantia in subiecto, sive viscido, sive seroso: unde *Cacochymia Pituitosa*, & *Serosa*. Facile ex Cacochymia Serosa oritur Viscida, & nonnunquam in certis solum partibus, ubi frigus accedit, vel ubi causet, v.g. in Arthritide vaga supervenit fæpe fissor morbus, v.g. Icthis, Podagra, Chiragra, Nephritis, &c. sine dubio ex Pituitosa Cacochymia.

Cacochymia Serosa Evacuacionibus, & Serum seu Lympham alterantibus, saltem tollitur, si verò haec Salia hanc in subiecto viscido, & *Cacochymiam Pituitosam* constituunt, corriguntur per Alterantia, Incidentia, Attenuantia, & Resolventia: imprimis per Salia Alcalia fixa, volatilia & salia, quae aculeis suis penetrant, & ita coagulata plura minus indurata, mollia & fluxilia faciunt: quo pertinent omnia salia digestiva dicta, imprimis Tartarus, qui est con-

crementum salsum, & corrigit mucus viscidum serosum, qui dicuntur Cacochymia Pituitosa, & Tartarus, ut Cremon Tartari, seu Cryalli Salis Tartari, Tindiana Tartari, Spiritus Tartari, Salis Ammoniaci, Sal volatile Tartari, Spiritus carminativus Terra solata Tartari, ex quo Liquor, Tartarus vitriolatus, semper generatur, quae paratur, ad imitationem TACHENII in *Clave Medicinae Hippocraticae*, est nobile remedium: item Arcanum duplicatum Myrsichii, quod est sal polychrestum, multi usus in Praxi, item Sal Ammoniacum, sal digestivum hypochondriacum, &c. quibus subinde aut Lapilli Cancriferi, aut Corallia preparata, aut simile quid, ad infringendum magis acida admiscenda imprimis Gummi, Sagapenum, & Mastiche, Myrrha, in specie Ammoniacum & Galbanum, quae omnia mirabiliter conferunt in attenuando succo viscido: Spiritus Aeris viridis, Gummi Ammoniaci cum Eryngio, Acetum destillatum, Spiritus salis dulcis, Oxymeli, &c. hic sunt optima, necnon Vegetabilia aromatica acriora, seu salia volatilia oleosa, valgo Aperientia, & Febrifuga dicta, visciditatem incidunt, & ita magis abundanter mere solent: ut Abiathium, Carduus benedictus, Centaureum minus, Tanacetum, Mentha, Armonia, & Rosmarinus, Fenniculum, Angelica, Galanga, & omnia incensumura: sicut de Colocythide notum est, quod itidem in mucro viscido probe conducit.

Sic ergo Digestivum, permittendum purgationi pro indebita materia viscida pituitosa, ut subsequatur evacuatio sanis doloris, & torminosa.

℞. Tartari vitriolati.

Salis Hypochondriaci. an. gr. xv.

Alysch.

Card. bened. an. ʒ℥.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. par. equal. 5.

Pulvis Digestivus pro duabus vicibus.

℞. Tartari vitriolati. ʒ℥.

Salis Card. bened. ʒ℥.

Flor. Salis Ammoniaci val. gr. xv.

M. f. Pulvis.

Div. in 3. partes.

℞. Tartari vitriolati. ʒ℥.

Lapilli Cancr. prop. ʒ℥.

Salis Tart. ʒ℥.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. par. equal. 5.

Pulvis Digestivus pro duabus vicibus.

℞. Tart. vitriol. ʒ℥.

Salis Alysch.

Lapilli Cancr. prop. an. gr. xiv.

M. f. Pulvis.

Div. in duas vel tres partes equal. 5.

Pulvis Digestivus pro aliquot vicibus.

℞. Crem. Tart. ʒ℥.

Tartari vitriolati. ʒ℥.

Salis Alysch.

Cichor. an. ʒ℥.

M. f. Pulvis.

Div. in tres partes equal.

Capiantur una vel altera die ante evacuationem.

℞. Salis Ammoniaci depur. ʒ℥.

Melich. ʒ℥.

Cinnam. ʒ℥.

Salis Alysch. gr. vj.

D. 5.

Pulvis Stomachicus pro 4. vicibus.

Usurpetur bis in die, mane ante prandium, & à meridie aliquot horis, duobus praeter praeter ceteram.

In forma liquida:

℞. Aqua Mentha ʒ℥.

Arcan. dupl. ʒ℥.

Lapilli Cancr. prop. ʒ℥.

Sal. Tart. gr. v.

Syr. de Myrs. ʒ℥.

M. 5.

Potio Digestiva pro duabus vicibus.

℞. Liq. Tereb. sal. Tartari ʒ℥.

De S.

Digestiva Effluvia.

De qua copiantur mane, & à meridie 30. vel 40. gutta.

℞. Aqua Ment. ℞i.

Cinnamon. ℞ii.

Gummi Ammoniaci Aceto sol. ℞.

Tartari vitriolati. ℞i.

Syr. rosar. ℞i.

Misc. pro duabus vel tribus dosibus.

Assumpto Digestivo, propinetur Purgans sequenti die, & sic salubris operabitur, & sine molestia.

MEMBRUM IV.

De Succorum Cacochymicorum evacuantibus univ ersalibus.

EA, quæ Cacochymia vitiatos succos evacuat, suæ varia, vel Universalis, vel Particularis: Universalis hæc totum evacuat corpus, operatio tamen ejus ad totum corpus machinam se extendit: Hæc igitur triplici sunt differentia: vel enim sunt *Emetica* seu Vomitoria; vel *Cathartica* seu Purgantia, in specie sic dicta, per inferiora; vel *Diuretica* seu Urinam citantia; vel *Diaphoretica* seu Sudoriferum; vel *Salivaria*, seu quæ Ptyalismum concitant, nempe cum Mercurio facta remedia. Hi sunt quinque modi Remediorum Evacuantium Universalium. Particularia verò sunt *Apoplegmatica*, *Erythra*, *Stomatocaria*, item quæ interdu ex Utero, Ano, & Vesica excreant: de quibus in *Infusuribus* sufficienter egit.

TITULUS PRIMUS

De Vomitoriis.

Nunciat agam de Evacuantiis Universalibus, & primo quidem de *Vomitoriis*, quorum hæc ingens est copia in omnibus tribus Regnis. Si tamen selectus Vomitorium esse instituerimus, ex *Regni Animalis* nullum, quod sciam, prodest Vomitorium, excepta *Rana Ursinum humanum*. Hæc enim per noctem Vino generoso infusa, manequæ filtrata ac hausta, egregium est Vomitorium; quod etiam Nobilissimi GNOFFELLI, *Medici Regis Polonia*, experitior censere fuit. Ea *Regni Vegetabilis* Alarum, Nicotiana, Helleborus albus, Oleum Olivarum, Succus Raphani rusticarum, Joli Sambuci & Ebuli cum Aceto & Oleo Olivarum præparati, Oleum ex arillis Baccarum Sambuci, & Succus Ventricularis.

Inter hæc excellit *Alarum*, quod tamquam optimum Vomitorium jam dudum innotuit: Nam in DIOSCORIDE (tamquam in Patriarcha, qui primò de Materia Medica scripsit) probat, quod Alarum purget, plegma evacuet, &c. in hoc Alaro singularia sanè reperiuntur. Nam folia & radix saporem habent insigniter acrem ac mordicantem, qui in sua differentia crassissimè immutat saporem Zingiberis, vel Zedoaria. Ab hoc Sale effectualis acris dependet primò vis vomitocia; cum enim particule hæc acres, membranas ac fibras Ventriculi, imprimis copiosiores circa Pylorum, vellicant, fibræ istæ contrahuntur, sicque Vomitus excitatur. Præterea & attendendus sapor iste acris specificus Zedoariae stimulus, à quo vis alterativa dependet, item Febrium Chronicarum, & Quartanarum curativa, item vis quoque Urinam citandi, Splenemque inflatum corrigendi. Hæc omnia ex ipsa Alari textura deservenda. Præterea etiam notable est, quod Alarum planta sit hyeme latissimè virens, ætate verò marcesca, certo iudicio, continere id singulare balsamum: conf. CARDILUCII Tract. egregius de *Phlo*, in quo de hoc Alaro non inielegantem habet dissertationem.

Dia etiam, quod Alarum curat Febres. Notum est, quod STROBELBERGERUS (optimus filii temporis Medicus) in Tract. de *Morbis curandi febres*, contra Quartanæ maxime commendat, si omnium teras vice in Vino calido, imprimis ingruecente paroxysmo frigido febrili, dosi à ℞i. ad ℞i. cum ℞ss. Piperis albi hauriatur. Verum methodus hæc est vana. Concedo quidem, impossibile esse absque repetito Emecetorum usui curari posse Quartanæ. Concedo etiam, quod optimum sit antiquitatum. Tentavi hoc, scilicet Alarum cum Pipere longo; & certè, si hoc aliquoties repetatur, Quartana cessat. Par ratio est in remanentibus Tertiana chronicæ (quæ quod diuturniores, eo

peiores) quæ repetito huius Alari usu curantur sanant. Modus igitur curandi ac nendi Alaro est triplex.

1. (Pulveris.

2. (Infusi.

3. (Decocti.

I. Quod Pulverem, observandum: quod exallius Alarum hoc aliquid redigatur, seu minutius pulverizetur, ad mellis Pomatum, Urinam, & Sanderis oles; particule enim ejus eo melius se infundunt pollicetur Ventriculi plicis: *Emecetæ ergo modo pulverizatum Alarum non tam bene operatur, sed alvum magis laxat.* Datur adulto à ℞i. ad ℞i. Rullico verò robusto ad ℞i. propinetur in Vino calido generoso in Febribus & quidem haustu paulo largiori.

II. Quod Infusa: reperiuntur Folia viridia.

Pro Infusa remissiori.

℞. Fol. Alari No. 12.

Quæ scindantur in fragmenta minuta, infundantur quæ per noctem in

Aqua Card. bened. ℞i.

Hydramel. simpl. ℞ss.

Manc Celatura detur, quæ mitius purgat.

Pro Infusa fortiori.

℞. Folia Alari virid. etiam No. ix.

Terantur in mortario, vel marmoreo vel lapideo alio, addendo Hydramel simpl. tamdiu, donec Folia in succum redigantur: hoc deinde diluatur cum

Aqua Card. bened. ℞i.

Etque præparatum Vomitorium.

III. Quod Decoctum, si decouatur radix Alari in Aqua, amittit vim Vomitoriam, & tantum fit Diureticum: si autem in Vino decouatur, manet vis Emetica, atque Vinum Emeticum. Primus observavit hoc HELMONTIUS, confirmavit verò ZWELFFERUS, & BOYLE in Principiis suis Philosophicæ. Ratio in suspensio est: Dicam quod sentiam: Superius diai, vim Alari alterativam in Sale effectuali suo non adeo volatili consistere. Dum igitur in Aqua decoquitur, partes salinæ volatiles avolant, Decoctum amaricat, & fit tantum Diureticum: Si autem in Vino decoquatur, penetrat Vinum testuram concretæ, atqueque scilicet particule avolent saline. Decouatur etiam Radix Alari cum Hydromelle, quod tamen non est Emeticum, sed egregium potius Pectorale, mucum Pectoris optime incidens.

Igitur solum tantum inter Vomitoria Vegetabilia excellit Alarum, reliquis sunt vitanda, imprimis ex Nicotiana;

nam subinde excruciat ægros miserè.

Hinc reiticio in specie Tabacum, potentissimum Vomitorium, & quidem eo summum, quam habet, violentiam. Sanè Olei Tabaci guttula una, vel altera summe est venenosa; Videmus enim quoties in corpore nostro excutitur turbas; unde metuendum, ne gravissima ac periculosissima eandem oriantur symptozata. Scio Infantes, qui Unguento ex pulveris Tabaci, in Tina capitis illito, in convulsionibus, cardialgiis, hypochimis, cholera, sudorem totius corporis, &c. inciderint. Usurpatur autem Nicotiana pro Vomitorio triplici potissimum modo:

1. In Fume; si enim parum fumi deglutitur, mos fit Vomitus, in non affectus scilicet.

2. In Infusa; si infundatur Vitis, ac sicutum mane bibatur.

Vel

℞. Tabaci opt. Virgin. qd. pl.

Infundatur cum Spiritu Vini q. l. per noctem:

Manc propinetur de Colatura coctile unum, & facit mirè præstat Vomitus.

3. In Masticatione; si scilicet Pili magistraline Tabacum mulicatum cum saliva in Ventriculum descendit, subito excitatur Vomitus.

Caveamus igitur à Nicotiana. Potest autem corrigi ejus venenam per universale Vegetabilem Venenorum corrogionem, oimram per Salem Tartari, & per Nitrum fixatum; hoc enim additum exhibet Effluvia parum vel nihil emeticam, sed econtrà quibundam laudatur in Emphysema, Asthmate humido, in specie verò *Synops Nicotiana*. Cum autem alia tutiora proleat, hoc facile carere possumus.

Reiticio Helleborum albus; utut enim apud Veteros fuerit utatissimus Helleborismus, tamen quod Helleborum albus in desuetudinem abiit. Dicit nequit, quom stupida symptomata inferat Helleborus albus. Non datur in omnibus tribus Regnis viciois Emetico-cathartico remedium, quom Helleborus albus, quod expertus loquor. Scio mulieri eundem Materialistæ nodulum ex Helleboro nigro parare, ministrari verò Officinæ infundunt Helleborum al-

bum, hinc secuti vomitus, cardialgia, sudores frigidi, &c. Ego stupescit statim periplexi, Helleboro fuisse album sane, præter supra & infra dictam hypercatarrin, adeo economiam animalæ afficit, ut suffocationis periculum imminuat. Nihilominus tamen in *Sternutatoris Apollinari* tantum locum obtinet, alii nulli auctor esse, ut eo nec gesserat, nec interire uletur.

Veteres quidem Helleboro alio frequenter uti fuerunt; Verum hic longè robustioris constitutionis fuerunt, vel isti in Græcia Helleboro alio gavili fuerunt miore, & Climatæ ratione nimis truculentæ: Notum enim est, variare vires Medicamentorum præ dispositione Climatæ. Accedit, quod ipsi non abique Vitis generulo alii Helleborum album adhibuerint; hinc nullum dubium, quoniam dulcedo Vitis temperare acrimoniam Hellebori potuerit. Unum tamen monito: *Mavis* est affectus curatu difficillimus, qui *sive Vomitus curari nequit*. Jam Maniaci post Antimonialia, & assumpta Vomitoria, parum levantur; hoc autem unicum est genus purgans, nimirum Helleborus albus, inque hoc casu totò & necessario usurari potest: Utque enim operentur Antimonialia, tamen id nulla cum *Atropia* fit; Solus ergo Helleborus albus est, qui vi specifica alterativa juvat Maniacos.

26. Ad. Helleb. albi 3i.

Infund. Vitis, coquantur, ut maceretur primò per noctem in loco calido: *Præcox* hoc prius collam abiciatur; est enim nimis acre, radice residua *Vitis* *Albanam* superinfundatur, & hoc cum radicebus in infusione stet per noctem. Mane Calatura detur à 3ss. ad summum 3ij. hinc propinetur Maniacò, à quo cunctabitur Maniacus; horum enim est Specificum.

Potè rejicio etiam triuale Vomitorium, scilicet *Oleum Olivæ*, cuius unc. v. cum Aqua tepida misceat: sed nocivum est Vomitorium; nisi enim inde laxatur tonus fibrarum & membrarum Ventruculi, unde potè propter atoniam debilis redditur Ventruculus.

Rejicio etiam Vomitorium PLATERIES succo *Raphani* sufficit, non vulgaris, ab *anc. li. ad anc. lii.* cum Hydromeli- te propinatum. Est Vomitorium subinde potens, sed in Ventruculo robustiori sæpe paulo diutius hic succus moratur, atque in mucum Ventruculi, ac eundem resolvit, unde gravis inflatio oritur.

Jure Vomitoria Vegetabilia etiam numeravi *Julus Sambucus* & *Ebuli*: Hic cum Aceto & Oleo Olivarum in forma Acetarii parantur, de quibus aliquot buccellæ sumptæ, potè operatur. Dosis tamen est inserta, nunc plus nunc minus sumitur, hinc etiam incerto modo operatur, ac deinde quæ conseruat ægri de debilitate Ventruculi; atoniam enim Ventruculi relinquunt, Equidem *Oleum ex Arillis Baccarum Sambuci* expellunt, paucarum gutturum dosi exhibitur, potens est Vomitorium, unde & à *BLOCHWITZ* contra Ictericum laudatur; sed cum Alarum potius præstet, hoc sufficere potest.

Denique *Sedum minus* seu *Perfoliatus*, unde *Illecebra* & acerrima planta antifebricitans est, cupis succus cum Vitis expressis potentem Vomitus ciet. Novi quid in Febris Tertiana certum hujus habet effectum, si scilicet hujus recentis cum Vitis tritæ ac subactæ Vermiculæ fuerit expressis ante paroxysmum laudatur. Quidam etiam de cet septimana Febris Tertiana confictus, succo hoc liberratus fuit.

Pergo ad *Regnum Minerale*, quod suggerit *Vomitoria Antimonialia* & *Violacea*: omnium optima, potentissima, & tutissima sunt Antimonialia; *Violacea* & *Mercurialia* Vomitoria stomacho membranoso maxime sunt hostilia, summeque præferuntur ejus robur, hic specie *Sai Viridi* vomitivum, quia Ventruculo valde adhæret, quicquid de hoc *ANGELUS SALA* dicit; adeoque paucæ Antimonialia ritè usurpata sunt iustarum emulorum. Et quidem per aliquot Ventruculi millenaria fuisseit oacum *Vitis Antimonia*, tam in forma liquida quam sicca, & in casu rigorosis ad *Vitis Minerali Cretæ* vel *Myrsinæ* confingendum. Jam de Vitis Antimonia dicendum, & quare illud elegerim, etiam tradendum.

Antimonium est Metallum suo modo imperfectum: id autem quod proprie vocari debet, est Regulum, in quo ejus textura metallica potissimum consistit, hic proprie est Antimonium, reliquum tantum est Sulphur commune minerale copiosum, utque enim facie nigra apparet, tamen est purum Sulphur commune. Jam ergo cum Regulum sit Metallum imperfectum, simili modo de Acido & Urinosa, i. e. de Sulphure & Mercurio partietur. Notandum: *Quia in Regno Vegetabili videntur Arida, & Urinosa, ita in Regno Mi-*

nerali Sulphurea & Mercurialia dicuntur, ita ut io quovis Metallo sulphureo lateat Acidum, & in quovis Metallo Mercuriali Urinosa etiam addit: Igitur Antimonium seu Regulum etiam Sulphur, & Mercurium habet, Sulphur hoc Antimonium internum est de natura Solari, seu ad perfectiorem Sulphuris Solis proximè accessu ita ut Aurum imperfectum, aut in fieri adhuc; præter vero Mercurialis accedit ad naturam Saturni, quem etiam quidem ex Antimonio parare conantur; saltem quod Antimonium gaudet Sulphure Solari, coque non adeo fiao, necnon adeo volatili: Igitur Regulum Antimonii à Sulphure externa purgatum alii *epi subpositum Lapidis Philosphorum elegerunt*, vocaruntque Saturnum Philosphorum: conser. *SCHEEDERUS Pharm. 13. cap. 11. pag. 421.* Utque enim Saturnus dicitur *Pater Dierum*, ita Antimonium etiam sic vocatur, cum ex ejus Sulphure fixato à Sulphure externo depurato ac magis fixato Lapidem Philosphorum elaboratur fludent; Videatur *PHILALETHÆ* (Scriptor est Anonymus, Anglus tamen) *Intreitas ad apertum & occultum Regis Palatium*, & *M. A. N. C. Append. Anni* (hæc cuncta) ibi hujus Lapidis Philosphorum fit mentio: conser. huius PANTALEONIS *Temple Hermæ apertus*, ubi Procelsum *PHILALETHÆ* examinat. Hic jungatur *BECHERI Supplementum secundum*, & quod præparationem Lapidis Philosphorum in via ficia, sufficit ejus demonstratio.

Igitur io Antimonio duplex est Sulphur; Æternum, & Internum.

1. *Æternum* est minerale illud, quod Regulo adhæret.

2. *Internum* est ficius, ad naturam Solis accedens, quod cum Mercurio Regulum Antimonii constituit.

Quod Æternum, illud minerale non differt à Sulphure communi. Probatur: fumatur Aqua fortis, & incinuitur strassula Aëronium grosso modo confusa, sic operatur Aqua fortis in Regulum; nimirum acidum minerale rodit Regulum, contra Acidum fici Sulphur externum separatur; tunc cum coheret in aqua calida accipitur perfectum Sulphur, non differens à Sulphure communi, nisi quod per se viridius, quam commune Sulphur. Alio autem modo elicitur Sulphur Antimonii.

27. Antimoniæ q. pl.

Hic pulveris affundatur

Oleum Viridi restitutum.

Deficientur per retortam, sic sublimabitur

sufficiens Sulphur.

Sulphur hoc minerale nudum si usurpetur, vim cathartici- gam, Regulæ autem handum, nullam possidet.

Quod alarum Sulphur ficius metallicum, h. e. naturæ Solari. Differentia utriusque hujus Sulphuris patet in præparatione Reguli Antimonii; Antimonium enim cum alcalis ficius Regulum amittit, arripitque tantum Sulphur commune. In specie strassula Antimonii non fit, nisi quando Sulphur externum penitus exhalaverit.

Dicendum igitur, quid sit *Vitrum Antimonii*? *Vitrum* in genere est concretum artificiale, & simplicissime unita, compositum nimirum ex Arena & Alcali Cinerum. *Præ* hoc ex *volatilibus*: Acidum enim Arenæ rodit Alcali Cinerum, hinc colligata ac junda in Vitrum abeunt. Par ratio est, si ex Arena, vel Saturno calcinato & Minio fiat Vitrum Saturni, aut si cum Lapide Pyritæ fici Arenæ fiat Vitrum Saturni, *Præ* id alterius per *volatilibus*, si Vitrum arte factum cum Salis fici aqua colligata in crucibulo, post in aqua solvatur, sic precipitabitur per Accutum Arenæ, quæ forma pulveris in fundo remanebit. Vid. quod Theophrastus Vitrarum, præter TACHENIUM in *Hesper. Chymicæ*, BECHERIUS in *Vite Minera aëria præparata*.

Jam videtur, quale sit *Vitrum Antimonii*? Constat igitur hoc ex Acido Sulphuris hioris colligati, & arduum cum parte Alcalina Mercuriali jundo: Acidum enim Sulphuris Antimonii paulo ficius mediantè Sulphure arripit substantiam Saturninam, quæ duo coalescent in pellucidum vitrum: hinc *præ facilitate hanc facilitatem Viri addit* *Boron* aut *Sai Tarsari*, quæ sunt Alcalia, ac motum interitum augent, floasque Vitri Antimonii promouent. Jam differentia videtur inter Vitrum commune, & Antimonii: Videtur DAVISONIUS in *Vite Pyritica* (Scriptor rarus, sed elegans): Nimirum in *Vite communis* imprudenter jundæ sunt *ficius*, *ficius* *nitæ*, & *Viridibus colligata*; quæ omnia in *nitæ* *græda* *fiunt* in *Vite Antimonii*. Nam

1. *Vitrum Antimonii* fluo fluxu potè adhuc sublimari, quod non fit in Vitro communi.

2. *Vitro Antimonii* aliquod decidit, si infundatur, *Vitro* autem *communis* totum nullo modo potè aliquid absumi.

Jam igitur queritur: *Quare in specie Vitrum Antimonii fignatur pro tot Croci, Symplicis, &c. et Antimonii parandis* Recipe. Ut in omni Evacuante, parva violenta in huiusmodi, attendenda visaliterativa specifica respectu morbi; ita & hoc in Antimonio attendendum. Nun fufficit ut Evacuans seu Vomitorius, sed & Anodyna temperativa analgetica, quae in eius Sulphure fixari laet, attendenda est. Dum paratur Vitrum Antimonii, separatur Sulphur externum, & tantum permanet fixius Sulphur internum solare cum paucodmodum Sulphure externo minerali perlicuissae adherente.

In hoc Vitro Antimonii habetur.

1. Ex Antimonio visaliterativa particularem antimonialium vomitum stimulat.

2. Ratione Sulphuris fixioris interni iuncti, & remedium confortativum, temperativum, ac corrosivum acidi corrosivum. Preparationem & correctionem Vitri Antimonii videbitis in Collegio nostro Glycimo & Pharmacopoeia.

Jam dicam, in quo conficitur vitri Antimonii Emetica, Alterativa, & Anodyna &c.; est enim nictus venenum, sub quo elegans medicina latet. Duali parat, Sulphur externum non purgare, sed tantum Regulam: fixior in portione exterioribus Antimonii vitri Emetica conficitur. In quibusvis enim Antimonialibus Purgantibus acido Sulphurum, cum substantia Saturnina coalescente, fit concretum Vitriolicum, à quo origo molliora Ventriculi, & consequenter Vomitus, hoc est, quod alii dicunt, in Sale fixo Antimonii esse vim Emeticam. Dubio exemplum: Gussert parum Mercurii vitæ, & super vitriolicis nauticandus se exeret: in hoc enim via Emetica Mercurii vitæ consistit; quod probat: si enim loco Aquae communis cum Oleo Tartari per deliquium præcipitur, longè mitius operatur; acidem enim infringit alkali, ut magis salis evadat. Pari modo Vitri Antimonii effertur vitriolicis: huius particulae vitriolicæ Ventriculi vellicant, ut exinde Vomitus sequatur e. g. solæ particulae acide plingens sunt, quæ acré quovis volatile finem, & impetum spirituum blandi vi anodyna fissent.

Antequam igitur ad utendum modum accedamus, quædam Dubia finitenda: Dubium scilicet fuit in Regula particulari, iunctis cum Mercurio & Sulphure, consistere vim Emetico-cathartica. Obicit quis: quod omnis Crocus Metallorum conficitur simpliciter ex Sulphure Antimonii externo, & nihilominus habet vim egregie Emetico-cathartica. Respondeo: Verum est, esse Sulphur externum, quod Crocum constituit, sed non solum; insunt enim etiam partes Regulinae, ut et panice, fuffientes tamen, à quarum particularum consuetio, Sulphuri externo adherentium, Croci Metallorum via cathartica dependet. Nam ut mediantibus Salibus alcalicis fixis separatur ab Antimonio Sulphur externum, quod est acidum, Salia alcalia huiusmodi imbibunt, & sic Regulam dimittunt: Sulphur autem Antimonii externum dum per alcalia dissolvitur, acidum rodit alkali, & sic semper huiusmodi aliquid de Regula Antimonii adhaeret, ut in huius ratione vim Emeticam habet; si quis enim ex Croco Metallorum exacte partes Regulinas separare posset, ceteris fere, illum nullam vim Emeticam haberetur. Alterum Dubium est, quod dixerim, sub calcinatione Antimonii fumum exhalantem, & in Flores sublimatum esse Sulphur externum Antimonii, & tamen hic Flores albi seu Fumus huiusmodi summe Emetico-catharticus, ita ut non in substantia, sed in infuso tantum usurpari queat: Respondeo: ut Sulphur externum sub igne quodvis metallicum secum rapit, sic etiam hic Sulphur externum rapit secum ex Regula plures particulas Regulinas, à quibus vis Emetica dependet.

His remotis, consideremus Titum, seu parum utendi modum: Usurpare tantum in Infuso cum Vino Rhenano, & Syropo; antiquum vero, quomodocumque etiam correctum, in Substantia cruda enim Antimonialia assumpsa cum Infusum, siquidem necia sunt, aut ad minimum fallacia. Recipiuntur in specie Vitri huius Antimonii, vel Croci Metallorum, vel Mercurii vitæ, qui gemina est Antimonii præles, gr. v. aut plura, infunduntur in Vinum Rhenanum, filtratum bibetur, ut sequatur Vomitus; quia Vinum Rhenanum est acidulum, & optime imprægnatur antimonialibus particulis: siue multum fere parum de Antimonio infundatur, nihil refert, modo determinetur quantitas Vini hauriendi, non quantitas Vitri aut substantiae antimonialis infundendæ: quia liquor recipit, quantum recipere valet. Si enim gr. v. vitri Antimonii Unciis tribus vel infundatur, eundem effectum habebunt, ac si gr. x. infunderetur; nam vis Antimonii est inersantia, ut docet WALESIUS in *Methodo medicandi*: Macerare ergo ratio Vini, non Antimonii. Optime præparare docet KERCRINGIUS in *Comment. super Curam trinum phleg. Antimonii* Bassili Valentini pag. 144. & 169.

Præscribitur igitur extempore:

℞. Vitri Antimonii vel Croci Metall. simplicis, ana albasitiae, vel Mercurii vitæ gr. iv. v. vi. aut viii.

Infundantur in

Vino Rhenano, generosissimo, vel albasitiae, q. l.

Stent in loco tepido per noctem: nam filtratur exactè per chartam emporicam: Filtratur ℞. ℥i vel ℥iib ad summum D. S.

Vinum Emeticum.

Hauriatur, & sic tunc ac iocundè operabitur: Addi etiam possunt Aqua Cinnamonii ℥iil.

Non ineptum est etiam quorundam inventum, quando ex Vitro Antimonii parvos Calices vomitorios fundunt: his Vini q. l. v. gr. ℥i. infundunt, reliquunt in satis tepido loco per diem, mane filtratum hauriatur, & sic egregium habetur Vomitorium. Talis Calix ad plures sunt annos servari potest, nec quicquam ipsi sensibilibiter decedit.

Pertinet huc etiam MARTINI RULANDI Calix ex *Libro ordinario servatus*, quem interit Pice obducat, huiusmodi adhuc liquidæ frustula Vitri Antimonii grosso modo contriti inspergit, post Vini ℥i. vel fufficientem quantitatem insulam per noctem in loco calido reliquit, maneque filtratum hauriendum præbuit.

Secundus modus est, ut loco horum Vinorum usurpetur in confectis Symplicum. Symplicis vel Oxysaccharum Emeticum optimum parat docet LUDOVICI in *sua Pharmacopoeia* pag. 212. nempe.

℞. Croci metall. ℥iil. ℥iil.

Infundatur per triduum in loco calido in

Areti Vini ℥a.

Sæpius aqua liquorem, deinceps filtra, & adde

Sacchari albi ℥i.

Vitro elaso in aqua calida detinenda, sponte Saccharum solvetur, & si lubet tingeretur cum

℞. fer. fer. Papav. errat. ℥i.

Hic modus est ceteris & rusticissimus, aliis incertus semper. Dosis ℥i. ad ℥vi.

Ad huius ferè, aut Oxysacchari Emetici Angeli itala imitationem:

℞. Vitri Antimonii ℥iil. vel v.

Infund. Areti Vini paræ; stentque per aliquot dies in digestionem, subinde agitando Acetum: Post filtratur, ipique ana Sacchari albi addant, sicque habetur Syrupus elegans à ℥iil. ad ℥i. in roburioribus ad ℥vi. propinquantur.

Vel potest etiam heri Syrupus Emeticus Chiratae hoc modo:

℞. Vitri Antimonii pulvis. q. l. v. gr. ℥i. vel ℥i.

Infundatur in

Succ. Citri res. per aliquot dies infundatur.

ad ℥i.

Stent in digestionem blandi caloris subinde agitando filtrato liquori addatur,

Sacchari ana;

vel c. l. q. Sacchari, coquantur ad Syrupi consistentiam.

Habebitur sic Syrupus elegans, cuius Dosis ℥i. est.

Præscribitur sequenti modo:

℞. Aqua Mentis. ℥vi. vel ℥i.

℞. Cinna. c. p. ℥i.

Syr. Emert. ℥i. (ubi varietur dosi per varietate præparatum.)

Syr. Nictiana ℥i.

M. S.

Mistura emetica pro una vice.

Alius Syropum Vomitorium habet LOTICHIUS in *Consil. pag. 31.*

Tertius modus in Infuso sit *Saga Vomitoria*, quia olim SYLVIVS frequenter in Belgio usus fuit, eruit tamen eius descriptio prodest in *Appendice TILEMANNI* de materia Med. quæ ita fit.

℞. Vitri Antimonii pulvis. ℥i.

Infundatur in *Mistura res. vel loco huius Succ. Cydon. res.*

℥i. plus minus.

Stent in digestionem loca calido per aliquot dies & noctes, hinc filtratur exactè, vel per linteum, vel per filtrum chartaceum: liquor filtratus huiusmodi evaporatur ad consistentiam Mellis seu Rob liquidioris vel spirituosioris, ita tamen ut Rob liquidioris ad gutta. v. vel vi. seu, ubi spirituosior est, ad Pisi unius vel duorum dari possit dosi, in quocunque vehiculo.

Sufficiens motet vomitus, & est remedium superfluum. Ad

Ad hujus imitationem profus hic Liptas in Officina Lipkiana ad iuligne Leonis Sympas Ruli idas Emietus, qui hoc Saccharo paratus à J. J. à J. tenet vomitus ciet.

Vomitio huc rusticissima se perpetui sunt ufus. Post hac in forma ficta eminet Tartarus Emietus Myfifell, qui tuffiffimus est Vomitorius antimonialis: vid. MYN-SICHT. in *Artem. Med. Glyster* pag. 13. correctus à LUDOVICI in *Pharmacia*.

Dixi fupra: Vitrum Antimoni non in forma ficta debet adhiberi, quia conflet, vim hujus emetico-cathartica, quam in minutiffimis fuis moleculis diffundit in liquorem infufum, effe inextinguiam, Mercurem igitur, ut si a liquidis vitrum Antimoni in fubftantia recipitur, hoc in regis ac plicis Ventriculi harendo, ita hypercathartica continuam, & cholera periculum, excitet.

Dixi: Cui igitur Tartaro emetico, qui est Pulvis antimonialis, utimur? Refp. Tartarus emeticus est infufum antimonialis in forma ficta. Hoc quidem videtur paradoxon, fed tamen verum. Tartarus est filius feu privigenus quid Vini: Scilicet eff acidum Vini cum alcali terreo faturum a fiv ergo per infufionem, five folutionem, idem acidum Vini in forma ficta impregnetur, quod poli filtrationem coagulando ac cryftallizando de fubftantia crassa antimoniali nil retinet: ergo idem eff, ac fi acidum Vini infundendo in forma fluida totum Vitrum Antimoni, quam fil folutis Tartari in forma ficta: Optimum igitur Tartarus emeticus est Vitro Antimoni fit, fi

24. *Vini Antimoni* Jij.

Tartarus cum ana *Cremoris Tartari*, bulliat cum affufione *Aqua emetica* q. f. donec fervent omnia, tepide filtratur, & in frigido cryftallifcentur, & ita in forma ficta, humida, & media, habemus Tartarum emeticum.

Dofis funt gr. ii. vel iii. ad fumum, in robulifibus gr. iv., rariffime gr. v. & quidem in Melancholicis affectibus contumacioribus, ubi & gr. vij. propinquantur. In Maniacis ordinaria dofis nil operatur ob acidum figna, ideo augetur dofis. Prescribitur cum tagello Sacchari, ut fine naufea affumatur, ita:

24. *Tartari emet.* gr. ii. iij. ad iv. vel v.
Sach. albf. gr. vi. vel Jij.

M. f. Pulvis, S.

Pulvis emeticus.

Addi poffunt *Olivi defiffi* Membrum, uti item, quando per inferiora volumus fimal ftimulare, additur Scammoniuf sulphuratum: e. g.

24. *Tartari emet.* gr. ii.

Stamm. sulphur. gr. ii. vel iij.

Sach. albf. gr. iv. vel v.

M. f. Pulvis.

Affomari in cochleari uno vel altero Jussell gallinacei, vel carnis: Saccharum infervit per corpore Pulveria, nam duo vel tria grana funt nimis tenuia, ut pereat via hujus Medicamenti in cadendo, non altera ratione.

In forma Boli:

24. *Conf. Menab* Jij.

Mercurii viti gr. ii.

C. Syr. Cinnamon. parum, f. Bolus.

D. S.

Bolus emeticus pro una vice.

24. *Res. Junip* Jij.

Tartari emet. gr. ii.

Stamm. sulphur. gr. i.

C. Syr. Cor. An. f. Bolus.

Dixi: non tamen proximus Sulphura antuta funt rejicienda. Refp. Verum eff, si quis igitur tutum habere vellet *Sulphur Antimoni auratum*, huc fequentem commendo methodum:

24. *Antimoni*,

Tartari,

Nitri an. part. equal.

Antimonium aurum in rigillo fuperinficitantur *Tartarus*, & *Nitrum*, detonecent mutuo, & tunc perasta detonatione fluant, ut feperetur *Regulus*: Materia fufa in cono fulfureo eff bipartita, *Regulofque* exatit feperandis. Si autem fufpicio quondam addit adhuc *Reguli* quid admixtum effe, rursus detoneatur Tartarus cum Nitro, & fluant, folveantur fcozime in Aqua communis, & recipiatur folutio Tartari ferveat per lineam tranfverfa: fit precipitatus *Cruca* feu *Sulphur Antimoni*, continuando id fundis, donec nil amplius precipitetur, Sepe-

tur hoc Sulphur edulcoratum efficeatur, liquor filtrum tradens evaporetur, quousque velit cryftallifari, fervetur ufus.

Ratio preparacionis in eo confiftit: nimirum fub detonatione prima abeunt in alcali fixum Nitrum, & Tartarus, quod promptè abforbetur à Sulphure Antimoni externe ratione acidi fui occulti, & fic *Regulus* fatus cadit, qui ante ab acido detinebatur: Fortis igitur illa virtus turgidum Sulphure externo & particulis *Regulini*. Precipitatio fic cum Tartaro: nimirum mirum hoc acidum eff, nam effi Sulphur cientes in Aqua ferveat ebulliat, non omne tamen acidum abluat. Hoc Sulphur. Jol. gran. v. vel vi. propinatur: Jufanti à gr. à ad gr. i. Si precipitatio fatis duplex, hanc pofterior minus operatur priori. Quia fupra in fcozias Antimoni feperatur Sulphura, & eff evadunt acriora, minus cathartica, ac potius diaphoretica anodyna.

Prescribitur fequenti modo:

24. *Crem. Tartari* Jij.

Sulphuris Antimoni iij. par. gr. vi.

Stamm. par. gr. ii.

M. f. Pulvis, D. S.

Pulvis emeticus pro una vice.

Liquor filtratus eff effentialis Tartari, Sulphure Antimoni ex fcozias impregnat. Hic Liquor eff abftergens ac tunc primarium viarum refolutivum, diureticus, ac litho- scripticus: uno nomine, egregium comedium.

Hæc Vomitoria blanda & tuta funt, fufficiuntque pro mille hominibus. Plura hæc de re, qui legere cupit, addet finceriffimum *Tractum BASILII VALENTINI*, cum *Commentario KERKINGII* (qui *Commentarius* omnium eff optimus) in *Cursa fua Triumphali Antimoni*: fcript eff etiam in *hunc Curram Triumphalem Antimoni* *Commentarius* PETRUS JOHANNES FABER, (cujus fcripta tamen minus funt bona; fpecius enim eff in verbis, tamen rebus) qui autem nihil habet in recessu. Poli hunc fcript eff etiam ALEXANDER HUCHTENOV. *De myfteriis Antimoni liber* dno egregius, in quo commentatus HEINRICUS THOLDENIUS. Verum qui adduxit ibi THOLDENIUS partim fua dubia, partim falfa.

Dixi quidem hæc ferveat remedia, tamen fiduro modo applicandus fit durus cuneus, ad Mercurium accedendum eff: Ex hoc fufficit *Tartari Minerale*, vel *Cretilli*, vel *Myfifell*.

Turkib Minerale in genere totus omne remedium Catharticum ex Mercurio paratum. Prænotato hinc: alio modo Mercurium vivum confiderari, prout eff in fua effentia; alio modo, prout eff in fua exiftentia. Loquor igitur primò de Mercurii natura. Mercurius vivus in fua natura eff fpecie Metallica: ex Aqua & Terra fubtili equabiliter proportionatis *Principio* feriali (quod *Principium* confiftit in Acido fui generis) præparatur. Hæc invicem contexta fubminiftrant liquorem hunc, nimirum Mercurium. Reprefentatur igitur Mercurius Alkali Metallicum, h. e. tale concretum, quod promiffimè ab Acido alteratur, & ab Alkali liberatur per Acidum. Hinc etiam eff, quod nihil magis queat agere in Mercurium quam Acida, & contrà nil Magis Mercurium ex fiffa fua confiftentia in liquorem fluilem redigere poffit, quam Alcalia. Acida autem illa funt vel occulta vel manifefta, quæ impennis in Spiritibus acidis mineralibus funt confpicua.

Prouit igitur Sulphura acida variant, ita & variat Mercurius, ita à Sulphure communi coagulatur in Cinnabarin, & contrà Sulphuris metallicis, quæ funt fæozia, coagulatur in Metallum imperfctum. Quoad Acida manifefta, notum eff, quod à Spiritu Salis, Nitri, Sulphuris, Vitrioli, &c. promptè coaguletur: tamen hic differentia obftanda: Dum Mercurius coagulatur ab Acido Salis communis, hoc fit, ut maneat volatilis Mercurius; dum verò coagulatur à Spiritu Nitri, Vitrioli, &c. ita coagulatur, ut magis maneat fixus: hinc eff, quod facillimè Mercurius vivus cum Sale communi paratus igne fublimetur, eoptrà Mercurius cum Spiritu Nitri paratus facillimè coaguletur. Atzoma igitur eff egregium: Spiritus Salis communis & Spiritus Nitri habent effe Omnes duns oppofitos; Spiritus Salis communis refolvit, fed Nitri plus minus fit. Hoc ita probò: Mercurius vivus refolvatur in Spiritu Nitri: fi autem abftrahatur Spiritus Nitri, hoc Acidum agit in Alkali, & Mercurius in fundo manet; si verò folvitur huc à Spiritu Nitri fadè injecceris Sal commune, precipitatur à Sale communi, ex Precipitato hoc feperato fublimato, ignique commiffo, fit Mercurius coerofvus: Sal commune hoc volatilitat, Sal verò Nitri figit Mercurium. Certum ergo fit, Mercurium liquorem ab acidis tantum coagulari. Jam quod etiam refolvitur Mercurius vivus à Salibus utrifque, exinde probò: quando fcilicet ex Cinnabari volo refolvatur Mercurium, addo

alio fuit tartari, Urinae humanae, Cancres clavellatos, &c. sic prodibit Mercurius vivus. Hoc est fundamentum contraversionis illius prolixae, & preparandi Mercurii corporum metallicorum. Modo igitur quis novaverit vinculum Mercurii, & Acidum fusiurandi, quod faciat Alcalia, Sal Tartari, Urinae, Cancres clavellati, &c. sic sponte fluit Mercurius. Fuit hic Mercurius in effluvia, quem alia etiam vocant Mercurium Virginum, item Mercurium de Mercurio: Jam consideremus Mercurium in sua existence: Hic non est amplius Virgo, sed maxime adulteratus; cum enim fit liquor, cum quovis Acidum conbuium agit, hinc etiam est, quod semper Sulphur Mercurio adhæreat, ita ut nunquam Mercurius purus eratur. Sulphur igitur Acidum subtilissimum, pertencissimum Alkali puro adhæret.

Dicitur Mercurium non posse sustineri ab Acidis, quod probat: Si recipiatur Mercurius vulgaris, & in diuturnam digestionem reponatur, sic successivè Mercurius vivus abit in rubrum pulverem, finissimum Mercurio in Aqua forti præcipitatur. Jam unde est principium hoc? Recipit est sulphur æternum quasi adulteratum, quod ab igne ætuum ita præcipitatur: ab hoc sulphure extero, quando cum Mercurio vivo, dependet entitas, silvatio, &c. à quibus dicitur locus Mercurius. Hic Mercurius in corpore nostro absorbet quavis Acidum, quæ à quibusvis aliis remediis intacta manent, ita ut finissima etiam Acidum in corpore humano à Mercurio absorberetur. Dum vero ipsi adhæret contagium Sulphureum, hinc est, quod attenuat, dissolvit, & coagulat humores, nam oculos, quam insensiles, nam naturaliter quæ præternaturaliter viciis, ut sub forma spissioris Salinis possint extorri: & ita in Lue v. Venerea per Salivationem curanda, ratione taliditatis fuge alcalina, absorbet Acidum Venereum; dum vero liquefact viscidum, facit ut ratione Acidis illis admixti. Certe Mercurius vivus ex se miror est, fuit ipsi acrimonia minus ferens illis est, unde ex se facit nec vivum, nec fecit nec est; ut vero ductus intra corpus retineatur, & pyralium & cecellum facit, & ita potius paritum Basile in corpore nostro, quam partibus solidis acrimonia, insensit. Sunt qui aliquot libras Mercurii vivi sine nota hauriant, nihilque incommodi inde sentiant, præterquam quod caligat femur solvere cogantur. Curat: Mulierem quidam ex alvi obstructione laborantem gravissima, cui Mercurius vivum cum potiusculis ad 3ij. propinavi, se tandem continuavit: donec 3xlvj. Mercurii in corpore haberet: Hic ad quartum usque diem hærebat, deinde lavare cepit, donec tandem Mercurius humores illos viscidos ac pertinaces solvit, alvumque strene laxavit.

Quod attinet Mercurium ita preparatum, ad fusiurandum, dicitur preparari cum rubeo acido forti, quæ cum sunt: Acidum autem est Viride magis forte. Jam ergo notetur: Secuti Mercurius vivus per le partibus solidis est innoxius, ita Acidum factus nocet: quod enim copiosius adhæret Mercurio subtilis Acidum, ex violentia purgat supra & infra quod vix minime, sed mitius operari solet: v. g. Mercurius subtilis est corrosivus propter corrosiora concentrata Acidum, si remedium totum & suavit laxat: Sic Mercurius præcipitatur cum Spiritu Vitrioli vel sulphuris, quod crebris, & rigorosis abstrahuntur Spiritus acidi, adeoque etiam, quod minime acidi est in Mercurio, ex huius, & simul minus purgatorius, quod magis est acidi in Mercurio (si mitiori igne abstrahatur) magis purgatorius erit; verbi gratia, Spiritus Niteri semel abstrahatur, hoc Mercurium minime tutum intra corpus assumendum, si autem abstrahatur summo igne Spiritus Niteri, ita ut Acidum non maneat in ipso Mercurio tunc est huius, & minime purgatorius, propter Acidum præcitat. Rationem vero quid minus purget Mercurius lapide abstrahatur, gustus suggerit: gustator enim omnia Castriæ, semper habet huiusmodi spiritum vitriolicum. Ex hoc Acidum fit quasi concretum Vitriolicum, quod rodit Ventriculum & fit Vomitus ciet. Fundamentum Mercurii præparatum vides in TACHENII *Recept. Chymicæ*, & in FRANCISCI SYLVII *Præf. lib. 4. Tr. 6. §. 20. & Tract. 3. §. 14. fup. ubi multa habet de Mercurio ergia.*

Pro nostro scopo Vomitorio elegimus Turbith Minerale emulsi vel (quod talius est) Myrsichum. Modus CROLLII in *basin. Chym. pag. 122. 123. & 124. descriptus*, sequens est:

Ch. Mercurii B. 5.

Infundit

Spiritus Sulphuris, per camp. rectif. 3ij.

Abstrahit Spiritum huius Sulphuris fore igne, idque tribus vicibus, quarta vice parum aevi Spiritus sulphuris addit & abstrahit emulsi, donec arena & fundus reoritur candida: hoc factio Caput mortuum alium infundit

in Aquam pluviam seu destillatam, digerendo edulcorat, donec oil acrimonia amplius in Aqua præcipitur, & sic Pulvis præcipitatus albus fit penitus flavus. Hoc Præcipitatum flavum phlegma longo collo immittit digestionem in cinerum igne per octidies, ut, si quid adhuc de sublimata Mercurii non sit ad acidum statim superjacet, hoc sublimetur in formate phlegma, & Pulvis in fundo residet: Pulverem hunc rectificat, & inter Spiritum Vinum affundit, terque deflagrare facit.

Ratio huius præparatio est: vult scilicet CROLLIUS mediante Acidum ligare duorum Mercurii, eligit Acidum, Sulphuris, quod medium est inter Acidum Salis & Niteri, Spiritum vero sulphuris eligit pro Spiritu Vitrioli reddificato, quia non semper hic perus habetur, nam semper aliquid de sua minera ipsi adhæret: hinc est, quod Spiritus Vitrioli limpidissimus, si parum flet, hac obscuro, cum scilicet particule metallæ præcipitentur; Item quod licet illi temporis longum ædum contrahat, quod consistit in motu Acidum concocione. Altrahit igitur vice Spiritum Sulphuris, ut sic mediante igne particule acidissimæ utantur cum Mercurialibus: ne tamquam nimis fiat corrosivus, adhuc semel abstrahit. Edulcoratio fit in Aqua destillata, quoniam edulcorationes debent fieri cum Aquâ destillatâ, nam concreta Mercurialia ferè sunt salia: Jam Aqua communis etiam est salia: ergo vix solvet Mercurialia. Spiritus Vinum deflagrare petimur, ut quicquid est corrosivum, ab Oleo Spiritus Vinum temperetur, & sic remedium tutum evadat.

Ufus huius Turbith Mineralis Crollii est ad gr. iv. vel v. per scopum vomitorio. Non datur autem in forma Pulveris, ne attactu suo gingivæ rodât, faucesque lædât; sed potius in forma Boli vel Pilularum: v. g.

Turbith. Miner. Croll. gr. v.

Theriac. opt. q. l. per incorporatioe.

Aux etiam

Turbith hoc Minerale redigatur cum Succo Liquiritiæ Nippan. in formam Pilularum.

Myrsichum autem Turpithum Minerale ita paratur:

Turbith. Mercurium subtilissimum terrefactum.

Emulgi solvit in Aqua communis, solutionem præcipitat cum Oleo Tartari per deliquium; præcipitatum hoc cum Aqua destillata vel Aqua communis talida crebris edulcorat, ut quicquid adhuc copiosi salis, tum acidit, tum viscosi, addit, hac abstrahit: tandem Spiritum Niteri aliquoties desuper deflagrare facit, ut penitus edulcoretur, & quicquid adhuc addit, sub flamma ignis viscidos. Ipsa sed edulcoratio cum Aqua Mellis non est necessaria, sed superflua.

Huius Dosis est ad gr. v. ad vi, ac eodem modo ac præcedens præparatur.

Ufus huius Turbith est, ut morbos fœdes: & ab aliis remediis planè inalterabiles, quantum possibile, tollat ac corrigat, partim viscidum, formem morbosum, potentissime incidendo partem cum quodvis vitiosum finissimum absorbendo, partim ex vitriolico sua natura Ventriculum ad purgationes stimulando: Luna Venerea, Gonorrhœa maligna inveterata, item scabies serena, Lepra, Cutis rosacea, quæ ab Acidum oriuntur specificis, hinc hoc Turpith Minerale vix corrigi possunt: hinc inveteratas Quartanas subinde Turpithi usque ante paroxysmos eradcat, hinc, modo confluit vires agri, tunc hoc Turbith adhæret potest: sic usque comederunt obtineat; nam acida ista, quæ vel fœderum vel Oleum Tartari corrigere nequeunt, hoc Turbith optime corrigat.

Operatur ratione sua salubritate, quia absorbet quodvis acidum, ratione sulphuris eterni operatur colloquendo humores viscidos: ratione Sulphuris & vitriolice sue texture nauseam, acque Vomitum efficit.

Resistitur autem hi c Sal Vitrioli vomitorio: Nam necessitate causandi de eo dicenda. Nimirum A. NIGELUS SALA, Vincentinus, Chymicus celebris, sincerus, & induratus, in *his scriptis Chymicis*, & speciatim in *Tr. de Turpith Emulcorato*, mirè extollit Sal Vitrioli vomitorium, ita ut etiam Mammam vomitorio vocitet. Iuxta hunc B. D. IOHANNES LANGIUS in *Mife. Carissæ*, etiam hoc Sal Vitrioli vomitorium extollit. Videndum igitur, quomodo fiat? quidque in recessu habeat?

Paratur hoc Sal Vitrioli vomitorium sequenti modo: Vitriolum calcinatur ubique ad colorem obscuræ prunæ, deinde Caput mortuum pulverisatum cum Aqua communis elixivatur; solutio hæc filtrata igne blando evaporatur, & concrevit Crystalli, quæ ferè colorem florum Perficorum amittunt, & ipsum Sal Vitrioli vomitorium constituunt. Calcinatur ad colorem prunæcum infus; incriminatum

lentiam laxativam etiam specialem habet vim contra affectus Melancholicos, Rhabarbarum ad affectus Renales: ubi per alvum evacuanda foras tenaciora, in specie acida prius reliquia conferr Colocythis ritè preparata, quæ in Hypochondriacis, morbis Mulierum chronicis, in Luc Venerea, Gonorrhoea virulenta, &c. bona est, utut varia Purgantia conveniant; in specie tamen Meperurus dulcis, si aliis permiscetur, uti evacuat, ita specialiter corrigit.

Laboramus abundantia Purgantium. Ex *Regum* autem *Alimentis* nil suppetit, cum in hoc nullo demer. Ex *vegetabilibus* ergo ex omni Purgantium caterva quatuor, vel quinque miltiora & tutiora pro scopo medico sufficiunt, v. g. *Jalapapa*, *Senega*, *Helleborus niger*, qui nobilis, *Alis*, *Rhabarbarum*, &c. quibus, pro stimulis nunc de *Stemmate*, nunc ubi fortius agendum, de extracto *Trachycoronum Albandal*, addi potest. Ex *Mineralibus* sufficit *Mercurius dulcis*: omnibus præferatur Antimonium per inferiora saltem purgans ritè paratum. Hæc sufficiunt pro mille hominibus purgandis.

Modus aspergendi est varius, prout animum vel alterum remedium huic vel illi forme apem est: usitatissimè præscribuntur Purgantia in forma Pilularum, inter quas ex Extracto Catholico, variis additis terminantibus; in specie Mercurio ducti, ubi mittitis laxandum, Massa Pilularum de Ammonia debito Stimulo, sufficiunt. Verum in Compositioribus Veterum Officialibus, qualis de Hiera, &c. Purgantia sunt cruda in substantia addita minus cortecta, ideo illa hodie non frequenter præscribuntur. Moderni solum Extincta Purgantia horum, five sint simplicia, five composita, quæ optimè sunt per Spiritum Vini tartarificum, vel beneficio Viniduci Tartari vulgaris, ut ratione Salis Tartari corrigatur aliquo modo via laxativa excedens venenosa. Pro Pilulis usualibus *America* ad Imitationem LUDOVICI concepit, vel TILEMANNI, præstant. Inter Pulveres Pulvis Jalapæ compotus sufficit. Insula inter, Senecum cum Rhabarbaro aut Helleboro est optimum. In forma Electuarii purgantia in parva dosi commodissime usurpantur. Si per fermentationem parantur, (sic paratur Colocythis in minuta frustula concisa, Elaterium, Scammonium, in specie Eula, Thyngialis, & trahatur sic, ut alitè Optum: de quo vid. Dr. LANGELOTT, *Epist.* ad A. B. C. ubi elegantem modum divulgavit.) Optime succedit cum succo Cydoniorum vel Pomorum Borsdorffianorum, addito Sale Tartari, fermentationi committitur, dehinc filtratur, & suspensus ad consistentiam Rubi vel Rhei maris. Sic fermentum ratione hac à B. ad 30, ad summum 50, propinquetur, bene sitit, valide operatur, licet correctum sit per fermentationem. Quippe placet, ca hoc Rob cum Spiritu Vini Extinctum aut etiam Extrallum preparari potest, & erit remedium magis tutum.

J. Quod attinet Jalappam, huius via solutiva iuxta HELMONTIUM ex HIPPOCRATE, deperditur ali-quid de virtute & facultatibus suis. Hoc autem de Aloë & Rhabarbaro via dici potest. Jalappa igitur est planta boë-dieno seculo tantum ad nos allata, ac Veteribus penitus in-cognita. Nam ex Indiis Occidentibus, regione nempe Me-xicana affertur solet. Dicitur aliis *Mexicanana nigra*: hinc cognegeneralia *Motafila* dicta, viribus testuorum scèrè eadem cum Jalappa conveniens; de qua vid. SCHROEDERUS *Pharmac.* Append. par. 10. Quoniam verò ignoramus, quid sit, (tunc quidam substituant eam radici buci Jalapæ) eam o-mittimus. Hæc Jalappa nostris in hortis culta crescit, diciturque communiter *Flos Mirabilis*, ab aliis *Mirabilis Peruviana*, *Jalappum Peruvianum*, etque juxta MORISONIUM plantæ heteroclitæ, nullius horum speciei respon-dens. Probo autem (utot contrarium statum WEDELIUS in *Diff. de jalappa* cap. 11.) quod idem sit flos, qui in hortis nostris crescit, cum Mexicana Jalappa, hinc modis.

2. Quia radix nostra in talcosis difficilis eadem facie ap-paret ac Jalappa, ita ut ovum ovo aen possit esse fe-milius.

3. Ex effectu; nostra enim sæpe purgat ac caotica. Ni-mirum 3℔ vel 5℔. nostre tantum præstant quàm 5℔. caotice; hæc enim magis est resinosa: nostra vel minus, adeoque hujus ratione dosi nonnulli augenda, quod ipsum in climatis differentia con-sistit. Imò observatum fuit, quod succos foliorum Floris Mirabilis infusissus, cum Saccharo in Syrupi consistentiam redactus, ac Infantibus propinatus, suaviter eos laxaverit. Confirmant hoc HÆFE-RUS in *Horculo Medico*, item HORSTIUS (*Pater*) in *observat.* Solus, quem miror, GEORGIVS HE-INTRICUS VELSCHIUS (Vir inextans lectionis Tom. II.

nia) in *Decad. Curar. & Myser.* in quodam loco na-gat Jalappam nostram esse eandem cum Mexica-na: non tamen addit rationem, sed opinor, eum deceptum fuisse libro illa rarissimo, qui vocatur *Thesaurus Mexicanus; Roma impressus*, à FRANCISCO HERNANDEZ collectus, & post ab ANTONIO RECHO in ordinem redactus. In hoc fit ejus quidem mentio, nihil tamen de vi ejus laxativa dicitur. Hinc suspicor, VELSCHIUM exinde fuisse deceptum.

Ulin Radix Jalapæ Medicus est vel generalis, vel specialis.

1. Generalis est, quod ab ejus Radicis assumptione alvus solet provocari, & excrementa serosa plus minus flava egredi, citra tamen Ventriculi subversionem & Intestinarum intorbonem.

2. *Usum Specialem* quod concernit humidioribus sub-jectis tantum convenit: hinc etiam ad Cachexiam pi-tuitosam, Hydropem, Fluorem album, affectus Catarrhales, &c. laudatur: in specie Hydropici, im-prius à BORELLO Myser. & Obs. Medico-Phys. Cent. 2. Observ. 33. pag. 126. tanquam appropriatum remedium commendandum. Vis operandi consistit in ejus particulis resinosis, idest oleosis, ab acido for-siter concentratis, adeoque in particulis acido-salis oleosis (D)

Probo hoc:

(1.) Si enim mediante Spiritu Vini Refina ex radice Jalapæ extrahatur, caput mortuum nil quicquam valet.

(2.) Quod piogiuor & facilius inflammabilis est Refina, eo melior & efficacior est Jalappa: hinc sequitur, quod extractio non in aqulo mentruo, sed oleo aut Spiritu Vini fieri debeat.

Malè igitur facit Medicorum vulgus, qui in Nodulis io-fundit Radicem Jalapæ Vini, Cervisii, aut Aquæ com-muni: si enim hanc centum amphoris Aquæ infunderent, nihil tamen resinose substantiæ, sed tantum mucilaginem quandam extraherent.

Modus operandi est duplex:

1. Particulæ suis viscidis Ventriculo & Intestinis ad-hærendo provocat eorum ipsos, & sic contentorum evacuationem.

2. Operatur etiam, quatenus subacta in primis vis, hu-mores attenuat, dissolvit, acrimonia sua liquefacit, sicque in serolum liquamen vertit.

Probo huic duplicem operandi modum binis exem-plis:

(1.) Si recipiatur Refina Jalapæ, eaque cum Saccha-ro assumatur, hæc dosi gr. xv. sufficienter, cum insignibus tamen Ventriculi terminibus, operatur: Resinosa enim Ventriculo ei, & prioribus Intestinarum adhuc adhæret, hinc ipsam, tormina, &c. ac tandem evacuatio, & in perdispositis hyper-catharsis.

(2.) Si verò recipiatur hujus Resinæ Jalapæ 5℔. & cum vitello Ovi subigamus, sit solutio blanda: nam vitellum Ovi oleosam Resinam resolvit. Potio hæc grata cum Aqua Fœniculi vel Mentha ant cum Sy-rupo propinata, sine torminibus operatur. Ergo par-tim irritando, partim liquefaciendo, operatur Re-fina Jalapæ.

Utriusque modus est duplex: insuper enim vel in forma solida, vel fluida. In forma solida, si recipiatur Pulvis 5℔. (quæ est ordinaria dosi, operatur quinquies, seu ten si scilicet in substantia usupetur: Vel, ut melius operetur, jungitur cum Tartaro, vel Tartaro vitriolato: quoniam detergendo viscidum loco stimuli additur: v. g.

℥. Crem. tart. gr. xv. ad 5℔.

Pulv. Jalap. 5℔. gr. xii. ad gr. xv.

Olei dissilati. Anisi vel Macis. gut. i. vel ii.

M. C. Pulvis. S.

Pulvis Purgans.

Propinquetur in vehiculo fervido, ut melius dissolvatur Tar-tarus.

Si stimulum addere lubet:

℥. Pulv. Jalap. 5℔. gr. xv. vel xvi.

Crem. Tart. vel tart. vitriol. vel Arcan. dupli.

gr. xii. ad xv.

Scam. prop. gr. i. vel ii.

Olei dissilati. Anisi vel Macis, vel Cinnamon. gut. ii.

M. D. S. ut antea.

C

Vo-

Vocatur *Vergetabile Purgans polycrethum*, ad plures usus sufficiens.

Vel alia ratione præscribitur.

34. *Sal. Jalapp. ʒi.* ad gr. xv.
Miri parit. ʒi. (vel *Miri gr. iv.* ad *vi.* & *Salis Tart. gr. iv.*)

Scamm. prep. gr. i. vel *ij.*
Olei defillat. Anisi vel Macis gutt. i. vel *ij.*
M. E. Pulvis: S.

Pulvis laxativus pro una vice,
 sine torminibus purgat. Vcl

34. *Crem. Tart. ʒi.*
Refin. Jalapp. ʒi.
Sal. Tart. gr. vii.
Olei defillat. Anisi gutt. ij.
M. E. Pulvis.

In forma Boli:

34. *Conf. fer. Tunis ʒi.*
Crem. Tart. gr. xv.
Bolis Jalapp. ʒi.
Olei defillat. Macis gutt. ij.
Cum Syr. Ros. fol. E. Bolus. S.
 Bolus purgans.

34. *Pulp. Rosul. ʒij.*
Pul. Jalapp. ʒi.
Scamm. sulphurat. gr. i.
Syr. Fumic. q. E. E. Rosulac. S.
 Electuarium Purgans.

In Pilulis.

34. *Extr. Capul. gr. xij.*
Ref. Jalapp. gr. iv.
Extr. Trach. Alband. gr. ij.
M. E. Pilula: S.
 Pilule Purgantes.

Quoad formam fuidam: usurpatur in Effentia, qualis fit,
 si 34. *Spiritus Vini aut alius appropriatus*, & affundatur *Rafid Jalappæ cum Cerevis Ciri*. Vid. BARTHOLINUS in *Hyg. E. R.*

34. *Spiritus Vini, vel alius Spiritus rectif. ʒij.*
Rad. Jalap. ʒij.
Cerr. Ciri ʒij.

Crem. (qui coloris gratia additur) gr. v.
 Stent hæc in Infusione in loco tepido, hincper li-
 quor, ac usui afferretur, dictaturque Effentia cinerea,
 cuius dosis ab ʒss ad ʒij. Etque hæc nil aliud, quam
 Refina liquefacta, que ita propinatur, si enim abstrahatur
 Spiritus Vini, remanet Refina liquefacta.

In forma Mifture:

34. *Aqua Hyssop. ʒi.*
Cinnam. ʒiij.
Pul. rad. Jalap. gr. xv.
Extr. Trach. Alband. gr. ij.
Syr. Cichor. cum Rhod. ʒss.
M. E. Focio: S.

Potiuscula Purgans.

Item si ipsa Refina in forma Mifture debideretur, v. g.

34. *Ref. Jalapp. ʒi.* ad gr. xij.
Sal. Tart. gr. vi. ad *vii.*
 Cum l. q. *Syr. Ros. simpl. vel stativ. aut similib. su-
 avioris*, bat Sympas grates.

Sal Tartari huic potioni admiscetur, ut Refinam corri-
 gat, ejusque in Ventriculi plucis pertinationem adhesionem
 prohibeat.

In forma Emulsionis si desideretur:

34. *Sam. Melon. extr. ʒi.*
Refin. Jalapp. gr. vii. viij. ix. ad xiv.
 subigatur, deinde affundatur.

Aqua tepide Rosul. vel Mentha vel alius approp. ʒi.
 & redigatur in liquorem lacteam; (oleum enim Seminis
 solvit Refinam, & sic coctus in formam Emulsionis;) adde
Aq. Cinnamomi ʒij.

& edulcoretur cum Sympo Rosulæ electivo, aut alio que-
 dam grato, aut Rosul. Mennæ Christi.

M. E. S.

Emulsiō laxativa pro una vice.

Addi etiam possunt *Scammonei sulphurati gr. ij.* aut *Extr. Trach. Alband. gr. i.* cum gr. viij. *Sal. Tartari*. Denique D.
 HARTWIGIUS cum vitello Ovi seq. modo propinavit.

Refina Jalapp. sumit gr. vii. viij. vel ʒss. in robustiori

bus verò g. xij. & xv. subigit cum vitello Ovi dimidia
 parte, vel cum integro vitello: hinc affundit *Aqua Fen-
 icul. vel Mentha ʒss.* vel q. l. ut fiat emulsiōnis Patis:
 addit deinde *Aqua Cinnam. ʒi.* vel ʒij. & *Tart. aut
 Syr. Cinnam.* parum pro edulcoratione;

D. S.

Emulsiō purgans.

Suaviter & copiose operatur. Propinavi hæc Mifuram
 spemius robustius, quam copiose supra & infra inde purga-
 vit, citra tormina tamen & anxietates. Ubi igitur paulis
 exaltius purgandum est, hæc Mifura potest recipi:

II. Pod Jalappam pergo ad *fenam*, quam noim ex opi-
 mis & mitissimis est Purgantibus. Hæc primaribus Medi-
 cine Veteribus Græcis, fuit incognita, nihilque de hac apud
 HIPPOCRATEM. Cùm verò Ars Medica à Græcis ad
 Arabes, Saracenos & Mauras fuerit devoluta, Arabes in
 locupletanda ea fuerunt occupati, nobisque fructum hæc
 notitiamur. Dicitur autem *Frutex Alexandrinæ*, quod prope
 Alexandriam in *Egypto* optime nasci invenitur. Si-
 millima frutex hæc est Coluteæ vesicariæ, unde subinde
 pulvis folia illius foliis adulterantur, nam Colutea etiam ves-
 icaria, in quibus semen recomitum, habet, non tamen est
 planta eadem. Differunt in eo: quod folium semine genitius
 sit stellatus (E) albus, flos autem Coluteæ papilionaceus &
 luteus: Præterea vesicæ fœnas sint compressæ, Coluteæ
 verò vesicæ sunt turpide. Differuntiam hæc habet JUN-
 GIUS (Vir Eruditus) in *Descript. prop. facm.* Nihilominus
 tamen cognata videtur Colutea lenax ex eo, quod Coluteæ
 in dupla doli tantum præfert, quantum fœnas in simplici,
 quod primus docuit BARTHOLINUS *Char. s. ʒij.* 60.

*Supra facm. Alexandrinæ tantum in nra sunt Folia, & quid-
 am ordinarii sunt spiritibus*, hi enim sunt Fibre corticis, hinc
 longe fortiores quam ipsa Folia, torminaque excitant, quare
 etiam rejiciuntur. Sunt qui putant, ideo non recipi spiritibus,
 quod adstringant, quod tamen est fallum: Nam ideo
 potius rejiciuntur, ne nimis torminosis sint remedium.

Huius autem *Fœnæ Sinæ expectorationis afus* vel *gener-
 eralis*, vel *specialis*. Generalis est, dum ab eorum nia alius
 aliquoties laxatur, plerumque tamen cum torminibus circa
 umbilicum: Que rejiciuntur, fub habitu leno, viscido,
 flavedine tincto, conspiciuntur. Interim tamen unum ex
 motoribus est Purgantibus, *Spiritus* est, dum pro purgatio-
 ne per *extractionem* in usu est, ideoque in morbis Chroni-
 cibus, quam Acutis, scilicet in his potius Vomitus quam
 purgantia conducantur iurisper.

In morbis igitur Chronicis usurpatur, imprimis dom
 producta morbo eliminat, & viscosa evacuat: hinc v. g.
 in Quartanis, Febribus aliis chronicis, affeclibus Hypochon-
 driacis, Hyphericis, in febribus, ideoque, in aliis, in specie
 Melancholia hypochondriaca, item est inter utilissima
 laxativa, unde à Veteribus rellata inter Melancholia, quæ
 succum Melancholicum, i. e. Cinnam vitulosum, à vicio pri-
 mæ digestionis natum, per *extractionem* purgant, in specie in
 affeclibus Melancholicis, non est adeo acris seu caustica,
 quam alia purgantia, unde fecioribus tantum ac calidioribus
 conducit.

Vi opte operandi refides in *substantia mucilaginis*, unde
 tantum per mellis aqua (scilicet per Aquam, serum
 lactis, Cerevium, aut Vinum) extrahitur cum vel sine
 ebullitione Mucilago, cujus nucleus est quasi refina subtilis
 ac acris, à qua via laxativa dependet. Hæc autem *Mucila-
 go* est hæc volatilis, aut *spiffa* ac tenacior: Volatilis blan-
 de operatur, sine insigni alteratione: *Spiffior* autem crudo-
 lia tormina excitare solet. Cavendum igitur, ne sub infusio-
 ne in loco calido Mucilago ista ipsius aut extrahatur, sic-
 que ægrum maximis torminibus vexet, hinc adiciant, ut
 ed melius operetur, *corrigentia vel humilantia*, nimirum Tar-
 tarus, & Zingiber, addi etiam solent. Zingiber addi-
 tur, quoniam eius acrimonia corrigi tur vi humilatrix la-
 xativa Sconit: Tartarus verò, vel Cremor, vel Sal Tartari
 additur, ut horum medio Mucilago exiat ed melius deterga-
 tur, & atqueatur, ne tanta tormina exciet: Nunquam
 igitur Senna aliique Tartare vel Zingiber præferenda.

Medus attendi duplex est: vel in *substantia* seu forma Pulve-
 ris, vel in *infuso* adhibetur. In forma Pulveris datur ordinariò
 à ʒss ad ʒi. In infuso datur ordinarie ʒij ad ʒss. Quoad
 Pulverem: proflat io Officinis Pulvis Sennæ *Menthae*
 (Proffell. Patavici) compositus ex Tartaro & Sennæ, qui scilicet
 usurpatur ad hunc ufque diem: quoniam autem est
 nauticulus, raro hodie adhibetur. Qui ergo in forma Pulve-
 ris Sennam præscribere volunt, ita ut per *extractionem* tantum
 operetur, v. g. in morbis Chronicis, ubi alius vesicæ & phle-
 gonia

golis adeit, item in Scorbuticis, Hypochondriacis, &c. sequentem in modum prescribit:

℞. Crem. Tartari,

℞. Sen. sine Ap. an. ʒij.

Singul.

Termin. Aul.

Clasam.

Galatop. an. ʒij.

M. l. pulvis.

De hoc Polvere capiat ager pro liberanda alvo; vel in principio coherere uno iussu, vel quantum cutellis capitis capere potest, & suavior laxabit.

Quoad Infusum male infunditur Sena à ʒij. ad ʒss. Sena certe multum largire & requiritur plus Menstrui. Jam ergo Sena cum Tartaro aut Infunditur, aut simpliciter Infunditur. Quia Infunditur simpliciter, ipsi pro solutione additur Sal Tartari; si vero sequitur, additur Cremor Tartari. Folia enim Senae nonnulla ebulliendo solvantur cum Cremore Tartari. Interim rarior fit Sena usque in forma Decussi cum Tartaro, quo macilagine substantia tenacior evaporat, & ipsior tantum remanet; sed pariter in Infuso usum. Rariorem tamen infunditur sola ubique Helleboto nigro, qui plenius additur & melius operatur: v. g. pro dosi una prescribitur ralis poris laxativa, & quidem per blandam Decussationem cum Cremore Tartari.

℞. ℞. Sen. sine Ap. ʒij.

Rad. Polyp. an. ʒij.

Crem. Tart. ʒij.

Coqu. in l. q. Aqua simpl. vase clauso.

℞. Galatop. ʒij.

addo

Aqua Cinnam. ʒij.

Syr. Berber. ʒij.

M. s.

Potus laxativa pro una vice.

Per solam vero Infusionem Sal Tartari.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ʒij. vel ʒss.

ultra ʒss.

Infund. in l. q. aqu. simpl. vel Fumar. vel Cichor.

Stent in loco tepido per noctem: mane Colaturae recipiatur qu. pl. Si mitius operari debet, recipiatur Infusum Senae ʒij. si vehementius, recipiatur ʒiv.

Colaturae addatur

Aqua Cinnam. ʒij. vel ʒss. ad ʒss.

Syr. Rafas. ʒij. vel ʒss.

M. D. S.

Potulacula purgans pro una vice.

Sunt Potiones gratæ palati, & elegantissimæ: Leviter operantur, non hypercathartica inferunt. Color ruber est à Sale Tartari.

Vel, quod melius est, cum Helleboto nigro aut Rhubarbo sequenti modo.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. vel ʒss. ad ʒss.

Rad. Helleb. nig. ʒss. ad ʒij. (vel Rhubarb. ʒij. ad ʒss.)

Sen. an. ʒij. ad ʒss. vel ʒij. ʒij. ad ʒss.

℞. Tart. gr. xv. ʒij. ad ʒss.

Infund. in l. q. aqu. simpl. vel Berber. vel Fumar. vel Cichor. vel Cichor. stent in loco tepido per noctem.

Colatur. ʒij. ʒij. vel ʒss. ad ʒss.

Aqua Cinnam. ʒij. vel ʒss.

Syr. de Pom. vel Rafas. solut. vel alius pro edulcorat. ʒss.

M. D. S.

Potulacula laxativa.

Possunt etiam de Colatura recipi ʒvi. pro duobus doibus, quod si pro pluribus doibus infundatur, v. g. in Melancholia Hypochondriacis; (qui enim habuit fume calidioris, his minus acris, & calidioris, sed potius humectantia conducunt, & sequens Infusum locum habet, quo etiam in alio adstricta ad plures dies, creberrimè etiam in doloribus Colicis sufficit usus sum.)

℞. Rafas. mib. ʒss.

Contunde in mortario marmoreo, affundendo

Aqua feruida ʒij.

Vel ebulliant Pulvisque conquestrare in Aqua compungi;

℞. Decussi batus feruidi ʒij.

Infunde

℞. Sen. sine Ap. ʒij.

Crem. Tart. ʒij.

℞. Rafas. mib. ʒss.

Tom. II.

Stent in loco tepido, vitro bene clauso, donec frigidum, frigidus liquor deat pro lubitu; vel, omni mane vel vespere, vel alterius diebus, in Melancholia Hypochondriacis pro scopo evacuandi, primisque vias apertas servandi & sordes eliminandi: capiat ager ʒij. vel ʒv. Ultra octidies autem hoc Infusum viz alterari potest: mox enim accit.

Quod si in morbis Chronicis, Febilibus, v. g. Quartana vel Helicam declinante, & Febilis intermittere chronicis confirmatis, in quibus evacuatio ante paroxysmum fieri debet, Infusum Senae expectatur, sequens est.

℞. Sen. sine Ap. ʒij.

Rad. Helleb. nig. ʒss.

Singul. ʒss.

℞. Tart. ʒij.

Potus etiam addi Radix Asci.

In hac ac costus includatur Rhubarbo, Infundaturque.

℞. Sen. sine Ap. ʒij.

Rad. Helleb. nig. ʒss.

De hoc Infuso ager quartanarius helicus recipiat duobus

vel quatuor horis ante paroxysmum ʒij. vel ʒss. & exinde blande evacuetur.

Ubi Infantes immixti purgandi sunt:

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

℞. Sen. sine Ap. ʒij. ad ʒss.

jur: cui si aliquis salis rari pro correptione aliquali addiderit, vitæ erit impediendum.

Medus aliandi jam superius. Nempè in *substantia* vari aut purpuram addiderit: nimis enim acrimonia sua volatili turba capis, adeo ut erigat & ANGELUS SÖLA, quod ridicula Hellichorii fonticula imponitur, tunc corpus turbatur. Recipitur ergo potius in Infusio, vel Extraculo. De cætera in qua etiam elæ dicit Hellichorii, non præparatur. In Officiis quidem affertur, ut in radia Actis infundatur visum sic mure castoreo. Error hic evadit tante Obli-vationis enim, omnia Purgantia esse medium quoddam inter ventumosi & medicamentosi, in genere quod tunc fit syngenesi nervoole fuit inimica. Hanc contrarietatem corrigere conati sunt Veteres per Aromatica, ut, verbi gratia per Mallichen, Zingib. &c. Verum, cum hæc correctio à posteriori tantum fiat, & malum tantum producat, non tollit ipse eadem prodigiat, illa parum valet. Deinde immixtum Purgantium Vegetabilium vim tam Acidam, quam Alcalinam enervat: ver. g. Acidam, ut Phlegma Actis, Spiritus Vitæoli, Phlegma Vitæoli populum, &c. omnia Purgantia Vegetabilia corrigunt, quia texturam eorum resinolam concentrando penitus convertit, ita ut nec dissiliat, nec potius, nec in partes solidas potius dividat agere possint: sic igitur radia Hellichorii potius castoreo. Ex opposito Salia fixissima generis corrigunt Purgantia, alia tamen modo: sic Sal Tartari corrector elæ omnium Vegetabilium Purgantium, nam non dissolvit Salia fixa texturam resinolam, sed visciditatem eorum cum humoribus corporis molles promove-unt, sic Radice purgantur per Salia fixa resoluta, facilius in nobis subiguntur, & in corpore nostro alterantur. Ergo Radice Hellichorii composita præparatur nil valet. Vnus potius est Radice recentis scilicet in Infusio, ubi membris aquola elicitur. Infundunt autem Hellichorum rari salis, sed ferè cum Saccharo, in modo Senas, modo Hellichorus in doct prædominetur, semper tamen & Sal Tartari pro correctio- re resolutis additur, ut sic facilius operetur. Seligatur Aqua in Infusio pro illis, qui medio modo se habent. Set- rum Lactis solum in Scorbuto siccloribus, in Hypochon- dria, & qui viciat vicerum habent. Porro in Scorbuto & Sanguine Scorbuto imbutis. Eligatur autem Vinum pro utroque finis, Sit igitur v. g. in Scorbuto sequens Formula:

Rad. Hellichorii nigri ʒi.

Pol. Sena. Sin. Rub. ʒi.

(Addi etiam potest aliquid de Polyposio, Nasturtio.)

&c.

Infusio in f. q. vi. Lactis depurati per nodum: mano

Rad. Chin. ʒiij.

Adde

Spiritus Cælester. ʒi.

Aqua Cinnamon. ʒiij.

M. l. Haugli purgati pro una do.

De cætero in Nodulis frequentissimus est Hellichorii usus: hic enim modus optimè convenit pro pluribus dolibus.

Quod Extraculum: vel recipi potest Extraculum com-positum superius dictum, vel quod ali compendiosius fi- ciant.

Radicales Hellichorii nigri incisæ, infundunt vi- no Rhenano, digerunt tamdiu, donec Vinum sapore & colore Hellichorii impregnatur, post infusio fiat ad consistentiam Rob.

Qui melius habere cupione, addunt sub infusione sal Tartari, sique habet Extraculum Hellichorii nigri correctissimum.

Quodvis igitur horum Extraculorum habueris, solum il- lud, quod cum Spiritu Vini extrahatur, elæ suspensum, fa- cilitate terminat. Præterea optimè, & in forma Pilularum Extraculum Hellichorii addiderit, v. g. in Epilepsia habituali omnium optime fuitur cum Mercurio dulci.

Rad. Hellichorii nigri rari par. ʒb. ad gr. xv.

Mercurii dulcis. ʒb. vel gr. xv. ad ʒl. pro ra- tione subiecti.

Adde pro stimulo

Extrem. Trach. Alband. gr. i. ad ʒi.

(vel *Samm. sulphur.* gr. i. vel ʒi. & *Extrac. Trach.*

Alband. gr. i. vel ʒi. vel ʒi.)

Cum f. q. ʒl. Menth. vel *Salvia*, vel *Ligni Saf-*

saf. aut *Sandii.* ʒi. *Pilula.*

D. S.

Pilulae Sanguinem purificantes.

Ad pro purganda Strophosis aut Cachectia etiam nostro eli- mati peculiari.

ʒl. Mass. Pilul. Tartar. Sume.

Extr. Hellichorii nigri an. ʒi. ad gr. xv.

Samm. sulphur. gr. i. ad ʒi.

Cum f. q. ʒl. Menth. q. ʒi. l. ʒl. pro una do-

CNOFFELIUS (egregius filie Præpositus) in usu ha- buit *Pilulas Balsamicas* distas, tantummodo polychrestas, quarum haec est Hellichorus niger, quinque egregium mor- bis chronicis pro scopo blandè evacuari, *Pilulas ipsas sunt* seqq.

ʒl. Mass. Pilular. de tribus Raf.

Extr. Hellichorii nigri an. ʒi.

M. l. *Pilula.*

Istis capere aote cognant. Conferantur etiam de his M. A. N. C. German. in *Append.* Si voluit formulam habere mag- nis compositam, addit de miscio

Tart. vitæoli. ʒi.

Resin. Jalap. ʒi.

Hæc compositio reverè elæ tucissima, qua etiam feliciter semper usus fuit in Chronicis, blandè enim ope- rantur.

Alor autem *Pilulas* de tribus ʒb. ingrediens, ita præ- parata sit, ut pars eius gummosa magis quali extrahatur, resnosa verò instringatur vel lapsetur. Ad imi- tationem harum *Pilularum* seqq. præscribere soleo:

ʒl. Mass. Pilular. de tribus Raf.

Extr. Hellichorii nigri an. ʒi.

Vitæoli maris ad albed. cald. ʒi. v.

Samm. præp. gr. i.

Cum f. q. ʒl. Gam. Ammoniaci. l. ʒl.

quales Hypochondriaci nostratibus proficua existunt, Sont qui destillatum etiam *Liquorem ex Hellichorio nigro* eli- cere fatigant; sed effectus nondum voto respondit, Sic PERRICHIUS (vir in rebus naturalibus expertissimus) in sua *Sapient. Hermet. contra Convuls. reiert.* reiert, reiert ex Radice Hellichorii nigri per Balneum Mariæ destillasse Aquam, que autem maxima tormina elicitur, in corpore.

Alii

Infundunt in Menstr. Vini Rhenani, destillant per alem- bicum; dicuntque inaviter purgare; sit autem Gen. penes experientiam. Ipsa Polia Hellichorii in formam *Essentia* red- acta, circa vim solutivam tantum sunt alterativa, & in spe- cie in Melancholia hypochondriaci proficua. Conf. THIER- MAIERI (Medici Bavari) *Casus*, & *Cura.* m. ubi de Hel- lichoribus multa sunt egergia: item CLAUDIUS THEODO- TUS *Pant. Hygiah.* ubi etiam multa ex aliis Auditoribus non- indigna congegit.

IV. Post Hellichorum nigrum sequitur, *Alor*, quæ duplex vel *Astasia*, vel *Americanæ*: Nam tam in America, seu India Occidentali, quam Asia seu India Orientali crecit *Alor Americana* non est in usu, sed utipsum saltem *Alor Ori- entalis Astasia*, Planta ipsa nil aliud est, quam species Sem- pervivæ (ʒ), & ut vocetur Sempervivum maximum mari- oom, tamen etiam in locis intermedii, ipsi & collibus, largiter crecit. Planta ex ingenio, *salis crispis ac acutis*, *succo purpureo*, &c.

Ex hac planta ferè exsiccata (non ex radice) elicitur succus, qui postmodum inspissatus hinc picce resine ad nos adducitur, hinc prout succus hinc præparatur, & sub præpa- ratione vel impurior vel purior existit, extenuis quadraplex est: *Alor enim dividitur in Calabellam, Hispanicam, Sacce- rinam, Carinam* seu lucidam. Omnium purissima est lucida (*Alor nigri coloris instar* est.) Juxta hanc elæ *Succorina*, que ex Infusa Succorata Asia Orientalis ad nos adducitur, Cæterum *Hepatica* ista dicta, quod ex obscuro tubo, & li- vidi coloris veluti Hepar fit, vix recipitur, nisi pro una ex- terno in unguento: *Calabellæ* elæ hominum pessima; varia enim sedibus inquinata: dicitur ita, quod Caballus esse Equi fuisse propinari. Ergo fucus hic expellendus (pro more a- lorum fucorum vegetabilium) elæ concretum non simplex, sed in duas alias partes divisibile, aimirum elæ concretum ex parte ex *substantia gummosa*, & ex parte ex *substantia resino- sa* constans. Hoc autem facile probari potest.

ʒl. Alor.

Cui affundatur *Aqua*, tunc *substantia gummosa* liquefit in Aqua; *substantia autem resnosa* in fundo insit picis mænet, quod contra lotionem obliervatur.

Mal

*Alia alminum in officinis recipi solent ressecta sepi laxativa sunt, sed nihil valet, quia substantia sua gummosa maximam partem privata est. Hæc hinc substantia: (resinosa & gummosa). hinc quoque facultates prædictæ sunt: substantia mucilaginosa seu, *amalgama laxat*, infusita nimirum & morte utitata ante præparand. vel magis adhibita. Contra *sabundantia resinosa adstringit, demulget viscidum, amaritudo sua balsamica quævis humorum alterationes corrigit, bilem acuat, in specie in ætenu Ventriculi collabente quævis serosa resina egergitur et remediū. Præterea in specie adhibendo R. smorroidibus, eadem ad sui fluxum provocat. Novit quendam, qui huius Pilularum Alotiarum provocavit fluxum Hamorrhoidalem, non secus ac fluxus Urinæ cruciatum hoc usu fuit concitatus. Veritas hæc, tam *Crassi* quam *Arabibus*, *Aliis* fuit æstimatione, ita ut huius fuerit omnium Pilularum. Loogram etiam sumptum absque molestia, & quidem tam pro scopo laxativo, quam pro scopo Ventricularem roborandi. Egregium quoque remediū est Aloë, si pulvis ejus Vultui recenti inaspergatur, aut etiam, si Spiritu Vini infusus imponatur Pileis; hæc enim absque supputatione & putredine juvat. Moderni tamen Aloë minis asperant, tum ob multosum amorem ac odorem, tum quod omnibus subiectis non æquæ conveniat. Quæritur sunt constitutionis siccioris, macrioris ac calidioris, his minis conveniunt Aloëtica, sive laxare vix efficere velimus. Moderni igitur distinguunt Purgantia in ea, quæ sunt consticta & una vice, & in ea, quæ successivè sunt, & ut vocant, per *virositas*, v. g. si in morbis Chronicis purgare volo, propius Purgantia successivè & per Episcipin operantur: si negotium sit per Pilulas, vocant Pilulas *asuales*. Pro scopo evacuandi minis convenit Aloë, sive integra sumatur, sive substantia ejus gummosa tandem ad *3j* propiatur. *Purgantia ergo asua sunt quæ in Pilulis asuales sunt.* In morbis Chronicis successivè quævis Pilula hæc convenit; verbi gratia: Laborat Mulier malo Hypochondriaco vel Hydrope, vel corripitur Mulier affectu Hypericis: in his omnibus morbis Chronicis confirmatis Purgantia sunt non semper conveniunt, sed tandem per *virositas* institutenda, non sed radicibus tollamus morbum, sed ut successivè peccata evacuemus; ita ut si verbi gr. non possum confirmatos affectus Hypericis penitus tollere, tamen præcaveo symptomata, si scilicet quævis septimana, vel mensuram spatio huius Pilulas asuales utar. Et quidem Aloë sumitur integra, scilicet in substantia in subiectis humidioribus: partem ejus gummosa in subiectis calidioribus aut acidioribus: verbi gratia: Si eodem Hypochondriaco succellente aut laute viventi Pilulas Aloëticæ, quovis menis sæpe singulis 4. diebus usurpandæ, essent præscribendæ.**

3j. Aloë lucid. 3j.

Gum. Ammon. in Aceto liq. (notante dico in Aceto liq. si enim deperiret, & evaporaret, magnam pateretur peruram Gum. Ammoniacum 3j.

Tart. vitriolatus 3j.

Com. f. q. 3j. Gum. Ammon. f. Pilula minor.

De quibus capit æger vespere duas horas ante cenam, numero impare, v. g. 11, 13, &c. quæ altero mane blandè evacuant.

Si verò hæc Pilula asuales præscribendæ ad fluxum prono, loco Aloë lucidæ recipio Aloë liquidam, cum Aqua communi, aut Aqua Cichorii, aut succo huius extractam: Si cuti & loco Glottiarum aut per *Transversarium* Pilularum, sequentes Pilula asuales parari possunt:

3j. Aloë lucidam, cum Aqua Cichorii, vel Fenniculi in vini digestione extractam.

Alii

3j. Extractum Cichorii, R. asuarum, Pilularum, &c. cujus ope elicitur Mucilagin, quæ filtrata est inspissata in Extractum nigrum abit.

Ex hoc solo sunt Pilule parvæ ex uno grano, sive *3j.* Conf. LUDOVICI Pharmac. pag. 154.

Hic est optimus & simplicissimus Aloë usus. Quod si quis *asuales magis copiosas*, desideret, in modò dicti Extracti gummoso Aloë, addat Extractum Gummi Ammoniaci: v. g.

3j. Extr. Gummi Aloë 3j.

Ammoniaci 3j.

Viridi Martis ad albed. calc. 3j.

Trub. Alband. gr. viij.

Com. f. q. 3j. Extr. Martis f. Pilul.

Dos: huius sat xv. vel 12.

Hæc Pilule sunt egregium præservativum, in morbis Chronicis sub ætenuatione Lunæ ante novissimum assumentur.

V. Post Aloë, quæ cum Rhabarbora sola habetur innoxia, ad hoc Rhabarbora pergo, plantam polychædam, & ægrè egregè proficuum. Nominatur *Rha*, & fluvio Asiæ & Europæ circa regionem Septentrionalem fecerunt, qui fluvius habet in Malcora *Walgia* dictus: vid. OL. E. R. II. *Binarum. Pers.* Nam frequentissimè ibi crescere perhibent, unde etiam *Rha* vocatur.

Hæc autem moco, *Rha* esse duplex: vel *Barbarum*, vel *Ponticum*: *Rhabarbora* esse vel *verum*, vel *Monachorum*: *Ponticum* est vel verum *Theriacum*, vel *vulgare*, dictum *Connoarium majus*. Hæc prædicta sunt distinguenda, aliis consilio oritur.

Rhabarbora verum, quod hinc in officinis recipitur, est Sincere, nullumque aliud habemus verum Rhabarbaram, quam quod ex Sina ad nos affertur.

Rhabarbora Monachorum dicitur, quod in claustris Monachorum veligia hujus Rhabarbari inveniantur: Nam Monachi commentati in Meseum & Arabes de Materia Medica, ignorarunt Rhabarbaram, eisdem loci substituerunt *Hippopapathum majus*. Quia verò Hippopapathum hoc à Monachis nobis pro vero Rhabarbato extenuatum, adhuc hodie dicitur Rhabarbaram Monachorum.

Dixi *Rha Ponticum duplex esse*: vel verum *Theriacum*, aliis verum *Alpini Rha* dictum, qui primus hoc ex semine præparare fecit. Dicitur *Rha Ponticum*, quod in regione juxta Pontem Euxinum imprimis reperitur fuit. Et hoc ab ALPINO in præfati *Tractat. de Rhabarbato* verè est descriptum. Opponitur hinc *Rhabarbarum vulgare*, quod nihil aliud est, quam *Cantariolum majus*, quod ab ignorantibus Pharmacopoeis Rhabarbati verum habuit. Notum tamen *Rhabarbolum Sincere* esse differt esse ab illis Rhabarbato *Discreto*. Nam *Rha Veterum* fuit *Rha Ponticum verum Alpini*: unde Veteres de laxativa *Rha* monuerunt, de qua tamen nil GALENUS, nil DIOSCORIDES habent. Omnia vero hæc *Rha*, tam verum Sincere, quam adulteratum, item Ponticum seu Theriacum, *fuit de genere Lapathorum*, ad quæ tantum genus hæc Rhabarbata seu species pertinent. (G.) Conf. MÜNTINGIUS de *Brianum. Veterum*, ubi egregia de hoc habet. In specie tamen horum Lapathorum quædam laxant magis, quædam minus: Nam Sincere Rhabarbata quidem & Hippopapathum quidem laxant: hoc tamen in dupla, illud autem in simpli doct. Radix Rhabarbari verè est longa, per rufescens, ponderosa, egregiè amara, et adstringens ac: *dupliis substantia gaudens*:

1. *viscidis acricula*, quæ in subiecto aquoso mucilaginoso fundata est, quæque levissimo igne avolat, ut nihil de ea remaneat; in qua tamen vis laxativa residet.

2. *fixiori adstringente*, amaricante, absorbente, anodyna. Hæc sunt potiores posterioris substantiæ fixioris facultates: Hinc uti ratione prioris substantiæ blandè laxat, ita posterioris respectu adstringit, & ad omnes fluxus, omnesque laxos & dissolutos morbos confert: si enim in substantia consumatur, primo blandè laxat, post adstringit. *Hepati admodum conferat Venæ, ut anima Hepatis fuerit dicta*: Uti enim ipsi hæmatocæcos negotium Hepati tribuuntur, ita hodierni hanc vim de toto Hepate explicare debent: hic *listero*, Hydropi, &c. conducit. PARACELSUS multum in *no Meditridis tribuit*, quod verum etiam est: Nam præterquam quod urinam suo colore tingat, observatum quoque fuit, Rhabarbati usum etiam in Nephritide conducere, quatenus scilicet Renum spiritum insitum confortando, vel fermentum vitiosum corrigendo, juvat.

Utadi modum quod attinet. Veteres doct *3j.* in substantia ethærocræta, quæ doct nimis magna est: in *disse* potius cum alia, aut in *Pulvere* adhibetur. Quod Insitum, in usu est v. g. in *Febribus Tertianis* sequens:

3j. Gum. Cent. min. M. i.

Rhabarb. et 3j. vel 3ij.

Rol. Sena. flos 3j.

Salis Turici 3j.

Infund. in C. q. Vini Albi, per noctem: mase colaturæ

3j. 3ij.

D. S.

Vinum Abinthiacum purgans.

Præ-

(G) Minus ad species Lapathorum rancorem est Rhabarbaram; hoc enim est flore monogale campaniformi, mense Cl. Tournefortio, in Hist. Herb. claus. 1. sect. 4. Lapathum verò est planta generis flore flaccato, hoc solo ab Actæa distinctum, quod acido sapore caret, & quæperet a Rhabarbato longe distans.

Præterea etiam usurpatur in *psulis* pro pluribus doſibus, nimirum cum *psallis* pro ſcopo hepatico, ut vocantur, ſeu pro ſcopo temperandi, & dyſcratiſis ſanguinis, in *Mere*, *Cachexia*, &c. corrigenda; v. g.

℞. Psall. min. conſuſ. ʒi. ad ʒʒ.

℞. psall. el. ʒʒ. ad ʒʒ.

Ciccam. ʒʒ.

Infundantur iā

Aque comm. libʒ.

Stent vāc clauſo per 24. horas in Balneo Mariæ: mane coletur.

Eſt potus grata, ægrique admodum proſpicua. Rarum eſt, quod præciter pro ſcopo purgandi ſuſumatur, ſed potius pro actua viſcerum euerſione adhibetur. In hunc ſcopum in Hæmorrhagis nimis, pro ſcopo præſervativo & correctivo, in Fluxibus alvi, & in iſis, qui ad Hyſtrophem inclinant, adhibetur: v. g. in *Dysenteria*, & iſque principio, ſæpius ſumit Pulvis mihi ſunt in ſis:

℞. Rhabarbari ſteli.

Cera. Cer. aſi. an. ʒʒ.

Extr. theſiari. gr. iij. (aut huius loco Laud.

quati gr. iʒ.)

Olei deſtillat. Ciccam. gutt. ʒ. vel iʒ.

M. l. pulvis.

Communiter Rhabarbarum totum recipitur; ſed alii vāc: ſupponendum igitur partem integram, non vāc totum; ſic in fluxu Hæmorrhoidum ſequens præſcripti remedium;

℞. Rhabar. ſteli. an. reſi gr. xv.

Manati. prop. ʒʒ.

Cera. rub. prop. gr. v.

M. l. pulvis.

Latet alium, & ſimal Hæmorrhoides ſit. ſic in Eleſtione etiam contra Hæmorrhagias nimis Narium, Uteri, &c. ſemper addendum eſt Rhabarbarum in ſpecie pro Gachectici & Hypochondriaci ſunt, qui parant Eleſtione aliarum, ſolem incertum ſent, totum Hepatis reſtione, ſimpliciter ex Pulſis & Rhabarbaro: ſed in ſpecie in ſis ſæpe expertum eſt ſequens remedium;

℞. Psall. min. conſuſ. ʒʒ.

Rhabar. el. exalt. pulvis. ʒʒ.

Cum ſ. g. Symp. Rhab. ſol. M. pro Eleſtione.

De quo capiat æger mare quantitate Noci moſchate, iſi etiam, qui reconvaleſcant a morbis acutis, recipiat hoc Eleſtione, & ingens ſolamen percipit.

Sunt etiam, qui Eleſtione cum Extrado Rhabarbari parant cum Spiritu vini; ſed hoc nihil valet: Alium Aqua pacate ſolent, reſtione & prudentiſis quidem, quamvis & hoc ſimile ingreſſetur. In Officinis prolat Sympus de Cæſario cum Rhabarbaro, qui ſolentibus ſtatiim poſt partum propinat, ut meconium, & variis iſis ſardis, quas in Utero contraxerant, evacuet: Acui hic Sympus poteſt cum ʒi. vel ʒʒ. Sympus emet. Angelica. Alii habent Rha. propriatate cum Rhabarbaro, quod laude. Proſtant etiam alia.

VI. Reſtat Scammonium & Celerychis; quæ duo raro ſimpliciter pro purgatione adhibetur propter vehementiam & violentiam: ſed ſæpe ſemper loco ſimali aliis Purgantibus adiunctur, nimirum quando non ſumitur integra aliquid purgantis doſis, ſed aloreviatur, tunc additur de his ali- quid pro ſimulo: v. g. ſunt præſcribenda Pulvis purgans, tunc recipitur Maſſa Balaſtam Tartarum Quercu. ʒʒ. ad minimum; ſi verb alia addatur, recipitur harum Pulverum ʒʒ. & adduntur Scamm. prop. gr. iʒ. & Trachſum. Aliquid. gr. ʒ. pro ſimulo.

℞. Maſſ. Pulvis. de Nier. cum Agar.

Anno. Querc. an. ʒʒ.

Scamm. prop. gr. iʒ.

Trachſ. Alband. gr. iʒ.

Cum Oleo deſtillat. Maſſa l. pulvis.

℞. Maſſ. Pulvis. de Nier. cum Agar. gr. iʒ. ad ʒʒ.

Cum. Ammoniac. cum Aceto ſoluto ʒʒ.

Scamm. ſulphurati. gr. iʒ.

Extr. Trachſ. Alband. gr. iʒ.

Cum ſ. v. liſſum. Abſolu. vel Liſſum. vel Liſſum.

l. Pulvis pauiores, vel plures, prout placet.

Sunt polychreſta. Addi etiam Extrado. Abſolu. ʒʒ. poteſt.

℞. Extr. Cathol. Andra.

Panchym. Cr. an. ʒʒ.

Cap. Ammon. cum Aceto liſſum. gr. iʒ.

Scamm. ſulphurati.

Extr. Trachſ. Alband. an. gr. iʒ.

Cum Trachſum Tartari l. pulvis.

℞. Extr. Panchym. Crill. gr. xv.

Cum. Ammoniac. cum Aceto ſol. ʒʒ.

Scamm. ſulphurati.

Extr. Trachſ. Alband. an. gr. iʒ. vel iʒ.

Cum Trachſum. vel Trachſum Tart. l. pulvis.

℞. Extr. Panchym. Cr. vel alius gr. xv. ad ʒʒ.

Abſolu. gr. iʒ.

Scamm. ſulphurati.

Extr. Trachſ. Alband. an. gr. iʒ. vel iʒ.

Cum Trachſum Tart. vel Trachſum Martis, vel Rha.

prop. l. pulvis.

Item in Pulveribus:

℞. Tartari viriolati. gr. iʒ. ad xv.

Scamm. ſulphurati. gr. iʒ. vel iʒ.

Trachſ. Alband. vel Extr. lior. gr. iʒ. vel iʒ.

M. l. pulvis pro doſi;

Cum etiam addi poſſunt:

Olei deſtillat. Anſi gutt. iʒ.

Hic Pulvis quiqueſcit, licet, vel ſepies purgat, uti alia bona purgatio comparata eſſe debet; quia Digeltivum tartariſtatum promovere omnium Purgantium vim. Pulvis hic non ſit molitius, mihi valde familiaris. Purgantia enim non ſunt violenta ſunt, nec in magna doſi præſcribantur; ſed lenia, & quæ vel ſepies vel ſepies tantum ad excretionem ſtimulant:

Io Bolis

℞. Pulv. Hypocraſ. laxat. ʒʒ.

Scamm. prop. gr. iʒ. ad iʒ.

Cum Conf. Rha. laxat. l. Bolis.

D. S.

Bolis purgans.

Item ergo Scammonium conſiderandum venit, quod nihil aliud eſt, quàm ſuccus iſſiſſimus præſtantiſſimus Convolvulus: quæ ita dicuntur, quod ſurgendo palmatiſis adhaerent: Græcè *Ἰσχυρὸν*, Germanicè *de Winden*.

Hæc Similis dividitur in *leves* & *aſperas*: Ad *aſperas* pertinet *Sarcoparilla*: *Levis* iterum eſt vel *maior*, vel *minor*: *Maiores* dicuntur Convolvulus *maiores* ſilphibris; & hæc opponitur *minor*, cujus ſolia etiam laſcitant. Ad Convolvulus dos *leves* pertinet Scammonium, ſimiliſſimumque eſt Convolvulus noſtro majori levi, & radice tantum diſcrepat. Repertur in Syria, præſertim circa Scammonium Antiochiam, ita diſtum, quod circa Antiochiam erexit. Ex hoc exprimitur ſuccus, qui iſſiſſimus eſt vel *maior*. Hic autem ſuccus duplici modo elicitur: vel Radia ingens recipitur, & deſuper abſcinditur, hinc in medio ſi perſectur, reponiturque in locum tepidum, ſed in medio intramini copioſum Lac traſſuſtat, qui ſuccus laſcus reſpoſitus optimus dat Scammonium: vel Radia & Planta ſimul contunduntur: Succuſque exprimitur; eſt tamen Scammonium hoc modo adulteratum. Priori modo Veteres ſum Scammonium præpararunt.

Adulterari etiam ſolet Scammonium cum Lade eſſiſſimo aut tithymalino; ſuccus enim Eliſe aut Tithymali mirè accedit ad formam Scammonii. Adulterium autem hoc dupli modo cognosci poſſit:

1. Scammonium genuinum non eſt adeo acre, quàm Lac eſſiſſimum.

2. Scammonium genuinum, cum aqua ſimplici trita, ſpirat odorem aromaticum non ingratus, ſed ipſum vim elendit alterantem; quod non ſcit adulteratum.

Item Scammonium hoc eſt ſuccus compoſitus pro more Vagabundum ex *gemma* & *reſiſſa* ſubſtantiſſima. Reſiſſa autem eſt *deſiſſa*: vel *acris*, vel *magis* inſiſſa, inſiſſa, inſiſſa. Prius cum *ſpiritu* vini, poſterior mediante Aqua elicitur. Poſteriori modo eſt v. g. l.

℞. Scammonium:

& retinetur cum Aqua ſimplici, ſe miſtura quæ laſca: Gummeda ſubſtantiſſima, aut cum contenta Reſina picea decantatur cum Aqua. Iſſiſſa verb materia remotionem nullius eſt pretii, niſi quod termina eſt. Adhuc hic eſt BRENDELLI, deſcribiturque in Chymia ſua in *Actu ſermon* redolentia, quæ quibuiſ alia præſent.

Præparatur tamem etiam ſuorum Reſina cum Spiritu Vini; haat hæc, moderate tamen, præſertim cum aliis miſta. Proſtat in Officinis Pulvis Cornuſini Comitib. de Warwrick de quo Auſter perſuadere librum conſcripti, qui conducit ad quovis morbos acutos. Baſin ejus conſiſquit Reſina Scammonii; v. g.

℞. Reſin. Scammon. ʒʒ.

Antimonii præſiſſi cum Niter albaſſi (volgo ſumitur Antimonii diſſi, ſed malè) gr. viij.

Crem. Tart. gr. iʒ.

M. l. pulvis.

Hic Pulvis diversimodè operatur; modò enim laxat, modò vomitum excitat. Ad hujus Pulveris imitationem aliquoties felici cum successu in *Ternis* prescripti sequens.

℞. Resin. scam. gr. xij.

Antimon. diaph. gr. ix.

Crem. Tart. gr. v.

M. f. Pulvis.

Prodest imprimis in Sanguine, Pituita, &c. In subje-
ctis Macris, Biliosis, Melancholicis, &c. non equè succo-
dit. Refina Scammonii autem in hoc Pulvere non tam pro-
copio laxandi, quam alterandi recipitur.

℞. Scammonii in genere est, ut sit stimulus in Purganti-
bus. In specie sub usu ejus exercetia externi solent te-
nuia, fluida, paulò acris; unde Veteribus inter *Cholagoga*
relatum. Operandi modus est duplex: Nimirum substantia sua
resinosa adhaerendo & vellendo, substantia vero sua gumme-
sa colligendo humores, & in seriem liquorem permitten-
do, operatur. Tamen in se non addit vehemens aut viru-
lentum est remedium, quàm illud est, quod valgò prodit;
cum nonnisi ex ipsa Radice habemus Scammonium. Imò
etiam Infantis Scammonium propinari potest, & si Pul-
veris fuliginis addatur, facit operatur: sic in usu est, si
prescribatur:

℞. Crem. Tart. gr. vi.

Tart. vitriol. ℥ss.

Scam. prepar. gr. ij.

Trach. diluat. gr. j.

M. f. Pulvis.

Hic pulvis a 6. vicibus, blandè tamen, operatus fuit,

Vel

℞. Pulv. Pepsil. ℥ss.

Tart. vitriol. vel salis diaph. ℞. vel salis

Ammoniaci gr. xij.

℞. Jalap. gr. v.

Scamm. sulphurea gr. ij.

Cam. Syr. Raf. fol. i. Bals. S.

Electuarium purgans pro una vice.

Simili modo *alita Cathartica additur*, v. g. si sit prescri-
benda Potiuncula ex Extr. Heliebore nigri & Scammonio,
per stimulo non recipiatur Refina, quam in odio habeo, quia
termina excitat. Recipitur ergo potius Scammonium pul-
verisum, huic affunditur *Succi Cydoniarum*, per se depura-
ti & probè agitentur, & in digestione ponantur, sic
emittitur Mucilago, quam inspissata, vel in forma Extra-
cti, vel Pulveris sumenda.

Veteres alium modum pro Scammonio corrigendo ha-
buerunt: loco enim *Succi Cydoniarum*, recuperant *Pomum*
Cydonium, quod excavata indiderunt Scammonium, voca-
rentque postea *Digridium*.

Corallia Scammonii per sulphur ad valet. Fundamentum
constitit in eo, ut spiritus acidus igne sulphuris corri-
gat Scammonium.

Jam vero

1. *Sulphuris fumus aspidis* penetrans integraliter afficit
Scammonium: quendam eam particulis plius, quæ-
dam modis alterantur.

2. *Spiritus ejus acidus* castrat & emervat Scammonium.

Ergò *Brendelliana corallia annibus proflas*. Si ulceris cor-
rigere placeat, Emulsioni addatur *Oleum Tartari per ali-*
quum sed tunc in majori dosi danda. Rarum aliis est, Scam-
monium per se pro scopo purgandi adhiberi, interdum ta-
men fit, ut vel in substantia, vel refina adhibeatur: v. g. Po-
tio sequens in forma Emulsionis grata prescribi potest:

℞. Resin. scam. ℥ss. gr. xij. ad gr. xv.

Teratur eum

Sacchari ℥ij. vel ℥ijj.

affundendo lentim

Succi Cui vel Cydoniar. ℥ss. vel ℥vj. ad ℥j.

Misc. exactè, huc Pepsil. lappos.

quæ blandè & eleganter operatur

Vel

℞. Scamm. crud. vel prepar. ℥ss. ad gr. xv.

Teratur c. l. q. Aqua Refor. cum paucis *Olio Tartari per*
aliquum acuta, in mortario lapideo, ac huc Emulsio
quæ decanter ut facibus, & addito paucis *Aquæ Cinnamomi*
edulcoretur cum *Saccharo* vel *Syrupo quadam*, &
erit *Potio grata*.

VII. *Urticæ* seise offert *Calceyashis*, cujus etiam unicus
est usus pro stimulo. Species est *Cucurbitæ sylvestris* (H),
vehemens purgans. Germani vocatur *Calceyashen*, Arabes

vocat *Mandal*, ac cum præposito Article *Al*, quod idem
est ac *Hic*, *Hæ*, *Hæ*, vocatur *Almandal*. In usu tantum
est pulpa laeas Cucurbitæ maturæ, quæ ex *Egypto* ex-
ficcata ad nos affertur: Semina ejus minus sunt in usu,
utur LOBELIUS eorum usum deprædicat.

℞. Urticæ vel generalis vel Syriacæ. Generalis est, quod
inter vehementissima Vegetabilia eminet Purgantia;
nam cum gravissima torminibus purgat. Quod usum spe-
ciale, proterbum est Prædicium: Quæ alia non arriquant,
ex aringis Calceyashis, adeoque ad Pituitas vitreas Vene-
ribus dilata, hinc mucilaginosissimos humores, prodest, sine
inter *phlegmæ* primatum ducit, ac in *Line Venereæ*
per alius laudatur.

Calceyashis hinc

1. *Saporis est amarissimi,*

2. *Simil. alchafui, &*

3. *Tob. minimo multum diffundit.*

Ab his particulis est, quod usum. Calceyashis sequitur
affus insignis, sitis clauda, inflammatio ventriculi, tor-
mina ventris, hypercatharsis, imò periculum convulsivum;
modò igitur ejus nimia acrimonia temperetur.

Ceteroquin sane læret in ex vis reolutiva & laxativa hu-
morum tartarorum, hinc in Calceyashide est vis Menfis
stimulandi jussu HELMONTIUM; hinc Forcum & So-
eandem pellit. In specie Cachectici conducit, unde &
quibusvis Elaisitis Anticachectici addi solet Calceyashis.

In corallina Calceyashide commendat, ut extrahatur cum mer-
curio aquæ potis, quàm spiritus, Aqua enim temperat
Refina Calceyashidis. Vitres per Gummi Tragacanthæ,
Oleum camomæ, Laudanum, &c. correuerunt, in Trochi-
scos subegerunt, & vocantur *Trochisci Almandal*. Alii
cum Urina humana correuerunt. Optima tamen correctio
est, quæ fit cum *Salis Tartari essentia*, & si diutius di-
geratur cum *Salis Tartari*, acrimonia ejus perit, reman-
etque tantum sapor amarus.

Utrum modum quod attinet: nunquam per se exhibetur
Calceyashis, nisi in fortiori Clymate. Recentiores Colo-
cythidem potius includunt, uti hoc imprimis urget LO-
BELIUS: quod valde rû, cùm peria via correxerat viru-
lentiam ejus: igitur potius in Infusum, vel in forma Trochi-
scorum, vel ad Extrahit adhibetur. In *Infusa Almandal* laxativis
additur dosi ℥ss ad ℥j. in subiecta tabula. Optima modus
in forma Trochiscorum ad gr. i. vel ij. pro stimulo; non enim
utor alia ratione Calceyashis, quam sub forma Trochi-
scorum. Extraham nunquam, quia minus tutum, usurpare
licet: nam propter relictissimam insignis tormina excitat.
Sunt qui dicunt: si *Poma Calceyashidis* recipiantur, ac in *Acid-*
o destillentur per alambicum, & accendere Oleum, quod latius
purgat. Sed sic fides penes experientiam.

VIII. Restat *Mercurius dulcis*, qui Extrahis Purgantibus
commode additur, ac fiant *Pilula Polydoxia* in morbis Chro-
nicis, quales Lues Venerea, Scabies ferina, Epilepsia Inve-
terata, & alii contumaciter affectus: v. g. ponant talem
Scabie ferina laborantem:

℞. Extr. Panchym. Cy. vel Helieb. nigri. gr. xv.

Mercurii dulc. ℥ss. ad gr. xv.

Scamm. sulphur. gr. j. vel ij.

Extr. Trach. Almand. gr. i. vel ij.

Cam. ℞. Menta vel Ligni Sassafr. f. Pilula,

quæ vocantur Mercuriales, S.

Blut-reinigende Pillen.

Vel

℞. Conf. Pamar. ℥j.

Mercurii dulc. gr. xv. ad ℥j.

Scamm. prepar. gr. v.

C. Syr. Rubi Mal. f. Bals.

TITULUS TERTIUS

De Diureticis.

INTER Purgantia generalia, conveniendis *vis Diuretica*,
per Urinæ copiosum fluxum quos recrementosa eva-
cuantia, siveque ea vel *Pilulis* vel *Fina*: E. g. *Diureti-*
cum Pilulis sit.

℞. Aqua Petrosel. ℥ij. vel ℥ij.

Osmid. vel Alkercap. ℥j.

Malvar. Junciperia ℥vj. ad ℥j. vel ℥ss.

Syl.

(H) Imò ad Angurium & solus in profunde lacinis diffusus, & fructus ferre accedit. ex ratione ab illa & a reliquis
Cucurbitaceis differt, quod fructu amaro sit & minus eduli.

- Spiritus Lumbi. per patref. 3ij.*
Tartari vol. vel Carui. 3ß. ad 3j.
Syr. Rh. terr. vel Fenic. 3ij. ad 3vj.
 M. f. *Poleo cochlearia fumida,*
 24. *Aqua Nider. terr.*
Omnia.
Petrof. an. 3j.
Malvat. Juniper. 3ß.
Spiritus Lumbi. terrestr. per patref. roß. 3ij.
Salis Ammoniaci 3ß.
Syr. Rh. terr. 3j.
 M. f. *Poleo.*
 Dosis s. j. vel a cochlearia,
 24. *Aqua Nider. terr.*
Omnia.
Petrof. an. 3j.
Malvat. Juniper. 3ß.
Spiritus Lumbi. terrestr. per patref. 3ij.
Olei diffillat. Terebinth gutt.ij. vel Juniper. gutt.vj.
Syr. Nider. terr. 3vj.
 M. D. S.

Mixtura diuretica pro aliquot visibus,
 Vel

24. *Aqua Fragr. 3ij.*
Tinctura Tartari 3j.
Syr. Rh. terr. 3ß.
 M. f. *Poleo.*
 24. *Aqua Fragr. 3ij.*
Sal. effus. Tartar. 3ij.
Chyl. urina 3j.
Syr. Rh. terr. 3ß.
 M. f. *Poleo.*
 24. *Aqua Fragr. 3ij.*
Lapill. Cancer. 3ij.
Spiritus Salis dale. an. 3j.
Syr. Rh. terr. 3ß.
 M. f. pro *Poleo.*

Pertinent huc *Tartarus volatilis*, *Spiritus Tartari volatilis* probè redificatus, *Tinctura Nephritica Ammelangi*, quæ paratur ex *Silicibus Sclariis* (sunt certi Silices, qui maculas flavas habent, prope Saalfeldium reperiuntur) Nitro, Tartaro, & *Misura Antimonii Unguini*, invicem misis, & per retortam tubulatam paratur, non redificatur. Modus observandus: Dissolvitur Nitrum in Aqua simpliciter, & post mixtum cum reliquis spiritibus, seponitur in cellam, ut probè subigatur, & postmodum destillatur. Est *Tinctura Nephritica Sclaria* multi usus, non saltem pro Diuresi, sed & Sudore, in affectibus maximè Scorbuticis non contemnenda.

Non credit huc *Spiritus Carminativus* polycrebrius de tribus Doct. MICHAELIS, destillatus ex Tartari & Nitri ana, per retortam tubulatam in receptaculum, in quo aliquantulum *Spiritus Vini tartarizatus*: liquor destillatus aliquoties à Sale Tartari vel à Capite mortis proprio probè redificatur, & ita asservatur; & sic est *Spiritus Tartari volatilis* egregiè diureticus, & ob vim discutientiæ status, dictus *Carminativus*, usus egregii in morbis multis.

24. *Spiritus Sal. Ammoniaci,*
Lumbi. terrestr. an. 3j.
 M. S.

Spiritus Diureticus:

Dosis 40. usque ad 50. guttas.

Hic in die assumatur in haustu Vini, aliis fit Sudoriferum; in Vino verò ratione alcali mutatur in salisam;

24. *Tinctura Tartari tartarizat. 3ß.*
 Dof. 50. gutt.

24. *Tinctura Tartari 3ij.*
Allyf. urina 3j.

M. D. S.

- Tinctura Diuretica,*
 Dof. 40. gutt.

24. *Spiritus Sarmis. de tribus 3ijß.*
Lumbi. terr. 3jß.

M. S.

Spiritus Diureticus.

Dosis 40. guttal.

24. *Liqu. Terra sol. Tartari 3ijß.*
Spiritus Sal. Ammoniaci 3jß.

M. S.

Mixtura Diuretica.

Dosis 40. gutt.

Pertinent huc Succinum & Sal volatile Succini; Diure-

ticorum apex, Oleum destillatum Sacconi, Petroleum, cinis Raphanacea, Aromatica, Allista, Cepæ, &c. quous præ aliis adnumero Perficariam acrem, quæ mirabile est Diureticum, & simul præservativum Nephriticum; Alkekengi, Terebinthina, Oleum destillatum Terebinthina; Juniperus, Oleum destillatum, & Spiritus baccarum Juniperi; in specie *Malvatium Juniperinum*, quod fit ex *Spiritus baccarum Juniperi*, sed Juniperi affuso & digesto; Camphora, Urina humana, & inde autum sal Ammoniacum, quæque spiritus, Lumbici & coram Spiritus per putreditionem paratos, & sal volatile spiritus & sal volatile Bulonium, propter vim alimentum Bolonium, quia vesicator Musci de Cantharidum genere, Scarabei Magies, & ubi fortiter agendum, insulsum Aclerorum, & Cantharidum ritè paratum: c. &c.

24. *Canthar. pulveris. 3j.*

Insundantur in

Vini Rhm. 9vj. 3ij. vel iv.

Stent in loco tepido per aliquot dies & noctes, filtratus per chartam.

Vinum diureticum.

Dosis gutt. x. xv. ad xx. adducendo, in haustu tepidi fuculi; vel hupus Insili cochlearie permiscetur aliis septem cochlearibus Vini vel Cerevisiæ: de quo Mollura una die cocti, altero die 2. & sic adducendo, propinquetur: vid. BARTHOLINUS *Coct. 5. Hippo. Anatom. 3i. & c. 4. xpi. fol. 145. 93. 34j.* & 40. Intendunt excitat Vesicæ exacerationem, & Miliam cruentam, qui curatur statim per uberiorum haustum Lactis, præcipue cum sale Tartari. Omnis præsertur succus Butele de quo vid. HELMONTIUS de *Lithia*. Fermentat iollar Vini, degenerat tandem in Acetum paræi & in Nephritide planè est singularis remedium. Vel fiat *Decollum Diureticum*.

24. *Herb. Fragr.*

Surmar. an. M. ijß.

Rad. 5. Aprinet. 3j.

Bacc. Alkekeng.

Juniperi. an. 3vj.

Sem. Fraxini.

Cicer. roß. an. 3ijß.

Arom. Tartari 3j.

Coqui in Aqua Petrof. & Alkekengi: In colat. lib. ijß.

disolve

Roh. Juniper. 3j.

Syr. Alth. Fern. 3j.

Spiritus Salis cum Spiritu Frag. dale. q. f. pro

grato sapore.

Vel:

24. *Raf. signi Juniperini 3ijß.*

Co. in l. q. Aqua simplic.

24. *Colatur. lib. ijß.*

Cui servent insul.

Bacc. Juniper. rer. 3ijß.

Rad. Fenic. 3j.

Terra sol. Tartari 3ijß.

Stent in insulo per noctem: Colatura odaloretur cum

Syrupo de 5. radiebus.

Diuretica Fina in specie sunt omnia Salia artificialia falsa compocita, qualia Tartarus vitriolatus, Nitrum, sal digestum hypochondriacum, quod fit, si destillatur *Spiritus Salis Ammoniaci ex Sale Ammoniaci & Sale Tartari*; remanet Caput mortuum falsum, quod potens est Diureticum; item Salia Vegetabilium ritè calcinando parata, ut sunt sal Stipitem Fabarum, sal Genistæ, & suo modo sal Fimi columbini, &c. sunt Salia falsa, & calcinatione diuturna sunt alexisata; item mediæ quasi temperate nature sunt Rob Juniperi, Semen Violarum, Mili Solis, & ex his parant Emulsionem concinnæ pro Urina pellenda; Extrafact Alkekengi item Vinum, in quo Silices candefacti aliquoties extincti fuerant: v. g.

24. *Tartari vitriolati. gr. xv.*

Salis Genist. 3ß.

M. D. S.

Sal diureticum.

Vel

24. *Tartari vitriolati. rad. 3vjß.*

Salis Stip. Fabar.

Genist.

Fimi columbini an. 3ß.

M. f. *Puleis* pro aliquot dosibus.

Sumatur in vino: vid. HOFFMANNUS in *Met. Medendi*.

Addi pro habitu etiam possunt olei diffillati Terebinth. vel

lav.

baccar. Juniperi gutt. iv. v. vel vi.

℞. Tartari vitriolati.

Salis Fin. columb. an. ʒiʒ.

Stip. Faber.

Genist. an. gr. xv. ad ʒi.

M. f. Pulvis.

Hauriatur in Vino.

℞. Tartari vitriolati. ʒi.

Salis stip. Faber. vel alius ʒi.

Olei defillat. bacc. Juniper. gutt. iv.

M. pro duabus partibus.

℞. Tartari vitriolati. ʒi.

Lapill. Cancr. prop. ʒi.

Salis fere. columb. gr. xv.

M. Succini ʒi.

M. f. Pulvis.

div. in ʒ. part. æqua ʒ.

Pulvis salinus Diureticus cum Vino sumendus.

Vel

℞. Arsen. dupl. ʒi.

Salis stip. Faber. vel fere. columb. vel Genist. ʒi.

Olei defillat. bacc. Juniper. vel Terreb. gutt. iv.

M. f. Pulvis pro duabus partibus.

℞. Tartari puri. vel Crem. Tartari. vel Nistri puri.

vel Nistri antimoniati. ʒi.

Sal Tartari ʒi.

Olei defillat. Terreb. vel Juniper. gutt. iij.

M. pro duabus part.

Vid. Tartarus tartaricus. LUDOVICI in Pharm. pag. 39.

℞. Salis Genist.

Stip. Faber.

Lapill. Cancr. prop. an. ʒi.

Salis vol. Succini. gr. iij.

M. f. Pulvis.

℞. Crem. Tartari ʒi.

Lapill. Cancr. prop. ʒi.

M. pro duabus partibus, in vehiculo fervido alluendis.

℞. Turis sal. Tartari ʒi.

Lapill. Cancr. prop. ʒi.

Misc. pro tribus partibus.

℞. Crem. Tartari ʒi.

Vitriol. Martis rivi par. ʒi.

M. pro duabus partibus.

℞. Salis effus. Tartari ʒi.

Vitrioli Martis ʒi.

M. in mortario lapideo, hinc exsicca, pro quatuor partibus.

Diureticæ etiam sunt Acidula naturales, item Spicitus

Salis & Nistri dulcis.

In forma Sali:

℞. Rab. Juniper. ʒi.

Lapill. Cancr. prop. gr. xv.

Tartari vitriolati. ʒi.

Misc. pro Sali.

Pro Eleqtuario Diuretico:

℞. Conf. Violar. ʒi.

Rab. Juniper. ʒi.

Lapill. Cancr. prop. ʒi.

Arcan. dupl. ʒi.

c. f. q. Syr. Hyd. terr. Sat. Eleqtarium.

superfundendum cum Spiritus Salis parum.

TITULUS IV.

De Sudoriferis.

Sequitur tandem Evacuatio per Sudorem, ob id Diaphoretica dicta. Fit Sudor, quando Sanguis quacunq; causa resolutus, & quasi liquefactus, cerebri circulo per uoluerum corpus raptus, sub quo motu simul attenuatur later ejus aqueus, seu vehiculum Sanguinis, quod copiosius dissolvit & imbibit sassa heterogenea atq; particulas recrementosas, per Sanguinis fermentativum motum separatas, simulq; dum per partes solidas circulator, sassa ista acquisita listivali virtute mundificat eas, fordesq; sub nutritione reitidas abstergit, quicquid interea sub circulari hujus Sanguinis, ejusque feroli latera mota, defertur in vasa capillaria peripherie corporis, penetrat in Glan-dulas miliaris Intercutaneas, per quas sunt guttularum minutissimarum forma tandem extra corpus eicitur. De Glan-dulis miliaribus STENO & MALPIGHIUS videatur.

Tom. II.

Quoad Sudorifera Remedia: sumimus nunc Pelatilla, nunc fixa: Priora sunt omnia Salia volatilila, & eorum Spicitus tamea Regno Animalis, quam Vegetabilis. Ea Animalis eliciuntur per simplicem destillationem, ut Sal volatile & Spiritus Cornu Cervi, Urinæ humane, Salis Ammoniaci, qui soboles est Urinæ, & polychrestus; Spiritus Crauti & Sanguinis humani, Viperarum: hæcque sunt tam macra, quam pinguis, quæ potentissima sunt. Illa, ubi sine caloris intentione artificiaii provocare volumus Sudorem; Hæc ubi simul calorem intensiorem reddere animas est. Ex Regno autem Vegetabilis sunt omnia Salia volatilila, quæ benebico putrefactionis sunt, & sublequente destillatione; qui Spiritus volatiles hoc in passo egregii sunt. Pertinent huc etiam Theriaca & Mithridatium, Eleqtoria Dialcordii Pra-castorii, & compositiones Theriacales cum Aceto imprimis vel Vino allumendæ, quæ copiosè Sudorem eliciunt: Spiritus volatiles oleosi, v. g. Spiritus Theriacalis camphoratus, Florum Sambuci, Roslimarini, &c. Pertinet huc Tinctura Bezoardica camphorata, Mixtura simplex, necnon Olea destillata, ut Oleum Succini, Caryophyllorum, Camphoræ genuinum; item Olea destillata empyreumatica ex Ossibus Animalium aliisque, quæ prius aliquoties à capite mortuo rectificentur, v. g. enim deponunt fetorem, & ad aliquem guttas assumptæ, copiosissimos & foetidos sudores eliciunt, ut Oleum destillatum Tartari, Ligni Guajaci, Buxi, &c. quæ cum nihil aliud sint, quam Resine vi ignis colligatæ, patet, quod hæc ratione etiam ipsi resinsolida concreta vim sudoriferam exinde obtinebunt, ut Angelica, Effensæ Lignorum, Theriacales ex Aromatibus resinosis; item Vegetabilia inensæ amara, & quasi incidentia, qualia sunt Abinthium, Carduus benedictus, Radix Vineticiæ, Flores, Roræ, & Succus Sambuci, Radix Chinæ, Cortex Chinæ-chinæ, Ligna exotica quæcunque, Sassafras, &c. domestica, ut Lignum Quercionum, &c.

Formule Sudoriferarum Pelatillarum:

℞. Salis Ammoniaci vol. gr. xv.

Camph. gr. ij.

M. S.

Sal Sudoriferum pro una vice.

Vel

℞. Aqua Fumar. ʒi.

Spiritus C. C. cum Sal. vol. ʒi.

Syr. Card. bened. ʒi.

M. pro Potione. S.

Potiancula Sudorifera pro una vice.

Vel

℞. Aquæ f. Sank. ʒi.

Spiritus bacc. Sank. ʒi.

Sal. Ammon. ʒi. ad ʒi.

Camph. (quæ potens & nobile est Sudoriferum)

gr. ij.

Syr. Card. ben. ʒi.

M. f. Potio pro una dosi. S. ut anteq.

℞. Aqua Card. bened. ʒi.

Spirit. Sal. Ammon. ʒi. vel Sal. vol. Sal. Am-

mon. ʒi.

Olei defill. Caryophyll. gutt. i. vel ii.

Syr. Fennic. vel Cori. Aranc. ʒi.

M. pro Haustu Sudorifero.

℞. Aqua Stracem. ʒi.

Cinacum. ʒi.

Spiritus Theriac. camph. ʒi.

Salis vol. C. C. gr. xij.

Succini gr. vi.

Syr. Card. ʒi.

M. f. Potio. S.

Haustulus Sudoriferus.

Quoad Sudorifera Fixa: sunt omnia Salia listivalia fixa, rite alcalisata; nam si remaneant salia, Diuretica potius proveniunt: item Sulphura metallica, & Mineralia fixa; unde omnia Antimonialia per Nitrum fixata, ut Antimonium diaphoreticum, Bezoardica mineralia, simplicia & composita, Antimonium diaphoreticum Martiale, Aurum diaphoreticum, Cinabarum Antimonii, &c. Pertinent & huc suo modo Animalium Cornua, & partes offeæ cum & sine igne præparatæ, ut Ossa Hominum sine igne, Cornu Cervi ultum & sine igne præparatum, Cranium humanum præparatum, Mineralia, Terra sigillata, Unicornis fossile, &c. Præ ceteris fixum polychrestum est Antimonium diaphoreticum Martiale, compositum ex Antimonio & Martis, cum triplo Nistri fixatum: cujus compositionem docet LUDOVICI in Pharmac. pag. 330, multi usus est in morbis Chronicis, ut Ictero, Febribus, Scorbuto, &c. Nobile conjugium

D

er

est sulphar Antimoni & Mars, quæ duo revera conferunt pro usu sudorifero interno. Lapis Bezoar nil valet, qui loter mille vix tones est geminus, sed vel adulterinus, vel artefactus: hinc præterit Calculus humanus qui optimum sudoriferum est, in morbis Pestilentialibus insigniter proficuum.

Formulae sudoriferarum Fæcularum:

24. Antimoni diaph.

Cornu Cervi fuscig. 3j.

Salis Card. bened. an. gr. xij.

M. pro Pulvere, haerendo jejunio stomacho in vehiculo calido.

Vel

24. Antim. diaph. simpl. scilicet Martialis 3j.

Salis Card. bened. 3j.

Land. opiar. gr. i. vel ij.

Ol. deffillat. Caryophylli gutt. ii.

M. f. Pulvis pro una dosi: S.

Pulvis sudoriferus pro una vice.

Vel

24. C. c. fuscig. gr. xv.

Cornu Cervi fuscig. 3j.

Recurd. solat. gr. iv.

M. S. ut supra.

24. Cornu Cervi fuscig.

Nervi anis. an. gr. xv.

M. f. Pulvis.

Sign. ut supra.

24. R. Samb. aut Juniper. 3j. ad 3j.

Cornu Cervi fuscig. 3j. ad 3j.

Antim. diaph. 3j.

Cum Syr. R. R. i. Bolus. S.

Bolus scilicet Electarium pro una vice.

Vel

24. Antimoni diaph. 3j.

Extr. Card. ben. gr. vj.

Cum Syr. Fumar. f. Bolus.

Vel

24. Extr. Card. ben. 3j.

Land. op. gr. i. vel ij.

Cum Ol. deffillat. Anis. vel Tartari rectif. f. Pilula.

D. S.

Pilulae Sudoriferæ & Sanguiferæ.

Vel

24. Extr. Card. bened. 3j. ad 3j.

Theriacal. gr. v.

Cum Ol. Fœnic. f. Pilula: S. ut antea.

Vel

24. Extr. Lignorum gr. xv.

Cornu Cervi fuscig. 3j.

Cum Ol. Tereb. f. rect. f. Pilula.

Sudorifera mixta ex Fialis & Pilulis:

24. Antimoni diaph. Martialis 3j.

Sp. vol. Viper. gr. v.

& quando niger est inquietus,

Land. opiar. gr. i. vel ij.

M. f. Pulvis.

24. Aqua scabif.

Fler. f. f. f. f.

Umar. 3j.

Cord. Hirc. f. f. f. f. 3j.

Sp. vol. Theriac. camp. 3j.

Antimoni diaph. 3j.

Cornu Cervi fuscig. 3j.

Sal. vol. Cornu. Cervi 3j.

Camp. gr. ij.

Syr. Card. f. vel 3j.

M. S.

Potio Sudorifera.

Semper bene agnanda pro a. vicibus.

24. Aqua f. f. f. f. 3j.

Cornu Cervi fuscig. 3j.

Sal. vol. Cornu. Cervi. gr. v.

Syr. f. f. f. f. 3j.

M. f. Pulvis.

24. Aqua f. f. f. f. 3j.

Theriac. Androm. vel El. f. f. f. f. 3j.

Sal. vol. Viper. gr. vj.

Camp. gr. ij.

Syr. R. R. i. 3j.

M. D. S.

Hauftus Sudoriferus pro una vice.

Vel

24. Aqua Card. bened. 3j.

Cliff. urinal. 3j.

El. Diacord. Frac. 3j.

Syr. Card. ben. 3j.

M. D. S.

Hauftus Sudoriferus.

Vel

24. Tinctura Bezoar. 3j.

D. S.

Tinctura sudorifera pro duobus vicibus.

In robustis vero corpore, & casu periculo pro una dosi 3j. sufficit.

Hæc sufficiant, quod Motum sanguinis Fermentativum retinendum, & quod Alterationem ejus succorum.

C A P U T IV. MONITA PRACTICA

De Facultate Animalis.

Absolute ita consideratione Facultatis Vialis generali Practica, pergitur ad Facultatem Animalem, tanquam altissimam Principalem Viem, in spiritibus Animalibus, & Systemate Nervorum fundatam. Quod spiritus Animalis: attendenda est eorum subtilitas, hinc corpus & volatilitas: sed de his commodius infra & hinc agam. Quod Systema Nervosum: in hoc attendendum primo ad Descriptionem, quod est Chylus, qui immixtus eas partem Nervosam nris, ob id etiam labeas, inspicie hunc acorem, facili illis afficit, Nervos partibus per se inanimatissimis, tunc coarctat, tunc ad eorum stridendum, quæ quædam est, tota coarctat, & subtilestima & delicatissima Fibris, cum coarctatis in Nervos, nunc hinc inde separatis & distributis. Nam & ipsum Cerebrum, tanquam hanc systema hunc, Fibram talium delicatissimarum tegmine glanduloso includitur, est systema; unde consequenter ex hac texture, unum reliquum systema Muscularium, Membrarum, Nervorum, Tendinum, utitur: de qua vid. MALPIGHIUS Tract. de nervis, utitur: item WILLISIIUS in Anat. cerebri & Nervorum.

In hoc systemate Nervosum maxime considerandum est debitas Fibillarum tunc, seu legitima eorum tractus, quæ tenuis Fibillarum nervorum dependit partem a propria texture, quæ insit chordarum tunc tenis: partem ad infusum & radii spirituum Animalium, debitas tunc Fibillarum nervorum conservantium. Hæc Fibille nervæ in debito tono constitutæ, arguunt sunt Motus & sensus. Motus omnis fit ab his Fibris, cum infusum, mediotibus spiritibus Animalibus, dicitur Fibrarum contrahitur promoventibus, etque omnis vel Animalis vel Naturalis. Ratione utriusque ubi hinc sunt hinc ipse Fibre vel deficiunt Paralyticis, vel etiam Moribus Convulsivis & spasmodicis, qui, ipsamodi scilicet, insequuntur proximè præcedentem irritationis scilicet, indeque natum rapidioris spirituum motum. Irritatio hæc in specie est vel a Frigore externo, vel si a causa interna, ordinariis utitur a vitioso Acido: Utraque Nervis sunt inimicissima. Hinc Acidum destruentia, penetrantia, simul tamen temperata Volatilia oleosa, adeoque Aromaticæ, Nervis sunt amicissima: hinc quæcumque Aromata & Vegetabilia aromatica suaveolentia, Salia volatilia, etque Simplicia prædita Salibus volutibus, & Ope deffillata, Nervis amicissima, item Sulphura metallica, quæ omnia Acidum peccans corrigunt & destruant, Nervina & Cephalica dicuntur, & in omnibus affectibus in Motu vitato ortis, sive Atonia aut Paralyticis, sive Motus depravatus, sive Motus convulsivus, convulsionem, v. g. Rosmarinus, Mentha, Salvia, Majorana, Lavendula, Spica, Strachia Arabica, Melissa. Flores Liliorum convallium, Callæorum, omnia etiam propriè sic dicta Aromata, ut Cardamomum, Macis, Cubebæ, Galanga, &c. & omnia ex his parata, Spiritus & Olea deffillata, cumque his parata Salia volatilia oleosa: Acidum etiam temperat Succinum & Saccharum, restit ad HELMONTIO Nervorum solamina dicit, Sal volutis Succini, etque Oleum deffillatum, quod præteritus est; Spiritus Salis Ammoniaci autus, etque tonnerboria: quæcumque facient Sulphura antimonialia, & Metallica facient ad affectus Paralyticos & Convulsivos adeo citata: in specie ad Paralyticos Aurum diaphoreticum parat, ad Convulsivos Cinnabaris Antimoni, & alia Sulphurata similia, ut singulari anodyna prædita; Salia volatilia oleosa nervina utricularia, in specie Succinata; item ex Sanguine & Cra-

Cornu humanum parat : Impellit à Salis horum volatilia cum Oleosis aromaticis fuerint reddita oleosa, in Syllēma Nervosū affectū sunt optima, & in specie Acidum lēdēda & urtana delinquendo, omnes turbas promptè amovet, v.g. sal volatile oleosum Syllā, curatam præparationem non facere debeat; speciatim Sal volatile oleosum præstans et ex Fuligine. Non difficile est Salia volatilia oleosa præparare. De modo Syllēma vid. BARNERI Tract. spir. vini cum acido. Eleganter procedit cum Succino sequenti modo:

24. Calce viva,
Salis ammoniaci su. part. equal.
Videtur addatur tercia pars sulfuris.

Mistura irroretur modice cum spiritus Rastartartarise, destillatur per retortam vitream in arena, & prodit Spiritus Salis Ammoniaci fuccinatus, separandus ab Oleo, & iterata redificatione egregius fit in affectibus nervis.

Similiter cum aliis Oleis destillatis possunt fieri Salia volatilia: elegans est hoc:

25. Cinnamonum vel Caryophylli;
affunde

Spiritum vini prædistillatum.

Stent in digestionē aliquandiu: Spiritus Vini tinctus (nam intensus rubescit) affundatur mixturæ ex salis ammoniaci & Calce viris una; Destillatur per retortam mox confectam foris igne: fit prodit spiritus urinosus, sapore & odore aromatico insigniter præditus, colore sacro vel sanguineo.

Pertinent & huc pro cura Syllēmatum Nervosū alia Salia volatilia composita, in specie Liqueor Cornu Cervi fuccinatus, nobilissimum remedium in Moribus Convulsivis partium internarum. Fit ex parte aëtica Salia volatilia Cornea Cervi probè depurati, & Salis volatilis Succini, creberrima cum spiritus Vini extractions, seu cum aqua simplicis solutionibus depurati; Hæc duo Salia miscetur cum spiritus Cornu Cervi rectificatus, & ad perfectam unionem aliquandiu cohobentur. Huius frequentius impotuerit erit mentio.

Si extempore præscribenda sit Mistura ad Nervorum stoniam, & affectus à nimia sensilitate Nervorum convulsivos polychæda, sit v.g. sequens Formula;

26. Aquæ Menth.

Fencl.

Mellif. an. ʒi.

27. Calce ʒij.

Liq. C. C. fuccin. ʒij.

Spir. sal. ammoniac. simpl. vel distill. modo a. lous. ʒi.

Laud. opiat. gr. ij. vel ʒij.

Syr. cort. Aurant. vel de Cassia. ʒvj.

M. f. Pois.

Cipiet æger cochlear ʒi. non quidem, bene sapit, sed certa est mixtura.

Basin huius constituit Laudanum opiatum cum Sale volatili, quod tollit sensilitatem nervorum, & iritationem sensuum. Acidum iricans delinquit Salia volatilia oleosa, addita Calthoreo & adjuvant.

Fibres legitime resiste sunt instrumentum sensus, Sensus autem, et motus est, sunt vel Nervos, vel Intervi: ratione Nervorum Externorum in specie considerandum est.

1. *Syllēma Nervosum*, huiusque maior vel minor sensilitas.

2. Ratione sensus naturæ huius partium motuum sensus.

Sensus consistit in motione fibrillarum nervosarum, facta ab objecto extraneo. Variat autem Syllēma Nervosū sensilitas, prout fibrillæ nervosæ magis vel minus sensiles ac tæpæ, adeoque ab objecto extraneo magis facilius, nunc difficius mobiles, ideoque magis vel minus sensiles sunt. Hinc Motus semper sunt sensibiles Viris, & Infantes Adulti; quippe Infantes tam facili in dolore denticulosis patiuntur convulsiones & motus convulsivos, ob delicatam Syllēma Nervosum. Idem sensilitas hæc attendenda est in Praxi valdeperè; tum propter spirituum in individuis varietatem, tum præprimis propter selectum remedium adhibendum, quæ pro major vel minori sensilitate intendatur & minuetur.

Quoad Symptomata; quorum Syllēma Nervosum est sensilis, obnoxii sunt moribus convulsivis, magis mutationes tempestivæ, & majores vel minores alterationes in morbis præcipiant. Impetrit habenda est ratio officii stomachi fibrillæ, prout eum hoc sensilis, vel non, variat infert Symptomata. Sensilitas specialissimè in stomacho, & circa præcordia obvia est; unde levi occasione astetiques

Tom. II.

præcordiorum, jectigationes, item lipochymia, frequentia illa in morbis Symptomata supervenient illa, quæ paulo sensibilibus habent Nervorum Syllēma. Quæritur enim de dolore, monstrat ierobiculum Cordis; & sic puer anæstætes, lipochymia, nunc alia symptoma, circa stomachi fibrillum primum habet somitem quæ originem, & idem propter Nervos ibidem magis motus quam in reliquis fibrillis interna, ubi tunica mucosa magis teguntur: vid. WELFFERUS in Cicut. aquat. 1817. & Nova pag. 85. Et hoc dirigant fœ Medici in Remediis selectis: Tales enim sensiles à levioribus Remediis magis patiuntur alterationem, alii e contra fortiusioribus non alterantur. Mulieres egregie nos vexant in Praxi ob mollem fibrillarum: similitudine & succulentæ, habent genus Nervorum subtilissimum, & sensibiles sunt præ aliis; inde levi morbo facili alterantur, & proinde cogant Medicos, ut in iis acriora & volatilia cum circumspectione usurpent, quæ alias in Viris sine delectu adhibentur.

Consensus partium deducendos quoque ex horum fibrillarum nervosarum ramificatione varia. Cùm enim iste supponatur sensum, & fiat, quando una parte laborante altera parte simul afficitur, necesse est, ut fundamentum omnis Consensus, & Morborum per Coelestem, in fibrillarum & tæpæ Nervorum, in specie nervosarum Membranarum, quæstatur: ratione quorum cum aliis connexæ consentiant, non connexæ non consentiant. Consistit ergo Consensus partium in connectione unius cum altera; qui triplici imprimis solet fieri ratione, ista quidem, ut omnes propriè dictus Consensus fiat ratione saltem Nervorum: Consentiant nempe partes nervæ triplici modo:

1. Quatenus Fibra nervæ sunt continue: quæ ratione imminente Vomita tremis labium inferius; Vel
2. Quatenus sunt contigine: quorum ratione Calculus Vesicæ subinde fibrillam insert Alvi, & Tenebrum excitat; quia collum Vesicæ & Intestinum rectum invicem incumbunt: sic affecto officio stomachi, sequitur linguitas.
3. Consensus partium fit ratione connexivis mediantibus fibrillis nervæ: quæ ratione consentiant Renes, Uterus & Intestina, stomachus & Caput, &c. quatenus hæc partes habent nervos fibrillis vel uno ple, xortos; unde in Nephritide, Rene à calculo affecto, supervenire solet Vomitus & Colica; & sic una parte affecta, reliquæ afficiuntur. Et notum est, Fœminas hystericas Hysterice passio esse obnoxia, & ex affecto stomacho oriri Vertiginem ob coactum tum Cerebri cum stomacho.

Hi sunt tres modi Consensus partium ratione fibrillarum nervæ, quatenus partes sunt continue, contigunt, & per fibrillas nervas connectuntur.

Nunc considerandum Syllēma Nervosum, quatenus in eo sit Motus animalis. Motus enim dividitur alias in Animalem motum simpliciter seu spontaneum, & Naturalem scilicet seu secundum quid: ille peragitur in Nervis, à spiritibus excitatis ratione prægressi sensus; quando e.g. noveo pro habitu manum, est motus spontaneus: at qui fit sine poltra arbitrio aut prægressa sensatione, est v.g. Motus instellarum perillatit, Disbragmatis, Motus Cordis palpitatus, &c. qui omnes sunt per fibrillas nervas diversimodè contextas, ratione certi non fibrarum nervosarum, per quem sunt aptæ, ut contrahantur & crispentur; tunc cum fibrarum latio, indicat Motus. Considerandus ergo tonus latus in Nervis, ista vel deficit vel deprævenit. Deficit in Atonia, unde Motus cessat, & quilibet affectus paralyticus resolutiones partium, in quibus unusquisque Motus cessat. V.g. si quis laborat Atonia Brachii, fit paralyticus: stomachus laborat Atonia, fit ingesta cum sensu, tanquam in lacnum vitream, ingeruntur, & sponte effluent, unde cessat modus retentionis & restrictionis; quilibet Atonia Ventriculi etiam in Læptetia observatur, ubi per Pylorum resolutum effluent cruda alimenta.

Causæ huius Atonia

1. Est deficit spirituum Animalium, conservantium in debito tono fibras; Vel
2. Iste spirituum fibrarum, in specie earum quasi nimia distensio & laceratio, ita ut non amplius in tonum debito redeant.
3. Vel spirituum relaxatio à copiosiore Lympha, vel acri vel acida. Si Lympha est copiosior, tunc Nervus fibrilli sunt; unde si fibrilli, cessat Motus; si sunt in nimia tensione, præstunt Motus convulsivi, similes in corpore humano, iique tam partium internarum quam externarum: v.g. Convulsiones interna.

D. 2 sum

Spina, ex Effluviis facies in primis viis establan-
dus, &c. qui utriusque tametsi nihil habent in re-
cessu, eoque jam dum excipit HELMONTIUS.
Inde quoque in Affectibus per eandem nervorum
SYLVIVS etiam horum fuit accusat: Ubi enim hi
ipsi ab eo adducuntur, substat ut plurimum Motus
Spasmodici & Convulsivi Nervorum, ex irritatione
partium sensuum abdominalium, quibus intereunt, in
Spasmos contrahuntur; unde & alie partes, cum quibus
conneti fuerunt coniunguntur, contusato tali
Spasmo per consensum simul affici solent: quod e. g.
patet in Nephritide, dum Tortina Intestini &
Ventriculi superveniunt; item in Affluente convulsivo
Mullerum hysteriarum.

WILLISIVM vero quod attinet: hujus *Cepula elasticæ* in-
terea in medio est relinquenda, donec certior ejus ratio
conferat: quis in Affectibus Spasmodicis acidum, aliudve
dolorosum, irritans, & motus nervosorum partium con-
sensus interea sufficiat.

Ubi ex Moderatis imperiis Tironi sufficiunt. Veteres
quod attinet Scriptores: horum omnium loco sit S E N-
NERTUS, ejus Libri Practici nobis instar Locorum
communium sunt; maxime enim dictus hic vir in eo sedu-
lus fuit, ut omnes Affectus ordines declararet: Nam ex omni-
bus Scripturibus antecessoribus collegit florculos (1) Vel
loco hujus sit FORESTUS, eisdem nempe *Observationum*
Libri, in cuius scholiis tota fere Praxis secundum Veterum
sententiam conscripta apparebit, per Carationes plus minus
illustrata (K). HELMONTIUS sedulo omnibus legendus
est; cum accuratiorum post PARACELSUM non habemus.
Judiciorum autem legatur, ne decipiamur; quia ejus
Theoria internum alimēti est subtilitas, ex sobinde vi intel-
ligibilis, Lectori filitem veterum excutit, & violentem vo-
lentem ad alterosque indagare expiar: Imitatio Practica
est impossibilis, quamvis ejusdem scilicet generosioribus
desideriis Remedia, sine quibus eam imitari non possumus.
Imo ipse in ploribus locis habet segmenta, e. g. sit,
eius *Alia contra Regimēti*, ubi multa habet, que optime ad
Systema verum Willismum possunt applicari, Interim
quatenus possit, cum imitari conetur, optinem enim
suggerit *Methode* à priori curandi: Experimenta eun-
dem cum Chymica quam Medica, optima sunt, & quo-
rum indolem constat, certissima.

Qui ergo utitur HELMONTIUM legere cupit, ob-
servet.

1. Ne totum mor perlegere taceat, ob prolixitatem &
confusionis morum.
2. Ut Anatomicis & Chymicis fundamentis probe in-
struatur sit; &
3. Ut, que legit, tanquam Paradoxa existimet, ulterio-
ri meditatione digna, & ratione & experientia aut
confutanda, aut reticienda.

Ad hocque legatur in principio sequestre Testium.

Transmissa Affectibus.

Transmissa Scholiarum.

Contra & contra Naturalium.

Arbitrii Vires.

Spina Arterialis & Galeni Ignora.

Elementa.

Terra.

Aqua.

Air.

Præparamenta Metallorum.

*Complexiones ac Affluentes Alimentorum Pige-
mentum.*

Imago Formæ imprægnatæ spiritum Seminis.

Formarum Oris.

Ratio Contrarium Reflexa.

Spina Vitis.

*Celer Effluvitur non dicitur, sed tempus Excre-
tionis.*

Triplex Scholiarum Digestio.

Sexplex Digestio Alimentis humanis.

Sylvarum Keller.

Tartari Symplicia.

Arvensis Tartari in Mythis memoranda.

Alimenta Tartari infusiva.

Tartarus non in Puta.

Celsum Erravit.

Demonstratio.

Scabiei & Ulceris Scholiarum.

Affluens & Taffis.

Levis humor neglectus.

Conterium.

*Tota prima Chymicarum Principia, neque quoniam Ef-
fectus de Morborum Excreta esse.*

De Statibus.

Vitis Raris.

Pharmacopœia & Dispensatorium Modernorum.

Spina Medicamentorum.

In Viris, Heris & Lepidibus magna est Virtus.

Buller.

De Tartari Spadonis Paradoxa.

Hamidum Radiale.

Lunare Tritum.

Magnetica Pulverum Curatio.

Infusio Martis ad Vitis longam.

Arvensis Paracelsi.

Arvensis Vitis.

Quod Observationum Scripturæ Præfatus, quales BOBEL-
LUS, SALMUTH, TULPIUS, RHODIUS, BARTHO-
LINUS, &c. legendi sunt cum iudicio exacto, attenden-
do lo hi ad duo:

1. Raritatem & varietatem casuum.

2. Effectum Remediorum subinde cognoscitur.

Quod præstat: ad initium & finem seu terminationem
Morbi attendatur, ponderentur omnes circumstantiæ Clini-
matæ, &c. Vitis generis, &c. si allegantur, ut sic ad o-
bstantiam casus potius pervenire, Eligantur etiam Au-
daces, qui non de fide sunt suspensi. Si circumstantiæ non
sint notæ, quod hinc modis illis cogitatio dirigenda ad
conceptus variorum, ut ita veritatis ingenium acquiramus,
& inquiremus quid sit magis vel minus probabile, ut in
casu simili de causa & originis ejus ob modis potius iudi-
care. Ubi explicatio circumstantiarum & Theoria simul
notata est, consideranda eadem, ex quibus principiis pro-
cedat: an ex Galenicis? an Paracelsicis? an sit perus Hel-
montianis? an vero hodiernis? & suspensibile. Cum proba-
bilioribus conciliatur, Instar omnium sit BURNET in
Theor. Præfatus.

Quod præstat: effectus probe considerandos est, tam
Remedium ipsum, & hujus efficacia per se quæ, qua ra-
tione, quo tempore, & quibus Circumstantiis adhibuit
fuerit? admodum? Conferantur similia exempla ejusdem
Auctoris, & adjuvantia & lædenda intendatur animus: In-
rata enim Exempla constituent Experientiam, que una in
causarum investigationem non deducit, Hinc Circumstantiæ
probe penitendæ, quatenus vel promovere, vel impedire,
vel immutare mitem Remedii effectum poterint; quid aliud,
vel melius, vel succedaneum, adhiberi potuisset; hoc enim
modo Praxis habitualis facile acquiritur: Econtra, nisi di-
ligenter proba considerentur, decipimur, que causa est, quid
Esoporis & specificis sæpius non succedat, quia non sunt
eodem Circumstantiæ.

(1) Quam optime Republica Medica consulum foret, si ad imitationem Ch. Sonnerati, Corpus veluti universa Medicina, jux-
ta sententia Philopis præfata, Remedium Anatomicum invenit; ac Celeberrimorum Præfatorum methodum, confunderetur.

(K) Nullum hic facit mentionem Auctor de Hippocrate, Celso, Galeno aliisque primi ordinis Scripturibus citatis, quo-
rum monumenta hucusque negligenda sunt, ut eisdem Materie existimant; sed hoc cum ejusdem farina Auctorum etiam
nocturna diurnaque manu sunt evolvenda ab eo, qui aliquid in Medicina proficere in animo habuerit.

PRAXEOS MEDICÆ LIBER I.

D E

MORBIS FUNCTIONES VITALES, SEU NATURALES LÆDENTIBUS.

O Prima Methodus est, & facile applicabilis ad Praxin, & intelligibilis, quam primò instituit POTERIUS, & deio SYLVIVS, procedentes secundum ordinem Functionum in corpore, sic sine confusione tractantur. In corpore, autem nostro Functiones sunt primariæ, quæ Nutritionem spectant, quia corpus nostrum conservatur per Nutrimentum; tandiu

quippe vivimus, quamdiu nutrimur. Nutrimenti ergò assumptio & distributio est prima & Functionibus primariis totius corporis. Assumimus autem Alimenta, stimulat per Appetitum, qui, quando fertur in bocca, vocatur *Fames*; in liquida verò, vocatur *sivis*. Ordinem ergò in Morbis humani corporis obsequens, quem Natura in nutriendo corpore; & incipio de *Appetitu animali*, seu *Fame & Sivi*.

S E C T I O I.

D E

APPETITU ANIMALI, ET FAME LÆSA.

C A P U T I.

D E

Anorexia seu Fames Imminuta.

QUOD attingit *Anorexiam* seu *Anorexiam* (L.); illa est, si magis destituitur desiderium ad alimenta, quod naturaliter habere debebat; & quidem nunc simpliciter, ita ut nullum planò stimulum habeant, nunc secundum quid, si in accensione ad mensam oculum habent appetitum, dum autem edere incipiunt, eundem renovant. Si cum hoc prostrato adest simul horror ad alimenta, vocatur *Tafidium*; de quo cap. 2. art. 3.

S U B J E C T U M.

Subiectum huius Affectus est: officium stomachi superioris seu *Intestini*, quod uti est sedes naturalis Famis, ita etiam in præternaturali Fame affectum est.

C A U S Æ.

Quoad *Causas*, nota est rejeção Veterum hypothesi de functione vasorum Ventriculi in assignanda Causa Appetitus, & rectius introducta Fermentorum doctrina; unde Alimentorum Digestionem & Famem oriri dicimus a Secco stomachi fermentativo, vellicatoe aëris Ventriculi inferioris; Famem verò diminutam à defectu vellicationis illius in officio Ventriculi superioris insitili, quæ vellicatio fuit, uti est Causa Famis seu Appetitus Alimentorum naturalis, ita cerat defectus illius esse Causa formalis proxima Anorexiæ.

Vellicatio illa, uti naturaliter fit ex Fermento filio simplici acidulo seu acido spirituosum, quod, subtiliter rodetur ut morficando rubeas interiores Ventriculi & aëris Ventriculi inferioris, Spiritus animalis movet, & Famem excitat; nisi habeatur quod agat, scilicet cibos liquidos, qui diluant Fermentum atque saturant, ut si vehementer agere possit in tunicis Ventriculi: ita Fames impingitur, & per cunctos aboleatur sive *Græci Stomach*, quando huius Nervi sunt affecti, ita ut non sentiant stimulum; aut sive *Fermenti digesti*.

Defectus vellicationis seu subtilis roboris est Causa generalis, reliquæ sunt speciales.

Jam in specie quoad *Orisium sensu*: deficit sensus vellicationis in Stomacho ob Nervos ejus, vel propter *Spiritus animales* affectos, si nempe particulæ Fermenti digestivi a-

diva

Præter necessitates assumendi Alimenta externa ad conservandum esse Vitale corpus nostrum, ulterius sensibile Stimulum Ventriculo implantavit Natura in Fame & Sivi; quarum ille in molestia cupisdam sensu cibæ aëris Ventriculi superioris seu inferioris, ab Acido volatili fermentativo excitato, nritur; unde ab illa sensu perceptione & vellicatoe ex citatur *desiderium solidorum Alimentorum*, quod *Fames* dicitur. Nam omnia, quæ dictum Acidum spirituosum conservant, & Famem conservant, quæ augent, Famem augent; quæ destruant, etiam Famem destruant. Pluribus de Appetitus natura vid. MÖBIUS in *Functionibus Medicis* pag. 2. pag. 100. Pro ut autem variat hoc Acidum spirituosum, tam in Animalium speciebus, quam in Hominum individuis, sive naturali à causa, sive præternaturali ex vicio alterum, etiam determinata Fames nritur, secundum quam succo tali appropriata saltem appeti solent: & ceterum Acidum tale ab assumptorum Alimentorum in Stomacho reliquiis subindo alterari solet, exinde Consuetudo, ejusque insignis potentia, originem ducit, secundum quam consuetudo, licet deteriora, magis appetuntur, & scilicet digeruntur alii insuetis, licet melioribus.

Sicut e contra determinata quorundam Alimentorum aversio oritur, vel à vi Imaginationis, ut plurimum Matris gravis, Stomacho Infantis certum quasi characterem imprimens; hinc enim Puer per totam vitam abhorret à Pance ob Matris tadum, ex denegato ipsi Pance nimis deinde abortum; tunc SCHOTTO in *Physica curiosa* lib. 3. c. 57. pag. 533. Vel à quadam lesione, ab assumpta quodam modo Stomacho, & huius lesionis quasi ibidem infixæ moria; hinc verò Virgo affluens pariter laxativum Cinnamonem larvatum, ex tadio & nausea huius Purgantis postmodum per aliquot annos Cinnamonem ferre non potuit.

Calorem imprimis non pauci avertantur ex eo, quod Matres vel Nutrices, dum adhuc lactant; denob reddentes gravis; unde Lactis à gravitate iterata infans alteratio, indeque ejus in Stomacho Infantis prompta coagulatio, & quasi castro, unde notat Stomacho insuete causa Infans per totam vitam abhorret Calorem; vid. SCHOTTUS in *Tract. de Aversis Causis*, item DIGBY Tr. de *Natura Corp.* pag. 38. GRAEFF de *Org. Vir. generat. inferiorum*. item KERKRINGIUS *Spit. Anac.* pag. 90. Famem hanc animam; li præternaturaliter tribus laeditur modis:

1. Quando immutatur, aut totum penitus cessat, ut in *Anorexia*.
2. Quando depravatur omnino, & fertur in vitiosa objecta, ut in *Vira* vel *Malicia*.
3. Quando augetur & excedit, ut in *Appetitia Cautiva*, & *Bulimia*.

(L.) Ab a privatio, & insu appetitus; *sympotus*, appeto.

dixit falino-volarile obdundantur. Hi Nervi sunt sextum, vel secundum Neuroticos, octavam par, per quos spiritus animales copiosius affluunt, qui, live per clementiam, live per coactionem sunt affecti, Anorexiam inservunt: sic Nephritis, propter convulsionem per contumaciam afflicta plexum Oris, fassit Nervum, ut non percipiat sensum a Fermento molestum, Appetitum deiecit. Ratio est, quoniam Rebus affectis & dolentibus, etiam reliqui Nerv ex plen Pallio suo seu Mefenterii, levi spasm & convulsionem simul afficitur. Unde non tantum dolorem Stomachi & Vomitus excitant, sed praeterea sunt causa, quod nimis percipi possit vellicatio a Fermento facta, & sic Appetitum deiecit, quod etiam servit in Colica & albedinis omnibus Intestinarum, Hernia itidem &c. in quibus ratione contumacia Stomachi simul plus minus afficitur. Hinc affectus omnis afflicti Stomachi, fassit inferre prostratum Appetitum, qui etiam pertinet Tumorem, Valsura & Ulcera: de quibus vid. SCHENKLIUS *ob. pag. 335 & 346*.

Quoad spiritum animalem: hi insuppetentiam causi sunt, quando Narcoticis fluidiores redduntur, indeque Nervi nimis sensiles: vel quando motus eorum a fortiori obiecto in Amore, Caris, Meditationibus ita innutatur, ut vel non ferantur sufficienter ad Stomachum, vel facta ibidem impressio non sufficiat determinando Spirituum motui a fortiori obiecto perturbato: sic notum est, Laudamum opiatum, & quaecumque Opia, aliae Narcoticae immoedice ingesta Appetitum prostrant: vid. WILLIUS *de Anat. Bruto. P. 1. cap. 3. & in Pharm. Rational. P. 1. Sect. 7. cap. 2. Ratio est, quia fluidum suo modo reddant superius Orificum Ventriculi, ut quasi insensibile fiat, & non percipiat vexationem. Hinc notum est, quod Nicotiana equine forma notorio inhibere solet Appetitum, propterea quia parit est narcotica, & nervo generi stuporem inducit, prout quia ingurginata est sale volatili oleo admodum penetrante, quod torrendi & temperati salina viti Stomachum Fermentat. Facit hoc inventum indurum, quod refert SENNERTUS *lib. 3. Pract. P. 1. Sect. 2. cap. 2. pag. 97.* ex MONARD, dum ipsi ad falsitatem Appetitum utuntur medicamento, factu ex solis Tabaci & Conchyliis fluviatilibus calcinatis, quae duo in Massam Pulverem coeunt & affluunt: quae Pulvis duplici ratione Appetitum prostrant, uno quoniam ratione foliorum Tabaci Orificium Stomachi insensibile reddunt, tunc ratione Cor hyliorum calidiorum falino-acidum vim Fermenti Stomachici aspernent & praecipitant, & ita ad multos dies Appetitum reprimunt: Hinc milites usurpant fumum Tabaci pro fallendo & insensibilando Appetitu. Pertinet hic, quod Deliria, Tristitia, Terror, trible ex insuperato allatum Nuncium, &c. fassit Appetitum deiecit, non solum alia graviora Animae pathemata quolibet, item magni Dolores, quatenus haec omnia compungit, ut spiritum animalium motus ita innutent, ut partim non dirigantur ad Stomachum pro implemento Fermenti digestivi, partim spiritus vehementius commoti in Cerebro non recipiant impressiones in Orificio Stomachi factas, ut plurimum istis minus vehementes: sic parili ex causa ex subitanea Pedis latione opimus etiam HELMONTIO prostratus fuit Appetitus.*

Quod digestum Fermentum: Imminuitur & cessat Fama I. quando Fermentum digestum in Stomacho est obnoxium a copiosa Materia viscidat aut pituitosa, itant nequeat spicula sua exere in Nervos, & hinc non vellicet Orificium Stomachi, vel reddunt *brus ex inertis*, i. e. misceat a Materia vel substantia pingui. Salva itidem viscidat & glutinosa, Fermentum Stomachale inquinat, ordinat Appetentiam deiecit soler inferre: frequens est hic in Febre lenta laborantibus, & Heedici, qui conqueuntur de Saliva glutinosa, & habent simul Appetitum prostratum tunc cum compressione Stomachi. Item etiam acridie in Hypochondriaci quibusdam, qui de imbecillitate corporis continuam cum Appetitu prostrato & glumosa Saliva conqueuntur a Saliva eorum plurimum in recessu habet, & multum facit ad Appetitum, vel prostratum vel autem, maxime in morbis Chronicis, praecipue si qualitates salinis sit imbuta, sicut in Coarctis vel Coryza quandoque accidit. *Symptomata haec, ex vitiis Salivae unice dependantia, curantur optime per Vinum medicatum Infusione radices Armoraciae & Cochleariae, adunato Heleno. Observavi quidem, quod, cum aliquoties hauserit, curati fuerunt: viscidum enim salivam, obnoxium & desfruentem Appetitum, correxit mihi capsula. Item inordinata aut nimis copiosa Alimentorum, imprimis non facile digestibilium, una viti Ingesta: unde galones, qui una vice plus ingurgitant, quam*

par est, per aliquot dies postmodum habere deiecitum Appetitum: Alimentis cum copiosis assumptis loco Chyli degenerant in Mucum minimi, quem nisi aliqui prius diluant, sive abstant potu Vini, sive subacido tancto, Famem haec inservunt. Cerevicia, seu Pons non rite detestati, praestertim recensiter, tararum & fasses in Stomacho praecipitantes, Appetitum Stomachi prostrant, huius enus ludo inherens debilitant Fermentum digestivum. Sic Pingula quaecumque copiosius assumpta, lupringello potu frigido, viscidum & crudicatum admodum in Stomacho primique viis cumulata, & inert reddunt Ventriculi Fermentum: hinc SENNERTUS *lib. 3. Pract. P. 1. Sect. 1. n. 2.* notabile habet exemplum ex AVICENNA de quadam, cui per 10. dies Appetitus penitus fuit deiecit ex assumpta Ely Otis violacei, in quo Cera & Adei in emplastris consistuntum dissoluti fuerunt: Pinguedo ergo admodum frangit vires Fermenti Stomachici. Item Acidula vel Aultera cuncta, quatenus nempe difficiles digestiones cum pandis Stomachi faciunt, & Vomitus acidos eient, lepe quoque Appetitum summe prostrant. Item spiritus Vini crebrius & copiosius affluunt ex hoc & adardius prostrant Appetitum, propterea quoniam acrimonia acidula salum Fermentum Stomachi temperat, & coarctat: Nam spiritus Vegetabilium virtutem habent temperandi & corrigendi acrimonia humorum in corpore nostro, hinc spiritus Vini copiosius sumptus altero die oritur Anorexia, neque moderat sumptus cacitet. Item fit uno taro: ut aliquando Bilis pinguis, & praeternaturali motu suo ex Intestinis in Stomachum regurgiet: vid. SYLVIVS *Pr. 1. 2. pag. 55.* unde & deiecit Appetitus, quatenus Fermentum digestivum alteratur, & percipitur in ore sapor amaricans, & tales assignant infamili Soda, quod nunquam nisi ex cruditate nidiosa, & ex oleositate Bilis, est: Et certum est, Bilis appetitum prostrant, sive in Ventriculo reperitur, sive in Massa sanguinea abundet sal volatili oleum: quoniam praecipit acidum, quod nimis possit augeri Fermentum Stomachi, a quo oritur vellicatio. Denique Excrementa varia subit impreda, alterantia, & inquinantia contenta coarctant, & ita immutando plus minus haecum Stomachici eturum, Anorexiam inducunt, ut Mentium insperant, item intermixtus Calor, &c. sic SCHENKLIUS *lib. 3. de Insuperantia Obf. 1. p. 120.* observat Vidnam ex deservendo Vinctis substantia, & ex maiore contradio, in insignem Anorexiam prolapsam.

II. Secundum Fermenti digesti vim in Anorexia est, quando deficit in Stomacho, cuius defectus non potest non causare Appetitum deiecitum: id quod fit ob varias causas, in specie, quando vel in toto corpore immunitur, vel ad Stomachum non deferitur, partim propter conturbationem spirituum, partim omnium Humorum in corpore: hinc enim quibusvis in Febribus, primario Continencibus, Ardentibus scilicet ac Malignis, secundario Intermitentibus, penitus cessare solet Appetitus, deficit Acidum vitale in Stomacho labefacti ob Humorum, adeoque Lymphae, plus minus factam alterationem, & immutationem in universo corpore, necnon pinguedinem sanguinis, ut abundantiam Bilis & salis volatilis oleo, defruentis acorem in nobis. Sane qui ob volatilitatem Bilis percutitur organum, hi facili incident in Appetitum deficientem: item ob id tempore Aethivo, Aere calido & squalido, minus quam Hyberno, elurimus. Rationem dant nonnulli, quod multa in Aere volutent insensibilia, maxime tamen opera, maxime quidem facta volatilia, quae dunt causam, ut deficit acidum in Massa sanguinea, unde ut plurimum Aethivo tempore propter abundantiam salis volatilis ex Aere attrahi debilitatur Fermentum Stomachi, & deficiatur Appetitus, qui contra tempore Hyberno augatur propter acidum, quod tunc Aere impraegnatus est, Arbitror tamen potius, ibi rariores & subtiliores spiritus magis absumi: hic vero eodem magis concentriari, unde varia Fermenti activitas accedit: & crebrior quoque Potus rursus temporis admittitur, qui diluit Ventriculi Fermentum, lubricumque inducit ipsi statum, unde diffus affectus seu Appetitus prostratur. Ceterum per alia Aethiva sumpta multum hoc facient: sic Pons nimis Appetitum prostrant, diluendo nimis & abstergeudo Fermentum digestivum: item Vinum, de quo HIPPOCRATES *1. Aph. 57. e. g.* Potus necus, vel Cerevicia, vel Sori Ladis usus nimis, admodum solet prostrare Appetitum: de quo TIMAEUS in *Cap. 1. p. 101. n. 11.* Riolo est facili: in Sero enim Ladis est sal volatili admodum temperatum, plus minus nitrosum, (ratione cuius refrigerat re & laae dicitur) quod obdundat & temperat acrimonia Fermenti Stomachici, & exinde cessat Appetitus. Tandem Calculi in Stomacho genti etiam Appetitum prostrant: de quo HOFERUS

RUS in *Herc. Med.* pag. 137. ubi subministrat exemplum Appetitus prostrati letaliter cum nausea, ex Calculis duris & copiosis in stomacho reperiis: non secus ac Alcalia asumpsa, item acidum Abhœcentia, ut Creta, Bolus, Cornu Cervi usum, Terra figillata, & Martialis, Appetitum evacare solent: de quibus notissimum est, quod notabiliter Appetitum declinant, obtundendo potius aditatem ac scrimoniam Fermenti digestivi. Sic acidum etiam ab Urina obtunditur, e.g. in Febribus famelicis, ubi propter acidum nimis volatile multum edunt, & corpora tamen non augentur, hinc Urina propria commendatur.

Hinc patet, quod Anorexia seu Fames deficiens sit: scilicet defectus villositatis in stomacho, & quidem Orisheio fustro, unde deficit desiderium naturale Alimento- rum.

DIAGNOSIS.

Quod attinet Signa: in *Diagnosibus* non opus est prolixitate, quoniam ea se patent, & ab ægris molesta habet iudicantur.

PROGNOSIS.

Nunquam bonum signum est Appetitus prostratio, in specie illa, que citra causam manifestam, aut citra stomachi oppressionem, ex defectu Aciditatis naturalis in stomacho, vel eius omnimoda extinctione oritur, ut in principio Malignorum affectionum evenire solet: in sanis morbum immine- tem, in morbois semper aliquid mali, denotat, sive morbus hic fuerit chronicus, (vid. HIPPOCRATES *lib. 7. Aphor. 6.*) sive acutus, (vid. GALENUM in *Met. Sect. 2. Aph. 6.*) Multum enim sum est in stomacho ad totius Microcosmi vigorem: unde semper suspecta Medico.

Qui obnoxii sunt Affectionibus chronicis convulsivis, podagris, calculis, nephriticis, &c. hiq. subito & sine causa Appetitus deficit, est signum imminenti paralytici: nec hi ipsi sine securi de cessatione morbi, nisi prius red- eat Appetitus.

Speciatim post qualibet Febrem, tam continuas quam lætermittentes curatas, bonus redire debet Appetitus: quoniam hic non redit, aut qui redit: denub prostratur, semper pertimescimus recidivas Febres. Verissimum enim est: in quacunque etiam statu vesicetur æger, illud HIPPOCRATIS: *In omni morbo confuso morbo, & brevi se habere ad ea, quæ ostendantur, bonum: vid. lib. 2. Aphor. 33.* scilicet æger adhuc aliquantulum sine nausea, & sine gravamine stomachi, assinit.

Si ægri quidem appetus, sed que ostendantur, susti- liant, magis signum est: deprivatum enim etiam mox desiderium inquit Appetitum.

Si in morbois, etiam apparenter levibus, Appetitus mox prostratur, raro bonum signum est, & uoum ex primariis signis morborum Malignorum. Deinde Appetitus in Prin- cipio & Statu morbi defectus non est adeo malum signum, modo in Declinatione reverteretur: Sed si Appetitus in Fine aut Declinatione morbi de novo prostratur, vel Recidivæ, vel alterius causam novi morbi metum incutit. Si lo Principio morbi continuè duret, periculosum est si- gnum, quia virtutis Vitalis magnam depletionem & gra- viorem morbum denotat, præcipue in Quartanis: item si à Tumorebus similibusve Ventriculi incurabilibus mor- bis Anorexia dependeat.

Si Pueri Anorexia corripiantur, periculum subest, ut- pote qui natura voraces sunt, & multo alimento opus habent.

Denique est fatale signum, quando ægri in acuta Febrili- bus, vel summa virium debilitate & prostratione, subito alimenta vel patum, que antea susceperant, avidè ap- petunt, & assunt: quod quidem exhibita assunt, sed terere debet Medicum.

C U R A .

Methodum modeste quod specat: in Anorexia curanda imprimis habenda ratio Causarum, tam proximæ quam remo- tæ, ut maturè removeantur, his enim sublati tollitur effectus. Hinc si e.g. à Causa externa spiritus turbentur, si per consensum Nervi afficiantur, &c. ad hæc ipsa scop- us dirigendus venit.

In specie, quod hic agendum superest Medico, est 1. Ut aote omnis removeretur ea, que vitiosa barant in stomacho, & hinc

2. Corrumpendo aut refocillando Fermentum stomachi di- gestivum.

Dico, quod fieri potest: Nam Fermentorum est magna vis, & non possunt facile hæc ad lubium Medici trahant: imò per Artem resistere, impossibile est, acui tamen potest per ea, quæ causas remonent, & stomachum evacuant.

Inter omnes autem Causas Appetitus læsi, sunt vel Mu- cus copiosior stomachum repleti, & hinc incerta stom- achali Fermenti, obstrui à Pinguine vel Bile. Quæ ergo hæc Causas remonent, sunt stomachum evacuantia, & Mu- cum copiosorem atque Pinguinem, obstruentem activita- tem Fermenti, abducant: unde utplurimum Vomitoria, aut per inferiora Purgantia, præmittenda veniunt.

Vomitoria sunt optima: hæc enim sunt, quæ commodissi- me & immediate molestum stomachum humorum vel lentorem expurgant, & unum Vomitorium plus & melius e- vacuat in affectibus stomachi, quam decem Purgantia alia per inferiora. Vomitoria convolvant Antimonium, quon- ius operentur per vim stomachi inimicam & malignam, non tamen prohibet, quominus legitime preparata & cau- tè exhibita operatus sequatur effectus. Usurpantur vel in forma siccæ, vel liquida, in Infans ætate Antimonialibus. In forma siccæ:

℞ Tartari Emst. ℥ss. ℥ss. gr. iij.

Sach. gr. vj.

M. S. Pulvis, S.

Pulvis Emeticus.

In Infans Antimonialibus elegans est modus WALÆI in *Methodo Medendi*, qui rectè monet, non attendendam esse quantitatem Antimoni infundendi, sed potius quantitatem Liquoris, in quem feri debet Infans. Nam sive infundatur vin. vel vi. grana Mercurii Vitæ, sive ℥ss. quæ inde est: modò iusta accipitur Liquoris quantitas. Sic, v.g. ℥j. Mer- curii vitæ est salutaris, si infundatur in ℥j. Vini Rhenani: sicut contra gr. vi. totum fuit letalis, si in ℥j. Vini infundatur pro dosi una: Antimonium enim non plus de se dissolvit, quam possit recipere liquorem. De Vetro An- timoni, Croco Metallorum, tam vulgari quam abanthraci Myrsinæ, & aliis, idem verum est: v.g.

℞ Cruci Metall. abanthraci. gr. v.

Infund. in ℥j. Vini Rhenani.

Secut per noctem in digestionem in loco calido: mane sit- tretur per chartam bibulam.

℞ Major ℥j.

D. S.

Vinum Emeticum.

Tutius hæc Infusa adhibentur, quàm si eiusmodi Anti- moniata in substantia portigantur, ob metum renouationis particularum in stomacho, que hyperæcharies aliæque ma- lia minantur. Sed hæc etiam præcaueatur, si subinde ha- lita Cerevitibus exalebat, aut alius liquoris superflubatur, que diluat materia emetica, si post vomitionem hancus Vini, vel porus cum Cydoniaco mure vel succo, Martia- libus aut Terret vel preparatis mistus, propinetur. Syru- pus Emeticus Angeli Salæ ℥ss. ad ℥ss. est egregius. His Vomitoriis, ut Ventriculo à materia crassa & viscidâ oneratum adjuvemus, addatur & nonnullis spiritibus Æru- ginis, tam simplicis quàm compositi, qui qui parantur ex Viridi Æris & Gummi Ammoniaci, ut lei qui singulari in inci- dendo Ventriculo maximo viscido. Quando ergo Appetitus est prostratus propter præstantiam materię crassæ & viscidæ io stomacho, sequens paratur Vomitorium:

℞ Aqua Mellis ℥j. vel ℥ss.

Cinnam. ℥ij.

Aust. squillæ.

Syr. Emst. an. ℥ss.

Admix. Viridi Æris unguis, seu Asphac. ℥ij.

ad ℥j.

M. S.

Potus emetica Emetica.

Quod Vomitorium egregie operatur.

Iti verò, qui non apti ad vomendum, aut à Vomitoriis abhorrent, præscribantur Purgantia per inferiora, qualia ex generalibus supra dictis poti possunt. Inter hæc specialiter præpositi Aloëtica omnia, quæ amica sunt stomacho, ior- des mucilaginosæ deterguet, & eadem exharunt, licet amara sint Verum enim est Proverbum: *Sitter in Mund, dem Mayn gesund, h.e. Amarum prodest stomacho.* Variis sunt Pulvis ex Aloë, v.g. Pulvis Francfortensis seu Angeli- cæ dicit: vid. HOFFMANNUS *Clav. Schraderian.* pag. 150: quæ stomacho gratæ sunt, & in Anorexia blande evacuant conveniunt. Pulvis Aloëticus viandæ L. UDOVICI, quæ videt. in *Spec. Pharm.* pag. 179. item Pu- lvis Aloëphlegmaticus cum Scammonio acutus. Alimento- est Aloë non loca: quoniam ex Aloë lavando exharuit mu-

multis purgans, cuius parte adstringente: vid. HELMONTIUS: in pennis succinera (lunatus, quæ pellicula, d. & præparatus, si voluit, per crebriorem inuersionem: v. g. inco. Rosarium, si voluit, vel alio. pro Alod. rubra. nota, &c. Quilibet hic potest abundare in semina. Hinc pro evacuatione leniori assumuntur mæne cum calidiora, pro vero Stomachum saltem successe purificandi, carumque vesperione tempore una altera hora ante cenam: per quæ scopis bene Purgantia etiam cum alio commutari possunt, v. g. cum Decocto Tamariandorum, si scilicet Cruditus alicuius simul adit, conf. RONDELETIUS Pr. L. p. 6, 13, item per Decoctum Psyllarum cum foliis Senne, ad imitationem TIMÆI & Galienorum. Ubi fortitudo gendum est. Verum compolitioni, nempe Massa Pilularum de Hieræ cum Agarico, quæ in Officinis prolat, merito præferretur iniqua: in Affectionibus biliosis præscribo sapientia & xv. ad 3i. addendo simul pro mucis Stomachum ebullientem incisione vel Gummi Ammoniacum, aut pro ebullientem correctione Extracchi Abinthii, &c. cum forti & acuto Stimulo. Hic mos eo de purgandis, illa debere tantum tribus aut quatuor, vel ad summum sex vicibus purgare, demonstrante hoc ipsum HELMONTIO, & CNOEFFELIO Pr. de Febre Epid. maligna non verb imitandum esse vulgi pravam consuetudinem. Dabo exemplum: in mucilaginis viscidæ ex Stomacho evacuanda præscribo talen Formulam:

℞. Mass. Pilul. de Hier. cum Agar. gr. xii. ad xv.
Extr. Albusch.
Vel loci bujus Gum. Ammoniaci aest. sol. 3i.
viij. vel 3℞.

Stomach. sulphur. gr. i.
Extr. Trach. Alband. gr. v. vel gr. i. ad ij.
Cum Ess. Martis f. Pilula. d. S.
f. Pilula. S.
Pilula. Stomachalis laxative.

Eadem Pilula de Hieræ cum Agarico conveniunt quæ egregie Hypochondriaci, qui leniter sunt purgandi, in tunc temporis adduntur appropriata, ut Extracchi seu Essentia Martialis liquida, aut Gummi Ammoniacum, nam hoc potens est in detergenda & resolvenda materia viscidæ, Stomachum incrustante. Dabo exemplum pro Hypochondriaco leniter purgando:

℞. Mass. Pil. Alband. vel de Hier. cum Agar. 3℞.
vel gr. xii.
Gum. Ammoniaci aest. sol. 3℞.
Stomach. rufes. gr. ii.
Extr. Trach. Alband. gr. i.
Cum Ess. Martis f. Pilula. d. S.
Pilula laxative.

Quæ mucum viscidum incident & blandè evacuant.

℞. Mass. Pilul. Masticin. gr. xv.
Extr. Albusch. gr. xii. i.
Trach. Alband. gr. i.
M. f. Pilula.

Vel præscriptis Pulvis catharticus, purgant sine ulla symptomate copiose in Hypochondriaci: v. g. in subiecto facili solutionis

℞. Tartari viridiat. gr. xv.
Stomach. sulphur. gr. iv.
Trach. Alband. gr. i.
Olei dissilut. Camm. gutt. ij.
M. f. Pulvis. S.
Pulvis laxativus.

Ubi Stomachicus mucilaginosus materia fuit infarsus, sequens profuit:

℞. Aquæ Nisep.
Mentha an. 3℞.
Tartari viridiat.
Extr. Agar. an. 3℞. vi.
Stomach. sulphur. gr. i.
M. f. Pulvis. S.
Potiuncula laxativa.

Et hæc etiam de Purgantibus sufficiant.

Postquam præmissa fuerint evacuanda, usurpentur ea, quæ viginti Stomachi Apparationem desunt: qualia sunt, quæ vi salina volatilis, nunc acri, nunc oleosa aromatica, polleant, & sordes mucilaginosas Stomachi resolvunt & absterunt: nam his detersis sponte Appetitus revertitur. Eadem etiam conveniunt, quando Pinguis assumpta, & Bilis sunt causa

Tom. II.

Appetitus dejectus: hic conducuntur Acida blanda, seu temperata, Stomacho grata: & Appetitus egregie Testicularia, quia præter vim stimulantem, pro longiore iocundis & ætenuandi convenient, quæ præterea blanda sua adhesionem totum Stomachum, plus minus pro Opia, copia Potulentia, Spiritus Vini absumunt, illiusque motum resoluunt, firmant. Sed observandum, quid per Acida provocare quidem, seu irritare nonnulli possunt Famem, sed genuinum pro stimulo digestionis præparare. Medico impossibile est, adeoque optatum est, removere potius impedimenta: quo factu, ipsa Natura Appetitus deiectionis resollit: quo resollit. Parientes ergo & cauti magis in Acidum usque debemus, cum Appetitus talis per Acida quasi arte factus, tandem plus nocet quam prodest. Nam occasione Acidi stimuli plus ingerunt ægri, quam naturalis Fermenti virtute digerere valent: unde Cruditates acide sic colliguntur, mille malorum matres. Sanè vix præterquam a Cremore Tartari, usum proficuum in hoc casu observavi ab Acidis, præsertim Mineralibus, nisi fortis Spiritus Salis, & Vitrioli Philosophici, ab HARTMANNO adeo commendati, præcipuis cum Spiritu Vini aut aromatico dulcificati, in atonia Ventriculi, hanc restituent, aliquid opus contulerint; adeoque Aromaticæ, præsertim acrisa paulo, imprimis absteruntur.

Quod attinet Medicamenta, quæ his scopis satisfaciunt: sunt primò Stomachica salina volatilia, tam acrisa quam oleosa, item Aromaticæ & Nervinæ: hinc Mentha, in specie crispia, Abanthum vulgare & Romanum, Pulegium, Salvia, Rosmarinus, & in genere omnia Nervina, sapore subacri & odore aromatico prædita, quæ omnia conveniunt in Appetitu dejecto. Unde etiam in genere omnia Aromaticæ, præcipua Cinnamonum, Galanga, Caryophylli, Zingiber crudum & conditum, Zedoaria, &c. optime conveniunt: imprimis Zedoaria satis est decastrata & vitrata, ubi flatus sunt molesti in Stomacho: sic grana Piperis integra deglutita Cruditatem acis egregie desolunt: sicut & de Zingibere PLATERUS observavit, quendam post Quartanam disturnentem, ex Cruditatibus acidarum, Appetitu gravatam solvi bujus usus disturnere se fecisse. His Aromaticis sunt confinia Semina Calida, majora & minoræ, nam & hæc salivæ volatilis oleo sunt prædita: item etiam Radix Helensii recentia singulare Stomachicum est: non minoris virtutis est Calamus aromaticus verus, cujus loco, cum hic sit transmissus, commodè substituitur Radix Acrii veri, quæ tam cruda quam condita, & empe comesta, elegans est in corrigendo Stomacho, & accendendo Appetitu dejecto. Radix Armoracæ, seu Raphani rusticani, item Radix Ari; hæc recens usurpetur minutim iacis cum coquebatur Spiritus faciarum Juniperi, vel Spiritus Vini: vel eadem simpliciter in locum umbræo excicata, (sed non iuxta Dispensatorem præparata) & pulverisata, quo acris, eo melius, convenit insigniter in Appetitu dejecto, & hinc dicitur vulgò Radix dyspepsia, quæ non solum consumendo & absumendo mareriam in Ventriculo retincentem, & Appetitum imminuentem, sed etiam fodicando & irritando Ventriculi parietem, & sic Spiritus animales ed concitatus commovendo, operatur. Plebejorum quidem hoc, sed optimum sanè est remedium: seligatur saltem substantia intermedia acris, cum extrema superficie, propter sal volatile in auras evaporans, sit insipida, & cum dimidio Extracchi Tormentillæ mixta, egregium suggerit Pulverem Stomachalem contra Anorexiæ. (M)

Iuxta hæc omnia Amaricantia acrisa Appetitum provocant, Pituitam mucilaginosam incidendo ac absterendo, ut Fermentum digestivum, impedimenti his sublati, pristinum recuperet activitatem, simulque Ventriculi tunicam nervæam vellit. Hinc varia possunt ex his composita Officialia, ut Species Diatrium-piperæon, Species Aromaticæ, & similia, ex Simplicibus bice parata Essentia & Elixiria, Elixir Mentha cum Spiritu proprio per infusionem paratum, addito paucis Saccharo; Elixir Stomachale Quercetani, Febrile Myrsinæ; Essentia Menthe, Zedoaria, Abinthii simplex & composita, Pulegii, Calami aromatici, & similia admodum conveniunt in hoc affectu. TIMÆUS & Galienus facit mentionem Essentia Panis cum Vino Malvatico destillatæ, quæ omnino non erit recedenda, nam Spiritus Panis per retortam destillatus, acidovolatilis est, inter Stomachica remedia singularissimus.

Ex hæcena distis paratur Stomachicum Stomachale, imprimis in malo magis chronico:

℞. Herb.

(M) Radix Ari bafi & Pulveris Stomachici Birckmanni, mstrabus familiarissimis, eumque Quercetani appellatione. Radix autem istam Vitis phœbeis meretur, ut legem & faveri uris, aliquos rariore respondent.

℞. Herb. *Alfifach.*

Menth. an. M. i.

Rad. Acori veri ℞i.

Orizans. ℞i.

Succ. a. Calid. maj. an. ℞i.

Incisi. Includ. Nodulo. 3.

Nodulus pro Vino Stomachico.

Capiat uger omni die bis haustum, addendo omni ha-

stui gutt. 4. *Spiritus Sals. Salis.*

Vel

℞. Herb. *Menth. crisp.* M. ℞i.

Rad. Acor. veri rec. ℞i.

Helen. vel *Armorea*. rec. ℞i. ad ℞i.

Zedoar. ℞i.

Cinnamon. ℞i.

Misce pro: Nodulo Vini infundendo:

De quo uger mane, & à meridie aliquot horis ante pa-

lum, aut etiam in ipso passu bonum haustum capiat, &

egregie Appetitus allicietur.

Item

℞. Herb. *Menth.* M. ii.

Card. ben. M. i.

Alfifach.

Succin. Cret. min. an. M. ℞.

Rad. Euph.

Caryophyllat. an. ℞i.Succ. Sinap. vel *Eruc.* ℞i.

Cinnamon. ℞i.

Caryophyll. ℞i.Incisi. & cont. includ. *Nodulo*, qui infusus ℞. Vini, ca-

piatur omni mane ad solum.

Quando simul laudamus:

℞. Herb. *Menth.* M. ii.

Rad. Acor. veri rec. ℞i.

Alfifach. M. i.

Rad. Acor.

Helleb. nigri rec. an. ℞i.

Zedoar.

Fel. Senn. Rec. ℞i.

Sem. Anis.

Fenic. an. ℞i.

Galang.

Zedoar.

Zingib. an. ℞i.

Sal. Tartar. ℞i.

Incisi. & contr. D. 5.

Nodulus purgans pro Vino.

Imò sola Radix *Armorea* recens, cum ana Rad. *Helen.* rec. Vino *Rhenano* vel *absinthio*, et *Cerevisia* infusa, omni mane hausta, egregium est Remedium; quod insigniter commendat GABELCHOVERUS C. i. Cor. 14. in Appetitu prostrato ex nimia visciditate & glutinositate Salivae cum nausea ac amarore in ore: Pituitam mucilaginosam incidit ac abstergit, unde homo fermentalis, remocius his vitiis, activitatem pristinam recuperat, atque Ventriculi tunicam nervaeam simul stimulat. Idem praestat Piperitis Vini infusa & propinata, vel sufficit haustus Vini generosi, vel Papis triticeus Vini intinctus, sensum sensumque desolatus.

Facit haec Observatio 1. THONERI l. 2. pag. 142. qui Fastidium ciborum ingens cum insigni vizium prostratione & amarore oris curavit:

℞. Rad. *Clebor.*Herb. *Alfifach.* Rec.

Rorismar.

Card. ben. an. M. i.

Cret. min. M. ℞.

Decoqu. in Vini vel *Aqua* Ment. ℞. ad consumptionem tertiae partis:

De quo mane & vespere capiat ℞i.

Similes videbitis Observationem in FORESTO l. 12. Obs. i. Conf. etiam RIVIERIUS in Obs. i. à PACHEQUO communicata, & l. 9. prax. pag. 547. qui habet exemplum Appetitus desolati, per Agrimoniam, Absinthium, & Gentianam emens in forma Decocti, ad aliquot dies ita ancti, ut etiam Casina Appetentia ferè secuta sit. Decoctum fuit tale:

℞. Fel. *Agrimon.*Cem. *Alfifach.*

Succin. Cret. min. an. M. ℞.

Coqu. in Aqua.

De *Cilataria* cepit uger bonum haustum cum paucis *Saccharo*.

Praeterea conveniunt etiam acida volatilia, non nimia,

sed potius temperata, ad appetitum provocandum, quam inter, praeter Tartarum primas vias fimi blandè abstergentem & relaxantem, excellunt Cydonia, quocunque modo usurpata; in his enim absolutis quasi cura est appetitus prostrati, imprimis cum Vomitu aut Alvi fluxu plùs minus conjuncti: hinc ZACUTUS LUSITANUS non sinit commendare potest cum medicamentis ex Cinnamon. Facit haec quoque Pulpa Cydoniorum plùs minus arommatizata, & Sympus Cydoniorum simplex & arommatizatus, omniaque Cydoniata; unde Millurius ad Stomachum roborandum Cydoniorum succus aut Sympus permiscetur: c. 8.

℞. Aqua *Mentha* ℞i.

Cinnamon. ℞i. ad ℞i.

Succ. Cydonior. ℞i. ad ℞i.

Symp. Cydon. Rec. ℞i. vel *Armorea*. ℞i. vel ℞i.

M. l. Potio. 3.

Potiuncula corroborans Stomachum.

Capiatur pro lubitu. Item

℞. Aqua *Mentha* ℞i.

Cinnamon. ℞i.

Spiritus Theriacal. ℞i.

Laudan. opiat. ferm. ℞i. ℞.

Syr. Cinnamon. ℞i.

M. 5. ut super.

Item *Spiritus Mallicibus acidus*, & Papis nobilis est in affecibus Stomachi omnibus; sicut & corrigit omnia Purgantia Stomacho adversa; Item *Spiritus Mineralis acidi*, cum *Spiritu Vini* rite diluicari, v. g. *Spiritus Sals. dulcis*, vel *Spiritus Nitri dulcis*, & *Spiritus Vitrioli dulcis* à gust. 3. ℞i. vel xv. ad 22. vel 222. pro noa dosi, semper biborio ante passum in vehiculo, praesertim calido, praeterpropter usurpati. Dulces sunt ideo, quia non desiccant, nimis suave acres; cum autem in nobis omnes succi sunt temperati, unde in Praxi temperatis remediis inhaeremus, remedia enim, quò magis temperata, eò magis grata, quia sine altertione corporis operantur. Excellent haec inter *Spiritus Merioli volatilis*: non autem vulgaris sit, sed praeparatur beneficio *Spiritus Vini ex Pirula regumata*. Item *Spiritus Viridis Aeris* volatilis ad gust. 22. vel 222. assumi potest. Optimum consilium est, ut mariscetur hi *Spiritus* cum Vegetabilibus Stomachicis vel aromaticis: hinc videmus *Elizir Proprietatis*, seu compositum aromaticum, quod optimè convenit in Anorexia, habere adjuvandum *Spiritus acidum Salsum* vel *Salis*, ut ita eò melius operetur: cuius dosis est ad gust. 30. vel 40. ieiunio Stomacho usurpatur. Vel℞. *Eliz. Propr.* ℞i.*Elizir. Alfifach.**Menth.* vel *Cal. arom.* an. ℞i.

M. 5.

Elizir Stomachale.

Vel

℞. Conf. pul. Citri ℞i.

Menth. viridiat. ℞i.Puls. *Hepat.* rub. ℞i.*Spiritus Sals. acuti.* ℞i.Cum l. q. Syr. *Cydonior. arom.* l. *Elizirium*.

D. 5.

*Elizirium Stomachale.*Conveniunt etiam Acetum pro condimentis in cibis, ut Acetum volatiliatum & assiduum Zingiberi, Semini Erucæ vel Sinapi, & Zedoariae, & sic usurpatur; atq; Acetum squillinum. Huc quoque pertinet Pulvis *Hepaticus rubus*, seu Pulvis *chlororum Drelicensium*. Nec negligenda sunt *Eliziria Stomachalis*, quorum non viliissimum est *Elizir Stomachale compositum* D. Michaelis, in quo coniungit Aromata salina & oleosa cum Spiritu Salsi, seu Vitrioli Philosophici, sequenti modo:℞. Herb. *Mentha* crisp. M. iv.*Alfifach.* Rec.

Rorismar. an. M. ℞.

Salvia.

Pulsill.

Mellisa an. M. l. vel M. ℞.

Rad. Acori veri rec. ℞i. vel *Armorea*. ℞i.Pimpin. vel *Eruc.* ℞i.

Cypri Orizans. ℞i.

Orizans. *Magick.* ℞i. vel ℞i. ad ℞i.

Sem. a. Cal. maj. an. ℞i.

Sinapi ℞i.

Res. *Sassafr.* ℞i.

Indur.
Galang. an. ʒiʒ. ad ʒil. vel ʒiii.
Cubeb.
Muc. Mofat.
Macis.
Cinnamon.
Zingib.
Caryophyll. an. ʒiii. vel ʒʒ.
Sem. Coriandri ʒi.

Irroratur cum *spiritu Salis* vel *Muriell Philoſoph.* (qui revera eſt *ſpiritus Salis*, & Butyro Antimonii aqua diluta & reſtificata) ad gratum ſaporem & ſubtilem acorem: extrahatur cum *ſpiritu Mentha cryſta* in loco calido: poſt filtrationem addet.

Extr. ſtomach. compoſ. vel *aſtri veri*, quantum poteſt in Eſſ. diſſolvit.

Dofis ʒʒ. ad gutt. ʒo. 60. uſque ʒi.

Hoc Elixir ſtomachale in Scorbuto & Malo Hypochondriaco conjungitur cum *ſpiritu Mentha cryſta* hoc modo:

ʒi. Elixir ſtomach. ʒiii.
ſpiritus Cubebae. ʒʒ.
M. S.

Elixir ſtomachale.

De hoc ſumatur bis in die gutt. ʒo. ad 40. & inſigniter appetitum renovat, & ſtomachum confortat: Vel

ʒi. Elixir Muriel. Mofat. ʒʒ.
D. S.

Elixir corroborans ſtomachum.

Dofis ʒo. gutt. bis in die, mane in vehiculo calido, veſperi in frigido, ſemper biborio ante paſſum.

Interdum etiam Eſſentia Ambra aliquid addatur: Ambra enim ſingulariter eſt ſtomachicum, & convenit in ſpecie in aſſectibus ſecum.

De cætero Alcalis eadem ratione ac Aromatica operantur: v. g. Sal Cardui benediſſi, item Tinctura Tartari acrior, i. e. ſaleſcali quaſi cauſico ſoluta, ad 40. gutt. uſurpata: impedimenta ſtomachi removet, & acri ſtimulo ſuperpetuum ſtimulat.

ʒi. Tinctura Tartari acerr.
Elixir prop. ſine acido an. ʒiii.
M. D. S.

Mixtura ſtomachalis.

Item convenit Eſſentia Piperis cum *ſpiritu Vini tartariſa* parata.

Pertinent huc etiam Salſa, v. g. Sal Ammoniacum crudum, quod eſt egregium ſtomachicum, incidens, quod antea diſi de Gummi Ammoniac, & alteras viſcidi, eaque extra ſtomachum removet, adeoque multum facit ad renovandum appetitum. Eſt quali Sal ſaluſum, ex ſale communis & ſale volatili Urina, quæ dant Sal ſaliſum tertium. Quilibet ſolus preſcribi Sal Ammoniacum cum Salibus Vegetabilium fixis: ſed eſt error inſignis. Ratio eſt: Quia ſalia fixa alcalia aſtriptum acidum Salis communis: unde avolat Sal volatile Salis Ammoniac, & ſic fit ſaliſum fixum: potius omittatur Salia fixa, & preſcribatur Sal Ammoniacum ſolum, vel Lapilli Cancrorum adjuvantur. Idem Sal Ammoniacum convenientiſſime cum Aromatibus jungitur, & conſtituit Pulverem ſtomachalem compoſitum: ſic pro ſtomacho detergendo, & appetitus reſtaurando:

ʒi. Flor. Salis Ammoniaci, vel Sal. Ammoniaci depur.
ʒi.

ʒi. Diſtinction piper. vel Cubebae, vel alius arom.
mat. ʒi. vel ʒʒ.

M. pro tribus vel 4. doſ. &

Pulvis ſtomachalis.

Qui capiatur omni mane.

Vel

ʒi. Salis Ammoniaci depur. ʒi.

Zingib.

ʒi. Diſtinction piper. an. ʒʒ. ad gr. xv.

M. D. S.

Pulvis ſtomachalis pro tribus doſibus.

Item:

ʒi. Rad. ari. aſper. ʒi.

Tom. II.

Lapill. Cancr. pap.
Salis Abſinth. an. ʒi. ad ʒʒ.
Ol. deſtillat. Caryoph. gutt. iii.
M. pro tribus doſibus. D. S.

Pulvis ſtomachalis pro tribus vicibus.

Vel

ʒi. Rad. ari. crud. ʒʒ.
Piperis nigr. ʒʒ.
Zingib. ʒʒ.
Flor. Sal. ammoniac. ʒi.
Ol. deſtillat. Cal. arom. ʒi.
M. f. Pulvis. S.

Pulvis ſtomachalis pro aliquot vicibus.

Vel

ʒi. Lapill. Cancr. prop. ʒʒ.
Galang.
Salis Ammoniac. depur. an. ʒi.
Piperis.
Zingib. an. ʒʒ.
M. f. Pulvis.

Vel

ʒi. Conf. ſumm. Abſinth.
Rad. Real. an. ʒi.
Zingib. cand. ʒʒ.
Spec. Diſtinction piper. ʒiii.
Salis Ammon. ʒi.

Cum ʒy. Cydon. f. Eleſſarium, S.

Eleſſarium ſtomachale.

Vel uſurpetur Vinum abſinthiacum cum Sale Ammoniac: quo etiam ſiſtunt Tartarea remedia, ut Cremor & Cryſtalli Tartari, Tartarus vitriolatus, item Panacea Holſteinenſium, Sal Tartari eſſentialis & ſimilia: Item

ʒi. Liqor. Terra ſal. tartari ʒʒ.

D. S.

Eſſentia ſtomachalis.

40. gutt. pro doſi bis in die.

Pertinet etiam hoc Pulveres ſtomachales Salini, inter quos

etiam eſt Pulvis ſtomachalis D. Michaelis, qui in appetitu proſtrato convenit.

ʒi. Rad. ari. aſper. crud. pulverif. ʒii.
Arian. dupl. ſem. Panac. Holſt. ʒi.
Salis Abſinth.

Cyſſi Arab.

Rad. Auri veri an. ʒi.

Cinnamon.

Caryophyll. an. ʒʒ.

Macis.

Piper. long.

Zingib.

Cubebae.

Cardamom.

Grati. Parad.

Zedoar.

Sem. Coriandri an. ʒi.

M. f. Pulvis.

Dofis ʒi. ad ʒʒ.

Egregie convenit in aſſectibus ſtomachi, ubi obrutum eſt Fermentum ſtomachale à cruditatibus. (N)

Vel

ʒi. Palo. rad. Ari ʒi.

Arian. dupl. ʒi.

Ol. deſtillat. Menth. gutt. vi.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis ſtomachalis:

Dofis quantum mucro cultri caput.

Huc pertinet etiam Pulvis ſtomachalis Birkmanni, qui in ZWELFFERI Animadverſ. in Pharmac. Auguſt. pag. 163. deſcribitur.

Si Anorexia ex vitiis ſpirituum animalium & Nervorum, Ambra ejuſque Eſſentia aliis ſtomachicis juncta ſingulariter convenit: item Vioſum, Spirituoſa & aromatica: poſſimum verò Eſſentia Meliſſæ & Pulegii, præprimis ſi juxta HARTMANNUM cum Olei deſtillati baccharum Juniperi aliquot guttulis, ſut Calami aromatici accutur: item

E 2 Bal-

(N) Quid quidem accuſat animadvertendum: Salina enim & Aromatica ſtomachica & ſi ſtomacho proſpiciant ſine, cum viſcidi, & ſenſitibus hominibus operetur, maxime tamen eosdem ledunt ſi macula ſaburra non ſecant: nam quemadmodum Salina & acuti medicamenta particula, in craſſum Ventriculi phlegma vim facientes, illud incidunt, & extenuant, & ad exitum cum agri levemente diſponunt: ita & cæterarum ſi Ventriculi diſſat tunicas non ſolantur cum impetu irrumpunt, illæ non ſine agitantibus doſibus moleſta, laſcivane, & corrumpunt. Præpoſteri igitur operantur Medici illi, qui in omni Anorexia, ita in quibuſvis Ventriculi morbis, iſdem ſtomachicis ſolutis, acerbis & aromaticis indiſcriminatim ſunt: pro variare enim cauſarum, & pro totius ſtomachi conſtitutione, varia & necumquam oppoſita adhibenda ſunt ſtomachica: na ut mirum videri nequeat, quandoque Appetitum Aqua frigida, & Lactis uſu, eſt præmo reſtitutum.

Balsamus Peruvianus, 6 vel aliquot guttae in haustu Vini, aut cum Saccharo propiuntur, vel cum vitello Ovi terbilis assumantur, quod RIVERIUS in pr. l. g. cap. 1. cum experum commendat: unde Tinsura seu Essentia Balsami Peruviani cum Essentia Tartari parata, in hoc passu foret usurpanda. Egerium quoque est Electuarium Stomachale Paracelsi, cuius descriptio datur in Tom. 5. Oper. Nemege

℞. Bals. Jussip. ʒi.
Puls. Zingib. ʒi.

Aceti vini,
Melle an. ʒi.
Cochlear. ʒi.

Cum l. q. Sacch. f. Electuarium.

Dosis ʒi. ad ʒi.

Vel praescribantur Condita sequentia Polytrasta, L. mol-
ti usius, in quampurissimis stomachi affectionibus chronicis, pro
sensibus:

℞. Rad. Cich. cond.

Storac. cond. an. ʒi.

Conf. Menth. crisp. ʒi.

Abynth. Rad. ʒo. ʒi.

Fl. Cichor.

Rosar. rubr.

Anisei,

Puls. Zedoar. an. ʒi.

Aceti vini,

Cinnam. purg.

Zingib. an. ʒi.

Mistridat. vel Theriac. ʒi.

Cum l. q. Syr. Menth. crisp. f. Electuarium.

D. ʒ.

Electuarium Stomachale.

Item:

℞. Conf. Menth. crisp.

Abynth. purg. an. ʒi.

Rosar. rubr. vel Anisei ʒi.

Rad. Cichor. cond. ʒi.

Aceti vini cond. ʒi.

Puls. Zedoar. ʒi.

Mag. Corall. cum Succo Citri,

Cinnam. an. ʒi.

Zingib.

Caryophyll.

Tindurp Corall. ap. ʒi.

Cum l. q. Syr. Menth. crisp. f. Electuarium irroran-
dom cum

Spiritu Salis dulci.

D. ʒ. ut antea.

Vel

℞. Conf. Ros. rubr. ʒi.

Mentha ʒi.

Zing. in lad. cond. ʒi.

Aceti vini cond. ʒi.

Spec. Diacynth. purg. Diamorb. dulc. ʒi. vel ʒi.

Cum Syr. Res. Tunica f. Electuarium.

Si expectantur Morbuli Stomachales:

℞. Conf. fl. Anisei vel Mentha ʒi.

Rad. Ari. cond. vel Zing. cond.

Spec. Imp. Impat. vel Puls. Stomach. Birkm.

an. ʒi.

Extr. Zedoar. ʒi.

Cum l. q. Sacch. in Aqua Fajaculi, vel Mentha sol.

ʒi. f. Melle.

irrorandi cum Oleo dashillato Mentha.

D. ʒ.

Morbuli Stomachales.

His adjuungi possunt Resina Biberitis Dodonaei, quas dedit
in Colleg. Fernalae. Chap. 1.

Sin Pinguis aut Bilia profluens appetitum, commode
grædium Elixir Proprietatis, tam solum, quam cum ap-
paratis mistum, & Remedia ex Abinthio, usurpari pos-
sunt; quæ Pinguinem quancunque potenter domant. In
Febribus, præsertim intermittentibus, ad revocandum ap-
petitum amara talia, v. g. præter dicta, Elixir Febrile Men-
sue, sunt optima, quod Elixir videbitis in opus. Arment. Chym.
pag. 254.

Si à Nervicis profluens sit appetitus, acida eum revocant.
Quod si verb, ut non raro, v. g. in Hypochondriacis, fieri
soler, Acidum præternaturale Ventriculi appetitum turbat
Absorbentia, v. g. Lapilli Cancrore, Greta, Ebur &c. lo-
cum habebunt: item Elixir Proprietatis sine acido: item cum
Spiritu Salis Ammoniaci paratum; Essentia Abinthii tatariz-
ata, Spiritus Salis Ammoniaci, simplex & aromatizatus.

Nec Extrema seu Topica ad Anorexiæ reglenda, sed
sub Linimentorum, Epithematum, Emplastrorum, &c. for-
ma applicanda: inter quæ convenit crassa Panis Vini ge-
neroso, vel acido vel Malvatico, aut Aceto, probe ebria,
pulvere Nucis molichæ, Macis, Caryophyllorum, alio-
rumque Aromaticorum aspersa, & ita inlata ipsi stomacho re-
pide applicata: item Elixir Menthae calide cum frustulo
Panis intusque Venterculo Impulsu, applicando desuper
laterem calefactum, admodum convenit, præsertim in spi-
rituum defectu. Balsamum Anglicum Ventriculo illitum
mirè etiam appetitum provocat, Convenit etiam Oleum
Stomachale Cræpæ, Malichæ, Nucis molichæ, Mincæ,
Abinthii, Caryophyllorum, Balsamum Peruvianum, Ta-
camahaca, Ceratum ex Ladano, Emplastrum Stomachale
Cræpæ, Hartmanni, &c. c. g.

℞. Olei ʒi. ʒi.

dashillat. Caryophyll. ʒi.

Abynth.

Mentha,

Jussip. an. ʒi.

M. D. ʒ.

Balsamus confortans stomachum,

Vel

℞. ʒi. ʒi. Stomach. Hartmanni, vel de Tacamah. q. f.

Malax. cum ʒi. ʒi. Peruv. & inducatur super aduam

sub forma Scuti Stomachalis,

D. ʒ.

Emplastrum Stomachale.

Pellis Vulpinis sumitur in forma triangulari stomacho
applicata, est experitum remedium: Vidi quoque aliquot ex-
perientias felicissimas, uter videtur ridiculum. Egregia quo-
que est Cera catholica Ruychii, cuius descriptionem commu-
nicavit Collegio Scherperiano p. 2.

CAPUT II.

De Appetitu depravato.

Quod atinet appetitum depravatum, est hic velin app-
etendo, vel averfando. In appetendo est, si aliquid inten-
tius, vel suetus vel inductum, cum maximo desiderio
appetunt, ut in Pica & Malaria: vid. SYLVIIUS pr. lib. 1.
c. 2. Contrarium vitium est in averfando, si certum eduli
genus averfatur, qui affectus speciali nomine caret. Vocatur
alias certorum ciborum Aversio, quando scilicet determinatæ
assuetudinis cibi, v. g. omnimodè averfatur Cæcum.

ARTICULUS I.

De Fastidio seu Averfatione determinata.

Fastidium hoc fuit Averfatio, est vel Nervicis, vel adu-
entivis: itam Nervicis non tantum per dispositionem
hereditariam à Parentibus in pectus peragitur, sed fre-
quentius à Matris imaginatione dependet, ob quamcum-
que causam gestationis tempore pro ingratu iudicata, ali-
menta averfatis: Adventivum vero post natiuitatem ex-
citatur:

1. Vel à mero quodam præiudicio, huc vel illa alimenta
per ingratu habente.
2. Vel ab alimentis ipsis, in nimis copia vel ad nauseam
oblati, vel illis cum satis mundè paratis vel
oblati.
3. Aliquando verè à humore, e. g. vitiato, Ventri-
culi Fermentum corruptumque afflatu, ut in Gra-
vidis sæpè observatur, quorum idem expliare
difficile est, nisi ex aliis compendis symptomaticis
eam forsitan aucupari liceat.

Cum autem rarius occurrat in Præli, mittamus hanc
Averfationem.

ARTICULUS II.

De Pica, & Malaria.

Pica in genere est appetitus ita depravatus, quando quo-
cunque tempore iniquitas peccatus appetitur; Malaria
verò

verò est appetitus quidem nimis, usualium tamen, ita ut vicia, sed cum nimis intenso appetitu se dediderit appetantur, unde & interdum plus, quam conducit, comedunt (O). Sic v.g. Pica est, quando Gravida appetit insulsa, e.g. crudas animalium Carnes, Condimenta & Medicamenta in maiori quantitate, e.g. Zingiber & Theriacum: vid. PLATEIUS *Op. pag. 239.* imò plant. absurda, v.g. Carbones, Capites, Corium, Atramentum, Ceratam, Plumbum: vid. TULPIUS *lib. 4. Obs. 13.* SALTHUTH *C. 2. Obs. 62.* imò Stenocoria: vid. BORELLUS *Cens. 4. Obs. 2.* vel noxia tandem, ut Calx viva &c., quod refert FERNELIUS. Malacia verò est, quando cerum eduli genus, v.g. Halices: vid. TULPIUS *lib. 4. Obs. 24.* & alios cibos & potus utitatur, sed utrumque appetitus nimis & inconveniens, appetunt: patiturque sæpe anxietates præcordiorum, languorem universi corporis, & supervenit vomitus variorum humorum.

PARS AFFECTA.

Pars affecta primaria ordinario statuitur stomachus, imprimis Orificium inferius seu superius, quod Fermentum: Ubi enim fundamentum est, & quasi residet appetitus naturalis, hic quoque residet præternaturalis & depravatus. Sed si ritè non consideremus, manifestum evadit, distindum in hoc morbo complicato esse subiectum patiens: Appetitum nempe infimum & Phantasia depravatam, Gulum, Odoratam, Audium, seu horum sensuum Organa.

Phantasia affici, ex eo certum est, quod Homines, dum stomachus appetitu sensili, ut se dicam, afficitur, seu à Fermento digestivo vellicatur, feruntur singulari affectu in tam varia, ut sunt Crota, Corallia, mororum Calces, Carbones, Atramentum, &c. Namque non stomachus seu Fermentum præcise, sed Phantasia est, quæ determinat appetitum ad hoc vel illud, ex. grat. in Pica, Objectum quidem stomachum stimulat, sed hic non declarat: sicut enim in Fame, præter vellicationem Ventericuli, Phantasia concurrere, ex Physiologia suppono; ita non vellicatio præva, sed Phantasia præva, quæ appetitum animalis regit, obiecta determinat, & uti alias Melancholici feruntur in cæca objecta, sic tales ægroti incidunt in objectionem cum edulis, in quod feruntur. Ergo & utique Phantasia vitium habet. Si inter Fermentum stomachi, equique in Nervos operationem, & inter appetitum hinc consequentem animalis, intercedit intermedium Phantasiae quæ, accesse fit, ut prius Phantasia, quæ id, quod à seculis sensibus externis & interno communi susceptum fuit componendo & dividendo quasi sensu perficit, præva afficiatur à quacunque causa occasionali hac, quæ tametsi frequentissime in Ventriculo fontem sui nidum sibi eligit: Adeoque Pica & Malacia lodes primaria in facultate Animalis, i. e. Subiectum habitationis in spiritibus animalibus erit locandam.

Quod Gulum afficiatur, certum est ex eo, quod alias quoque res fœditer & pessimi saporis, & à quibus in statu sano ægri maxime abhorreant, cum insigui voluptate deglutiantur; quin & interdum dicant, habere talia suavissimos sapores. Exemplum videbitis in SALTHUTH *C. 2. Obs. 62.* de Virgine, quæ omnia candida, & inter alia etiam Calceas parietum abstraxit, ac Cerasum, singulari voluptate devoravit, & eorum deprædicationi suavitatem ac dulcedinem: Hic certum est, fuisse depravatam Gulum, Calx enim est admodum acris. At BORELLUS *Cens. 4. Obs. 3.* habet exemplum de Virgine picante, quæ fœdora humana comedit, quæ non sine adeo lapida, & tamen cum insigni gustu appetita deglutivit: unde certum est, affici Gulum fide dubio à Lympha salivari corrupta, & Gulum depravate, quia talia talia ingerere non possent. Res illustrari potest ex eo, quod suppleffio Mentium in Mulieribus creberrime dicitur Pica, quando scilicet sanguis separatæ, in vasis Uteri, ab exteriora vel alia causa coagulatus, flagrant inquitur, indeque ad corruptum sui tendens, obdegenerat excretionem facilius sentimque recurgit in to-

tam Massam sanguineam; unde consequenter, & afficitur Lympha, quæ, uti per internam tunicam stomachi glandulosam transiundit, ad supplementum Fermenti digestivi concurret, ita eadem Spiritum vehiculum salivæque materia existit. Dum igitur saliva infesta est, non potest non Lingua simul affici, & Gulum depravari, unde saliva non minus, quam Fermentum stomachi vitale, simile affectum est in Pica. FRAGASSATUS equidem h. *Epig. de Lingua pag. 235.* gullandi hanc in Pica depravatam voluptatem à Papillis nervis vitiosis in Lingua deducere nititur: sed ego consensum potius si fundamentum constituitur in saliva.

Afficitur etiam Odoratus, quatenus res fœdæ cum singulari iucunditate nobis adveniant. Exemplum affici Odoratus habet SALTHUTH *C. 2. Obs. 62.* & 63. de Virgine picante, quæ insigniter delectabatur à fœdore veterum Librorum, à tuncis blattique eroforum, siveque propriis coarporum, ita ut sæpe per totos dies in tales Libros immitteret, & odorem suavem, uti dicebat, hauriret. Item BORELLUS *rheto. hoc aliud exemplum habet de Virgine picante, quæ intensissime afficiebatur odore Cori, tanquam balsamo, quare semper in re detinuit, & malicivæ ut periret odorem suavem, quævisque Calceas vetustissimas, quorum odorem fortissimum Mosca, & Ambra comparavit.*

Hæc probant esse non simpliciter affectum stomachum, sed infimum Phantasia Spiritibus animales, & hinc Gulum & Odoratam, ceteraque Sensitive (P). Id quod ulterius confirmatur ex eo, quod picanes non præcise in Alimentum ferantur, ut in talia, quæ Alimentum loco ab ingenti possunt, sed etiam in alia aliorum Sentiam, non præcise Gulum aut Tactum in stomacho, obiecta: v. gr. dum Pica impellit Mulierem ad exsuctionem Ventris ex filiabus, vel dum alia per Picam appetit fragorem Carbonum fossilium pedibus contritum. Quasi exempla cum præcise ex stomacho, secundum certam Famis vel Sitis modificationem affecto, non oriuntur, (conf. *Alia Swiss. Roy. Pluim. 1. pag. 447.*); distinguendum ergo videtur inter subiectum Radiationis, quod refertur stomachus, & subiectum Dominationis, quod est faculta Animalis, ratione spirituum Animalium in Phantasia alteratorum.

CAUSÆ.

Quod attinet *Causam appetitus talis depravari*, certum est, hærere in Fermento digestivo stomachi. Nam sicut in genere appetitus oritur à Fermento stomachi digestivo vitali naturaliter ritè constituto; ita in specie etiam ab eodem alterato appetitus vel ausus vel depravatus in Pica & Malacia originem ducit. Videmus enim quod omnia Animalia habeant in suo genere determinatum stomachi Fermentum digestivum, ratione cuius Fermentum illud se habet, seu appropriatum agens mensuram in objecta appetita, ac sub illa certo modo determinatur totum appetitus; hinc unaquaque species fertur in cibum certum: sic Canis appetit Ossâ, Scivus Frustum mectens, Feli Mures, Ciconia Ranas, Anser Arenam, Bos Graminem, Carduelis Carduam, Homo Panem, &c. nulla alia ex ratione, nisi quod adinventi sunt appropriatum objectum possunt (speciem in illis stomachi Fermentum. Unde simili ratione Pica, de Malacia oriri videatur; nimirum dum certa ratione alteratum & determinatum est Fermentum stomachi, ut in insulsa & singulari, nunc hoc nunc illud, v. gr. Ceratam, Carbones, Arenam, Atramentum, &c. ardenter feratur. Sed in quo consistat illa specificatio Fermenti, ut in singulari species certo modo determinetur, & ita in unoquoque speciali individuo appetitus determinetur ad hoc vel illud? à priori adhuc est impercrutabile. Idem certe spiritibus improprie, quæ hic habere volunt nonnulli & intellectus & explicata sunt difficultate, uti nata quorundam Ciborum appetentia per certam spirituum in Utero Matris alterationem facile, & accurate explicari queat.

Quæ-

(O) Pica Græci πικρα, vel Αἰτία πικρά, narsimæ avis nomen est: quare avem multiplex infensum ciborum, præsertim in Gravida, appetit, qui πικρὸν & Picatio quoque dicitur, hoc etiam nomen insignitur, obferunt sane videtur. Sarsi hinc præteritum est, quod ait Harmanus in Lex. Etymologica, πικρὸν dictum esse à πικρῷ, vermis, erit enim ab humoris acris ventriculorum vermis mare turrescente. Fortasse verura loquatur, qui æquæ; Maribus hinc Picem dicit, quod quædammodum avis hæc variogutis primarum roborebus est nota, ita de ægritudine præterit variis & insularibus oblectant ciborum desideria tenentur. Malacia vero, quæ multis cum Pica confunditur à panibus, molliis, originem trahit, quod scilicet qui ex morbo affliguntur mollioribus quædam corporis, ætatisque præterit, quæ minora ignavia polleant.

(P) Pica fela lapsa Phantasia, obiecta ex quod Organum vel Instrumentum Sentiam omnium tam exteriarum tam interiorum, secundum systema patiuntur: ex variis enim Phantasia suppositis, falli & præparata itaq. ad Gulum, Viscum, Odorem &c. pertinentia deducit facili possunt, obijce ex quod vel Lympha, vel Salivam, vel reliqua fœdiora accipimus.

Quæritur: in quo consistat alteratio & depravatio determinata Fermenti stomachici? Res est ardua. Probabile videtur, hoc ratione Causæ occasioalis, ut plurimum in Ventriculo existentis, acquirere singularem acrimoniam, etiamque acrem saltem, ipsa munda corrosivam, quæ occasione tam determinata & sensilis sit vellicatio, pro cuius varia impressione in Orificio stomachi, Phantasia exinde decepta, tam varia edulia, aut quæ horum loco ingeruntur, imò & subinde ridicula, appetit (Q). Depravationem istam Fermenti quodammodo occasionalis Causa confirmat exempla eorum, quæ ex Scabie retropellunt Picam Græzæ inciduntur: vid. M. A. N. C. ann. 1. Obs. 83. pag. 299. item FEHR Tr. de Affectionibus pag. 98. Sic cum Scorbuto iocundum Pica & Malacia complicari solet, de quo vid. HORSTIUS Obs. pag. 135. & 7. Obs. 35. Illustrat etiam illud asseritum HILDANUS Cæsar. 1. Observationes 37. dum refert Picam obortam ex Ulcere facium, in quo pus generatur; unde appetebantur Haleces, Pisces, & Carnes salis & infumæ, & similia falsa, quæ optimè deglutiebantur; res non appetitas vero, Jucula, &c. fastidiebant & nullo modo deglutire poterat, dum interim superiora, licet graviora & morbo nociva, sine ullo noceamento bene digerebat. Fundameutum consistit in hoc: nempe ex Ulcere facium exsiliant Pus in stomachum, alteratur ejus Fermentum digestivum, illudque pro natura Puris acrisioris acido-falsi singularem impressionem facit in Orificio stomachi, & ad emulsionem Halecum & similibus salutorum quasi stimulat; et exinde talis inordinatus, determinatus tamen, appetitus fuerit. Hinc & Mundum soporibus in Mulieribus, in quibus vitium abundat acidum, frequentissimè Picam infert, alterando Sanguinem, Lympham, & his mediocriter consequenter etiam Salivam, & ipsum stomachico Fermentum.

Id specie multum hoc frequentius observatur in Mulieribus Gravidis, quoniam his non solum RIVERIUS ræmen curiosum exemplum habet C. 4. Obs. 93. de Feleali-quandia picanæ, non quidem gravidæ, sed etiam sterili, quæ devaravit Calcem, Carbones, & similia: sed cum hæc sit gravis, potius liquor genitalis, vel aliud simile excoarctandum corruptum & suppressum, occasione mala fegessit. Sic Picæ simile exemplum de Cane venatica gravidæ videb. in *Actis Societ. Reg. Helvæ*. 1. pag. 447. Non tamen hoc universale esse, probare possunt & confirmare similit. Puellæ adhuc impubescentes picanæ v. g. Pica in Puella 8. anorum observata in M. A. N. C. ann. 4. Obs. 143. pag. 150. Sic Pueri, item Infantes picanæ, subinde observantur, imprimis ex Matre Chloroti laborante, quod testatur RIVERIUS in *Præxi*, & PETRUS JOHANNES FABER, qui in *Cusat.* 68. habet exemplum de proprio Filio 3. anorum Pica laborante, qui Arenam, Cisternas & Terram efflagitavit, & magno cum crepitatu his vici solitus fuit, Lac vero & alios cibos omnino reposit, Quot. ntiam M. A. N. C. ann. 6. Obs. 139. pag. 302. FORESTUS lib. 18. Obs. 7. & FONSECA L. 7. Obs. 91. in *Schola* habet exemplum de Puella Crustas, & Calces parietum avidè deglutientibus. Gævidæ ergo non solum, sed & steriles hoc vexantur malo; aliz etiam Mulieres, sèpè Virgines, quibus Menstrua suppressa; quorum exempla specialia profant in FONSECÆ Observationibus. Nec Mulieres tantum, sed etiam Viri non ræd Pica & Malacia laborare deprehenduntur: Nam scit certum est, labore Visus affectu Sotocæloni hysterice simili; ita etiam profant exempla Virorum similit. Pica laborantium: Exempla multa videbitis in SCHENCKII Observationibus. L. 3. Obs. 1. pag. 319. ubi de Pica. Ut oibis dicam de curiosa Observatione, quam habet BARTHOLINUS Cæsar. 3. *Med. Anat.* 169. de Marito picanæ, nauseante & vomente, cujus Conjugis gravidæ nausearet & vomeret: simile exemplum vid. in M. A. N. C. ann. 2. Obs. 215. pag. 216. & MARCELLO DONATO in *san. Med.* lib. 1. §. 2. Quod si interior sit picanæ Matris gravidæ appetitus, malum hoc non ræd est hereditarium; quale exemplum habet FONSECA L. 2. *Caus.* 23. de Puella 14. anorum, quæ à tenera ætate insatibilis Calcem parietum, & Laterum fragmenta sèpè appetit, & decenteri nullo modo potuit. Ratio, quia Mater gravis quodam Tefas & Calcem comedere solita fuit; unde caractere hereditario affecta fuit. Quo etiam facit Historia, quam habet TULPIUS lib. 2. Obs. 24. Novi hic Mulierem, quæ impensè delectata cu-

spidibus acutis Græce, cujus Mater gravis Melancholia hypochondriaca correpta, his delectata fuit.

Ex his patet solutio binarum Controversiarum: Nempe I. An in Pica appetantur similia? an verò contrariarum id est? An appetantur ea, quæ convulsant cum Fermento stomachici? an verò, quæ non convulsant? Resp. cum videamus tales ægros appetita avidè sumere & digerere sine noxa; patet, quod similia tanquam grata à stomacho appetantur, i. e. appetunt ea, quæ sunt similia, & quæ se habent ut objecta convenientia ad activitatem Fermenti stomachici vitiatæ, seu in quæ possit agere & digerere; reliqua omnia, quæ non potest solvere, reperiuntur. Ut enim acidum esuriam naturaliter constitutum fertur saltem in appropriata sibi, seu in quæ commodè agere potest, ita illud simili modo in præternaturali ejus alteratione, inconfecta & singularia ardent appetit; & quidem talia saltem, quæ ipsi sunt quasi similia; aut quæ promptè potest digerere. (R)

Hæc deinde mano non ducunt ad resolutionem II. Questionis: An in Pica, quando subinde extraordinaria ingeruntur, hoc fiat sine aut cum noceamento ægri? Nam ex talibus assumptis, Græzæ aliorumque usu, profant exempla, quod devorata sint hæc soluta & inordinata, & tamen non nocuerint. Respondetur: sicut in ordinario victu sobrietatis est cardo dicere, & alimenta etiam non optima moderatè assumpta conducunt, immoderatè verò nocent; ita pariter in Pica ræd nocent talia assumpta, licet soluta, modo sobrietate nec nimia quotitate ingerantur, à quibus non appetitus non levis alius coarctogere læsio; hinc enim exierit picanæ sèpè aliquot cochlearia Theriacæ, aliæque Mulieribus Zingiberis devoravit, sine ulla insequente alteratione & noxa, cæter. PLATERO Obs. lib. 1. §. 233. Quo facit Observatio TULPII lib. 2. cap. 24. de Muliere gravidæ, quæ gestationis tempore 1400. Haleces, sed non una vicè, devoravit sine noxa. Item supradictum est exemplum, quod habet PLATERUS L. 1. cap. 240. de Puella, quæ Cepam sub cineribus coctam Theriacæ implem (quæ antea Ruboni phlebotomica fuit imposita) sine noxa devoravit, cum tamen certum sit, Cepam veneno fuisse imprægnatam; sic Medici quidam Gallus, de la FORGE, in *Comment. super Cæsar. de Medicis* pag. 285. & 286. refert exemplum de Puella picanæ, quæ comedit lapides, qui tamen fuerunt gratiores, quando prius ad campus radice Lunæ expositi fuerant. Ad hæc plorima talia profant exempla abfurdorum & notiorum sine incommoda assumptione: Sic LINDEMANNI uxor, Melancholia hypochondriaca laborans, Araneas majores, *Repte Spianæ*, ubique locorum anxio collegisse ac devorasse innoxie, dicitur. Fermentum enim fertur in similia, & determinat assumenda: quod scipio, non nocet, quia digeritur, modo servetur doctis: si nimium devorantur appetita, nocent. Si igitur assumuntur ordinatè, nec una vice nimis copiosè, non nocent. Alias optime etiam cibi in statu sine inordinatè ac copiosis assumpti, etiam sunt venena.

Ex hæcenus dictis definiri potest Pica, quod sit appetitus variarum rerum abfurdarum, ex Phantasia corrupta, quæ quando occasione vitiatæ, principium ducit. Adeoque sub hac latitudine subestiam Pica erunt spiritus animales, vel vitiatæ, vel vitiatæ tæ moti, quatenus & inde opus Phantasiæ depravatur, ut crebrius occasio sit ex Ventriculo & hujus Fermento alterato, ubi subiectum Radiationis erit.

Causa proxima erit vitiosus spirituum motus, quatenus Phantasiæ morbus turbat.

Causa remota occasioalis est multiplex, Mensum defectus, Graviditas, Fermenti digestivi alienatio, & quæ sunt alia plures circumstantiæ, semper hic probè observandæ.

Uno nomine videtur Pica & Malacia reverè esse species Melancholiæ hypochondriacæ, quia ejusmodi Homines alia ut plurimum Melancholiæ signa præ se ferunt, in qua ad certum quoddam phantasia, occasione Fermenti stomachici præternaturaliter alterati, dirigunt Imaginatio; unde & tam delirius appetit, & desiderium ad certum quoddam edulium, vel hujus loco aliud quid insatiatum assumendi, supervenit. Ut enim Melancholici tales feruntur in certum subiectum, si putat v. g. esse Cucurbitam, sui exemplum novi: ita Picanes habent Phantasia depravatam, quod velint bibere Araneam, edere corium cum Lana, &c. Hinc & Corn edunt, Phantasia nempe saltem demulcente, ac quod in Melancholicis non nunquam fieri solet; in hoc malo facile influuntur: vid. PA.

(Q) Conferatur etiam, quæ de his adnotavimus tom. 1. eccl. 135. lit. F.

(R) De hac analogia Gælium quod Cibi in Lingua excitant, & errandem facili vel difficili in Ventriculo digestionem aliquam quæque e. L. tom. 1. subnotavimus.

PANAROLLUS *Præm. 3. Offens. 38.*

Nempe tali casu

- (1.) Imprimis Stomachus evacuandus.
- (2.) Permeendum vitium acris acidis salum factum, saturandum, imprimis per Martialis, vel per alia Appropriata alterandum; Et
- (3.) Stomacho acido moderata & ipsi gratis succurrendum.

S I G N A.

Quod attinet signa, res est clara, quod *Diagnosica*.
Quod Prognosica: distinctio paululum de circumspicienda promerendum: Nam citra tamen possunt comedi res appetere, sed sobrietate melius tamen est consueti, quam plane inconvulsa, imò noxia, appetere. Quamvis enim Feminas talia præternaturalia sapis sine damno assumptis observatum fuerit, quatenus tamen ex copioso rerum absorptum est tractu temporis pariter tandem humores inde generantur, hincque sunt corporis Langor, Cacoehymia, Hydrops, &c. postquam cum viis semper sine nota talia assumant, sed ab illis vel ad vomitum urgentur, vel alia mala perantur: quæque videt, præter SALMUTH C. 1. Off. 41. BRASSEVOLUS in *Compendio* 2. 3. 4. de Muliere tollitur, quæ mota desiderio assumentis Glaciem, in gravia incidit symptomata.

In Prægnantibus imprimis observandum: esse denegationem rei appetitæ non semper ferre posse, quia per hæc Fortis non altera variatione defecatur: vid. PANAROLLUS *Præm. 1. Off. 12.* sed interdum trucidetur: Cuius accensum fit de Muliere, quæ duobus vicibus dentes in pedus cuspisdam viri immittere, atque sic binis moribus petere gessit, quivirantem primum quidem mortuum percutit, alteram vero regulavit: unde factum, ut duo filios in lucem ediderit, unum viventem, alterum mortuum. Jucundum exemplum habet SALMUTH C. 1. Off. 41. de Muliere gravidâ, quæ Pica laborans (suntam habuit libidinem vellandam barbam lanionis, unde magnam partem illius erulit), quod etiam altera vice fecit: tertia vero vice lanio denegavit: hinc peperit tres fides unum mortuum, & duo vivos. Unde vel ipsi concipientes, vel quantum possibile persuadendum ad finem mentem deducende. Interim notè PANAROLLUS *Præm. 3. Offens. 38.* loquitur: *Temperantia Mulieribus Pica laborantibus optimam remedium.*

C U R A.

Quod *Cura*: super jam formatas fuerunt Indicationes & cum præsertim Pica & Malacia in Stomacho fundata sit, remediis Stomachicis curanda venit. Ante omnia evacuandus Stomachus Vomitorio. Observetur tamen statim ægri: *An subjectionem potius sit Gravidâ? an vero non?* In Gravidâ acutius Vomitus provocetur: nempe in tali, quæ facile vomant, & adhuc in primis versentur gestationalibus moribus: in ultimis, quarto quinto & frequentibus moribus non sine periculo propinantur: Ergo tunc consilio procedendum. Vomitoria supra in Generalibus dedi. FABER pro Vomitorio utitur Sale Vitrioli vomitivo, ut & Infuso Mercurii vitæ: sed Mercurius vitæ tutius exhibetur, quam Sal Vitrioli vomitivo, ex eo, quoniam hoc tantum est Vitriolum ad albedinem calcinatum, hinc inimicissimum Stomacho, cuius robur atque vires deiecit & prostravit: Mercurius vitæ per se est latus purus. Nec inepti sunt, qui cum Dederint Vomitoria misceant, aut hinc illis superbibere jubent: sic enim præsentia rei exhibita ejus desiderium tollit & humor pævus simul evacuat: vid. SENNERTUS *Pr. 16. 3. 2. 2. 3.*

In Vomitione autem respicienda est habilitas subiecti, prout inclinat ad vomitum. Si Picaeas ad vomitum non apta, aut circumstantiæ quedam vomitum prohibeant, Purgantia per inferiora administranda, & quidem mitiora ex Pilulis, præsertim Aboticiis: quibus admissendum est aliqd Mercurii dulcis ritè parati: aut parentur Pilule, quæ superius dedi. AGRICOLA miscet cum Extracto Hellebori nigri purgando Mulieres non gravidas, ex Menstruum suppressione Pica laborantes, hoc modo:

*℞. Mercurii dulcis.**Extracti. Helleb. nigri. ss. 3℞.**Colonythid. gr. 3.**Cum Succo Cydonior. 1. Pilula, 5.**Pilule laxative.**Vel**℞. Mercurii dulcis. ritè par. 3℞.**Extracti. Helleb. nigri. gr. xv.*

Truch. Alband. gr. ij.
Cum ℞. Mench. 1. Pilula, 5.
Pilule laxative.

Conveniens quoque est, ut purgantia propinquentur simul cum re appetita, imprimis ut salutaris ægri: v. g. in appetentibus Cretam aut Arenam, aut Calceum vivum, optimum est, ut cuncta permiscantur Mechocanna alba, vel Pulvere Jalappæ, aut similibus.

Quod si vero totam Humorum massam malè se habere est signa innocet, iuxta SYLVII *Præm. 1. cap. 2. 9.* Sudores quandoque blandos per Antidonia movere conveniet.

Præmissa Evacuatione opera dauda, ut alteretur vitium in Ventriculo, ac corrigatur labes Fermento Stomachi digestivo indulta, quod heri anquit, nisi causa illius removetur. Hinc si v. g. Menches suppressi sint, revocentur: si aliquid affectionale Hypochondriacæ subit, hæc tollatur. Hinc deuter Stomacho grata & appropriata Acidula blanda, spiritibus volatilibus nonnihil temperata, sic enim fit, ut acor Fermenti naturalis reducat, & Appetitus depravatus corrigatur: quæ inter in Regno Vegerabili excellent Succi & Syrupi Cydoniorum, Limonum, seu Citri, Aurantiorum, Graustorum acidorum, &c. quoniam sunt ingularia Stomachica. Specialiter etiam commendatur a quibusdam contra Pica Aqua pampioeorum Vitis, primo Verè ex Vitium farculis inculis exillans, quæ est imprægnata subtili tartaro, seu aciditate volatili, ratione cupis corrigi Veneticulis labem, & Appetitum reducit. Uturper solitariæ, vel convocentur etiam diluatur cum Spiritu Theriacali vel Aqua in Julebis. FORESTIUS 1. 1. Off. 17. Puellam picaem corripit per Syrupum de Abiaco sapidis usurpant, propinandum postmodum Purgas ex foliis Scenæ. Commendantur etiam Cappares cum Aceto conditi: cui experti, quibus nonnumquam etiam solent addi Semina Camminativa, Anisi, Fœniculi, Carvi, &c. Electuarium Corticem Aurantiorum cum Essentia Croci paulillo, in Pica & Menstruorum suppressione adhibuit cum successu QUERCETANUM imitatus FERMISTUS: vid. VELSCHII *Mittelm. Cass. 3. Off. 12.* Radices Petroselinæ cum Decocho Cicera propter viam diareticam præmissa Vomito: Haustus Vini generosi itidem conducit, quoniam in Vitis singularis vi est rellaurativa Stomachi, imprimis si sit iesum super folia Menthe vel Portulacæ, & Abinthii. LINDANUS in *Coll. super Haemorrhagiam* specificè commendat Conservam Rosarum cum Spiritu Vitrioli acidulatam, cui addit pulverem Zedoariz in hac forma.

*℞. Conf. Rosar. 3℞.**Pulv. Zedoar. 3℞.**Spiritus Vitrioli. q. s. ad gratiam aciditatem.**M. 1. Electuarium, 5.**Electuarium Stomachale.*

De hoc subinde aliquid affumitur ter de die, mane, meridie, & vespere: continuatur tandem, donec cesset affectus, nam dicit esse expertum.

Loco Conservæ Rosarum melius cesset, si recipereur *Conserva Menthe crispæ viridula*; nam est singularis in hac afflu: v. g.

*℞. Conf. Menthe crispæ viridulæ. 3℞.**Pulv. Zedoar. 3℞. Div. 3℞. ad 3℞.**Syr. Cydon. simpl. vel aromatiz. q. s.**F. Electuarium.*

De quo sæpè æger capiat pro lubitu.

Item convenit Aqua Cinnamomi cydoniata, vel sola, vel cum Elixir Menthe imprægnata, & acidulatam cum panis in Spiritu Vitrioli Philosophici: v. g. præmissis premittendis hæc *Mistura Stomachalis* talis:

*℞. Aqua Menthe.**Mellif. cum Vitis an. 3℞.**Succ. Cydon. 3℞. vel Succ. & Succ. Citri an. 3℞.**Extr. Menthe 3℞. ad 3℞.**Spiritus Salis dulc. 3℞.**Syr. de Succo Cydon. pro lubitu.*

(nam Syrupi non bene præstiterunt in magna dosi propter admissum saccharum.)

*M. 1. Par. 5.**Mistura Stomachica.**Vel**℞. Aqua Menthe.**Mellif. cum Vitis an. 3℞.**Cinnam. cydon. 3℞.**Extr. Menthe. 3℞.**Succ. Citri,**Cydon. an. 3℞.*

Spiritus Salis doli. ʒi.

Syr. Cydon. ʒi. ad ʒʒ. vel ʒ. l.

M. l. Perle.

ʒ. Aqua Mentha.

Mist. an. ʒi.

Succ. Cydon. ʒʒ.

Elis. Mentha.

Syr. Cydon. an. ʒʒ.

M. l. Perle.

ʒ. Aqua Mentha.

Mist. an. ʒi.

Cinnam. cum Vin. vel cydoniat. ʒi.

Succ. Cydon. ʒi.

Spiritus Salis doli. parum.

M. l. Perle.

De his Mifluris capiuntur subinde cochlearia aliquot. Succis si beneficio sulphurationis à fermentatione præserventur, centum annos durant.

SYLVIVS in Praxi, Modernorum commendare solet Salia volatilia, non communia, sed oleosa, seu Olea Vegetabilium impræparata: Sed caute adhibenda, quoniam sunt generosa nimis, & metus est, ne aliquando causent abortum.

Imò Narcotica quoque, v. g. Theriaca & Mithridatium, magnarum observantur virium.

Interdum in graviori malo, imprimis Gravidarum, fatiendum, & abstergendum est Fermentum acre in Stomacho, unde ad Pulveres Cachectici & Martialis confugiendum est: (vid. BRENDELIUS *Chemist.* 150. Idem RIVERIUS *Cent.* 4. Obs. 93. specificè commendat *Pulverem Stomachicam Quercetani* seu *Birkmanni* completum, qui vidit in SCROED. *Pharmac.* 1. 2. pag. 266. & ZWELFFERI *Animad.* in *Pharmac.* *Angustani* :) necnon Crocum Martis aperitivum, & hunc expertum dicit in Pica Mulierum, ex quacunque causa orta. Dantur & alii Pulveres Cachectici, quorum basis est Mars, loco cuius etiam Corallia, Terræ, Perle, Masticeptilam, Ebur, & similia Abstergentia, Fermentum saturatiora, adhibentur: quibus præmissis Purgatio per Pilulas Mercuriales inseritenda venit.

Quæstio est: An Venæ sectio conveniat in pueris Gravidis & quibus et Mensium suppressionem hic afficitur venis, etiam conveniat? Ratio dubitanti oritur, quia in talibus et Mensium suppressione talis morbus supervenit. Equidem de his, in quibus Menses supprelli, dubium non est, quin à Venæ sectione, suo tempore soluta, multum adferat auxilii. Interim non opus est, ut præcise Venæ sectio semper in tali affectu administraretur, nec nisi Plethora aliave Indicatione adsint, quæ Venæ sectionem fudeant, cum Natura per Hæmorrhoidum fluxum quandam liberaverit: Nam Venæ sectio per se opem non fert. Sic enim refert RHODIUS in *Cent.* 1. Obs. 37. de quodam, qui scabie fœdatus, & Malacia inguini laboravit, & emensus fuit solo Hæmorrhoidum fluxu. Facillius autem in curari potuit: nam hic fluxus salutaris fuit, Venæ sectio verò non ita. Unde si remedium esset aliquid in tali affectu, ad naturam Melancholicæ hypochondriacæ accedente, Hirudinum ad Hæmorrhoides applicitorum iterum utilis videtur.

Uterius observetur in Gravidis, ne iocundetur nota Frentui, eas non semper denegationem rei appetitæ ferre posse; si enim denegatur ipsi res appetita, laeduntur Infantes. Ex tali calu observavit SCHOTTUS in *Phys. curiosa* Puerum à Pane abhorrentem, ex vitio Matris, cui picanti denegatus fuit Panis. Aliud MARCUS MARCI refert de *Idiotis*: Gravidam scilicet cum appetitu summo usum fuisse Carpinum capitibus, increpata ab hoc, averfata fuit, ediditque Puerum, cuius dimidia pars capitis fuit iossa capitis Carpinis: Vid. porro SALMUTH in *Phys.* qui iacundum habet exemplum C. 1. Hist. 34. Si res appetita à Muliere non planè contra naturam est, e. g. Arfenicum, & haberi potest, concedatur; non verò in nimia doli. Interim imitetur artificium PANAROLLI, ut nempe perissuosibus & fraude defraudetur, i. e. modò ægrarum desideria adimplendo, modò vel directè vel indirectè eadem detestando. Erat autem tale: Habebat Puellam 12. annorum, devotam Corium inauratum, perfusam ei, pessimum habere saporem, illo vivit Decodo Colocyndidos cum particula Asæ fortidæ; percipiens saporem, ipso cessavit: vid. *Prætor.* 3. Obs. 38. & 50. Si verò res non possit haberi, tunc maxime, iuxta persuasiones rationales, datur dicta saturantia, Fermentum stomachale & acidum Stomachi rite restaurantia. Item

huc spectant Vomitoria, ejusmodi abstergentia commissa, quatenus his etiam abominatio quædam rerum desideratarum, dum Ventriculo ingrata cernitur, excutitur.

ARTICULUS III.

De Fastidio Alimentorum.

Vid. SYLVIVS *Prax. lib. 1. cap. 3. pag. 33.* Contrarium verò vitium modo explicatis affectibus est *Fastidium Alimentorum*, quod est Nausea, & Horroris seu Averfionis species.

CAUSÆ.

Averfatur autem Ventriculus, quæ ipsi sunt nociva, dum hujus Fermentum pinguedine vitiatum est, five fit assumptum purius, five Cruditas nidens, five saliva biliosa, Stomachum laedens: sicut etiam ingentium, seu ex certa lésione superveniens Fastidium, semper præsupponit præcedens nocumentum: v. g. fastidiè & horret Virgo Cinnamomum, quia antea cum hoc lævatus fuerit Pulvis Purgans violentus, à quo Stomachus adeo nimis fuerat lésus. Præ cæteris frequentius horret ægri febricitantes Carnem, quia laeduntur ab eam assumptione, quatenus non digeritur, sed in Cruditatem nidens, & in liquorem amarulentum degenerat, à quo offenditur Ventriculus. Horret ægri tales Cerevisiam lapuleam, partim propter amarorem, cum tales ægri subinde de molleto amarore in ore, quod de rubidus nidens, emquerantur, partim quod non digeratur, sed & ipsa facile nidorem hostilem contrahat: Unde vel Aquam Vini temperant, vel Cerevisiam secundariam desiderant, cum talia facile transierit, & suavi acidulo sapore amica fiat Stomacho. Observari exinde, quibus ægris adhuc Cerevisiam bene bibentibus, crebris propter urgentia sympnoma, & repetitè exhibitum fuit Opium, granolatum licet, quod exinde horrorem Cerevisiæ contraherent, propter nauseolam Opii amarorem, Ventriculum offendentem. Hinc quibus amara datur Purgantia, resinosa præterit, ut fici subinde arguerit, ita Cerevisiam ferè horret, aquola vel acidula ferè appetentes: Ob id fulepi acululi tam grati sunt talibus. Ob id, quando Cerevisia bene apit quolibet in morbis, præterit acutus, bonum signum esse solet. Abstemium à Vino videb. *ist.* M. A. N. G. *Ann.* 4. Obs. 103. à *Panc.* 6. Obs. 158. (S)

CURA.

Ad restaurandam autem suavitatem & facilem assumptionem Cerevisiæ de Carab. nil molius observavi, quam Elixir Proprietatis *Panacoli* rite paratum & propinatum. Ab hoc enim adhuc appetitus salum redit, eoque curatur Fastidium. Abstemium autem etiam remedia ex Mentha, imprimis Elixir-Mentha, cum spiritu acido quodam aculeatum: hinc Cydoniata, succus seu Vinum, & Syrupus Cydoniorum, Cydonia condita, & similia, optimè conferunt.

CAPUT III.

DE

APPETITU NIMIO.

Appetitus nimius est, quando augetur, ita ut plus quam Naturæ legitimis curfus permittit, appetatur. Hic duplici vocatur nomine: uno *Appetentia Canina*, altero *Bulimio*.

ARTICULUS UNICUS

De Appetentia Canina & Bulimo.

Appetentia Canina, vulgo *Halsbunger*, dicitur à similitudine Canum: quoniam taliter affecti alimenta non com-

(S) Abstemium dicitur qui abstinet à temeto h. e. à vino: quare quædam interdum sequuntur *ist.* dicit, Abstemium à vino, ita minus proprium est dici, Abstemium à pane, ut hic loquitur *Aulic.*

communiunt, sed copiose deglutiunt, interdum etiam vomunt, inflat Canem. Bulimus vero, vulgò *Welf-magen*, h. e. *Lupi stomachum habens*, vox Græca ratione compoſitionis, à *Welf* molitum, & *Wagen*, id est voracitas nimia, deoriat ingentem Famem. Dicitur *Bulimus* idem, quia Græci omnes rebus insignioribus vocabulum *Bul* præpohuerunt: vid. VOIGT de *alib.* *libro* pag. 200. Vulgò quidem Appetentia Canina & Bulimus confunduntur, & pro eodem affectu habentur, sed male. Hæc inter autem talis est differentia: Appetentia Canina est continua, inordinata, & ferè inextinguibilis Fames, quando ægri inflat Canem avidè ingerunt alimenta inrensè appetita, quæ aut promptè digerunt, aut, quod frequenter contingit, densò indigesta evomunt. Bulimus verò est tam intensa Fames, per inter valla faltem recurrit, ut ægri ob id etiam propter Stomachi orificium superius molliùs affectum, per ejusdem consensum Animi deliquium patiantur: vid. SENNERTUS & RIVERIUS. Non tamen semper cum Canina Appetentia conjungitur ejus Vomitus, ut tollatur observatio SENNERTI *lib. 3. Pr. P. 3. Sæc. 1. c. 4. pag. 102.* Bulimus verò est ingens Fames cum Lipothymia seu defectu Animi conjuncta.

SUBJECTUM.

Subjectum morbi sine dubio est Orificium Stomachi inferum.

CAUSÆ.

Causa autem Appetitus aucti, tam in Bulimo, quam Appetentia canina, est vel in, vel extra Ventrículum. In Ventrículo Causa proxima est *Succus Acidus* vel nimis corrosivus in stomacho residens, siquæ volatilis vel penetrantior adlivus, utque non à materia villosa irreplet seu fixus, sed subtilis & quasi spirituosus in stomacho, Orificium finitimum insipienter vellens seu moriens: in quo ipso omnes omnino Medicorum Sæculi conveniunt. Veteres enim, dum producent *Succum Melancholicum*, hoc ipso succum Acidum in Stomacho confirmant: nam HIPPOCRATES ordinariè Melancholicum Succum per Acidum describit, dum subinde Melancholicum comparat cum Acero acerrimo. Dum ergo dicunt Veteres, impemiss AVICENNA, Melancholicum esse Causam Bulimi & Appetentiae Canine, ex ipso dicunt esse Acidum: PETRÆUS, & antiqui Galenici, adducunt *Bilem purioram & arguiorem*, seu mixturam illam, primariè ex Acido insigni Stomachi & Bile resultantem: unde etiam Infantes, quibus frequens est reſectio talis Bilis portæque & arguiore, tunc temporis patiuntur tormina ventris, & exulcerationes ani, propterea quoniam Acidum etiam has exulcerationes producit: quæ tamen curantur per illa, quæ Acidum absorbent. Hinc inde est, ac si dicant, peccare Acidum corrosivum in Stomacho. Hermeticoz Schola, uti Microcosmi adiones & operationes per Macrocosmum definit, configit ad *Spiritum salinum acriorem & Vitriolicum humilem*, qui Spiritus salinus acidus & acris cum fit acerrimus in stomacho, quicquid ingeritur, promptè celerrimèque coquacis, & à quo omnia assumpta, tanquam à fortissimo menstruo, dissolvantur. In hoc annos conveniunt, quod Acidum fit nimium, vellens stomachum. Nec deest eaperientia: siquidem Acida assumpta, ingrimis vero Acetum, succus Catri, Spiritus Vitrioli & similia, uti naturaliter Appetitum stimulant; ita & à similitudine effectuum poterit argumentari, quod talia intensiora in Stomacho Famem Caninam præternaturalem intendunt. Confirmat hoc etiam eaperientia eorum, qui laborant Appetentia nimia: quæ enim ejiciuntur in appetentia Canina per vomitum, Acida plius minus viscèda esse solent: teste FONSECA (sui Medicus Papæ) *lib. 2. Confut. 86.*, ubi exemplum habet cuiusdam Adolescentis, qui ingulis mensibus per vomitum rejecit succum crassum insipidum nigrum, postmodum verò succellens Appetentia Canina, quo tempore & quæ reſectio, omnino fuerunt Acida: Sic HORSTIUS *lib. 4. Obs. 4.* observavit, quod Juvenis Appetitu Canino laborans acida ingulis evomerit. Confirmat hoc etiam Hypochondriaci & Melancholici, qui ob acidum notum laborant appetentia Canina; & BLASIUS *Observat. pag. 122.* Ventrículum inextinguibilis fame laborantis acidum spirale odorem testatur. Ob simile enim acidum excedens Canes non tantum ingerunt dura Olla, sed eadem etiam feliciter digerunt.

Præter acidum, etiam *Acriorina triuſa seu Alcalica*, maxime volatilis & adiva, Famem Caninam causare probabilè reddit, quod is, quibus Bilis per dudum peculiarem ad Ventrículum defluit, & voraces quoque observentur:

Tom. II.

vid. VESALIUS de *Hum. Corp. Fabr. l. 5. c. 8.* & MÆLIUS *Fund. Med. cap. 10.* præprimis cum POTERIUS *G. 3. Obs. 96.* testetur, se acidis famem Caninam curasse.

Huc etiam pertinet Orificii & Membranz nervæ Ventrículi nimia sensibilitas, qua Spiritus copiosius alledi continuam Famem excitant. Atque hæc quidem ordinariè sunt appetentia Canine causæ.

Extraordinariè etiam evenit, ut appetentia Canina interdum oriatur à *Periculis latè*, five in Ventrículo producantur, five in Intestinis hoc condensato; quatenus alimentum, & chylum absorbendo, Ventrículum verò rodendo, appetentiam Caninam inducant. Exemplum fuit raro: quondam tamen hinc inde à Veteribus, quom etiam Moderni Medicis, allegata: Exemplum à TRALLIANO *lib. 7. c. 14.* ZACUTIUS *TOLUSITANO Med. Primæ. lib. 1. c. 118. 62.* & SCHENCKIO *lib. 3. ubi de Appetit. Canino Obs. 2. pag. 312.* de Muliere, intensissimo appetitu affecta, curata tamen per usum Hiæræ, i. e. medicamentum ex Aloe parati, cuius usui Vermes 12. cubitos longum excrevit, & ita à fame Canina liberata fuit. ZACUTIUS LUSITANUS, qui Læ. reſect hoc, elegantem habet discursum de hac materia. Videtur MARCELLUS DONATUS *lib. 3. Sæc. 2. Obs. 9.* & à Modernis observatum, Scorbuticos non raro à Lumbriis latè cum appetitu Canino vexari. Sic R. D. MICHAELIS aliquando reſcit, curasse se Formicam scorbuticam similiter appetentia Canina laborantem, quæ post usum Succi Nalurtii aquatici rejecit Lumbriculum latum insignis longitudinalis, & exinde appetentia Canina promptè cessavit.

Verum, à *Vermibus latè* possunt inducere Caninam Appetitum merito dubitatur, propterea quoniam taliter appetentes, ut promptè appetunt, ita promptè digerunt, quod fieri nequit à Vermibus. Puzarim ergo, an cum Vermibus in Intestinis simul adesse acidum succosiorum ultimum, à quo & appetentia oriatur, & etiam Digestum, quod non solum præsupponit Vermes: Hi autem dubio procul vellendo, & moriendo, malum insigiliter augebunt.

Extra Ventrículum autem ex rebus Non-naturalibus præbet Inedia, & longior alimentorum denegatio; ex Præternaturalibus omnes evacuationes Chyli & Sanguinis immoderate.

Cæterum, utut tales, Canine appetentia laborantes, multa doverent, & citò digerant, raro tamen solent pinguescere, sed potius emaciantur. Ratio est; quoniam in talibus ob acidis succo, & acrioris etiam in corpore luaviores, Massa sanguinea redditur aspera & minus nutritiva. Nutritio namque nostri corporis fit obſervèdè seu materialiter à succo blando, pingui, chylo & subacido; unde eorum, qui probò nutriuntur, Massa sanguinea est semilacea, quod videmus in Infantibus. In his vero, cum deſit talis succus pinguis chyloſus, & potius abundet acidum, fit, ut propter asperitatem Massæ sanguineæ minus nutriantur, sed potius emaciantur. Videmus hoc in Scorbuticis, qui laborant Atrophia propter excessum acidum rancidum, specifiè tamen saporis, à quo Massa sanguinea aspera redditur. minus potest outrire corpus. Unde rarum est exemplum, quod habet AMATUS LUSITANUS *G. 7. Curat. 37.* de Muliere melancholica, ingenti fame correpta, quæ ob id multa & copiosa devoravit, & cum arida fuisset & emaciata, exinde tamen postmodum pinguis fuit reddita. Rarum, uti dictum, hoc est: Interim si consideremus statum, Mulieris ægræ, quæ fuit melancholica, pater folus dubi. Rarissimum est quod habet SCHENCKIUS *lib. 3. ubi de Fame canina, Obs. 6. pag. 319.* quid famem Caninam periodicam observavit quoniam circa solstitium invadentem, & quidem tantummodo 10. dierum spatio persistentem, consequente ingenti ciborum fiducia; qui ipso tadem observationem habet famis Canine epidemicè grassantis, *lib. 1. Obs. 2. pag. 31.* Sicut etiam rarum est, quod observatur fuit appetitus Caninus epidemicus, quo quidam curatus habet beneficio boli Armeæ, cuius usui Vermes copiosè ejeci sunt: vid. FORESTUS *lib. 2. Obs. 28. in Sæc.*

Quod attinet Bulimam cum Animi deliquio: eadem habet Causas, utpote miores: atque nam propter Orificii stomachicis, & Membranz nervæ nimiam sensibilitatem, cum aliqui Spiritum animalium dispendio aut torpore, ad Lipothymiam tandem dispendit. Distingendum autem hic est inter Appetitum verum, & falsum: Falsus enim est, quod etiam interdum ægri fieri in ultimo mortis agone eventus, & est quasi imaginarius, & venit ex aliqui imperio delirio, quia ægri nesciunt quid agant, & malum figunt, præsumpti si per totum morbi cursum sine appetitu fuerint.

P

51-

SIGNA.

Quod attinet signa, *Diagnosis* est facilis.

Quod *Prognosis*: Affectus hic ut plurimum est citra periculum, facile enim relinquitur, nisi ob Animi deliquium secundum immixtum morbum, unde deficit ager, praecipuum si Ventriculo adhuc repleto illud contingat, aut magis evacuationes & colligationes corporis legatur.

Post Morbos, imprimis Febres, in flatu Riconalescentia impetus solet invadere Appetentia, Canina similia; quae tamen est sine periculo, signum potius est Naturae fecoligentiae. Cancrasi nisi agri sint moderati & temperati, aut si nimis comedant, solent pati Racidivam; vid. RIVERIUS *Prax. Lib. I. p. 6. t. 3.*

Quae Canina Appetentia cum Vomitu aut frequentioribus Decubitionibus perleverat, periculosa est, quatenus in Cachexiam, Hydropem, Tabem, &c. degenerare solet.

Bulimus supervenies Morbis Chronicis, Quartanae, Hydropi, &c. raro est citra suspicionem foeculi ventris.

CURA.

Quod attinet *Curam*; in hac dum primarum attendenda indicationes:

1. Est, ut temperetur Acidum illud acre volatile, ut acrimonia suam penitus amittat.
2. Ut temperatum ita, & corroborate sua exutum, recuperetur.

I. Quoad prius; dixi, Acidum temperandum esse; quia aliis, si humorem velimus purgare, autemque temperetur a sua acrimonia, metus est, ne evacuantur irritatum gravia inferat symptomata. Si enim foris velimus evacuaere per vomitum, metus est, ne Cholera morbus concitetur; ut recte putat HARTMANNUS: si velimus per inferiorem purgare, metus est, ne excutieret Intestina, & ita inopetant affectum Dysenteriae similem.

Ex, quae acre Acidum illud temperant, ex superioribus sunt notissima, in specie triplicia: (1.) aut sunt Salia alia dicta, tam volatilia, quam fixa, praesertim pollentiora, quae Acidum omne absorbent, & in salium aut insipidum transmutant: Sic v. g. si Spiritui Vitrioli acido, imo acidissimo, addatur Sal Tartari fixum, exinde Spiritus Vitrioli omnem aciditatem amittit, & fit plane insipidus. (2.) Temperant Acidum corpora Terrea, & Marina, Aetheria communiter dicta, quae Acidum in se absorbent, imbibunt, & ita ejusdem activitatem temperant: Sic v. g. si Aceto aceto rimo infundatur Lappuli Cancrorum, fit ut Acetum corroborat eos, qui absorbent in se ferre Acidum, & exinde Acetum fit insipidum (3.) Corrumpunt Acidum omnia ea, quae acrimoniam ejus obtundunt, qualia sunt Pinguis aut Mucilaginosa, huiusmodi similia, quae obtundunt, & hebetant Acidum: vid. BARNETTE *Prax. pag. 120.*

Quod attinet *Materiae Medicam*: Inter Alcalia seu Salia fixa & volatilia pertinet Sal Tartari, aut Oleum Tartari per deliquium; Sal Alkali; in genere Salia fixa Vegetabilium omnia, Sal Cardui benedicti, Centaurii minoris, item Salia volatilia, quae inter eminent Sal Urinae, &c. Haec si u. surperetur, potenter coarctant Appetitum quocunque nimium: Item Spiritus Urinae, Spiritus Corvi Cervi, & similia volatilia. Pertinent huc etiam Cepae, Allium, & similia Simplicia, sale volatili acri praedita. Inter Terrea sunt Lappuli Cancrorum, Corallia, Margaritae, Greta, Lapis Haematites, Corus Cervi ustum, & similia, quae absorbent Acidum, & ita temperant, ut deponat acrimoniam. Bolus Armena hoc pertinet, non minus quam Terra sigillata; haec namque acidissima Acidum temperant: item Mars & haec namque acidissima Acidum temperant: quoniam Acidum quocunque imbibunt, non tamen in Appetentia Canina, sed in specie in Malo Hypochondriaci sunt convenientissima; live sit Limatura Martis cruda, live Crocus Martis aperitivus quicunque, live Tindura Martis quicunque. Hoc observetur in preparatione Marialium pro hoc usu, ne praeparantur eadem omnis Acidis ubi enim Mars ab Acido lemel est saturatus extra corpus, tunc fane nunquam intra corpus Acidum amplius potest absorbere. Quibus nunc Opista commodè addi possunt: v. g. dabo exemplum Pulveris praescribendi, temperantis Acidum contra Appetentiam Caninam, ex modo citatis subditis:

℞. Limatur. Martis minimis pulv.

Croci. rub. prep. an. ʒi.

Lappuli. Cancrorum prep. ʒi. vel ʒss.

Mart. Ferlar. prepar. ʒi.

Lapid. Caeponum prep. an. ʒi.

Craei Orient. gr. v. ad ʒi.

Land. quasi gr. ii.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis Principitatus.

Sufficit pro duobus vel tribus dolibus, prout magis vel minus appetit ager, & manifeste Appetitum minuit, in paulo pingui abundans.

Si volumus remedium ex Salibus, potest sufficere haec Formula:

℞. Arsenium diaph. ʒi.

Salis Arseni.

Cerae. min. an. ʒi.

Mart. Corvi vel Urinae, aut alius ʒi.

Blasph. Arseni aut alius (pro odore & sapore) ʒi. ad gr. xv.

Prout magis vel minus volumus medicamentum fiporem.

M. f. Pulvis pro dolib. duob. aut tribus, S.

Pulvis Temperans.

Vel

℞. Salis Cord. leud. ʒi.

Mart. Ferlar. prep.

Lappuli. Cancrorum prep.

Offi. sep. an. ʒi.

M. Pro tribus dolibus.

Item Urinae potus Famem nimiam sedat.

Denique quod attinet *Olea*: sunt quatuor *Olea expressa*, & in specie *Olea destillata*. *Expressa* sunt *Olea Amygdalarum dulcium*, *Lini*, quod egregium in Pleuritide, Nephritide, Jus pingue: *Popullaria*, ut *Oleum Anisi*, *Carvi*, & praeceteris Caryophyllorum, quod potens est in absorbendo Aelid quocunque, unde etiam Rigores febriales ab Acido ortos compellit. Pertinet hoc etiam vitellum Ovi ad duritiem cocti, quod teste HARTMANNO, valde convenit in Appetentia Canina propter copiosum Oleum, Acidum excedens egregie obtundens: unde etiam inde paratum *Oleum Ovorum*, uti potum est, convenit, quia hoc *Oleum* ex vitellis Ovorum obtundit vires Acidi in Appetentia Canina, ut cesset, & exinde Appetitus ad naturalem statum redeat. VILLANOVANUS reicit, quendam his hanc affectum Paene caute, & Amura Olei imbato, suffulisse: Mulierem verò Bovis liquorem Adipem cum pari calens Olei quantitate duabus vicibus bibisse, sicque Caninem Appetentiam cum quinque diebus Fallidum commutasse.

Observandum autem, ne Pinguis ejusmodi utatur, ubi Vomitus simul urget, ac si melius se incipiat habere ager, ab ulteriore eorum usu abstinere.

Commendantur praeter modo dicta etiam alia, v. g. Cochlear, Cancr. Hyuatilis, Caro foetilla, haec enim est impraegnata fere corpore sale volatili, & propter pinguedinem difficillimè digestibile, seu coctissimè, nade eucrat vi corroborant Acidi elurini. Commendantur u. Dieta Cerebra Animalium, imprimis Butyri frisa; Cerebra Animalium enim in totum sunt oleosa & pinguis, & obtundunt acrimoniam corrosivam succi Acidi in Appetentia Canina: Item convenit Amylum & Oryza cum multo Butyro & Lacte cocta; haec namque sunt *Olea*. Similiter pertinet huc Propea, & Pistacia, oleosa non minus, quam Amygdalae dulces.

Ratione Olei destillati conveniunt Spiritus omnes Vegetabilium inflammabiles: hi namque nihil aliud sunt, quam *Olea volatilia* per fermentationem, & confusae ob id blando acido pingui, impraegnata sale volatili Plantae. Unde Spiritus Vini, aut solum Vinum dulce, & generosum, Appetentiam Caninam sedat, ut HIPPOCRATES *lib. 2. aph. 21.*, GALENUS in *Comm. ut. in hunc locum*, & ZACUUS LUSITANUS *l. 2. de Med. Princip. lib. 69.* testantur. Locum Spiritus Vini simplicia convenit Spiritus Menthae aut Salviae; aut Vinum geniosum, cui iofusa Salvia & Albinum, uliurapi possunt; horum enim Sal volatile oleolum temperat omne Acidum. Faciunt hoc quoque Essentiae Abianchi, Palegi, Melissae, &c. quae ab HARTMANNO commendantur, imprimis si cum his mazerentur Olea destillata, v. g. Carvi, & similia; haec enim citra usum temperant Acidum in stomacho, & hincque a SYLVIO commendatur Paie sequens:

℞. Aqua Mentha. ʒi.

Cochlear.

Tindura Cinnam. cum Spiritu Vini. par. an. ʒi.

Offi. Albinchi. ʒi.

Miscuitur pro Potione.

℞. Olei destillati. Menthae.

Juniperina. ʒi.

Mi.

Misceantur

Dentur 2. vel 3. guttur pro doſi.

Denique hic non ineptet vel ſociantur, vel ſubſciantur *Oplera*, aliaque *Narctica*, adeoque ſenſum Ventrículo ſuſceptientia, quæ minis Oriſicū ſiniſtrum percipiat velliſcientia. Hæc ipſa tamen cauſiſſimè ſunt uſurpanda, quoniam palliant tantum aſſedum, non verò reverà curant. Hæc perſentent Landanum opiatum notum, cujus loco ſubſtituitur Theriaca, uti etiam Mitridatiad: hæc quo enim Opio cæſi ſunt ſuperſtrudæ, & cum Sale Abſinthii aſſumpta Acidum deſtrunt, & per ſedorem nonnihil immittunt. Pariet Solanum ſuriſum ſeu maniacum cum Vino inſuſum, ſi hauriat, quomocumque Appetentiam deſicit, uti expertus eſt GESNERUS in *Ephedra*, qui videatur, quoniam eſt admodum elegans Diſcurius.

II. Ubi ita temperum fuerit *Acidum expurgandum eſt*. Nam hic ſuccus faciliſſe omniò in Serum, ut poſſit evacuari circa noxam. Purgatio inſtituenda eſt per Vomitus, vel per ſecceſſum. Quod Purgatio ſeu Evacuatio, præter illa, quæ aliis in Mælo hypochoſtædi præſcribuntur, convenit imprimis Extraſtum Panchymagogum *Crollii*, Item Extraſtum Agarici, item Senas, & medicamenta ex Aloë parata: e. g. juxta POTERIUM C. 3. Oſ. 96., Pillule de Hiera ſimplici *GALENI*. Imitandus venit hæc in parte FORESTUS *Sect. 3. lib. 18. Oſ. 3. pag. 138*, qui habet exemplum Appetentia Caninæ in Minacha vomitu eſſorum, ſimulque humorum acidorum, in fine vomitus ſeriente aliquid amarulenti, quod ſauces vellacavit, quæ ſolam fuit curata per hæc Pillulas.

℞. *Mell. Pillulæ. Ror. ſimpl. Gal. 3i.*(meliores ſunt *Zweiffertii*)℞. *Rhabarb. opt. pulveriſ. 3i.*Cum ſ. g. Defuſi vel Sympii *Ror.*

F. l. a. Pillule.

Quæ cùm inſticipies ſuiſſent mane uſurpata, vomitus turbatus ceſſavit: & hæc ratione etiam alius juvenis fuit curatus.

Dixi anec: Succum Acidum temperatum ſub forma Seri poſſe evacuari: unde etiam ad Purgantia referret Jalappa, quæ miſe Serum expurgat, hinc pro eius evacuatione poſſet præſcribi Pulvis Purgans ab amico quodam expertus:

℞. *Pulv. rad. Jalapp. 3i.**Reſin. Jaſam. gr. v. ad 3i.**Salis Tart. vel Tart. viridul. gr. li. ad v.**Linat. Mart. ſine acido præp. (ſi adit nimis acrimonia) gr. v. ad 3i.*

S E C T I O II

DE SITI LESÀ.

Sitim quod attinet: eſt appetitus humidus præternaturalis auctus, conſiſtens in vellacitate aut inſignioris moleſtæ ſenſu circa Fauces, h. e. Inexpañione Pharyngis, oriunda ab acrioribus Salibus ſaliſ, aut acrioribus alcalinis, membranis Faucium, Lingue, Palati, vicinarumque partium vellacantibus & pungentibus, concurrente ſubinde Salive non rite diſſemini dicta ſalis acris, nec abſtergenti, deſectu, Sitim ita exaſperante: Conf. SWALBE Tr. *Reſer. Moris. pag. 154*. Cupis Sitis moleſtia ſtimulat ad aſſumenda liquida aquæ, quæ ſimpliciora, eò meliora, cùm polulentur à Natura eorum ſiltem in ſinem, ut per vehiculum, tam ſolidorum alimentorum intra corpus diſtribuentur, quàm excrementorum extra corpus eliminandorum inſerviant.

Ubi liquidorum Appetitus, Sitis, Natura carſa ad ſalam aquam ferretur ex quo omnia Animalia, ſola Aqua pura & ſimplici ſunt contenta: fed non pro ſimplici nutritions, ſed pro vehiculo nutrimenti. Homines verò per artem nutrimentum ſimul cum vehiculo iſto conſurgunt, ut videmus in Cerevitiis, dum ſimplicia accipiunt, v. g. Hordei, grana incoguntur Aquæ, & ita mucilaginem Hædæ nutritivam eliciunt, & ſic pro potu Aquam nutritivam acquirunt.

Ladine Sitis ſeu Appetitus humidiorum, præternaturaliter imprimis, quando exarſe ſeu incenditur: raro enim morboſe deſicit Sitis, uſu in deſiccantibus, quando ſæpe in morbis acutis ſquallida lingua & aridiſſimis faucibus ſunt, & tamen non ſitiant, vel præter ſecus in faucibus totalem abolitionem, vel quid ſub deſitio Sitim non percipiunt, &

Tom. II.

M. L. Pulvis, S.

Pulvis Laxativus.

Vel

℞. *Extr. Aloë cum Aqua tartariſ. par.**Cerall. rub. præparat. an. 3i.**Gumm. Ammoniaci cum Aloë ſol. 3i.**Extr. Martis 3i.*

Trachi. Alband. 3i.

Cum ℞. *Morſch. l. N. n. 1301* pro doſi 10. vel 15.

Quæ ſuprà dial de Theriaca, etiam confirmantur à PONTANO in *Curat. & Reſponſ. pag. 74*, ubi reſert de Ancilla, inſuſtibiili Appetentia tribus menſibus detenta, una cum crebro vomitu; quæ ipſa cùm aſſumpſſet Vomitorum ea Autimonia, & ſole Vino poliſſimum recitralſet, aſſumpta 3i. Theriaces omniò fuit curata. Bolam Armoniam ſuperius recommendavi, quod confirmat FORESTUS l. 11. Oſ. 28. in *ſchola*, ubi reſert Murbum quendam, Falem Epidemicum appellatum, ea eo, quod iſta Fæne Epidemica correpti, fuerunt ſanati ſolo uſu Bolæ Armenæ: ita quidem, ut poſt eius uſum ſimul copioſiſſimi Vermiculi fuerint reſecti. Non minùs notatu digna eſt Oſervatio MEARKE, qui in *Hiſt. Med. pag. 159* reſert Bolam repentinum ſponte Naturæ, ſuccedente gravi Diarrhæa, curatum.

Culminum ergo quod attinet: cùm ſit defectus virium propter nimiam Famem, curatur optimè per Vinum generoſum; quod quæ generoſius eſt, eò magis ſatiſfacit ſcopo Medici. Omnes enim Auctores ab HIPPOCRATE ad hæc uſque ætatem commendat Vinum, idque generoſum, quod abundat ſulphure & ſpiribus volatilibus, quæ potentius poſſit temperare Acidum, imprimis Vinum Malvacicum, vel Hiſpanicum, vel Frontiaicum, aut loco Vini ſimplicis poſſet fieri Vinum Hippocraticum, idque generoſum & Cinnamomum ſimilique iuſu fuerant: Hoc ſanè Vinum multum conducit. Præterea mica Panis Vini introſa naribus applicata præ cæteris curat Bulimum: Item commendatur odor Vini: item Panis, iſipſique odor ſpeciatiſſimè commendatur ad Bulimum à LANGIO l. 2. *Epil. 28*. Vinum, licet alias naturaliter augeat Famem, in Bulimo tamen ratione Animi deſiderii remedium eſt: magis tamen convenit, ſi fruſtrum Panis Vini introſum comelatur: Nam cererem eſt, quod Vinum & Panis Bulini paroxyſmum citò coſceant.

Tandem Theriaca prodeſt: præcipuè hauſtus Vini generoſi, imprimis Hiſpanici vel generoſiſſimi, maxime valet, in quo Theriaca parum ſolentur: ſic et meliſſis convenit, quatenus ſenſibilitatem Oriſicū ſtomachi ſopit.

tunc itis etiam noſcentibus potus propinandus eſt. Rarità depravatur in morbis, idque ſine periculo, dum nempe ægrum conſuetum horrent, & alium ſimpliciorum iſonſuetum, aut etiam abſurdum, deſiderant, ut ſchizantibus evenit.

C A P U T I

De Siti Nimia.

Quod attinet Sitim Nimiam, autè omnia diſtinguendi ſunt eius gradus. Eſt enim vel moderata, vel immodica ſeu Clauſa; Ha v. g. ab Exercitio, Loquelæ diſtorta, cum ariditate Faucium: hæc in Febribus poſt aſſumpſa Purgantia, aſſumpta Venæa acris.

PARS AFFECTA.

Alius Satiſſum ſunt ſiltem Fauces, vel ſpeciatiſſime Pharynx ſeu expanſio *ſtophagi* in ſummitate ipſa *ſtophæ* ſuſſipſione eſt ſimul Oriſicū Ventrículo ſiniſtrum, ſeu vulgò dictus ſtomachus, ſeu coſtalis ſedes Panis & Steli. Iſta licet & breviter, ſi terdum uno haſtuſ, vel reposita ſaltem elida Fauſum elatione, eſt corrigibilis: & hinc repetitis etiam pluribus haſtibus via eſt extinguibilis. Dictæ partes vellacitæ à Sale acris & ſaliſ inducere poſſunt iſtiſmodi

F 2

Appe-

Appetitus liquidorum vel humorum, Sitis dictum. Videmus enim quod post usum Salutarum aut Piperatorum habemus magnam Sitem, ubi nihil aliud percipere possumus, nisi vellicamentum & molestiam insensum in Fauces & Pharynx, quod monstrat, Sitem esse in Fauces unde Sitis ab alumpna vel gargasione potest tolli, abluendo simi- rum Fauces.

C A U S A E.

Quod Causa: Causa proxima est Vellicatio quaedam & molestia singularis, Fauces affligens, partim positive, partim privative: *Positiva*, si reuera Sal aliq. volatile nimis acre & copiosum, Fauces aut Intra Fauces similitudinem rorem, pinguis & vellicans est; unde prout causa talis vellicans in vehiculo plus minus glutinosa fore viscido haeret, indeque facilius seu difficilius eluitur, magis vel minus consummas esse solet: *privativa*, quod insita Causa occasionalis se habet, secundum quam intenditur. Hinc coarctat simul Sitem, Fauces alio abluente & diluente, defectum, qui solus Sitem quoque inferre potest, v.g. post duntaxat Loquelam, Purgantium potentiorum usum. Sic qui noctu dormit ore aperto, evigilantes saltem. Ipsi autem Sal acre contrariam habet rationem cum Causa vellicante, quae in Fame peccat, five hoc Sal sit alcalio-salium de genere Bili, ut sit in Febrilibus, five sit purè salium, ut in Hydropicis & Scorbuticis, item in Catarrhis à Lympha lasa oriundis, obviat. Unde uti in Fame urgeat Acrimonia acida, ita Acrimonia lasa, vel simpliciter vel alciua, inquinat Salivam, unde continet Sitem. Hinc etiam est, quod effluentes utriusque potantur Sitem, & Sitis non attendat, Famem, Acidum enim in Fame obtundit Acre. Huiusmodi Sitis Lympham salivalem impregnata, Linguam, Fauces & Gulum vellicat, et ita Sitem producit.

Quod Causas remotas: Sane haec vel Externæ, vel Internæ: *Externæ* varia assumpta acrimonia, v. g. Armonia, Salita, Piperata, Purgantia, Arsenicum, Mercurius sublimatus: *Internæ*, quæ vellicant; sunt sepe triplices.

I. Est *Acrimonia alcalina* Bili plus minus oleosa, indeque plus minus amarulenta, & glutinosa, ubi Sitis magis esse solet: molestia: Si oleositas Bilia amaricans, Sitis solet esse ferè inextinguibilis: Nam hoc Sal volatile oleosum faciliè impugnat Lympham & Salivam, quæ salia reddit necessaria Sitis sit cum amaro ore. Sic enim Febrilibus continuo correpti in astu cum offerebuntur Bilia oleosi, de intentione Sitis utriusque inquit conqueri solent, caput magis vel minus intenti, prout in talibus organum Bili et Intestini in stomachum regurgitat, ac prout inaequale acris magis vel minus infertur stomachum, ac prout parcius Salivæ tunc solet esse proventus.

II. Causa remota est *Acrimonia lasa*, uti Lympha in genere, ita Lympha salivalis in specie, semper in Affectibus quibuscumque Catarrhalibus, Febrilibus Catarrhalibus, Cathecticis, Hydropicis, &c. in quibus ordinario admodum urge-re solet Sitis, ob Sitem maximam partem extravahtum, & Mulli sanguinis detractum; hinc defectu suo partim im-mediato, partim reliquæ Lymphæ reddendo salum, tale quid præstat; non secus ac in quibuscumque Scorbuticis, in quibus Lympha salivalis falio, ac simul plus minus glutinosa existens, sordes est contumacia huiusmodi Sitis, quæ nimis intensa sunt Salia.

III. Causa Sitis naturalis & pæternaturalis est *Saliva parca*, non sufficiens abluendo Ore & Fauces: hinc post Purgantia sequitur Sitis, quia exhausta est & subducta Lympha. Hinc qui diutius loquuntur, percipiunt Sitem, quia deficit Saliva ordinaria: hinc in Febrilibus, præter salia biliola a-eria, nimis urgens est Sitis propter defectum salivæ, quæ in Febricitantibus est familiatissima, adeo ut Lingua arida & non raro siccata deprehendatur. Facit hoc *Saliva viscida* & glutinosa, & plus minus acre salia, ut in Plethoricis, Medi-cinis, Tabidis, item Febricitantibus ac similibus, item ex mor-bis Convalescentibus. In salubris enim Saliva glutinosa, vi-scida & salso-acris, uti Famem non leviter imminuit, ita contra Sitem perniciem ex Faucium aspiditate, Lingue glutinositate, &c. solet inducere, cum per abstergendis Fauces minus apta sit.

Ad modum enarrans Salivæ vitia multum tribuit *Spiritus*

salis, vel materialiter cum simul alterantur, vel ad secretio-nem eius plus minus tribuuntur. Hinc illosam defectum vel abluem in imbecillioribus, delatigatis, &c. vel respiratorum, dum iniquitas eorum in corpore sit nocua, & ad quandam salubritatem specialius diriguntur, ut in magnis Doctores, Iracundiis, Paroxysmis febrilibus immisoribus, aut jam inchoantibus, Sitis ordinario in saliva parca, viscidior, & glutinosiore, indeque cum Faucium quidam lesio-ritate, affligere solet.

Præter dicta probè etiam notandum: quod in siti finalitè habenda ratio *Stomachi* & *Pulmonum*, quæ duo in provo-canda siti multum conferunt: Stomachus quò minus esse, & magis fluxus, eo intensior est Sitis: quò magis actus sanguinis in Pulmonibus, eo magis mitius Pulmo, id quod ex Vomica Pulmonum, item ex Empyemate, patet.

Hæc scilicet omnia in eo consistant, uti gravem mole-stiam & vellicamentum circa Fauces inferant, & ita situm admodum intensum reddant. Verum ad situm vel augenda vel imminuendam multum facit *Constitutio*; Hæsi-ta, qui aditus sunt magnis potationibus crebris solent sitire: Exempla hæc faciens elegans habet ALEXANDER DEODATUS in sua *Valeriana*, pag. 26. de Puella septenni admodum siculosa & liberos, idque propter Na-tricem siculicam, quæ siccior lactata, quæ per Constitutio-nem ita fuit, & ite in Insarum cum Lacte hoc rati-um transiit.

In genere *Differentia Sitis* observetur: quid semper qua-dam affligat cum ardore febrili, quidam sine eo; quod po-terius in Catarrhis, Scorbuticis, Hydropicis, &c. obve-nit, & probè hæc Differentia notanda in Cura.

S I G N A.

Signa Diagnosticæ urger sitis.

Quod *Prognosis* verbò nil per se Sitis in recessu habet, sed per accedens taliam, prout est intensio vel tota, ratione causæ morboz.

Sitis nimis & inordinata aliq. causa externam semper statim decedente denotat, adeoque morbum imminere porrendit.

Quæ à causis externis excitatur, potu assumpto faciliè sedatur, quæ vero à causis internis procedit, pro illarum diversitate variat.

Si urger sitiens, hoc est, in quo omnes causæ, circumstan-tiæ & indicia sitis, ut Lingua arida, Os glutinosum aut ex-ficcum, Alitus insignis corporis, in Febrilibus Ardentibus & Malignis, non congeritur de siti, malum signum est: quia apte ignit adeo Delirium, aut innuit deficientem sensum partium in Lingua, & omnium omnium facultatum corpus gubernantium prostrationem; adeoque imminet mor-tuem. Vid. HIPPOCRATES *lib. 4. aph. 48.*

Sitis in Febrilibus aliq. affectibus brevioribus, cum ho-rum solatio sponte evascat: in Hydropo vero aliq. Chronicis vix sedatur.

Sitis in Febrilibus Ardentibus parca, est admodum suspec-ta; Unde non adeo sit securus tunc Medicus (T).

Cum naturaliter cum Fame nulla sit sitis, & contra; adeoque, quando Acidum esuriam in stomacho domina-tur, deficit sitis; Si vero salivam aut acre contrarium, ut geat sitis: Ob id in siti plus minus clausa, illius nempe naturalis defectum semper concludatur: Sicut etiam sitis talis defectu, illius alicuius adhuc præsentiam, & plus minus dominium colligatur.

Quando ægris, dum bibant, potus deglutitur, cum loquar delabatur, quando sentit: Glæx, Glæx, pessimum signum est; innuit enim stomachi tonum plane resolutum.

C U R A.

In Cura ergo seu Methodo Medendi tres Indicationes dominantur.

1. Tollatur causa Fauces irritans, nempe *impetore Acrimonia lasa* Fauces vellicans.
2. Auguratur materia Sitis & Lympha salivalis per Aquam diluta.
3. Ne nimis ingurgietur Potus, & gravetur Venter, salivam Sitis, si sit nimis.

Quod

(T) Nisi ratione sitis difficilis remedium ager, Hippocrates enim 4. aph. 54. ait: Quibus plurimum siccæ tussis leviter irritantes in Febrilibus Ardentibus sunt, nec molem Sitis inferantur. Siccæ enim & Arter irritant visciditas sit à saliva sensu siccæ siccæ, adeoque sit corpus siccum alio ut Arterium Febris feriat, postea tamen ager beatitudinem ex infirmitate gaudere habet, non sitis. Hoc signum ergo frenare est poterit. Me licet à Febris malignæ, vel ægritudine Delirium hoc cum persequenda, cum per se sitis causa, Sitis sensu non asse.

Quæ ætinet hos scopos, & quidem Indicationem primam: hæc pro varietate varia, varia largitur remedia. Ea, quæcumque irritantior solent, partim sunt acida & magis aspera, partim temperata, quæ acrimoniam vellicantem aut ariditatem, plûs nimia oleosa, vel Silem, aut fallam, corrigunt & emendant. Acida nimirum sint ex Vegetabilibus acetosa & similia, item Pruna acida, Prunus Citri, Anarariorum, Granatorum acidorum, Rubi Idæi, Berberis, Ribes, Cydonia, Cerasa, & omnium horum Succus: item primi omnium, Tamarindi, qui in Febribus præter hoc, quod sitim compescunt, etiam æstum impediunt, & blandissimè alvum subducunt. Ea his Sacculi parati Syrupi eundem habent usum; utut non adeo potentes, propter admixtum Saccharum. Pertinent hæc Succi expressi et Semperivivi, & Portulacæ. In Semperivivo esse singularem vim contra æstum, probant Angli; item tam Acetum simplex, quam rosaceum, violaceum & Rubi Idæi: sic aquæ destillatæ Portulacæ, Laducæ, Nymphæ, imprimis aqua Prætorum, Tinduram Rosarum & Violarum præterea: Imprimis convolvit Tindura stercoris Bellidis, quæ est cyroga in Sili compescenda. Pertinet hæc Nipaisicum rubrum, Pulvis silicet acidus, ex Cremore Tartari, Spiritu Vitrioli & Tindura Sassafras confectus. Ex Mineralibus Phlegma Vitrioli acidulum, modo legitime destillatur, ut participet aliquid de sulphure Vitrioli, item Phlegma Sulphuris, Spiritus Mineralium acidi: tam simplices, quam compositi, Clysti disici, in specie Sulphuris Vitrioli, Vitrioli Philoposici, seu Spiritus Salis: in Febribus æstiosioribus Spiritus Vitrioli, cum Julebis, & potulentis assumpti, quorum gutturle pauce sitim melius accionant. Clysti in specie paratur ex Sulphuris Antimonii, & Vitrioli ana: destillantur per retortam, sic fœmina volatilis sulphurea prodit; qui optimus in Febribus urdentibus & Siti, de qua SCHROEDERUS in Pharmacologia Antimonii. Clysti talem commodè potui ordinario vel Julebis possunt infundari ad sistendam sitim, vel gutturle s. ita ad xxx. dentur per os.

Temperata sunt Subdulcia aut Sub-pinguia, Lac & Sero Lactis, Crem. Molles imprimis nitro volatili curigund, quod in Febribus imprimis Scorbuticis, æstum compescit, live solius propinetur, live solvatur in Sero Lactis Nitrum acrimoniatum, live aqua destillata Seri Lactis, modo legitime destillatur. Modus utendi est, ut accipiantur Seri Lactis mensura c. Hæc indatur potum Citrium in talesis lactis, sic enim acidum Citri ex Sero Lactis præcipitatur quicquid calidos aut butyrosi in eo continetur. Coletur ut hac clarum: ut superet per petu. Loco cibi etiam sumi potest. Loco Lactis naturalis humantificia seu Emulsiones, quæ sitim temperant, ex feminibus frigidis majoribus, ut Portulacæ, Laducæ, Papaveris albi; aut etiam Emulsio paratur ex Hordeis. Convoeunt item Pallule, Glycyrrhiza, imprimis cum Radice Chinæ aut Sassafras decocta, & propinata.

Ea, quæ per secula seculo horum & Lympham salivalem augent, sunt quæcumque Potentia Ventriculo grata majori dosi assumpta, quæ Vino, vel Cinnamon alteriusve aromatis gravioris tanillo, contemperata sint, itaut Julebi utriusque scopo satisfaciunt. Verum est, aquam simplicem appetere Naturam: sed in illa, præsertim frigida, aut nimis copiosa propinanda finis cauti: possunt enim exempla eorum non paucæ, qui ea nimio aquæ frigide potu sunt demortui. Tris recentest AMATUS LUSITANUS c. 3. Curat. 62. item SCHENKIUS lib. 1. Observ. exemplum habet, quendam ex subito aquæ frigide post pastum potu mortuum esse: similia exempla extinduntur à frigido Potu videbunt in MARCELLO DONATO in Hist. Med. Arab. lib. 1. c. d. Sin verb non imminuat mors, metus est, ne periculosa Afflata inducat, idque propter coagulationem Sanguinis in Pericardio, ab aqua frigida factam: Tale observavit GABELCHOVERUS in c. 1. Cur. 17 & 18. Aliæ naves prætereo. Ratissimum est, quod habet BARTHO-LINUS Cent. 1. ob. 19. de Multieribus Gronlandicis, per aquam frigidam potam à Variolis curatis: Sed, uti diu, raram hoc est, & potius ipsarum idiosyncrasiam tribuendum, quam imitandum. Raro ergo, aut nunquam aqua simplex usurpanda: potius convocantur hic appropriata, quæ sitim acrimoniam blanda aceditate temperant.

Tertia scopo ordinariæ satisfactione Gargarismata, elationes Faucium, Mucilagines Lingue & Fauces illitæ; quoniam Siti est Faucium affectus.

Ex his varis possunt fieri Formulæ, imprimis ea acetosa vulgari: nam acetosa Radix, Pulvis, & Semen Decocta, Liqueorem seu aquam tingunt colore rubeo instar Vini, &

recentis capessius succos Vinum rubellum colore & suavi acidulo sapore elegantissimè refert; unde ægri decipi possunt stilibus. PLATERUS describit tale Medicamentum: & Radicem & Folia Acerose coquit in aqua, in quo Decocto involvit postmodum Sympson aut succos appropriatos, hoc modo:

℞. Decocti Rad. & Fol. Acer. ℞i.

adde

Succ. Acer. rec. expr. ℞iij.

Syr. Ribium vel Berber.

Granat. an. ʒij. ad ʒj.

M. pro Julebo, s.

Julebus refrigerans contra Sitim.

Gratus est gustui, Sitim, in specie febrilem, simul compescit, & aquam apertam levat.

Usitatum alias est Decoctum Hordei simplex; hoc enim sulphureum est, unde egregiè temperat saliva siticulosa, ac

℞. Decocti Hordei simpli. ℞i.

Succ. Citri.

Cydon. an. ℞i. vel ʒiij. ad ʒij.

Tindura Flor. Bellid. vel Papav. errat.

Rosar. an. ʒi. vel ʒij.

Syr. acer. Citri vel Ribium ʒij.

Spiritus Vitriolatus talis q. l. pro grato acore,

M. D. S.

Julebus refrigerans contra Sitim.

In Febribus Malignis Decoctum Hordei cum C. aut Radice Scorzæuræ præscribitur; quia Decoctum Hordei simplex est nimis crudum & stansulentum, nec Syrupi semper necessarii sunt: loca ergo Decocti præscriba potest:

℞. Decocti Rad. Scorzæuræ.

Cichor. an. ℞i.

Succ. Rubi Idæi ʒij.

Citri.

Tindura Flor. Bellid.

Rosar. an. ʒj.

Syrup. Rub. Idæi.

Acet. Citri an. ʒi.

Spiritus Sulphuris q. l. pro grato sapore.

℞. Decocti Altrææ. vel Citri Myrs. ℞i.

Tindura Flor. Bellid. ʒij.

Syr. Rubi Idæi

Scabiosa an. ʒij.

M. pro Julebo.

Interdum Julebi instat Tinduram per infusionem extempore parandi præscribantur, qui sunt gratissimi. Modus est hic:

℞. Flor. Raf. rub. vel Bellid. ʒij.

Infundantur cum

Spiritu Sulphuris q. l.

Infundantur in

Decocti Hordei. ℞iij. ad ℞iij.

Stent in loco calido, donec suaviter rubescat liquor;

Colaturæ, imprimis si leniter abstergere animus est,

adde

Syr. Julebis.

Acet. Citri

Ribium an. ʒi.

(vel horum loco Syr. Rad. Idæi ʒij.

M. pro Julebo grato.

Vel

℞. Decocti Hordei. ℞iij.

Flor. Raf. rub. ʒij.

Succi Citri ʒij.

Stent in loco moderato, per aliquot horas: post blandam ebullitionem Colaturæ adde

Syr. Ribium ʒij.

M. f. Julebus.

Loco Decocti Hordei interdum non sine fructu præscribitur etiam Decoctum Tamarindorum; in specie quando alvus nimis clausa simul blandè laxanda est: cui accedat Tindura Rosarum, Violarum, & Bellidis, paratæ cum Phlegmate Vitrioli: Modus est talis:

℞. Pulv. Tamarind. vel Tamar. contus. ℞i.

Coq. in c. q. Aqua simpli. vel ʒiij.

Colaturæ ʒiij. adde

Tindura Flor. Bellid. cum Phlegm. Vitrioli pan.

ʒi. vel ʒij.

Violar.

Rosar. an. ʒj.

Syr. Ribium

Berber. an. ʒi.

M. D. S.

M. D. S.

Iulebus aperitivus contra Sitim.

Conveniens etiam est Decoctum Tamarindorum cum Passulis, egregie temperans ac simul alterans, praefertim illis in calibus, ubi aceditas Tamarindorum nonnulli suspensa videtur.

℞. Tamarind. ℞i.

Passul. min. coquass. ℞i.

Coq. in l. q. Aqua.

Colaturae ferventi infunde

Cort. Citri rec. ℞i.

Colaturae refrigeratae addo

Fistulae Rosae. ℞i.

M. pro Iulebo.

Sunt nonnullum subiecta, quae nequeant perferre Acidia: in tali casu optimum est Nitrum simpliciter depuratum secundum methodum TACHENII *App. Chym. in fac.* ad aliquot drachmas usque ad ℞i. vel ℞i. mensurae Potionis ordinariae, vel Decocti Hordei, vel Aquae appropriatae addidit: & ita assumptum egregie confert ad effervescentiam Massae linguae, & Sitim febrientium temperandam: vel, quod melius, Nitrum antimoniatum, sulphure Antimoni in preparatione Antimoni diaphoretici barum, cum haec habent vim contra malignitatem Pestis, hanc egregie temperat saliva, & sitim coarctet, quia etiam fomitem utris plus minus glutinosum ac viscidum resolvit & abstergit: convenit etiam Hydroticis, quoniam Urinam movet: Ex. grat.

℞. Decoct. n. caput ℞i.

Nitri prepar. ℞i. vel ℞i. usque ad ℞i.

& ℞i.

Mise. S.

Potio refrigerans contra Sitim.

Prescriptionis Formula, quae est grata, cum aliis Nitrum sit causandum, est haec:

℞. Decoct. Hordei ℞i.

Aqua Cinnamon. ℞i.

Nitri depurat. vel antimoniat. ℞i. ad ℞i.

M. S.

Potus contra Sitim.

Vel

℞. Aqua Aneth.

Sempervi. an. ℞i.

Rosae.

Succ. Sempervi. an. ℞i.

Nitri depur. ℞i.

Syr. Violae. ℞i.

M. F. Potio. S.

Potio refrigerans contra Sitim.

Si Acrimonia salis, ut in Hydroticis, Scorbuticis, & Phthisicis, Spiritus Salis & Nitri dulcis est optimus, quatenus est diureticus. Ratione Nitri Serum Lactis, Germ. *Melken*, egregium etiam est remedium ad sistendam Sitim, in specie Februm scorbuticarum. Certum enim est, quod non raris Scorbutici vehementer conqueantur de acrimonia Salivae salis, & hinc orionda Siti, quae non melius compesci potest, quam Sero Lactis, quod nitro volatili, sed oleoso temperato turgidum, alium simul apertam servat, saliva quae vis acris corrigit, ac per urinas capurgat. Modus utendi est hunc solitari, nunc cum Succo Citri acidulatum, & nempe Succo Citri vel Acrium diffusillam infillitur, vel cum toto aut dimidio *Pomo Citri in talenla incise*, Mens. j. Sori acidulatur: Sic enim omne crassamentum botryosum, & superfluum calcisum, fundum petit: postmodum colatur, & leniter exprimitur, & Serum acidulum clarum, gustu suave, contra Sitim sapienter. Aut quod melius est: Sero Lactis infunditur succus Cochlearum & Acetosae, agitantur simul, & per pannum colatur, & sit Serum Lactis acidulatum appropriatum contra scorbuticorum sitim. In Febris ardentibus Serum Lactis leniter acidulatum cum Sympulo aut succo quodam, aut cum Nitro antimoniatum, est elegans. Inter quae temperanda sunt sitim, praeter Serum Lactis, est impium ipsum quoque Lac: item Passulae, etque hic parata Decocta, quibus iuxta modo & radices Chinarum, item lignum Salsifrae, pro circumstantiarum ratione, addatur. Lac quidem, nisi Febris aliave circumstantia illius usum interdicit, utpote quod acrimonia quavis notabiliter temperat, praeparationibus, hincque excitata sitim, compellit. Emollientes etiam supra dixi convenerunt ad temperandam sitim, ab acrimonia salis oriundam, ex seminebus frigidis majoribus, item granis Hordei, Amygdalis dulcibus, & similibus. Emollientis huiusmodi crassae dabo formulam ad imitationem SYLVII:

℞. Hordei ad creparum. coll. ℞i.

(vel saltem, vel addita Amygdal. dulc. ℞i.)

Cum Decocto Hordei. L. Amalo ad ℞i. vel ℞i.

cui addo

Julebi Rosarum aut Syr. Violae. q. l. pro grato sapore.

Et erit Emollio satis conveniens S.

Emulso refrigerans contra Sitim.

Facient hoc etiam iuxta eundem SYLVIIUM Julecula carnum gelatinosa, cum aqua multa parata magisque nitida.

Quod si in Scorbuticorum, Hemicorum aut Phthisicorum Siti, Temperans contra acrimoniam salis attendenda sit, praeter Serum lactis convenit Decoctum Radicis Chinarum cum radice Liquiritiae: de qua videb. TIMAEUM a *Guldenklee* l. 3. *℞i.* 29. p. 637. ad cuius imitationem praescribi potest ista:

℞. Rad. Chinae in talenla. incise. ℞i. vel ℞i.

Liquiritiae ℞i. ℞i. ad ℞i.

Rosae. Ligni Salsifrae. ℞i.

Succ. rubri ℞i. vel ℞i.

Infusa & confusa infund. i.

Aqua comm. ℞i. vel vii.

Stent in Balneo Mariae per noctem: mane addo

Passul. min. coquass. ℞i. ad ℞i.

Coque igne lento, vale bene cooperato ad Siv.

De quo aeger quocumque subinde pro lubitu capiat bonum haustum in Scorbuto, Phthisi, Lac Venerea, & similibus; mane calide, & a meridie frigide.

D. S.

Potus contra Sitim.

Quod si hie quidam acidum aut Citri aut Acetosum addere velit, pro me erit concessum.

Mentio facta est Radicis Liquiritiae: haec cum Semine Femicali decocta temperat Sitim, quando oritur praecipue ab acrimonia salis, qualis affligit Phthisicos, Hemicos, Emphysematicos & Catarrhicos: in quibus calibus non adeo conveniant Acida, aut haec saltem parcissime; Sed potius propinanda sunt Temperata lactis ex Glycyrrhiza, Passulis, & similibus: praescribuntur vel sola, vel cum Hordeo, aut aliis. Exemplum sit tale:

℞. Hordei crudi. M. j.

Passul. min. coquass. ℞i. vel ℞i.

Semine. Anisi.

Fenniculi an. ℞i. vel ℞i.

Rad. Liquiritiae. raf. & incise. ℞i. vel ℞i.

Coqui in Mens. j. Aqua fusa ad consumptionem tertie vel quartae partis, circa finem addendo

Cinnamon. q. ℞i. ad ℞i.

De Colatura bibat aeger, quantum lubet.

Hoc aliquando in imminente Tabo Scorbutico, cum Siti laesa, Saliva glutinosa, & Appetitu dejecto, salubriter praescripi. Vel

℞. Hordei mund. M. j.

Passul. min. ℞i.

Gram. Tartari ℞i.

Cum l. q. Aqua simpliciter coqui invicem ad

creparum Hordei.

Colatur. D. S.

Potus alterans & laxans.

Sed de his aliisque Salivae vitii corrigendis conf. SYLVIIUS l. 3. *Prax. cap. 52. & 53.* Ex omnibus, quae Salivam, viscidam ac glutinosam attenuant, & resolvunt, imprimis excelsit Sal Ammoniacum, ioternè subinde usurpatum.

Denique in leviori malo praefallenda Siti conveniunt Gargarismata quaecumque, quae Obsterunt, & Fauces eluunt, ac simili ratione licet non tollant, saltem minus torquere faciunt: Convenit itaque imprimis Aqua communis, in qua Nitrum depuratum vel antimoniatum dissolutum: item Cerevisia secundaria calide gargarizata, ac diversae Oris collationes, quae alias in Febris continuis praescribuntur; praefertim quando Linguae est arida, scabra, plus minus nigricans. In talibus calibus Succus Sempervi majoris: item Macilagine Linguae & Fauces squalida & arida illinenda, ex Semine Phylli, Cydoniorum, Malvae cum Aqua rosacea, & Sempervi majoris, aut cum Phlegmate Vitioli extractae: & harum Macilagineum Succ. solet convenienter addi ana vel dimidium Succ. Sempervi expressi, aut Cydoniorum, & immisceri tantillum Nitri depurati bene, vel Salis Ammoniaci v. g.

℞. Aqua Sempervi maj. ℞i.

Succi spissum ℞i.

Macil.Sem. Cydon. cum Aqua Spermatis. Rosarum extr. ℞i.

Sili

S E C T I O III.

DE ALIMENTORUM MASTICATIONE LAESA.

Solida Alimenta assumpta, antequam Stomacho transfuerint, prius in ore ad meliorem sui transformationem per Masticationem preparantur, beneficio comminationis & divisionis à Dentibus, imprimis maxillaribus, & beneficio eorum quae Saliva permixtis & subactis. De Dentibus vide MORSI PARS PRIMA.

Sunt autem officii sui generis, & primario in Genulis Temporalibus moventur. Saliva est Lymphæ sui generis in Glandulis coagmentata Maxillaribus, & Stomatice copiosa, tam Palatiis, quam Sublingualibus & sanguine arteriarum emulsa, & in os propria ductibus effusa, confusa primario copiosa parte aqua, quæ subtili & occulto acido volatili est imprægnata, unde attenuatam, ipsamque fermentativam obtinet vim: propter quæ fies etiam Alimenti sub Masticatione permiscetur, ut huius medio ad meliorem Fermentationem permiscetur, & faciliorem Fermenti stomachici ingressum præparetur; cum Saliva hæc cum Fermento dicto magnam analogiam & convenientiam, adeoque homogeneitatem quandammodo habere videatur. Originem ex Glandulis Salivariis: videbitis in STENONIS Observat. anatomice de vasis Oris, & canalem, & vasis item WARTHONIO in Adenographia 4. 22. Evidens vero Usus vid. in DEUSINGII Exercitationibus de Nutritum animal. elaboratis pag. 3. & item in Appendice huius Exercitationis p. 303.

Pars huius Salivæ imprægnata: massam Farinæ fermentat. de Saliva off. vide anatomice.

Præter quem Usum primarium Salivæ, dum nempe parte aquosa Alimenta retinebunt, salina acidula eadem incidendo & penetrando, adeoque lassar Fermenti, farinaceæ massæ additi, Fermentationem in Stomacho faciliat, & succubatio etiam cōfert Salivæ:

1. Fermentum stomachale ea parte resistendum.
2. Facies & gulam pro faciliiori deglutatione lubricando.
3. Liqueum, & Os pro promptiori illius motione & loquelia humectando.
4. Stimul aliam perpetuo molefam resistendo.

Tanta autem Ciborum preparatio in Ore est necessitas, ut horum comminationem non sufficientem quamplurima Animalia ruminando reficiant: fecit Salivam deglutientia, pluraque Ciborum in Fermentum mutantia, deficientem permixtionem Aves in Inguine absolvent: vid. SEVERINUS de Libella Hippocratis pag. 303. Observant enim Homines ruminantes, quarum Ventruculi musculari: vid. BARTHOLINUS in Crura 3. Historia 16. item RHODIUS in Crura 2. Historia 59. item HORSTIUS lib. 4. Observ. 9. & 109. Anatomice Inguine videtis in BARTHOLINO Crura 4. Epist. p. 135. & 142.

Alimentorum Assumptum & Masticationem laesam quod attinet, accuratè & succubè secundum Theoriam pro more complexus est SYLVIVS lib. 1. cap. 4. Præ De Saliva ferrentis & motu violento h. a. cap. 51. & 52. Primaria, quæ hic occurrunt, vitia sunt, quando aut immixtura aut deficiat pila masticata, vel quando depræparatur Masticatio. Immixtura aut deficiente Masticatione primaria vitia sunt, vel Musculorum convulsio (ad quos etiam musculi coteris, Linguae convulsio, pertinet; de cuius tamen malis infra, ubi de Causis vitii;) unde Spasmus Cynicus & Tortura Oris: vel Maxillarum, & cum his Dentium Morbularum.

C A P U T I.

De Musculorum Masticationi inferientium Vitii, in specie

De Spasmo cynico & tortura Oris.

Quod Musculos moventes, primario Musculi Temporalis & hinc Musculi Genas & Labii communes, sui

considerationem merentur, cum in finem à Natura Magistra fabricati, ut præter aratum decentem, moventes Maxilla inferiori, & ad superiorem conveleantur, idque valde, addecentè interserviant.

Vitiatur horum Musculorum motus, quando vel Spasmo laborant, adeoque convulsæ, seu peritricæ eorum fibræ contrahæ & rigide perficiunt, adeoque inferior Maxilla superiori confluente adducta perficitur: vel quando idem Paralyti laborant, & fibræ eorum relaxatæ & flaccide inferiorem Maxillam pondere proprio deorsum labi permittunt, absque redditione ad superiorem. Convulsio aut Paralysis Temporalis Musculi rara est, quin eam Convulsionibus universalibus epilepticis & Reluctationibus universalibus a popliteis concurrat, quibus curatis universaliter, & particulariter alicuius cellas; non interdum speciale Musculi vulnerati, vel alio modo afflicti, subitè vitium particularibus remediis ceteris, pro causam varietate, & cum aliis similibus partium similibus afflictiis convenientia vel analogia, curandum.

Genas & Labii interservientium Musculorum simultanea Convulsio aut Paralysis pariter nonnullis aliis gravioribus huius generis aliarum partium interarum afflictiis supervenit: & tunc speciatim utriusque Faciei partis Convulsio, & Oris hinc inde utriusque ductio, tamquam in ridiculum, vel potius Cynismus ringentibus, Spasmi Cynicus (2) dicitur. Sin vero alterutra faciem Faciei Musculorum pars vel convellatur, vel Paralyti afficiatur, & exinde rella Oris figura in alteram partem disloquetur, in Convulsione quidem pars sana ad signum convulsam, in Paralyti pars ægra reducta ad sanam, Oris Tortura speciatim dicitur: in qua modo dicta Oris ad alterum latus disforse, Oculum alter rixè claudi nequit, nec æger debere exfoliare, quæ nō exspuere possit, ex altero autem Oris laepe id præstare potest. Quod si æger habeatur ridere, velisteriam Opprobriare, facili apparet, alteram Faciem partem liberè movere non posse. Quod si pars Faciei dura sit cum scissibili pila masticata, & hæc aliam rellè se habentem ad id trahat, à Convulsione illius lateris malum esse, palam fit. Sin vero pars afflicta mollis, laza & enis sentiat (& est Oculi inferior Palpebra ferè decidit) ad sanam partem trahatur, à Paralyti malum esse ostenditur.

C A U S A E.

Causæ equidem, tam externæ quam internæ, huiusmodi Convulsionem & Paralytum suo tempore, ubi de his in genere tractabimus, evolventur. In specie nunc in radice scilicet principio Nervorum, ad Faciem alteram partem derivatam, hinc malum; quinque dimidium Faciei totius, quin etiam alia illius lateris partes, plures vel pauciores, simul afficiuntur. Sin vero specialiter vel in Musculo uno alterove Faciei, Sin vel in Nervi cuiusdam fasciculo speciali, ad hoc derivato, malum hæreat, illa saltem Faciei pars, quam ille Musculus regit, occupata apparet: sic verbi gratia, Torturam Oris à Paralyti tali particulari parat EPIPHANIUS FERDINANDUS in Hist. med. 12. nam, ex simpliciter repetita applicatione Aceti accerimus, qui fuerat immaceratum Litharium, ad foveas in Variolis delendæ non secus ac HENRICIUS ad HEER in Observat. 17. notat, quendam ex Ebrietate sopitum & tota nocte nive verberatum, Tortura Oris maxima exinde laborantem, dextra genæ fenestras vicinior omnino resoluta. Torturam vero Oris est Spasme natam observavit PLATERUS lib. 1. Observat. 138. & 139.

P R O G N O S I S.

Quoad Prognosis. Tortura Oris, si per se emiserit, malum est difficile, aut tamen curabile: si vero acotis morbis superveniat, eoque ex Spasmo, periculossima, quo etiam pertinet Aphorismus HIPPOCRATIS ap. Sect. 4. in febra non intercurrente, si Labium aut supercilia, aut oculus, aut natus per-

(2) Symptomi, Convulsio, d. enis traho, vello: caninus, d. alicui, canis, & unde Spasmi Cynici, Convulsio canina, qua tempe facies ad canini rictus immittem disloquetur.

procuratur, imbecillitas jam corpore, in propius jam mors est. In specie superveniens Spasmo vel Paralyti reliqua corporis, Apoplexiam, vel Epilepsiam universalem, inde mortem portendit: Conf. lib. 2. Prægnat. T. 1. & FONTANUS in *Methodo digerendi morbi* cap. 2. pag. 1. & 10.

C U R A.

Cura præmissi universalis, i. e. primas vias laxantibus, aut ulteriori efficacia fortius Purgantibus, & Sudoriferis ex Aromaticis & Volatilibus, quin & interdum Decocto Sudorifero ex Lignis, per aliquot dies continuato, sequens ex Paralyti fuerit malum, utpote frequentius, postea Vescicatoria Nucha vel ad Anrem affectum applicentur, ubi etiam Cucurbitæ scarificatæ admoveji possunt. Hinc Callorem, tam internæ quam externæ usurpatum, est optimum: Extractum ejus in Ore decinetur: Essentia Callores cephalicus loco affecto crebrius illinatur, præsertim cum Tinctura Asæ dulcis sive Benzoidis commista, quam commendat TIMÆUS in *Goldenklein in Cassius* pag. 73. Quin & Essentia Rosæmarini, Sæviæ, &c. similiter admoveji possunt. Nucha item & Venterum colli Aqua Vitæ (i. e. Spiritu Vini) rectificata foveri & illiniri Oleo destillato Chamomillæ, Succij & Terebinthinae debet, In Ore decinetur Masticatoria: v. g. Rotulæ Plateri.

℞. Nuc. Mæcher. 3ij.

Rad. Pyrethri,

Angel.

Sem. Staphisagr. vel Sem. Coriandæ,

Sicapiæ. ʒi.

Angel. (vel Camini.)

Callos. an. ʒss.

Piper. ʒss.

Mastic. ʒij.

Cera q. l.

M. F. Rotulæ.

Aut Callorem in Spiritu Vini dissolutum, aut fiat Garuntatio, vel diuturna in Ore retentio Decocti Radicis Pyrethri cum Semine Erucæ.

Et Spasmo si fuerit malum, Universalia ista similiter locum habent, uti & Sudorifera, & hinc quilibet ea & cum Callores parata remedia. Speciatim observanda & frustatè imitanda Cura PLATERI l. 2. per Narcoticis aromaticis, mediante Sudore & Somno, hujusmodi affectum curantibus, ver. gr. Mithridatium, Symplicium Papaveris, Opiatæ & similitur. Euphorion optimum ex Semine Geminis, *Hon-Saamen*, Inflat Fetus usurpatum. Plura de hoc affectu videbitis in SENNERTO l. 2. Præf. par. 1. cap. 1. item in TIMÆO in *Goldenklein in Cass.* p. 73. M. A. N. G. Ann. 3. Observat. 332.

CAPUT II.

De Maxillarum Vitiis.

Maxillæ & his mediantibus Dentium Molarium vitio læditur Masticatio, quando *Maxillæ immobiles* vel in tantum, vel in totum fuerint: Idque vel ob Luxationem, in qua Os nimis hiat, à quavis violentia externa factam, interdum ex Ossificatione vehementiori adeoque nimio Oris hiatus indolentia, facili tunc per instillatam alapam, vel per percussione, sub mezo, tunc curabilem: vel ob *Tumorem*, aut Faciæ tum in Tonsillis inflammatis, aliæ ratione nimis tumebundis, in quibus vis Os aperiri potest; aut Parodontum, liberum in sua cavitate Maxillæ processibus motum impediendum: vel quando nutritionis privatio error, aut universalis ex massa sanguinis quasi decubitus ratione, lentæ *caries* huiusmodi huiusmodi illam Maxillæ cum Offibus Temporum repleret, adeoque motum liberum illius impederet, ut in Scorbuto interdum contingere affirmat SENNERTUS. Que tamen omnia mala faciliè patent, eorumque ex aliorum similium graviorum curatione medicatio manifesta est. Conferatur quoad Maxillarum hos & similes affectus, SENNERTUS l. 2. c. 17. His ferè modis immittitur aut deficit Maxillæ motus, ad Assumptionem & Masticationem requisitus.

Tom. II.

ARTICULUS UNICUS

De Dentium Stridore.

Deprecatur motus Maxillarum, quando erumitè movetur Maxilla, unde lenis ex Dentium crebrimine enliffime natus supervenit in affectu, ubi id Stridor Dentium dicitur. Oritur præcipue à Spasmo reciproco Musculorum in Genis, abductioni & adductioni motus opera interventum, qui aliqui convulsivo motu affecti Stridorem talem inferunt.

CAUSÆ.

Specialiores huius Causæ sunt vel Frigus externum, vel Vermes seu Lumbrici Intestinelorum, ex qua causa Stridor Dentium mediarum Infantibus familiaris existit. Sicut & ex causis aliis, Convulsionibus communibus, oriri potest. Speciatim etiam per consensum fieri solet, in Febrium nempe Rigoribus, in quibus non raro est Stridor Dentium, ob consensum cum partibus circa præcordia membranosis.

PROGNOSIS.

Sine manifesta causa superveniens adulto Dentium Stridor, malum portendit, aut Apoplexiam aut Epilepsiam imminet.

In Febrium Dentibus stridere malum, præsertim si deliranti id accidat.

C U R A.

In Cura causis sublati, & ipse affectus morbosus cessat optimum tamen remedium est Balsam Peruvianus, extrinsecus usurpatum.

CAPUT III.

De Dentium Vitiis.

Dentium vitio Masticatio læditur, quando vel deficient, vel, præsertim licet, vacillat, aut carie & sapore affecti, aut dolore affligi fuerint.

ARTICULUS I.

De Dentium Defectu.

CAUSÆ.

Deficient Dentes vel proprio, vel alieno, Gingivarum nempe vitio, *infra*, ubi de Dentium vacillatione, præmissis explicando. Proprio vitio, dum evelluntur, aut excutuntur, à quavis causa externa, vel ita alterantur, ut tantum minus viventes non amplius cum Gingiva viva coherere queant, sed sponte sua decident. Uti enim mortificationem, v. g. cariesum Os, cum vicinis partibus, vita communi & propria per ratione spiritus infusi & infusi gaudens, uniri nequit, sed necesse est, ut excidatur & separetur, quo cum vivo Osse partes subjacentes moles, viventes, consolidatione debita, nutrimento mediante, uniri deus queant; ita Deus minus vitalis non jungitur amplius Gingivæ, seu ab hac separatus excidit: idque (1.) si mortuus fuerit proprie ætatis, adeoque senil sui ratione: de qua vid. HELMONTIUS *Alimenta Tartari Infensia* §. 25. (A) (1.) Si ab externis nimis ledatur & vicietur, ut sunt nimis frigida, copiosius assumpta, Dentibus inimicissima, & quæ senium eorum accelerant, item nimis Acida, Dentes & Gingivæ quasi ambugendo æstantia; item nimis Calida, eoque vel crebrius assumpta, vel Dentibus admodum, à quibus successebatur ita penetrantur & arroduntur Dentes, ut frustulatum tandem excidant. Quo facti perverfa plurimum confusio, dolores Dentium vel Aceto simplici, vel per coditionem medi-

G

causa

(A) Senie communem præmatura efficiuntur Dentes, non tam longa ætate variæ, quàm quod clausi sint. Clausi autem ap-
pellantur Dentes, quorum formatio in radicibus Nervos suscipientia, omnino obliteratur, unde sensus privatus. Vide quæ de Den-
tibus narramus tom. 2. col. 148. lit. I.

carum curantur, à quibus suspensus non solum omnino Dentis, & insensibilis, sed sunt subtiliores villorum juncimae fibrillae; sed de ipsi Dentis simul mortificatur & corrumpitur. Per ratio est Opusculum saporis usitatorum. (3.) Nihil viscidum & glutinosum Dentibus inimica fuit, ut fuit omnia Dulcia, Saccharum, Ficus, uti & Caeus: Haec ipsa etiam, ut promptè de tenuiori Dentibus adhaerendo, transpirationem eorumdem propter necessariam nutritionem impediant, ita & successivè aciem attrahunt, qui continuè ipsi adhaesione, successivè eisdem alterat: hinc & Lac & quilibet Lacticia, ad hanc rationem inimica Dentibus observantur, eoquæ ad ipsi corruptionem seu cariem, & successivè deficientiam disponunt. Haec ipsa Gingivas simul ipsi minus alterando, & laxiores ac flaccidiores reddendo, indeque outrimentum, per Dente per Gingivas transmittendum, corrumendo, ipsos Dentis insigniter ledere valent, (4.) Carie denique ipsi minus exili Dentis à Lapide dentali seu Lithodonto obfessi, sui sordibus variis inquinati, nigrique ac foetidi reddit, minus firmiter cohercet, sed successivè decidunt: Quæ postea vitia nonnisi ex vitata Dentium outritione privata, undeque primitus orta, originem ducunt. In quem finem notò, nutriti Dentem non solum per propria sua vascula, azyriodas & venulas, circa sui radicem implantatas, sed laterales etiam ex adherentibus ipsi Gingivis; unde & tam firmus eorum, quoque ipsi sunt, est nexus, ut Dens cum osseum coneretur, ex se lodoles, quoque Gingivis investitur, acutissimi tamen se sentio, adeo mutue vitæ & nutritionis Dentis fuit participes. Ac sane particularis, ac præ aliis partibus propria Dentibus est nutriendi & augmentandi ratio, adeo ut, cum contraria attritione necessario impugnantur, nisi nova eaque continua augmentatione reparentur, brevi penitus absumerentur. Quod ulterius ex eo patet, quod uno eavallo vel ephalo, vicio utrinque se dilatare magis soleant, & ex opposito ipsi respondens, oblongari nonnihil, & in prioris spatium aliquantulum subtilitate observetur.

DIAGNOSIS.

Dentium defectus per se, partim *intra vitam*, partim ex relatione, patet.

Causarum verò diversitas dignoscitur vel ab antecedente violentia externa, vel diuturna Mercurii traditione, vel ab hoc producta Salivatione, vel à Scorbuto; utpote quibus prægressis, vel presentibus, de causis certi erimus.

PROGNOSIS.

Dentium defectus si fuerit à causa externa, de vicinis nihil merendum, modo adhuc sint firmiores. Si vero oriatur à causa interna, v. g. Scorbuto cæ, reliqui facile sequuntur, & successivè elabuntur.

CURA.

Quod Curam: Dentis exidentes aut deficientes reparet, solius Naturæ est, quæ in Junioribus, per recentem Dentium subascentiam priores alveoli suis extrudit, & defectum ita restituit. Quoad itaque Dentium novorum primordia & quasi semina intra Gingivas restituit recondita; novi Dentis post priorem defectum renasci facile possunt: id quod non tantum Genuini (B) seu Sapientia dicti Dentis comprobant, sed quod etiam interdum in scelestos Dentis renati observari fuerint. Atque quod reliquum est huius defectus illos Naturæ nonnihil suppleret potest, artificiales Dentis ex Ebore, vel deute Hippopotami fabricatos, cinisiorum lacum substituendo, pro loquace saltem gratia, non autem pro meliori Masticationis beneficio. Equidem exempla quorundam præstant Dentium sanorum, ex Homine recentè revulsi, in propriis vel alienis alveolis de novo insertorum, firmiter capta Gingiva coacturum, tanquam si nunquam Dens defuisset, ita ut etiam Masticatio laetis hoc modo perfici potuerit: sed quædam adeo incerta res nonnumquam confirmata est, eam in medio relinquo. v. *Observationes* SCHENKII pag. 202. ex PAR. E. O. L. 2. cap. de Dentibus, item RIVIERUS in *Observ. Medicin. p. 357.* vel 63. & BORELLUS L. 1. *Observat.* 10. pag. 18.

Quod si Dentis elabuntur aut ab incauta Mercurii traditione, aut Salivatione, conveniunt Medicamenta Salaria,

aut ipsa Folia Auri degletia, &c. Ubi autem malum fuerit à Scorbuto, acrimonia Sæpi scorbatica temperanda, quod infra sua loca parabit.

ARTICULUS II.

De Dentium Carie, Fattore, & Venemibus.

Cariem Dentis quod attinet; est hæc atrox Dentis, nunc major nunc minor, quæ insensibiliter substantia ejus absumitur, & nunc successivè evascat, nunc altero latere precedentem consumitur, donec successivè magis corollis frustulatum excidat, lachot malum ut plurimum in parvo purulo extrinsecus, quod nigrescit premixis, hoc foraminum aperitur, sicque ad interiora ejus penetrat, quæ quæ coniora ac molliora, indeque facillius dissolubilia: ed promissu absumuntur, & Dentem cavum reddunt. Coniungatur tunc, ad interiora sui penetraverit corrosio, dolor, quæ major nunc minor, prout radicem Dentis ægrivum diversimodè simul atroferit. Ex corrosio ita Dente nata facies, ubi per Dentis foraminulum relicum, seu per fissulam, liberum spatium effluendi laud oasæ fuerit, id interiora magis, ac radicem Dentis unam alteramve, spaciolum in Maxillaribus, vitaverit, acrimonia sui nunc Gingivam, nunc ipsam Maxillam artodit, & præsertim per illa hujus foraminum, per quæ vas ex Dentis subeat, sensim extrâ affluit, & Tubercula nunc in Gingivis, nunc sub Maxillis, excitat, quæ tandem cæsa saniorum acry liquamen fundunt. Et licet eratur talo Tuberculum & excrescat Ulcusculum, subinde tamen quoties ex carioso Dente nutritio vitata novo sanies generatur, recidit, & interdum in Filulam vel Gingivæ, vel Maxillæ degenerat, adeo ut talia curati nequeant, nisi Dens laesus evulsus fuerit.

Fæorem etiam subinde Dentes cariosi inferunt, balisum prius incipientem, præsertim si major fuerit eorum excavatio, ut alimenta cariosa repleta in eadem putredinem attrahere queant.

Imò ex nutritio Dentis carioli proprii corruptione, aut alimentorum masticationem in illis remanentem putredine, formam in eorum cavitatibus generatur, gravissimorum dolorum, aliorumque malorum auctores.

CAUSÆ.

Causa Cariei est hæc Dentis quacunq; occasione nutritio, sive Gingivarum vitiorum, & à contiguo Dente abscidentium, indeque ejus lateralem outrimentum impediendum, (unde Scorbuto Gingivæ vicio omnium frequentissimè Cariem parantur,) evenit culpa, sive ipse Dens sui nutrimenti assimilatione, aut huius successiva transpiratione frustetur, ex illius corruptela, & in Acidum corollum degeneracione. Cariem precedentem contrahat. Acidum itaque ex outrimento Dentis degenerat, Dentem corollum Cariem inducit.

Causa remota rationem habent tam omnia Dentis alterantia supra allegata, quam infra circa Gingivas, quoad Dentium vacillationem, alleganda.

PROGNOSIS.

Caries Dentium maturè curanda, alias sæpius recurrentes Odontalgias, Tubercula & parvos Abscessus Gingivarum aut sub Maxillis, interdum etiam Filulas, circa dicta loca inferre potest.

CURA.

Quod Curam cariosorum Dentium, præsentissimum equidem remedium est Dentis carioli *Evulsio*, interdum etiam necellarium, si longius procederit Caries; cum facillè aliâ contiguis Dens contiguo carioso infici, & hinc idem malum contrahere possit: Ut taceam confirmatam Cariem, alla ratione, quam Evulsione, curari non posse. Quamdiù vero vel nondum ed usque procederit malum, vel propere pericula, sub Dentium evulsione interdum observata, hæc nimis meretur. Remediis res tentanda est, Cariei scilicet progressum ulteriolem inhibendo.

Evulsio appropriat. peragitur instrumento, ac succedente

(B) Genuini Dentis, qui à *Litham*, quasi serò nati dicuntur. Quod *apertum* & *subascentem*, h. e. Dentis perfectio- nis & sapientie, à *visita*, perficit, & *subascentem* sana mente sum prædictis. *Haec enim ante subascentem*, quæ hinc incipit *scire*, videlicet *aperturam* ab ætate 18. ad 26.

quod melius, quod minus firmiter Dens hæret, & quod magis idem vacillaverit. Quod autem disponatur ad faciliorem magis, & minus dolentem Evulsionem, remedia quedam à nonnullis adhiberi solent; v. g. Tithymali succus Denti indatus, aut si ea eo & oleo Amomolico formentur globuli, aut cum Farina triticea pasta, & cavietur Denti indatur.

Præter Tithymali lac alba ex simili Lacteorum genere pari virtute pollent: ut Lac fuscum Farinæ admixtum, vel ex lacte Tithymali cum Farina triticea subacta hæc pasta, quæ frisa in pinguedine Ranae incidit Dentes sine dolore cadere, vel Farina filiginis micatur cum lacte Caryophylli infuso pulvis, indatur Denti cavo, siquæ aliquando permittitur, brevi sic cadere affirmant. Succus pariter Chelidonium majoris, cavis Dentibus indatus, eos frangit & ejicit. PETRUS ASSELINUS certum prodidit, quod si Cicada, miste inter segetes cantando se oblectans, contusâ impingat Denti corrupto, tunc integrum illum eximi possit: vid. VELSCHIUS *Medicinis*. Cent. 2. Observ. 82. *anma*. Anno 4. M. A. N. G. Pinguedinem item Ranarum viscidum, Dentibus affricata, aut liden indita, Dentium casum promoveat: semper coquantur Ranae in olla virescenti sulfura Aque communis, & pinguedo quando innabit, quæ Denti Evulsionem promovet. Vel

℞. Gum. Ammoniac.

Cam. Myrsinæ.

Succ. cypræ. aa. ʒiſs.

Mixta addatur.

Pinguedo Ranae viridis, & Corp purum,
F. Unguentum Denti extrahendo applicandum vel indendum. D. S.

Unguentum singulare pro Dentibus.

De Utrina & Dente canis, huc usque problemis, vid. SENNERTUS l. 2. *Præc. §. 1. c. 10. p. 27.* Cariei verò ulterior progressus pro Artem & Medicamentis inhibere, efficacissimè imprimis per *massam* Dentis cariosi in loco carioso cum Cantheria aduali, five ex Ferro vivo, ob subtilitatem commodiorem ex Argento vel Auro factâ, quo lacto, Auro foliato Dens cavo repletur; præferatur enim hæc majori parturine & corruptione. Vel ex Cera, cum Myrrha probè subacta, vel potius Cera viridi propter admixtam Æruginem, impleatur Denti carioso excavato, ipsâ Myrrha Denti indita egregia est in hoc casu. Conf. hic RIVERTUS in *Observ. Communicat.* p. 212. & 663. ubi refertur, quod Dentes Terebinthinis implantur, & Cantheria aduali Dens inauratur in Carie. Loco à Qualia Cantheriâ, ubi modicum visum fuerit, potentiale adhibetur. Sic Aquis Fortis Denti carioso admodum, vel spiritus filia gart. i. vel ij. bombaci inditæ, sc. Denti adhibite, mirè corroboracionem juvare, & Cariem præferre dicuntur, item Zingiber in Osmelice codum & in cavernam Denti immisum, præferat corruptionem. Coralliorum pulvis Denti cavo indatus, vel Os Ispie, item Camphora Cariei ulteriori progressum inhibet: vel ex pulvere Coralliorum aliorum, cum Melle rosæ Limonem crassius redactum, Dentibus illitum, Canem inhibet. Vel

℞. Croll. rub. prop.

Os. sup. pulv.

Corn. Cor. nli prop. aa. ʒiſs.

Myrrh. el. ʒiſs.

Camph. gr. v. vel vi.

Cum l. q. *Mucil. Tragacanth. f. Filula*, Dentibus cariosis excavatis indendæ. S.

Pilule singulares pro Dentibus.

Tartarus Dentium ablata Caries sponte curat. Sin minus, Gallis Moschata cum Cypero & Maltice mulla, Denti cavo indatur. Tollitur & Fæcor Dentium, si abluatur Aqua, in qua sal ammoniacum dissolutum, post prandium & cernam.

Vermes ex Dentibus elicere subinde necesse est. Præstat hoc optimè subina in Vino decocto, & in ore retentis, quæ copiosè Vermes elicit. Mucum seu reliquia Chyli interioris tunice Ventriculi fuilli, seu Pyloro adherentes, calentes adhuc, Denti dolenti impossitas, Vermes elicere traditur in M. A. N. G. *Ann. q. Observ.* 217. Fumus item Seminis Hyofcyami specificus est, per infundibulum, fuscepore ore, mirabiliter Vermes expellit. Conf. *Alia Medic. Hoffmanni*. *Plum.* 1. pag. 209. i. Suffusus item seu Fumus ex Fructu Habacaci contuso, cum Cere misto, facila exinde pasta, in lumen ferream ignitam injecta, fumum suggerit, quo, ore extemplo, cæteratim Vermes cum ipso copioso rejecti, & crudissimi dolores sopiti, observati fuerunt. Spiritus sul-

Tom. II.

pluris quoque Dentibus cum bombace indatus Vermes optimè necat, & dolorem inde oriundum cadit: vel ex Pulvere Galliarum, cum succo Radicis pyrethri imprægnato paratur remedium, quod Denti inditus Vermes expurgat. Seum cervinum, quæcumque contra Vermes Dentium valeat, vid. BARTHOLINUS *Cent. 2. Hyst. 96.*

ARTICULUS III.

De Lapide Dentali, seu lithodonto, & Dentium nigredine.

Quod Lapidem Dentalem seu Lithodonta (C) (ut vulgè ex vasa perisitione vocant Tartarum Dentium) vult ortum & generem optimè delineavit HELMONTIUS *Tracl. Alimenta Tartarificia* §. 22.

CAUSÆ.

Nempe nutrimentum Dentium laterale ex Gingivis depravat, sub his perfectum cum Dente assimilatione frustrum, & vitiatum, siquæ in excrementisiam plus minus naturam degenerans, adhærescit saltem superficie tenus Denti, siquæ, quia jam ad duritiem dentium ex aliquâ sui pro nutriendo Dente alteratione, detentum fuit, sâ induratesiam quasi lapideam dentalem coagulatur saltem, & talem, plus minus tamen friabilem, dentium acquirit, simulque, quicquid mucilaginis ciborum ac potuum imbibitur, simul sese fortiter indurât. Nunquam igitur sane Gingivæ, & quæ cuspidali figura ad Dentis medium affurgunt, hancque firmo amplexu retinent, dentalem hunc Lapidem generare solent; bene autem hæc Flaccida, cruenta, minisque aptè Dentibus adherentes, adeoque externis injuriis ad sensum Denti partem aditum permittentes, nec commodum nutrimentum impediunt, sed potius etiam laudabiles pervertentes, hoc malum inducunt.

Par omnino est ratio *serididum, nigerrum, alium modo malè vitiatum Dentium*. Quicquid enim hic subest vitii, nonnisi productum morbosum & frustrata & depravata privata Dentium nutritione casum, seu externa illa *supra* circa Dentium casum, speciatim *Vitiosa*, & Dulcis, primam occasione suggerit, seu Gingivarum morbosus status, alterando nutrimentum Dentium, & vitando lateralem ejus nutritionem in causis ferit. Sine ut febribus nil inopè familiare est, ac Gingivarum per varias febrium passionem, speciatim cruentam flacciditatem, ita & in talibus Dentium nigrities, & forditates frequentissimæ est. *Nigrities* sunt Dentibus adherens, quid nisi extraneum est Gingivis, plus minus corrupti, & acore infestis eroris, Dentibus adherentis, velligium est? à cuius hostili præsentia, ut irritant Gingivæ, & invitantur Denti pori, ita ex facili hinc accensio, etiam & Cariei successibus progressus. Justa lesionem Gingivarum & Dentium lesio indeque sordium excrementariorum pluralitas ac veritas estimanda: Hæc & sâ Inundatione Mercuriali pro cura Luis Veneræ, similiter concitata salivatione, ut notabiliter vitantur Gingivæ, ita nigrescere subit, & pluribus sordibus inquinari observantur Dentes.

DIAGNOSIS.

Quod *Diagnos*: Dentium Tartarus & Nigredo sponte nobis innotescit: unde Causarum signa diffidiva necessaria sunt, cum inter interius unica eorum dicit, ut ex externarum veritè dari possint, ut ex *supra dictis* patet.

PROGNOSIS.

Quod *prognosis*: Lithodonta & Dentium Nigredo Gingivis uti & Dentibus ipsâ, maxime nocentibus ad totalem erosionem, crebriorem dolorem, aut præmarum casum faciliè disponunt.

CURA.

Tophi Dentium, seu Lithodonta, corumpunt forditates & nigrities, curantur per ea, quæ sordes didas abstergere, viscosum hanc acidum, Gingivis & Dentibus hostili, absterbere, & etiam blanda adfrictoria vi Gingivarum tonum roborare valent. Quod si longius processerit malum, & tenacius mucus Dentes vitaverit, potenter incidenda

G 2

& Dil.

(C) *Lithodonta*, quæ videtur esse tartarus, h. e. Lapis Dentium.

& Dissolutio, & quicquid heterogenei fuerit, absumptio, & quasi evidenter, adhuc eruat, habendo semper respectum ad scorbuto plūs minus præsentem. Convenient igitur in leviore modo Os sepius, Cornu Cervi usum, Mandibulae Lucii pisces, Testes Ovarum calcinatas, Cinis Nicotianæ, Rosmarini, Urina calida, cum qua fricantur subinde Dentes & Gingivæ, Tartarus calcinatus, aut parum salis Tartari, aut Aluminis ulii, Cineres Vegetabilium, ut Nicotianæ, &c.

Duriores subiecta lapides ex Silice, Pumice, &c. vitanda sunt, quia crebriori usu Gingivæ atterere, & absumere valent, ut rectè monet ZWELFERUS in Pharm. Rag. pag. 101., nisi ubi fortius agendum; tunc enim, paulo tempore, adhibita minus nocent. Exempli loco sit Parina Virginea *Agrostis*, egregiè Dentes dealbans, & à Tartaro corrosivo purgans.

Hic modo dictis convenienter Radix Iridis Florentinae additur, partim quia & ipsa conveniat, partim propter odoris gratiam, propter quem saltem finem non inepta. Parus Dentificius, aliquot guttuli Olei destillati Caryophyllorum, aut Ligni Rhodii, possunt addi: Ex. gr.

℞. Corn. Cerv. \mathfrak{ss} . 3ij.

Coral. 3ij.

Rad. Irid. Flor. 3ij.

Alum. \mathfrak{ss} .

Sal. tart. an. 3ij.

M. f. Pulvis: qui trinetur cum

Spiritu Cælestiali,

addendo

Olei destillat. Caryophyllor. guttas aliquot

D. S.

Pulvis Dentificius.

Quod si didis Pulveribus color purpurascens conciliandus, *Cocciniglia* in Aqua Aluminis solvatur, & cum hac adspersum pulverem, qui exinde rubescit: sed leni admodum igni idem purpurat.

Quod si pertinacius fuerit malum, sordes tenaciores obliatas nigrities, firmius Dentibus impactus, ac firmius conglutinas Lapis, optimum remedium est spiritus salis cum Melle ad gratiam saporis, vel quantum placet, mistus, & ita Gingivis illitus. Spiritus Vitrioli suspensus est, cuius loco Oleum sulphuris in f. 3. Aquæ communi dilutus, vel cum Melle rursus subactum, adhiberi potest. Pertinet hæc Opuscula BORELLI *s. c. observ. 65.*, ad gravius malum præsertim conveniens. Non incommodum est, si recipiatur Vinum, cui permisceatur spiritus sulphuris, ut aciesit; hunc immittatur radicula Polyopodi per viginti quatuor horas: quæ siccatæ, & loco Dentificii adhibita, Dentes firmat, mundat, & candorem utilem inducit. Et ea, quæ de Spiritu Vitrioli refert RIVIERIUS in l. 6. Prax. c. 2., potius spiritui salis, quam spiritui Vitrioli applicanda veniunt: Quo etiam facit ejusdem Liquor ex Alumine ulio, hic egregie conveniens.

Pulvis Dentificius Principis Altenburgensis.

℞. Oss. Sepis,

Corn. Cerv. \mathfrak{ss} .

Pumic. præp. an. 3ij.

Melch. 3ij.

M. f. Pulvis: cui adspersatur

Spiritus Risor. 3℥.

& succetur: laterum

℞. Gran. Chermes,

Santal. rubri an. 3℥.

Spiritus Vin. q. f. pro extrahenda Tinctura.

Irrora aliquoties prædictum Pulverem & sicca.

D. S.

Pulvis Dentificius.

Nou incommodum est, hujusmodi pulveribus Dentificiis Salem Ammoniaci subinde addere, Dentibus, Gingivis, ac omnibus Oris partibus imprimis conveniens. Vol

℞. Aqua plantag.

Sodi. min. an. 3ij.

Sal. Ammon.

Tact. an. 3℥. ad 3℥.

M. filtra, D. S.

Aqua pro Dentibus.

Qua ipsa Dentes non omni passu ablutuntur, & Gingivæ blandè fricantur.

Sant. sal Ammoniacum in Aqua solutum, pro Dentium ab omni passu ablutione, Fæorem eorum imprimis tollit: Si-

cui matutina mundificatio cum Urina humana Dentes, & Gingivæ & quæ plurimis malis præservat. (D)

ARTICULUS IV.

De dentium vacillatione.

Dentes sæpè etiam vacillant, seu minus firmiter Gingivis coeuntur.

CAUSÆ.

Quod attinet Causas: Dentes hoc vitium contrahunt vel propria, vel aliena, scilicet Gingivarum, culpa. Propria eadem est, sed in minori saltem gradu, quæ & Dentes decidere potius & cadere facit: de quibus sufficenter adum. Aliena Gingivarum culpa consistit in eo, quod fibrosi illarum caro vel mollis, vel flaccida, vel simul tumida, vel etiam nonnulli exulcerata, adeoque in omnibus his casibus plūs minus cruenta, simul exadat. Rarum est, quod in SCHENKII collecta *obs. l. 1. c. 2. de Dentibus* p. 200. refertur, ex defluxione in Dentium alveolis, hos gyrata pinna interdum impleri, ut Dentes extrudantur: suspicari tamen, non tam ex defluxione, quam Lapidis seu Tophi dentalis uberiori incremento, potius vitium hoc ortum traxisse. Ista vero mala Gingivarum oriuntur frequentissimè saliva, vel in genere acrore, vel in specie scorbutico sapore, seu vitio acri sale iniquitate culpa, à qua tonus fibrarum Gingivarum resolvit & emolliti, penetrari eadem, & plūs minus succellunt non raro finit admodum cum pruritu erodi assolent, vascula sanguinis, una per diarethra vitiatas, sanguinem paulatim transfundunt.

Potest & Mercurii usus, cum pro salivatione excitanda, & hinc acrioris & præternaturalis usque copiosi salivæ profluvia, quæ salia pro usa Cosmetice applicatur, ordinario Gingivæ reddere laxare, & omnes Dentes hinc mobiles quasi vadere solet. Hæc pertinet etiam Opusculum usus in Odontalgia.

DIAGNOSIS.

Dentium Vacillatio ex relatione facili innoscit.

Causarum vero signa distinctiva cognoscuntur, vel ex Autocentibus, ex. gr. Odontalgia prægressa, salivatione Mercuriali, vel Conjunctis, v. g. Scorbuto, &c.

PROGNOSIS.

Dentium Vacillatio, quæ ab Odontalgia oritur, ut plurimum spontè remittit.

Quæ & à salivatione Mercuriali, hæc cessante, pariter cessat, modo non addit Gingivarum nigredo.

Vacillatio Dentium à causa interna sæpè est diuturna, quæ Dentes tandem facili elabuntur. Quod si ulterius cedat negotium, vitari magis Gingivæ, exacerbat, profundius absumi eadem, vel corrumpi etiam, & ad Gangrænam disponi assolent. Malum, quod in genere scorbutum appellatur.

Quod si firmior pantholus Gingivarum fuerit æstura, relaxata eadem nihilominus sanguine uberior in se recipit, & spuria inremescit & excrecit caro laxa, flaccida & surdida, & facili ad usum erorem distante, in Gingivarum hinc diu excrecentia seu Dentium superincarnatione.

CURA.

Ut igitur removeantur hæc mala, præmissa debita radicis morbo interius Causatione *Oliva facida*, tumida, cruenta &c. adstringentibus; *axillaris Abstergentibus* & Mundificantibus ac Adstringentibus consolidandis: corrupta, & plūs minus gangrenata, ab ulcero mali progredi præservanda. Conveniunt igitur Flores Rosarum rubrarum, Flores Aquilegiæ, & ex his panatum Unguentum de Aquilegia ad Scorbuto Oris præsertim proficuum: Descriptio ponitur in TILLEMANNI *Med. Mod. Coron. Cervi*, & Ebor usum, Lacca & Myrrha, Alumen, cum erudum quam usum, Lapid. Cancrorum, Folia Quercus, Ligu-

(D) Dentium Tophi cum solidissimi sunt, instrumentis quodammodo chalybeis ad hoc usum expressi parari, ab Odontariis evolvantur: id autem maxime faciendum est diligentia, ne Dentes infracturam vi aliqua ratione inferantur.

Rut. R. vix Iros Florentiss. Bistort. Tormentilla.
Flores Malve arborescent. Nasturtium aquaticum, Ruta,
Salvia, Rosmarinus. Ex his vel sunt Pulveres Dentificii,
cujus exemplum vid. in BARTHOLINO Com. 6. Myrrh.
54. qui elegans est pro Dentibus scorbuticis: imbuatur
ulterius cum Spiritu Cochlearie, ut ita melius appropri-
tur. Item.

℞. Flor. Malve arbor. rubr. ℞.
Carm. Cor. nfi p. p. ℞.
Alum nfi.
M. f. Pulvis subtilissimus. S.
Pulvis Dentificius.

Quo post Oris collutionem, & Dentium purificationem
bene fiantur Gingiv. Vel ex istem fiat Decodum: v.g.
Ruta in Vino decoquatur, quo calidissime Or eluatur,
egregio cum succo vitæ contra hoc afflicto Scorbutico. Salvia,
item Rosmarinus, decocta in Aqua cum pisco addito Alu-
mine, egregius est Gargarismus ad dicta Dentium vitia,

℞. Herb. Salu. q. m. ℞.
Flor. Malve arbor. rubr. M.
Rad. Polyd. ℞.
Fiat Decodum in Aqua fer. q. C.
Colat. ℞. adde.
Mell. refat. ℞. ℞.
Nervi animalati ℞. ℞.
Alum. nfi.
Tere. f. g. an. ℞. ℞.
Milk. pro Desid. S.
Aqua pro Dentibus.
Vel

℞. Herb. Salu.
Cochlear. ad. M. ℞.
Cofus in C. q. Lactis.
Colatur. ℞. ℞. adde.
Succ. Cochlear. rub. ℞.
Syr. Aquilæ. ℞.
M. pro Gargarismo.
D. S. ut antea.

Aliquand in ore tenetur.

Pertinet hoc Gargarismus de Tormentilla Myrs. p. 403. Du-
tillum ad Gingivæ roborem Petri in Pharmac. p. 313. Si
quoque aliud quid, certe Myrrha & Laccæ in istis Gingi-
varum vitiis sunt præstantissima: Hinc Tinctura Laccæ
Myrs. est nobilissimum remedium in Scorbutico & putredine
Gingivarum & Oris, cui commodè Myrrha afficiari solet.
Nam sola Myrrha corroboret masticata præsertim egregiè
contra Scorbutum Oris. Tinctura Laccæ præsertim 46. Arma-
mentar. MYNSICHTI & consp. M. A. N. C. Ann. 6.
App. Tit. 10. pag. 76. B. D. MICHAELIS Tincturam Lac-
cæ patetbat ita:

℞. Pilgum. Tinctur. q. v.
In q. d. distilla.
Alum. nfi. C.
Solutorem hunc figere cum
Lacca putrida, ut
donec tingatur.

Nos incollatum fore: & addatur Myrrha, vel pro-
miscue ejus Tinctura. Vel

℞. Sap. Meditaneus. ℞.
Solve
Aqua Pluvialis. ℞.
Colatura. D. S.
Aqua pro Dentibus.

Huic immixta spongula applicetur loco affecto.

℞. Aqua Sali min.
Præcoll. an. ℞.
Spiritus Cochlear. ℞.
Mell. refat. ℞.
Spiritus Sali q. f. pro grato sapore.
M. S. ut antea.

Humectetur lineum & fiantur Dentes & Gingivæ, à
Scorbuto male se habentem. Vel

℞. Aqua Præcoll.
Sali. an. ℞.
Spiritus Cochlear. ℞.
Alum. nfi. ℞.
Mell. refat. ℞.
M. S.

Mistura pro Dentibus, & Gingivæ.

Potè uterque Mel rosaceum, cum Spiritu Sali tantil-

lo usque ad gratum acorem imprægnatur, omnia ulcera &
putredinem partium in Ore sanant, si præsertim ex Scorbu-
to originem ducant, in specie, si simul cum Decodo Sai-
viæ subinde abluantur Gingivæ. Egregium quoque est Li-
nimentum Hermannii ad hos Gingivarum afflicto, quod
describit in Præf. Chymicæ. pag. 125., sed cui non incom-
modè Myrrha addenda venit, ad imitationem SENNER-
TI in Præf. ib. 3. p. 3. f. 3. cap. 7. pag. 633. Cui simi-
le est elegans Linimentum contra Oris & Gingivarum Scorbutum
quod habet DECKERS in Com. in Præf. Barbetti p. 156. i
cujus loco possit etiam recipi:

℞. Alum. crudi. ℞. ℞.
Flor. Aquilæ.
Sali. Sali. an. ℞. ℞.
Rad. Iros Flor. ℞. ℞. vel ℞. ℞.
Myrrh. et. ℞.

Cum L. q. Mellis refat. f. Linimentum.

Egregium ad vacillationem Dentium scorbuticam.

℞. Rad. Bistort. ℞. ℞.
Flor. Cochlear. rub. ℞. ℞. vel ℞. ℞.
Colatur. ℞.
Alum. nfi. ℞.

Istretore aliquot guttis Olei dissilati Caryophyllorum,
& imprægnatur largiter Spiritu Cochlearie, qui ad Oris
Scorbutum est egregius.

℞. Sali. rad. Bistort. vel Torment.
Flor. Balast.
Refat. rub. an. ℞. ℞.
Myrrh. et.
Alum. nfi. an. ℞. ad ℞. ℞.
Mell. refat. q. f.

Melli ad ignem liquetum inspergantur sensim pulve-
res, f. Unguentum. D. S.

Unguentum pro Dentibus contra Aphas, & Scorbutum,
Hoc illinantur Gingivæ & partes malè scorbuticæ affectæ.
Quo etiam pertinet Linimentum SCHROEDERII pag.
300. l. 2. c. 17.

℞. Rad. Iros Florent. ℞.
Pennis. ℞.
Alum. nfi. ℞.
Lapill. Camer. p. p.
Ceram. rub. p. p. an. ℞. ℞.
Escipie cum Mellis refat.
D. S. ut antea.

Linimenta hæc, tam pro gratia odoris, quam propter
vin specificam, Olea dissilata Caryophyllorum imprægnari
possunt.

Præter hæc lo efficacissima Gingivarum scorbutica Succo
quoque Cochlearie, cum Alamine ullo mixtus, per-
quisit egregius est. Sicuti ad hæc ipsa G. nivarum vitia ex
Scorbuto nulli credit Vermicularum, citius Decocum cum
Alamine & Melle nobile experimentum est, gargarizand
utpatum: vid. M. A. N. C. Ann. 6. Observ. 12. p. 30. N.
DIGBY Medic. Experimental. p. 2. p. 31. Item egregius est
Mistura pro his Gingivarum malis ex Aqua Calcis viam
cum Alamine crudo & ullo, ac Radice Iros Florentiss.,
quod in mentem revocat aliam non inconvenientem Mistu-
ram efficacissimam in Scorbuto Oris, nempe Cæmereum
Aquam Calcis vivæ supernatantem salisfæm.

℞. Sapi. Camer. ℞.
Quamvis Laccæ ℞.
Vireb. Cypr. gr. vi.
Aqua Rosarum,
Sali. an. ℞. ℞.

Solve calore lesi, ut probe imprægnetur à Laccæ. D. S.
Mistura pro Dentibus contra Scorbutum Oris.

Mistura hac laventur gingivæ, & egregie ulius erit.
Ac merito excolitis ulius Laccæ; Nam B. D. MI-
CHAELIS aliquando putredinem Gingivarum scorbuti-
cam tantam, ut gangrenam minaretur, & propter inten-
sissimum fetorem necesse juxta agrum commorari posset, per
solam Tincturam Laccæ, præmissa internali universalibus,
felicitè restituit. Vel

℞. Gum. cum Laccæ ℞. ℞.
Alum. nfi. ℞.
Escipie cum
Mellis refat. ℞.
adde

Spiritus Sali parum pro grato sapore.

D. S.

Linimentum contra putredinem Gingivarum.

AC

& Dissoluta, & quicquid heterogenei fuerit, absumptis, & quasi excreta, adhibenda erunt, habendo semper respectum ad scorbutum plus minus praesentem. Conveniunt igitur in levis modo Os lepro, Cornu Cervi ultum, Mandibulae Lucii piscis, Testes Ovarum calcinatae, Cinis Nicotianae, Rosimarini, Urina calida, eum qua fricantur subinde Dentes & Gingivae, Tartarus calcinatus, aut parum salis Tartari, aut Aluminis albi, Cineres Vegetabilium, ut Nicotianae, &c.

Duriore subiecta lapides ex Silice, Pumice, &c. vitanda sunt, quia crebriori usu Gingivae atterere, & absumere valent, ut reddi docet WELFERUS in Pharm. Reg. pag. 101., nisi ubi fortius agendum; tunc enim, paulo tamen parvis, adhibita minus nocent. Exempli loco sit Farina Virginea *Myofiliis*, egregie Dentes dealbans, & à Tartaro corrosivo purgans.

Hilce modo dictis convenienter Radix Iridis Flammula additur, partim quia & ipsa conveniat, partim propter odoris gratiam, propter qualemvis finem non inepta. Paritis Dentifricis, aliquot guttes Olei destillati Caryophyllorum, aut Ligni Rhodi, possunt addi: R. gr.

℞. Cor. Cor. ʒij.

Corall. ʒij.

Rad. Irid. Fl. ʒij.

Alum. ʒij.

Sal. tart. an. ʒj.

M. f. Pulvis: cui immoretur eum

Spiritus Cerebralis,

addendo

Olei destillati Caryophyllor. guttas aliquot:

D. &

Pulvis Dentifricus.

Quod si dictis Pulveribus color purpurascens emulsiandus, Coringium in Aqua Aluminis solvatur, & cum hac adspargamus pulverem, qui exinde rubescit: sed leni admodum igni idem purpurascit.

Quod si pertinacius fuerit malum, sordes tenaciores obstant nigricis, firmius Dentibus impactus, ac firmius conglutinati Lapis, optimum remedium est spiritus salis cum Melle ad gratiam saporis, vel quantum placet, nullius, & ita Gingivae illitus, Spiritus Vitrioli inspectus est, cuius loco Oleum sulphuris in f. q. Aquae communis diluatur, vel cum Melle rosato subditi, adhiberi potest. Pertinet huc Opuscula BORELLII. s. *Of. 65.*, ad gravius malum praesentem conveniunt. Non incommode est, si recipiatur Vinum, cui permisceatur spiritus sulphuris, ut acceat: huic immittatur radícula Phylloidi per viginti quatuor horas: quae siccat, & loco Dentifrici adhibita, Dentes firmat, mundat, & candorem illis inducit. Et ea, quae de Spiritu Vitrioli refert RIVIERUS in lib. 6. Prax. c. 2., potius spiritus salis, quam spiritus Vitrioli applicanda veniunt: Quo etiam facit ejusdem Liquor ex Alumine ulso, hic egregie conveniens.

Pulvis Dentifricus Principis Aitenburgensis.

℞. Of. ʒij.

Cor. Cor. ʒij.

Pumic. prop. an. ʒij.

Melisi ʒj.

M. f. Pulvis: cui adspargatur

Spiritus Rhar. ʒj.

& succetur: Interim

℞. Gran. Chermes,

Succali rubri an. ʒj.

Spiritus Vini q. f. pro extrahenda Tinctura.

Iterea aliquoties praedictum Pulverem & foca.

D. &

Pulvis Dentifricus.

Non incommode est, hujusmodi pulveribus Dentifricis Saleam Ammoniacam subinde addere, Dentibus, Gingivis, ac omnibus Oris partibus imprimis conveniens. Vel

℞. Aqua Plantag.

Sidi. min. an. ʒij.

Sal. Ammon.

Tant. an. ʒj. ad ʒj.

M. filtra, D. S.

Aqua pro Dentibus.

Qua ipsa Dentes ab omni pasta abluantur, & Gingivae blandè fricentur.

Sane sal Ammoniacum in Aqua solutum, pro Dentium ab omni pasta ablutione, Factorem eorum imprimis tollit: Si

cui mazina modificatio cum Urina humana Dentes, & Gingivae & quamplicitis malis praerervat. (D)

ARTICULUS IV.

De dentium vacillatione.

Dentes saepe etiam vacillant, seu minus firmiter Gingivis conneduntur.

CAUSAE.

Quod attinet *Causas*: Dentes hoc vitium contrahunt vel propria, vel aliena, scilicet Gingivarum, culpa: Propria eadem est, sed in minori saltem gradu, quae & Dentem decidere potius & cadere facit: de quo plura sufficienter adhuc. Aliena Gingivarum culpa consistit in eo, quod fibrosa illarum caro vel molli, vel flaccida, vel humilissima, vel etiam nonnulli exarctata, adeoque in omnibus hac calibus plus minus eructa, semel eradit. Rarum est, quod in SCHENKII collectis *Obs. l. 2. cap. de Dentibus* p. 100. refertur, et delusione in Dentium alveolis, hos gypsa pituita interdum impleri, aut Dentes extrudantur: suspicor tamen, non tam se delusione, quam Lapida sua Tophi dentalis uberiori incremento, postea vitium hoc ortum traxisse. Ista verò mala Gingivarum oriuntur frequentissime halitui, vel in genere acruetis, vel in specie scorbutico sapore, seu vitio acri sale inquinatae culpa, à qua totius fibrarum Gingivarum resolvit & emolliet, penetrat eadem, & plus minus successe non raro sensu admodum cum pruritu erodi solent, vascula linguenda, una per diarrhoea vitiat, sanguinem paulatim fontentibus.

Potest & Mercurii usus, tam pro salivatione excianda, & hinc acrioris & praeternaturalis sensusque copiosioris salivae profluvio, quam facit pro vim Cosmetico applicatae, ordinari Gingivam proinde laxare, & omnes Dentes hinc mobiles quasi reddere solet. Hac pertinet etiam Opusculum usum in Odontalgia.

DIAGNOSIS.

Dentium Vacillatio ex relatione facili innotescit.

Causarum verò signa distinctiva cognoscuntur, vel ex Antecedentibus, ex. g. Odontalgia progressa, salivatione Mercurialis, vel Conjunctis, v. g. Scorbutis, &c.

PROGNOSIS.

Dentium Vacillatio, quae ab Odontalgia oritur, ut plurimum sponte remittit.

Quae à salivatione Mercurialis, hac cessante, pariter cessat, modo non addit Gingivarum nigredo.

Vacillatio Dentium à causa interna sepe est diuturna, quae Dentes tandem facili elabuntur. Quod si ulterius cedat negotium, vitari magis Gingivae, exulcerari, profundius absumi eadem, vel corrumpi etiam, & ad Gangraenam disponi solent, Malum, quod in genere scorbutis, appellatur.

Quod si similis paululum Gingivarum fuerit textura, relaxata eadem nihilominus languente uberius in se recipit, & spuria immisceat & exerceat carne laxa, flaccida & tardida, & facili ad eundem errorem dissilire, in Gingivam hinc dicta excreta seu Dentium superincarnatione.

CURA.

Ut igitur removeatur haec mala, praemissa debita radiis morbo interius Curatione *Oligiva facit*. tumida, craenta &c. adstringentibus; *assulcrata* Absorbentibus & Modificandibus adstringentibus consolidandis: *corrupta*, & plus minus gangraenata, ab ulnere mali progressu praeservandis. Conveniunt igitur Flores Rosarum rubrarum, Flores Aquilegiae, J. ex his passum Unguentum de Aquilegia ad Scorbutum Oris praerictum proficuum: Descriptum prollat in THELMANNI *Med. Mod. Coru Cervi*, & Ebur nigrum, Lacca & Myrrha, Alumem, tam erudum quam album, Lapilli Cancrorum, Folia Quercus, Ligastri,

(D) Dentium Tophi cum solidissimi sunt, instrumentis quibusdam elabuntur ad hoc opus expressis paratis, ab Odontiatris evelluntur: id autem maxime faciendum est diligentia, ne Dentes instrumentorum vi aliqua ratione infirmetur.

Alii, R. mix. Ileos Florentine, Bistortæ, Tormestillæ, Flores Malvæ aristatæ, Nallurum aquaticum, Ruta, Salvia, Rosmarinus. Ex his vel sunt Pulveres Dentificii, cujus exemplum vid. in BARTHOLOEO CROO 6. *apler*.
 54. qui elegans est pro Dentibus cariebus imbutis: unguentus aliter cum Spiritu Cochlearia, ut ita melius approprie-
 tur, item.

℞. Flor. Malvæ arb. rub. 3℞.
 Cam. Cro. nfi. p. p. 3℞.
 Alam. nfi.
 Nuc. Mosch. an. 3℞.
 M. f. Pulvis subtilissimus. S.

Pulvis Dentificius.

Quo post Oris collutionem, & Dentium purificationem bene fricetur Gingivæ. Vel et istem hat Decodum, v.g. Ruta in Vino decoquatur, quo calidissime Oris eluatur, egregie cum succo contra hos affectus Scorbutici. Salvia, item Rosmarinus, decocta in Aqua cum pauco addito Alu-
 mine, egregius est Gargarismus ad dicta Dentium vitia.

Vel

℞. Herb. salu. q. n. 3℞.
 Flor. Malvæ arb. rub. 3℞.
 Rad. Polygal. 3℞.
 Fiat Decodum in Aqua fusi. q. f.

Colat. Et addde.
 Mell. refat. 3℞.
 Neri antimoniat. 3℞.
 Alap. nfi.
 Turb. figul. an. 3℞.

Misc. pro Dentibus. S.
 Aqua pro Depithina.

Vel

℞. Herb. Salu. 3℞.
 Cucklear. 12. M. III.
 Coque in f. q. Lactis.
 Colatur. 7. 12. addde.
 Suci. Cucklear. 3℞.
 Symp. Aquilæ 3℞.
 M. pro Gargarismo.

D. S. ut accipiat.

Aliquando in ore coactum.

Pertinet hoc Gargarismus de Tormestilla Myal. p. 403. De-
 dentum ad Gingivæ roborandam Potius in Pharmac. p. 113. Si
 quoque aliud quid, certe Myrrha & Læta in istis Gingi-
 vitarum vitiis sunt præstantissima: Hinc Tindura Lac-
 cæ, Myal. est nobilissimum remedium in Scorbuto & putredine
 Gingivarum & Oris, cui commodè Myrrha afflicti solet.
 Nam Iola Myrrha coctibus multatæ præstare egregie
 contra Scorbutum Oris. Tindura Lacce prolat. 16. *Armen-*
ia. MYNSICTH, & conies. M. A. N. C. *Ann. 6.*
App. Th. an. pag. 76. B. D. MICHAELIS Tinduram Lac-
 cæ putabat: ita.

℞. Phlegm. Virid. q. v.
 in quodidam.
 Alum. nfi. q. f.
 Solutionem hanc digere cum
 Lactis purissimæ,
 donec digatur.

Non incoactum foret, si addatur Myrrha, vel pro-
 miscuetur Tindura. Vel

℞. Sap. Medicament. 3℞.
 Solvo in
 Aqua Pincæ. 3℞.
 Colatura D. S.
 Aqua pro Dentibus.

Hanc linteis spongiosa applicetur loco affecto.

Vel

℞. Aqua Sedi m. 3℞.
 Prunell. an. 3℞.
 Spiritus Cucklear. 3℞.
 Mell. refat. 3℞.
 Spiritus Salis q. f. pro grato sapore.

M. S. ut accipiat.

Humectetur linteum & fricetur Dentes & Gingivæ, à
 Scorbuto malè è habentes. Vel

℞. Aqua Prunell.
 Salu. an. 3℞.
 Spiritus Cucklear. 3℞.
 Alum. nfi. 3℞.
 Mell. refat. 3℞.

M. S.

Mistura pro Dentibus, & Gingivæ.

Purè ulcèris Mel rosaceum, cum Spiritu Salis tutil-

lo usque ad gratum acorem impregnetur, omnia ulcèra &
 putredinem paritum in Ore sanat, & præsertim ex Scorbu-
 to originem ducunt, in specie, & simul cum Decodo Sal-
 viae subinde abluatur Gingivæ. Egregium quoque est Li-
 nimentum Hermannii ad hos Gingivarum affectus, quod
 describit in *Præf. Chymicæ*, pag. 123, sed cui non incommo-
 dè Myrrha addenda venit, ad imitationem SENNER-
 TI in *Præf. lib. 3. p. 5. feli. 1. cap. 7. pag. 633.* Qui simi-
 le est elegans Linimentum contra Oris & Gingivarum Scorbuto
 quod habet DECKERS in *Cam. in Præf. Barbetti* p. 156. i
 cujus loco possit etiam recipi:

℞. Alum. crudi 3℞.
 Flor. Aquilæ.
 Pul. Salsolæ an. 3℞.
 Rad. Iros Flor. 3℞. vel 3℞.
 Myrrh. et 3℞.

Cum f. q. Mellis refat. f. Linimentum.

Egregium ad vaccinationem Dentium scorbuticam.

Vel

℞. Rad. Bistort. 3℞.
 Flor. Salsolæ rub. 3℞. vel 3℞.
 Colatur. 3℞.
 Alum. nfi. 3℞.

Irroretur aliquo guttu Olei dissilati Caryophyllorum,
 & impregnetur largiter Spiritu Cochlearia, qui ad oris
 Scorbuto est egregius.

Vel

℞. Pulv. rad. Bistort. vel Tormest.
 Flor. Salsolæ.
 Salsolæ rub. an. 3℞.
 Myrrh. et
 Alum. nfi. an. 3℞. ad 3℞.

Mell. refat. q. f.

Mell. ad ignem liquefacto inspergantur sensim pulve-
 res, f. Unguentum. D. S.

Unguentum pro Dentibus contra Aphthas, & Scorbuto
 Hoc illinatur Gingivæ & partes male scorbuticæ affectæ.

Quo etiam pertinet Linimentum SCHROEDERII pag.

300. l. 2. r. 57.

℞. Rad. Iros Florent. 3℞.
 Prunell. 3℞.
 Alum. nfi. 3℞.
 Lignil. Concr. p. p.
 Corall. rub. p. p. an. 3℞.
 Excipe cum Mellis refat.

D. S. ut accipiat.

Linimenta hæc, tam pro gratia odoris quam propter
 viam specificam, Oleo dissilato Caryophyllorum impregnari
 possunt.

Præter hæc in incrementis Gingivarum scorbuticæ Suc-
 cus quoque Cochlearia, cum Alumine alio mistus, per-
 quam egregius est. Sicuti ad hæc ipsa Gingivarum vitia ex
 Scorbuto nulli codic Vermicularum, cujus Decodum cum
 Alumine & Melle nobile experimentum est, gargarizand
 usurpatum: vid. M. A. N. C. *Ann. 4. Obsev. 11. p. 50.*
 DIGBY *Medicæ Experimental. p. 2. p. 78.* Idem egregia est
 Mistura pro his Gingivarum malis ex Aqua Calcis vivæ
 cum Alumine crudo & ulso, ac Radice Ileos Florentine,
 quod in mentem revocat aliam non inconvenientem Mistu-
 ram efficacissimam in Scorbuto Oris, nempe Creosotum
 Aquæ Calcis vivæ supernatantem salsissimam:

℞. Hypos. Creosot. 3℞.
 Gummi Lacce 3℞.
 Virid. Cyp. gr. vi.
 Aqua Rosarum.
 Salu. an. 3℞.

Solve calore levi, ut probe impregnetur à Lacce. D. S.

Mistura pro Dentibus contra Scorbuto Oris.

Mistura hæc lavetur gingivæ, & egregie ulserit.

Ac merib extollit utra Lacce; Nam B. D. MI-
 CHAELIS aliquando putredinem Gingivarum scorbuti-
 cam tantum, ex gangranam minaretur, & propter inten-
 tissimum foetorem nemo juxta ægrum commorari posset, per
 solum Tinduram Lacce, præmissis internis universalibus,
 feliciter restituit.

Vel

℞. Gum. cum Lacce 3℞.
 Alum. nfi. 3℞.
 Excipe cum
 Mellis refat. 3℞.
 Salu.

Spiritus Salis parum pro grato sapore.

D. S.

Linimentum contra putredinem Gingivarum.

AL

Affricetur subinde Gingivæ, juxta Lacram hanc nobilissima est Myrrha; v. g.

℞. Pul. Salv.

Alum. sulf.

Maxill. Lucil. pil. calcin.

Moring an. ʒiſſ.

Mellis q. ſ. pro linimento ad fricandos Dentes.

D. S. ut cates.

Quod si efficacia possit, aliquot gustus Spiritus Salis imprægetur.

In graviore morbo ulterius procedendum est, atque 6a, præter Linimentum *Harmanni* supra laudatum, ad Unguentum *Ægyptiacum*, cum Melle rosato probè permixtum, deveniendum, pro graviore exulceratione, aut inde meturgendis malis Gingivarum curanda. Vel

℞. Alum. sulf.

Salis Ammoniac an. ʒiſſ.

Maffick.

Thuris an. ʒiſſ.

M. f. Pulvis S.

Pulvis Dentifricus contra putredinem Gingivarum, Affricetur Gingivæ, postquam antè & post *Dentiffo* Salvia *Tormentilla* ac *Rosarum rupearum* Oculorum fuerit. Imò interdum Aqua forti graviter Gingivarum luxurietes sedanda. Conf. item *Linimentum SENNERTII* lib. 3. *Prax. p. 1. cap. 16. p. 51.* Aut denique Aquæ Virides ex Viridi *Æris*, pauco Anripigmento, Alamine, & quibusdam Vulnerariis, addito Melle in Aquam infusis & decoctis, hic commodè adhiberi possunt: quo affricte Gingivæ à luxurie flacciditate & putredine, defenduntur: c. g. sit vel Decoctum Viridis *Æris* in Decocto quodam, vel *Aqua Viridis Harmanni* *Prax. pag. 110.*, vel *Aqua Viridis Plateri* cujus descriptio præstat in *fine Observationum ejus.* Harum basis est Viride *Æris* cum Vino, aut melius Aceto: afficiuntur quoque Colcothar, Cerussa, Alumen, &c. *Vid. SCHRODERI Pharmacop. (D)*

ARTICULUS V.

De Dentium Stupore.

Stupor tandem seu *Hemadys (E)* affici dicuntur Dentes, siquæ Masticationem impedit, quando speciali doloris genere afficiuntur.

SECTIO IV. DE DEGLUTITIONE LÆSA.

Cibus ita in ore preparatus ulterius protruditur inferiora versus, quæ actio *Deglutitio* dicitur, siquæ, dum Lingua beneficio ad Gula partem superiorem, equique expansionis cavitatem, *Pharynx* dictam, devolvitur: Cibus protrusus imprimis à Sphinctere, se angustante, promovetur, & oclusa *Laryngis* rimula deorsum pellitur, quæ per ipsa per fibras carnea musculosa, *Œsophagi* cunicula cruciatum invadentes, motuque peristaltico in succellivè coarctantes, continuatur, donec Cibus in Ventriculum ingeat: ita ut *actio* hæc Fibrarum musculosarum, & Spirituum animalium beneficio peracta, in principio voluntaria, in progressu verò involuntaria, dicenda sit. Fibrarum musculosarum ipsiusque *Œsophagi* accursum Anatonem vid. in *WILKINSI Pharmac. Rat.*

CAUSÆ.

Deglutitio lædatur, quando vel impeditur seu immovetur, aut deficit, vel quædam depravatur, dominatur

1. *Œsophagus* parte,

2. *Stomachi*, seu Orificii Ventriculi superioris, culpa.

Œsophagi vitium est (I.) Quando tam Muscularum ejus tria pars, Fauces sui ampliatione efformantium, una cum Sphinctere, Paralyti resolvuntur, quam ipsa musculosa ejus

Tonica simili malo corrumpitur. De posteriori vid. *VILLIUSI Pharmac. Rat. Vol. 1. p. 11.*: De priori *TULPIUS l. 1. observ. 41. (II.)* Propter ejusdem Convulsionem & Spasum: quando propterea ejus contrahitur & angustiam nimiam alimenta non possunt deorsum protrahi. Sive hoc fiat (1) vel à Tumoribus, tam propriis, quam partium vicinarum: Illud quando inflammatus *Dynamico*, aut quando *ſclerose* Tumore obducitur, quando à *Carcinoma* excreſcente vitatur; exempla quorum vid. in *RHODII obs. 46. & 47. C. 2.* Hoc, quando Tonillis, Aspera Arteria, aut Uvula intumescunt, inflammantur. Sive hoc fiat (2) ab arcta nimis Clausura & strictura Fibrarum ejus; idque nunc ex Spasmo seu Convulsione, quæ pertinet Hypochondriaci subinde, non secus ac Mulieres Hystericæ, Gula adstrictioem, & contrahitur per Nervorum ipsosum ob compressionem patientes, quod alii ex Vaporibus hypici ex Hypochondriis elati, Fauces stringentes, malè derivant. Nempe pertinet hoc Gula strictura ab Utero, cujus mentionem facit *HELMONTIUS Tract. Asthma, & Tract. p. 13.* Hinc etiam in epileptico paroxysmo difficillima aut nulla solet esse Deglutitio: Sicuti & suspensa Convulsio & contrahit Fauces à Vermibus videri potest in *THONERO lib. 2. Observat. pag. 94.* Nunc ex illarum nimia exsiccatione

(D) *Exspirissimum habere hanc Aquam coctam ad Dentes mordendi, & Gingivas mundandas roborandasque.*

℞. Foliorum Myrti, Salvie, Rosamarinii & Olei: Corticem Malorum Panicozum, & Nucum Cupressi an. Mj. destillentur ex Aquæ fontanæ ʒxiij. Singulis destillata Aqua libris addatur Aluminis crudi ʒij. & pro Dentium & Gingivarum abluenda Aqua servetur.

(E) *Aliputis ab alpe, si sanguis, & cili, dens tymon trahere videtur: quare Svidas, aliputis, interpretatur dolorem sentio ex Dentibus sanguinolentis. Falsi Hemodia pro Dentium Stupore sumitur; est autem de quocunque Dentium dolore intelligatur.*

SUBJECTUM.

Peri afflicto in Dentium Stupore est hæc Periodiolum tactu quasi semi-privatum.

CAUSÆ.

Causæ sunt vel Internæ vel externæ. Internæ causa est Lymphæ salivales acritas: Inter externas sunt Acida, vel assumpta, vel vomitu rejecta.

DIAGNOSIS.

Diagnosi ex egri relatione patet.

PROGNOSIS.

Dentium Stupor à causa externa sponte remittit, nisi obiectum fuerit magis costumax.

A causa interna dependens, ut plurimum est diuturna, & sæpe redit.

CURA.

Curat Stuporem Dentium Portulaca recens masticata; Cacus tam recens, quam vetustus, adeoque aliqui manifestiore dives; Siliqua cerata masticata; item calidum Ovi Vitellum ad duriciem coctum applicatum. Omnium optimè est calida Urina applicata.

ARTICULUS VI.

De Dentium algore.

Affine Dentium Stupori est *Algor*, *Dentium* dum frigora atactu notabiliter alterant: Nempe Acidum & Frigus inimicissima existunt Dentibus, unde illorum nimis impressione afficiuntur sicut illorum interiores, & quasi irritantur, ut à percipue obiecti actione specialis quidam dolor in Dentibus percipiatur, Masticationis negotium insigniter impediens.

CURA.

Algorem hunc Spiritus Vini Dentibus affricitur, vel Panis calens masticatur, vel Vitellum Ovi affricitur, calide masticatur; item Theriaca Dentibus affricitur, huic malo modetur.

tionis in Febribus ardentibus coarctatus; quo suo modo etiam peractis defectus Salivae, Deglutitionem plus minus impediens, quae non laesa madet Gula, post exercitum etiam nimium potest loqui: Nunc ex illarum ad assumptum coarctatione & conglutinatione, quo HUGHESTEDTER facit *Observ. Duesd.* 3. G. 5. de adfectione Gulae ex potu Vini Malvatici, in quo radix Consolidae majoris insula fuit, unde Aetium soluta illud: hinc Ancella virginitatem minus praefectum balneo ejus adhibito palliavit. Sive hoc bar (3) ab Obstructione, propter deglutina varia, aut majores in Fauces isthmus, live principio *Ætophagi* haereticos, uti Boli Majoris, Nux Perficis, Ovum gallinaceum, &c. aut acuta Gulae missa, ibique cum sua insolita presentia, quae propter dolorem, & huius occasione inflammationem aut abscedit, Deglutitionem impediens; v. g. Officula, Spinae Plurimae, Acutae Gulae intra.

Obsidium superioris Ventriculi seu Stomachi in culpa est, quando sic licet, per *Ætophagi* iter demissa, nihilominus admittit debet recedere; id quod fit impetina, quando quacunque occasione irritatus vel laesit, contumacia se hinc inde claudit, adeoque assumpta ulterius progredi impedit. Id quod fit (1.) Quando vel inflammationem vel exortum, aut plus minus exacerbat, vel Tumorem quocunque; 2. priori quilibet modo cognoscibili, obsequium fuerit: quo facit curiosa, & notabilia *Observatio WILLISII Phlegm. Rationali* Platum. 1. pag. 45. (1.) Quando copiosiores, plus minus aciores, Flatus in epistemo angustis inclusi fuerint, quorum ipse praesentia utrumque, speciatim superioris, Obsidium ad pertinetiam sui frigidum irritat, unde assumpta nonnulli difficeret admittit, aut plus minus sicut copiosi Flatus eructantes infestum, etque ad plus minus sicut una reitricitur, quo facit non negligens *Observ. RIVERII de Morbis infirmis*, item *PLATERI Obs. lib. 3. pag. 132.* (3.) Quando quacunque de causa coarctat, aut assumptum horum Ventriculi; nam & sic Obsidium claudit, non assumptum sui hostia. Hae rationes familiariter est forbitantibus, quilibet liquida aut esculentia fluida deglutit, sed Carnes, quae fixa vel similia pertinetur resque, & oblata nulla modo, aut nonnulli difficeret, admittit. Pertinet haec *Observatio AMATI LUSITANI Cens. Cap. 49.* ubi post feream Sanguinis, & assumptum corruptionem, deglutitum omnimoda difficultas, etiam Aque, sola Vini assumptione salva. Conferatur *HILDANUS Cens. 5. Obs. 34.*

Tandem *depravatur Deglutitio*, & imprimis triplex modo: 1. Fir Carpiis in morbo, ut liquida optime possint deglutiri, non saluta: vid. *PLATERUS*: Id quod est ob vitium Gulae; in specie ob ejus angustiam vel tumorem.

2. Accidit nonnumquam, et solida facili deglutiri possint, non vix liquida, quae hausa subito cum suffocationis metu per os & nares redeunt: quale exemplum habet *SANCHEZ*.

Vitium hoc fit propter Laryngem, ob Epiglottidem non perficte claudentem Laryngis simulam, quae a solidis quidem deprimitur, liquida vero dum in Laryngem apertam penetrare incitant, ex suffocationis aut doloris secula cum impetu regurgitant, & quae data porta, per os & nares praetendit (F). Quo pertinet durities ossis Epiglottidis non sicut claudens Laryngem de qua vid. *BARBETTE in Anat. Practica, & in Coll. nostrae Testis*.

3. Depravatur, quando in eodem assumptorum vel solidorum vel liquidorum genere, quaedam facilia, quaedam difficilia, quaedam omnino non deglutiri possunt: de cuius ratione infra, speciatim ex Nausea Ventriculi, conlatur.

PROGNOSIS.

Quod *Prognosis* igitur: Deglutitio quo magis vel minus soluta, eo magis autem vel minus periculum vite imminet. A Paralyticis Musculorum Faucium nata difficultas Deglutitionis, periculosa & difficilior curabile pulchra est.

Quod si ob Spirituum morientium defectum, & adeo infirmum virum resolutionem, prout in acuta interdum accidit, malum evenit, pessimum signum, & mortis futura indicium.

Si cum lenitate, quasi in lagoam vacuam, decidit potus, malum. In Vulneribus si accedat ex Convulsionibus Deglutitio laesa, periculosa; sicut alias Convulsionibus Faucium in acuta periculosa, in chronica minus (G).

Si a Tumoribus pro se quidem, & ex interna causa naturali oritur malum, per Tumorem vel facili, vel difficiliter, vel omisso non curabilium natura. Prognosis facili est: sic v. g. ex Ulcere *Ætophagi* cancrolo omnimoda, adeoque lethalis deglutitio impotens: ita quo *Ætophagi* cartilagineum laesum Deglutitio penitus abolita: vid. *Ann. 3. M. A. N. C. Obs. 170.* adeoque lethalis.

Deglutitio res alienae in Faucium isthmum vel haerent, vel extra haec, vel ad Ventriculum tandem descendunt. Dum in Fauces haerent, praeter inimicum sui praesentiam interdum simul dolorem excitant, unde tumor, inflammatio, abscessus, ique vel lethales, (de quo vid. *HILDANUS Cens. 1. Obs. 33.* item *Cens. 5. Obs. 35.* ex Officula *Ætophagi* laeso tumor, dolor, febris, inflammatio, mors). Vel hoc rursus abscessus per peritum cum parte excretionum, aut deglutitum faciat: conferatur item *HILDANUS Cens. 5. Obs. 33.* ubi Mulier Officulum devoratum quo penitus suffocatur, postea tandem die, excitata suppuratio, egerit: vel per alia plus minus vicina loca exitum sibi quaerunt: quo facit exemplum notabile *PARÆI Lib. 2. Cap. 19. Chirurgia de Graminis ramulo deglutito*, qui postea integer per intercostale spatium erupit: item *HILDANUS Cens. 1. Obs. 33.* ubi Spina Plurimae guttuli per hiennum insula, post excitato abscessu in extrema cœli parte eructa: sicut etiam Officula, ex Lesione Claviculae sinistra lateris succedente, tussis post femore ipsarum excerta, legantur in *M. A. N. C. Ann. 4. Obs. 175.*

Dum vero ad Ventriculum quocunque modo descendunt, vel inferius per Anum successive denuo excluduntur: dum v. g. Miles metu, ac in itinere spoliatur, i.e. ducatus deglutit, colique post aliquot dies ephlere abdergent sine noxa rursus reddidit, teste *MICHAELIS*: Vel dum solida deglutita tertia die sine noxa per alvum fuit reddita, notiore *BARTHOLINO Cens. 1. Hist. anar. 59.* Vel in Stomacho pertinaciter haerentes varia mala inferunt: dum v. g. Pylorum obstruunt, quod obstruendo, & consumatur fuerit, mortem comitem trahit, Auctore *KERCKRINGIO in Specimen Obs. 1. Conferatur etiam HILDANUS C. 9. Obs. 35.*

Quo etiam pertinet Acutiae, quarum quaedam sine periculo, quaedam cum summo periculo deglutitae obviuntur: conf. *M. A. N. C. Ann. 4. p. 77.* Vttri frustula, ut Annulus, cuius asperitate excitata dysenteriam notat *ZACUTUS LUSITANUS Lib. 1. Med. Præc. Hist. 34.* Cæterorum hac facultatum affectuum Prognosis, ex dictis facili est.

CURA.

Cura horum affectuum pro eorum varietate, & mali inde nati diversitate, etiam variae. Si Paralyticis, qui generali Paralyticum & Convulsionum cura patitur: in specie tamen si vitium paralyticum circa Fauces, & principium *Ætophagi* in culpa sit, convenit Decothum Salivae & Erucic cum Vi-

no

(F) Fortasse & quatuor ejusmodi erit deglutitio difficultas, ut solida assumpta Musculorum Deglutitionis interventionem canonem, sanguinem vix cum objectum impedimentum facili removere, adeoque hac ratione deglutiri possit: contra vero quoniam liquida ad canalicularem acquirendum aqua non sunt, vel mirum sit autem vim adipisci non possint, ut impedimentum superare queant, adeoque hoc illas elabatur.

(G) De hoc Deglutitionis impedimento ad Convulsionem orta videtur manifestissimi homines Hippocrates 4. aphor. 1. ubi ait, Si scierim habenti collum repente pervertitur, ac vix post deglutitum, lethale est. Quamquam enim quamperimus Interpretes intelligant de Colla pervertisse, quae ad Vertebrae luvationis dependat, nihilominus hanc interpretationem minus iuxta Hippocratis morem esse existimamus. Siquidem impedit Deglutitio ad Vertebrae non luvationis hinc cum febre sua sine febre fit, semper lethalis erit. Neque cum aliis acutis, formam hic est de impedimento Deglutitionis facta de Tumore existit quidem in partibus profundioribus Gula, sed non apparent; nam non dixisset Hippocrates impedimentum Deglutitionis repente fieri debere: tumores enim sine apparentes sine non apparentes repente fieri vix possunt. Hippocrates igitur de eo Deglutitionis impedimento loquitur: hic est, quod ad Convulsionem etiam ducit: apparet autem duae conditiones, ut scilicet febris adfit, & tumore non existat: quod nempe collum pervertit & impedit Deglutitio ad Convulsionem prorsus erit, quae semel aliqua tumore apparent fieri potest. Quoties Convulsionem omnes ex eodem Hippocrate febribus supervenientes mala sunt: lethalis autem erit ea Convulsio, quae febri repente supervenit, tanta sit, ut collum pervertat & Deglutitionem impediat.

no paratum, in ore aliquandiu detentum: vid. PLATERUS l. 2. p. 209. *Obferv.* Item Decodum Eruci & Sinapi, Pilegii, Nelfartii: item Nux Moichana masticata & deglutita effe egregia: item Aqua Vitæ Infufionis Thymi, fimili ratione an nec decet, vel & infufionis Florum Lavendulæ cum aliquot granis Calorii fimili modo in ore detenta: item Aqua Apoplectica, Epileptica, &c. in ore detenta: Effentia Calorei, Spiritus Theriacalis cum Effentia Calorei junctus, Ceraurum nigricum, Anifi, Liliorum convallium, Aqua Anhalim, item Sacca Salvis miffus cum Sinapi, item miffus cum Nuce Mochata & Caffineo, & infufus lotus deglutitus. Terebinthina cum Aqua Primolæ Veris mediante Vitellæ Ovi miffa, fuccellit deglutita valde convenit: item Oleum Succini defillatum, aut Oleum defillatum Anifi, Salvis, &c. guttatim inter fucces injecla, egregie conducunt. Externè Collum regioque vicina in vopoda Oleo Lumburico terreftrem, colino, Spiritu Lumburico terreftrem cum Oleo defillato Sociali, Anifi, Lavendulæ, Caryophyllorum, & fimilium.

Quid & Tumoris harum partium OEſophagum anguſteat, & ita Deglutitionem impedit, per generali Tumorum Curacione, vel Gargarifiis dicutientiſſimis *Scabiei*, & *Riverii*, vel ſuppurantibus, ſi quidem cogniti fuerint quales ſint, removendi ſunt.

Clauiſa Functio & OEſophagi *ſpasmus*, Aromaticis & Nerviniſ, blandis Opiatis, additis tam internis, quam externis, curanda. Ad Deglutitionem ſpafmo quali impeditam, pertinet etiam ſuo modo, quando in Febrilibus ardentibus aut malignis ſine faucium tumore aut laſione ſenſibili, ſed ex Ariditate faucium & Lingue, & proprii OEſophagi exſiccatione, Deglutitio aboletur: id quod peſſimum ſignum eſſe ſolet; ſicut enim muſculofus Lingue & Pharyngis quaſi convulſus & exſiccatus ſunt, ut deglutire non poſſint: levare ſemper poſſet nonnulli per *Gargarisma* CORNARII *Obſerv.* in. ex Aqua tepida cum pauco Aceto, vel etiam per Mucilagines Seminum Cydoniorum cum Aqua Spermatis Rancum vel Prunellæ paratas, ſuccibus cerebriſ illatis, & blandè deglutitis. Externè *Tringum* ZACUTI LUSTANI *Prax. admir.* ad hunc affectum, compoſitum ex Unguento Pili Zachariæ, Unguento roſato, reſumptivo, Oleo Amygdalarum dulcium, Violarum & Mucilagibus cum Lacte molliet:

Salvis deſectus potu præſertim Vini, vel Cereviſiæ ſconditæ reſeitur, item Cryſtalli friſtula in ore circumſecta Salvis copiam nonnulli provocat.

Aſſumpta externa per ſui varietate appoſitis coranda, ut in liſto HOECHSTEDTERII exemplo, propinato Acido ſtragulatæ & faciem anguſtia ſublata ſunt.

Ad ſpafmum OEſophagi, Deglutitionem impeditentem, pertinet etiam, quando Hypochondriaci aut Hyſterici fauces quaſi conſtringit, & cum loquela plis miſus impedita Deglutitio inhiberi ſolet, propter ſpafmum diſtærum partium. Curatur imprimis Abſorbentibus acidum primario viarum appropriatis, ſimilique vi aromatica nervis conſuccentibus: hinc Marcellia, Bolus Armena, Terra ſigillata, Maxille Lucii pifici, Dent Apri, Corallia, Cornu Ceri vi uſum, Nux Muſchra, Opiata. D. MICHAELIS curavit ſpafmum ex malo Hypochondriaco cum Pulvere abſorbente ex Creta, Lapillis Cancrorum: item Effentia Ca-

ſtorei & Caloreſta, Spiritus Salis Ammoniaci & ſimilia in talibus pathematibus ſunt a tima: vid. SENNERTUS in *Prax. l. 3. ſect. 1. c. 1. p. 7.* SCHENCKIUS l. 3. WILLIS *Pharmacol. Rationel. l. 45.* (H).

Res alienæ variè ſubinde deglutantur non lavem moleſtiam inferentes: inter quas ſunt fruſta Vitæ, pro quorum noxa averenda, & ut ſine ſummo per ſperior tandem excudantur, convenit in ſpecie Pala paula inferior ex Oriæ vel Milie, vel Panis, debita copia aſſumpta, ſine omni deſpectu ingenti potu: id quod etiam ſuo modo in Aciculis & muſculibus deglutitis continet, item in glaciſ Piceum aliſive acutiſſimis ad Stomachum delatibus obicit: Sic per huiusmodi ſpiffiora involant res deglutite acutiſſime ſentim ex Ventriculo per Inſectia ulterius promovetur. Aciculis deglutitis ſubinde gravia iſterica ſymptomata: iſterici tamen, & Ventriculo ſit infixe, adhibet HILDANUS *Comment. 6. Obſ. 35.* Oleum Amygdalarum dulcium & Saccharum, in forma Eleſtarij miſta, ante poſtum, ut ita deſinat per Oleum leſiri, per Saccharum vero ulcus fortè penetrans abſtergi poſſit. Nam quanta mala inferre poſſint Aciculis videtur in HILDANO *Obſ. 35. Com. 1.* THONERUS *pag. 136.* Aciculis per vias utinarias obſervavit. De Caltrivoro Pruſſia DANIELIS BECHERI *Progreſſus Regimontani KERKRINGIUS in ſpiffioris Anatomie Obſ. 41.* Alias res deglutitæ in Facibus vel harrentes, vel etiam in Aſperam Arteriam, aut ejuſdem ramos, ex improvis diſcipulis, aut intra OEſophagi ſuperiorem tractum adhuc harrentes: ea iterum artiſtice extrinſeque vniuunt, vel ulterius promoventur, deſorim trudent, vel tuſi vel artificiali ſternutatione, vel in ſpecie excitata vomitu per Vomitorium liquidum inſuſum, denſo fortè ejiciunt, propinando ſimul crebriſ Emollientia oleoſa pro viis magis lubricis reddendis. Aut denique, ſi huiusmodi non ſuccedat negotium, Inſtrumentis res tentanda, in quem ſacem vel Focicæ poſitis longis, vel Inſtrumentum WILLISII *Pharmacol. Rationel. Vol. 1. pag. 45.* aut HILDANI *c. 1. Obſ. 35.* aut huius ſuccedanea *cap. 6. Obſ. 34.* vel Candela cerea vel Spongiosa cum filo, item pro Aciculis, Humulis HILDANI *c. 1. Obſ. ſervat. 31.* adhibeat, quo ſaris extrahatur; quia periculum aliſis eſt, ne diutius in OEſophago harrendo, tandem ex dolore inflammatione & abſceſſum ſuppuratum, ſi non mortem ipſam, inferant: Conf. HILDANUS *Com. 5. Obſ. 35.* Denique obſervandum eſt, ſubinde res quaſdam duriſſimas in ſtomocho Panium diſtincto harere cum tuſi, & variis ſymptomatiſ quaſi phthiſicis, que omnia re extraneas loterum ipſone ea creta evaneſcunt: vid. HOECHSTEDTERUS *Ducat. 6. Obſ. ſervat. 10.* BORELLUS *Com. 4. Obſervat. 69.* PANAROLUS *Pneumol. Obſervat. 7.*

In ſtomacho ſi ſuerit vitium, prius ea cauſa, vel mala ejus methodicè curanda, vel Inſtrumento WILLISII *Pharmacol. Rationel. Vol. 1. p. 45.* utendum. *Sic ſecunda cauſa*, Cæminativa externa & interna propinando, inſtrè de Inflammatione ſtomachi dicenda. Quoad tertiam cauſam, Stomacho gratiſ & acceptiſ Inſuſendum.

Depravata Deglutitio, cum quædam curabilis, quædam non curabilis, illa verò Nervorum ex vizio ſpeciatiſ oritur; partim ex ſempum ſuprà tractatis, & prolixiſ ſatis aliſis ac diſtis, partim ſuo loco dicendis, Curatio maniſteſta erit,

S E C T I O V. DE CHYLIFICATIONE LESA.

DE Chyleſi ſeu Chylificatione notum eſt, quomodo fiat. Nempe promota ita alimenta ad Stomachum, tranſeunt ibidem in liquorem pulcatum, ſecundum Veteres Cremori Ptiſæ ſimilem, Chylum (1) appellatum ique non effectivè à Calore, ſed beneficio Fermentationis planè ſingularis, quam Calor Stomachi & ambiendum vicerum non levis promovet: de qua Chylificatione videantur MOEBIUS in *Fundamentis* p. 368. HELMONTIUS *hinc inde in ſui ſcriptis*, in ſpecie *Tractat. Sexuplex Diſpoſit.* item SYLVIIUS in *Diſſertationibus Medicis Diſſert. 1.* item CHAR-

LETON in *ſequentia animalis Exerc. 1.* item THOMAS CORNELIUS SENTENTIUS *Progymnaſia. Medicæ* & quidem 6. denique KERGERUS *Tr. de Vermenſ. ſect. 3.* GORREUS in *Deſcriptionibus Medicæ*, LANGIUS in *Epistol. pag. 276.* DIEMERBROEK p. 29. & ſeqq. *Anatom.*

Fermentatio hæc, qua tranſmutantur Alimenta in Chylum, dependet imprimis à ſacro ſubtili acido-ſaline, ſeu Fermento ſpirituiſ in ſtomacho ſaltem reperibili, qui partim inſtar Meoſtrui diſſolvit cibos, partim volatiliſ aciditate cum alimentorum particulis diſſolvit, in ſpecie ſaliniſ alcali-

(H) Optima quidem hæc ſunt omnia medicamenta pro impetata Deglutitionis cauſa tollenda. Verum quomodo morbi huius cauſam tollere poſſunt, niſi deglutiantur? Si autem deglutiantur, nullum jam erit Deglutitionis impedimentum.

(1) Xanthi propriè dicitur ſuccus, ſeu humor è corpore expreſſus: à Medicis autem ſumitur pro ſucco, quem Ventriculus per digeſtionem à cibus elicit. Quare quædammodum Xanthi eſt Græci ſuccel expreſſio; ita Medicis eſt *ſp. Diſſoluti* ciborum aliſis, quem Chylificationem appellant.

calibus, Fermentationem efficit, & ita utraque actio succedente in aliam efficitur, & liquor nemp plus minus spissum lactem, salum, volatilem, temperatum, Chylum dictum, quem non immerito liquidiori Cremori vel Pyssinae assimilant, transformat: Et si tantillum ad se aciditatis, attractu filis in perfectum falsedinem veniat: sub qua actione Spiritus primarii Efficientis, mediante necessario vehiculo Acido eturino, locum obtinent. Hinc ea omnia, quae vel sunt duriora, adeoque difficultur solubilia, vel quae sunt fale volatili multum depauperata, ut Alimenta vel exsiccata, vel fale condita, vel fumo indurata, difficillia solent esse digestionis. Hic duo notanda:

1. Quod Alimenta acquirant certam determinationem ad istud subiectum alendum; unde in prima digestionis fundamentum consistit totius nutritionis in toto corpore.
2. Quicquid non ita mutatur, non sit perfectè nutritivum, sed alterativum: Nam quae nutriunt nos, perfectè subunguntur, & haec sunt line omni molecula: Si autem viciatur digestio, & in primis vis depravatur, emergunt Cruditates.

Simile Fermentum acidum volatile, alimenta contrita levi Calore in vitro paucarum horarum spatio in liquorem salium lactem instat. Chyli artificialis convertens, Chymia, Natura amula, docuit curiosos, eumprimis TACHENIUM in Hippocrate Chymicae cap. 13. p. 22. quale Menstruum etiam ex Vinolo artificiosè parat BRUDITUS BOYLE in Philosoph. Experimental. p. 2. p. 20., mediante quo Alimenta non in Chylum tantum artificialem, sed hunc etiam postmodum la liquorem rubrum instat Sanguinis mutavit. Carnea salite fale volatili depauperata non bene digeruntur; Carnes verò infusatae solae difficillia. Maximi momenti negotium est hanc Alimentorum fermentativa Digestio, cum hoc ipso eadem disponatur, & ad heterogeneorum maturè in interfus separatum, & ad praemioem volatilisationem & spiritusalem in praecordis: id quod sine exacta Fermentatione fieri solet. Hinc in his, in quibus imminuta, aut Cruditate acida depravata est haec Fermentatio, ut in Cachectia, in his debita Sanguinis maturitas & spiritusale, adeoque debitus corpori deficit vigor.

Præsertim Acidi talis salini esurini & fermentativi cessatur Ructus acidi in fauci, & quorum optimus est Stomachus, naturaliter subinde præsentis, qui etiam Apepsia, Linitus, Dysenteria &c. supervenientes, resistit Fermenti digestivi indices habentur: hinc & Acida volatilia, speciatim Panis, tam grata & amicalia Stomacho, quatenus suo modo sunt homogenea: unde & a Martialium usu frequenter Ructus odorosi sulphurei erumpere solent, similes illi, qui sensibilibus odorata percipiuntur, quando Linitus Martis Spiritus acidus, nempe Salis, affunditur. Unde & Pinguis, quae acrimoniam Fermenti huius obdundat, uti Appetitum proferunt, ita etiam Digestionem in Stomacho turbare & impedire solent.

Origo Fermenti huius primario est ex Tunica Stomachi glandulosa interna, ex qua talis Lympha fermentativa quasi transudat, quae in rugis eius obvia habet reliqua quaedam Alimentorum prius digestionum, mora diuturniori non leviter accentescentes, & a Saliva continuo deglutita insigniter fusa, & ad Fermentum aliquis mutatur exaltatur, quae omnia multis usione Fermentum istud digestivum stomaiale consistunt. De Tunica Ventrliculi interna glandulosa videtur THOMAS CORNELIUS CONSENTINUS in Programmat. p. 232. item WILLIS in Pharmacologia Rationali p. 12. quam in specie continet Ventrliculus porcinus, & quo Obolus. Anatom. Amphibolus p. 23. Et ita fermentatur Alimenta, & ea, quae prius in Stomacho accedebant, successiva Fermentatione transmutantur ita, ut aut plumb, aut maximam partem, depositio illo acore abeat in usum, nunc infidum dulcem, nunc salum, nunc acidum, semper tamen naturaliter volatilem, idque varia sub temporis mora, dum in uno citius, tardius in altero, ob varias circumstantias, negotium hoc absolvatur.

Chylificatio haec & Alimentorum Fermentatio leditur tribus modis:

1. Quando plus minus imminuitur, & tandem plane abolitur, ut non sufficiat ut nullatenus digerantur Alimenta.
2. Quando arguitur.
3. Quando linguatur depravatur, unde innumeræ Ali-

Tom. II.

mentorum emergunt corruptiones: ad quas referuntur etiam suo modo, si sub digestionem copiose Flatu nascentur, Stomachum distendentes, inflationemque Stomachi intereunt.

C A P U T I

De Chylōsi imminuta, abolita, & depravata.

Chylōsi imminuta, & Abolita aliis dicitur Cellis & Chylificatio laesa; ratione modi fermentativi dicitur Pepsia laesa, Apepsia, & Dyspepsia (K) quae ultima nil aliud est, quam Alimento in liquorem viciatam conversio, ita ne & Cibo Pocuque non Chylum laudabile, sed vel Pituita, vel Humor acris, alcales, aut nidolorosus, fiat: Haerent siquidem Alimenta ultra ordinarium tempus in Ventrliculo, nullam plane vel exilem admodum mutationem in consistencia, colore & odore experiuntur, led cruda aut lemicoda, per quancunque viam exierint; ita ut partes vel non, ut in Apepsia, vel non sufficiunt, nutriantur. Malè in Abolita Chylificatione ingeruntur cibi, quia obus potius quam ut nutriant; unde HIPPOCRATES in morbis acutis à travi alimento incipiendam fuisse nutritionem. Aulla verò Chylificatio (L), utut pusillima, præter SYLVIIUM, eam inter Ventrliculi symptomata refert, dum omnem Digestionem laesam imbecillitatem Ventrliculi nomine exprimit, fit quando aut citius, quam debet, absolvitur, adeoque hanc, Plethora Habitata corporis aetheticis, quae HIPPOCRATES l. 2. aphor. 3. periculosum admodum pronunciat, sequitur: aut quando intra conferunt, ut Digestionis finitum tempus nimis immutatur Alimenta, ut me sic quidem convenientem corpori alendo materiam præbeat: simili modo ac massa quævis, nimiam diutius fermentata, corrumpitur & acetic: quæ tamen nimia Digestio via concipi potest. Quando enim eam Chyli aeternitas contingit, cum HELMONTIO Tr. Phys. Rector, ad Chylificationem potius depravatam accendenda erit: quæ fit, quando Alimenta talem mutationem experiuntur, cujus intuitu ad nutriendum corpus ineptissima, ad insana autem mala producenda aptissima, redduntur. Quæ Depravatur Alimento alio nomine rectè Cruditas dicitur: quare licet sit innumeris modis, dum variis ob causas Digestiones possunt viciari, in specie binæ illæ Cruditates, Acida & Nidolora, maxime peccant. Cruditas Pituitosa, quam SENNERTUS & RIVERIUS iungunt, ad Chylificationem immutatam potius referenda erit.

Cruditas Acida est, quando Alimenta abeunt in liquorem acidum fixum, plus minus viciatam, nec sufficienter attenuatum & volatilissimum, fundamentum & origo tantum omnium morborum Chronicorum: Siquidem omnes illi affectus, quos Praedicti quidam Veices, ut ex eorum latione notum, ex Antipraxis Pepsium seu laezaliqui eorundem Intemperie, Stomachi nempe calore debili, seu inaequalitate frigida, & hac vane simplici, vane verò composita, complicata cum intemperie Hepatis calida, derivant, revera ea Cruditate Stomachi Acida nascuntur. Sane ledit frequenter Praedictorum, etiam Moderorum, & impt nisi Italorum & Galorum, vos docebit, quod hi omnes accedunt inaequali Intemperie Stomachi frigidam & Hepatis calidam. Verum hæc in parte merito laudandos HELMONTIUS, qui prius caliginem diffudit, & Calorem non effectivè, sed dispositivè tantum, digere statim, & sufficienter confirmat, quando potius Fermenta & Permutationes laesæ ex causas proximæ introducitur laesam Digestionem. Nidolora Cruditas est, quae eadem eorum-rumpuntur lex, ut abeat in liquorem putrilaginosum horridi saporis & odoris, & omnino nutritioni incipit, quod Nider vocatur: qualis percipi solet ea usu Inguem, aut Otorum, cum Butyro fixiorum, nec adeo bene postmodum in Stomacho digestorum; tunc enim exhalant Ructus gravescentes, odorosi, qui solent comparari communiter cum Cruditate Nidolora, à qua illi etiam dependent.

(K) Pepsia Coctio est a pepsi verbo. Hinc Apepsia & Dyspepsia &c. abolita & turbata Coctio: qd & Bradypepsia seu tarda Coctio, d. Brachy, tardus.

(L) Aulla hanc Chylificationem, Taehypepsiam non ineptè appellatur, d. vixit celer.

C A U S A E.

Chylifici ergo laesi. Causa proxima erit vel in *Fermenti* stomachici, vel subiecti vitio, vel erit in vitiis *assumptorum Alimentorum*, seu Objecti haud recte proportionati.

I. In *Fermento* quidem, quando non sufficienter, nec legitime digerit, sed depravatam alimentis purius corruptum. Imprimis Fermentum Stomachi debilius, Spiritum animalium vel defectu, vel ad alias partes impetu, hinc parciore ad Ventricularem affluxu, frustratur Chylificationem, per causas de *Appetitu* praefata allegatas: hinc debilitati ut minus appetunt, ita minus etiam aut plane non digerunt, aut Spiritum defectu, aut in loco quodam dolentes, v. g. Nephritici, aut graviores Animi perturbationibus quae praecipuam, vel divertiuntur, vel accercent, aut quod concepta amentia sponte abhorrent Digestionem assumptorum: Stomacho enim nonnunquam per consensum afflicto, ut in Nepluridie, languet Appetitus, & tunc vitiatur Digestio prima, sicut etiam in *Vulneribus* Capitis in Stomacho Cruditates nascuntur. Animi etiam pathemata, Terror, Pavor, &c. etiam turbant Digestionem primam, & Cruditatibus Acidis occasione praebent: Quo etiam facit Motus corporis, qui moderatus promovet Digestionem: sicut etiam Somnus repentinus nonnullum, dat occasione Cruditatibus. Quae omnia pathemata agnoscunt Spiritus variis affectibus: nequam exemplum videbitis, apud HELMONTIUM Tr. *Phys. Lib. 6. c. 20.*

Deinde idem Fermentum digestivum, vel non satis acre, vel non satis volatile non sufficienter digerere valet, contra omnia acidum firmum, aut a vitioso & peregrino aere, vel salso vel alio vitioso sapore, vel facile aclescentibus, ut dulcibus, in Stomacho corruptum, uti fit in Hypochondriacis & Scorbuticis, Cachecticis & aliis morbis Chronicis, dissolvit quidem praeter Alimenta, sed eadem non rite fermentant, debet volatiliter nequit, nec in salisferum debitas abis, quin potius nimio acre eadem in malam vitiolam abis transmutat, ea quibus imprimis *Cruditates Acidae* emergunt. Quod si vero propter Pinguiam copiosius assumpta, aut Ova, *Diutius* nimis firma & condita, habebitur Fermentum adactivum, aut etiam ex perverso Biliis motu per vaicula flectitur, ex Intestinis haezilia in Stomachum aliquantulum reingrunt, ab hisque faule volatili oleo debilitatur, alteratur etiam eandem Fermenti adactivam, adeo ut assumpta Alimenta non possint convenienter digerit, quin propter talem praesentiam Biliis, vitiata Fermentum, succellive putrescant potius, & Cruditatem *Induram* constituent.

Quod si eveniat, ut quandoque occasione vitiolae Reliquiae ex praevius Digestionibus, vel rugis Stomachi firmius affinit, vel intra eam cavum etiam copiosiores aut parciore, neplurimum Putrescit vitiolae aut acide sub forma haerent, & harum praesentia impeditur Fermenti adactiva, cessat Appetitus, deficit Digestio. Inertia talis Fermenti digestivae etiam inducit in perversa cutatione morborum, si remedia sunt pulveres fiores, quales Antimonium firmum, ac Salia fixa, & copiose, in specie in acutis, praescribuntur. Observandum quoque, quod in reconvalescentia Februm Intermittentium adit libes stomachalis, ob inertiam Fermenti stomachalis, nimis hebetati, aut nimis hausti a copiosis talibus ingestis.

Equidem in unoquoque individuo, tam Brutorum, quam in specie Hominum, peculiaris, & a priori non pericratabilis Fermenti est varietas, ratione diversis usus Assumptorum: unde fit, ut non tantum Appetitus variet, sed etiam, ut ipsa variet alimentorum Digestio, ita ut ea quae unus appetit avidè, ea facillime digerit, alius e contra reipit, aut non sine molestia digerit: Appetitus hinc est index, qui loquitur & monstrat quali, quae sunt assumenda: Nam quae facile assumuntur, facile digeruntur; quia ea tantum appetuntur, quae appropriata sunt Fermento stomachici, & quae ipsi sunt amica, consequenter facile dissolvit, & facile fermentant. Hinc inculcat nobis HIPPOCRATES in *Aphorismis*: *Quid appetit facillime legi digeratur, quam vero asperius: Ita hoc fundamento etiam, Consuetudinis magna adeo est habenda ratio: Idem HIPPOCRATES, de omnibus morbis consuetudo, hinc dicitur, insuavis, licet malioribus esse preferenda dicit: Ratio est haec, quia ab omnibus Assumptis temper quaedam Reliquiae in plicis & rugis stomachi haerent, quae si non ingredientur materialem compositionem*

sem Fermenti, uti multi volunt: certum tamen est, quod nonnulli aut certo modo per Consuetudinem, Fermenti digestivi naturam quodammodo alterent, & ita modificent, ut ab ipsis saltem similia Alimenta magis appropriata reddantur. Hinc ab affectibus nimis alteratur, quia Fermentum illud quodammodo est homogeneum, & nulla est dyfficultas inter Assumpta & Fermentum, sed hoc se habet ad illa, ut proportionatum agens: E contra insuavis licet molestia, quoniam non habent convenientiam cum illo partes Alimenti. Hinc etiam il, qui certa quidam nonnunquam abhorrent esula, incipiunt a minima doli, & succellive ascendendo, cadunt ibi succellive familiarissima reddunt; quia ratione & Venosum vidui quidam affectu dicuntur, quatenus illud succellive Fermentum stomachici alteratur & mutatur, talia enim hostilia, tanquam amica, facile arripit. Si ergo ex his alteratur Fermentum, & crasi feminali degenerat, & praesentiam acquirat saporem: unde talia laevo & perversus super Fermenti stomachalis in Morbis Chronicis maximas turbas dat, eoque contumaces reddit.

Haez sunt vicia Fermenti stomachalis, superveniens & vitia ipsius stomachi, si licet etiam haez, quod malum in morbis malignis obviu, imo lethale est, vel exacerbat, vel caecitatur, vel patitur exerecentiam.

II. Quod etiam vitium Chylificis alterum: *Alimenta assumpta* sunt Causae Chylificae laesae, quando eadem certa ratione Digestioni sunt inepta, quod fit imprimis vel propter eorum *Quantitatem*, dum sunt nimis copiosa, vel propter eorum *Qualitatem*, dum sunt vitiosa, & Digestioni alias inepta, aut ipsa assumptionis ratione Ventriculo molesta. Quando enim copiose nimis ingeruntur, & varia nimis assumuntur, non possunt digerit, quoniam Fermentum Ventriculi digestivum hic habet in rationis adit insular Mensura, habet determinatam adactivam, ultra quam non pergere potest: sicut unumquodque Menstruum fermentativum, quod solvit & fermentat, requirit proportionem objecti debitam, in quo agere debet.

Habebatur ergo ratio Quantitatis, ne plus assumatur, quam Fermentum digestivum solvat & volatilifit: Nam si nimia Alimentorum Quantitate obtinuit in tantum Fermentum stomachale, ut nec illud solvendo, nec convenienter fermentando volatilifit, sufficit: haez sepius nimia Quantitate Alimentorum oritur Cruditates Acidae, dum assumpta recipiunt quidem acorem fermentativum, sed propter nimiam copiam non sufficienter Fermentationis insinuantur: evolvuntur, seque loco Chyli, in forma posse crudae plus minus acide: nunc in stomacho haerent, cum gravant, Ructus movent, nunc hinc inde in Intestinis colliguntur. Quantitas tamen haec absolute determinari nequit, utpote quam Idiolytici, Aetatis, Vitae aetatis, aliarumque circumstantiarum diversitas variat; & certitudo de his vix alia reperiri potest, nisi quam ea mente HIPPOCRATIS de Veteri Medic. Text. 16. corporis sensus determinat.

Praeter Quantitatem, in specie *Farinaria* nimia Cibi etiam turbat Digestionem: ut enim magis, adeoque alchellifica ferè fit Fermenti stomachalis potentia: unde & semel variis admodum Cibos potest dissolvere & fermentare; certum tamen est, quod non fit universalis, quin magis determinatur ad hunc vel illum Cibum. Si ergo Pinguiam cum Acris, Acidam cum Dulcibus, Aromata cum Vino aut Spiritu Vini, Fructus horaei cum aliis dyspeptis, Lac cum Fructibus horaei & acidis, & quasi quadrata cum rotundis, tam promiscue ingeruntur (M); etiam certum est, quod Fermentum, dum promptius agit in unum quam alterum, & sic citius unum vel alterum fermentet, necessario exinde Digestio non leviter vitiatur, & pessime oriuntur Corruptiones & Cruditates, quantum comes est Mucus copiosus in Ventriculo relictus: vid. KERGERUS de *Fermentis*. Nam id, quod non recte digeritur, via necesse est difficultate per Pylorum transmittitur, unde vel copiosus Mucus obruit stomachum, vel retenta diutius in stomacho, tempore loci in putredinem & omnimodum corruptionem abeunt, & ulterius vitium Chylificis. Ob id recte HELMONTIUS, Sobrietatem, seu moderatam assumptorum quantitatem, cardinem totius Dietae esse dicit, ex Varietate enim Cibi etiam emergit Cruditates Adorales. Quantitas ergo Alimentorum debita, quam praescribit Appetitus, observetur.

Quo-

(M) Cibi etiam simpliciter maxime facit ad faciliorem Chylificationem, ostendit quoque & experientia praeorum Mundi hominum, qui paucis simplicibusque cibi contrarii maxime sibi & longevi erant. Postmodum multos morbus multa ferula fecerunt, neque sem multiplicitas, & multiformis assumptu condita & composita, ut non esset confusio vomitum cibum quodammodo festivo aut Seneca Epist. 93.

Quod Alimentorum Qualitatem, cum præscribitur simpliciter Appetitus, secundum quem delectus est habendus; nam verum *Verberibus* illi: *Quod sapit, variis*. Et ut denegetur *agro*, multum minus *Quod*, de Alimentis, modo ea appetant. Nam que cum appetitu assumuntur, facilius & sine labore digeruntur, modo non excedat in quantum, quia semper ratione habent in stomacho confectus alimentis non recedentes.

Determinantur autem Appetitus, & inde Alimentorum alimentorum Qualitates, cum per Consecutionem, quam per chylocrasiam. Quod Consecutionem in Alimenta Ventriculi molesta sunt, quando non iusto & consueta tempore, vel eadem, priusbus nondum integre digestis & excretis, de novo ingeruntur: *Consecutio* liquet in cibis: tempore multum vale, quantum HIPPOCRATES de *Vita acuta*. Test. 25. scribit; nam & his, qui bis in die alimenta capiunt, & his, qui semel, repentine mutationes nasas & morbos inducunt: Quod si autem qui intertempore Alimenta nova ingerunt, statim in Ventriculi gravitate, oblationes, anxietates, horborymos, &c. percipit; ita ut AVICENNA hoc errore aulium alium deteriorum prolestat, si semper ratione super nos quod non digelium, demittat.

Quæ veterem *Chylosi* in quibusdam, ubi res cuius est inimica, alteri gratia: unus cum desiderio videtur Calorem derogat, alter vero non: idem attendendum ne talia propinetur, quæ auvantur alias, quia facili corruptuntur, & præcipuum varias turbas in præcordiis, & Cruditates Nidorositas gressant. Quænam valeat appetitus res, Panis tantum monstrat, quem non salidissimus. Ratio, quia Fermento stomachi est amississimum, itaque propter Spiritum acidum volatilem in Panis copiosum, & quasi homogeneum & symbolizantem cum Fermento stomachali. Unde etiam Panis, ratione acris fermentativi in panificio concepti, vel tunc spiritus illius acidus volatilis adjuvat, ut reliqua alios promptius colligescant, & consequenter chylosificetur ac digerantur: nuda Panis quod melius est fermentatum, adeoque in eodem magis extractus spiritus omniacidus volatilis, etiam nobis saluberrimus: quod minus verò fermentatum, & quo magis spiritus & glutinosus, eo magis nocivus est, & ad præcipuum ab ita macrum erant, seu passim viscidum & etiam in stomacho. Urut autem Panis ex omnibus alimentis sit nobis familiarissimus, tamen uti omni *ingrediente*, ita Panis *passim*; quia nimis exinde acris alia sumpta omnia improprietat: & quia Panis motus fermentativus est alius, impeditur Digestio, quoniam illius ratione non alteratur Chylus in salum; huius verò ratione non habetur debile, & subiectum tale debet vitalis crasis sit characterem a Fermento digelivo, recipere nequit; impeditur adeoque notabiliter Digestio, cum passa viscidum & cruda relinquuntur subinde in stomacho. Et hoc etiam *debetur* illi, *Quare quidam Panem copiosius ferre quæant, aliis minus* p. nempe quorum volatilis ac lubellus, adeoque salubris potens est fermentum digestivum, ut v.g. in pluribus literatis, hi utipsum iam luduntur a Vino, huius acidu prævalente noni Fermentativo spiritus naturalis, cum nec debet fibili nec corrigi, nec appropriari tali subiecto potest; unde in talibus æstus facilis ac acidus, elixiens ac sulphure: hinc plures Hypochondriaci, item Cordis palpiationibus laborantes, carditis morbi solent: vid. LANGIUS *de* *Chylo*, Cap. 30.

Ita hanc Qualitatem Alimentorum, præ cæteris observantur sunt eorum *Durities*, & *Mollitas*: Duriores difficultur solvantur, & viscidiora difficultur fermentantur; hinc dura sunt viscidiora Alimenta ledunt Digestionem primam, & Cruditatem Acidam inducunt, facientes, ut in stomacho oriatur passa eruda viscidum ac talia ingesta. Non ergo permittenda nimis Varietas Alimentorum, cum in Ali-

Tom. II.

mentis variis etiam variis sunt proprietates speciales: varia enim Alimenta ad Graduum Nidorosam disponunt.

Pertinent hæc *Frangia* difficultur digestibilia, laboremque magnum Fermento stomachali facientes, eo quod aquis partibus, quæ tamen ad Coëctionem requiruntur, non miscantur. Præter Ciborum varietatem *Panis nimis*, aut uti in nimis confertim ingesta, vel Aquea que vis sunt, quæ insigniter turbant digestionem: Ratio, quia

1. Panis nimis nimis diluit Fermentum stomachi spirituum digestivum, itaque nimis diluendo quodammodo debet.
2. Quia facit Alimentorum in stomacho fluxationem, quæ ubi nimis fuerit, impedit nonnullam legitimam Fermentationem.
3. Quia totum stomachi ledit, eundem diffendit, easque fibras laxat & flaccidas reddit, ut, quælibet libet, non adeo commodè per Pylorum emitti possint: hinc eadem præter tempus in stomacho detenta corrumpuntur, & in vitia varia abeunt.

Hæc etiam referenda sunt nimis Potationes, quarum rationes LOWERUS de *Corde* p. 140. reddit. Quo etiam spectant, quando abique ulla, vel non sufficiunt Potu, Cibi solidiores assumuntur, cum maceratione necessaria hæc ratione defraudantur. Digestio Alimentorum tandem leditur, quando Alimenta non sufficienter masticantur, ita ut Masticationem qui negligit, Arabibus animam suam odisse dicitur: vid. HELMONTIUS de *Vita* Rat. §. 11. GREMPS *Arbor*. *Nov. l. r. 3. §. 3.* & MOEVIUS *Fundam. Physic.* c. 9.

Ex his facile patet, quid habendum sit de Veterum Imperie inæquali: nam eandem non habere fundamentum in re, patet ex eo, quod Sanguis qui calorem, & sic dictam temperiem vivat, omnibus partibus distribuitur regulariter, & proportionaliter moveatur ad Hepar & Ventriculum. Quamvis ergo Sanguis debito calore viget, & quoad æquali proportionem circuletur, tam ad Hepar, quam ad Ventriculum, tandem sane his ipsis eadem debita conciliabit Temperiem, & eodem modo debet calere Hepar, & caleat Ventriculus. In ista ergo, quæ dicit, Veterum Imperie, experientia non docuit, quod reverè semper subit visum Fermenti stomachali, quod fer nimis & viscidum acidum, nec facile volatilissimum, quin simul obrutum copioso mucro crasso, & viscido: Propter illius in talibus Cura non cum sit, quæ caliditatem stomachi & refrigerant Hepar, fed quæ vim habent attenuandi & dissolvendi, imò etiam volatilissimum & temperandi nimium Fermenti acorem (N)

Præter hæc causas primarias Chylosis inæ, secundariæ nonnullæ adjuvæ, quæ, quatenus rationem aut expulsiorem turbant, etiam Chylosin vitiant: quæ exemplum non inegantur est. Proccedunt Cartilaginis Enormis, quam lapsus causam fuisse Chylosis læsæ, & simul stomachi hypomotum, testis est expertus ZACUTUS LUSITANUS in *2. Med. Princ. Hist.* 16. quæst. 16. item Veracis Venericuli adnati, Chylosin turbare valent: quæ exemplum habet FORESTUS in c. 11. Obs. 12. & 30. Notum etiam est, quod Rous afflicti Calculo propter calculum nervorum, qui intercedit Ventericuli & Renes, similiter solent turbare Digestionem. Cura vi Forniam æsthericam, cui, quando urgebat dolor, linguebat appetitus, & hibeat Coventum: eum verò dolores cessarent, sedibat appetitus cibi & potus, & hibeat amaram Coreviam, quam in parvis simo bibere non potuit.

Præfixi jam paulo & accuratius Cruditas Nidorositas & Aciditas consideranda veniunt, *Aciditas* in Acido plus minus viscido Digestionis defectu oritur, consistit; *Nidorositas* verò *Cruditas* nihil aliud est, quam Patrodinis inchoata species.

H 3

I. C.

(N) Hæc Antiquorum Antipræxia Viscerum, sive Inæqualis Ventriculi & Hepatis Imperie, hæc tam absona et inanis excessivissima est, ut putat hic A. Petrus enim Prædicti quæ putaverint ciborum in Ventriculo digestionem Calore, tamquam à causa efficiente, fieri; quomodo sanguinis efficientiam Hepar crediderint, hæc à ratione illi aberrasti credendum, si nunciam Ventriculi digestionem, atque eandem tempore Calore excrevis indicia in universo corpore predeprendentes, Ventriculi frigida, atque Hepar calidum est reputaverint. Stantes autem Corpori in quo immittitur Chylositas, & Calor totum Corpus occupat simul observatur, familiarissimum Hypochondriaci est, nil mirum ergo si in Hypochondriaci efficientiam Viscerum Antipræxiam accuserint Antiqui. Si vero credas (quæmadmodum reverè credendum est) ex labefactis Ventriculi fibris, quædam effluvia fermenta crediderint præferri acidi fieri, atque eadem tempore acidum Chylum in acrem adeoque irritantem & æstusum Sanguinem degenerare; habet jam morbi-jam corpus statum in Hypochondriaci æstusum, in quo Ventriculi languet tam universi corporis æstus. Hæc enim, paucissimatis verbis, idem perferat tria ac Antipræxia Viscerum, vel Inæqualis Imperie Antiquorum, ut manifestissimum est. Nunciam quæque quid fieri hæc facili curatio est, caliditatem Ventriculi & refrigerantibus Hepar infusa, ut contra Petrus nunc A.; ita hæc nimis difficile est in medicamentis simul adhibere, quæ enim fibrarum Ventriculi & Fermenti digestivi robur conferunt, ac simul ea, quæ acrimoniam Sanguinis remouent, & æstus temperare valent: Hinc ergo si in Hypochondriaci æstus afflicti sit curatio.

I. *Cruditates Acidæ criticæ*

1. Ob acidorum Humorum in toto corpore abundantiam.
2. Ob Acidorum frequentem usum, vel etiam eorum, quæ licet non assu aciditatem manifestam præ se ferant, reconditam tamen & supervenientem fermentatione se magis efferentem possident: quales sunt Saccharum & Mel, quæ non minus in Ventrículo acedescere, quam extra hunc, spiritum acidissimum fundere, satis notum.
3. Ob usum Aromaticum acrimium & magis oleosorum, v. g. Piperis, Caryophyllorum, Zingiberis, &c. utpote quæ vel propriam aciditatem reconditam, vel acidiorum acrimoniam exaltant energiam, sapientiam & Cruditatem Acidam producant.

II. *Cruditates Nidorosæ* ut patet, observetur

1. Eam contingere in Febris, præteritis acutis, in quibus Fermentum digestivum, cuiusque debitas acor deficit, unde appetitus cessat, & alimentorum nausea supervenit, & Cerebrum convulsæ Impulsum suis nimis amaricantis humoris adit, Acidis contrâ delectantur.
2. Viri eandem à Bile, similibusque Humoribus alcalinis, ad Ventrículo copiosius delicta.
3. Viri frequentius ab Assumptis, quæ aut eiusmodi nidorosam dispositionem in se habent, quales sunt Pinguis, Oleosa, Frias. Fermentum digestivum & ejus acidum plûs nimis obundantia, quod facit in specie Ora, Lac, & Lacticia, Olea: aut quæ, si cum Ventrículo Fermento coeunt, acidum contrahunt, v. g. Limatura Martis, quæ dupliciter nonnumquam rictus aquæ acidioris movet, & si mollior acidum immergatur, aut cum eodem confingatur.
4. Quando Assumpta quælibet in stomacho diutius morantur seu retinentur: restât id idem H. E. L. MONTIUS: non potandum, quid Chylus vtri insit in foras subditi excretionis capax, quid diutius retineatur; nam ipsa nimis alienatur potius & corrumpitur.
5. Nidorosa Cruditates emergit ex humoris visibilibus, facit putrescibilibus, unde postmodum Diarrhoeæ, &c.
6. Dulcia, quæ sub diuturno calore ad amaricantem prona sunt, v. g. Pallasia, Glycyrrhiza, &c. eandem in stomacho facit Cruditatem Nidorosam contrahunt, sub quæ amaricant, seu, ut alibi dicti sunt, buiscent, de quibus supra.
7. Cruditatis Nidorosæ præteritis sunt signa Rictus, de quibus supra. Sic viri fecerunt nauseam super, eructant superius signa rictus & Nidum putredinis, inde fecerunt vomitum & superius nauseam.

Ex his præsuppositis verè loquar, fieri Cruditatem Nidorosam, quando Fermentum stomachi vel deficit, vel Assumptis plûs nimis ad hanc tendentibus ac dissolutis infringitur. Unde debito modo nec fermentalem acorem contrahunt, nec digerunt Assumpta, sed mox sua in loco calido humido ad Corruptionem plûs nimis, pro paucis Assumptis feracibus, vel annuunt vel vegetabiliem, ordinariè facili putrescibilem, disponantur. Unde pro Putredinis natura Alcali emergens, agens in Pinguis, saporis uterum, vi explicabilem, subinde amaricantem, representabit. Præteritis hæc illustrant Ora, quibus vi citius quid aliud nidorosum contrahere observatur; hinc etiam eandem ad duritiam codæ, brevis pot tamen nidorosum eructant. Deinde facillimè Ora cum furore sua acidorem coquant: Alcali nempe Ovorum copiosum agit non solum in proprium Oleum, sed simul in abundantiam adjectum Butyrum, unde & hujus additi ratione, & Acidum stomachi magis obundat, atque ejus activitas fit pariter ratione, & nidorosus vi intenditur: Hinc rictus Rictus erumpit, qui indicant quidem inchoatam Fermentationem, sed depravatam, & in ipsa actione et interitis Fermentis digestivi deficientem, unde ex Putredine Concocturam Rictus tales ricti oriuntur. Accedit Pylorus in furorem adus, qui portas transitus claudenda, irritatus ab hostili Concocto, dicta digerendo retinendoque, magis magisque eorum putredinali Corruptioni occasionem præbet.

DIAGNOSIS.

Quoad Signa Diagnostica, ex sunt facilia. Nam in Chylis plûs nimis immutata, præter ea, quæ habet S. E. N. NERTIUS l. 3, Prax. p. 121, concurritur ægri de Dolo graviativo stomachi diutius horis post passum: item con-

queruntur ægri de Rictibus, etiam quinque vel sex horis ab alimentorum assumptione maleis, itaque non acidis, sed nunc insipidis, nunc parvis, nunc palpitantibus, nunc genium assumptorum odorem & saporis saltem representantibus: qui sunt, si assumpta non digeruntur; unde diu à pulis assumpta plant non, seu leviter immutata, rejiciuntur. Percipiunt Dolorem gravativum circa præcordia post passum plûs vel minus obortum: Item coqueruntur tales ægri de Appetitu maxime & fore seipsum deiectione de Infusione stomachi à pulis: Item adit super Pectus & Diasteno præcordiorum. Præterea insalubres subiectis, impiiis Hypochondriaci, mox post passum adit Phlogoson seu rubet faciei, quasi essent ebrii, seu quibus semper observandum, quod semper fiat à stomacho, eo tempore copioso Mucis nimis acido, ab alimentis non rictè digestis refuso, onerato: Item coqueruntur ægri tales ut plurimum de difficili Respiratione, ita quidem, ut Respirationis impedimentum percipiunt in præcordiis, in specie dum dorso incumbunt, eo tempore inchoantem hypochondriacum: Item matutino tempore solent habere Quæ pueris de Mucis vitio plenum, quæ revera est à stomacho, dum per recubationem nocturnam regurgitat & predestinat ad oropharyngum tendit, & ita matutino tempore exoritur: Urine à illa naturali recedunt, dum modo tenses & aquosæ, modo crassæ & rubræ turbide apparent. Omnia hæc symptomata sunt in Digestione immutata & asidua, propter succum fermentativum crassum & obortum, qui nimis potest fermentare, quin potius alimentis sub forma liquoris aut palis vitiois acide & fluxulentis in stomacho subiebat. Ceterum quando depravata est Digestio, illam testantur imprimis Rictus. Subinde Vertigine corripitur, imprimis ricti, quales Vertigine, impiiis in nodum senectutis, semper radicem habet in stomacho. Hæc & similia signa ut plurimum etiam in malo Hypochondriaco occurrunt, tam in principio quam incrementum, cum hujus mull, rictus revera hærent in stomacho.

Cruditates Acidæ conculcitur ex Soda, Rictus acidi & copiosioribus, item in talibus ægris solent præ cæteris copiosius esse flatus, & quæ erigunt, aut acuta sunt ære, præ vomitum sunt admodum crassæ, vitiois, ac pituitosæ, interdum ferulæ, plûs minus acida: Alius subinde et consumat, ubi facies ab acido vitiois coagulata & indurata: alius plenum est asidua.

Cruditates Nidorosæ Rictus habet fortis aut saltem horridus insar Ovorum furorem: aut Pictum præteritis, atque hinc non saltem, præteritis matutino tempore, percipiunt saporis eregientem & abominabilem, quæ eructum seu ligni putridi, quem sufficienter exponeat æqueat, subinde umor etiam Cardialis & alysalis mulca percipitur ex Ora & stomacho: quæ aut Naturæ insalubri sibi vomitu rictus, sunt liquida, sunt flava, & ut omnia insipida, aut quodammodo amaricantia, aut insipida-dulcia, aut ex amarior dulcescentia. Præteritis habet Alium sapientiam plûs solito aptam, & tales Cruditates Nidorosæ laborant.

Cruditates Præteritis pondus frigidum in Ventrículo habent, & hujus gravitativus dolor indicat.

PROGNOSIS.

Quod attinet signa Prognostica: certum est, in Chylosis interitis & Cruditatibus consistere fundamentum completum Morborum, in specie Chylosorum, quatenus vitio Digestionis prime non in secunda, multo minùs tertiarum rigitur: nam Cæchyliæ est mater Cacochymæ, adeo ut ex Cruditatibus Acidæ & variis diversis originibus sunt Febris Intermitentes, Malum Hypochondriacum, Scorbutus, nisi hic oriatur per contagium melle linguæque communicatione, Cachexia, Passiones Colicæ, Pathemata Arteriarum, Calculi Reum, Affectus Melancholici, in Mella languens deficiens Hamatosis, revera originem doceant sicut similia acor in stomacho, vitiosus alimenta, et ipso Morborum Cancrosum, Scabiei, Serpiginis, Herpetum fortis & Erythematum.

In genere omne acidum seu acor vitiosus subinde in corpore oberrat, fundamentum habet in vitio Digestionis ex corruptione acidi. Arthritis patit, dum Vnum acies in Ventrículo, aut putrescit ex vitio acore tinda, prout in corporis, ex hac Acida stomachi Cruditatibus habet suum ortum: Imo omnes illi Affectus Chronici, de quibus in posterum plura, qui alias ex Obstructione Viscerum & Melancholici, Hepatis & Lienis, corumque antipraxis cum frigida Ventricali Intemperie oriuntur dicuntur, revera ex vitio Chylosæ, & in specie, quando Fermentum stomachi est ni-

mis acidum, nec rito volatiliſſimum, dependent.

C U R A.

Quoad *Causas*: Digestionis vicia, quæ à cauſis externis dependent, ſacile corriguntur, cauſis illis ſublatiſ, & mox liore Viſcus ratione inſtituta. Impoſſibile eſt arte promovere vel inhibere Chyloſin; eſt enim opus ſimpliciter Naturæ, & doſi vitalis Fermentorum appropriati, juxta HELMONTIUM, nulla arte imitabili. Ob id adjuvamus ſaltem Naturæ opus, & corrigamus Fermentum Vetriculi, quomodo heri poeſt, & reducamus in naturalem ſtatum.

1. Impedimenta quæcumque, Mucum nempe & ſuccos in Stomacho hærentes, utpote craſſes & viſcidæ de acidis, removere: quod imprimis fiat per *Pomaria*, & hinc *Pargania*, in ſpecie Aloſtica.
2. Stomachum extergendo *Aromaticis volatilibus*, Salcalcalina oleoſa conſtantibus.
3. Stomachum leniſſimè quaſi ſtimulum addendo, blandioribus *Aſidis* ipſi gratis.

His tribus modis curatur Chyloſis læſa.

Quoad *Primum ſuſcepit*: *Pomaria* primum obeineat locum, erudicatos, omneſque ſordes poſt Digestionem reliſtas, veluti erudicatos ſuccos, removere: inter quæ ſuperius dictam, Inſuſa Antimonialis eſſe præferenda, in quibus non tam eſſe ponderanda ſubſtantiam, quàm liquorem, in quem ſit inſuſa; verivobis enim eſt, quod *Hypochoſiæ obſcuræ aqua ad vomitum ſalubris* ſit. Imprimis per materia viſcida & tenaci in Stomacho reſolvenda & rempunda, comode præparatur Vomitorium.

℞. Aqua Myſopi ℥i.

Cinnamon. ℥i.

Spiritus Gum. Ammoniaci ℥℥ ad 3℔.

Olym. Squill.

Syr. Emet. an. ℥℥.

M. S.

Hauiſus Emeticus præ non vice.

Poſt Vomitiæ *Pargania* impedimenta removere: inter quæ Maſſa Pilularum de Hierva cum Agarico in ſubſectis paulò reſolutoribus conducit, ex qua ſuperius dedi Formulam. Præter hæc Pilulæ Maſtiche ſunt elegantes, & Stomacho appropriatæ; nam Maſtiche eſt ſingulari ſtomachico, ratione ſpiritus acidi volatilis. Toteſ ſemora alvum equantia, eſt Aloë, maxime Pilulæ Aloëphragme et aromatis factæ, hæc ad imitationem ZWELFFERI correſpondet, vid. *aus Aſiæ medicæ Pharmacop. Auguſtanæ*: Stomacho eſtim conducunt, & ſi aromatica tonum ejus reſtituunt. Si volumus ejus laxativum reddere, uno alterove grano Scammonii acuatior, ſic magis conveniunt ad detergendas ſordes emulſaginosas. Stomacho ſæpe adhaerentes. Duobus exemplum hoc modo excipimus.

℞. Maſ. Pilul. Aloëphrag. v℔ de Ammon. gr. xvi. ad 3℔.

Tartari viſcali gr. vi.

Scammon. ſulphur. gr. ii.

Extr. Trach. Alband. (quod egregium eſt ad petuitam viſcidam incendendam) gr. ℥.

Cum *Tartaro Tartari* (quæ ſtimulat, & eſt ſalina abſtergens) ſ. *Pilula. S.*

Pilulæ Stomachicæ laxativæ.

Vel

℞. Maſ. Pilul. de Hiv. cum Agar. vel Pomaria. Zwelf.

Extr. Potholym. Croſſi, vel Carbol gr. xv.

Gumm. Ammoniaci acris (ſquill. ſul. vel Extr. aut ſucc. Inſup. Aloëphrag. ℥℥. vel gr. xij.

Extr. Trach. Alband. gr. j. vel ij.

Scammon. ſulphur. gr. i.

Cum *Elix. propr. vel Eſſ. Mentha. vel Spiritu Maſch. f. Pilula.*

D. S. ut anteq.

℞. Maſ. Pilul. Maſchic. ℥i.

Extr. Aloëphrag. ℥℥.

Trach. Alband.

Scammon. ſulphur. an. gr. ij.

Cum *Eſſ. ſigill. Saſſapar. vel Extr. Tartari, vel Eliz. propriæ. f. Pilula. D. S.*

Pilulæ Stomachicæ Purgantæ.

Vel

℞. Maſ. Pilul. de Ammoniac. Rore. ℥i.

Extr. Martis cum ſpir. prop. ℥℥.

Trach. Alband. gr. ij.

Olei deſſilati, Meſ. gr. j. vel ij.

Cum *Pilula tartari f. Pilulæ deſiderando.*

D. S. ut anteq.

Poteſt etiam beneficio remediſſimum Salinorum, imprimis ex Tartaro, heri Pulvis Laxativus, & Stomachum egregiè evacuant.

℞. Tartari viſcalis.

Cremor. Tartari an. ℥℥.

Scammon. ſulphur. gr. iij. vel iv.

Trach. Alband. gr. j. vel ij.

Olei deſſilati. Anq. gutt. ij.

M. f. Pulvis. D. S.

Pulvis Stomachalis Laxativus.

Nam ultra 2. vel 3. ſides vix operabitur, pro conſtitutione tamen ſubſecti.

In ſirma liquida pro ſubſectis facilis purgationis, præpemptis mulieribus delicatis, ſat talis poſito:

℞. Aqua Aloëphrag. vel Myſopi,

Mentha an. ℥℥.

Tartari viſcalis.

Extr. Agar. an. ℥℥.

Trach. Alband. gr. j.

Scammon. ſulphur. gr. ij.

Syr. Ref. ſeſal. ℥℥.

M. D. S.

Hauiſus Purgans.

Deſcriptionem *Formula deſpectu*, ſeu *universalis* habet SYLVIVS 2.9. §. 52. item 2. 12. §. 50. Exemplum tallum Pilularum, ſordes in prima viſi abſtergentiam, quæ Francofurtensibus ſut Gialliſis ſubſecti poſſunt, ſit:

℞. Gum. Ammoniaci Acris ſol. ℥℥.

Maſchic. el. gr. xv.

Aloë ſuccor. gum. prop. gr. ix. vel xij.

Extr. trach. Alband. gr. iij.

Cum *Eſſ. Mentha. f. Pilula an. 60. S.*

Pilulæ Stomachicæ laxativæ pro aliquot vicibus. De quibus ſit ſolis una vice 2. xii. xv. præter præter, idque omnibus tribus vel quatuor ſeptimanis pro ſubito. Omnes ſordes viſcidas decurgunt, reſolvunt, & ita cruditates acidas, & mala inde nata prætervent, conveniunt in morſis Chronicis, Cathedricis, Hypochoſiæ.

Aliam adhuc compoſitionem loco *Pilulæ* in *Gialliſis* communicavi in *Colleg. Pharmac. in Loderio. & Coll. Pharmac. Pertinent* huc *Pilula de Ammoniac. Quercetani* in SCHROEDERO, *Familiares Zwelferi*, *Pharm. Reg. p. 66.* & *Pilula Tiliomanii famigeratiſſimi*, in *Idea Form. & Coll. Form.* item *Pilula Benedicte Striederii*. Modum parandi alias videbitis in LUDOVICI *Pharm. ad Myſtem. ſetulum accuſmod. p. 179.* item *Re. de Sale tartari vol. de ſar.* Alii non incommode Cremorem Tartari in hunc finem adhibent, a 3℔ ad 3℔ in pulcilo carnis vel puli bene calido, horæ una alterate ante præſum, quavis ſeptimana ſemel uſurpanda.

Alterantis contra Chyloſin hæſim ſunt ea, quæ eſſant Sale volatili aromatico blando, quæ ſi maricatur cum ſubſectis Acidis, ſunt egregia remedia. Et his imprimis commendantur *Somina*, quæ vocantur *minora Catida*, Apſi, Carvi, Petroſelin, Camini, & poſt hæc præ cæteris Galanga & Zingibor. PLATERUS in *Oſi. l. 2. pag. 408.* egregia aliquot habet exempli Chyloſis & Cruditatis, vitio Stomachi & primarum viarum, Curatæ per ſumum Zingiberis, ſive crudi ſive conditi, ac poteſt oporſi meſe uſurpari. Radix Acori veri coctita mano comefeſt quæcumque Cruditates & Apeptias corrigi. Nux Moſchata quidem etiam eſt elegans, ſed quia eſt nimis obſeda, & ob id obtundere ſolet Fermentum Stomachi, aliis ſubſedo eſt temperanda, imprimis ſimplicibus Stomachicis diſſis, quæ ſunt ſatis nota. Præ cæteris palmam obtinebant Abſinthium & Mentha, quæ ſunt duo ſingularia Stomachica: hinc à quibusdam Moderat Vinum abſinthiacum, quod mirabiliter ſordes & vitia Digestionis primæ eliminat: Poſt Abſinthium Myrrha, notum Zedaira, item Acorus, Roſmarinus, & Lignum Saffraſ, & quæphiora ſupra à Apetitu imminuunt ſeu Anoreſia allegata ſanguine conducunt.

Item Acid ſpirituſa præ cæteris conducunt, ut *Spiritus Salis dulcis*, qui eſt optimus; item *Spiritus Nitrî dulcis*; *Spiritus Maſchicæ* bene rediſſus, æquæ eſt egregius, miſtus cum *Spiritu Menthae*. Magnam etiam meretur conſiderationem *Eliz. Reparatæ Paracelſi*, quod tamen hoc ingredientem liquorem Alcabæ, præparare non poſſumus. HELMONTIUS alia ratione in ſubſectis præparavit, qui videtur. Vulgo præparatur cum *Spiritu Rosæ*, æquæ cum *Spiritu ſulphuris* ut *Piluli Acidis*, lege conſumit: hinc duplex habetur, cum & ſine acido, *Eliz. ſine acido* præparatur cum *Alcali ſar*: cum Li-

Lixivio nempe Salis Tartari solvantur species, hinc inspissatur: inspissatum magnati affunditur Spiritus Vini tartarificus; & admodum est hoc utile mulieribus & infantibus in Cruditatibus Acidis: in quibus etiam aliisque affectibus, cum Alesti volatili paratum misce potest, si Spiritus Salis Ammoniaci cum Spiritu Vini paratur & speciebus affunditur. Dicitur est fessal lequari, cuius doli gurg. jss. Alias *Elis. Proprietatis rursus* acce per se in Cruditatibus Nidorosis maxime conducit, nullum cum Spiritu Cochlearis, qui egregie convenit: c. g.

*℞. Elis. Propriet. ʒij.
Spiritus Cochlear. ʒi.*

M. S.

Elisir Stomachale.

Dosis gutt. 80. mane.
Convenit etiam egregie *Elis. Virelli Myel.* rite paratum à ʒij. ad ʒss. & *Elisir Stomachale D. Michaelis*, cuius superior facta sunt mentio. Efficacia Mellifici, Menthae, Pulegii, Rorismari, Ligni Sassafras, Myrrhae, cum Spiritu Vini tartarificato paratæ, omnes conveniunt, si addantur cum parva quantitate Spiritus Salis, vel Spiritus Vitrioli; sic enim concipiunt subtilem volatilem acorem; v. g.

*℞. ℞. Mellifici ʒij.
Spiritus Vitrioli phleg. ʒij.*

M. S.

Essentia Stomachalis.

Dosis gutt. 40. vel 50.

*℞. Elisir Stomachal. ʒij.
Spiritus Mastich.*

Cochl. an. ʒi.

M. S.

Elisir Stomachicum.

Dosi ʒo. vel 40. gutt. bis in die,
In nimia & contumacissima Ventriculi mucilaginis opellus est Spiritus Althematicus, vel solus vel mistus; ut

*℞. Elis. Stomach. Dofler. Michael. ʒi.
Spiritus Althematic. ʒss. vel ʒij.*

M. S. ut antea.

Dosi ʒs. vel ʒo. guttularum est egregium & optimum remedium.

Cydonia, & omnia ex his parata: ut Succus, Symplicus, &c. miri conducunt ad perveniendum Digestionem. Interdum etiam sunt *Vina medicata*, ut Vinum absinthium, vel Vina tale medicamentorum juxta SYLVII *Praxin*, ex Absinthio, Mentha, Radice Gentianæ, & Acori veri, aliisque aromaticis, quibus de Mace, vel Zingiberis aliquid, potest addi: c. g.

℞. Herb. Menth. crisp.

Galenum. montan.

Althick. an. M. ʒ. vel M. j.

Rad. Eual. Camp. (quam superius commendatam cum Rad. Armorac.)

Acori veri res. an. ʒi.

Galanga ʒij.

Cinnam. an. ʒij.

Mace ʒi. (tantum, quia nimis oleosa)

Semin. Anis. ʒij. ad ʒij.

Concisa & contrita includuntur Nodulo. S.

Nodulus pro Vino Stomachico.

Nodulus bis infundatur in Menf. j. Vini *Almonæ*, sicut per horas 12. in loco calido: De quo capiatur ante primum horum haustus, singulis haustibus addendo Spiritus Salis dulcis (qui acidum volatile) gutt. xv. vel loco huius *Elisir Proprietatis*, imprimis cum Spiritu Cochlearis factum & paratum.

℞. Herb. Menth. crisp.

Althick. an. M. ʒ. vel M. j.

Rad. Eual. ʒij.

Zingib. vel Zedaira. ʒij.

Cinnam. an. ʒij.

Semin. Anis. ʒij.

Facit & contrit. inclut. Nodulo, Vino infundendo, ut in eodem ex vehiculo Spiritus Salis dulcis gutt. xv. ad ʒss. affundantur.

D. S. ut antea.

Item:

℞. Herb. Althick. an. M. ʒ.

Mentha M. j.

Rad. Acori ver. res. ʒij. vel ʒij. (aut huius loco Zingib. vel Zedaira. ʒij.)

Cinnam. ʒij.

Includ. Nodulo. D. S.

Nodulus pro Vino Stomachico.

Elodurii loco sufficit Rob Baccarum Janiperi, imprægnatum pulvere Zingiberis aut Macis, addito paucio Saccharo ad imitationem PARACELSI.

Conveniunt ulterius egregie Salina, Mucum incidentia & abstergentia, inter quæ Sai Ammoniacum, vel vulgariter depuratum, vel ad imitationem HARTMANNI *cap. 26* nobile est stomachicum in Chylo Iacta, propinatum à ʒij. ad gr. xv. in Vitis absinthie, vel Vitis insulsus Lugni Sassafras. Post hoc non minus etiam Vinum vitriolatum seu *Arsenium duplicatum Myel.* egregium est in affectibus stomachicis, aut etiam Tartarus vitriolatus ad imitationem TACHENII paratus, imprimis si cum aromaticis speciebus Distinctionis per se, aut cum speciebus Diagonalis, aut stomachicis *Myofitidis*, Cubebis, similibusque Pulveribus stomachicis mistum: item Terra foliata Tartari, seu sal Tartari essentialia, Hepaticum rubrum, aut Gremori Tartari, vel solus vel cum sale Tartari, vel similibus Pulveribus stomachicis mistus. De spiritibus dulcificatis res nota est: nec Mixtura simplex est inegans, cum ex acido volatili temperato confect; item Spiritus Carminativus de tribus, de quo infra mentionem faciam, egregie convenit. Nodi si sunt *Pulveres Stomachici Biermanni & Quercetani*, in quibus Iacta est Radix Ari sale volatili acris & penetrans juxta præparata: cum vero in arida Radice maxima pars salis volatilis volat, & ob id inanis nonnulli evadat, melius est, ut insulsio fiat cum Radice Helenii in Vitis. Præterea pertinet Rob Pulvis stomachalis D. MICHAELIS, cuius compositionem supra de Anorexia dedi. Vel

℞. Rad. Ann. ʒi.

Lapill. Cancr. præp. ʒss.

Salis Althick. ʒij.

Olivi distillat. Caryoph.

Macis an. gutt. iij.

M. I. Pulvis pro tribus doibus, S.

Pulvis stomachalis.

Vel

℞. Pulv. Rad. Aron. ʒss.

Flor. Sal. Ammon. ʒij.

Piper. nigri ʒss.

Zingiber. ʒss.

Olivi distill. Calam. arom. ʒij.

M. I. Pulvis.

Convenit item *Trages Stomachalis*, quam dedi in *Colleg. Pharmacop. Sederber. p. 2. Class. 1.*, vel bujus loco sal volatile oleum egregium est. POTERIUS in uso habuit *Spissum Stomachicum*, quo plura præstitit in suis agris: descriptio nullibi præstat; nemo igit præter *Aliam* POTERII, Bononiæ degestem. Interim probabile est, quod fuerit remedium Antimoniale ex Regulo Antimonii Martialis paratum, ad imitationem feræ Antimonii diaphereticæ. Ad speciem stomachicam pertinet etiam Chocolata, que est succus inspissatus ab India ex fructibus Cacaum Germanicæ *Koe Xei Nasse*, conditus cum Cinnamomo & Piperis: Hæc in Vitis vel Lacte cocta & pota, est egregium stomachicum, & simul antiscorbaticum: vid. ZACUTUS LUSITANUS *l. 2. cap. 7. Prax. admin.* In viribus roborandis etiam conducit. Angli ergo haustum de hac operantur propinquant pro meliori operum promotione.

Hic pro scilicet annumeranda venit Ambra grisea & Medicamenta saphata, que in Chylo Iacta Senum sunt optima; vel in forma cum *Saccharo*, vel liquida usurpata, cum spiritu nempe *Menthae*, vel *Melle*, vel *Salvia*, in *Arsenium Stomachicum* redacta.

Non spiciat præstari est *Aeris Theri*, plangit apud Chineses & Japonenses singulari virtute: ad nos tamen sicca adfertur, que britha Sienibus & Japonensibus elegantissimæ est medicina, que non tantum stomachum roborat, sed & præcipuis liberat & præferat à Calculo & Arthritide, morbis Chinesibus & Japonensibus propter huius plantæ frequentem usum incognitis; item in Cephalalgia potenter convenit, præsertim ab ebrietate, & somnum arceat, stomachum impemissis confortat & vigilas citra virium debilitatem etiam ad tres dies noctisque protrahit. Usus est, ut Folia, quotum pugillus magnus cepit, aut infundantur, aut coquantur in Aqua simpliciter fervida, obiecto paulillo Sacchari, & illud insulsum aut Decoctum postmodum subinde calide haustur; ac talia non pugillus pro tertio ad minimum vice sufficit. Essentia quoque cepit paratur beneficio Spiritus Roris Majalis, qui ammoniacalis Gullivi est impregnatus. Item Elisir Menthae coquebit: Vel

℞. Aqua Cinnam. Spiritus ʒij.

Elisir. Menth. ʒij.

M. S.

Haustu.

Hauſtulus Stomachalis.

Dofis cochli. i. vel ij. in fine pulvis.

Conducit etiam Effluvia Piperis cum Spiritu Vini parata, & *Rofina compofita ut Salvia, Zedaira, & Myrrha*, cum Spiritu Salis Ammoniaci vinofa parata, dofis 40. gutt. item Aqua Stomachica Mallicina: c. 3.

℞. Maflich. xl.

Rad. Arerivulg. an. ℥ij.

Galang.

Caryophyll. an. ℥j.

Clausa. ℥℥.

Zingiber.

Maflich. 3℔.

Mis Solam affunditur Vinum Malvicinum: digerantur in loco calido, hinc per Balneum Mariæ deftillantur.

Dofis effi cochli. i. vel alterum per intervalla ante prandium vel cœnam per horam unam: item linteum multiplicatum eo madefactum commodè applicari potest regioni Stomachi.

Hæc in genere de Chyloſis loſione.

In ſpecie quoad *Credulitatem Meliorem*, cuſ ſimpliciter incorrigibilem, id quod corruptum, evacuandum eſt. Conveſcit autem Vomitus, ſunt Evacuatio per Rhabarbarum & Tamariſcodum. Præterea curatur per Precipitantia terrea, inter quæ eminet Cryſtallus præparatus. Poſt horum exhibitionem mirè conducunt Julebi acidulati, & Subacida volatilia, Cydoniata, Succus Citri, Succus & Syrupus Portulacæ, item Conſerva Roſarum aut Menthe virgularis, Spiritus Salis dulcis, Vireoli dulcis, Elixiir Precipitatus, Spiritus Maſliches, Pulvis Hepaticus ruber, cum Elore ſine igne, Gremori & Cryſtalli Tartari cum Corallii rubric. c. 3.

℞. Crem. Tartari, vel Pulv. Hepat. rub. 3℔.

Corall. rub. præp. ℥j. ad 3℔.

M. f. Pulvis pro a. doſibus. D. S.

Pulvis Stomachicus.

Vel

℞. Pulv. Hepat. rub.

Uter. ſine igne an. 3℔.

Citri doſ. Macis, vel Nuc. Maſlich. ij. vel iij.

M. f. Pulvis pro aliquot doſibus.

D. S. ut antea.

℞. Salis Diſſol. Hypochond. 3℔.

Lapilli Cancr. præp. ℥j.

M. f. Pulvis pro duab. doſibus.

D. S. ut ſuprà.

℞. Arcan. doſt. ℥j.

Cib. Sep. præp. ℥j.

Pulv. Nuc. Maſlich. gr. vi.

M. pro duab. vel tribus doſibus.

S. ut ſuprà.

℞. Arcan. doſt. ℥j.

Spec. Diarrhœop. ℥j.

M. pro duab. doſ.

D. S. ut ſuprà.

℞. Lign. Terraſol. Tartari 3℔ij.

D. S.

Effluvia Stomachica.

Deſtur pro doſi 40. ad 50. guttulae.

℞. Spirit. Salis dulc. 3℔.

D. S.

Spiritus Stomachalis.

Dofis ſunt gutt. 30.

℞. Aqua Mentha 3℔.

Cinnam. 3℔.

Succ. Cydonior. 3℔.

Syr. aſterel. Cieri 3℔.

M. f. Pulvis. S.

Hauſtulus Stomachicus.

Vel

℞. Aqua Mentha 3℔.

Cinnam. cum Vinis 3℔.

Syr. Cydonior.

Peruul. an. 3℔ij.

Spiritus Nitri dulcis parum.

M. per Potione. S.

Hauſtulus conſectus Stomachicus.

Credula verò *Acida* corrigitur per Abſorcentia & Acidum deſtruentia, ac Aromatica volatilia, ut Cocchiacium, Centaurium minus, Rhabarbarum in nodulis, Abſethium, & omnia ex ipſa parata, ut Radicem Holeni, & Armaraciam, Acori veri, Vinum & Cereſivum abſinthium, Eſſentias, &c. item Caryophyllum, Nucem Moſchatæ, Zingiber, de quo reſert PLATERUS, Poſtifiſcos poſt jejuniū Quadrageſimalis tempus cruditates, ex picciſum eſſi calidiſſis, opinio pulveris Zingiberis uſu corrigere, & mala inde nata avertere: per Eſſentiam & Spiritum vegetabilis volatiles, Mentha, Salvia, Cochlearia, & ſimiles, item Aquam Vitæ Maricki, Spiritum Antiſcorbuticum, Naſturtium, Piperiſtid, quæ eſt planta accerit ſaporis, & potentiſſima in corrigenda Stomachi Cruditate *Acida*: Eſſentiam Ligni Saffraſis, & ſimilia, quæ acorem temperant. Cinnamomiſta hæc etiam conferunt, Galanga, Mentha, Fœniculum, Roſmarium, Tinctura Tartari acris, Elixiir Proprietatis ſine acido & volatile, Spiritus Salis Ammoniaci volatilis, Tartari volatilis, Coſta Cervi & Carminatives de tribus, & ſimilia Alcalia volatilia, imprimis cum Spiritibus vegetabilibus commiſta, ut ſunt Salia volatilia oleoſa: quæ eſt Spiritus Salis Ammoniaci aſitatus, caryophyllatus. Sin Acidum alimur, conveniunt Salia omnia ſua, ut Sal Abſinthii, Cardui benedicti, Tartari, Artemiſie, item Sal Digeliſſimum hypochondricum, Arcacum duplicatum, Pulvis Stomachalis *Quæſtati* & *Mickæli*, Lapilli Cancroſum, Creta, Coſtu Cervi ſilium, Eluſi, &c. quæ Acidum abſorbunt.

Deſtruendo *Acida*, Purgantia denum adhibenda: aliſi enim hæc methodo obſervetur, niſi per Purgantia evacuabitur, ſed termina & motus convulſivi excitantur. Uſus Cancroſum ſtuviaſſimum mirè proſucum eſt, præprimis ſi cum reſſis aſſumantur, cum egregiè Acidum abſorbent: quod ne iterum augeatur, ab omnibus amoniſi Acetatis, Acidis aliis & Acceſſibus abſtinentur eſſi (O).

In *Credulitate Mielioſa* Salina omnia, ſive Alcalia, ſive *Acida*, ſive Salia, vel ſola, vel cum Aromatibus mixta, conducunt. Videntur, quæ Mucum vſiſſimum aut Pituitam generare apta nota ſunt. v. g. Caput virgulinum, Pedes bovini, Piſces, Alimenta cralla, Ova ſorbilia, &c.

Extorſi ad Chyloſis imminutam conſtrunt Olea nonnulla deſtillata ſuaveolentia, plùs minùs aromatica, & itidem parata Baſama, quoniam hæc ſunt Stomacho grata. Hæc inter excellens eſt Oleum Angelicæ deſtillatum, Mentha, Caryophyllorum, Macis, Baccarum Juniperi &c.; Oleum Stomachale compoſitum *Crateni* itidem eſt egregium: ſpectatium Oleum deſtillatum Malliches flavum reſiſtatum extrinſectis illitum. Vel

℞. Olei Stomachal. Crat. 3℔.

doſ. Mentha 3℔. vel 3℔.

Caryoph. vel Macis gutt. vi. viii. ad 3℔.

Zedair. 3℔.

M. S.

Oleum externum ad illincendum regionem Stomachi. Illinatur Stomachi regioni, applicando deſuper Laterem caleſcendum.

Vel

℞. Olei Menth. per infuſ. & caſt. par. 3℔.

expr. Nuc. Maſlich. 3℔.

Olei deſtillat. Menthy 3℔.

Macis.

Caryophyll. an. 3℔.

M. S. ut antea.

Pro Baſamo ſufficit Oleum Nucis Moſchatæ expreſſum, cum Oleo deſtillato Corticum Aurantium & Macis mixtum; vel Baſamus Stomachalis *Timai*, cujus deſcriptionem dedi in *Collegio Inſtitutionum*. Item Baſamus Peruvianus regioni pericardiorum illitur, etiam eſt egregius.

℞. Olei expr. Nitif. 3℔ij.

deſtill. Nuc. Juniper. 3℔.

Calami arom. 3℔.

Macis 3℔.

M. pro Baſamo S.

Baſamus Stomachalis.

Præterea Tacamahaca, Galbanum, Maſliche, &c. in

ſoc-

(O) *Fœniculum ab Acido poſſumatum reſiſſum* Pulvis ex Teſtis Oſtrearum, quem A. uſſer Diſſert. de Uſu & Abusu Precipit. cap. 3. §. 56. to. i. col. 173. vocat Precipitantis magni mome. *Reſus præparationem tradit* Cl. Homberg, in Act. Acad. Scient. ann. 1710. *℞* partes concavas Teſtarum Oſtrearum, à ſordibus munda, arque ad Solem per aliquot dies exicca: exiccatas contunde in mortario marmoreo quoſque in pulvem abeant: hinc iterum ad Solem exicca, ac denud in pulverem redige, per tenuiſſimum interniculum traſiciendum *Dofis* d. gr. xx. ad xxx. exhibenda in v. vel vj. cochli. Pini albi, vel Aqua Maſſia, man. jejuni Stomacho, per tres hebdomadas, vel menſem.

forma Emplastrum seu Scuti Stomachalis regioni Stomachi applicetur: c. g.

26. Tacamahac. p. iii.

Balsam. Peruvian. p. i.

Cum *l. g. Theriac. vel Oleo dissilato quodam, Bauc. Japiteri, &c.* fiat Emplastrum:

D. S.

Emplastrum Stomachale.

Item

26. Tacamahac. p. iii.

Gum. Cerauna. p. j.

Mala. cum *Bals. Peruv. vel Oleo dissilato, Mentha*, postquam igitur liquefacta fuerint:

D. S. ut antea.

Vel

26. Emplastr. Stomachale. Crem.

Tacamahac. ab. q. l.

Liquefacta Mala. cum *Balsam. Peruvian.*

D. S. ut supra.

Pertinet hoc *Sinum Stomachale de Syrene* HARTMANNI in *Praxi Chymiatr. pag. 167.* item *Emplastrum de Tacamahac* SCHROEDERII *Pharm. l. 2. tab. 53. n. 13. p. 205.* item *Emplastrum Stomachale MYNSCHII in Arzney. Chym. pag. 304.* Tandem Spongia Vini generosissima, cui Simplicia Stomachica fuerint infusa, imprægnata, Stomachi regioni impoſita ſeu applicata, ideoque calida, ſeridem in uſu eſt. Omnia denique externa in Chyliſi leſa conveniunt, quæ in *Amentia diſta*, & ſuo loco de Vomitu & Diarrhœa dicuntur.

C A P U T II.

De Flatibus in Stomacho & Intestinis.

Quando ſub Chylyficatione viciata ſimul generantur copioſi Flatuſ inque ingeſſit Stomachum diſſendunt, dicitur *Inſtatio Stomachi*: Quod ſi Flatuſ cum ſonitu non ſemper grato per os erumpant, dicitur *Eructatio*: Sin copioſi admodum ſupra & infra ſimul erumpant, ut in malo Hypochondriaco, dicitur *Chæra ſæca*, qui tres affectus putum inter ſe diſtincti, & uno modo curari poſſunt. Flatuſ ſi in Stomacho retineatur, ſatis ſunt moleſti, imò interdum tam atroces, ut peſſima inducant ſymptumata, ſic BARTHOLINUS exemplum habet *C. 2. Syſt. 81. p. 687.* Formant, quæ Ventriculū adob habuit inflatum, ut graviora habita ſuerit.

Flatuſ cum neque ad Vapores, neque ad Exhalationes reſecti poſſint, (vid. KERGERUS *Tr. de Form. §. 3. c. 3. p. 233.* & *ſequenti*), merito ab HELMONTIO ad tertiam quandam claſſem huiusmodi entium, nempe ad Gas ſeu Spirituſ incoercibiles reſeruntur; quod Gas ipſi eſt ſubſtantia ſubtilis ac ſpirituoſa, in corpus viſibile incoercibile, nec immediatè redactibile, genita ex miſtis corporibus per motum fermentationis aut efferveſcentiæ.

Sunt autem varia *Gas Syſtrophici, Pinguis, Apera, Sicca Syſtrophica* ſunt, quæ vocantur communi nomine Flatuſ; nulli enim modo poſſunt in corpus aut viſibile aut palpabile reduci aut coerceri, ſecus ac in Vaporibus; unde fruſtra & incuſum laborant, qui magno ſcilicet volunt capere Flatuſ, ſeu Spiritum fermentoſum Vini, qui impoſſibile eſt, ut coercerentur in aliquod corpus.

Reperiuntur etiam Flatuſ in aliis locis, ſi materia & cauſa efficiens commoda adſuerit, non tantum lo Tumoribus ſtatuſentis; ſed & obſervandum eſt quod in Venæ ſectiōne non levis ſtatuſ prorupit, quævis à Ventriculo & Intestinis aliſque partibus, ſæpe communicetur; itaq; qui nunc in Stomacho exiſtant, mox ad Maſſam ſanguineam delati, Flatuſ, præcordiorum aniaerates, diſticultates ſplendiendi cœ. præcurrent, & ſimplici ex vulneratis vaſis ſanguicis prorumpant.

Natura eorum obſcuriſſima eſt, & ordinarîo ſolent confundi cum Exhalationibus & Vaporibus, qui tamen toto cœlo diſtincti.

Quod attinet Vapores: ſi ſunt effluvia humida, beneficio caloris reſoluſa, à frigore tenui in guttas condenſabilia, unde Halitus condenſati, Flores, Fuligo, dicuntur, cum quibus nullum commercium habent Flatuſ; liquorem Vapores & Halitus calore ſolvuntur, & frigore confringuntur: neutrum autem horum Flatuſ patiuntur.

Ex his patet, Flatuſ eſſe producta nova corporum, cum

aliis nullo modo conferenda: unde ab HELMONTIO tanquam nova entia, novo nomine appellantur Gas; generatio ergo eorum eſt de novo, cum non præexiſtant localiter in ſimpliciſ, ſed materialiter hæc demum in Stomacho, idque nec à Calore, nec à Frigore per ſe, ſed tantum ab Acido præternaturali per viciatam fermentationem, & eſt in materia craſſa, viſcida & prolixa: hunc eſt, quod Veteres diacere, oriſi Flatuſ a Melancholia, hæc enim eſt aliud, quam aciduſ ſuccuſ. Unde in Moleſtibus Hyſtericis Hypochondriacis, Scorbuticis, Cachecticis, ſimilibuſque vitiis Fermenti Ventriculi mucaginæ acida obruti, vel Sac- ci pancreatici nimis acidi, copioſiſſimi generantur Flatuſ, propter Acidum fermentans materiam piſtiſſimam & viſcidam etiam quibuſcunque ex cibis, ita ut cauſa efficiens non flatuum ſolum, ſed & flatuum ſi Acidum, Materia ergo, ex qua, ſeu Subiectum, ſit viſciduſ ſua muſcaginoloſum piſtuſ.

Remotiſſis dubiis, præſtius examinabimus Flatuum horum naturam, & conſideremus Flatuſ artificiales, qui in moriam eorum non ducunt. Equidem, quod obiter inſinuo, nonnulli dicunt: quod *ventruſ eſt in Microſcopio, Flatuſ eſt in Microſcopio*: ſic PARACELſUS *Part. 4. Carlines* Mundum diſſinuat per Flatuſ. Sed hæc parum ad ſem facere videntur: Ventuſ enim eſt motuſ acris viſciduſ eſt.

Moduſ generandi & elevandi ſit nunc per viſcidam Fermentationem, ut patet in Panificio, Cereviſia & Muſto; nunc per efferveſcentiam. I. e. materialiter exiſtunt ex miſtis, non formaliter. E. g. Spirituſ Nitri metallico corpori diſſolubili, imprimis Marti vel Veneri, aſſuſuſ, corticoſo & diſſolvendo caſcit ſtreptuſ, efferveſcentiam, copioſa bulla; imò & Flatuſ emergunt copioſiſſimi, & quidem adeo fortes, ut poſſint etiam torriſſima vaſa diſfringere: vid. BECHERUS in *Phyſ. ſubterræ. c. de Liqyſatione*. Si deſtillat Tartaruſ, formaltem efferveſcentiam ſub deſtillatione concipit, itaut, niſi pauſe ſint quædam rituiſe, Flatuſ ſub efferveſcentia tam violenti ſurgunt, ut minimè coerceri valeant; ſed omniſ propter Flatuſ copioſiſſimoſ diſfringuntur. Item ſi Acetum deſtillatur, aut Succuſ Citri ſuperſtendatur Coralluſ, Oſtreſ, Lapilli Cancrorum, &c. Flatuſem tantuſ ſitit, & bullarum preventuſ oriſtur, ut niſi detur pauſa, diſfringatur. Sic etiam Farina quicunque modo tractata, ſive cocta, ſive friſta, ſive macerata non parit Flatuſ & videret eorum contrariuſ, & fermentuſ, ipſote Farina indigne erodunt. Similiter ac Fruſtuſ hoci, eorumque Succuſ, in ſpecie Muſtuſ quocunque naturaliter modo, copendo, deſtillando, &c. tractatum, nullum Gas, ut vocat HELMONTIUS, ſtatuentem erudit, ſi non fermentet; ſimul verbò atque fermentare, & inde aciduſ ejuſ adiuſm ſeci incipit, Flatuſ copioſiſſimi & impetuſoſiſſimi erumpere ſolent, qui etiam, niſi detur ſpatiuſ, fortiſſima doli diſfringunt: ſic HELMONTIUS *Tr. de Flatibus*, & KERGERUS *I. c.* ſi accipiat quæ Butyrum Antimonii, & aſſundat Spiritum Nitri, inteſta ſi efferveſcentia, & tantuſ Flatuum impetuſ, ut niſi vaſ ſit aperuſum, coerceri nequeant. Unuſ adhuc urget: Poma matura quacunque ratione tractentur, ni Flatuum emittunt: quando autem calore fermentationem accipiunt, & fortiter agitantur, diſfrumpunt correa propter Flatuum proventuſ, qui Poma autem non inſeſcibiles aut e

de novo per fermentationem generati ſunt.

Equidem verum eſt, eſſe multa Alimenta, ex quibz præ reliſque generantur Flatuſ: uti ſunt Raphani quicunque, Armoracii, Allium, Cepa, Uruſ recentia, Poma cruda, Callæna, aliique Fruſtuſ horum, Cereviſia novella & inſectata, Muſtum, Cæſeuſ, & ſimilia. Verum hi gignunt non in omni Stomacho nam robuſtuſ hæc, utut maxime ſtatuſentia, ſine ſtatuſentia digerit; ſed tantuſ in deſectuoſo, aut qui aliſ ſimul cibis copioſiſſis ſe nimis ingurgitavit, in hoc, ex Alimentoſ etiam optimis & non ſtatuſentia, per vitiuſſimam fermentationem copioſiſſimi exaſcuntur Flatuſ. Quod non inſunt Alimenta, patet ex eo: quod duo Homineſ alter ſanus, alter uger, v. g. Hypochondriac, iſdem Alimentoſ utentes, prior oculoſ generet Flatuſ, poſterior copioſiſſimoſ: non inſunt ergo Alimenta, aliaſ aequaliter generarentur. Ratio eſt diverſitaſ Fermentorum in Stomacho, unde Hypochondriaci & Hyſterici ſerè ex omnibuſ Alimentoſ eliciunt Flatuſ, quod alia non faciunt ſubiecta, qui in illis abundat Aciduſ vitiuſſim. Ceterum interm eſt, Alimenta quædam in quibuſdam magis eſſe apta, ut etinde faciliſſimè elaborentur Flatuſ, quàm lo aliis: e. g. præter jam dicta eadem Alimenta, quæ conſtant ſæpe volatili acris interm lo Stomacho ſano nihil obſte poſſunt. Nemp talia ſtatuſentia, ſæpe volatili acris abundantia, incidunt & attenuant muſcaginem Stomachi, & poſtmodum cum Acido Stomachi concurrendo in ſub.

subiecto ita viscido, ex eis generantur copiosissime bullae, in quibus bullis falsa tandem coeunt, & pedetentim resolvunt, & tandem Flatus sunt.

Nisi ergo occasione talium Ingelorum nati foret Flatus, de subiecto materie viscidæ, seu picuissimæ humoris confirmatur insipio. Quod vero addit in talibus talis mucilago acida viscidæ, experientia testatur; quia in vomitu eructant copiosius crassa, viscidæ, tenacia, plurius munda acida. Interim rarum est exemplum, quod habet RHODIUS *Centur. 2. Obs. 32.* de subitanea Ventriculi & Abdominis Inflatione ex eis. Flatus pinguium post usum Decocti Chini.

Quæritur: *Quomodo ex Acido fermentantur in materia viscidæ generentur Flatus?* In Farina res nota est, quod in ea sint duo Alia, Acidum & Urinolum, ratione quorum talem vim habet germinativam: ex Farina aqua subacta fit pulvis tenax insigniter viscidus, in qua, addito fermento, incipiunt resolvi falsæ, & emergit Acori Acidum enim agit in Alkali, unde fermentando falsæ impedita impetuosius tumescunt, donec viscositas resolvatur & imbutur: Patet etiam in Melle, quod tractatum beneficio ignis, & inspissatum, relinquit copiosum succum viscidum, cuius Acor, qui in omni Melle est, agit in Alkali, adjuvata visciditas resolvitur in subtilitatem volatilem: vid. HELMONTIUS (P).

Patet ergo, quod Flatus non insit in rebus, sed fiant per mutam fermentativam ab Acido in materia viscidæ. Hæc etiam intelligenda sunt de Colica flatulenta.

PARS AFFECTA.

Pars primariè affecta est Stomachus, tam cavum ejus ratione Flaturum, quam necessariè orificium superioris, cujus clausura conviuit vel non, dissolvit vel non.

CAUSÆ.

Causa prædominans distentionis stomachi sunt Flatus in Stomacho, generati ab acido fermentantur in materia viscidæ. Quorum pertinet compressio: quemadmodum enim Aer naturæ suæ vim quandam elasticam sui expansionis possidet, ratione cuius ille compressus inflas plumes seu lanas custodiam semper se iterum explicare conatur, hincque Vapores vel alia corpora leviora fibi contigua propellit, & Ventrem excipit; ita Venti in Microcoli cavitatibus undulant, si hanc condensationem comprimantur, aut per naturam suam expansionem, aut à calore viscerum magis agitati, vel novorum accessu superati, angustias hinc spatium evitare conando, uniusque eorum alterum agitando, Ventrem Microcoli seu Flaturum producant: quod exinde evidet, quod circa Coli iliam securam arduissimam (inque Coli inflammatione, reteris rigidisque ejus fibris cum cæteris in idem Colon amplissimum in Hypochondriaco sinistrio spatum occupet, substat Flaturum copia, & impetus major inde observatur, atmosphaera scilicet illa Inflationem compressa.

Remota sunt materia, vel Assumpta vel Retenta. Assumpta sunt omnia illa, quæ viscidiora generant succos, quæ ad Flatus dispoñunt. Quoad Retenta, consistit, quod Gradatim acida inducunt Flatus, ut fit in Hypochondriaci, Scorbaticis, Cachectis, quorum mala omnia oriuntur ex Gradatim acida, in quibus ordinariè generantur Flatus.

Partes de Flatu Naturales & Preternaturales. Item de quaduplici Inflatione differentia, dum alius est Acidus, ut in Hypochondriaci & Jejunii, alius induratus nonnulli graveolens, ex Gradatim acriore; alius spississimus, seu ita simpliciter assumpsum odoratum & sapore finem refert, v. g. post esum Cepacorum, Armaricæ, Raphani, Picium, alius insipidus, quando aditus Flatus sine certo ac determinato sapore. Conf. HELMONTIUS Tr. de Flat. Interdum, licet raris, addit etiam Rodus Fridus, pessimum tunc, & admodum horrendus. Flatus Naturales sunt, qui semper & in omnibus subiectis reperiantur, imprimis in

Tom. II.

Jejunio (quod patet in diffecit animalibus, ubi Jejunum reperitur totum Flatibus repletum) hunc in hominem ordinati, ut conservent parietes Intestiniolum distentione, ne invicem collabantur, & consequenter pori continui in Intestinis maneant patuli. Hi pinguentur in nobis ex mucos naturalibus Intestiniolum acido, concurrente simul sale volatili oleoso seu Bile pingui, sunt Flatus inde sulphurei foetidi: quod exinde patet, quia sunt inflammabiles. Quare autem forteant Flatus? ratio petenda ex artificibus Chymicis, ubi deprehendimus, subiecta sulphurea & pinguis si solvantur ab alcalibus, & precipitentur ab acidis, forentem dare insigniter nares ferientem: Sic cum Antimonio, Tartaro, & Nitre, Crocus Metallorum vel Regulus antimonii paratur, & fornicatur Antimonio nil aliud iuxta quam sulphur Antimonii dissoluitur ab alcali: quæ si solvantur simpliciter Aqua, osillum spargunt odorem; si vero hæc solutio precipitatur ab Acidis instillando Acetum destillatum, Spiritum Vitrioli, Nitri, &c. immensus emergit fœtor. Sic Flatus etiam in nobis foetent, quæntes oriuntur una cum concurrente Bile, cuius sal volatile & proprium oleum solutum precipitatur ab acido, & dat Flatus foetidos. Est notissimum est, quod magis pinguis sunt falsæ, eò magis foetent Flatus; quod minus pinguis falsæ, eò minus foetent.

Preternaturales Flatus sunt, qui sub digestionem prima, Secunda, & tertia per materiam viscidam pinguem ab effluore Acido generantur.

DIAGNOSIS.

Quod attinet Signa Diagnostica in Inflatione stomachi, notandum: (1.) Quando erumpunt Rodus, falsæ se prodit animum; quando verò hi ipsi, propter orificium stomachi instillatum firmius clausum coeuntur lo cavo Ventriculi, adfunt præcordiorum angustia: (2.) Deinde eadem præcordia sunt admodum distenta: (3.) Si eadem tangantur, refulsit quidam ibidem percipitur: (4.) Aëri consequenter de difficili respiratio, propter distentum stomachum, & hinc impeditum Diaphragmatis motum, io primis dum sapini incumbunt, & dolor interdum rancens est, ut arger neciat, quo se verat: interdum ita, ut animi deliquia simulet, quod in Hypochondriaci fit frequens: (5.) Subinde quoque percipiunt fluctantes quidam in stomacho, quando de iactant ex uno latere in alterum, ut describitur à FORESTO Lib. 1. c. 1. Obs. 33. in Strab.

Gravitas & distentio talis quoadque non solum circa ventrem ipsum percipitur, sed & totum pedus occupat; aliquando verò retro & inter collum & dorsum, ac ipsas vertebrae irritat, sæpe autem utrumque latus subit; interdum verò tumorem circa os Ventriculi efficit, & tunc Rodus inanes sunt, parum alleviantes; & Flaturum, qui per alvum externi confluunt, erupit inlabitur. Augetur malum, si ante perfectam resolutionem cibum largius accipiant; sic enim magis membra inflantur, & cum dolore distenduntur.

In genere Distentio stomachi laterum usque adeo est molesta ægro, ut cessat quousque se convertere debeat: interrogatus de passione, dicit: *se spiritum illi aëreosum*: imò hæc anxietate interdum eo usque procedunt, ut respiratiores visibiles difficiles reddantur. Si emittant Rodus, levatur; ceruclatur, de insigni angustia præcordiorum consequuntur.

Inflatione ergo ab Intumescencia, orta à Flatibus, genitæ ab Acido per Fermentationem in subiecto viscido.

PROGNOSIS.

Quod attinet Signa Prognostica: nulli Flatus sunt boni, excipiantur jejunis, licet mellis sit, & cessant; inveniunt enim stomachum ab digestionem plus minus defectuolum; unde ordinariæ sunt Hypochondriacorum sympeema.

1

(P) Si singulas materias quædam viscidam & glutinosam in aliquo cavo viscere conclusam, motum in suis particulis compressionibus acquirere, ut quædam ex his tenuiores falsæ volatiles, quædam rarefactionem adificiantur, h. e. si in eorum aliquamodi distentionem materiam subiectam in amplioribus falsis spaciis abundantiorum excipiant; consequere facile poterimus Flaturum generationem, & Viscera illis continenter inflationem, etiam nullo concurrente Acido. Non solum ac vulgo videmus crassissimos, & viscidissimos liquores, sola agitatione, h. e. æris per minia permeatione, in Spumam flatulentiam; sive bullularem are repletam convertere, aliis. Hinc patet, quod ad Flaturum grossum medietatem humorum crassissimæ cum motu intestini particularum requiratur: nam liquores, et particulis siccis stratis consistens, ab mediis petiis dissipantur, quæ in spumam abeunt; & contra si nimium crassissimæ, ad rarefactionem concipiendam minus erunt aptæ. Sic videmus Vini Spiritum de summam tenuitatem, æque Oleum de summam particularum crassissimam, hanc facili in spumam convertere, eamque citè amittere. Contra Aqua, est pura spumam vel non concipiat, vel concipiat citè perdat; atque cum Sapone commixta, ex levi agitatione in crassam duces conservandam spumam abiecit: tunc enim est in illa viscidum, ut obtemperet quidem æri, ejus particulis sese intermiscens; parci tamen eadem quæ distendit, ut i formam viscidam existat, neque evadat.

Infatio Ventriculi, quæ in convalescentibus fit; recidivam morbi prioris significat.

Ut autem per se parum in recessu habeant Infatio Stomachi, & Bædus; diutius tamen durantes, nec facile corrigibiles, metum futuræ Tympanitidis, seu Hydropis feci incipiant.

Ructus, qui ejiciuntur fortidi, pessimi sunt nocte, & à GABELCHOVERO in Cent. 2. Cap. 15. in anacardiacis, admodum functi declarantur; imò monet Medicos, ut sibi caveant & taliter eructantibus, ne fectore contagio malignum in pulmonem inspirant.

Rarum est, quod BARTHOLINUS in *Art. Med. Hoffm.* p. 199. & RHODIUS C. 2. Obs. 53. observarunt, æterna frigiditate corporis quocunque in loco Ructus continetur.

CURA.

Flatus cum fæte per fermentationem vitium, ab acido præternaturali in subjeço viscido excitatum, in Cura

1. Astrovanda & expurganda materia viscida, crassa, & pituitosa in Stomacho, & primis viis circa sanæ hærenti, hinc *Purgantia* optimè hic conveniunt, ut Pilule laxativæ cum Gummiacis,
2. Per Medicamenta *Aromaticia salino-volatilè oleosa* discutiendi Flatus, ut facilius per guttur inferius erumpant, & simul acidum fermentatum temperandū vel corrigendum,
3. Flatus impetus per *Nervum & Nervata*, flatulentias egentes, & fermentationis motum silencia, penitus coarctandus & legendus,

Quoad 1. Conveniunt medicamenta *Purgantia*, citius de tutius evacuantia & Romacho somitem morborum, maxime Anticostialia, imprimis à RULANDO usurpatur Aqua Benedicta. Vomitoria si non commoda, Aloetica imprimis conveniunt, & Pilule ex iis paratæ, hinc & Pilule Mastichinæ, vel Aloëphragmæ, ad Ventriculum crebrius eructantem usurpantur; quibus semper addatur Gummi Ammoniacum, Galbanum, succos viscidos reolventes & evacuantis; e. g. ad *Affricas Stomachi chronicæ* & sæpe recidivantes, ex materia viscida acida oriundos, optimè conveniunt tales Pilule usuales:

℞. Gummi Ammoniaci in aceto sal. ʒi.

Mastic. el. gr. xv.

Aloë socotr. gr. iij.

Extr. Trach. Alband. gr. iv.

Cum ʒssent. Menck. l. Pilule Nona. 6a.

D. S.

Pilulæ pro aliquot vicibus.

Dosis 12. vel 15. &c.

Alia Formula talium Pilularum in *Affricis Hypochondriacis, Hypericis, Scorbaticis*:

℞. Gummi Ammon. acor. solus.

Varial. Maris Solar. 20. ʒi.

Aloë soc. gr. xv.

Mastic.

Myrrh. an. ʒi.

Extr. Trach. Alband. gr. viij.

Cum l. q. ʒssent. vel Olei destillat. Mentha. l. Pilule

No. 105.

D. S. ut antea

Vel

℞. Maff. Pilul. de Ammon. Quera. vel Extr. Cathol. ʒi.

Mercurii dulc. gr. xv.

Extr. Trach. Alband. gr. iij.

Olei destillat. Cameli gutt. j. vel ij.

Cum ʒss. Zedoar. l. Pilule,

D. S.

Pilulæ pro una vice.

Quidam etiam commendat Pulverem Senæ laxativam, qui non est inolegas. *Vel*

℞. Pulv. Salap. gr. iij.

Scamm. sulphurat. gr. iij.

Riri gr. v.

Olei destillat. carminat. capsul. gutt. j. vel iij.

M. f. Pulv. S.

Pulvis purgans pro una vice.

II. Substrata somite, in specie mirè conveniunt Simplicia *Aromaticia*, *Carminativa* & c. Sola volatilia oleosa, acidum temperando & corrigendo, viscidumque incidendo, qualia sunt Radices Angelicæ, Gentianæ, Aristolochiæ rotundæ, Acori veri, Galangæ, Cortices Aurantiorum, Nuc. Moschata, Cardamomum, Caryophylli, Macis, Zingiber, Zedoaria, Cinnamonum, & ex his destillata

Olea: & Salinia volatilibus oleosis simplicibus Carminativis paratæ. *Misturæ v. g.*

℞. Aqua. Fenicel.

Mentha an. ʒi.

Cornia. cum Vin. ʒi.

Spiritus Anis.

ʒssent. Caria. Aurant. an. ʒiij.

Olei destillat. Macis gutt. v.

Syr. Cere. Aurant. ʒvi.

M. f. Phil. coctilem hauriende,

D. S.

Porciuncula contra Infationem, FORESTUS in *Jen. Obs. l. 1. Obs. 39.* in Stomachi Infatione cum dolore ejus intolerabili & distensione, atque ex elu ciborum flatulentium nimio & multo, & potu multo, tale habet experimentum: Decoquit Flores Chamomillæ, tam vulgares, quam, quæ est nobilior, Romanæ, misuram incil an. M. j. & adheco paucis Semin. Anis, Feniculi & Carvi, in Cerevisia. Hoc Decodum cum bibisset, ita feliciter curatus fuit. Speciatim Oleum Chamomillæ sapientum mirabile Carminativum est: item ejus Aqua, Essentia, & omnia ex Chamomilla. Multi asserunt, quod Oleum Chamomillæ destillatum, colore cæruleo tingatur, quando destillatur per alembicum cupreum: sed non est: nam si in Balneo per alembicum destillatur, etiam fit cæruleum.

Potro semina quatuor Calida majora, ut Anis, Cumini, Feniculi, Carvi, & minora, quæ revera sunt solamen pauperum, uti HELMONTIUS dicit, eorumque in Vino paratum Decodum, optimè prouinc, utem Olea eorum destillata, vel cum his, & Spiritu salis Ammoniaci viscoso, *methodo superius indicata*, fiat sal oleum, quod in Flatibus omnibus egregium est: hinc Spiritus Anis, salis Ammoniaci anictus peffloralis, item Semina Aquæ, Baccæ Lauri, Juniperi, exque his parata quæcumque.

Post convenit Calorem, quod est singulare remedium ad omnes affectus flatulentos, maxime multiores & hypochondriacos, vel in Substantia, vel ejus Extraculum & Essentia, imprimis cum Spiritu salis Ammoniaci viscoso facta, aliisque ex eo paratis remediis: item ex Myrrha atque Theriaca: Cortices etiam Aurantiorum sunt sobile aromaticum ad acidum Stomachi corrigendum, & Flatus discutiendos, itum eorundem Essentia, & Oleum destillatum, Spiritus salis Ammoniaci cinamomiatum, & ingenere quæcumque Aromaticia sile volatili oleo largitur imprægnata. Ratione Cinnamonis Species omnes Aromaticæ Officinales huc spectantur: Vel

℞. Semina. Coriander. ʒi.

Anis.

Fenichel. an. ʒi.

Zedoar.

Zingiber.

Galang.

Sal. Ammoniaci an. ʒi.

Spiritus. Diatriar. pip. ʒiij.

Kilnsack. aromat. ʒi.

M. f. Trages grossa. S.

Trages Stomachica.

Uterius ex Compositis sunt Aqua Stomachicæ usitæ, tam simplices quam compositi, Foraculi & Mentha, Aqua Carminativa *Darmestellii*, Aqua Cinnamonæ cydoniata, Syrupus Corticum Aurantiorum, item Syrupus Baccarum Lauri vel Juniperi: de quibus vid. HORSTIUS l. 4. Obs. 4. & l. 5. Obs. 1. quæ etiam Spiritus Anis: Essentia Chamomillæ Romanæ, Olea destillata *Seminum superius mentorum*, Carvi, Anis, Corticum Aurantiorum, Cinnamonum; item Bullasum Sulphuris terebinthinatæ & anictus in contumacioribus Ructibus est optatum: omnibus his meritis præterius *Spiritus Camomiativus de trikes*, qui fit ex Tartaro & Nitre, pelliturque per Rectortam adaptato Recipiente magno, cui Spiritus Vini tartarifatus inest; postmodum redineatus fit spiritus elegantissimus odoris urineti, potestissimus in quibilibet Flatulentis, distensione, aliisque Stomachi affectibus, dolore & hypochymia, aut aliis symptomatibus, & in specie conducit Hypochondriacis.

Ex his variaz concineri possunt Formulæ.

℞. Aqua Mentha ʒi.

Carm. Darmest. ʒi.

Spiritus Theriac. campher. ʒiij.

Carminativus. de tri. ʒi.

Kand. spirit. gr. iij.

Syr. Cere. aurant. ʒvi.

M. f. Phil. S.

Mix.

Mixtura Stomachica confortativa.

Detur in Paroxismo, ubi nullus ardor aut ætus: Vel

℞. Aqua Mentha ʒij.

Chamemill. Rom. ʒj.

Zidac. ʒij.

Carm. Dornor. an. ʒss.

Spir. Carmine. de trib. ʒij.

Essent. Opi ʒj.

Syr. Cort. Auram. ʒj.

M. S. ut antea.

Vel

℞. Aqua Chamemill. ʒij.

Essent. Caffor. tartar. ʒij.

Spiritus Sal. Ammon. an. ʒj.

Syr. Cort. Auram. ʒij.

M. S. ut supra.

℞. Elix. Propriet. sua acido ʒij.

Essent. Caffor. ʒij.

Opi ʒj.

M. D. S.

Elisir corroborans Stomachum.

Dosis an. gurtale.

III. Tandem etiam *Spiritus Nitri* nobilissimum est Carnitativum, imprimis dulcificans & temperatus cum duplo *Spiritus Vini* digestus & cohabitatus aliquoties pro *Spiritus Nitri dulci Aristoteli D. Michaeli*, nobisque sic magis appropriatus redditus. Hic enim, ut sit acidus, praefertur tamen reliquis, figendo potenter erumpentes *Spiritus flatuosi*, & impediendo fermentationis & effervescencie motum adeoque quascunque flatulentias cohibet: speciatim confert, si cum *Flatibus conjunctus* sit ardor, seu ætus, aut etiam superveniens vagæ phlogosæ, quæ tunc citò iterum evanescunt, nunc citò advolvunt, & solent uriri ex Rile, cum Acido in Intestinis concurrente & vitiosè effervescente; quibus in casibus peculiariter est *Spiritus Nitri*. Experientia semper confirmata sum in Adultis & Infantibus, quando cum *Flatibus* simul ascendunt sudores anxiosi, incalcescit facies, & robur venit, quod tunc convenit maxime *Spiritus Nitri* qui hanc effervescenciam in primis viis. Melioratur adhuc, si pro dulcificatione ejus, loco *Spiritus Vini* simplicis, sumatur *Spiritus appropriatus*, v. g. *Spiritus Anisi*; *Mentha*, *Baccarum Juniperi*, aut etiam *Spiritus Vini* aliquis aromaticus, seu *Spiritus Vini Carmine* aut *Vegetabilibus* compositus, i. e. *Spiritus Vini Vegetabilibus aromaticis Carmine* affusus, digestus, & aliquoties cohabitatus: cujus exemplum exhibet SYLVIVS l. 1. Prax. 2. g. 18. ubi de *Rachibus*, qui propter delectum Simplicium est elegans.

℞. Rad. Angel. ʒi.

Imperator.

Galang. an. ʒij.

ʒel. Serimar.

Mojan.

Rad. Iorn.

Basilic.

Summ. Cort. min. an. ʒss.

Bacc. Leori ʒij.

Semin. Angel.

Levif.

Anisi an. ʒss.

Zingib.

Mor. Moschat.

Mor. an. ʒij.

Cinnam. ʒij.

Caryophyll.

Cortic. Auram. an. ʒi.

Concietis & contusis crasse, affunde.

Spiritus Vini Malvac. vel Myxan. ʒal.

Digerantur per biduum in Balneo Mariæ, hinc ad siccitatem destillentur: quicquid ascenderit, magneti iterum affundatur, per biduum digeratur, mos tertio quartæ partes destillentur, & asservetur *Spiritus destillatus* pro fin.

Convenit & ejus Mixtura Polythoracæ extenuata contra Flatem & Rachem & ceteros Morbos flatulentos, sequens, quæ sit illius omnium:

℞. Aqua Punic.

Mentha an. ʒij.

Spir. Vin. rellif. vel Aq. Vitis Mart. vel Spi.

ritus Carmine. ʒij.

Nitri gutt. xx.

Olei destillat. Meri gutt. ʒj.

Leod. qvati gr. iij.

Tom. II.

Syrupi Mentha ʒij.

M. S.

Mixtura Stomachica confortativa coctione iterum sumenda.

Dosis cochlear. ʒj.

Ad hujus imitationem praefertur oleo sequenti modo:

℞. Aqua Ment. ʒij.

Carmine ʒij.

Eliz. Ment. ʒij.

Spir. Nitri dulci. gutt. xv.

M. S. ut antea.

Vel

℞. Aqua Ment. ʒij.

Carmine Dornor. ʒij.

Spir. Nitri dulci. ʒj ad ʒij.

Auricam. diaphor. ʒj.

Leod. qvati gr. iij.

Syr. Cinnam. ʒij.

M. S.

Mixtura contra Inflationes.

Vel

℞. Aqu. Chamemill. Roman. ʒij.

Fanicul. ʒj.

Spiritus Theriacal. camphor. ʒj.

Nitri dulci. ʒj ad ʒj.

Leod. qvati gr. ii.

Syrup. Myrty ʒij.

M. E. Punic, S.

Mixtura confortativa contra Inflationes.

Mixtura hæc propinquetur, ubi phlogosæ & æstiones urgent.

Item *Spiritus Nitri theriacalis* ad au. vel 30 gutt. convenit.

Poreò Ambra in Radu commaciatæ cum singulari specifi- cum commendatur à ZACUTO LUSITANO l. 2. Prax. admir. Ol. 2. cum Saccharo in forma Pulveris inspurata.

In *Rachibus* furidis Pilulæ Mallichinæ conveniunt imprimis.

Item ad *Rachis acidis* distinguitur præ cæteris conveniunt *grana Piperis*, vel integra vel modici confusilla, No. v. vel ʒj. mane jejunè deglutita: vid. RIVERIVS Ol. 37. Merb. infrequens. Item contineat *Armatura*: Sicuti ad acidum distendum in flatulentis affectibus alii laudare soleant Talos Lepocis pulverisatos, aut Talos fusillos, Lapillos Cancro- rum, Cornu Cervi præparatum, imprimis ulum; & Ebur usum, Corallia rubra præparata, Antimonium diaphoreticum &c. ut hæc terites hia ed promptius absorbant acida in Flatibus peccant. Unde ex his Aromaticis & Terreis possunt fieri Pulveres egregii: e. g.

℞. Corv. Cerv. usi præp. ʒij.

Coryl. præp.

Ebor. usi præp. an. ʒij.

Salis Abstin.

Chamemill. an. ʒj.

M. E. Pulvis, S.

Pulvis pro aliquot vicibus.

Dosis ʒj ad ʒss.

Vel

℞. Aqua Mentha ʒij.

Cinnam. spiritus. ʒij.

Lapill. Canr. præp. ʒj.

Syr. Fanciculi ʒij.

M. D. S.

Potentilla pro aliquot vicibus.

Essentia Abstinendi omni pasta in Cerevisia usurpetur, item Succus expressus, Vinum abstinethes, quatenus corrigat causam materialem flatuum: ab omni pasta vesperatino usurpetur Pulvis ex Corallis, Othecolla, & Ossè Sepiæ ana, pulverisati in Spiritu Vini Juniperi. Vel

℞. Ebor. usi.

Corall. rub. præp. an. ʒss.

Ser. Diarion-piper. ʒj.

Entraff. Zedac.

Cort. Auram. an. ʒss.

Cum l. q. Seebari in Aqua Fanciculi solat. E. Rosala,

irritandæ cum

Olei destillat. Meri an. Punic. gutt. iij.

M. D. S.

Rutule Stomachales confortative contra Inflationes. Ubi nimis & contumacissima mucilago Flatuum & Ra- dum causa, optimus est *Spiritus Aethiopiæ*, vel solus, vel missus cum duplo *Elisir Stomachali D. Michaeli*, dosis gutt. xx. vel xxx. Est egregium remedium.

IV. Enterici Oles, tam destillata quim decodta au Infa-

13

fa, Carminantia suprà citata commodè possunt illiniri, fovendo desuper locum, latere calefacto. Reliquis præfertur Oleum destillatum Chamomillæ, Chamomillæ, Seminum Carminativorum. Vel

24. *Ol. exp. Nuc. Mosch. 3℔.*
destillat. Bacc. Juniper. 3℔.
Mucis 3℔.

M. S.
Balsamus Stomachalis.
Vel

24. *Ol. Chamom. 3℔.*
exp. Nucis 3℔.
destillat. Cvi. Aur.
Fenic.
Mentha.
Zedoar. an. 3℔. ad 3℔.

M. pro Lioimento, S.
Linimentum Stomachale.

Aut Totus humulus externè applicandus, qualem dedi in *Collegio Formular. pro terminibus colicis.* Vel

24. *Spiritus Anis. 3℔.*
Vini camphor. cruent. 3℔.
Theriac. 3℔.
M. S.

Epithema contra Inflationes.

Applicetur cum panno coccineo imponendo desuper laterem calefactum.

Item applicetur Emplastrum de Raccis Lauri, malvaarum cum Oleo Chamomillæ, Abinthii, Mentæ, vel Juniperi.

Vel

24. *Tacamahac. p. liij.*

Balsum. Ferru. p. j.

Liquefacta misc. cum Theriaco in Emplastrum.

Item Spiritus Vini infusio Aromaticorum, extrinsecè applicatus calidè convenit.

Clymata Carminantia etiam commodè simul injici possunt, qualia præscribi solet in Cardialgia, Colica flatulenta, &c. Clymata etiam ex Urina humana, imprimis Pueri, vel solæ, vel cum Carminantibus colla: e.g.

24. *Rad. Angel. 3℔.*

Sem. Anis.

Fenicul. an. 3℔.

Ferment. pistor. 3℔.

Coque in Urina Pueri.

24. *Calatur. 3vj.*

addo

Mell. destillat. 3℔.

Ol. destillat. Cvi. 3℔.

Misce pro Clystere in Tympanitide. Vel

24. *Spec. Carnis. M. j.*

Rad. Levist. 3vj.

Sem. Anis. 3℔.

Coque in l. q. Urina hum.

24. *Calatur. 3vj. ad 3vj.*

addo

Elect. de Bacc. Lauri 3vj.

Mell. Mercurial. 3℔.

Sul. Chlor. stævill. vel Neri antimoniari 3℔.

M. f. Emema.

SECTIO VI. DE ASSUMPTORUM IN STOMACHO RETENTIONIS LÆSIONE.

C A P U T I.

De Vomitu & Nausea.

NOTUM est, quod omnia Alimenta; quæ per os ingruunt, transmittantur ad Stomachum, & ibidem retineantur, digerantur, & in salum tertium transmutentur, tandem digesta naturaliter per Pylorum, seu foramen Stomachi orificium transire debeat: Si autem fiat, ut hujusmodi ingesta rejiciantur demò per os sursum ex Stomacho, est motus præternaturalis. In eum namque finem est constitutum Oesophagus iter, ut Alimenta assumpta deriventur in Ventriculum: quando verò varia humida, Sanguis, Pus, Acida, Bileja, &c. subinde per superius ejus orificium & connexum Oesophagum ejectionem, vocatur Vomitus, quem ordinariò Nausea præcedere solet. Jam quod attinet Vomitus: rursus revera nil aliud est, quam convulsio Pylori, qui servosus & fibrosus est, & hinc systole totius Ventriculi, per irritationem imprimis orificii superioris gravem & nimiam: Dum enim, ut omnium opinio HELMONTIUS expresse *Tract. Phl. Rati. §. 2. 6. 21.* Pylorus irritatus fortiter se contrahit, & costringit, fit, ut contentus fibrarum traxio, subito sequatur motus totius Ventriculi peristalticus inversus, qui à Pyloro progreditur usque ad Stomachum, & in orificio sinistro terminatur: idque propter fibras cerviceas, tam circulares quam transversas, Stomachi tunicam mediam intersecentes, & in specie ab orificio sinistro ad dextrum potentes, similiter contritas: hanc Pylori & totius Stomachi convulsionem ad orificium sinistrum usque sequitur similis Gulæ convulsio, indeque omnium contentorum ex Stomacho in Gulam, & sic per consequens ex Gula in os protrusio. Est enim Pylorus, uti rectè inquit HELMONTIUS, Redor & Præfix retentiois & transmissio-

nis Alimentorum in Stomacho, & omnium in Stomacho reperculum & excretorum, unde in Pyloro subest ista pars, que in Vomitu affligitur, dum sui apertura naturali transmittit inferiora versus Ventriculi contenta, & sui contractura præternaturali superiora versus regurgitare facit eadem ipsa contenta. Verè esse et, quæ modo dixi, confirmat ocellaris experientia: Conferatur, quoad vomendi modum, OLAUS RUDBECK, *Professor Suenus, Anatomicus insignis, in suis Observationibus Anatomis.* HELMONTIUS *Meth. anat. annexis in l. i.* Hic in *Observat. 20. p. 309.* ita inquit: *Causa rursus difficultas Vomendi altius palam facta: primò Pylorus se contrahit, max. systole totius Ventriculi ab orificio inferiori ad superius sequatur, ac tandem Oesophagus effunditur.* Confer. simul de modo KERRINGIUS *Spir. Anatomico Oes. l. de Vomitu lethali à summo deglutito & intra circulum Pylori baxente, ac VILLIS in Pharmaz. Rationali Part. 1. sect. 2. c. 1. §. 8.* ubi, quo modo fiat vomitus? explicat; item quæ habet HELMONTIUS allegatus, quando ait: *Si aperte Pylorus duntaxat contrahitur, in eundem maxime vomendum parat, quid idem de hujus Pylori primariò est peccatum in illa, qui Lienteria corripiuntur.*

Nausea præcedit Vomitus; quæ Nausea vulgò dicitur latatio nimis orificii superioris; quod tamen omnino falsum est: quin potius nihil aliud est, quàm inane vomendi desiderium, & consistit in nimia orificii superioris vel sinistri Ventriculi clausura, & firmiore coarctatione, propter irritationem ejus loci à re molesta factam, quod insinuat videtur RIVERIUS, quando in *Praxi l. 2. c. 2.* orificii dicti robor accutat: sicut fortius coarctatio Pylori dat Vomitus. Nam quod in Nausea adde nulli coarctatio & angustatio orificii Stomachi superioris, patet ex eo, quod Nausea reverè sit species subditi, quo aliqd absorbentur, & differt à Vomitu secundum magis & minus (Q.). Quando enim vel integer Stomachus, vel speciatim orificium ejus superius sit

(Q.) Si Nausea & Vomitus differant secundum magis & minus pars afflicta in utroque verbo vel erit idem Orificium Ventriculi sinistrum, vel idem Orificium dextrum. Si ergo leviter Stomachus irritatus fuerit, sit Nausea: si fortiter Vomitus. Quamquam autem non negem ex Stomachi contractione impedimentum fieri cibi in Ventriculo descendendi: atque insuper ex Pylori coarctatione alimtus in Ventriculo contenta per superiora rejice debere: minime tamen primario affectum, Nauseam, aut posteriorem Vomitus appellarem, sed illum impedimentum Cibum in Ventriculo descendens, hunc rejectionem totam, quæ transitum per istam

errore quodam ex Intestinis. *Ad Transmissa* pertinet Vomitus in principio Paraxysmorum Febrium intermittentium, dum nempe Succi ex Pancreate & Felle in Intestinum Duodenum effusi, violenter effervescentes Pylorum irritant viciniam, aut etiam in ipsum Stomachum regurgitant, & ita Vomitus inferunt: item si Bilia per intestinum ductus Choleochi violenter, item Sanguis congruentius, Pus, (aut extra valia Ventriculi propria effusa, aut cum aliis humoribus ex viscis membris, imò toto corpore, huc derivata,) huc deferantur: quo etiam Faeces alvi spellant, in Iliaca pissione interdum Vomitus reiecit, & Clysteres & Suppositoria Vomitu reiecit. Mirabilia interdum excreta ex Stomacho per Vomitus sunt reiecta, inter quae et Rete illud artificiosum quasi humano contextum, de quo vid. KERKRINGIUS in *Spicil. anat.* Obs. 6. Observatio etiam fuit Vomitus Butyraceus, licet ager Butyrum non comeditur; Sericicus, Cochlearius, Bufonem, Lacertatum: vid. BARTHOLOINUS c. 5. *Hyst.* 94. & SCHENKIIUS Obs. & M. A. N. C. Ann. 3. Notum est, quod *Asphyxia*, sive quantitate nimia ingesta, ut commestrationibus & crapulis dediti aperiantur, sive qualitate quacunque vitiosis, acris & rancida, pinguis, laxantia Galam & Pylorum, Ventriculo alia inimica & molesta, & praecipuis, quae vel individuali subsidio abhorrentur, vel Antimonialis, Mercurialis, aut similia acris, irritantia stomachi tunicae nervam, scilicet Vomitoria & Venena, vel quae in eodem facili corruptuntur, quod Colonibus, item Infantibus lactentibus frequens malum, Vomitus, inferant: sicuti videmus tantillum odoris antimonialis (ita reodum HELMONTIO vocatur) quod impraegnat Vinum infusum Antimoni, citra corporealem ejus maciem, stuporem non raro inducere Vomitus. Ita ab Arsenico Vomitus Ierusalem SALMUTH c. 1. Obs. 10. ab Helleboro albo BONETUS *Epist.* l. 3. *fol.* 8. Obs. 6. ab assumpta Gilla *Thymophylli* HEINRICUS ab HEER Obs. *apud* var. Obs. 26. ex abusu Insuli Agriaci & foliorum *Sennae* LIBAVIUS in *Cyph. Med.* HORNINGH *Epist.* 76. & à Croco metallum, HILDANUS *Cent.* 4. Obs. 51. *apud* 79. annotantur. Furore enim Archi stimulat contrarius libris conatur Ventriculus egerere contentum. Faciunt huc etiam Pinguis, sur creberris aut etiam copiosis assumptis; idque duplici ex ratione: Pinguis enim creu difficillime digestibilis, relaxando fermento acido-saline, non Invenit intersum molestias & gravare Stomachum; praeterea orificum superius laxant; unde, dum ex irritatione horum superestit Pylari constrictione ex laxitate Stomachi, facili supervenit Vomitus post Pinguis. Huc pertinent decem Uvae ultra tres menses succi plene reiecit, quarum mentionem facit KERKRINGIUS *loc. allegat.* & Picae eodem ratione excreta, qualem BORELLUS *Cent.* 1. Obs. 9. vidit: item suo modo Vomitus Sebaceus in M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 533.

Retenta sunt v. g. secreta post digestionem primam in Stomacho: *Transmutata* sunt Cruditates variae, nidorosis, & acidae: Quo etiam pertinent Vermes, Nulcam & Vomitus exanties, de quibus RIVIERIUS *Cent.* 1. Obs. 28. & BARTHOLOINUS *Cent.* 1. *Hyst.* 49. & c. 3. *Hist.* 14. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 538. & MOEBIUS *Epist.* *Med.* lib. 4. P. 2. c. 5. p. 183.

Vomitus per consensum seu secundarius est ferè frequentissimus, & fit, si causa commota fit extra Ventriculum, motuque hi ab eastrano quodam ipsi impri manent. Partes Ventriculi in consensum trahentes duplici generis sunt: ita ut vel ratione continuitatis, quae partibus cum Ventriculo intercedit, Aërophagi scilicet, Diaphragmati & Intestinis, vel ratione istarum partium, cum quibus Stomacho, intervenientibus Nervis, est connexus; Nervorum enim affectio est sentire & confectare. Sic Aërophagi part superior, si digesta tantum, vel quocunque modo irritetur, fit non statim Vomitus, vomendi tamen conatus, excitat: Diaphragma tunc consensu Tufum, illiusque validior consensu, Vomitus pedifsequum habens, confirmat: ejus phaenomeni ratio, praeter viscerum omnium Abdominis, hinc Ventriculi, propter vehementiorem compressionem, partium est continuitas, quam cum Ventriculi orificio superiore Diaphragma eodem celebrant; licet communione Nervorum, quae partes has duas intercedit, aliquid huc conferre, non adeo improbabile fit. Intestinarum tandem affectus eo modo accendendi sunt, quatenus iidem illorum motus peristaltici vel in totum, vel ex parte invertitur, eoque ad Ventriculum continuato, hic exurgitur, & concutitur: hinc notorie sequitur Vomitus in Dyfenteria, Passione Colica, Iliaca, & Vermibus, propter consensum tinnitumque interiorum, Ventriculo & Intestinis continuatum. Sic interdum Dolorem

Colicum excipit Vomitus propter contiguitatem Stomachi, nam etiam consensum sympathicus cum Stomacho talem Vomitus facit. Curavi super Hypochondriacum gravi dolore Coli superiori hyeme in Hypochondrio sinistro affectum, qui continuos vel Vomitus, vel nauses vomendi conatus patiebatur, cum enim dolor fuerit in sinistro latere, in quo Splen infusus ut plurimum reperitur, facile patet, quid fuerit per consensum, quem etiam postmodum curavi. Quae per communes sibi Nervos movent Vomitus, sunt praeterfieri Caput, Reines, Hepar, atque Lien: Sic in Nephritide, seu Renibus calculo affectis, ordinario supervenit Vomitus, quia Reines ex eodem plexu Mesenterii bauriunt Nervos, ea quibus nonnulli ad Stomachum derivantur: pariter ac Abdominis reliqua viscera Vomitus sympathice excitant, qui à visis illorum ipsam deduci debent, quoniam Nervos à plexibus Mesenterii communes cum Ventriculo possident: item in Passione Mulierum Hystericiis crambis oritur Vomitus, & quidem interdum salubres, nam in his partes membranose ingruunt convelluntur: item in Contusionibus Crani, alivis limilibus Vulneribus Capitis, facillime supervenit biliofus Vomitus, propter Membranas Cerebri, Stomacho & reliquis partibus, praeterfieri internis, plus minus communes; aut graus nervosum ad inordinatum motum concitatum, quod colligitur à tremore, convulsionibus & delirio, eundem Vomitus concitantibus. Hinc HIPPOCRATI tales Vomitus *Cent. Praen. fol.* 3. §. 184. periculofissimi, quo causam, scilicet genus nervosum admodum irritatum, veniunt. In specie Mulieres patitur Vomitus ingruens, non tamen per effectum, propter suffocationem Mensuram, sed etiam per consensum quando nempe virorum sunt cupide, & Spiritus animales affectos, & inde Succum fermentativum Stomachi alteratur: vid. HILDANUS c. 4. Obs. 32. ubi rectè dicit, quod sipe Vomitus dunturum & petinas affligit Viduas, Moniales, & Virgines adultas, defectu Veneris, & visio lipioru genitalium in illis retenti: item THEODATUS *de Pulcritud.* p. 172. recenset Vomitus continuos, eoque periodicos sive certo tempore affligentes, ex retento in Muliere Semine post multissimum coitus: ita HOEIIERUS in *Mer. Med.* p. 137. *fol.* 12. habet exemplum Vomitus post quamcumque coitationem, ubi non Mensum suffocationem accedente simul quadam pectoris constrictione. Quo etiam referendi Vomitus *spontanei salubres*, qui periodica infestant annuulis, idque ferè ex vicerum Abdominis, Ventriculo plus minus vicinorum vel conextorum, vitio: tale exemplum refert SCHENKIIUS lib. 3. Obs. 8. dum quidam singulis mensibus per biduum, Bilem atqueque, cum Pictula conpendam vomere solitus, vitam ad multos annos produxit. Hi omnes Vomitus Spiritus animales variè affectos pro causa agnoscunt, ut superius dixi; Imprimis si huc male veniant, qui vitio nonnulli Splenis sunt affecti, ut videtur est apud FORESTIUM in lib. 18. Obs. 27. de quodam, qui circa Lienem infidie dolebat, idque per certa intervalla, unde certis ferè periodis huiusmodi Melancholicum (ut loqui amat FORESTIUS) ferebat omnia atrum, evomebat: Sic BORELLUS in c. 3. Obs. 93. p. 270. & 279. insigniter commendat nullitatem Vomitus mensurati: & apud PANAROLLUM in *Praen.* 3. Obs. 22. habetur Vomitus matutinus ordinatus, à multis admodum symptomatibus praeservatus: item Vomitus septennis gluxit in Puella ob Mensum suffocationem. In Gravida prius & ultimis mensibus Vomitus obviat est: Sicut LOTICHIIUS Obs. p. 442. refert, quod sequum Conceptionis in Viragine extiterit: ZACUTUS LUSITANUS l. 2. *Praen.* Obs. 13. de quodam, qui singulis mensibus, duobus diebus, quatuordecim vel quindecim libras per Vomitus excrebat humis nigerrimis, de pici liquide similis, qui exinde omnino salvus ad annum 20. produxit vitam; & Obs. sequenti, quendam tribus quibus mensibus atrobilium Vomitu perierat laborantem, usu Chalybis curatum, apertis Haemorrhoidibus, per quas evacuebatur sanguis, & lib. 3. *Praen.* *admir.* Obs. 115. recenset perniciosissimum Vomitus mensurum seu singulis mensibus, materiae, massae globiformis instar, concretæ. Facit huc Vomitus studiò proleutus in Hypochondriacis, si scilicet singulis mensibus, aut sex hebdomadibus, semel largius mero se ingurgiant, & hinc Vomitus artificialem non citra facilitatis commodum insilunt. Elegans quoque & admodum ridiculum est exemplum PLATERI in *Observ.* p. 655. de frequenti Vomitu, post amputatum caput secuto: Simile inter rara referendum est exemplum BARTHOLOINI c. 4. *Hyst.* 44. de Vomitu contagioso in Familia quadam, qui malignitatis fuit suspensus, & similiter alio ppe contagio affecti. Pertinet huc Vomitus continuus Ierusalem

errore quodam ex Intestinis. *Ad Transmissa* pertinet Vomitus in principio Paronyimorum Februm intermitentium, dum nempe Succus ex Pancreate & Felle in Intestinum Duodenum effusi, violentius effervescendo Pylorum irritant vicinum, aut etiam in ipsum Stomachum reurgunt, & ita Vomitus inferunt: item si Biliis per inflectionem ductus Choleodochi vitioles, immo toto corpore, Pus, (aut extra vala Ventriculi propria effusi, aut cum aliis humoribus ex vicinis membris, immo toto corpore, Pus derivata,) huc deferantur, quo etiam Faeces alvi spefiant, in Iliaca passione interdum Vomitu reedat, & Clysteris & Suppositoria Vomitu recedat. Mirabilia interdum excreta ex Stomacho per Vomitus sunt rejecta, inter quae est Rete illud artificiosum quasi humano contextum, de quo vid. KERKRINGIUS in *Spir. anat.* Obs. 6. Observatus etiam fuit Vomitus Butyraceus, licet aeger Butyrum non comederit; Sericus, Cochlearum, Infonem, Lactearum: vid. BARTHOLINUS in *3. Hyst.* 92. & SCHENKIIUS *Obs.* 4. M. A. N. C. *Ann.* 3. Notum est, quod *Alapira*, five quantitate nimia ingesta, ut commolationibus & crapulis dediti experientur, five qualitate quacunq; vitiosa, acris & rancida, pinguis, lasantia Gula & Pylorum, Ventriculo alias inimica & molesta, & praecipue, quae vel individuali falsidii abhorrentur, vel Antimonialia, Mercurialia, aut similia acris, irritando stomachi tunicam nervam, scilicet Vomitoria & Venena, vel quae in eodem facile corruptuntur, quod Galenibus, item Infantibus lactentibus frequens malum, Vomitus, inferant: sicuti videmus tancillam odoris antimonialis (ita redit cum HELMONTIUS vocatur) quod imprægnat Vinum infusionis Antimonii, citra corporalem eius tunciam, stupendo non raro inducere Vomitus. Ita ab Arsenico Vomitus lethalem SALMUTH C. 1. *Obs.* 10. ab Helicoboro ab BONETUS *Supplet.* L. 3. *lib.* 2. *Obs.* 6. ab Alapira Gilla *Thesphragis* HEINRICUS ab HEER *Obs. optat.* var. *Obs.* 14. ex abusu Insuli Agarici & solonum. Senes L. B. A. V. I. U. S. in *Gst. Med.* HORNUNGII *Epist.* 76. & de Croco metallorum, HILDANUS *Com.* 4. *Obs.* 51. *sig.* 79. annotantur. Fatore enim Archi simulati contradiis fibris conatur Ventriculus ejicere contenta. Faciunt hac etiam Pinguis, aut crebris aut etiam copiosis sumpta; idque duplici ex ratione: Pinguis enim creu difficillime digestibilis, retinendo fermentum acido-salino, non leves intermit molestias & gravant stomachum; praeterea aspicuum superius lavant, unde, dum ex irritatione hocum supervenit Pylori constrictione ex laxitate stomachi, facile supervenit Vomitus post Pinguis. Hac pertinet decem Vm ultra tres menses fauci plenus rejecte, quorum mentionem facit KERKRINGIUS *loc. cit.* & Pileti eadem ratione excreta, qualem BORELLUS *Com.* 1. *Obs.* 9. vidit: item fmo modo Vomitus Salicatus in M. A. N. C. *Ann.* 3. *Obs.* 353.

Romina sunt v.g. recrementa post digestionem primam in stomacho: *Transmissa* sunt Cruditates variae, visciditiae, & acidae: Quo etiam pertinent Vermes, Nauseam & Vomitus excitantes, de quibus RIVERIUS *Com.* 1. *Obs.* 21. & BARTHOLINUS *Com.* 1. *Hyst.* 47. & C. 3. *Hyst.* 14. M. A. N. C. *Ann.* 3. *Obs.* 358. & MOEBIUS *Epist. Med. lib.* 1. P. 1. c. 5. p. 13.

Vomitus per consensum seu secundarius est scilicet frequentissimus, & fit, si causa conomita sit extra Ventriculum, motusque hi ab extraneo quodam ipso imprimantur. Partes Ventriculi in consensum erabentes duplicis generis sunt: ita ut vel ratione continuitatis, quae partibus cum Ventriculo intercedit, Oesophago scilicet, Diaphragmati & Intestinis, vel ratione illarum partium, cum quibus stomacho, intervenientibus Nervis, est conatus, Nervorum enim affectio est sentite & confentire. Si Oesophagi pars superior, si digito tantum, vel quocunque modo irritetur, si non statim Vomitus, vomendi tamen conatus, excitat: Diaphragmatis concussio Tullio, illiusque validior concussio, Vomitus pedissimum habens, confirmat: cuius phaenomeni ratio, praeter viscerum omnium Abdominis, hinc Ventriculi, propter vehementiorem compressionem, partium est continuitas, quam cum Ventriculi orificio superiore Diaphragmatis fibræ celebrant; licet communione Nervorum, quae partes has duas intercedit, aliquid huc confertur, non adeo improbabile sit, Intestinarum tandem affectus ex modo accendiendi sunt, quatenus iidem illorum motus peristaltici vel in totum, vel ex parte invertitur, eoq; ad Ventriculum continuato, hic exagitantur, & concutitur: hinc notorie sequitur Vomitus in Dysenteria, Passione Colica, Iliaca, & Vermibus, propter consensum tunciarum interiorum, Ventriculo & Intestinis continuorum. Sic interdum Dolorem

Colicum exple. Vomitus propter enliguitatem stomachi, nam etiam consensum superficialis cum stomacho gravi Vomitus facit. Curavi super Hypochondriacum gravi dolore Coli superiori hyeme in Hypochondrio sinistro affectum, qui continuos vel Vomitus, vel inanes vomendi conatus patiebatur: cūcūm doloris dedit fuerit in sinistro latere, in quo Splen infons ut plurimum reperitur, facile pater, quid fuerit per consensum, quem etiam postmodum curavi. Quae per communes vel Nervos vomitus Vomitus, sunt praeteritum Caput, Renes, Hepar, atque Lien: Sic in Nephritide, seu Renibus calculo affectis, ordinario superveit Vomitus, quia Renes ex eodem plexu Mesenterii hauriunt Nervos, ex quibus nonnulli ad stomachum derivantur: pariter ac Abdominis reliqua viscera Vomitus sympathetico excitant, qui à solis illorum ipsam dedit debent, quoniam Nervos à plexibus Mesenterii communes cum Ventriculo possident: item in Passione Mulierum Hystericis crebris oriantur Vomitus, & quidem interdum salubres; nam in his partes membrorum: inliguitur conveituntur: item in Contusionibus Crani, aliisve limilibus Vulneribus Capitis, scissimè superveniunt biliosi Vomitus, propter Membranas Cerebri, stomacho & reliquis partibus, praeteritum internis, plus minus communes; aut genus nervosum ad inordinatum mutum conveitunt, quod colligitur à tremore, convulsionibus & delirio, eundem Vomitus concomitantibus. Hinc HIPPOCRATI tales Vomitus *Com. Prae.* *lib.* 3. §. 384. periculofissimi, ob causam, scilicet genus nervosum admodum irritatum, veniunt. In specie Mulieres patiuntur Vomitus Menstruorum, sed etiam per consensum quando nempe virorum sunt cupide, ob Spiritus animales affectos, & inde Succum fermentativum Stomachi alteratum: vid. HILDANUS C. 4. *Obs.* 32. ubi rectè dicit, quod ispe Vomitus diuturnus & peritimus affligat Viduas, Meniales, & Virgines adultas, desecta Veneris, & vitio liquoris genitalis in iidem retentis: item THEODATUS in *Valeriod.* p. 173. recenset Vomitus contumaces, eoq; periodicos five certo tempore affligentes, ex retento in Muliere Scimae post coitionem coitus: ita HOEIERUS in *lib. Med.* p. 137. *Lib.* in 12. habet exemplum Vomitus post quancūq; citationem, aborti ob Mesium suppleffionem, accedente simul quadam pectoris constrictione. Quo etiam referendū Vomitus *spontaneos*, quos, qui periodice insistant nonnullis, idque ferè ex vicerum Abdominis, Ventriculo plus minus vicinorum vel conectorum, vitio: tale exemplum reiert SCHENKIIUS *lib.* 3. *Obs.* 1. dum quidam singulis mensibus per biduum, Bilem utraque, cura Paitita conjunctam vomere solitus, vitam ad multoties novum produxit. Hi omnes Vomitus Spiritus animales variè affectos per causam agnoscunt, ut superius dicta: Imprimis hic malo vo-
gatur, qui vitio nonnulli Splenis partu affecti, ut videtur apud FORESTUM in *lib.* 18. *Obs.* 17. de quodam, qui circa Lienem subside dolebat, idque per certa intervalla, unde certis ferè perodiis humorem Melancholicum (uti loqui amat FORESTUS) ispe etiam omnino atrum, evomit: Sic BORELLUS in C. 3. *Obs.* 93. p. 370. & 375. insigniter commendat utilitatem Vomitus mensuris: & apud PANAROLLUM in *Prae.* 1. *Obs.* 22. habetur Vomitus matutinus ordinarius, à multis admodum symptomatibus praecedentibus, item Vomitus sepepenns salutaris in Puella ob Mesium suppleffionem. In Gravidis primis & ultimis mensibus Vomitus obviis est: Sicut LOTICHIIUS *Obs.* p. 442. reiert, quod signum Conceptionis in Viragine extiterit ZACUTUS LUSITANUS L. 2. *Prae.* *Obs.* 11. de quodam, qui singulis mensibus, duobus diebus, quatuordecim vel quindecim libras per Vomitem excrebat humorem nigerrimum, & pxi liquida similia, qui exinde omnino salvis ad sanum so. produxit vitam, & *Obs.* sequens reiert, quendam virum quibusvis mensibus arbitralio Vomitu perindis laborantem, usu Chalybis curatum, aperitis Haemorrhoidibus, per quas evacuabatur sanguis, & *lib.* 3. *Prae.* *ad.* *Obs.* 115. recenset perniciosissimum Vomitus menstruum seu singulis mensibus, materie, massa globulorum infar, concretum. Facit hac Vomitus studio prohiectus in Hypochondriacis, si scilicet singulis mensibus: aut (ex hebdomadinis, semel largius mero se ingurgiant, & hinc Vomitus artificialem non citra sanitatis commodum insistant. Elegans quoque & admodum ridiculum est exemplum PLATERI in *Obs.* p. 655. de frequenti Vomitu, post amputatum caput lactato: Simile inter rari referendū est exemplum BARTHOLINI C. 4. *Hyst.* 44. de Vomitu contagioso in Familia quodam, qui malignitatis fuit suspexit, & similes alios per contagium affecti. Pertinet hac Vomitus continuus lethalis

in corruptione & sphacelo Pancreatis, quod eam subintrantem in Ventriculo, sphacelatum factum, illam facile irritare possit: vid. *RARBETTE in sua Praxis* l. 4. c. 3. Item Vomitus contumax lethalis ab Pancreas lapidum vel scirrhorum factum, recurrendum a *PANAROLLO Pract.* l. 1. c. 44. Inter Vomitus causas est & depressio ventriculi mucronata, quam *RARBETTE Anat. Pract.* l. 4. c. 4. & *DECKERS in Praxis* epus p. 156. annotatur.

Inter ea, quae vomantur, etiam est Pus, & sanguis purulentus & cruentus.

Spleneticis valde familiares sunt Vomitus quicunque conueniunt, tam cruenti, quam non-cruenti. Primitus spleneticis vomitibus subinde periodicis nonnullis affliguntur, praecedente non raro dolore tenso circa regionem Splenis, idque cum calum impiorum euboria: vid. *FORESTUS l. 11. c. 17.* item *BORELLUS Pract.* p. 104. p. 2. & in *Append.* 484. *Centur.* pag. 179.

Primitus Paris est in variis locis, Pare vel in ipsa Ventriculo et bonis Abcessu, ratione deorsum continui, v. g. Sphaceli & Ischaemion, vel in aliis partibus per metastasi transiunt ad Stomachum; quod testantur observationes, Abcessus Hepatis, pancreatis, Liato, Melastoni, &c. fuisse excreta per Vomitus, quaeque ratione Arteriae Colicae & Venae Portae communicant: sicut ab Abcessu Hepatis Vomitus cruentum Pus *BONETUS in Sepulch.* l. 4. c. 40. testatur: de quibus infra plura, ubi de Inflammationibus.

De Vomitu sanguinis testabo infra peculiari Capite.

DIAGNOSIS.

Quod atinet signa Diagnostica: de illis vix epus est, ne minus dicam, cum satis manifesta sint: Immoente enim Vomitus pertinetur acri aliquam molestationem circa praecordia, & nonnullum rigorem Cordis: huius superuenit Vastigo, cum qua Salivae copiosius fluxus evenit, tremor labii inferioris, tandem violentius conatus Stomachi, quo rejiciuntur omnia in Stomacho.

Causa autem quia variatur, determinatur hoc modo: Differentia semper Vomitus per effermentum & per consensum probè attendenda est, quia in hoc versatur cardus totius Causae, & artificiali coniectura hic opus est.

Semper Vomitus esse per consensum habundatur, si partes quales in usum consentiunt cum Stomacho, vel ob viciniam perirent cum Nervis aëstus, ita ut vel doleat vel pulsus internum plus minus afficiat, subito superueniat Vomitus Stomacho antè nullum.

Sed affectus hic per consensum, ratione originalis font adeo vultu, ut nonnulli artificiali quidam sydoma praecognoscant, donec manifesti fiant: v. g. interdum Calculus & Colica laqueus Vomitus, non Calculus non statim sentitur: metus ergo in hoc fit Medicus.

In specie Vomitus per effermentum cognoscitur, si post repetitum Vomitus, & Stomacho exarsit, si post superius inausu vomendi conatus, illius gravitas, tenio & insatio, cibo insillium, ructus acidi vel aëoris, similiaque signa observantur: Itaque quidem, si Tumor vel Ulcus subit, nullus remediis mitigari potest excretu, imò Pus in postea casu simul exterritur: Sin vero Vultus, et loca aliquae illius circumstantiae hoc concludere licet.

Quod si verò per consensum labora Stomachus, patet. Si aliquando ante Vomitus percipitur, quidam molestia in regione Stomachi, si primo vel secundo die percipitur Nausea, Vomitus ipse est contumax, nullaque arte corrigibilis & anno assumptum denud rejicitur, & quidem, si nulla sit suspicio partium coarctarum, talis Vomitus oritur ob viam singularem in Stomacho vel partibus vicinis, ab icterico rheni aut Galieni, aut simile pitium.

Utrum verò humor ad Vomitus sinuatus in cavitatem Ventriculi liberè fluat, vel rursus aut tunica ipsius inhaerent, si diagnosticatur: quod ille levissimo conato & sum alimentum recipitur, coarctatus a passu quodam Ventriculi tenio & anxietate; aut si post vomitus Vomitus coarctatus, ut plurimum soli tamen humores viscosi excreantur; hoc vero ab ingrossa praecipua demum cibi consistit, cetera vero illa Nausea admodum molestia, & rejiciuntur alimentis sive humoribus, aut cum illis maximo demum cum coactu viscidis & crassi videt.

PROGNOSIS.

Prognostica quod spectat: In genere Vomitus omnia, qui non illi nimio, ut plurimum esse salutaris.

In specie Causae remotae ante omnia probe considerandum

sunt, cum ipsi vomendi conditionibus, eam pro earum ratione variorum Prognosis. Hinc enim Vomitus, qui est a Causa externa, vel ex Menstrui suppressione, qualis in Gravidis, vel Vomitus in principio morborum spontaneus non nimis, vel Vomitus in declinatione morborum Criticus, potius salutaris sunt, quam periculosi, Sine verò nimis, a Pharmaco praescriptum aut Veneno, vitae periculum portendit.

Si a Tumore similitudo conformationis Ventriculi morbo contingit, pro huius faciliore aut difficiliore Cura, qui est a Vomitu sedando modo maior modo minor spes est.

Vomitus ab Humore viscido difficillime curantur, dum *HILDANUS Cens.* 4. c. 32. de quadam Religiosa refert; eam per 31. annos singulis diebus Pituitam viscidam, Bile interdum intermixtam, exomissit.

Vomitus Chyli & Alimentorum frequentior, malus est, potissimum si cum febre fiat: vid. *HIPPOCRATES Aphor.* 3. Aphor. 39. Semper enim ratione excrementorum observandus est, Aphor. 2. test. a. in Vomitionibus, quae spontè sunt, si qualia appetet, evacuantur.

Vomitus lividi, praesentibus plura minus graveolens, aut Vomitus Vermium, superveniens in morbis, praesentibus Malignis: item Vomitus humaris fauci & obfcurae nigricantis upiorum sunt lethales.

In morbis Malignis Vomitus continuus & proteradus pessimum signum est.

Ordinationem quidem est, ut in morbis Malignis ex contagio haec in principio morbi addit Nausea & vomendi conatus: Sed si in progressu morbi superveniat Vomitus, illeque pertinaciter perdurat, pessimum est signum, & plerumque mors sequitur. In benignis morbis upiorum signum est Vomitus, sive in principio sit, sive in statu, ut sit in Febribus Intermitentibus, Ardentibus, Quanticis, leviore enim vim Naturae adhuc laudabilem.

Vomitus, qui supervenit calidè ab alto, percussione, & aliis Infectionibus Capitis singulum sunt signum, inquit enim gravem Infectionem Cerebri, Cerebri & Mesencephali, & nisi semperlibè inducatur Trepanatio, morbi supervenit.

Vomitus Hypochondriacorum & Scorbaticorum, item spleneticorum, aut qui Lemis & aliorum viciorum scirrhorum, aliisque chronicis laborant afflicti, periodicis, est saluberrimus, qui superveniens Haemorrhoidibus levare morbi certum autemque affertur.

Vomitus poraceus, uraginosus, nigricans item ex multitudine humoribus coarctis, vix variegatus ac interitus, valde periculosus est: vid. *HIPPOCRATES Prognost.* l. 1. c. 11. & *RIVIERUS l. 4. c. 11.* nistales a cerorum Ciborum crassitate aut corruptione proveniant: niger verò, qui afflicti Melancholici obnoxii, aut quibus ab Abscessu talis contingit, non semper est periculosus.

Vomitus ex Putride Bile permixtus, uti comestodissimus est: ita fœcoris, seu Putridissimus aut Biliosus tantum, deterrior observatur: vid. *HIPPOCRATES Prognost.* l. 1. c. 12. & *RIVIERUS l. 4. c. 11.* & *Prædictum. Tract.* 111. item *RIVIERUS Pract.* l. 4. c. 7. p. 612. & 614.

Pariter Fœcam alid, & ano iniectionum Vomitus semper lethalis exitus: Vermium verò aliorumque toto genere praeter naturam rejectio, uti ratione causae mali quidem sit, hoc tamen ratione effectus dicitur.

Denique Vomitus Criticus uti laudabilis, Symptomaticus verò periculosus: vid. *DECKER in sua Praxis* l. 1. c. 131.

Modo atopiadus Causae, faciles erimus in Prognosi.

C U R A.

Quod attinet Methodum Medendi; in hac

1. Cautum remedium irritantem habenda est ratio, neque potius remota removenda: sive per effermentum sive per consensum Vomitus inferat; quod etiam de Nausea intelligendum.
2. Senfus Ventriculi, speciatim Pylozi, acutus, & nimis Spirituum impetus, seu Causa efficiens formis, Opacitatis aut Similibus Anodynis, quippe qui non parum auxilii in his affectibus praestant, sciendus & iustitiam mandandus.
3. Medicamenta Ventriculo gratia, Aromatica volatilia, suavolentia, admixtis blandè Acidis adstringentibus pro liberam debito tono firmando, & inebriato resurgendo, usurpanda.

Pro his scopis obiciendis observandum,

1. Non quicquid Putridum esse solum, non spontaneum, aut motum inlethali Naturae, sed saltem eum, qui uti oi

nus aut Symptomaticus, adeoque ex vi Cause morboſe cum virum acri diſpendio accidit. Vomitus Criticus ſineſus eſt, niſi ſit nimis: Vomitus Mulierum gravidarum non eſt ſupprimendus, niſi excedat, quia tunc evacuat corpus primis menſibus, & puerperium inde ſalubre evenit, non tamen excedat modum. Pluribus evenit in principio morbi Vomitus, qui non ſilendus; ſed ſi maturè vult ſupprimi, illum promovemus.

II. In Vomitu Scorbuto non conveniens Calida Aromatica, quæ malum magis exacerbat, ſed potius Abſorbentia ſeu acrimoſam Salis ſcorbutici mitigantia & temperantia, qualia ſunt Lapilli Cancrorum, Ebur ſine igne, Corallia, Antimonij diaphoreticum, item juſta EUGALENUM, Lac, præprimis capſillum, cum Succo Naſurtii aut Cochleariz miſtum ſi ut ſic ceſſante acrimonia ceſſet Vomitus: vid. DORINGIUS Centur. 2. Xpſid. 30.

III. Vomitus Sanguinis citò ceſſanteſcit optimam eſt, aliis ob copioſam perſiſcentem Sanguinis ac Spirituum ſequuntur Lypheymia & Syncope lethales.

IV. In Vermibus ſemper præcurandum, non aliter ſi adſiſſit, ſed aliter ad minimum diſcurus, vel artu, vel natura, ſi deſectio promovenda.

V. In omni Vomitu uniù obſervetur, ne Albus ſi adſiſſit, ſed quantummodo poſſibile eſt, aperta teneatur, vel artu vel natura: hinc levis Clyſteris tantumnon in omni Vomitu, imprimis contumaci, commendatur, ut, quod irritat Ventericulum, detrahetur ad Inteftina, & eliminetur. Iidem tamen in paucis quantitatibus injiciantur, ne Ventericuli fuodius Colo incumbens exinde comprimitur & irritetur: conſ. GABELCHOVERUS Centur. 2. Cur. 4]. Purgans blandum interdum convenit, quod revellendo ſimul videtur operari, quale ex ſuperioribus de Apopleſia laſeſa petere licet: cui tamen taſtillum Opij addendum.

Excipitur tamen caſus Morborum quorumvis cum excretionē Cutanea, plùs miùs critica, conſuſionum: e. g. Febres acutæ cum Variolis, Pechiis, Purpura: item Scabies, aut Pathema corporis & artuum Scorbuto per excretionem Cutaneam, miliarem &c. leviorum. In his omni, præſertim Febribus acutis cum excretionē Cutanea conſiſtens notandum, ſicut apte excretionem illam ſeſe intendentibus urgent præcordiorum pathema, anxietates, diſſidiles reſpirationes, Vomitus, hypochondriorum tendones, alvi fluxus &c. quæ omnia præcedente illa excretionē Cutanea cum euphoria ceſſant; ita ſi inſuper illa excretionē, non vel redire hæc pathema, & horum loco capiti & generis nervoſi ſymptomata ſupervenire ſolent. Eſt ergo in tali caſu pertinacior Vomitus neget, proſciùd vel plane non, vel cauſiſſimè conveniunt Glyſmata, ne motus ille ad extra excretorius, irritando Inteftina, provocetur intrò ac Diarrhœa ſymptomatica, vel Dyſenteria excitetur & Potiùs appropriatis Sudorificis, Quæſtis, debitè miſtis, Naturæ turbatus motus reſtituatur.

VI. Somnus, quantum ſeri potèſt, conſultandus: Nam & hic motum humorum quomocunque, tam progreſſum quàm inſeſum, ſiſtit, irritationes lenit, & evacuationem quomocunque cohibet.

VII. Ab errore externo, imprimis à Venæ leſione, ſi ſit Vomitus, non eſt ſilendus, ſed tamdiu hic ſiſta remediòrum conſultandus, quàmdiu eſt ſuſpicio Venæ aliquid adhuc ſuperelle, & medicamenta in Ventericulo remanent. Promoveatur in tali caſu Vomitus, alſomendo potuſenta, in ſpecie Pinguis, acrimoniæ exceſſivam Venenorum contigentia: Omne Venenum Vegetabile & Minerale conſiſtit in exceſſiva acrimonia nobis hoſtili; non verò ita res eſt hæbet cum Animalibus, ubi alia ratio.

VIII. In Nephritis, Nephritis ſive Anxietate, & ſimilibus Stomachi humoribus aſſectibus, maturè hic accurandum, ne dum cum Vomitu ſiſtaſtandum, ne præternaturalibus humoribus aliorum ſapit, ſiſtit, inſiſtitur vomitio: Conſ. M. A. N. C. 200. 4. Op. an. p. 77.

Quod ergo attriſet remedia ad Vomitum directæ quæcunque Cauſa ſit irritans, removenda, ſive ſit per eſſentiam Vomitus, ſive per conſenſum. Curato enim morbo, hoc ipſo curatur Vomitus, ſive erato ſiſta, curatus etiam eſt Vomitus. Unde ſi fuerit per eſſentiam Vomitus, evacuanda eſt Cauſa irritans. Cauſam autem, quæ removen, ſunt varia, pro Cauſarum varietate. Pro hoc ſcopo utantur quidam Vomitorum & quidem medicorū, præprimis ſi alſumatur copioſiora prava, & quocunque modo Rrimonia, item humores excretionis in Ventericulo tale quid præſentent,

vid. VALLESIIUS l. 2. Xpſid. 20. Hoffmannus M. M. l. 2. c. 9. & RIVERIUS l. 2. 414. c. 9. De Stomacho viſſeſe, qui omnia removen, & plègma tamen eluvare non poterat, proſicquitur eſt ſequens:

℞. Aquæ Menth. ʒiſſ.

Cinnam. ʒiſſ.

Spiritus Maſtich. ʒiſſ.

Theriacal. camphor.

℞ſer. Croci an. ʒiſſ.

Spiritus Salis dulc. gutt. xʒ.

Syr. Nicotiana ʒiſſ.

M. E. Pule. S.

Mictura ſtomachalis diſſolvens, cochlearum ſumenda. Aut etiam blandum Purgans ſuprà jam commendatum. Utraque interdum ad Modernorum imitationem cum parva Opij doſi uſurpanda: ſed rariùs ſit; nam Vomitus ſponte ceſſat, Cauſa irritante evacuata: Si opus eſt, ſalubre eſt conſilium RIVERII, quod dicit inſerit in Dideritis Galſis. Quod ſi verò per conſenſum Vomitus fuerit, curato primario morbo, etiam curabitur Vomitus: hinc v. g. qui à partium Inflammatione, turgelcentia ſanguinis enormi, aut ſolemi quodam illius excretionē ſuppreſſa, optimè Venæ leſione curatur, Ventericulo ut tali aliaſ minùs adequato remedio: vid. RHODIUS G. 2. Obſerv. 66. & 67. BARBETTE Prax. l. 2. 2. & WILLISIIUS Pharm. rat. p. 1. S. 2. cap. 3. Inſerit ſaltem ſiliſſat Opiatum ſenſus conſenſus.

Quæ irritatioſ Romachi ſenſibilem, & nimium ſpirituum impetum compenſant, ſunt Opia, & alia Anodyna, quatenus ſpirituum in ſiſtis Ventericuli impetum refrangunt, ſenſum ſtomachi obtundunt, ejuſque perceptionem hebetant. Omnes Vomitus compenſantur Laudano opiato, quod primarium Vomitus ſiſſent eſt, præprimis ſi à Vomitorii nimio impetu tale quid fuerit: vid. SYLVIIUS Prax. l. 1. c. 15. & WILLISIIUS loca allegare. (R.) Poſſet etiam uſurpari Eſſentia Opii, Theriaca, Michridatum, Philonium Romanum, Electuarium de Oro, Diſcordij Præparatum, quod nobiliſſimum eſt, Eſſentia & Extraculum Theriacale cum Laudano opiato, Syrupus Papaveris, Crocus, tam internè quam externè adhibetur: e. g. in Vomitu ſimpliciter compenſando, demulcendo Ventericulum nimis irritatum.

℞. Menth. ʒiſſ.

Maſtich. ſuperiùs deſcripſe. ʒiſſ.

℞. Diſcord. Præ. ʒiſſ. vel ʒiſſ.

Succ. Cydon. ʒiſſ.

M. E. Pule. S.

Potuiſcula confortans,

Vel

℞. Ag. Menth. ʒiſſ.

Cinnam. cum Vin. ʒiſſ.

℞ſer. Op. dulc. ʒiſſ.

Syr. Menth. ʒiſſ.

M. E. Pule. S. ut ſuprà.

Expertus etiam eſt ſequens Bolus in Vomitu, Singultu & ſimilibus:

℞. Theriac. ʒiſſ.

Laud. opiat. gr. i.

℞. Maſtich. Maſt. gutt. ii.

Cum Succ. Cydon. E. Bolus.

D. S.

Electuarium pro una vice.

"His pro terriſ ſcopo adiunguntur ſtomachica bene odorata, & Aromatica, Ventericulo grata, quæ in omnibus remediis ſtomachicis, ſive ſi Nauſia ſive Vomitus, addenda ſunt. Nam uti Fortida Nauſiam inferunt, ſi Aromatica ſuaavelentia ſolantur ſtomachum. Hæc inier, primaria ſunt Cydonia, & quocunque Cydonata, in ſpecie Vinum cydoniatum per fermentationem, Mentha, Abſinthium, Meliſſa, Radices Zedairæ & Cyperi, Cortices Citri & Aurantiorum, Maſtiche, Caryophylli, Nux Moſchata, Macis, præ cæteris Cinnamomum, & hinc Aqua Cinnamomi ſimplex & cydonata, Syrupus de Canella, ſeu de Caſſia Myſſa, Eſſentia Cinnamomi & Caſſia lignor: Myſſa, Eliſar Mentha, Aqua Maſtichina Myſſiſſa, item Decoctum Jalis ad quemvis Vomitem præſantiſſimum ex Caryophyllis & Maſtiche; quod videt, apud SENNERTUM, l. 2. Prax. de Vomitu p. 199. Nempe

℞. Caryophyll. crudiſſimiſ conſuſ. ʒiſſ.

Maſtich. ʒiſſ.

℞ſer. rad. p. i.

Simil. mictura coquantur cum

vin. rubri ʒiſſ.

In

(R.) Ad compenſandem nimium Ventericuli irritationem, ab humoribus progreſſimè acerbis & acrioribus ſaltem, juvat ſuperiora refrigerare largire potus; quæ nempe & Ventericuli ſenſus retinendi, & Venarum excitandi artus ſucci dilui aliquo modo poterunt.

In vase clauso ad medias, sit *Potiuscula Jussii* p. 324. Item Effluvia, & spiritus Mastiches, qui est egregius, Menthae, Theriacalis camphoratus, Ellaei Proprietatis Paracelsi: de quo vid. HORSTIUS l. 4. Observ. 55. Eliait Vitrioli *staphylici*, Balsami Peruviani aliquot guttulis, & ejus Tinctura ad imitationem WILLISII parata; hinc Simplicium Morum Extracha, & Olea destillata. Camphora cum Speciebus Dia-Moichi assumpta commendatur à RIVERO. Quoad *adstringentia*, excellent Cydonia, Symplicum de Rosae lactis, qui blandè adstringit, Symplicum Coralliorum *Rosacearum*; hinc Succus Granatorum, Acetum Vini, rosaceum, præparatis Acetum Zedairæ per Infusionem, optimè convenit: Decoctum, & Erratum Radicis Tormentillæ, Bistortæ, quo via præstantia remedium hoc in casu datur; Erratum Abiinthii, Ligni Aloës. In specie confert spiritus Vitrioli cum Conserva Menthae, Abiinthii, Rosarum, &c. præsertim spiritus Vitrioli Martis, qui primum speciem est ad sistendum Vomitum; nam præter acetem stomacho gratum habet simul saporem adstringentem, ob consuetudinem substantiæ metallicæ, quam cum Vitriolo secum vehit; ubi etiam spiritus Vitrioli Philosophicus, item cum spiritus Vitrioli vel spiritus Nitri ex Terra sigillata paratus *Zoyus syriacus*: vid. PRÆVOTIUS p. 41. In *Salutis*. Modus est hic. Terra sigillata imbibitur antea pulverisata cum spiritus Vitrioli, vel spiritus Nitri ad consistentiam pulvis, quæ pulvis concrevit in loco frigido in Lapidem, & hoc concretum Aluminis: lapis hic tritus & pulverisatus in loco frigido & humido stat in Liqueorem, qui Liqueor blandè acidulus vel solus usurpatur, nomine *Liquoris syriaci*, ad gutt. x. vel xix. vel cum equali parte *Spiritus Ceraurum nigrum* digeritur, donec periclitè uniatum; qui Liqueor admodum potens est, valde adstringit, & rariore Terræ sigillatæ malignitatis resistit. Hinc dicitur à PRÆVOTIO & BARTHOLOEO *Aram Pualiti ex Terra sigillata* & quia Terræ sigillatæ inest aliquid de primo ente Auri: Tinctura Martis adstringens similiter est conveniens, & omnes ex Marte parata Tinctura hic conveniunt: Alumen Mishur additum pro hoc scopo, & Adstrictiva & Absorbentia terræ primaria sunt, ut Bolus Armena, Terra sigillata, Corallia, & omnia ex his parata medicamenta. Conserva Rosarum, Menthae vitriolata. Ea his omnibus per cæteris palmam præcipit Succus Cydoniorum: hinc spiritus Vitrioli prodest; nam spiritus seu Oleum Vitrioli, ad aliquot gutt. v. vel vi. in haustu Vini Matvæci admodum commendatur à RULAND & HARTMANNO in Vomitu disturno, dosi cochli. i. vel ii. donec sistatur Vomitus. Alii Mixturem hanc præscribunt ita:

Ag. Aqua Menthae Jil. vel iij.

Cinnam. 3vi.

Succi Cydon. 3i.

Spiritus Vitrioli rectif. gutt. v. vel vi.

Olei destill. Cinnam. gutt. iij.

M. S.

Adstringens Potiuscula stomachalis.

Capiatur coctum, v. g. cochli. i. per vias, & feliciter operabitur: cui interdum gr. l. vel ii. ad summum gr. iij. Londoni opiat possunt addi, & sic erit efficacior.

Vel

Ag. Aqua Cinnam. simpl. vel cydon. 3ii.

Spiritus Vitrioli 3i.

Olei destill. Cinnam. gutt. iij. vel iv.

Syrup. Menthae 3i.

M. f. Patis, S.

Adstringens Mixture stomachalis.

Item

Ag. Aqua Menthae.

Rubi idai. an. 3i.

Cinnam. 3vi.

Spiritus Theriacal. simpl. camphorat. 3ii.

Succi Cydoniorum 3i.

Essent. Ambra 3i. vel 3i.

M. S. ut antea.

In specie convenit in Vomitu nimio, qui in Febribus accidit, cum animi deliquio, aut ubi extrema frigit, præter Ambram, quæ stomacho pergrata; Ambra enim est optimæ anælepticæ.

Item ubi non sufficit acor adstrictioris, ad Alumen confurgendum, quod in omnibus fluxibus sanguinis & aliorum succorum potentissimum est: & suæ insignis Prædictæ sequentem Mixturem in secretis habet contra Vomitus, Lienteriam, Alvi fluxum, & similes affectus, ubi moderata, aut paulo fortiori opus est adstrictione. Formula est hæc:

Tom. II.

Ag. Aqua Menthae.

Cinnam. an. 3i.

(Vel *Ag. Aqua Menthae* 3ii.

Cinnam. spiritus 3i.)

Adde

Spir. Vitrioli 3i.

Olei destill. Mai. gutt. iv. vel v.

Alumina gr. iv. vel v.

M. pro *Angustia coctum* capiendum in Vomitu, tam Sanguineo, quam communi, Lienteria, & aliis Diartheis.

D. S. ut antea.

Vel

Ag. Aqua Menthae 3ii.

Cinnam. cydon. 3i.

Spir. Nitri dale. *theriac.* 3i.

Alam. gr. iv.

Syr. Corall. Querc. 3vi.

M. f. Patis.

Ag. Aqua Menthae.

Essent.

Cinnam. cydon. an. 3i.

Succi Cydon. 3i.

Ess. Symplic. *sapra* dist. 3i. ad 3i.

(potenter enim adstringit.)

Syr. Corall. Querc. 3i.

M. D. S.

Adstringens Potiuscula.

Theriac 3i. cum Aceto assumpta enim confert. Vel paratur Bolus ex *Theriacis*, & *Spiritu Vitrioli* ad gutt. ii. vel iij. In Vomitu Febrium, præsertim Malignarum, remedium elegans est *Salis Aliphath* 3i. cum cochleari Succi Limonium, vel Granatorum misti: vid. RIVERIUS *Cogn.* 1. *observ.* 15. & C. 2. *observ.* 59. E. 6.

Ag. Aqua Cinnam. 3i.

Succi Cydon. 3i.

Salis Aliphath 3i.

Corall. rub. præp. 3ii.

Syr. de Ros. sic. 3ii. vel iij.

M. S. ut *supra*.

Si Pituita crassa in causa sit, pro bonis incisione conveniunt Aromatica & incidentia Salina, ut spiritus Salis vel Nitri theriacalis. Sin vero malum abnoscione, & Inflammatione tunicarum Ventriculi, conveniet Linthus ex unguiculae Seminis Pysylli, Cydoniorum, cum Symplicio solutivum: vid. BARBETTE *prax. in allegor.* p. 324. & 136.

Incer *Extrema* ad Vomitus compellendum, præter illa de *Anorexia* relata, conveniunt Crusta Panis seu Panis tostus, Aceto Vini vel Vini adstringente, aut in quo Cydonia ebullierint, vel Vini Malvarico ebullis, hinc Pulveribus aromaticis, Caryophyllis, Cinnamomo, Macæ, &c. adpersus, & ita externè stomacho calidè applicatur: item spiritus Vini camphoratus, vel Balsamum Anglicum calidè, cum linteis multiplicatis superius admotum, est egregium: item Foras humidus ex Decocto Abiinthii, Menthae, Melissæ, Palegii, & similibus aromaticis in Vini vel Aceto decoctis, cum linteis multiplicatis, vel spongia calidè admotus: E. g.

Ag. Camar. Aliphath.

Herb. Menthae an. M. ii.

Rad. Asiri vtri.

Levis. an. 3vi.

Cypri solaris

Galang. an. 3ii.

Majusk. 3i.

Caryophyll.

Muris an. 3ii.

Concisa & contusa include *Sacculis interpassis*, in forma *stigma* vel triangulari, qui ita paratus & probè calefactus imponitur stomacho: vel calefactus irroratur cum Vino, & calidè imponatur parte humida stomacho; vel coquatur in Vino, Spiritu Vini, Aceto, &c. & ita servidus applicetur.

D. S.

Sacculus extræ applicandus.

Vel

Ag. Herb. Menthae *crissa* M. ii.

Nos. Melch. 3i.

Caryophyll. 3ii.

Macis

Cinnam. an. 3i.

M. f. *Pulvis grossus*: excipitur cotone, & includatur Sacculo interpassato, irroratur cum Spiritu Vini *theriacali*, vel Oleo destillato *Menthae* ut dicitur *Juniperi*.

K

D. S.

D. S.

Externa Species Stomachales.

Item Theriaca, vel sola; vel cum Balsamo Peruviano probe mista, alliciter extergit copiose regioni Stomachi; vel aliter indicta Emplastri forma admoveatur; vel ad imitationem HOECHSTEDTERI, irascatur Theriaca cum Aceto Rubi Idii, & applicetur regioni Stomachi: vid. in Decade 7. Cap. 8. Item fiant Lixiviae suavelentia ex Theriaca, additis Oleis de Illitibus; vel fiat Liximeum ex Oleo Nucis Molchate expresso, tempus corpore, cum Oleo de Illitibus Macis, Carvi, Menthae, Zedoariae, &c. & aliquot guttis Olei de Illitibus Caryophyllorum acutum, extense laungitur: E. g.

℞. Olei sapor. Nuc. Moschat. an. ℥i.

Rosae, Juniperi ℥i. ad ℥ii.

de Illit. Menthae.

Caryophylli.

Macis an. ℥ss.

Cinnam. gutt. v.

M. D. S.

Balsamus Stomachalis.

Item Oleum Masticheum, Abinthii, Cydoniorum, Menthae, Oleum Stomachale Crataegi etiam cum Oleis subactum, Emplastrum Stomachale Crataegi, de Carana, quod est singulare; Compositio ejus secundum BARBETTE in sua Praxis, ubi de Vomitu, p. 158. est haec;

℞. Sapor. Aromat.

Mastiche an.

Olei sapor. Nuc. Moschat. an. ℥i.

de Illit. Cere. Citri.

Menthae, an. ℥ss.

Quam. Carana q. l.

M. I. Emplastrum.

Inducatur super alutam, obducatur cum Sandois rubra in forma Sani Stomatialis. D. S.

Emplastrum Stomachale.

Vel

℞. Emplast. Stomachal. Crat.

Tamachos. an. q. l.

Malax. cum f. q. Olei Stomachal. Cratem. vel Balsamo Peruviano; indue super alutam, f. Cratum Stomachale absque Sandois, irroretur cum Oleo de Illitibus Menthae, D. S.

Emplastrum Stomachale.

Plura Externa huc faciunt, quae supra dedi, ubi de Clysteratione, & quae sunt hoc de Diarrhoea laudantur an. g.

Sacculus Croci Ventriculo admodum, egregie Vomitus sistit, etiam cum, qui navigantibus solet esse familiaris: de quo eleganter videbitis historiam in BACONIS Perusalinae Liber. VII. & Mortis pag. 121. Egregia sunt Cataplasmata, facta ex Fermento, additis Pulveribus aromaticis, quale est Symplicium ad S. gulatum, quod optimum est in quibuscunque Stomachi affectibus, in specie in Vomitu, Vel quod addit DECKERS in Barbette Praxis, ex Colleg. Jesuitarum D. MICHAELIS delumpsum:

℞. Pulv. Menthae.

Rosae. cub. an. ℥i.

Mastiche ℥i.

Nuc. Mosch. Na. iii.

Caryophylli.

Cinnam.

Macis an. ℥i.

Croci ℥i.

Fermenti acerr. ℥i.

Cum f. q. Aust. ref. f. Cataplasma plant. Singulare.

D. S.

Emplastrum Stomachale.

Ad imitationem horum in consummatione Vomitu, aut morbo navigantium, tale Emplastrum applicandum venit:

℞. Fragor. acerr. ℥i. vel ii.

Pulv. Menthae ℥i.

Rosae. ℥i. vel ℥i.

Nuc. Moschat. No. ii. vel iii.

Menthae.

Caryophylli.

Cinnam. an. ℥i. vel ℥i.

Sen. Anis.

Cumini.

Feniculi an. ℥i.

Aust. rosae. parum.

Misc. ad confectum Cataplasmae, applicandum Ventriculo in Vomitionibus.

D. S.

Emplastrum Stomachale.

Levo Nucis Molchate & reliquorum Aromaticorum, Cataplasma hoc guttis aliquot Olei de Illitibus Menthae & Caryophyllorum irroretur potest.

Plura quidem in genere de Vomitu curando.

In specie tamen consideranda; quae de Vomitu Vomitus curantur: In hunc finem

I. Artificialis Vomitus non est curandus, nisi per accedens sit nimis, tunc enim supprimendus.

II. Spontaneus non est curandus, quia fit cum euphoris integri, quicquid etiam respiciatur, nil sit omnino, adeoque debilitetur aeger, vel nihil aliud Stomachi & exasperetur Vomitus metuenda sit; tunc enim curandus, causam irritantem removendo, aut ejus generis praecavendo, aut gentem alibi cavellendo & averendo per Venae sectionem, aut Haemorrhodum, Hirsutium applicationem, apertionem.

III. Non-spontaneus Criticus non est curandus, nisi, quod ratum, sit nimis, tunc enim, ad Vomitus artificialem, si tendens.

IV. Non-spontaneus Symptomaticus curandus est, observando praeparis: an sit per coactionem? an per effluam? Si per coactionem, primarius scopus, quantum possibile, evadendus est: loteres, ne alia causa Vomitus excitetur, Opus irritatio Stomachi sistenda, vel solus Stomachi sensus leniendus, & appropriatis roborandus: v. g. si ex Nephritide, à Capitis Vultu aeger sapienter vomat, una cum primari morbi curatione, Mistura Aromaticis, cum Opio aut Papaverinis mistis, nimis Vomitus nonnulli compescendus. Sin vero per effluam sit Vomitus, considerandum: an vitium sit in eisdem fibris aut per vis, supra modum undecunque irritatis? vel in ipso ejus corpore, quando evasceratur, escoriatur? &c. an vero vitium consistat in causa quorundam materiarum seu occasionalium, cum plus minus irritatoe. Hujus ratione consideretur: an sit per *excessum*? an vero per *defectum*? hoc est, an Causa peccans materialis in eo generetur? an vero aliunde deferatur? Sin vitium est in ipso Stomacho, hoc debitis modis curandum, & sensus auctor Opus sopiendus? Sin Causa materialis occasione suggererit, si vis humor peccans fuerit, five fermentum saltem peregrinum, adeoque vitium vel in Stomacho quorundam, vel in eo radicatum, adeoque per *excessum*, tunc vitium materiale vel corrigendum vel eliminandum: hinc Opus & appropriatis, plus minus adstringentibus, Ventriculo succurrendum, & ulterius generatio praecavenda. Sin vero per *defectum* sit malum, & aliunde transmissa materia peccans, haec vel corrigenda, vel per alium evacuada, vel alio avertenda; quae ratione Gravissimi vomitibus Venae sectione in brachio Interdum succurritur.

V. Non-spontaneus Morbidus, omnino quocunque modo curandus; v. g. Saugum Vomitus, causae etiam eius sollicitum habendo rationem. Conf. hic pluribus WILLIS Pharm. Ration. Vol. 1. pag. 76. & seq.

In specie Vomitus artificialis est ostendens; e. g. post assumptum Vomitorium vehementius aut diutius aegrum vomat, convenit Fetus externè calide applicatus, ex Abinthio, Mecoia & Aromaticis fuculo inclusus, & in Vino decoctus; item haustus Vini generosi non nimis frigidi super vomitiones seu hypercathartes ab Antispasmodicis sistit, Theriaca etiam, si vires ferant, aut Philaunica Laudani opiat, aut parum Essentiae Opii, in Elixir Menthae propinat. Praeterea etiam remedium dicitur Potus Lactis cum Pane cocti, aut Panis Vini generoso acido intinctus & comestus. Clyster stidem ex Lacte, in quo Theriaca dissoluta, inspicitur; item Crusta panis tolla, Vini generoso amicta, cum pulveribus Aromaticis inperia applicetur.

Sic Lac quoque vomitibus orato remedium est, vid. HELWIGIUS de alia *Wanglii* §. 102. idque praetertim si est accitior aut venenoso medicamento fuerit concitatus. Conf. FORESTUS lib. 18. observ. 17. unde & Scorbucorum in Vomitu profectum fuit. Item in escoriatione, aut erosione Ventriculi Lac cum Saccharo conducit. Quomodo alias Ardores, Anxietates, Vomitus, qui escoriationem Ventriculi praetertim circa antrum Pylori, insequuntur sit tractanda, vid. WEPFERUS de Crust. agn. p. 133.

Si Stasis aut Vomitus immoretur ab assumpto Medicamento vel ingratu vel fœdite, convenit masticatio Corticum Cuxi speciosiorum, cui subinde de pulpa aliquid quantum adhaerit; vel Panis tollus Aceto intinctus, & pulvere Caryophyllorum inspersus, ora ac caribus admoveatur.

Plura de Vomitionibus nimis per Medicamenta a fœdis, ca-

exurum medendi ratione, vide apud WILLISIUM in *Pharm. Ration. pag. 75. (S)*

C A P U T II.

De Vomitu Cruento.

C A U S Æ.

Jam sequitur Vomitus Sanguinis, seu Vomitus Cruentus, qui est, quando rejicitur sanguis per os: Et fit vel ex aperta quacunque ratione arteriola aut venula stomachi, idque vel vicio suppreffurarum confluxum sanguinis aliorumve humorum evacuationem; vel vicio Splenis, adeoque ex deficiente Vase Brevi in stomachum, vel denique vicio Pancreatis, in quo tunc alterave vena à Lympha cum præter naturam acidiore essetia, aut aperta, refundunt sanguinem in Duodenum, qui regurgitat in stomachum, & sic non raro Vomitus Cruentus inducitur.

Rarioris Causæ, ob quas fit interdum Vomitus Cruentus, sunt primario suppreffæ confluxus sanguinis in corpore cacernendi evacuationes: hinc post *Hæmorrhoidum* & *Mæstrum suppreffionem* ex robore Naturæ supervenit Vomitus Cruentus: idque tunc in Gravidis, quàm non Gravidis. Exemplis talia non sunt rara, & referuntur à RULANDO in *Curat. Empiric. Crit. 3. Curat. 4.* CORTHUMMIUS *De Morb. acut. l. 3. p. 33.* & àb HOECHSTEDTERO *De med. l. 2. c. 6.* refertur exemplum Vomitus sanguine admodum periculosi propter suppreffionem Menstrui in Virgine: item SCHENCKIUS *l. 3. Observ. simul habet Obervatorem Vomitus Sanguinis propter suppreffionem Menstrui*. Fit quidem non raro, ut Prægnantes ipse ex Menstrui reventis interdum affligantur Vomitu tali sanguine, idque ferè sine periculo: ac enim motus Naturæ, quos non facili licet à Naturæ: vid. *M. A. M. C. An. 9. p. 10. Observ. 6.* & SALMUTH *C. 2. Hif. 34.* qui refert de Puergante Vomitu sanguinis confluxu afflicta quodam, donec scilicet ipso conceptu edito ab opere liberaretur, & simile ferè exemplum habet SCHENCKIUS *l. 2. Observ. de Gravidâ*, qui sanguinis Vomitus per 7. menses perpessus fuit, & tandem feliciter peperit. Ad hæc confluxum evacuationum suppreffionem pertinet Ulcus consolidatum antiquum thibiarum, Vomitus Cruentum inferens: vid. RHODIUS *Crit. 2. Observ. 45.* Ratio duplex à se partim quod sanguis, ante sub forma puri evacuat, suppreffus: partim quod fermentum acre ulcusculum multiplicat erexit vascula arteriaria in Pulmonibus. In Mutatis Vomitus Cruentus non raro contingere solet, pede manique ablata, ubi Natura sanguinem refundant.

Tom. II.

tem per Vomitus rejicit: vid. CORTHUMMIUS *l. de Morb. acutis cap. 30. p. 35.*

Spleneticis tandem valde familiares sunt Vomitus Cruentus. Quoad modum: certum est, quod per venaem oil immediate veniat in stomachum, sed hæc beneficio Valorum Brevis, arterioli & venoli, quæ raro, ferè & nunquam, actur ex Splene, sed ex Arteria Cœliaca, Splenica, & Vena Splenica ante ingressum horum valorum: Quoad ergo Splen scirrhusus est, vel alio modo infarctus, non potest admittere sufficienter sanguinem per Arteriam Splenicam affluentem, qui tamen stagnando in dicta Arteria, ob denegatum spatium non potest remeare convenienter ad Splenicam Venam, lege circulatoria. Impeditur ergo sanguinis motus in Arteria & Vena Splenica, stagnat quodammodo in Arteria Splenica, in specie circa Vase Breve, ante nempe ingressum Arteriae in Lienem, quod Vas Breve ad Ventriculi seu stomachi fundum subiepit. Sub tali occasione stagnatio sanguinis impeditur facta, tandem per Vas Breve aperitum sanguis arteriosus in stomachum evacuat: hinc subinde ante Vomitus sanguinis percipiuntur pulsationes circa dorsum in latere sinistro, ubi sunt costæ mæstæ inferiores, & brevi post ruptionem Vasis Brevis arterioli sequitur sanguinis Vomitus, talibus subiectis subinde salutari. ZACUTUS LUSITANUS in *l. 2. Med. Princ. Hif. 10.* aliquot recentis exemplis Splenicorum & similibus, quos sanguinis Vomitus familiariter sublevari: quæ etiam habentur in PLATERO *l. 3. Observ.* & SCHENCKIO *l. 3. Observ.*

Non tamen semper à Splene sunt Cruentus isti fluxus, uti hoc communiter existimant, quin & ex *Hepate*, citra Lienis notam, Vomitus sanguinis fieri potest: de quo conf. HOECHSTEDTERUS *De l. 2. C. 3. p. 146.* Miræ sunt uti subinde sunt humorum metallalis & translationes, ita & valorum andæmones, & apertiones. Confluxus de Vomitu sanguine, in ea Splene an ea Hepate, SCHENCKIUS *l. 3. Obs. 1.* THONERUS in *Obs. pag. 140.* SENNERIUS *Præf. l. 3. p. 3. l. 2. cap. 3. pag. 307.* BARTHOLINUS *Crit. 2. Hif. 36. C. 4. Hif. 60.* HORSTIUS *l. 2. Observ. 3.* Observationem rariorum habet RIVIERUS *Crit. 4. Observ. 6.* de rubrico, qui cum aquam fluminis potasset, ac incipit Hæmorrhoidem simul habuisse, hæc lateribus stomachi infusa, contum sanguinis Vomitus induxit.

Denique ex Pancreate subinde fieri sanguinis Vomitus, ex eo ferè patet, quod interdum tales sanguinem vomentes coqueantur de dolore profundo sub Hypochondrio dextro; locum scilicet monstrant infici, ubi inseritur Ductus Pancreaticus in Intestinum Duodenum: & præterea tandem Vomitus sanguinis sæpius sequi solet: de Paris Vomitus, quod fit nonnisi ex Pancreate cauterato, vel per abscissum nonnihil viciat. Et tales Vomitus Pancreatis præ cæteris solet

K 2

præ-

(S) Hæc reticenda hoc loco est elegans Historia Vomitus diuturni in Nobili Meniali ferè quadragesaria. Hæc quom imo: ægritudinebus, præsertim capitis afflicto, & malest tremore, nervorumque amissionis amia, longo jam tempore vexatur; post multa incassum adhibita præstia, incensum cum 1718. Bædærico Jerviali viri capiti; quod postquam via per labandam assumpsisset, repente in alimenorum Vomitus incidit, ut sive solida sive liquida essent maxime cum comatu rejicerentur sanguisque cum cæstrato, ut quandoque illa ad Ventriculorum mœmæ periculis cæstratus visum fuerit. Multiformia à subita medicamentis vel et ipsa quoque rejelia, vel sine emolumento retenta. Hinc cardiagia, anxietas, lypeymia, & septemviri febres: imo mense Martio, perseverans eadem immediabilis Vomitione, adeoque viribus summe labefactis, horrenda hysterica convulsiones, quindecim diebus & notum spatio, Agrotatorem in terra exercuerunt, qui reperitis Venæsectionibus tandem cessare. Minus vero cessu Vomitionis obstinatio, ut quicunque cibi specie, sub quacunque forma deglutimus Ventriculus, veluti res nova insipia læssetur, cum impetu euceret: videbatur profectibus Ventriculi catum subitum à Diaphragmate superius, inferius verò & secundum latera à musculo imi ventris, & à tunc quondam scirrhusum indolem nata, qui Regius sedem longo jam tempore occuparet, veluti à torculari feriter comprimi, ut ad fauces summa cum violentia resisteret. Quæ primam in Stomacho resideret capax Lac fusi gelidum saccharum missum, quo solo, sicuti vinore, per plures dies Agram aluimus. Hinc facio animo ad Lac ipsum super à capilla acribus emulsionem animam adjecturam: & quidem præter res obtrix, non singulis sex horis duæ vel tres Laetis uncia exhibita, à Ventriculo, reliquorum alimenorum usque, amice compellibatur. Postmodum medio Autumno ad Jusculum, & Carnium infusionem succum, hinc ad Percula, & Carnem ipsam transiit salubri est, cohibita omnino per dies extremis anni mensis Vomitione. Verum proximi sequenti anno 1719. & quod satis veluti quondam (si sic loquar: est) saltem esse dixit, eadem qua anno antecedenti die, absque ulla præcatolica causa, iterum Vomitus iteravit, sed nova qualem affligendi specie: nam quom confusa, & vel satis vel ægræ assulata alimenta retinere non poterat, ad incoacta & abjecta devexum est. Cum hoc scirrhusum (anno 1710.) quicquid sunt menses, ex quo Nobilis Agri prædicti hæc Choleleum cum parte sili, frigidaque basulam sumit; vespere vero nam Ladicea mensi olei unctis, nunc Hælecti, vel Thyri aliorumque prædictæ carnis mœmæ conditæ dedit: super vero Ladicea, Sencha, Capa, Allio in acetaria missis, maxima cum voluptate se ingurgitat: atque hæc quidem alimenora amissionem admiratione non solum retinet, sed perfelli digress, ipsos pancreatis narrare. At contra nec Carnis, nec Jusculi, aut cuiusquam simile cibi vel odorem ferre potest, & si vi facta aliquid ex his deglutitur, illico Vomitus supervenit, qui & Choleleste ipsa non semel rejelia est. Lac sive calidum sive frigidum sapine lenatur, sed post secundum vel tertium remanens rejellum. Quod autem mirum magis est, in hac promia ciborum ferè emission Vomitione, Medicamenta semper in Ventriculo solbentur: Carbatica præcipiti, qui pro superandis alibi spicissitate subinde exhibita sunt, nec nascentem nunquam moverant, nec ventriculorum sagittant. Hæc misere vivendi genera utitur Nobilis Meniali, pro qua subleuenda Batina mineralia, Cholelestea, Acidula, Serum Laetis, Ceraffa Sibirii, & Jecurata Stomachica & Alkalina, tum interna tum externa in usum suis usque adhuc nequiquam provocata. Quid inde eveniunt sit, præstatetur.

procedere dolor gravitatis & obtusus in superiori Lumborum regione, ubi situm est Pancreas. Hæc hac in parte contentum SYLVIIUS, qui in l. 4. Prax. cap. 15. dicit: quod utrumque sanguis, qui simul per Ventrículum, & per Alveum reijciatur, oriatur ex Pancreate, quando scilicet vasculum eius quoddam a fusco acriore contrahatur: unde sanguis in Intestina cadens, partem inferiorem deiecit, partem ex irritatione Duodeni sursum in Ventrículum propellatur, & etiam Pus, quod reijciatur per Vomitus, hæc pertinet, quod ex Pancreate est.

DIAGNOSIS.

Quod attinet *Diagnosin Vomitus Cruenti* Non raro decipiunt Medici: qui Vomitus materie nigricantis habent pro Cruento: vid. HOECHSTEDTERUS *De v. cæf. 4. & 5.* ubi grumosa nigricantis reiecta refert, quæ putata sunt Sanguinem grumulosum fuisse, sed falso, fuerunt enim succi Attraharii valde nobis, nec partim vitio digestionis primæ, partim ob micellam vatrium humorum in Intestinis, ex qua miscela oriuntur. Si ergo reijciuntur fluida rubicunda, immixti reijci Sanguinem arterialem: Si obscura fluida, grumosa: iollar subfiantes Hepatis, est semper Sanguis venosus: Si verb non ideo obscurus, sed saltem nigricans cum sensu dolorifico morificante, vel cum sapore acerbato non astringit, reijciatur, talis non est Sanguis, vel saltem non solutarius, sed simul acidi fuscus, qui sui miscela astringit inlar humorem acrium eruentem emergere facit. Novi Medicum, deceptum ab alio, qui se iurgicavit Vno cruento, illud supra iterum & infra reddens: ille Medicus putavit, esse Sanguinem nigrum.

PROGNOSIS.

Vomitus Sanguinis diuturnus malus est. Vomitus Spontaneorum Cruentorum, aut qui aliorum viscerum chronicis affectibus laborant, periodicus, saluberrimus est.

In quocunque Sanguinis Vomitus sæpius recurrens, supervenientes Hæmorrhoides saltem assunt morbi certam. Ecretiones Sanguinis sursum aut deorsum in Exanthematis, Variolis, Morbillis & similibus lethales sunt, vid. HOECHSTEDTERUS *De v. cæf. 1.*

Vomitus Cruentus vitio evacuationis solennis suppressæ, v. g. obstruccionis Menstrui, &c. non adeo est nocivus, nisi excedat: quia Observationes testantur, nonnullis ordinario ferè Menis Vomitu fuisse reiectos: vid. PANAROLLUS *Præf. 3. obferv. 6.* BARTHOLOMÆUS *Cræf. 5. Hæf. 32. & TIMÆUS à Guldankle l. 4. Cæf. 13. (T)*

LINDANUS in Vomitu Sanguinis hoc instituit Prognosis: Sanguinem ægri reijciunt ex Ventrículo duplici forma; vel grumulosum seu crassum & atrum; vel tenuem fluidum, & uigrum inlar astringenti, & acrium. Neutrum autem est atra Bils, per vitiosum succorum in Intestino Duodeno concursum facta, quibus eam atra Bils erat, il posside moriuntur: quod ipse dicit, aliquoties vidi. Nam atra Bils longè differt à Sanguine, quæ omnes partes exuens quasi cauterizat.

CURAE.

Vomitus Sanguinis, si Criticus, non sopiendus: Morbi- dus verb consideratur vel absolutè, prout est excretio sanguinis simpliciter præternaturalis; vel respectivè, respectu causarum antecedentium, quæ sanguinem vel concitant, vel in specie ad illa loca distandi faciunt. In Vomitu igitur Cruento corando, posterioris huius ratione, Cause antecedentes removende, idque extra paroxysmum, vel excretionis consuetas revocando, vel vicerum vitia corrigendo. Priori ratione, idque in primo paroxysmo, sanguinis motus, ne nimis in ventrem effundatur, corrigendus, vel revellendo vel avertendo; sanguis verb jam effusus, duplici possidet remedia:

1. Vasa aperta adstringentibus sunt coarctanda, ut sanguis sistatur.
2. Sanguis effusus plus minus congruatur reliquis resolutor & ciculator.

Quibus subinde Venæ sectio, vel in brachio, vel in pede,

aut etiam, per Hirudines, Hæmorrhoidibus apertione, in corpore vel simpliciter plethorico, vel in quo sanguinis evacuationis suppressa est, subinde præstare sunt; Hæmorrhoidum enim fluxus quasi vicarius est evacuatus.

(Pœmum sanguinem evocentem, profuturum Menstrui protinus liberatori, auctor HOEPPOCRATE: utriusque scilicet sanguinem eventum Narium aut Hæmorrhoidum profusum salubriter superavit: quod ubi parvus, Phlebotomia prodest. Quodsi verb solennem quandam sanguinis suppressionem superveniat Vomitus Cruentus, ex Menstrui suppressæ, Saphenæ aperiatur; si in est vitio vicerum Abdominis, v. g. Lienis, Hæmorrhoides, item Venæ Brachii fiantur apertæ, si in Hepatis, Venæ sectio in Brachio dextro; si in Hæmorrhoidibus suppressis, Venæ Ichiadica in parte finis Pedis minimo digito vitio: si in ex Hæmorrhagia Narium confusa suppressa, ex Venæ Brachii, eisdem lateris cum Nare, modo sanguis fluere solebat. *Conf. FORESTUS lib. 12. obferv. 12. & 17. Schol. pag. 159. 160. (V)*

Remedia inter, quæ conveniunt, pro primo scopo, sunt *Adstringentia*; quæ ex Cydoniis, Plantagine, & Portulacæ parantur, imprimis succus & Sympus: item Abies, & de præ omnibus aliis succus Radici Urticæ majoris; quæ Radix Urticæ majoris vel decocta tantum, vel infusa similiter est admodum experta. Præterea conveniunt Sympus de Symphyto *Fernaldi*, de quo vid. BARTHOLOMÆUS *Cræf. 1. Obf. 61.* Item expertissima in Aeglia contra Vomitus est *Sympus frequens*, patens ex *Bocis Salutarum Plantaginis & Radici Symphyti majoris*, vel Calcitrapæ; quæ non solum valdeper commendat BOYLE in *Philosoph. Experimental. Vol. 1. p. 110.* fed descriptionem ejus videbitis etiam in *DIGBY Receipt. Vol. 1. pag. 135.*

2. Rad. Symphyti. maj. rec. collat. 3vi.

Ext. Plantagin. Mii.

Concidantur, & contundantur omnia in mortario, & exprimatut Succus fortiter per pœmum, & quoniam de- puratus cum f. q. Sacchari (parte) vel dupla) f. C. o. Sympus: de quo ut superius sæpius quotidie cohibeat.

Catholice est ferè in quacunque sanguinis reiectione compendiosa. Alias ad supprimendum sanguinem Oleum seu Spiritus Vitrioli eminet, qui simul styptica v. vasa forma, hinc Aqua Urticæ majoris & Foliorum Plantaginis, neidulata cum Spiritu Vitrioli, sumitur cohibeat, & egregiè Vomitus sistit, & pro hoc scopo ab HARTMANNO & RULANDO maxime commendatur in *Theat. p. 184.* ubi habet exemplum horridi Vomitus sanguinis curati per hæc Mixturem:

2. Aqua Rad. Urtic. 3vi.

Spiritus seu Olei Vitrioli q. f.

at acieat modice, M. S.

Aqua Sanguinem sedans.

Verba Andrich sunt hæc: *Arta dicitur q. frigida pota frangat Ventrículum, Sanguinemque profusum inlar mirabili pro- pterferat, quam etiam Daimem plures alii Auctores admodum laudare solent.*

Simile exemplum videbitis in *Obferv. RIVERII*, ubi similis Vomitus eodem modo fuit curatus.

Porrò Semen Hyocyami HEURNIO utitur: Crocus Martis adstringens, imprimis illic, qui ex Virgilio Martia in Aqua soluta, ingestione Olei Tartari per deliquium precipitatus & edulcoratus. Tinctura Martis adstringentes, cum Terra sigillata, Catechu, & aliisque Terre medicata, Lepi Hieraticæ, cum lactem cum blandè acidis propinata. Es his BIERLINGIUS in *Adversat. Curat. p. 107. & 109.* sequens præscribit *Electuarium.*

2. Confus. Ræf. 3ij.

Marm. præp. 5. lb.

Cræf. Mart. adstringens. 3i.

Sem. Hyoc. albi 3ij.

Cam. Syr. Perulacæ, f. Electuarium, &

Electuarium Sanguinem sedans.

De quo dosis quæritur Nucis à vellente. Item

2. Confus. Ræf. 3ij.

499.

(T) In *Prognosis* autem tutius ferenda, semper memore esse debemus Aphorismi Hippocratici ejusdem, Sanguinem supra ferri, qualiscunque sit, molare est; nam & si cum ægri levissime remanentibus educti possint, malum tamen semper est per se- periora ejici: periculum enim imminet, ne vel suffocetur æger, Sanguinem aut vomitus aut exparto, vel ex illius portione in or- gana spiritalia delatetur, & in pus mutetur, in pleuriam aut empyem incidat.

(V) *Periodus* hæc integra, parvèbèl nata, legitur quidem in editione Francfortensi, doct tamen in Veneta. Exponitur fortassis illa Veneta: editor, nimium, & ne via dicam, superfluum in Phlebotomia celebranda Venarum secundarum delatum exesum. Quædam enim minimè credimus indifferenter Venas secundas esse; nequaquam tamen adeo singulis hæc in re præ- cedendum esse existimamus, ne in Hæmorrhoidibus suppressis e. g. omnia Venæ Ichiadica in parte finis pedis, minimo digito vitio, apertenda sit, ut præcipi bis A. de qua re tu alibi.

Spes. Diarrag. frig. 3ij.

Bol. Armen. 3i.

Semin. Myrs. 3ij.

Syr. Myrrin. q. l.

M. D. S.

Electuarium Sanguinem sedans.

Item *Tinctura Viridii Martii* est egregia in quacunq; Hæmorrhagia: Modus præparandi est hic:

3℥. Terra Viridii Martii probè calcin. & solut.
(aliis enim Vomitus mover, quod vidi) qu. v.

Solvatur in Spiritu Salis:

Solutio abstrahatur per retortam in arena ad mellis consistentiam, cui affunde spiritum vini bene rectificatum: ponatur in digestionem loci calidi ad aliquod tempus, & evadet Tinctura rubicundissima, per filtrum à remanentia separanda. Hæc Tinctura saporis subdulcis adstringentis datur à guttis 15. ad 20. & 15. in Aqua appropriata, & egregiè confert.

FORESTUS in suis *Observ.* l. 18. obs. 18. habet Mixturam ex Trochiscis de Carabe & Terra sigillata, cum Aquis convenientibus dilutis, quæ præmissâ Venæ sectione habet effectum singularem in Sanguine fluente sistendo, & concreto simul dissolvendo: quæ Mixtura descripta est in **SEN- NERTO** l. 3. *Præc. de Urinis* p. 158. est prima Formula in Vomitu Sanguinis: nempe

3℥. Aqu. Rosæ. 3℥.

Percolat.

Plantag. an. 3i.

Trech. de Carab.

Terra sigillata an. 3℥.

M. S.

Potio Adstringens.

Ad eas imitationes:

3℥. Aqu. Rosæ. 3℥.

Plantag.

Percol. an. 3i.

Acet. vitæ. 3ij. vel 3℥. ad 3vi.

Trech. de Carab.

Terr. sigillat. an. 3℥.

Syr. Myrrin. 3ij. ad 3i.

M. D. S. ut antea.

SYLVIVS habet Mixturam ad quacunq; Sanguinis excretionem, & in specie ad Vomitus Sanguinis, polychre- tum, in *Præc. l. 1. cap. 6. §. 30.*, quæ prima frons quidem immixta apparet, sed quod ipse testari possum, admodum est proficua. Formula hæc est:

3℥. Aqu. Plantag. 3i.

Cinnamon. 3i.

Aceti distillat. 3℥.

Cerall. rub. prop. 3℥.

Sanguis. Dracon. 3℥.

Land. opiat. gr. ij.

Syr. Myrrin. 3i.

M. D. S.

Potiuscula Adstringens.

Hæc Mixtura sæpius coctilem fumpæ curabit pleraq; vasorum rupturas, & supra multorum expectationem Sanguinis effluxum brevi tollet.

Quod si metus est à coagulatione Sanguinis, addi potest prædictæ mixturæ *Lapilli Ganæ*, prop. 3℥., ut & *Antimoniæ diaphor.* 3i. æque ita usurpari. Cum autem hæc Mixtura propter Sanguinem Draconis, quem non habemus genuinum, sit suspecta, ad has imitationes sequenti modo corrigi potest:

3℥. Aqu. Plantag. 3i. vel 3ij.

Cinnamon. 3ij. vel 3vi.

Aceti distillat. vel rosæ. 3ij. vel 3℥.

ad 3vi.

Cerall. rub. prop. 3℥.

Terr. sigillat. gr. xv. ad 3i.

Land. opiat. gr. ij.

Syr. Myrrin. vel alius appropriat. 3℥. vel 3i.

M. D. S.

Potiuscula Sanguinem sedans.

Loco Aceti addi quoque possunt gutt. xii. *Spiritus Viridii*.

Capiatur coctilem.

Item

3℥. Aqu. Plantag. cum Spiritu Viridii vel Ruri

modo supraddictis acidis. qu. v.

Cut addatur

Terra sigillat. pro lobum, a. g. 3i. vel 3℥.

M. S. ut antea.

Dorur subinde coctilem.

Effervescit quidem, sed non diù durat, & acquirit saporē adstringentem aluminosum.

3℥. Aqu. Hyperici.

Plantag. an. 3i.

Succi Plantag. ros. eogr. vel Cydon. vel Ora-

nator. 3vi. vel 3℥.

Mamut. prop. 3℥.

Boli Armen. prop. 3℥.

Land. opiat. gr. ij.

Syr. de Symp. 3vi.

M. D. S.

Potiuscula Sanguinem sedans.

Vel

3℥. Aqu. Urinæ. mixt. cum Spiritu Viridii acidis.

3vi.

Cinnamon. spiritus. 3i.

Terr. sigillat. 3i.

Mamut. prop. 3i.

Land. opiat. gr. ij.

Syr. de Symp. 3vi.

M. S. ut antea.

Ad Vomitus Sanguinis in Phthisi, quæ inter alia im- primis de dolore in latere dextro sub Hypochondrio que- rebatur, ubi Pancreas inferior insectino, profect sequens Potio:

3℥. Aqu. Mentag.

Tormentil. an. 3i.

Cinnamon.

Aceti distillat. an. 3vi.

Cerall. rub. prop. 3℥.

Trech. de Carab. 3i.

Terr. sigillat. 3℥.

Mamut. gr. vi.

Land. opiat. gr. i.

Syrup. de Symplyt. Tern. 3i.

M. F. Paris, S.

Potiuscula Sanguinem sedans.

Commode & **Lapilli Cancrosum** possunt addi, quando nempe metus est coagulati Sanguinis adhuc in Stomacho hærentis, quod patet ex angustis præcordiorum, ex imminente lipothymia, et difficili respiratione, pulsus debili, Ventriculi inflatione, facieque citrina ac pallida; quibus interdum superveniunt Phlogosæ. In his enim elurpatur *Sanguinem græsum dissolvens*, et **Lapilli Cancrosum** cum Aceto soluti, vel Corallia præparata in Vino acido, Antimonium diaphoreticum, Saccharum, Trochisci de Carabe, & de Terra sigillata, Camphora. In specie Sperma Ceti à 3℥. ad 3i. in juleculo calido, vel hæntis Cerevisiæ dissolu- tum & assumptum, mirabile est ad dissolvendos Sanguinis grumos: reliquis vero oportet per Rhabarbarum, emi- leve laxans educere, aut etiam Vomitorio leniore evacuari. Conf. **BONETI Sepulchreus**. T. 733. §. 9. & **RIVERIVS** *Crus. 4. Observ. 26.*

In Vomitu Sanguinis vitio Sydeni, in quo copiosius aut æger interdum deficit, aut viribus licet resumptis, in inco- rabilem Ascitem delabitur, noto: ad Præservationem & fundamentum Curationis, & inde movenda plura ma- la, nil melius convenire, quam Martialis aperientia dicta, & hinc Absinthium, omniaque ex eo parata. Conf. **DODO- NÆUS** in *Hist. Virg. p. 24. & in Obs. p. 47.*

Externæ ad Vomitus Cruentum Scutum ex Theriaca cum Croco, Aceto Rubi idem irroratum, convenit ex **HOECHSTEDTERO** *Dur. 2. Café p. vel Paris tollis*, cui in Vino Malvatico vel Aceto intincho sit adpersus **Caryophyllorum** pulvis, auctore **HARTMANNO** *Præc. Chymicor. p. 177.*

Paris interdum excretio non statim sistenda, sed blandè potius promovenda; ulterior tamen simul ejus proventus impediendus. Quorum illud præstat, præter Antimonium diaphoreticum, vel Antihæticum **Pæonii**, & **Lapilli Cancro-** rum in Aceto assumpti, Myrrina, Aloëtica, Sulphurum, item Saccharum Saturni, Vitriolum Martis, & ex his duobus parata Tinctura Antiphthisica, doſi gutt. xxx. vel xl. usur- penda in Decodo quodam Vulnerario, e. g. in Decodo Chærefolii, aut Plantaginis, aut comarum Hyperici. Ul- teriorem Paris proventum impediunt Balsimum Sulphuris anisatum, aut ex floribus Antimonii paratum, à gutt. iij. viij. ad x. vid. **SYLVIVS** *Præc. l. 2. c. 9. §. 12. p. 68.*

S E C T I O VII.

DE DOLORIS SYMPTOMATIBUS STOMACHI.

N^orum est, & frequenter in Praxi experimus, quod acri conqueantur de gravissima Anxietate & Angustia circa Præcordia, & Dolor Cordis, & similibus, & humi nesciunt, quid conqueantur; de his & eorum Symptomatibus, quibus tam multum negotii nobis facillunt, agemus.

C A P U T I.

De Angustia, & Anxietate Præcordiorum.

Q^{uod} attinet Anxietatem & Angustiam Præcordiorum, notum est, Cor ex se nullo sensu, nullaque molestia corpori esse molestum. Cæterum sæpius evenit, ut in Præcordiis, hoc est, ut explicat FERNELIUS l. 4. de Febr. c. 10. regione circa Ventriculum, Diaphragma, Jecoris cavum, Lienem, Pancreas, in specie Ventriculo, eoque superiori orificio adeoque in ea regione, quæ Collis noster, anterior & versus Sternum se inflectentibus circumfribitur, non raro sint Anxietates, & insignes molestiæ, item frequentes Dolores acri gravissimi: & quidem si acri conqueantur de Angustia Præcordiorum, live Ventriculi regionis, live non explicabili molestia illius loci, quando properat inquiri, adeoque ex nimis anxietatibus hinc inde in lecto se volvunt & palitant, dicitur in specie Anxietas. Sin dolor sit, qui in ea regione frequenter affligit, & quando acri intento digito unctionat in fovea ista, quæ dicitur Scrobiculus Cordis, in specie vocatur Dolor Stomachi seu Cardialgia; præprimis si nã cum dictis Anxietatibus & Angustia Præcordiorum jungatur insignis Dolor compressivus & constitivus, ut dicant: *Animo angere, & Cor mihi videtur sumpti, vix sum apud me*; quod insinuat cum contorcionis sensu. Quando vero cum his Anxietatibus, & Angustia conjungatur se sensus: *Molestia atque viscositas*, vocatur Cardalgia, & dicunt, *Membra atque caput meum mortui*. Anxietates illas optime illustrat Vomitus imminens ab assumpto Vomitorio, ut qui maxime acrius reddit acrios: *Omnia ipsi sunt angusta*, Carlo terræque graviter videtur: *morsus frontis periculis*. Cardialgiam vero representant dolores illi, qui post digestus grandiores bolus, aut durior assumptus, non sensibilibus & interdum atrocissimè affligunt, quod vocant, *Compressionem Stomachi*.

P A R S A F F E C T A.

In utroque casu Malum semper oritur ab affectu plus minus Orificio Ventriculi sinistro: præsupponenda atque hic sensibilibus hujus orificii, & inde nata proclivitas ad sui contrahendam, variolæ palmosi: de qua supra in Prelegem. aliam. Conveniunt adeoque, & differunt Anxietates & Cardialgiæ: Illæ quæ vagæ; Hæ fixæ: Illæ simpliciter ab irritante, subinde nunc commodè explicabili, molestia; Hæ à convulsiva constitutione. Anxietates illas dico oriri omnes quibusvis in morbis simpliciter ab affectu Præcordii, seu speciatim Ventriculi; uti non solum ostendunt angustia illæ, quæ Vomitus ab assumpto medicamento immediate præcedunt; sed & mulieres Hystericæ subinde de gravissimis Anxietatibus vagis conqueantur, in quibus simpliciter affectum esse Orificium Stomachi superius, testantur totius subinde supervenientes, à quorum eruptione sensibile levamen percipiunt: Item in Febris, v. g. Intermitentibus, nunc præcedunt, nunc in ipso paroxysmo affligunt Anxietates multiplices, quæ quod fixæ in Stomacho, consistunt ea eo, quod à frigido poro affarim haulto ordinariò insigniter casperantur, & nonnisi Vomitu superveniente solvantur: In Febris, tam Benignis quam Malignis, gra-

vissimæ Anxietates, quæ frequenter affligunt acrios, itidem simpliciter sunt ea molestia Orificio sinistro Stomachi, & partibus membranosis affectis, nullo vero modo ex Corde affecto. Est enim sicut videtur levare in talibus malum, tamen revera in Stomacho est, & cessante sudore redeunt: atque suppresso sudore effluvia illa, quæ insensibiliter aut sensibilibus aliis diffunduntur, retenta, affligunt Præcordia & membranosis eorum partes, unde Anxietates à parili ferè ratione, atque in Diarrhæis, quod copiosiori diaphoresi gaudet corpus, & minor erit Diarrhæa, sed quod minor est diaphoresis, eo copiosior Alvi fluxus. Porro esse Anxietates ex Præcordiis, ostendunt gravissimæ illæ Præcordiorum Angustia, & subinde lethales Anxietates cum Hypochondriorum extensione præcurrentibus lithomyis, sudore frigido, &c. quæ superveniunt interdum contorcioni Vertebrarum: hinc est, quod si, qui cœna largiore se replent, noctem insequentem inquietam patiuntur, dum hinc inde se pedigare ab Anxietate coguntur saltem propter Stomachum, ea nimia repletionem malè affectum. Quotiescunque ergo acri vel anali sunt, vel de Anxietatibus conqueantur, *Cordis sensus Anxietates*, qui affectus est frequentissimus; certi esse possunt, semper & simpliciter isorem & radicem habere in Stomacho, speciatim circa sensibilibus ejus finitum Orificium. Unde etiam, quando acri dicitur. *Cor & Animo mihi videtur*, sibi vocant Cordis angustiam, potentes laborare Cor. Profectò Cor est musculus ferè indolens, aut si tantillum irritatur, sequitur ejus motus convulsivus, qui vocatur Palpitatio Cordis. Im vero tales acri nullam Palpitationem talem patiuntur, hicque mihi Cor esse affectum constans; potius, uno verbo: videtur illis affectus, quem PETRUS SALIUS DIVERSUS *Adhæsiorem Præcordii* vocat, quatenus nempe, utroque Ventriculi orificio ardoris confusio, statim aut quavis materia rarefices spatium sufficiens se explicandi non reperit, hic Ventriculum dissendendo Diaphragma comprimit, & respiracionem difficilem reddit. Malum simpliciter hæret in palmo Orificii Stomachi sinistri, à quacunque causa graviter affecti. Excipio tamen istum affectus Suffocantes, seu Inspiracionis negotium turbantes: nam & illi anxietates reddunt acrios: Quæcunque reliquæ Anxietates oriantur ex Stomacho.

C A U S A E.

Causæ, quæ Anxietates tales pariunt, sunt nunc manifestæ Acroria, vel Stomacho hostilia assumpta, ut Mercurius sublimatus, Arsenicum, Lac coagulum, Fungi &c.; nunc Alimenta sub digestionem corrupta, ut Fructus horum; vitia, nunc Contenta peregrina, ut Flarus & Humores atropinosi; nunc Miasmata & Fermenta alunde suscepta, ut in Peste Morbique contagiosi, ut fœsque videmus: nunc ipsi Ventriculi impatiens vitium, Inflammatio, Elctricæ &c.; nunc Nervorum vitia convulsiva, Orificium ejus aut membranas partes vicinas inficiencia, ut in Vertebrarum contorcionem.

C U R A.

Curantur Anxietates hujusmodi nunc per Alcia aromatica & olea, seu Carminativa, & discutientia, & effervescentes succos; in specie acidum, corrigentia: ut luti Virgoliata & Nitrata, in genere per ea, quæ succos vitiosos effervescentes corrigunt, & halitus inde elatos resolvunt & discutunt. Seppæ ergo est habenda ratio Morbi adjuncti, Hamorum effervescentium & reliquarum Causarum, pro quarum varietate etiam Cura varianda: e. g. Anxietates in Hystericis optime per Salia & Callosa curantur: id quod etiam locum obtinet in Hypochondriacis: in aliis cum Phlogosi & inflammatione junctis Anxietatibus, Spiritus Vitioli aut Nitri dulcis, aut Tinctura Berberidis vel Millura simplex, similique conveniunt; quibus Opiata, si ferat acri conditio, subinde addenda sunt. (X)

CA-

(X) Si ab Alimenti Stomacho hostilibus, aut Venenis assumptis oritur talis Anxietas, nullum potest Medicamentum esse, quàm Vomitus citre. Vomitus autem excitabitur nequaquam ferriusibus Emeticis: & utitur ab eis potius, præcipue si corrupta Venena Ventriculibus exagitant: sed Aqua tepida, Oleum, Decolla Camœdani, &c. similibus.

CAPUT II.

De Cardialgia.

Quod Cardialgium seu Cardigium est, quando à causa quadam, graviter & continuo Ventriculi Orificium finitimum irritante, huius dolorifica contrictio & convulsiva crispatur, quæ cum insigni dolore semper iuncta est, oboritur. Regio stomachi, præsertim in Scrobiculo Cordis, Veteribus vocata fuit *æpipla*, quæ vox, ut ut prope significet *Gastrum*, nihilominus tamen, quoniam talis Dolor stomachi seu Orificii superioris, sæpius in consensum trahit Cor totumque corpus, ut exinde non raro sic dicitur *lipothymia*, *syncope*, sudores glutinosi, frigidi, ut moriundorum, circa caput, virtum omnimodæ prostrationes, & non raro stupenda, & horrenda symptomata oriuntur; præterea vocantur Dolores huius Cardialgiam, quasi dicere voluerint Dolores Cordis, cum tamen non laboret Cor, sed afficiatur Orificium Ventriculi finitimum. Et quidem hic Dolor Orificii superioris est admodum molestus & intolerabilis, ac subside propter symptomatum frequentiam & vehementiam toti corpori periculosus: propter quæ causam etiam HELMONTIUS ibidem habuit sedem Animæ & Dæmon-Viratum, quæ conspirationem Lenis cum stomacho, cum seculo Animæ, cuius Dæmon-viratusque se extendat in omnes operationes animales Homini proprias.

Observanda hic imprimis est differentia Hominum: quidam habent orificium stomachi finitimum, quidam minus à Billi, ut sæpius Anæstetæ & Cardialgia laborant, isti erant *lipothymia* incurant, quæ tamen non terreat Medicum. Contrarium est in reliquis.

PARS AFFECTA.

Nobilis parvis hic locus affectus; nam leve Vultus, si attingit hoc Orificium finitimum, sæpe est lethale: imò Plaga cum manu fortiori insidit, mortem inferre potest: quæ exemplum recenset BARTHOLINUS in C. 5. *Nihil*, 30. ex Pagno nempe stomacho violentia applicato subortum esse mortem: Non raro epileptica superveniunt pathemata cum Dolore Ventriculi, à Bile præstata evententem à de quo vid. AMATUS LUSITANUS C. 1. Car. 30. Nec mirum est, quia Orificium stomachi, maxime finitimum, & admodum sensibile, consensum facile cum toto systema nervoso facit; unde isto affecto, totum nervosum genus commutatur, & in spasmodum ac convulsionem pertahitur.

Cardialgia autem hæc, sicut Anæstetæ, interdum sunt vagæ, interdum fixæ. Vagæ non cessant, & iterum incipiunt; hærent autem in stomacho & Intestino Duodeno; oriuntur ex effluventia succorum heterogeneorum, maxime Bili cum alia succi præternaturaliter fermentantis; unde simul percipiuntur Phlogosæ. Cardialgia verò, & Anæstetæ hæc oriuntur ex simili causa, sed continuo agente.

En hæc patet, *subspasmus* seu *Parvam affectam* esse Orificium stomachi superius finitimum, sensibile admodum, quod irritatum convulsivè quid patitur, & ita quo magis sensibile, adeo plus minus iocundum dolorem, & graviora alibi symptomata & accidentia, etiam aliarum partium, patitur. Observandum hic simul, quod Cardialgia non semper præcisè affligit in parte Abdominis anteriore Epigastrica, quin potius sæpe in Dorso sentitur, non tantummodo in suprema Lumborum regione, aut circa ultimas Ventræ thoracis, sed sæpe dolor inquitur ductum Oesophagi, ita ut sæpe intra Scapulas ferrius adfendere videatur, & sic à spasmotica contrictio & motione Oesophagi, stomacho continuata.

CAUSÆ.

Causa Proxima Cardialgiæ est ingrossus læsio & contrahitæ convulsiva dicti Orificii Ventriculi, utpote partis sensibilissimæ, ex molesta irritatione oriunda, quæ læsione, ratione Nervorum plurimum, & maxium, & spirituum animalium insigniter afficitur, postmodum facile totius Microcosmi æconomia turbatur, & graviora symptomata oriuntur, vel potius totum nervosum genus in consensum trahitur, & actionum animalium consequenter ingrossus læsio & prostratio supervenit. Si causa irritans sit acris & corrosiva, oritur sensus corrosivus insignis seu mortificationis, cum angustia iunctæ.

Causa Remota est omne id, quicquid lædere potest dictum Orificium, & ad dolorificum equimodè spasmus contrahere, sive hoc fiat immèdiatè & per effluvia, sive per consensum saltem, dat Cardialgiam.

Per *Consensum* non adeo frequenter sunt Cardialgiæ, ut ut interdum in Nephritide, in specie in contortione Ventræbrarum Doræ, cum quæ *sui mali fœdus*; gravis dolor observari solet; levis quidem est hæc res, sed non levis, præcipue hebdomadibus craselia insert symptomatica, quod ipse vult item à depressione & induratione Cardialgiam Enclimam: vid. BALLONIUS *Epidem.* l. 3. p. 243. & SENNERTUS *præf.* lib. 2. p. 1. 16. aliarumque partium vitis, e.g. Calculi in Vescicula felleæ contentes: vid. KENTMANNUS *de Calculis*, à Lapide in Intestino Jejunum: vid. SCHNEIDERUS *l. 3. de Catarrh.* p. 7. item à Scirrhus Pancreatæ, & Melenteris: vid. RIVIERUS *Com. 2. Olf.* 90. Interdum Hysterica passio gravior Cardialgiam per consensum infert, quod observavi in Muliere hysterica, quæ semper dicebat: *ibi malum residet*; patiebatur ardorem stomachi, qui ardor oriebatur à Bile effluente cum acido, excreta materia dicebat: *malum evanuit*; Quo spædat Menstrum suppressum, Cardialgia frequens causa.

Per *Effluvia* verò, vel ipsius stomachi aut partium vicinarum subest vitium, vel 10 stomacho contentorum, & horum vel intus gastrorum, vel extrinsecus assumptorum. In specie quoad Contenta, hæc effluvia Cardialgia auctores, Cardialgiam frequenter inferunt *Flatus*, imprimis in stomacho vacuo oberrantes, plus minus cum diabolentibus; hi namque Flatus ex potenti utrinque Orificii structura inclui angustia, vago motu vagæ & indignæ Anæstetæ, ac tubum Cardialgiam inducunt, in specie acies acidi ac trivi, aut simili vitioso acore inquinati: unde Hypochondriaci & Hysterici frequenter est hoc malum: vid. RHODIUS *Cent. 2. Olf.* 70. 10 quibus ægri jaceant, ita, ut videatur opus Cor ferè destrui, dum dicunt: *Cor sui videri fœdum*, ut etiam polleant interdum Venæ scissuræ: sed male. In specie hi ipsi corripiantur quodam Febre intermittenste, tunc cum in principio parvus finitimus, in quibus hæret iniqui & septicæ, graves Anæstetæ, interdum Cardialgia, & Flatibus utriusque, quæ, si cum impetu per os præsumunt, sicut Ruchus. Fir hoc ex effluventia succorum in primis vis, præsertim in stomacho, unde vellicat eius Orificium, & Cardialgia insertur, quæ in Febribus intermittentibus coarctat optime per Clysmata.

Potest sunt *Excrementa* quæcumque in stomacho flabantia, quæ inter ferè primatum obinet materia vitiosa glutinosa, & acida, Pirata vitrea dicta, Orificio stomachi finitimo impada, quæ dicitur oriri à tartareis humoribus; hi enim acore vitioso inquinati, edunt & vellicat, quæ postquam perterebant stomachum, unde isti dolores, quæ postquam horum unam vel duas æger verat: Item Excrementa talia, quæ vulgò Bili præcoræ, & ægruosa, à colore viridiusculo vocari solet, in quibus acidum peccat corrosivum, gravissimas præcordiorum angustias & molestissimas Cardialgias inferunt: vid. PLATERUS *l. 2. Olf.* p. 436. & 437. AMATUS LUSITANUS *l. 1. Car.* 20. ZACUTUS LUSITANUS *pr. edm.* lib. 2. *Olf.* r. & PANAROLLUS *Præf.* 2. *Olf.* 30. Excrementa hæc orantur partim ex corruptione assumptorum sub digestionem prima, v.g. Urinarum: vid. RHODIUS *Cent. 2. Olf.* 93. partim vero transmutantur ex Intestini, in specie ex Duodeno in stomachum; quando enim Bili, vel naturaliter vel præternaturaliter coacta, occurrat acidum paulo intensiori, vel pancreatica, vel stomachica, tunc ex horum tam solitaria quam simulanea cum Chylis miscela abeunt in varios, & dissimiles humores diversarum proprietatum, nunc nigros, nunc virides, nunc fusciores: nunc alio colore vitioso præditos. In specie in Bili præcoræ & ægruosa peccat acidum Paocreatæ nemum, sorsim simul vitiosum auctum; unde talia evomentes sæpius patuntur fluxum dentium ex vitioso acido, ex quo cum Bile amara conciscit liquor viridis acris, & corrosivus deterrum lapora, & qui in stomacho, si non Vomitus aut Cholera medium, certe gravissimas angustias & Cardialgias inferre solet: vid. BONETUS *l. 1. sect. 7. Olf.* 121. HOLLERIUS *Olf. præf.* 21. & BORELLUS *C. 1. Olf.* 35. sive per in vincta exitum talia contenta, sive occasione vitiosorum fermentorum ad motus & excretionem præternaturales coacta fuerint. Comprobat hoc ulterius Experimentum GRAFFI *de Suro pancreatica*, qui cum receperet Bileo Bavam ex folliculo Fellei Canis apert, exmpe misceret cum Spiritu Vireoli insigniter acido, accepit multum ex nigro viridescens, & ita id, quod vulgo dicitur Bili ægruosa seu istodes: ut

est videtur potest in Tr. de Sarc. pancreat. Unde etiam In-
flammas familiaris sicut Escera porcorum idu viridia, easque
semper cum torminis alia puria, quod ducit originem
ex vitio & corruptela Lactis, quod vitiis visio impuritas
non ritit dignitas, sed praevenerunt scilicet
Jervic: Nihil penitus, viridit: unde etiam tulla Es-
cra scellatur non raro solent exoritur podicem, pro-
pter nimiam acrimoniam, & admodum inferre tormina,
propter aciditatem Intestina roborant: hinc, quod obiter
moxo, per Lapidum Calcem, Sericem Anisi, &c. talia
Infantibus Escra curantur; quoniam talia evigilant acro-
niam, & vitium Lactis emendat, & observatum fuit,
quod in gravissimo statu Cardialgie, et talium succorum per
vomitum rejectionem levamen percipiunt, maxime in
Febribus adveniens. Huc etiam pertinent Lapidem & Cal-
cem in cavitate Ventriculi collecti aeternitatem additi:
vid. HOFFERUS *Med. Mod. 2. l. 3. cap. 3. cap. 1.* & BONETUS *l. 3.
2. 2. Obs. 51.* Praeterea Absorptione visio & extraordinaria
nimis acris familiaris inferre solent Cardialgiam passionem:
Sic VALERIOLA *lib. 2. Obs. 7.* & SALMUTH *C. 2. Obs. 9.* interdiffusum Cardiacum passionem renerunt, ortum
ex improvise haustu Mercurii sublimati loco Emulsionis
Amygdalarum, quam curavit VALERIOLA per Cry-
stallum propter acidum dissolvendum, per Theriacum cum
Butyro terebinti, obtundente, & temperate acrimoniam
corrosivam Ventriculorum erodentem, sed praeterea quod
quod PLATERUS in *Obs. Cardialgiam lethalem ob Arle-
cium propinatum*; BONETUS *apud B. l. 3. f. 7. Obs. 2.*
& 3. BARTHOLOINUS *C. 2. f. 18. l. 1. de Veneno*; PE-
TRUS JOHANNES FABER in *Curat. exemplum* habet
Cardialgie interitum cum parvis symptomatibus, ex ob-
itio Calci recentis, & molis, in Ventriculo postmodum
coagulati, qui simile fieri solet, & Lac quodcumque inten-
perit haustum, aut si acidum quodcumque, v. g. Vinum
(vid. AMATUS LUSITANUS *Curat. 4. Obs. 56.* Item
FORESTUS *l. 18. Obs. 13.*) superingeretur, indeque co-
aguletur & grumescit in Stomacho: tunc enim detritima
symptomata, id specie syncope, praecedentium anxietas,
sudores frigidi & similia symptomata, viri solent, ut ob
id Lac coagulatum inter Venena a quibusdam fuerit relatu-
m. De Cardialgia a pota Frigida, vid. RHODIUS *C. 2. l. 1.
Obs. 71.* Balsami Sulphuris abusu *Art. Hist. p. 2. l. 2. c. 21.*
Dixi *cap. aeternitatem*, de Hirudine cum pota assumpta.
Vomitum sanguinolentum producente; hic verò, quod rarum est,
ex RHODIO *C. 2. Obs. 72.* Cardialgiam crudelem induco
ex Hirudinibus productam, Naribus, ut fieri solet in Gallia,
per hemorrhagias artificiales excreta appendicis, postmo-
dum per Nares in Gulam, & Orificium Nuchae fissuram
irrepentibus; quae Cardialgia curata fuit, quod obiter mo-
no, per Aquam salicam propinatam, propter quoniam
sal admodum contrahit Hirudinibus. Partis nempe ra-
tione Hirudines non applicat, ut hemorrhoides provo-
cent, non itaque ingrediuntur Intestinum rectum, &
gravia inferunt symptomata; in tali casu solent elici medi-
ante Clystere ex Aqua salita; sic enim prompte egrediun-
tur. Non fecit ac Verum subinde Cardialgie sunt auctores;
patet ex eo, quod his excreta solent cessare, observante eo-
dem RHODIO *C. 2. Obs. 73.* vid. etiam M. A. N. C. *Ann. 4.
Obs. 258.* Cardialgiam quoque intulerunt Laccet, ut
habet GESNERUS *lib. 2. Hist. Animal. cap. de Lacerta*, &
Pesciculi; vid. HEURNIUS *de Morbis Capri cap. 7.* Lum-
brici; vid. HERCULES SAXONIA *Pract. l. 2. c. 2.*
cap. 7. & HEINRICUS AB HEER *Obs. 16.* & RHODIUS
l. 2. Elegans est, quod habet PLATERUS in *Obs. de
Cardialgia intensissima & cruciata maximo ob deglutiti-
onem Anguillam vivam, quam postmodum mortuam, &
veluti excoriatam, per alvum excrevit.* Signum huc excre-
tatio est, quod nam fermentum stomachi inciperit agere in
Anguillam, unde tantum excrevit rosis. Hoc etiam vide-
mus in Piscibus voracibus, v. g. Locto, qui pisciculos mino-
res ita seorsim seorsim digerit, Cardialgiam etiam PLA-
TERUS habet ob deglutitum Scarabaeum: aliud exem-
plum habet intensae Cardialgie, obortae ob deglutitionem
Cochlearis, quod ipsum loquaci die per annum reddidit,
Pertinet huc Vitrum deglutitum, & Acicula deglutita, per
Urethram iterum egressa, Cardialgiam, unguitas praetor-
diorum, respirationem difficilem, & dolorem punctionum
Ventriculi, inferentes.

Quod ipsum atinet Ventriculi tot partium vicinorum
vitiis, Cardialgiam inferens, varium admodum esse po-

test: Sic HILDANUS *C. 3. Obs. 9.* observat Dolorem
Ventriculi, primo levem, hinc gravissimum cum dolore,
capitis, tandem vagi omnes corporis partes vicissitudi-
mira affligentem, lethalem: id aperto cadavere Uleus cu-
rum, magnum, & fectidum circa Osqueum Ventriculi fini-
sum fuit inventum: quale etiam observavit DODON. *AE-
US Obs. med. cap. 25.* non fecit ac RIVERIUS *C. 2. l. 2.
Obs. 90.* negat Venarum dolorem distantum lethalem; ubi
aperto cadavere, interius Scirrhos, Pancreas, Mesen-
terium, Jejunum & Pylorum occupat: similes tumores,
Ventriculo dolorem inferentes, observavit HIPPOLYTUS
BOSEUS *de Familis. anat. lib. 2. pag. 12.* & ZACHARIUS
l. 2. Obs. 22.

Pertinet huc suo modo Lintus, Memores, ac distans
Tristitia ad Cardialgias pertinens dispositiones. Conf. PLA-
TERUS in *Obs. p. 15.*

Hi ipsi Dolores Stomachi seu Cardialgie, utut vagum
sint symptoma, non raro sunt periculosi, distato tempore
per periodo affligentes. Hinc inde bus per prolium exempla,
quale imprimis est singulari BARTHOLOINUS *C. 3. l. 2. f. 18.*
50. ubi recensitis tales Ventriculi Dolores periodicos interitus
dicitur statum tempore affligentes: Sic GUARINONIUS in
Conf. 179. habet interitus Ventriculi Dolorem, mensura
tempore affligentem in Muliere.

DIAGNOSIS

Quod Signa Diagnostica Anstetur & Cardialgie: recen-
sentur ab aegris, qui concurantur, le iugum molestias in
praecordia scilicet, manifestantur regione sterni infimo-
re & scrobiculi Cordis; quales, non possunt verbis
sufficienter exprimere molestiam; quibus super accedunt tes-
tificationes corporis, & inquietudines, vigilae, respirandi
difficultas, item imminuta subinde animi deliquia; quo
ordinario praegreditur vertigo aut isocoma: Anxietas,
has insequentur faciei livor, extremitum refrigerationes,
& subinde sudores frigidi: aegri interdum quali examina-
tione, interdum ex doloris acerbitate se miris delignant,
necesse sunt quid agant.

Praeterea autem observandum; quod huc Cardialgia
seu Stomachi Dolor non semper affligit in parte Abdomi-
nis Epigastrica anteriore, quae potius est regione Ventriculi
Dorsum atrociter affligit saepe, non tantummodo in supe-
riore Lumborum regione, aut circa ultimas Venteras Pecc-
toris seu Thoracis, ubi scilicet incumbit Stomachus Pancreas;
sed, quod magis mirandum, super Cardialgia sequitur du-
ctum Oesophagi, ita ut dolor talis super inter Scapulas sur-
sum ascendere videatur, totum inferius circa Venteras Den-
sum seu Thoracis fit gravior ille, quae ascendit inter Scapulas,
& fit a spasmodica contractione & motione: quoniam non
raro aegri conquirentur isomodo de dolore compressivo in-
tra Fauces, qui dolor aegri ex Stomacho, per continuatum
Oesophagi ductum ad Fauces derivatur.

Potest observanda distinctio; in scilicet Cardialgia po-
tius inferitis potius seu penetrata habetur per dolore Colico,
& Colicus dolor in ea parte Coli, quae immediate subser-
vitur stomacho, habetur per Cardialgia: qualia exemplum
SCHENKIUS in *Obs. recenset l. 3. de quibusdam Medicis
deceptis, causantibus quoniam in anteriore stomachi regio-
nem dolorem fecientem; tanquam Cardialgia laboraret*
quem tamen atrocem dixerit unicus Clysther injectus, dum
minimè hoc ipso fuit sedatus dolor Colicus, alias enim ni-
hil praestitit Clysther (V.) Id quod in specie diagnosticæ,
considerando circumstantias loci dolentis, & hinc anteceden-
tibus & consequentibus: Nam ut plura magis foris veritas
proceduntur dolor in Cardialgia, quae in Colica vera, qua-
si densum, versus Umbilicum & Lumbos vel Rens de-
scendit, tardetiam solis affligit Cardialgia, quoniam si ponit
atrociore fuerit, horrendo interitum symposita. *Conf. Saxon-
ia, an hoc Humores? ut Flatulentia? ut per consensum
Reorum? an per consensum alius alterius partis? praeterea
hoc, quod facile patet, recipitur a SENNERTO in
Pract. l. 2. c. 2. f. 179.*

PROGNOSIS

In Prognosi: Dolor Ventriculi seu Cardialgie, huc ad-
fectus videtur terribilis, & aegria summa, tamen ex se
suo male est, & ubi habet in recessu, modo non cure-
tur: si tamen sit acerbior, ut diutius protrahatur, propter

(Y) Multum praeterea potest Clysther etiam in vera Cardialgia, praestare enim per Clysther ex, quod Turbida occupat, facit
potest quod Ventriculorum laceris ad inferius decurari, atque alio diebus causa translati, Cardialgia sedari.

Syncope motam, nus contemendum malum est, propter periculosiorem, quam alias superveniunt, symptomata: unde magis periclitantur in Cardiacis hoc affectu, qui Ob Ventriculi admodum feeble habent, aut obnoxii passionibus convulsis; item qui rari ac tenerae texturæ, in talibus nempe, vel etiam in aliis, interdum est extremorum refrigeratio, ac Sudor circa fronsæ ac tempora frigidus Lipothymia ac Syncope, aut Convulsionis superveniunt, res periculo non caret; metus enim est, ne dicta symptoma excedant, & sic majus periculum imminet. Sic in Febribus, cujus symptoma existit, præterit continens & acutus, cum benignis quam præterit malignis; dum ægri filia de æstu & ardore insigne circa Ventriculum, vel quæ illis dicitur *seda*, aut etiam de vera Cardialgia conqueruntur, res merito suspecta, aut admodum periculosa, est: vid. HIPPOCRATES *S. 4. Aphor. 65.* signum siquidem est, partem magnam adesse humorum saburram, partem ingentem Ventriculi Inflammationem cum subsequente Sphacelo, partem Nervorum Orificii Ventriculi striduram spasmodicam.

Pessima Anæxia & anxiosissima Cardialgia filiet oculis ex aliis & mordacitate humore; in specie Bile porracea, vel arginosa; hinc est illa, quæ ex Lacte oritur coagulato, quemadmodum *Athen. Hæstius. Pluim. 2. Observ. 17.* constit.

Illa, quæ oritur ex Pituita viscida, plura minus acida; contumacior quidem est cæteris, minus tamen molesta, ac minus gravis Symptomata stipata esse solet.

Cardialgia post Alimenta variis assumpta sæpè quidem est molestissima; rursus tamen remittit, modo non supervenient Febria.

Cardialgia in Puerilis sæpè Epilepsiam; in Adultis verò morbos Chronicos, eosque molestissimos, excitat.

Cardialgia denique à Lumbricis & Flatu utriusque morbi periculosa, interdum tamen ex Lumbricis Ventriculi mercedibus gravissima symptomata oriuntur, ex quibus ægri repente desiciunt; vid. RIVIERIUS *lib. 9. cap. 10.*

C U R A.

Quod attinet Curam: in hac

1. *Miserè removenda* in *primis Causa* Stomachum irritans antelans quævisque, five sit iæterna, five sit externa; item five per essentiam, five per consensum fuerit.

2. *Flaccidus est Stomachi Dolor* aut tunc inde angustia tum per generalia Opiata inermis, quam per specialia Aromatica appropriata; unde Theriaca ad hunc egregium est Anticardialgicum; ita tamen, ut quavis Causæ sublatio ordinari primum locum obtineat debeat, interdum tamen Anodyna & Narcotica, si dolor nimis urgeat, præmittenda veniant.

Primum quod attinet *deducendum*: quæ Causam irritantem remouet, in affectu per essentiam, nempe humoralium Contentorum, five assumporum, five intus genitorum visorum, per se planum est, quod excedant Vomitoria, quæ AMATUS LUSITANUS, FABER, & omnes Authores, ubi necessarium, commendant. Si verò est per consensum, cunctis morbus primarius; ver. gr. Nephritis, in qua deest Anodyna. Hinc in principio Febria Intermitentia & Ardens, si æger patitur Cardialgiam enormem, maturè propinquat Vomitorium, alias est merus, ne æger incredibili putremata incurrat. In Febribus Malignis ordinario observant Cardialgia, ubi vitium est in sinistro Orificio Stomachi; hinc in Malignis, quæ oriuntur à Comaglo, præmittenda Vomitoria Antimoniaia, aliis ob graviora symptoma via speratus effectus sperandus. Observamus hoc tempore in Pectehis, quæ sunt malignæ, contagiosæ, & acutæ, in quarum Cura si detur Vomitorium in principio morbi, morbi cursus absolvitur sine anxietatibus, si negligitur in principio, incredibilia symptomata ægros affligunt. Piz cæteris tamen Vomitoria Antimoniaia præcellunt, quæ uterum sunt v. g. Aqua benedicta *Hærmanni* aut *Rutæ*; vel quidam solent commendare, si Vitiu abstrichites in Poculum Vomitorium *Rutandæ* infundatur. Paratur hoc Poculum de *signis Jussiperi cum Fier & Viris Antimoniis* grasse modo imprægnatum, qualem modum habebitis in *Collagio Tomatino* D. MICHAELIS: est admodum elegans hoc potulum.

Vel

Æ. Tartari Em. Myof. gr. ij. ad liij.
Ziaosubar. Anij.
Chamemill. ad. gr. v.

Tota II.

M. 8.

Pulvis Vomitorius pro una vice.
Vel

Æ. Aqua Chamemill. Rom.

Mentha an. 3℔.

Spic. Carminat. Syll. 3℔.

Syr. Em. Arg. Sals. 3℔. vel 3vj.

M. 8.

Potituncula Vomitoria pro una vice.

Post Vomitoria, & quidem in malo minus acuto, asurpanda sunt *Purgantia*: sed quoniam hæc per se Ventriculo sunt inimica, & molesta, irritando ejus Orificium finistram, facile possunt exasperare malum; propterea convenientissimum est, ut iidem addantur Opiata, simili modo ac de Vomitu didum fuit: qui modus miratus est apud Modernos, ut etiam Opiata omnium humorum excretionem sistant, & etiam hypercathartes removeant, nihilominus tamen convenientibus Purgantibus permixta, eadem blandè & suaviter, nec adeo vehementer, operari faciunt. Hujus rei alias horrenda veterum Prædicorum prostant vestigia, nam ut plurimum usurpant Electuarium Diaphenicon, cum Philonio Romano, sub hæc Formula:

Æ. Mell. Diaphen. (quod etiam purgat) 3℔.

Philon. Roman. (propter Opium) 3ij.

Miscuerunt pro Electuario.

Quod purgat blandè, & simul dolorem sistit: de quo videre poetitis RIVIERIUM in *san Praxi*, ubi de Vomitu, *l. 9. cap. 7. pag. 415.* Item de Cardialgia *cap. 10. p. 433.* ac SCULTZIUM in *Consilio 214.* alioque. Verum quoniam talia Electuaria sæpè sunt asædosa, commodius à Modernis prescribuntur talis Formula; quæ etiam in Colica est præbica: v. g.

Æ. Tarc. Merul. vel Arac. dupli. Myof. gr. xij.
vel xv.

Scammon sulphurat. gr. ij. vel liij.

Laud. opiat. gr. i. vel ij.

Extr. Trach. Alband. g. j.

Olei dissilat. Curvi vel Chamem. Rom.

gutt. ij. vel 3.

M. E. Pulvis. S. = 12. 172.

Pulvis laxans, & sedans dolorem.

Laxat per inferiores, & hoc facto sistet dolor.

Vel

Æ. Mass. Nil. Alophang. cum Scamm. gr. xv. ad 3j.

Extr. Trach. Alband. g. j.

Laud. opiat. gr. i. ad gr. iij. vel ij.

Olei dissilat. Esculetig. liij.

Cum Effrat. Mentha vel Alband. l. Filala.

D. S.

Pilule laxantes & sedantes dolorem.

Vel

Æ. Mass. Filal. de Hier. cum Agar. 3j.

Scamm. sulphurat. g. j.

Laud. opiat. gr. i.

Cum Effrat. Alband. l. Filala.

D. S.

Pilule Stomachales laxative.

Vel

Æ. Mass. Fil. de Ammon. Querc. gr. xij.

Mag. Jalap. gr. v.

Scamm. sulphurat.

Laud. opiat. an. gr. j.

Cum Effrat. Capiv. l. Filala.

D. S.

Pilule Stomachales laxative.

Vel

Æ. Mass. Fil. de Ammoniac. Querc. gr. xij.

Aeri salin. gr. v.

Cum Effrat. Capiv. l. Filal.

D. S.

Pilule Stomachales laxative.

Certum est, quod admodum convenienter possunt miseri Opiata cum Purgantibus; ubi tamen simul observandum, quod Opium, quoniam omnes spirituum & humorum motus sistit, si addatur Purgantibus, ejus respectu Purgantium dolis plura minus augmentanda sit, ne suppressatur omnino minor Purgantis dolus. Et conveniunt talia Purgantia Opiatis mixta, in specie illis, qui obnoxii sunt hypercatharsi, aut facile volunt terminibus Inestimationum, ut Mulieribus, quæ ex levi purgatione suffocationem uterinam incurrent. Item convenit talis mixtura illis, qui facillime sunt solentibus alvi; quemadmodum reperitur, ubi don grana Scammonii & c. cles purgant; in his enim remora injicitur Purganti. Item con.

L.

convenit hæc mixtura *idæm*, qui acidis corrosivis succis abundans, ac lymphæ acriter salso-acida turgent, in specie Scorbuto-hypochoondriaci, quibus per Purgantia commotis, ob succos crudos & acidos gravissimos superveniunt Abdominis tormina: hoc ne sit commode permiscetur Laudanum opiatum, aut saltem die uno aut altero cum Digestivo præmittitur. De hac mixtura, vid. HOFERUS in *Merc. Med. pag. 124*. sicut Moderni Belgæ: SYLVIVS, & ejus discipuli utuntur, tali mixtura Laudani opiatum cum Purgantibus. POTERIUS, Scriptor nobilissimus curavit aliquando Cardialgiam alius omnibus relinquentem, in suis *Observ. Com. 1. Cap. 24*. mediocribus laxativissimis suis Pilulis Catholicis, Compositio præstat in *epid. Pharmacis Spagyricis*, & habet exemplum de Dolor. Ventriculi intensissimo periodico, quotannis certis temporibus, certisq. diebus redeunte, qui alius quampilumis irritis tandem à POTERIO curatus fuit per *Pilulas Catholicas*, quæ sunt hæc:

℞. Aloe sequens. ʒi.

Myrrh. ʒi.

Massick. ʒi.

Croci Orient. ʒi.

Magist. Saturni. meteorif. ʒi.

Cum Syr. Raf. Jalas. f. Massæ: cuius Dosis à gr. xv.

ad ʒss.

Valde commendat hæc *Pilula*.

Præcipuum autem ingrediens, quod obcurat proponit, est *Magist. Saturni meteorifera*, quæ videtur esse Flores Antimoni correcti, per inferiores saltem purgantes; *Magist. Saturni* enim alias est Antimonium; per meteorisationem nil aliud intelligit, quam in Flores sublimationem.

Quod si *Cardialgia* oriatur à Flatibus, aut exhalationibus ex effervescentia humorum in Intestino Duodeno obvia, nempe ex Bile & Succo pancreatico (nam Succus pancreaticus & Bili commixti, dum effervescent, halitus aeris in Stomachum mittunt) uti coniungit interendum in Febrilibus Intermittentibus, item in paroxysmis Hypochoondriaci & Hylerici; in talibus casibus optima sunt Clysmata Carniatiiva seu aromatica, ea ut nempe, quæ Flatus discutiant & blandè Intestina abstergant, Origano, Pulegio, Chamomilla, cum Sale Tartari parata, quæ in paroxysmis Februm Intermittentium, paroxysmis Hylerici &c., sunt optima, nunc simplicia, nunc partitis vicibus injecta: v. g.

℞. Herb. Mentha.

Elm. Chamomill. an. M. j.

Rad. Angel.

Rac. Lauri.

Jaupari. an. ʒss.

Sem. Anis.

Feniculi.

Sali Tart. an. ʒij.

Coq. in f. q. *Aqu. simpl.*

Colatura ʒij.

℞. addo

℞. Thear. de Bar. Laur. ʒi.

Olei diffillat. Anis.

Feniculi an. ʒss.

M. pro Clysmate, ʒ.

Clyma contra Flatus.

Quod tepide applicetur. Vel

℞. Herb. Chamom. M. j.

Flor. Sambal. M. j.

Rad. Loroph. ʒi.

Sem. a. calid. maj. an. ʒij.

Sali Tart. ʒss.

Coq. in f. q. *Aqu. simpl.*

Colat. ʒij. addo

℞. Thear. de Bar. Lauri.

Hier. cum agar. an. ʒi.

Olei diffillat. Rac. Jaupari. ʒij.

M. f. Clyma pro duobus vicibus ʒ.

Clyther contra Flatus. Vel

℞. Herb. Calaminth.

Origan.

Rasa an. M. j.

Rad. Lauri M. j.

Sem. Anis.

Camph.

Danion. ʒi.

Sali Tart. ʒss.

Coque in f. q. *Aqu.*

Colatura ʒij. addo

℞. Thear. ʒi.

Olei Anis.

Rasa an. ʒss.

M. f. Clyma, ʒ.

Clyther contra Flatus.

℞. Tartari additur propter duplicem scopum, (1) ut mensuram acuat: (2) ut vi salina incutiat.

℞. Herb. Mentha aut Calamintha ment.

Origan.

Puleg. an. M. j.

℞. Chamomill. vulg. aut Rom. M. j.

Rad. Angel. ʒij. vel ʒss.

Rac. Lauri ʒij.

Sem. Anis.

Danion.

Feniculi an. ʒi.

Gemina bene egregia sunt Carniatiiva.

Coque in f. q. *Aqu. simpl. & Uxin. hyem.*

Colatura ʒij. vel ʒss. addo

℞. Thear. ʒij.

de Rac. Lauri an. ʒss. vel ʒij.

Olei diffillat. Anis.

Feniculi an. ʒss.

M. f. Clyma, ʒ.

Clyther contra Flatus.

Incipiendum tepide, vel una vice vel, si Flatus obstitit præsentis; duplici vice applicetur.

RIVERIUS in tali caso habet Clysmata ex solo Vino albo aut Hippocratico cum Oleis diffusillat. Carniatiiva parata; quæ non sunt inelegancia.

Quæstio est: an *Vina festo conveniant*? quod negatur; per se enim in Cardialgia tulenda nil emolumenti habet: unde quando proflant exempla Cardialgiarum, per Venæ sectionem curantur, verè sunt casualla, quam ex lege Artis exhibita. Exemplum tale habet RIVERIUS C. 1. *Observ. 44*. de Dolor. vehementi, Ventriculi & Lienis regionem occupante, qui alia omnibus irritis, Venæ sectione tandem fuit curatus; vel Cardialgia propter alium affusum ex Sanguine nata fuit, & cum hoc suo modum convalescit, ratione cuius Venæ sectio indicata fuit, ut v. g. in Menstruis suppressis, item si à Sanguinis turgescentia nimis dependat: vid. FORTIS C. 2. *Comf. 56*. Pertinet hoc etiam exemplum THONERI in *Obs. pag. 153*. de Dolor. Ventriculi immensi & ingenti in Plethorico, alius irritis Venæ sectione subito incanacescenti inflat curato & idque propter, quia tantum adfuit suspicio Inflammationis Stomachi, quæ tamen non est sufficiens (2).

Sensum Doloris tollant in primis Papaverina, & Opista vid. WEDELIUS *Opus. pag. 116*: quæ inter Venteribus in usu fuit Philonum Romanum ad ʒss., item Pilule de Cynglossio ad ʒss. Modernis in usu est Laudanum opiatum, cum Decocto Flor. Chamomillæ usurpatum, & Laudanum Hylericum: item usurpant sequens Mixture specifica contra dolorem Stomachi & Præcordiorum, sunt ad Cardialgiæ omnes casus.

℞. Aqu. Chamomill. ʒij.

Cinnamon. ʒi.

Elm. Mentha. vel Citri, vel Aurant. ʒij.

vel ʒss. vel ʒvi.

Olei diffillat. Chamomill. vulg. vel Rom. gutt. vi.

Sand. quicq. gr. i. & iii. ad vi.

Syrap. de Hyss. ʒvi.

de Cassia ʒi.

M. D. ʒ.

Mixture dolorem sedant per una vice. De qua capiantur per dosi duo vel tria Cochlearia; & in genere Anxietates dispellit.

Mixture hæc diversimodè specificari potest, hinc potest hinc etiam addi Spiritus Salsi Ammoniaci, aut in sedulo sensus simul adit, Spiritus Nicot. dicitur: E. g.

℞. Aqu. Chamomill. ʒij.

Carmenit. Dorat. ʒi.

℞. ʒss.

(2) Mox igitur oblati negandum est Virefiliurum in Cardialgia inani habere posse, ita ut si nunquam illa prodierit id casu accidisse dicendum sit, ut ait hic A. Respondendum potius juxta ejusdem Auctoris nostri doctrinam, quod si Cardialgia cum affetu convulsiva sit à Sanguine pendens, vel ejus à Sanguine oritur prolepti in corpore plethorico, Sanguinis aliqua suppositione saluberrima vel cum Inflammationis suspitione hoc casu Venæsectione inani habere potest. Ita ut si præ prædictis venæsectionem ad deprehenderemus effectum illud Galeni, in vehementibus doloribus & maximis Inflammationibus nullum majus auxilium intertriphicam Sanguinem misere-

Eliz. Mentha 3℔.
Spiritus Nitri dulc. 3℔.
Laud. opiat. gr. iij.
Syrup. Cinnamon.
Mentha. an. 3℔.

M. S. et antea.

Vel etiam pro Causarum varietate addi possunt Pulveres quidam terree fixi absorbentes, & quidem omnia in debita dosi.

Vel

℥℥. ℞. Flor. Chamomill. Rom. 3ij.

Mentha.

Opil (Petrinde enim est, five Opium in forma sicca five lipida adhibetur.)

Spiritus Anis. an. 3℔.

M. D. S.

Essentia dolorem sedans.

Dosis 30. ad 40. guttul. Vel

℥℥. ℞. Spiritus Ess. Camom. anisat. 3℔.

Assent. Opil 3℔.

M. Pro tribus dosi.

Essentia dolorem sedans.

Vel

℥℥. ℞. Spiritus Carminativ. de trib. 3ij.

Assent. Opil 3℔. ad 3℔.

M. S.

Essentia dolorem sedans.

Vel

℥℥. ℞. Spiritus Carminativ. de trib.

Assent. Camom. an. 3℔.

Opil 3℔. ad 3℔.

M. S.

Essentia dolorem sedans.

Vel

℥℥. ℞. Cor. Cerv. cum Sale vol. 3℔.

Essentia Opil 3℔.

M. S.

Mixtura dolorem sedans.

Dosis gutt. xlv.

Convenit etiam Tinctura acerrima, ter in die à 40. ad 50. guttas.

Aliis quæ in Cardialgia in genere conveniunt pro causarum ratione, vel appropriata Stomachico-aromatica blanda in casu, quando Platus aut similia addunt: vel Absorbentia in Bile præteritis seu recentibus porraceis: ut tactam propterea Ventriculi vicia debitis modis curanda. Aromatica talia ad Cardialgiam usitata præ cæteris sunt Radia Angelicæ & Ebuli Campanæ, Feniculi: Herba & Semen Feniculi, Anisi, Herba Rosmarini: speculum est Chamomilla, tan vulgaris quam præstantiori cum effluvia Romana, quæ mole est aroma, una cum vi anodyna, & omnia ex his parata remedia; quia sunt expertissima in Cardialgia, & non habent in hoc passu nil conferendum. Sanè RIVERIUS, AMATUS LUSITANUS Cent. 4. Cur. 59. vix sufficienter possunt commendare Aquam Chamomillæ destillatam in Cardialgia fatalente, si ad 3ij. propinetur; hinc Decoctum Chamomillæ cum extractissimum miribet à FORESTO ad Cardialgiam commendatur. Alii Essentiam Florum Chamomillæ cum proprio Spiritu paratam commendat. D. MICHAELIS paravit Essentiam hanc cum Spiritu Vegetabili Carminativo, i. e. Spiritu Vioi à specificis seu simplicibus Carminativis abstracho; quæ Essentia à 3℔. ad 3℔. propineta in affectibus Stomachi & Cardialgia est convenientissima & elegantissima. Alii Oleum destillatum spirituum Chamomillæ vulgaris, & Romanæ meritis excolunt in haullulo Vini assuetum, aut Oleo Nucis Moschate mixtum & exterius illitum, admodum est conveniens ad tollendam Cardialgiam: vid. *Art. Med. Hoffm.* N. 1. pag. 113. & *Pol. 2. def. 87. p. 308.* PAULI *Præscrip.* Item. p. 253. in specie AMATUS LUSITANUS Cent. 3. Cur. 30. FORESTUS l. 18. observ. 20. Post Chamomillam in terribis conveniunt Decoctum Ligni Sassafras, Hyssopus, summatas Anethi, Mentha crispæ, aut Flores Aoranthi seu Rosmarini, & Flores Verbasci, qui sunt singulariter anodyni. In specie Cortices Citri & Aoranthorum, & ex his parata Elixiria, Tinctura & Oleum destillatum Corticem Aurantiorum. Ex dictis Simplicibus destillatæ Aquæ, Aqua Chamomillæ, Florum Sambuci, Hyssopi & Cinnamon convenient. Vinum absinthites similiter est utile, uti etiam ad Dolorem acrem Vinum decoctionis Noci Moschate, qui laudatur singuliter à STOECKERO in *Praxi*: item Spiritus Vini anisatus, seu Spiritus & Oleum destillatum Anisi, Spiritus Salis Ammoniaci simplex & anisatus,

Tom. II.

est egregius in Cardialgia. In urgente casu potest propinari Elixir Mentha, item Olea destillata Carminativa: e. g. Oleum destillatum Carvi experimentum est THONERI in *observ. p. 136.* ad gust. iv. vel v. n. paratum; duo enim casus, hoc exemplum habet coratocum à vehementissimo totius Abdominis, itemque àervo Ventriculi Dolore: item eodem casu habet exemplum ingratæ Dolore Stomachi, qui per intervalla, præterit à cibo assumptis, nique ad Scapulam se extendit ex sympathia cum Ventrículo, cujus Orificium superius alligatum septimæ Doræ Verberæ; qui dolor insuper 5. guttis Olei destillati Succini subito suit curatus. Haic simile est Oleum Anisi & Cumini.

Et hæc conveniunt in specie in Anxietatibus vagis.

Quod si percipiatur simul Ardor in regione stomachali, tunc modò dictis Aromaticis commodè adduntur blanda Acida, quæ Ardorem refringunt, v. g. Succos & Syrupos Granatorum acidorum, Rob & Syrupus Cydoniorum, Succos Citri, Syrupus acetosatis Citri & speciatim Spiritus Nitri dulcis, imprimis ex Spiritu Nitri cum duplo Spiritu Anisi dulcificatus, & similia.

Si oritur Cardialgia & Stomachi Anxietas à facili acoribus, Acidis, ex Bile porracea & æruginosa, præstia dicta, in qua Acidum cum Alkali effervescentia dominatur, eadem propinquant Acidum effervescentia destruentia, v. g. Tinctura Cochlearum marinarum, Maser Perlarum, Pulvis Marchonis, Cornu Cervi usum, Ebur usum, Lapilli Cancrosum, in specie Crythalli præparata: v. g.

℥℥. ℞. Crythall. mont. præp. 3℔.

Corall. rub. præp. 3℔. vel 3℔.

Cor. Citri præp. 3℔. vel 3℔.

Laud. opiat. gr. iij. vel iij.

M. pro tribus dosibus, S.

Pulvis dolorem sedans.

Vel

℥℥. ℞. Marr. Perl. præp. vel Corall. rub. præp.

Cinnab. Antimonii vel nativ.

Antim. diaphor. Martial. an. gr. viij.

Laud. opiat. gr. iij.

Olei destillati. Cerephylli, gutt. j.

M. l. Pulvis, S.

Pulvis dolorem sedans.

Capiantur hi Pulveres in Aqua Chamomillæ, imprægnata cum Essentia Calorei.

Nempe in tali Bili æruginosa, teterrima symptomata Ventriculo inferente, Crythalli montana præparata speculum alexipharmacum Bili æruginosæ rectè dicitur LANGIO, qui adhuc loquitur more Veterum; licet difficulter solvatur per mœstrum, tamen convenit, ut destruat acidum corrosivum in his prædominans.

Si Mucilago viscidior Cardialgiam loferat, addenda erant Tartarea, & Gummatæ, ut Cremor Tartari, & Gummi Ammoniacum.

Pertinet hæc Cardialgia intensissima & periculossima, nata ex haullulo Mercurio sublimato, in qua convenit Oleum Amygdalarum dulcium cum Lacte levatum. Quidam solo Lacte, quidam verb cum Oleo Tartari per deliquium temperato, utuntur pro potione, cujus historiam & Curam referre VALERIOLA l. 2. observ. 7. qui casum cum sit singularis, & non inolegans, ejusdem remedii paucis communicabo.

Primo præscripsit Fomentum exterius proficuum:

℥℥. ℞. Fol. Hyss. albi

Assynth. Rom. an. M. 8.

Majeth. 3ij.

Crythall. parif. 3ij.

Coquantur in

Ol. Rosæ.

Violes.

Lillies.

Antibi an. 3℔.

Vini rubri 3℔.

ad humiditatis consumptionem. Coletur

Et hoc remedio applicato mirum levamen percepit, Interim postmodum præscripsit hunc Potiorem:

℥℥. Crythall. præp. 3℔.

(ratio, quoniam acidum Mercurii sublimati arripit Crythallum, & coarctatur)

Theriac. 3℔.

Bayrii ros. 3℔.

(ad demulcendam acrimoniam Mercurii sublimati)

In Decolla hordei q. l. misc. & pro aliquot vicibus propinat.

L 2

Ta-

Talibus scilicet obtunditur Acidum corrosivum Mercurii subtilitati, ac fenilis Dolor Ventriculi mitigatur. Loco Batyri in Lade solum propinasset.

NR. Hyofcymus externè, & Cryſtallus internè, perſequerent totam Curam: nam Cryſtallus externè in Fomento nihil præſtat, nitiſque ejuſ totum hypocheſt vulgari. Per Cryſtallum montanum etiam curata eſt à THONERO in Jure gallinacea ulceraſata. SCULTETUS in Arman. Chir. p. 2. Obſerv. 39. Terram ſigillatam cum Syropo Conſolidæ majoris in erolione Ventriculi dolorifica ut ſingulare remedium commendat.

Pertinet hæc ſuo modo elegans Caſus, quem habet THONERUS in Obſerv. 2. pag. 146. de Dolorè Ventriculi pnoſorio, qui ſuit curatus per ʒiſſ. Olei Amygdalarum dulcium, in Jure Galli propinatu; quo ſacto intra tres horas Acciſula per vias urinaris fuit excreta, & exiſte Dolor omnis ſubito diſparuit. Facit hæc etiam, quando oritur ſimilis Dolor ex deglutitiſ Vitri fructuſis, Aciculis, aut ſimilibus, ubi conveniens eſt, ut uſurpetur Puls pioguit ex Milio aut Oryza ſiſta; & aque non nimis fluxilis, ſed aliquantisper ſpiſſa, quæ aſſumitur abſque ſubſequentè potu; ſic enim ſit, ut huic Pulvi involvatur fructuſ Vitri, vel Aciculæ, aut ſimiles res acutæ miſſæ Pulvi, citra noxam ex Ventriculo per Pylorum dilabantur.

Reliquæ Cauſæ Appropriatæ ſua exigunt Remedia; hinc v. g. Aquæ falſæ potu Cardialgiæ ab Hirudine curatam elegerit RHODIUS Cent. 2. Obſerv. 72.

In Cardialgiâ à Veribus
ʒiſſ. Elix. Propriet. ſine acido ʒiſſ.
Spir. Sal. Ammon. ʒiſſ.
M. S.
Elixir Stomachale.
Vel

ʒiſſ. Eſſent. Alſinch. tartariſ. ʒiſſ.
Spir. Sal. Ammon. ʒiſſ.
M. S.
Eſſentia Stomachalis.

In Doloribus Ventriculi Senum gravioribus, aut etiam in aliis Cardialgiis cum gravi virium depletionè & Lipothymia ſanctis, elegantes ſunt Pilule Pteris, quas deſcribit C. 3. c. 30. ita:

ʒiſſ. Ambra griſ. gr. ij. vel iij.
Mefich.
Cerei Orient. an. gr. ij. vel iij.
Opi Tobac. (rite præpar.) gr. iv.
Miſc. f. Pilule: quæ in Senibus, & viribus deſectis ſunt convenientiſſimæ.

Idem POTERIUS citato loco C. 31. habet exemplum diuturni Doloris Ventriculi, aliis omnibus irritis, tandem Decocto Ligni Saffraſis per 20. dies continuè curati.

Item Abſinthium ejuſque Eſſentia Senibus vigilantibus prodeſt: Sic ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Med. Princ. lib. 58. Obſ. 10. exemplum habet de importuno Ventriculi Dolorè potu Vini abſinthiiſ curato. WEDELIUS Eſſentiaſ hæc Carminatiæ addit Eſſentiam Caſſorei & Aodynam, cum Olei Caryophyllorum gutt. j. vel altera; valet & in Siogultu & in Inflammationibus Ventriculi, doſi gutt. xxx. miſcet cum Elixir Proprietatis, quando Cruditates Ventriculi adſunt. Deſcriptionem Eſſentiaſ hujus Carminatiæ videb. in ejus Opul. pag. 119.

Quod attinet Extrema: interdum hæc maxime conveniunt Linimenta ſuaveolentia ex Oleis imprimis deſtillatis cinnamata, quorum compoſitiſ eſt ſicilis: v. g. ex Oleo Chamomillæ deſtillato, item Maſtiche deſtillato, Macis, Caryophyllorum, & guttulis quibuſdam Olei deſtillati Cinnamomi: quæ ſi acra fuerint, excipiantur cum Oleo Chamomillæ infuſo, Maſtiche, Nardino, & Oleo Stomachali Cereati; item cum Oleo Nucis Moſchatae expreſſo in mulieribus; item Baſſamo Peruviano: addi etiam poſſet Oleum deſtillatum Succini ad Convulſiones Stomachi, quibus reſiſtit. Modus præſcribendi eſt hæc:

ʒiſſ. Olei deſtillat. Chamomill. ʒiſſ.
Macis.
Caryophyllor. an. ʒiſſ. vel gutt. xv.
Baſſam. Peruviani ʒiſſ.
Cum Olei anpr. Nuc. Moſch. q. ſ. f. Baſſamus. D. S.
Baſſamus Stomachalis externè adhibendus.

Vel
ʒiſſ. Olei Stomach. Cereati, ʒiſſ.
deſtill. Succini ʒiſſ.
Angelic.
Caryophyll.
Macis an. gutt. iv.

Cinnam. gutt. ij.
M. D. S.
Oleum dolorem ſedans.
Vel

ʒiſſ. Olei deſtill. Eari. Juniper. ʒiſſ.
Caryophyllor.
Macis an. gutt. vi.
expr. Nuc. Moſch. q. ſ.
M. S.

Baſſamus dolorem ſedans.

Illinatur regio pericardiorum, imponendo deſuper laterem calefactum.

Item
ʒiſſ. Olei anpr. Nuc. Moſchat. ʒiſſ.
deſtill. Alſinch.
Mentha.
Caryophyllor. an. gutt. v.
Baſſam. Peruviani. gutt. vj.
M. D. S.
Baſſamus Stomachalis.

Vel
ʒiſſ. Olei anpr. Nuc. Moſch. ʒiſſ.
deſtillat. Caryophyll.
Mentha. an. gutt. v.
Baſſam. Peruviani ʒiſſ.
M. D. S.
Baſſamus Stomachalis.

Poſt Linimenta externa conveniunt ulterius Emplaſtica, regioni Stomachi applicanda: quæ inter elegans eſt Emplaſtrum Carminativum Myſſichis; item, ſi ſuſpecto ſit flatuum, Emplaſtrum de Bacis Lauri. Ex omnibus excelsit Tacamahaca, per experientiam POTERII ſingulariter commendata in l. 3. c. 32. p. 240. quæ ſola in forma Emplaſtri regioni Stomachi applicata, acerbiffimos dolores curavit, & hæſtenuſ crebra experientia ejus uſus fuit confirmatus, quod etiam fuit in frequenti uſu D. MICHAELIS: Loco ejus ſumipoteli Gummi Caranæ, non minus efficacis: Præſcribuntur vel ſimpliciter ita:

ʒiſſ. Tacamahac. vel Gummi Caranæ. p. ij.
Theriac. part. j.

Liqueſceta in mortario calido, miſceantur pro Emplaſtro; ſic ſiſta dolorem; quod malaretur cum Oleo deſtillato Succini in Convulſione Stomachi; vel loco Theriacæ Tacamahaca miſceatur cum p. j. Baſſami Peruviani pro confortatione Stomachi. Inducatur ſuper altum in forma Scuti Stomachalis, S.

Emplaſtrum Stomachale.

Applicetur aut adhaereat. Non autem prius ſuſinde obducatur, potius nudè imponatur: ſi illud auferre velimus, illinamus Oleo calido. Eſt nobile remedium in huiſmodi affectibus Stomachi, in ſpecie Cardialgiis; unde Emplaſtrum Stomachicum de Tacamahaca Schræderi commodiffimè uſurpatur poſſet. Ipſe POTERIUS circa ſuam Pharm. Symplicia excellens habet Emplaſtrum ex Tacamahaca compoſitum pro affectibus Stomachi hæc forma:

ʒiſſ. Olei deſtillat. Moſchic. ʒiſſ.
Mentha.
Alſinch.
Nuc. Moſch.
Caryophyll. an. ʒiſſ.
Tacamahac. ʒiſſ.
Cera Cirr. ʒiſſ.
M. f. Ceramum.

de quo accipitur q. ſ. pro Scuto Stomachali.

Item convenit Emplaſtrum ex ana Tacamahaca & Cerei Stomachalis Cereati, quæ liqueſceta in mortario calido malaretur cum Baſſamo Peruviano.

D. S.

Emplaſtrum Stomachale.

Jam quoque omnia, quæ de Tacamahaca dicuntur, intelligenda etiam ſunt de Gummi Caranæ, nobilioris forſan uſus: vel ex ana Gummi Caranæ & Tacamahacæ, in mortario calido liqueſcitorum, & cum Baſſamo Peruviano malaretur, ſit Emplaſtrum indecedum in altum in ſermo Scuti Stomachalis, & imponendum regioni Stomachi. Cæterum videatur, quod attinet naturam Gummi Caranæ & Tacamahacæ, MONARDES de ſimplicib. Comm. in Cluſ. p. 318.

Denique poſt huiſmodi Emplaſtra uſurpatur externè etiam Fotus vel Fomentationes ex Aromaticis, Abſinthio, Mentha, Hyſſopo, Floribus Chamomillæ ſimplicis, & Romanæ, Origano, Majorana, Semine Fœniculi, Carvi, Bacci Juniperi, &c. regioni ſtomachi applicandi: ſi- que

que duplici sub forma, aut ut species coquantur in Aqua & Aceto, aut in Vino, & illud Decoctum panis linteis tripliciter aut quadrupliciter applicetur stomacho; vel ipsam Species infusoletur Sacculo, coquantur parumper Aqua vel Vino, & ita Sacculus applicetur regioni stomachi, lobinde renovandus. Focus potest esse talis, quem commendat in-
us alia FORESTUS in l. 18. infero. 22. ad cupus imitationem

℞. Mith. Alkesh. asprat. prest.

Flor. Chamemill. Melilot.

Rosar. rubr.

Mith. Mith. an. M. l.

Sem. Anisi

Carvi an. ℞.

Coque in l. q. Aqua comm. Colat. ℞. adde

Thuris. ℞.

Aqua. Rosar. ℞.

Asti rosar. ℞.

M. pro Potu, Ventriculi regioni applicando. S.

Focus externus.

sanis sunt melliores ita:

℞. Crem. Alkesh.

Mith. Mith. an. M. l.

Flor. Chamem. Ram. an. M. l.

Rac. Juniperi com. ℞. ad ℞.

Sem. Anisi

Carvi

Cameli

Fenicul. an. ℞.

lacus & contus implentur Sacculis oblongis interpositis, qui obulit in Vin aut Aqua, & ita, quomodo calid fieri potest, imponatur regioni stomachi, repetenda crebrius.

D. S.

Sacculus externus applicandus.

Vel

℞. Cumar. Alkesh.

Herb. Mith. an. M. l.

Mancha. an. M. l.

Flor. Chamemill. Rem. M. l.

Rac. Juniperi com. ℞. ad ℞.

Sem. Anisi

Carvi

Dandi

Fenicul. an. ℞.

Parie. an. ℞.

lacus & contus includ. Sacculo interposito. S.

Species ad Potum.

Coquantur in Vin, & tepide cum spongia applicetur stomacho; vel Sacculus probe calefactus irroretur cum Oleo diluato Succini, Manche, vel Chamemilla, & applicetur.

℞. Herb. Origan.

Rosmar. an. M. l.

Rad. Aur. veri.

Galang. an. ℞.

Caryophyll.

Cinnam.

Mast. an. ℞.

Rac. Lauri

Sem. Anisi

Carvi

Fenicul. an. ℞.

lacus & cont. includ. Sacculo, qui Vin generose ebulliat, & applicetur. S.

Species ad Potum.

Omnibus in casibus satisfacit Hyofcymus, quem in Cardialgia korbatica preprimis commendat DRAWIZIUS cum cum aliis Anodinis: c. g.

℞. Fel. Hyof. albi.

Melua sub fronte colla & delictis pofat.

an. ℞.

Parie. Herb.

Leut. an. cum Decolla Leut. ad delictum

confusum redact. ℞.

Mut. Trogar.

Sem. Hyof.

Cydon. an. ℞.

M. l. Carapafina. S.

Puls dolorem sedans.

Quod si Dolor Stomachi & Ventris sit occasione refrigerationis corporis externae, & inde patet Flatum, tunc conveniens est, simplex quidem, sed admodum bonus, Sacculus Mentagana. Formula est haec.

℞. Parfar. M. l.

Mili. rafi M. l.

Salis comm. decrep. M. l.

Miscetur, calefiat in Sacculo, &

applicetur.

In Colica, quoque est elegans.

Molieres interdum vitio, ut putant, Matricis, & ejus occasione impuritatibus congestis, contumaces dolores in Orificio Ventriculi superiori percipiunt, quos in casu tali tollit sequens:

℞. Unguent. pomar. ℞.

Seri hircin. ℞.

M. l. Linimentum. S.

Unguentum lenitulum.

Quibus innungatur Scrobiculus cordis hanc, meridie, & vesperi aliquot diebus (A).

Pertinet huc etiam Doloris Ventriculi peculiaris species, Osiophagum simul molesta, Ardor stomachi, quem Germani vocant den Sode.

C A P U T III.

D E

ARDORE VENTRICULI.

Non raro enim ebullit praeter naturam in Stomacho materia excrementitia, unde insigis Ardor & Dolor Stomachi percipitur, ut quasi copiosi sumi sulphurei per gulam ascenderent. Malum hoc a primaria passione vocatur *Ardor Stomachi*, iis vero, qui Germanos sedantur, *Seda*.

PARS AFFECTA.

Subjettum est Stomachus ratione contentorum, & Orificium finistrum cum Osiophago ratione aëris.

C A U S A E.

Causae huiusmodi Proxima est Effervescencia nimia in Stomacho, orta ab acido vitioso nimio, effervescere cum quodam alcalino pingui seu oleoso, & cruditate nidiorosa. Acidum enim & alcali, dom effervescunt, inducunt Ardorem plus minus interitum, prout plus vel minus olei vel sulphuris ipsis admixtum fuerit. Nam Effervescencia sola non infert Ardorem; si autem oleositas adest cum Effervescencia, tunc talis calor totentus emergendo adscendit, siue Bilis regurgitet in Stomachum, siue sint assumptae biliosae, vel alcalinae, vel nidiorosa &c., quod alcali simplex non facit, nisi addatur oleosum, quod patet per Mechanicam.

Causa Remota sunt variae: quaedam respiciunt nunc Acidum, nunc Alcali urinosum; unde Alimenta vel nimis Acidum, v. g. Vinum, Acetum &c., vel Pinguis assumpta, cruditati nidiorosa aërii praebentia, Ardorem Venericuli excitant. Hinc il, qui sunt incedendi, aut quibus facili acrior Bilis ex Duodeno in Stomachum regurgitat, obnoxii semper huic affectui propter Effervescencia Bilis cum acido Stomachi, tunc temporis vitiosi, obortam; item Hypochondriaci plures in quibus humiliter acidum in Stomacho praedominatur, quando Mellita, aut Saccharata, & alia Dulcia facili acetoctia affomunt, propter horum faciliem Effervescencia cum acido facili Sodam incurrunt, imò etiam Aromaticia, aut Acrida, v. g. Allium & Cepae, assumptae copiosius, effervescendo cum acido, non raro Sodam inducunt. Plura, quoad Causas, dici supra de Cruditate acida.

DIAGNOSIS.

Signa Diagnostica ex egrorum relatione patent; quando nempe circa praecordia conquassantur de Dolore gravativo, sub

(A) In Cardialgia ab Utero non leve sentiem emolumentum Mulieres; & graveolentibus Stomachi regioni vel naribus applicitis praeparatum licum habet Aia fœtida parvi dolenti superimpofita: sumus autem late, pennarum, tabaci, charta, & similibus remanent, sicut fœtus trullus excitare, & Cardialgiam solvere.

sub forma aque ebullientis sensim sensimque adscendens, & fauces inferiora versus contringentia: quem Dolorem etiam rufus nidorosus, & amarefcences tandem, comitantur.

P R O G N O S I S.

Nihil habet in recessu, imprimis qui post alimonia assumpta observatur, cum facile cesset: qui tamen sine causa manifestella affligit, morbum chronicum ut plurimum constituit.

C U R A.

Occurritur facili sode, modo temperemus maturè acrimoniam humorum effervescentium, aut destruas acidum vitiosum; subijungendo, si opus fuerit, vel Vomitorium, ad quod tamen raro recurrimus, vel Laxativum.

Conueniunt igitur v. gr. Lapiduli Cancrorum, uti & Ebur ulsam, Bolus Armena, Corallia preparata, Lapiduli Carpinum vel Percarum CrySTALLUS preparata, Lac Lunæ, Unicornu fulsile & similia. Præ cæteris Creta & Terra Martialis: hæc Species Diacretæ, & Moselli de Creta *Myrsinifol* suot expertissimi, vel horum loco.

℞. Creta prep. ℥i.

Nux. Mosch.

Rbor. nfi. prop. an. ℥i.

Unic. fessil.

Corall. rub. prop.

Lapill. Cancr. prop. an. ℥i.

Cum ℥iv. vel vi. Sacch. in Aqua. *Perall. solut. ℥. Moselli.* Quibuldam usitatum est etiam Latere combollos intensè rubefcentes pulverizatos cum Saccharo missos, aut in Mosello redactos propinare: nam & hi, quoniam participant de Terra Martiali, unde rubedo, potenter compescunt quacunque effervescentiam. Album Græcum seu sterus Canis ossa vocatis à multis est probatum. Quibuldam etiam in ossa est Siligua Ceratæ comesta, quæ solet iodam brevi suffocare. Conserva fructuum Cynosbati ad ℥i. dosi Avelanæ ejusdem magnitudinis insigotiter conuenit: sed hic observetur, quod hæc illæ in interiori parte Fructus, quibus adherent Semina, non sūt separandæ. Syrupus & Conserva ex summitatibus Quercus commendatur ab HORSTIO L. 4. *Observ. p. 194.* Potulaca, ejusque Succus, & Syrupus, aut ipsa planta recens assumpta sunt egregia, ut & Succus Sempervi: Nitrum etiam depuratum vel antimoniatum in Aqua Florum Sambuci solutum, item Cre-mor Tartari ad ℥℥. datus, quo Ardor Ventriculi jam desperatus fuit sublatu: v. M. A. N. C. *Ann. 3. OH. 110. p. 316.* vel *speciem illud KERGERI de Ferment. contra Febres*, Corallia nempe cum Cremore Tartari: v. g.

℞. Cre-m. Tart. ℥i.

Corall. rub. prop. ℥i. vel ℥℥. ad ℥i.

M. Pro defibus duabus, S.

Pulvis vaporans.

His denique addatur Nux Moschata, quia oleo temperata est.

Ex his variis possunt fieri formulæ, Reginæ.

℞. Creta prep. ℥℥.

Cera. Cerui nfi. prop. ℥i.

Corall. rub. prop. gr. xv.

M. pro defibus duabus, S.

Pulvis vaporans.

Vel

℞. Creta prep.

Farin. Lætar. an. ℥℥.

Nux. Mosch. gr. x.

M. ℥. Pulvis, S.

Pulvis vaporans.

Vel

℞. Arcan. dupl. ℥i.

Off. sup. pulv. ℥i.

Nux. Mosch. gr. vi.

M. pro defibus duabus, S.

Pulvis vaporans.

Vel

℞. Arcan. dupl. ℥i.

Creta prep.

Unicornu. fessil.

Nux. Mosch. an. ℥℥.

M. ℥. Pulvis, S.

Pulvis vaporans pro aliquot vicibus.

Vel

℞. Spec. Diacretæ Myrsinifol. ℥℥.

Arcan. dupl.

Nux. Mosch. an. ℥℥.

M. S. ut auro.

Vel

℞. Creta albfim. prop. ℥i.

Corall. rub. prop.

Rbor. nfi. prop.

CrySTALL. prop. an. ℥i.

Nux. Mosch. ℥℥.

M. ℥. Pulvis.

D. S. ut auro.

Vel cum ℥. q. Sacch. ℥. Moselli.

℞. Conf. sum. Querc. ℥i.

Creta prep. ℥i.

Nux. Mosch. ℥℥.

Cum ℥. q. Syr. *Perall. ℥. Elethariacum.* Inter Evacuantes, temperata succis & iodato effervescentia motu, optimi sunt Tamarindi in Decocto, aut Infuso usurpati, laxant semper & refrigerant egregie, ac in biliosis hunc affectum sedare solent: vel usurpatus Rhabarbarum aliæque similia: vel ubi Purgatio validior opus,

℞. Mass. Pilular. de Amom. Querc. gr. xli.

Magister. Jalap. gr. iij.

Scamm. sulphurat.

Extra. Troch. Alkand. an. gr. iij.

Cum Rhois. Propriet. ℥. Pulvis.

Habuiamus symptomata Ventriculi dolorosa: sit munc

S E C T I O V I I I.

DE FÆCUM ALVINARUM A CHYLO SEPARATIONE,
ET SUCCORUM PANCREATICI ET FELLEI
EFFERVESCENTIA VITIOSA.

DE hac committer altum apud Auctores est silentium, nihilominus necesse est, ut de ea agatur. Præsuppono hic ea Physiologicis, quod Chylus totius in Stomacho ex alimentis productus elaboratur succedere per Pylorum in Intestina, apparetur quidem homogeneus, cum tamen non paucæ partes heterogenæ, & economiæ animalis conservandæ ineptæ, solbnt, in Intestinis, antequam aliorum pergam, probè separandæ. Nempe habet se Chylus ad instar Lactis, in quo ad sensum, licet homogeneo, faculentia: tamen callosæ solbnt, in Intestinis præcipitandæ. Separatio hæc fit manifestius duobus hinc Succis, Biliis & Pancreatico, in fœ Duodeni & principio Jejunii in Intestina velsus, ibidem Chylum diluentibus, blandam in & cum eodem Effervescentiam excitantibus, eundemque alterantibus, & ita simul crassiores, viscidiores, & quasi callosas ejus partes præcipitando, per alvum evacuan-

do separantibus: ita sicut Chylificatio in Stomacho fiat beneficio Fermenti salini volatilis acidi, ita & Fæcum separatio fiat in Duodeno à Fermento Biliis primatio, licet & Lympha pancreatica etiam aliquod conferat. Si fiat, ut vitiatur hic alteratus Chylus in Intestinis & depravetur, non possunt non exinde emergere varii morbi: Aut enim nulla planè sit Fæcum separatio, & alteratio, ut io fluxu Intestico, item Cordiaco sufficienter patet; de quo negotio videatur SYLVIVS in *Differt. medica* 1. io Interi specie enim ex obstructo Folliculo Fellei excrementa sunt candida, unde corporis tabescentia: Vel perversa sit separatio, unde Massa sanguinea cacochymica. Nihil quidem excrementorum catalogo male olim fuit adscripta, cum in se reverà balsamicus sit liquor, & condimentum quasi balsamicum, Chylo pro ipsius & totius Massæ Sanguineæ conservatione ab omni corruptione patredimali additum, instar Mithrac

cu-

enodum Aloëve: unde & Vermium faciem ex Chylo generationem, quantum possibile prohibet: vid. HELMONTIUS Tr. Scaphur. Digest. Præterea quoque Biliis sale suo volatili oleo, seu essentiali ejus constituto, si quid manifestè & præternaturalis acris adhuc in Chylo deprehendatur, hoc, utpote toti corpori hostile, destruit, & in salum tertium volatile transmutat: simulque Chylos totum optinè diluit, & fluidiorem ac liquidorem reddit, & ita per accidens Facum excretionem simul nonnulli promovet.

Nec improbabile est, alii quod afferunt, Bilem oleositate sua sulphurea occulta, ut in se appareat flava, quasi tunc Chylum, adeoque primum per faciliorem in sanguinem transformationem dispositionem addere, ut hujus sulphureæ tincturæ medio exaltari facilius, & in rubrum sanguinem converti possit: cujus defectu Cachexia & Leucoplegmatia, Anasarca, & quando Hydropes ex parte aut videntur: sicut Pileures, quando colores lucidiores vult reddere, addunt Fel seu Bilem: cum omnis color ruber ex sale volatili, cum oleo volatili digestis coalescit: non sicut ex Sale volatili Cornu Cervi & Spiritu Vini sit Tinctura rubicunda: Ergo in Cachexia, Anasarca &c. si plius Bili deficit ex deficiente Hæmatogali oritur.

Constat cum Bile eodem in loco Sacum Pancreaticum, subinde acidus, plus minus tamen, in animalibus reperiatur, qui Chyli dudo modo à Bile alterati effluores & quasi calidius partes leniter coagulando precipitat, & blanda quidam cum Bile Fermentatione, que in statu præternaturali subsiste in Effervescencia generat, diffusam Facum separationem iniquitatem adjuvat: De hoc Sacco, adeoque ipse Pancreas, vid. GRAFFIUS Tract. de Sacco Pancreatico item SCHWABE Tract. de Pancreate. Hi duo Sacci, Biliissem, coactas sale volatili oleo, & Succo Pancreatico, coactas acido temperato subeunt Chylum, hanc utramque, incidunt, resolvunt, & facta blanda Fermentatione, crassiores ac faciliiores partes à reliquis tenuioribus imperatris & nutritivis separant, & hæc posteriores transmutant in Vala Laeta.

Chylus in Intestinis tenuibus alteratur & perficitur, & à Chylis succulentis separatur, motu Intestinalium peristaltico succedente secundum eorum ductum promovetur, ita quidem ut Succus tenuior nutritivus intret Vala Laeta, Tunc verò precipitatur, ulteriori motu per Intestina trahitur, in quibus deorsum consequenter consistit, usque ad Intestinum rectum protrahitur, & ita foras emittitur: Iam verò in interno Intestinalium pariete imprimis considerabilis est Mucus eadem Intestina obducens, qui nihil aliud est, quam crassior Chyli pars (dum ejus tenuiores partes per Intestinalium foramina transcolantur) tripli, qui oblinendo Intestina ab ipsorum succorum acrimonia eadem defendit, simulque lubricando Chyli Faciemque motum faciliorem reddit: Antequam tamen Intestinalium eadem videbitur in WILLISII Pharm. Rationis. Motus Peristaltici seu Lumbricis visibiles exemplum videlicet in HELMONTIO Tract. de Plac. §. 48. Ab hac Chyli in Intestinis perfectione, & Chymi nutritivi à Chylis faculentis separatione, maxime Vita, vel sana vel ægra, dependet post legemque nempe stomachi digestio: item: alia enim, si nihil separatur utilis ab inutili, stricte corpus suo nutrimento, si vero vitiosè separatur, ita ut necesse Excrementa Chyli permixta, & ita subintrent Mulum Sanguinem, nil aliud, quam ingens hujus Cachexia, vel vitiosissimus sanguinis status, expellendus venit. Certe multum in recessu habet status vel naturalis vel præternaturalis Sacri Fellici & Pancreatici, & ab his vel legitime vel vitiosa Chyli perfectio, & ab eorum involuntario naturalis vel præternaturalis facta fermentatio, ita ut dispositivè & excitativè Morbos quoscunque sine concerta horum Succorum vita, vinitatem plus minus stomachi Digestionem præsupponentes; Ita enim fundumque consistit in Crassi Sanguinis.

In hoc certe puncto, imprimis ex vicio horum duorum Succorum in Duodeno, & ibidem blandè oborta Effervescencia, Chyli secretionem, & sic poro, maximam partem Morborum, in specie Chroniconum, & omnia in Intestinis divisa Symptomata, originem ducere, quamplurimi Medici hærent, quos inter præcipuus est SYLVIVS, qui cum magno facie applausu suo tempore Triumphantem hunc statum appellaret, nempe ex Bile Flava, & Succo Pancreatico, & demum ex Pituita, composita partem ex Saliva continuè depurata, partem ex reliquis Chyli in Stomacho digesti, & per Intestina transcolati: adeo, ut ex Stomacho, Digestivè viticiata, in specie Cruditate acida, & ex vitiosa constitutione horum duorum Succorum tantummodo omnes Morbi

Chronici originem suam ordinariè habeant.

Nam hæc tria, si rectè se habeant, blandam ac temperatam in Intestinis excitant Effervescenciam, si vero vitiantur, tunc vitiosè separatur à Facibus alvinis Chylus qui ab eorum vicio, imprimis à Bile, inquinatus & depravatus, similiter Mulum Sanguinem, & tandem totum corpus inficit & inquinat, unde varia mala tunc Abdomen affligunt, tunc succedunt in totum corpus redundante: hoc enim in loco non tantummodo radicem parasyronum Ferbrum interstitium, sed præterea Colicæ, Diarrhææ, Mali Hypochondriaci, Suffocationis sic dicitur Uterinæ, & similia quamplurimum, statuit. Nam hi Sacci permixti, per necessitatem Naturæ inevitabilem Effervescenciam inducunt, ex eo, quoniam immixti sunt sal volatile, quale est in Bile, & acidum, quale est in Succo Pancreatico, concurrant sine Effervescencia: quæ tamen his Succis legitime constitutis, est blanda & temperata; his vero Succis vitiatiss, eadem est vehemens & impetiosa, aut inter se mutuo, aut etiam cum Chylo, imprimis si hic nimis acidus, nec rite volatilissimus fuerit, oritur in Hypochondriaci, contingit: hinc scilicet est, quod tunc Hypochondriaci sæpe sub Hypochondrio dextro, ubi semper hi Sacci inferuntur in Duodenum, patiuntur varia Symptomata Abdominis, nunc Phlogosæ & Ardores, ex Bile præcipuis nimis copiosa & nimis oleosa, quod verò per Fermentationem talem vitiosam in Pituita ab acido vitioso factam consurgunt Flatus, Rugitus, Murrura, Ructus, Borborygmi, Diffusiones, & similia quamplurima Abdominis symptomata, qualia, v. g. in Hypochondriaci sæpius observantur. Imò Cachexia, licet cupiscuntur species, si non ex stomacho, quod rarissimè, ut plurimum ex vitiatiss his duobus Sacris, vitiosum cum Chylo Effervescenciam, & præternaturalem Facum separationem constituentibus, radicaliter oriuntur: dum v. g. in iracundis, in terribis, &c. varia Abdominis Symptomata, Dolores, Æstusiones, Diarrhææ & similia Symptomata contingere solent, oriri hæc ipsa videntur ex vitiosa Effervescencia horum duorum Succorum, per Animi motus, indeque etiam sanguinis vitiosam Fermentationem, præternaturaliter constitutam, & vitiosè ex suis statibus dejectorum.

CAUSÆ, ET CURA.

Causa verò, quæ Chyli hanc perfectionem in Intestinis, & debitam à Faculentis separationem depravat, est vel ipse Chylus vitiosè in Stomacho genitus, vel est vitium facis Fellici, aut Pancreatici, vel utroqueque, vel saltem alterius vitiosiorum: quibus subinde accedit etiam suo modo Mucus ille pituitosus, Intestinalium parietes naturaliter alias oblinens.

In Chylo ipso est, si hic depravatus digestus, & quidem pro ratione vitæ generis indolens, scilicet ubi ut plurimum laboramus Cruditate acida; exinde enim & Mucus vitiosus in Intestinis à toto corpore generatur, qui ineptos est pro suspicienda Fermentatione.

Secundum vitium est in Bile, epistatque sale volatili oleo, quod non rite se habens, non rite transmutat Chylum in salum tertium, nec Facies separatur.

Primaria autem Bili vitia sunt.

1. Quando abundat, Chylus cum illa dilutus fit nimis o-Joleus, & tunc expurganda est.
2. Quando eadem nimis arida & salina est: tunc vel Acidis blandis, v. g. Spiritu Vitrioli, Natri, & Salis dulcibus, aut succu acidis Vegetabilium, Citri, R-hium &c. precipitanda & corrigenda & vel Oleosis volatilibus obtundenda: Acids enim dulcificata conjungantur cum Bile, & illam temperant.
3. Quando eadem est oleosa nimis & pinguis, ratione cuius obscuritur acrimonia salina maxime necessaria, & tunc Salibus volatilibus, aut actioribus aut aromaticis, accenda.
4. Quando deficit, vel simpliciter in Folliculo Fellico, vel quando non deferatur ad Intestina ob Mucum orificii, enusque oppilationem à Calculo, (deficiente Bile deficit secretio Facum,) hoc iussu est, Spiritibus aromaticis volatilibus salinis oleosis, v. g. Spiritu Salis Ammoniaci, Cornu Cervi, Effluentia Abinthii, Centaurii minoris &c. est similiter restitueranda.

Lympha Pancreatica peccat:

1. Quando abundat, & tunc evacuanda.
2. Quando, quod frequenter accidit, est nimis acida, aut nimis aspera (ratione cuius austeritatis perstinetque Alvi obstruções, Dolores Intestinalium torquentur,

res, & suffocationes Uterine oriuntur) similis xpiolo sapore impragnata, tunc Alcala; tam fixa, ut Sal Centuarii minoris, Abinthil, Sal Tartari; quim volatilis, ut spiritus Salis Ammoniaci, Sal volatile Uripaz, Cornu Cervi &c. acidium istud absorbendo; ita omnia Terrea, ut Creta, Corallia; Lapilli Cancrorum, & Metallica Martialis, Antimoonium diaphoreticam, &c. absorbendo; vel Aromaticis seu Volatilibus oleosis, v. g. Callicoreum, Galanga, Zedoaria; Olea aromatica destillata Macis, Caryophyllorum, spiritus Vini, & similia, blandè obtundendo, eam corrigent.

3. Quando deficiat: & tunc blandè Acida subetilla, aut spirituscula, qualia Acida vegetabilis, spiritus Mineralis dulcificati, ut spiritus Nitri dulcis, Succus Cydoniorum &c. speciatim alimentosa, Vioum & Aetum, conducunt.

Verùm cum sepius tam complicata symptomatum sit syndrome, & etiam tam singularia horum faccorum vitia & corruptiones, ut vig artificiosa conjectura Medicus cognoscere possit, quodnam primarium vitium; Ob id talia, quæ omni genere hos succos vitiosos, eorumque vitiosas Fermentaciones corrigere valent, & quæ uniiversaliter ferè horum vitia corrigunt, in promptu esse debent: qualia sunt Salia temperata, Arcanum duplicatum Myrsellæ, spiritus Carmineatus, item Acida volatilibus permixta, spiritus Aetolicus, seu spiritus Nitri dulcis, dupli semper triplo spiritus Aquis panctis, & in specie Opiata. Nam hæc Opiata qualescunque vitiosas Effervescencias ac puternaturalem faccorum statum, scilicet sibi sunt ac tollunt, imprimis si appropriatis permixta fuerint. Imprimis conducunt hęc Mixturæ ad imitationem SYLVII conscripse: a. g.

℞. Aq. Cheridifol.

Menth.

Carminativ. an. ʒi.

Cinnamon. ʒvi.

Aet. rosæ. vel ʒvi. vel Aet. destill. ʒi.

Capill. Cæur. præp. ʒi.

Antimonii diaphor. ʒi.

Laad. opiat. gr. iii.

Syr. Scalyorh. ʒvi. ʒvi. vel ʒvi.

M. S.

Mixtura benè circumagitanda,

Vel

℞. Aq. Card. bened.

Indiv.

Menth. an. ʒi.

Aet. destill. ʒvi.

Spiritus Nitri dulc. ʒi.

Lapill. Cæur. præp. ʒi.

Antimonii diaphor. gr. xv.

Syr. Cort. Aetæst. ʒi. vel ʒvi.

M. D. S.

Mixtura benè circumagitanda,

Ufuspetur cochleatim.

℞. Aq. Pæpar.

Hyssop.

Menth. an. ʒi.

Mix. simpl. ʒi.

Laad. opiat. gr. iii.

Syr. Scalyorh. ʒvi.

M. pro aliquot doſib. S.

Mixtura benè circumagitanda,

Vel

℞. Aq. Menth.

Auriferorh. Darnet. an. ʒi. ʒi.

Tinct. Benzad. ʒi.

Lapill. Cæur. præp. ʒi.

Antimonii diaphor. gr. xv.

Laad. opiat. gr. iv.

Syr. Cæulor.

Syr. acutif. Chlorin. ʒi.

M. S.

Mixtura benè circumagitanda.

Hæc Mixtura conveniunt in dubio statim, quando nescimus, quinam Succorum peccet (B).

Mixtus denique Mixturæ peccat:

1. Nimia copia; tunc evacuandus per Colocynthidem

Imprimis.

2. Nimia crassitas & visciditas; & tunc Incidendus per Salia, tam salia, Tartarum vitriolatum, &c. quæ eundem abstergent, quim Alcala; item attenuandus & resolvendus per Salina volatilia aromatica, in specie per Gummatia.

3. Quando deficiat; & tunc augmentandus per Alimenta viscidâ, aliisquidâ assumpta.

Hæc sunt primaria Humorum in hoc loco peccata, quæ data opera corrigenda, ne exinde mala oriuntur plurima; his enim causis adio Bilis impeditur, Chylus vitiosè diluitur, & Facum separatim impeditur sensibilibus. Ex hisce duobus, nempe ex vitio Chyli sub Digestione prima, & ex vitia eundem perfectione sub Digestione secunda in Inestino Duodeno, emergit semper quo tantum omnium Morborum, & amois Cacochymia, exceptis nempe Morbis à Contagio, & in, quæ dependent à parentum Chacochie Hereditario. Alias ex his Functionibus læsæ primariè omnes Morbi Chronici, qui ordinari Obstructionibus Hepatis, Lienis aut Mesenterii, originaliter adscribuntur; secundariè Acuti, oriuntur, sive enim peccent conjunctim sive separatim, necessariè exinde vitiantur Cræsis sanguinis, unde oritur Cacochymia totius corporis, adeoque effluſcant varii Morbi & symptomata: non locis ac plura. Mulierum circa Menses vitia radicem primam circa hæc partes figunt. Unde, si quæ Obstructiones, Tumores, aut similia mala viscerum Abdominis in Chronicis Morbis subinde observantur, Producta potissimum morboſa asserenda sunt.

Hæc lo genere præmonere volui secundum Modernorum hypothefin, propter, quia dabatur occasio, ut horum subinde mentionem inijciam: Sufficit hic, quod obiter insinuo. SYLVIVS, quond Theoriam, in Diff. Medici, quæ benè applicabilis ad Praxin; quond Praxin vero, in de 5YLVIUM videtur 1. 1. præp. cap. 10. & 11. quæ inſar omni um. Nemo usquam hoc negotium tanto studio tradidit, præter SYLVIVM; ejus hypothefis faciliè sunt applicabiles, licet loterdum impingat; tamen titrol cum comendo. Occasionem sumpsit ex HELMONTIO Tr. Scaphis. Digestio qui Tractatus alia est elegans modò corrigunt quidem errores in eo, juxta hodierna experimenta.

S E C T I O IX. DE CONTENTORUM IN INTESTINIS EXPULSIONE LÆSA.

Dicitur est superius, quod Chylus, seu id, quod è stomacho dilabatur, in Intestinis separetur in duas partes; quarum pars alimenticia ulterius promoveatur intra corpus per Vasa Lactea sic dicta; pars verò excrementicia, in Intestinis relicta, post aliqualem moram extra corpus Excrementorum nomine excretaetur.

Expulsio hæc Contentorum in Intestinis læditur tribus modis.

1. Quando diminiuitur, ita ut aut tuta sit, aut ad tempus

ominò nulla: id quod fit in Alvi Retentione, item in tarda Eiectione.

2. Quando augetur in Alvi Plethoris variis, Diarrhæa, Cholera, Lienteria, Celica.

3. Aut denique quando depræatur, ita ut cum dolore, cum Terminibus, aliisve similibus signata contingit symptomata: item quando retinenda excretaentur, dum loco Facum rejicitur sanguis, vel alia, ut Pus, uti fit in Dysenteria, Fluxibus Hemorrhoidalibus, &c.

CA.

(B) In dubio statim, ut liquet V. 1. satis erit vel nulla, vel ex remedia exhibere, quæ nil proficiunt, saltem obesse non possunt, quod Strabonem diaphoreticum, spiritum Nitri, Laudanum Opium, & similia parentia medicamenta preparare, ut facit hic A. S. cum fortassis prævalens Succus Pancheriaci acidulus, mixtum erit Aetum destillatum, spiritum Nitri & alia acida remedia; si contemp. Bilis volatilitas excedat, haud opportunitatem erit Antimonium diaphoreticum, Laudanum opium & hujus farina alia.

CAPUT I.

De expulsione Alvi contentorum Diminuta.

ARTICULUS I.

De Alvi Retentione.

CAUSAE.

Quod attinet *Alvi retentionem*, dum parum vel nihil, aut admodum tardè fit Contentorum intestinalium excretio; cuius Causa est vel in ipsi Contentis opellendis, vel in ipsi Intestinis expellendis.

Quod attinet *expellenda Contenta*: hanc ipsa inferunt Retentionem A vi, quando non perveniunt usque ad Intestinum rectum propter deficientem Peristalsin seu Motum peristalticum, ut illud excretionem irritet; cessante enim Stimulo, cessat Alvi excretio. Nam in statu naturali fit necessarius Faecum stimulus, si sub debita consistentia moti ab Intestinis per Motum peristalticum protruduntur usque ad rectum Intestinum, ubi stimulant Alvum, quod solum sensibile nobis: in naturali sua Faeces non sunt urgens, nisi eo perveniant, & ab eis irritantur Intestini Rectum.

Fit autem hoc (1.) propter eorum paucitatem ex Alimentis paucis sumptis; (2.) propter eorum ad Motum peristalticum ineptitudinem; quando enim inepta sunt in motu, fit ut agant in Intestinis, eorumque, imprimis Coli cellulis, fœci maxime & lei, ut non possint protrudi: vid. KERKINGIUS in *Spis. fac. Annot. Obs. 39.*

hæc sunt ad motum Contenta, tribus ex occasionibus: 1. propter eorum expellendam & induratum, v. g. ex putredine Potus, in eis qui parit vitiis, in Febribus ardentibus post nimis sudores, post gravium corporis motum, &c. Adhuc etiam quidam duntaxat & auctera similes causas nimis iudicant, ut panis crassus & spiritus, quæ hylæ astringentia causa propter visciditatem & tenuitatem suam non raro solent duriores dare Faeces, indeque etiam Alvi peristalticam obstruunt: vid. MOEBIUS *De fist. pag. 479.* Sic res compta est de Melipsis Alvi adstrictione cuticulari, in ut etiam Epilepsia aliquando supervenerit; & penam hoc facit eorum Lapilli, sive Ossa; hinc vulgo *fructus Intestini Germ. der Klammern.* Item Ova ad duritiem colli similes insigniter solent Alvi adstringere: Exemplum habet CORNARIUS in *solo Capill. Conf. a. de quodam*, qui ex esu quatuor Ovorum ad duritiem coherum jejuno-luncho, insignem Alvi adstrictionem passus fuit, ita ut post aliquot dies in Faecibus Alvi, per medicamentum laxativa cuncta, adhuc integra eorum fructu vitelli & albuminis Ovorum apparuerint: Item Fructus nonnulli horæ cum pellicula truci obdoli & deglutiti, quales sunt Uvae crispæ. *Ger. de str. al. hylæ contentum Uvae Vitæ, Germ. die Weinbeeren*, si scilicet comederunt unicum pelliculis: nam hæc pelliculae admodum nudauntur Stomacho in digestionem, quin crude & indigeste dissolvuntur ex Stomacho insigniter acido; nam dum coarctantur cum reliquis contentis in Intestino Colo, fit ut exinde locustentur, & in Intestini Contenta, ac hinc inde in globos qui coguntur, & premaxillima Alvi obstruunt ex talium pellicularum effusio nimis sequitur. Sic ab eis immoderato Nucum Castaneorum conspersionem Alvi obstruunt in mare lactente & infansulo lacte observat TIMÆUS in *Guidel. lib. 1. Cap. 15. p. 215.* Item Cerasa, & imprimis eorum Nuclei integri devorati: vid. HELMONTIUS *Tr. fecund. Digest. KERKINGIUS Obs. 6.* SCHENKIIUS *Obs. 1. p. 3. sub Tit. de Excretionibus*; ubi in Cive Trevisensi observat Johanne Thomsen HILDESII in *Per tredecim annos adstrictionem alvi eo numero Cerasa cum nucleis comesta qui nucleoli post id tempus rursus Alvum subierunt.* Item Vita sedentaria et plenum duriores reddit Faeces propter deficientem in motu excretionem, cum Intestina nimis agitentur & commoveantur: hinc inde subsistunt & difficulter deroduntur in Intestini Rectum. Quies & somnus nimis multa etiam possunt de quibus vid. HOECHSTEDTERUS *De med. a. Cap. 1. p. m. 394.* hæc utriusque Studii, Scribæ, & Virgines petri, & Sartorum famuli, Sutorumque (de ultimis tamen, tempore Sutorum famulis, res non absolute semper veritas est) pierumque eam largior potius vitiis hoc impedit: hoc malo laborant. In Quæte enim & Somno languidior stercetur respiratio, non quam tardior in Intestinis motus unde Scybala sensim sensimque magis exsiccantur, inde obstruuntur Quæte & Somni succi acidi aucteri adaugentur, unde etiam nonnulla hæc facientia sub Tit. *Anorexia.*

Facit hæc etiam II. Faecum alvinarum nimia visciditas & glutinosa, peritaciatis patietibus Intestinarum adherens, ratione cuius subinde impeditur est, quod minus Faeces possunt excreti; unde II, qui capio utantur viscidis Alimentis, sive qui eadem in Pituitam excrementariam, sive Mucum viscosum ex transmutata digestionem, transmutant, solent esse obnoxii Alvi adstrictioni: aut qui Mucum viscidum vel acido vel auctero abundant, in specie Pituita, quam vocant, vitæ, Alvi solent esse obstruorioris; idque ob magis, quo parcius bibunt, at qui parcius moveantur: Faeces enim à Mucos & Pituita simili involutæ & coagulatae in Intestinis hærent, ut hæc non sentiant Stimulum Faecum. Unde interdum Hypochondriaci, de quibus postmodum, obstruuntur Alvi incurant, in talibus enim deficientem motu, minus quasi concussis Intestinis, Faeces retentæ prædetentem reocclusionem consensum acquirunt, indeque Alvum clausam patiuntur.

Præterea III. Faeces *condensata & coagulata* Alvi obstruuntur inducunt; idque ex vitiis Acidis, vel Stomachi, vel pancreatici in Intestinis prædominantia, imprimis si simul austerius plus minus fuerit iste scor. Notum enim est, quod Bili & Succus pancreaticus, qui separant cremorem nutritionis ab excrementis, ita simul excrementis certam consistentiam tribuunt, secundum quam nunc magis nunc minus sunt fluxiles. Unde ut abundans Alkali oleum Bili diluit Faeces & fluxiles facit, ita Acidum vel Stomachi vel Pancreatici vitiosum, aut nimium, aut aucterum, Faeces illas nimis coagulat, hæc & indurata, quia impeditur adstricta Bili oleosa, facientis ad molitiem Faecum. Hinc plures Hypochondriaci, & quod idem est, Mulieres Hypericæ, laborant ordinario Alvi obstruunt, & Alvi excreta sunt ferè nigricantia propter austeritatem animam Succus pancreatici, cuius austeritate induratur Faeces, diutius in Intestinis subsistunt, hæc etiam in quadam Idæi specie solent aut omnino, aut maxima ex parte, induratur & condensatur esse Faeces; hinc Alvum signis & cardis propter Bili absentiam (in isto scilicet Idæo, ubi denegatur exalutis Bili in Intestinis) & consequenter Acidis in Intestinis abundantiam. Et hoc sunt Causæ, propter quas Alvum vitiis Faecum plus minus suppositur: superius Causæ, quando ulcerata vitiis *offensum Intestinum* non sufficienter propelluntur suppositur Faeces.

Vitiis autem horum plus minus tardior est Alvus & obstruunt variis ex causis: (1.) Quando eadem non transmutantur Faeces vel sunt inepta ad transmutationem, vel non sufficiunt propellunt: *inepta ea sunt ad transmutationem*, si ea obstruunt, aut infarsita, aut nimis angusta, v. g. in Inflammatione eorum; unde induratur, & quasi nimis coalescent: ac ordinario Alvum suppositur in Tumoribus hærentibus intra Velicam urinariam & Intestinum Rectum, vel inter Vulturam & Anum in Mulieribus: Exemplum vid. apud TULPIUM lib. 3. *cap. 10.* Huc pertinet Anas imperforata; de qua vid. FABRICIUS HILDANUS *p. 2. Obs. 3.* BENIVENIUS & PARÆUS & JOB van MEEREN *a. 21. pag. 160.* Affectus autem hic parum attenditur; perforato enim Ano cessat symptoma. Item in Gangræna, in qua pelles eorum contrahuntur, unde malum est desperatum: Exemplum habet BARTHOLINUS *Cons. 6. Hist. 31.* de coarctura lici ex Inflammatione Intestini, cumque subsequente Gangræna, unde obstruuntur Alvus secuta, & BARBETTE in *sua Præci l. 4. c. 7. p. 198. Edit. parva Drexleræ*, lethalem Alvi obstruuntur notat ex Gangræna Coli, ubi recto annectitur. Item, quando coalescent post eorum Evulserationem, aut post Dyenteriam; nam post Dyenteriam nonnumquam in hinc coalescent, sub sanatione invicem consolidantur Intestina, ut exinde non raro postmodum lethalis Alvi suppositio sequatur: Conf. JOHANNES RHODIUS *Cons. 2. Obs. 77.* MARCELLUS DONATUS *cap. 10. l. 4. pag. 161.* & M. A. N. *Cons. 2. pag. 140.* ubi Alvus suppositio herbat fuit ex Ulcere Intestini Recti. Et in passione liliacæ similis accedit Alvi obstruunt. Pariter Excrementa carnea in Intestini quodam onata Alvi obstruunt inferi: Conf. M. A. N. *Cons. 6. pag. 137.* & RHODIUS *Cons. 2. Obs. 81.*

Præter hanc angustationem, Intestini (2.) non *permoveantur* Faeces, quando deficient in suo Motu peristaltico, vel affectionem vel Paralyticam, vel Convulsivam. Quoad priorem quidem, dum resolute fibræ Motui peristaltico sunt impædæ & Intestinis sunt infensia, etiam cessat Intestinorum Motus peristalticus, ut in Suppore Ani; nam sensu abolito Intestinorum, etiam tunc temporis aut parum aut nihil exercitur & expellitur; hinc non raro frustrâ Apoplecticis Stimulatur Alvus per Clystera, Intestinis interdu Paralyti affectis & insensibilibus redditur. Quoad posteriorem, oritur Intestinorum affectio Convulsiva, quando ex irritatis Intestinalibus sequitur peritaci fibrarum contractura,

vel quando undecumque ipsa fibra Intestinelorum in unum
tervere loco spatio contrahit non promovet Concreta, ob
impedimentum peristalticorum eorum Motum: id quod fit v. g. in
omni Colica cognata, in Colica febricitante, & similibus
Intestinelorum doloribus, ubi fibrae Intestinelorum ratione dolo-
ris irritatae, & spasmum plus minus contrahunt, in loco
spasmo contracto, Facies haerent, unde Alvi peritissimè
suppressa esse solet, Unde & sedè tunc singulae actiones pro-
spiciunt Purgatio, lenioribus magis proficit: cum alia ir-
ritando, in acrimonia malum exasperat, & haec autem emol-
liendo, Intestinelorum sensum quasi demulcendo, magis pro-
ficiunt. Sic etiam in Nephritide pariter obstitit alii Alvi
ordinarii, propter contentum eam fibris Intestinelorum spasmum
convulsis, unde & tormina tunc maxime sunt. Frequens est Gra-
vidis, parvi vicini, Alvi distictio, ob Uterum & grandio-
rem Fetum, qui Intestinum Rectum comprimit.

DIAGNOSIS.

Quod attinet Signa Diagnostica, sunt haec: si aegri morbo de
non quotidie, sed interdum ad aliquot dies, interdum etiam
septimanas, non efficiant Faeces: vid. Olf. PANAROLLI
Pars. 1. §. 2. ubi observat aliquem, qui interdum in 15. diebus
interdum ad 30. interdum post 7. menses demum solutus
est exonerare Alvum, sed rarum & infrequens hoc est.

Symptomata autem huius Obstructionis sunt varia: Dolores
Abdominis gravativi, compressivi, nunc vagi, lancinantes;
supervenit Nausea, Vomitus interdum, Capitis sym-
ptomata, inquietudo, jactitatio corporis, Vigilie, Vertigo,
& Cephalalgia. Doceat haec, quid sit Alvi obstructio,

PROGNOSIS.

Alvi suppressio malum est frequens & quidem pro cir-
cumstantiarum conditione nunc plus nunc minus periculosa.
Peritior si fuerit, subinde est lethale malum, nunc im-
mediatè & per se, nunc mediatè, insequente nempe lito:
de quo postmodum. Deinde si non semper inter lethum, ni-
hilominus pro experientiam apertum patet, quod Alvi
peritioris causa labioide gravis inter symptomata, interdum
Animi deliquia: item quod animum in ipsa excretionis
Alvi supervenient ex contentu Naturae Haemorrhagiae usu-
rim: Evidentius tale habet SALMUTH c. 3. §. 9. 10. de Alvi
nomini obstructio, ita ut in excretionis Scybalorum san-
guis per natus proficiat. Faeces in Alvi nomini obstructio in In-
testino Colo conservatae & coagulatae interdum decipiunt
Medicos, ut tales aegros habeant pro Splenicis. Nam vol-
garis est consuetudo, ut omnia symptomata in latere sinistro
sive hypochondrio finitur, adscribantur talis spleni: unde
eum in latere sinistro Coloni sit angulus, & propterea inter-
pretor deorum versus Rectum, hinc lapsi sit, ut ibidem
locum habentia Scybala, talia inferatè pronuntia, quae
vixit splenicis attribuantur, & non raro pro splenicis
habentur: Exemplum talis pro splenicis habui habet SAL-
MUTH Crat. 1. Olf. 24. de c. 2. Olf. 98. de quodam, in quo
per animum anam & sensu, Scybala retenta dolore remissa
& tamen hypochondrii finitur insistent, ut inde propo-
sit talia symptomata pro splenicis fuerit habitus, postmo-
dum tamen pauci emolliensbus adhibitis curatus fuit: &
eventus detexit, quod sanctum ab indurata Scybalis ortum
erant visum afflicto. Conf. item SILVIUS l. 1. Prae-
cap. 24. §. 37. p. 168. PANAROLLI c. 3. Olf. 1. de quodam
reverti, qui non sinitit 10. et 20. dies incolum servatus
est, sed conculsi, & eque. Alvum ita excrevit in fuisse, ut no-
que ad 3. menses fuisse excrevit: forsitan terrore dicitur
non Naturae ut convulsi est in fanguine: Hic ille: Imò in ca-
lidiore purgata propinata, quia fuit effectus, egrum
& Medico fuit: Spiritus enim exibat, ut in talibus per
Purgatio evacuat corporis liquida & tenora, ipsi cras-
sibus & viscidioribus Faecibus ad Mucos adhuc remanentes
habui, uti jam olim hoc observavit SENNERIUS in Praef. l. 1.
ubi de Alvi retentione pag. 302. & 303. Hic quoque SEN-
NERIUS de Colica observat Motum videlicet rejectum ad
inter Intestini quae evacuant: sicut & LIPSIUS ex vita se-
dentia, metacum Alvi incerta obstructioem, quam
ereb huiusmodi spiritus Visceris suffulgit, facta Alvi solutione
scybala aut portis Mucus prodit in longum protractus ad us
ipse LIPSIUS una cum excrementis lachrima se redditurum
potuit. Tandem omnis Alvi obstructio semper solet augere
Stomachi & Capitis pathemata, & nisi in huius Alvi, in
deterius labori sit. Unde omnibus praenotandis Prae-
dictis, in Vulneribus Capitis, in Cephalalgia, in Melancholia,
& quibuscumque Capitis affectionibus, semper opem danda

est, ut sit libera Alvi & aperta: nam quidem propter Vapo-
res ascitendentes, ita propter contentum, quod mediastibus
Nervi copiosissimi, omnia interna viscera, in specie Inte-
stina, habent eum suo principio Cerebra. Quilibet istud mali
Hypochondriaci pathemata ab Alvo obstruenda exacerbantur.

Obstructio Alvi cognoscitur in Homines temperosis etia
laxissimè produci Epilepsiam, in specie autem tam quae
dependet ex vitio excrementorum: pro epilepsione enim
irritatur eadem Intestina, & ob contentum totum syste-
ma nervosum convellitur.

Alvi obstructio cum passionè illa est lethalis, si non
permittit.

Obstructio Alvi cum passionè Colica morbum extremè
exasperat.

Pregnantium obstructio contrahitur, addit Partum val-
de difficilem.

Obstructio Alvi ex Paralyti Intestinelorum ut plurimum est
lethalis.

C U R A.

Quod attinet Curatio: lo ante omnia consideranda est
Causa morbi, praesens, quae remota, & quomodo symptoma
immediatè solvitur. Unde

1. *Spasmi contractum ratione conveniunt ea, quae emol-
liunt, earumque visciditatem & austeritatem corri-
piunt, adeoque fluida & mobilia excrementa reddunt.*
2. *Conveniunt ratione diarrhoeae, quae vel eorum angus-
tiam tollunt, vel eadem plus minus sensibilem velli-
cam, ac blandè stimulant: uti sunt acriscula plus
minus amaricantia & irritantia: vel denique irrita-
tionem in eis, & inde natam eorum spasmum sol-
vant, ut leniunt Anodyna;*

Ea, quae emolliunt, sunt talia, quae & dissilia faciant, & vias
laxent, ut Aquea, Oleosa, Mucilaginea, Dulcia, & hinc
Guaiaca, & eadem similia de leniter irritant, sunt A-
crida, tam salina quam specifica Purgantia, & horum inter-
tentè Amara Facibus enim fluidibus, & Intestina leni-
ter irritant, eorum Motu peristaltico committit, ejiciuntur
Contenta. Quae irritantem uti spasmum Intestinelorum finitur,
sunt Anodyna seu Lenientia, Mucilaginea & temperata,
Oleosa, hinc Narcotica & Opiata: Quae diarrhoeam male
vel curabiles, ut Inflammationem, Exacerbationem vel in-
curabiles, ut Coarctationem &c. leniunt, ad effectum ratione patent.
Quae dissilia Indicationem indicant Materia Medica, im-
pedita excretionem sunt Oleum Amygdalarum dulcium recentem
necesse expellunt ad Bilis, vel ut, quod optime & blandè
Alvum subducit, siue aliamur per se, siue in Cerevisia
calida: vel Juscula pinguis: Vel

3. *Olf. Salmuth. de c. 2. exp. 3. §. 3.
Syr. Refar. fatar. §. 1.
M. pro Haustu.*

Hic medicamina ex Jalappa, ex Folio Sennae, & ex Scam-
monio proficunt: Item Aethiops, quibus necesse, non esse
adhibenda in frequenti Alvi obstructione, ut, & Rhubarba-
rum: quia talia medicamina praeter virotem laxativam in
se continent sublequent aliquam adhaerentiam, nisi hanc
corrigantur per adjuvna Antimonialia rite parata, & in
casu nostro in Clysteribus usurpanda. Sal laxamentum
Visi isturatum cum spiritibus salis (venerat alius sal sacrum)
blandè etiam Alvum subducit irritando nervos. Item con-
veniente insignitur Ora horribili cum Bistemo assumpta, ex-
que quod magis fortis, eo magis ipsi plus moveant Alvum,
emolliendo neque ad coarctationem corrigendo: de quo prolata
Observatio in HOFERII Heraclei Adversis, quod scilicet Ora
horribili assumpta Alvum fluidum, & parvam quod Diar-
hoeam, in uso alterius sublequent produciunt: vid. etiam
BARTHOLOINUS c. 6. exp. 65. & BRASAVOLA de
Purgantibus c. 2. Item copiosius etiam Potus promovendo
contenta Alvum fluidum reddit, quoniam aut indurata
aut exaricata Faeces diluit: vid. BARTHOLOINUS Crat. 3.
Hyl. 40. ubi refert peritiorum Alvi obstructionem largo
Vini haustu curatam: id quod in specio aut Hypochondriaci
per laboriosis necessarium est, item Melioribus, ut ed
promptus erant Faeces. Porro huiusmodi alitantes seu
ordinarius alimentum, unum medicatum, quod medicatio im-
primis fit, quando Porcietia alterantur resolutibus em-
molliensibus & laxativis, in specio cum Psyllis, quae
sunt egregium remedium ad blandè laxandam Alvum, &
nihil aliud, quam nullum conceptatam, temperant in
se, & quod blandam irritant viam obtinent, unde vel Psi-
llis nuda assumpta conveniunt, imprimis Hypochondri-
cis & Scorbaticis, quibus Alvum subducit apertam: nam
Purgatio eis necesse: vel cum Psyllis, earumque pulpe

tenuilium permiscetur Cremoris Tartari, aut Arcani duplicati, c. g.

℞. Pulp. Passul.

Tamarind. an. ℥i.

Cryſtalli Tartari ℥iij.

Pulp. Rad. Jalap. ℥iij.

Scamm. sulphurati ℥i.

Antimoniæ per infer. purg. ℥℥.

Cum f. q. Syr. Raf. folat. l. Eleazarium, D. S.

Eleazarium laxativum.

Somnolus mane & vespertini, pro dosi quantum capiunt duo cupides cultri.

℞. Pulp. Passul. ℥℥.

Arcan. duplici. vel Tartar. vicinat. ℥i.

Extr. Troch. Albod. gr. iij. v. vel ℥.

Cum f. q. Syrop. Pomer. l. Eleazarium, S.

Eleazarium laxativum.

Convenit ergo specibus *Passula laxativa*, quarum varietas descriptiones, uti videbitis in *Dispensatorio*. Fiant ex *Passula* cum *Cremore Tartari* & *Senna*: præscriptio ℥℥. pro dosi, c. g.

℞. Pul. Senna fine ℥iij.

Crem. Tartari ℥iij.

Decoque in Aquam ℥i. ad consumptionem tertias partis.

℞. Decoctum infusum, & infundum

Passul. min. ℥℥.

Decoque ad molliorem, & addo

Syr. Refar. folat. ℥i.

M. D. S.

Passula laxativa.

Cochleate plenius ante cenam. Vel

℞. Pul. Senna fine ℥iij.

Cinnam. ℥i.

Kingiber. an. ℥iij.

Aqua Endiv.

Vini opt. generat. an. ℥iij.

Infunde per noctem & mane bulliant ad consumptionem tertias partis: Colaturæ addo

Prun. emul. Ungar. N. ℥.

Decoque cum

Sacchari ℥i.

ad consistentiam Syrupi: addo

Aqua Cinnam. ℥℥.

Syr. Refar. fol. ℥i.

D. S.

Pruna laxativa.

De Prunis his *Laxativa* ante cenam assumat patiens tres vel quatuor, juxta *THONERUM* *Obs. 2. l. 2.* Vinum passulatum similiter egregium est delicatulis, quod Alvim adstrictum blandè educit: item *Prunus passulatum laxativum* *TBAELII* in *Epist. l. 3. Epist. 16. p. 522.* ad cuius imitationem *MIBOMIUS* sequenti modo prescribit:

℞. Passul. min. ℥.

Pul. Senna fine ℥iij.

Cinnam. ℥i.

Incisus & contusus infunde *℞iij.* Vin per horas 24. de Colatura propinat ante cenam bonum haustum.

℞e sæpè ad hujus imitationem præscribo *Decoctum Passulorum* cum *Senna*, quod ex *Dissert. de Dolore Hypochondriaco* notum est; vidi exregios effectus: c. g.

℞. Pul. min. contus. ℥iij.

Conquassentur in mortario, ut fiat pasta, coque in

Aq. comm. ℞iij.

Colaturæ ferventi *℞iij.* ad *℞iij.* infunde

Pul. Senna fine ℥iij.

℞iij. Pulv. p. iij. vel Senn. Anis. ℥i.

Stent in loco calido per noctem: mane *℞.* Colaturæ.

D. S.

Potio laxativa.

Dequ: capiat haustum pro lubitu mane, præprimis in *Hypochondriacis*, *Hystericis*, affectibus *Melancholicis*, & blandè stimulat.

Facit hæc Serum Lactis probe depuratum, quod in *Febribus*, nam *Ardentibus*, & *Malignis*, quàm *Hypochondriacis* & *Scorbaticis* si Alvim habent obstructam, (id quod fit ex Succo pancreatico nimis austero & acido coagulante *Prunis*) ac simul phlogis ac inflammatione laborant, aliquæ in culibus ad Alvim suavitè laxandam conducit. Ratione n.

Tom. II.

(C) Inter *Cathartica salina* severa, & nunc temporis familiaria, reputanda sunt *Magnesia Nitri*; quæ vulgè nomine *Pulveris Cornicis Palmae coccineæ*, atque *Sal Catharticum Anglicum*, seu *Epistemicum dictum*: de quibus *tom. 4. obs. 1.* in *Matéria Medica*, opportunè erit firmo.

trofatis sunt, in alcali volatili oleo fundatæ, temperatè egregiè Succo pancreatico vitulorum acidum: plûs miola austerum, ac demulcet scrimoniam fævis scorbutici, simulque emolliet Fæces, sive solitariè usurpentur, sive, si fuerit debilis, cum Syropo Rosarum solutivè adhibeatur, sive infusioe & ebullitione aliquali *Tamarindorum* magis gratum & laxativum reddatur, sique potus erit appropriatus in obstructione Alvi *Febrium Ardentium* & *Scorbaticorum*.

Nota aliàs quoque sunt *Decocta* vel *Juicula Pulverum*, imprimis in quibus Herbes Emollientes, v. g. *Folia Malvæ*, *Herba Parietaria*, *Violaria*, *Mercurialis* & similia ebullierint: quolia *Decocta* successivè usurpata similiter blandè Alvim subducunt: vid. *Decoctum Emollientis* ac *Radice Altheæ* *HORSTII* *Obs. p. 372.* *M. A. N. C. Ann. 3. p. 372.* *BARBETTE*, & *HARTMANNUS*: loco quorum etiam recipi possent.

℞. Rad. Altheæ ℥i. ad ℥iij.

Herb. Malvæ vel Bractea arisa. M. l.

Passul. min. ℥iij.

Coq. in l. q. Aqua:

Colatura ℞iij. vel ℞iij. addo

Pul. Senna fine ℥iij. ℞iij. vel ℥℥.

Cremor Tartari ℥iij.

Stent per noctem, blandè bulliant ad diffusum, Tartari, mane iterum colesur: Colaturæ addo

Syrup. de Spina cervin. ℥i. pro lubita, q. l.

Potio Laxativa.

Est emollientis blandum, successivè Alvim stimulat, item *Decoctum* de *Ficibus Mallicentibus*, seu quibuscumque aliis, similiter Alvim subducit, imprimis si decoquantur in Porto ordinaris, seu *Decocto Hordei simplicis*. Fiant etiam *Conservæ Laxativæ Violarum* & *Rosarum* elegantes: quando loco *Sacchari* his additur *Manna electa Calabre*, & *Flores* recentes *Violarum* & *Rosarum* cum hac conjunguntur in *Conservam*, quæ mista cum *Pulpa Passularum* & tantillo *Cremoris Tartari*, blandissimè & suavitè Alvim subducunt. Quod si duriores Fæces, aut copiosus Mucus, aut viscidus, aut *Picea vitrea Intestina* incrustaverit, & Alvi obstructio fuerit fomes, nil melius est *Gummæ Ammoniacæ* & *Galbano*, in vehiculo appropriato dissoluta, sive solo, sive stimulo laxativo acuto, v. g.

℞. Ag. Mentha ℥i.

Gumm. Ammon. Acet. sol. ℥i.

Syr. Refar. fol. ℥i.

M. pro duob. dosibus, S.

Potiuscula Laxativa ad 2. vices.

Hæc Potio in duas partes divisa fit; mirabiliter dissolvit Mucum & evacuat; si verò contumacior fit Alvus, acuetur hæc Potio stimulantius. Ubi ergo Mucus tenax, in iis præscribo talem Formulam.

℞. Ag. Mentha ℥i. vel ℥iij.

Cinnam. ℥i.

Gumm. Ammon. Acet. sol. gr. xv. vel ℥i. usque ℥℥.

Tartari vitriol. gr. vj. viij. ℥i. ad gr. xv.

Scamm. sulphurati. gr. iij. vel iij.

vel hujus & *Extr. Troch. Albod. an. gr. i.*

Syr. de Pomis, vel Refar. folat. ℥℥. vel ℥i.

M. S.

Potiuscula Laxativa.

Insolenter Mucum viscidum educit. In mollioribus subjectis *Gummæ Ammoniacæ* sufficit.

Tandem *Salina* & *Tartarea* remedia, ut *Cryſtalli* & *Cremor Tartari*, vel solus ad *℞* in *Juiculis* servido, præsertim in quo Herba quædam emollientes prius decocta fuerint, propinatus; vel cum granis duobus *Scammonei sulphurati*. vel *Extracti Trochiscorum Albandal* acuat; item horum loco etiam ipsum *Sal essentielle Tartari* & ad *℞* usurpatum usque ad *℞iij.* in vehiculo calido, vel solum vel dicto modo acuat, aut etiam *Trochiscum Tartari* legitime per *Spiritum Vini* parata pro senibus (C). *Graviores* & contumacioribus in malis ad *Mercurium vivum* potest fieri confusum, ad *℞iij.* vel iij. pro una vice, vel in *Juiculis* carnis pinguiore, vel in Oleo *Amygdalarum dulcium* propinatum: vid. *M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 225. & 325.* Vel alii laudant Vinum, in quo *Mercurius vivus* per mensem in loco tepido fuerit infusus, intercedente crebra agitatione, aut aliquandà ebullierit; quod Vinum, relicto *Mercurio*, non tantum *Lumbros* enecat, sed insigniter Alvim, etiam pertinacissimam, referare dicitur, si ad cochleare unum vel

M. 2

alterum propinquet. In desperatissima Alvi obstru-
tione, irritabilis, mirabile quidem obtinet Aurum fulminans non
adeo exactè edulcoratum, à gr. vj. vel vii. ad x. usque,
cum Extracto Hellebori nigri in Pilulis redactis: nam tales
Pilule ex Auro fulminante cum extremum commendantur
prædium. Conf. RULFINGIUS in *Chym. pag. 339.*

Vel

℞. Syr. Refos. folat. ʒʒ.
Auri fulm. gr. xij.
Trach. Alband. gr. j.
M. S.

Syrupus aperiens pro una vice.

Sanè in adulto Quartanæ à gr. v. Auri fulminantis, cum
Nitro antimoniato ante paroxysmum propinati, effectum
tuavis laxationis observavi. Nitrum antimoniatarum torpida
irritat Intestina, ut facilius fiat excretio, & resper-
tu talis Nitri adjuncti Aurum fulminans mira præstat in hoc
affectu. Quociens itaque ausum est, hoc Aurum fulminans
loco laxativi porrigere, non nimis edulcorandum, ut spors
salutis aliquantisper remaneat: nam quod magis est edulco-
ratum, eo magis est diaphoreticum, vel quod minus edulco-
ratum, eo magis catharticum. Item hoc Aurum fulmi-
nans in affectibus Infantum intestinalibus, in specie flatu-
lentis, cum torminibus constantis, est optimum remedium.
Deinde & hoc singulare est, quod in Adultis facies rugi-
rimo colore inficit, tam Aurum fulminans, quam Auri
cum spiritu salis solutio. Fortior enim Purgancia minus
convenit in peccinaciori & facili Alvi obstru-
tione, no irritando Intestina horum spualis dolorolus & tormina ex-
citando, malum exasperet; unde cautissimè in talibus
casibus tractentur Purgancia, ut præpositio horum, præter-
mition acriorum, usq. Intestina magis contrahant, & Ex-
crementa indurentur, ac ex continuata irritatione dolorolus
egri in morbum illiuc adducantur.

Enteræ quæ applicantur, sunt primariò quidem, uti no-
tum est, *Clysmata*, eoque ex Emollientibus & Lubrifican-
tibus parata, quæ nota sunt omnibus: v. g.

℞. Herb. Altheæ.
Chenemill.
Mell.
Mabazan. Mf. vel Mj.
Rad. Lil. albor. ʒʒ.
Sal. Tartari ʒi ad ʒij.
Coque in *Aqua simpl.* vel *dura bullis caprell.*
Colatura ʒi. addo
Salis Gemm. ʒi.
Ol. Lil. alb.
Mell. refos. an. ʒi. vel ʒʒ.

M. pro Clysmate emolliente in induratis facibus tepl-
dè injiciendo.

D. S.

Clyster Emollientes.

Iniecio Clysmate egres aliquid latet deatæ incubat,
ut feratur usque ad Intestina (D)

Vel

℞. Herb. Melva.
Mell. an. M. ij.
Rad. Altheæ.
Lil. alb. an. ʒʒ.
Coque in *l. q. Aqua simpl.*
Colatura ʒi. addo
Ellebor. Benedict. laxat. ʒi.
Ol. Sem. Lin.
Rapar. an. ʒʒ.
Virid. Ovi n. j.

M. pro Enemate, S.

Clyster Emollientes.

Virtutem irritandi Intestina torpida obtinet quoque Mel
inter Clysteres assumptum, sive simplex sive compositum:
v. g. Mel rutaceum, rosaceum, mercuriale, & ad imita-
tionem Mellis etiam Manna Calabrisa, sicuti enim Apes

ex floribus optimis succum eliciunt, eumque transformant
in Mellis consistentiam, ita & calore Solis ex floribus &
foliis præstantioribus succum in ætrem elevatur sub forma
Rosæ cuiusdam, qui deinceps cum succo transudante incorpo-
ratur, & a frigore coagulatus in foliis arborum reperitur
sub iura Mannæ (E)

℞. Spec. emoll. M. ij.
Flor. Samb. M. j.
Coque in *l. q. Lactis bubuli:*
Colatura ʒi. addo
Mell. Mercurial. ʒij.
Virid. Ovi. num. iij.

Misc. pro Enemate pro *duabus vicibus*, S.

Clyster Emollientes.

Vel sola Clysmata ex Lacte bubulo cum Melle & Saccha-
ro, pro scopo laxativo iniecia, sufficiunt.

Superius dixi: quod interdum conveniant Purgantia in Alvi
obstru-
tione ad eandem imitationem suam, qui decoquant
Purgantia in Jure Viridi, & Colaturam Derocid inflat Enema-
tis injiciunt cum laudabili effectu. Item & ex Nephriticis
de vel simili affectu Alvi obstru-
cta sit, Clysteres Emol-
lientes terebinthinat perquam sunt proficui: item Clysmata
ex solo Oleo expresso Seminis Lini, item ex Oleo Semi-
nis Rapi, sunt admodum expectata: v. g.

℞. Ol. express. Sem. Lin.
Rap. an. ʒi. vel v.

Dia caryoph. Querc. ʒvi. vel ʒi. ad ʒij.

M. pro Clysmate, in alio commutatione egregio, alius
irritis, S.

Clyster Emollientes.

Sanè PRÆVOTIUS Alvi legentium gravem solo Oleo
communi bene maturo, ad lib. j. per Clysterem iniecio lo-
navit: Sic RULANDUS in *Thes. Pract. Caus. a. Oh.* 99. p.
233. exemplum habet Alvi per tres hebdomadas obstru-
ctæ, ita ut nullis neque Clysmatibus neque Suppositoriis
moveri posset, tandem iniecia singulis horis ʒi. Olei Oli-
vapum, Alvi emollita, & multa Syphala reperta fuerunt:
Sic idem RULANDUS C. p. *Caus. 53.* quendam rusticum,
qui similiter ob syphala indurata Alvum habuit obstru-
ctum, curavit per Clystera ex Oleo Seminis Lini ad ʒv. quod in-
jectum omne solum, nunc cum ʒʒ. Trochiscis an Alband-
al, egregiè Alvum obstru-
ctum curavit: v. g.

℞. Ol. Rapar. in quo ʒi. Trochisc. Alband. et alii ʒij.
addo

Virid. Ovi n. j.

Mell. refos. ʒi.

Misc. pro Enemate, S.

Clyster Emollientes.

Ubi autem Emollientia hæc pro solvenda Alvi non suffi-
cerint, his premittis, ad alia quædam paulo Activiora accen-
dendum erit; & quando jam necesse est induratarum Facum,
egregium est sal Gemmæ, quod à ʒʒ. ad ʒi. usque ad ʒij.
vel ʒij. Clysteribus additum, quicunque Syphala indurata
potentissimè resolvit & dissilias facit, nihil namque magis
emollit Fæces duras, ac Intestina ad eorum expulsi-
onem irritat, quam sal Gemmæ. FORESTUS l. i. c. Oh. 5. ex-
emplè in Facibus induratis à ʒi. ad ʒij. cum Decocto Emol-
liente simpliciter usurpavit: Sic LINDA NU S comme-
ndat in obstru-
tione Alvi obstru-
tione, & fac Clyster vel Enema
solu-
modo ex juleico Carnis cum Melle, cui addatur
Sal Gemmæ à ʒʒ. usque ad ʒi.

℞. Herb. Chenem. sum flor. Mij.
Flor. Samb.

Perla. an. M. j.

Coque in *l. q. Aqua simpl.*

Colatura ʒi. addo

Sal. Gemm. ʒi.

Mell. ref. ʒi.

M. pro Enemate, S.

Clyster Emollientes.

Vel

℞.

(D) Hæc Obstru-
ctio est Fabæ. Hi'dani qui Cent. i. 77. arcanate animadvertit, Colon tenuissim. per Coccum exortum, d
dextra Rete ad securi cavum vergens, convulsis, ac sub Ventriculi fundo, progressa ad sinistram lateri, & Lienæ accumbere: nam
ad posterora delatum, ad sinistram Rete descendit, eoque alligari, ibique angustias ex Angustia tendens, per Epom
dus: ʒyros ferri, in Rectum dissolvit Intestinum. Hinc inferi, quod Clysterem iniectionem in dextrum latus descendere debet,
ne in sinistram lateri jacenti tum Rectum Intestinum, tum postrema pars Coli, qua Lienæ, & Renti sinistro atheri, & ʒyros
mole comprimitur: quare eo agerentur sin illovis iniectionis: vin aliovis Coli ʒyros subdit, nec ad ultimum Coli caput atatum,
neque ad Valsulam usque Babuini pertingere poterit, quo sane pertingeret, si in dextrum latus descendere ager.

(E) Cuius como 4. de Manna formam habebimus, videbimus in vera sua, quæ hic A. de Florum & Foliorum sua: in
aerem sub forma rosæ à Solis radiis elevatur, deinde à frigore coagulata, ac denique in Arborum foliis repta, & Manna no-
mine datus, dicit.

℞. Decoct. Emoll. ℞. ad ℞. j.

El. Benedict. lax. ℞. j.

Sal. Comm. ℞. j.

Mell. rosar. ℞. j.

M. pro Ememate, S.
Clyster Emollient.

Vel

℞. Spec. Emoll. M. ℞. j.

Stercor. ovill. ℞. j.

Coque in l. q. Aqua.

Colatura ℞. iiii. adde

Sal. Comm. ℞. j.

Vitell. Ovi. n. j.

Mell. Mariscial. ℞. j.

M. f. Emema, S.

Clyster Emollient.

Ubi Flatus simul adiunt, Clysteribus addi potest

Ol. deßill. Camini.

Carol. an. ℞. j.

Quid si Sal Gemmæ non sociatur, commodissimè in Clysteribus incoquitur, vel Pulpa Colocythidis in sodulo ligatur, vel etiam Trochiscis Albandal, v. g.

℞. Decoct. Perlar. vel Emollient. Mell. Chamem.

& Violar. ℞. iiii. vel ix. io quo ebulliat

Pulpa Colocyth. in sodul. ligat. ℞. adde

Sal. Comm. ℞. ad ℞. j.

El. Benedict. laxat. ℞. j.

M. f. l. a. Clyster, S.

Clyster Stimulans

Vel

℞. Spec. Emoll.

Carmin. an. M. j.

Pulp. Colocyth. in pot. lig. ℞. j.

Coque in Aqua simpliciter

Colatura ℞. iiii. adde

Sal. Comm. ℞. j.

El. Benedict. lax. ℞. j.

M. f. Emema, S.

Clyster Stimulans.

Vel

℞. Herb. Mariscial.

Perlar. an. M. j.

Pulp. Colocyth. in pot. lig. ℞. j.

Coque in l. q. Aqua:

Colatura ℞. iiii. adde

Mell. Mariscial. ℞. j.

M. pro Ememate, S.

Clyster Stimulans.

Vel

℞. Flor. Chamemill.

Mellil.

Violar.

Verbasc. an. M. j.

Pulp. Colocyth. in pot. lig. ℞. j. ad ℞. j.

Scam. Lim. ℞. j.

Coque in Aqua simpliciter

Colatura ℞. iiii. vel ix. adde.

Sal. Comm. ℞. j.

El. Benedict. laxat. ℞. ad ℞. j.

M. f. Emema, S.

Clyster Stimulans.

Additum potest Vitell. Ovi N. j. Sed observetur: quod in his, ubi Acria stimulantia, ut Sal Gemme, Colocythidis &c. ingrediuntur, Oleosa & Mucilaginosa emittenda sunt; Olea enim obtundunt salinam acri moniam, & sic non possunt incidere & simulare. Vel ubi Colocythidis non est sufficiens, tanquam ad ultimum, ad Antistomalia, est configiendum, si scilicet loco Colocythidis, ℞. Croci Metallorum Decoctio superius dicto Colocythidis incoquatur: nam hoc extremum est remedium; cuius vim crebriorem factum videbitis in Obs. RIVERII, qui aliquot habet exempla Decocti in Clysteribus admodum feliciter: Vel, quod magis approbem, Iosifum fiat Croci Metallorum, cupas ℞. j. aut iv. Decocto Emollienti iam facto admiscetur, & sic conjunctim insciuntur, additis simul reliquis convenientibus. Formula sic hæc:

℞. Decoct. Emoll. q. s. ℞. vel vj.

Infus. Croci Metallor. ℞. j. vel iiii. ad ix.

Sal. Comm. ℞. j.

El. Benedict. laxat. ℞. ad ℞. j.

M. f. l. a. Clyster, scilicet Stimulans, S.

Clyster Stimulans.

Loco Infusi talis ætate potest Symp. Aconici ℞. ad ℞. j.

addi; scilicet enim stimulat.

Vel ℞. Spec. Emoll. q. s. M. ii.

Croci Metall. in pot. lig. ℞. ad ℞. j.

Coque in l. q. Aqua ad ℞. j.

Colatura adde

Sal. Comm. ℞. j.

El. Benedict. lax. vel lenis. ℞. j.

Misc. pro Ememate, S.

Clyster Stimulans.

Vel ℞. Decoct. fer. Reg. Antimonii ℞. ad ℞. i.

Sal. ferment. Viti ℞. j.

El. Benedict. lax. ℞. j.

Mell. rosar. ℞. j.

Misc. pro Ememate, S.

Clyster Stimulans.

Ceterum in Clysmatum usus speciatim observandus est intestinorum status; ubi enim intestinorum motus deficit, & hæcæ morbo sensilia stimulo indigent, Acria saltem stimulantia usurpanda sunt modo dicta: Curam videbitis vel titulo Apoplezie & Paralytico. Ubi vero irritatis Intestinis, indeque dolorosis eorum spasmus, aut ubi alias suspicio est Intestina quocunque loco affecta aut irritata, ibidem contrahi arduum, & spasmus affici; ibi Stimulantibus & Acrioribus malum exasperatur & Emollientibus & Lenientibus saltem tunc insisteret, etiam eadem subinde per os propinquare.

Applicatis Clysmatis, si ulterior necesse sit stimulus, imprimis suppliciter, etque multiplicia. Communicet parantur ex sale & Melle, & cum Pulvere Radicis Heilebori nigri; sicut videtur est in Officinis Pharmaceuticis. SYLVIVS de Alvi obstru. cap. 11. §. 38. seg. subministrat, & omnibus præfert, suppositoria ex Alumine, idque ad imitationem ANGELI SALÆ, qui in *seisericis*, & quidem in *Appendice* pag. 440. facit mentionem suppositoriorum ex Alumine saccharum, quæ suppositoria similiter admodum commendantur à SYLVIO, uti dixi: siue hæc ex Aluminis rapui frustulo, in longum in formam suppositorii confuso, & Oleo Amygdalarum dulcium, vel Liliorum alborum illito: vel si Alumen pulverisatum oniatum cum Tragacantha, in Aqua Liliorum alborum soluta, compingatur in suppositorium aluminosum, in Alvo adstricta admodum conducit. LINDANUS ex cocto Melle acce Salæ marino, gemmeore parata commendat; ita quidem, ut in talibus suppositoriis, pro adultis quidem possit sumi ℞. ad ℞. iiii. cum graois tribus vel iv. Trochiscorum Albandal, & ita fieri suppositorium acce; io parvis vero loco Trochiscorum Albandal possuit sumi species Hieræ picæ *Caleni*, etque cum paoca quantitate salis Gemme permisce: cum Melle io suppositorium facti acce. *Vel*

℞. Supposit. ant. N. j.

Illinatur Oleo Diacalyth. S.

Suppositorium sedis.

Vel

℞. Pulp. Jalapp. ℞. j.

Sal. Comm. ℞. j.

Cum l. q. Mellis ad debitam consistenciam cocti f.

Suppositorium, S.

Suppositorium sedis.

Ceterum observetur, quod, ut eo melius operentur suppositoria & Clysmata, iis præmittenda sint Medicamenta Emollientia siue Lubrificantia & lenientia, per os, ne frustra iis irriteret Alvus, & sequatur, quod læpè fit, Iosfammatio loestini Recti. Sub horum usu sit Iosfasma seu Balneum ex Emollientibus confectum; sub egredo vero è Balneo usurpentur etiam Unguenta externè Abdomini illinenda, vel Saccali simpliciter Lenientes & Emollientes, plus minus Aconidii, io Ladæ cocti, ubi necesse spasmus &c. vel in Febribus durioribus, vel loestinorum spasmus, BORELLUS C. v. Obs. 12. seg. laudat.

℞. Tel. Maive,

Alth.

Plantag.

Alyssum. an. M. j.

Flor. Chamemill.

Mell. an. M. j.

Scm. Foenogr.

Lin.

Camini. an. ℞. j.

Coque in Mai Albi q. l. usque ad consumptionem duarum partium, siue Fæci; & post Fotum sequens innogatur Linimentum.

℞. Ol. Amygd. dulc.

Violarum,

Liliorum,

Refar.

Ced.

Chamomill.
Nardin. an. 3℔.
Adip. anferis. 3℔.
Cera q. l.

M. f. Linimentum: in quo dissolvatur parum Emplastri de Raccio Lantri.

Econtra applicatur interdum Unguentum acrota stimulantia ad coitandam vim Intestinalium moticem labentem, five promovendam Intestinalium motum peristalticum, cum Felle Tauri, Sale Gemmæ & acuta. Commendatur Zibethum umbilico inunctum: (obiter moneo, in Colica hoc inunctum esse secretum): præterea Emplastrum ex Felle Tauri & Colocythide Umbilico applicatum est egregium: Exemplum habet SCHENCKIUS l. 3. Obs. de Excrementis, in Puella, quæ per tres menses non deposuit Alvum, curata tamen per tale Emplastrum, non omisit aliis. Item Oleum Calocythidis per vesicam destillatum nobile & singulare quod est: Maceratur prius in Aqua communi, & destillatur, hic prodit Oleum paucum, ejus una alterave gutta Umbilico illita, Alvum facit stimulat: quod etiam faciat Extracta Purgantia non nimis inspissata, quæ cum Oleo Colocythidos Umbilico largiter illita Alvum legitiemè satis stimulant. In Officinis præstat Unguentum de Arthanis, quod malaxatur cum f. q. Olei Diacolythidos Quercetani, & Abdomini toti illitur, Alvum optime reficit: D. MOEBIUS ad hoc, tanquam ad sacram anchoram consuetam, confugit, applicando supra Umbilicum, quod etiam commendat CLAUDIUS de Jurgis ad Inferm. l. 1. to. cap. 2. Alii commendat tale Linimentum in Alvi obstructione:

℥. Olei Amygd. dulc. res. exp.

Piagn. anferis.

Buty. Mosai.

Ung. Diathusa an. 3℔.

Salis Gemma 3℔.

Spc. Hiera simpl. 3℔ ad 3℔.

Colocythid. gr. xvi. ad 3℔.

Diagrid. gr. iv. vel v.

M. f. Unguentum.

Quod commendat, ut illinatur Abdomini ad movendam Alvum, SOLENDER Conf. 29. feli. 3. pag. m. 306.

Vel

℥. Unguent. de Arthanit.

Moriat. an. 3℔.

Piagn. anferis. 3℔.

Salis Gemma 3℔.

Diagrid. 3℔ ad 3℔.

Cum f. q. Olei anther. Noli f. Linimentum. Conveniunt etiam Linimenta Epomphalia (F), inter quæ est Emplastrum ex Felle Tauri supra dictum, si nempe fiat ex Felle Tauri cum Aloë hepatica, Sale Gemmæ & modico Scammoni, v. g.

℥. Aloë hepatic. 3℔.

Feli. Tauri 3℔.

Scammon. 3℔.

M. invicem, optime tere:

Cum f. q. Butyri non saliti, vel Pinguinis. facim. f. Linimentum molle:

Quo Umbilicus inungendus, & si fortissè agere velimus, plantæ pedum. Vel

℥. Elater. 3℔.

Stamon. 3℔.

Extract. Troch. Alband. 3℔.

Cum f. q. Olei Diacolythidis. redige in Linimentum. Quia ratione nonnulli etiam in Alvi obstructione commendant, ut plantis Pedum applicetur Linimentum, factum ex Oleo Populeo, cum Hiera picta usitata, quod Alvum emolliet & solvit. Sic

℥. Testam Juglandis, imple cum Pinguine anferina, applica Umbilico, simulque Abdomen illius ea. Item

℥. Fœcum asinarum: fubege cum Pinguine anferina, & Abdomini illine.

Item Pulpa Pomorum Borsdorfiaorum cum panis Croco subacta, & Abdomini toti illinatur convenit quoque. De Suppositoriis jam monui: Sunt qui dicunt, quod in desperata Alvi obstructione nil melius sit, quam digitus instructus Oleo Seminis Rapi vel Lini (quod Oleo communi seu Oleo Olivæ melius in obstructionibus Alvi inmittatur Ano; hinc enim potestissime solvi asserunt.

Alii etiam sunt modi, quibus juvantur Alvo adstricta laborantes, inter quos observatu dignum est exemplum, quod recenset MEIBOMIUS Tract. de Ussu Flagrum in Re Præpar. p. 7. de quadam Principe, qui non potuit Alvum deponere, nisi prius à servo flagellatus (G.). Præterea Tullius & Sternutatio similiter adjuvant nonnulli excretionem Alvi: sic PLATERUS in obs. p. 20. habet exempla quorundam, qui ob duricem Excretionem ægrè poterant per podicem excretare: his crebriorem Tullum imperabat, ut beneficio illius Tullis, diaphragma moto, infra Excretionem eliciantur. Fit nonnumquam, ut aut à Podice nonnulli lasso, aut Excretionis crassioribus aut induratis, hæc hæreant, ut nonnulli insigni dolore possint excretari, uti etiam fit in Hæmorrhoidibus, ut animi sæpe deliquim peritiam negri. In tali casu idem imitandus venit PLATERUS, qui somentat cum Oleo, & simul imperat sternutationem & Tullum, & sic feliciter Alvi suppressionem tollit, & Facces retentas eicit: Vid. l. c. p. 346.

Alvus nimis obstricta interdum causâ est, ut per alias vias, & Naturæ planè contrarias, Ventriculi, & Gallæ, sursum versus ejiciantur Contenta: ad quam Expulsionis intestinalis lætionem primario refertur Iliaca Passio.

ARTICULUS II

De Passione Iliaca.

Iliaca Passio est confusæ contumaciore Alvi. Desinitur, quod sit Motus Peristalticus Intestinalium inversus, ubi cum dolore circa Umbilicum intensissimo Excrementa alvina mata retrograde per os ejiciuntur, à contumaciori Alvi obstructione.

Distinguitur ab Excretionis illa per alias vias de novo apertas ista, v. g.

1. Per Umbilicum apud SCHENCKIUM l. 3. obs. 2.

℥. 3. sal. stibis: Struatur aliam hoc extracta.

2. Per Fistulas ex Intestinis perforatis, obs. 4. & apud eundem, & Penem cum Urina obs. 7. citati Aulstis: simile apud BORELLUM c. 3. obs. 16. & HILDANUM Cent. 1. obs. 72.

3. Ulterioribus Mulieribus quibusdam per Naturalia, v. g.

obs. 1.; per Ulcus Vesicæ & Intestini Recti: obs.

10. per partem Podis superiorem obs. 11. SCHENCKIUS l. 3. p. 193. Editionis in folio.

Quando ergo Alvus ita obstruitur, ut per superiora ejiciantur Excrementa, vocatur *Alvus seu Morbus Iliacus*, Convulsus & Chordatus, quod tenet Intestinum tādū comprehendatur convolutum instat chordæ, cujus causa rectè dicitur Motus Intestinalium Peristalticus inversus: ita ut reverè id, quod est Vomitus in stomacho, hoc est Iliacus Morbus in Intestinis. Nam quando incipit talis inversio Motus Peristaltici in Priore, sit Vomitus: quando vero incipit Motus iste Peristalticus inversus in quodam loco Intestinalium, in specie in fine Ilei circa principium Coli, ubi propter Valvulam frequentior est sedes Ilei Morbi, tunc sit Morbus Iliacus.

Est enim unus continuus tractus ejusdem substantiæ similiter connexus, à summitate Oesophagi usque ad extremum Podicis hiatus: totus tractus est una substantia membranacea, fibris cicularibus nervis, obliquè tamen incedentibus composita, quæ substantia nunc est amplior, nunc angustior: amplior est, dum constrictis stomachum; angustior est, ubi Oesophagus & Intestina, in specie Colon, & tenuis, efficit. Unde sicut in statu naturali unus continuus est Motus à summitate Oesophagi usque ad Podicem, quo ingesta succedunt Motu Peristaltico naturali protrahuntur; ita si quodam in loco inverteatur hic Motus, ut facie contrario modo sursum versus, tunc oritur excretio Contumaciore per superiora, non per Podicem: quæ excretio interdum est humida, si incipiat Motus Peristalticus inversi à Pyloro: hinc etiam, si iste Motus Peristalticus inversi incipiat circa intestinum Ductus Paucercitici & Choledochi, in specie oritur *salus Choleæ*: si vero Motus hic inversi incipiat in Ileo, seu alio quodam Intestinalium loco, est *Alvus*, five locus inversiois Madæ Motus Peristaltici sine Intestina tenuia, five sint crassa, & nam interdum Podex five extremum Intestini Recti est locus, ubi incipit talis inversio motus, quæ ratione non tantummodo Clysteres alvi injecti, sed etiam suppositoria per os deorsum rejecta fuerunt, existente tunc final Valvula Coli vel supra, vel

(F) Quid scilicet in viâ deorsum, h. e. supra Umbilicum applicetur.

(G) Inur qui tardum Alvum, Tabaci sumo per os exsultis, & salivæ deglutitis, quidam minimis horis sollicitum.

Causa sive *Pars affecta* Intestina, hanc totam nunc tracta, nempe Ileum, Jejunum, Colon &c. Veteres quidem crediderunt totam hic saltem affici: attamen contrarium testatur experientia, dum Coli, reliquorumque Intestinarum diversis loci passim inflammati in eademvener Intestibus observantur, licet saepe Ileum, & post principium Coli, sit locus Partis affectae: primario tamen eo in loco est Pars affecta, ubi Motus Peristalticus est inversus; nam Intestinum rectum Foris in Utero porritur oculum, & quidem intras, Passione hanc inaequale diebus plius minus odo, observavit JOHANNES POSTIUS: vid. *Observ. Anat. in Anatomia Realdi Columbi* p. m. 78. Facile quoque fieri potest, ut per consensum afficiatur Mesenterium & alim vicium partes, sibiisur & inverteitur naturalis hic Motus, & praeter naturalis infertur, nunc viris *Contemptum*, nunc viris *Intestinarum*: Illorum collorem, vel rectorum induratum, vel Intestina infarciuntur, Horum vel inflammatorum, vel gastricatorum, vel ingurgitatorum mutus, vel coarctatorum, vel ulceratorum, vel hernia translocatorum, vel convulsorum &c. Hic nempe causa quibusvis Irritatione Intestina, plus minus sibiisur Motus contentorum deorsum, unde Alvus obstruita, & provocatus Motus contentorum sursum inverteitur, unde Iliis Morbus.

C A U S A E.

Causa Motus talis compressiva seu Peristaltici inversi est irritatio quaecunque Intestinorum, in certo quodam eorum tractu, ita tamen, ut Intestinum irritatum non possit bene deorsum versus moveri: quando enim irritatur in quodam loco Intestinum naturaliter, succellit raris magis & deorsum versus depressitur; unde, si nunc quaecunque causa aliquid impedimentum addit, quod Motum Intestinali irritati inferiora versus cohibeat, multum vero irritatio nihilominus continetur, necessarius sibiisur contractus motus sursum versus insensitatur: exemplum huius de Irritationibus conficienda.

Causa ergo *Principalis* Intestinorum affectum *Peristaltici* est spirituum animalium impetus, motum istum concitans; *Materiales* est contentus eorum Obstructio, quam insequitur distensio ab argenteis & cumalatis Facibus, qua facta spiritus animales concitantur, & huius Intestinarum portiones irritantur ad motum inversum, uti Venterculus ob alimiam repletionem Vomitionis insituitur.

In specie *Causa* *est* Intestina irritantes, Excrementorum, transiunt per Intestina plus minus impediunt, sunt variae, HILDANUS *Observ. Cent. 3. observ. 61.* asserit, quod principia Causa seu radix Ilei consistat imprimis in hae Intestina Ilei circa Caecum, & in principio Coli, ubi est Valvula, & quod coarctatio & induratio Scybalarum in dicto loco, & consequenter angustia & continua singulari Intestina, sit causa frequentior Iliaci Morbi: quibus accedunt quaecunque angustationes praeternaturales in dicto loco: hinc e. a. ex Scircho & Ulcere cancroso in Caeco, quod Ileum opplevrat, ut nil ad Colon penetrare poterit, hunc alioquin observavit: Sic etiam NICOLAUS FONTANUS in *Consiliis & Responsis* p. 84. post Illacum passionem Isteralem, observat materiam induram & quasi lapideam sine ullo Valvula circa Intestinum Caecum peristalticis adherentem, illudque ita extendentem, ut extrahi non poterit. Herniam subsequitur Iliaca passio, nisi Hernia inveterata addit, & exitus major, in omnibus enim Herniis est obstructio Alvi. Quando ergo diu morantur Excrementa, accedunt, & acidum aetherum Intestina costringunt, eorum membranas vellicat, unde Motus inversus Peristalticus

elicus: per adhuc Ligamenta autem Intestina ad fixum aut tuncum redeunt, Quoties in Iniquiori scem Morbum Iliacum observare contigit, Herniam vel Umbilicalem vel Inguinalem addit, tunc fieri praedicere possumus, & nunquam fallit, quomodo ob exultantem patientem ipse non observare solet: vid. M. A. N. C. *Ana. 2. Observ. 97.* & quia non possunt expelli Excrementa per Intestina, in Umbilico & Scroto convolvunt, hinc non sine horrore sanguinem versus Excrementa eieciuntur. Assumpta aetheria & similia periclitantur Alvim coadunare quia huc faciunt: hinc Ileos ex usu alimio Mesepilorum, aut aliorum duriorum & aetheriorum observatur fuit, Ileos peritacem est usu Malorum Cydoniarum nimis observavit ZACUTUS LUSTANUS *lib. ult. Prae. N. 2. Obs. 2.*, curatum alia Isteris, Seroere vaccino recenti totum Abdomini iter illius: Idem I. r. Dolorem Iliacum ex Facibus induratis ob eum copiosum Avelanarum, per Balneum oleaginum, & epoti Omenti aretiani lippiditibus curatum: Pariter L. a. *Obs. 2. Princip. Med. 97. Obs. 16.* ex Pyrorem crocodorum ingurgitatione nimia obstruit Intestina Volvulum observavit, FORESTUS L. 25. *Obs. 21.* descriptum Ileum ab Arsenico sumpto propter huius corrosivam irritationem, per Oleum Amygdalarum dulcium, consultius Vomitu, curatum. Observata quoque fuit Inflammatio & Ileos, si argi post nimium motum, calorem, & sudorem, ingurgitatum frigidum, & est internum Isteris: Ulcera facit Intestinarum coarctationem, impediunt Motum Peristalticum, huc periclitantur: hinc recte KERKRINGIUS *Opus. Obs. 42.* Iliacum Passione interduum ab Ulceribus Intestinarum gravioribus cum Inflammatione potius, quam eorum inertia Convolutionem, ipsi asserit. Uteriori itidem considerationi relinquit, quod PEYERUS *de Intestinis Gland.* pag. 78. asserit, interduum Lympham in pressa quodam Glanularum Intestinalium subseruere & stypticum factum, peritacem strictionem efficere posse, PANAROLLUS in *Prae. N. 2. Observ. 30.* quatuor habet species Ilei a diversitate Causarum differentes: *primam* causam dicit esse Herniam secundam vult esse Convolutionem Intestinarum tertiam dicit esse Adstrictiorem Intestinarum (qua tamen non procedit) praeteritum dicit ad instar Interitinis lueruere: & quartam vult esse Defectum Intestini unius in cavatem alterius (7).

Examinemus hanc causam. Vulgaris est persuasio, convolutio Intestina: unde RIGOLANUS dicit: Volvulum Isteris digni complicari. Verum illa Convolutio Intestinarum est talis, hypothesis enim pondum est provera agita, quod Intestina ita convolvi queant: quoniam enim ea Mesenterio adherent, impossibilitate est talis Convolutio: demonstrant hoc ipsum HELMONTIUS in *Tr. de Flatibus*, ubi acut RIGOLANUS refertur: unde nati huc appellatio Volvuli quoniam Ileos dicitur volutus a *Voluto*, est absurda. Nec quousquam offendat, quod hinc inde apud Auctores, etiam BARRETTUM, fiat motus Intestinarum convolutorum, per Anatomem in Iliacis observatur, nam arbitror subelle tum semper Gangrammam Intestinarum in qua corrugetur invicem ac complicat fient, & ita apparetur convolvi videntur Intestina: hinc RIGOLANUS *Cent. 3. Obs. 26.* notat Passione Iliacam Isteralem, in qua Ilevum tribus complicationibus convolutum & complicatum, & quasi coactum in unam massam circa finem illius, & ita hae portio Gangraem affecta fuit: vid. egregius Discursus in KERKRINGII *Opus. Ana. Obs. 42. pag. 95.* & 96. ubi Iliacam Passiorem ex Ulceribus Intestinarum & Inflammatione refert. Verum *Distensio Intestini unius in alterum*, sive *Intestini*

reposita intra Abdomen Ileo, & nuncia & Vomitus serere, quae ad animalium obitum facti sunt. Confirmat utrumque omnino Intestini spirituum Hagenotus ex eo, quod Pelti carni eorum, quoniam Cere, & ex his carni Caruli ex apud gerantibus vero animalibus praemissum in Ventum interduum per coepitum alimenum affertur: & denique certis paribus porum Intestina in alio fide obsequium fuerit. Necnon dicitur hic obierit A. in tunc tempore quo ob Interitum volutus Intestini Passione praeterea, Chylus efficit Ventum Lactarum sublevis, ac per Mesenterium trajicitur fuisse quod quidem praeterea in Iliac Passione fieri posse negat.

Tandem Ch. Auctore satisfacere enarrat Objectionem ex Billrothi Medici praeterea, quod scilicet in Iliac Passione Chylus Intestini & Supplicia An induta per Or quondam educta fuerit: quod quidem oblique Motu An peristaltico nimis explicari posse videtur. At autem quod (seda Historia veritate) si impedimentum in An signum, necesse est Chylus per vim injectam peristalticam An obsequium superaverit quoniam passu amplius eadem vim reaverit ab pressum Muscularum Abdominis: & Diaphragmatis, debet sursum cum Facibus ferri. Sic Glan An sublevis, ac Rellum ingressu, quoniam validissimum a Splancheris inflammatum atque a spiritibus animalibus coarctum in istum coarctationem, sursum versus propellatur: facili parit transmissio Muscularum Abdominis: & Diaphragmatis deest, ac Facum sursum reductum motum sequi.

(1) Cl. Rayfchius *Obs. 91.* Ilium morbum esse Aeternum Intestinarum, & praecipuum tamen hanc autem praecipuum ponderat ait a Neris Intestinarum, si non in totum, sed in parte obstruita: unde videtur Intestina, & praeterea remota, An Motu Peristaltico naturali destruantur, utque spiritibus animalibus deficiant. Id confirmat differtentia cadaveris. Uterque, Vini affli, qui in totalem alio adstrictum, & totum tamen huius mirabili dicit, & sine differe, incidit.

in eavitatem inferioris, five ingressus inferioris in rivatum superioris, est satis frequens, & in *Praxi* 6 SYLVIO aliquos observavit: vid. *L. r. Prax. c. 15. p. 15. & supp.* Dux sunt causae, secundum SYLVIO, Inflammatio, & Ingressus Intestini in aliud (Defectus à superiori in inferiori intestinum incurvatus est: Hæcna subinde etiam Ingressum ejusmodi excitant in Colica.) Causa hujusmodi Ingressus sunt subinde Flatus, diversimodè Intestinum tenes diffidentes, quo fit, ut in uno loco magis dilataret Intestinum, quam in altero, cum nimio motu, & inordinata re-digitione corporis acri in lecto: ægror nempe, dicit SYLVIO in torminibus dolere se variè contrahere, & corpus suum variè mutare, & agitare: hæc corporis violenta contrahit & agitatio facit fieri, ut Intestinum a Flatibus dilatum admittat partem ipsius Intestini. Flatus non dissentiunt, & propter angustiam loci fieri, ut se invicem incant, & ut se mutuo ingredi intur; unde necesse est Impediri Motus suarum. De quo mirus hic Ingressus cum dolore est, infer Motum. Peritæsticam interitum; in specie in Morbis Intestinum dolorosis, in convulsivo Spasmo Intestinum, facile mutuo introcedit; ut non raro Convulsio inferit Obstructionem, ita non raro Colica convulsiva, maxime iscorialis, ileon inferit, quæ Colicæ est frequentissima, & oritur vitio Intestinum convulsivo & contrahit, à quo claudicat ileon: vid. *DRAWITZIIUS de Scorbuto*, qui urget has Convulsiones & Spasmos convulsivos Intestinum. Et sunt Ingressus hæc mutuos Intestinum est frequentissima veri ilei endi, cuius fœdi modum oculatiter observavit *PERVIERUS de Gland. Intestini. p. 13.* Præter exempla SYLVII non videlicet in *SCHENKIO L. 3. Obs. hujusmodi necnon Ingressus Intestinum tenuium in ileo ad digitum hujusmodi*: item apud *REALDUM COLUMBUM L. 1. p. 13. 17. de Re Anat.*, *BLASIIUM*, & *PLUMPIUM in Tract. Med. c. de Defensio*, item *HEINRICUM ab HEER Obs. 24. §. 4.* Ingressus hæc Intestini in Intestinum semper habet subiectionem alteram causam, Inflammationem & Gangrænam, attestantes hæc *Exempla* quamplurimum *sup. cit.* Denique Inflammatio Intestinum, & hæc subiectionem Gangrænam quatuor corrugat Intestina, subinde ducit ædum: huncce lethalem: conf. *KERKRINGIUS in 1704. anat. Obs. p. 42.* item *BARTHOLINUS in Pr. c. 4. Obs. 92. p. 529. & Hist. 92. p. 542.* ubi Ingressum suum Intestini in alterum habet, *HELMONTIUS Tract. de Hæm. §. 31.* Inflammationem a Febrili induratus dependente: Dubium tamen est, an *Virum Facit producant Inflammationem? an Inflammationem Facit indurationem?* tam verò non videtur simile, in ileo contentam materiam ita potius indurari, ut protulit ab Intestini continuo Motu Peristaltico irritari nequeant. Itaque oriri primò Inflammationem credide est: deinde verò Facum indurationem esse vix denegatam: utriusque fit probabile, in crassioribus Intestinis hoc facile posse evenire: Antem antem Inflammationi perbetur Facum Intestinum præternaturaliter acidi, qui lædunt sua Sanguinem, Intestinum substantiæ influentem, inquinant, Inflammationeque parant: quo pacto foras etiam subortum est Contagium interens Ileum, teste *ALEXANDRO BENEDICTO lib. 20. c. 6. & OLAVO BORRICHIO in Epistola Bartholini citatis.*

De Inflammatione videtur in *BARBETTE Chirurgia p. 195.*, quæ si sequitur Vulvum talem esse ingressus, item alter nequit, quam ut sequeat Febris aliqua; quam 6 Vulneraria quis vocitaverit, à verò non multum aberrabit. Nancifixerit autem Febris Malignæ indolem, degenerante Inflammatione in Gangrænam & Sphacelum. Gangrænam ilei observavit *CASPAR BARTHOLINUS: vid. Crat. 6. Hist. 58. Hist. anat. THOMÆ BARTHOLINI, item R. V. F. R. I. U. S. Cent. 3. Intestinum Rectum nigrum, & Gangrænam corruptam vidit etiam GUIDO PATINIUS.*

Dux hæc dux causæ, nempe Inflammatio & Ingressus Intestinum mutuos, constituunt cum SYLVIO, innotant autem frequentiori Causæ. Nam observavit etiam *CASPAR BARTHOLINUS & POSTHIUS*, ut iam dictum, ileon ob Intestinum Coactum; quare & hic Coactio Obstructionem & Insequentem Inflammationem producere valet: vid. *M. A. N. C. de. g. Obs. 93.* ubi exemplum adducit, quod Obstructionis & Inflammationis in non eodemque subiecto quandoque concurrant. Hinc *SENNERTUS* similes & Motus inveri Intestinum genus observavit

Tom. II.

In Hypochondriaco, qui ex Hypochondriis erudis humoribus & crassis evomuit, prætereaque integrum etiam Clysterem, superveniente Epilepsia & Cæcitate: In hoc subiecto necesse fuit, ut erosa fuerit *Valvula dicta Bæstini* in colo; alius impossibilis fuisset transitus clysteris: id quod ipsam fortasse factum est ab humoribus acerbis inibi hærentibus (K.).

DIAGNOSIS.

Quod attinet *Signa Diagnostica*: eadem per se sunt clara; quando nempe nil aut parum descendit per inferiora: hinc succedere Abdomen indurere & intumescere, supervenit murmura varique motus in Abdomine; Intestine ægræ nauseant, sæpeque percipiunt vomendi conatum; supervenit Vomitus, primò quidem omnium ingelorum, succellere recementorum variorum flavescitiam, & tandem per os contenta Intestinum Eacramenta, quæ alias per podicem efflent excrementa, Vomitu rejiciuntur; modo adei habitus febrilis, interdum lipothymia; & tormina itidem subinde crudelissima ægræ versant, & anæstetia: via explicabiles eisdem frangent: tandem sudor admodum frigidus syncope advenit: dolor Abdominis interdum est intensus, ut etiam Clystina iocela interdum per os prodierit: adeli interdum pulsatorius & ardens dolor in certo Abdominis loco, si scilicet adeli Inflammatio Intestinum; adellæ simul ut plurimum febris lipyria, ubi nempe frigent æcarrea, interiora verò utuntur, ubi Pæces vel prædunt per os, vel immiscent prodire, urina suppurat, quod Vesica in conflatum trahatur: vires omnes languescunt, singulas supervenit, qui prodromus convulsionum & epilepsie, quæ hæc tragediæ tandem finem imponit.

Imprimis autem hic notanda sunt, quæ Ileum præsentem aut futurum esse, monstrant. Et quidem imminet Ileum prodant: (1) Alvus percutat suppreffa, ita ut Podex interdum ierò retrahatur appareat, ut neque specillum neque stibula clymatica intrudi possit, est prænuncius: (2) Intestinum tenuium crudelia Tormina: (3) Incipiens Nausea & Vomitus: Quod si (4) superveniant Singulares, ferè mors est in olla.

In fiene nonnullam sequitur aliquis dejectione Eacramentorum tenuium & fluidorum: in facto verò nulla: Imminet, aut jam adeli in saculo Ileus Vomitus frequens succi biliosi cum excrementis hamoribus: Quando Intestina crassa primario Colon, affecta sunt, adeli simul Podex interiora verò reclusis, ita ut ne sivea appareat, & tanta sit angustia Podicis, ut specillum quidem introire possit, si Podex autem liber est, tunc Intestina tenuia sunt affecta, magis tamen superiora: ut Jejunum, quando magis Nausea & Vomitus urgat: ubi majores dolores circæ regionem Epigastricam cruciant ægrum, ileon est affectum. Si iam adeli Inflammatio, patiens & febrilis, & horrore contineatur, adeli dolor incerto Abdominis loco palliatilis se ardens, item Febris lipyria, sitis & ardor quasi quidam Ventriculi: si iam adeli Sphacelus, cessat dolor, scilicetque adeli sudor frigidus, diffucilis respiratio ob conflatum nervorum, tandemque supervenit lipochymia, in nonnullis etiam epilepsia, Equidem & in Colica interdum analogia symptomata observantur: quanta tamen hæc inter sit differentia, videatur *SENNERTUS L. 3. Prax. pag. 247. ubi de Ileis*; item *RIVERIUS in Pr. l. 10. c. 2.* Nam sæpius quidam Colicæ pro Iliaco Morbo à timidis Medicis habetur.

PROGNOSIS.

Quod *Prognosis*: raro evadunt Iliacæ; omnis enim Ileus est periculosus & peracutus affectus, in quo plures intereant, quam convalescant: unus tamen facilius curatur, quam alter.

Qui tales sunt in Inflammatione Intestinum, ut plurimum, si non semper, moriuntur, qui ex Gangræna, semper est lethalis.

Ileon, ubi etiam stercoris Vomitus supervenit, ut plurimum est capitalis, & à quo pauci convalescunt. Si tamen ex Hernia superveniat Vomitus, non adeo desperatus est, quum si ea aliis causis, vid. præter *SENNERTUM in Pr. l. 3. ubi de Ileis pag. 248. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 55. p. 170. Ann. 6. Obs. 44. & Ann. 8. Obs. 93.* utrius etiam Ileos ex Hernia non sine periculo sit.

N

Quæ

(K) Sufficit si Intestinum Colon summi fit distensum, ut *Valvula Bæstini*, & reliqua *Valvula Commotives Kerkerlingii* nonne seu fuerint non possunt, ut constatarent pariter: oblique eo igitur quod *Valvula illa* à Succis acerbis excreta fit, ut ait hic A., parum Clysteres à Colo in Ileum Intestinum ascendere.

Qui ex Scybalis est induratus, vel ex mutuo Intestinelorum Ingressu curari potest.

Si Ingressus fiat per adfensum, curari potest si vel per descensum, est incurabilis, teste SYLVIO.

Si ex ulu legitimo Opiatorum succedit quies atque somnus & doloris remissio, salva res est; si vero non, desperata.

In illo dolor iste acutissimus subito sine causa manifesta deficiens, Gangræne Intestinelorum signum est.

Facit huc Aphorismus 10. HIPPOCRATIS scilicet 7. Ab illo vomitus, aut singultus, aut furdus, aut convulsio, aut dyspnoea, malum.

Si contingat cum stranguria, nisi febris superveniente capiat urina fluxerit, iuxta APOCRYPHUM scilicet 6. aphor. 44. lethalis est, eum iuxta allegatum HIPPOCRATEM scilicet 7. §. 3. febris convulsionem solvat: item si febris acuta cum parotidibus addit; item si alvus citra causam manifestam fiat aperta; vid. TULPIUS L. 2. aphor. 4. & RHODIUS L. 2. aph. 79. qui observat, fieri quandoque, ut etiam in illo lethali tandem ante mortem Alvi excretio superveniat, quæ tamen malum potius est signum, nempe deficientia facultatis animalis seu spirituum animalium, unde non amplius tam fortiter contrahuntur Intestina, sed hæc flaccida facta, toties ante irritata, scilicet excretum, vel potius quasi prolabi sinitur excrementa.

- Arabes, quinque gradus Ilii constituerunt:
 1. Periculosissimus Ilii est, quando steruus vomont.
 2. Si sudor ex toto fit frigidus.
 3. Cum spiritus, qui respiratione emittitur, est frigidus.
 4. Cum ructus est frigidus.
 5. Cum per alvum crepitus frigidus erit.
- De huiusmodi Iliacorum fectore, conf. PANAROLUS PARS 3. Olym. 16.

C U R A.

Quod attinet Curam, consistit in eo.

1. Ut irritatio Intestinelorum sistatur.
2. Ut excretio Contentorum naturalis quacunque ratione promovetur.

Unde prout causa irritans varia, & prout multipliciter Alvi illi potest, varianda subinde specialis Cura.

Ea, quæ interiorum, sunt tam Interna quàm Externa. In genere, quoad multiplices istos scopos, adhuc observandum:

I. Ubi Stercora dura adfusa, aut ubi saltem præsupponuntur talia, ubi illi agi potest, nisi hæc ipsa indurata Clysteribus prius emolliantur: nam si diu nimis exasperent ægri sine periculo, & Stercora postmodum per superiora ejiciantur, raro, vel cum magna difficultate, evadunt. Testatur hoc non solum CURA FORESTI L. 31. Olym. 22. & scilicet etiam rustica, quæ cum per quinque aut plures dies non desique ea illo omnia per superiora rejiceret, nec quicquam retinere posset, Clystere emolliente inchoata servata est. Excretio igitur retentorum omni studio promovenda venit.

II. In illo morbo, quæcumque Purgantia facitiora, aut etiam leviter stimulantia, per os exhibita, non conveniunt, nisi jam sedata sit omnis Intestinelorum irritatio, & hinc ortus Mocus eorum inversus: nam, subsistente irritatione, & durante aut imminente Vomitu intestinalis, Purgantia quæcumque tam lenia quam fortiora, semper evadunt Vomitoria, & ita malum non leviter exasperant. Per os igitur, quantum possibile est, sagaciora sunt seu venena; revera enim Mocus iste inversus augeatur, & Vomitus Stercorum, si non Motus, occasio suppeditatur, Conf. SYDENHAM Tr. de Meth. curandi Feb. p. 67. & 68. qui admodum elegans, quando dicit: quod non applicanda sint Purgantia nisi prius restituta in Joergum Venericuli, atque adeo ad motum naturalem deducta; quod verissimum est. Vid. JOEL Prax. L. 4. Sect. 3. c. 6. DRAWIUS de Stercoribus, qui dolores causat, s. 2. p. 362. M. A. N. C. Ann. 2. Oly. 238. Atque hæc imprimis de stimulantibus per os intelligenda sunt; quæ enim Clysmatum forma incipiuntur, totius usurpantur. Potius ergo Laxantia adhibenda.

III. Observandum: licet periculum præsens vitium sit, metuendum tamen, nisi sequatur multa excretio, & revocetur omnis motus humorum deorsum, qui sursum secebat, non extra periculum esse ægrum. Nam quia totus Venter inferior commotus est, non prius securitas credenda erit, quam sequatur Alvi profluvium, aut sponte, aut

per artem provocatum. Unde mortui sunt nonnulli incuria ista, de quibus Medicus jam securus erat, ut dicit BALLONIUS L. 2. Conf. 16. Semel ergo cessante Morbo Iliaco seu Vomitu Stercoreo, non mori a Cura abstinendum: propiciator igitur ægro, si non recidivam cadat alia faciem.

IV. Etiam observetur, quod in hoc affectu ægri subinde summa virium dejectione laborent, & non raro Animi deliquis; propterea Medicus semper Aquam aut Spiritum Theriacalem camphoratum, aut Spiritum Vini cum Aqua Cinnamomi, præsertim propter Venericuli labem, aut spiritum Rosarum ambratum, Confessionem Alkermes, quo viribus consulatur, aut similia rescidiva in promptu habere debet. Animi deliquium oritur ex fectore, quo tales funt afflicti: Jam omnia seipsum nocentissima judicantur. De fectore hoc consulti PANAROLLUM PARS 4. Oly. 16. de Juvenc quodam, Vulvulo tandem mortuo, qui foetidissimum odorem non tantum in omni vomitu & ructu, sed etiam tandem ex toto corpore, exspiravit.

V. De Opia quaeritur: an usurpandum sit? Resp. Opia propter irritationem & præternaturalem motum & dolorem interdum usurpanda; sed caute: solum quidem irritationem & Motum Peristalticum inversum, quo remoto, Ileos non adest; sed simul impediunt Alvi excretionem. Propterea considerandum est, quod magis urgeat? Nempe si (1.) magis affectum inducit Irritationem, præmitenda sunt Opia, & hinc subjugantur, quæ Alvum stimulant, & Feces educunt: si vero ex Oblivione undecumque orta natum sit malum, hæcque adeo magis urgeat, danda sunt, sed nonnisi relaxata lue aperta Alvi, ad Irritationem & Motum Peristalticum inversum meruerim quasi tollendum, aut recidivam præcedendam. (2.) Quando alii omnibus irritis, aut in specie propter continuum Vomitus nihil intrinseci potest, perperis omnibus circumstantiis, ad compescendum stomachi furorem propinquent. Non tamen expellatur, donec vires deficiant penitus, sed his utcumque adhuc robustis, Opia usurpanda, appropriatis tamen humicibus junda; e. g. cum Aqua Menthe spirituosâ, Aqua Cinnamomi, &c. ut aliquando suffumigato Mocu Peristaltico inverfo, alia remedia melius operentur. Porro (3.) in ipso Intestinelorum à sale acrisorbuto, nervos melancolicos aut fibras ascientis, ut in Colica forbitica, ad remissionem illius usurpi possunt, ut remittente spasmus, alia Abstergentia aut Evacuantia eo melius operari possint. (4.) In inflammatione Intestinelorum fugiantur, ne ad citam Gangrænam hæc disponant; fugiantur Opia, si mors est in oïla, ne prodiuturnior remedia alia salutaria: De quo Opil usi in Passione Iliaca conf. WEDELIUS in Opil. p. 120. item M. A. N. C. Ann. 2. Oly. 238. p. 340. & Ann. 9. & 10. Oly. 114. p. 379.

VI. In ipso Morbo, à quacunque causa fuerit, ægri vident Frigida quævis, tam Alimenta quam Medicamenta; quia Calida intus & extra usurpantur. Omnis Potus frigidus fugiendus, sed calidus Venterculus demulcendus; jam convalescentes tanquam Puerperæ tracheidæ nec sefe Aeris frigido caponant, nec in Vultu peccant; quin in & post affectum Vultus tenuis ordinatur, & nonnisi cochlearia aliquot Infusi gallinæ forbeantur, Ova forbilla &c. assumantur, quemadmodum & admodis externis studiosè se à frigore præservent ac defendant: hinc paradoxon satis videtur, quod HIPPOCRATES L. 2. Epidem. Sect. 6. in Vulvulo tenui seu molli (id est flaccido) frigidum Vinum, multum, meracum commendat (L.); vid. VALLESIUS Commentar. in hanc locum, & HORSTIUS Cent. Præf. Det. 6. p. 1.

Conveniens ergo in hoc affectu quamplurima supra ad alvum adstriam laudata, uti sunt, ratione quidem Alvi clausi, Clysmata Abstergentia & emollientia, & ex Vico, Urina pueri, & semibibus Carnianis parata, à ZACUTO LUSITANO L. 7. Medic. Princ. Hipp. 97. Oly. 309. commendata. Simplicia Emollientia, & ex his parata Clysmata, item Oleum Lini, Raparum, Sesamolum, &c. Clysmatis instar usurpanda, satis lue cogita: quo etiam pertinet Clysmata Emollientia WEDELI in M. A. N. C. Ann. 2. Oly. 238. Quid si hæc Emollientia non satisficiant, & opus sit stimulo, ipse incoquitur Colocynthis; item Olea dicta applicantur, quibus incocti sunt Trochisci Albandi, vel Oleum Diacolythidum mistum; vid. RULANDUS de Trach. Præf. p. 238. ubi habet Observationem de Ileo periculo, curato per Clysterem ex Olei seminis Lini 3j. cum Trochi-

(L.) Hæc frigidum Vinum multum, & meracum, in Ileo tenui exhibendum esse quidem contendunt, sed in Ileo tenui & frigido Vinum multum & meracum propinandum ex Hippocrate testimone. Legendum enim esse αἶμα λευκὸν ὑγρὸν, αἷμα λευκὸν &c. non τὸν αἷμα λευκόν, αἷμα λευκὸν, ὑγρὸν αἷμα λευκὸν &c. Vide de hac re eruditissimum & accuratissimum Jo. Ant. Vander Linden.

chilorum Albandal 3℔. parum bullitis: hoc bene launxit Umbilicum, reliquum iniecit: excretis copiosis, hoc solo curavit. Quo pertinet Clyster Hermanni ex Jure Pilorum, Eustachio Eusebio, Oleo Lini, in quo Trochisci Albandal ebullierunt. Vel

℥℥. Heri. Mercurial.

Pariter.

Flor. Lil. alb.

Samb. an. M. 3.

Semin. Napi 3℔.

Coq. in f. q. Aquæ.

Colatura 3℔. adde

Infus. Asinimulæ 3℔.

Sol. Gemma 3℔.

Mell. Mercurial. 3℔.

M. f. Emula, S.

Clyster Aperiens.

Vel

℥℥. Heri. Malva.

Pariter, an. M. 3.

Flor. Malv.

Samb. an. M. 3.

Coque in f. q. Aquæ simpl.

Colatura 3℔. adde

Sol. Gemma 3℔.

Syr. Rosæ. Ang. Sals 3℔.

M. f. Emula in fœcibus induratis viscidis, S.

Clyster Aperiens.

Facit huc POTERIUS Olf. & Corat. l. 2. c. 83. de Iliacæ Passione, per Oleum supra & infra intestinum curata. RIVERIUS commendat per Clysteria Decoctum Intestini & Orneti Vervæ, in quo Butyrum & parum Salis Gemmæ dissoluta sint; sed in induratis Fœcibus: Item LINDANUS laudat Clystra ex Decocto Hordei, vel alio, addito Nitro ad 3℔, idque in specie, si mahum adsit, ut mentuendum est Inflammatione Intestini: vel ad imitationem ZACUTI l. 2. Med. Princ. Olf. 97. ex SCRIBONIO LARGO fiat Clystra ex Oleo cum Ruta & Nicro decoctum, quo Iliacum Morbum cum Vomitu stercoreum curavit. Quod si verò vel Motus Peristalticus inverti incipiat in Intestini crasso, aut ab ipso Podico, qui tunc est retrahendus; injecta talia stimulant raro, nisi nunquam, scopo iustificatione, sed potius irritant: valent tantum in Intestinis tremulis, in crasso vero affectu per superiora curamus: vid. M. A. N. C. Ann. 3. Olf. 209. Propere omnes bene observentur circumstantiæ, & usuperent, que nullo modo simulant, sed simpliciter emolliunt & relaxant. Emollientia & Relaxantia sunt Julecula, acrimosiam plus minus imperantia, & blandæ abhorgetica, ut Julecula gallinacea, veliola, vel cum Chamomilla, aut Plantis Emollientibus decocta: v. c.

℥℥. Heri. Malva cum flor.

Flor. Chamom. Rom. an. M. 3.

Rad. Alth.

Liquirit. an. 3℔.

Coque in Julecula gallinacea:

Colatura 3℔. vel 3℔. adde

Liqu. Terra sol. Tartari 3℔.

Olei Amygd. dalc. 3℔.

M. f. Potio, S.

Potio Emollientis.

De qua in Fœcibus induratis ad 3iv. pro dosi, probè agitando haurienda.

Subinde etiam Pinguia, Intestina lubricantia, in usu sunt qualia sunt Oleum commune, aut Oleum Amygdalarum dulcium, sed recens, ad 3℔, in Juleculo calido assumentum: Item Vinum Malvaticum cum 3℔. Spermatia Ceti.

Vel

℥℥. Olei Amygd. dalc.

Vini Malvæ. an. 3℔.

Thuris. 3℔.

M. pro Potione, S.

Potio Emollientis.

Vel

℥℥. Decoct. Pass. min. cum Tamarind. 3℔.

Olei Amygd. dalc. 3℔. vel 3℔.

Syr. de Ros. 3℔.

M. S.

Potio Aperiens.

Item

℥℥. Crem. Tartari 3℔.

Scamm. præpar. Brendel. gr. 12.

Syr. Trochisci. Alband. gr. 13.

Tota, II.

Olei destill. Anisi gntt. vj.

M. f. Potio.

Div. in 3. partes æquales, S.

Pulsio Aperiens.

Raparum Decoctum, tam crudarum quam prius affatur, copiosius haustum est laudatum, vel Decoctum Florum Chamomillæ adjecto Butyro non salita tepide haustum: nec minus Succus Pomorum Bosdorfianum putridum mirabilis est in tali Iliacorum casu: conf. M. A. N. C. Ann. 6. Olf. 114. p. 153. Et sanè observavi in quodam Iliaco, quod post ingectum Clystra ex Olei Raparum 3℔, Lini 3℔, Diacolocynthidos Quercetani 3℔, invicem mixtis, idque sæpius repetitum, cum simul bina Poma Bosdorfiana rursus comestisset, copiosi fecules fortiter cum flatibus inde fuerint sublecati. Sic in Muliere ex Bubonocoele utriusque lateris cum gravissimis Alvi torminibus, ac immixtione Ileo propter spasmum Intestini, me insula plura tentante, ubi iamvis Venter accendens applicatione gulsæ Pomorum Bosdorfianorum putridorum cum paucis Croco, & super totum Abdomen infiltratione, Mulierem levavit & Alvum reservavit.

Quid si hæc, & que supra de Alvo obstruata fuerunt commendata, non sufficiunt, in Pertinaci Alvi clausura conveniunt bina remedia, quæ insar omnium sunt: nempe Globuli plumbæ scilicet, & Mercurii vivus. Conveniunt Globuli, si Facum induratum recentio, five Conglutinatione Intestini: aliquis adit, five Ingressus Intestini inferioris in superius Ilium excitaverit: quo in casu inferius detrahatur in fons locum; sed præmissio imprimis usæ Olei Amygdalarum dulcium recens expressi, succulæ piaguetica, similisve fluidi, ut horum medio quasi lubrificentur viæ. Globulos hoc primum credo introductosque LUBMONTIUM Tr. de Flar. §. 3. Ubi verbis Inflammatio, vel Gangræna, vel Hernia, vel Ingressus Intestini superioris in inferius, excitaverint affectum, nihil possunt, quia potius exasperant malum: vid. de his Globulis, præter LUBMONTIUM, HEINRICUS ad HEE R Olf. 2. & M. A. N. C. Ann. Olf. 96. p. 155. pluresque alii Auctores WELSCHIUS Hæmorrh. §. 19. Olf. 33. cum Saturno Mercurium in amalgama redigere, hincque Globulos parare docuit. Rarum est, quod Iliæ ex Omphalocœe per duos Globulos curatus fuerit, Auctore WELSCHIO loco citato: sic ZACUTUS LUSITANUS l. 2. Præsent. adducendo Olf. 27. dicit & observat, quod Pilæ plumbæ primum 12, post 18, parvas tamen, (Germanicis Scherret) current, & crantur Ilium desuperatum, ex nimia Caliditate crudarum ingurgitatione, seu ingluvie, ac Fœcibus inde induratis natum; licet etiam habet exemplum Ilii, octi ex Pyria crudis copiose ingessis. Verum hi Globuli non semper ad usum tui, quia interdum diutius in corpore morantur: tale exemplum de tali Globulo observatum, qui undecima die tandem redditus fuerit per Alvum: taceo, quod non semper sufficiunt: vid. FONTANUS in Cassi. pag. 15.

Globulis ergo plumbæ præterendus Mercurius vivus sed probè sit depuratus, & copiose ingessos, in dictis casibus nempe, ubi utiles sunt Globuli plumbæ; sed dico, facis copiose assumi debere. Communiter ad 3℔. præcipitur, ut capiatur in Oleo Lini, vel Oleo Amygdalarum dulcium, aut cum Oleo communi & Saccharo, movendo nonnulli æquum delupur; quod quidem non contemnito, sed potius tamen, Mercurium ad aliquot uncias assumentum esse, ad minimum 3℔. vel iv, interdum etiam a 3℔. ad 3℔. ut et melius penetrare possit, applicando simul externè Fomenta blandè emollientia, & postmodum simul æ per Alvum ejedus est, (nam si minor est dos, tardè & difficulter redditur,) propinquit ægro Olei Amygdalarum dulcium 3℔. cum Olei destillati Anisi 3℔. ut lubricetur demò & emundetur Intestina: commodum etiam est, ut præmittatur aliquandiu Oleum Amygdalarum dulcium recens ab 3℔. ad 3℔. vel 3℔. vel Sperma Ceti in vehiculo calido, ut et melius lubricetur viæ. Aliquando ERBENIUS, Arabiar. Solennis, propinavit ad 3℔. Mercarii vivi, præsentè Febri, in pertinaci Obstruptione Alvi, & que variis antea adhibitis Catharticis & fortissimis Emeticis refocti non potuit. Ut ergo promptius operaretur assumptus Mercurius, ægrum post decubitationem primum, mox salutatione, curri demum impostum hinc inde cum violentia & impetu, super frusta & rora calis, trahi jussit, qui postmodum domum reversus in somnum incidit, mane vero reperit Stenocora cum Mercurio vivo in lecto, non per 3. dies motuque illum duxerit. Hæstionem viscidit ad Differt. case de Oleris Hypochondriaco c. 5. §. 3. Vel immittatur æger in Balneo Aquæ tepide vel Decocti emollientis tepidi postquam Mercurium ita assumptus, ut interius Mercurii visus pro-

moveatur per externum illud Fotum. Prostant exempla pro-
prietatum fuisse Mercurium ad Bz. imo ad Bz. vid. HEIN-
RICUS ab HEER *obferv.* 27. ZACUTUS LUSITANUS
laco allegat. obf. 35. & PARÆUS l. 16. c. 58. Quia verò
Globuli & Mercurius frigore suo aliquantulum Intestina la-
dunt, poſt horum uſum ZACUTUS *laco allegat* Clyſteres
ex Vito generoſo, HEINRICUS ab HEER l. 4. c. 5. Vito
Cretico injicere jubet; quod aliis emollientibus & ano-
dynis Enematis præſtare licebit; imò quia internum Mer-
curius aliquoties & in majore quantitate exhibitus retine-
tur, huc dolorem colla, & intumefcentiam gingivarum
movet, & exin ſalvatio imminet; his etiam partibus ſuc-
currendum per Mel roſarum, Syrupum Violearum, &c. &
Mercurii cutus per Clyſteres omni ſtudio promovendus, &
reliquie ipſius per intera Solaria, v. g. Bezoarticum Sola-
re, Antimonium diaphoreticum, & aliæ Diaphoretica, com-
pamantur: qui vult videre plura de Mercurio in Illiac Paſ-
ſione, videat RIVERII *Prax.* p. 456 Item HEINRI-
CUM ab HEER in c. l. RHODIUM l. 6. c. 1. obf. 10. &
in obf. HEINRICI à MOINICHEN, *Calce anarum.* Ly-
ſeri *anarum*, pag. 244. Et quidem, quòd Mercurius ſit me-
loſus Globulis plumbeis, patet ex FONTANO, qui in *Ca-
ſuſt.* & *Reſponſ.* p. 85. Illiæum Paſſione tandem Mercurii
ex curata reſert, poſtquam æger tres bombardæ Globales
ſine ſuccellu devoravit: Proximæ æque alicui Bz. ſed irri-
ſo ſuccellu; & cum illam doſim ſumere vellet æger, epi-
leptia ſuperveniente interit. Cravi tamen Mulierem
quandam verberibus læſam in capite, cum Febre ſuperve-
niente, pertinaçiffima Alvi Obſturbatione laborantem, cum
Abdomine hinc indurato, tumido & doloroſo, & præſentem
in Hypochondrio ſiniſtro tumore duro, unde mali cauſa,
ut tandem quoque ſingultire inciperet, quæ integras duas li-
bras Mercurii vivi ſuccellu deglutit cum ſalute. Cum
enim metuerem jam imminenteſcem Iſtium, die 14. Junii præ-
ſcripſi:

℞. Ag. Mentha. ℞.
Mercurii vivi depur. ℞. iij.
Olei Amygd. dulc. ℞. iij.

Miſta hauſt pro una vice ſine alteratione. Die 15. Junii:

℞. Ag. Mentha. ℞. iij.
Cinnam. ℞. iij.
Mercurii vivi purg. ℞. iij.
Olei Amygd. dulc. ℞. iij.

ſed iterum ſine effectu. Veſperi ſequens ordinavi Clyſma:

℞. Decoll. Flor. Chamom. ℞. iij.
Ag. herodill. ℞. iij.
ſal. Camma. ℞. iij.

Miſc. pro Clyſmate.

Sed omnia fruſtra. Die 16. Junii. Potio eodem Mercuria-
lis denud hauſta fuit: ſed fruſtra; unde dolor Hypochon-
dri ſiniſtri increſcebat, Abdomen durum evaderebat, & ſin-
gultus major. A meridie dedi:

℞. Ag. Mentha. ℞. iij.
Cinnam. ℞. iij.
Mercurii vivi purg. ℞. iij.
Syr. Rafas. Jalus. ℞. iij. M.

Hauſt fruſtra.

Interne ad emolliendas Foces præſcripſi:

℞. Purga. anarum. ℞. iij.
Qua calide crebrius Abdomen imungebat.

Die 17. Junii præſcribebam:

℞. Laſt. Jalus. ℞. iij.
Terebinth. cum vitell. Ovi ſol.
ſal. Tartari an. ℞. iij.

M. pro Clyſtere, qui pro duabus vicibus, ſed fruſtra,
applicabatur.

Potio Mercurialis proxima denud hauſta fuit mane, &
iterum de novo hauſta veſperi, ita ut ægra Bz. Mercurii
in corpore haberet, unde & varios motus in Abdomine per-
cepit: ſed Alvus elauſa manebat; ideò & eodem die Iſteſus
pro ſemicupio ordinatus fuit:

℞. Herb. & Flor. Chamom. M. vi.
Malva rec. M. iij.
Flor. Sambus. M. ii.
Rac. Lauri ℞. iij.

Coquebantur in Aqua.

Iſteſebat ægra, continuando intereſt ſemper litum Abdo-
minis cum Aſturgia aſerina.

Die 18. Junii. Iſteſus idem & Clyſma continuabatur.
Mercurius pertinaçiter in corpore ſubſiſtebat, ut & 19.
& 20. die. Hoc tempore dolebat collum, tumefcebat gin-
give, vacillabant denique, & Mercurio retento ſalvatio ſu-

perveniebat; unde pro faucibus, & collo leniendis

℞. Mell. roſati ℞. iij.
Syr. Violear. ℞. ad ℞. i.

Miſcebantur.

Pro Abdomine verò illiſſimo:

℞. Unga. de Arcticko. ℞. iij.
Olei Diſcultur. Quæſar. ℞. iij.

Miſcebantur pro Linimento, quo iungebatur Abdomen.

Die 21. cum eadem adhuc perſiſterent, & ultra oclium
Mercurius vivus in corpore hæreſet, pro faucibus duris &
tumore in Colo ſub Hypochondrio ſiniſtro emolliendo, cum
diſſo Unguento præſcripſi:

℞. Emplaſt. de Olenta.

Gum. Ammoniaci ſecti ſol. an. q. l.

Miſcebantur pro Emplaſt. quod maiusatum cum Oleo Tar-
tari ſorido, inducebatur ſuper alutam, & applicabatur in
tetro Hypochondrio.

Die 22. Junii:

℞. Decoll. Spor. Emall. ℞. iij.
Saliſ Cin. clavell. ℞. iij.
Mell. deſpum. ℞. iij.

Miſcebantur pro Clyſmate, læpis iterando.

Hiſ & ſimilibus factum eſt, ut podetentia ſoluta Alvus,
Mercurio ſuccelluſe in paucis quantitate apparene. Conti-
nuabantur Clyſmata, Unguenta ſuper diſſa, donec die 29.
Junii nocte ex improviſo ſedum copioſa Mercurio vivo
repletum fuerit; hanc pro Alvo aperta ſervanda, & Mercurio
ſi, fauces adhuc obſiſtent, eſciendo, die 3. Julii præ-
ſcripſi:

℞. Laſt. vetricin. ℞. iij.
Saliſ Cin. clavell. ℞. iij.
Mell. roſat. ℞. iij.

Miſcebantur pro Clyſtere, qui pro duabus vicibus applica-
batur.

Sed cum die 23. Julii adhuc Mercurii reliquia ſuperſe-
ſent, ordinavi Decodum Nephroleſis ex Rad. Enula, &
Famculi pro ſudore, item Bezoarticum Solare ſequenti
modo:

℞. Pulv. Bezoart. ſana. ℞. iij.
Bezoart. Solar. ℞. iij.

Miſcendo pro Pulvere.

Vamitui copioſe materiam viſcidam creberribus ſupervenit
ab hoc Medicamento, & ita continuata interne Juſcula,
externe Clyſmatibus, ſuccelluſe convaleſcit.

Præter hæc diſſa, ratione irritationis plura minis inten-
ſe, interne etiam præter Anodyna & Opia ſuper lauda-
ta, Juſcula pingua emollientia, quæ acrimoniæ tempo-
ret, & indurata emolliunt, uſurari ſolent; quærum hiſtoriam
videbitis in RIVERIO. Imprimis Juſculum Do-
coctionis Malvæ, aut Decodum Florum Meliſſi & Cha-
momillæ, item Juſcula Decoctionis Raparum, quæ & la-
nuant, & ſimul blandè obſterguunt; item Decodum Hor-
dei cum Melle & Nitro aduſendum. SYDENHAM c.
l. ubi de eorum ſymptomata, in principio Morbi pro ſiſten-
da irritatione, & compenſando Vomitu laudat ℞. Saliſ Ab-
ſinthii cum Succo Limæum allumpti, ſuperſingella ſubſi-
de Aqua Mentha: ac ſane remedium hoc non eſt contem-
pandum. Obſervavi in Illiac, quòd poſt hanc Potiunculam,
ad illius imitationem ſcriptam, & Vomitus ceſſa-
verit, & Dolor Abdominis multum remiſſerit.

℞. Ag. Mentha ℞. iij.
Spiritus Thoria. ſimp. ℞. iij.
Saliſ Abſynth. ℞. ad ℞. iij.

Syr. de Spina ſervina ℞. iij. ad ℞. i.

M. &

Potiuncula ſtomachalis contra Vomitum.
Hæc Potio multas mutandi ſuſpiciſ repetita optimum eſſe.
Cum in Illiac ſolet habere: Vel

℞. Ag. Mentha ℞. iij.
Cinnam. ℞. iij.

℞. Saliſ Abſynth. ℞. iij.

Laud. opiat. gr. ii. vel iii.

Syrapi de Spina ſervina ℞. iij.

Miſc. pro Potione, &

Potio ſtomachalis lenitiva.

℞. Ag. Fœniculi

Mentha an. ℞. iij.

Spiritus Thoria. ſimp. ℞. iij.

℞. Saliſ Abſynth. ℞. iij.

Laud. opiat. ſerm. gr. ii.

Syr. Fœniculi. ℞. iij.

M. D. S. ut antea.

Ca.

Capiatur coelestium.

℞. Aqua Femul.

Mentha an. ʒiʒ.

Carmis. cum vin. ʒi.

Spiritus Sal. Ammoniaci anisat. ʒiʒ.

℞. Opi ʒi.

Misc. & datur in principio, ʒ.

Potio Lenitiva, coelestium Iumenda.

Item spiritus Terebinthinæ à PETRÆO seu egregius commendatur ad stilendam irritationem. Commendatur etiam Theriaca in haustu Vini calidi generosi ad ʒi. assumpta, quando scilicet malum non est ab Inflammatione, multum prælat; item Syrupus Papaveris & similia. Vel

℞. Succin. Præpar.

Antimonii diapher.

Cinnabar. Antimonii an. ʒiʒ.

Laud. opiat. gr. ij.

Camphor. gr. i.

M. f. Pulvis, ʒ.

Pulvis Lenitivus.

Vel

℞. Cinnabar. Antimonii ʒi.

Dent. Hippoc.

Bezoard. mineral. an. gr. viii.

Camphor.

Laud. opiat. an. gr. ij.

M. f. Pulvis, ʒ.

Pulvis Lenitivus.

Vel

℞. Corn. Cerv. sine Igne,

Dent. Hippoc.

Cinnabar. Antimonii an. ʒi.

Sal. vol. Corn. Cerv.

Succin. an. gr. v.

Camphor. gr. ij. M.

Divide in ʒ. partes, ʒ. ut antea.

Si ab Inflammatione malum fuerit, post abstinentiam Alimentorum à RIVERO adeo commendatam, cætera paribus, Venerit profectus erit, tam in brachio quam crure, repetens, cum Clysteribus Emollientibus, Anodynis, ex Lacte cum pauco Saccharo, Emulagine Seminis Pylidi, & Nitro.

Vir juvenis corripiebatur Colica, ad quam alias proclivis erat, eaque Tachæ concitata, occasione Animi pudorem: perierat tunc per noctes ʒ. & ʒ. diem, hinc rhodissimum vehitur sub pessime viæ conditione acerbè dolens.

Die Mercurii vesperi cum rediisset, accedens, offendo illos de quatuor copulæ, viscidae, & biliosæ materiei Vomitus consequenter, cum totius regionis infra Umbilicum dolore, & ad tactum remittens: contumem autem doloris ausa ferre non poterat: Alvus utcuque fluida, pulsus celer, frequens admodum, magnitudine moderatus, durus, levis intensa, super manuum reciprocos. Sulpicabar Inflammationem Intestinalium in quadam Ilei loco, occasione dolorum & motuum in rhoda excitata: forsan ingressus quoque in quadam Ilei loco partis superioris in inferiorem simul aderat. Ordino Clystia, quo applicata spasmus manuum & pedum supervenit, recentum tamen per diu diem horum bene evacuavit. Interdò Effluentiam Theriacalem camphoratum cum medio Effluentia Opii præscripti his allendendam.

Die Jovis eadem adhuc omnia, saltem dolor remissus; interdebatur vero ariditas faucium & linguæ, sitis ciama, calor mediocris, &c. ex quibus cum superioribus signis colitis confirmabat adeo quendam Intestinalium tenuium in quadam loco Inflammationem: potum, nisi probè calidum, revomebat: quoties aliquid biberet, toties dolores recrudescere. Interdò eadem continuanda iussu una simul cum Potione analeptica cum Effluentia Opii, quam tamen subinde revomebat, interdum tamen quiescebat alterius horum somnolescent: extrinse Lixum anodyno-carmintivum applicui: sed omnia symptomata eadem. Inter alia

℞. Flor. Sulphuris ʒi.

Maxill. Lucii p̄ss. ʒi.

Laud. opiat. gr. i.

M. f. Pulvis pro duobus dosibus vesperis.

Aliquale levamen percipit, flatus & murrura infra Umbilicum angustantur, Clysmatia usui de Veneris vesperi, & die Saturi mane, Alvus laxata fuit. Pulveres continuati, mador subfrigidus cum pulsu supra descripto affligebat. Tandem appetente die Solis aliquoties liquamina Dercorea

feridissima evomuit cum insigni virium prostratione, ita ut perfectus Ileus adesset.

℞. Aqua Menth. ʒiʒ.

Spiritus Theriacal simpl. ʒiʒ.

Salis Absinch. ʒi. ad ʒiʒ.

Sir. de Spina cerv. ʒi.

M. pro Potione.

Cepit hæc, & Vomitus cessavit, nec de dolore Abdominis unquam amplius conqueffus fuit. A meriede potione ad imitationem SYMDENHAM L. a. præscriptam repetere iussu, & sanè nullo remedio in toto Morbi cursu, quin ab hac formula, melius & scilicet levamen perciperet potui; unde per plures noctes continuare iussu, simul ordinando Clystia supra allegata ex Oleo Rapum, Lini & Diacolocynthidis Quercetani, quod sæpius etiam repetitum non sine fructu fuit, & crebriores scæssus spontanei hoc inieci fuerunt, præsertim cum die Martis bina Poma Borsdiana succellive deglutivisset, hinc enim nocte sequenti copiosi scæssus facti cum flatibus depositi fuerunt. Inter hæc die Solis, Lunæ, & Martis æger de difficillima respiratione, & anxietate summa conqueffus, vi loquendi habens potentiam, & pessimo pulsu ac madoribus supra allegatis colliquisitis tandem frigidus, quin & singulis lobis imperviente, quoties nempe respiratio difficilis & præcordiorum anxietas remitterent.

Externè sedulo usurpavit Lixum, Laxato calefacto superimposito:

℞. Ung. Diabasis ʒi.

Olei Chamomill. ʒi.

distill. Jussupri,

Terebinthin. an. ʒiʒ.

Miscendo pro Lixamento.

Quoties Later calidus non incumbere Abdomini, toties potus habebat æger.

Diebus ultimis de Testiculæ sinistri superiora versus retractione convulsiva, item de Penis intra corpus retrocessione tali, ut parum emineret, conqueffus erat, Alvus fæ commode fluida erat: unde ex Inflammatione Intestinalium gangrenata mortem supervenisse arbitror.

Si ad Hernia, tradiderat scilicet Hernia Intestinalis reponendo ut suo loco videbimus: iam in casibus depressis cum telione quoque, vid. DURETUS in *Halleri Prax. cap. de Hernia*, PARÆUS L. 7. cap. 15. & BARBETTE *Anat. Præf. L. 4. cap. 2.* testatur quod RIVERTUS in *Praxi*, quoddam pedibus liberatus fuisse. Alias Clysteres acriter non negligendi sunt, dum ROLFINCIUS L. 7. *Compt. 3.* repetitis Clysteribus antimoniatas Femina Iliacam ab Hernia relictam fuisse refert.

Sim ad *Hernia*, res depressæ facit est, & Solis Emollientibus atque Laxantibus operandum.

Sim à *Gangrena*, est incurabilis.

Hæc interna, ad Ilei curam usitatis, etiam simul Externa, partim Alvi excretionem promovendi, partim Emollientia & suaviter Lenientia usurpantur.

Oleum igitur destillatum Chamomillæ cæruleum cum Pinguetudine Taxi, Anseris, Anatis, &c. permixtum, universo Abdomini crebrius illiendum: vel Galbanum *Parsellæ*, cum Unguento de Arthanis & Diabasis mixtum, & Oleum Chamomillæ vulgare, vel Anethinum, Disco. locynthidis Quercetani, crebrius illinatur Abdomini, linthea probè calefacta desuper applicando: e. g.

℞. Ung. Diabasis.

de Arthan. an. ʒiʒ.

Pingo. Taxi.

Olei Diacolocynth. an. ʒi.

M. f. Lixamentum.

Item ZACUTUS LUSTANUS L. ult. *Præf. num. 2.* Ob. 5. curat Ileum pertinacem ex usu Malorum Cotonorum induratis Facibus contractum, aliis omnibus irritis, per Stercus vacuum recens crebrius repetitum, toti Abdomini illinendum.

Si Dolor urget, quod est frequens symptoma, convenit Omeotum Agui caltrati recentissimè & calidè Abdomini impomere, autè enim sulet lenire dolorem & mitigare symptoma. Quiddam etiam Sanguinem Vespertilionis, tanquam specificum, Hypochondriis illinuit: uti etiam, & Exuvie Serpentum cum Oleo rosato decodit: Venti toti applicantur: vel fæ etiam Iuleis in Balneo Decoctionis Plantarum emollientium, ut beneficio Inflationis in Balneo relaxatio fiat, & compescatur Dolor: e. g.

℞. Herb. Chamomill. cum flor. M. iv.

Maius,

Mollis. cum far.

Parietis, an. M. li.

Rac. Juniperi Bb.

Incisa & cont. miscantur pro Balneo.

Applicatur etiam Cataplasma ex Pomis Borsdorffianis puris cum tantillo Croci; vel ex Stercore ovillo cum Lacte cocto.

Venter, & jam quoque Modestus, in casu, quo Intestina a copioso Stercore fuerint repleta, una cum praesentia Flaxum, applicatur Folium, & Flatus copiosus in Intestina iniecerunt, cum in finem, ut Flatus Intestina nimis distendentes Scybala istis impa in parietibus abscedere facerent & postmodum separata Stercora facilius per Clysmata, vel aliis modis, possint elici. Videre potestis hunc applicandi modum in EPIPHRASE I. 3. de Morb. Text. 35. § 24. (M). AMATO LUSITANO C. 2. Caput. 110. Item in RIVERII Praxi p. 456. ubi etiam in EPIPHRASE FERDINANDI Affer. 34. ZACUTUS LUSITANUS in l. 2. Praxi Admiranda Obf. 28. habet tale exemplum Ilei, ex usu nimio Olyae femicudum ob reventas Faeces per applicationem Follis curati; quae cura tamen nullius est usus.

Denique, cum omnia alia videntur frustranea, delibendum est, an audendum sit consilium RABETTE, quod habet in sua Annotate ad Praxi applicat. p. 148. qui dicit, aliis aliis purgantibus apertione Abdominis esse insitueudum, & manuali opera Intestinorum situm corrigendum.

CAPUT II.

D E

Expulsione contentorum aucta.

Quando nempe aut citius, aut caeteris, ut frequentius, aut copiosius, eliciantur copiosa Excrementa & contenta. In genere vocatur Alvi Fluxus, qui Alvi Fluxus pro Excrementorum varietate vario modo nocet, & varia sortitur nomina, dum distinguitur in Diarrhoeam, Lienteriam, Dysenteriam.

ARTICULUS I.

De Diarrhoea.

Communissimus Alvi Fluxus est, qui vocatur Diarrhoea, quae est Numerum variorum sibi mutua naturalium aut corruptorum diversimodis confusorum per Alvi fluxum copiosus effluxus, explorandum etiam habens: ex massa sanguinea, per fermentationem extremam segregata, & in Intestina amandata; hinc enim variis Diarrhoeis, quae sunt nunc copiosius cum Terminibus, nunc cum Flatuum protum, interdum sine illis, interdum in Intestino Redo Palatione, nunc Nivitis, nunc Sero, nunc Bile, nunc Viriditate, nunc Cruente, sine Terminibus tamen, nunc Purulenta, quando nempe Pus per Inferiora rejicitur, & qui sunt alii modi. Observata quoque sunt Diarrhoea Diagonalis & Oleosa Insular Butyri: vid. M. A. N. G. Ann. 2. Obf. 30. p. 15. Interdum Diarrhoea Lapidea, vel copiosi Lapides per Alvi fluxum excreci, ut refert SCHENKIUS in Obf. 1. ubi etiam habet exemplum Diarrhoeae tandem lethalis, in qua stipula Oculi, & Oculi, & quidem copiosius, fuerant excreta: etiam observata fuit Verminea & Fructibus horis corruptis: vid. HORSTIUS l. 4. Obf. 26. sed mitius has Diarrhoeas mirandas. Purulenta Diarrhoea speciatim oritur: ex praegressa reposita cupisum aut Abcessu aut Ulceris Meenteris, Pleuritidum, &c. Sic enim PARAEUS in suis Obf. ex Ulcere anum Pus per Alvi fluxum rejicitur: sic habentur exempla Diarrhoeae Sanae ex reposito Jecculo Abcessu: vid. BENEDICTUS SYLVATICUS Cms. 3. Conf. 19.

Præ cæteris observanda sunt diversae Diarrhoearum ratione Causarum fensique modorum: dum nempe Diarrhoea est vel Artificialis, qualis est Purgatio seu Catharsis per Medicamenta indurata, ratione veneni, alcalini; vel est

Naturalis extra Artem Medicam, sed ipso Naturae motu insituta: & hæc est vel Spontanea, vel non Spontanea, quæ sit Natura coacta, illa, Spontanea, quæ facili in corpore eadem famo excitatur, & nullum morbum præcedentem habet, quæ exoritur, quæ debent, vel ob Causam & errorem externum, ut v. g. Fructibus horis assumptis, seu Cucumerum: talia enim Intestina Diarrhoeam, quatenus in Stomacho fermentantur, & sic successe pellunt Fermentum stomachi, & Massam sanguinem fermentant, organum Bili excitant, qualis notissimus est: Hæc etiam pertinet Refrigeratio corporis nocturna. Vel ob internam materiam morbosam Metastasis, quando propter aliquam evacuationem suppresam sit Diarrhoea; qualis v. g. Pleuritidem in Senex legationis solvit; de quo v. PANAROLUS Prax. 1. Obf. 36. i. quæ quando Pleuritidis suppuratæ supervenit Diarrhoea Purulenta: Heque Diarrhoea cum euphoris relinquatur, quia sunt ad salutem ægri. Faciunt hæc Diarrhoea, quæ dicuntur oriri ab Hepate, Cerebro, Liene, &c. V. g. ZACUTUS LUSITANUS l. 2. Prax. et Admir. Obf. 22. refert Fluxum diuturnum cerebralem Cauterio ad Bregma indito curatum: idem l. 1. Med. Prin. 28. refert Alvi fluxum ex debilitate Brachii anius subortum, cu corroborato sanatum: sic refert RHODIUS l. 2. Obf. 24. insignem Diarrhoeam ex Urine suppressione natam, dum fuit repleta per Pancreas Urina, per Renes alias secretanda: sic Lochia suppresæ interdum excitant Diarrhoeam, Puerperis non infansibilem, ob materiam metastasam: similis Diarrhoea videtur esse illa, quam refert MEARA, Nibron, contra William in Nihilis Medicis Prax. pag. 132. de Diarrhoea Sero, ut ipse inquit, orinata ex Capite, quæ remotæ ex Massa sanguinea orta videtur, ut pote quæ quoties suppresæ fuit, toties copiosi Pediculi generati sunt, ipsa verò fluente, ipsi Pediculi avascebant: Sic SCHENKIUS l. 3. Obf. Diarrhoeam ex disrupto Lienis Abcessu notat: & SYLVATICUS l. 3. Conf. 18. refert Diarrhoeam Saniofam cum Febre & Jecculo Abcessu, ex Bubone sub Axilla.

Omnes hæc Diarrhoeæ saltem spontaneæ Naturæ motu, per metastasis nempe materiam, & variam ex uno loco ad alterum translationem sui motum, originem ducunt. Vel denique Spontanea Diarrhoea excitatur ob spontaneum humorum motum, ubi ex quacunque causa vitium Bili, ejusque sal volatile oleosum, ordinario infestis sit simul jurgi solit; quatenus regurgitat in Stomachum, epulse acida destruit, unde sanæ, fitis, & tandem Diarrhoea supervenit. Tales sunt Diarrhoeæ, quæ ex motu Diæta in peregrinationibus, item quæ tempore Verno aut Autumnali quibuldam sua sponte superveniunt Diarrhoeæ.

Non spontanea est vel Morbus vel Morbi Diarrhoea, quæ est Morbi est illa, quæ subinde ægros affligit, sine externa, sine interna occasione ratione, item quæ alterationi corporis post Fructus horis supervenit. Homiendi Diarrhoea interdum est vel Epidemica, quæ uterumque simul emagistra: alia non Epidemica seu Communis. Diarrhoea Contagiosa per halicum contagium multiplicatur, & simul est maligna, quæ interdum in acutis variatæ, symptomata gravia, & sudores frigidos sæpe habet comites. Denique Diarrhoea Morbosa alia est Accidentalis, alia est Habitudo: Accidentalis in morbis externis ex improvviso venit: Habitudo est, quando nempe quidam diu & subinde ad longum tempus habent Alvi laxationem, qui vel levi ex causa solutionem Alvi crebriam habent. Testantur Observationes, talem Alvi fluxum quosdam ad senem unum, vel aliquot etiam, assilisse.

Diarrhoeæ duntaxat, & quasi Habitudoles, quasi Catasphales sunt, adeoque in Cerebro Venteris oriri dicuntur. Vid. Pharus Med. p. 411. Item ZACUTUS LUSITANUS. Videtur hic Intestini Diarrhoea Serois noctis magis affligentes, Lympha præsertim Pæcreatica vixit exire: hic & ex Glandulis Intestinarum. Vid. & DEODATUS Valart. p. 30. semper tamen ad Ventriculi Digestionem lesam; cu fundamentum mali, hic respiciendum. Faciunt hæc ex Scorbuti virio Diarrhoeæ singulares, quæ subinde oriuntur. Vid. SENNERIUS l. 3. Prax. p. 592.

Diarrhoea Morbi, seu quæ contingit in Morbis, est non Symptomata, nunc Crises. Crises Diarrhoea sunt, quando in acutum Morthorum statu & declinatione materia coacta, seu siccis massis sanguineæ, fermento novo separet: &

(M) Lengi ob Hippocrati mitti abstinere, qui putant ad hoc opus Clystrem adhibendum esse annuo vacuum, cu induratum, ac pulsa cathartica retrahendum esse, ut per solium Flatus in Intestinis contentis feris alacritate: hæc enim graviter vel impossibilis, vel periculo plena forsage est. Evidentissimè rem exponit Hippocrates c. 1. dum ait: Follem hunc induratum, & in ventrem statim immitto, à quo & ventrem & Intestini contractionem distendas: deinde extracto Folle Clystrem adhibeto.

præcipitate, sero involute per convenientia loca struem & cribrata separantur, & ita conferunt per Intestina amandantur. Quo & pertinet *Diarrhoea Sanguinis*, utriusque, & quidem per modum Crisios affligentes: quales *Diarrhoeas* aliquot observavit RHODIUS in C. 2. *Obfer.* 85. ubi habet de *Diarrhoeis Sanguinis Criticis*, in Febribus ægros ad salutem vicinioribus: quales exemplum nullus æquum Authorum auctorit.

Symptomata Diarrhoea in Morbis est, quæ in principio aut incremento Morborum & Febrium Magnarum, ex turgescencia massæ sanguineæ fermentativa, limulque organo, & speciatim ex fermento maligno eam colligante, quæ periculosa, aut in Pthiſis vel in Hæclicis subinde oritur; quæ si non semper, saltem ut plurimum est maligna. Symptomata ista inter sunt primariæ *Colliquæfactions diarrhoeæ Fluxus Alvi colliquæfactions*, quando ægri cum pusca alimentia copiosissima varia excernunt. Oritur ex tale acerrimo volatili, unde Morbus acutissimus oritur, talesque *Diarrhoeas* præter Ardenſes & Malignas Febres, ut & Pthiſiales, imprimis Pthiſicos & Hæclicos vident: sequitur Pthiſicis ordinario aliquando ante mortem superveniunt; hinc & Pthiſicæ quæpiamlibet ab insecto Clymate saltem usuali, copiosas patiuntur dejectiones, & à levi etiam propinato medicamento indignerit evacuantur, seu simul admodum laeduntur: ob id simul causi in laxandis Pthiſicis. Colligativa dicitur, quia serosum partium nutritivum, ac ipsa massa sanguinea, ex texturæ mutatione ita fatiscunt, ut inſar liquoris serosi copiose per Alvum evacuantur, cum juncta notabili corporis emaciatione, virumque sensu prostratione. Sanè quibuslibet Tabidis, undecumque illi mali contrahitur, de facili talis imminet *Diarrhoea*. *Diarrhoeæ* etiam quædam observantur *Periodicæ*, per certum tempus affligentes, & redeuntis, sedque lo habita nonnihil cœchymerico, & debilitate fermenti Stomachi adſcitate. Exemplum habet FORESTUS in lib. 27. *Obfer.* 2. de *Diarrhoea* quædam spontanea, qua serosus & alii humores excrebantur, singulis ferè tribus mensibus recurrente, præprimis in obulosis humidis, præsertim Pepsionis, velociter: sic *Diarrhoeam* etiam Mesenteriam refert SCHENCKIUS à 3. *obſervationum*, quæ *Diarrhoea* declinante Læna cum variis torminibus afflicta, ita ut tandem ægrum etiam interfecit.

PARS AFFECTA.

Int. affecta ut cognoscatur, duo suppono.

1. Quod Excreta ista, quæ per *Diarrhoeam* rejiciuntur, non sint adhuc Intestinalia; nam interdum in ægris Excrementa ad 40. vices rejiciuntur. Certum ergo est, materiam hæc effluentem differre ab Intestina, partem ea Ventriculo ratione assempertum, partem ex Massa sanguinea, per Ductus tam Pancreaticos, quam Choleochos, ac Valvæ excretoria Glandularum Intestinalium. Unde si ita dicta Excrementa per Valvæ Choleochos magis transcolenter, & à Bile simul concitata magis tinguntur, sit *Diarrhoea dicta Bileſa*: si vero per Pancreatica Valvæ uberius materia effunditur in Intestina, aut per Glandulas miliaris, dicitur *Serosa* &c. sicut, si ipsa excreta paulo crassiora & viscidiora, ac minus tincta fuerint, & sic Chylus nondum assimilatus Sanguini esse videtur, dicitur *Diarrhoea Pithyſa*, quæ tamen vel ex vicio Chylificationis, vel ex vicio Intestinalium, quibus incipiens imminet Dysenteria, originem habet. Alias illa est *Diarrhoea* in radice.

2. Recrementa ista, quæ sub cursu excernuntur, antè non præexistisse in Massa sanguinea talia: siquidem tunc fabrosa Sanguini permixta esse haud potuissent sine fabroſa vitæ noxa, cum alias sani fuerint: sed fieri materialiter ex Sanguine corrupto per degenerationem.

Per ergo affecta, seu *Subſiſtum Radicationis* est imprimis Massa sanguinea, interdum turbata, & sub forma talium sedum corrupta. Subiectum *Dysmetabolis* sunt Intestina, quatenus per ea talis fluxus sit; & Stomachus, quatenus in hoc hæret causa occasionalis, sine qua fit nunquam *Diarrhoea*. Ex sic Intestina instrumentalis tantum & potè passivè se habent, massa sanguinea primario affecta nativè.

C A U S A E.

Quod Causas scrutabimur in eas, quæ *Diarrhoeam* morboſam inferunt, utpote cum exinde ceteræ species faciliè

judicari, aut earum bendi ratio explicari possit. Cum ergo omnis *Diarrhoea*, à quacunque causa dependet, sit Purgatio quædam naturalis, sive à causa externa sive interna oriat, sive Contagialis & Maligna sit, sive non; eodem planè modo se habebit, atque Hypercathartici à Medicamento vegetabili Purgante oriunda. Jam verò inferunt Purgantia Hypercathartici duobus modis: Vel

1. Irutando tanquam simpliciter Stomachum & Intestina, unde uberior liquorum qui in illis locis vel naturaliter transcolenter, vel transcolari apertati sunt, effluxus quod faciunt subinde Vomitoria. Antimonialia, Resine acriter Purgantia vegetabilia; item Mercurius sublimatus, item Vermes: vid. in RIVERO *Obſervat. Crit.* 2. *obſerv.* 38. Vel

2. Fermentando, & ratione salis volatilis acris, destruendo acidum Sanguinis nativum ac vitale, colliquæfando Massam sanguineam, speciatim Chylum quasi muscum, nec adeo periculis Sanguini assimilatum, unde patet colliquæfata, ex fermento & putrefactione redditis, sero involuta, per convenientes vias ad Intestina amandantur, idque per Ductum, partem Pancreaticum, partem Bileosum, in quibus transcolatorio modo eam à Massa reliqua separatæ & præcipitatur, ejiciuntur & expelluntur: uti fit à Laxantibus, Venis infusis, aut quando odoribus Purgantium, a-lilive similibus modis quidem porgantur, licet non levis copia per Glandulas miliaris in Intestina etiam tranſeat: vid. PECHLINUS de *Purg.*

Ex utraque etiam causa *Diarrhoea* quoque, & excessiva earum gradus, *Cholera*, oriri solent.

1. Ab Iruditione quidem: ut à Mercurio sublimato, aut Aqua forti, POTERIUS observat.

2. A Fermentatione: ut à Fusidibus horis, à Contagio fermentativo aliunde suscepto.

Ibi simplex Acrimonia rerum irritando, hoc malum inferit: ob id affectus sua natura levior est. Hic simul Fermentum præternaturali acridissimum adeſt, plus minus malignum, fermentando agens, turbans, & colliquæficans Humores & Massam sanguineam, & de iocis mutans; estque naturæ nunc acidæ, nunc volatilis: quod Fermentum acridissimum proferunt Fermentum Stomachi. Unde usquam observatur *Diarrhoea*, in qua non Stomachus semper simul fit labefactus. Unde ibi Temperantia imprimis & Opiata, hæc juncta Abſorbentia Sudorifica, plus minus acidum abſorbentia, conveniunt.

Confirmatur porro Causa *Diarrhoeæ* per Purgantia artificialia, quorum vis consistit in sale volatili acris alcalino-o-leoſo, quasi bilioso, quod testatur eorum fapor acris, amarus, nauseosus: unde omnia Purgantia inimica sunt Stomacho & Fermento digestivo, hinc fit quod saepe Purgante otis amatur, sitis, inedia, & alia putremata quæ in *Diarrhoea* & *Cholera* adſunt, sunt præterita. Hinc Purgantia corrugantur per acidam, quatenus destruitur sal volatile oleosum: sic & *Diarrhoea*. Quocirca ergo more Remedium Purgantium vel fermentando aliterat & colliquæfaceret potest Massam sanguineam, vel Intestina acris irritare & stimulare, est Causa ut oriat *Diarrhoea*. Unde per Præcipitantia Sudorifica, fermentationem in Sanguine præternaturali compescit, & hinc per Opiata, omnem humorum motum, simulque Irritationis sensum in Intestinis compescit optimè curatur *Diarrhoea*. Hinc Fruſtus horum tam facile excidant *Diarrhoeas*.

Ex dictis manifestum evadit, Causam *Diarrhoeæ* Proximam seu Occasionalem (supposito nempe ubique Spiritu impetum faciente esse Causa effluente, formali, proxima) esse Humorem acrem, seu potius minimè æquum Fermentum, nempe acre, vel irritans Intestina, vel inquinans ac plus minus colliquæficans Massam sanguineam. Fermentum istud acre volatili atque alcalinum, ac occulte acidum, specifiè tamen saporis, esse videtur, quod cum Bile, vel in Intestinis, vel in Folliculo selico, commixtum, talem testuram, saporis & naturam acquirit, quod Purgantium naturam seu crasim imitatur, & ita similem cum illi effectum producit.

Fermentum hoc sæpius quoque acidum esse, utilissima levantia persuadent: quæ præter Opiata, sunt Corallia, Terra sigillata, Cornu Cervi usum, Hiematites, & Martialis, Tormentilla, ejusque Extractum acre, Vinum abunthier, Oryza, item Puls Amygdalarum dulcium cum Lactæ &c. talia nempe omnia temperando, ac in specie corrigendo acidum infervient.

Justas has Causas Proximas, Causa interna Remota seu Occasio disponens corpus ad *Diarrhoeam*, nunc est Fermentum

tum Stomachi digestivum, nunc est ipse internus Naturæ per humores concitatus. Morus. Fermentum Stomachi, quando non debito modo se habet (nam in omni Diarrhæa est appetitus prostratus, quando autem appetitus redit, cessat Diarrhæa; si ed habet aliam adeoque vel debile, vel vitiatum est, hincque quod Cibum nec fermentat, nec Bilem digerit, iade subdit hujus culpam Alvius lui, eoque Fluvius excitatur. Unde quocunque Acidum spirituosum stomachale quocunque modo destrueret, e contra Bilem augere, vel in organum generatorem concitare valent, ad Alvi Fluxum disponunt; sicuti quorum potens est Stomachi Acidum elurium, a propriis Purgantibus difficietur laari solent, & rarius habent Diarrhæam; quia Acidum Stomachi destruit Fermentum acre alcalinum oleum, quod agitando Sanguinem, infert Diarrhæam. Ab interno Naturæ motu provenit Diarrhæa, aut per motum criticum, aut symptomatice; de quibus iam dictum. Accedit his simul habitus corporis, multum ad Diarrhæam promovendam faciens: nam si, qui densæ sunt texture, & cutis habet ipsissimam, adeoque parum transpirant, uti sepius quotidie egerunt, quim qui poros habent apertos, ita & illi Diarrhæam magis obnoxii, uti recte annotat GABELCHOVERUS *Coar. 3. Coar. 73. in Schol.* quia transpiratio inestibilibi impeditur, & turgescentia Sanguinis promovetur: propterea id, quod retinetur per Alvi fluxum solet deponi. Rationem in Glandulis Intestinalibus querere videtur PEYERUS *Tr. de Glandulis Intestinalibus pag. 86.* Hinc in quolibet Diarrhæa tam sedulo operanda, ut vel copiosiori insensibili transpiratione, aut tenuiori sudatione, corpus perscrutabile converteretur.

In specie ubique Causæ Antecedentes examinandæ, an ab errore externo? an verò ab interno Fermento, aut Contagio? an ab humorum Orgismo oriatur malum? Ea his etiam Differentiarum Diarrhæarum essentialium patet ratio: Est speciem Epidemicam plus minus Malignam aut Contagiosam, ea Fermento alcalino salino acris maligno, vel ex inquinamento alio Stomachi hostilibi, vel cum aere inspirato, vel cum assumpis ingesta, vel excretis ægrotum suscepit. Se consilium multiplicat, & primitus oritur. Diarrhææ Hæmorrhæica fundamentum in vitio Fermenti digestivi, ab assumptione alterata, & Bili a naturali crasi alterata, residet: illud non ritè digerit & subigit, nec tali corpori appropriat assumpta: hinc, nempe Biliis, nec ritè pericit & separatur eadem ab excrementis, quoniam potius mutua miscela sponsum acrem Intestina ardeant, & ad celosiem expulsiorem simulantes, acquirunt: quibus occasionebus & Ventriculus & Intestina adeo irritabilia successe exadunt, ut à levissimo objecto, v.g. ab ordinario Potu, ad excretorium motum seu fusi contrahantur irritentur. Viscera etiam, ut Hepar, Pancreas &c. & in toto soluta, Humorum translocationi occasione suggerere possunt, unde talia & fluunt, quæ alias retineri deberent. Diarrhæa Colliquativa fundamentum habet in deficiente plus minus Acidis stomachali, & acriori contra reddita Bile, unde partim Chylus aeris salis evadit, lotissima simulans, partim illa acrimonia falsa Mucilam sanguineam resolvit, colliguescit, et in sua textura facit in serosum salium liquorem abeat, quod per Glandulas Intestinales & Pancreas secretum sub tali Diarrhæa specie excernatur. Diarrhæa omnis Oleosa & Pinguis, si non est ab assumptione nimia Pinguium, oritur ex colliguescentia Progreddinis corporis, adeoque coniuncta est cum epulmodi macie & tabe lethali.

Quoad Causas Remotas externas, Diarrhæam excitantes, sunt partim frigidi Potus, partim ipsa Assumpta, facili fermentabilia aut corruptibilia. Nocum enim est, quod inter Assumpta Fructus horæ, item Cucumeres, Melones, Pruna, Uvæ, &c., utpote facili fermentescibiles, Diarrhæam inferant.

DIAGNOSIS.

Signa Diagnosticæ, quæ ex relatione ægri patet, antecedentia, & consequentia optima dant Signa: semper adesse Nausea insignis, & nuplimum Appetitus deplexus, Sitis e contra acta, & delectio Virium, interdum aliqua simul verant Tormenta, aut Mucura, vel Borborygmi, immedie scilicet excretionem antecedentia. Malo ingravescend tandem veniunt Præcordium anxiatis, Lithomyia, & Sudores frigidi, maxime circa frontem, tandem Mors, nisi maturaretur Cura.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*. In hac ante omnia exactè observandæ sunt Differentiæ Diarrhæarum: nam ea harum confidera-

tione, & cum viribus ac statu ægri collatione, manifesta & exere Prognosis.

In specie omnis Diarrhæa Critica Spontanea non nimia, si excernatur ea, quæ debent, idque cum euphoria ægri, salutaris est: in minimis, coetura: vid. HIPPOCRATES *Æphor. 2. l. 1.*

Nec recedenda est ea, quæ ab materis Metastasi, vel spontaneum Humorum motum, accidit.

Symptomata vero Diarrhæa in principio Morborum, aut etiam Morbis malignis cum excretionem cutanea iustis, superveniens, si non semper, cerè ut plurimum est mala: id ver. gr. Diarrhæa superveniens Peripneumonia, est pessima, & omnis talis Alvi Fluxus in principio Morborum superveniens, ut plurimum malus est: Quia (1) impedit Coctionem materis inestibilibi, seu legitimam heterogoeorum faciem separationem, per naturalem humorum fermentationem. (2) Quia Vires proleant. (3) Quia lobloqueum est febribi Conlutationem: id quod pator, quia rejecta tunc temporis ut plurimum sunt fortida. Ergo talis Diarrhæa Symptomatica semper sistenda, aut saltem ita cohibenda, ne sit nimia. Unde semper errant Medici, qui tunc Purgantia iudicari cæssant, quando scilicet supervenit talis Diarrhæa. Sed rectè dicit LINDANUS, ipios tunc necesse, quid sit Superveniens morbo? nam cum talis Diarrhæa superveniat, tantummodo Morbo propter summam materiam cruditam, eoque sepius malignam, non debet laudè irritari aut exasperari Purgamentis. Pertinet hæc & *Sell. 6. Aphorism. 5. HIPPOCRATIS, & l. 5. Epidem. Text. 4. & l. 1. de Morb. Text. 6. Longa Diarrhæa laborantis superveniens Vomitus, morbum solvit.* Hinc ubi in Diarrhæa habituali urgent Stomachi symptoma, nausea, vertigo, anxietates præcordiorum, Vomitus blandus insillatur: Item *Aphorism. 17. Sell. 6. Ophebolonia laborantis Alvi præstus eorpi, hæmum solvit.* Nempe sit tunc Diarrhæa ex metastasi: conf. GALENUM in *l. contra Juliam, cap. 1.* Item *Aphorism. 19. Sell. 7. Si Leptophlegmiam detente Diarrhæa superveniat, malum solvit:* et ex dicta omne tunc ratione: conf. M.A. N.C. *loc. 3. pag. 315.*

In quacunque Diarrhæa, quo magis valet Stomachi Appetitus, eo melius est, quo magis prostratus, eo peius: & redeuntis Rustici actus, vel rediens Appetitus, Diarrhæam declinantem innouat.

Omnis Diarrhæa Epidemica Contagiosa, est maligna & periculosa.

Omnis quidem Diarrhæa est periculosa: sed hoc non est univèrsale. Interdum Diarrhæa in habitioribus & succulentioribus medicioris est: interdum in Prægnantibus Alvi Fluxus usque ad finem partus sine noxa est. HIPPOCRATES quidem *Aphorism. 34. Sell. 5. dicit: Maliori intergenerati, si Alvi motum fluxu periculosa est, ne abortiat, quia spiritus delibantur, Fætas fit imbecillior, & inflat pondera jacet in Utero, Uterus in suo tono relaxatur, neque sufficiens est ad retinendum Fætum, unde irritatus convellitur, & dolorem habet, Fætumque excludit, unde Abortus.* Sed limitandus hæc Paragraphus: Si quidem rectè hic SCHULZIUS *Conf. 340. observat: Tibi, inquit, videtur fluxum ad fidendum indubitanter, (nempe in Gravidâ) ne multum ægri, servare enim nonnullas Prægnantes epulmodi vacatationes, quæ ad partum citra necem: aut contingit in utero frangit mei, inquit, quæ prægnans per quatuor menses, sanguineas dynterices itam tam valde intestinum passu est, ut nullo modo sanari possit, tandem exitulo facta est, & interitum, sponte sua interitum.* Vid. item P.L.A.T.E.RUS, quoad hoc punctum de Gravidâ in *obser. pag. 102.* Item de simili Alvi Fluxu & Dynteria Gravidarum RALLONIUS *lib. 1. Conf. 57.* Ubi ergo apparet, hanc Diarrhæam esse sine inflammatione, tunc salus comatus Naturæ, & tantummodo ratio Stomachi habetur. Ratione Excretorum notetur, quod magis hæc à statu naturali recedunt, adeoque quo deteriori conditioni fuerint, eo ceteris paribus Diarrhæa deterior habenda est: hinc si crassa admodum, aut alba, aut viridis, aut crocea, aut spontanea desiccatur, hæc omnia mala sunt: item mala est delectio pauca, glutinosa, alba, subspallida, lubrica: calidiora vero est nigra, sicut non semper, æruginosa, pinguis, livida, sticta &c., innunt enim hæc Fermentum Sanguinis colliguescivum magnum portendunt. Viscerolus quidem dururnior est, id nihilominus exitialis. Omnium periculosissima est Diarrhæa Colliquativa, & quidem semper in Morbis acutis: & si talis Tabidis aut Hæthici superveniat, plerumque lethalis est: & quibus Pthiificis, vel confirmatis, vel quibus capilli defluunt, ipse super veniunt Diarrhæa, semper est Colliquativa, & eodem ad eorum deducit.

In

In Diarrhæis Sudor & Urina ordinari ſuppreſſæ, ſi iterum copioſius profluant, de Alvi Fluxu ceſſaturo ſpes quædam illuceſcit.

C U R A.

Acce omnia conſiderandum: an & quæ ſit curanda? Id eſt, an telinquendus ſit Naturæ motus? an verb ſeſtinetur Cura? Si cædant Diarrhæa Spontanea quæ vitio Aſſumptorum, vel ratione Metaboliſæ materie morboſe evenit, cum motus Naturæ non corrigendus, niſi eacdet, indeque vires deſiciat: Item Critica Diarrhæa etiam curanda non eſt, nec turbidus ſaultus conatus Naturæ, ſed proſpiciendum faltem appropriatæ Stomacho, ut conſervetur appetitus, ne ſuperveniat ejus ſymptoma; ſi ſervantur enim tales interdum ſponte ceſſare: Imò interdum promovenda ſunt hæ ipſæ.

Curanda verb eſt, vel (1) Diarrhæa Artificialis nimia, five Hypercathariſis, ſi Criticæ copia egeruntur: de quo videatur WILLISIIUS in *Pharmac. rational.* p. 110.

Vel (2) Diarrhæa Spontanea, ſi exceſſiva & ex errore externo: In tali exceſſiva ſæpè conſueta ſunt ſuntia Stomachi ſymptomata, ut Nauſæa, Vomitus: ne proſtrant vires, aut ſuperveniat Cholera, maturè ſiſtenda.

(3) Diarrhæa ſymptomatica omnis, ſeu ea, quæ in principis Morborum, maxime ſcutorum, aut incremento ſupervenit, & conſueta cum proſtratione virium, anæſtætiſmus ægrotum, interdum cum ſyncope, qualis primariè remedia poſtulat, ſiſtenda & compedienda eſt.

(4) Diarrhæa Epidemica, aut Maligna Contagioſa curanda eſt ob periculum proſtrationis virium; cum ſæpè ſint lethales.

(5) Habituali Diarrhæa curanda eſt, quæ ob inveteratum Stomachi malum, aut Hepatis tumorem: hæc enim ad Tabem deducit ægrotum.

Quod ergo Meritum Medendi: obſervata Cauſarum remotione diverſitate, Diarrhææ quæ maxime curari debent, ut ſymptomaticæ & Epidemicæ, hæc Indicationibus levanter.

1. Fermentatio præternaturalis Maſſæ ſanguineæ compedienda, alioquinque Conſtentorum Colliquatio ſermentativa inhibenda, & Fermentum ſalinum acre, nunc ædium, nunc ſimul alcalinum, ſeu biſoſum, adeoque æruginoſum, deſtruendum, idque moderatè Acidis, Incaſtantiſantibus, & Adſtringentibus.
2. Blandis Sudorificis junctis Maſſa ſanguinea repurganda, ac fermentativa ſubſtantiæ eliminanda; ſi Curatio erit magis ſola lutea.
3. Acre irritans, quodcumque temperandum Abſorbentibus, vulgò Præcipitantibus diſci.
4. Irritationis ſenſus auctus Opia, Theriacalibus, vel ſimilibus ſopandis, adeoque hinc auctus Spiritum impetus, & eſſerus Humorum motus localis, iſdem ſiſtendus.
5. Blandè evacuada ſunt Excrementa, occaſionem ſubmiſtraſſa, ſi que ſunt.
6. Stomachus, quantum poſſibile, & Appetitus læſus, ejusque tenos plus minus reſolutus, apprimè reſtituendus.

Pro his ſcopis melius conſequendis ſequenti probè obſervanda ſunt Axiomata:

I. In quovis Alvi Fluxu, qualiſcumque etiam ſit, Ventriculi ſemper ſumma habenda eſſe curam; cum ſemper hic fit labefacturus: quæ magis enim fundio Stomachi appetitiva læſa, eo periculoſior eſt Diarrhæa; & Appropriatè maturè ſuccurrendum Stomacho: Imò certum eſt, Diarrhæam non poſſe curari, niſi Stomacho appetitus redeat & hæc calidus Potus & calidus Focis apprimè convenient: ipſi ſcilicet ægri obſervant, ſubito aque Potum ſaltem frigidiculis ingerunt, quod mox Alvi ſtimulus ſentiant: Item parvus Potus in quavis Diarrhæa convenit; cum FO-RESTO annotante l. 2. *aphor.* 4. bibendi abſtinentia omnem Alvi Fluxum maxime ſolvat (N). Pro reſoluto autem Ventriculi tone reſtituendo convenient Vinum & Vinola, Cydoniata / Mallicæ, & ex hæc parata Medicamenta, Vinum Abſinthiæ, Menthe, Cinnamomum, &c. reliquis Medicamentis admiſcenda. Calidi Focis ſunt varii, tam Sacculi, quales ſuprà circa Vomitus ordinati, quam Emplaſtra, præſertim ea Tacamahaca, cum Baſi-

Tom. II.

mo Peruviano & Aromaticis applicata.

II. In Diarrhæa ſymptomatica aut Maligna nullo modo purgandum. Peſſimus mos eſt, quod in Mædibus ægris, aut aliis in principio ſupervenientibus, Purgantibus veſtit ſuccurrere. Potius Diarrhæa ſymptomatica tractetur per blanda Laxantia, ſcilicet ut materia morboſa removeatur, Naturæque motus promoveatur. Diarrhæa omnis, illata ex turgentiſſimæ cauſæ morboſæ, vel Naturæ eſt: nam in tali ſe habet paſſivè, non adivè ut promoveatur Purgantibus. Non ergo ſymptomatica Diarrhæa irritanda eſt per Purgantia, ſed ſiſtenda aut moderanda eſt, ne fiat exceſſivè præternaturalis; quia

1. Impedit Colliſionem materie morboſæ, & ſeparationem legitimam.
 2. In principio acutorum Morborum Vires proſtrantur; &
 3. Eſt conſequens Colliquatiſſimum, quod patet, quod reſecta ſunt ſæpè livida, ſquida, ac horrida.
- III. In nulla Diarrhæa Epidemica Contagioſa maligna, & quidem in principio, ubi vires integre, & Aleaſpharmica, tam ædium quàm alcalinum Fermentum peccatis deſtruenda; & per ſudorem efficienda, primatum obinent: hinc Theriacalia, item Spiritus, & Eſſentia Theriacalis, Tinctura Bezoardica cum Opio, Antimonialia ſtra, Terræ ſigillatè primatum ducunt, ſpectatim ſi a Fermento præternaturali Humores ipſi ad colliquationem diſponantur: nam ſi à ſimplici Irritatione Inteflinorum eſt Diarrhæa, non æquè neceſſaria ſunt; unde in Epidemica pariter atque Contagioſa magis, quam aliis ſpeciebus, conveniunt: æger ſimul quæſtus, & in loco calido ſe continet.

IV. In nulla Diarrhæa in principio evacuatio per Alvi, ut quibſdam mox eſt, dum in principio dant Rhabarbarum, vel Symplicem Roſarum ſolutum, indiſtinctum, ſed ſiſtendus eſt efferveſcentium Hamorum impetus, quo ſalto, ceſſat Diarrhæa. Sufflaminato Humorum impetu, ubi, quod notandum, necceſſe fuerit, vel Clyſtæris blandis Alvi tractanda, vel blando Laxativo, aut Rhabarbaro aut Tamarindis, Inſeſſina adſurgenda, idque in caſu, quando adhuc hærent reliquæ incrementorum, quæ Inteflina irritant: conſ. hic SEPTALIUS in *Admæd.* & *Curr.* *med. l. 7. §. 49.* Potius ergo ſpæterius motus aliquandiu Naturæ erimus, quando non ſuccedit, & morboſæ Cauſæ poſſimilim rationem habeamus. Rhabarbarum tamen in omni Diarrhæa prodeſt, non præciſè ſcopo evacuandi: ut ut & hic ſubinde accidat, præſertim Dyſenteris ſed aliterandi Anodyno ſtyptica. Hoc in Dyſenteris, nimia Menſtruatione, Midu crenato, Hæmorrhoidibus, aſſeſſibus Inſtantem excrediſſima acida & pituiſis adeo præuocum exiſtit.

V. Utut Vomitus in Diarrhæa ſit periculoſus, tamen ubi Ventriculus maxime laborat, Inſiſtatur, cauſæ tamen, adeoque ubi in principio Diarrhææ, aut in ſtatu, maxime urgent Stomachi ſymptomata, nauſea, vertigo, anxietas præcordiorum, & exinde diſtortior evadit affectus: idque ex HIPPOCRATE *ſect. 4. Aphor.* 17. item *Aphor.* 15. *ſect. 6.* qui ſunt auri, & l. 2. de *rat. Viſit.* 15. 16.

Vir conſiſtentis ætatis, habitusque cæteriquam ſani, in leſione ante tres menses Diarrhæa ita inſeſſans eſt cum Appetitu proſtrato, ſiti & imbecillitate virium, qui curatur quidem quoad Diarrhæam per debita remedia, deſiciat ſubſolentis adhucum Appetitus, & pauca comedens qua libet tamen nocte quinque vel ſexies per Alvi rem deditur liquida. Malum ſimpliciter videbatur eſſe ex Cruditate Stomachi nidoreſa: ſiquidem omni mane patiens hæc ructus odoroloſos, præterea, quod ſignum fermenti digeſſivi depravati. De cætero exhibui Vomitorium, unde melius ad rempus habebat, ſed non diu poſt recidivabat pathemata, non tamen atrociter, Ea quibus pater, in Habitualiſus Diarrhæa, ea læſo Stomacho natis Vomitoria eſſe optima.

VI. Adſtringentia, quæ tali, non conveniunt in Diarrhæis; quid enim juvat ſtringere & ardere partes Alvi irritantes, & excrendam retinere, dum omnia adhuc ſunt in motu? Omnium Prædicorum reſſionia peribent, quod, ſi in principio morboſiſſimæ adheſione, aggravat morbum, dum ſimplicis metaboliſæ in aliam partem nobilem, ut ſuperpervenitum convulſionem, Febrium, & gravifſimorum ſymptomatum Abdominis ſupervenit metus: ſi enim ex Diarrhæa, Cydoniatis intempeſtive ſupplicat, Item lethalem obſervavit BALLONIUS: vid. BONETUS *Phar. Medic.* pag. 413. Nec Stomachus aut Inteflina tali laborant

O

lati-

(N) Hæc autem non adeo & perpetui verum eſt, ut obſervatum quoque non ſapiat ſit, Diarrhæas frigidas, largioribus Aqua potandis eſſe ſonantes: necpe rar, quæ ab acerbis ſalſisque humoribus diutius eximulentiſſimæ ſaltu, abundantiſſis, & frigidiſſis humoribus, quæ poſſet ſuccerem acritas diſui, & temperari, expulſionibus.

lasiante nimia, vel resolato tono, non magis scilicet, quam in Hypercathari. Non igitur, nisi in Diarthea duorum jam curata, pro primarum varum tono redintegrando, proprie dicta Adstringentia, Cydonia v. g. aut ex Mespila decumpe, conducunt. Cui autem lubet in principio hanc usurpare, adjungat semper Sudorifera. Cætera, quæ sapore Symplici plus minus impregnata sunt, v. g. Tormentilla, Terra sigillata, Corus Cervi ulmi, Saccharum Saturni, &c. non tam adstringendo, quam specifica sui textura saporem Fermenti vel Humoris peccantis corrigendo, adhibendo prodesse potius videntur.

VII. Ridicula nimis à quibusdam Medicis Viom prohibetur, quia peccet Bilis, vel adit Febris: ne ergo Calidis irritetur, interdum volunt, ut fed illunetur. Vinum enim in Diarthea est potus medicamentosus, quatenus est Ventriculo amicum, tam simplex generosum, quam medicatum, & viribus atteritis tanquam refectivum acribus est propinandum: Hypercathari enim seipse hauris calidi Vinum curavit. Sic Diarthea trimessem desperata Vino Rosmarini curatum refert WELSCHIUS *Hararog. l. pag. 29*: sic in Diarthea post Purgantia, post Fructum horum abusus, Vinum abstinens egregie confert (O).

Quoad Remedia, quæ conveniunt in Diartheis, opera danda est, ut

(1) Sit stomacho grata.

(2) Motum fermentativum Sanguini inducendum fiant per contraria.

(3) Sudorifera adhibeantur.

Inter hæc ex Regno Vegetabili primatum ducunt Theriacalia, adeoque Opium & omnia Opia: nam Opium quocunque motus & evacuationes corporis, præter ludorem, compellit, hæmorrhagias sistit, paroxysmos febiles inhibet, vomitus sedat &c., in genere omnes humorum motus, siue sanæ effervescentiæ, siue alicui, potenter compellit, unde semper cum Abstergentibus, Diaphoreticis miscetur Opium correctum. Propter hoc Opium Theriaca in Aceto allumpea expellendo ludorem est egregia, de qua, & speciatim de Electuario Diascordii, jam *supra dicti*, & consideracionem meretur effatum FORESTI *l. 2. c. 17*. Tales iuc meretur laudes contra quoscunque Alvi Fluxus, imprimis Cholericos, ita ut Veteres non satis illam potuerint laudare, cum maxime ab Opio vim suam habeat ludoriferam, alsumitur à St. ad St., egregie confert: & quidem quod magis est recens, eo potentius operabitur: compellit morcicantiam humoris & torporem inducit; quoniam minus ioficitur sunt Opii vires. Eadem Theriaca commodè etiam regioni nubilicæ & stomachi illinitur, siue sola, siue cum Balsamo Peruviano mista, aut etiam aliquot guttula Olei destillati Macis impregnata. Nobilis est Electuarium Diascordii *Fracastrii*, egregium planè. Ovi vitella bene cum albumine quoque ad duritiem cocta, cum Aceto rosaceo irrorata, & quæ aciculata, experimentum sunt præstantissimum HELMONTII in *Tr. Pyrenæ Reller pag. 184. §. 32*. aliquoties à me experiri etiam in Diarthea, quæ jam per quatuor dies pertinaciter Theriacibus resti terat, & nunquam fessellit: conf. M. A. N. C. *Ann. l. pag. 67*. Interdum addo Pulverem Nucis Moschatæ vel Macis. Sunt qui recipiunt Boli Armenæ & Nucis Moschatæ, ana, miscent cum uno altero vitello Ovi ad coquendum cocti, & ita sine Sale alsumunt contra Diartheas, quod experimentum est STOECKERI in *sua Praxi*. Malum Cydonium Cera impictum & altatum consuehant egregie convenit.

Quibusdam etiam, seu probatissimum commendatur Sevum hircinum (multa sanè latent in Hirci) quod liquefactum cum tantillo Farinæ triticinæ miscetur, ut fiat insular Pulmenti, quod Pulmentum subinde allupum laudatur inguenter contra Diartheam. Tormentillæ Radix, ejusdem Decoctum, & in specie Extrafactum ejusdem: Aqua quædam aut Spiritu Vini totum, præmissa, si opus est, levi Purgacione abstergeria, v. g. Rhabarbaro, Myrobalanis, unà alterave vice à St. ad St. usurpantur in convenienti vehiculo, ut Jusculo calido, Aqua Cinnamomi cum Vino cydoniato, Aqua Menthe, &c. egregium est in omni Diarthea & Dysenteria, tam benigna, quam maligna Epidemica, & omnibus aliis Medicamentis præcellit: addi potest si opus est, Laudanum Hyftricum, vel Laudani opiat gr. l. ad ij. Faciunt etiam huc Plantago, ejus Radix, & Semen, item Portulaca: quæ duo quocunque ratione usurpentur, egregia in Diartheis sunt; uti etiam Folia Myrti, Flores Balsallivorum, Lysimachia Bore luteo & purpureo, Diartheam to

specie compellunt Fructus aulteri, quatenus potest: quales sunt fructus Myrtellorum, Cydonia, Mespila condita, aut, quod præstat, cruda, & horum enim Succum cum Succo Persicæ imacolata mixtus, & tene igni ad tertiam partem inspissatus, maximum est remedium. FORESTUS *l. 22. Obser. 2*. aliquoties feliciter expertus est utrum Mespilorum in quibusdam, Diarthea continens labomenteria, qui aliis irritus, his Mespila fuerunt carati. Item addi potest non ineluctant Sorbus terminalia, quæ est egregium specicum in Diartheis etiam Epidemicis, item in diuturnis, quæ abluendo fructum horumorum supervenit: Folia habet insular Vitis, Germ. *Elei beer* vocantur: nota est Mullercula quam colligitur Fructus, dum incipiunt maturare, quodam tamen perfecte maturi sunt, & saporem asseruiculis habent, exprimunt Succum, & inspissant in consistentiam Rob, quod nobile remedium est in Diarthea: in prioribus annis, quod grassabatur Diarthea, aliis irritis egregie præstat: dosi Coch. j. in vehiculo quodam. In ejus locum etiam Rob Sorbi succupiat potest substitui: fed hoc est inferioris conditionis, ut egregie etiam conveniat Stomacho. Spongia Salicis calcificata, & ad St. data, in quibusdam fupparat commendatur ad Diartheas: hæc ipsa Spongia alia commendatur ad HARTMANNUM ad Cholera paucorum granorum dosi, si in Aqua quodam Syptica propinatur: sicut etiam St. Seminibus Sophiæ Chirurgorum, quod præstantius est, atque Semen Plantaginis supra laudatum. Retidum hæc Extrafacto Rhabarbari, aut etiam Rhabarbarum totum, scopi plus satifacit, adstringit, acrimoniam humorum temperat, & tunc temporaria potenter ludorem movet. Nux Moschata & Macis communia sunt, & omnibus quoque contra Diartheam remedia, eorumque Oles destillata intererit & externe conveniunt. Gelatione Coran Cervi St. in per ordinario diluola est admodum specifica in Diartheis, in specie epidemicæ grantibus.

Denique Cinnamomum, ex quo Aqua & Oleum est destillatum: præstat illi remedium ad Diartheam. Ulterius Malum Cydonium, ejusdem Succus rector, item Miva Cydoniorum aromatizata, & Cydonia quælibet sunt egregia in Diarthea quocunque, unde Miva Cydoionorum aromatica cum Theriaca mista, additis aliquot guttula Olei destillati Cinnamomi vel Macis, experimentum est sepius probatum LOTICHII in *Observationibus*; quibus si addantur aliquot gram Laudani opiat, erit Bolus eo magis efficax: Vel

St. Miv. Cydon. aromatiz. St.

Aqua Cinnamom. spiritus. St.

Terra sigill. St. vel Benzard. mineral. gr. xv.

Laud. opiat. gr. ij.

Olei destill. Cinnam. vel Macis gutt. ij.

M. D. S.

Potiuscula cochlearum sumenda.

Capiatur subinde cochlearium.

Itali Lignum Lenticinum, seu Lignum, ex quo transudat Maffiche, laudant, & ubi potest haberi iniqui pretio, est admodum elegans. Decodum huius Ligni potum iustingit notum est, in cuius locum Decodum Maffiches, siue Grammatæ ex Lenticlo secreti, quo stomachicum nobilissimum in quibusque Diartheis usurpari potest. Fuit secretum D. OSWALDI contra Diartheam in Aqua appropriata, vel Potu ordinario. Prescribit potest ita, ad imitationem nempe TILEMANNI in *Materia Medica*:

St. Aqua Plantagin.

Fol. Querc.

Tormentill.

Asaf. an. St.

Vel harum loco

St. Aqua simpl. vel pluvialis. Biss. vel Biss.

Maffich. et St. vel Stig. ad St.

Macis St.

Coquantur: Colaturæ adde

Aqua Cinnam. St.

Misc. pro Potu ordinario, S.

Potus pro aliquot vicibus.

Vel edulcoretur cum Rosulo Manno Christi perlata, vel Syrupus Maffichino, vel Cydoniorum præ Julio. S.

Jalap.

Qui crebro tepide hauriantur à STOECKERO enim & plurimis aliis egregie in Diarthea commendatur.

Potest etiam de Succo Cydoniorum sulphureo addi parum.

Loco hujus Decodi STOECKERUS impregnat Aquam

(O) Fitum quædammodum non semper Stomacho amicum, quippe quid in eo asetat, & chylificatorem turbet; ita non semper Diarthea remedium erit, præsertim si hæc à prænaturaali Ciborum aciescentia nati docet.

Aquam fumo Mafliches: ſcilicet adiciant Maflichen ſupra pœnas candentes, ſumum excipiant illa nova vitreata, & mox ollam ſumo bene repleant impleant Aqua ſimplici vel appropriata, hoc ſubinde repetant, donec ſubtilem Mafliches ſaporem aciculam Aqua contraxerit, que eſt Potus ſtomachici egregius conveniens in Diarrhæa & Dyſenteria. Inter Aquas appropriatas ſunt imprimis Aqua Tormentillæ, Pimpinellæ, Plantaginis & Portulacæ: ea ſiccis ſunt ſuccos Cydoniorum & Granatorum, Rob & Mûcus Prunorum ſylveſtrum, quod Rob commodiſſime loco ſucci Hypocifidis poſſet ſubſtitui. Aliis Aqua Chalybeata, item ſerum Ladis Chalybeatum, uti & Acetum Chalybeatum, convenit. Decoctum Graſorum Janiperi ſtomacho gratum & diureticum, laudatur à RIVERO; Urinum enim promovendo neceſſario Alvi eſt ſiccata: item Decoctum Cornu Cervi, Priapi Cervi, Ceti, &c. pro Potu ordinario aſſumptum, corrigendo & temperando egregie convenit in quibuſdam Diarrhæis, ſpecta tim epidemicæ graſſantibus, aut aliis contagioſis. ELLENBERGIUS, quondam Mediciſ Hallenſis Saxæ, pro Potu ordinario Menſi. Corregit, in qua decoit Sæcheri albi ʒiij. & Gummi Arabici ʒʒ, propinat. Poterit Terræ illæ minerales ſigillatæ, Bolus Armena, Terra Solaris in aurifodinis, que habet principium metallicum, ſulphureum acidum, ratione enus convenit figendo Fermentum alcalium, & promovendo ſudorem. Ut autem promoveatur, manenteſ cum ſpitiſu Vitrioli Martis: ſic naturam aciduſſimam acquirat, uti eſt in Lignore Scyptico: de quo ſuo loco dictum, qui præmiſſo blando Phoretico aptus eſt ad gutt. xx. Hinc Martialis, Crocus Martis & Terra Vitrioli daleis (eſt caput mortuum elavivatum) quatenus temperant quodcumque acre, & in ſpecie acida abſorbent, ſimulque vi ſudorifica poſſent, ſunt conveniſſima in quacunque Diarrhæa, in ſpecie, ſi cum vehiculis acidulis aſſumantur, aut cum ſpitiſu Vitrioli irrorentur, ſic enim magis adſtrictoria evadunt.

Inter Abſorbentia etiam ſunt Coſtallata, Cornu Cervi, Cryſtallus, Smaragdus; ſic nempe ZACOTUS LUſITANUS l. i. Med. Prim. Myſt. 22. & obſ. annexa Diarrhæam diuturnam & ingentem refert, ex Veneno ab amalia in cibo propinato, alius irritis per Smaragdum percuratam ad gr. x. in Coſt. Cydoniorum; ſic in Diarrhæis Bilioſis, nempe in Bile æcruoſa, & porracea diſſilis, Cryſtallum laudat iſte, quæ pro hoc ſcopo ſequenti modo præſcribere ſoleo:

ʒi. Cryſtall. præp. ʒiij.

Benzard. Martialis ʒi.

Land. hyſt. gr. iij.

M. C. Pulvis pro duabus doſibus, ʒ.

Pulvis pro duabus doſibus.

Facit huc ſimiliter Lapis Hamatites, qui quocunque Flamma Alvi inſigniter refrænat, tam Menſtrualis, quàm ex Saccharo Saturni & Viride Martis præparatus Artificialis, à ʒʒ. vel gr. xi. ad gr. xv. & ʒi. in Aqua appropriata: nam & ipſe Hamatites naturalis ex Marte & Saturno vim ſuam habet in ſiftendo ſanguinis fluxu, & compediendis etiam Diarrhæis: de quo vid. M. A. N. C. Ada. 2. obſerv. 33. p. 227. & GLAUBERUS pag. 6. Præparatio eſt genuina: nam Saccharum Saturni per ſe egregium eſt in Diarrhæa ab acrioribus humoribus nata, & à multis non incommode commendatur, in ſpecie in maligna & perniciosa Diarrhæa, & Dyſenteria, & in ſpecie imprimis excrementa ſunt nimis acria, miſtum cum Croco Martis adſtringente, non tam præciſe adſtringendo, quam vitioſos ſapores abſorbendo: Conf. POTERIUS Com. 3. a. 77. Com. 2. cap. 39. & 81. ubi gravia Alvi proſtrava Croco Martis proſtant curata.

Ea hæcenus diſſis plures concinari poſſunt Formulæ, v. g.

ʒi. Ag. Plantag. ʒiij.

Cinnamon. ʒi.

El. Diaſcord. Fract. ʒi.

Corall. rub. præp. ʒi.

Terra ſigill. ʒi.

Syr. Myrtin. ʒi.

M. f. Potio: ʒ.

Potio Adſtringens ſudorifica.

Vel

ʒi. Ag. Tormentill. ʒiij.

vel huius loco Plantag. & Portul. an. ʒʒ.

Acc. Vin. vel roſæ. ʒʒ. vel ʒi.

Blæth. Diaſcord. Fract. ʒiij.

Terræ ſigillat. ʒi.

Antimon. diapher. ʒi. ad ʒʒ.

Syr. Cydon. vel Syr. de Roſ. ſin. ʒʒ. vel ʒi. ad ʒi.

M. D. S. ut antea.

Cochlearim capiat æger probe reſtus in leſto; pro duabus aut tribus doſibus, ſudorem expectando: Acida nempe cum Terra ſigillata ac ſimilibus propinata, texturam aluminofam quali acquirunt.

ʒi. Ag. Menſch. ʒi.

Cinnamon. cum Vin. vel cydon. ʒi.

Acc. Vin. vel ſimp. ʒi.

El. Diaſcord. Fract. ʒi. ad ʒi.

Antimon. diapher. vel Terra ſigill. ʒi. vel ʒʒ.

Syr. Cydonier. vel Mûcus Cydon. anpat. ʒʒ. ad ʒi.

M. pro duabus doſibus, vel per intervalla 1. vel 2. Cochlearia.

D. S. ut antea.

Vel

ʒi. Ag. Menſch. ʒi.

Theriacal. Aug. vel Cinnamon. ʒʒ.

Spiritus Theriac. camp. ʒiij.

El. Diaſcord. Fract. ʒi.

Terra ſigill. ʒʒ.

Syr. Cydon. ʒi.

M. D. S.

Mixtura Adſtringens ſudorifica.

Uſurpetur pro tribus doſibus expectando ſudorem, capiendo doſim primam mane, alteram à meridie hora quarta, vel quinta, tertiam poſt mediam noctem, vel expectando alcerum mane.

ʒi. Ag. Menſch. ʒi.

Cinnamon. ʒi. vel ʒiij.

Extr. Tormentill. gr. viij.

Croc. Martis adſtring.

Land. hyſt. an. gr. vi.

Syr. Cydon. ʒʒ.

M. pro una doſi, ʒ.

Mixtura Adſtringens ſudorifica, pro una doſi.

Vel

ʒi. Ag. Menſch. ʒi.

Spiritus Mûri dale. ʒʒ.

Terra ſigill. ʒi.

Land. opiat. gr. iij.

Syr. Cydonier. ʒi.

M. ʒ.

Potimcula Adſtringens bene circumagitanda, pro aliquot doſibus.

Pro temperanda acrimonia humorum:

ʒi. Amygd. dale.

Sem. Papav. alb. an. ʒʒ.

Cum ʒ. q. Decoſti Corn. Cervi. f. Emulſio ad ʒʒ. adde

ʒi. Cinnamon. ʒi.

Terra ſigill. Albi.

Corall. rub. præp.

Corn. Cerv. aſſi præp. an. ʒʒ.

Edulcoretur cum Julepo Roſæ. ʒ.

Laç temperans bene circumagitandum, pro aliquot doſibus.

Vel

ʒi. Conf. Roſar. vitriol. ʒi.

Terra ſigill. ʒʒ.

Olæi deſtill. Mar. gutt. i.

Land. opiat. gr. i.

Cum Sympo Myrtin. f. Bolus, D. S.

Eleſtuarium Adſtringens, pro una doſi,

Vel

ʒi. Conf. Roſar. rub. ʒi.

Benzard. miner. gr. xv.

Land. opiat. gr. iij.

Olæi deſtill. Cinnamon. gutt. ii.

Cum Sympo Cydon. f. Bolus, S.

Bolus Adſtringens.

Vel

ʒi. Conf. Menſch. vitriol. ʒʒ.

Eleſtuar. Diaſcord. Fract. ʒʒ.

Terra ſigill. ʒi. ad ʒi.

Antimon. diapher. Martialis.

Extr. Rad. Tormentill. an. ʒʒ.

Cum Sympo Imperator. f. Eleſtuarium, aliquoties de die ſumendum doſi ʒi. S.

Eleſtuarium Adſtringens.

Mulier quædam corripiebatur Diarrhæa ſimplici, ſed tunc epidemicæ, cum varia & multiplici phlogi: primò die i. vel 10. vicibus ſecundo 40. vicibus deſcit: unde virum inſignis probatio, anxietas præcordiorum, inquietudo, &c. Vocatus à meridie ordinatus.

24. Terra sigillat. 3i.*Antim. diaphor.**Extrakt. Tormentill. cum spiritu Vini par.**an. 3ß.**Londæ. formos. gr. li.**M. f. Pulvis.**Divid. in 2. part. equal.*

Capiebant unam vespertī, alteram post mediam noctem in
rebusculo sequenti.

24. Ag. Scord.*Tormentill. an. 3i.**Cinnamon. 3i.**Spiritus Theriacal. camph. 3i. ad 3ii.**M. f. Suis.*

Cessabant hanc dejectiones, sed tamen nox inquieta absque
somo fuit.

24. Cor. Cerv. fœs igne.*Respard. Martial.**Extr. Tormentill. an. 3ß.**Theriac. gr. li.**M. f. Pulvis.*

Capiebant in illo vehiculo: cessantur ferè in totum dejectiones:
sed, utat se egeret, sudorem tamen nullum ex-
asperare possuit.

24. Cor. Cerv. fœs igne an. 3ß.*Extr. Tormentill. gr. v.**Theriac. gr. li.**M. pro Pulvere.*

Dormivit bene, nonnulli sudavit. Mano conquirebatur de
infigni crisi præcordia molesta, & dolore compressivo: E-
rgo contestorum adhuc recurremorum circa primas
vias, sed per ista remedia ab excretionis cohibitorum. Hinc
24. Spiritus Carnis. de rub. 3ii.

Dosis gutt. 40. bis in die.

Passiones hysterice supervenerunt, ab istis nempe retentis
occasionatæ, quæ tamen sequenti mane per teras dejectiones
alvinas spontaneas fuerunt levatæ: unde continuato spi-
ritu curata est.

In Diarrhea Terminata cum copiosis fecibus nigri-
cantibus, appetitu prostrato, siti intensa &c., primo ad ab-
stergendas Primas vias, & ad removendas, si quæ adhuc
sedes, & temperandæ simul alium impetum humorum;

24. Cor. Cerv. fœs igne.*El. Diaphor. Fracast. an. 3ii.**Rhabarb. li. 3i.**Corall. rub. prop. 3ii.*

Cum. l. q. Symp. Corall. Rosæ. f. Electuarium.
De qui capiebant læpiti pro lubitu: cujus usu cum immi-
nueretur quidem nonnulli Alvi fluxus, non tamen peni-
tus sicciteret, ac Tormenta simul urgerent.

24. 3ß. Tormentill. 3ii.*Opil. 3ß. ad 3i.**Miscendo.**Dosis 40. gutt. bis vel ter in die.*

Denique Ovum ad duritiem coctum, cum Aceto rosaceo
profuit.

Tandem in Diarrhea Epidemica maligna, cum modo di-
ctis semper Alexipharmaca sudorifera præcipuis usurpan-
da erunt, quæ etiam conducunt in quacunque Diarrhea;
nunquam enim Diarrhea sine sudore curatur (P). Sudori-
feria sunt Antimonia hia, aliaque sparsa cognita: miscen-
da tamen semper Appropriata: cum spiritu Theriacali con-
jungatur spiritus Mastiche, cum Terra sigillata, Sal vo-
latile Viperarum & similia. Superius anno, cum grassaretur
hic Diarrhea Epidemica, non absque applausu Medenti-
um, aliquoties alium vidi egregium hujus Pulveris, etiam
ubi jam adesset delirium:

24. Terra sigillat.*Antimon. diaphor. an. gr. xv.**Pulv. Mastic vel Nuc. Mastic. gr. 4ß.**Sal. vol. Viperar. gr. vi.**M. f. Pulvis pro una dosi: 5.**Pulvis Adstringens.*

Cui interdum Laudan. opiat gr. i. vel ii. addi possunt,
Usurpat in l. q. Vini acidoli.

24. Terra sigill. vel Cor. Cerv. fœs igne gr. xxiv.*vel 3ß.**Extrakt. Tormentill. gr. xv. vel 3i.**Sal. vol. Cor. Cerv. gr. vi.*

M. pro duabus dosibus, vel robustiori pro una dosi, cap-
tando sudorem: cui etiam Laudanum opiatum, vel Ex-
traktum Theriacale in debita dosi addi possit: 5.

*Pulvis Adstringens.**Vel***24. Ag. Plantag. vel Tormentill. 3ii. vel iv.***Gelat. Cor. Cerv. 3vi.**El. Diaphor. Fracast. 3ß. vel 3ii. ad 3iii.**Antimon. diaphor. 3i. vel 3ß. ad 3ii.**vel Respard. Martial. 3i.**Extr. Tormentill. 3ß. ad 3i.**Syr. Cydonior. 3ß. vel 3vi. ad 3i.*

M. pro duabus dosibus, expectando semper sudorem,

*D. 5.**Potio Adstringens pro duabus dosibus.**Vel***24. Ag. Menth. 3ii.***Cor. Cerv. fœs igne 3ii.**Respard. Martial. 3i. ad 3ß.**Extr. Tormentill. 3i.**Syr. Cor. Anar. 3iii.**M. pro tribus dosibus, 5.**Potio Adstringens pro tribus dosibus.*

In eadem Diarrhea maligna Gelatina Cornu Cervi soluta
& Potui addita, semper egregium habuit effectum.

Vir quidam gravi Diarrhea maligna decumbens, &
junctis Febrilibus symptomatis, cui inter alia optime
profuit.

24. Ag. Menth.*Scord. an. 3ß.**Cinnamon. 3ii.**Acet. Vini 3vi.**Theriac. Androm. 3ß.**Respard. Martial. 3ß.**Syr. Cydonior. 3iii.**M. f. Suis.*

Capiebant pro lubitu, & ad diaphoretic corpus disponebat;
hic viellam Ovi durum cum Aceto assumptis. Interdum
interpolatis vicibus Clyster ex Lacte ordinatum fuit, propter
Tenaculum similiter graviter urgetem.

In Diarrhea à Vomito, per incitum potu, laudatur Sma-
rgidus ad gr. xli. in Cont. Cydoniorum assumptis. Ut verb
stomacho simul succurratur, optime ipsi conducunt Cydo-
nata, speciatim Vinum cydoniatum, pro lubitu subinde
hauriendum. Vel fit Mislura cydoniata, urgete fœi sub-
inde coelestium loci Julepi haustenda, intermedio relinqui-
tam remediorum tempore.

24. Ag. Rabi Idæi 3ii.*Cinnamon. cydon. 3i.**Succi Cydon. 3ß.**Spiritus Virens Martis gutt. vi. vel Spiritus Sa-**lis dole. gutt. xv.**Syr. Cydon. aromat. 3vi.**M. D. 5.**Potio Comfortativa, sive Mislura stomachalis.*

Item pro scopo stomacho succurrendi conducit Haustus Vini
generosi, item Vitellum Ovi cum Aceto.

Interdum contra Diarrheam prævalent Theriaca, imprimis
peccet, Venericulu vel Umbilicali regioni impolita & illita,
vel sola, vel cum ana Balsami Peruviani, aut Olei destil-
lati Mastiche mista, quæ irrorentur aliquot guttis Olei
cupissimæ destillati, in specie Macis: sicuti & Balsami sto-
machalis ordinario conducunt. Item Fomenta, parata ex
Aromaticis, Abiesino, Mentha, Melissa, Caryophyllis in
Vino decoctis, & ita regionem stomachicam & Umbilicalem
cum linteis applicatis: Item Olea destillata aromatica Macis
& Mentha, Carvi, &c. extenuatis illita: v. g.

24. Theriac. Andr. rec. 3i. vel 3ii. ad 3iii.*Olei destill. Ess. Junip. vel Menth. 5ß. & 3i.**ad 3ß.**Caryophyllor.**Macis, vel Nuc. Mastic an. gutt.**iii. v. vel vi. ad 3ß.**M. f. Linimentum, 5.*

Unguentum ad ungendum stomachum, & Ventrem,
stomacho, & Umbilico illatur, impendo Latereum ca-
lescentum. Convenit quoque Crusta Panis tosta cum Vino
austro vel Aceto ebria & imprægnata, & Pulvere Nucis
Moichatae, Caryophyllorum alperia, calidè admoveatur
stomacho: Vel

24. Form.

(P) Natus scilicet prævalentia Antimoni, nunquam Diarrheam sine sudore curari. Qui Febriles supervenientes Alvi fluxus, solent
suppressionem sudoris superveniente cessare; verum qui sine febre vexant, superveniente aliquot alio sudore finiantur.

34. *Form. acri.* 3ij.
Pulv. Fol. Menthae 3j.
Zedair. 3j.
Caryophyll.
Galanga.
Zingiber. an. 3ij.
Acer. rosae. q. l.

M. l. Capsula, liliendum lieto, S.

Emplastrum Adstringens singulare.

Item Balsamum seu Linimentum factum ex Oleo Macis distillato, & Oleo Menthae & Carvi distillatis, & cum l. q. Olei Nucis Moschatae expressi fiat Balsamum, Stomacho & Umbilico liliendum: c. g.

35. *Olei destillati. Menthae* 3j.
Zedair. 3j.
Caryophyll.
Cinnamon. an. gutt. li.

Cum l. q. Olei Nucis, super l. Balsamum, S.
 Balsamum Adstringens.

Quando opus est leni Intestinum absterfione, tam in principio quam declinatione, tunc imprimis usitatum est Rhabarbarum, idque nunc in subdantia ad 3j. cum Conserva Rosarum usurpatum; vel Rhabarbarum totum ad 3j. vel 3ij. cum Pulveris Nuc. Mosch. gr. v. vel viij. usurpatum vel in forma siccis; vel cum Symplo Rosarum solutivo: vel Symplo Rosarum solutivum propinatur in Decocto Hordei, cui additur 3j. prater propter Terrae sigillatae: c. g.

36. *Rhabarb. el.* 3j. vel 3j.
Nuc. Mosch. gr. viij.
Land. hyss. gr. liij.

M. l. Pulvis, S.
 Pulvis abstergens.

37. *Rhabarb. raffi* 3j.
Cortic. Myrabal. citr. 3j.
 Cum Conf. Rosar. sat. Bolus, S.

Saccharum Solptivum.

Vel etiam detur blandum Decoctum Tamarindorum, quod suavit Alvim laxat, & Stomacho amicum est. Sed non conveniunt Salia, nisi in declinatione pro reliquis exterminandis, vel in principio, quando semper excernenda varia, vel in primis viis congesta sunt, vel ad hanc loca alione de moventur, vel quando ex Fructibus horum malum recum natum est: tunc aut remaneantur fordes horum locorum, ne ab illis suppuratur, vel retardetur via Appropinquans Remediis, in principio blanda talis Absterfio locum habet.

Clymata etiam Anodyna ex Lacte in tali Intestinum relaxatione, in specie, si in crassa fuerit malum, optime conveniunt: quoniam tunc habetur indicatio, quando crebra, & tamen parvis, deiciunt acri, peccante magis humores, quam copia excernendorum.

38. *Lact. Chalybeati* 3vij.

Yussil. Ovi N. l.
Olei Chamemill.

Mellis rosae. an. 3j.
 M. l. Enema, S.

Clyster Leniens.

39. *Flor. Chamemill.* M. ij.
Verbasci M. j.

Rad. Althea 3j.
Sem. Cydonior. 3j.

Coqu. in l. q. Lactis vaccinae
Colat. 3vij. addo

Theriac. 3j.
Terebint. cum vitello Ovi sol. 3ij.

M. l. Enema, S.

Clyster Leniens.

Si si acrimonia oriatur dolor in Ano, & excoctio Intestini Refti & Podici, confert Clyma ex Lacte, vel simpliciter vel chalybeato: Item Focus ex Lacte calido, cum Spongia applicato: vel Lactis Decoctum cum Floribus Verbasci, Chamomilla, Folis Hyofcyami &c. applicetur.

Naperrime sub cura habui Chirurgum, qui lotra sa. horas ultra soo. vicea sellaro coactus est, cum appetitu Stomachi nullo, pulsa crebriori, forti tamen & robusto: Huic tandem, postquam in causas antecedentes inquisieram, & agrum ultra sepeperam in Hypochondrio sinistro dolorem obtudum, qualis illis Spleni tribuitur, percepisse auidem, praescriptis Clyma ex Lacte chalybeato cum Terebintina, eo quod parum quidem, sed saepius deiecerat; quo premisso, ordinavi buae Pulverem:

40. *Corn. Cerv. asii* prop. 3j.
Hamaui. prop. gr. xv.
Terra sigillat.
Nuc. Mosch. an. gr. viij.
Land. opiat. gr. ij.
 M. l. Pulvis.

Divide in duas part. equal.

Huius aeger accepit dosim unam, hinc Diarrhoea cessavit adeo, ut post hunc saltem his deiecerit.

Si ergo praesumptio fuerit humorum Acrimoniae peccantis, Clymata Leuientia locum habent.

Atque haec in genere pro Diarrhoea Cura.

In specie jam consideranda sunt Diarrhoearum Differentiae, de quibus, an & quales sint curandae vel relinquendae, ex supradictis patet Nempe (1) Artificialem, (2) Spontaneam ab errore aestivo, (3.) ex Humorum Metastasi; (4.) ex Humorum spontaneo Motu, & (5.) Criticas non esse curandas, sed relinquendas, nec Naturae motum turbandum: quin spectatorem saltem agete; & si deiecere videatur, moderate stimulare.

Sin vero tales Diarrhoeae futurae sint nimiae, adeo ut ob Ventriculi vitium hinc laesi ejus Fermentatio, vel Bilis defectus, aut eius corruptela, vel Intestinum irritetur, aut facilius irritabilitas hinc accendat, sit, sitenda venient moderate.

Indicium, quando curandae vel non curandae sunt tales Diarrhoeae, praeter dicta imprimis suggerit Ventriculi Appetitus, & Coctio, quibus salvis, nil nocet Diarrhoea. Sananda igitur sunt.

1. Diarrhoea modicior, si sint Nymia.
 2. Diarrhoea Morbus, tam simplex quam Epidemica.
 3. Diarrhoea Symptomatica, praeteritam Caliginatam.
 4. Diarrhoea Habituali.

Quibus omnibus generalis ista cura applicanda venit.

In specie in Diarrhoea Artificiali, si sit ex Hypercatharsi, conveniunt (1) Narcotica, quae sensum irritationis tollunt, & inde natos quoscunque humorum motus sistunt, ut Opia; hinc Theriaca, & Elethuarium Diacordis cum Aqua cinnamomi usurpatur. (2) Diaphoretica terrea, quae humorum transfectionem compellunt, & acrimoniam temperant: v. g. Terra sigillata, Antimonium diaphoreticum, Cornu Cervi sumo igne, item Hematites vulgares, vel artificiales, cum Saccharo Saturni & Vitriolo Martis; Hematites enim est filius Saturni & Martis; hinc Vinum Rhenanum generosum, speciatim Vinum abinthites, item Spiritus & Essentia theriacalis, sive per se sive cum aliis, c. g. Essentia Anodyna, multa egregia est in Diarrhoea ex Hypercatharsi.

41. *Antimonii diaphor.* gr. xij.

Terra sigill. 3j.

Land. opiat. gr. ij.

M. l. Pulvis.

D. S.

Pulvis Adstringens.

Vel

42. *Theriac. Androm.* 3j.

Cornu Cerv. sumo igne gr. xv.

Cum Spiritu Menthae l. Bolus, S.
 Elethuarium Adstringens, pro una dosi.

Vel

43. *Aqua Mosch.* 3j.

Cinnamon. cydon. 3j.

Spiritus Theriacal. camphor. 3j.

Antimonii diaphoret. 3j.

Land. opiat. gr. ij.

Syrup. Cydon. 3j.

M. S.

Potio Adstringens.

Vel

44. *Aq. Tormenill.* 3j.

Spiritus Theriac. camph. 3j.

El. Diac. Frac. 3j.

Beccard. ferriat. 3j.

Syr. Cydon. 3j.

M. l. Potio, S. ut adest

Aeger in lecto calido detineatur.

Abdomini, imprimis regioni Epigastricae, Emplastrum ex Theriaca imponatur: vel Focus ex Decocto Abinthii, Menthae, cum Aromatibus in Vino decoctis.

Quod si Tormina, aut Alvim egeredo conatus adsint, Clyma ex Lacte tepido, in quo Theriaca dissoluta sit, injiciatur, aut etiam Clyma ex Valnerarii monnihil adstringens & blandè abstergens, Confer. M. A. N. C. Anno 3. Oct. 301. p. 325.

Diarrhoea.

Diarrhœa nimia ob Errorem externum. v. g. Fructus hofnos, &c. per Abfciencia & Figitia fiquit.

℞. Corall. rub. prop.

Corn. Cerv. affi. an. 3℔.

Noc. Mafchat. gr. xij.

℞fen. Opi gut. ar.

M. pro duabus dofibus, in bauftu Cypergæ calide, vel ℞. ni abfciencia calidi affumendis, S.

Pulvis Adftringens.

Vel

℞. Terra figill. gr. xij.

Corall. rub. prop. gr. v.

Lead. opiat. gr. ij.

M. f. Pulvis: S. at anted.

Vel

℞. ℞. Menftr. 3℔.

Opi 3℔.

Olei diffillat. Cinnam. gutt. xij.

M. S.

Effentia Adftringens.

Dofit gutt. 45. ad 30.

Vel

℞. Aqua menth. 3℔.

Cinnam. cydon. 3vi.

Spiritus Thoricat. camphor. 3℔.

Corall. rub. prop.

Corn. Cerv. affi. prop. an. 3℔.

Lead. opiat. gr. ij.

Syr. Cydon. cramat. 3vi.

M. f. Pois: S.

Potio Adftringens.

Capiatur coctilem, expellendo fudorem. Vel

℞. Theriac. 3℔.

Terra figill. 3℔.

Cam f. q. Syr. vel Esset Cydonior. f. Bolus.

D. S.

Bolus Adftringens, pruna dof.

Vel

℞. Confer. Menth. viticlar. 3vi.

Corn. Cini com.

Diaxam. cum Aromat. an. 3℔.

Terra figillat. 3℔.

Confilt. Alkerm. 3℔.

Cam Mva Cydon. f. Elufuarium. D. S.

Elufuarium Adftringens.

Si ex Metafis nimia fufura fit Diarrhœa, radix mali eff quellenda, & præfentim cum Catarhœ tali Diarrhœa fuit obnoali, præfentim nodurna, ut rectè innotat BALLONIUS: vid. BONETTI Rhazet Medic. pag. 411. (unde & à Cerebro Veneris talim Diarrhœam deducunt, fed male) Avertentibus, & aliorum Derivatibus, adeoque Velicatoris aut Foficulis Diarrhœa talis erit lenienda. Egregia Obfervatio talis Diarrhœa Catarhœ vocatæ. Egregia Velicatoris eraturæ, videbitis apud ZACCUTUM LUSITANUM.

Diarrhœa ex Spontanea Hæmorum Motu abali, patitur ne ca, quæ ex Errore careto oritur tractanda, Ventriculo imprimis fuccurrendo: nbi Amara, ut Abfinthium & Theriaca, fpeciatim conducut: Vel

℞. Rad. Ari 3℔.

Termatill. 3℔.

Piperis 3℔.

M. f. Pulvis.

Dofis quantum capit cultelli culpis in Vino.

In Diarrhœa quali Hæmorrhœa, ad aliquot annos durantibus, conveniunt interne imprimis Martialis quæcunque, & Aromaticæ Stomacho grata: imò Theriacæ. Sic RIVERIUS l. 2. Obferv. 47. mentioem facit Alvi Fluxus per octennium duntaxat, Thermis curati: quibus ipfa Thermis etiam curatus fuit alius Alvi Fluxus diuturnus, cum Ulcerebus conjunctis tæte eodem, citato loco, Obferv. 49.

Colligarius Diarrhœa vix, nifi curato primario Morbo aufertur poterit: interim Temperantibus ac blandè Adftringentibus ulterius ejufdem progreflus, quantum poffibile, cohibendus.

ARTICULUS II.

De Cholera.

SUMMOS Diarrhœæ gradus, & qui rarè abique malignitate exiftit, eff Cholera (3), illa tempe affectio, quando, cum jammo impetu & fingulari violentia varia fordes recrementofa, tam fursum per Os, quàm deorfum per Anum, expurgantur, concurrente fimul Ventrici ac Inteftefione dolore, plûs nimis vehementè, inflatione & diftentione Hypochondriorum, cardialgia, fœti, pulfa celeri & frequentè, interdum parvo, insigni præcordiorum anguftia, nec raris intervenientibus lipothymis, fuperveniunt inquietudo & jectigatio, partium extremarum frigus, fudor frigidas, imprimis circa frontem, & proflatio ftricta, tandem quoque adveniunt fingulas & convulfiones, prædromi lefitalitatis.

Omnia hæc fymptomata fune atrociora, prout Causa efficiens occasionalis acrior, & malignior exifterit. Mafum acutum hoc à Diarrhœa differt fecundum quatuor, & minima, nulloque fui præcedente præfigio fubfequitur: altera 2. vel 3. dies non durat, rarè ad quartum fæpi fufinefione exiftit, & dicitur Cholera Minima, in qua variis fucci, aut acres, nunc infipidi, peccant. Nam præter hæc etiam Cholera Sine a datur Mafia nempe, in qua litem Fatus copiofi fuprà & infrà, vel per utrumque guttur, eructantur, frequentè in lipothymiam cedens, ac in Hypochondriaciâ fufinde obfervabilis.

Hæmida Cholera eff, quæ jam confiderata venit, cujus Causa eff eadem cum Causis Diarrhœæ, nifi quod gravior, & pro operandi ratione magis effica exiftit: hinc vel acce quodam Venenum, v. g. Mercurius fublimatus, Arfenicum, aut fimilia quodam affumptum, contumè vellicans & rodens Intefinum imprimis Duodenum, & Stomachum, Cholera infert: vel Fermentum malignum acce alcalinum, concitans Mafiam fanguineam, eamque fermentativo potu colligefcens, indeque fimul Succum fitefium & pancreaticum turbans, Cholera infert: Scilicet fimilis tunc eff ratio, atque Hælleboræ, Scammoniatæ, Colocynthis, aliave graviora Purgantia fimul fuprà & infrà purgare folent: fiquidem Purgantia talia acia, & intenciamurancantia, vel incuratè uturgata, vel is propinata, qui Stomachum ac Intefina habet fenfibiliora, eadem fymptomata, atque in Cholericis obvia funt, concitare folent: nempe fitim, anxietatem, æfium præcordiorum, extremorum frigus, tandem convulfiones, ac mortem.

Acce hoc, five irritans, five colligefcens, five f fideque utplurimum) utrumque fuerit, nunc humoris copiofi, facie fe exhibet, ea Affumptis nempe vel le vitiolis, vel faltem intus corruptis genitum: nunc verò, effque utplurimum in vehementiori affeûu, & qui fipote fua ea interna oritur Causa, fub mole minima exiftit, adeoque rectè Fermentum malignum appellari poterit.

PARS AFFECTA.

Subfiftum fœu Pars affeûa Cholerae proximum eff Intefinum Duodenum cum Pyloro, & principium Jejunii, ibidem fcilicet, ubi infernuntur ibi Ductus, Pancreaticus & Choledochus: Hæ enim partes à fucci acribus plûs nimis & contrariis eo effatim irritant, in convulfivum fimulantur affeûu, adeoque ex perfiffalicio mox fursum ac deorfum naturæ fitefimi fimul Sutcos hos acriorès aut infigniter corruptos emittunt.

CAUSÆ.

Causa Proxima funt, vel fortis ac infigni Irritatio ab acce, tam affumpto venenolo, quàm in corpore præternaturaliter genito: vel Colligefcens & Conturbatio Mafie fanguineæ, indeque natorum Sacorum, à Fermento peregrino, acio, maligno, de natura alcalina, cum ipfis confufo: quod Fermentum vitiofium Mafiam fanguineam fermentando alterat, tranfmutat, & corruptum, ita ut partes corruptæ ac vitiofæ Sero involvunt, tandem per abufum (nam revera abufatur Natura huius vis) Ductus Choleochi & Pancreatici ad Intefina abigantur, & ibi concurrente & effervefcendo hæc tragediam Cholerae agunt, nuda fimilima.

(Q.) Cholera quatuorvis nemem à Bile quæ χαλε Græcis dicitur nemem habere videtur, ut huc enim morbo Bili eff, quæ de ficitur & reventur piffilimam: Alexander Trallianus etiam illam ejufdem de duobus effe à χαλε, quod eff Intefinum quæftion materia quæ per ventrem advehitur, per Intefina excernatur.

lima infert Symptomata, acque Purgantia acris maligna affumpserat. Prioris exemplum est Cholera, quae observavit POTERIUS *Centur. 2. cap. 59.* à potu Aquae Fortis nata: posterius exemplum suggerunt v. g. Purgantia maligna incoactis propinata. Nam quid tale vitiosum Fermentum fit, quod Massam sanguineam inquit, patet ex eo, quod, utat non raro ab Alimentis corruptis occasionaliter inchoat Cholera, nihilominus tamen excrementorum quantitas est tanta, et alimenta, ut quavis assumpsa, omnia, & quocunque modo corrupta, longè superet, quæ excrementa non oriuntur, nisi ex Massa sanguinea, quæ communis fœcis, & promixta condita est totius Oeconomiae animalis. Hinc etiam est, quod Purgantia, si sint nimia, non raro Cholera exsurgit, in illis scilicet, in quibus copia fœcis contraria, præsertim acris, per medicamentum Purgamentum motu ad Intestina detrahuntur, & ibidem tam effervescent, quam multa fœci miscela vitiorum saporem accedendo, tam visiolet Intestina flumant, & Cholera exoritur: ubi interdum in Hystericiis, Scorbuticis & similibus, observari solet. Hinc etiam est, quod Fructus hominis, ut ipsius Acris vitio in liquorem acre quasi vitriolatam corripit, aut in Stomacho inebelliosi sub digestionis vitiat, in talem Chylum vitiosum ac fermentativum abeat, ut & Intestina irritando, & Massæ sanguineæ crasis turbando & coagulando, Cholera exoritur. Unde etiam ex ista commotione præternaturali Massæ sanguineæ Symptomata febrius nostrorum adfuit, tam ratione Pulvis, quam ratione Caloris & Cephalalgie. Imò facit imprimi billosa. AMATI LUSITANI *Cent. 3. lib. 13.* De Muliere caecochyma Cholera correpta cum Febre, supervenientibus tandem Menstruis, in qua, quando efflabant Menies, Alvus erat altitudo, simul veritate Menies supprimebantur, cum Fœci ingenti augmento redibat Cholera, & sic vicissim; quod inane effervescentiam febrem in Massa sanguinea; quæ Massæ sanguineæ per Menies fluentes, alim his suppressis per Cholerae motum, evacuabatur, idque cum effervescentia facie adjuvans dolor Veneris & Intestinarum, infans totum, ac discit, effectus generis contentorum aequum effervescentiam, dicta confirmant.

Idem ergo consistunt per Duodenum Pellem & Pancreatem Sacri variis, plus minus corruptis, ex eorum miscela, & contrariis emergit Humor tertius diversi coloris & proprietatis, atque nunc Bilis, & nunc Porracea, nunc alia similia, tam supra quam infra respici videtur; & in speciem movetur, Nullique intensius imprimis à Fermento maligno (quo nomine nihil aliud concipere possumus, quàm immam acrimoniâ, etiam in minimo interdum efficaciam, nervosis partibus sensissimam, & summam præternaturalem imprecisionem, humoribus vero in singulari texturali mutatione inferentem) concitata, tam graviosa ac perniciosa circa præcordia in regione Stomachi, & præsertim lumbari dextra, ubi Intestini Duodeni situs, Symptomata excitare solet. Peracutum enim est malum Cholera quodque graves anxietates præcordiorum: extremorum migrationes, lipothymias, scilicet, pulsus intermittentes, ingultus, non raro convulsiones cum pulsu parvo, celeri & frequenti, inducit: simili ratione atque eadem à maligniori Impurgantibus quotidie observamus: Hinc etiam est, quod Thymalia, Sodorifera, & Maligantia resiliencia, primario in hac Cholera sunt attendenda: unde etiam PANAROLLUS *Perv. 1. Observ. 11.* Cholera à Veneno quasi perennitè affert, & JOHANNES COLLE *L. 3. Med. Pract. lib. 2. de Morbis malignis*, inter affectus Ventriculi Maligni reponit. Accedit & hoc, quod interdum aut Critica hæc evacuatio, febres alioque morbos universales solvens, aut quavis Symptomata, qualis illa, quam RIVERIUS *Cent. 3. Observ. 78. & Observ. à Parachum canum*, refert, alias nunc Sanguinis commotiones ac impuritates pro Causa agnoscit; v. g. Humores nidosos, aut Bilem sic dictam acrim, qualem à quadam præcordiorum angustia, & obstructione viscerum laborante, *Idem* quæ ubi maximo cum impetu rejectam fuisse TULPIUS *lib. 2. Obs. 11.* refert. In genere quæcumque & qualescunque Symptomata forem ac detestatam Antimonialem purgationem, aut Helicolum album sequuntur, aliunde violentius Catharticum, ea similiter obvia sunt in Cholera. Jam verò notum est, quod dicta res inter Venena corpori inimica reponatur: Ergo &c.

Hæc in genere de Causis & Sædi modo.

Quod Remanet Octavialis Causæ, quæ Fermentum corruptivum & Cholera producat, sunt vel Interne vel Extrinsecæ. Hæc in specie sunt Assumpta varia plus minus præternaturalia: Illæ verò aut ex Assumptis lætis genita, aut

spontanea contentorum Corruptela nata, ac Patredine maligna inquinata: frequentiores tamen Causæ sunt, vel Assumptæ fermentando facili corruptibili, & in nidorem biliosum transmutabili, nisi debite à Fermento Ventriculi subigantur, vel Medicamenta assumpta acris plus minus maligna; vel denique certa Venena, aut acrimonia contraria, ut propria sua natura Cholera inducant.

Quod Assumptum, notum est, quod ex vi Pericorum aliorumque Fructuum humorum facili effervescentium, & postmodum putrescentium in nidorem biliosum acilium degenerantium, oriuntur Cholera: vid. TIMÆIUS *non Gæd. lib. 3. Cap. 1. pag. 119.* quin et Malignum Pericorum est Cholera contrarium in se ipso observavit, ZACUTUS LUSITANUS *L. 2. Præf. Admir. Observ. 15.* sicut ex eorumdem nimio superfluitate Corevilia, Mulier septuagenaria Cholera correpta fuit, quæ 300 vicibus una die Aquam insipidam per alvum, & 100. vicibus Pituitam per os, respectu cum febre & delirio: vid. FONDANUS *in Anatol. L. 3. Exemp. 12. pag. 164.* item ex effluvio melanoem eandem Cholera observavit ZACUTUS LUSITANUS *L. 1. Præf. Admir. Obs. 16.* idem ex effluvio Præputium præcocium cum Ovis frigidis, superfluita frigida, observavit Cholera ingentem idem ZACUTUS LUSITANUS *lib. ult. Præf. Admir. lib. 1. c. 1. n. 7.* ita ut æger biduo 300. vicibus egeret copiosum humorem aequum, & 60. vicibus vomeret. Hinc etiam Mullum, Corevilia novella, Vinum non rite delatatum &c., facillime Cholera inducunt, si eorum fermentativa vi ad Massam sanguineam forsitan digestionis errore deferatur: Sic SCHENKIUS observavit Cholera ex Mulo, idque Fungorum, Potu frigidæ, Ambulatione cum pedibus nudis, & Lotione pedum in aqua frigida, quæ singula periculum Cholerae induxerunt: vid. *L. 2. Observ. 3.* Ex Vino acido in nimia quantitate ingurgitato RIEDLINUS *obs. 51.* Phaeolis, Cepis, Fungis BRASSAVOLUS *L. 9. in Hippo. de Villa Anconæ L. 4. Text. 103.* ex nimio Raphani usum Cholerae interdum observavit AMATUS LUSITANUS *Cent. 2. Obs. 32.* ratione salis acris, quo corrupto, insigniter potest depravari etiam Sanguis: Ex enim nimio Lactis, uti iuvande interdum est Cholera, ita ex nimia corruptione (nam Lac facillime fermentatur & corrumpitur) Cholera observavit HEINRICUS AB HEER *in obs. apud rara 15.* Sic ex Oryza cum Lacte parata, sed frigide assumpta, interdum Cholera observavit ZACUTUS LUSITANUS *lib. ult. Obs. 16.* speciatim Ova Barbi & Lucii piscium insigniter Cholerae inferunt: de quibus SCHENKIUS *L. 7. Observ. 1.* item TIMÆIUS *in Cal. L. 2. c. 7. p. 118.* qui ipse per eum Barbi contraxit Cholera.

Hæc omnia præternaturaliter Fermentum in Stomacho corruptum, & degenerant in liquorem acre, in quibus præponderat alcali oleum, quæ partim irritant Intestina, partim deferuntur ad Sanguinem & Cholerae inferunt: prout plus vel minus maligna, eo etiam vis prænotata fermentativa volatilis major vel minor.

Post Assumptam impemissam sunt Medicamenta Purgantia nimis generosa, aut fortiora, ut inconcinna doli, vel subdolo, cuius contenta quolibet sunt acriora, propinata, quæ non raro inducunt Cholera: vid. RIVERIUS *c. 2. Observ. 19.* item in RHODIO *Cent. 2. Obs. 69.* quod est rarum exemplum, dum refert: quod ex assumpto Antimonio non rite correctio singulari hebdomadibus per biennium Colica recidiva per aliquot horas excitata fuit recurrens. Ita FORRESTUS *p. 18. Observ. 44.* Cholera periculosissimam observat ex taleolis radicis Heliolebi abbi. Vini infusus, concitatus, curatus per 31. Pulveris Florum Nymphaeæ albus, ceu proprii ejus antidoti: Sic Acris ferè omnia, & Venena quondam acris, uti sunt Aqua Fortis, Antimonialia, Arsenicalia, Mercurialia, in specie Mercurii subtilissimus corrosivus, item præcipitatus, acrimonia sua nunc Pylorum, nunc Duodenum rodendo, crebras inducunt Cholera. Inter Internas Causas, Febres Malignæ in principio ipsi interdum adjuvantes habent Cholera, ut plurimum lethales: sic & Cholera Epidemica, plus minus malignæ, subinde observatae fuerunt, qualem refert SYDENHAM *Tr. Observ. de Morbis acutis lib. 4. c. 2. p. 139.* Sic WILLIUS in *Phor. Ration. lib. 1. c. 5. p. 109.* Cholera Malignam refert etiam Epidemicam, quam tamen sub nomine Dysenteriam non creasse desinit. Septies satis Phlebotomias observantur, seu Pellem in fino gerunt, v. g. illa, cuius RIVERIUS *Observ. Morb. Infrequentium 26.* meminit. Rarum etiam est, quod ab oculis Fontanella Cholerae à se observata refert JOHANNES MICHAEL FEHR *Tr. de Abstin. p. 106.* Ut nihil dicam de singulari idiosyncrasia

fa, cuius ratione ex auditu Tonitru Cholera subito enata: vid. *Alta Sect. Reg. Indem.* 2. pag. 448. Ratio hujus est in HANNEMANNI *Methodo cognosc. simpl. Prag.* §. 35. p. 71. Sicuti notari dignum est, quod habet FONSECA l. r. Conf. 84. de Cholera, in qua evacuatur sursum & doctum nigra, idque vitio Lienis obstruendi ob Menfes deficientes. Tandem PANAROLLUS *Prax. 1. Obferuat.* s. 1. obferuat in Viro Cholera sanguinem; idem videtur Ghar, cum maximis symptomatibus, occasione nimis Venetis contraxit cui cum aliquando ferocius incuberet, in tam copiosam sanguinis Cholera incidit, ut etiam mortis periculum immineret, per Div. Lapidis Hæmatitis, in Viro, seu Succu Granatorum acidorum assumpti, curatam, postquam ad 12. libras sanguinis rejectæ, cum omnium admiratione; quod plane singulari est, & non memini me apud ullum Auctorem tale quid legisse.

Omnia que suprà de Purgantibus dicta, in Diarthea & Cholera conveniunt. Ergo, ut in Hyperbarbari vehementiori & Diarthea, ita etiam in Cholera, ad duo imprimis respiciendum est: Vel (1.) ad Acere irritata, illudque ut plurimum acidum, tunc solitarium, nunc Bili permixtum, idque cum hac effervescens, & ita Rilem Acridiorem omnium pessimum constituit, à qua etiam gravissima Cholerorum circa præcordia Symptomata: Vel (2.) ad Fermentum malignum fermentativo motu colliquescenti Mafum sanguineam, & coarctatis inde derivatis succis: est quod materiam alcalinæ acris simillimæ Purgantibus gravioribus.

DIAGNOSIS.

Quod attinet Signa Diagnostica: ex superius facta enarratione Symptomatum clara sunt, ex quibus etiam est facilis.

PROGNOSIS.

Cholera, quæ sponte sua sine Causa manifesta externa corripit ægros, ut plurimum est perniciosa ac ferè lethalis.

Cholera periculosissimum est peracutum est malum, intra biduum, vel triduum, imo 24. horas, ægrem pugnant: utut ex RHODIO *superius alleg.* consistit in quodam ex Antimonio minus decoctæ præparato Cholera ad bicanum, per intervalla tamen, & quidem per periodos, affluisse. Periodum ferè observat tertianam, ita nempe, ut de tertio in tertium diem moveatur, seu plus minus exaltet.

Cholera, quæ supervenit in principio Febrium, imprimis Malignarum, ut plurimum est funesta, utar in declinatione quarundam Febrium interdum possit esse salutaria, si nempe fiat per modum Crises; quod tamen rarissimum est.

Propter Malignitatem cautissime tractanda Cholera; suspecta enim admodum est propter metum recidivæ; cum ipsius ægri jam reconvalescentes ex supervenit insinuat recidivæ obcaus: vid. HORSTIUS l. 4. *Obferv.* 1. ubi notat, Choleriam passionem ferè curatam, ex Potu Vini non rite deservati, lethaliter recidivam.

Minus periculosa est Cholera, ubi stomachus non afficitur, ubi non lipothymia & anxietas præcordiorum suæ.

Quod perturbatio Ventris major est, & quod magis patitur Ventrículus, eo periculosior est Cholera, & etiam periculosiora habet symptomata, eoque citius mortem infert.

Quod magis à statu naturali recedunt Excrementa, speciatim si fuerint livida, aut si fuerint fetida, aut si fuerint nimis corrosiva, qualia sunt ea, quæ dicuntur utriginosa, & porracea, utpote intercani quibusvis hostia; item cum lotura: earum simile quid exoneretur, eo periculosior est Cholera: & longè adhuc maius malum, si nigra aut livida reiciantur, ut ex TULPII *Obfer. l. 4.* innoscere potest. Sin tamen aliquando oriatur cholera per Crisim, potest esse salutaria, uti monui (R.).

Cholera colliquescentia, mutans habitum corporis, semper ferè lethalis est.

C U R A.

In eura eadem Medendi ratio est cholerae, quæ Vomitus atque Diarthea, utne Remedia magis efficacia, aut magis selecta sobriè adhibenda sint. Maxime attendendæ sunt causæ: An oriatur ab Assumptis? an à Fermento maligno? pro-

pter quod summa circumspectio opus est, quam cholera suspecta est propter metum recidivæ; ipsius enim ægri jam convalescentes ex supervenit insinuat recidivæ obcaus.

1. Temperandum est quodcumque Acere, quod cholera insit, & blandè in principio morbi per leniter Sanctorum evacuentur.
2. Desistendum est Fermentum malignum alcalinum, quod cholera excitat.
3. Hinc utroque in casu Opistis Humorum & Partium motus sistendus;
4. Appropriatis Odoriferis stomachus roborandus. Dico Odoriferis: nam in omnibus Intestinatorum & stomachi affectibus sunt egressa Odorifica, live internæ live externæ usurpentur, quibus simplicis solis potest Alvus fisci. Sanè multum hinc tribuit HELMONTIUS, qui solo Empismo Odoriferis sièrè desperatissimas curavit cholera.

Pro his scopis melius obtinendis, observetur:

I. Semper Medicamentis Anti-cholericis addenda esse Alexipharmaca Bezardica, vel ipsa remedia propinata ex se vim habeant alexipharmacam; quæ causæ eius ut plurimum sunt malignæ, ut rectè monet LANGIUS *Commentariis in Falernum*; unde non satis sumus tuti in Cura.

II. In principio Morbi bene considerandus Naturæ motus, idque in specie, si à externa Assumptis facile fermentabilibus vel putrescibilibus oriatur malum, tunc enim bene considerandus Naturæ motus. Si enim, monente HIPPOCRATE, *evacuatur ea, quæ debent, coarctari, & facili ferunt.* Unde ex tali causa, v. g. ab Alimentis corruptis & umilibus, nata cholera non subito nimis est supprimenda, & ab Adstringentibus fortioribus in initio est abstinendum & cavendum; nec Vomitus & Alvi defecatio statim ab initio cohibeatur, quia supprella Excrementa commota adhuc aut fermentativa, live à Fermento maligno per colliquescentem transmutata fuerint, live ex Assumptis genita detineantur, sub cicore gliscunt, & novom ac deterius incendium minantur; uti hoc rectè monet FORESTUS lib. 11. *Obfer.* 45. item AMATUS LUSITANUS *Cent. 3. Cura 11.* Unde inimico viceribus iaculo facili multa ac gravia symptomata supervenire possunt: sicuti contra, si Cathartica excretionem promovere velimus (quod SYLVIIUS *Prax. l. 19. §. 29.* & RIVERIUS *Præpar. l. 9. c. 9.* continentur) iuxta SYDENHAM l. 1. oleum igni adderemus. Igitur cum lenissimè Cathartici operatio non minus insuper excuset cumulus. Ipsiorem potius Naturæ agere debeamus, aut saltem in principio iuxta RIVERIUM & SYDENHAM Acre illud abstergendum blandè ac diluendum; hinc demum Opistis Morbi impetus transigendus.

III. Opata nunquam iata laudanda sunt remedia in Cholera & omni Alvi fluxu, quæ suæ namque ostendunt, & in majori quam confluxu doli, c. g. ad gr. 40. præstibenda; sin tamen magna adit virium diluatio seu prostratio, magna Laudati doli iuxta RIVERIUM non est exhibenda, sed melius est, partitis vicibus propinare, adeoque in minori doli, in grano uno vel duobus subsistendum, semper cum appropriatis Analeptics miscenda, & etiam bis in die exhibenda: quinimò si tardius accesserit Medicus, ita ut æger vomita ac detractionibus ad plures horas fuerit exhaustus, jamque graviora symptomata, v. g. extremorum frigus, immineat, in tali casu, omnis quibusvis aliis auxiliis mos ad sacram Laudati anchoram est accedendum; sicuti aliis, Opata in cholera eura nunquam omittenda sunt; cum Bezardicis, & Antimonio diaphoretico mista.

IV. A nimio Potu, in specie frigido, quantum possibile, abstinendum: haustus tamen Vini moderatus optime convenit, nisi pro loco abstergendum vel temperandi, vel Serum Lactis, vel Decodum Hordei cum Syrupu Rosarum, vel Decodum Palli aquosum, aut simile: diluentia enim amite prouide. Sed omnia, quantum possibile, tepide exhibenda.

V. In declinatione Morbi, ubi cessat impetus, Adstringentia & stomachum roborantia usurpant, ubi conveniunt.

Brevibus Purgantibus igni oleum additur, & adstringentibus ac soporificis ignis intra viscera coercetur, vid. SYDENHAM *Obferuat. p. 221.* Ergo temperanda ante omnia Humorum est acrimonia, hinc eorum & spirituum impetus coercendus; tandem quantum possibile, blandif.

(R) Novi quendam, qui singulis annis, cum Veris tempora data opera magnam Cereferam copiam ingereret, in Cholera non dei incidit, quæ non solum ingrossis fructibus præco sapore ac adve defatigatis per superiorem & inferiorem redidit, sed maxime corruptorum humorum sub terra se exonerabat: hinc melius postmodum se habebat, & per totam Æliam optima corporis valetudine fruabatur.

diffimē simul abstergendum & eluendum est. Scopo primi Abstergentis fixa, secundo Opiata, praeteritum cum aliquali diaphoreti usurpata, & desique Rhabarbarum in Jusculo Pulli, vel Decoctum Tamarindotum, vel Serum Lactis, vel Decoctum Hordei cum Passulis usurpandum. Conf. SEPTALIUS in *Animadv.* p. 201. ubi Dulcia, ut Mannam, Saccharum, Mel, merito rejicit; & quidem dum Naturam evacuantem adjuvamus, non dierum, sed horarum spatium naturae est dimittendus, quod idem recte monet p. 202. Adeoque Praecipitantia Sodorifera blandis Opiatis mihi optime conveniunt, expectato sudore. Cum Vomitus urget, Medicamenta brevibus intervallis & coelestium affumantur: vel cum vis liquida possit propinari, ubi id denotat Soli Opiatis impraegnati, qui seci deglutiendi, abstinendo aliquandiu ab omni potu. Conf. GRIM. *Compend. med. Chym.* p. 72. & seq.

Medicamenta igitur, quae didis conveniunt scopis, sunt Mentha, & omnia ex Mentha parata; cum haec, seu lingulari specificum, Stomachum sui modis pacificum, commendatur a TRALLIANO, quoniam nempe singularissime convenit; unde etiam ejus Succus insigniter commendatur ad Cholera: Porulacae item & Scordium ac Plantago, sive in Decocto cum Symplo Cydoniorum & Confessione Alchemiae, aut Electuario Diafordii, sive eorum Succus cum Mentha, propinentur. Pariter Semina quatuor Frigida majora, Amygdalae dulces, & similia, & ex his parata Effusio, propter vim temperandi acrimoniam Humorum effervescentium a quibusdam commendatur; quas tamen mihi probe, quia laxant Stomachum, Aromata oleosa, Nox Molchata, Caryophylli, & similia, commendatur similiter: Acidia item, effervescentiam Sanguinis nimiam compescit, commendatur, Sal Prunellae a RIVERO commendatur, ubi cum Cholera conjunctus est ardor & sitis. Alios inter praeterita conveniunt Terra sigillata, & Terra Solaris, & Martis Solaris; est Terra, quae reperitur in suis sedibus, coloris flavi, & quae impraegnata est primo Essentia, & soluta cum Spiritu Salis, dat Tincturam insigniter adstringentem, & quae Fluxibus malignis epidemicis, Alii praeterita, conveniunt. Reperitur item in Martibus solitis Terra Martialis, quae similiter impraegnata est primo Essentia & Semine Martis. Similiterque hic commendatur Cryphallus parata ad 36. & cum lingulari laudatur specificum, Bilem aeruginosam temperant. Juxta Cryphallum & Smaragdum est, qui acerrimi illius Succu corrosivi non insignit, speciatim ubi cum convulsione imminere videtur. Uterius Martialis, imprimis Antimonium diaphoreticum Martiale est egregium; hinc Cornu Cervi ultum, Eserine igne, Coralli rubra, in usu sunt.

Quod Differentes Cautum: in Cholera a Causa nimis acuta, adeoque a Venenis corrosivis aut similibus excluditur, v. g. Arsenice, Mercurii sublimati, Aqua forti, &c. conveniunt imprimis Pinguis & Oleosa; Acute tale obtundentia: ut Oleum Amygdalarum dulcium, aut Botryum non solum, quae corrosivitate dulcescent: item Lac, cui semper Appropinquat, ut Terra sigillata, admisceri possunt; Acidem enim & Pinguis & Lactis potenter temperant. Conveniunt interea Acute illud Abstergentia, ut Terrae minerales sigillatae, Cryphallus parata, quae Cryphallus in Bile aeruginosa seu poterea, in qua active Acidum praevalet, seu appropriatum laudatur a LANGIO in *Appl.* l. i. c. 6. & l. 3. c. 1. item ZACUTO LUSTANO in l. 2. *Praxi* Admir. Off. 15, qui hunc Cryphallum ulum insigniter similiter expertus est; Videtur etiam potest HEINRICUS ab HEER in *Osfero*, 2. ubi Cholera incepto uli Funtium Spasmodum etiam, ulu Cryphalli moneant cum Sacco Cydoniorum, vel Limonium, & Berberum, uno alterve clystere curari: Exempli loco sit POTERIUS, qui l. 2. cap. 39. in Aqua Furti, pro Vino epota, nauseam, vomitus, dysenteriam, febrem continuam refert: quae tamen omnia curavit per Lac & Emulsionem Amygdalarum dulcium cum gr. xv. Terrae sigillatae aut Lemniae: hinc noctu per Theriacem 3ij. cum aliquot granis diuturnae; tandem propinavit Lac vaccinium chalybeatum cum Cere flavae dr. i. paulillo Nucis Molchatae & diuturnae Terrae Lemniae additu: Conf. SYLVIVS c. 15. §. 46. in Praxi. Extrilectus Forum ex Abstergenti, Mentha, Rosis levis, Mace, Nuce Molchata & aliis ordinavit. Didia addi potest Sal Tertari, quod absorbet, in specie Mercurii sublimati corrosivam vim detrahens.

Si a perverso usu & effervescentia Præstium horarum oritur malum, praeter blanda Abstergentia, eorumque colluvium Evacuantes, conducunt Praecipitantia didia, Salia Alcalia, Terrae: ut Sal Abstergentis, Sal Tartari, Terra sigillata.

lata, ac Ebur ultum: quibus Opiata semper addenda; ad imitationem nempe Cerevisiae vel Mufli effervescentium impetuosius, didis modis cohibitorum. Vel

24. *Aqua Menthae* 3ij.

Cinnam.

Menth. an. 36.

Spiritus Martialis gutt. xv.

Elect. Diaford. Fracast. 3ij.

Terra sigillata. 3ij.

Cornu Martis addit. 36.

Syr. Cydonior. 3ij.

M. f. Poie, quae etiam in Diarrhaea convenit. D. 3.

Pocin Confortans.

Si verò a Fermento Maligno per modum nimis purgationis excitata fuerit Cholera conveniunt blandae Acida, illud destruentia ac praecipitantia, Sodorifera blandis Opiatis mixta expectato sudore v. g. Succus & Syrupus Granatorum, Ribium & Berberum, Syrupus Coralliorum, Portulacae, spiritus Vitrioli, imprimis Spiritus Vitrioli Martis, & cum Spiritu Nitri aut Vitrioli paratus Liquor Syrticus, cujus supra feci mentionem; item Solutiones Coralliorum cum Succo Citri aut Limonem: Tinctura item Sulphuris Vitrioli insigniter convenit; uti etiam in principio morbi Tinctura Bezourdia, Mixtura simplex, quae & effervescentiam Massae sanguineae compescit, ratione Spiritus Vitrioli blandè adstringendo, & sudorem movendo malignitati occurrat: Terrae minerales cum blandè Acidis propinatæ, hinc Terra sigillata cum Spiritu Vitrioli est egregia: item Antimonium diaphoreticum, Antimonium diaphoreticum Martiale, Benardicum Solare, Juvale, & Martiale, Ebur sine igne vi absorbendi, & Sodorifera, item conveniunt.

Praeter ceteris laudatur Opium, & omnia ex Opio parata remedia, quae inter praecellit ad Cholera Electuarium Diafordii Fracastorii, cupis dosis ad summum convenit in Cholera a 3ij. ad dr. i. Compositio est ex Adstringentibus rudis & theriacalis, nihilominus quoad ingredientia, est satis elegans, utur loco uluissim vel sola Conierva Menthae cum Terra sigillata & aliquot granis Laudani opiatu admixto conveniat. Theriaca & Mithridaticum, & ex his facta Extrada Theriacalis, Spiritus & Essentia Theriacalis & Menthae; quibus in majori malignitate semper addenda est Camphora.

Ex didis facile est, varias Formulas concinnare. Sic SYLVIVS in quacunque Humorum attemperatio, & hinc orta Cholera curanda, hanc Mixturam commendat:

24. *Aqua Plantaginis* 3ij.

Feniculi 3ij.

El. Diaford. Fracast. 3ij.

Syr. Papav. albi 3ij.

M. f. Poie 5.

Pocin Confortans.

Val elia modo.

24. *Aqua Menthae*,

Cinnam. cydon. ad 3ij.

Spiritus Theriacal. 3ij.

Lign. Hyss. 36.

Leod. spirit. gr. iv.

Syr. Corallior. 3vi.

M. f. Poie 5. ut antea.

24. *Aqua Plantaginis*,

Portulacae an. 3ij.

Cinnam. cydon. 3vi.

El. Diaford. Fracast. 3ij.

Cryphall. prop. 36.

Antimonii diaphor. 3ij.

Terra sigillata. gr. xv.

Syr. Papav. albi 3ij.

M. f. Poie pro aliquot dosibus, 5.

Pocin Confortans.

Vel

24. *Aqua Portulacae* 3ij.

Cinnam. 3vi.

Spiritus Theriacal. comp. 3ij.

Nitri dulc. 36.

Elect. Diaford. Fracast. 3ij. vel 3ij.

Antimonii diaphor. Martialis. 36. vel 3ij.

Syr. Portulacae 3ij.

M. f. Poie pro aliquot dosibus: 5. ut antea.

Capiatur coelestium, expectando sudorem parvum.

24. *Aqua Menthae* 3ij.

P

24.

Ebor. sine igne. ℥iij.
Cryſtall. præp. ℥iij.
Terra ſigillat. ℥iij.
Laud. opiat. gr. iij.
Eſſent. Opii ℥iij.
Syrupi Perſular. ℥vi.

M. l. Pulvis: S. ut ante.

℥i. Aqu. Portulac. ℥iij.
Cinnam. ℥iij.

Spiritus Theriacal.
℥i. Diſcord. Præc. an. ℥iij.
Conf. Alkerm. ℥i.
Ebor. sine igne ℥iij.
Syr. Corall. Quercetæ. ℥vi.

M. l. Pulvis: S.

Potuiuncula Conſortativa adſtringens.
Vel

℥i. Aqu. Menſch. ℥iij.

Portulac. ℥iij.

Terra ſigill. ℥iij.

Cryſtall. præp. ℥iij.

Laud. opiat. gr. vi.

Syr. Menſch. ℥iij.

M. l. Pulvis: S. ut ante.

℥i. Aqu. Menſch.

Rubi Idæi an. ℥iij.

Spiritus Theriacal. camph. ℥iij. ad vi.

Corall. rub. præp. ℥iij.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. Rubi Idæi ℥vi.

M. D. S. ut ante.

Item

℥i. Theriac. ℥iij.

Terra ſigill. ℥iij.

M. l. Bolus. S.

Bolus Conſortativus adſtringens, pro ora doſi.
Datur in cochleari Aceti Viſci.

℥i. Theriac. ℥iij.

Terra ſigill. ℥iij.

Cryſtall. præp. gr. xii.

Cum Syr. Menſch. l. Bolus. S. ut ante.

℥i. Cryſtall. Menſch. de. i.

Terra ſigillat.

Corall. rub. præp.

Cryſtall. præp. an. ℥iij.

Laud. opiat. gr. ii.

Cum Syrup. Corall. Quercetæ. l. Bolus: S. ut ante.

℥i. Cryſtall. Menſch. ℥iij. ad ℥iij.

Cryſtall. præp. ℥iij.

Terra ſigillat. ℥iij.

Laud. opiat. gr. iij.

Cum Syrup. Menſch. vel Portulac. l. Eleſtuarium pro duabus doſibus.

Eleſtuarium Conſolativum adſtringens, pro duabus doſibus.

℥i. Conf. Menſch. utriuſq. vel Refar. rub. ℥iij.

Theriac. ℥iij.

Terra ſigill. ℥iij.

Cum Syr. Cydon. aromat. l. Eleſtuarium: S.

Eleſtuarium Conſolativum adſtringens.

Vel

℥i. Ebor. sine igne.

Cryſtall. præp. an. ℥iij.

Laud. opiat. gr. iv.

M. l. Pulvis.

Divide in duas port. æqual. D. S.

Pulvis Conſortativus adſtringens.

Vel

℥i. Terra ſigill. vel Antimoni diaphor. ℥iij.

Reſard. Reſar. vel ſervial. ℥iij.

Laud. opiat. gr. iij.

M. l. Pulvis, qui nobilis eſt in Cholera.

Datur duæ doſes. S. ut ante pro duabus doſibus.

Vel

℥i. Aqu. Menſch. ℥iij.

Cinnam.

Aceti Reſard.

Spiritus Theriacal. camph. an. ℥iij.

Syr. acet. Ciri vel Cydon. q. l.

M. pro vehiculo ſuper Pulverem. S.

Potio Colorata pro vehiculo Pulveris.

Vel

℥i. Cryſtall. præp.

Ebor. sine igne, vel Theriac. vari præp. ℥iij.

Boli Arm. ℥iij. ad ℥iij.

Laud. opiat. gr. vi.

M. l. Pulvis pro aliquo doſibus. S.
Pulvis Conſortans, & Adſtringens pro aliquot doſibus.
Vel

℥i. Aqu. Menſch. ℥iij.

Cinnam.

Eſſent. Theriacal. an. ℥iij.

Syr. Corallin. ℥vi. ad ℥iij.

M. D. S.

Potio pro vehiculo Pulveris.

In hoc capitur Pulvis, ſubinde hauriatur unum vel alterum cochlear epiſidem.

Ante aliquot annos mihi occurrit Scapſius, qui ex nimia computatione incurrit in Cholera, cui propinavi hunc Pulverem.

℥i. Ebor. sine igne ℥iij.

Reſard. ſervial. gr. v.

Pulvis. Adſcord. confort. ℥iij. e.

M. pro Pulvere:

Quem aſſumebat, & cum Theriaca illinoſcit Ventriculū & ita bene ſe habuit adjuſto ſedere.

TIMÆUS ſenſuſſentia in Cholera, & profluſio Alvi vehementiſſimo, & ſimilibus Fluxibus, commendat ſuam Opſiam Reſardiam, cuius compositio eſt hæc:

℥i. Theriac. Androm. ℥iij.

Conf. de Hyacin. ℥iij.

Pulvis. Reſard. ſerv. ℥iij.

Milicentur.

Vid. ejus Deſcriptio Medicamentorum ſingularium p. m. 422.

Quod attinet Extrema in Cholera: conveniunt quæ impetum Stomachum reſpiciunt, quæ inter eminet Theriaca ſimili ratione atque ſupra in Diarrhæa laudata ſunt, in ſpecie Spiritus Vin, aut aromaticus, aut camphoratus, ſeu largiter Camphora impregnatus, in ſpecie & Vegetabilibus Cordialibus & Aromaticis abſtraſtis, cui exemplar ſingularis dicitur. Camphoræ calidæ, cum ſimilito multiplicato ad d. li. præcordiis cepti manu applicetur. Hoc ipſo æger, qui per quatuor noctes diſſequæ pertinebat Cholera ſuprà & infra etiam geographiſſima remedia, reſpexit, curatus fuit. Conf. HENRICUS ab HEER, in Obſervationibus: Vel

℥i. Spiritus Vini camph. ℥iij.

Theriac. ℥iij. ad ℥iij.

M. pro Epithemia Ventriculi: S.

Extrema Mixture ſtomachalis.

Proſenſum etiam eſt Panacæum, Viſco generoſo intinctus, & Pulveribus aromaticis adjuſtus.

Rare event, modo datur Interna, ut, ſive in principio, ſive progreſſu, opus ſit abſterſione Intestini, Laxativa vel Clyſmata. Si tamen opus eſt, ut in Cholera erumpit imprimis Diarrhæa enata, vel reliquis quædam in Intestinis hærentes abſtergere, vel continuo eadem Alvin ſimulantur & quali Tenefimus inſeſcunt, removende ſunt, imprimis ſi ex corruptione Alimentorum in Stomacho nata ſit Cholera, ſi talis caſu SYLVIVS Praeſent. l. 2. c. 25. §. 29. partim pro excretionem per ſuperiora adjuvanda, partim Intestina verſus promovenda, propinat Vomitorium Antimoniale, admiſſio Lugduno oratio: Formula hæc eſt.

℥i. Oxyſach. ſumitro. ℥iij.

Laud. opiat. gr. iij. vel gr. i.

Aqua Menſch. q. l.

M. l. Haſſan.

Quo equidem propat Vomitorium viſci ſecit imitari Juſſerim; potius, ut temperaret, ſimilique abſtergere in Sorum Lactis ſolum, vel cum ℥iij. alterave Syrupi roſati aut Violarum ſolutivi temperatum, vel blandum Laxativum Decoctum cum eo paratum, imprimis ſi addit nimia ſit. cum temperet efferveſcentiam Sanguinis, exhibemus, vel Inſuſum blandum ex Reſardato, & Bolus eo eodem cum Conſerva Roſarum, exhiberi ſuſtinet: item Pulpa Tamarindorum ad ℥iij. In Seru Lactis diſſoluta non eſt fructuſa. Applicatur etiam Clyſmata Laxativa, cum Theriaca imprimis admixta, addendo d. li. vel li. Theriacis uni Clyſmati ad imitationem RIVERII, qui ſubinde ſua Clyſteribus admixcet Theriacam non abſque ſuſu, nempe Clyſteribus ex Lacte addit Theriacam ad d. li. & iii. interdu ad ℥iij. vid. RIVERIVS l. 3. Obſerv. 72: ubi caſum Cholera periculolum habet. Locu Theriacæ interdu perſpicitur Eleſtuarium Diſcordii, quod ſimilis ſerè eſt alius.

Si Cholera ſit & Remedia Purgante ut exinde celat Hy-

per.

percarbari, tunc vel solum sufficit Laudanum opiatum, quod in quacunque Hypercarbari est praefectissimum remedium, si cum Vino bibatur. In *Diarrhoea pili aperi* *flui Americi* pertinacis, cum successu praescribitur.

M. Ales. Theriacal. 2i.

Op. 3d. ad 3i.

Milla propinabatur ad gutt. 40. bis vel ter in die. Uti etiam notum est quod Theriaca dr. 4. ad dr. ij. sc Theriaca ratione Op. prae caeteris in quacunque Hypercarbari conveniant, in hanc Vini generosi calidi, aut adustitatis assumptam; sicut RIVIERUS *Cens. 2. Obf. 19.* habet Observationem de Choletici ex Supercogitatione admodum periculosa, propinatis gr. vi. Laudani opiatii exoptati curata. Similiter idem RIVIERUS curavit Scem 70. amorum, propinando inter ceterum Decodum Plantaginis & Portulacae, de quo superius cum Sympo Cydoniorum & Eleucluarum Discordii ac Confectione Alchemiae, singulis nodibus exhibendo granum. vel ij. Laudani opiatii. Facit quoque *Cens. 3. Obf. 18.* mentionem Cholerae, cum Tormenta febris, malignae: casus fuit admodum periculosis, qui tamen fuit curatus praescripto Clystere ex *salsis* cum *Confectione Alchemiae* ad dr. iij. de *Theriacis res. dr. i.*, quo subito Vomitus & Alvus suppleta fuit: denique ad praecognitionem semper duabus horis ante paroxysmum gr. ij. Laudani opiatii propinavit, & sic praeservavit, & curavit. Simile exemplum habebitis in *Obf. 2. communicata* a PACHECO.

Plura hac concessi possunt, quae dixi *supra* art. 2. de *Diarrhoea*.

ARTICULUS III.

de Lienteria.

AD ALVI FLUXUS auctos pertinet etiam Lienteria, i. e. *Intestinorum Levitas* (S), seu *Diarrhoea Assumptum*, quae est, quando assumpta omnia, prout fuere ingesta, per Alvum egerantur: aut eii talis ALVI FLUXUS, in quo parum, aut leviter, aut omnino non immutata, per Alvum egerantur omnia, ita ut tunc referantur exacte proprietates suis omnes.

PARS AFFECTA.

Pars affecta primaria est ipse Stomachus, maxime Pylorus. Revoco in memoriam hic, quod recte Pylorus ab HELMONTIO dicitur *Rostrum*; si enim Pylori orificium non tunc clauditor, dilabuntur Alimenta ex Stomacho, & tunc supervenit Lienteria: quia non ad debitum tempus persistunt in Stomacho. Cum vero in naturali statu ad legitimum Digestionem requiratur, ut Fermentum digestivum debet dissolvat & alteret Alimenta, ut Stomachus convenienter eadem retineat; tunc ex contraria causa necessitudo oritur Lienteria.

CAUSAE.

Causae ergo Lienteriae sunt investigandae vel in Fermento stomachali non digerente, vel in Pyloro non retinente. Nempe

1. Succus Stomachi fermentativus, aut omnino deficiens, aut inertis, aut ex retentis variis impeditur. Lienteriam efficit.
2. Quando Pylori tanta est laxitas, & e contra reliquarum Stomachi partium tanta irritatio, itaut non debet retineat, quin poenit Assumpta per Pylorum dilabatur, quam revera excrementa, etiam Lienteria oriri solet: idque, ut dixi, in specie, quando cum hac Pylori laxitate vel levissima coniungatur Stomachi irritatio aut mollitia.

Prior Lienteria vulgo dicitur oriri à Febrile Concoctio laesa: *Pylorus* vero à Retentione laesata, & Ex-pultrice irritata, *Causa* ergo *Primaria* est Fermentum Stomachi digestivum laesatum, aut inertis, aut deficiens, cui accedit Stomachus praeternaturaliter irritatus, & Pylorus laxatus, ita ut sic Assumpta ad sufficientem usque dissolutionem venire nequeat, sed per Alvum promoveantur. Sola enim laxitas Pylori vi videtur adaequata Causa, nisi accedat simul humor & reliquarum partium Ventriculi irritatio, quatenus Pylorus non ex inferiore Ventriculo Tom. II.

li parte, sed huic eminentiore loco prodit.

Ad has Causas Proximas collimant ceterae Remotae, Ventriculorum & Pylorum ad irritationem & laxationem disponentes. Illustrant hoc observationes Aethorum. Sic FORESTUS *lib. 20. Obf. 29. & 30.* Lienteriam observat admodum contumacem, ortam ex Ulcere Ventriculi. In hoc enim Ulcere non tantum fuit notabilis alteratio Sacri Fermentativi Stomachi à Pure acris Salis, & ob id imminuta Digestio, sed potenter etiam Stomachus ab Ulcere doloroso continuo irritatus quolibet Assumpta sui coactione mox deinde eiecit: curatum tamen fuit hoc Ulcus & per consequens etiam Lienteria (i.) abstergendo & mundificando per Aquam musam; item per Decodum Hordei cum Melle rosaceo: postmodum (s.) consolidando cum Decodo Radicis Symphyti majoris, cum Terra Lemnia, vel alia similata propinata, vel cum Lacte vaccino, item Pulvere Equitici. Sic Lienteriam ex irritatione Stomachi ab acrore Humore in eodem retento ortam, GABELCHOVERUS *Cens. 2. Obf. 47.* observavit, dum refert eamplum cuiusdam, qui borborismus & debilitate Stomachi nongit affectus, omnia potenter in ea forma, qua assumptis, per Alvum deorsum eiecit: Curatus tamen fuit per Abstergentia & Temperantia, imprimis Serum Lactis.

Potest inter Remotas Causas erubescere & nimis Patet etiam subinde ad Lienteriam disponit, idque propter relaxationem nimiam Stomachi, praesertim Pylori, oriundam: huius enim fibrae relaxatae non possunt sufficienter se contrahere, & propterea succedat Lienteria, seu Alimentorum crudorum egressio. AMATUS LUSITANUS *Cens. 6. Cuv. 7.* Lac, prout desampent, eiecitum observavit, quam Lienteriam ex nimio Mucos in Ventriculo putat, & per Oxytel cum Specibus Hierae picrae, & Rhabarbora curavit. Sic DEODATUS in *Palaeo. p. 28.* Puellam nimis siculicolum & bibulam ex Nutrice bibula, Lienteria affectam ex relaxato Pyloro in hoc malum incidisse refert. Denique Scorbutus non raro secum conjunctionem habet Lienteriam, primò observare BARBETTE in *Praxi*; cum tamen continuo in Praxi occurrat, ut alimenta à talibus assumpta, sicut fuerint ingesta excrementa. Malum est difficile & admodum contumax in Scorbutis, & originem ducere videtur ex irritatione Stomachi ex Sale acris scorbutico, tam per membranam Stomachi glandulosam, eo delato, quam cum Saliva deglutito: cum enim Gingivae Scorbuticae, non raro laborent Ulceribus, Saliva in Stomachum descendens non potest non molestiam contrahere eidem; & cum Alimenta, dum masticantur, hac ipsa Saliva imprægnentur, tunc Stomachus ad praeternaturam excitationem stimulator, ut non possit diutius retinere, sed vel levissima latione Pylori deorsum elaborat. Sic acris irritatus Stomachus inter Vomitus, aut Vesica urinaria ab urinae acrimonia, calculos aut ulcere vellicata frequentem mictionem seu stranguin; sic cetera quondam Venena Lienteriam excitare solent; membranae enim Ventriculi huiusque fibrarum transverfarum contractione, Alimenta expelluntur, quae diutius morari conveniebat: vid. MOLINETTI *Leviti. Anatomicae parol. l. 2. c. 4. pag. 281.* Tandem ab Errori extremo, & assumptis Fructibus boris, interdum periculosa evenit Lienteria, in qua observatum est, quod Pocus parum immutatus redditus fuerit, quae saepe est letalis; im-mut enim Fermentum Stomachi plane deletum ab ipsis Assumptis, Diarrhoeam excitantibus.

DIAGNOSIS.

Quod attinet signa Diagnostica res est aperta.

Ut autem Causas eius distinguamus, notandum, quod in illa quae ex Digestione Stomachi debiliore oritur, semper sit halitus foetidis & acidus, appetitus dejectus, status Stomachi, murtura Abdominis, & similia.

Quae à Laxitate Pylori, ex causis antecedentibus, & proximarum reliquarum denegatione colligitur.

Quae vero ab Irritatione, ex mordicatione, rosione & ardore Ventriculi, ex acrim per superiora ac inferiora reiectione disijcitur: quibus accedunt Acrimoniae scorbuticae, & similiae in toto Signa.

PROGNOSIS.

Prognosis quod concernit.

Lienteria Scorbutica est malum periculosum, difficile cu-

P 2

ra-

(S) *Alex. de Leviti, de Pyloro Intestinum: unde Aethorum Levitas Intestini, h. e. continua & copulata Intestini superficialis, eibus intestis elab. fuerit.*

rationis, & facile recidivans: laud si graviores morbos excipias, ut plurimum lethalis evadit: vid. BARTHELE Prax. Lib. I. c. 3. §. 6.

Lienteria periculosa est in Prægnantibus.

Lienteria diu durans, uti tadem atrophiam & tabem, in summam virium prostrationem necessario comitem habet: ut taceam, ad Cachexiam quoque succedive eandem dissonere.

Lienteria, quæ gravioribus supervenit Morbis, five Acutis, in specie in Febribus ardentibus & maligna, five Chronicis, est periculosa, & similiter lenta tabe ægrum interficit, quia difficulter legatur propter virum insignem dejectionem, quæ tamen debet restitui per Assumpcionem.

CURA.

In Cura observandum:

I. Stomachum esse roborandum, & ita Aromaticis quam moderatè Acidis blandè adstringendum, ut ita Fermentis Stomachalis vires redire queat, & Pylori fibrarum laxitas restituatur: adeoque pro hoc scopo convenient omnia illa, quæ tam in Anorexia, quam Apetia fuerunt infirmata.

a. Irritationem in Stomacho maturè esse ostendendam, tollendo acrimoniâ humorum quorumcumque, in specie Gisorum, & sapendo Ventericuli lenium: adeoque pro hoc scopo, quæ in Vomitu, Cholera, aut Diarrhea fuerunt laudata, locum inveniunt.

Pro quibus scopis telicibus obtinenda, notandum est.

I. Quod in præsentia Excrementorum Ventericuli pituitosorum vel limulim, conquant quidem Vomitus, eadem tamen admodum lenia. Fortiori enim vel quantitate vel qualitate, in specie obstat nima inopia, quæ, Veteribus fuerunt in usu, totum Ventericuli facillime destruant, aut certe malum irritant, quod si minus Purgatio per superiora locum habeat, fiat velis Evacuatio per inferiora: blandior nempe, & quæ præter vim abstergentis laxativam simul nonnulli adstringit, & Stomachum roborat: uti sunt Aloëtica, Rhabarbarum, Panacea Stomachi, Myrobala, &c.

II. Si metus vel suspicio Venenæ adit, & diaria Methodus relinquenda, & hoc per convenientem viam evacuandam, eique per Alexipharmaca, aut Venoque Specifica, resistendum. Quod pariter observandum, si Lienteria ex Frangis, vel alitis Fruitionibus botanicis copiosis assumptis, & facili corruptibilitibus, similibusque occasibus cæteris conseruat, ut Appropriatis Alexipharmacis obviari eatur.

III. Cavendum, est iuxta FORESTUM l. 22. Observa, s. in hoc Fluxu si fortioribus Purgantibus, uti etiam a magis eorum dosi, adeoque, quantum possibile, cum eis procedendum, quæ aliqualem adstringentem alvi participant: ut ut in principio, præsentibus recementis fortius irritantibus, non ita ut ad ea procedere debeamus, quæ Fluxum adstringunt. Convenit ergo inter Laxativa Rhabarbarum cum Vitis: Sic HELIDÆUS PADUANUS in observ. p. 156. Puerum triam annorum, gravi Lienteria affectum, curavit per ʒj. Rhabarbari cum Succo Cydoniorum vel Vitis ante cenam exhiberi: Addunt etiam Species Hieræ picæ: Pilule pariter Malticæ conveniunt hoc in passu, quæ ex blanda Purgantibus, Stomachicis ac Aromaticis sunt compositæ, ad gr. xv. vel ʒj. tunc possunt ordinari: item Pilule Aloëticæ.

Medicamenta ergo, quæ ad Lienteriam conveniunt, quod attinet, ferè sunt eadem, quæ supra ad Vomitus fuisse laudata, isdem simul observatis cautela, suntque omnia Stomachicis blandè Aëda, & Aromaticis: qualia sunt v. g. Abenthum, Mentha, uti etiam Salvia, Cinnamonum, in specie Cydonia & omnia Cydoniata, Melsia condita, Nucis Moschata, & Macis, Galanga, Zingiber, item Corallia, Solutiones & Sympus Coralliorum Quercetani: unde refert FABER in Cur. 63. de Lienteria, præmissa Purgatione, curata Aqua Cinnamonis & Sympus Coralliorum. Hinc Corallia, & speciatim paulo elegantiores Tinctura Coralliorum, maxime salutaris, in Aqua vel Spiritu Cinnamonis propinatæ, conveniunt insigniter in Lienteria, cum ratione participationis substantiæ Coralliorum, acce quodvis temperent, & satopæ Idem huius Stomachum ut plurimum gratæ sunt. Harum tamen præparatio admodum variat: non inutilis est modus pro hoc scopo, quando Corallia solvantur in Succo Cacti: Solutionis filtratæ, & inspillatæ debentur Rob. postmodum affunditur Menthrum debent, & exstrahitur Tinctura: quod Menstruum est nunc spiritus Aëreobuticus completus in Tinctura CoralPurum

Anisicorbutica, quæ erit conveniens in Lienteria Scorbutica: quæ extrahitur cum Spiritu Rosarum ambrato ad restitutas vires imbecillitas, tam ex Senio quam ex Venæ, nunc affunditur Effluvia aut Spiritus Ligni Sulfuris, lique Tinctura Coraliorum salutaris in Licuoreti egregia, & qui sunt alii modi. In Lienteria Scorbutica, uti dico, convenit Tinctura Coralliorum Antiscorbatica, quæ utrique scopo facit: Corallia possunt etiam in Succo Lianum solvi: de qua solutione caputur cocturæ, & est egregia. Præterea convenit Zingiber in India conditum, uti & Nucis Moschata in India condita, item Myrobala condita: poterunt enim adstringunt. Elaxir Proprietas, tam commune legitime paratum, quam sine acido, non est inolegas. Alumen etiam legitime applicatum aliis irritis valet in quacunque Viscerum laxitate, & à PÆTREQ in diff. Harmonia laudatur eui singulari, & præsentissimum remedium in hoc affectu, pulvere trans cum alia in liquida aut sicca forma: Melsia supra in Vomito commendata, & hic notanda. Optimum est Alumen dulcificatum: de quo videtur Serapio POTERII, & DARIOTTI in pulvere Chymicum Scholæ diffinitio. Dicitur etiam quod Pulvis pro Priapio Cervi & Tauri insigniter conveniant, si pulverisat à ʒss. ad ʒj. in Vitis medicato propinquetur. Vitis quoque abundans chalybeum convenit, aut Vitis in infusione Abenthum, Melsia, Pulegii, Mentha &c. legitime usu erit proficuum. FORESTUS l. 22. obs. 28. refert Lienteriam deperatam, ex quatuor macies: curant alia irritis hoc remedia: exhibuit nempe vitellum Ovi pulvere Nucis Moschatae unius in sperio, super regulam ignis per calefactum affatum, quo ipso Fluxus desistit, & æger probe convaleuit: unde loco huius euphorisio HELMONTII ad Diarrhoeam, ex vitello Ovi unico, vel duobus ad duritiam coctis, cum pulvere Nucis Moschatae & Aceto rosaceo etiam locum invenit, casus usum felix: & ego in Diarrhoea observavi. Tandem Succus Cacti, Cydoniorum &c., cum Aqua Cinnamonis, Nivæ etiam Cydoniorum aromaticæ cum pauca Terra figillata, mella, & hinc refert aliquot gustus Spiritus Vitis irrigata, similitur laudant: item Conferva Rosarum vitriolata cum terra figillata: vel cum Theriaca mixta, Lienteris curant.

Quæ Irritationis scoli tollunt, sunt Theriaca, & Theriacalis, Laudanum opium & omnia Opiorum, item Eleocharium Diacordis præparati. Ex his facile est plura componere. Facit hoc imprimis Eleocharium SENNERII v. l. in suo Praxi, ubi de Lienteria p. 293. quod est expertum.

ʒi. Conferva. Mentha vel Rosar. probi vitriolati, ʒij. Theriac. opi. vel loco huius Diacord. præparat.

ʒss. ʒij. vel ʒij.

Ol. diffill. Mentha gutt. vi.

Cinnam. gutt. iij. vel iv.

Com. Myr Cydoniorum aromaticis, aut Succo Cydon.

l. Eleocharium.

Cui etiam possit addi Terra sigillata vel alia similis à ʒij. ad ʒj. pro lubito, ʒss.

Eleocharium confectus Stomachum.

De hoc deur crebro portio Nucis Juglandis vel Castaneæ ad insular, donec Lienteria cesset, & simul summa, ex AMATO LUSITANO desumpta RIVERIUS feliciter est usus: vid. Pr. Med. l. 10. r. 4. AMATUS autem LUSITANUS l. 3. c. 36. hoc solo Remedio hentericum curavit. Panis bicodius in Spiritu Vitis maceratus, & hinc Theriaca illius & comellus, etiam convalevit in Lienteria. Aliquando eundem in Lienteria Scorbatica prescripti sequens Eleocharium:

ʒi. Corall. rub. prop. ʒj.

Terr. figill.

Lapill. Caner. prop. an. ʒj. vel ʒss.

Ammon. gr. xv. ad ʒj.

Galang.

Zingiber.

Cubeb. an. ʒss.

Mora Cydoniorum aromatic.

Succo Cydon. ana q. l. l. Eleocharium melle. D. S.

Eleocharium Stomachale.

De quo præterea acrimonia irritant scorbatica, & inde nata corrigenda Lienteria, medicamentum cocturæ famob æger, & convalescebat.

ʒi. Lapill. Caner. prop. ʒj.

Corall. rub. prop.

Acrimonia diaphor. an. ʒij.

Salis vol. Cora. Cora. ʒj.

Oli diffill. Macis,

Mor.

Musha an. gutt. vi.

M. l. Pulvis.

Dosis ʒi. mane & vespere.

Hic etiam Laudanum opium addi potest.

Deique spiritus Mastiche, Decoctum Mastiche cum alio mictum, ejus spiritus acidosus, Syrupus Masticheus TIMÆI non Galdankel, quem in Epist. pag. 456. describit, cum Oleo destillato Menthe & Cinnamomi, & omnia similia in Vomitu astringit, optimè hic conducunt. Præter communia Adstringentia, ut sunt Mastiche, Terra sigillata, Tinctio interna Stomachi gallinæ &c., commendant præ cæteris Congulum Leporis & Hædi Ecceatam & ad ʒi. propinquant. De aliis Adstringentibus, spiritus Salis, Li-quore styptico, ceu potius, non est multa dicam. Obser-vandum saltem, an magis Tonus stomachi roborandus Ap-propiet Adstringentibus? an magis Acce vellicos abster-gendum & temperandum (T)?

Externè in laxitate stomachi, ut debitus ejus Tonus resti-tuatur, conveniunt Sacculus sequens pro Fœtu:

ʒi. Com. Abfisth.

Mush. Musha an. M. l.

Flor. Chamemill.

Rofor. rub. an. Mʒ.

Mafisth. ʒi. vel ʒi.ii.

Caryophyll.

Nuc. Mafisth. an. ʒi.

Zedair.

Zingib. an. ʒi. ad ʒi.

Includitur Sacculus interpellando, qui in Vina coctus vel ma-ceratus repudi Ventriculo admoveatur, & subinde repe-titur.

ʒi. Com. Abfisth.

Mush. Musha an. M. l.

Mafisth. ʒi.ii.

Caryophyll.

Nuc. Mafisth. an. ʒi.ii.

Zedair.

Zingib. an. ʒi.

Sacculus interpellatus inclusit S.

Sacculus pro stomacho.

Exillis in Vino, & crebro applicetur stomacho. Qui si non sufficit, plura Externa applicanda, supra in Appetitu posita, Christianiana Iafa, & Vinum laudata. Cataplasma in Fermento & Pulveribus Aromaticis supra in Vomitu lau-datum, hic & in quibusvisque Affectionibus stomachi maxime locum habet: Formulæ quoque videre potestis in Catalog. Judicium MICHAELIS: sicut & Emplastrum stomachalo de Laudan. Crasso, vel solum, vel mixtum una cum Taca-mula & Ballamo Peruviano, de qua superior, egregium decontra Lienteriam. RULANDUS recipit solum micam hanc, cuiusque Aceto impregnata regionem stomachi non aliq. facelle applicat.

ARTICULUS IV.

De Colica.

Lienteria incipit Optima Viscosa (V) live Chylifera Alvi enteria, quando nempe Alimenta assumpta digeruntur quædam in stomacho, sed digesta sub forma chylifera cum excrementis una per Alvum exonerantur; quam tamen RIVERIUS Lienteria saltem gradum remissionem credit: duplex hujus Colicæ, annotante SYLVIO Pr. Lt. at. 3. ʒi. & a. hendi est modus.

1. Quando Chylus non fecerit ut Fœcibus aliis in Intestinis, sed simpliciter, prout ex stomacho solet di-luui, sine alteratione foras emittitur; cum debilitate agri & infigni languore vitium; unde Sacra græca, plus minus albacantia, Chylifera invicem permixta appa-rire solent.

2. Quando fit quidem secretio Chyli ab Excrementis, cæterum propter defectum distributionis Chyli hic qui-

dem secretos, tandem cum Excrementis confusos nihilominus exonerantur.

Prior Passio Colicæ species, quando scilicet nulla secre-tio Chyli ab Excrementis contingit, fit vicio Biliis, quando nempe Bilia ad Intestina non deferuntur, ut ibidem possit in-sistere secretionem illam, h. e. quando Bilia in Intestinis de-ficit, quod fit in Idieri ista specie, in qua obstructus est Por-us Cholelocus: nam solus succus Pancreaticus non po-terit perficere Chylum, nec debetam secretionem militare, sine Bile, in qua maximum momentum situm est: hoc de-fectum licet Bilia ad Intestina, si tamen hæc est inera & in sua crasi vitata, i. e. non sufficienter bilis acris, sed potius tantummodo oleosa, ac nimis pinguis, nec potius nimis fe-rofa, vel aqua, tunc similiter nulla Excrementorum à Chy-mo nutritivo potest fieri separatio, bujuse debita perfectio; unde Colici Fluxus species emergit.

Posterior Colicæ species fit, quando parentibus Dudibus, Choleodocho & Pancreatico, fit quidem secretio Chyli, sed nulla distributio; quia obstructa aut infesta sunt orifi-cia Vasorum Lacteorum in Intestina hiantium, & mor-gobita, unde non potest eadem subintrare Chylus nutritivus, adeoque propterea Excrementa cum Chymo nutritivo exonerantur.

CAUSÆ.

Causa Præxima prioris est Obstructio vel Infarctus dige-norum Dudum, sive à Calculo sive à Mucro, sive ab alia re: Cæterum notum, Chylum perfectionem ultimam accipere in Dundeno, accedente Fermento Fellico, quod deficiente, nulla fit separatio Chyli à Recrementis, unde Chylus erodit.

Causa Præxima posterioris est Obstructio vel Infarctus Va-sorum in Intestina tenuia hiantium: nam licet fiat separatio Recrementorum à Chylo, per peritoma istam illud In-tellinis incumbens, per quod tanquam per sitrum cribra-tum aut tranfolatut Chylus nutritivus, fit incursatum sic mucagine viscida ac tenaci, dista uriscifolia nim infascien-te, non potest admitti Succum chylifera nutritivum, at-que propterea confusa Excrementa cum Chyme nutritivo exonerantur.

In hanc autem Colicam Fluxibus Ventriculis usperimam est salvis, quia Chylus perfectus exoneratur: uti hoc obser-vat FRAMBESARIUS in Conf. a. l. 5. Interdum enim fit legitime digestio prima, licet secunda vitetur: sicut taliter affecti non raro insignem habent appetitum, quod obser-vat FORSTIUS l. 12. obs. 26. in Muliere, in qua appetitus adhuc fuit salvis. Interim tamen hoc non universaliter adeo asserendum, quia tunc magis tunc minus salvis vide-tur: id quod docet curia's Observatio 78. M. A. N. C. an. 4. & 5. pag. 63, ubi quidam post ejusmodi generis Car-nim effluxum Fluxum patiebatur; lo hoc nempe Carnes, quia non bene in Chylum perfectum digerere transmutabatur, sed probabiliter ulduoso sapore corrum-pebatur, etiam inde factus Chylus separatus: ac perfec-tioni ulteriori in Intestinis ineptus, Fluxum Chylifera concitabant. A Pileibus nihilominus etiam durioribus, tam recentioribus, quam salitis & fumo induratis, non idem patiebatur, quia sine dubio Venericuli Formæto magis ap-propinquati, & hinc melius digesti fuerunt. Vitium ergo to-tum Fluxus Colicæ est vel in ipso Chylo manè digestio, adeoque inepto subeundi alterationi Bili, vel in ipso Pile non fecerant, vel in poria Intestinum non admittenti-bus Chylum.

Causa Remota est omne id, quod Folliculum Felleum aut Choleochum obstructum, aut Mucum copiosum in Intesti-nis facit. Si officia Vasorum, Lacteorum aut à Mucro viscida obstructur, e. g. in Infantibus aut Senibus, quibus malum hoc fita frequens est: aut à calculo & cicatrice Intestinarum post durum Alvi Fluxum, præsertim Dyentericis, hinc membræ Intestinarum interiora eroduntur, configura-tur: quale quid illi, qui per Indiam Orientalem iter faciunt ob Dyenterias locis illis familiares, sæpius experiantur. Hoc etiam pertinet Glandularum Mæstærii obstructio-nes ac dispositio scirrhosa, à quibus Fluxum Colicæ or-tum esse, diversis Auctorum Observationes testantur; ver-

(T) Quævis nam negem ex irritatione Fyltri, imò & universi Ventriculi fieri posse citam Affertum veris Intestini detur-bationem, quæque Lienteriam; arguam avertendum sequentem Lienteria causam esse potius Fermenti digesti hanc, ac Ven-triculi enteria. Quod si accuratius mundum esse doceat, error in Præxi committitur, h. e. irritationem qua nupsum est præ-sens, Mæstæria pinguis & oleosa ad Phlegm deturbandum exlabeatur, qua Mæstæria tamen debili & laxa Ventriculo in-ficit, adeoque morbum potius exasperat.

(V) KNAUER scilicet, & KNAUER videri, à KNAIE Ventri, & Alvi: Cælia sèpi pro Ventriculo Medicis sumitur, & postea Colica Passio dicitur, fit propriè Ventriculi affectio.

gr. DIEMERBROCCIIUS *Ant. l. 1. cap. 3. M. A. N. C.*
Ann. 2. 1652. & RIVIERUS *Lio. cap. 4.*

DIAGNOSIS.

Signa distinctiva, seu quibus distinguere possumus, à qua Causa oritur Fluxus Celiacus, sunt facillima. Nam ubi dehebit Bilius, evisce actio, excreta per Alvum omnino sunt albicantia, vel græci, aut saltem pulvis; item omnia invicem sunt permixta, nec ullum cupidum patet vestigium fœctionis: Ubi verò obstructa sunt orificia Valorum Læto-rum, tunc Excreta sunt ricta Bile, hærescunt omnino, & sic potu; & præterea Chylus talis cum Excrementis hinc inde confusus tantum apparet, ita ut certa quædam differ-entia Chymi nutritivi, & Recrementorum in excretionem conspicua sit.

In perfectâ Cæliacæ affectionis gradu dolores Vetriculi febri, delirio, anxietate &c. à passu brevi poss. urgere solent. *CONT. FERNELIUS* *Method. p. 305. & Liber Med. p. 414.*

PROGNOSIS.

Quod *Prognosis*: malum est facia grave, si diutius duret, quo æger vel maciem vel atrophiam incurrit, & tandem ad lethalem talem perducitur; quamvis Fluxus Celiacus alia species ostendat, alia tardius ac difficilior curetur: ver. gr. quæ ab Humorum viciatitate difficilior sanatur, quam quæ à Biliis assuæ deorsum; nisi forsitan hujus causa fuerit ma-lum difficiliter movet, v. gr. Calculus Meum Chole-do-chum obstruens.

Imò incurabilis est illa, quæ à Cicatrice Intestini, & Coactu oculorum Valorum Læto-rum, Glandulive Mesenterii induratis oritur.

CURA.

In *Cura Prima* speciei Celiacæ Fluxus, Folliculus Felleus obstructus, aut causa ista obstruens removeatur illis, de quibus *infra de Hære* dicitur. Imprimis accendat illis is, quæ ita volatili acris & oleosa constant, adeoque plus minus amara sunt, seligendo imprimis Stomacho simul gra-tia vel accepta; nam Biliis debita salubritas prædita non per-mittit obstrui suum Duod. Quando ergo obstruitur, est in-ertia Biliis epulæ debetia acrimonia lila. In *secunda* specie abstergendus est Mucus adherens parietibus Intestino-rum, aut removenda quæcumque impedimenta, Chyli distri-butionem inhibentia.

Utrique scopo satisfaciunt simplicia vel Aromatica, vel blandiora, vel acriora intense Amariantia, Bilem & ejus-dem acrimoniam augmentantia, Ductusque Chole-dochi, & Valorum Læto-rum obstructiones resolvuntia. Præcipuum est Abieshim; Mentha, Agrimonia, Capillus Veneris, Cardus benedictus, Radices quæque Aperientes dicuntur, Radices Cichorii, cujus amator nitrosus egregie in specie convenit, Intestina abstergit & in genere omnia Amari-cantia. Novi Celiacum, tantum cum loco Vini absinthio fuisse curatum. Item convenit Rhubarbarum, Feniculum, Radia Rubæ tindurum, Semen Anis, Fœniculi, imprimis Ciceres rubra, quorum Decoctum à quibusdam insigni-ter commendatur: Gummatæ sapida laudata, Mucum vi-scidum, Vaia Læta obstruere, resolvuntia, in specie Gummi Ammoniacum, & Mixturæ eis consistat, item Pulvæ eis in Gummatibus conveniunt. Gummatæ hæc de-sillata suggerant spiritum acidum volatiliem, in hoc casu optimum, maxime si conjugatur cum Æthere, & destil-letur spiritus Viridis Æris composuit, huc componatur Viride Æris cum parte dimidia solus Gummi Ammoniaci, seu addatur omni Sulphuri: sic destillando per arenam ex-recta prædit spiritus acidus volatilis, qui ad Mucum dissol-vendum est optimus, de quo *postmodum* ubi de *Absterge-ntibus* in nro sunt in tali casu, ubi resolvuntia, & absterge-nda Pituita, Oxymel nam simplex quam ferissimum, cum A-qua Vitæ insperperat: loco hujus videri potest dicto *Spiri-tus Viridis Æris composuit, dicto Abstergendo*.

Remoto Mucò, lubumitrande sunt Salia Alkalia Mu-cum abstergentia, & officia Va-orum Læto-rum infarsa optime referantia: Idem convenit Tindura Tartari, tam vulgaria, quam Tindura stercorum Reguli Antimonii vel Alkali Tartari, & Natri, quod imbibat spiritus Vini tali

Tindura: item Tindura Tartari composita locum inveniet: hæc cuip Tindura, solo alkali impregnata, aperient, Bilem accunt, & pluribus intentionibus satisfaciunt. Convenit etiam Tindura Martis pomata, Liqueor Terræ foliæ Tartari, cui cum, & ex eo parata Tindura Vitrioli Martis *Zuccellieri*, alique Essentia Martialis aperient cum Menstruis temperatis non nimis acidis paratæ. Quibus tandem Salia volatilia omnia ad meliorem penetrationem commodè possunt administrari: Spiritus Salis Ammoniaci, vel simplex, vel oleosus factus, addita Aromaticis, vel per se, vel cum spiritus Cochlearis mistis, spiritus Urinæ, spi-ritus Carniati-vus de Tribus, cujus *supra* feci mentionem, ex Tartaro, Nitro, & spiritus Vini, ad gutt. 30. vel 20. in Aqua Menstræ, vel alia appropriata, aut haustu Biliis abster-gentibus usurpatis, spiritus Tartari volatilis per fermentationem, sive cohabitationem à sale fixo, de quo videatur TA-CHENIUS; & similia volatilia Aromatica, Bilem acro-rem reddentia, & viciatitate Intestini abstergentia, cum spiritus Cochlearis, Næsturi, &c. mista. Quidam com-mendant Adstringentia, sed non conveniunt, potius malum exasperant. FRAMÆSARIUS *in supra* in. cu. specificum commendat Pudentem sive Pispum Cervi.

Quod attinet Externa in Cæliacæ: parum aut nihil ope-rentur, nisi concurrat vitium Vetriculi in Chylificatione laesa, in quo casu applicari possunt, *quæ suo loco dicta*.

C A P U T III.

De Expulsione contentorum alvi depravata.

ARTICULUS I.

De Dysenteria.

Non raro depravatus Alvi Fluxus in excretionibus de-lorosa, quando præter Chylum aut similia ex Alvo ejicitur sanguis, æquæ ac Pus, vel Sanies, cum Ventradiolo-æ ac torminibus, quæ inter primarium ducit *Diarrhæa Cru-enta*, aut secundum legitimum Veterum usum dicta *Dysen-teria* (X).

In genere quicunque Alvi Cruentus Fluxus secundum Veteres, HIPPOCRATEM, & continuos aut successio-ros egi, *Dysenteria* appellari solet, talis Hemorrhoidibus accepta, quibus admodum talis auctoritas: unde in hoc ge-nerali sensu apud Veteres non sunt *Grades*, sive potius *Dysenteria Dysenteriorum*.

I. *Prima Differentia* est, quando sine Intestini vitiis, motu & impetu Naturæ, ea quæcumque causa sanguis vomit in toto corpore abundans et Venarum nescitis in Intestinis nescitis effunditur, & per Alvum excreatur; differens saltem loco effusus ab Hemorrhoidibus, in quibus saltem Venæ Ani aperiantur; in hac verò Dysenteria etiam reliquæ, ad superiora Intestina secundum totam eorum longitudi-nem, perque omnes eorum anfractus, distribuitur. Talis Dy-senteria interdum evenire solet is, quibus aut membrum aliquid amputatum fuit, e. g. pes, brachium &c., tunc enim non potest non abundare sanguis in toto corpore: quæ ex-emplum refert HILDANUS in *Med. Com. 1. de Juvenc*, cui dicitur tibi amputatæ fuerunt, qui post curam, Dysenteria lethali fuit correptus; aut in quibus solennes evacuationes sanguinis supprexis in quibusdam locis, sanguis per alvum sibi viam querit, v. g. Mulieribus, quibus suppremitur Menfes; tunc enim non raro fit Diarrhæa Cruenta. Non raro talis Diarrhæa Cruenta supervenit Homini-bus Splenetici aut Melancholici, item quibus Vomitus Cruentus, etiam interdum talis Diarrhæa Cruenta familiaris est: Pertinet hæc Dysenteria Nothæ Sæcbotiorum, de quibus vid. HORSTIUS in *suis Observ. l. 7. observ. 354. 355. dum Scor-butici sæpius sanguinem excreverunt, qui neque Hemor-rhoidalis, neque Diarrhæa genuina fuit, sed Diarrhæa No-thæ ea analomiae Vasorum in Intestina orta. Sic pariter ex Ulcere Mesenterii interdum Diarrhæa Cruenta oritur fo-let: talis sanguinis excretio item est usitata is, qui labo-rant, utur raro; Ulcere Pancreatæ, quæ SYLVIVS *in Pr. observavit*, quid Ulcus apertum interdum Pus, interdum autem non purum sanguinem effudit. Pertinet hæc etiam Dysenteria Critica singularis: de quibus vid. RHODIUS.*

(X) Dysenteria item fitur ac difficilior in Intestini, & paritè in, Difficiliter, & *traxit*, Intestinum. Cæcus hunc Morbum Latine Tormina appellatur.

DIUS in suis Observatiōibus, quales nullus Auditorum unquam vidit.

II. *Secunda Species Dysenteria*, seu Fluxus Alvi Cruentus est ille Fluxus, quo Sanguis tenuis & aquosus, & lotioris carum similis, uti appellatur, sine dolore excerpitur, quod propter Hepatis imbecillitatem fieri dicitur, & alias Fluxus Hepaticus appellatur; quia talis præsupponit virum vitio Hepatis non ritè sanguificanti; sicut hoc nomen ipsi omnes Veteres tribuunt, utur Hepar in se sit infans. Tacebo jam de hoc, est enim revera nil aliud, quam apertio Valvæ internarum five superiorum Hemorrhoidalium.

III. *Tertia species Dysenteria* est, quando ab vitio Intestini ipsi modicum, cum ingulis Terminibus, & cum mucositate, hinc cum purulenta materia, Sanguis ejicitur, quæ tertia species est. Dysenteria dicitur, prout bodie in nominis venit, & quæ nil aliud, quam *Diarrhæa Cruenta terminata*, sicuti reliquæ Diarrhææ Cruentæ fere semper sunt abque Terminibus (V).

PARS AFFECTA.

Par affecta in Dysenteria sunt Intestina, nunc citius i. vid. SPIGELIUS *Anatom.* p. 179. PANAROLII *Præf.* 1. *Obf.* p. 2. & BARTHOLINUS *Com.* & *Obf.* 2. i. nunc tenuis, quod præteritis feculentis cadaverum, quales BARBETTE *Præf.* 1. 4. 5. & M. A. N. C. *An.* 3. *Obf.* 116. gelantur, disparitas quædam Signorum, de qua in *Diagnosibus* docetur, credere jubet; nunc concludit, quod HORSIIUS 1. 4. *Obf.* 10. docet; quatenus scilicet ab obsequio vellicatur, irritatur, & Spiritus infans incandescit. Latet enim Intestina, si ab obsequio sensibili vellicantur & irritantur, & tandem sic, ut talia pathemata sequantur.

CAUSÆ.

Causæ Dysentericæ est vel Effluvia *Præputia Formalis*, vel Materialis, five *Occasionalis*. Illa est Spiritus influens, sed occasione talia ad præternaturalem impetum provocatus, & dulces terminosorum & excrementorum, Sanguinis ac Muci, profusio prima vitæ.

Sed ob hoc, causa Causa universalis, Causa imprimis particularis in *Organis* talis consideranda venit. Hæc est Acre quædamque interitum, pertinaciter Intestina afflicta, quæ in tantum continetur vellicata, & stimulantur, ut propter irritationem continuam eodem Sanguine effluat, itaque cum insigni dolore: ab acri obsequio enim Intestini membrana vellicata & puncta sic contrahunt, unde Terminibus, cum ad locum latum hæc uberior Sanguinis affluunt, & per lacerationem Vasa aperiantur, & Sanguis profundetur: & qui acrioribus fermentis utitur, post crebrius Intestinum Sanguinem emittunt. Optime hendiunt Dysentericis offendit Hypercatharsis, quod Purgantibus, v. g. Antimonio, psipatis, violenta facit, quia Intestina ipsa afficiuntur, & sic Hypercatharsis Cruentæ superest.

Acre autem hoc in specie est Acidum membrana Intestini Nervique inimicissimum: unde v. g. Molities Hypericæ, acris, acris, acidus & erodens: hinc fæces turgidæ, & cum aliis vellicata Nervorum sensibilibus obineant, aut afflicta Intestini spasmidici obnoxia sunt, mediocriter etiam Purgantibus facili graves Dysentericæ incurrunt, quatenus Intestina à Purgantibus fortius vellicata, & ab Acido non excoriata & erosa, cum gravissimis terminibus Sanguinem fundent: unde quodcumque acre fortius Intestina vellicat, simulque plura minus Sanguinem, & reliquos inde dematos succos exagitant, facili Dysenteriam excitant. Novi bina exempla in Hysterica, quæ habuerant system Nervosum Intestini sensibile, quod gravem Dysenteriam incurrerunt.

Porro, ratione hujus Causæ Materialis distinguenda est una tertia Dysenteria; dum alia est *Benigna*, alia *Maligna*: *Beniga* ut plurimum sine febre est, item sine contagio, & rariis sporadicè, seu sparsim quosdam Glegen homines in hoc vel illo loco affligit; *Maligna* verò Dysenteria ut pluri-

mum conjuncta est cum febre maligna, interdum pellicentia, simulque epidemicè grassatur, ac læpe integram regionem devastat, & potest contagio se multiplicat, de qua postmodum.

Dysenteria Benigna & Sporadica, seu levissima, in diti, oritur ex Acri quocumque, frequentius tamen ex Acri acido plura minus corvino, intestina potentius irritante, & plura minus exoriente: & ita Terminibus & Sanguinis effluviis excitato; & vitioque ex illis talibus, aut corruptis, aut ita scem pergrinum degenerantibus, aut denique oritur, ex Succo Pancreatico nimis corrosivo, vel per se tali, quando non temperatur sufficienter à Bile, vel propter irritationem à Purgatis copiosis in Intestina effluo. Nil enim magis est nimium partibus nervis, & Intestinis, quam Frigus & Acidum; unde, si tale quocumque errore ad Intestina pervenerit, membranas nervositas, excoriat, & ad Sanguinis profusionem disponit. Rara nempe est Dysenteria Benigna, quæ sit vitio languine Maltæ, sed fere tantum ex Contentorum in Intestinis corruptione & depravatione. Hinc notum est, quod imprimis Fructus horæ five sotumatis, qui facillime corrumpuntur, & corrupti, vel in corpore alterati, & non ritè digesti, intestinum & fortem acutum contrahunt, dicit Dysenteriam; quos inter Fructus, Pepones, Melocis imprimis, & Cucumeres eminent, uterque Pruna ceræ, Germ. *De spiliis*, quæ ipsa non paucos Dysentericos reddidit, refert FORESTUS 1. 4. *Obf.* 23. SENNERTUS in *Præf.* & MOEBIUS in *De febribus*. Saccharum, item Cibi dulces & mellis, in Stomacho corrupti, imprimis in Hypochondriacis aut Hystericis, in quibus subiectis vitiosa fermentatio vel omnis acies, vel lui intellecta cum Bile acutissimè excitant, & cammarum nimis movent, Dysenteriam incurrunt inferunt. Eius iterum Usurum nimium, uti etiam Melli, plura minus fermentando & accedendo, facili ad Dysenteriam disponit nam Multum corruptum similiter accit. Purgantia etiam fortiora, uti Antimonium seu Colocythis, aut similia, irritando acris & vellicando Intestina, & ita acrum Succorum ad ea derivationem prouocant, Dysenteriam Benignam non raro inferunt, ordinario in visibus systematis nervosis subleiora. Mercurius etiam vivus pro Curo Luis Venereæ extra illius Dysenteriam interdum inferre observant Galli, scilicet per Inoculationem Mercurialium Lum Veneream curantes. Sic Ulcus pelvis-dicuum curatum Dysenteriam ingreditur lethale. vid. N. N. G. *Ann.* 8. *Obf.* 23. pag. 314. & Verminus quos Dysenteriam excitat: vid. RIVERIUS *Obf.* 3. & BARTHOLINUS *Ad Hæst.* 1. 2. *Obf.* 31. Sic et uso Aceti in plumbis vix affert vix observata sunt Dysenteria à SENNERTO, vel etiam Aquis in canibus plumbis distillis alternatis. Adamas devoratus nec quovismodè tritus Dysenteriam inferi, quod certum est, ratio, quæ eundem tantum propter angustiorum acutem incidendo & petendo non possunt non lacerare Intestina; cum notum sit, solum Vitrum non ritè comminatum tale quidd præstare: vid. ZACUTIUS LUSITANUS in 1. 1. *Præf.* *Adm.* *Obf.* 18. item 1. 2. *Obf.* 10. de Dysenteria, Tabæ & Morbo ex Adamas impotè devorato Sed dice: Adamas non mutum tritus alas enim minutissimè pulveris pro Dysenteria cura adhibitis fuit refert WORKMIUS in *Adm.* p. 103. ubi de Adamas item ex asperitate Anulidoganti observavit ZACUTIUS LUSITANUS Dysenteriam, quæ Dysenteria Puls cralla ex Uræa mederi potest (2).

Hæ Causæ, five erore externo five interno, inferunt Dysenteriam Benignam, in quibus peccat Acidum acre intestina erodens. Sed hæc vel Dysenteria Benigna, quæ non multum facili negotio.

Quod Endemiam Dysenteriam, nullibi huius mentionem faciam observavi, præterquam in SYDENHAM *Obferv.* circa *Morbos acutos* p. 347. §. 4. 3. qui talis Endemica Hæbentorum Dysenteria mentionem facit.

Epidemiam quod tenet: hæc omnium frequentissima est, & Autumnali præterit tempore aut hujus confinis, solet affligi.

(Y) in M. A. N. C. Dec 1. Anno 8. *Obf.* 43. Wedelius (ut Auctor auctor quoque in sequentibus verbis) mentionem facit Dysenteria indolens, quam *Beniga* appellat. Hæc anno 1669. per Auctoris viciniam epidemicè grassatur; Ea præterea se de minime quidem dolore conqueritur, quæque talia tamen causæ esse querunt, etiam si alia maxime terminibus excorretur: non potest quidem Dysenteria torqueretur, omnia multis per afflicta querantibus, id autem Wedelius tribus Causis assignat. & gangrenosa Intestini confusio: & exemplum addit maxime efficaciam Causarum, quæ sensum obducunt, & carnis vasa applicat corrodunt, in ipso necesse inducunt.

(Z) Dr. Maubec trallat perniciem de Dysenteria, est Causam hujus morbi proximam, & symptomatam ab ea pendentem, est crassum & acrimoniosum Succus, qui spe Glutularum Intestinales in Sanguine in Intestinis separatur. Hæc Succus ferendus Naturæ leges fluidus & tenuis est, & crassum autem & acrimoniosum acquirat ex mixta materia extranea, quæ e prius in Sanguinem primam delata, deturbatur postmodum in Glutula Intestinales.

affligere. Oritur ab Acri acerrimo, Intestinis speciososuo sapore insensibilis, eoque sub mole minima efficacissimo, adeoque saltem Fermento subtili tot mala inferente. Hoc nunc acutus est, antimonialis, aut helleboriz, vel colocynthæ quædam prospicit; nunc mitis: unde nunc Maligna nunc Benigna, utraque insigniter Contagiosa.

Maligna plures habet in recessu, & imprimis observanda vis eque Contagiosa, quæ se per Contagium malignum mirifice in corpore humano propagat: non enim solum per sedes communes promptissime inficit, sed etiam (quod observatum dignum est) per instrumenta. Clysterum potest alium inficere, teste HELIDÆO PADUANO *italie in Obs.* p. 104. Dicit enim, sæpius Dyfenteria corripit eos, quibus Clyster infunditur, instrumentum non bene abluo, quo antea Dyfentericus fuit usus: sicut etiam HOLSTIUS *in Obs.* dicit instrumenta sacrificiis apta, non purgata, ejusmodi aliorum contagiosa excitare.

Exempla talium Dyfenteriarum Epidemicarum plura minus Malignorum sunt frequentissima; imprimis scriptæ de hac LAMONIERE de *Fluxu Dyfenterie epidemice* item WILLISIIUS in *Phor.* Rat. p. 1. pag. 119. & 125. It. SCHENKIUS in *Obs.* lib. 6. (si fallor) 6. *de acria Morbis malignis*, BARTHOLINUS *Cas.* 3. *Hist.* Anatom. 65. non minus quam AMATUS LUSITANUS *Cas.* 3. *Cen.* 90. Et quidem talis Dyfenteria Maligna non promittit quicquam animalia affligit: nam Dyfenteria interdum in Homines solum, interdum in Bruta tantum grassatur, dum SALMUTH l. 3. *Obs.* 59. Causas talium & Feles Dyfenteria Contagiosa Maligna laborantem observat, quod rarum est. Oritur huiusmodi Epidemice Dyfenteria ex Causa externa plures affligente, lo quorum corporibus exaltatum Contagium fermentativa vi se multiplicat, imprimis propter Aërem plures mihi præternaturaliter alteratum, & Alimentant inquinatum, & A. quærum vitio, ac Fluxum horum corruptelæ & inquinamento. Sic Dyfenteria heralis est ex Brafficæ capitæ, notio roræ infestæ, refertur in M. A. N. G. *Act.* 3. *Obs.* 85. p. 123. Item post diuturnam Siccitatem & Aëstem ignisalem, ubi Rubedo corripit fructus, aut Miasma malignum exit ex Terra, foliis arctisissimis Arsenici adherens: quale fuit Miasma Anni hujus seculi 54. & 66. in quibus mirabiliter grassata fuit Dyfenteria, ubi post Aëstem ignisalem Febris corrupti. Post Aëstem ignisalem, & inde hinc ortam ebullientiam candidam insulari Virgilio Saturni in canalibus plumben restorum, superponente pluvia, & flore isto ita abluo, ac Aquas inquinantem, anno 1644. Dyfenteriam perlinentem in Belgio ortam observavit LINDANUS in *Coll. priv.* ad Hartmannum. In consideratione hujus Dyfenterie Malignæ Contagiosæ, cum omnia Contagia condant in Miasmæ fermentativo, Miasmæ quidem inquinante, & consequenter Succos alterante, sed arbitror sensisse WILLISIIUM de *Causa Dyf.* *Tract.* de *Febris* l. 1. *pag.* 125. quod scilicet talis Dyfenteria non oritur ab Humore aliquo vitioso in Intestinis Visceribus productæ, qui acrimosia illa corrodæ; (non ita: quoniam tantillus fermentativus odor potest etiam fumum inficere) sed rectè dicit, Causam ejus esse Miasmæ quoddam Sanguinis imprefum, adeoque intus ipsi confusum, inde ad Intestina latum, is imprimis inimicus, acrimosum hostilem afferens, Intestina irritans, Valorem osicula referens, & Sanguinis excretionem faciens. Nempe Miasmata talia videtur esse nature quasi animalialis, de natura Colocythidis, aut Scammonii, aut similis, quæ in specie Intestina saltem acrimosia sua vellicare aut afficere, simul tamen & massæ sanguineæ Crasin fermentativa sua vi pervertere valent, aut simili ratione, ut Arsenicum, quod gustu dulce est, & etiam extra non cito sentitur, intra autem cum symptomatibus multis mucos eructans facit. Unde ratione prioris Tormina, & hinc Cruentæ doleant, ratione posterioris Febris maligna asphæda esse solet. Tale offe Fermentum contagiosum, quod fermentando corruptit Sanguinem, & ipsi acrimosiam aut naturam letificis insigniter hostilem impertit, nullum esse dubium: sicut enim Butyrum Antimoniæ partibus nervatis illum Ulcera excitat, ita in Intestinis similis Causa acida ejusmodi Exulcerationes excitare potest.

Quod actius progressum in Dyfenteria, est talis in principio, dum Dolores & Tormina Intestinarum urgent, excrementa liquida albicantia, plus minus mucilaginosa, seu Mucus albus, binc Sanies, & Pus cum Sanguine. Unde propterea plerumque de Sanguine, nunc plus de Mucosæ cernitur, dividunt vulgò Dyfenteriam in *Rubram*, & *Albam*, Sanguis, qui excrevit, equidem ex Vasis vel anatomici vel diceretis aperitis profluit; Mucos vero quid præciat sit?

controvertitur. Sanguis, qui præfunditur, non est præciat ab Excoriatione aut Exulceratione Intestinarum, ut vocant; nam utat hoc in Benigna ab acrimosia succorum acidocorrosiva simpliciter orienda locum habet; in Maligna tamen, & in qua tantillum saltem Miasma acre, Contagii medio propagatum, Causæ proximæ vices obinet, non opus est tali Excoriatione; Sufficit ab illius Contagii acerrima & Intestinis inimicissima acrimosia continuo & tam fortiter stimulari Intestina, ut hac ex irritatione & crebriori contractione tandem proprium Craorem fundant & expriment; simili modo atque à Pulvere ferussatorio fortius vellicatur Nares, ut Mucum crebriorem, & tandem largam hæmorrhagiam fundant; ita ut Cruoris profusio fit saltem conseqens, & effectus alterationis in intestinis; nunc (pina alicubi infixa ex doloris occasione affluxum Sanguinis uberiorem, indeque, ubi denegatur hæc excretio, Tumorem facit. Similis Spina est tantillum Acri alicubi rodens in Benigna, vel Miasma virulotum Intestinis hostile in Epidemica & Maligna; hinc vellicatis Intestinis, & horum repetiti spasmus, & insignior Sanguinis fluxus excitatur, unde tumensibus Sanguine Intestinis eadem rubet, & non raro inflammantur, & per apertam partem, partem erosa vasæ Craorem profundunt.

Nempe hoc est insignis *Arctis* Intestinalis, seu spiritus insiti, Craorem proprium insitio profundentes, ex irritatione ab occasionali Fermento, ut loquitur HELMONTIUS acri, Intestinis insigniter hostili, unde & Termina & Sanguinis per anum profusio, aut Muci extravasatio, copiose superveniunt; binc enim rectè dicit, quod Dyfenteria a Pleuritide tantum differat in radice, seu loco afflicto, cum quæ aut causam convenit.

Mucus hic sub curia morbi interdum est valde copiosus. Multi admirantur, unde fit? non sanies est, aut Pus: et ut dicit, qui dicitur, quod nihil aliud sit, quam Putrida, quæ naturaliter oblitit prius Intestinarum; quod tamen non potest esse, propter etiam & excessum, quæ subinde excrevit, ejus quantitate, pro qua capienda Intestina ipsa interdum non sufficerent. Probabiliter videtur HELMONTII sententia, qui dicit, destillare Mucum talem ex Intestinalis lacis, & esse nihil aliud, quam Nutritorem Intestinarum irritatorem proximam, sed depravatam, aut frustat Intestinis insensum, simili modo enim ac pari exulceratione plocat isquem, qui nihil aliud est, quam Nutritorem istarum partium: ita Nutritorem hoc, cum intestinis lacis, excoriat & exulceratis affligit nequeat, ex parte lacis nunc sub forma Muci, nunc sanies, nunc Puris in cavum eorum destillat, prout diversi sunt gradus corruptionis hujus Alimentis proximæ; jam sæpè Sanguinem una effundunt *læsa carum similes*.

Tres autem Gradus in hac Dyfenteria imprimis observandi sunt.

1. Quando tantum adfuit atrocitas Tormina cum Excretionibus mucus & crassæ.
2. Quando cum Torminibus copiosius Mucus plures minus præternaturalis & eructans excrevit, quemque vulgo dicunt esse Abstrationem, aut aliqualem Excoriationem Intestinarum.
3. Quando in tantum susceperit malum augmentum, ut jam in Intestinis lacis sequatur perfecta Exulceratio. Quod in gravi Dyfenteria per generetur in Intestinis, patet ex Anatome: non enim tantum in Intestinis, sed & in Glandulis Melanicis Pus copiosum colligitur & abacitur, illa autem Abstratio iterum est triplex, secundum illa nempe, quæ aut cum Mucos interdum excrevit observantur:
 1. Quando saltem interiora Mucosa hæmorrhagica, seu crassa illa, quæ Intestinarum carni obducitur, abstrahitur.
 2. Quando jam aliquid de Intestinarum tunica crassa abstrahitur. HIPPOCRATES vocat illud *Ramenta Intestinalia* in *Sell.* 3. *Apoph.* 64.
 3. Quando jam ipsorum Intestinarum substantia crustificata, sive caro quasi subulstribit eroditur, & cum exeat Caruncula, ut dicit HIPPOCRATES *Sell.* 4. *Apoph.* 26. qui tertius gradus est acerbissimus, & mortiferum signum.

Carunculae tales, quæcum passim apud Anchores sit mentio, quid sint? explicat obcurum est. Sane substantia Intestinarum membranosa non videtur esse: potius Glandulis Intestinalibus tumefactæ, & morbi progressu à substantia Intestinarum separatæ, & ita excrevit Carnium, sive molecularem carumlarum speciem relescentes.

Tandem, de *fit Exulceratio in Intestinis Dyfenteria afflicta* uti vulgo asseritur, merito dubitatur, & rectè hoc negat HOLDERHOFFIUS *Tr. de Err. Medit.* pag. 33. ex

eo, quod aliis Dysentericis Cura per Specifica tam cito fieri non possit: ut taceam, tantumnon impossibilem curatu videri talem Exulcerationem, cum aliarum partium membrorum Eulcerationes, ut Laryngis, item fistula Ani, sint ut plurimum incurabiles: Ergo non nisi in disturniori Dysenteria, etque graviore, tandem Excoriatio, & forsan aliquis Eulceratio, locum habebit, quæ in ordinaria non facin statuenda erit.

Dole acerrimus, qui torquet Dysentericos, non est promissus & simpliciter ex Corrosione aut Eulceratione Intestini, ut hæc videatur talis causa; sed ferè maxima ex parte est ex Convulsione & Contractione spasmodica Intestini, quia Intestina irritata spasio quodam corruptæ convellunt & contrahunt, & motu quasi vermiculari se torquent, sub quo tam insignes sunt Dolores. Præsupponit hic suprà dicta de Systemate nervoso: subinde retrovertitur Umbilicus, quod signum est manifestum Motus convulsivi, hinc successiva sunt Tormenta, non continua, sed remittunt, prout malum non mitius nam gravius est. Tormenta hæc ordinarij præcedunt Excretionem, nisi Intestina gangrenata sint, quando sub ista spasmodica contractione Intestina simul propellant, & alterius eogunt Contenta, & ita ad excretionem stimulant.

DIAGNOSIS.

signa Diagnosticæ ex dolore & Excretione Impejis de-fumuntur.

Dysenteria nempe prebendit egros cum insignifimis Intestini Dolorebus & Tormentibus: subsequuntur Dejectiones, & quoties deiecit Alvus, ingens cruciatus, & Intestinum depressum cum dolore, & molestissimo Viscerum omnium quasi descensu, adeit: Dejectiones non sunt Aerocolæ, sed varium rerum, nam simpliciter mucosæ, sunt intermixtum sanguinem, nunc simpliciter sanguineæ, quæ aggravante morbo sunt putrilagineosæ, & interdum membranarum speciem referunt.

Quando Sanguis simul eacernitur plûs minus, *Dysenteria Cruenta*, sive *hæmæ* appellatur: si verò Mucosa superabundet, ut solitaria sint, in specie *Dysenteria Alba* vocatur.

In Maligna sæpius est conjuncta Febris plûs minus intensa, quæ interdum petechialis, Lingua subalbida mucilaginea dicitur obita, & si vehementius aëhet corpus, nigra erum & siccæ observatur, una cum summa virium prostratione: ægri sunt anxii, & iniqui, stant insigniter & subinde præcedente alterius morbo, Sanguis sincerus copiosus continetur, id quod corrosivis majorum aliquæ va-rietur Intestinis & Mesenterio argumentum est. Non minus Intestina inflammantur, indeque Gangræna incutitur: Aphææ Interdum succos obdunt, im-piunt, quando Adstringentibus incompellè adhibitis sup-pressi sunt Dysenteria: afficitur successivè simul Intestinum kelson, inde ordinarij dolorosissimum Tenesmus patitur: ægri supervenit non raro Ani prociencia, Appetitus prostratus, interdum Nausea & Vomitus urgent signum, & Vi-gilia, ut etiam interdum Deliria, & tandem quoque lethales Convulsiones superveniunt. Graffatur communiter in In-cola inlar Pestis, etque Contagiosa, & sequæ tunc temporis sub forma Febris malignæ multiplicat.

Causam signa partim ex Eacrementorum conditione, partim signis Humorum in corpore abundantium, partim à Viri genere, v.g. militari, ac Dieta, similibusque cir-cumstantiis petuntur.

De Maligna & Pestilenti sit colligitur ex eo: si commune fuerit malum, pluresque cum symptomata malignitatis prop-riis, v.g. anxietate Præcordiorum, Petechiis &c. moriantur.

Ante omnia autem per meliorem curam sciendum est: *An in-temia ex crassa Intestina afficiantur?* Denunciant hoc Locus, & Modus doloris, Tempus exitus eacrementorum, & ho-minum varia Mistio. (1.) *Locus doloris* arguit tenuia Intestina affecta, qui est circa & infra Umbilicum, ubi situm ileos & jejunum: in crassis verò affectis est magis circa latera in-fra & iuxta Stomachum, secundum nempe Coli dudum. (2.) Quoad *Modum doloris*, brevis longè vehementior est affec-tus Intestini tenuibus, ac si cultris hinc inde discinderen-tur, ut quasi aculeis pungenterent; qui econtrà dolor rem-ittitur & nonnihil obduntur est in crassis. (3.) *Celer excre-tio* post dolorem crassa Intestina affecta, tardior verò excre-tio Intestina libeudata arguit; eo quod à loco affec-to ad Podicem longior via sit. (4.) Si tenuia afficiantur, *premissa magis & confusa invicem sunt excrementa*, Stercoris, Sanguis, & Mucus, propter longius iter, quod mutuo con-ficiunt: in crassis verò Intestinis minus sunt confusa, sed po-

tius sunt aperta veigia distinctionis & se levicem. (5.) Te-nua affecta magis ad Vomitus stimulant ægros, præteritum quò propius respectu Ventriculi afficiantur; crassa minus: unde & analoè magis sunt, & potius se habent ægri in te-nuibus affectis, quam in crassis. Consultatur quoad hoc pun-ctum & Prognosis in Dysenteria SENNERIUS, qui facia est accuratus, & RIVIERIUS.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis:

Bengua minus est periculosa, Maligna periculosa. Quò magis tenuia afficiuntur Intestina, eo periculosioris laborat æger, & econtrà.

Considerandum etiam an Dysenteria habeat Febrim? item an adde Vomitus? Sane omnis Dysenteria, præteritum Epidemica, cum Febre iuncta periculosior esse solet, quam quæ sine Febre; & quò magis acuta & malignior hæc fue-rit: liquidum & Petechiæ in Febrilibus talibus observatæ fuerunt.

In Dysenteria quasi Pestilentiali eo periculosioris laborat æger.

Illa Dysenteria, quæ cum Vomitu affligit, & cui ferè se advenere solet Singultus, est deterrima; eum periculum habet, non iple Stomachus plûs minus affectus sit: Quò magis aligitur Stomachus cum Cibi fastidio, eo peri-culosior est: si non adde Vomitus, & ægri alimenta assu-munt cum Appetitu, talis non est lethalis, nisi culpa Medi-ci fiat.

Dysenteria, in quibus Eacreta sunt viridia, nigra, aut varia aut admodum graveolentia, sunt pessima: item Dy-senteria, quæ ab atra & portacæ Bile, ut vocant, incipit, nulla præcedente Febre, nec Cœdemon signis apparentibus, valtiola est, teste HIPPOCRATE *sest. 6. Aphor. 22. & 24. & FONTANO in Methodo generali pag. 62. cap. 5. 6. 7. & pag. 77. propter corrosivum acidissimum Sacrum, valde erodentem Intestina*; item quæ à Dejectione biliosa aut æru-ginosa, hinc magis erodente, vid. HIPPOCRATES *sest. 7. Aphor. 23. Omnium tamen crudelissima videtur, quæ à Pituita acida atque siliâ, utpote qui humor ratione tenaci-tatis difficultè abstergitur.*

Si Dysenteria Ructus superveniat, vel Crepitus ventris, bonum signum est, scilicet redeuntis suo modo Fermenti dig-estivi.

Econtrà Convulsiones ac Deliria, Dysentericæ superve-nientia mortem asperumum significant.

Si à Dysenteria laborantibus veluti Carunculae delinquant, lethale est, teste HIPPOCRATE *sest. 2. Aphor. 16. ut plurimum quæ profundus Ulcus denotant: vid. SEN-NERTUS *Præf. lib. 3. p. 2. sest. 2. cap. 7. pag. 334. & 337.**

Dysenteria indolens sæpè mali est omnia: *tem* enim seu Gangrænam Intestini, indeque inducunt inflammationem ostendit: conf. de *Dysent. Epidemica querendum indolente* M. A. N. C. *Ann. 2. Obs. 43. p. 82. item RARTHOLINUS in *Alis Med. Hoffm. Vitem. 2. pag. 183. RHODIUS *Cent. 2. Obs. 11.***

Quando adeit Tenesmus in Dysenteria, cum tanta Ani itaui Clystères injecti statim elabuntur, aut cum barta Podi-cis adstrictione, ut nihil possit introrremi, certum plerumque est mortis signum: vid. la MONIERE *Tr. *suprà* cit. cap. 5. pag. 264. & 291. Nempe hic capor, illic paralytica consti-tutio Intestini Recto inducitur ex virtutis animalis prostra-tione adeit.*

Dysenteria, si est symptoma Febris Malignæ aut Va-riolarum, periculosa est, & ferè lethalis.

Dysenteria superveniens Febrim, aut quæ aderat, si in-tenditur, malum est; quoniam Inflammationem aut in-fignem Intestini corruptionem ostendit.

Lienteria superveniens Dysenteria disturne, est admo-dum mala.

Aphææ Dysentericæ supervenientes, ut plurimum letha-le sunt indicium.

Gravida Dysenterico Tenesmo correpta, frequentis A-bortum patitur, idque cum periculo, imprimis si grandior fuerit Fœtus. Interdum tamen Dysenteria Gravida ante Partum salutari observata fuit, teste FORESTO l. 22. *Obs. 36. item A MATO LUSITANO *Cent. 2. Obs. 51.** quia post Partum plerumque hæc liberantur: testante HIP-POCRATE *sest. 2. Præf. lib. 3. p. 2. & l. 5. Epidem. Text. 33. l. 7. Epidem. Text. 49. & SENNERIO *Præf. lib. 3. p. 243.** per bina exempla hoc comprobant. Sit autem Benigna, non Maligna, non nimis gravis, & non longè ante Partum; alia est periculosa, & mors in olla: Epidemica tamen Gra-vida

vidis non lethalis observata fuit in M. A. N. C. Ann. 3. Olf. 17. pag. 22.

Dysenteria cum Oris amarore, vel Vomitu bilioso in principio malitiosissima esse solet, in specie in principio: vid. SAYONA in *suu. Diss. Med. Diss.* 31. p. 20. & M. A. N. C. Ann. 8. Olf. 63. p. 106.

RIVERIUS *Cent. 2. Olf. 63. ex Maculis in facie erumpentibus in Dysenteria*; item ex Maculis Dysenteriae in progressu morbi superveniente, Signum Præagiticum lethale ominatur: imminet enim Convulsiones, & affectus systema nervosum insigniter; cum Singultus sit signum Convulsiones Diaphragmatis, quæ superveniens, malum, in principio autem Singultus non adeo sinister.

Si in Dysenteria post Autem finitum vel dextram oliga Macula vel Tubercula apparent, æger citò moritur, in quo equidem incertus est SENNERTUS; signum tamen certum esse vult: HOFERUS in *Herc. Med. p. 192.*

Veneris exercitum Dysenteriam curat: id quod RIVERIUS in *Pr. notat ex AMATO LUSITANO Centur. 2. Cur. 47. qui refert, quendam Dysenteria Epidemica laborantem, celebrato cum uxore coitu, sanatum.*

Id, qui ex Dysenteria intereunt, præcipuum mortis causam habent Intestinalium Gangrænam: vid. RIVERIUS l. 3. Olf. 5. Ac sanè quidam Dysenterici ante mortem abique pulsu toti algidi, adhuc tamen de interiorum intensissimo æstu coquebantur: Conf. M. A. N. C. Ann. 8. Olf. 63. pag. 106.

Dysenteria à Causa externa, ut à Fractibus horis, non adeo periculosa est; quæ autem ab interna, sæpe periculosa: in qua, si Sanguis sincerus excreatur, periculior est, ob vasa maiora erota.

Quò magis vel minus Intestina cancræta sunt, eò gravior, vel mitior, vel melior Dysenteria est.

Dysenteria, quæ loretina crassa affecta, utpote symptomata minus periculosa habens, ac à Clysteribus multum levamina admittens, non adeo periculosa est; ut & quæ à Mania oritur: vid. HIPPOCRATES *Seff. 7. Aphor. 3. Conf. M. A. N. C. Ann. 3. Olf. 116. p. 125.*

Spleneticis supervenient Dysenteria, bonum signum est: vid. HIPPOCRATES *Seff. 6. Aphor. 48. nisi hæc longior cateterit, tunc enim aut ex Lienteria, aut Hydropes percunt, jasta Seff. 6. Aphor. 43. & *Cent. Seff. 3. Tract. 195. & 196.**

Pariter & Podagricis salutaris observatur Dysenteria, jasta l. 3. *Præd. Text. 15.*

De cætero Senes & Pueri ex hoc morbo sæpius pereunt, quam qui media ætate constituti sunt: vid. HIPPOCRATES *Seff. 2. Text. 30. & SENNERTUS *Prax. lib. 3. pag. 243.**

C U R A.

Quod Curam: In genere pro meliori medicationis ratione, atque Scripturam Prædictorum utiliori lectione, observandum autem omnia: an B-nigna, an vero Maligna fuerit Dysenteria? item an à Causa interna vel externa? & hæc vel à Supposito acutius, vel Contagii nata fuerit? Nempe Epidemicæ non sunt principis Malignæ; id quod notatum in M. A. N. C. Ann. 8. Olf. 163. p. 106. Ex ea considerationibus variarum Dysenteriarum, variis subinde apud Prædictos modis ratio, uti patet legenti ex la MONTE-RE, WILLISIO *Pharm. Rational.* SYDENHAM in *Olf. de Morb. acutis* &c.

Quod Methodum medendi in hac sequentes Indicationes observande.

1. *Acutis Intestinalium inflata, tum Acce vellicans corrigenda, quam Opia, aliisque Anodynis & Appropriatis (scilicet Irritantibus nonnullis) sopiendo, indeque provocato Spirituum imperium compellendo.* Ea vero, quæ Acce vellicans corrigit, sunt; vel Generalia, illud aut obediens aut adhorbens vel Specialia, specificum saporem Dysentericum corrigentia.
2. *Præcipitantibus sive Abhorbentibus, & blandis Sodoris feris, in specie in Dysenteria maligna, Massasunguis varianda, & Mafina contagiosum eliminanda.* Interdum in B-nigna blandè Abhorbentibus & Laxantibus Intestina eluenda.
3. *Necesse distinctis illis debitis Vulnerariis, item Adstringentibus sive Symplicis ex similibus refrendenda.*

Methodus hæc diversa est à Methodo vulgari, quia vulgo respiciatur saltem ad Produendum morbum, nempe ad Intestinalium Exulcerationem, non vero respiciunt radicem Mot-

bi feu Acce illud vellicans, unde tot mala oriuntur: Hinc jubent communiter (1.) Evacuare Intestina purgando: (2.) Clysteribus eadem abstergere: (3.) Dolorem urgentem sedare; & (4.) Ulcera purificare & consolidare. Sed in hac Methodo sæpe felicititer moriantur ægri, & qui evadunt, Naturæ, non Artis beneficio obtinent.

Pro his scopis autem melius obtinendis, observentur sequentes Regulæ:

I. Quod *Anodyna & Narcotica* à multis quidem cum Necrotica in Dysenteria proclamantur; quod exemplo illustret L. 3. Olf. 10. THONERUS & ZEGHIUS *Conf. 37. sed falsò*; idque saltem vitio præconceptæ hypothese; quia potius expertus ille Prædictus LINDANUS in hac tota Cura semper ab Anodynis & Narcoticis Curam incipientiam suadet, in quo coniectura ferè omnes Moderati, qui omnes Opia cum Appropriatis paulis, miram vim tribuunt in Dysenteria curanda: vid. BARBETTE in *Pr. lib. 4. c. 5. de Dysent. pag. 150. HORSTIUS lib. 10. Olf. 3. HOFFERUS in *Herc. Med. p. 195. THEODATUS in *Valeriana, p. 340. WED ELLIUS in *Opist. pag. 122. Unde etiam tot prolant exempla feliciter curatarum Dysenteriarum per Opia: Sic RIVERIUS in l. 2. Olf. 66. refert Dysenteriam in Fluxum Hepaticum mutatam cum febre & summa virium prostratione, per Laudanum opiatum curatam: vid. etiam L. 3. Olf. 37. 44. & 44. item L. 3. Olf. 4. 4. Olf. 87. in specie WILLISIIUS in *Pharm. Rational. vol. 1. c. 3. p. 128. & 300. necnon LUDOVICI in M. A. N. C. Ann. 4. Olf. 107. HELMONTIUS Tr. Bastilis, & MARCUS MARCI, in *Viridis narcotica & anodyna solum*, placens dolores, dicit esse: Terra Viridis pro hoc scopo sublimatur cum Sale Ammoniac, & est Ariana Anglorum.*****

II. Sed non dandum, uti dicit, Opia, in principio sola, sed potius alia, præsertim Appropriata, multa, idque in specie specificis & Abhorbentibus sudaritis in Dysenteria maligna, e.g. Theriaca cum Olio humano, & Hepate viperino; item si opus fuerit, blandè Intestina Abstergentibus, in specie Rhubarbaro, in B-nigna jungi debent; sic melius & tutius operantur.

Ac sanè crebrius licet repetitum Opiatum virum, adeoque quasi continuatam optimè ferant Dysenterici, minus debilitantur exinde, quam ab allicitantibus, & Tenefimo continuis. Nempe præmissio Laxativo unà vel altera vice, mox ad Laudanum opiatum accedendum, & in hujus usu perseverandum, nisi ubi urgeat malum, tunc enim, mitigatis utcumque Opio symptomatibus, blandè Laxatio subiungenda, Opiatum hanc usurpato, Signum autem remittentis mali est, si ab Opiatum usu potenter summa naturali corripantur ægri, quamvis verò ab illorum usu nulla debita quies observetur, & agrypi maneat ægri, etiam citra manifestam causam, malum est indicium delatentis adhuc mali, cohibiti, non curati, aut enervati. Irritati enim adhuc, insensibiliter licet, Naturam indicio est; & ferè malignitatis graviores, ac spiritibus magis improfæ, aut quali perniciosis saltem, ac de facili recidivanti, docet.

III. *Laxativa* in Dysenteria Maligna nihil valent, sed potentissima sunt: potius irritati Intestina frabrones excitamus, & vires dejicimus: in B-nigna verò hanc meretur laudem, in principio usurpata; sic enim eluunt Alvim, si autem in principio morbi Laxativum propinatam fuerit, mox ab hujus facta operatione Opiatum lubicundum. Nempe quod Abstergentia primas vias, ac blandè Laxantia, habenda simul ratio tam subiecti patientis plus minus cacochymici, quam Causæ antecedentis, non fit à *Assumptis an fit à Contagio* idque tam propter impedimentum Dysentericæ majorem vel minorem, quam propter alia in subiecto cacochymico metuenta symptomata. Cacochymiam igitur in principio convenientibus laxare, non inconveniens est; uti & si à Fructibus horum malum ortum fuerit, præmissio tamen quoque Sedativa, v.g. vespere antecedente, vel Laxantia quoque Opiatum addere convenit. Quando itaque primæ viæ abstergenda, ac Alvim blandè laxanda est, fit in principio vel Rhubarbaro vel Sero Lactis, de quibus infra: in progressu morbi penitus abstinendum. Ad hæc ita ipsi qui in principio inadem Purgationem, non sine cautela hoc faciunt: Volunt nempe, si Dysenteria oriatur ab Humore strabiliario, acerrimo & maxime coarctato, quod tunc ferociam illius potius temperando purgandum fit. De modo purgandi optimè scripsit LUDOVICIUS SEPTALIUS in *Animad. & Caut. Medic. l. 7. p. 224.*

IV. *Pomina* in Dysenteria planè sunt inane quid, in Malignis planè nocivi, nisi Dysenteria sit ab Hypercathari, aut assumpto Veneno. Pro majori illustratione rem Exem-

plō & observatiōne confirmabō . Vic Juvenis Dyſenteria graviflūctus, in principio quidem nonnullū cruentū, sed in progreſſu tota mucoſa, exercebat: aderat ſimul febris continua: hunc lenē evacuantibus Rhabarbariſ, mox per Opia & Specifica aggreſſus fui curare; ſuccēſſu quidem Cura, ſed magno labore, & ſub continuo calide Cereviſie potu, Latenterque caleſciturum Pedibus & Abdomini applicatiōe: ſubinde ſudores ſpontanei, præſertim venter, erumpēbant cum euphoria. Cellante Dyſenteria durabat adhuc ſeris continua lenta cum gravamine Ventriculi, & appetitu penitus deſectū, copioſe ſemper Muco Ventriculi obducente: ob id ordinavi ſal Ammoniacum cum pulvis Lapillis Cancrinis, cujus ceptitū uſu attenuatus quidem nonnulli ſuiſt Mucus, ſed non reſpectū: coſtus ergo propinavi Vomitorium ex Syrupi Emetici ſic. idē ob magni, quod veſperi præcedente uger ſpontaneo vomitu varia muſcigaliſſima excreviſſet: ſed Vomitorium nihil eſſet, ut uſu anxium reddiderit ægrum, Muco nunc in Ventriculo copioſe abundante reſectū vim, tamen copioſa mucoſa creſcit & tuſſi rejectū, febre lena adhuc perdurante, quibus reſectis multum levatus fui. Excrevit autem illa ſec Ventriculo: nam & ſtimulum tuſſis in regione ſerobiculī Cordis percipiebat, & quæ exercebat, illinc progreſſe aſſerebat: ob id Milurum ex Aqua Hyſſopi, Syrupu Nicotiane, & Oryſſele ſquallidice ordinavi, cujus uſu rejectū quidem copioſius, ſed crebriores etiam denſo ſecceſſu paſſus fui: reverſa interim, & præſertim ſequentem Pulverem:

M. Red. Ari non prop. 314

Lapill. Cansr. prop. 514.

Miscellaneous

Omni mane largam dosim capere iussi; quo assumpto, ut pe-
nitris et Ventriculo eradicaentur mucosa, 40. guttas Tin-
cturæ Tartari bene acris omni mane capere iussi; sicque con-
sulere.

Ex hoc Casu didici

h. Necrarius effe in Dyfenteria Benigna laborantibus, p^{er}mittere Laxantia; si enim hoc in principio fecerint, tantum Muci fibrum in declinatione morbi circa Ventriculum & primas vias non habuiffent: Nam quoniam Dyfenteria erat benigna in corpore enfiis laetis infarctis, hi ipfi motu febrili correcti, & in Mucum temperatum conuerfi, circa primas vias depofiti; fed Auddyfentericis & Opacis remedia petenti, noltimud illas turbas decernit.

3. *Dalci* in Dyfenteria, si malum sit vel ex Ventriculo, vel declinante morbo, nihilominus adhuc foveatur à Dyfpepsia Ventriculi, Vomitoria mistura tunc posse propinari. Vomitoria equidem in Dyfenteria solum, quam Diarrhoea, fuit periculosa, propterea nequidam Ventriculi laesionem. Sin autem Dyfenteria sit à Pharmaco maligno, aut Veneno, et materiae rutilae quondam pars in Ventriculo haereat, vomitoria. CONF. SENNERTII 2. Prae. 4.

De cæteris conveniunt, magis in Benigna, quam Maligna locum habere videntur; la MONIERE tamen *Præf. de Fluxu Dysenteriae malignæ* observavit subinde in primo principio Vomitoria fuisse proficua: Et aristote hoc ita efficit, in tali nempe, que Contragium magnum inspirando habuit, Ventriculum saltem adhuc abducere: idque si superius Intestina laborent, si Cacochylia addit, aut malum sonat, necnon Hæmorum in primis viis, Intestinis, & Ventriculo molesta obstruat; si denique Natura eo vergat, æquæ eisdem facultatibus audent, visibique adhuc confert, æd. Vomitus namque disturgens Dysentericiæ curasque videt. MERCATIUS.

V. *Sedem* tam per se, quam Diaphoretici provocati, in specie tubercula esse ratio in Dyenteria Epidemica plus minus Maligna, Sanè dum hic ante aliquot annos in universis reipote grassaretur Dyenteria Epidemica Maligna, Flores pugnati fuisse Rutilios folia Sudoriferi, præparatis Tindura Bezardica, eurasunt. Eodem tempore quidam Rulifici, & ipse Dyenteria Maligna correptus, iunxit Balneum Sulphuris gutt. x. & ultra, cuius remedium nū per repetitis Sudores ipse fuit curatus. Adeoque tentandum videtur, an non in Dyenterici Malignis Sulphurata. Crocata, & Camphorata, preservative prout et curative, sint optima. V. g. Flores Sulphuris, Extratum Sulphuris, Balneum Sulphuris juniperinum, ac succinatione poculis: Elixir Pedunculæ Crocilla, Spiritus Vini camphoratus, crocatus, ethereal etc. Unde dicet PETRÆUS in *Isis Dyenteritidis*, quod rectè faciant Hermetici, qui Dyenteriam non tantum Pergamini, quam Diaphoretici aggrediantur, & fla-

tim corredo Aere Baccis Juliperinis, alternis diebus Potio-
nem Paracelsi Perfrictientem, aut Aquam Theriacalem ac-
simile Diaphoreticum Alepharmacum propinquit: post ex-
pulsionem Veneni polimodum curatio Appropriato utantur.
Hinc etiam ipse MONIERE refert, quod Sudor primis
morbi diebus, vel sponte prodians, vel debito Sordificatorio
vul prolicitus, Dysenteriam frequenter supprimit, serolis
humoribus foras propulsus. Quo magis ergo corpus transpi-
rat, & magis Sordibus afficitur, minor est Dylencteria.
Exinde apparet, eandem ferè, que in Febrilibus Continuis &
Malignis, Methodum medendi observandam esse.

VI. *Adfingere*, uetula, in principio & progressu morbi nil valet, postea graviter nocet. Certe nil peius, quam ut in Dyfenteria *Adfingere*: siquidem non nisi laxata, sed irritata, sunt Intestina: impitius nocentissima sunt intertempore, & hanc aetate Appropiata & Aclsiapharmaca in Maligna, & aetate Abstergeant. Laxativa in Benigna, exhibita: interitum saltem in declinatione, ubi commodè usurpari possunt. Nam valde *Adfingentibus*, maxime in principio, Dyfenteria supprella, fuisse, quæ exagit affe- ctum, nunc Patrem contumacem, nunc gressibus Melen- terii: vid. le MONIERE: Sic enim MARTINUS, Tr. de Morbis Melenter. p. 44. inlammationem & Abfcessum Melenterii periculum notat ob Dyfenteriam finitè *Adfingentibus* curatam & supprellam: sic etiam PAREUS ex Dyfenteria intertempore supprella observavit VELSCHIUS de Egerio. Diff. 2. p. 16: sic in quos morbos Dyfenteria *Adfingentibus* supprella fubinde deferat, vid. HILDANUS l. 2. Obs. c. 46.

Quemadmodum igitur periculum nocivum est, mox aut saltem intertempore Adstringentibus & Symplicis fuliginaria Dysenterias, ita simul probe attendendum, ut Fermentum Dysentericum probe corrumptum totum ex corpore eliminetur, alias enim aut vitando Lympham, aut afficiendo Nervum aersualem, cui in specie inimicum exitur, (nam & Intestina huc spoliatur,) varia excitare potius symptomata, vid. HORSTIUS *de ag. d. Oefor.* 21. & *lib. & Oefor.* 31. & 32. VELSCHUIJUS *Ætiogr. d. 2. Cnr. a. pag. 60.* RHODIUS *Cent.* 31. *Oefor.* 87. THONERUS *Oefor.* pag. 295. & 246. Corrodo hec, ut didicim, per Appropriata in Maligna, per Temperantia in Benigna, in specie per Ladicina. Evacuatio partim per Sudorem in Maligna, per Alvim in Benigna. Et quidem neglectus Lavacivorum ac Sudoriferorum, illorum præparis in principio, horum i declinatione, perverius econtra Opiatum usus, imprimis occasionem pravis symptomatibus infundere videtur.

VII. *Tyma febris* frultranea est in quacunq; Dysenteria ; in Maligna enim nociva , nisi forlitan gravis evacuationis sanguinis supprellio aliud insisteret : in quo tamen casu cau-
et hat, adeoque nemini auctor sum, ne imitetur SYDEN-
HAM in *Obs. de Mork. Acutis* p. 292. Se3. 4. c. 3.

[illegible]

IX. *Stomachus* in tota Cura Dysenteriae summa semper habenda est ratio, non fecus ac in quibusvis Alii Finibz. Quò magis enim furit, eo pejor erit status morbi, & quò melius le habet, vel appetendo nonnulli, vel alimēta quædam peritendo, eo major spes saluti adest: cœtera Appetitus penitus dejectus, aut Vomitus superveniens, aut etiam Sanguis, pessima sunt signa. Ob id et semper simul Appetitui, Interne pariter & externe, Stomacho succurrendum est; cuius catione Vium, præsertim in admodum Vomitis, non sœpius absolute consideramus; acoris vero ratione nonnulli succedat videretur. Modicè autem propina-

Ebor. sine igne. ℥iij.
Cryſtall. prop. ℥b.
Terra ſigillat. ℥b.
Laud. opiat. gr. iij.
℞iſm. Op. ℥b.
Syrup. Ferulac. ℥vi.

M. f. Pulv. : S. ut antea.

℥. Aqu. Ferulac. ℥iij.

Cinnam. ℥b.

Spiritus Theriacal.

℥i. Diſtillat. Frac. an. ℥iij.

Conſ. Allicern. ℥i.

Ebor. ſine igne ℥b.

Syr. Cerall. Quercitat. ℥vi.

M. f. Pulv. : S.

Potuiocula Conſortativa adſtringens.

Vel

℥. Aqu. Menſch. ℥iij.

Ferulac. ℥b.

Terra ſigill. ℥iij.

Cryſtall. prop. ℥b.

Laud. opiat. gr. vi.

Syr. Menſch. ℥b.

M. f. Pulv. : S. ut antea.

℥. Aqu. Menſch.

Rubi idai an. ℥iij.

Spiritus Theriacal. camp. ℥iij. ad vi.

Terra ſigillat. ℥i.

Cerall. rub. prop. ℥b.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. Rubi idai ℥vi.

M. D. S. ut antea.

Item

℥. Theriac. ℥i.

Terra ſigillat. ℥iij.

M. f. Bolus. S.

Bolus Conſortativus adſtringens, pro una doſi.

Decur in cochleari Aceti Vini.

℥. Theriac. ℥i.

Terra ſigill. ℥i.

Cryſtall. prop. gr. xij.

Com. Syr. Menſch. i. Bolus, S. ut antea.

℥. Conſerv. Menſch. de i.

Terra ſigillat.

Cerall. rub. prop.

Cryſtall. prop. an. ℥b.

Laud. opiat. gr. iij.

Cum Syrup. Cerall. Quercit. f. Bolus : S. ut antea.

℥. Conſerv. Menſch. ℥iij. ad ℥b.

Cryſtall. prop. ℥i.

Terra ſigillat. ℥b.

Laud. opiat. gr. iij.

Cum Syrup. Menſch. vel Ferulac. f. Eleſtuarium pro dua-

bus doſibus, S.

Eleſtuarium Conſortativum adſtringens, pro duabus

doſibus.

℥. Conſ. Menſch. vitriol. vel ℞ar. rub. ℥i.

Theriac. ℥i.

Terra ſigill. ℥i.

Cum Syr. Cydon. aromat. f. Eleſtuarium : S.

Eleſtuarium Conſortativum adſtringens.

Vel

℥. Ebor. ſine igne.

Cryſtall. prop. an. ℥b.

Laud. opiat. gr. iv.

M. f. Pulv.

Divide in duas part. equal. D. S.

Pulvis Conſortativus adſtringens.

Vel

℥. Terra ſigill. vel Antimonii diſtillat. ℥b.

Bezaard. Saler. vel Juvial. ℥b.

Laud. opiat. gr. iij.

M. f. Pulv. : qui mobilis eſt in Cholera.

Dentur duas doſes : S. ut antea pro duabus doſibus.

Vel

℥. Aqu. Menſch. ℥iij.

Cinnam.

Aceti bezaard.

Spir. Theriacal. camp. an. ℥b.

Syr. acetoſ. Citri vel Cydon. q. f.

M. pro vehiculo ſervare Pulverem. q. f.

Potio Conſortans pro vehiculo Pulveris.

Vel

℥. Cryſtall. prop.

Ebor. ſine igne, vel Paſic. vari. prop. ℥i.

Beli Arm. ℥i. ad ℥b.

Laud. opiat. gr. vi.

M. f. Pulv. pro aliquot doſibus. S.

Pulvis Conſortans, & Adſtringens pro aliquot doſibus.

Vel

℥. Aqu. Menſch. ℥iij.

Cinnam.

℞m. Theriacal. an. ℥i.

Syr. Cerall. ℥vi. ad ℥i.

M. D. S.

Potio pro vehiculo Pulveris.

In hoc capitur Pulvis, ſubinde hauſtatur paucum vel aliter

computatione incurrit in Choleram, cui propinavi hanc

Pulverem.

℥. Ebor. ſine igne. ℥i.

Bezaard. Juvial. q. v.

Pulv. Anod. confort. ℥b. e.

M. pro Pulvere.

Quem allumebat, & cum Theriac illinebat Ventriculum

& ita bene ſe habuit adſuſo ſudore.

TIMÆUS Von Goldenklee in Cholera, & profluſio Al-

vi vehementiſſimo, & ſimilibus Fluxibus, commendat ſuam

Opiatam Bezaardicam, cuius compositio eſt hæc :

℥. Theriac. Androm. ℥i.

Conſ. de Hyacin. ℥b.

Pulv. Bezaard. Tern. ℥iij.

Miſceantur.

Vid. ejus Descriptio Medicamentorum Singularium p. m.

412.

Quod attinet Extrema in Cholera, conveniunt quæ im-

primis Stomachum reſpiciant, quæ inter eminet Theriaca

ſimili ratione atque ſupra in Diarrhæa laudata ſunt, in ſpe-

cie Spiritus Vini, aut aromatici, aut camphorati, ſeu lar-

giger Camphora imprægnati, in ſpecie à Vegetabilibus

Cordialibus & Aromaticis abſtractis, cui extemperè ingu-

la uncii d. i. Camphoræ citæ, cum ſimili multiplicato ad

drachm. præcordiis veloci manu applicetur. Hoc ipſo æger, qui

per quatuor noctes diebus perſiſtens Cholera ſuprà & intra

etiam generoſiſſima remedia, reſecit, curatus fuit. Conſ.

HEINRICUS ab HEER in Obſervariis : Vel

℥. Spiritus Vini camphor. ℥iij.

Theriac. ℥iij. ad ℥iij.

M. pro Epithemate Ventriculi : S.

Extrema Mixture Stomachalis.

Peſticum etiam eſt Paucis coctis, Vapo generoſo introductus,

& Pulveribus aromaticis adſperſus.

Rare evenit, modo datur Interna, ut, ſive ſi principio,

ſive progreſſu, opus ſit abſtergere Intefſtinum, Lavativi

vel Clyſmatis. Si tamen opus eſt, ut in Cholera erroe im-

primis Diæta enata, vel reliquis quædam in Intefſtino hæ-

rentes abſtergeat, vel continuo eadem Alvim ſtimulan-

tes & quaſi Teneſmum inferentes, removende ſunt, impei-

nis ſi ex corruptione Alimentorum in Stomacho nata ſit

Cholera, lo tali caſu SYLVIVS Præcox l. p. 6. 15. §. 29.

partem pro excretionem per ſuperiora adjuvanda, partem in-

feriora verſus promoveoda, propinat Vomitorium Antimo-

niale, admiſſo Laudano opiato : Formula hæc eſt.

℥. Cryſtall. Vomitu. ℥i.

Laud. opiat. p. b. vel gr. i.

Aqua Menſch. q. f.

M. f. Hauſtus.

Quo equidem propter Vomitorium vim hæud facile imitari juſ-

ſitum; poſius, ut temperarem, ſimulque abſtergerem Sto-

machum Lactis ſolum, vel cum ℥i. alteravo Syrupi rotati aut

Violarum ſolativi temperatum, vel blapdum ſamarindor-

um Decoſum cum eo paratum, imprimis ſi addit nimia ſti-

git, cum temperet effereſcentiam ſanguinis, exhiberem,

vel ſoluſum blandum ex Rabarbaro, & Bilum ex eodem

cum Conſerva Roſarum, exhiberi ſuaderem : item Pulpa

Tamarindorum ad ℥i. In Sero Lactis diſſoluta non eſt fru-

ſtranea. Applicatur etiam Clyſmata Lenientia, cum The-

riaca imprimis admitta, addendo drachm. vel iij. Theriacis un-

Clyſmatis ad imitationem RIVERII, qui ſubinde ſuis Cly-

ſteribus ex Lacte addit Theriacum ad drachm. & iij. interdu-

ad ℥b. vid. RIVERIUS l. p. Obſerv. 78. ubi calum Cho-

leræ periculoſum habet. Loco Theriacæ interdum perſpicue-

tur Eleſtuarium Diſcordii, quod ſimilis ſerè eſt unis.

Si Cholera ſit à Remedii Purgante ut exapde oriſtus Hy-

per.

peraccharis, tunc vel solum sufficit Laudanum opiatum, quod in quacunque Hyperaccharis est preloquissimum remedium, si cum Vino bibatur. In Diarrhoea ipsi usum Vini Emetici pertinaci, cum succello prescripsi.

℞. ℞ss. Theriacalis ℞ss.

Op. 3℞. ad 3℞.

Mista propinquantur ad gutt. 20. bis vel ter in die. Uti etiam notum est, quod Theriaca a dr. 4. ad dr. 12. ac Theriacalia ratione Op. per campis in quacunque Hyperaccharis conveniant; in haustu Vini generosi calidi, aut abstinuitis assumptam; sicut RIVIERUS *Cms. 2. Olf. 19.* habet Observationem de Cholera ex Superpurgatione admodum periculosa, propinatis gr. vi. Laudani opiat. exoptate curata. Similiter idem RIVIERUS curavit Senem 70. annorum, propinando in interdum Decodum Plantaginis & Portulacae, de quo superius cum Symplo Cydoniorum & Electuario Dialcordii ac Confusione Alchemiae, singulis noctibus exhibendo granum j. vel ij. Laudani opiat. Facit quoque *Cms. 2. Olf. 18.* mentionem Cholerae, cum Tertiana febre, malignae: cuius fuit admodum periculosa, qui tamen fuit curatus prescripto Clymate ex *Jussulo* cum Confusione Alchemiae ad dr. iij. & Theriaca rec. dr. j., quo subito Vomitus & Alvus suppedita fuit: denique ad praecutionem semper diutius horis ante paroxysmum gr. ij. Laudani opiat. propinavit, & sic praeservavit, & curavit. Simile exemplum habebitis in *Olf. 2. commemorata* a PACHEQUO.

Plura huc contineri possunt, quae dixi *supra* art. 1. de Diarrhoea.

ARTICULUS III

de Lienteria.

AD ALVI FLUXUS auctus pertinet etiam Lienteria, i. e. *Intestinarum Levitas* (S), seu Diarrhoea Assumptum, quae est, quando assumpta omnia, prout fuisse ingesta, per Alvum egerunt: aut est talis ALVI FLUXUS, in quo parum, aut leviter, aut omnino non immutata, per Alvum egerunt assumpta, ita ut tunc referant exacte proprietates suas omnes.

PARS AFFECTA.

Pars affecta primaria est ipso Stomachus, maxime Pylorus. Revoco in memortiam hic, quod recte Pylorus ab HELMONTIO dicitur *Ballis*; si enim Pylori orificium non sit clauditur, dilabuntur Alimenta ex Stomacho, & tunc supervenit Lienteria: quia non ad debitum tempus persistunt in Stomacho. Cum vero in naturali statu ad legitimum Digestionem requiratur, ut Fermentum digestivum debite dissolvat & alteret Alimenta, ut Stomachus convenienter eadem retineat; si aut contraaria causa accesserit oritur Lienteria.

CAUSAE.

Causae ergo Lienteriae sunt investigandae vel in Fermento stomachali non digerente, vel in Pyloro non retinente. Nemoque

1. Succus Stomachi fermentativus, ut omnino deficiens, aut incertus, aut ex retentis variis impeditus. Lienteriam efficit.
2. Quando Pylori tanta est laxitas, & e contra reliquarum Stomachi partium tanta irritatio, ita ut non debite retineat, quo potius Assumpta per Pylorum dilabuntur, quam revera excernantur, etiam Lienteria oriri solet: idque, ut dixi, in specie, quando cum hoc Pylori laxitate vel levissima conjungatur Stomachi irritatio aut molestia.

Præ Lienteria vulgo dicitur oriri à Facultate Concoctrice laesa: *Posterior* vero à Retentrice labefacta, & Expultrice irritata, *Causa* ergo *Proxima* est Fermentum Stomachi digestivum labefactum, aut incertus, aut deficiens, cui accedit Stomachus praeternaturaliter irritatus, & Pylorus laxatus, ita ut sic Assumpta ad sufficientem usque dissolutionem retinere nequeat, sed per Alvum promoveantur. Sola enim laxitas Pylori via videtur aduagata Causa, nisi accedat simul haec & reliquarum partium Venterculi irritatio, quatenus Pylorus non ex inferiore Venterculo Tom. II.

li parte, sed hujus eminentiore loco prodit.

Ad has Causas Proximas collimant ceterae Remotae, Venterculum & Pylorum ad irrationem & laxationem disponentes. Illustrant hoc observationes AUCHORI. sic FORESTUS lib. 20. *Observ. 29. & 30.* Lienteriam observat admodum contumacem, optam ex Ulcere Venterculi. In hoc enim Ulcere non tantum fuit nonnulli alteratio Succu Fermentativi Stomachi à Pure acris falso, & ob id immutata Digestio, sed praeterea etiam Stomachus ab Ulcere doloroso continuo irritatus quolibet Assumpta sui coactione mox deinde ejecit: curatum tamen fuit hoc Ulcus & per consequens etiam Lienteria (1.) abstergendo & mundificando per Aquam mullam; item per Decodum Hordei cum Melle rosaceo: postmodum (2.) assurgendo cum Decodo Radicis Symphyti majoris, cum Terra Lemnia, vel alia similata propinata, vel cum Lacte vaccino, item Pulvere Equitæ. Sic Lienteriam ex irritatione Stomachi ab acrore Humore in eodem retento ortam, GABELCHOFF. *Cms. 2. Olf. 17.* observavit, dum refert exemplum cysidum, qui horborum & debilitate Stomachi nonnulli affectus, omnis potentia in ea forma, qua assumptis, per Alvum demum egessit: Curatus tamen fuit per Abstergentia & Temperantia, imprimis Scrum Lactis.

Potest inter Remotas Causas crebrior & nimius Patus etiam sublede ad Lienteriam disponit, idque propter relationem nimiam Stomachi, praeterea Pylori, orisandum: hujus enim fibrae relaxatae non possunt sufficere se contrahere, & propterea succedat Lienteria, seu Alimentum crudorum egellio. AMATUS LUSITANUS *Cms. 6. Cms. 7.* Lac, prout desumptum, enclum observavit, quam Lienteriam ex nimio Mucos in Venterculo pueri, & per Oxytel cum Speciebus Hierae picrae, & Rhabarbaro curavit. Sic DEODATUS in *Valde*, p. 28, Puellam nimis titulosam & bibulam ex Nutrice bibula, Lienteria affectam ex relaxato Pyloro in hoc malum incidisse refert. Denique Scorbutus non raro secum conjungit hanc Lienteriam, primam observante BARRETTE in *Praxi*; cum tamen continuo in Praxi occurrat, ut Alimenta à talibus assumpta, sicut fuerunt ingesta excernantur. Malum est difficile ad admodum contumax in Scorbuticis, & originem ducere videtur ex irritatione Stomachi ex Sale acro scorbutico, tam per membranam Stomachi glandulosam, eo delato, quam cum Saliva deglutito: cum enim Clavice Scorbuticorum, non raro laboret Ulceribus, Saliva in Stomachum descendens non potest non molestiam contrahere eadem; & cum Alimenta, dum masticantur, hac ipsa Saliva impraegnantur, tunc Stomachus ad praematuram excretionem stimuletur, ut non possit diutius retinere, sed vel levissima laxatione Pylori demum elabatur. Sicut acris irritatus Stomachus infert Vomitus, aut Vesica urinaria ab urinis acrimonia, calculosum ulcere vellicata frequentem mictionem seu stranguriam; sic certa quadam Venena Lienteriam excitare solet; membrana enim Venterculi hujusque fibrarum transverfarum contraditio, Alimenta expelluntur, quae diutius morari conveciebant: vid. MOLINETTI *Exercit. Anatomico-pathol.* l. 2. c. 4. pag. 281. Tandem ab Errore externo, & assumptis Frustris horum, interdum periculosa evenit Lienteria, in qua observatur etiam, quod Patus parum immutatus redditus fuerit, quae saepe est lethalis; inquit enim Fermentum Stomachi plane deletum ab ipsis Assumptis, Diarrhoeam excitantibus.

DIAGNOSIS.

Quod auctus *Signa Diagnostica*, res est aperta.

Ut autem Causas ejus distinguamus, notandum, quod in illa quae ex Digestione Stomachi debiliore oritur, semper sit halitus foetidus & acidus, appetitus dejectus, status Stomachi, murmura Abdominis, & similia.

Quae à Laxitate Pylori, ex causis antecedentibus, & proximis reliquarum denegatione colligitur.

Quae vero ab Irritatione, ex modificatione, ratione & ardore Venterculi, ex acrimia per superiora ac inferiora reiectione judicatur: quibus accedunt Acrimoniae scorbuticae, & similiae in toto Signa.

PROGNOSIS.

Prognosis quod concernit.

Lienteria Scorbutica est malum periculosum, difficile cu-

P 2

12-

(5) *Ann. qd. Lavis, tempore Intestinum: unde Annot. in Levitas Intestinarum, h. e. cunctis & apud Intestinum superfluis, cibis incoctis ubi sunt.*

rationis, & facili recedens: imò si graves morbos excipiat, ut plurimum lethalis evadit: vid. BAR-BETTE *Prax. Lib. I. c. p. 5. 8.*

Lienteria petiolosa est in Prægnantibus.

Lienteria diu durans, ut patet atrophiam & tæbem, ita liquidam virum prostrationem necellario comitem habet; ut tæcam, ad Cachexiam quoque successivè eandem dissonere.

Lienteria, quæ gravioribus supervenit Morbis, five Acutis, in specie in Febribus ardentibus & malignis, five Chronicis, est periculosa, & similiter lenta tabe ægrum interficit, quæ difficulter curatur propter virum indolem dæmoniacam, quæ tamen decenter restitui potest Absorptione.

CURA.

In Cura observandum:

1. *Stomachum esse liberandum*, & ita Aromaticis quàm moderate Acidis blandè adstringendum, ut ita Fermentis Stomachalis vigor redire queat, & Pylori fibrarum laxitas restituatur: adeoque pro hoc loco conveniunt omnia illa, quæ tam in Anorexia, quàm Apepsia fuerunt infusa.

2. *Irritationem in Stomacho maturè esse ostendendam*, tollendo acrimoniâ humorum quonvisque, in specie salis, & sopiendo Ventriculi ignem: adeoque pro hoc loco, quæ in Vomitu, Cholera, aut Diarrhæa fuerunt laudata, locum inveniunt.

Pro quibus locis scilicet observandum, notandum est.

I. Quid in præsentia Excrementorum Ventriculi putrilorum vel similibus, conquant quidem Vomitoria, eadem tamen admodum levia. Fortior enim vel quantitate vel qualitate, in specie obstat nimis iniecia, quæ Veteribus fuerunt in usu, topum Ventriculi facillime destruant, aut certe malum irritant. Quid si minus Purgatio per superiora locum habeat, faciliè Evacuato per inferiora; blandior nempe, & quæ præter vini abstricte-laxantem suum nonnulli adstringit, & Stomachum roborat: ut sunt Aloëtica, Rhabarbarum, Passaca Stomachi, Myrobalani, &c.

II. Si metus vel suspicio Venæ ædi, & diutina Methodo relinquenda, & hoc per convenientem viam evacuandum, eique per Alexipharmaca, aut Venæ Specifica, resistendum. Quod pariter observandum, si Lienteria ex Fungis, vel aliis Fructibus bonis copiosis attempis, & facili corruptibilibus, similibusque occasionalibus externis contrahatur, ut Appropriata Alexipharmaca obviari catur.

III. Cavendum est juxta FORESTUM l. 22. observat, 22. in hoc Fluxu à fortioribus Purgantibus, ut etiam à magna eorum dō, adeoque, quotum possibile, cum us procedendum, quæ aliquam adstringentem alvi participant: ut in principio, præsentibus recementis fortis irritantibus, non statim ad ea procedere debeamus, quæ Fluxum adstringunt. Convenit ergo inter Laxativa Rhabarbarum cum Vino: Sic HELIDÆUS PADUANUS in observ. p. 116. Puerum trium annorum, gravi Lienteria affectum, curavit per ʒj. Rhabarbari cum Succo Cydoniarum vel Vini ante cenam exhibiti: Addunt etiam Species Hiæ pueræ: Pilule pariter Masticinæ conveniunt hoc in passu, quæ ex blandis Purgantibus, Stomachicis ac Aromaticis sunt compositæ, ad gr. xv. vel ʒi. cum posset ordinari; item Pilule Aloëticæ.

Medicamenta ergo, quæ ad Lienteriam conveniunt, quod attinet, scilicet sunt eadem, quæ supra ad Vomitum fuisse laudata, in eodem simul observatis cautelis, suntque omnia stomachica blandè Acidia, & Aromatica: qualia sunt v. g. Abinthium, Mentha, uti etiam Salvia, Camamomum, in specie Cydonia & omnia Cydoniata, Mespila condita, Nucis Moschata, & Macis, Galanga, Zingiber, item Corallia, Solutiones & Symplicia Coralliorum Quercetani: unde relict FABER in Cur. 65. de Lienteria, præmissa Purgatione, curat Aqua Camamomi & Symplicia Coralliorum. Hinc Coralliatæ, & speciatim paulo elegantiores Tinduræ Coralliorum, maxime indurata, in Aqua vel Spiritu Cinnamon propinatæ, conveniunt inogerit in Lienteria, cum ratione participationis substantiæ Coralliorum, acce quodvis temperet, & ratione Menstrui Stomachico ut plurimum gratæ sint. Harum tamen præparatio admodum variat: non inutilis est modus pro hoc loco, quando Corallia solvantur in Succo Cigri, Solutioni filtratæ, & infusum ad consistentiam Rob. postmodum affunditur Menstruum debitum, & extrahitur Tindura: quod Menstruum est nunc spiritus Antiscorbuticus completus in Tindura Coralliorum

Antiscorbutica, quæ erit conveniens in Lienteria Scorbatica; nunc cautabitur cum Spiritu Rosarum ambrato ad reddendâ vim imbecillam, ut est Seno quam ex Ventre, nunc affunditur Essentia aut Spiritus Ligui Salsifia, sique Tindura Coralliorum salsifia, in Lienteria ægrogæ, & qui sunt alii modi. In Lienteria Scorbatica, uti dico, convenit Tindura Coralliorum Antiscorbutica, quæ utrique scopo facit: Corallia possunt etiam in Succo Limonis solvi, de qua solutione capitur cochlear, & est egregia. Præterea convenit Zingiber in India conditum, uti & Nucis Moschata in India condita, item Myrobalani condita; poterit eam adstringunt. Elixir Proprietatis, tam communis legitione paratum, quàm sine acido, non est inelegans. Alumen etiam legitime applicatum alii itritis valet in quacunque Viscerum laxitate, & à PÆTREQ in diff. stamonica laudatur seu singulari, & præsentissimum remedium in hoc affectu, pulverem tenuem cum aliis in liquida aut sicca forma: Mithra supra in Vomitu commendata, & hoc notandum. Opium est Alumen dulcificatum: de quo videtur scriptum POTERII, & DARIOTTI in goldena Chymicis chymicis. Dicit etiam quod Podenda seu Priapus Cervi & Tauri insigniter conveniant, si pulverisat à ʒj. ad ʒi. in Vino medicato propineatur. Vinum quoque abstinens chalybeum convenit, aut Vinum infusionis Abiethi, Melissæ, Pulegii, Menthe &c., legitime usum erit proficuum. FORESTUS l. 22. obs. 28. refert Lienteriam degrepatam, est qua oritur macies: curatam alia irritis hoc remediis: exhibuit nempe vitellum Ovi pulvere Nucis Moschatae unius imperio, super regulam ignitam sic calefactam afflavit, quo ipso Fluxus desit, & æger probe convalescit: unde loco huius euphorisio HELMONTII ad Diarrhæam, ex vitello Ovi unico, vel duobus ad duritiam codit, cum pulvere Nucis Moschatae & Aceto rosato etiam locum invenit, cuius usum felicem & ego in Diarrhæa observavi. Tandem Succus Cigri, Cydoniorum &c., cum Aqua Cinnamon, Miva etiam Cydoniorum aromatica cum pauca Terra figillata mista, & hinc leviter aliquot gutta Spiritus Vitrioli irrorata, similiter laudatur: item Conserva Rosarum vitriolata cum terra figillata: vel cum Theriaca mixta, Lienterias curant.

Quæ Irritationis sensu tollunt, sunt Theriaca, & Theriaca, Laudanum opiatum & omnia Opiata, item Elecharium Diacordii Fracastori. Ex his facile est plura componere. Facit hoc imprimis Elecharium SENNERII n. 1. in sua Praxi, ubi de Lienteria p. 199. quod est excerptum.

ʒi. Conserv. Rosar. vel Rosar. præd. viridat. ʒij.
Theriac. qv. vel loco huius Diacord. Fracastor.
ʒij. ʒij. vel ʒij.

Ol. deffill. Menthe gutt. vi.
Cinnamon. gutt. iij. vel ix.

Cum Miva Cydoniorum aromatizata, aut Succo Cydon.
Elecharium:

Cui etiam potest addi Terra Sigillata vel alia similis
à ʒij. ad ʒj. pro lubitu.

Elecharium confortans Stomachum.

De hoc deus crebro portio Nucis Juglandis vel Castaneæ ad id, donec Lienteria cesset: & simili forma, est AMATO LUSITANO desumpta RIVIERUS scilicet est usus: vid. Pr. Med. l. 10. c. 4. AMATOR autem LUSITANUS l. 2. p. 56. hoc solo Senem lientericum curavit. Panis bilisus in Spiritu Vini maceratus, & hinc Theriaca bilisus & coctus, etiam convalescit in Lienteria. Aliquantum etiam in Lienteria Scorbatica præcipiti sequens Elecharium.

ʒi. Corall. rub. prop. ʒi.

Terr. figill.

Lapill. Caust. prop. an. ʒi. vel ʒij.

Ammon. gr. xv. ad ʒj.

Galang.

Zingiber.

Cubebæ, an. ʒij.

Miva Cydoniorum aromatiz.

Succi Cydon. ana q. l. Elecharium molle. D. S.

Elecharium Stomachale.

De quo pro temperanda acrimonia irritante scorbatica, & inde nata corrigenda Lienteria, medietatem cochlearis sumebat æger, & covalerebat.

ʒi. Lapill. Caust. prop. ʒij.

Corall. rub. prop.

Ammoniaci diaphor. an. ʒij.

Salic. vel Corn. Cervi. ʒi.

Ol. deffill. Meris.

Mentha an. gust. vi.

M. l. Pulv.

Dosis ℥i. naup. & vesp.

Hic etiam Laudanum opiatum addi potest.

Deinde spiritus Mallicus, Decoctum Mallicum cum aliis mixtum, ejus spiritus aculeus, Symplicum Mallicum TIBBETI *non* *delectat*, quem in *Epist. pag. 458.* describit, cum Oleo destillato Menthe & Cinnamon, & omnia similia in Vinitu usitata, optime hic conducunt. Præter communia Adstringentia, ut sunt Mallice, Terra sigillata, Tinctura interna Stomachi gallicæ &c., commendant præ cæteris Consanguis Leporis & Hami siccatum & ad ℥i. propinquant. De aliis Adstringentibus, spiritus Salsi, Liquire Egyptici, cum sosis, non est ut multa dicam. Observandum saltem, an magis Tonus Stomachi roborandus Appropiatis Adstringentibus, ut magis Acce vellicatis abstergendum & temperandum (?)

Externè in lasitate Stomachi, ut debitus ejus Tonus restituatur, convenit Sacculus sequens pro Potu:

℥i. Com. Albus.

Herb. Mentha an. M. l.

Flor. Chamamill.

Rosar. rub. an. M℥.

Mallic. ℥i. vel ℥iij.

Caryophyll.

Nuc. Moschæ an. ℥i.

Zedair.

Zingib. an. ℥i. ad ℥i.

Includatur Sacculo interpapula, qui in vino rosato vel maceratus tepide Ventriculo admovetur, & subinde repetatur.

℥i. Com. Albus.

Herb. Mentha an.

Mentha an. M. l.

Chamom. cup. fer. M. l.

Mallic. ℥iij.

Caryophyll.

Nuc. Moschæ an. ℥i.

Zedair.

Zingib. an. ℥i.

Sacculo incorporato inclusi S.

Sacculus pro Stomacho.

Ebulliat in Vino, & crebro applicetur Stomacho. Qui si non suffecerit, plura Externa applicanda, *supra* in *Appendice præfata*. *Chylificatio lae*, & *Præm* laudata. Cataplasma ex Fermento & Pulveribus Aromaticis *supra* in *Præm* laudatum, hic & in quibusque Affectionibus Stomachi maxime locum habet: Formulæ quæ videri possunt in *Colleg. Jussiana* MICHAELIS: sicut & Emplastrum Stomachale de Landano *Cranio*, vel solum, vel mixtum unum cum Taca-mahaca & Ballamo Peruviano, de *qua* *superius*, egregium est contra Lienteriam. RULANDUS recipit solim micam Panis, eamque Aceto impregnatam regioni Stomachi non oblique succellit applicat.

ARTICULUS IV.

De Colica.

Lienteriam occipit Colica Fluxus (V) live *Chylis Alvi* *curritur*, quando nempe Alimenta assumpta digeruntur quidem in Stomacho, sed digesta sub forma chylis cum excrementis una per Alvum exonerantur; quam tamen RULANDUS Lienteris saltem gradum remissionem credit; Duplex huius Colicæ, annotant SYLVIO *Pr. L. c. 13.* §. 3. & 4. hendi est *modus*.

1. Quando Chylis non feceratur à Fœcibus alvini in Intestinis, sed simpliciter, prout ex Stomacho solet dilabi, sine alteratione foras emittitur; tunc debilitate agri & insigni languore virum, unde Euxetra grisea, plus modo albacantia, Chylis invicem permixta apparet solent.

2. Quando fit quidem secretio Chylis ab Excrementis, cæterum propter defectum distributionis Chyli hic qui-

dem secretus, tandem cum Excrementis confusus nihilominus excretitur.

Præ Passio Colicæ species, quando scilicet nulla secretio Chymi ab Excrementis contingit, fit vitio Bili, quando nempe Bilis ad Intestina non defluat, ut ibidem possit influere secretione istam, h. e. quando Bilis in Intestinis deficit, quod fit in Idieri illa specie, in qua obstructio est Porus Choleochus; nam solus succus Pancreaticus non potest perficere Chylum, aut debitam secretionem influere, sine Bile. In qua maximum momentum situm est: aut defluat licet Bilis ad Intestina, si tamen hic est laesum & in sua crasi visum, h. e. non sufficienter salina acris, sed potius tantummodo oleosa, ac nimis pinguis, aut potius nimis ferola, vel aqua, tunc similiter nulla Excrementorum à Chymo nutritivo potest fieri separatio, hujusve debita perfectio; unde Colicæ Fluxus species emergit.

Posterior Colicæ species fit, quando parentibus Duodeno, Choleochus & Pancreaticus, fit quidem secretio Chyli, sed nulla distributio, quia obstructio aut infarctus fuerit orificia Vascularum Lacteorum in Intestina hiantium, & de mox obita, node non potest eadem subintrare Chymus nutritivus, adeoque propter Excrementa cum Chymo nutritivo excretantur.

CAUSÆ.

Causa Proxima prioris est Obstructio vel Infarctus duodeni Duodeno, sive à Calculo sive à Mucos, sive à alia re. Cæterum notum, Chylum perfectionem ultimam accipere in Duodeno, accedente Fermento Fellico, quo debescit, nulla fit separatio Chyli à Recrementis, unde Chylus erudit.

Causa Proxima posterioris est Obstructio vel Infarctus Vascularum in Intestina tenuia hiantium; nam licet has separant Recrementorum à Chylo, per peristaltica massas illas Intestinalis incumbens, per quod tanquam per filtrum cribra-tum aut transeolat Chymus nutritivus, si incallatum sit mucagine viscida ac tenaci, dida orificia simul infarciunt, non potest admitti Succum chylisum nutritivum, atque propterea confusa Excrementa cum Chymo nutritivo excretantur.

In his autem Colicis Fluxibus Ventriculus usquequaque est salvus, quia Chylus perfectus excretitur; uti hoc observat FRAMESARIUS in *Cons. 1. l. 5.* Interdum enim fit legitime digestio prima, licet secunda vitetur, sicut taliter affecti non raro ingemunt appetitum, quod observat FORSTUS *l. 12. c. 16.* in Muliere, in qua appetitus adhuc fuit salvus. Intermittit tamen hoc non universaliter adeo asserendum, quin tunc magis nunc munda falvus videatur: id quod docet curio *Observatio 76. M. A. N. C. Ann. 4. & 5. pag. 63.* ubi quidam post comitibus generis Carminum cum Fluxum Chylum patiebatur & in hoc nempe Carnes, quia non bene in Chylum perfectum digerendo transmutabatur, sed probabiliter nidoso sapore corrumpebantur, etiam iode factis Chyli separationis ac perfectioni interitus in Intestinis incipit, Fluxum Chylum concitabant. A Piscibus nihilominus etiam durioribus, tam recentioribus, quæ salitis & fumo indurata, non idem patiebatur, quia sine dubio Ventriculi Fermento magis appropriati, & hinc melius digesti fuerunt. Vitium ergo totum Fluxus Colicæ est vel in ipso Chylo manè digestio, adeoque inepto subeundæ alterationi Bili, vel in ipsa Bile non leccante, vel in poris Intestinalium non admittentibus Chylum.

Causa Remota est omne id, quod Folliculum Felleum aut Choleochum obstruit, aut Mucum copiosum in Intestinis facit, si officia Vascularum, Lacteorum aut à Mucos viscida obstruunt, e. g. in Infansibus aut Senibus, quibus malum hoc satis frequens est; ut à calum & cicatrice Intestinalium potest ducatur Alvi Fluxus, præsertim Dyentericus. hinc membranae Intestinalium interioris crassiores, confan-tur: quæ quid illi, qui per Idiam Orientalem iter faciunt ob Dyenterias locis illis familiares, sæpius experiantur. Hæc etiam pertinent Glandularum Mentræ obstru-tiones ac dispositio scirrhusa, à quibus Fluxum Colicæ ortum esse, diversis Auctorum Observationibus testatur; ver-

81.

(T) Quævis namque ex irritatione Fylori, mox & universi Ventriculi sibi posse citam Affectionem versis Intestinis detrahunt, adeoque Lienteriam; atque ad hucmodum sequitur Lienteria causam esse potius Fermenti digestio habet ac Ventriculi actionem. Quod si accuratius notandum est, docet, non error in Præm committitur, h. e. irritationem quæ nupquam est præterit, Medicamentis pinguis & oleis ad Phlegma dimittendum exhibentur, quæ majorem tunc debili & iam Fermentum infertur, adeoque morbum potius exasperant.

(V) KUKHIN *deco.* & KUKHIN *deco.* à Kukin Venter, & Albus: Colicæ sibi præ Ventriculo Medicis famulatur: quod nempe Colicæ Passio illa, si proprie Ventriculi affectio.

DIUS in suis Observationibus, quales nullus Auctorum unquam vidit.

II. *Secunda Species Dysenteriae*, seu Fluxus Alvi Cruentus est ille Iuxus, quo Sanguis tenuis & aequalis, & leuissimum carum similes, uti appellant, sine dolore excernitur, quod propter Hepatis imbecillitatem fieri dicitur, & aliis Fluxus Hepaticus appellatur, quia talis praesupponit oriri vizio Hepatis non rite languificantis; sicuti hoc nomen ipsi amoeni Veteres tribuunt, utrum Hepar in se sit lesio. Tamen jam de hoc; est enim reuera aliud, quam apertio Valorum interiorum five superiorum Hemorrhoidalium.

III. *Tertia species Dysenteriae* est, quando ab vizio Intestini spasmoticum, cum induribus Tormibus, & cum mucosa effluvia, hinc cum purulenta materia, Sanguis ejicitur, quae tertia species *acuta* est. Dysenteria dicitur, prout hodie id nomen venit, etiam aliud, quam *Diarthra Cruentia terminata*, sicuti reliquae Diarthrae Cruentae ferè semper sunt abque Tormibus (Y).

PARS AFFECTA.

Par Affecta in Dysenteria sunt Intestina, rursus crassius vid. SPIGELIUS *Anatom.* p. 179. PANAROLLUS *Deen.* s. *Obf.* 9. & BARTHOLINUS *Com.* 6. *Hystr.* 1. nunc tenuia, quod praeteritis sectionibus cadauerum, quales BARTHETTE *Pr.* l. 4. c. 3. & M. A. N. C. *Ana.* 3. *Obf.* 116. testantur, diffiparis quondam Signorum, de qua in *Diagnosi* dicitur, credere potest nunc coniunctum, quod HORSTIUS l. 4. *Obf.* 30. docet; quatenus scilicet ab obsequio vellicatur, irriteretur, & Spiritus ignis incandescit. Languet autem Intestinum, si ab obsequio sensu vellicatur & irriteretur, & tandem fit, ut calia pathemata sequatur.

CAUSAE.

Causa Dysenteriae est vel Efficiens Proxima Formalis, vel Materialis, five Originaria: Illa est Spiritus ignis, sed occasione dolorosa ad praeternaturalem impetum provocata, & doctorem torminorum, & excrementorum, Sanguinis ac Muci, profusiois prima artifex.

Sed nisi hoc, seu Causa universali, *Causa* imprimis particularis *vel Originaria* irritationis talis consideranda venit. Hoc est Acre quodcumque internum, periclitans Intestinis adherere, esse in tantum continuè vellicans, & stimulas, ut propter irritationem continuam tandem Sanguis effluat, idque cum insigni dolore: ab acri obsequio enim Intestina membranis vellicata & puncta se contrahunt, unde Tormia, cum ad locum laesum fiat uberior Sanguinis affluxus, & per lesionem Vasa aperiantur, & Sanguis profundatur: e. g. qui acrioribus fermentatoris utuntur, post creberrimam Fermentationem Sanguinem emittunt. Optime fieri modum Dysenteriae ostendit Hypercatharsis, quod Purgantia acris, v. g. Antimonii, praeipitatis, violentia fiat vellicatio, quae Intestina ipsam afficiunt, & sic Hypercatharsis Cruentae supervenit.

Acre autem hoc in specie est Acidum membranarum Intestini Nervique inimicissimum: unde v. g. Mulieres Hypercatharsis, acrioribus, acido & erodentibus succis cugidas, & quae aliis vel Systema Nervorum sensibilibus obiectis, aut affectibus Intestini spasmoticis obnoxii sunt, mediocriter etiam Purgantibus facile graves Dysenteriae incurruunt, quatenus Intestina à Purgantibus fortius vellicata, & ab Acido acri excoriata & erosa, cum gravissimis tormibus Sanguinem fundunt: unde quodcumque acre fortius Intestina vellicans, si nimis plus minus Sanguinem, & reliquos inde derivatos succos eugitas, facit Dysenteriam excitare potest. Novi bina exempla in Hypercatharsis, quae habuerunt Systema Nervosum Intestini sensibile, quod gravem Dysenteriam incurruunt.

Porro, ratione huius Causae Materialis distinguenda est aequa omnia Dysenteria; dum aliis est *Benigna*, alia *Maligna*: *Benigna* ut plurimum sine febre est, item sine contagio, & rarius sporadicè, seu sparsim quodam saltem homines in hoc vel illo loco affligit: *Maligna* verò Dysenteria copiosi-

mum conjuncta est cum febre maligna, interdum pestilentiali, similique epidemice grassatur, ac saepe integras regionem devastat, & poenit contagio se multiplicat, de qua postmodum.

Dysenteria Benigna & Sporadica, seu levissima, ut disti, oritur ex Acri quocunque, frequentius tamen ex Acri acido plus minus corrosivo, intestina poenit irritante, & plus minus escoriante; & ita Tormia & Sanguinis effluvia escitante; five oritur ex assumptis talibus, aut corruptis, aut in aeternum peregrinibus degenerationibus, aut denique oritur, ex Succo Pancreatico nimis corrosivo, vel per se tali, quando non temperat sufficere à Bile, vel propter irritationem à Purgantibus copiosius in Intestina effluat. Nil enim magis est inimicum partibus nervis, & laetissimum, quam Frigus & Acidum; unde, si tale quocunque errore ad Intestina pervenerit, membranas nervositas excitat, & ad Sanguinis profusionem disponit. Rara nempe est Dysenteria Benigna, quae ex vitu linguamque Majore, sed ferè tantum ex Concremento in Intestinis corruptione & depravatione. Hinc notum est, quod imprimis Fructus horum five autumnalis, qui facillime corrumpuntur, & corrupti, vel in corpore alterati, & non rite digesti, intemum & intestum acorem contrahunt, dant Dysenteriam; quos inter Fructus, Pepones, Melones imprimis, & Cucumeres eminent, ut etiam Pruna ceræ, Germ. *Die Spillinge*, quae ipsa non paucos Dysentericos reddidit, refert FORESTIUS l. 4. *Obf.* 23. SENNETIUS in *Praxi*, & MOEBIUS in *Hystr.* Docuerunt, item Cibi dulces & mellis, in Scamacho corrupti, imprimis in Hypochondriacis aut Hypercatharsis, in quibus subiectis viscosi fermentatione vel nimis accensio, ut vel miscela cum Bile organum excitat, & carminam nimis movent, Dysenteriam interdum inferunt. Eius item Uvarum nimius, ut etiam Mulli, plus minus fermentando & accensio, facit ad Dysenteriam disponit nam Mullum corruptum similiter accit. Purgantia etiam fortiora, uti Antimonium aut Colocynthis, aut similia, irritando acris & vellicando Intestina, & ita acrum Succorum ad ea derivationem promovendo, Dysenteriam Benignam non raro inferunt, ordinario in subiectis Systematis nervosi subtilioris. Mercurius etiam visus pro Cera Luis Venereae estis illius Dysenteriam interdum inferre observant Galli, saepius per Inundationem Mercurialium Lucem Veneream curantes. Sic Ulos pelum diuturnum curatum Dysenteriam insulit letalem, vid. M. A. N. C. *Ana.* 3. *Obf.* 213. pag. 324. & Vermibus quoque Dysenteriam excitat: vid. RIVIERUS *Obf.* 3. & BARTHOLINUS *Op. Hyst.* l. 4. *Obf.* 31. Sic & ulu Aceti in plumbeo vase affectu observata fuit Dysenteria à SENNETIO, vel etiam Aquis in canalibus plumbeis diutius afflatis. Adamas devoratus nec quoniam tritus Dysenteriam inferit, quod certum est, ratio, quia eundem tamen propter angulorum acurum incidendo & periclando non possunt non lacerari Intestina, cum notum sit, fulum Vitrum non rite comminatum tale quid praestare: vid. ZACUTIUS LUSITANUS in l. 3. *Prax.* *Admir.* *Obf.* 58. item l. 2. *Obf.* 10. de Dysenteria, Tab. & Morbo ex Adamanto impulso devorato Sed dice: Adamas non minutim tritus, alius enim minutissimè pulverisatus pro Dysenteriae cura adhibitus fuisse refert WORMIUS in *Med.* p. 503. ubi de Adamanto item exasperate Annuliduglatici observavit ZACUTIUS LUSITANUS Dysenteriam, qualis Dysenteriae Puls crassa & Crassa moderi potest (Z).

Hae Causae, five errore externo live interno, inferunt Dysenteriam Benignam, in quibus peccat Acidum acre intestina erodens. Sed haec fuit Dysenteria Benigna, quae non multum facit negotium.

Quoad *Endemiam Dysenteriam*, nullibi huius mentionem faciam observari, praeterquam in SYDENHAM *Obf.* circa *Morbos acutos* p. 247. §. 4. c. 3. qui talis Endemica Hyperborea Dysenteria mentionem facit.

Epidemiam quod attinet: haec omnium frequentissima est, & Autumnali praesertim tempore aut huius continis, facile affligit.

(Y) In M. A. N. C. Dec 1. Anno 3. *Obf.* 43. Wedelius (ut Auctor noster quoque in sequentibus notat) mentionem facit Dysenteria indolens, quae *laxa* appellat. Haec anno 1669. per Auctoris viciniam epidemice grassabatur: Ea praesens de minimis quidem dolore conqueveritur, sanguinolenta tamen caef olim querebat, etiam si ali maxime tormibus excrucietur: quae vero indolens Dysenteria tunc querebat, omnes multo praefatis sanguinolentibus sublimi. Ad autem Wedelius tribuit Causa mai. Significat, & gangraena Intestini non confusio: ex exemplum adducit maxime efficaciam Confusio, quae, si forte obsequio, coram quibus applicatur corrodere, in ipsum nervi sui tunc est.

(Z) Dr. Maubec ita dicitur periculi de Dysenteria, aut Causae huius morbi proximam, & symptomatum ab ea pendentem, esse crassum & acrimoniam Sacri, qui per Glanularem Intestini & Sanguine in Intestini separatur. Haec Sacri secundum Naturae leges fuit: & ita est: crassum autem & acrimoniam acquirit ex trassione materiae extraneae, quae & prius vis in Sanguinem primam delata, derivatur postmodum in Glanularem Intestinum.

affligere. Oritur ab Acrida acerrima, Intestinis speciosissimo sapore infestissimo, eoque sub mole minima efficacissimo; adeoque saltem Fermentum subtili toto mala inferente. Hoc nunc acridum est, antimonialis, aut helleborine, vel colocynthide: quasi potiusque; nunc mitius: nunc nunc Maligna nunc Benigna, utraque insigniter Contagiosa.

Maligna plus habet in recessu, & imprimis observanda vis eque Contagiosa, quae se per Contagium malignum misceat in corpore humano propagat: non enim solum per sedes communes promptissime inficit, sed etiam quod observatum aliquem est per instrumenta Clystrum potest aliunde inficere, teste HELVIDE PADUANO *Itala in Obs.* p. 104. Dicit enim, fœpides Dyfenteria corripit eos, quibus Clyster infunditur, instrumentum non bene abluo, quo antea Dyfentericus fuit usus: sicut etiam HOLSTIUS *in Obs.* dicit: *Instrumenta siccificari apta, non purgata, epistodi ulcera contagiosa excitare.*

Exempla talium Dyfenteriarum Epidemicarum plus minus Malignarum sunt frequentissima; imprimis scriptis de hac LAMONIERE de *Fluxu Dyfenterico epidemico*; item WILLIUS *in Pharm.* Tab. P. 1. pag. 119. & 125. li. SCHENKII *in Obs.* lib. (si fallor) 6. ubi de *Morbis majoribus*, BARTHOLOMÆUS *Cres.* 2. *Hijer.* Annot. 65. non minus quam AMATUS LUSITANUS *Com.* 3. Cap. 90. Et quidem talis Dyfenteria Maligna non promiscue quocunque animalia affligit: nam Dyfenteria interdum in Homines solum, interdum in Bruta tantum grassatur, dum SALMUTH *J. 3. Obs.* 55. Canes saltem & Felis Dyfenteria Contagiosa Maligna laborantes observat, quod rarum est. Oriuntur hujusmodi Epidemicæ Dyfenteria: ex Causa externa plures affligente, in quorum corporibus exaltatum Contagium fermentativa vi se multiplicat, imprimis propter Aërem plus minus præternaturaliter exaltatum, & Alimentum inquinatum, ex Aquarum vitio, ac Fructuum horum corruptela & inquinamento. Sic Dyfenteria lethalis ex evis Bradicæ capite, notio rare inficit, refertur in M. A. N. *C. Ann.* 3. *Obs.* 15. p. 143. Item potest discursum Siccitatem & Aëtem aliquid, ubi Rubedo corripuit fructus, aut Miasma malignum exit ex Terra, solis aractibus inflat Arsenici adhaerens: quale fuit Miasma Anni hujus seculi 24. & 66. in quibus mirabiliter grassata fuit Dyfenteria, ubi post Aërem liquidum Fœvus corripuit. Post Aërem squalem, & inde hinc ortum efflorescentiam candidam inflat Vitrioli Saturni in canaliculis plumbeis rectorum, superveniente pluvia, & floce illi ita abluo, ac Aëras inquinat, anno 1644. Dyfenteriam pertinacem in Belgia ortam observavit LINDANUS *in Coll. priv.* ad *Herrmannum*. In consideratione hujus Dyfenteria: Malignæ Contagiosæ, cum omnia Contagia consistant in Malignæ fermentativæ, Miasmæ sanguineæ inquinant, & consequenter Succos alterant; recte arborum sensisse WILLIUS *de Causa Dyfenteria: Tract. de Febribus* 1. 10. pag. 116. quod scilicet talis Dyfenteria non nriatur ab Humore aliquo vitioso in internis Visceribus producto, qui acrimonia sua corrodat; (non ita: quoniam tantillum fermentativus odor potest etiam immode inficere) sed recte dicit, Causam eam esse Miasma quoddam Sanguini impressum, adeoque incito ipsi confusum, inde ad Intestina latum, his imprimis inimicum, acrimoniæ hostilem afferent, Intestina irritata, Vascularum o-scula referant, de Sanguinis excretionem faciens. Nempe Miasmata talia videntur esse naturæ quasi antimonialia, de natura Colocynthidis, aut Scammonii, aut similis, quæ in specie Intestina saltem acrimonia sua vellicat aut abscere, simul tamen & massæ sanguineæ Crasin fermentativa sua vi pervertere valent, aut simili ratione, ut Arsenicum, quod gustu dulce est, & etiam ortum non cito sentitur, inera autem cum symptomatibus viciis mixta cruentum sicut à Uno de ratione prioris Tormina, & hinc Cruentæ dejectiones, ratione posterioris Febilis maligna adpensa esse solet. Talis enim Fermentum contagiosum, quod fermentando corrupt Sanguinem, & ipsi acrimoniæ aut naturæ Intestinalis insigniter hostilem imprimit, nullum esse dubium: sicut enim Butyrum Antimoniis partibus nervosis illitum Ulcera excitat, ita in Intestinis similis Causa acida ejusmodi Excoriationes excitare potest.

Quod attinet progressum in Dyfenteria, est talis in principio, dum Dolores & Tormina Intestinarum urgent, excremuntur liquida albicantia, plus minus mucuginosa, seu Mucosa albicans, hinc Sanies, & Pus cum Sanguine. Unde prout nunc plurimum de Sanguine, nunc plus in Mucos excremunt, dividitur vulgo Dyfenteriam in *Rubram*, & *Albam*. Sanguis, qui excremunt, equidem ex Valis vel anatomici vel directi aperti profluit; Mucus verò quid præcipue sit?

controvertitur. Sanguis, qui pensatur, non est præcipue ab Excoriatione aut Exulceratione Intestinarum, ut vocant; nam utut hoc in Benigna ab acrimonia fucorum acido-corrosiva simpliciter oranda locum habeat; in Maligna tamen, & in qua tantillum saltem Miasma acre, Contagium medio propagatum, Causæ proximæ vices obtinet, non opus est tali Excoriatione; Sufficit ab illius Contagii acerrima & Intestinalis inimicissima acrimonia continuo & tam fortiter stimulari Intestina, ut hac ex irritatione & erebriore contrahione tandem propriam Cruorem fundant & exprimeant: simili modo atque à Pulvere sternutatorio fortia velluntur Nares, ut Mucos erebriorem, & tandem largam humorem morrhagiam fundant; ita ut Cruoris profusio sit saltem consequens, & effectus alterationis in Intestinis: nempe Spina alicubi infixa ex doloris occasione affluens Sanguinis uberior, indeque, ubi denegatur hæc excretio, Tumorem facit. Similis Spina est tantillum Acre alicubi redens in Benigna, vel Miasma virulentum Intestinalis hostile in Epidemica & Maligna: hinc vellicata Intestina, & horum repetiti spasmus, & insigniter Sanguinis fluxus excitatur, unde tumens Sanguine Intestina cadem rubent, & non raro inflammantur, & per aperta partem, partem erosa valis, Cruorem profundunt.

Nempe hoc est indicatio *Arcti insignialis*, seu spiritus infisi, Cruorem proprium furiose profusentem, ex irritatione ab occasionali Fermento, ut loquitur HELMONTIUS acridi, Intestinalis insigniter hostili, unde & Termina & Sanguinis per anum profusio, ut Muci exarvalatio, componit super veniant: hoc etiam recte dicit, quod Dyfenteria à Pleuritide tantum differat in radice, seu loco affecto, eam quæ ad causam conveniat.

Mucus hic fuit cursum morbi interdum est valde copiosus. Multi admirantur, unde fit? non famus est, qui Pus: ut sit dicit, qui dicit, quod nihil aliud fit, quam Pus, quæ naturaliter oblitit parietes Intestinarum; quod tamen non potest esse, propter nimiam & excessivam, quæ subinde excremunt, ejus quantitatem, pro qua capienda Intestina ipsa interdum non sufficerent. Probabilior videtur HELMONTII sententia, qui dicit, destillare Mucum talem ex Intestinalis laesione, & esse nihil aliud, quam Nutritivum Intestinarum irritatorum penitum, sed deparatum, aut frustula Intestinalis infusum, simili modo enim ac pars exulcerata plorat liquorem, qui nihil aliud est, quam Nutritivum illarum partium: ita Nutritivum hoc, cum Intestinalis laesione, incoeratis & exulceratis assimilari nequeat, ex parte laesa quæ sub forma Muci, nunc sanies, nunc Puris in cavum eorum distillat, prout diversi sunt gradus corruptelæ hujus Alimenti proximi; jam sæpe Sanguinem una effundunt *latura talem similes*.

Tres autem Grades in hac Dyfenteria imprimis observandi sunt.

1. Quando tantum affinit atrocia Tormina cum Excretionis mucus & cruentus.
2. Quando cum Torminibus copiosus Mucus plus minus præternaturalis & cruentus excremunt, quomodo vulgo dicunt esse Abrahonem, aut aliqualem Excoriationem Intestinarum.
3. Quando in tantum fuscipit malum augmentum, ut jam in Intestinalis laesione loquatur *passiva Exulceratio*. Quod in *graviori Dyfenteria* Pus generetur in Intestinalis, patet ex Anatome: non enim tantum in Intestinalis, sed & in Glandulis Miliaribus Pus copiosum colligitur & abraditur, ita autem Abrahon iterum est triplex, secundum illa nempe, quæ una cum Mucos interdum excremi observantur:
 1. Quando saltem interiora *Valentia Insensibilis*, seu crassa illa, quæ Intestinarum carni obducitur abraditur.
 2. Quando jam aliquid de Intestinarum tunica crassa abraditur. HIPPOCRATES vocare solet *Sanientia Intestinalis in fact.* 3. *Aphor.* 66.
 3. Quando jam ipsorum Intestinarum substantia erassiuscula, sive carni quasi fuscipiat eroditur, & tunc excreat *Carnuola*, ut dicit HIPPOCRATES *Sect.* 4. *Aphor.* 36. qui tertius gradus esse acerbissimus, & mortiferum signum.

Carnuola tales, quarum passim apud Anthores sit mentio, quid sint? explicata obcurum est. Sanè substantia Intestinarum membranosa non videntur esse; potius Glandulas intestinales tumefactas, & morbi progressu à substantia Intestinarum separatæ, & ita excrete Carnium, sive moleculas carnosas speciem referentes.

Tandem, An sit *Exulceratio in Intestinalis Dyfenteria* affecit? uti vulgo afferitur, merito dubitatur, & recte hoc negat HOLDERHOUTIUS *Tr. de Err. Medis.* pag. 33. ex eo,

eo, quod alia Dysenteriae Causa per Specifica tam cito fieri non possit: ut taceam, tantumnon impossibile curatu videri calem Exulcerationem, cum aliarum partium membranarum Exulcerationes, ut Laryngis, item fistulae Ani, sint ut plurimum irrurabiles: Ergo nonnulli in diuturniori Dysenteria, eaque graviore, tandem Exorriatiae, & forsitan aliquis Exulceratio, locum habebit, quae in ordinaria non statim statuenda erit.

Dolor acerrimus, qui torquet Dysentericos, non est promiscuus & simpliciter ex Corrosione aut Exulceratione Intestini, ut huc videatur totalis causa; sed ferè maxima ex parte est ex Convulsione & Corrugatione spasmodica Intestini, quae Intestina irritata spasmò quodam correpta se convellunt & contrahunt, & motu quasi vermiculari se torquent, sub quo tam insignes sunt Dolores. Praesuppono hic supra dicta de Systemate nervoso: subinde retrorahitur Umbilicus, quod signum est manifestum Motus convulsivi, hinc succussiva sunt Tormina, non continua, sed remittunt, prout malum nunc mitius nunc gravius est. Tormina haec ordinariè praecedunt Excretionem, nisi Intestina gangraenata sint, quando sub ista spasmodica contractione Intestina simul propellunt, & ulceris egressum Contenta, & ita ad excretionem stimulant.

DIAGNOSIS.

Signa Diagnostica ex Doloze & Excretionis Imprimis desumuntur.

Dysenteria nempe praebendit agros cum insignis Intestinarum Doloribus & Torminibus; subsequuntur Dejectiones, & potius dejectus Alvus, longae craciae, & haec testium depressio cum dolore, & molestissimo Vilitum omnium quasi decessu, adeò: Dejectiones non sunt stercores, sed varium rerum, non simpliciter mucosae, nunc intermixtum sanguine, nunc simpliciter sanguinea, quae aggravantes morbo sunt putrilaginosa, & interdum membranarum specie referant.

Quando Sanguis simul excreatur plus minus, *Dysenteria Cruenta*, sive *Rubra* appellatur: si vero Mucosa superabundant, aut solitaria sint, in specie *Dysenteria Alba* vocatur.

In Maligna sepius est compuncta Febris plus minus interea, eaque interdum petechialis. Lingua subalbida mucilagine densa obrita, & vehementius afflatur corpus, nigra etiam & sicca observatur, una cum summa visum prostratione: agri sunt anxii, & inquieti, sine intermissione: subinde praecedente ulterius morbo, Sanguis sincerus copiosius coctus effluit, ita quod corrosivum majorem aliquot vaforum in Intestina & Mesenterio argumentum est. Nonnumquam Intestina inflammantur, indeque Gangraena incurabili afficiuntur: Aphae interdum fauces obfident, imprints, quando Adstringentibus impetibilibus adhibitis suppreffa sunt: Dysenteria: efficitur succussiva plus Intestini Rectum, unde ordinariè dolorosissimum Tensum patitur agri: supervenit non raro Ani prociencia, Appetitus prostratus, interdum Nausea & Vomitus urgent agros: non raro succedit singulus tantum pessimum Signum, & Vigiliæ, ut etiam interdum Deliria, & tandem quae lethales Convulsiones superveniunt. Graffata communiter in Incolis iollar Petis, eoque Contagiosa, haec tunc temporis sub forma Febris malignae multiplicat.

Causarum signa partim ex Extremorum conditione, partim à signis Humorum in corpore abundantiam, partim à Vice generis, v.g. militari, ac Dieta, simulque circumstantiis petuntur.

An *Maligna & Pestilens* sit? colligitur ex eo: si communo fuerit malum, pluresque cum symptomatis malignitatis propriis, v.g. anisate Praecordiorum, Petechiis &c. moriantur.

Ante omnia autem promeliori causa sciendum est: An *tenuis aut crassa Intestina afficiantur?* Denunciant hoc Locis, & Modos doloris, Tempus caius excretae, & horum varia Mixtio. (1.) *Latus doloris* arguit tenuia Intestina affecta, qui est circa & infra Umbilicum, ubi situm Deo & Jejunum: in crassius vero affectis est magis circa latera infra & juxta Stomachum, secundum nempe Coli ductum. (2.) Quod *Modum doloris*: hic longè vehementior est affectus Intestinis tenuibus, ac si cutis hinc inde diuturnior, aut quasi aculeis pungentior, qui contra dolor remittit & nonnulli obstruit est in crassius. (3.) *Color exorriat* post dolorem crassa Intestina affecta, tardior vero excreto tenuia Intestina laesata arguit, quod à loco affecto ad Podicem longior via sit. (4.) Si tenuia affricantur, *permissa magis & confusa* involunt sunt excrementa, Stercus, Sanguis, & Mucus, propter longior iter, quod moros conficiunt: in crassius vero Intestinis minus fuit confusa, sed po-

Tom. II.

tius sunt aperta vestigia distinctionis à se lavicem. (5.) *Tenuia affecta magis ad Vomitus stimulant agros*, praesertim quod propius respectu Ventriculi afficiantur; crassa minus: unde & anisati magis sunt, & peius se habent agri in tenuibus affectis, quam in crassis. Consultatur quoad hoc punctum & Prognosis in Dysenteria SENNERTUS, qui laetis est accuratus, & RIVERIUS.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis:

Benigna minus est periculosa, Maligna periculosa.

Quo magis tenuia affricantur Intestina, eo periculosior laborat ager, & e contra.

Considerandum etiam an Dysenteria habeat Febrim? item an ad Vomitus? Sanè omnis Dysenteria, praesertim Epidemica, cum Febre magis periculosa esse solet, quam quae sine Febre; & quo magis arcta & malignior hae fuerit: siquidem & Petechiae in Febrilibus talibus observatae fuerunt.

In Dysenteria quasi Pestilentiali eo periculosior laborat ager.

Ista Dysenteria, quae cum Vomitu affligit, & cui ferè se adungere solet Singultus, est deterrima, cum periculum subit, non ipse Stomachus plus minus affectus sit: Quo magis enim affligitur Stomachus cum Cibi solidio, eo periculosior est: si non adesset Vomitus, & agri alimenta assumunt cum Appetitu, talis non est lethalis, nisi culpa Medici fiat.

Dysenteria, in quibus Excreta sunt viridia, nigra, aut varia aut admodum graveolenta, sunt pessima: item Dysenteria, quae ab atra & peracua Bile, ut vocant, incipit, nulla praecedente Febre, nec Colicis signis apparentibus, exitiosa est, teste HIPPOCRATE *lib. 4. Aphor. 22. & 24. & FONTANO in Methodo generali pag. 62. cap. 5. & 7. & pag. 77. propter corrosivum acidissimum Succum, valde erodentem Intestina*; item quae à Dejectione biliosa aut seruginosa, hinc magis erodente: vid. HIPPOCRATES *lib. 7. Aphor. 23. Omnisque raptus crudelissima videtur, quae à Putrida acida atque falla, utpote qui humor ratione sonacitatis difficultè abstergetur.*

Si Dysenteriae Ructus superveniant, vel Crepitus ventris, bonum signum est, scilicet redeantis suo modo Fermenti digestivi.

Econtra Convulsiones ac Deliria, Dysenteriae supervenientia mortem ut plurimum significant.

Si à Dysenteria laborantibus veluti Carunculae desiciuntur, lethale est, teste HIPPOCRATE *lib. 4. Aphor. 26. ut plurimum quae profundus Ulcus denotant: vid. SENNERTUS Praef. lib. 3. p. 2. Aphor. 2. cap. 7. pag. 334. & 337.*

Dysenteria indolens sepe mali est omnis, & quae cum Gangraena Intestini, indeque indicium infestissimum ostendit: conf. de *Dysent. Epidemica quorundam Indolentia* M. A. N. C. *Ann. 2. Obs. 43. p. 22. item RARIHOLLINUS in Actis Med. Hassens. Volum. 2. pag. 183. RHODIUS Cons. 2. Obs. 11.*

Quando adesset Tensum in Dysenteria cum biatu Ani, itaut Clysteres injecti statim elaborant, aut cum tanta Podicis adstrictione, ut nihil possit incommitti; certum plerumque est mortis signum: vid. le MONIERE *Tr. Supra cit. cap. 5. pag. 264. & 191. Nempe hic tumor, illic paralytica confusio Intestini Recti inducitur ex virtutis animalis prostratione adesset.*

Dysenteria, si est symptoma Febris Malignae aut Variolarum, periculosa est, & ferè lethalis.

Dysenteriae supervenientia Febris, aut quae aderat, si intenditur, malum est, quoniam Inflammationem aut insignem Intestini corruptionem ostendit.

Lienteria supervenientia Dysenteriae diuturnae, est admodum mala.

Aphae Dysenteriae supervenientes, ut plurimum lethales sunt indicium.

Gravida dysenterico Tensum correpta, frequentius abortum patitur; idque cum periculo, imprints si grandior fuerit Foetus. Interdum tamen Dysenteria Gravida aut Partum salutaris observata fuit, teste FORESTO *l. 22. Obs. 34. item A M A T O LUSITANO Cons. 2. Obs. 51. quia post Partum plerumque hac liberatur; testante HIPPOCRATE *lib. 3. Prædict. Text. 30. & l. 5. Epidem. Text. 33. l. 7. Epidem. Text. 49. & SENNERTO Praef. lib. 3. p. 243. per bina exempla hoc comprobant. Sit autem Benigna, non Maligna, non nimis gravis, & non longe ante Partum; aliis est periculosa, & mors in oia: Epidemica tamen Gravida**

Q

plo & observatione confirmato. Vlt Juvenis Dysenteria gravi constitutus, in principio quidem nonnulli cruenti, sed in progressu tota mucosa, excrebat; aderat simul febris continua; hunc sine evacuationibus Rhabarbarinis, mox per Opia & Specifica aggreffus fuit curare; successit quidem Cura, sed magno labore, & sub constanti calidæ Cerevisiæ potu, Laterumque caletidorum Pedibus & Abdominali applicatione; subinde sudores spontanei, præsertim vespertini, erumpbant cum euphoria. Cessante Dysenteria durabat adhuc febris continua lenta cum gravamine Ventriculi, & appetitu penitus destitudo, copioso nempe Mucos Ventriculi obfidente; ob id ordinavi Sal Ammoniacum cum paucis Lapidibus Cancrinis, cujus repetitio usu attenuatus quidem nonnulli fuit Mucus, sed non reiecit; coactus ergo propinavi Vomitorium ex Syrupi Emetici ℞. idque eo magis, quod vespere præcedente æger spontaneo vomitu varia mucilaginis excreverit; sed Vomitorium nihil effecit, ut ne anxium reddiderit ægrum, Mucos nempe in Ventriculo copioso obtundente remediis viis, tamen copiosa mucosa fœcruat & rufi rejecti, febre lenta adhuc perdurante, quibus rejectis multum levatus fuit. Excrevit autem illa ex Ventriculo; nam & simulum rufus in regione scrobiculi Cordis percipiebatur, & que exerebat, illic prodire asserbat; ob id Miduram ex Aqua Hyssopi, Syrupo Nicotianæ, & Ozymelide squillitico ordinavi, cujus ulu rejecti quidem copiosius, fed crebriores etiam demò feces passus fuit; propterea Intermissi, & præscripti sequentem Pulverem:

℞. Rad. Ari. ana. præp. ℞ij.
Lapill. Cancr. præp. ℞ij.

Milferendo.

Omni mane largam dosin capere jussi; quo assumpto, ut penitus ex Ventriculo eradicares mucosa, 40 guttas Tincturæ Tartari benè acris omni mane capere jussi; sicque convalescit.

Ex huc Causa didici:

1. Necessarium esse in Dysenteria Benigna laborantibus, præmittere Laxantia; si enim hoc in principio fecerim, tantum Mucos fibrarum in declinatione morbi circa Ventriculum & primas vias non habuim: Nam quoniam Dysenteria erat Benigna in corpore crudis fecis infarctis, hi ipsi morbi febri corrigendi, & in Mucum temperatum conversi, circa primas vias depositi; sed Antidysenterici & Opia remedia detenti, postmodum illas turbas dederunt.
2. Didici in Dysenteria, si malum fit vel ex Ventriculo, vel declinate morbo, nihilominus adhuc foreturi à Dyspepsia Ventriculi, Vomitoria equidem in Dysenteria posse propinari. Vomitoria equidem in Dysenteria magis, quam Diarrhæa, sunt periculosa, propter metuendum Ventriculi læsionem. Si autem Dysenteria fit à Pharmacis malignis, aut Veneno, & materies relicta quædam pars in Ventriculo hæret, conveniunt Goss. S E N N E R T U S L. 3. Prax. p. 355.

De cætero si conveniunt, magis in Benigna, quam Maligna locum habere videntur; la MONIERE tamen Tract. de Fluxu Dysenteria maligna observavit subinde in primo principio Vomitoria fuisse proficua: Et arbitror hoc ita esse, in casu nempe, quo Contagium malignum inspirando hæsum, Ventriculum saltem adhuc obducit; idque si superiora Intestina laborem, si Cacochylia adsit, aut malum vomit, necnon Humorum in primis viis, Intestinalis, & Ventriculi molesta labura; si denique Natura eo vergat, ægrique eidem facilius aufcultat, viribusque adhuc conficit, &c. Vomitu namque distinguitur Dysenteria curatas vidit MERCATUS.

V. Sudores tam per se, quam Diaphoretica provocati, in specie habenda est ratio in Dysenteria Epidemica plus minus Maligna. Sanè cùm hic ante aliquos annos in universa hæc regione grassaretur Dysenteria Epidemica Maligna, Paiores pagani suos Rusticos ipsi Sudores, præsertim Tinctura Benoardica, curarent. Eodem tempore quidam Rusticus, & ipse Dysenteria Maligna correptos, iussit Balsami Sulphuris gutt. xx. & ultra, cujus repetitio usu per repetitos Sudores ipse fuit curatus. Adeoque tentandum videtur, annon in Dysenteria Maligna Sulphurata. Crocata, & Camphorata, præservative pariter ac curative, sint optima. V. g. Flores Sulphuris, Extractum Sulphuris, Balsamum Sulphuris juniperinum, ac succination potius; Elixiir Peffilientiale Crullii, Spiritus Vini camphoratus, crocatus, theriacalis &c. Unde dicit P E T R. E U S in *soli Differentia* noster, quod rectè faciant Hermetici, qui Dysenteriam non tam Purgantibus, quam Diaphoreticis aggrediuntur, & si-

Tom. II.

tim correcto Aëre Bacis Juniperinis, alternis diebus Potiorem Paracelsi Pestilentialem, aut Aquam Theriacalem aut simile Diaphoreticum Alexipharmacum propineet; post expulsionem Venosi postmodum curativo Appropriato utatur. Hinc etiam ipse la MONIERE refert, quod Sudor primus morbi diebus, vel sponte prodians, vel debito Sudorescorum usu prolicitus, Dysenteriam frequenter supprimeat, serolis humoribus foras propulsis. Quò magis ergo corpus transpirat, & magis Sudores afficit, minor est Dysenteria. Exinde apparet, eandem terè, que in Febribus Continuis & Malignis, Methodum medendi observandam esse.

VI. *Adstringentia*, ut talia in principio & progressu morbi nil valent; potius graviter nocent. Certè nil peius est, quam uti in Dysenteria Adstringentibus: siquidem non relaxata, sed irritata sunt Intestina; imprimis nocentissima sunt intempere, h. e. ante Appropriata & Alexipharmaca in Maligna, & ante Abstergentia Laxativa in Benigna, exhibita; interdu saltem in declinatione morbi commodè usurpari possunt. Nam valide Adstringentibus, maxime in principio, Dysenteria supprella, subinde graves excitat affectus, nunc Parcin contumacem, nunc Abfcessum Mesenterii; vid. la MONIERE: Sic enim MARTINI in Tr. de Morbis Mesenterii. p. 44. Inflammationem & Abfcessum Mesenterii periculolum oriat ob Dysenteriam finitè Adstringentibus curatam & supprellam: sic etiam Parcin ex Dysenteria intempere supprella observavit VELSCHUIUS de *Ægagrop. Diff.* L. 1. p. 16: sic in quos morbos Dysenteria Adstringentibus supprella subinde desierit, vid. HILDANUS L. 3. Obs. 45. & 46.

Quemadmodum igitur perquam nocivum est, mox ut sittem intempere Adstringentibus & Sypticis sustinere Dysenteriam, ita simul probè attendendum, ut Fermentum Dysentericum probè correctum totum ex corpore eliminetur, alias enim aut vitando Lympham, aut afficiendo genus nervosum, qui in specie inimicam existit, (nam & Intestina huc spectant,) varia excitate potèst symptomata, vid. HORSTIUS lib. 4. Obs. 31. & lib. 5. Obs. 11. & 12. VELSCHUIUS *Ægagrop. Diff.* L. 1. Cap. 4. pag. 60. RHODIUS Crit. 11. Obs. 87. THONERUS *Observat. pag.* 195. & 246. Correctio hæc fit, ut dictum, per Appropriata in Maligna, per Temperantia in Benigna, in specie per Lacticia. Evacuato partim per Sudorem in Maligna, per Alvim in Benigna. Et quidem neglectus Laxativum ac Sudorescorum, illarum præsertim in principio, horum in declinatione, perveris contra Opiatorum ulus, imprimis occationem pravis symptomatum subministrare videntur.

VII. *Vasa* omnia frustanea est in quacunque Dysenteria; in Maligna enim nociva, nisi foras gravis evacuationis Sanguinis supprellio aliud insuerit; in quo tamen casu cautè fiat, adeoque nemini auctor sum, ut imitetur SYDENHAM in Obs. de Morb. Acutis p. 255. Sect. 4. c. 3.

VIII. *Clysmata* raro fuisse usurpanda: Nam ut ut hæc valde sint utilissima in Dysenteria, tamen si prius fuit pessima: scilicet nimis abunde malum exasperant potius, quam leniant. Unus laudem habet, vituperum meretur abusus. Locum non habent, nisi (x.) ubi affectus sunt Intestina crassa; & tertia enim eorum viis non pertingit. (x.) In Benigna, ubi eluendæ fœces quædam. (y.) Ubi acrimonia insignior temperanda. (4.) Quando nimis affligitur tesia Intestina superiora, & Pylorus, ut quasi per accensum revulsor stimulo liberetur. (y.) Ubi consilii data necessaria. Non tamen crebrius aut copiosius iniciantur; Quia (x.) omnes Clysthes, quæcumque fuerint, etiam ex Lacte, Intestina tanquam aliqual peregrinum, plus minus irritant & vellicant, & ita malum quomodocumque exasperant, & revera motus spasmodici sunt; vid. HELMONTIUS, qui accuratus est, quoad usum Clysmatum in Dysenteria. (y.) Quia Tenesmus iazè graviter per Clysmata exasperatur; & (x.) Quia ipsa Intestina irritata mox denovo Clysthes resiliunt, & ita propter suas contrahatas & spasmos dolores exasperant, partem juvare possunt: in declinatione ergo morbi usurpanda.

IX. *Stomachi* in tota Cura Dysenteria summa semper habenda est ratio, non secus ac in quibusvis Alii Fluxibus. Quò magis enim furit, eo peior erit status morbi, & quò melius se habet, vel appetendo nonnulli, vel alimenta quædam perferendo, & major spes salutaris adest: contra Appetitus penitus destitudo, aut Vomitus supervenientes, aut etiam Singultus, pessima sunt signa. Ob id semper simul Appropriata, interne pariter & externe, Stomacho succurrendum est; cujus ratione Vinum, præsertim in admodum Vomito, non nocet absolute consideratum; aceto verò ratione nonnulli suspensum videtur. Modicè autem propina-

Q 3

tum,

tum, Stomachum refluant, & in Dyſenteria Epidemica ſalubre eſt. Anno 1666. cum Dyſenteria Maligna epidemice graſſaretur in Miſina, præſertim ruri, obſervatum fuit, quod ægri, dum laborant Vomitu in Dyſenteria, Cereviliam, Julepum, & Laxativa omnia evomeant; potum Vini autem calidi coadjuvabiliorem fuiſſe ægris potu Cereviliæ; cumque citius receptum, nec adeo laſite per Vomitu fuiſſe reſectum; Ob id etiam Cinnamonom nonquaquam omitendum eſt in remedii Antidylenterici.

X. Caveant ſedulo ægri, ne Corpora reſurgant, ſed quantum poſſibile, calidum illud & blando calore irroratum conferant, præſertim Pedes: nam quò calidiora conferantur extrema, eò melius habent ægri; ſi verò tantillum refrigerentur, præſertim Pedes, acerbiores ſuperve-niunt dolores. Eadem ex ratione à Frigidæ Potu, quantum poſſibile, abſtineant; ſimul enim atque Potus non calidus ingeritur, ſuſcipit Tormina & Alvi excretion, crudelitè ſuperveniunt; hinc Juleſcia Decoctioni Galliarum ſæpius ſorpta, licet minus grata, ſunt ſummè probata.

XI. Denique quaſi ſua ægri, & quoniam poſſibile, omnem Corporis ſedationem remittant, nec ex leſſo ſurgant, ſed ſaltem per patinas ſubtiliter colligant rejicienda. Sanè, referente la MONIERE c. 6. p. 104, Quies tantæ fuit utili-tatis, ut, qui ſtatim à morbi principio decubuerunt, nec ve-riti ſunt in lecto, vel in pulvienti, vel ſuper linteis delice-re, morbi violentiam facile ſuperant: lic quò magis deſice-re, eo minus Fluxus exacerbat.

Nec XII. eligenda Venæ, cum tam quantum ſalubre commendat RIVIERUS. Reſert AMATUS LUSITANUS *la ſua* C. 3. Cur. 47. de quodam Dyſenteria Epidemica laborante, qui celebravit eam Uſore coitum, & mane laus evaſit (A).

Plures Cautiones, quæ ad Præſin faciunt, videbitis in *WILLIUS Pharmac. Ration. Vol. 1. pag. 131. & 132, item SEPTALIO c. 1. pag. 320, qui etſi elegans; item in HOL-DERHOFF de *Erratibus Medicinæ, ubi de Dyſenteria.**

Remedia Alterantia in Dyſenteria, acré vitium pec-cans temperantia, & irritans ſilientia, ſunt vel Commu-nia, vel Specifica; ita enim melioris cognitionis ergò diſtinguere lubet. Communia ſunt & conveniunt, vel quate-nus aſtringunt, ut Styptica, vel quatenus conſolidant, ut Vulneraria, quæ blando ſuo alcali, deſolant ſcæ H E L-MONTIO & TACHENIO, acidum in exulceratis In-tellus temperat & abſorbent, vel quatenus in genere om-ni acré corroſivum deſtrunt, illud vel obtundendo, ut Pla-guina, Oleſcia, Lacticia; vel ſuccos acidos & corroſivos imbibendo & abſorbendo, ut Terræ medicatæ, Oſſa ani-malis, Corallia & reliqua Aleſcia. Specialia verò, ſeu Medicamenta Specifica ſunt illa, quæ ſpeciatim acré dyſen-tericum, ut ſic, emendare, & conſequenter vim ac impet-um Spiritus inſiti coſtere, & ſingulari proprietate Dyſenterium propriè curare valent, & quorum vim & eper-giam antidylentericam longa experientia confirmavit. De diſtinctis hu diſtinctè.

Iner hæc eminent Priapi, Priapus Cervi, Ceti, & Tau-ri, Cranium humanum cum Ulnæ, Tragæa Gnanorum Ades, Sanguis Leporis, Hepar Serpentum, Ungula equi-næ, Stercus caninum; ſicut & generalia Abſorbentia com-mune cum Specificis miſceri poſſunt, Priapus Ceti eſt om-nium optiſum, quem laudat D. MICHAELIS; poſt hunc eſt Cervi Priapus; viliffimè eſt Priapus Tauri. Facit men-tionem horum Priaporum HELMONTIUS in *Plura Sa-rano*, eo quæ commendat non magis contra Dyſenteriam, quam in ſpecie contra Pleuritidem, in qua ipſa hi Priapi ſunt eſperci. Uſurpantur vel in forma ſicca, vel in forma humida: In forma ſicca, quando nemp exaſcantur leſe in furno, hinc exſtant, & quantum heri poſſit, commi-nuuntur, cujus Raſura (non præſcribuntur pulveriſandi) præſcribitur à 3℔. ad 5℔. in Juleſcio calide, ſivo in Potu La-tiſi, ſivo in Aqua Foliorum Quercus, aut etiam in Potu Cereviliæ calide; idque ſubinde repetatur, & uſum eſt ex optiſis contra hunc morbum Remediis, vel ſolum, vel cum Laudano opiato niſurpatur; Superiori anno Paſper, deſperata Dyſenteria eueceptus, Remedium à me petebat, & præſcripti ei ſequens:

℞. Raſur. Priapi Cervi 3℔.

Laud. hyſſer. gr. 12.

M. f. Pulvis pro duabus doſibus.

Vel

℞. Conſerv. Raſur. anisq. 3℔.

Raſur. Priapi Cervi 3℔.

Laud. opiat. gr. 12.

C. f. q. Syr. Cydon. arom. f. Electuar. pro duabus doſibus.

D. S.

Electuarium Adſtringens pro 2. doſibus.

In forma liquida præſcribuntur in Decoſto, quod ad aliquot uncias crebriſus haſtium ſimiliter eſt eſperum, & quibidam in ſecretis habitum. Non tantum per in potando, ſed etiam pro vehiculo aliis inferit Remediis, v. g. cum eodem Emulſione parando ex Semibus appropriatis, Semine Papave-ris albi, Pineis, Amygdaliſ dulcis, &c. ubi Decoſum horum Priaporum eſt liquor appropriatus. quo ſunt tales Emulſiones: e. g.

℞. Sem. Papav. albi

an. 3℔. maj. an. 3℔.

Amygd. doli. 3℔.

C. f. q. Decoſi Priapi Cervi, vel Ceti f. Emulſio: adde

Terra ſſilis. albi 3℔.

Ulnæ. 3℔.

Corall. rub. prop. an. 3℔.

Syr. Papav. albi 3℔.

D. S.

Lac Conſortativum adſtringens.

℞. Decoſi Priapi. Ceti, vel Cervi 3℔.

Aqua. Cinnam. 3℔. ad 3℔.

Syr. Corall. Querc. 3℔. vel 1℔.

M. pro Juleſcio: S.

Juleſcio Conſortativum adſtringens.

Hauriatur crebriſus imprimis nocte, quo Dyſenteria inva-leſcit: eſt grati ſaporis, & optime convenit.

Superiori aliquoties præſcripti non ſine effectu:

℞. Fel. Med. terreſtr.

Plantag.

Sangu. an. M. 3℔.

Fler. Raſur. rub. p. 1℔.

Rad. Tormentill. 3℔.

Raſ. Priapi Cervi, vel Cervi 3℔.

Inciſa & conſula conjuantur in f. q. Aquæ ſimpl.

Calentura 3℔. adde

Aqua Cinnam. 3℔.

Syr. Cydon. arom. 3℔. vel 1℔.

M. D. S.

Potio Conſortativa adſtringens.

Plura qui cupit videre de efficacia horum Priaporum, adeat DORNCK & L L I U M Traſſat. German. de Dyſent. item STOKERUM in *ſua Praxi* p. 31. in quem commentatus eſt THOLDIUS.

Hi Priapi multiplex experientia ſerè apud omnes con-firmatis, ſubinde alia permittuntur, & ſunt Pulveres com-poſiti Antidylenterici; v. g. multi commendant hunc Pulve-tem;

℞. Priapi Cervi 3℔.

Rad. Symp. major.

Tragacanth.

Muc. Aluſi. an. 3℔.

Terra ſſilis.

Bol. Arm. præpar.

Corn. Cervi aſſi præp. (imbibit omne acidum

Zedair. 3℔.

M. f. Pulvis; D. S.

Pulvis Adſtringens.

Hunc Pulverem multum commendat EURERUS Tr. de Dyſenteria pag. 15. qui Traſſat. eſt admodum elegans. Vel ut alii componunt:

℞. Raſ. Priapi Cervi 3℔.

Terra Solar. Hong. vel 3℔.

Corn. Cervi aſſi præp. an. 3℔.

Corall. rub. præp.

Pulv. Tormentill. an. 3℔.

M. f. Pulvis.

Alio modo:

℞. Terra ſſilis. 3℔. vel 3℔.

Raſ. Priapi Cervi 3℔.

Corn. Cervi aſſi præp. an. 3℔. ad 3℔.

Corall. rub. præp.

Pulv.

(A) Præſcriptum hic ſci interſerere variam interpretationem verbo Hippocratis 7. Epid. circa finem. τῶν μὲν ἄχρονων ἐντερίων ὅσοι, ἵνα καὶ ἡλικίαν CORNARI, FOESII &c. At Fabius Calvus Medicus Ravennatis legitur τῶν μὲν ἄχρονων, quod ſcilicet Achromus, proprium interatrii nomen eſt. Alii tamen legunt τῶν μὲν ἄχρονων ἐντερίων ἀνὸν P. Le Clerc, Hiſt. de la Medec. & Mercurialem ſuper cit. Hipp. loc.

Pulv. Tormentill. an. ʒiij.

M. f. Pulvis. ʒ.

Pulvis Adstringens.

Cajus dosi ʒi. bis vel ter in die in vehiculo quocunque calido.

Vel

ʒi. Rof. Priapi Cervi ʒij.

Cornu. Cerv. fœs ignis,

Animalium diaphor. an. ʒi.

M. f. Pulvis.

Divid. in tres partes æquales, & ut antea.

Addi his Pulveribus possunt Landani opiatii grana aliquot, & gutta olei Cinnamon.

Vehiculum pro dictis Pulveribus esse potest;

ʒi. Aqua. Card. bened.

Mentha an. ʒiij.

Cinnamon. ʒvi.

ʒij. Opii ʒij.

Syr. Card. bened. ʒvi.

M. D. S.

Potiuscula Confortativa ad Pulverem.

Juxta Præparum Cervi, Cornu Cervi est egregium remedium, quod multis scopis ad Curam Dysentericæ satisfaciæ, quod facili patet, siue usum affumæ, siue sine igne præparum propinetur, imprimis ejus & Eboræ Gelatina v. g. sit Julepus propinquant ad Dysenteriam:

ʒi. Dactyl. Mand. cum Cornu. Cervi. ʒiij. (loco hujus potest sumi *Dactylum Priapi Cervi* pro lubitu)

Gelatin. Cornu. Cerv. ʒij. vel ʒvi. ad ʒi.

Aqua Cinnamon. ʒvi.

Syr. de Symplic. Fern. ʒi.

M. f. Julepus: S.

Julepus Confortativus.

Capitur pro lubitu.

Aqua Cinnamon additur propter stomachum, cui est convenientissimæ, cum in Dysenteria ratio omnino si habenda stomachi, imprimis quando affecta sunt intestina tenuia, & sequi solet Vomitus.

Vel etiam Gelatina Cornu Cervi, & Gelatina Præparum dicerem, maxime Priapi Cervi, dissolvuntur in Potu ordinario hoc modo:

ʒi. Gel. Cornu. Cervi.

Priapi Cervi an. ʒi.

M. S.

Gelatina ad Potum.

Hæc Gelatina super igne liquefit, cujus dosi Cochli. i. vel iij. in Mens. i. Cerevisiæ, vel Potus ordinarij, & crebrius usurari potest. Non alicui saporem Cerevisiæ, & tamen egregie confert; sunt enim hi Priapi concretum quasi medium inter Cartilagineos & Ossæ.

Quidam commendat pro Potu Decoctum Cornu Cervi cum Radice Pimpinellæ, uti est RIVERIUS, utpote qui Pimpinellam, Sanguisorbam scilicet (altera enim nimis acris foret) ceu expertam in Dysenteria commendat: Vid. RIVERIUS *Cerv. ʒ. Observ. 22.*

Juxta coram Cervi etiam aliorum Animalium, imprimis violentem intertemperum, Ossæ & Cornua in Dysenteria fructuaria & egregia, partim sine igne præparata, partim & usæ. Usæ quidem, quacunque sint, coincidunt vi absterptiva, temperativa & diaphoretica: sed & non usæ convenienti. De Ossibus bovinis calcinatis, quæ multum commendantur, item Ossibus humanis calcinatis aut sine igne præparatis, quæ similiter sunt admodum utilis, ex Homine nempe violentem intertemperum desumpta, utpote in quibus de Muniæ vitali, siue Spiritu infuso nonnulli adhuc superest, nihil dicam: saltem moneo, quod Ratusa humani, vel Cranium humanum sine igne ad ʒi. vel sola, vel cum Opiat. sint egregium Specificum in Dysenteria, imprimis desumpta ex Homine violentem intertemperum. Exemplum prostant, quod Dysenteria contraxit beneficio Ratusæ pulveris (sæpe Cranii humani ad ʒi. propinquant fuerit curata, quæ etiam experta est ab Illustri dñe BOYLE, Angli, ut ipse mihi narravit: videatur etiam commendata hæc Ratusa apud RIVERIUM in *sua Pract. lib. 10. cap. 6.* Hinc etiam Utrina Cranii humani, tam suspensæ quàm rota frædi, singulare Specificum est in Dysenteria & ʒi. vel gr. xv. ad ʒi. siue sola, siue cum alijs propinata. Tocco polychrestum ejus usum in Hæmorrhagijs omnibus de hæc Utrina, & Arcanis sub eadem sepulchris contra quancunque Hæmorrhagiam v. Vid. HELMONTIUS *de Medeg. Naturæ. Curæ.* Unum adhuc monere de hæc Utrina: experimentum egregium factum est in Angliæ, uti retulit mihi unus ex Collegiæ Experimentalis Regiæ: Gorræc quidam secari Venam: verum, utut

linguis floridis existerit, tamen accepta Utrina subitò supprellum fuisse: cum verò depositisset Utrinam, denud conferret existit, simul ac verò denud manu arripuerit, cella sicutum indigui præstentium admiratione. Narrat hoc ipsum etiam BOYLE in *sua Philosophiæ Experimentalis, Angliæ ediditæ conscriptæ.* Porro Dens Hujusmodi, & hujus loco Uniconum verum, est singulariter expertum in Dysenteria, si præparatum à ʒi. ad ʒi. vel ʒi. ad ʒi. propinquet. De hoc Dente vid. WORMIUS & BARTHOLIUS. Conferat imprimis hic Dens Hypopotaami tunc temporis, ubi imminet convulsiones, utpote contra quas est singulare remedium. Certum est, quod obiter adsepto, experimentum contra Hæmorrhoides nimium fluentes; item contra nimiam Hæmorrhagiam Uteri, seu nimium Menstruum fluxum, est experimentum HOECHSTEDTERI.

Uva Quercina singulariter dicitur Specificum, quod à non paucis commendatur, uti potestis videre in SENNERTO *cap. de Dys. p. 359.* item SCHENCKIO *l. 3. Observ.* Verum cum non semper reperitur hujusmodi Uva Quercina, in defectu hujus non incommode potest subistit Viscum Quercinum, aut etiam Fungus Quercinus, vel Fungus Sorbi aucupatorum; hi ipsi enim similiter sunt egregii.

Post Uvam Quercinam est *Tragen Graevæ Altes*, seu Panis infuscatum cum Succo Baccarum Sambuci, & est egregium Specificum à plurimis expertum. Laudes videbitis in HARTMANNI *Pract. Chym. p. 19.* item BORRELLO *l. 2. Obf. 40.* Optimis præparandi hæc Pulverem modus est hic: (nam vario modo præparatur:)

ʒi. Intei Graevæ, Altes rec. exp. qu. v.

Ex quo per subsidientiam clarificato cum Farina secalina conficitur massa, à qua ordinario modo Panis formetur, qui bis in fornace ad debitam duritiem coquitur, ut redigi possit in Pulverem. Ex Pulvere isto cum Succo Baccarum Sambuci iterum formetur Panis, & priori modo coquatur, id quod tertia vice similiter sepeatur. Deinde ubi tertia vice similiter pulverificata ista Pasta fuerit, addatur.

Sang. Lepor. crudi rec. (de quo postmodum) ʒiv.

Pulv. Priapi suspensæ, uti notum est, vel Cori, vel Cervi, vel Tauri ʒi. vel ʒi.

Succi Gran. Sambuci. rec. q. l.

M. f. Massa, quæ denud in clibano blandè siccetur & pulveriletur.

Addatur, si libet, Saccharum ad pondus omnium.

Dosis est ʒi. sine Saccharo vero à ʒi. ad ʒi. Insuperatur Panni tollo, Vino insitudo, & ita assumatur.

Quidam conjungunt Saccum Graevæ utrumque materiam cum Succi Sambuci ana, & cum Farina Frumentis q. l. faciant Pastam, & superiori modo procedat.

Pasta est mentio sanguinis leporini; qui similiter singulare est Specificum Antidysentericum. Oportendum autem est, quod non accipienda sanguis ex Lepore sponte mortuo, aut rigore enecato, sed potius, quantum heri potest, in fuga capto, & dum ita à Canibus fatigatur, & summo sub periculo & pavore mortis constitutus est, jugulato; tunc enim sanguis est optimus, qui duplici modo usurpandus: aut enim hic sanguis Linteo mundo excipitur, quod Linteum secarum haullul Cerevisiæ, vel Potui ordinario per noctem infusum Dysenteriam curat; aut ipse Sanguis Leporis, superiuri modo capti, calciscatus & pulverizatus ad ʒi. vel ʒi. propinquet; nobile & expertum est remedium: vid. HELMONTIUS *Tr. Pract. Medicinæ. §. 21.* Et usum hujus Linlei expertus est desideratissimus noster Præceptor, D. MICHAELIS, felicissimo sepius cum successu. Commendat & hunc sanguinem SCHMUCK in *Theor. Secret. 10. Theor. 2. RHUMELIUS p. 415.* & HINDERERUS in *Medicina Militari.*

Juxta hunc sanguinem non minoris etiam est usus sanguis pavidi Agui, qui etiam prius perterrefactus, & in articulo mortis constitutus, juguletur, & sanguis dicto modo calcigatur, & usurpatur. Multum in recessu habet, & loco infamis leporini convenientior à quibulum subsiditibus & sic enim pavore, ejusque idea sigillat sanguinem rocam, ratione cujus remedium est ad Dysenteriam. Usurpatur igitur Pulvis talis sanguinis, tam leporini, quam agni, à ʒi. ad ʒi. imprimis in succo vel Syrupu Cydoniarum; cui si addere velimus vel Mumiam, vel aliquid simul de Lapide Hæmatite, perinde est. De sanguine agnino vid. etiam RHUMELIUS in *Barb. Hyem. p. 415.* item MINDERERUS in *elegantia sua Medicina Militari.* Porro inter specifica dicitur Hepar Serpentum & Viperaurum rusc exsiccatum & pulverisatum etiam nobile est Specificum, & primum fere locum meretur in omni Dysenteria, seu Communi benigna, seu

Epi-

Epidemia maligna: vid. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 127. pag. 309. Dofis ʒʒ. gr. xv. ad ʒi. vel solum, vel cum Crystallo mixtum, quæ Bili porraceæ, & Dyfenteriz Antidotus prædicatur à LANGIO in Epist. 1. & experimento comprobatur ab HEER in epistodi Observations de Cholera. D. MICHAELIS in frequentissimo simul ac expertissimo & felicissimo fuit usu, cum communicatum fuit à D. ELLENBERGIO, Medico Hellenfi, qui satelliti Principis Fluxu desperato laboranti in haustu Vini rubri propinavit, tam felici successu, ut intra horam fuerit suppreffus Fluxus c. ʒ.

ʒʒ. Pulv. Hepat. Viper. ʒʒ.
Crystall. præp. vel Corall. rub. præp. ʒi.
Laud. opiat. form. ʒi.

M. pro duabus doſibus: S.
Pulvis Adstringens.

ʒʒ. Pulv. Hepat. Viper. ʒi. ad ii.
Extr. Termentill. ʒi. ad ʒʒ.
Laud. opiat. gr. ij. vel Laud. hyſſar. gr. ix.
Olei deſſillat. Mac. gutt. ij.

M. pro duabus doſibus: S.
Pulvis Comſortans.

ʒʒ. Extr. Termentill. gr. xxiv.
Hepat. Viperar. ʒi.
Lapill. Cancer. præp. ʒi.

Laud. hyſſaric. ʒi. lx.
Olei deſſillat. Cinnam. gutt. ij.

Miſce divid. in duas partes æquales; S. ut antea.

ʒʒ. Pulv. Friapi Cris ʒʒ.
Hepat. Viper. ʒʒ.

Corall. rub. præp. ʒi.
Laudaa. opiat. gr. v.
Olei deſſillat. Cinnam. gutt. iv.

M. pro 6. doſibus. S. ut antea.

Anno 1669. cum acerbiffimæ hic graſſarentur Dyfenteriaz Epidemice, hoc Pulvere felici cum ſuccellu graviffimam curavi Dyfenteriam:

ʒʒ. Pulv. Hepat. Viper. (vel Serpent.) exſicc. gr. xv.
Crystall. præp. ʒʒ.

M. ſat Pulvis:

Detur in triplo.

Prima doſis aſſumebatur mane, ſecunda à meridie hara regia vel quinta; tertia doſis poſt mediam noctem. Certè miratus ſum efficaciam horus Pulveris, quam nunquam credidiſſem. Vehiculum erat ſequens:

ʒʒ. Aqu. Termentill. ʒi. vel iii.
Cinnam. cum Vin. vel cydoniaz ʒvi. vel ʒi.
Spiritus Theriacal. camphorat. ʒi. vel iii.
Syr. de Symplicio Parnal. ʒʒ. vel ʒi.

M. tam pro vehiculo diſſertam Pulverem, quam etiam cohibeam uſurpando.

ʒʒ. Aqu. Plantagin. ʒi.
Mentha ʒi.
Cinnam. ʒi.

Syr. Diacod. ʒi.

M. D. S.
Potiuncula Comſortativa.

ʒʒ. Troch. de Corall. ʒi.
Hepat. Viperar. ʒi.

M. L. Pulvis.

Divide in 2. partes æquales: S.
Pulvis Comſortans.

Capiatur in dicto Vehiculo.

WEDELIUS ſelleam Veleham ante Hepatis exſecutionem ſeparari jubet, hic enim ſtimulandi vim habet: unde & io Partu diſſili Bili Viperarum adhibetur non ſine ſuſſa, uti cum HELMONTIO idem aſſerit. Interdum etiam addebam Terram ſigillatam, & Oſa bovina an. ʒi. felici cum ſuccellu. Præſcribendam Crystallum præparatam, ut abſorbere t, & imbibere, ſicque temperare acidum; inferuiſſem ſpeciatim Bili porraceæ vel æroginoſe corrigendæ, unde ſpeciatim eſt Crystallum io Cholera, à Bile porracea orta: Hepata verò præſcripi ratione malignitatis, ob quam ſelicem uſum ingreditur Pulverem Antidyſentericum D. Michaelis, qui eſt talis:

ʒʒ. Hemat. præp. ʒi.
Cruen cer. cum Antimoine aſſi.
Gucci Martis adſtring.

Mag. Corall. cum ſucco Ciperi an. ʒʒ.

Pulv. Hepat. Serpent. vel Viper. ʒi.

M. L. Pulvis.

Boſi à ʒʒ. ad ʒi. uſurpatur feliciter. Conf. HOFFMAN. Ni Clavis p. 104.

Præter Hepata Viperarum ſunt, qui inguſcit etiam commendat Hepata Ranarum viridum, qui Pulvis ſimili uſu dicitur fuiſſe ſeruatim Paracelli Antidyſentericum, de quo ſi bdes penes Auctorem.

Non ignotum eſt etiam, quid à multis commendetur Pomum excavatum, cum Cera & Gummi Arabico repletum, aſſatum, & comedum tanquam ſpeciatum Antidyſentericum. Laudatur admodum tale Pomum ab HARTMANNO in Pr. Chymicæ. p. 196. uti etiam ab HORSTIO l. 4. obſerv. 20. item in Problem. p. 70. Dier. 60. Quæſt. 5. Sanè AMATUS LUSITANUS in l. 6. Corat. 12. multiplici Cera uſu curatam Dyſenteriam obſervat. Loco Pomii communis melius eſt, ſi uſurpetur Pomum Cotonæum maturum, utpoſe cum hoc noo fit inſelegas contra Dyſenteriam ſedum: Auctor eſt VALLERIOLA l. 8. ſeſ. 4. Præſcripiſi aliquando experimenti gratia:

ʒʒ. Gum. Arab. ʒi.
Maliſic ʒi.

Pulverifiſſat adde

Laud. opiat. gr. ij.

Hic Pulvis Pomu excavatum indebatur ac aſſabatur, & totus comedebatur, erat elus io ſapore adſtringentiſſimus: ſed non vidi adeo magnum effectum, utut aſſo fit contentandum remedium.

Quo etiam pertinet Pulvis Dyſentericæ Cratidis ex Gummi Arabico, Corallis, & Tragacantha.

Porr Stercus Canis ſeu Album Græcum vulgò commendatur, & admodum expertum eſt remedium pro pauperculis, ſpeciatim ſi Canis per ſex dies nocteſque prebò Obſibus fuerit nutritus: nam ſuperius commendavi Oſa. Doſis eſt à ʒʒ. ad ʒi. addito paucò Saccharo in vehiculo Laſis capilli, vel ſimplicia vel chalybeati. Nam hoc ſtercus, vult licet, revera tamen non ignobilè & ſingularè eſt experimentum in Dyſenteria, & omnibus Hæmorrhagiis, etiam deſperatis. Sanè FRANCISCUS JOEL in ſua Praſi de Dyſenteria, & FORESTUS, uti etiam MINDERERUS in Medic. Militari, idem multis nominibus commendat. Sic ruſſicam Muherem quæ ultra 4. ſeptimanas gravi Uteri Fluxu laboraverat, mediatæ hoc ſtercoris ſeliciffimè curavi.

Ungula equina, ſeu iſtud Cornu molliſſimum, quod ex Ungulis equinis exiſtindit, quando ſerramentis applicatur, exſiccata, & pulverifiata, ad ʒi. frequenter propinata, optimè eſt remedium ab EURERO ad Dyſenteriam commendatiſſimum; quam Ungulam caballinam in Butyro vel Piogurdine toſtam, & quidem ex Equo, ſtendem ſpeciatim laudat HELMONTIUS Tract. Pylor. Actiſ. ʒ. 22. item Tract. Inſura Alſia Regim. ʒ. 41. Videti etiam poſſet LANGIUS Comment. in Fabrum, qui & ipſe adſipulatur HELMONTIO, equine aſſerta approbat. Curat etiam Epilepſiam, ſed cautela hæc obſervetur, ut Ungula colleſta ſit ex Equo quæ non ſcivici; alia plurimum oboli, quam prodeſt. Satyrion multa attribuit in hoc morbo, idque imprimis, qui PARACELSI terant velligia, qui inſinguler illius Radicem commendat in quamplurimis morbis. Duæ vel tres Radices Potui inſuſite, & ita potatæ ſingulariter commendantur contra Dyſenteriam, unde & Radix Satyrionis à multis admodum laudatur.

Aqua ſuborta, ſive Aqua in qua ſuber bullierit, pro Potu ordinario, item Pulvis ſubers combuſti. Acanthum dicitur contra Dyſenteriam, expertum à BORELLO Cent. 8. obſ. 43. & 57. & à RIVERO in l. 4. obſerv. 57. Quidam etiam commendat inguſcit Jelos Juglandis, tempore vernarum in Mayo arboribus adſcendentes, qui ſereno cœle collecti, ſiccati & pulverifiati, & ad ʒi. in Aquæ appropriatis propinati, à multis commendantur. Hæc pertinet Termentillæ, quæque Pulvis & Extrahum; Rob item ſicco tormen-talis, & horum deſecta ſuſu accuſantur: cou ex Diarrhæa cognus præſuppono. Unicoræ ſedio, Terra Vitrioli dulcis, ex Vitriolo Martiali ſaltem deſumpta, quibulvis Martulibus longè præſertenda: quæ Martialia ſuavæ quidem, ubi ab Acido ſpecialiter originem trahit Dyſenteria, malumque eſt levis, quia Acidum ſaturat; in reliquis autem caſibus, Dyſenteria nempe Coſtagiæ, aut Maligna, vel Epidemica, minus probus viſentur. Sulphar, bupique Flores ſunt præſtaſes. Liſum Faxini iſto tempore collectum, ad ʒi. pulveretentus in Vino calido adhibutum, ſingularè eſt ſpeciatum in Dyſenteria.

Tandem Alumen inter alia quamplurima etiam laudatur ad Dysenteriam: & quidam tantummodo recipiunt tria Aluminis fructula magnitudinis Pili, propinquant in Vino rubro calido, & precioso dicitur esse Arcanum, Alii, quod magis approbo.

Alum. crad. 3℔.

Cinnam. 3℔.

Redigunt in formam Pulveris, & ita in Vino rubro, doſi ʒi. propinquant.

Sicut etiam Aluminis aliquot grana aliis Pulveribus mixta sunt optima (B).

Hæc sũt sunt specifica.

Progredimur ad ea, quæ communiter & generaliter ad Dysenteriam usurpantur solent, & pleraque Simplicia Symplicia, Adstringentia, & acidum Absorbentia, & Pinguis illud obducenda, ac alias in Diarrhoea, Cholera & Vomitu usitata, item quælibet Vulneraria magis usitata sunt, ven. gr. Plantago, Portulaca, Tormentilla, Pimpinella, Galbanula, Perfoliata, Hedera terrestris, Concommodium, Lychnachis, Portentilla, Folia Quercus, Millesfolium, Barba pastoris: Radix Tormentillæ, Plantaginis, Nymphaeæ, Filipendula, Consolida majoris, Paeonia, Bistorta, Eula, Flores Rosarum rubrarum, Balsamium, Juli corallini, Flores Papaveris rhæadæ, Bellidii, Hypocistis, Cymæ Quercus (NB. in Quercu singularia insistant contra hunc morbum): Semina Plantaginis, Acetosa, Portulacæ, Nalturii, Aquilegiæ, Perfoliatæ, Papaveris albi, dcc. STOEKERUS in *ſua Praxis* tanquam expectum commendat Semen Papaveris contutum, cum vitello Ovi, & fruxum in cineribus, Mala Cydonia, Meſpila, Sorba, Myrtilli, spongia Cyprobatii (cujus alias 3℔. commendatur ad quævisque Hamorrhagias) Nas Moschata dcc.: hinc omnes distorum simplicium Succo, Syrupi, Extracta, Succus plantaginis, & Hedera terrestris quæ singulares laudantur. In fine Dysenteria valde confecti succus Abſinthii, & Mentha depravata, ac Saccharo in Syrupum redacta: habet enim Mentha cum Abſinthio mixta miram viam corroborandi Ventriculum.

Aqua Barba pastoris, Cinnamomi, Quercus dcc. commendatur specifice ab HORSTIO, ab aliis Aqua Tormentillæ, Plantaginis, Cinnamomi cydoniata, Syrupus de Rosa ficis, Myrtinus, Plantaginis, Portulacæ, Cydoniorum, Coralliorum Quercus, de Symphyto Perfoliati, Papaveris: imo & Dysenteria à multo Fructum usu contingit, in ipſo principio valde laudat Iſyrupum de Abſinthio cum Aqua Cinnamomi, vel Theriacali RIVERRIUS in *Praxi*, ubi de Dysenteria. Melius utique Decoctum.

Præ cæteris convenit Lac crebris usurpatum, in principio ferocissimum, e.g. Caprillum abstergendi fine, in progressu Lac Barbium consolidandi & glutinandi fine: hinc & ex Lacte parata remedia frequenter à quibusdam in Dysenteria laudantur, quia temperant humores acris, irritacionem Intestinarum cessant, & quibusdam additis, simul adstringunt: Lac Amygdalarum dulcium, & Seminum, sive Emulſio cum Aqua chalybeata parata, ut oleositas omne obtundat acidum: item Lac chalybeatum, tam medicamenti quàm alimentii vires sustinet. De jejuno ejus usu vid. HOLTERHOFF *loc. cit.* p. 39; item quomodo in mem. consulationis corrigendum, & ne vitiose concretet, precavendum? videtur *Pharus Medicor.* BONETI ex BALLONIO pag. 426. nempe in specie chalybeandum.

Eo præstiosius evadit Lac, si Appropriata in eo decoquantur: nempe Lac chalybeatum, in quo Radix Symphyti majoris decoquatur, de quo bonus haustus calidè propinquetur argro ter in die, quod, ut supra dixi, singulare est specificum.

Vel

3℔. Lact. rec. in quo quinquies vel sexies mergatur

Ferrum ignatum Meuf.

Hinc incoquantur

Rad. Symph. major.

Tormentill. an. ʒi.

ad tertiam partem consumpſionem.

D. S. Lac sanans.

De Colatura ter in die propinquetur bonus haustus.

Vel

3℔. Raf. Præpi Corvi 3℔.

Rad. Tormentill. 3℔.

Coqu. in Lactis ʒi.

Colatura mīc. cum pauco Saccharo,

D. S.

Lac adstringens.

Sed NB. abſt. febris.

Si ipsum Lac solitarium videatur incommodum, dimidio Aquæ, vel communis vel caſidum appropriatæ, diluatur, invicem ebulliant, & ita crebris propinquent. Convenit itidem Decoctum Oryzæ in Lacte cum vitellis Ovorum & succo Hedera terrestris. Mirè prodèſt tale Lac in Dysenteria quibuscumque, & eo efficacior erit hic potus, si singula haustibus addatur 3℔. Scortæ canini, & exprimat (C).

Præterea Effluvia & Sympſi Symphyti majoris, Effluvia Vulneraria compoſitæ, Extractum Theriacale, Tormentillæ, &c. usurpantur, quæ Extracta cum Laudano apitata dant elegantes Pilulas molles: item Spiritus Theriacalis compoſitæ, Tinctura Corallorum salſificata, Tinctura sulphuris Vitrioli, Liqueſcens ex Terra figillata cum Spiritu Nitri, à BARTHOLETO Liqueſcens Auræ dictas, Tinctura Hamatilis, & Theriacalia quæcumque, item Mixtura simplex in principio Dysenteria Malignæ.

Præter dicta etiam Terræ Mineralis conveniunt, ut Terra figillata, Offa humana calcinata, Terra Vitrioli dulcis, i.e. quæ per crebrisque loſionem dulcis reddita, & loco omnium Crocorum Martis adstringentium esse potest, ex cujus 3℔. ter propinata FABER Cur. 12. p. 124. Puerum curavit. Hinc AGRICOLA hunc commendat Solum:

3℔. Terra Virid. dulc. 3℔.

Off. Microſm. calc. gr. xij.

Theriac. 3℔.

M. pro Bola.

Vel

3℔. Theriac. 3℔. ad 3℔.

Terr. figillat.

Vitrioli dulc. an. gr. xv.

Off. Microſm. prop. gr. xij.

M. f. Bola: S.

Bolus Adstringens per una doſi.

Vel

3℔. Theriac. Andr. 3℔.

Homat. prop. ʒi.

Off. Microſm. prop. gr. xv.

Sacchar. Saturni gr. vi.

M. f. Bola: S. ut antea.

Vel

3℔. Rak. Serbi torm. 3℔.

Encard. Martiæ. gr. xv.

Terr. Vir. dulc. gr. vi.

Laud. apic. gr. s. vel ʒi.

M. f. Bola: S. ut antea.

Item Bolus Armena, Anrimonium diaphoreticum, Myrrha, (est balsamica & elegans, imprimis ejus Effluvia) sulphur & Flores sulphuris, Sacrum (hoc est singulare) sunt egregia, imprimis Lapilli Cancerorum præparati, Umbilicus marinus præparatus, Trochisci de Terra figillata, & de Carabe ad dr. i. insigniter conferunt, non tantum in Dysenteria, sed etiam in putu sanguinis: E. g.

3℔. Aq. Plantag. ʒi. vel ʒiij.

Cinnam. 3℔. vel ʒvi.

Aust. rufæci, vel Aust. doſi ʒiij. vel 3℔. ad 3℔.

Fl. Dianth. Præpi ʒi. ad ʒiij.

Troch. de Carabe. vel de Terr. figillat. an. 3℔.

Lapill. Canc. prop. ʒiij.

Antimon. diaph. ʒi.

Syrup. Myrrin. ʒvi. vel ʒi.

M. f. Bola: S.

Pocin Adstringens.

Modus hic per Mixturam præſcribendi est Sylvianus.

Vel

3℔. Aq. Plantag.

Par-

(B) Quod vulgo circumſertur adſerſus Dysenteriam, reliquique affeſus, in quibus valida adſtriſſione quæ est, ſpecificum Helvetii, ex Alumen cum Sanguis Draconis iſſe conſtituit. Dn. tamen Proment illud aſſiſt. radice Peruviana, ſer uſſe quam Ypecacuanha in colle appellatur. De hac autem commodè eris dicendi locuſ: pag. 4. tomæ de Materia medica ſer monem habebimus.

(C) Pra Lactis ex ſiſa quæ uſtrates est Lactis poſui Serum ad ʒiij. & ultra quæcumque poſt affluſum Bolum ex Tamarindis, vel Conſerva Roſarum incompletaſum, cum Rhubarbo iſſo: potui remedium ad in affeſis præſertim Dysenteria, ac jejuniſt. adſerſus enim vi ſeri diluatur Saltem Intestina extenuantem acris, ac febris affeſi ſacili negotio remittitur.

Portulac. an. ʒiſs.
Cinnam. ʒvj.
Astr. refat. ʒſs.
Trach. de Carab. ʒi.
Corn. Cerv. aſſi prop. ʒij.
Sacchar. Saturat. ʒi.
ʒyr. Myrrin. ʒvi. vel ʒi.
M. D. S.
Mistura Adstringens confortativa,
Vel

ʒ. Aqu. Plantag. ʒij.
Cinnam.
Astr. refat. an. ʒvj.
El. Diaſcord. Frac. ʒi.
Terra ſigill. ʒſs.
Sacch. Saturat. ʒi.
Laud. opiat. gr. ij.
ʒyr. Myrrin. ʒſs.

M. f. Potio: S.
Potio Adstringens;
Vel

ʒ. Aqu. Plantag. ʒij.
Spiritus Theriacal. camphor. ʒij.
Extract. Tormentill. ʒſs.
Corall. rub. prop. ʒi. ad ʒij.
Terra Virg. dale. gr. xv. ad ʒi.
(vel loco horum)
Trach. de Carabo ʒiſs.)
Laud. opiat. gr. ij.
ʒyr. Myrrin. ʒi.

M. f. Potio: S. ut antea.
Vel

ʒ. Aqu. Mentha.
Plantag.
Tormentill. an. ʒi.
Cinnam. ʒvj.
Trach. de Carab. ʒi.
Corn. human. ſine aqua ʒij.
Laud. opiat. gr. vj.
ʒyr. de Symp. Fern. ʒi.
M. f. Potio: S. ut antea.
Vel

ʒ. Aqu. Plantag. ʒij.
Cinnam. ʒvj.
El. Diaſcord. Frac. ʒiſs.
Theriac. Andr. ʒi.
Terra Virg. dale. ʒſs.
Laud. opiat. gr. ij.
ʒyr. Myrrin. ʒi.
M. f. Potio: S. ut antea.
Vel

ʒ. Aqu. Plantagin. ʒij.
Tenell. Corn. Cerv. ʒi.
Astr. defill. vel ſimpl. ʒvj.
El. Diaſcord. Frac. ʒiſs.
Antimonii diaphor. ʒſs.
ʒyr. Cydonior. ʒi.

M. f. Potio pro tribus doſibus: S.
Mistura Adstringens Confortativa pro tribus doſibus.
Vel

ʒ. Aqu. Plantag.
Eard. an. ʒiſs.
Astr. Vini vel refat. ʒij. ʒſs. ad ʒiſs.
El. Diaſcord. Frac. ʒi. ad ʒiſs.
Corall. rub. prop. ʒi.
Extract. Tormentill. ʒſs.
ʒyr. Cydon. arom. ʒſs.
M. f. Potio: S.

Potio Adstringens.

ʒ. Aqu. Plantagin. ʒij.
Cinnam. ſpirituſ. ʒij.
Astr. Vini ʒſs.
El. Diaſcord. Frac. ʒiſs.
Corn. Cerv. aſſi prop.
Extract. Tormentill. an. ʒi.
Laud. opiat. gr. ij.
ʒyr. Cydon. ʒi.
M. S. ut antea.
Vel

ʒ. Aqu. Plantagin. ʒij.
Mentha. ʒiſs.
Cinnam.
Astr. Vini an. ʒſs.

El. Diaſcord. Frac. ʒij.
Corall. rub. prop. ʒi. ad ʒi.
Extract. Tormentill. ʒſs.
ʒyr. Plantag. ʒſs.

M. D. S.

Potio Confortans ad quietem. Vel

ʒ. Aqu. Mentha ʒij.
Serpill. ʒi.

El. Diaſcord. Frac. ʒiſs.
Terra ſigillat.
Corn. Cerv. aſſi prop. an. gr. xv.
Puls. Hepat. Viperar. ʒſs.
ʒyr. Cydonior. ʒſs.

M. f. Potio pro tribus doſibus: S. ut antea.
Hic in Dysenteria cum copioſa ſanguinis reſeſione per infe-
riora, nitra biennium durante, ab aſſu Potuiſis Purgantia
blanda ex Gummi Ammoniac in Aceto ſoluto, cum Scam-
monio ſulphurato, & Extracto Trochilicorum Albandal;
(que tamen in Virgine delicata cachectica, cui non ritè ſue-
bant Menſes, cum tumore Abdominis flatulento, nato ex
mucro acido-ſciſido, ultra 15. imò 18. ſeculis procuravit),
proſuit hæc Miſtura, cum opima Specifica incaſſum adhi-
buerat:

ʒ. Aqu. Plantagin. ʒij.
Cinnam. ʒſs. vel ʒvj.
El. Diaſcord. Frac. ʒi.
Trach. de Carabo ʒſs. ad ʒij.
Nemat. prop. ʒi. ad ʒi.
Antimonii diaphor. gr. xij.
ʒyr. Card. bened. vel Plantag. ʒſs.

M. pro Potuiſis.

Que Miſtura coſtictam ſumpta omnia ſecata reddidit.
Hæbit quoque agnatum Malicetum, 17. annorum natum,
texturæ aliis delicatæ, & fermenti digeſſivi ſtomachici a-
deo teneri, ut etiam blandiora quoque remedia, tam al-
terantia quàm laxantia, eandem graviter affecerunt. Præ-
terea hæc Scorbuto hereditario affecta, & Hyſtericis paſſio-
nibus obnoxia, Tuſſum ſtomachalem patiebatur, ex acido
ſciſido ſtomachi abortum: pro qua curanda præſcripiſi,
præmiſſis præmiſſendis, hæc Pillulas:

ʒ. Gum. Ammoniacin Aceto ſol. ʒſs.
Aliaſ laſ. gr. iij.
Extract. Trach. Alband. gr. ſſ.
Laud. hyſſer. gr. v.
M. l. Pillula.

Cepit hæc veſperi ante cenam, mane aliquoties cavavit,
ſemelque vomuit, & ſana redditæ ſuit. Hinc interjeſſis ali-
quot menſibus Tuſſis rediit, unde eaſdem Pillulas iterum
præſcripiſi, quibus aſſumptis in copioſiſſimos Vomitus,
Hypercathartics eructus cum Tenſimo, ex quibus hinc vires
proſternebantur, in paſſionemque Hyſtericam incide: in quo
caſu inter alia remedia hunc Pulverem proficuam experta
eſt:

ʒ. Corall. rub. prop.
Corn. Cerv. aſſi prop.
Antimonii diaphor.
Terra ſigill. an. gr. vj.
Laud. hyſſer. (cujus ordinaria doſis aliis fuit
gr. vi. in ſubſpecto vero delicato dedi)
gr. iv.

M. f. Pulvis.

Hunc Pulverem aliquoties deglutivit non ſine ſuccellu,
Paſſioni verò Hyſtericæ ſatiſfecit Elitix Uteriſimo D. ad-
hibita, ſicut Tenſimo Seculi ex Floribus Verbaci
& Chamomillæ in Lactæ bullitis, ut & Clyſma ex Lactæ ſim-
plici, addito tamen pauco Sacchari: quibus adhibitis reſtitu-
ta eſt ſanctiter.

In ſorma Pulveris aliis ſequentes etiam mihi familiares
ſunt.

ʒ. Trach. de Carabo ʒi.
Puls. Hepat. Viperar. ʒi.
Laud. opiat. gr. ij.
M. f. Pulvis pro duabus doſ. S.

Pulvis Adstringens.

Quibus addi etiam poſſunt Otri defill. Cinnam. gutt. ij.

Vel
ʒ. Trach. de Carabo ʒi.
Puls. Sulphuris ʒij.
Laud. opiat. gr. ij.
M. pro duabus doſibus: S. ut antea.
Vel
ʒ. Puls. Sulphuris ʒſs.
Briard. Martial. gr. xv.

Tor-

Terp. scill. gr. xii.
M. f. Pulvis pro dosi: S. ut anteq.
Vel

¶ *Terra scillat.*
Flor. Sulphuris an. 3℔.
Antimonii diaphor. Martial. gr. xvi.
Vitrioli Martis ad albedin. calc. gr. viii.
M. pro duabus dosibus: S. ut anteq.
Vel

¶ *Cornu Cerv. præpar. 3℔. ad 3℔.*
Land. hysser. gr. v.
M. f. Pulvis: S. ut anteq.
Vel

¶ *Cornu Cerv. præpar. 3℔. gr. xv.*
Bezoard. Martial. 3℔.
Land. hysser. gr. v.
Olei dissil. Cinnam. vel Martis gutt. i. vel ii.
M. f. Pulvis: S. ut anteq.

Propinquat in vehiculo calido: conuenit in fluxu.

¶ *Extr. Tormentill. 3℔.*
Terra scillat. gr. xvi.
Cornu Cerv. præpar. 3℔.
Land. opiat. gr. ii.
M. f. Pulvis.

Divide in 2. partes æquales: &
Pulveres Adstringentes.

¶ *Extr. Tormentill.*
Corn. Cerv. præpar. an. 3℔. ad gr. xii.
Uvic. scill. gr. v.
Land. opiat. gr. i.
Olei dissil. Martis gutt. i.
M. D. S.

Pulvis Confortativus Adstringens.

¶ *Extr. Tormentill. 3℔.*
Corn. Cerv. præpar.
Lupul. Cancr. præpar.
Land. hysser. an. gr. v.
Olei dissil. Cinnam. gott. i.
M. S. ut anteq.

Sic etiam Crocus Martis adstringens à 3℔. ad 3℔. & hinc Rubrica fabrilis; quæ multum de Marte participat, continent: Pulvis Bezoardicus *Senneri* cum aliis compositis in Malignis: Pulvis Saxonicus adstringens Bezoardicus, Thus, Myrrha, Gummi Arabicum, Putamina Ovorum anferiorum, Ossa bovina, Ebur, Maxilla Lulci piscis, Dens Hippopotami, Ostepiaz, Talus porcinus calcinatus, qui commendatur à BARTHOLOIN *Cum. 5. hñ. 97.* & Saccharum Saturni, quod nobile est remedium, & vobis (NB.) sic commendatur: plus in recessu habet in gravissimis Tormentibus, temperando specificè & corrigendo saporem dysentericam, à 3℔. ad gr. xv. cum aliis Mineralibus usurpatur; unde etiam, cum hoc Saccharo Saturni præparatur Tinctura Antiphilica, quæ est elegans in Exulcerationibus interna quibuscunque. Pertinet etiam huc *Michaeli Li-* quor Sypticus, & Tinctura illa Martis adstringens, ea Terra sic dicta Solari, cum Spiritu Salis paratus: Conf. HOFFMANNI *Cleu. Sched. pag. 133.*

Hic & additur Theriaca, Mithridatium, Electuarium Discordii *Fraserii*, Laudanum opiatum, & similia nota.

(D) Qui præservantibus gratia aliquod postulat.

¶ *Theriac. Andr. 3℔.*
Raf. Priapi Cui 3℔.
Pulv. Rad. Tormentill. 3℔.
Extr. opiat.
Uvic. scill. an. 3℔.
Antimonii diaphor. 3℔.
Land. opiat. ferment. gr. xv.

Cum C. q. Sacri Cydon. f. *Electuarium.* D. S.
Electuarium Præservativum.

¶ *El. Discordii Frac. 3℔.*
Raf. Priapi Cui, vel Cervi 3℔.
Trach. de Carabe 3℔.
Tom. II.

Flor. Sulphuris 3℔.

Cum Sacro Cydoniarum f. *Electuarium:* S. ut anteq.
De quo capiat æger mane, à meridie, & sub introitu lecti pro lubitu.

¶ *El. Diacordii Frac. 3℔.*
Raf. Priapi Cui 3℔.
Antimonii diaphor. 3℔.

Cum Sacro Cydoniar. f. *Electuarium:*
D. S. ut anteq.

De quo mane quantitate Castaneæ præservativè, curativè autem in die.

Quod si vel in principio vel in declinatione Dysentericæ Benignæ Laxativa pro primis viis abstergendis usurpanda veniant, cautè hoc fiat, quandoquidem ii, qui in Dysenteria statim eunt ad Purgantia, non curant, sed omnia deteriora faciunt; qui verò prius sibi sunt Spirituum impetum, ac Tormenta sufflaminant, optime curant, dicit LINDANUS. Quando igitur ad incipientem Dysenteriam quis venit, dato Anodym, & hinc conciliato Somno, eundem est ad Purgationem, & blandè saltem citanda letellina, vel in principio detur blandum Laxans, mistum cum Opio, vel præmissa Laxativo mox subyungatur Opium. Inter Purgantia sufficit Aloë, vel usurpatur imprimis Rhabarbarum, quod tutum est, nunc crudum, nunc leviter tostum, ut parvis volatilibus exhalantibus reliquis substantia interea styptica minus laeset; & hinc Myrobolani: nam præter vim laxativam simul vim anodynam Rhabarbarum tribuit HOLDE-ROFF l. c. nunc solum usurpatur, nunc cum Laudano opiato; hinc v. g.

¶ *Cornu Cerv. vel El. Diacord. Frac. 3℔. ad 3℔.*
Rhabar. opt. pulveris. 3℔. ad 3℔.
Land. opiat. gr. i. vel ii.

Cum Syr. Cydon. vel de *Raf. sac. M. f. Bals.*
Detur in duplo: S.

Bolus Absterrens pro una vice.

Uti possunt velpeii, & si opus est repetatur mane; si enim prima vice non sufficienter abstergit, reiteretur. Vel

¶ *Conf. Rafar. antiqua 3℔. vel 3℔. ad 3℔.*
Pulv. Rhabarb. 3℔. vel 3℔. ad 3℔. vel 3℔. 3℔.
Landan. opiat. gr. i.
Syr. de Raf. q. f.

M. f. Bals: S. ut anteq. Vel

¶ *Pulv. Rafar. 3℔.*
Pulv. Rhabarb. el. 3℔. ad 3℔.
Landan. opiat. gr. i.

M. f. Bals: S. ut anteq.

¶ *Agu. Plantagin. 3℔.*
Cinnam. 3℔.
Pulv. Rhabarb. el. 3℔. ad 3℔.
Land. opiat. gr. i.
Syr. Myrobol. 3℔.

M. S.

Potio Laxativa bene circummagitanda.

¶ *Rhabarb. el. 3℔.*
Flor. Rafar. rub. p. q.

Infunde in C. q. *Seri Lactis:*
Colatura 3℔. vel iii. adde
Syr. de Raf. f. 3℔. ad 3℔.

M. S.

Potio Laxativa.

¶ *Agu. Plantagin. 3℔.*
Pulv. Rhabarb. 3℔.
Land. opiat. gr. i.
Cum Syr. Myrobol. vel Cydon. q. f.

M. D. S. ut anteq.

Laxantia talia commodè mane propinantur: Somnifera verò seu Opia tutius & consultius sub noctem dantur, quia raro de die agunt, sed vero felicius ægri dormiunt; ad hæc circa noctem ordinariè exasperatur Dysenteria, & sic interdum, ut Dysenteria correpti patientur dolorem gravitatem obtusum & compressivum sub Umbilico, quæ materia ibidem inane hæret, unde facili oriri suspicio possit, quasi pathema hoc oriretur ex suppressis per Opia fec-

(D) Huc referendum est Electuarium Antidysentericum, jussu Annæ Anglorum Reginae à Regis Medicis compositum, æque à Dom. Leccan publici juris factum, cujus Formulam, pro integri exercitii usus concinnatam, integram dæmus. ¶ *Dia-* concord. Frac. 3℔. Cachu, Ros. rubr. Terebint. Ven. Cinnam. an. 3℔. Cornu Cervi ussi, Rad. Tormentillæ, & Cretæ. an. 3℔. Acacie Germ. Bol. Armen. an. 3℔. Croci Mart. adstring. & Coral. rubr. an. 3℔. Gummi Arab. 3℔. Pulverisetur pulverisanda, & cum C. q. Syr. Ros. sic. f. Electuarium. Dosis 3℔. cui addi possant Mer- cur. dulc. gr. v.

cessibus, quod tamen non est; quin potius ex contagio spatio Intestinum, in quodam loco perniciosa vellicitorum, originem ducit; unde externè Lenientia, item Lator calefactus Abdomini applicatus molestissimum istum dolorem compressivum & gravativum in Abdomine sistunt.

Si *Dysenteria Maligna*; ostentenda Lavativa, & tunc in principio, nunc sub exitu morbi, Sudorifica usurpanda veniant, Speciebus juncta: e.g.

℞. Coru. Ceru. flos ignis gr. ℥ss.

Antimonii diaph. ℥ss.

Sal. vol. Sopor. gr. v.

Laudani opus. ror. par. gr. j.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Adstringens.

Vel

℞. Coru. Ceru. flos ignis gr. xviij. ad ℥ss.

Terra sigill. ℥j.

Sal. vol. Coru. Ceru. vel Extrall. Theriac. gr. vj.

M. pro duabus dosibus. S. ut anteq.

Vel

℞. Pulv. Bezoard. Laud. ℥j.

Corall. rob. prop. vel Antimonii diaph. ℥ss.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Adstringens singularis.

Vel acui potest *Sal volatile*, aut *Spiritus*, antequam *Extrall. Termentilla*,

Vel

℞. Tsa. Cran. ham.

Bezoard. Minor. vel Solar. an. ℥ss.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Adstringens confortativus.

Qui olim etiam usitatus erat D. LANGIO.

Vel

℞. Agu. Mentha. ℥j.

Spiritus Theriac. anaph. ℥ss. ad ℥ss. (in omol-

bus Alvi Fluxibus potest)

Antimonii diaphor. ℥ss.

Off. ham. calc. ℥ss.

Extr. thoracal. gr. v.

Syr. Card. bened. ℥ss.

M. f. Tera pro una vice: S.

Potio Adstringens confortativa.

Ubi nimia dissolutio Sanguinis adeit, Liquor Stypticus, & v. Aurum potabile *Barkholius*, et Terra sigillata & Spiritu Nitri convenit.

℞. Sola. Effus. Chinam. ℥ss. (nobile remedium)

Mentha. ℥ss.

M. D. S.

Constatum Tincturam 20. usque ad 25. guttas. Vir consensitens utatur, Dysenteria Epidemica ex Contagio occasione pavoris afflicta, cum per sex, vel septem dies saltem Diarrhoea simpliciter humoralis, quae incessive in Dysenteriam mutabatur, magis tamen Mucosam, nimis Cruentam, Albam commiserit dictam. Die Saturi vesperi vocatus praescripi:

℞. Agu. Storac.

Mench. an. ℥j.

Acet. vini. ℥j.

El. Diaphor. ℥ss.

Terra sigill. ℥ss.

M. pro duabus dosibus.

Sudavit, & melius habuit.

Die Solis admodum debilis, febrilis & anxius erat; & quociens Cerebrum bibere rasilium frigidissimum, aut Potiusculum haurire, torres incontinenti urgebat fecibus. Verum ad Jukula calida, vel Hamulum calidum non item; non fecus atque dum probe tectus stragulis; & munus potibus, vel operculi Abdomini aut Pedibus admotis probè calentes, & consequenter nonnulli sudores, toties angulum & anaxi-rates praecordiorum cessabant, & *stiduros*, dicebat, *homi fa habere*, nihil timere; simul vero atque vel lecto foreores, vel Pedes nudaret, subit anxietatis praecordialis, tum sensu molestus torminosus Abdominis, vel erioriori dyscho-nie afflictebatur; unde & calidè custodiendum & calidam Potum propinandum fusi per totum motus cursum, Hinc die Solis praescripi:

℞. Antimonii diaphor. Martial. ℥ss.

Terra sigill. gr. xv.

Ceru. Ceru. affi prop. ℥j.

M. pro duabus dosibus.

Quas vobiscum calidè Jussu gallinacei, vel Vini capiebat, & sic melius habebat; unde & pro sequente nocte adhuc unam

dosis capiendam morat. Sed utat Opus tam supra, quam sequentibus diebus simul propinaret, tamen paucissima, & minime talibus proportionibus liquebatur Sanguis; id quod ferè obtinet in Dysenteria; ut Opus in crebra & magna dosi ferè, quae, quam parco, vel nullo Somno, & minori virium postulatione, quam ex torminosis & feces-sibus patitur, aut Opus alia inferre solent, Ergo die Lunae praescripi:

℞. Raf. Priapi Ceru. ℥j.

Laud. opiat. gr. iij.

M. pro duabus dosibus.

Vesperi praescripi Potio sequens:

℞. Agu. Plantagin. ℥j.

Ginnam.

Spir. Theriac. camphor. an. ℥ss.

Acet. Vin. ℥ss.

El. Diaphor. ℥j.

Lupill. Gauc. prop.

Aquilon. diaphor. an. ℥ss.

M. f. Potio:

Capiebat pro Juhitu.

Die Martii praescripi:

℞. Ceru. Ceru. affi prop. ℥ss.

Mag. Corall. cum Sine Ciri ℥j.

Terra Viridi dale. ℥ss.

M. pro duabus dosibus.

Unam cepit mane, alteram circa mediam noctem in vehi-culo Cerebrum calida, Cumque probe condiret, vesperi verò Tinctura Bezoard. gurt. L. cepit, quam postea omni mane reperitam semper cum successu hoo propter Sudorem as-umpit, & quae evasit. Nam & alii huic malo tunc tempo-ris obnoxii in principio bis vel ter accepta hac Tinctura mediante Sudore facile evaserunt; sicut alii Effluvia The-riacalis anodyna D. Michalis ad 40. guttas optime consulit.

Die ergo Mercurii, Jovis, & Veneris eodem Tinctura Bezoardica mane capiebatur; & meride verò Mixtura ex Elecluario Duacordii. Sed cum nihilominus quiesce ter vel quater, etiam noctu torpidum visibus, patere adhuc fecibus mucosum cum panco somno, sine torminosis tamen nullo appetitu, sibi jam tamen moderata, judicavi haec morbi protrahendum jam saltem ex vitio Stomachi non divergentis eriri, Unde die Saturi jussu mane capiat Ori vitellum induratum cum Aceto rosacea, cujus usi optimè ha-bit: propterea vesperi bibarique ante coenam idem repetere jussi: Sub curia morbi ex parte pro coctendo Tenebro graviter urgente jussi capere Sircas columbinas; hoc cum Aceto calidè probe subigere; & tam Abdomini inferre, quam Pedici applicare, & si quid calidè renovare, cujus usu commodè habuit.

Quibus & similibus, tam generalibus, quam specificè legiti-mis Methodo usurpatis, non mitigatum fuerit malum, pro restituenda Intestinum nota ab Ulceribus Inducta, pro tercia indicatione in destinatione morbi conveniunt Potiones vulnerariae, quibus semper ablegatur & consolidat-ur Intestina, & purificetur Sanguis. Conveniunt etiam tunc Balsama Sulphurea, tam commune cum Oleo Terrebstrina, aut Oleo Anisi, aut Oleo Bezoard. purgari, aut Oleo Sacchari preparatum, quam Balsamum Sulphuris nobiliss, quod co-hibet descriptis POLEMANNUS Tr. de Sulphur. Philosphorum, qui videtur: Fit ex Sulphure aurato Antimonii, Potiones Vulnerariae possunt praescribi hoc modo ad imitationem SYL-VII. l. 2. c. 53. §. 37.

℞. Hydor. terrefr. M. i. vel li.

Alchimill. 160 Pyrola.

Plantag. an. M. i. vel M. ss.

Sammis. Hyperic. ferens. M. i.

Raf. Ceru. Ceru. ℥ss. vel ℥ss.

Coque in q. Agu. simplis.

Colatura fil. ℥ss. vel ℥ss.

Syrac. corall. Rosacet.

& Symp. Ferul. vel Sydenh. an. ℥j.

M. pro Potio.

De qua bis vel ter argut quotidie bennu haustum capiat

qualibet vice viij. vel x. ad 25. guttas Balsami Sulphu-

ris terrebstrini, vel anisi simul assumendum.

Item Balsamum Peruvianum preter hoc, quod Vomitu in Dysenteria molestum supprimit, etiam Intestina lara ad ℥ss. anod. equant. Propinatur in forma Pulvis cum Saccharo albo, aut Coralli preparatis molitur; vel in vitello Ovi assumptum & dissolutum ergagium est, sicut etiam Clysteribus felici cum successu addi solet. Genf. M. A. N. C. Ann. 32. Off. 77. p. 127. & Ann. 3. Off. 63. p. 108.

Item *℞. Herb. Hydor. ter.*

Plaga.

Plantag.

Ternstrolii, an. M. l.
Yl. Balan. p. iij.
Raf. Friapi Cui *Yil.*
Coque in *q. Ferrarior.*
Calatara *Yil.* addo
Syr. Corall. Querc.
de Symp. Fern. an. *Yil.*
 M. S.

Potui Adstringens Vulneraria pro aliquot vicibus.
 Hæc sunt interna, commendata in Dysenteria.

Juxta hæc interna, non negligenda *Externa*, quæ inter imprimis conveniunt interdum *Clysmata* pro certis icopiis injicienda, sed non adeo frequenter usurpetur, ac magis insectina irritentur, ac crebrius superveniunt tormina.

Clysmata autem ista sunt aut Temperantia acrimoniam humorum, adeoque simul Anodyna, aut sunt Consolidantia emollientem, seu Intestinorum laxitatem. Imprimis quando urget Træctus, Vomitus, Tormina crassorum Intestinorum, tunc conveniunt Anodyna *Clysmata*, quæ de temperant, sicuti in fine morbi Vulneraria usurpanda. Ea, quæ temperant, & de anodyna polleant, sunt *Clysmata* ex *Laëte*, vel *solo*, vel in quo Saccharum injectum, injicienda tepide: vel *Lac*, cui interdum ratione doloris incoquantur Flores Chamomillæ, & aliquot capita Papaveris, addito parum Sacchari: vel *Clysmata* ex *Laëte* addantur Theriacum *Yil.*; sic interdum *Lac chalybeatum*, in quo dissoluta *Yil.* plus minus *Seri hircini*, cum vitello *Ovi* diluti, ac iterum concretæ, est elegans: c. g.

Yl. varicis, vel *simp.* vel *chalyb. Yil.*
Seri hirc. (quod est optimum; curus loco etiam cervinum usurpâri potest); *Yil.*

Mixta injiciantur pro *Clystere*: S.
Clyster Leniens:
 Vel

Yl. Flor. Melilot.
Sambuci;
Verbasci an. M. l.
Cap. Pop. cum *sem.* N. lili. ad v.
Coque in *l. q. Laëte baln. chalybeo.*
Calatara *Yil.* addo
Theriac. *Yil.*
Seri cor. vel *hirc.* *Yil.* ad *Yil.*
Mell. *Ovi* q. l. pro solvendo *Sero*.

Milic. pro Enemate: S. ut antea.

Loco Capiti Papaveris addi potest *Philonium Romanum* ad *Yil.* omnia Theriaca, vel *Laudani opiani* gr. ii.

Quibusdam experient est *Clyma*, quod recipit *Lactis* quantum sufficit, in quo decocta sit Radix *Symphitæ* majoris & *Gigeris rubri*: cui additur

Pinguet. capris, cum vitello *Ovi* dil. *Yil.*
 M. pro *Clysmate*.

Potest etiam commendatur *Clysmata Vulneraria*, sive Consolidantia, inter quæ imprimis commendo *Clysmata* terebinthinata, quæ ad imitationem *SYLVII l. a. g. 51.* & *BARBETTE*, præscripta in Affectionibus Intestinalium, & *Mæsti*, sunt singularissima: v. g.

Yl. Laëte ros. chalyb. *Yil.* vi. ad viij. l. & *Yil.* (non in minima copia: loco etiam *Lactis* assumi potest Decodum quoddam Vulnerarium, aut aliud appropriatum.)

Terebinth. in vitello *Ovis* (sic enim fitisic in hunc em) *Yil.* vel *Yil.* ad *Yil.*

Mell. rosæ. *Yil.* vel *Yil.* ad *Yil.*

M. l. *Clystere*: S.

Clyster leniens.

Cui etiam Theriaca ad *Yil.* vel *Yil.* addi potest.

De hoc Enemate dicit *SYLVIVS*: *Tali Enemate*, & quidem antea, circa initium vel adque maturè lapsa, curavimus simul Dysenteriam cum *Puris* & *Diarrhoeis* conjunctam. Dabo aliud exemplum, quod habet *BARBETTE* in *Praxi* sua.

Yl. Terebinth. cum vitello *Ovis* dil. *Yil.*

El. Diacord. Præ. *Yil.*

Puls. Rafar. rub. *Yil.*

Laëte varicis. *Yil.*

M. pro *Clysmate*.

Quod idem cœu capertum commendat.

NB. Pulveres tamen *Clysteribus* admitti, (dem quidam addunt Terram sigillatam, Trochiscos de Carabe, Rosas rubras) non adeo conveniunt; si enim remanent in Intestinis, illidem adhærent, malum irritant & exasperant.

Hæc fuerunt *Clysmata* Anodyna Temperantia; sequuntur nunc Vulneraria, & Consolidantia *Clysmata*, qualia

Tom. II.

sunt Adstringentia & Mundificantia: v. g.

Yl. Berk. Bursæ pastæ.

Plantag. an. M. l.

Rad. Symp. max. *Yil.*

Coque in *l. q. Aqu. simpl.*

Calatara *Yil.* ad *Yil.* addo

Raf. Fern. in vitello *Ovi* dil. *Yil.* vel q. l.

M. l. *Clysmate*: S.

Clyster leniens.

Tepide injiciatur.

Balsamum Peruvianum in *Clystere* in duabus Virginitibus, in quorum excrementis Caruncule, seu portiones quædam velut carne apparuerunt, cum succibus adhibuit. Pertinet hæc *Clysmata* ex *Cancris* *Stavilibus*, & eorum Decoctis, quæ similiter egregie conveniunt. Modus præscribendi est talis:

Yl. Juriæ Caner. furvæ. canos. vel *cof.* *Yil.* vel *Yil.* addo

Seri hircini cum vitello *Ovi* solat. (vid. *MO-RELLUS* p. 227.) *Yil.*

M. l. a. pro *Clysmate*: S. ut antea.

Acce corrosivum adhibet, & vulneraria vi prodest insigniter in Dysenteria.

In dolore adhuc urgente addatur *Syrupus Papaveris* *Yil.* ad *Yil.*, ita enim præscribit *DEODATUS*.

Yl. Juriæ Caner. furvæ. *Yil.* vel *Yil.*

Seri Caner. furvæ. canos. *Yil.*

Calatara calidæ addo

Mell. *Ovi* N. i.

Syr. de Symp. Fern. *Yil.*

Papav. albi. *Yil.*

M. pro *Clysmate*.

Yl. Decoll. Caner. furvæ. *Yil.*

Terebinth. cum vitello *Ovi* solat. *Yil.*

Olei Lili. *Yil.* *Yil.*

Milic. pro *Clysmate*.

Oleum Lini in Dysenteria præsentaneam præstat operam: vid. *ROLFINCIUS Chym.* p. 222.

Inter *Externa* ulceris commendantur Applicanda, quæ interdum sunt: 1. *Emulsionis*; quæ pertinet Theriacæ, Abdomini largite illius. Item *Emplastrum* Theriacale *THOMÆ l. 3. Cafe* 18., & *Lini* mæta ex Oleo muli, chea, Crodorum, Myrtino, Hyperici, Abdomini, Menthe, Nardus, Hyocyami, Nucis Moschatæ capessit, & similibus, acutis cum destillata Macis, Menthe, Cere, Chamomillæ, Anethi, Anisi, Foeniculi, limbalibusque appropriatis, quæ calide largite tam Ventrículo quam universo Abdomini illinenda. Porro regioni Remachi Omentum Impervecce recenter extraham, & Oleo Hyperici uraturum impostendum, quod indigiter commendatur. Addunt quædam Theriacæ, & his Oleis etiam Terram sigillatam, Canella, Crocum Martia adstringentem: sed est ridiculum, ubi enim hæc operantur, cum ulceris penetrare nequeant. Par sit iudicium de Emplastis ex talibus & similibus paratis, uti est contra Rupuras, & Emplastrum Stypticum *Adyphesii*.

NB. *Fomenta* etiam in forma Sacculorum varia applicantur, quæ inter egregia sunt Sacculi ex Felis Quercus in Aceto codis Abdomini, & Podici applicati, *RULANDO* in eisdem *Praxi* usitati: ad cujus imitationem præcipuo superiori anno hos Sacculos, & egregium olivævi effectum.

Yl. Yl. Querc.

Furfur. tritic. an. M. lili.

Yl. Chamomill.

Verbasci. an. M. lili.

Concilia includantur *Sacculi* duobus, uno rotundo majore, altero oblongo minore: immergantur Aceto calido, & major applicetur Umbilico, minor verò Podici urgente dolore temetipso; crebrius repetantur, & egregie conferunt.

D. S.

Sacculi Lenitivi.

Vel

Yl. Flor. Chamomill.

Linar.

Sambuci.

Verbasci. an. M. lili.

sem. Foeniculi.

Lini an. *Yil.*

Sac. Junip.

Lauri an. *Yil.*

Incisa concludantur *Sacculi* interossando, Abdomini applicando, D. S.

Sacculi Lenitivi.

R. 3

Vel

Vel
℥℥. Herb. Verbasci cum Flor. M. ii.
Flor. Chamemill.

Sambuci an. M. i.
 Incisa & contusa includuntur Saccula: S. ut antea.

Vel
℥℥. Herb. Linari.
Flor. Verbasci an. M. ii.
Scm. Aneth. ℥℥.
Papav. alb. ℥℥.
Hyssopum ℥℥.

Incisa, & contusa includ. *Saccula interponenda pro Tenefmo: S. ut antea.*

WEFFERUS admovent Spongiam & Decocto Florum Verbasci in Lacte cum levamine.

℥℥. Theriac. ℥℥.
Ol. assill. Mar. ℥℥.
M. f. Linimentum. S.
Unguentum Lenitivum.

Vel
℥℥. Theriac. Androm.
Ol. exp. Nuc. Mosch. an. ℥℥.
assill. Macis ℥℥. vel ℥℥.
M. pro Balsamo: S.
Balsamus Lenitivus.

Imponatur regioni stomachali & umbilicali, impeniendo de super Laterem calcitatum (E).

Omnia aliis convenient, quam *supra de Vomitu & Diarrhea dicta fuerunt. Item*

℥℥. Ol. exp. Nuc. Moschat. ℥℥.
Balsam. Sulphur. anis. ℥℥.
Peruvian. ℥℥.
M. f. Linimentum.

Portu notabile est, quod exeretio Facum sanguinolentum super Caput mortuum Vitrioli, vel Vitriolum modice calcinatum, vi quasi sympathetica singulariter conveniat in Dyenteria, id quod CNOEFFELII fuit secretum, aut Pulvere Sympathetico Crur circa adspersi potest. Egergeth semper Faces deponat super Caput mortuum Vitrioli, vel Sacramenta prima vice excreta cum Salis communis manipulo miscantur. Quo etiam facit Perficaria cum Vinodices chalybeato in mortuorum contusa, & ad Cataplasmatibus confectis cocta, applicatur Lambis & Spinis iuxta Reones refrigeratum demum applicetur, post aliquot horas in Fumo equino sepietur, sicque morbus curatur: vid. AGRICOLA *Chirurg. parv. pag. 820.* Tandem Suffitus et Rafura Cornu Cervi Podice exceptus, quando nempe Rafura Coron Cervi inicitur prunis candentibus, & fumus exhalatus per insudibulum excipitur: item Suffitus Aceti, super Laminam terream calcitatum effusi, item Suffitus ex Zingibere Anno excepti crebrius, & quoties Alvim deilectum egri, sunt egregii, & Modernorum quorundam, in specie Anglorum, qui Dyenteriam hic curant, experimenta elegantia, maxime in Dyenteria cum Tenefmo. Quae plantis Pedem applicantur, non magni facio, ideoque hoc etiam praeterito.

Pura qui cupit de Dyenteria, adeat imperitis SENNERTUM, qui tam in *Praxi I. 3.* quam *peculiari scripto de Dyenteria*, sufficienter de eadem tractavit.

ARTICULUS II.

De Tenefmo

Tenefmo (F) Dyenterica cognatum, & usquequidam confusum malum est: nam ordinaria Dyenteria etiam supervenit, adeo ut ferè id, quod in Intestino superioribus est Dyenteria, hoc in Intestino Recto est Tenefmo. Germanice vocatur *der Stuhlwang*, quibusdam *der Stuhlkanal*. In genere nempe consistit, est *Affectus cupiditas egrediendi per alvum, in qua ipsa tamen piam, idque ferè saltem nihil movetur, aut visum, aut tractum, aut perulentum, aut nihil emittit, excreta.*

PARS AFFECTA.

Pars affecta est Intestinum Rectum, imprimis ubi Anus

eingetur Spindere masculo, ibi sensibile admodum est, & si leviter irritatur, Tenefmus adeit.

CAUSAE.

Causa Tenefmi Precina Efficiens Formalis est spirituum eo provocatorum impetus: *Causa Causa Occasionalis* est irritatio continua Intestini Recti, quod quacunque occasione ita simulatum & irritatum spirituum vi se contrahit, & ita egestionem urget.

*Priusquam autem Intestinum Rectum, & simulatur vel per Consensum ratione aliarum partium, vel per Efficiam. Per Consensum etiam observatur aliquid in Nephritide seu dolore Reum, quia tunc tempora sub motu Calculi contingit Tenefmus propter quoddam Nervos ex Plexibus mesentericis ad Intestinum Rectum derivatis, ex quibus etiam alii ad Reines distribuuntur: Observavit id TIMÆUS *in Galdenklein*, & ego etiam. Item Calculus Vesicae, ubi imminet Urethrae, in Vriam frequenter Tenefmum inducit, pondere suo, & iritatione colli Vesicae similiter irritans Intestinum Rectum: confert. HORSTIUS *in suis Problem.* pag. 70. Doc. 6. Quæst. 6. Item TIMÆUS *in Galdenklein* in *Epist. p. 141.* Adhuc Mercurius propinquum partem Tenefmum interdum patiatur, propter Uterum incumbentem Intestino Recto.*

Hi sunt Tenefmi pro Consensum.

Per Efficiam frequenter oritur Tenefmus, si malum haereat in ipso Intestino Recto, primario à Mucro tenaci acido seu Pituita viscida causa, firmier Intestino Recto agglutinata; & illud plus minus rodente, vellicante, hinc exortante, & tandem plane exultante: qua ratione ordinaria Dyenteria supervenire solet, propterea quod, quæ excreantur, acida & acris corrosiva, & simul glutinosa, Intestinis pertinaciter adherent. Item Anus inflammatus similiter non raro infert Tenefmum; unde & Hemorrhoidibus cæcis, indeque plus minus tumefactis aut dolentibus, Tenefmus, seu frequens comes, se afficit. Pertinent huc etiam Alcarides Intestinum Rectum mortificantes, & rodentes, qui usquequidam etiam, & non semper, Tenefmum inferre solent: vid. FORESTUS *l. 21. observat. 29. in febr.* Tandem Purgationibus violentioribus, aut post Aloocrudam sapientius usurpata etiam supervenit Tenefmus, partim propter excrementa acriora excreta, & Intestino Recto nonnihil adherentia, & illud plus minus simulantia, partim vero propter particulas Purgantium reosolitas, visciditate sua diu Intestino pertinacius adherentes, & hoc continuo simulantes. Faciunt etiam hic omnes Excoarationes, Evulserationes, aut Fistulae interius Intestini Recti, pertinaciter etiam Tenefmum junctum habentes.

DIAGNOSIS.

Diagnos est clara per se, imperitius ex relatione egri.

PROGNOSIS.

Tenefmus ex se consideratus, leve est malum: si tamen habeatur Causam ratio, variat Prognosis.

Nempe qui per Consensum, est alique periculo; per Efficiam vero subsidit Procidendum Anni infert.

Interim si processerit, & non rite curatur, inducit Excoarationem Intestino Recto, & non raro in Ulceris fœdum degenerat, quod ultieris tandem facit in Fistulam Anni abire, difficiliter sanabilem, sed per sectionem curandum: quales Fistulae hic locum sunt rare; in Anglia vero frequentes.

In Gravidis gravior Tenefmus, si non semper, subsidit tamen Abortus est causa: vid. *Prognosis in Dyenteria*, & HIPPOCRATES *lib. 1. §. 77.* id quod confirmat la MONNIERE *de Dyenteria l. 5. pag. 348.* nempe Prægravis dyenterica Tenefmo corrupta semper Abortum pessis est, & cum periculo, si grandior fuerit Facies.

CURA.

Cura varianda est pro Causam ratione. Ante omnia Causa vellicans removeatur, unde, & si per Consensum fuerit Tenefmus, curato priori morbo, & ipse evanescit.

(E) Verum non innotuit mihi, quid sit Dampierius, superius Dyenteria remedium est, frigida fluminis aqua Balsamum, idque de se experientiam esse subicit.

(F) Tenefmus à vicia, tendit: quod si illud pars affecta in hoc morbo transierit & curam subeat, Hoffmannus in *Inst. Therap.* Tinalping, servandum esse censuit.

Interdum Opiatis vellicatio Intestini fupinodica mature fitatur. Si per efficiam fuerit, imprimis Causa materialis, Humor acris, acidus & viscidus, corrigatur & abstergetur. Excoriatio verò inde nata, aut Esculceratio jam facta mundificetur, & denique consolidetur. Conuenient ergo Clysmata mucum abstergentia, & vi anodyna Irritationem fupinodica in pauca quantitate, nempe ab ℞. injecta, simul haec vel eis simplicia Laque, vel cum Sevo hircino permixta. Nam & Fetus Laetis tepidi Tenefimi molestiam lenit. Alias autem Decoctum Ciccorum ruborum cum Floribus Verbaſci inflat Clysmatis, cum Sevo hircino, vel cum Melle roſaceo injectum, cui & Sal Tartari additum, satis est conueniens: c. g.

℞. Flor. Verbaſci. M. j. vel ℞.

Semina. Cicer. rubr. ℞j.

Sal. Tart. dt. j.

Coque in l. q. Aqu. simpl.

Colatura ℞. addo

Sevi hircini cum vitello Ovi dilut. dr. vj. ad ℞j.

vel ℞j.

℞. Mell. roſati ℞. vel dr. vi. ad ℞.

M. pro Clysmate, pro duabus vicibus applicando: S.

Clyſma Lenitiuum pro duabus vicibus.

Formulam elegantem habebitis in SENNERTI Praxi, cui de Tenefimo, quam etiam commendat D. MICHAELIS, in qua haſis ſunt Lumbri terrefreſtes, ea quibus parata Clysmata etiam in Dyſenteria ſunt egregia: c. g.

℞. Flor. Verbaſci. M. j.

Reſar. rub. M. ℞.

Lumbri. cenſ. ℞. dr.

Sem. Foenug.

Phyllis an. dr. li.

Coque in Laque recenti, ubi magis dolor leniendus; vel in Sevo Laetis, ubi materia peccans abstergenda:

Colatura ℞. addo

℞. Mell. roſat. dr. vj. ad ℞. vel ℞j.

M. ℞. Clyſm. pro duabus infundendis vicibus. S. ut anteq. Prae ceteris appropriatum remedium in Tenefimoe est Verbaſcum, seu, ut alius vocatur, Tapiaſ barbatus, quocunque modo extenuat uſuratum, ſpeciatim Decoctum eius aut Florum in Laque, cum ſpongia, vel linore multipliciter inflat Fomentis Ano admodum & nam dolorem lenit, acrimoniā temperat, fluorem repellit, & ſpeciatim Tenefimam quocunque, etiam Dyſentericam, curat. Facit hoc ſuſumigium ea Verbaſci & Terreſtriſina Myſcedet, quod egregie conuenit; vel ſunt ſimul ſacculi ea Verbaſci, Folii Quercus, & Anemone, qui vel in Laque decocti, vel loco eius in Aceto ſervido ebulliti, Podici applicentur. Vel

℞. Herb. Linar.

Verbaſci an. M. j.

Tien. Chamom.

Verbaſci. so. M. j. vel ℞.

Inclade ſacculo, in Laque chalybeato coquendo: D. S. Sacculus dolorem ſedans.

Ager in ſella perforata Decocto ſerventi inſidet, & ſuum eurgenteum excipiat, vel in Laque chalybeato cocta linore multipliciter calide applicentur; vel inclindantur. Sacculus interpaſſato, & calide parti dolenti aduocatur. Optimo Clyſteres ſunt ex Jure Capitis aut carnis vervecinae, cum aliquot guttis Olei deſtillati Philophorum, vel Ceræ; hoc enim Oleum Ceræ mirabile eſt in Excoſtatione Intestini Recti, potenter abſtergit & consolidat. Loco Olei Ceræ aut ſimilium, etiam Bullatum Peruvianum ſimili ratione applicatum; eſt efficax. Praeter dicta & Suffus Tenefimam ſunt, in ſpecie Suffus ex Latere candefacto, vel Limatura Martis candente, Aceto ſerventi inſuſo. Ano exceptus, i quibulaſ etiam multum eſt commendatus. Alii ſunt etiam Suffus ex Thure, Mirra, Galbano, Nuce Moſchata, Roſis & ſimilibus: item Fumus Decoctionis Sabinae ex Aqua & Aceto, Laminæ ferreae aut lateri calefacti inſuſi, pro Focu exceptus, eſt egregius. STOECKERUS in Praxi mirabiliter iuvare dicit ſuſumigium de Thure & Pice, ſuper carbonem viſcos prociſis. Quod ſi verò graviter urgeat Tenefimus, etiam poſſunt applicari Glan- des, ſive Suppofitoria, parata ex Sevo Hirci, vel Melle inſuſato, cui Pulvis de Cynogloſſa, vel nonnulli de Opio additum fuerit; quae in gravi dolore Tenefimi ita applicanda: conſ. AMAT. LUST. c. p. 108. 97. Sed verorū, ne ſola applicatio Suppofitorii, irritando Intestinum, malum exacerpet.

Tandem, ubi nonnulli exulcerati fuerit Anus, conveniunt Inſectioes ex Venerariis paratae, illinendo poſtmodum cum Oleo Roſarum & Lumbicorum terreſtrium, pro-

bè in mortario plumbeo agitant; vel etiam cum ſololeone Linbargyri in Aqueo ſubactis & in Linimenti conſiſtentiā redactis; vel cum Unguento populeo, de Tutia, aut Unguento Diapompholygos, aut de Cereſſa camphorato; aut etiam dicta Linimenta levi ſuppofitione ex Sevo hircino cum pulvere Thuris, Tutia & ſimilibus excepta ad mundificandum & consolidandum Ulcus ita applicantur; vel anguinae Albi camphorati & Diapompholygos ana, cum pauca Terra Pſorioli dulci ruti parata, ſubacta, & in conſiſtentiā unguentis redacta, quocunque modo, vel liſtela vel aliis applicatur, vel Ano intruditur.

Denique ad consolidandum & mundificandum Ulcus in Tenefimo entum, Oleum Mallicis optimè conuenit ad aliquot guttas in Aqua Mencha, Plantaginis, aut Pulegii exhibitum, quod valde laudatur, conferens etiam, ſi ex ipſa Dyſenteria ſitit malum. HILLERUS in C. 1. Corae. 75. reſert Tenefimam Chronicam & admodum contumacem, quem poſt multa alia fruſtranea curavit Otto Vitrioli rubello in Juſculo Carnis exhibitio, i quo purulentia multa excreta fuerunt. Haeremus adhuc io Fluxibus Alvi, & quidem in iis, in quibus excrevit Sanguis. Sit ergo.

A R T I C U L U S. III.

de Fluxu Hepatico.

FLUXUS Hepaticus Modernis rariffimè viſus, adeo ut ob id non pauci omnino dubitent dari revera talem Fluxum, aut hi, non quidem antiquiffimi, ſed majoris ævi, multa de eodem clameſcit & ſcribunt, adeo ut etiam VARANDÆUS conſcripſerit ſpeciale Tract. de Hepatide, ſeu de hoc affectu, aut Alvi Fluxu vitio Hepatis contingente.

Eſt Veteribus hic Fluxus Hepaticus, quando nempe Sanguis aquoſus & impermixtus, terreoſus, atque, ut vocant, loturæ carnosus ſimilis, abſque dolore aut gravioribus ſymptomatibus per Alvum copioſe rejicitur.

Appellationis ratio deſumpta ſunt, prout i Veteribus deſcribitur, ex præconcepſa Hypotheſi Majorum, quod nempe Hepar languifcet; adeoque cum hunc Fluxum oriſi viderentur ea deſcribere Sanguificatione in Hepate, ob id cum Fluxum Hepaticum vocarent. Sed talis Fluxus Hepaticus Veterum eſt revera non-eſs; ſi enim exactè conſideremus exempla eorum, qui referuntur hoc Fluxu laboraſſe, ea longe aliud quid perſuadent, ſc. nil aliud, quam Fluxum Haemorrhoidalem, ea Haemorrhoidibus ſuperioribus oriturum. Unde nunquam Hepatis vitio hoc fieri dicendum eſt, cum Hepar de languificando muovere jam ſic depoſitum.

C A U S A E.

Quod ergo attinet Diarrhoeam Cruentam, Dyſenteriae contra-diſtinctam, tres ſunt caſus in quibus Diarrhoea talis Sanguinea indolens, Fluxus Hepaticus Veteribus dicta, eſt toler.

Nempe 1. Quando uberior ſunt Haemorrhoides interne & ſuperiores, qualem ſub nomine Hepatici Fluxus intelligit BARBETTE ſua Praxi.

2. Quando talis Fluxus remanet poſt Dyſenteriam, jam conſtam, in qua propter deſuperatam Maſſam languineam, & exorta interiori Intestini cum membrana, Vaſa languifera exorta noduſ perſecti consolidati ſic enim etiam ſubſide aliquid de Sanguine tenuiori tranſiit, & de ſeſolens talis Sanguinea Diarrhoea, & ut SYDENHAM vocat, Dyſenteria habituali ſuper eſſe ſolet a onde Dyſenteriam ſuperveientes Fluxus Cruentus, nullo modo talis Fluxus Hepaticus ſtatendum.

3. Quando quocunque occasione Vaſa quædam languifera in Intestini, vel per anuſtomia, vel per diſtinctionem, aperiantur, & ita Haemorrhagiam intestinales excitant.

Eodem etiam Causæ Internæ, quæ v. g. Haemorrhagiam

Narium excitare valet, eæ etiam ſimilem Haemorrhagiam Intestinis inferre valet, in ſpecie Acrimonia Sanguinis

morborum plura moris officioſa intestinalium Vaſorum; ita

Causa eo eſt proprior, quod ſeroſus magis Sanguis ſimul

exiſtere ſolet: qualis affectus exemplum ſuggerit DEODATUS, qui Fluxum Hepaticum ac Diarrhoeam cum Fluxu

Uterino & Profluſio Menſium immoſco in una Femina

ſimul obſervavit, in Polernad. pag. 331. Conſ. etiam BON-

TIUS de medicina Indorum p. 24. Quæ ratione etiam huc

per-

perinet Dyenteria Notha Scorbuticorum, eujus fella est
 reatio fupra, ufi & hæc foras ad Hæmorrhoides perti-
 neat. Adhæc ex Suppreffione confectæ copiofam Sanguis
 evacuationem etiam Fluxum Cruentum talis oriri poteft.
 Quo pertinet Obfervatio FORESTI l. 32. *Obferuat.* 30.
 de Fluxu Sanguinis pari ex vita etola, & Sanguinis Na-
 rium Fluxu uifato fuppreffo, Venælezione in brachio
 curato, Sic ZACUTUS LUSTANUS lib. 2. *Medic.
 Princip.* lib. 86. obferuat Sanguinem Fluxum Hepaticum
 in illis, in quibus artum aliquis præciuit; item ab omnia
 exercitatione fella, & fimilibus caufis: quæ quidem coacer-
 vare poffunt Sanguinem utilem, & ita dare occafionem, ut
 quocunque in loco erumpat; non autem poffunt inducere ve-
 rum Hepaticum Fluxum. Eacumplum tale propofuit DEO-
 DALIUS l. 2. p. 217. non minus quam BORELLUS *Cent.* 2.
Obf. 99. Tandem occafione insignis euafida & confir-
 mæ Obftructionis in quodam Vifcere Abdominis, propter
 impedimentum circulationis Sanguinis, interdum Arterie
 Meientericæ perfpirant in Inteftina, & talem Fluxum
 Cruentum eiciunt. Quo pertinet BARTHOLOMI *Hyflor.*
 41. *Cent.* 6. ubi notat Cruentæ Dejectiones, fupervenientes
 Meientericæ Obftructionibus falutares. Sic Sanguinis mi-
 nor Fluxus in Læciofis videlicet recenfitur in MARCELLO
 DONATO l. 4. *Hyflor. Med. Mirac.* cap. 9. Quæ facit ob-
 feruat. 30. FORESTI l. 32. in *Schola.* excretionis Sanguinis
 Vini, in indurato Splene fæltè falutaris. Addeur de Fluxu
 Hepatico, & ipfi fimili, meritis dabitur Moderui, cum ra-
 riffima, imò ferè nulla, præfent exempla. Ob id BAR-
 BETTEI a. vult, quod talis Fluxus, diûus Hepaticus, fit
 tantummodò apertio fuperiorum Venarum Hæmorrhoida-
 lium; per quæ evacuetur Sanguis, & fubinde per Anum
 deficiat, & efiulte; quæ fententia etiam mihi videtur veri-
 fimæ.

Quibus tamun placet defendere talem Fluxum, qui à Ve-
 teribus vocatus fuit Hepaticus, ipfi nullam aliam poffunt
 affignare Caufam, quam nimiam Sanguinis aquofitatem &
 tenuitatem, ob nimiam Seri abundantiam, quod ipfum abun-
 dantiam Serum in tantum tenuem & fluxilem reddat Ma-
 fiam fanguinem, fimileque Vafa fanguifera, imprimis Me-
 fenterica copiofiora adeo laet, ut eandem Sanguis aquofus
 per Vafa laxata facili & copiofe tranfudare poffit.

Unde Remota Causa erit partim Chylificatio læu, partim
 Seri excreta vitata lue impedita. Chylificatio læu, quan-
 do ex copiofis affumptis potentioribus, aut aliis quacumque ex
 ratione Chylus non laduus & legitimè confiteoritur, fed
 tantummodò tenuis, aquofus & admodum fluxilis con-
 fertur. Unde fi poftmodum vel vitio Reum vel vitio debet
 motiois corporis, vel alia quacunque ea caufa fupprimi-
 tur Seri excreta, non poffunt non exinde fubfequi Sanguis
 aquofus & facili tranfudabile. Sed, uti diûi, veriffima efi
 fententia eorum, qui ftaunt, quod non reverè fit talis Fluxus,
 fed tantum oritur ex apertione Venarum Hæmorrhoi-
 dalium fuperiorum: de quo paulò poft plura.

DIAGNOSIS.

Quod attinet fignis Diagnosticis: per fe patens.

PROGNOSIS.

Quod prægnofis: Eandem fimilitè ftantur, quo folet
 ftatus in Fluxu nimio Hæmorrhoidum, aut aliis præternat-
 urilibus Sanguinis excretionibus: fcilicet excreto nimis co-
 piofo & frequens Sanguinis tandem corpus ad Cachexiam,
 hinc Hydropem, Talem, & fimilia fymptomata ne-
 ceffario difponit, ut propterea Fluxus Hepaticus diûus, in
 Iuvenibus interdum difficiliter, in Senibus verbè nunquam
 ferè, aut raro curetur. Præfupponit femper fcilicet in cor-
 pore vitium, à quo ipfo Fluxus dependet, & cuius refpectu
 magis vel minus curabilis evadit.

CURA.

Quod attinet Curam: per Caufarum antecedentium feu
 remotarum varietate variat; alias eadem efi, quæ reliqua-
 rum Hæmorrhagiarum: Conveniunt etiam eadem Remed-
 ia Symplica, quæ vel in Diarhæa ufurpantur, vel quæ ad
 nimium Hæmorrhoidum Fluxum adducunt, vel deni-
 que quæ alias Hæmorrhagias quæcunque in genere fup-
 primere folent: unde fi fit Hæmorrhoidum apertio, harum
 lege curetur, præfentem per Martialis, in fpecie per Tinctu-
 ram Sulphuris Vitrioli. Si fequitur Dyenteriam, eadem
 efi Cura, quæ Dyenterie levis.

In fpecie, quæ ad Fluxum fupprimendum commendat-
 ur, fuit imprimis ex Tormentilla, Plantagine, Santali,
 Corallitis, Agrimonis, & ex Urtica maxore petita remedia.
 Succus Plantaginis, Portulacæ, & Succus Urticæ majoris,
 uti quæcunque Sanguinis Fluxum fiftunt, ita in fpecie ad
 Fluxum Hepaticum commendantur: quibus fi miferetur
 Succus Saniculis, ob efi convenientior, Cum his Succis mi-
 Syrupi Coralliorum, item Papaveris albi, eorum vires in-
 tenduntur. Conveniunt etiam Martialis, quæ omnia per
 fe femper adstringunt, tam Terra Martialis in mineris Mar-
 tis frequens, quam etiam Crocus Martis adstringens, & La-
 pus Hæmatites cum Succo Granatorum, aut Tinctura Soli-
 phoris Vitrioli, quæ Tinctura Martis adstringens: de quibus
 alibi, quia præparaciones eorum fuit variz, adeoque ha-
 bendus delectus. Agrimonia fide Eupatorii fpecificum
 efi POTERII, qui dicit, fe Decocto, Eupatorii defperatam
 Hepatitidem curaffe. Cum hoc Decocto, fide parata Efflen-
 tia ex Succo Eupatorii (non ex Herba fæca, uti procedunt
 Pharmacopœi) fi miferetur Tinctura Sulphuris Vitrioli,
 uti legitima Lapidis Hæmaritis Tinctura, (quæ parca manu
 adminiftratur) erit Miflura maxime conveniens: v. g.

℞. Effent. Agrim. diûo modo par. ℞i.

Tinctura Sulphuris Vitrioli ℞i.

*Effent. And. cum Tere. Cydon. (de quo fup-
 loco) vel quæcunque modo parat. ℞i.*

M. S.

Tinctura Adstringens.

Dofis 30. guttule.

Non hæc ratione Addo Effentiam Opilam, propterea
 quoniam Præfentem Obfervationibus confiat, Fluxum
 Hepaticum poft Dyenteriam Landani opaci ufi curatum.
 Unde Opilam non negligenda. Id quod affirmat etiam
 RONTIUS in *Medic. Indorum* s. 4., quid dicit, optimum re-
 medium ad Fluxum Hepaticum efi Extractum Opil vel
 Croci.

Si Agrimonia plus minis ferofo diûum malum inducat,
 Rhabarbarina, item Viteraria, & Adstringentia cum O-
 piatis conducunt: hinc Terra, de quibus res nota efi, quod
 adstringunt, ut Terra figillata, Corallita, Trochifci de Ca-
 rabe, Unicornis foliis, &c. conveniunt: Sed, ut obiter mo-
 no, due fuit fpecies, quæ *Unicornis fæltis* venient nomini.

Primo fpecies reverè fuit Offa Aëumalis calcinata, calci-
 natione vaporis à vapore humido & calido, terra eleva-
 ta: Videbitur etiam in Officinis materialium, quod talis
 Offa datur pericula pro Unicornis offili, quæ linguæ ad-
 hærent inftar Corui Cervi uli, adeo ut non fiat habenda
 pro vero Unicornis offili in hac affeûu profecto. Altera
 porcis fpecies, quæ efi verum Unicornis foliis, efi fpecies
 Margæ, quæ interdum fuperveniente fpiritu falino coagu-
 latur, ut in veram abeat duritiem lapideam, ita tamen,
 ut quali per cancellos fit divifa nunc Margæ huæ concremum
 adharere, feu Margæ, adhibenda in Fluxu Hepatico. Item
 non inconfulum efi ad Sudores & Sudorifica decurrere ad
 imitationem VARANDÆI, qui l. 4. pag. 173. dicit: *Phy-
 dam potius in prægreffu morbi non laudat efi Sudores Dece-
 floquadam, ut Seminis Melli, Radici China, vel Sarpællis,
 procurare, quia Sudores alii Fluxum imminuere folent, & apti
 alium fæltæ materiam, & Hepæ caliditate, quod aperiri non
 erit inerte: Si enim uger fudet, & leviter id ferat, magna
 erit falus fpecs, minorique in Hepate noxa fignum. Nam
 quicunque magna Hepatis imbecillitate, Scribo aut obftru-
 ctione tenentur; via enim Sudoris guttulum untrere pof-
 funt. Pro hoc fæpo Lignum Lentifciani, ex quo fuit
 Malliche, item Lignum Cotoneum, decoctum inftar alio-
 rum Lignorum & propinatum, fingulariter commendatur
 in hoc morbo: Nam, ut rectè dicit VARANDÆUS citato
 loco, ubi contumacior fuerit hie morbus, quod etiam tunc
 temporis necesse fit accedere ad Decocta Lignorum, ut
 illorum beneficio provocatis Sudoribus, nimis fluxilis eva-
 dat Maffa fanguinea, & ita nimis paulò tranfudare pof-
 Ineffim. Porro gelatina Corui Cervi parata vel indic-
 cata cum Aqua Cinnamonis, à LINDANO in tali cafa
 tanquam expertis commendatur.*

Denique Paffule fingulariter in hoc morbo conveniunt;
 hæ enim multum faciunt ad laudabilem Sanguinis crâ-
 & æquabilem fermentationem confervandam: in Paffulis
 quippe multa latent, quæ aut Sanguinis dyfcrâfiam, aut
 eum vulgò fic diûam temperiem corrigunt: fuit enim reverè
 Mullum concentratum, quod blandè fermentando mul-
 tum valet ad corrigendam vitiatam Sanguinis fermentati-
 onem. Facit hoc Obferuat. 20. l. 32. FORESTI, ubi nil
 aliud ægrum ceavit, quam talis Diarhæa Cruentæ, ex
 Sim-

Sanguine acriore nata. Causa est hic: Quidam Sanguinem purum reijciunt, adeoque excoriatione cum paucis ventris vermibus & rufis valida, cum capitatione humoris crudi & urina supposita, hac sola Potione curatus, quæ lubeat, mixtae dolorem, & urinam provocat:

℞. Fol. Malva,

Valer. an. Mj.

Herb. Hyssop. M℞.

Radix. Liquirit. rafa 3℔.

Spical.

Pistachia.

Uvar. paff. an. 3℔.

Pruna Damasq. No. 3℔.

Coque in Cerevisia, qua continuò utens ager sanabatur.

Nec obliuid Cura PETRI JOHANNIS FABRI, qui notat Fluxum Hepaticum ex potu Aquæ frigidae & usu Lactucarum cum Aceto multa, curatam, præmissa Purgatione ex Extrado Rhabarbari, Symplo Coralliorum, cum Aqua Cinnamomi sapientia sumpta.

Quod si suppreffis quidam Sanguinis excretio malum indixerit, hac in ordinem revocata, & interea Venæsectione revulsoria indituta, curetur.

Quod si tandem impeditum Sanguinis circulo ex infarctu aut tumore Visceris inspicitur, hoc, quantum possibile, subleto, & Venæsectione revulsoria administrata, Fluxus Cruræus suffraganeus erit.

Sed pergo. Nunc est, ut disti, Moderatorem sententiam esse, quid Fluxus Hepaticus sit revera apertio Venarum Hemorrhoidaliarum superiorum; quare sit

ARTICULUS IV.

De Hemorrhoidibus.

Hemorrhoides, quod vim Etymol., nihil aliud notant, quam quæcumque *Sanguinis Fluxum* (G): propriè tamen aliqutur tumorem de Fluxu Sanguinis ex externis Venis Ani fere læteliis rufis; vocatur Germ. *Vena aurea*, quia solum ad usum ægrotum Vals hæc billant Sanguinem, quæ Vals sunt Venæ & Arteriae, secundum leges Circulationis Sanguinis. Dantur quidem etiam Hemorrhoides Muliebres, quæ evacuatæ Sanguinis ex Vals externis Vulvæ: de quibus tamen, cum non sint hujus loci, inter Morbos Mulierum agendum.

Hemorrhoidalia hæc Vals, ratione infectionis in Intestinum Rectum, sunt duplicia: nempe *Hemorrhoides Superiores*, seu *Internæ*, & *Inferiores*, seu *Externæ*: Extremæ ex infestè Pollicem lambunt: utraque confluant Arteriam ac ejus sociam Venam.

Quoad Originem, Arteria Hemorrhoidalis Superior seu Interna oritur ex Arteria Mesenterica inferiore; Venæ vero Superiores five Internæ oriuntur ex ramo Mesenterico five Vena Splenica Venæ Portæ: unde diserunt Veteres, sed falsò, per hunc ramum Mesentericum evacuari Splenem per Hemorrhoides, cui tamen asserio repugnat lex in violabilis Sanguinis Circulationis.

Quoad Vals Hemorrhoidalia Externa five Inferiora, horum Arteria quidem oritur ex trunco Hypogastrico Arterio Iliaque interne, quæ Arteria Hypogastrica, præter Venam Hemorrhoidalem, copiosius ramis ad Utterum mittit Venæ vero Externæ oriuntur ex Vena Cava, nempe ex ductu ejusdem Hypogastrico, ex quo etiam Vena Pudenda, item Vena, quæ ad Muculum elanum, item Vena, quæ ad Intestinum Rectum derivatur, & hæc sunt Hemorrhoides Externæ: Jam verò cum ex hoc ramo Hypogastrico, arterioso pariter ac venoso, deriventur etiam in Mulieribus Vals ad collum uterinum, per quæ Vals in iisdem sit excretio mensura, adeò ut ista Vals Hemorrhoidalia ad Anum & Vals menstrualia Uteri, oriantur ex uno trunco, exinde facile patet, qui fat nonnunquam, ut supius in Mulieribus menstruationis defectus compenferit Fluxu Hemorrhoidum; siquidem interdum in habitioribus post 45. annos ordinario Mensura Fluxui succedunt Hemorrhoides, interdum Mensium obstruendum loco sunt Hemorrhoides. Exemplum vid. in HORSTII *Observ. lib. 4. Observ. 52. & Probl. Dord. 6. quæst. 1.*: Conf. BARTHOLINUS in *At. Med. Nephrol. Volum. 1. pag. 165.* Subinde etiam cum Mensibus, sed raro simul fluunt Hemorrhoides: Conf. M. A. N. C. Ann. 2. *Observ. 24. pag. 39.*

Antequàm ulterius pergamus, interiori doctrinæ erigere ante omnia *Differentia Hemorrhoidum* sunt attendenda; nempe Hemorrhoides in genere sunt vel *Puræ*, vel *Fluenter*: Illæ sunt dolentes, & alio nomine dicuntur *Cava*, ex eo, quoniam non sunt apertæ, sed oculis quasi clausi convalent; unde propter clausuram furibundè dolent & tument, *Fluenter*, five alio nomine *Apertæ* dicuntur, quæ apertè Sanguinem fundunt, & nunc confertim fluitant, tunc successivè guttatim effundunt. Pius hæc, signum est obstruere Arteriae: si guttatim & pedestrem effluat, Venæ sunt affectæ, sique sit excretio, maxime si fœces alvi ejiciantur, tunc enim ante excretionem conatus est pressuræ, Hemorrhoides hæc Fluenter sunt vel Spontaneæ, vel non Spontaneæ: *Spontaneæ* sunt beneficium Naturæ he ipsam exonerantis: in Morbis Chronicis oriuntur, vel appropinquat & subinde in apparenter fanis cum euphoria solem emitti; idem Germanis vocatur, *Vena aurea*. Hemorrhoides non Spontaneæ sunt vel Criticæ vel Morbide: *Criticæ* sunt, quæ Morbum acutum in declinatione, beneficio Naturæ he ipsam exonerantis, solvunt, adeoque salubres sunt: *Morbide* verò sunt, quæ maleficio Sanguinis, aut propter quæcumque causam in perniciem ægri in Morbi principio oriuntur, irritata Natura ab impetu causæ morbosæ, adeoque hinc novæ & præternaturales. Hemorrhoidum fluxus subinde est frequens Variis, raro quidem noctis, magis autem Italis; in his enim, Viris nempe, hic Fluxus Hemorrhoidalis quasi vicarius est Menstruationis muliebriæ. Hinc enim profiant exempla Virorum, per flaps periodos Hemorrhoidum Fluxum parientium, ita ut interdum singulis mensibus interdum singulis septimanis, nonnullis in Viris redeat: ob id etiam alio nomine Hemorrhoides Fluenter dividuntur, in *Erraticas* quæ insalubres, & *Periodicas*. *Erraticæ* sunt, quæ nullam cererem recurrit tempus obliant: *Periodicæ*, quando erident, imprimis in Viris, certa & singulari periodocurrunt: qualis periodicitas hæmorrhoidis Exempla in Viris videb. in M. A. N. C. Ann. 4. *Obs. 22. & 69.* Item in AMATO LUSITANO G. 5. Cap. 3. de Viris, qui singulis mensibus per Hemorrhoides habuit evacuationem indit Mulieris per Uterum; imò, quod in quibusdam Viris prædictis mensibus Hemorrhoidum Fluxus periodice hæc motu in illis indixerit. Muliebres etiam interdum, atque raro, accidunt Hemorrhoides, sed tantum temporis uterum ex contritæ sunt cum utero Mensium, quod vel suppremantur, vel naturali regala effluunt, quæ tunc superveniunt Hemorrhoides loco Mensium. In his autem subiectis, ubi sunt, non certis modo observant, nunc sunt sine ordine. Aliquæ scio Exempla, quod in habitu corporis fœculentior & torpidior partium post 40. annos, quando naturaliter fluere desunt Menes, superveniunt Fluxus Hemorrhoidum periodicus, ita ut, cum in his certa periodo fiat evacuatio per Uterum, hinc naturaliter cessantem infestat Hemorrhoidum Fluxum, imò interdum a juvenibus ex Mensium obstruione præternaturaliter oriuntur Hemorrhoidales Fluxus, fluentes periodicè, quæ exempla subministrat HORSTIUS l. 5. *Observ. 45.* in Gravidis pariter, quibus naturaliter cessant Menes, interdum superveniunt Hemorrhoides, Mensium loco in Gravidis fluentes: Exemplum habet SCHENKIUS l. 3. *Observ. de Hemorrhoidibus.*

Id quod fuit per aptas Hemorrhoides, ordinariè est Sanguis, similis cætero in corpore Sanguini, adeoque nunc floridus, nunc obscurus, nigricans: interdum tamen loco Sanguinis etiam alii excrementi Seci, v.g. Humæ, vel albidus & aquosus, nonnulli viscidus, aut etiam alii variegatissimè, sub Hemorrhoidum forma per hæc Venas emulgeri solent; quæ ipsæ Mucositates hæmorrhoidales sunt similes Flui albi in Mulieribus, quales Hemorrhoidum Fluxus nehi, ut sic dicam, Exempla videb. in SENNERTO, ubi de Hemorrhoidibus p. 432. SCHNEIDERO l. 3. de Catarrh. cap. 7. pag. 270. & seq. item M. A. N. C. Ann. 1. *Observ. 75. pag. 180.* Interdum item Aqua citrina, & loturæ carniæ similes, aut similes Aquositas, effluit in istis Hemorrhoidibus, quas Vesicales appellant: Vid. FORESTUS l. 3. *Observ. 5. de Fluxum Hemorrhoidum Ichorodes*, etique Curam, videbitis in VELSCHT *Mor. pag. 2. pag. 61.* Sic & Seri acerrimi Fluxus per Hemorrhoides in quodam Arthritico observatus fuit.

Effluunt autem interdum Hemorrhoides sponte citra arbitrium, aut intentionem ægri: observavit tamen contrarium PANAROLLUS *Præcept. 1. Observ. 47. de quodam*, qui, si voluit, ex intentione intensè potterit pro-

Promovere & sistere hunc Fluxum Hæmorrhoidalem.

Hæc sunt Hæmorrhoides Fluenter.

Quod attinet Hæmorrhoides Ferentes, seu Cæcæ: hæc sunt nihil aliud, quam incipiens Inflammatio Ani: ordinario enim fere Insequentes se mutuo, ex impedito Sanguinis fluxu & refluxu per Venas Hæmorrhoidales; Sanguis enim evacuandus, dum propter clausuram oculorum in istis Vasis, & fibrarum vellicatarum strituram, non potest exire, nec remeare, nec cessare flagrat, inflammatione partium porulorum ardat, & in his subsistit, atque sic Tumorem ac Inflammationem inducit, sicut alia omnia Inflammatio oritur ex impedito Sanguinis motu, de quo alibi; unde Hæmorrhoides interdum suppurantur, & in Abscessus Ani periculosos degenerant; hinc impedito in his Sanguinis motu, Tumores & Dolores gravissimi inperueniunt. Talis ergo Cæcarum Hæmorrhoidum status est admodum dolorosus, adeo ut in tali casu agri dicant, esse ita dolentes, quasi perforetur Podex ferro candente: & quando volunt excrementa alvi eacernere, propter ingentem dolorem sapienti animi patiuntur deliquia; Imò dum Internum ita affectu sunt Hæmorrhoides, ex præterlabente hercule interdum tales oriuntur dolores, ut etiam convulsiones superveniant. Scio ego exemplum Mulieris hoc in loco, que quando volebat eacernere alvi excrementa, in animi deliquium, cum faciei tumore, rubore & incallescencia incidere ea iidem Hæmorrhoidibus Cæcis: simul ac verb excreta fuerunt hercula, cessabant omnia talia symptomata: Conf. BARTHOLINUS O. 4. *Histor. Anat.* 40. pag. 310. Externæ taliter affectæ præter dicta symptomata, tantum scilicet quam ambulationem admodum molestem reddunt.

Hæc Venæ ergo Hæmorrhoidales Cæcæ ex Sanguine flagrant, & in hoc loco conservato, tempore insignem contrahunt Tumorem, imprimis in Externis, qui Tumor subinde ad insignem magnitudinem foras prominens, adeo ut pateret LINDANUS in *Coll. manuscriptis super Hæmorrhoides*, se observasse Hæmorrhoides Cæcæ in tantum Tumorem auctas, ut pugni instar extra Anum foras prominerent. Sub isto Tumore subinde variam magnitudinem aique figuram Vasa Hæmorrhoidalia præsentant: unde a figuræ varietate etiam varia nomina sortuntur, & pro ut vel Verrucas, vel Urturum bacas, Mora, Ficus, &c. præsentant. etiam Hæmorrhoides nunc *verrucales*, nunc *thæci*, nunc *ficulæ*, alia *Myrica*, appellari solent. Tumor ergo hic variiformis cum sit, cauto opus Medico est, ne confundatur Hæmorrhoides dolentes cum Verrucis, Cruris, aut Condylomatibus aut: de quibus vid. RIVIERUS in *Prax. cap. de Inflammatione Hæmorrhoidum*. Tales Hæmorrhoides Cæcæ & tumentes nunc sponte disparent, nunc pericervant, nunc aperiantur, nunc fluunt; Imò si Sanguis flagrans non diluitur, aut dissolvitur, spontanea coagulatione indurantur, & in perfectos Scirrhos abeunt, quas exempla non sunt pauca: vel suppurate degenerant in Abscessus, ex quibus oriuntur Ulcera mali moris, & non raro Filibula. Prostat exemplum Intestini Recti ex Tumore Hæmorrhoidum Cæcarum scirrhos, imprimis in SANCHEZ in *Observat.* pag. 377. de Muliere mortua ex Hæmorrhoidibus Cæcis duricibus, quæ ipsa post mortem dissecta offendit Intestini Recti terminum sex digitorum longitudine Ad Anum usque kibitum & induratum: simile exemplum vid. in RIVERO. l. 3. *Observat. de Dolore & Inflammatione Hæmorrhoidum*, in Tumorem durum degenerantem. Item hæc Hæmorrhoides Cæcæ ex Sanguinis inclusi constitutione nunc mites sunt & benignæ, nunc malignæ, cancrose, gangrenosæ, &c. Effluunt autem Hæmorrhoides imprimis extra voluntatem aut intentionem ægri, & sponte Naturæ: nihilominus consuetudo, seu altera Natura, esse adeo potest, ut etiam Hæmorrhoides voluntario fluente reddere quæ: Exemplum habet PANAROLLUS *Anat. 2. Observ.* 47. de Sone, qui cum jam juvenis laboraret Fluxu Hæmorrhoidum fluctanti, in tantum illi reddidit familiarem eundem, ut, cum in senectute se aliquo modo male haberet, pro voluntate intendit potuerit promovere & sistere hunc Fluxum Hæmorrhoidalem, prout ipsi libere. Sane crebrius recidiva hæmorrhoidum Cæcarum, item earum generis in Gravidis, & difficulter Partientibus, esse instat Vaticum habere videtur. Vid. VELTHUSIUS de *Liens* p. 94.

PARS AFFECTA.

Subjunctum est Podex, seu inferior orificium Intestini Recti ratione Valsorum sanguiflororum.

CAUSÆ.

Causa affectuum hæc sunt recentiorum hæmorrhoidaliū, ut Sanguis vel fluat vel stagnet, sunt vel Internæ, quæ promovere, ita ut quasi sua sponte superveniant; vel Externæ, dum variè afficiuntur ista Vasa ab æternis occasionibus.

Quod Causas Internas: quocunque modo accidunt hæmorrhoidalia pathemata, omnia sunt præter naturam, cum hæmorrhoidales affectus naturaliter nemini contingant, adeoque semper eorum affectus præsupponat statum præternaturalem & morbidum. Hinc sicuti Mulieribus vizio Menstrui supervenire solent; ita Viris nonnisi hypochondriaci, aut etinde Scorbutici, vel spleneticis; uno nomine, Melancholicis affectibus ab acido vitioso natas, accidunt. Hinc rectè notat FORESTUS l. 2. *Observat.* 5. in *Sæculi*, quod isti, qui laborant hæmorrhoidibus, color faciei ad viridem nonnihil colorem declinat; testis AVICENNA: id quod in multis aliquando advertentes, solo hoc signo indoli eos hæmorrhoidibus laborare pronuntiavimus. Nempe semper præsupponitur Valsorum illorum Stimulus, vel irritatio, vel spina dissidens infixa, h. e. Fermentum salinum in Sanguine epasque Serro præternaturale, quod quacunque occasione; vel hereditaria ex vizio, vel ex præcedentis causis morbois contrahendum, nunc extertit occasio, nunc solentis eviscidam Sanguinis evacuationem suppressit causâ, ad ista loca delatum, vellicando loca ista tenilia, imò & fibrarum nervorum fibrilla, Sanguinis flagrantem seu conservationem, hinc Tumorem plus minus inflammationem tandem Dolorem interminum cum Fluxum inferre: Uno nomine: quæ sunt Causæ, quare subinde erethicior & chronicæ hæmorrhagæ Narum, five habituales alius Sanguinis evacuationes quopiam alitigunt; ex istis autem causis hæmorrhoidaliū pathematum, cum nonnisi excretionis loco differant, Conf. de tali Fermento vitioso, quod acri suo stimulo hæmorrhoidales affectus concitat, elegans Consilium CNOFFELII in M. A. N. C. *Ann.* 5. & 6. *Append. pag. 1.*

Quod Causas Externas: sunt ex variis, Motus nempe aut agitatio sub equitatione vel redione paulo laboriosior, Causis diuturnis, Saltatio, Purgatio, & similia, quæ tam in non dispositis, quam imprimis in dispositis, pathemata hæmorrhoidalia inferunt. Fœmine: etiam in ultimis Gravidationis mensibus, aut etiam, ubi difficili laborant Partu, Cæcis incurrit Hæmorrhoides in utroque enim casu motus Sanguinis circa Uterum & Anum nonnihil impeditur; partim Vasa propter Uterum angustata, in causâ sunt, quod tument Vasa hæmorrhoidalia, cum Podex imprimis non parum patitur, & ita occasu subministrat, ut flagret in Venis hæmorrhoidaliū, quæ flagratione tumescit Vasa, & inflammata part, dant hæmorrhoides Cæcas dolentes: utrum non observat ex tali casu natus hæmorrhoides, nisi in illis, qui ad Hypochondriaci seu Melancholicæ pathemata sunt proclives. Ac sane, quæ crebrius parit Mulieres, eo magis hoc affectus easperant: Purgationes quoque vehementiores non raro inducunt hæmorrhoidalia pathemata, partim ac precipue, quando particule medicamentis Purgantis relinque acres Intestini Recto visciditate sua perstacina adherent, illudque stimulant, quo occasione do facili dolor & inflammatio oriri solet; partim quando purgatione acres & salini evacuati humores circa Intestinum Rectum non raro do dolores excitant, & ibidem vellicando occasionem subministrant apertioni Venarum hæmorrhoidaliū. In specie hic acculari solet Aloe, quæ Venarum ora aperit, & hæmorrhoides citat. Effatum hoc est Atabum, a LEONHARDO tamen FUCHSIO, & JOHANNES JACOBO MANARDO, minus Atabibus faventibus, hoc reicitur: sed revera commune hoc est quilibet Purgantis magis refoctis, ut in dispositis Hæmorrhoidibus coarctent: sed MANARDUS in *Epist. Medicis* lib. 12. *Epist.* 3. pag. 226. ex potu Rheubarbari, ad observavit in Viro, quod etiam de Sennæ & Scammonii ad hæmorrhoides refert & CULFETUS in *Armen. Chirurg. Observ.* 76. Nimia etiam Sanguinis intestina commotio, v. g. nimia Incundia, uti quibusdam Hæmorrhagibus Narum, ita prædispositis ex causâ interna, vel ex Valorem de Intestini Recti relaxato toto, Hæmorrhoidales affectus inferit.

Ex quibus patet, quod Causa Hæmorrhoidaliū affectuum omnium sit tantum Sanguis evacuandus; idque vel propter Quantitatem sponte Naturæ evacuandus, vel pro-

pter

per Qualitatem, nempe Sanguinis agitatione, iracundia, vel simili motu factus rursus emittendus: maximis enim iracundis super venire solent Hemorrhagiae Narium: sicuti interdum Eustachia Causa irritans ad hos ipsos affectus disponere potest. v. g. Suppositoria acris, Frictiones fortes, violentior digitorum in Anum introitus: Vid. HORSTIUS & p. 46. serv. 26.

DIAGNOSIS.

Quod Signat Lumborum dolor sine manifesta causa ex febre, hemorrhoidum infantum est signum: Vid. GAREL-CHOVIERUS *Causa Chron. 65. Anat. pag. 91.* Distinguentur autem omnia fluxus hemorrhoidales verum, *Diarrhoea Crassa* acutior, quoniam alia vocant *Diarrhoea Serotina* mendosa: de quo videndum in specie HORSTIUS & p. 46. serv. 31. pag. 393. & 394. ubi se mentio fallacis hemorrhoidum fluxus, Scorbutici familiaris: qui ipse in hoc differt à vero fluxu hemorrhoidum, quod hemorrhoides vero artus uicemmentum imprimis à perianthe, & etiam cum excrementis una fugiens evacuetur; ob id etiam raro solet exernal sanguinem atque excrementa protrudere: si vero fiat, ut promiscue excrementis Sanguis tam ante quam post excrementa; vel etiam longè post excrementum sine dolore, tumore, &c. copiosius Sanguis effundatur; tunc suspitionem potius esse, nonne sit Scorbuticus evocatus, quam Fluxus hemorrhoidalis? Alius color faciei ad viriditatem inclinat, pathognomonicum fluxum est hemorrhoidum laborantium, teste FORESTO. Interdum insulso hemorrhoidum fluxu Occiput & Cervix valde dolent, dolique per totum dorsum descendere videntur, qui hemorrhoides fluentibus evanescit.

Deinde signa Hemorrhoidum internarum distinguenda à *Complanatione, Crispe, Ferrata, & alia* à Affectibus: Vid. imprimis in RIVERII *Pr. pag. 419. de Hemorrhoidibus Cap. 10. cap. 1.* Nempe à *Rhabdosis* distinguuntur, quod hoc sunt *Polypus* necesse: à *Complanatione*, quatenus haec rugum Polypus intermiscere oblonge, ejusdem cum reliquis illius substantiae sint, & extra Venarum quoque loca comparent, cum hemorrhoidum emittentis magis rotunda, nigra, & in Venarum tractum intrinsecus eascent: à *Thymi* five *perianthe*, quod haec sunt tubercula caecis, & enodis, qualia etiam in genitalibus utriusque sexus ab impuro coitu exoriri solent, flores Thymi figura emulantes, coloris candidi aut subrubri, ac doloris experti: à *Ficis*, quatenus, quoniam haec cumores pariter lervi & doloris sint, carnosius tamen majus obervantur, cum hemorrhoides nihil, nisi Venae Sanguine rursus erigunt.

PROGNOSIS.

Quod *Prognosis* certum est, hemorrhoides tam fluentes quam furentes esse peccata naturae.

Observanda sunt distinctio hemorrhoidum supra allegata: nempe Criticae aut Spontaneae, non nimiae, sed parvae, debiles & periculosae furentes, sunt saluberrimae: cum teste experientia & auctoritate Veterum, praesertim & curant Morbos, vulgò Melancholicos distos, alioque graviore Chronicos, ut inter Affectus Hypochondricos, Mania, Melancholia Hypochondriaca, Scorbutus, Scirrhi ac Tumores vicerum, & similia mala; & quando fluxus levis Menstruationis mulieribus, sunt similiter salutares. Sic exempla Virorum longaevitae ex hemorrhoidum periodico fluxu videtur in M. A. N. C. *Ann. 2. observat. 192. p. 326. Ann. 4. & 5. observ. 44. pag. 38. & observ. 69. pag. 37.*

Econtra chule, vel inaequales supplesse distos Morbos exasperare solent; sicuti in Scorbutico supplesse hemorrhoides mortis causa observatur: vid. M. A. N. C. *Ann. 3. observat. 331. pag. 343.* HIPPOCRATES *de Epid. 32. & 4. de Aphor. 22.* HORSTIUS *2. observ. 26.* & HIGHMORUS *Anat. p. 356.*

Hinc supplesse hemorrhoides, quae semel ex iterum fluant, non nocent, nec exacerant Chronicos Morbos, praesertim Arteriales, quae alii silem fluentibus non parum levatur.

Verum ubi fluxus hic fuerit nimius & copiosus adeo, eadem imminere pericula, atque quae hemorrhagiam nimiam quavis solent inquiri; nempe universum corpus debilitat, ad Hydropem, Tabem, simileque affectum disponit, in specie Visus ad exercitium Venturum omnino impotentes reddit, cum magno firmiterum tepio: conf. hic in *Prognosis* simul HIPPOCRATES *de Epid. 6. Aphor. 12. 22. & 23.*

Imprimis notandum est, quod distantes curanti hemorrhoides incumbat, ut una laudem severius aperta, qui aliis variis Morbi immiserent corpori: conf. DEODATUS *de Polypis p. 93.* item HORSTIUS in *Probi. Dorad. 6. Quaesit. 2.* quod illustrat *de AMATIILUSITANI* *Crit. 3. Curat. 3.* ubi ex emulso hemorrhoidum fluxu supplesso

copiosus Sanguis per os effusus fuit, & aliud mentis sanguinis (parum enim contraxit). Atque hoc imprimis evenit, quando simpliciter stringuntur Valvulae ora, sine Fermentis intestinali, sanguinem agitantis & dicta pathemata inferentia, correptione.

Hemorrhoides Caecae male curantur, seu ubi jam adfectu Inflammatio, non raro dant Ulcera, quae facillime degenerant in Abscessus, Ulcera, & interdum Fistulas incurabiles, in Anglia majorem utilissimum, interdum lethale.

CURAE.

In Cura primariè, ut in omni exactione, attendendus est Naturae motus, & constructio subiecti plus minus, vel sana, vel morbida, hoc est, Chronicis affectibus plus minus obiecta: Natura enim sola in quibusdam subiectis itaque minus naturalis hunc motum & evacuationem in saniem haurim insinuat, ut nempe majora mala vertat, Hinc

1. Hemorrhoides fluentes, seu fluere consuetae, ut suo tempore fluant, conservanda; quia mitigant majores morbos Chronicos.
2. Hemorrhoides consueti fluere suppressi, seu in Caecis degenerantes, aperienda.
3. Hemorrhoides nimium fluentes moderate sistenda.
4. Nunquam fluere consuetae, raro, aut in Chronicis saltem affectibus, in quibus pariter motus Naturae ad haec Valvula, & in subiectis tantum tali crassitudine opus habentibus, aut eam facile ferocibus, praesertim ubi, suppressi solent sanguinis evacuatione, Natura quasi sponte se inclinat, aperienda.
5. Hemorrhoides Caecae si non fluant, vel non ex eis sit, ut fluant, aut resistendo aut distinguenda, aut, si alias fluxant, aperienda.

Semper verò eorum dolor inflammatorius sistendus.

Ergo ista Remediorum genera pro curandis hemorrhoidibus Affectibus locum habent:

1. Quae eas aperiant.
 2. Quae eas claudant.
 3. Quae Appropriata & Anodyna dolentes discutiant.
- Pro illis scopis rite obtinendis notandum in genere, quod pro curandis hemorrhoidibus nimis aperta omnia contra-motus illa Remedia, quae in Diarrhoeis, Dysenteris, vel ipsa Choleris, aut etiam aliis quibusvis Hemorrhagibus, specifice conveniunt virtute. Caecis vero omnia illa easdem conveniunt, quae vulgò in morbis Splenicis, & restandis vicerum Obstructionibus laudari solent.

Motus autem, hemorrhoidalia pathemata, siue fluant, siue non fluant, existere non in exalté fasis, sed qui inclinant ad Affectus Hypochondricos, ira ut hemorrhoides sint consequens talium Affectuum Hypochondriacorum; hinc rectè dicunt Praedicti: Hemorrhoides in sua radice magis habere originem cum Affectu Hypochondriaco: Conf. *Miscellanea Curiosa Medica, Ann. 3. observ. 22. p. 40.* i. e. hemorrhoides in corpore sano constructi apparentes, sunt signum deficientis plus minus sanitatis, & Hypochondriacorum Affectum quasi confectus: adeoque Remediis huic Appropriatis, in specie Martialibus, & hinc Vegetabilibus Americantibus Aromaticis, eorum radicalis Cura trahenda est, non ferè modo, ac in genere Morbi Chronici & vulgò dicti Splenicis tractari solent. Martialis enim Fluens insulset, & Caecae vel facient ut disparant, vel aperiant, quod observatum est in Liqueore Martis Solari. Cum his misceatur simul Appropriata, ut Scrophularia, Millefolium flore albo, Crassula, Pilulae de Bello, Conf. W E D E L I U S Op. p. 224. & M. A. N. C. *Ann. 3. obs. 12.*

In genere Martialis, & hinc Appropriata in hemorrhoidali Affectum Cura utraque abolvunt paginam, Martialis quidem una eademque, citra additendum vel aperiendi respectum, promiscue in quibusvis hemorrhoidum pathemata conveniunt: quatenus Acidum specificè peccant in sui fonte corrigunt & alterant, unde effectus ejus morbosus facillè cessat: hinc Liqueor Martis Solaris, vel Solutio Martis cum succo Cydoniorum, item lo gravius malis Achedularem vius conducit. Externè vero imprimis conducunt Saturoina, in parte affecta Acidum peccans asorbentia & corrigentia: unde omnia Linimenta & Unguenta in mortuam plumbeo bene subigi debent, & Liquidis naturis Gessula, vel Saccharum Saturni addatur.

Quoad Media Caecis peritendis convenientia, consultum est, ut, antequam applicentur Aperientia, praemittantur Emollientia hemorrhoides Caecae, Balnea nempe ut Semina Emollientia, item Fomenta, imprimis parata ex Lacte tepido, vel solo, vel cum Emollientibus bullisio praefiantissima enim sunt ad compellendum dolorem hemorrhoidum Caecarum, observant id ZACUTUS LUSITANO

NO in sua Praxi, quæ sic interdum sponte solent referari? Emolliat verò aperiantur, vel applicando Hirudines, vel tridacna Folia in Flens recentibus modicè tripiç, quæ fortè impressione Lac acve ac ferè cunctum plorant, cum acripione Vasa tumefacta succedivè aperiantur, vel si hoc non sufficiat, illiungitur commodè cum Succo Syriacis, et quæ vel solo, vel cum Succo Betæ misto, imprimi debet, cum adde instillatione, vel dolor nimis urgat: Vid. HENRICUS ad HEER in *de Opisth. para. 6.* Vel tercipiantur Alia Acria, ut Succus Caprarum recens, vel solus, vel cum Aloe sub forma Linimenti mixtus: Item Succus Aperi, Bryoniae, Censaurii moriois, &c. extenit illius quidem spiritus: Suppositoria etiam ex Radice Cyamini si fida, hæmorrhoides fulgenter stimulant ut aperiantur: vel si Hiera picra cum Pulvere Colocynthis & Melle parata: pulvis Colocynthis, ut solus, aut etiam adjecto Felis bubuli, aut Felis porcini, cum Melle vel Oleo Amygdalarum amararum peroralibus in consistentia Linimentis, poterit etiam stimulare hæmorrhoides Cæcis & Canci tridacna fructuantes in Oleo cocti ad mellis consistentiam etiam aperiant hæmorrhoides, & imprimis in inertia inflammationem convenerunt: nisi dolor ac nimia inflammationis incrementum resistit. Omnia ista Remedia Extrema urgente plus minus inflammatione, ardore Ani, &c. tandem prius dantur in mortario plumbeo, donec lividum coloris ex Plumbei ramentis contrahat, sic & tucius applicari possunt: Plumbam enim convenit ad arcendam inflammationem.

Tandem Linimentum ex modica Colocynthis, cum Oleo Amygdalarum amararum probè mista, illiungitur etiam eadem referat: Item Castagium fadum ex Stercore columbino, cum Semine Staphylis & Lycopodium, similiter applicari potest. Succus & magna seu pulpa Galiopeidis, seu Urticæ mortuus, Furentes hæmorrhoides aperit. Valde quoque commendatur ad Obstusas hæmorrhoides quod sequitur.

U. Urtica vesica & sana sanam partem.

Quæ bulliat ad minimum per horam unam; desuper mectur & purificetur; addendo in fine

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Subjacet & firmiter exprimitur.

Quod si Calor adde hæmorrhoidum, prius addenda est Aqua Rosarum: si vero adde simul Pruritus hæmorrhoidum, addendum consilium de Succo Limonis, vel Aceto destillato, vel Aceto Rosato.

Hic ita permixtus erget collector in seile, & foras exit linco multiplici, si vero calidissime imprægnat, quæ licet tandem novè fortalido imprægnata admoveatur subinde, donec hæmorrhoides aperiantur.

Denique inter Apertis hæmorrhoidum Alia, & quæ Fluxum eorum promovere, nil melius est applicatione hirudinum Venis Ani, pro promovendo Fluxu hæmorrhoidum. Modus applicationis est: Illinatur locus cum Aqua dulci saccharata, vel Lactè tepida, vel Unguine animalium recenti, ut facilius hirudines adhaerant: si sufficiens fuerit, adpergantur Sale communi, cuius acrimonia senecties deciduat: vel illinatur locus Aqua Absterge: si interdum introperant in Anum, tunc ne intus fuisse malum inferant, incipiant Clystia ex Aqua salta, tunc si tali Clystmate hirudines deciduat, & tunc cum Clystmate ejiciantur. Cons. SENNETUS l. 1. Prax. ubi de Hæmorrhoidibus Praxi. 3. Quod si vero profundius delitescant Vasa hæmorrhoidalia, ac præsertim superiora, ita ut comoda hirudinum applicatio fieri nequeat, incutatur ZACUTUS LUTANUS l. 2. Pr. Admir. observ. 74. qui docet, quandoque per Cædibuturam applicatam erumitè manifestata sint: quæ alius super genum in parte externa applicata in hæmorrhoidibus suppressis, conveniunt.

Quod licet Remedia, promovere hæmorrhoidum Fluxum remedia Aloetica quæcunque, quatenus tempore parte sui resina circa partes Ani adhaerendo eadem stimulant, ut hinc facile Sanguis effluit, hinc Pilule Aloephagmæ, & ræione Aloes Aliis Proprietates, & similia, quæ ingrediuntur imprimis Aloe, item Myrrha, quæcunque sanguinis fluxu promovenda: item quæcunque Purgantia acrisia, & magis resinosa comode utantur dissolvant.

Theriac Hæmorrhoides tunc aptas quæ accitæ, si non videri fluxum, modo dicta eadem promovere, in specie Forus ex Emollientibus, si vero nimis fluxum, in tali casu suppurantibus. Suppurantibus tunc Remedia interna, quæ Materiam. Interdum conveniunt Rhabarbarum totum, cum Myrrabala pro cetera tamen Tamarindi: quos commendat RIVERIUS ad hæmorrhoides Fluxus: Ciste Quercus, et quæ his paratæ Consuetudo & Symplicum. Decodum Ligni Lentiscom præstare a nimio Fluxu hæmorrhoidum: Symplicum de Radis licitæ, utit vulgari,

est tamen efficax; BORSELLUS tunc quæ dea, observat. 51. vel feret, quod hæmorrhoidum Fluxus augere, ut Rha. ferret. totus per Symplicum: hinc aliquos adhibuit Symplicum de feno ens Porculacum, Myrritides, & Cydonispermum inter convenientes: succus Urticæ majoris ad An vel tres bullas, quæ perperam RIVERIUS: & c. Item. Item duo vides liquore Rha coria aliquis bullas, aut ex hoc paratam Symplicum, & c. Adhuc, quæ, dicitur quæque Hæmorrhoidum mirabiliter effluunt, ita in specie Fluxum hæmorrhoidum. Deinde sagaciter in per ordinario aliquando contrariatur a regimine etiam experimetur est BARTHOLOMÆUS ad. Ad. Hæmorrhoides, l. 1. p. 165. Dea. Eius maris esse hyponotam præparat de affluens, feni. D. MACHAELS de ræpim. causa Hæmorrhoides nimis fuerit, ut quæ Deute esse iam curabat feri Annulus pollicis Pedum applicandis, quibus hæmorrhoides felici cum successu compotitur solebat. Ossis Microcosmi præparata, item Trochiscus de Carabe, quæ a 36. ad 38. ultrapari possunt, conveniunt: Item de Terra sigillata, & in genere omnis ex Remedia: quæ in se ad Hæmorrhoides nimis laudantur item quæ de Vinis Rhabarbari interperat commendata, ex ferè ad Acidi absterge ferè insinistrata sunt, hic pæpimè conveniunt: speciem Martialis omnia, quæ uti Acutum quæquæ hanc absterge: ita hoc ipse in Vitioli quæ naturam digerent, & si vult hanc apertum servat, cum simul sanguinem coagulandis, & ceteris eam quæcunque, & speciem per hæmorrhoides Vitioli, & ceteris, ut Tinctura Martialis, Tinctura Sulphuris Vitioli, Tinctura Vitioli Martialis, & ceteris, potius Tinctura Anapholica, aut Lique Martis Solaris, aut Crocus Martis percipit: Capis Hæmorrhoides & similia. Item. Item. Item.

U. Aqua Symplicum.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

Urtica parva sine Galiopeidis infusa.

sum, cujus felicem successum aliquoties observatum in *Colicis* *jae* confirmat; imprimis si adhuc Pulvis subtilissimus de Corticibus Quercus adspargatur, qui insar pollinis adhaerere, & alius in Dynteria est magnam remedium. Tandem Terra Vitrioli dulcis rite edulcorata, vel iola cum Bombace applicata, vel cum albumine Ovi subacta, aut cum Succo Plantaginis in Linimento consistens testacea, & ita applicata, egregie confert: Item

Unguent. de Taria,

Ol. Myrris, q. l.

Misc. pro Linimento: S.

Unguentum Lemitum.

Vel Unguentum de Lithargyrio, vel Tutia, cum Cincra Oleaceum subactum, compescit nimium Hemorrhoidum Fluxum; item Sulfumigium raris Ugulae aquinae.

Vena scilio in Brachio, quomodo utriusque, non adeo necessaria videtur, nisi insar occasum solens suppresse sanguinis evacuationi Hemorrhoidum nimis mactuatur Fluxus. Quando autem Vena scilio locum habet, tum in corpore pleno, superiore potius Vena aperitur, quam inferiores (v. g. in tumore nimio plus nimis inflammatorio, aut dolore nimio, cujus occasione alia metuenda symptoma, aut nimio etiam fluxu &c.) potissimum si hemorrhoides non sint provocandae; Venis namque Mallooli apertis, interdum Sanguis magno cum impetu ad partem affectam ruat, unde excruciat malum, & inflammatio aut gangrena accedit. Aliis corpore non aquo pleno, aut Sanguine non adeo urgente revellendum est Salvetella, antequam Hirudines applicentur. (H) v. RHODIUS *Anatol.* p. 485. & 486.

Quod si vero hemorrhoides Caece non aperiantur, nihilominus tamen admodum dolentes & tormentantes discutiendae sunt, praesens dolore, Anodyna, ut Lac, Opia, Decodum Foliorum Hyoscyami in Lacte chalybeato, ac similia sub Focis forma, vel cum spongia, vel cum lineoleis multiplicatis, calide applicata egregie confertur. Imprimis tamen quaedam Specifica crebriori experientia hic conveniunt: Probata hic Momordica planta insigniter vulneraria, & imprimis Ulceribus Mammarum dicata, cujus *Practica* sive *Vena spissa* & rubicunda in Oleo communi, vel Lini, vel, quod melius est, in Oleo Amygdalarum dulcium infusa, dant nobis Oleum non laetem Vulnerarium, & ad quavis Ambusta, sed in specie ad hemorrhoides Caece optimum. In Muliere quadam, quae ex Menibus imminutis dolore hemorrhoidum afflictebatur, feliciter huius tentavi experimentum. Post Momordicam eminet hic etiam praeteris Verbalcum, & ex Floribus ejus infusum paratum Oleum. Verbalcum certe appropriatissima est planta ad Caece & Fluentes hemorrhoides compescendas. Applicatur variis modis; praecipuis in Lacte, vel in Aqua fetiarum, vel Vino adstringente cocta Folia, vel Flores Verbalci infusa Suffusa, vel Fomenti spiritibus in sella perforata, optime curant hemorrhoides. Experimentum hoc est MYNSCHTII ad Condylomata & Hemorrhoides Caece. Aut Flores Verbalci & Sambuci simul Sacculo inclusi pro Fomento in Aqua simpliciter, vel Lacte bulliant, & ita applicentur: aut in graviore dolore, ubi Verbalci Foculi solus non sufficit, imitetur FORESTUS l. 23. *Osfera* 6. in *Sibol*, qui alia remediis irritis dolorem hemorrhoidum intantum, & qui nullis aliis fodiari poterat remediis, feliciter curavit Foculi Foliorum & Florum Verbalci, sive Thapli barbat, in Aqua cum semine Hyoscyami cocti, quo ipso omni dolore evanuit. Quidam recipiunt Laum Verbalci, hanc cum Terbinthina miscunt in formam Pilularum, quibus Suffus tentatur ad hemorrhoides compescendas, id quod experientia comprobavit. De Floribus Sambuci dicti jam. Quidam etiam pro eodem scopo faciunt Cataplasmata ex Pulv. & Floribus dictorum Simplicium in Lacte decoctis, & applicant cum fructu: est sane egregium. Quod si inflammatio praesens, aut haec multum progressa sit, convenienter addantur Folia Portulacae, quae addita, in ista scilicet, valdeper commendantur.

Post Verbalcum & Sambucum nota sunt Folia Mandragorae, ut ait ratio: nam Mandragora ex Solanorum genere non parum conpindam habet nocolin: Item Folia Solani

Tom. II.

finioli, Portulacae, Hyoscyami, Flores Chamomillae, & similia. Post Verbalcum eminet Linaria, quae res notissima est, quod sit usum ex primariis Specificis contra furorem hemorrhoidum, quocunque modo usurpetur, cupis Oleum, aut etiam ex Linaria, vel sola, vel cum Floribus Chamomillae, parati Foculi in Lacte cocti & applicati, item Linimenta, Unguenta, &c. cum Sevo Hircino, sunt singulissima Specifica HARTMANNI p. 160. §. 3. in *Pr. Chym.* HORSII l. 4. *Obf.* 50. & HOEFERII in *Nov. Med.* p. 95. Nam certum est, quod ex Linaria quocunque parata sint expertissima in Caece hemorrhoidibus.

Linimentum laeqens in dolore & tumore Venarum hemorrhoidalium pletumque Caeceum inter Topica varia palmarum sibi praeripit, quod parat ex Herbis & Floribus Linariae coquendo cum Adipe portico: cui expresso praeper refrigerata vitellum Ovi permiscetur, & cum Lana aut Gossipio parti dolenti applicatur. Hoc Linimentum confectum ad miraculum filit dolores, referente JOHANNES WOLFFIO *Adversus Haesitas celebrissimum*, qui hoc Secretum Principi suo Haesit Landgravi revelare noluit, donec ipsi annuam Borem bene signatum promitteret (1). Vid. SCHONFELDERS *Med. p. m.* 50. VOLTERUS, in *Rebela Obsterica* p. 132. laudat seqq.

U. Herb. Linar. cum Her. lq. M. l.

Myrr. M. l.

Ol. Rose.

Verbalci, an. 3ij.

Bady. res. 3v.

Coqu. & exprim. per pannum: suant denud adijciendo

Sal. Linar. M. l.

Esprine & adde

Vitell. Ovor. No. iij.

Misce.

U. Herb. Linar. M. l.

Flor. Verbalci M. l.

Sambuci M. l.

Sem. Fennigr.

Lini an. 3l.

Infusa & coctula D. S.

Species ad Potum.

Coquantur in Aqua vel Lacte.

Decodum lundatur super lateres calcassos, in sella perforata excipitur Suffusus; post hoc Decodo immituntur linteamina, & sub forma Foculi humidus applicatur.

Foculi urticae Urinae hemorrhoides tumentes curat: Vid. VELSCHIUS *Militemia*, Cent. 1. *Obf.* 37. *concreta* Anno 4. & 5. M. A. N. C. Modum parandi Linimenti habet, uti dicitur, HARTMANNUS, & in ZWELFFERII *Pharm.* *Obf.* etiam ejus est discipulo: v. g.

U. Unguent. de Linar. 3vj. vel 3l.

Ol. express. Sem. Myrr. 3j. vel 3ij.

Sacchari Saturati (in ardore & inflammationis metu) 3ij. vel 3j.

M. pro Linimento.

Cautelem audietis in fine.

Liquor quoque simpliciter ex Floribus Linariae putrefactis egregie anodymus in hoc casu colligi potest, atque ex Floribus Sambuci & Verbalci.

De Oleo Momordicae supra locutus sum. Quidam etiam commendat Oleum, in quo Bacce Herbae Paridis cum modico Vino coctae sunt, quod dicit Linimentum revera elegans, uti hoc in hemorrhoidibus Caece ac Pudentibus in Puerpera observavit GESNERUS, ac commodè cancrois hemorrhoidibus quolibet ex Bacis hic remedia applicari possunt. Pertinet hoc Oleum septem Florum *Myoscyti*, item Oleum Seminibus Papaveris & Hyoscyami, in specie Oleum Alclorum, aut etiam Scarabaeorum stercorarium, Germ. *der Mist. kafer*, quae sunt singularissimum Specificum in dolore Caeceum hemorrhoidum: ex quibus, cum Oleo Carvi vel Lini infusis, pluribus permixtis, sunt Olea expertissima contra hemorrhoides dolentes & tumentes. Oleum & Cineres Scarabaeorum sapienter expertus est in Caece hemorrhoidibus BIERLINGIUS in *Adversar. Curiof. Centur.* 1. p. 49. URSULAE CARTESIÆ,

S 2

Prin-

(H) *Esq* verum esse credam, posse *ja Vena scilio* in partibus corporis inferius patui, quam superius, Sanguinem variè determinari, ut ad haec vel illa membra abundantius fluat; Nihilominus si in Brachio Vena secunda sit, perinde est donec sit Salvetella, ac quocunque alia Brachii Vena fecerit. Nam quomodo Sabotella rarus sit Venarum Brachii, ea aperta, Sanguis eandem viam determinatorem acquirit, ac si vel Cephalica vel Basilica aperitur.

(I) Hinc quidam, ut cum Medico invenit gaudente jectatur, vulgatum verbum Botanicis familiarem ad Linaria ab *Egula* differens, *Egula* laescat, sine lacte Linaria crescat, *Epula* sic deformavit, *Egula* uil robin, sed dat Linaria Taurum.

Erucicifera Italia Patavina in secretis fuit *Oleum Afellærum*. Nempe *Afella* contuli coquantur in *Oleo giaculo*, aut *Lini*, aut quod optimum cum *Oleo nucum expressis*: In tali quodam *Oleo* etiam sine coctione in cucurbita probe elausa, aliquandiu digeruntur, hanc *Oleum* ex his experimentis nobilissimi & singularissimi usus ad *Hæmorrhoides*. Eodem modo cum *Scarabæis stercoracis* *Oleum* & *Linimentum* anodynum ad *Hæmorrhoides* efficacissimum parari potest, quod valde commendat *SOLEMANDE* s. 4. *Conf.* 30. Quidam parant *Unguentum* ex modo dictis *Oleis*, quod externis *Hæmorrhoidibus* cum modo potest illiniri; in *Hæmorrhoidibus* vero intus latentibus sub forma *Suppositorum* immitti, ut pertingat ad partem affectam, hoc modo;

℞. Afellæ confus. ʒi.

Ol. violac. ʒi.

Coq. & colentur, adde

Cera ʒss. plus minus, prout magis vel minus desideramus Unguentum fluidum vel crassum.

Misce

Certum est, quod *Afella* in Chirurgia in composendis doloribus nimis *Hæmorrhoidum*, in *Ulcibus* & *Fistulis*, in *Ulcibus Mammarum*, non habet par remedium: conf. *FONSECA* l. 1. *Conf.* 37. & *BORELLUS* c. 1. *Ol.* 63. de usu *Mellepædi* in hoc casu, *Oleum* *Buxi* infigne est anodynum, propter quam causam etiam applicatur *Hæmorrhoidibus* dolentibus, non minus quam *Dentibus* in *Odonalgia*, in qua est singularare. Sunt qui putant, hoc *Oleum* esse *Oleum Heracini* *Rulandi*; sed falsum est, paratur enim illud ex *Corylo*.

Tandem in usu etiam sunt contra dolorem & tumorem *Hæmorrhoidum* *Cæcarum* *Mucilagines* *Seminis Psyllii*, *Lini*, *Cydoniorum*, nunc solæ, nunc cum *Saccharo Saturni* & *Campora* pauca mixtæ: quibus etiam parum *Opii* addi potest in graviore dolore, & ita applicati, ac speciatim in *Hæmorrhoidibus*; siquidem in his, etiam in externis *Remediis*, ex præpollent, quæ acidum illud, unde *Hæmorrhoidalia* pathemata oriuntur, vel absorbent, ut *Saturina*, vel vinopulsa alcalina corrigunt & temperant. Quibus *Mucilagibus* in ardore ac inflammatione commodè adduntur *Succus Portulacæ*, & *Succus medii Corticis Sambuci*;

Vel

℞. Mucil. Sem. Psyll.

Cydulæ.

Lini cum Aqu. Refar. par. an. ʒi.

Butyri rec. non saturi ʒi.

Mucil. Ovar. no. ʒi.

Ol. rosæ. complet. parum.

Agitentur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, ad colorem lividum ulque, f. l. a. *Linimentum*, nequam egrégium in inflammatione, ac dolore *Hæmorrhoidum*: s. *Unguentum Lenitivum*.

Vel

℞. Mucil. Rad. Alib.

Sem. Cydon.

Lini cum Aqu. Refar. par. an. ʒiij.

Ol. Ovar. ʒi.

expressi Sem. Hyos. ʒi.

M. l. Linimentum in mortario plumbeo.

D. s. ut antea.

Oleum enim *Ovarum* in mortatio plumbeo agitatum; dolorem maxime lenit.

Hinc aliquoties ad hujus imitationem cum fructu præscripti;

℞. Mucil. Sem. Cydonior. cum Spiritu. Ros. satr. ʒi.

Spiritus Vin. camphorat. ʒij.

Sach. Satur. ʒi.

M. l. Linimentum: s. ut antea.

Quo linteum humectatum applicetur crebrius.

Balsamum Sulphuris ad extra, i. e. cum *Oleo Hyperici*, aut *Nucum*, aut *Seminis Papaveris* expresso paratum, appropriatissimum est, & nobile experimentum *RULANDI* contra *Hæmorrhoidalia* pathemata: cui affertur *FONSECA*, qui mirè laudet in tali casu imò in Secretis esse habundantem *Cribit*. Interim tamen in hujus defectu & *Balsamum Sulphuris terebinthaceum* non incongruum est ad hanc ipsa dolentia pathemata, quod fuisse & discutit dolorem. Posterior hoc compositum paulo acrior est: addatur ergo *Saccharum Saturni*, vel *Campora*. In *Hæmorrhoidibus* cum inflammatione, gangrænâ incipiente, ac tumentibus pugni instar, sequenti *Linimento* uxor *NAVARRÊT* proximam decursu restituta est:

℞. Ol. Ovar. ʒi.

Balsam. Sulphuris.

Ol. Philis. an. ʒss.

Misc. per Linimentum.

Videatur *BLEGNY* Tom. 1. *Ol.* pag. 16. Ubi deficit verum *Balsamum Sulphuris Rulandi*, tunc

℞. Plur. Sulphuris:

Misceantur uidi cum *Terebinthina*, aut *Oleo Terebinthina*, & applicentur.

Vel ad imitationem hujus *RULANDI* in *Carat. Empir. Carat. 1. Carat. 7.* contra dolorem & tumorem *Hæmorrhoidalem* applicetur *Sacculus* ad *Folios Quercus* & *Glandibus* contulis paratus, qui in *Aceto collosus* & applicatus; ut ipse loquitur, miraculi instar dolores fessit *Hæmorrhoidales*. Unde ad imitationem *RULANDI* hunc *Sacculum* in usum quoque vocavit *LOTICHIUS* in *Observat.* pag. 529. & similiter se esse expertum scribit. Loco horum sunt *Emaculi* ex *Furibus triticis*, & *Floribus Verbaici*, quæ invicem cocta applicantur.

Denique *Scrophularia* summum esse remedium, quod singulariter & super alia convenit in quibuscumque *Hæmorrhoidibus* affectibus, in quocunque statu fuerint; multiplici adhibetur usu, interno pariter ac externo: nunc cum hanc *Radia Scrophulariæ* Autumnum collectæ, amuleti instar seculum gestata, aut coxæ alligata in regione dorso, ut femora attingant aut cutim, singularæ experimentum est ad *Hæmorrhoidalia* pathemata, fluentes alimur sibiando, atque Dolentes, & Cæcis dissolvendo: vid. *HORSTIUS* & *SCULTETUS* in *Artem. Chirurg.* Tab. 42. pag. 374. Theriaca etiam cum *Saccharo Saturni* lineolo molli suscepta Potius intrudi potest: c. 8.

℞. Theriac. ʒss.

Sacchari Saturni ʒi.

Cum f. g. *Olei Memor.* misc. in formam *Linimenti*. Interdò ulteriores *Radia Scrophulariæ*, vel etiam *Foliorum Pulvis* usurpantur, cum cibo vel potu capiendò, dolorem omnem statim sedere, sepius expertum esse affert *HEINRICUS* ad *HEER* *Observ.* 20. sive ipsa subsistat sicca, aut viridis, sive decoctum affumatur: Conf. etiam *SCHULZII* *Consil. Med.* p. 207. Sicuti eadem *Radia* in retibus disticta, s. lo annexa, & Vino infusa, alimur Fluxum *Hæmorrhoidalem* compescere solet. Patiens nempe de hoc novem diebus in nimio Fluxu bibat: post Radices exprimat, & siccetur, ac eo modo, quo siccantur Radices, etiam *Hæmorrhoides* immineat, & quas siccari, ac alimur dolorem cessare, afferunt. Si vero rursus aperire velimus, Vino vel Aquæ simplicis rursus imponende sunt, atque tunc iterum nonnulli haudent. (K) Caravi Mulierem juvenulam, quæ occasione primi partus difficilis *Hæmorrhoidum* Cæcarum dolorosissima pathemata contraxit: duravit hoc malum integro anno: Post partum denud gravida facta, longè pejus habuit, non secus ac in subsequente puerperio, ita ut interdum ad plures dies alium suppressere cogere, motu insani *Hæmorrhoidalis* doloris: supponebantur interdum, & gravi cum dolore pus fundebant. Hinc tentandi: gratia tempore autumnali totam *Scrophulariæ* plantam transivisti, ut Radices quasdam femoribus alligaret, & quasdam una cum Foliorum incisâ, nodulo inclusit, Cerevisiâ infunderet, & inde ordinariè biberet: Folia quædam minutim conciliâ omni matutino tempore cum Pace butyro assumat. Horum unum per unam alteram septimanam continuatè egrégè convalevit. Item sola recens hanc *Radia* sciam cum Butyro dat Unguentum singulare ad *Hæmorrhoides* dolentes: vel ex Radice rectè collectâ Autumnò benè mundatâ & contulâ in mortario lapideo cum Butyro recenti, fiat Unguentum, quod in oïla nova elausa per dies 15. in cella, aut fimo equini, aut alio loco humido, reponitur: sed in liquefacta scilicet feni igne Butyro exprimat, & cum Pinguedine humana servetur per Linimento egrégè & singulari contra *Hæmorrhoides* Dolentes. *SOLEMANDE* s. 4. *Conf.* 20. mentionem facit cuiusdam Chirurgi, qui omnes *Hæmorrhoidales* affectus certò curavit, sive sint Dolentes, sive Tumescentes, sive Fluantes, scilicet per Herbas integras *Scrophulariæ* & *Craulæ* majoria cum suis Radicibus; macerat easque, seu infundit in Cerevisiâ, & ita infusi hujus mane & vespere bonum haustum offert: Nam quantum illa hanc *Craulæ* majoris Radix vero tempore, dum primo folia protrudit, & aliquot ejus nempe nodi, saltem caerulei suspensæ, ut circa lumbos cutim attingant, conferat, in *Hæmorrhoidum* Cæcarum dolori.

(R) Simile quid narratur de ea Sedi specie, quam Vermicularum vulgò vocant, quod scilicet quomodocumque tunc radices ab agro asportata sensim succedant, sic *Hæmorrhoides* tumentes sensim quoque curentur. Sed de Amuletis ut, & Curatibus Sympliciteriis alibi dicemus.

loribus, ex quacunq; causa natis, videbitis in *Mellefolio* *Cornifol* *Med. anno 2. observat.* 195. p. 596. & BARTHOLINI *Alia Hæmorrhoid.* Vol. 1. cap. 51. Id quod probatur aliquando in *Strudilio*, Hæmorrhoidibus Cæcis admodum afflato, qui hoc usus Amuletis egregie convalescit. Crassula hæc major vocatur Sedum Telesium (L.), Ger. *die fette Heune*, & singulariter commendatur ad Hæmorrhoides Dolentes, etiam in dolorosa affeibus Alvi, interno & externo usu imprimis si ejus Radix cum primū turgentibus primo Vere Folis contundatur, & teratur cum Oleo Rosarum, hinc coquantur blandè ad humiditatis superflue evaporationem & consolidationem Linimenti, & ita applicetur in forma Unguenti: Convenit egregie in dolore & ardore Hæmorrhoidali. SOLE-NANDER & c. testis ferè, quibus verbis sufficienter commendare debeat ad quæcunq; hæmorrhoidum vitia. Chelidonium minus, idque usq; tam interno quàm externo, Flentibus siliis, Dolentes verò aut Tumescentes perficte sanat. Herba siccata infunditur Cerevisiæ: Herba verò recens contusa, aut Succus expressus, si extrinsecus admoveatur, certa experientia idem præstat: hoc modo Empiricus quidam omne Hæmorrhoidum vitium curabat. Aqua destillata adhibita eos curavit, qui ferè Hydropici facti fuerant nimio profusio: Planta contusa Oleo incocta ad Unguentum contra quæcunq; Hæmorrhoidum vitia in specie contra Hæmorrhoides Dolentes & Tumescentes: Flores etiam & Folia mane comeduntur: in specie si Radix hæc appendatur, tanquam singulare Secretum ad Hæmorrhoides commendatur. Quidam

Y. Pulv. Rad. Scrophular.

Chelid. min. an. ʒi.

Cum Ol. *Verbasif.* Linimentum magnæ laudis ad Hæmorrhoides.

D. S.
Unguentum Lenitivum.

Vel

Y. Herb. Chelid. min.

Lin.

Flor. Verbasif. an. M. l.

Rad. Hypericani.

Scrophul. an. ʒi.

Es incit. & contus. i. sacchari, Lacti incoquendi.

D. S.

Sacchari Lenitivi:

Vapor Decocti in secula perforata excipiatur Ano, postmodum Species Decoctiois Sacculo incluse applicentur calidè loco dolenti, vel ex sicca forma, vel immerit prius in Lac Decoctiois.

Y. Herba Linar. M. li.

Flor. Chamæm.

Verbasif. an. ʒi.

Rad. Scrophular. ʒi.

Sem. Fœugæ.

Lin. an. ʒi.

Incit. & contus. D. S.

Species Lenitivæ.

Decoctum Millefolii intrinsecus crebrius usurpatum ad sedandas Hæmorrhoides Furentes, & abstergendas Fluentes, est nobile: Vires hujus Decocti videb. in *obs. 5. Riveriana*, communicata q̄b & Pacheco: Pulvis item Millefolii & Tormentillæ. Huius addenda est Theriaca recens, que linteis illita, Hæmorrhoidibus recentibus Cancris impolita, brevi dolore compescit.

Tandem fit hoc Unguentum compositum.

Y. Balsam. Sulphur. imprimis cum Oleo Hyperici

par. ʒi.

Ol. Myrrid. ʒi.

Sem. Papav. expr. ʒi.

Sacchar. Saturni. ʒi.

Camphor. gr. vii.

M. f. Linimentum: S.

Unguentum.

Camphorum non immerit addo: nam mirabile est remedium ad Hæmorrhoides dolentes; si eius ʒi. ad ʒi. subigatur (nam non dissolvitur) in Aquæ Malvæ, vel Rosarum ʒi.

& ita applicetur cum linteis ad dolentes & ardentes Hæmorrhoides: v. g.

Y. Ag. Fl. Verbasif. vel Funiculi ʒi.

Camphora cum Oleo Amygd. sol. ʒi.

M. D. S.

Mistura Refrigerans.

Et cum linteis duplicatis applicetur rursus Ani.

Vel

Y. Ag. Rosar.

Flor. Verbasif. an. ʒi.

Spiritus Vini camphor. ʒi.

Sacchari Saturni ʒi.

M. S.

Mistura Refrigerans.

In immenso ardore & dolore egregie quoque convenit Linimentum ex *Ceraffa* part. ii. & *Camphor.* p. i. cum paucis *Spiritus Vini camphor.* illinendum (M).

Quod & Chronicis fidi sunt, & quasi Habituales, affeibus dolorosi Hæmorrhoidales, speciatim post Mercurii emanationem, convenit egregie Fonticulus in Tibia: Vid. VEL-SCHIUS *Hæmorrh.* 2. p. 50. & ZACUTUS LUSITANUS 2. 2. *Præsent. admiranda observ.* 3.

Hæmorrhoidum Excrecentium Cratoneum facilem, & tutam videb. apud RHODIUM *Cons. 2. observ.* 94.

Circa adhibitionem Unguentorum in Hæmorrhoidibus Cæcis dolorificis notanda, & observanda verba WEDÉLII *Traité de Comp. Medicamentorum* p. 135. *Lect.* inquit, *quod amari adeo Prædictis deprædicatur Unguentis, & in specie de Linariis, in eo causa, incit tamen, quibus observantibus id conformari scripsimus, si scilicet aliquoties observaverimus, hæmorrhoidibus Cæcis dolorificis minis lege præfuisse, quia potius dolorem ferreum quam intendit. Dilatant enim magis sellulas Venerum, feridius ibi collectam, vel sanguinem citius feridum feridiusque exasperant, transpirationem præbent, &c.*

Molestum symptoma est, quando Puerperæ hæmorrhoidibus Cæcis affliguntur: melius enim est, ut promoveatur Lochiorum Fluxus, ne his suppressis excitetur hæmorrhoidum Inflammatio. Cùm enim fiant Lochia ex Venis Hypogastriæ, ex quibus oriuntur Venæ hæmorrhoidales, facile fit, ut sanguis etiam illic infuset, agnet, & Inflammationem Alii inducat: In tali casu prodest illud Linimentum ex Decocto Raccorum Paradis in Oleo cum modico Vini, quod antea laudavi, cujus Olei illinitio statim dolores cessare facit, ut expertus loquitur GESNERUS in *Epist. l. 1. pag. 11.* Item Experimentum FORESTI est: Nempe.

Y. Ciner. Suberis, Germ. Panisfol. helix, qu. v.

& cum ana visellii Ovi & Olei Rosar. aut Ol. Sem.

Lin. f. Linimentum nobile.

Quod frequentius feliciter usurpavit FORESTUS in dolore hæmorrhoidum Cæcarum: Vid. *ib.* 21. *obs. 25.* ubi nobilis Mulier, quæ in Puerperio semper dolore hæmorrhoidum valde affligebatur, aliis multis frustra tentatis hoc Linimentum præsentaneum semper levamen percepit. Locus hic probè notandus est, quia multa in se continet, quæ huc spectant: Conf. HARTMANNUS in *pr. Chymiatr.* p. 160. Cum Oleo Myrrino, quod similiter commendat LINDANUS in *Comm.* ad hunc locum: loco hujus infundi potest Coryledon, adhectis guttis Libanoticis coronari: vid. VELSCHIIUS *Medicam.* *Cent. 1. obs. 38. annex. M. A. N. C. anno 4.*

Si nimius adit ardor sub dolore, commodè Suber cum Oleo Rapistræ, quod LINDANUS loco Olei Myrrini sumit, aut in defessa hujus cum Oleo Lin. probè miscetur (per eo enim dicit, quod valdeperè conveniat in dolore hæmorrhoidum Cæcarum) in mortario plumbeo in Unguentum, & aliquantum Succo Sempervivi, seu Sedi majoris addatur, cum tantillo Cerevisiæ & Cera: sic enim fieri inquit, ut statim cesset dolor & ardor hæmorrhoidum Cæcarum. Potest etiam Camphora addi. Alias in simili dolore applicatur Saccharum Saturni cum Aqua Rosarum est elegans, quod similiter etiam ardorem sistit.

Et hæc fuerunt hæmorrhoides Cæcæ dolorosæ.

Denique non raro Exulcerata sunt extrinsecus hæmorrhoides dolentes, & in Abicissas degenerant, ad quos Experimentum est

(L.) Est potius Anacampteros, vulgò Faba Crassa J. B.

(M) Nescimus familiare est Unguentum de Malis insanis, seu fructibus Melocagena, quo cum maximo æquum levamine usq; Fecula quidam, immensus pecunia vim coegit, referent noster Jos. Donzelio in Theatro Pharmæ Secretum ferè in mortis agone revocavit: Recipebat Mala insana, eaque contrita Oleo rosato sepeliebatur, facta deiectione percolabatur, addebatur Ceraam ad Unguenti consistentiam, & Viridis Aeris tantillum. Postea Viridis Aeris acris Serri portione ex Fecis turgentibus usque dolentibus prælicebatur, cum euphorbia. Sic Japenatur videmus: Hæmorrhoidum dolores ferè datæ applicatione Unguenti restat, cum Cremore Tartari, & tantillo Opii, oblique sensu scilicet sensu parit, & salta ex Tartari, mixtū Serri aliqua transfundimus.

est singulari Domini BOYLE Philof. Experim. T. 2. Sect. 1. p. 271. Edam ex Oleo Amygdalarum dulcium cum Auro fulminante, Ulceribus & Apoplethibus, ex hemorrhoidibus natis, applicandam. Facit etiam mentionem bu-

jus BARTHOLINUS C. 4. Epist. p. 513. ex communicacione ex Anglia facta. Præ cæteris vid. AGRICOLA in Chir. parva pag. 594. COUL & VELSCHIUS Method. 2. p. 61. (N).

A. R.

(N) Subtiliam hoc loco Historiam Medicam Hemorrhoidum, mira varietate, horrendis cruciatibus, ac summo tandem evenu Nobilium Mulierum affligentem, quem olim conscripserim ad Celeberrimos, qui in Europa erant Medicines Professores pro Consilio, dum Ægra adhuc viveret, mittendam.

Neapoli 9. Maii 1715.

Excellentissima Domina fræ quodam generis gracilem ab ipsa crepandis fortis corporis habitum, vigesimo tertio ab hinc anno, quartæ à prima conceptione mense, absque præpositi evidenti abortum passa est: ac quem anno sequenti demum concepisset, septimi mensem Fortem iterum immaturè excludit: quo tempore primam Hemorrhoidum tumorem pati cepit, & tolerabili tamen molestia. Id non tantum quin duobus successivis sequentibus annis marem primò, deinde femellam, naturæ partu tempore, atque etiambus 1712, & 1713, & opportune cadentibus, in lucem produxerit. Hoc eodem anno quoniam maritus morbo, cui primus ibi morbi videbatur, Cachexia scilicet laboravit, Versum Chalybeatis adhibitis medicamentis, integri eliminata fuit.

Præcipuo hincj sæculi, quem Ægra ducitur in Fæbris corpore affligi, in illius declinatione ex critica, coque immoderata Diarrhæa, Hemorrhoidum morbo: cruciatibus capitis tumorem etiam majorem cum doloris sensu consensum affligentem, ac tandem Sanguinem, sed libenter sensum excludere coepit. Ad post biennium, quoniam ferreæ rerum difficiliorum necessitate ad plures dies, & ad plures dies horas Ægra & festius, pro demum itaque, tumore scilicet, ac hoc ibi Cruræ apparuit. Ex quo tempore, morbi indolis est consuetudo, ut alvi fæces egeret volens, quod omnibus matutinis accideret subito (N) Hemorrhoides immensæ, tum magis, atque extra pedibus consensu exuberantibus, Sanguis cum doloris, & gravitatis sensu, tunc majori, tunc minori copia profunderetur, ac prout corpus universum in operis molestiam, & non modicam languorem incurrebat. Hinc quoniam partes insensibiles & dolentes, nonnulli post multas horas, & post longum in lecto decubium, ab excruciatu summo, & dolore alii quondam remitteretur; saltem est, ut nonnulli à prout ad decubulationem, & ad despectu mania obcedit, Ægra tandem reddebat. Quapropter nonnumquam ex assuetudine molestia, labellatit singulis economis animalis functionibus, corpus universum in dies festius magis emacrescit, pallidum, & fæcis colore datuparetur, debile ac infirmum foret, & Catharticis prout dispositionem contraheret.

Hoc miseram Viri genus transibat Excellentissima Laborum, cum Mense Februarii elapsi jam anni 1714. à soluta immo dici alto, maxime per irritata Hemorrhoides in excruciatu molem extenuerant, ut à sua sola prolapsa prædictum diem spatio reperto nulla indurgetur potuerit: quo tempore Febvis acuta, Vigilia perennes, Ciborum fastidium, somnus Varius languor, ac acerbissimi, & maxime ferendi Dolores. Pari afflicta (præsertim quoniam tunc temporis Sanguinem multitudine evelleret) plagiisq; primo, nec ex rubra livida colerem, ac demum rubeam in aliqua particula contraxerat, tunc non ex levi argumento crederetur, ne Gengras tumorem etiam assidens, membra tunc sana in Spasmodicum traheret. At particula rubea afflicta tandem à sanarum consuetudine recessit, ac demum abunde fluxum Sanguinem, sponte sua remitti coepit, hinc feri mensis novum intervallum, & in hoc, & dolor scilicet sedati fuit, ac mense Aprilis ad cum salubri gradu pervenit Excellentissima Domine, quem toto longissimi morbi decursu nunquam experta fuerat: Faci enim satis tolerabili reddebat incommode, & quoniam Sanguinem modica quantitate externam, nec Hemorrhoides immensæ, nec prelabebatur. Hinc scilicet est, ut etiam matutinis horis in lecto surgere, incidere, atque domo progrederi potuerit.

Mense tamen Junii serena Morbi iterum levitate coepit, sed tunc cruciatibus stipata. Et tunc dolere primò demum Laborum coepit circa Hemiparum, ac dolore incrementum pro dies tamen, difficultas Respiratio superuenit: Febvis continua comitata est, quæ circa vesperam migraretur, ac Ægram lecto affligeret: Alvi autem iterum à tunc eundem sensu, ac mulieribus, nonnulli præsertim, coepit erigere, & coepi à pulsatibus extollere coepit; præsertim quod nec in utroque latere decubere fasili poterat; nam cum in sinistram partem inclinabat, hinc juvenis spirandi difficultas ardebat. Quoniam autem ad Hemiparum dolorem aliquantulum desierat, alibi tamen difficultas perseverabat Respiratio, hinc n. à sensu lecti falsia, junctæ regimen diaphoreticæ, ut tuncque hypochondrium circumspiceret, iugiter celebrabat. His malis tunc afflita, & omnino passiva Hemorrhoidum accessu cruciatus, spualium miram acquirere mitem, seris doloribus jactata, nec unquam alvi excrementis turbata fuit, quin immo magis supervenit Hemorrhoides.

Ab eo tempore nunquam eundem bene voluntudini momento gratia est Excellentissima Domine. Nam tamen spirandi difficultas larga facta fastidia, & post pauca lora Urina excretionem, cessavit, ac prout & Febvis remiserit, & somnus capaverit Ægra, & in utroque latere decubere potuerit; Nihil tamen minus Hemorrhoidum molestia afflicta adhibendo illam turquet, nec alio modo appetit argumentum, quo morbum in melius cassum fore speremus, nisi Divino fræ præsidio, efficax afflicta parti (unde omnium morborum serena) adhiberetur medicamentum.

Cum ergo quoniam maxime inest illarum facies cateropis solidas depertire cœntur Domine, tunc vi ad illarum expulsiorem facta, Hemorrhoides lesa assuam eviti prædictum prelabatur, ac quodam magis, quodam minus Sanguine turpida, illum tunc affligit, tunc modice, & non sua acerbè dolore, & animi tamen non desinit, evanescit. Hinc lecto seruitur sanguinem Ægra, ac tunc pari afflicta ad Ovi asperum magnitudinem affligens, in consensum venit, cuius hinc aqualis est perferens, sed, ut in Variis solis, inæqualis, & insensibilis. Si dignis contraxerit, namque membrum sublimem Venerem p. n. differtur, namque deprehendit, sed glandulæ veluti parenchyma, per cuius poris Sanguis, non sicut ac per reliquis glandulis corporis partibus præterit, iterum videtur. Sunt quædam exuberantia, quæ maxime per alia, quædammodum est longiorum quædam ad Cœcum scilicet fidem præparat, sunt tamen & alia diuersa sensu hinc expulsi prædicta, & ad Cœmolum naturam vergentes. Hinc feri spiritus, & equorum amplexum non obuiem, sensum lanchationis remittuntur, ac tumore multo residerit incipit, ac quodam Hemorrhoides fluctuantes reddidit, tandem obfistens, nonnulli ad tumorem diem extenuatur. Cum magis morbus seruit, tunc à lecto surgere nitens parit illi Ægra, cum vero nitens ardet (quædammodum tunc temporis est cum hac seruitum), tunc lectum à prout, velut hinc ante proutum, dolens, proutum scilicet occupatur.

Misere hoc vivendo genere nitit Excellentissima Domine, ac prout macie, & brida tunc colore defecit, fræ jigitur vexat Febriula, & post exiguæ velut horis tentatur gæmæ, quod feraciter aliorum incrementum in dies sensisset, atque Cachexia in Hydropem degenerasset, ni Urina copia partim Naturæ vi, partim Nitrogenum medicamentorum ne procurata, sensum collictem corpore clariorisset.

Mediamerita pro Morbi longitudine non pauca sunt propinata: ad eam tamen supram entia collimatur, ac Viscerum Arteria, à qua sensu, & veluti sole ferit Sanguinis gæmæ, emenderetur, Altilinis, & Chalybeatis, ac salsi ferri edulci per Urine vias præpararetur, ex Nitro, & Tartaro petri prædictis. Hæc quidem non sine aliqua emolumento addita sunt; nisi quod Tulliora Tartari usui, et quod major impendat Hemorrhagia, intermissis. Balnea mineralia, quod Færem exacerant, posthabita. Lar Eli apud veterem morbi, Topica parti afflicta pro rei necessitate varia sunt applicata, denigra, levis Narcotica, blanda Cathartica, Alistergena, Estanica, Transmutata: tunc temporis ablatæ ex herbis, & succis medicis specificis, addit tantillo Aluminis, uti

911

vel Virialis est exiguatā: de immixtione urinis in camporeis, & aliterque parant, Medicamentum ex Antimonio, & Chalybe Chymica melleosā parant, per m. affundit affigat est. Deu. facti, ut assequat.

Maxima quae de Historia Mercurii Faculsiōis Domine N.N. ad plures jam annis misit sequitur, ac sensu videretur, & quia Judicia quorū memi (quāquam amos, & exiguam) in anticipis hac rerum istam requirunt: Iussu abrenuntiam, quibus resisteret mibi infat est, et quae per brevitatem quaeque meam operam, & quae sentiam (mitem meliora sentire possit) pauca scribam.

Addit & Confiliū d. Celeberrimo Viro, atque amico acerrimo orando, Pio Nicolao Garclio, Augustissimo Rom. Imper. & Regi CAROLI VI. Medico, regi, &

Historiam Medicam favi, ac diuturni morbi, quae Extravasatio Domine N.N. ad plures jam annis misit sequitur, ac sensu videretur, & quia Judicia quorū memi (quāquam amos, & exiguam) in anticipis hac rerum istam requirunt: Iussu abrenuntiam, quibus resisteret mibi infat est, et quae per brevitatem quaeque meam operam, & quae sentiam (mitem meliora sentire possit) pauca scribam.

A mellea, & pericula nomis Hemorrhoidum venarum immixtionem, quae hanc maximam facere negotium videtur, exordium, pericula, & effluū necessit. & quia Judicia quorū memi (quāquam amos, & exiguam) in anticipis hac rerum istam requirunt: Iussu abrenuntiam, quibus resisteret mibi infat est, et quae per brevitatem quaeque meam operam, & quae sentiam (mitem meliora sentire possit) pauca scribam.

Historiam non ad Faculsiōis laboris partem (maxima si immixtione, & abrenuntia sit) in Venarum Hemorrhoidum venarum immixtionem incurrere: Sed hic affluū, & si Judicia, & bene aliis Corporis habitū praedicti (quod vix sole) curripit, & sedens, & domesticis melleosioribus praedictis videtur: resisteret mibi infat est, et quia Judicia quorū memi (quāquam amos, & exiguam) in anticipis hac rerum istam requirunt: Iussu abrenuntiam, quibus resisteret mibi infat est, et quae per brevitatem quaeque meam operam, & quae sentiam (mitem meliora sentire possit) pauca scribam.

Historiam non ad Faculsiōis laboris partem (maxima si immixtione, & abrenuntia sit) in Venarum Hemorrhoidum venarum immixtionem incurrere: Sed hic affluū, & si Judicia, & bene aliis Corporis habitū praedicti (quod vix sole) curripit, & sedens, & domesticis melleosioribus praedictis videtur: resisteret mibi infat est, et quia Judicia quorū memi (quāquam amos, & exiguam) in anticipis hac rerum istam requirunt: Iussu abrenuntiam, quibus resisteret mibi infat est, et quae per brevitatem quaeque meam operam, & quae sentiam (mitem meliora sentire possit) pauca scribam.

Historiam non ad Faculsiōis laboris partem (maxima si immixtione, & abrenuntia sit) in Venarum Hemorrhoidum venarum immixtionem incurrere: Sed hic affluū, & si Judicia, & bene aliis Corporis habitū praedicti (quod vix sole) curripit, & sedens, & domesticis melleosioribus praedictis videtur: resisteret mibi infat est, et quia Judicia quorū memi (quāquam amos, & exiguam) in anticipis hac rerum istam requirunt: Iussu abrenuntiam, quibus resisteret mibi infat est, et quae per brevitatem quaeque meam operam, & quae sentiam (mitem meliora sentire possit) pauca scribam.

Historiam non ad Faculsiōis laboris partem (maxima si immixtione, & abrenuntia sit) in Venarum Hemorrhoidum venarum immixtionem incurrere: Sed hic affluū, & si Judicia, & bene aliis Corporis habitū praedicti (quod vix sole) curripit, & sedens, & domesticis melleosioribus praedictis videtur: resisteret mibi infat est, et quia Judicia quorū memi (quāquam amos, & exiguam) in anticipis hac rerum istam requirunt: Iussu abrenuntiam, quibus resisteret mibi infat est, et quae per brevitatem quaeque meam operam, & quae sentiam (mitem meliora sentire possit) pauca scribam.

Historiam non ad Faculsiōis laboris partem (maxima si immixtione, & abrenuntia sit) in Venarum Hemorrhoidum venarum immixtionem incurrere: Sed hic affluū, & si Judicia, & bene aliis Corporis habitū praedicti (quod vix sole) curripit, & sedens, & domesticis melleosioribus praedictis videtur: resisteret mibi infat est, et quia Judicia quorū memi (quāquam amos, & exiguam) in anticipis hac rerum istam requirunt: Iussu abrenuntiam, quibus resisteret mibi infat est, et quae per brevitatem quaeque meam operam, & quae sentiam (mitem meliora sentire possit) pauca scribam.

Historiam non ad Faculsiōis laboris partem (maxima si immixtione, & abrenuntia sit) in Venarum Hemorrhoidum venarum immixtionem incurrere: Sed hic affluū, & si Judicia, & bene aliis Corporis habitū praedicti (quod vix sole) curripit, & sedens, & domesticis melleosioribus praedictis videtur: resisteret mibi infat est, et quia Judicia quorū memi (quāquam amos, & exiguam) in anticipis hac rerum istam requirunt: Iussu abrenuntiam, quibus resisteret mibi infat est, et quae per brevitatem quaeque meam operam, & quae sentiam (mitem meliora sentire possit) pauca scribam.

Historiam non ad Faculsiōis laboris partem (maxima si immixtione, & abrenuntia sit) in Venarum Hemorrhoidum venarum immixtionem incurrere: Sed hic affluū, & si Judicia, & bene aliis Corporis habitū praedicti (quod vix sole) curripit, & sedens, & domesticis melleosioribus praedictis videtur: resisteret mibi infat est, et quia Judicia quorū memi (quāquam amos, & exiguam) in anticipis hac rerum istam requirunt: Iussu abrenuntiam, quibus resisteret mibi infat est, et quae per brevitatem quaeque meam operam, & quae sentiam (mitem meliora sentire possit) pauca scribam.

Historiam non ad Faculsiōis laboris partem (maxima si immixtione, & abrenuntia sit) in Venarum Hemorrhoidum venarum immixtionem incurrere: Sed hic affluū, & si Judicia, & bene aliis Corporis habitū praedicti (quod vix sole) curripit, & sedens, & domesticis melleosioribus praedictis videtur: resisteret mibi infat est, et quia Judicia quorū memi (quāquam amos, & exiguam) in anticipis hac rerum istam requirunt: Iussu abrenuntiam, quibus resisteret mibi infat est, et quae per brevitatem quaeque meam operam, & quae sentiam (mitem meliora sentire possit) pauca scribam.

Historiam non ad Faculsiōis laboris partem (maxima si immixtione, & abrenuntia sit) in Venarum Hemorrhoidum venarum immixtionem incurrere: Sed hic affluū, & si Judicia, & bene aliis Corporis habitū praedicti (quod vix sole) curripit, & sedens, & domesticis melleosioribus praedictis videtur: resisteret mibi infat est, et quia Judicia quorū memi (quāquam amos, & exiguam) in anticipis hac rerum istam requirunt: Iussu abrenuntiam, quibus resisteret mibi infat est, et quae per brevitatem quaeque meam operam, & quae sentiam (mitem meliora sentire possit) pauca scribam.

ARTICULUS V.

De Ani pruritu.

Propter cognationem Affectuum obferuo, subinde quodam graviter affligi *pruritu* ani facto molesto, in quo alius irritis, optima est aqua plantaginis, in qua modicum Alumina coctum fuerit, quo ipsa abluatur, & foras sit locus pruriginosus, sicut ad similes ani affectum cum Exulceratione iusdem praestans est Linimentum hocce:

*℞. Linzerre.
Sulphuris citr.*

*Tragacanth. an. ℥i.**Cum Aceto, adjecto pauco Oleo rosato, ℥. Linimentum.**℞. S.**Unguentum.**Quo locus in Podice iungendus.*

In casu, quando citius dolor ani, qui accidit ob chartam, vel Vitriolum, vel Piperem, vel Simili Imperium, in tali casu optime convenit pulmosum Foculi ani cum Lade tepido, addita pauca Aqua rosata, uti vult BORELLIUS *Cas. 4. obs. 52.* in dolore ani, cui Vitriolum fuit afflicum. Plura, ubi de inflammatione ani.

Abolimusque, qui in contentorum Intestinalium expulsionem & distributionem laet obvia, & sunt

S E C T I O X.

DE CONTENTIS INTESTINORUM PRÆTERNATURALIBUS.

CAPUT UNICUM

De Vermibus, seu Lumbricis Intestinalium.

Vermes Intestinalium Adultos pariter ac Infantes crebro vexant, & Symptomata adeo plura cum aliis morbis communia inferunt, ut etiam Medicos doctos aliquando fallant, referente FORESTO. Triplex horum Differentia communiter statuitur: (1.) Terribilis seu Vermium Longorum, Lumbricorum in specie sic dictorum; (2.) Larvarum, qui Vesicæ infest, ut Membranae tenuis aliquot ularum longi subinde excrescantur; & (3.) Alvarius seu parvi sili Vermes, Terminibus similes, qui Intestinum Rectum incolant, inter quos Latini rarissimi sunt, Præter hos tamen etiam

aliam Vermium Differentiam salubere observabilis fuit, uti sunt Vermes Curatissimi dicti, item observati fuerant Vermes Curati & Vid. M. A. N. G. *ann. 3. obs. 83. pag. 109.* item BORELLIUS *obs. 52. pag. 127.*

C A P U T X.

Generatur Lumbrici quavis ex proprio suo semine, utique nobis communicato, quod imprimis ex Alvaribus patet, qui licet copiosissime per Medicamentum Purgans rejedi, brevi postea tamen repullulant, de novo egrossescunt, demum ejcendi, in specie Lumbrici vivipari observati fuerunt, teste PANAROLLO *Panc. 1. Obscrvat. 19.* SCHENCKIO *M. p. Observatorem.* FORESTO *M. p. 1. Obscrvat. 36.* & BORELLIO *M. p. 1. Obscrvat. 98.* Cui

Non possum non hic commendare Marci Gerboisii *Descriptio*, quod in seipso experiri tanquam speciem ab eodem commentatur in Ephemeridibus Naturæ Curiosiorum Centuria prima & secunda, Observat. 13. pag. 65. & nihil aliud *℞. Testi Delectum ex Scrophularia, Telopea, Chelidonio minore, & Mellefolio, quod ad ℥viij. mens, addito panisuli Sacchari, quod sit ferri debet; immo nec fani remedium, uti in praesentia, quo Auctor multa confirmata promittit, etiam commendabile, & propria tamen experientia non dum suppetit, qua id confirmet. Hoc vel simili modo Pari afflicti tractari possent, si fedius diceret, in sola Chemica operatione spes, nulla esset, fundari debet.*

Non minor se effere debet in commentis Philidorum distilla, Viperarum abies corrigenda, quam cum in acrisi sua rationabiliter perferantur, induratiorem efficit, Salia diutius, etiamdem aculeos infringere, per abies vias eliminare, & denique Viperam robur, & Viperam totam restituere, ut Sanguinis massa & recentissimi purgata, & repetitis cratibus per viscerum, & variis Glanclis exhalata, in vasa Balausticum, & Natura amica liquora converteretur; Sed hoc omnia prorsus in tanta fluiditate, & soliditate, quæ sit confusa? Prædictum, & dolicantia si ego magnum in Lacti praesentem est, sed hoc aliam morbo, fuit observatum; quod si, non magno Hippocrati consilio, Lac colatum, & Chalybeum addidit, & hoc non parum, sed addita portione Dextri ferariorum ex radicibus China, & Salse parati, cabili propinquum. Capillum autem, ut mediatis afflicti arderet, quod si hoc quavis modo abies turbaretur, tunc ad emulsiem linderem Decollum ex Passulis & Radicibus Clonia, Salse, & Caryophylla, summittitur Hyperici, & Refusa Eboris paratum ad ℥viij. cabili propinquum, assumpta prius Viperis pulcherrime receptissimè parati ad minimum Draconis semis; eandem imple mentationem Gelatina Cornu Cervi & Eboris, additis fructibus Viperarum recentium parata, quæ Ego efficacissimam experiri sum, si in Jussuli ordinariis ad usum, alterutro cochleari dissolvitur.

Hec dolicantia juvare merito accipere Chalybeum, & Americana Medicamenta, sapio tamen frustra addidit; Sed in Chalybeum non ulla non sperandum est documentum praesentem, sapio nimirum Medicamentis formulam, & preparationem mutando, ut denique vari compotes evadantur; inter hac tamen simpliciora & minime acris ceteris praferrem; hinc summi per ardet Testiaria Martis tartarizata, cum simplicis Aqua ferri parata, additis debet tempore inter decollum summittitur Centaurii minoris, foliis trerariis Abies, & Radicibus Galanga, necnon medicis portione Corticis Winterani, & haec Testiaria calata, & per reflectionem depurata sumi ad minimum debent 40. gutta, cum debito regimine. Reliquas omnes Testiarias, & Miltaria, cum acrisibus meritis parantur, sicut & Salse volatilis, excepto Sale volatilis Suctio, quod deperatissimum est, magno studio vitanda esse, cum sub Cate Neoplatum, sum in nostri Subjelli temperatura, judicem. Eius memorato Sale volatilis Suctio in subdola portione Nitro depurato nulli, egregium valuit Diureticum, quod vel memorato Testiaria interdum jungi possent, vel adjectis lapillis Cancrorum, per se ad hunc, & praedictum Affectum Medicorum operari. Mactio Aeris Urbani in Campesem, & apertum, summi est commendabile, & non infimum inter Aeris praesentia hoc habet. De Medicamentis ex Antimonio, & Chalybe parata, non habeo quid dicam, cum à Viris doctissimis sit commendatum & Diaphoreticum Martiale Lumbrici bovis generis efficit, & plantulis. Famula quidem praeparationem ex Martis, & Antimonio necessarium publicare edita Libello Pharmacopoeiae Petrus Joannes Hieronymus Zanichelli, sub specie sicuti Nitro Martis hanc eandem praeparationem si videret desiderat majori cum candore enervari, uti Nicolai Lemery Aetium Gallicum de Antimonio, titulo de Floribus alvix Regulo Antimonii, & fore in hac causa non esset inconvenientia remedium. De Dieta non habeo quod ponam, cum accuratissimi habet moderatores, quibus me, & hac qualicumque via, Philidorum animi candore submitto. Datum Vienna Austria, ipso diebus Julii Anni MDCCXV.

Pius Nicolaus Garelli Augustissimi Romanorum Imperatoris, & Hispaniarum Regis Medicus.

Quoniam non hoc Consilium advenisset, ex Urinarum paritate, Hydriis cum Affluente Excitissimum Dominum prebendo, & quavis Urinis iterum largiter profunderent, adque corpus duntaxat subdolemus post Viperam Abdominis, videtur latere rationes, evidentissima phlogosis, & subsequens necrosis signa, missa Aegroti mortem tandem obvi, quod L. Georgius ad Graminum 1. Septembris 1711.

tamen hic sumus, ne Intestinalia Lumbricorum cum eorum forma confundamus, de quo vid. BARTHOLINI *Alia Med. Hist.* Vol. 4. pag. 157. In specie Lumbrici palmaris longitudo observari solet, ut plurimum convoluti invicem, plerique junati: Ergo rarum est, quod Lumbricus Teres longitudo trium unarum observatus fuerit in M. A. N. C. Ann. 3. *Observ.* 254. pag. 457. Nam Latus alius Lumbricus ad plures ulnas excrecere solet, qualem trium unarum, item sex unarum longitudo excretum vidit JOEL in *Praxi* lib. 4. novem unarum in M. A. N. C. Ann. 4. *Obs.* 204. sicut AMATUS LUSITANUS *Cent.* 6. *Cur.* 74. Vermen latum quatuor cubitos longum per Vomitus excretum observavit. Plures & notabiles de Lumbricis Observationes videb. in BINNINGERO.

Causa Remota hujus mali sunt præprimis Cruditates Ventriculi ac Intestinalium patibilissimæ unde in Pueris, addephagias litantibus, præsertim pullitibus eiusmodi verminosa observatur, non illis saltem, qui dectitionis ætatem superaverunt juxta HIPPOCRATEM *Sect.* 3. *Aphor.* 26. sed & minoribus & lactentibus etiam adhue: unde Nilis munda a-mara, sed habes & inera, generatur, hinc *ubi deficit Bile*, Lumbricorum patiam effe recte HELMONTIUS dicit.

DIAGNOSIS.

Dignoscitur Lumbricorum præsentia ut plurimum ex fortiori oris peculiari & ad acorem vergente, Saliva copiosiore colore profluente, imò sentiente & cum nausea rejecta; item Stercoribus bubulis similibus corruptis & griseis, tunc sc. ubi Oculi album flavescens simul contrahit, seu lacerus ad-judus est.

Accedunt his alia signa minus frequentia, dolor sc. & morbus Ventris, præprimis horis matutinis, itaut Abdomen quoties interdum iustari videtur; pavores nocturni, Dentium fridores, tremores atque convulsiones, Febres modò erraticæ, modo continuæ, corporis contabescencia, item Gingivarum erisio: Vid. RIVERII *Prax.* lib. 10. c. 9. Facies modò rubore suffunditur, modò pallescit, appetitus ad voracitatem usque intenditur, nates frequentius icalpant, Ventriculo æstuoso sitiant, rursi sicca laborant, ab Alimentis tamen assumptis, imprimis Dulcibus & Lacte, postissima sympto-mata remittunt, ut Acidis verò & Amaricis licet.

Qui Lumbrici Lati laborant, eos varia & multiplicia aq-ue diuturna symptomata vexant; quæ inter etiam hoc pec-uliariter observatur, quod cum excrementis Alvi corpuscula Cacæritia feminibus analoga procedunt: Vid. BARTHOLINI *Alia Med. Hist.* Vol. 4. pag. 150.

Quoad Alvarias, notum est, quod hi ipsi phasies Lunæ ob-servare solent: vid. BARTHOLINI *l. 2.* Unde etiam in specie usque à nona vel decima hora nocturna usque ad auroram, moveri & excitari solent, hoc est sodicare & ve-rezare ægra; cætero tempore, mane, tota die, & vespere, ut plurimum quieti sunt, saltem de nocte in Podice tumultu-ant: adeo novi quondam tota nocte ab illis dormi coacti, ut dormire nullo modo quæant, interdum de illis dormi tan-tillum animadvertendo.

Præter hanc molestiam & hoc mali junctum habent, quod invalescentes quibusdam Annum & Intestinum Re-ctum, imò Nates & Femora erodere solent: quin & Ul-cus Ani & Intestini Recti in quibusdam existunt, quod re-fert SCHENCKIUS *lib. 3. Observ.*

PROGNOSIS.

Quod plura sibi habent combinata symptomata, & quod il-lorum plures atque majores existunt, eo pejores etiam ob-servantur.

Sunt verò, si speciem consideremus, mites nostri Afca-rides, nisi majores exsint: Lati verò, uti haud gravia exsint symptomata, difficilioris curamini observantur.

Alia graviora, præprimis Lumbrici, morbos non raro ac-cerunt, sc. Febres satis insensibiles, Animi deliquia, Apho-niam, Deliria, Epilepsiam, Pulsum intermittentem, Co-licum, & Appetentiam caninam.

In morbis aliis sponte procedentes, vel per Alvum, vel per Os, & quidem in statu Cruditatis, & Principio morbi, raro sine periculo Nati vim mortis imminuent ex summam malignitatem denotant, unde fuga se valuer redimere. Sin verò excreantur in statu coditionis & Declinatione, bonum est.

G-U-R-A.

Pro Cura ergo Vermium imprimis observandum, ut Tom. II.

1. Eneccentur.

2. Per Purgantia, imprimis Jalappum, & Mercurium dulcem, alvare modis epiciantur, ne putrescant in Intestinis, & sic ex illis, novo fulcitate seminio, novi Lumbrici generentur: Vid. RIVERIUS *c. 2. Observ.* 28. *c. 2. Obs.* 5. *Obs.* 27. pag. 280. 281. & 398.

3. Pulv. Jalapp. 3i.

Mercurii dulc. 3i.

Cum Saccharo in L. q. Aqua Hyper. solut. L. Rosula, pro

3. vel 4. dolibus: S.

Rotule pro Vermibus pro aliquot vicibus.

Vel

3i. Conferv. Flor. Persic. 3ij. vel 3i.

Mercurii dulc. gr. xv. ad 3i.

Mag. Jalapp. vel Spec. Dia-Tarbi, cum

Rhabarb. gr. v. vel viij.

Scamm. gr. ij. ad vj.

C. l. q. Symplic. Flor. Persic. L. Balsu: S.

Saccharum purgans pro una vice.

Imprimis autem Lata decretescente sub ultima ejus qua-dra, quia Vermes aggregandi, & qui Vermibus obnoxii sunt, semel in Mense decretescente Lata debitis subsidia sunt præstandi. In specie in Morbis Puerorum semper Vermes debent esse suspensi, cum præ cæteris istis solent esse familiares, auctore SALMUTH *Cent.* 1. *Observ.* 266. quod pariter de Adultis ait BORELLIUS *c. 1. Observ.* 89.

Remedia ergo magis Appropriata, Vermes enecantia, sunt in specie Raphanus rusticus; ejusque Succus & A-qua destillata, cum alia mista, Nasturtium, Abanthium, Carduus benedictus, Centaurium minus, Flores Persicæ, Tana-cetum, Flores hyperici, de quibus vid. BARTHOLINI *Alia Med. Hist.* Vol. 4. *Obs.* 40. herba Sabine, Scordi-um, Corallina, Radix Diadami albi, Filicis, Gentianæ, Graminis, Zedairæ, uti & Allium, Cæpe, Porrum in Lacte cocta, & Semencia, Semen Portulacæ, &c. Myr-rica & Aloë, quælibet remedia ex coru Cervi, Spiritus cornu Cervi essentia, de quo vid. HARTMANNUS *pag.* 179. quælibet Mercatoria, unde Bolus Hartmanni cum coactura Rosarum & Floribus Benzoi; item Infu-sum ac Decoquum Mercurii cum Aqua Graminis, copu-rum aut Allii paratum; idem Pulvis contra Vermes Officina-rius ex Mercurio cum Saccharo subacta, &c.

3i. Mercurii vivas.

Teratur in mortario vitreo cum Saccharo, donec pulvis griseus emergat.

De quo 3i. ad 3i. in cochleari ligneo.

Pulvis TIMÆI *ven. Gualtheri*, quem *l. 3. Cap.* 26. & A-cetum ejusdem, quod *l. 6. Fyph.* 6. descriptis, Oleum Ligno-rum, v. g. coryli, item Juniperi, quæ RIVERIUS *l. 2.* a-Succus, egregia sunt. Spedant hoc etiam Acida, v. g. Succus Citri, Spiritus Vitrioli, vel sulphuris, liq. Aqua communis spiritu sulphuris acidulata subinde hausta mirabiliter Vermes expellit: alii spiritum Vitrioli cum l. q. Sacchari in Pulveris formam redactum contra Vermes propinant. Sic WEDELIUS Puerum verminosum Tinctura Violarum virescens curavit: Vid. *Tr. de Med. Facultat.* *l. 2. Sect.* 2. c. 3. *pag.* 179. Quod etiam præstat conferva Rosarum virescens cum a liia mista.

Extræ chyliferae frequentius laici, & primò quidem ex Lacte, Decoquo Ficuum, Passularum, Liguiritia, Melle &c. pro alliciendis Vermibus, ubi per os Anthelmintica exhibita sunt, imprimis conveniunt. Quod si verò ad cras-sa loricata descendisse videantur Lumbrici, ex enecanti-bus & specificis illa parari debent, v. g. ex Radice Grami-nis, Gentianæ, Abanthio, scordio, Centaurio minori, Portulacæ, corallina, Semencia; &c. in Lacte coquendis & cum Melle applicandis.

Abdomini denique applicator Fel Tauri cum Pulvere colocynthidis subactum, quod Umbilico imposuim, forti-ter eos pellit: item Cataplasma ex Myrrha, Aloë, Aceto rosaceo, & Felis Tauri paratum; Oleum Abanthii, Amy-gdalarum amararum, Hyperici, Diacolocynthidis *Quercetani*, & quod CRATO *l. 3. Cap.* 23. commendat, Petro-leum, item Oleum destillatum Ligni coryli, aut Catapla-sma ex Farina Lupinorum, Myrrha, Aloë, &c. quæ RU-LANDUS *Cent.* 2. *Obs.* 21. præscribit; item ex Hiera-picra Cataplasma, Oleum contra Vermes, ejus RA-THOLINIUS *Cent.* 2. *Hist.* 67. merinit, Unguentum contra Vermes Offic. item TIMÆI *lib. 5. Cap.* 16. aut ex Unguento & Arthanis, & Mercurio vivo, quod R.I-VERIUS commendat: vid. PLATERUS *Praxi Tom.* 3. *pag.* 111. & 112.

T 11

In specie ad *Latus Vermes*, qui Scorbutoles imprimis affligunt, Succus Nalurti recens expressus exhibitus, est optimus, item Pulvis Jappum cum Semine Santonici à Di. ad 3℔. propius, et eorum pargans, teste DRAWIZIO *in Eboracollis pagin.* 127. item species Dia-Turbich cum Rhubarbo, hinc Mercatoria.

Ascarides verò in specie eurant Suppositoria ex Cacao

Hollandico aut Lardo, nunc simpliciter ita applicatis, vixit Melle illita; item Enemata Abstergentia cum Colocynthido, item Enemata vel Balnea ex Abdomine: Vid. BARTHOLOMÆUS *lib. Med. Historiæ. Volum. 4. pag. 1501.* Hinc Pulvis ex Tartaro Vitriolato, Colum Cervi, & Extrah Trochiscorum Allmandi eos efficit, uti & Mercatoria. (O)

S E C T I O XI.

D E

VARII INTESINORUM DOLORIBUS.

DIFFERENTIÆ.

In scrutinio autem Causarum ante omnia observanda sunt horum Dolorum *Differentiæ*, desumptæ vel à *Parte afflicta*, vel à *Causa Efficiente*.

I. *Ratione* quidem *Partis afflicte* differuntur Intestinorum Dolorum, vel ratione Intestini dolentis, vel ratione sinus partis dolemis. Intestina, quæ affliguntur, nunc sunt Tenuia, nunc Crassa, unde diversi Dolorum Intestinorum, dum Illaci & Colici sunt, Tenuia si afficiantur, ut Jejunum & Ileum, vocari solet imprimis *Dolor Sinus*; quando verò in Intestino Crasso, in specie in colo, & parte superiore Intestini Recti argret dolor, *Colicus* dici solet: aut non raro hi duo Dolorum confunduntur à vulgo, adeoque in genere quæcunque Intestinorum Tormenta generali *Colicæ* nomine venire solent; nec multum refert. Facile tamen distingui possunt observando situm *Doloris affectum*, & *Intestinorum* Tenuium & Crassarum Situm. Quod *Doloris affectum*: Dolorum Intestinorum tenuium, imprimis Illaci, acerbissimi sunt & crudeliores Colicis. Quod *Situm*: Illaci dolores regionem Umbilicalem, & infra eam regionem Hypogastricam occupant, Colici verò magis lateralis & superioris, potius. Nam Colon Intestinum à dextro inguine incipiens, supra & circa dextrum Renem sursum aurgit versus Hepar, & inde sub Collis nothi traohierum versus ad Hypochondrium sinistram, cuius magnam quidem partem occupat; nihilominus tamen modo angustiorum consequtur ad Renem sinistram, in hypochondrio sinistro, indeque porro ad Inguen sinistram, ubi tandem ad Os Sacrum in Intestinum Rectum devolvitur. Hinc illi Dolorum, qui in Abdominis ambitu modo descripto percipiuntur, omnes sunt Colici, utem nonnulli eum tantum hoc appellent nomine, quod partem Abdominis superiorem & anteriorem inflat cinguli ambit: cum tamen sæpè Dolor usque ad Umbilicum, imò interdum usque ad Vesicam ingrai ambitu devolvatur, qui severè etiam sunt Colici. Tenne verò Intestinum, ubi emergit ab Intestino Duodeno, versus hypochondrium sinistram torquetur, & hinc recedens mediolum Ventris imprimis occupat; Unde in, & circa, & infra Umbilicum percipi Dolorum sunt imprimis Illaci.

Utiq; obtinuit, ut hi Dolorum confundantur. Et in genere omnes Dolorum, qui Abdomen occupant, *Colicæ* vocantur: Ideo & huius consuetudinis & Nos accommodabimus, & nomen Illaci & Colici confundemus, cum ratione modi fieri naturaliter conveniant.

Ratione Sinus Doloris hic iterum est Differentia: dum nempe quidam Dolor dicitur *Hypochondriacus*, alius *Dolor Lumbaris*, & alius *Umbilicalis*. *Hypochondriacus* Dolor est ille, qui in primis & frequentissime percipitur in hypochondrio sinistro; interdum, sed rarius, in hypochondrio dextro, idque sub Collis nothi, Dolor acerbus est ac modum pertinax, qui communiter ascribitur Lienis affecto. Unde vulgo quicunque Dolorum in ista parte percipitur mox habetur pro augurio affecti splenis; tamen, cum ille Dolor sit ut plurimum punctioris, radens, & mordicans, Lien verò eique parenchyma per se fere insensibilis sit, adeoque vis, præterquam gravitatem & obstumum Dolorum, imprimis ex insidiis ejus nimis eorum, à viridis fucis, seu Sanguine productam, seu saltem Dolorum obscurissime sentimus.

Hi cum frequenter in Praxi occurrant, & multis propria habeant, eorum naturam declarabo: nam dum distributionem Continentia in Intestina, & excernuntur Excrementa, non parvi & pauci Intestina torquentur Doloribus: de quibus utitur in Capite generali quodam de Doloribus ita agendum, nihilominus tamen consultum duxi, & hic quidam de his præmonere.

In naturali quidem statu indolens planè, & consequenter insensibilis Intestinorum est adus, & contentorum distributio, nisi quod tantum Intestinum Rectum levis sit illud, quando Facies tant exercere. Deinde tantummodo interdum levis adus Murrura & Borborygmi, quando flatum, naturalis Intestinorum tenuium, speciatim Ilei, peristalticum Intestinorum motu hinc inde agitat, illa Murrura & Borborygmos infert: nihilominus tamen præternaturali in statu luinde hæc ipsa variis & gravissimum cruciantur Doloribus, *Tormina* alias appellatis & *tergendo*, quod in his Intestina quasi contorqueri aut convolvi, & omnino consisti videntur: ac revera formaliter umores ferè Dolorum Intestinorum, paucissimi exceptis, à convulsivo spasmico Intestinorum, in quem à spirituum impetu cidentur, immediate oriuntur, quo torqueri & convolvi videntur.

Utut autem causaliter isti varii, vix tamen quæcunque Causæ Dolorum infertunt, nisi ad Motum convulsivum per irritationem Intestina disponantur, *Causa* ergo, Dolorum Intestinorum facientes, sunt Irritatio Intestinorum, quibus Motus convulsivus inducitur fuit, sub quo ægri affliguntur. HELMONTIUS non solum Convulsiones spasmodicas illustrat eleganti exemplo *Traité de Flatibus* §. 38., ubi refert in Puero Herniam Umbilicalem à Flatibus, ut Intestina prolapsa præterier per tunica tenuem conglaci, qui ingentes passus Dolorum, quotiescunque Intestina lumbicalia spasmico convelli conspiciuntur: sed & ordinario ferè Alvus suppressa esse solet sub talibus Intestinorum Doloribus, dum spasmia illis impeditur, ac nimis retardatur naturalis Motus peristalticus, & hinc medio contentorum protrusio. Rectè hi Dolorum *Tormina* ducuntur. In specie tamen, cum in his multa lateant, observandum, nullum Auctorium hanc materiam rectè pertrahere, exceptis duobus, WILLISIO sc. & SYLVIO licet variè: SYLVIVS sc. virtutes activas secundum Salia explicat, WILLISIVS verò Convulsiones, Spasmos, horumque naturam rimatur, Horum velligis insinuat, & hos duos simul conjungamus pro meliore intellectu.

CAPUT UNICUM.

D E

Imi Ventris Doloribus, & in specie de Passione Colicâ.

EX præfatis Dolorum speciebus trahimus Colicam, cum aliis nullis scriptorum symptomata occasionalia rectius suggerat. Evolvemus ergo naturam Dolorum intestinalium.

(O) Qua de Vermium generis, causis, ac remediis hic addi poterant, ad Librum V. Praxeos, ubi de Lumbricis Intestinalibus, atque in opportuno loco, distulimus.

seu quasi diffidentem, ex diffentis ejusdem substantia membracoe, percepti quæ; facili patet, quod dictus Dolor panchorius & cerebrus non Splenis, cum ineptissimus sit Lien pro tali dolore, sed saltem Colo, sub Hypochondrio sinistro sensibili angustato, & doctum versus contorto, proprie convenit: Unde etiam his Doloribus Hypochondriaci tumor nunc datus & tactui reatens in Hypochondrio sinistro, nunc vero infignis illius Hypochondrii intumescens, tumor molli, & facili cedens, nullo modo Splenis, sed simpliciter Intestinalis sub Hypochondrio incurvatus, in specie Colo, hinc & illo, proprius erit; cum Lien in profundo situs multo modo contingi poterit: conseruat SYLVIVS Praef. cap. 16. §. 5. & 57. Vid. & SALMUTH Com. 2. Offens. 34. item HILDANUS Com. 2. Offens. 31. Est Fallacia Canis non Canis.

Dolor ergo bicc punctuarius & cerebrus acerbissimus in Hypochondrio sinistro observabilis, frequentissimè situs est in Intestinalis, partem quidem in Intestinalis Jejunum, partem vero, & quidem utplurimum, in Intestinalis Colo, qui in utroque Hypochondrio curvatura facit angulum satis acutum: Gravissimè ergo errant, dum dicunt, Germani scilicet: *Wegs pangs*; si in sinistro, inquit, situm est, si dicunt: *Lies pangs*. Hi Dolores alia percipiuntur, si quis equitudo se exercet, si non afficitur, percipit in Hypochondrio Dolorem, maximè, si post primum, equitat; Jejunum enim mos, aut Duodenum, inquit versus Hypochondrium sinistram, & facit angulum; unde Dolor panchorius sub Hypochondrio sinistro, sub Intestinalis Jejunum incurvatus; frequenter tamen in Colo, nunc in destro angulo, nunc in sinistro.

Quod attingit Jejunum Intestinalis: Duodenum, ubi desinit a Pyloro pergit ad principium Jejunum, conseruat hoc ipsum Jejunum mos ad Hypochondrium sinistram, itaque a Lumbo a Mesenterio liberis affligens contorquetur postmodum denovo in Abdominis mediastinum. In isto, ut se dicam, angulo, seu contorsione ista, sæpius hinc nunc Flatus, nunc vero utplurimum Mucilago acida, quæ ibidem pertinaciter affixa Dolores istos acerbos Hypochondrii sinistri in profundo situs inducit. Verùm hi Dolores sunt frequentissimi in Colo: id quod rectissime observat WILHELMUS FARRICIUS HILDANUS C. 1. off. 11. præsertim quoniam Colon amplius in sinistro Hypochondrio angustatur, & in ista angustia contorquetur internis, ita ut ratione situs & conformationis facillimè Fluxus ibidem aliter, Stercus aut Evcrementa ibidem hærent, & non tanquammodò internum dolorem, sed etiam resistentiam tactui, ut etiam perceptibilem intumescant, inferre possunt.

Hic ergo est Dolor ille frequens admodum Hypochondriaci, partim, quoniam horum Intestina semper obducit copiosa Mucilago viscida acida; partim, quia his sanguinem deficiunt Flatus. Passim ergo est, hunc Dolorem esse in Splene, utpote qui per se ineptus est illiusmodi Dolore. Et neut dicant, Medicamentum splenetica, ram interna, quam etiam externa, Emplastræ & Unguentæ, spleni admodum convenire in sopiendo hoc Dolore; respondet: quod ista Medicamenta interna splenetica habeant vim aut carminativam, aut temperandam acidum in Intestinalis, & ita removeant causam antecedentem; item Emplastræ & Unguentæ ordinario ingreditur Gummi Ammoniacum, quod habet vim egregiam dissolvendi & liquificandi Mucilaginem viscidam ibi flagrantem; & ita evenit, ut, quæ spleni conducere putantur, reverà coadjuvant Intestinalis Colo, à tali causa effusa. Garantur Terzeis absorbentibus, Cinnabaribus, Carminativis, & Martialisibus. (P)

Post Dolorem Hypochondriacum est *Lumbalis Dolor*, etiam frequentissimus, & qui sæpius confunditur cum Dolore Nephritico: siquidem Pylorum, dum in Intestinalis se dimittit, ibi Intestinalis Duodenum, Ventrículo proximum, superfluum reperit dextræ Lumborum regionem; unde si in Intestinalis Duodeno dextra principium Jejunum subinde oriatur Dolores, cum illi Dolores percipiuntur circa dextram Lumborum regionem, seu in Dorso: *allacer* in spina Dorso, dicunt ægri, & rectè *Dolor Lumbalis* vocatur: cum pari effecta est hinc Duodeni, & principium Jejunum.

Dolor hic *Lumbalis* est multiplex: nunc *Nephriticus*, Tom. II.

nunc *Mesentericus*, nunc *Pancreaticus*, nunc *Intestinalis*. *Nephriticus* est, qui ex Renibus, vel Calculo, vel alio affectu laborantibus oritur, & utplurimum obtusus, gravitativus & contundens esse solet, & vitæ in excretionem Urinæ variis adjunctis habet; & ægri dicunt: *primor*, non *pangor*: est enim insular pondus pimentis & contundentis malici in regione Lumbari. (Q)

Mesentericus (ita dictus quod Plexus mesentericus, & Nervi ex Spinali medulla ad hunc Plexum derivati, ingremis afficiuntur) est, qui sit circa Lumbos, propter Mesenterium superioribus Lumborum Vertebriis anatum, cuius Nervi vellicati propter ipsos & convulsiones, quæ subeant in dicta regione, graves lancinantes Dolores, & quasi divellentis Lumbos à spina Dorso, excitant, & nunc Dolores parturientium, Hystricis, &c. subinde oriuntur. Frequens hic Dolor est scabaticis, & vulgo confunditur cum Nephritico, licet reverà non ita, & inchoando in dicta Lumborum regione, tandem universum Abdomen & Intestina occupet.

Lumbalis Pancreaticus fit ex Pancreate, transverso Lumbo incumbente, affectu, vel tumore, vel scirrholo, vel ulcerato, vel simili morbo affecto, æque in superiori regione Lumbari juxta Costas notas obscuris hinc obtusus, & in profundo delicatissimus, quasi contundens, & leviter interdum pulsans, minusque gravis, minusque molestus.

Lumbalis Intestinalis Dolor est, qui circa regionem Lumbarem affligit, frequenter ad Hypochondrium dextrum inclinat: fit ex dolore Intestinalis Duodeni cum principio Jejunum, vel propter Chylum vitiosum, vel propter coalescentes ibidem hinc Succos, scilicet & pancreaticum, ibidem acrimoniosus, & effectivè preternaturali variis Dolores lancinantes excitantes.

Hæ sunt Differentiæ Dolorem Intestinalium, quoad Partem affectam.

Il. altera Differentia Doloris Intestinalium fundatur in variis Causis, æque, & hinc modis indeque Termina Abdominis, adque *Pachematia Colica*, sunt vel *Humorosa*, vel *Convulsiva*. Nam uter semper sit Termina à spina Intestinalium, vel in toto tractu, vel in quadam parte orientur, tamen ratione Causæ antecedentis ista dirimite iubet, & quædam tales Dolores symptomatice, vel à Contentis humoris, in Intestinalis hæreticis, occasionaliter proritantur; vel quatenus sine his, ipsorum Nervorum ad Intestina distributorum vitio, & ipsius, excitantur. Ideo distinguimus, & per Humoralem eam Intestinalis, quæ fovetur à Causa materiali in Intestinalis hæretate: per Convulsivam eam intelligo, quæ oritur ex vitio Nervorum, ad Intestina ex Plexibus Mesentericis distributorum, ratione quorum Intestinalis ipsorum oritur Colica Convulsiva, quæ Dolores variis, & pro causam proximam variatè efficiendi modo distinctis, affligit hinc Dolor in Colica Humorosa est nunc *Fixus* seu *Perterebant*, nunc *Pungens*, nunc *Diffractus*, nunc *Ratus*, nunc *Contundens*, nunc *Gravans*, nunc *Pulsans*: de quibus Colicæ Humorosæ Differentiis & Causis præ cæteris SYLVIVS in cap. 14. v. §. quando oritur Colica ex contentis stercoreis, ex Flatibus, ex Mucagine viscida, hinc inde Intestina obducunt.

Sic eum *Dolor Perterebant* & *Fixus* est, quando scilicet Intestina in uno eodemque loco perterebantur, aut quasi perforari videntur: Oritur hic ipse vel à scybalis induratis, in cellulis Intestinalium firmiter impadit, & tunc est pertinax; vel oritur à Mucagine viscida glutinosa & acida, in determinato loco quodam hærente, & pertinaciter agglutinata, in specie in angulis Intestinalium sub Hypochondrio sinistro, in quibus apertum invenit diverforium, ubi nempe angustatur & deoritur contorquetur Colon. Humidum Mucilago viscida & acida pertinaciter Intestinalis agglutinata, ratione viscositatis, Dolorem Continuum & Fixum, ratione aciditatis, Dolorem Perterebantem & quasi Perforantem infert. Vel oritur à Punctura vitrea Veterum, quæ infert Dolorem Fixum quasi Perterebantem. Et hic est Dolor ille, qui Hypochondriacos non raro verat, & est Dolor Colicus à Materia viscida acida, & Punctura vitrea. Uti dico, est imprimis ordinaria, & infatigabilis Colica.

Dolor Pungens in Colica Humorosa oritur ab Acido acriori pertinaciter Intestina vellicante & pungente, quasi acu vellicatur.

T 2

Dolor

(P) De hoc Dolore Hypochondriaco, saltem putant Splenetica, integram habet Dissertationem tom. 5. col. 2257. &c.

(Q) Si Calculus erit sceler, Dolor Remem officinis erit punctuarius partim quæm gravitativus; non autem cum sceler Calculus, quæm Remem, vel potius Dixerem exquisitus sensus, punctuarius doloris causa esse poterit.

Dolor Diffusus & quasi diffusus est, quando intestina diffusi & diffusim videntur. Hic oritur frequentius a Flatibus aut ex Materia viscida per viscosam fermentationem ab acido indurata. Alias, quoad generationem Flatuum, sufficit ea, quae habet HELMONTIUS Tr. de Flatibus, qui legatur attendere, maximum enim locum affundit doctrinam de Dolori Intestinorum a Flatibus. Hi in Intestina coarctantur, & inordinati mori, hinc inde Dolores Tenivos & Divulsi vel iadacum, & hic Dolor Colicus a Flatibus vitio Assumptorum est frequens, semper tamen necesse est, concurrat Intestinorum Spasmus, nunc in uno quodam loco fixus, nunc hinc inde vagus, cuius occasione Flatibus exitus interceptur, qui aliunde facili, qua data porta, exitum invenient.

Dolor Gravis oritur ex Materia copiosa plus minus viscida, abique acrimonia eadem parti, maxime Intestinali tenuibus, iuxta; ac praeterit Pinxit vitrea simplex Dolorem talem inferre. In Intestinis crassius latus Dolor Gravis fere cum sensu Tumoris remittit illi. Interdum Tumores & Abscessus in Melenterio lateres talem Dolorem Gravitatem in Abdomine inferunt. Ne ergo confundatur.

Quid si pravam Acidam sit peccans haec materia, siue ex vitio Stomachi, siue Succo Pancreatici, praeter Gravitatem, Dolor quasi Contundens oriri solet, qui etiam sensu molestus est; dicunt: *Corpus sibi haberi, ut si sistantur esset*.

Dolor Contractus, *Lacerativus*, & *vaga Lancinatio*, ac si in corpore omnia se circumvolvent, acerbissimus Dolor est, qui Intestina contorquetur, & invicem quasi convolvit videntur, & frequens Intestini Colicorum. Tales Lancinationes vagae oriuntur ex Convulsione & Spasmodica Intestinorum contrahente, de qua postmodum. Lacerationis hinc sensus adei in Colica Nephritica. Novi Mulieres multipares, dicentes, Dolorem Nephriticum esse acerbiorum ipsa Partu Dolorebus. Si ergo adiunt tales Lancinationes & Contortiones, tunc est Colica Convulsiva, siue Habitualis, siue Accidentalis sit.

Insuper dolor varius, nunc *Rodens*, nunc aliis symptomatibus variis consociatus, est ex Acido acris nonnullis, quasi muricario, vellicente, ardorente, fodicante, & quasi exoriente Intestina: urthriticum etiam in Intestinis agnosce Vermes, qui sepe satis copiose habulantur.

Denique Dolor adei *Pulsans*, qui ex Arteriarum, in motu pleno impeditur, est spasmi, & frequenter Inflammationis Intestinorum comitatur, vel quando haec ad Inflammationem disponuntur: tunc enim Arteria tenditur, ut quae tunc sit Pulsus durus sensibilis, ut patet ex inflammatione Digiti propter infiamm Spinam, in quo mox Pulsus Arterialis Dolor percipitur. Praeterea tamen & aliud quoddam in loco vellicans, facile ex superveniente spasmo Arteriarum Dolorem Pulsantem inferre potest.

Tormina Abdominis Convulsiva sunt, quae cum Dolor contorquente, lacerante, lancinante, & Abdomen subinde contrahente, nunc in duritiam tendente, nunc vaga, nunc quodam in loco crebris hinc, aut convulsivis & contrahentibus Intestinorum simpliciter oriuntur, adeoque crebrioribus lancinationibus, & contortione ac lacerationis sensibus, Intestinalis vel Abdomine molestus percipitur; annulique artorem habet ex Spasmi & convulsivis contrahunt Intestinorum.

Colica haec Convulsiva, siue Causa materialis in Intestinali haerente, ad manducationem WILLISII iterum est vel *Accidentalis* vel *Habitualis*. Illa Accidentalis est ista, quae a Causa evidenti saltatoria, nunc externa, nunc interna, sine praecedente certa in corpore praedispositione ad Colicam, sepe a Causa quodam occasione oritur, de illi, qui genus nervalem sentit, adeoque facillius irritabile obtinet, imprimis molesta est, adeoque frequenter a Causa externa vel a modo quodam interno, in alia quodam parte radicata, excitatur, & sic per consensum frequenter Intestina affligit. Talis Colica Convulsiva Accidentalis, ut a notioribus incipit, est, quae v. g. observatur in Nephritide, in, aut post Partum, item in Purgantibus. Notum est, quod Nephritidis supervenient ordinaria Tormina Abdominis Convulsiva, Vomitus, Singultus, Alvus adstricta, aliaque similia symptomata. Non oriuntur haec propter Contorta in Intestinis, sed oriuntur a Convulsione Intestinorum, ex Plexibus Melenterii nervi, a ramo iaccatoali & pari Vago crinidis, qui diffundunt ramos partim ad Reaes, partim ad Intestina, partim ad Stomachum.

Ubi ergo per Dolorem Renalem, mediante Nervo ad Reaes istum derivato, communicatur huius dolorosis Spas-

mus seu Motus convulsivus isti Plexui radicali, ex quo oritur Nervus, tunc in gravius malo omnes Nervi a Plexu oriendi reliqui similes convelluntur, adeoque Intestina convulsa Colica pathemata contumacissima inveniunt, ubi miserè torquentur acri, nullis nec Purgantibus, nec Evacuantibus cedere: Stomachus convulsus Vomitus aliaque symptomata habet, & rectè huius sedem statuere puto WILLISIIUM Tr. de Anima Brutorum P. 2. cap. 15. in Melenterio, ita quidem ac pertingat ad Plexum Melenterii maximum, qui quascunque ex Causa irritans & contrahens Dolorem Intestinorum & Vorticulis inferit. Sic Dolores Abdominis, qui affligunt parturientes, & dolores post Partum, &c. sunt tales spasmi, quibus Uterus & Melenterium, ipsaque Intestina acervim nervorum, sensibilibus convelluntur, & Convulsionem Abdominis inferunt; quibus in Partu accedit convulsiva Uteri contrahente; unde non rarum est, quod Mulieres committunt post Partum Dolore Colico laborem; ratio est Convulsio spasmodica partium Abdominis. Nec rarum est, quod Mulieres sub difficili Menstruum fluxu patiantur Tormina gravis Abdominis, est similibus Intestinorum spasmi.

Tormina Abdominis Habitualia sunt illa, quae habitum quasi contrahunt: I.e. quae certam in corpore & fixam radicem dispositionem, quae Causam antecedentem, & testem fontem in corpore latenter agnoscunt, quae leviter a Causa praetexta, vel occasionali quascunque in corpore latente commota, atrociter, nunc levis, Tormina Abdomen occupant, & aliquandò agrum cruciant, utur Intestina, quoad Contenta, rectè se habent. Tormina haec nunc successivè denud remittunt, sed saepius reverti solent, in quibus saepe Umbilicus interiorum retrahitur, interdum insigniter distenditur, & denotum notabilem contrahi: subinde etiam in Epileptico morbo, interdum in Paralytica pathemata transmittitur; cuius rei nuper bina exempla vidi. Mallet cum in tertium annum crebro Epilepsia esset affecta, gravissimo corripiebatur prosopismo, quo efflante, de humilibus talia, quae Intestina lacerant videntur, convelluntur. Talis domo est v. g. Dolor Abdominis Scorbucorum, semper in suffocationibus hypochondriacis vel hysterice virgo dedit, Virorum & Mulierum, est obviis, estque nihil aliud, quam Convulsiones Melenterii, & Plexuum nervosorum, & conjunctorum Intestinorum, quarum partium vehementer contrahuntur ultimas insequitur faucium contrahit, & quasi suffocatio, in hac praeter Tormina Abdominis adiunt difficiles Respirationes, *sufocatur ut morbum*, inquit.

Pertinet hic etiam isti gravissimi Abdominis Dolores, qui non raro Morbis durioris, & in specie Febribus intermittebus male curatis, in quibusdam superveniunt, quod cum talio experimus, qui multa condone remedia Evacuantes, qui frustra propinantur, & potius malum irritant; sicuti etiam mihi semel evenit, qui curae volui Febrem intermittemem solo Olio Sacchari Jalaperi: sed post everserat Dolores atrocissimos, qui ulla Purgantibus levigari non poterunt: ad aliquos dies continuabantur Tormina Convulsiva, orta ex Febre illi suppressa. Originem videntur habere ex metastasi Fermentis morbo ad Glandulas Melenterii, Nervus inaprimis eleca Plexus Mesenterici vellicatis, unde postmodum spasmi dolorosi pertinacissimi partium Abdominis membranasum superveniunt; sicut etiam non raro sunt similia Tormina in Melenterio Abfessibus, Morbibus cognatis: vid. BARTHOLINUS ann. 4. Epil. pag. 253. Propter communicationem spasmodicam edoce etiam *Bartholinus*, certique temporibus affligit, observata sunt.

Omnes hi Dolores, tam Humores quam Convulsivi, hoc commune habent, ut ratione aetiorum sunt cum Ardore aut Phlogi plus minus intensi, nunc verò cum Algore sine Frigore aut Rigore fœda affligant, nunc Vomitus adei, nunc adest, nunc, idem saepius, contenta Alvi obstruunt. nunc Alvus fluida, interdum nimis aperta. *Ardor & Ales* nunc universum corpus occupat, atque plus minus febrilis est, & verè ea impetu spirituum, & concitatore sanguinis ceterorumque Humorum motu, occasione Dolorem excutitur, oratur: interdum solum in profundis sub Hypochondrio dextro propè regionem imbarem, ubi inferuntur Ductus Pancreaticus & Choleochus in Intestina Duodenum, percipitur. Hic autem Ardor & Phlogies interdum perceptibilis sunt ex Effervescencia Acidum cum Bile acione; eundem enim Caloris ac Ardoris sensus oritur, qui acrius insigniter est molestus, illic frequentius in Dolori Lambi, Intestinali,

nali, seu circa regionem Intestini Duodeni: de hoc nuperrimè habui Observationem in Subiecto, maximè Bile oleosa prædicto. *Aliter* verò, aut Colicæ superveniens *Ripæ*, qui in Abdomine percipitur, qualis e.g. etiam interdum in principio Febrium intermittenrium obviat eî ex contraria causâ. Oritur nempe ab Acido omnis acri simplicis aut austero, aut alio modo excessivo, quod occurrere sibi paucè, vel minis oleosis, aut etiam obcurat à materia viscidâ in Intestino Duodeno, ibidem cum eadem concurrere effervescent quidem, Dolorem tamen cum Frigoris sensum junctum infert: sicut videmus Spiritum Vitrioli Sal volatilem non oleoso affusum, effervescentem quidem, sed satis frigidam, inferre. Hoc Frigus sæpius quidem in regione Lambæ, & interdum etiam in aliis Intestinarum locis, percipitur prout plus vel minus Acidi, aut copiosius ille Pancreaticus exillat Succus. Reverè autem vis videtur esse positivam Meli, quâ potius oritur ab Acido peccante, Membranas metâ circa et viscosas vellente, & in spâsmodico genere, quæ Frigoris sensum locum repræsentat; parili ferè ratione, atque Rigor & Frigus febri nuntiât à tali Membrana circum Præcordia, & hinc Panniculo carnosâ, spâsmotremulo oritur. *Præterea* interdum Abdomine dolentes affligit, præsertim in Colica Convulsiva erebrioribus observantur, ut in Nephritica, Hysterica & Scorbutica notum est: minus in Colica Humorosa, nisi vel Intestina superiora temia magis afflicta sint, vel occasione Allumptorum in Ventriculo corporum, malum ortum fuerit; interdum tamen à Colo malâ affecto, quatenus Ventrículo proximè subleantur, Vomitus coarctari solet. *Alia adflicta*, ut plurimum erit ex Intestinarum convulsivâ, eaque pertinaci in quodam loco contractura; unde in Convulsivâ frequens est, & hinc etiam in Humorosa, magis tamen in illâ, & etiam si aperiatur Alvis in Convulsivâ, parum commodi exinde percipiuntur; sed in Humorosa, in hac enim, si evacuetur, quod evacuari debet, melius ordinario habere solent agri.

Anterior illius originem optine explicat, v.g. Spiritus Vitrioli acida Oleo Terēbintinâ affusis, ex quibus oritur effervescentia cum intensissimo Ardore, ita ut per vitrum manus infensèr incalcat, & læpius vitrum rumpatur, vel si confusantur Spiritus Salis rectificatus cum Spiritu Vinâ rectificato, ex quibus duobus, celeri manu permixtis, tam intensâ excitatur Calor, ut intestum erumpat flammula, & vitrum, nisi sit admodum capax, in mille frusta dissiliat: simili ferè ratione Acidum vitiosum nunc ex Pancreate, nunc aliis locis ad Intestinum delatum, occurrere Bili, Ardorem inferre solet.

Cautum pœter hunc Ardorem, etiam non rarè sunt Ardores in Abdomine, ut in aliis locis, hi sunt conjuncti cum sensu posticâ, & sunt Dolores Ardentes Pulsatioris, qui oriuntur ex Inflammatione cupidiâ Intestini, quando lo Sanguis in Vasis capillaribus Intestinarum effunditur, ibique Inflammationem inducit, in qua Inflammatione inseparabilis comes est sensus pulsatorius.

PARS AFFECTA.

Pars affecta in talibus Terminibus semper sunt Intestina primariò, nempe à Morbo, i.e. à Dolore. Pars verò affecta à Causâ in Colica Humorosa sunt eadem Intestina, uti etiam in Colica Convulsivâ, quando Malum est per Effensionem; sed in Colica Convulsivâ per Consensum, aut etiam in Colica Habituali, visum est in Nervis, & Plexibus Meisenterici nervis, vel per Consensum affectis, vel ab Acido acri eo deposito & congeito irritatis.

CAUSÆ.

Ex his patet, quæ sint Causæ omnium in Intestinis Dolorum? In genere sunt duæ Causæ, quæ Dolorem Intestinis inferunt.

Prima Causa sunt Contenta in Intestinis varia, plûs minus naturalia, quæ ibidem Dolorem inferant, & multiplex eorum nocendi artificium.

Secunda Causa est spâsmotica Intestinarum Convulsio, quæ Intestina in miras dolorificas crispationes & contorsiones cogatur.

Utriqueque concurrunt in graviore Dolore hæc duo, ut ex adit à liquido Acce, impauius ex Pancreate, quod Intestina irritat aut vellat, & hinc supervenit ex irritatione spâsmotica & dolorifica Intestinarum Contractio.

Adeoque in omnibus Intestinarum Terminibus, tam humorosa quàm convulsivâ habitualibus, quoad Causam Antecedentem, respiciendum est imprimis ad Acce-acidum

plûs minus austero, plûs minus viscidum, vel ex Stomacho ad Intestina delatum, adeoque ab Allumptis vel viscidis, vel viscosè digestis, est distributum: vel io Plebis nervis Meisenterici, vicinisque locis membranis, peritaciter hærens, & à quacunq; Causâ externa excitatum.

Quoad Intestinarum Contenta, quæ Colicam Humorosa constitunt, imprimis dixi esse attendendum ad Acidum: vis enim datur Colica vera, quæ non habet ortum, seu Doloris sensum, ex Acce viscidis, & Intestinis molle; qui si adit, dat Termina, vel Flatum, diffidentes Intestina: hinc Colica Stercoraria à Stercoribus induratis hinc Colica Plebis à Succis glutinosis, imprimis acidâ, item ab Allumptis, præsertim Fructibus horæis, fermentescibilibus, item à Cerevisia novella, item à Pinguium cum superio. Flo Potu frigido, vel acido erebrioribus oriatur Colica. Bili enim per se inepta est ad inducendum dolorem. Colicum, eum per se diluat potius Contenta, & ita ratione. Salis volatilis oleos, quod est saponaria natura, Intratis quâ absterget, temperet acorem, & adherentes, sordes dissolvat. Clysteris naturalis per absum Naturæ quâ abstat: Colica contra lethalis est, ubi abest Bili; aut si Biliâ observetur Colica, à Bile poracea seu Terugiosa originem eadem habebit: Acor potius blivus in subiedo plûs minus viscidis hærens, indeque elevat Flatum, Humorosa Colica inferunt. In specie sub Purgantibus generosioribus Hypochondriaci & Scorbutici sæpius Termina patiuntur, partim à Simulâ Remediâ Purgantia, partim ab acrioribus ad Intestina commotis Humoribus: item post eum Alimentorum difficultes digestibiles, aut qui copiosum Mucilaginem viscidam, loco Ghylî subministrant. Colicæ subinde oriuntur, præsertim si Abdominis superveniat nimia refrigeratio: in specie Pinguiâ assumpta, quibus Potus facile acidosus superbibitur, abest in Mucaginem viscidam, & aciescentem, quæ Intestinis postmodum dat Colicam. Sic potius Cibos acidos, Fructus horæos, Poma cruda immatura, Pyra, Vinum, & Mustum insumatum, post Potum non rariè delectatos (& Kæterling) nec deputatos, item post absum Cerevisiæ alacæ (& Breyhan) ex Tristico facile fermentescibilibus, & limbulum Potum, una cum Melle alacis dulcibus, peritaciter in digestionibus debilibus Stomachi, fermentantio & accipiendo subinde Colicæ superveniunt. Item ex Officinarum oimio via frequenter oriuntur atrocissima Termina, quod aliquando observavit FORESTUS l. xi. Obs. 7. Præ cæteris Flatum, hinc Stercora durius retenta, & tandem Cruditates viscidæ acidæ in Intestinis frequentissimè Termina Abdominis inferunt: hinc Hypochondriaci, in quibus notissimè est excessus Acidi, & in quibus reperitur materia viscidâ io Abdomine & Intestinis, & copiosus Flatus, admodum proclives sunt ad Termina Colica. Hinc redè Mulieres prohibent Nutrients ab omni Acido, etiam enim Infantibus in Termina Ventris incident. Acidum enim, ut Lac coagulatur in Stomacho, ita viscidum Mucilaginem in Intestinis crasse producit, unde exoritur Termina Infernum. Hac ratione intelligenda venit doctrina Paracelsi, quæ pro Colicâ adducit Spiritus Salium resolutos, aut etiam Tartarum nimis resolutum, aut etiam coagulatum nimis, qui Tartarus stypticus aluminosusque acutus Spiritibus Intestinis à vicinis partibus irritat & excruciat: nempe Acidum peccans hoc ipso infusatur. Stercora quod attinet omnia indurata, in Intestinis remanens viscidâ & crassa, & ab acido plûs minus austero coagulata, Colicam Stercorariam dicam, subinde perquam omnemacem, inferant, subfistentibus firmis in Intestinarum cellulis dictis Stercoribus, & ita ad Dolorem eadem irritantibus. Hinc in idem interdum supervenit Colica pertinacissima, ex defectu Bili & abundantia Succi Pancreatici in Intestinis, unde Contenta ab Acido coagulata & consipata Intestina vellunt: hinc Acidâ maximè nocent Colica laborantibus.

Facit hic Doler Colicæ in Lus Gallicæ interdum affligens, ex Acido specifico notus viscidis, quem observavit ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Præterit Admir. Obs. 22. nullis, nisi Mercurialibus Unguentis, succumbens.

Pertinet hæc varia Præternaturalia dephutia: uti, quando v.g. ex Nummis aureis deglutitis, indeque eorum subfistentia, in cellulis Celli Stercori transiunt impediendo, contumacissima Colica oritur: vid. BARTHOLINUS Cræ. 3. Et 69. item BORELLUS Cræ. 4. Obs. 25. Item ex Potu Aquarum Arsenico infestatum Colica observata est. Colicam atrocissimam cum Tollis, præcordiorum angustia & Respirandi difficultate, à Vapore Saturni hausto, videb. in M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 131. Idem observatum est ab Aquâ hausta ex Vain plumbeo incis incrustato. Ibid.

Pertinent hæc Calculi, qui subinde à Colicâ fuerunt ex-

creti

ereti cum levamine, itaut revera detur *Colica Calculosa* à Calculis in Intestinis coagulatis: qualia exempla vide l. 4. *Obs. 44. & segg. HORSTII.*

Ex Vermibus quoque & Lumbricis in Intestinis stabulantibus gravissimus Colicus Dolor obortus est: vid. AMATUS LUSITANUS *Cent. 1. Cap. 3. & 33. p. 331. 336. & 337.* de gravissimo item Dolor Colico, percepto ex Calculo magnitudine Ovi Gallinæ excreto: item à BENEVENO *cap. 9. pag. 132.* ubi habet Colicam Dolorem intensissimum, qui curatus fuit excreto Lapide ex Intestinis per Fomenta emollientia soluta: Conf. etiam SCHENKIIUS, & M. A. N. C. *Ana. F. Obs. 70.* cum Cura, HILDANUS *Cent. 1. Obs. 77.* THONERUS l. 3. *Obs. 4.* RHODIUS & SALMUTH: Dolorem à Laceris & Buionibus vide apud BARTHOLINUM *Cent. 3. Myf. 9a.* Tandem speciosa buci ipsi Intestinum Affectus p. n. multiplices Dolores inferunt: ut nil dicam de Inflammatione Intestinorum. Colicam Dolorem Ichthem ex Intestinis à Dysenteria conglutinis, observat RHODIUS *Cent. 1. Obs. 77.* Sic pariter Colicam Ichthem notavit SCUTETUS in *Armen. Chirurg. Observ. 61.* patam ob Cancrum occultum, ex Obstructione occulta Mestus Choleodochi.

Pertinet hac denique, quod observat HORSTIUS l. 4. *Obs. 47.* Tormina continis sub Hypochondrio dextero à Calculo, Vesicam biliarium replente, & Intestinum atterente. Pariter Colicam Dolorem à Picula, à externa Intestinorum superficie hærente, notat RIVIERUS in *Obs. communis.*

Nil magis solet excitare Colicam vitio Intestinorum, quam Acidum intestinis inimicissimum: item Frigida, ut alias partibus nervosis infesta, ita in Intestinis faciant Colicam, five Acidum hospitem in subiectu serpo, five vitio digestionis primæ, five per Pylorum, & ex Pancreate ad Intestina veolat.

Secundam Causam Colicæ dixi esse non Contorta in Intestinis, sed potius spasmodicam Convulsionem & Contracturam, quæ constituit Colicam Convulsivam. In hac considerandum etiam venit Acidum, Nervosorumque foris inimicissimum, in Plexibus nervosis Mesenterii vicinique locis pertinacis hærens, à quacunque Causa externa excitatum, (idque vel cum nutrimenta proprio ad distas partes delatum, vel cum viculo Lymphæ eo depositum:) id quod in Scorbüticis, Hybericis, &c. post Febres malè curatas certissimum est. Item Tormina Abdominis contumaciore, ut ut semper sequi atrocia, sæpe ab Abscessibus in Glauulis Mesenterii & Pancreate fiunt, teste BARTHOLINO l. 2.

Sunt autem hæc *Termina Convulsiva*, vel *Hypochondriaca* & *Hyberica*, vel *Febrilis*. *Passivum Hybericum* quidem quod attinet, revera hæc nihil est aliud, quam species Colicæ Convulsivæ, cuius fundamentum hæret in Plexibus nervis Mesentericis irritatis, & in spasmodicis Convulsionibus concitatis, unde etiam partium superiorum superveniunt spasmi, iodeque præcordiorum angustia, difficiles respiraciones &c.; nam sensus Globi in Abdomine moti, quem Mulierculæ & ignorantes Medici pro Uteri habent motu, est Plexus centralis maximè convulsus, adeo ut etiam observetur talis Globus in Viris, qui tamen Utero carent: vid. WILLISIIUS de *Passivum Hyber.* Scorbütici Dolores omnium sunt vehementissimi, & miserè torquent, ut iuxta illum cæteræ species sint saltem rixus jocique; quos ex Convulsionibus Intestinorum redde, & omnium opinio demonstrat / O-HANNES DRABITIUS in *Institutione de Scorbuto delat.* rixus S. S. qui eleganter hoc negotium declaravit per Motus

convulsivos, & Spasmos Nervorum, in & extra Meicenterium notorum, & ad Intestina derivatorum.

Inchoat in specie ejusmodi Dolor in Dorso ac regione Lumbari, hunc & pergit ad interiora, & Intestina graviter affligit: inchoat scilicet, ubi annectitur Meicenterium, & pergit anteriora versus usque ad Umbilicum: interdum est admodum vagus & occurrat, interdum fixus, & in quo Umbilicus interiora versus retrahitur, & interdum in Intestinis & Abdomine Convulsionem & Contracturas inferit dolorosas: Subinde hæc cessant, & superveniunt nunc Convulsionem artuum, tunc verò Paries, quibus cessantibus, repetit Abdominis Dolor: interdum pertinaciter Abdomen afficit. Quæ omnia certum non possunt concipi, nisi per talem Convulsionem. Accedit quoque, quod in tali Colica Poles læpè sit peritissimè elatus, & interiora versus contractus, quando nempe & ipse est convulsus, ita ut nullum Clyma poterit applicari propter Spasum, simul Intestinum Redum occupantem. Fit non raro, ut ipsum Abdomen excavatum appareat, & Umbilicus introsum versus retrahatur videatur, propter istas Convulsionem, quibus Umbilicus, & foras etiam ipsum Peritonæum simul afficitur. Cæterum est, quod hi Dolores Abdominis Convulsivi sint gravissimi & contumacissimi, & nil rectè traduntur, facili degerant in Paries, nti in locis vinosis, Austria, Moravia, Franconia, &c. sæpi experientur incolæ, vel Contracturas Artuum. Habet Virum scorbüticum, qui alias optime valet, levi autem occasione, vel ira, vel terrore, vel ex assumptis alimentis tantillum ferme telescentibus, ex dactu Vini Rubi Idæi, ex Potu Cerevitiæ non rixè delectatæ, &c. subito corrumpit Colica Convulsiva: horridus paroxysmus est, post horas sex convalescit, percipit dolorem perita Spina dorsæ, quæneus ab acido membræ nervæ vellicantur, & ipsum concipiunt: vibetur ad Umbilicum, variis Torminibus & torturis totum Abdomen excruciat, donec ad Spina dorsæ quæres resiliat. Subinde prostant vestigia talium Dolorem Convulsivorum apud TULPIUM l. 3. *Obs. 32.* & THIERMEYERUM *Pr. T. 2. cap. 4.* aliisque Scitpores Prædicos & Theoreticos; sed quos ipsi saltem ex Humoribus, speciatim ex Bile derivare nuntur. Non autem commodè qui hæc extricare possunt: nunc dicunt, oriri ab Humoribus intra Membras Intestinorum, seu ipsam eorum substantiam, nunc in concavo, nunc in parte convexa Intestinorum contentis, nunc dicunt oriri ab Humoribus biliosis vel acerbis in duplicatorem Peritonæi affluis: alii alii aliignant Causas: Conf. FORESTUS l. 25. *Obs. 3.* item ROLDANUS in *Enchirid. Anatom. de Peritonæo cap. 13. pag. 98.* Sed facilis est doloris horum symptomatum explicatio, modo superius dicta ponderetur. Solus WILLISIIUS primum oculos aperuit, tam in *Anat. Cerebr.* quam in *Tr. de Morbis Convulsivis*, ut & de *An. Brutorum F. 2. cap. 15.*

Febrilis Termina sunt ea, quæ Febris intermittens diuturna omni adeo bene curatis supervenire solent, ut ut etiam critico modo superveniant: Alius pertinaciter est clausa, Purgantibus etiam fortioribus si laxantur ægri, si tamen ferè sine Dolorum levamine. Videtur autem oriri ex Mæstasi materia morbozæ, delatæ ad Glandulas Mesenterii, vellicantis partes nervas, unde etiam non raro fuerit similia Tormina in Meicenterii Abscessibus:

Dolores Abdominis considerantur secundum suas Differentias, vel ratione Partis affectæ, vel ratione Causæ efficiens: quod ut clarius percipiatur, inspicitur sequens Tabula.

I. In Parte affecta consideratur

Intestinum datus
Situs Doloris, unde Dolor, vel

1. Tenax: Dolor fixus.
 2. Crassum: Dolor Colicus.
- Hypochondriacus utriusq; lateris. Lumbaris, qui iterum vel Umbilicis.*

Hypochondriacus, Mesentericus, Pancreaticus, Intestinalis.

II. In Causa Efficiente
consideratur Dolor, velNumerus A.
Convulsivus, B.A. In Doloze Humorefa
consideratur vel

Modus

Ficus, seu Terebrans,
Pungens,
Diffundens,
Bulens,
Convulsans,
Gravans,
Pulsans,

Causa

Flatus,
Sarcina indurata,
Hæritia,
Mucus tenax,
Assumpta varia: Horum facillè
fermentescibilia,
Cetrifera novella,
Pinguis cum Potu acido,
Nemini auri,
Coliculi,
Intestinelorum affectus: scil.
Hæritia, Inflammatio, &c.ab Acido in sub-
jecto plus minus
viscido,

Modus Doloris

Latrans,
Lancinans,
Centurgens,
Pulsans,
His additur Abdomen tendens,
ut in subluxatione Verte-
brarum,B. In Convulsivo
consideratur

Accidentali

Nephritica,
Parturientia,
Purgantia,
Menstrua,
Abcessus partium vicinarum:
ut Glandularum Mesenterii,
Pancreatis &c.ab Acido Nervos
vellicante,

Causa

Hypochondriaca,
Hysterica,
Stercoraria,
Febrilis.

Habituali

Ratione Adjuncti in genere est

Frigida,
Calida.

Multa essent dicenda de Colicis Malignis: sed temporis angustia impedit hoc. Moneo saltem, quod Vomitus & Singultus talis Colicæ, ex vicinitate Stomachi & Diaphragmatis, omnes hæc ex similibus Spasmi ex Mesenterio vibrati.

DIAGNOSIS.

Pergo ad Signa Diagnosticæ:

Diagnosticæ Signa Doloris hauriuntur ab ægro & symptomatum syndrome: In hac simus cauti, ut diagnosticamus bene in Colicæ affectu eam, quæ est conjuncta cum Nephritide, à follicaria.

Ute autem ritè cognoscantur hi Dolores Intestinales, & ritè à se invicem discernantur, tria summa capita observanda sunt:

1. Antecedentia, ut constitutio ægri, victus ratio, mores consueti, an scorbuticus, calculosus, &c.
2. Adjuncta seu essentialiter inhærentia: nempe ipse Doloris modus, & adjuncta reliquarum partium symptomata.
3. Consequentiæ: mutationes nempe in Urina, in Alvi excrementis; Juvæcia & Nocentia, si Alvus non respondet; Fæces induratae, vel Intestini contracta; si Purgatoria nil evacuant, vel parum sine levamine, est Colica Convulsiva.

Ex his invicem collatis, sed probè ponderatis, facile est, Dolores dictos à se invicem discernere, & sciendi eorum rationem cognoscere. In specie attendendum; an sit Colica Humorefa? an verò Convulsiva? & si hæc; an sit Accidentalis? an verò habitualis? & si habitualis; an sit Stercoraria, hysterica, an alia?

Speciatim stipiùs confunditur Colica simplex cum ista, quæ supponitur Nephritidi. Ut ita melius cognoscatur radix morbi, omnes circumstantiæ probè penitendæ, & speciatim Urina, in qua, si sit Colica Nephritica, notabiles mutationes

observari solent: si enim sunt aquæ, Colica est Nephritica: intestinus tinctus in medio Coloratus in superficie, signum Colicæ Stercorariae.

Solitaria facillè distinguitur ab ea, quæ incipit in Affectibus Uteri: Nam ubi cum convulsione Intestinelorum concurrens convulsio partium ad Uterum pertinentium, percipitur Dolor, qui à Lumbis deorsum trahitur versus Sanum pudoris: item si adest simul Affectus Uterinus Dolor iste etiam ad Os Femoris seu Coxendicis pergitur: item, si adest iudicatus Dolor iste eum difficultate motus, percipitur gravamen in Dorso & Lumbis prope Renes, & hinc sequitur postmodum Dolor colicus.

Denique si acerbatur Dolor colicus, ut fiat Passio hysterica, tunc percipitur simul angustiam in precordiis, item percipitur impedimentum in respiratione, propter similem convulsionem Diaphragmatis deorsum versus.

Ut à Dolore Nephritico distingatur Colica: observetur quod in Dolore colico post partum sit remissio, imprimis post assumptam Aromatica, quæ sunt colicæ remedia: Dolor verò Renalis post partum fit acerbior. Deinde, si adest Dolor Renalis, mutatio semper est in Urina, quod non est in Colica: aut, quod obiter moneo, quod in Dolore colico Scorbutico adfit Stranguria insignis, & Urina coloris admodum fulgidi & salini excremitur, sed non semper tandem ubi Dolor est colicus, clysteres aut evacuationes Alvi eum levant: Renalem aut parum, aut nihil solent levare. Denique in Renali Colica adest semper Dolor plus minus obtus ac gravativus in Dorso circa Lumbos, qui non est in Colica vera.

Plura de Signis distinctivis Colicæ veræ à Colica Nephritica, videb. in SENNERTII PRAXI.

In Colica Convulsiva est dolor lacerans, sed non ita gravativus & obtusus, ut in Renibus: Unde excrementa pallide & lactea: copioso sedimento impregnata, quod non fit in reliquis speciebus colicæ.

PRO.

M. pro Clysmate una vice applicando. S.
Clyster Emollient.

Ubi verò sint Flatūs, convenit Clysmata Carminantia, &
Emollientia, imprimis cum sale gemmæ injectum: c. g.

℞. Apoc. Carm. Mii.

Rad. Angel.

Levis.

Sem. Cerei an. ℞.

Bacc. Junip. ℞.

Coqu. in l. q. Aquæ:

Calatura ℥viii. addo

℞℥℥. de Sacris Lauri ℥vi.

Mell. rosar. ℞.

Salis Gemmæ, vel Niri dapor. ℞i.

M. f. Emema: S.

Clyster Carminans.

Vel

℞. Apoc. Emoll. Mii.

Carmia. Mi.

Sem. Cerei ℞.

Baccar. Junip. ℞.

Coqu. in l. q. Aquæ:

Calatura ℥viii. addo

℞℥℥. Niri. cum Agar. ℞i.

Mellis Mercurial. ℞.

Salis Gemmæ, vel Niri ℞i.

M. f. Emema: S. ut anteq.

Vel

℞. Herb. Verdu.

Flor. Chamom. an. Mii.

Rad. Levis. ℞.

Sem. Anis. ℞i.

Coqu. in l. q. Aquæ:

Calatura ℥viii. addo

Sal. Gemmæ ℞.

Mell. murcor. ℞.

M. pro Clysmate. S. ut suprà.

Vel

℞. Herb. Calaminash.

Rosa an. Mii.

Flor. Alib.

Aneth.

Chamom. an. M℞.

Bacc. Lauri.

Sem. Cerei.

Cumini an. ℞.

Fenugr.

Lini an. ℞i.

Coqu. in l. q. Aquæ:

Calatura ℥x. addo

Salis Gemmæ ℞i.

Ol. Anethi.

Rosa.

℞℥℥. hier. pier. an. ℞.

M. f. Emema: S.

Clyster contra Flatūs.

RULANDUS cum maxime expertum Clysmata laudar in
desperata alvi obstructione, in dolore colico, & Iliaco so-
quens, utut incommoda sit compositio:

℞. Decoct. fer. chamom. vel verbascoi ℥viii.

Ol. Cham. per infusionem & decollationem ℞.

℞℥℥. levis. Lauri. ℞i.

Sacch. rubr. ℞.

Diagrid. gr. vi.

Sal. comm. vel Salis gemmæ ℞i.

M. pro Clysmate.

Cujus usum commendat, tanquam sibi scriptis expertum.

Loco Salis gemmæ in colica flatulenta potius olea dis-
tillata simul addenda, quam potenter penetrant, & flatu dis-
cutiunt: c. g. Et Clysmata Carminativa Anodyna, quæ
etiam hypochondriaci, item hyberici commodè præscribi
possunt hoc modo:

℞. Fol. Lauri pili. vel M. i.

Flor. Chamom. Rom. aut vulgar. M℞.

Rad. Angel. vel Levis. ℞i.

Sem. a. Cold. minor. an. ℞i.

Coqu. in Ag. comm.

Calatura ℥x. addo

℞℥℥. de Bacc. Lauri ℞i.

Syrup. papav. f. ℞. vel loco hujus Ther. ℞i ad ii.

Ol. destill. Angel.

Cervi.

Cumini.

Tom. II.

Bacc. Lauri an. gutt. iii. vel iv.

Virid. Ovi No. i.

M. pro Clysmate pro 2. deflatis injiciendo, propter flat-
tus, qui impediunt, quo minus totum una vice possit
injici. S.

Clyster Lenitivus contra Flatūs.

Vel

℞. Fol. Lauri Mi.

Flor. chamom. Mii.

Rad. Angel.

Levis. an. ℞i.

Coqu. in l. q. Ag. comm.

Calatura ℥ix. addo

℞℥℥. de bacc. Lauri ℞i.

Theriacæ ℞i.

Ol. destill. cervi.

Cumini.

Bacc. Junip.

Lauri an. gutt. v.

M. pro dysmate, duabus vel partibus vicibus injiciendo
S. ut anteq.

℞. Sammirat. Anethi.

Herb. chamom. an. M℞.

Rad. Levis. ℞i.

Bacc. Lauri ℞i.

Sem. fenic. ℞i.

Coqu. in l. q. Aquæ:

Calatura ℥ix. addo

℞℥℥. de bacc. Lauri ℞i.

Theriac. ℞i. ad ii.

Ol. destill. Angel.

Cumini.

Rosa an. gutt. v.

M. f. Clyster pro duabus deflatis: S. ut suprà.

Vel

℞. Herb. chamom. Rom.

Mentha an. Mi.

Bacc. Lauri ℞. ad i.

Janiperi ℞.

Apoc. Anis.

Cumini.

Fenic. an. ℞i.

Sal. Tarr. ℞i. ad iii.

facil. & coctus. coqu. in l. q. Aquæ. simpl. vel ubi Sal Tas-
tari additum non fuit, in Urina humana:

Calatura ℥ix. addo

℞℥℥. de baccis Lauri ℞i. ad ℞i.

Mell. rosar. ℞.

Ol. destill. Anethi vel Bacc. Lauri ℞. ad ℞i.

Virid. Ovi. No. i.

F. Emema: S.

Clyster contra Flatūs.

Vel

℞. Flor. chamom. Mii.

Fol. Lauri M℞.

Rad. Levis. ℞i.

Sal. Tarr. ℞i.

Coqu. in l. q. Aquæ:

Calatura ℥viii. addo

℞℥℥. de bacc. Lauri ℞i.

Ol. destill. bacc. Junip. ℞i.

Cumini. ℞.

Syrup. papav. simpl. unc. i.

M. pro dysmate duabus vicibus injiciendo: S.

Clyster contra Flatūs.

Ulcus, ubi sunt omni Flatūs in intestinis pro cæteris
convenienter clysmata ex urina pueri, quæ mira faciunt in
afflictibus intestinalium flatulentis: G. scil.

℞. Urin. pueri impuberis:

& ipsi addatur

Fermenti parum:

ipsique postmodum incoquantur Semen Anis & Anethi, &
Calatura unc. vii. vel ix. addatur

Mellis dapsam. unc. i.

scopus injiciantur: insigniter confert afflictibus

Flatulentis.

Vel

℞. Decoct. cervi. unc. vi.

Urin. human. unc. iv.

Fermenti ℞i.

Salis comm. ℞i.

Mell. rosar. unc. i.

M. pro dysmate ad imitationem VALERIOLE præscri-
pro

V

pto in gravioribus doloribus Flatulenti. Vel

℞. Spec. Carminat. M.℞.

Coqu. in l. q. Olei Rosaceae 3℥.

Colatura 3℥.℞. adde

Ol. Amygd. Terebinth. 3℥.

℞. M. l. Enema: S.

Clyster contra Flatus.

Vel

℞. Urinae puericulae 3℥.

Sperm. Cer. 3℥.

Vitell. Ovi No. 3.

Syrup. Papav. alk. 3℥.

M. l. Enema: S. ut antea.

Confec. DEODATUS in *Palaeodiariorum* p. 197.

Faciunt hac etiam Clysmata Terebinthinata cum urina, quae superius in Dyenteria dedit; & imprimis in doloribus convulsivis, Nephriticis, Hystricis, Scorbaticis, &c. sunt optima, & multum commendantur à THEODATO in *Valer. pag. 127.* qui etiam in Colica flatulenta hoc Clysmata praescribit (*Utriusque l. c. c. 127.*)

℞. Tel. Mercurial.

Chamom.

Rosin. M.℞.

Alysch.

Ruta

Laurian. M.℞.

Sem. Camom.

Ros. Laurian. 3℥.

Infusa & contusa coquantur in Aqua rosae, & Rosi Mal-

vae. an. 3℥.

(Ingredientia sunt nimis copiosa propter 3℥. potest

facile emendari.) *adde*

Ol. Rosae express. 3℥.

℞. Clyster 3℥.

M. pro Clysmate in affectibus Renalibus & uterinis.

Vel

℞. Urinae, aut deorsu Emoll. ad imit. vitellu 3℥.

Terebinth. cum Vitello Ovi deorsu 3℥. vel iii. ad 3℥.

Mell. calar. vel Mercurial. 3℥. vel 3℥.

M. l. Clysmata: S.

Clyster Lenticivus:

Conferatur hic WILLISIUS de *Animæ Interitum*, ubi

de *Colica pag. 394. p. 2. c. 15.* & in specie in *Colica Nephritica*

proficui sunt Terebinthinata Clysmata.

Sunt, qui cum singulari Clysmata laudent; & commendant

decocum Veronicae cum Myrrha, & Vini, quibus B. D.

LANGIUS addit Salis Tartari dr. 3. ad dr. 1. aut Tincturam

Tartari, Senibus Clysmata ex Vino malvatico cum Oleo

Chamomillae, & quae vim anodynam habent, facienda;

hinc Symplicium Papaveris, sed caute, addendum.

Fortiores Clysmata, etque in Colica humorosa saltem

conducuntia, minus in convulsiva, sunt ea, quae ingredi-

unt Colocynthis in petia ligata, vel Aqua benedicta, aut

infusum cotici metallorum ab unc. 1. ad unc. 1. vel iii. de quibus

Clysmata Antemonialibus, aliis irritis, in colica profici-

unt, vid. RIVERIUS c. 1. 1. 53. & 67. Item c. 2. 1. 52. &

c. 3. 1. 52. & 53. de *Alvo obstru. l. v. 2.*

℞. Javis piscum 3℥.℞. vel vii.

Aqua. Bened. 3℥.℞. vel iii.

℞. M. l. Enema: S.

Clyster Lenticivus:

Vel

℞. Decort. Pifer. 3℥.

Stec. Reg. Antimonii 3℥.℞. ad 3℥.

Mell. mercurial. unc. l.

M. pro Clysmate: S.

Clyster Absterivus.

Imitatur hac in parte RULANDUM, qui ipse hic est

Antecessor, & tali utitur Enemate cum Aqua benedicta

cum 6. unc. 1. 2.

℞. Decort. Pifer. (exegreg. absterg.) 3℥.℞.

℞. Bened. 3℥.℞. vel iii.

Saur. 3℥.

Ol. Olivar. unc. l. vel unc. l.

M. pro Enemate.

Initiatur quavis hora doloris recurrendis pro duabus,

vel 3. defusis: Indigniter hunc commendat Clysterem, &

quidem in contumacia alvi obstruente, in dolore illa-

co & Colico.

Simile exemplum habet idem in perniciosissima alvi ob-

struente in puerpera, quae per sodios & noctes nihil excre-

erat; & jam hancora per os exibat; curata hoc Clysmate,

in quo loco Aqua benedicta addit Extractum Liliae:

℞. Decort. Pifer. 3℥.℞. vel iii.

℞. Bened. 3℥.℞. vel iii.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

℞. M. l. Enema: S.

30. Clysteres sine effectu accepserit, alium Medicum Manuam ab 3. ad 3. b. cum 3. l. Olei Amygdalarum dulcium propinquant in Juculo Galinæ Pingui, & agrum a Dolore liberasse. Commendat hanc sententiam RIVERIUS Prae. l. 10. c. 1. Vel Oleum Amygdalarum dulcium loco Butyri Jucula admisceatur, quibus etiam Spermatidis Ceti 3. b. commode addi potest. Singulare Experimentum CRATONIS ad solvendum Aluum, & sedandos Dolores Colicos est Oleum Amygdalarum dulcium 3. b. ad 1. l. cum vino Malvas. & Spermatidis Ceti: vid. Differet. men. de Spermat. Ceti 1. p. 2. §. 4. par. 110. (K.)

Ut ergo blande laxetur Alvus in Intestinatorum Dolorebus, blandissime Emollientia & Abstergentia locum habent, praecipue in Colica Convulsiva, ubi Acris parum vel nihil operatur; Lubrificantia verò, ut Oleum Amygdalarum dulcium, & Pinguia, optime laxant. Inter Emollientia & Abstergentia sunt imprimis Potio pulsatilla, & hinc Pulveres salini cum stimulo scammoceato, Inter Lubrificantia & Pinguia convenit Potio PLATERI, in principio Doloris Colici propinanda, quae ex leniente & emolliente procedit. Praescripse est hæc:

℞. Ol. Amygdal. dulc. 3. b.
Miri Malv.

Syrup. Papav. an. 3. b.
M. f. Potio.

quæ detur pro Haustu. Vid. Observationes PLATERI: Nam & Oleum Amygdalarum dulcium in Juculo calido propinatum, subitè sedat Tormina Infantum. Loco Syrupi Papaveris etiam Spermatidis Ceti 3. b. addi, & ita Alvus laxari potest: Vel ubi tutius uti licet Purgantibus, Cremer Tartari cum Resinis Purgantibus propinquetur, ad imitationem WELLSII l. 1. pag. 136. c. 5.

℞. Crem. Tart. ʒi.
Scamm. sulphurat. gr. ii.
M. f. Pulvis: S.
Pulvis Aperiens.
Vel

℞. Crem. Tart. ʒi.
Mag. Jalapp.
Scamm. an. gr. v.
M. pro Alvi laxanda. S.
Pulvis Aperiens.
Vel

℞. Corall. rub. prep.
Matric. Lucii piforis an. ʒi. b.
Astr. fulm. gr. v.
M. f. Pulvis: S. ut anteq.

Vel Infusum Sennæ cum Sale Tartari & Zingibere paratum, vel Infusum Rhubarbari cum Senna, adhibeatur. Vel ubi viscidæ ac tenax Pituita primariè peccat, Potione cum Gummate Ammoniaco in Colica Humorosa sunt admodum convenientes: Propter ubi pertinax est Colica ex Pituita vitæ & acida.

℞. Aqu. Mentha ʒi. vel 3. b.
Cinnamon. ʒi. ʒi. vel 3. b.
Gumm. Amm. cum Aceto sel. ʒb. vel ʒi. ad 3. b.
Tart. viridiat. ʒb. ad gr. xv.
Scamm. sulphurat.
Trock. Alband. an. gr. i. vel ʒi.
Syrup. Rafas. selat. vel de Pan. ʒb.
M. pro una vice: S.

Potio Purgans pro una vice.

Potio hæc mirè saluberrimè educit. Vel

℞. Aqu. Ment. sen. Senn. Pomer. Boreodoff. anar. ʒi.
Gumm. Amm. cum Aceto sel. gr. xv. ad ʒi.
Folia Hypocistidis. ʒb.
Scamm. sulphurat. gr. ii.
Extr. Trock. Alband gr. ʒi. vel i.
Syrup. Rafas. selat. ʒb.
M. S. ut anteq.

℞. Aqu. Chamemill. ʒi.
Gumm. Amm. cum Aceto sel. ʒb.
Tart. viridiat. gr. xii.
Scamm. sulphurat. gr. ii. vel iii.
Laud. hystr. gr. vi.
Syr. de Spina cervin. ʒiij.
M. f. Potio: S. ut supra.

Tom. II.

℞. Lapill. Contr. prep. ʒ. xii.

Tart. viridiat. ʒb.

Trock. Alband. gr. ii.

M. f. Pulvis: D. S.

Pulvis Emolliens.

Curavi Juvenem, natione Westphalum, Mala hypocondriaco, ut vocant, alias obstitum, qui post ingremum corporis, in specie pedum, in ludensio ipellendo resistens, altero die incipere dolere latere sinistro sub costis: Dolor erat acutus, admodum ponderosus, cum frequentis vomitus admodum molesto, ipique ægro dolorosis, ingenti fœti, & virium prostratione, hinc Dolores lancinantes, sed raro, ex illo loco in totum Abdomen progressi, ad lumbos refluēti, & in sinistro hypocondrio tandem terminari solebant, ubi terebrantes punctiones primariè vexabant, Alvus erat obstrueta, respiratio erat parva seu difficilis, contactum in latere dolente & fortius prementem benè perferre poterat, punctioemque fixè insitum ad pericordia ascendere videbatur. Clymata quidem bene usquebantur, sed Dolores persistebant, unde usquebatur Alterantia, Anticolicas, Anthyphocondriaca, quæ etiam nil juvabant. Tandem Gummi Ammoniacum sequenti modo præscriberebam:

℞. Aqu. Mentha ʒi.
Gumm. Ammoniaci in Aceto sel. ʒb.
Tart. viridiat. gr. xv.
Scamm. rasati gr. iv.
Extr. Trock. Alband. gr. i.
Syr. de Pomis ʒb.
M. f. Potio.

Ab hac Potione r. s. sedes sine torminibus venerunt cum euphoria, & symptomata doloris evanuerunt.

Mercator quidam Arnæbergensis simili Dolore cruciatus, copiosè erat purgatus, sed Dolor persistebat: Praescripsi hanc Potionem, unde copiosis evacuatis viscidis, Gumm. exadit. Semel tamen in Virgine cachectica hæc Potio Dysenteriam excitavit.

Io. Declinatione verò Morbi, ubi viscidæ adhuc, vitæ & acida Pituita in Intestinis hæret, commodè usurpetur eadem Gummatum cum Mercurio dulci, qui eam potenter dissolvit & abstergit. Imitandus hæ in parte DEODATUS, qui declinante Morbo ex hac causa nato, præscribere solet has Pilulas.

℞. Mass. Nilal. Coch. min. ʒi.
Aquila alb. dulc. sen. Mercur. dulc. gr. xvi. ad ʒi.
Ol. dissill. Anis. gutt. ii.
M. f. Pilula mane deglutienda.

Inepta autem est hæc Compositio: possunt assumi alia, v. g.

℞. Mass. Nil. de Hier. cum Agar.
Mercur. dulc. an. gr. xv.
Trock. Alband. gr. i.
Ol. dissill. Anis. gutt. ii.
Cum Aceto Mentha f. Pilula: S.

Pilula Purgantes.

Mercurius enim dulcis est ceteris medicamentum, & in frequentiori usu est RIVERIO, in casibus Obstr. hepatis fit mentio Purgantis, quo vocat Calamellano Targui, quod nihil est aliud, quam Mercurius dulcis, additis tantum aliquot granis Scammonii sulphurati, in hac proportionem: v. g.

℞. Mercur. dulc. ʒi.
Scamm. sulphurat. vel Raf. Jalapp. ʒb.
M. f. Pulvis

& cum Musc. Traganthacæ f. Nilala pro una dosi in bæ paraty mi.

℞. Mass. Nil. de Ammoniacæ Spersa ʒi.
Extrakt. Abster. ʒb.
Trock. Alband. gr. ii.

Cum Ol. dissillat. Anis. f. Nilala: S.
Pilula Purgantes pro una dosi.

Item

℞. Tart. viridiat. gr. xv. ad ʒi.
Scamm. prep. gr. iii.
Trock. Alband. gr. ii.
Ol. dissill. Zedæi. gutt. i.
M. f. Pulvis: S.
Pulvis Purgans.

V s

Lo

(R.) Oleo Amygdalarum dulcium rectè expressè, de Carnium Jusculis mixto, familiarissimè utitur ad ʒi. & vi. ex enim etiam in principio Colicæ exhibito, & Dolorem sedantem, & Alvum solvunt. Cum autem Intestinales Piscum sunt signa, habet ad sanandam ament vel alteram securè propinquam, Quin & eadem varietate officinam, maximam remedium est adjuvare Colicæ Convulsivæ: quippe quod fibrarum spasmum lenit, & spirituum atrox compescit.

Loco Digestivi sit:

2^a. Tere. vitriolus. vel Sal. Ammon. sugar. 3i.

Ol. dissilv. aut. gutt. iv.

M. pro duabus assibus. S.

Pulvis Emollient.

Quod si verbis Colica Humoralis mos in principio Purgantia conveniant, commodè eadem cum Opisthis miscantur, ut supra de Cardialgia dictum fuit, quo hinc maiore Intestinorum irritatione subleto Dolor Alvin laxetur. Modus hic est recens ultimus: Venteribus pomellis, in specie HELD. & PADUANO, hoc fuit adstratum, qui propinavit in Colicis Doloribus rescripserunt *glist. Diaphan.* 3i. ad 5vi. & *Zibum. Rem.* 3i. quod laxat, Doloremque laetis.

Ceterum Colica laetitia coltra non perierunt hos Bolos seu Elecluaris, propterea conveniunt potius Pilulas Aloeticas cum Laudano opiato ad imitationem RIVERII praescribende, qui G. 1. Obs. 63. & G. 2. Obs. 1. has imprimis commendat Pilulas:

2^a. Alois optima 3i.

Diagrid. gr. viii.

Laud. opiat. gr. lii. vel v.

M. f. l. Pilula.

Similes Pilulas cum Laudano opiatum permixtas videbimus apud POTERIIUM Cent. 3. c. 27. Pertinent hoc *Pilula STOECKERII*, quibus, ut ipse scribit, cum summo suo honore Duem Tartarorum curavit in Colica:

2^a. Alois succus, vel Pilul. Aliphang. 3i.

Opil.

Crocian. gr. i. vel ii.

(pro Croco potest sumi & Caffeyrum)

M. f. Pilula.

Quarum vel dimidia pars, vel omnes, exhibentur jeiuno stomacho; Dolorem enim post horam sedant, & postmodum solvunt, & faciunt, ut dicit, operationem.

Si solamus, ut in *medicis* deo melius & potentius operentur, acuum has ipsas cum gran. lii. vel lii. *Scammonii sulphurati*, & ita commodè usurpari poterunt.

2^a. Aloisulat. 3i.

Extralli Zedair. gr. viii.

Stachm. sulphurati. gr. i.

Laud. opiat. gr. i.

Ol. dissilv. Caru. gutt. li.

Quam *Essent. Zedair. l. Pilula*,

Item

2^a. Gummi. Ammon. cum Auro sol. 3i.

Diagrid. gr. vi.

Laud. opiat. gr. i. vel v.

M. f. Pilula pro a. doibus.

Clysteribus quoque Laudano opiatum à quibusdam inje-
cti solet à gr. iii. ad 3j. nec dubium est, quin cessatur
si Dolor: sed caute agendum est: Com. MORELLUS
Cent. 4. Obs. 94. Loco huius rutilis Theriaci ad 3i. Clysteri-
bus addit.

Sedato autem paroxysmo in Colica Convulsiva, conve-
niunt appropriata Purgantia, commodè cum Sudorifero
interponenda.

III. In usu Vomitoriorum Remedium, quod intergrum ne-
cessaria sunt, causi sumus maxime: si enim Ventrículos &
superne partes Intestiniadum repletae omnino fuerint, ex
ulo maxime erit, ut Medicamentis ad deiectionem ingessis
locus datur pertractandi. Quod si potius Dolor, ejusque
Causa, inferiores partes phibet, non solum frustra tenta-
tur Vomitus, sed aliquando fit cum certa aegrotum peri-
cle, cum Volvulus facile evadit inde. Illustrat Vomito-
riorum usum Observatio PLATERII l. 1. c. 4. *Observationum*
pag. 451. *Supra*. Adolescentis quidam nobilis et inordinata
victus ratione, & nimio Potu Vini Masticis Narbonensis,
Cardialgia primum, mox Colico Dolor laborans, post-
quam semel curatur, materiam quam par erat, le acri fir-
miter concredidisset, & quodrigis est celeriter per urbem veho-
retur, recidivam passus, septem septimanarum spatio du-
rante Morbo, licet lapsus Clysteribus & Narcoticis usus
fuerit, non tamen integrè sanari potuit, donec Vomitorio
Antimoniali usus fuerit, à quo nro mox magnam copiam
arguginosae Bili aliquoties vomuit, uti & Putuit; atque

inde Urinae, quae et atro croceae diu permanserunt, in nar-
turalem colorem permixtae, ipsaque sanitas ad se redire
cepit.

IV. Opia in Doloire Colico semper sunt optima, in
principio & progressu Morbi adhibita, primario in Colicis
Convulsiva, hinc etiam in Humoralis; in qua ipsa saltem,
ubi necessitas urget, locum habent. Et quidem tutius est,
ut Alvi evacuatio praemissa faciat, nisi summa Doloris
atrocitas nimis urgeat; frequentius tamen in usu duci
possunt, ubi Materia morbois fuerit tenax & acrior; mi-
nuta vero, nisi eadem fuerit viscidior. Nam Opia acce-
quodque temperant, viscidie verb Materie motum ul-
terius impediunt, & ita tandem magis figunt, quatenus
Morum Intestinorum inhihent. His ipsis Opia, tam in
principio, quam in progressu Morbi, semper Appropriata
& Resolventia pro Causae morbois dispositione varia ad-
denda erant, ut eo melius succederet operatio. Prae ceteris
Opia Landanum hystricum est egregium remedium,
tam in Colica Convulsiva, quam etiam in reliquis. Deni-
que, si quando Opia utendum, non sunt differenda eo
ulque, donec vires vitales jam collapsae, usque non
longè sit ab interitu; tali enim in casu non raro soler vires
dormiendo finiri: potius in principio ut incrementum Morbi
vires validis usurparent. Adeoque in Colica Humoralis
usurpantur Opia post Purgantia, & hinc etiam Purgan-
tibus mista, & nonnisi in casu necessitatis aut Purgan-
tia. Nempe, ubi tanta est, siue Ventrículos debilitat, siue
vomitoritio, ut nec Pilula possit detineri, ibi (1) Re-
medium Anodynum ordiuntur; (2) paucis horis elapsis
Catharticum, eo temporis spatio interjecto, ut Narcoti-
cum à Cathartico tanto distet intervallo, ut ab eo non vici-
catur & perat, eas tamen in Venericulis moras trahant, quae
ad virtutem purgativam communicandam eidem sufficiant, quae
ut suam demum exeret operationem, cessante autem; licet
Catharticum, modo id possit fieri, diu post Anodynum
rectissime propinetur, cum etiam ad horas 12. ab hoc ad-
sumptio Alvis illi aegris respondet, atque nonnisi ope-
ritur, solvatur. Cui autem hinc, ut in aliis plerisque
Morbis, in quibus indicantur Narcotics, Catharticum
semper Dolorem intendat (saltem finita jam operatione,
qua quidem vigente, melius nonnunquam cum aegro agitur)
iisdem solenne est, Anodynum ingerere, ubi pri-
mo exspiravit Cathartici *intra* ut rectè loquitur SY-
DENHAM in *Observ.* circa Morbos acutos p. 297.

Ex his patet, Opia conducere magis (1) in Convul-
siva, quam Humoralis, (2) in Accidentia, quam Habitua-
lia, (3) Quam Materia acri, tenui, seu ut vocant, bili-
osa, quam quae à Materia viscidior. (4) In Fluvientis,
quam Humoralis. (5) Praemissa Alvi quatenus leontia-
ne tutiora esse. (6) Appropriata Causae vel Morbo locan-
da esse.

V. In omni Colica fecundum *Praxis praescripta* *Pharmacopoeia*
& *Pedem*; hinc calidus Potus est optimus. Et observari in
Colica Convulsiva cum copioso Vomitu convulsiva, & ali-
quot Sepebibus, ex Abdominis ab aere frigida refrigeratio-
ne nata, opimum fuisse remedium bonum. Hasnam Aquam
Vitis suscipere, unde omnia mala cessant, hinc rara
est & via imitanda Observatio, quam habet AMATUS
LUSITANUS *Cap. 2. c. 7. Obs. 31. ZACUTIUS*
LUSITANUS l. 2. *Prax. Almo. Obs. 35. FOR-
ESTUS l. 2. Obs. 12. Platerius l. 2. Obs. 37. & imperi-
mis SEPTALIUS* *lib. 2. Obs. 1. c. 8. Colica desperata,*
copiose Aquae gullit, nre refrigerant Potu curant. Sed
arbitror, accidentiarum fuisse affectum, quasi occasione re-
frigerationis Intestiniadum contravulsum spasmis relaxati fue-
runt; unde intrahilis fluxus Bili copiosus evacuata fuit: Ergo
ponnisi casumque, imitandum venit. (3)

VI. In Fluvientia Colica, in qua Fluxus non cessat, sed
semper produri morbois rationem habent; utur per acci-
dem affectum exasperant, in principio Carmineas acri &
aromatica valde effluencia nimis conveniunt, sed potius
saltem in declinatione; illorum vero loco Spiritus Salis dulci-
s adhibetur.

VII. Si Alvi relaxatae Dolores persistant, id quod in spe-
cie in Colica Convulsiva convenit, & quidem, nisi Ma-
teria

(1) (S) Difficile fore expellere uti, quando venter Aqua usu Intestiniadum Convulsiones, & Nervorum Spasmi solvi possunt: praescriptum quoniam dicit Hippocrates, & quotidianis experientis fuisse, Frigidum, quasi Nix, Nervos esse committi. Verum tamen etiam illi, quod ex eodem Hippocrate Teste servatis Aquae persudare jubentur, Forsi Frigida Aqua ipsis, quoniam-
tamen expellere, & naturalis Naturae per Nervos, utrum condere prater naturam possit, & Nervos laesit & resper diffingit &
centraria Spiritui in aeternis, seu inordinatis motus, tempore Convulsione aliis potest Frigida Aqua usu à praeternaturali motu
retardari, & cohiberi, ut Convulsioni remedium sit.

teria est in Intestinis, usurpanda sunt adhuc Remedia Appropria & Aromatica, quae nempe ratione Salis volatilis temperant Acidum, incidunt Viscosum, discutunt Flarum, ac Ventriculo & Intestinis grata sunt; & hinc etiam Remedia, quae Mulieribus in Passione Hysterica propriantur, imprimis volatilia Salina. Unde ex his Caloreum & Caloreata cum Opiatis mixta; ex istis Chamomilla, Semina Calida maiora, & similia, imprimis conducunt. Visum simpliciter vix semper aequè tutum videtur, medicatum melius convenire praeferitur.

Quod si ergo Alvus relaxata, & ista universalia pòssunt minus principia fuerint, & nihilominus tamen Dolores percutiat, aut si urgeat adhuc Colica Convulsiva, ad Appropria accedendum est, eaque in specie Aromatica, cum hac Acidulo temperant, Flatusresolvent, Viscidum incidunt, simulque Nervivamica sunt, eorumque Spasmos fustigant, adeoque in genere in quibuscunque Algodinis Doctores conducunt. Talis sunt Herba Veronice, quae eam sagulariter Speciebus laudatur, col fimen novè edit Chamomilla, imprimis Chamomilla Romana, Schera, seu Herminum, Cortex Aurantiorum, Zedoaria, geotiana, Helenium, Absethium, Scirpus & Calida maiora; Ex quibus modò dictis destillata Olea, Decocta, & alia multiplicia Praeparata valent, ut Aqua Florum Chamomillae, Veronice, Cinnamomi, Menthae, Aquae spirituosae compositae, Spiritus & Aqua Calmationis Paracelsi, & Anethici V. g.

℞. Flor. Chamom. Rom. Sambuci, Fol. Menth. Rata sic. an. M. li. Balsam. Junij. res. li. lb. Lacti sacrat. ℞. Sem. Camph. ℞. Anis. Foen. an. ℞. Calam. Arom. ℞. Symp. Cort. Aurant. ℞. Cinnam. acut. ℞. Zedoar. ℞. li.

Pulveriscentur omnia tenuissimè, & adspersantur cum Spiritu Nitri rectif. ℞. ad ℞. Infundantur cum L. q. Spiritus Rati, non addè rectifi. sufficit.

Seriet per 24. horas in Balneo Mariæ, digerantur lento igne, vase bene munito, Tandem destillentur per alembicum ex arena, vel cineribus lente, ut caveatur empyreuma.

℞. est coctlear. i. vel li.

Huc pertinet etiam Effusio Carminativa WEDELII in Opuscul. descripta. cum Anodini & Caloreata mixta, Item Symplicum Corticem Aurantiorum, de Papavere, ubi Dolor adeit; Symplicum de Alchae Fernelli, ubi colicium, & acrimonia temperanda; Caloreum. Sulphor, omnia Salia volatilia, adeoque Liqueor Cornu Cervi, Spiritus Salis Ammoniaci, Spiritus Tartari, Spiritus Carminativus de tribus, Stercus equinum, Stercus lupinum, Testes equini, &c. Promiscuè hæc in quibuscumque abdominis Doloribus conveniunt & in specie tamen, ubi Flarus urget in Hypochondriaciis, Spiritus Carminativus de tribus, &c. est optimus. Ubi verò sunt Tormina Convulsiva Hysterica, Liqueor Cornu Cervi succinatiss, salia volatilia oleosa, item Camphora, & Aqua Theriacalis camphorata, item sterces equinum, & similia conducunt: v. g. in genere contra Dolores Abdominis.

℞. Aquæ Chamom. ℞. vel li. Spiritus Theriacal. simpl. vel camp. ℞. Lact. opiat. gr. ii. vel iii. Symp. Cort. Aurant. ℞. M. f. Patis: coctlearum usque modò: S. Potus lenienter usque modò.

In Colica Homomorphi Flarulenta;

℞. Aqua Menth. ℞. vel li. (vel Aqua Menth. & Chamom. an. ℞. ℞. Elixir. Mentha. (nisi urgat affus) ℞. ad ℞. Essent. Carn. ℞. vel ℞. Spiritus Nitri dale. vel Anticoll. ℞. vel ℞. (vel Spiritus Nitri rectif. gutt. x. vel xv.) M. f. Patis: S.

Potio lenienter contra Flarus.

Capiat coctlearum, subinde, si possibile, aliqualem sudorem expectando, Et convenit etiam in specie talis Mixtura cum Spiritu Nitri in Colica, cum ardore corporis quasi

febrili iuxta, seu in Colica putrida Billoia.

℞. Adhuc alia Formula;

℞. Aqua Sem. Anis. Flor. Chama. an. ℞. Cinnam. ℞. Spiritus Eddar. ℞. Nitri dale. ℞. Olei dissoluti simpl. gutt. vi. Lact. opiat. gr. ii. Symp. Rad. Rusc. ℞. M. f. Patis hauriendis coctlearum: S. Potio contra Colicam.

℞. Aqua Cort. Aurant. p. m. Vin. ℞. Physog. Aquæ elegatis est Calmationis ℞. Spiritus Nitri dale. rectif. ℞. Symp. Cort. Aurant. ℞. M. f. Patis: S. Potio contra Flarus.

Sumatur coctlearum, expectando sudorem.

℞. Aqua Mentha. ℞. Chamom. Zedoar. Carminat. an. ℞. Spiritus Nitri dale. Thiriac. camp. an. ℞. Symp. Papav. n. li. M. f. S.

Potio Dolores sedans coctlearum sumenda.

In Colica Convulsiva, qualis est Scorbutica, Hypochondriaci, Hysterica, &c. cum ardore ad Cor, ut loquuntur, cum difficili respiratio;

℞. Aqua Fl. Chamom. Mentha Pulg. vel Parn. an. ℞. ℞. Calverri (sic turbida Potio) ℞. vel li. Liq. Corn. Cerv. succ. vel hupus loco Spiritus Salis Ammoniac. ℞. vel li. Lact. opiat. gr. ii. (vel ℞. Opi. ℞. ad ℞. ℞. Symp. Anem. vel Corn. Aurant. ℞. vel ℞. M. f. Patis: S.

Potio Dolores sedans pro aliquot vicibus. Capiat coctlearum pro 2. vel 3. doibus, expectetur, si possibile, blandus sudor.

℞. Aqua Mentha. Mentha an. ℞. Carminat. ℞. ℞. Calverri ℞. Spiritus Salis ammon. ℞. Lact. opiat. gr. ii. Symp. Anem. ℞. M. f. Patis dolores sedans.

℞. aqua Menth. ℞. (vel bupus & aqua Synt. ℞. ℞. Spiritus Salis ammon. ℞. ℞. Opi. ℞. Symp. Cort. Aurant. vel Chamom. ℞. ad ℞. (Vel loco Symplicum Elixir. Aurantiorum anemum: S. M. D. S. ut antea.

℞. Aqua Mentha. Foenic. an. ℞. Spiritus Salis ammon. rectif. ℞. Lact. opiat. gr. ii. Symp. Foenic. ℞. M. D. S. ut antea.

Vel quando Salis non conveniunt;

℞. aqua Chamomill. Sambuci, ℞. ℞. Calverri ℞. Una. veri prop. ℞. Macill. Lact. p. m. Sal. volat. Cor. Cerv. gr. v. Symp. Anem. ℞. M. D. S. ut supra.

℞. Aqua Chamom. ℞. Mentha ℞. Essent. Opi. ℞. Macill. Lact. p. m. ℞. Sal. volat. Cor. Cerv. gr. xv. Symp. Foenic. ℞. M. D. S. ut antea.

Capiat subinde coctlearum.

℞. Aqua Mentha ℞. Carminat. ℞.

spasmos, & inde ad tunc sensibilem duritiam, remitti faciunt, & sic quodvis acidum intestinum irritatorem temperant & corrigunt. Conf. HELMONIUS in *Traët. de Flatibus* ff. 35. Semina hanc de causa in VINO generosa, & haulta, à STOEKERO commendantur; unde & eorum destillata Olea, non ita recens oleum destillatum Zedoariae, Corticem Aurantiorum, vel Anglica, vel Menthae, vel Macis, ad aliquot guttas propinquant, sunt laudata in Flatibus, Tormentis & doloribus Intestinarum; Spiritus Salis Ammoniaci anilutis, Callosorum, & omnia medicamentis ea ex eo, egregie conferunt; non tantum in colica, ubi adfuit Flatus, quos potenter dicitur, aut ubi adfuit Pituita viscidissima, quam temperat, sed etiam in colica convulsiva; non locus aut in *Succinatione Theriacali*, quae severtit est colica Convulsiva; item in doloribus & convulsibus Convulsivis, egregium quoque est callorem; live per se, live mixtum cum aliis: in specie in colica Convulsiva cum Salibus volatilibus propinatur, in specie cum Sale volatili Succini, cui & addatur unum vel alterum gramum Opil, fit egregium Medicamentum. Dabo exemplum in colica Convulsiva:

℞. Calor. ʒij.

Salis volat. Succini. rʒij. parati gr. v.

(nam in Succino multa latente arcana contra convulsiones & Epilepsiam.)

Laed. opus gr. ʒij. vel ʒij.

M. F. Pulvis.

Pulvis dolores sedans pro una vice.

Veteres Callores ʒij. ad ʒij. in haulta Vini calidi propinquant in pertinatione colica, ut constat ex JOELIS *Praxi*, & SOLENANDRI *Consilio*, & colica sit orta, uti dicit JOEL, à causa frigida; in aliis tamen etiam convenit: & SOLENANDER commendat callorem clysteribus additum, scilicet aliquot grana ejusdem in VINO dissoluta, insinuantur cum clystere in colica; v. d. *Opus Soli* 3. *Consil.* 31. Nos nititur Callores cum Tinctura Tartari acriter, vel cum Spiritu Salis Ammoniaci sine oleo Essentiam extracta quam sola ʒij. ad ʒij. dosi, vel cum Essentia Opi socia, optime conducunt. Vel

℞. Tinctura Tartari acris. ʒij.

℞. Calor. ʒij.

M. S.

Tinctura Resolvens: ad guttas.

Ipsa enim Tinctura Tartari, cum praesentissimum remedium mirè extolletur ab HAUPTMANNO & LANGIO.

Vel

℞. Elvir. Propr. sine acido.

Tinctura Tartari acris. ad ʒij.

M. S.

Elisir Resolvens:

Vel

℞. Tinctura Tartari acris. ʒij.

℞. Gummi Anon. ʒij.

Myrr. tartariz. ʒij.

M. D. S.

Essentia Resolvens: 50. guttas.

Vel

℞. Spiritus Carminis. de tritico ʒij.

℞. Calor tartariz. ʒij.

Opus ʒij. ad ʒij.

M. D. S.

Mistura Resolvens.

Dosis. Rate. 50.

Pertinet hoc decodum R. D. D. LANGII, & Zelenia Anonyma, ex Callore & Alia ferida, cum Spiritu Vini tartarizato parato, quae Essentia Anonyma & in colica & in Passione Hysterica; i. e. Colica convulsiva, & in praevendis Vaziolis & Morbillis, est egregia; item Extratum Callores, vel cum Laudano opiato, vel cum Extratum Theriacali, quod habet vinu opiatum, mixtum, & cum Oleo quodam destillato in Pilulas Anticolicas redactum, dicta Tormenta sedat.

Ex his ferè paratur Extratum speciem Anticolicam *Myrsinellu*, quod dosi ʒij. vel ʒij. ad ʒij. in omni vehiculo commodè usurpant potest: Elegans est Compositio, uter quidam adfuit Ingrediente non multi pretii. Floris Sulphuris à dr. ʒij. ad dr. cum cantillo Myrrhae, praevalens praemittendus, in colica valde proficit, propinquant commodè in VINO vel alio vehiculo calido, probè corpus contendo; & sanè expectissimum fuit remedium. Vidi Romae egregium effectum in comite, colica perniciosa laborante, qui alius acrius per dr. ʒij. Florum Sulphuris fuit curatus. Vel remittentur Sulphur & eius Flores convenienter cum *Essentia* *Choris Carminativa*, facili ex oleo destillato *Cori cum Auram-*

tium, *Atq.*, *Zedaria* & *fenitibus*, quibus impraegnatum *Castoreum*; v. ʒij.

℞. Flor. Sulphuris ʒij. ad dr. ʒij.

Olei destillati Atq.

Zedaria. an. gutt. ʒij.

Laudan. opiat. gr. ʒij. ad dr. ʒij.

Barck. q. l.

M. F. Pulvis. ʒij.

Flores Sulphuris ergo volui sint commendari. Aromaticum tale volatili oleo impraegnatum vinu anticolice per se nota est, v. g. Zedoariae, quae est carminativum egregium, Flatum reductivum, & quae, praemissis praemittendis, tam in Substantia, quam in Tinctura, & inde parato Extrado, est nobilis; Galanga, quae alius egregium est Utriusque; Cinnamon, Gentiana, Caryophylorum, Nucis Moschatae, & hinc ex his parata species hic dicta Aromaticae compositae in *Dysenteria*, nempe species Diacumini, Diacalamintae, Dianthi, Dauglangae, Diastrom-piperon, & tandem Species Diaphysiphur *Myrsinellu*; item Olea eorum destillata ad aliquot guttas propinquant, similiter egregie commendantur, qualia sunt Carvi, Gummi, Anisi, Foeniculi, Caryophylorum, Lauri, Corticis Aurantiorum, Anglica, Succini, Macis, Zedoariae, Menhae; quod ingenuè commendat THONERUS: cumque his possint ferè composita Elmofarcha; hinc PANAROLLUS *Praxi*, 2. *Obsev.* 3, cum sapientia expertum remedium ad Colicam ex Causa frigida commendat Oleum Becarum Lauri, aut Oleum ex Cornibus Aurantiorum per expressionem paratum, cum VINO (potius est succus oicini expressus), quo bibito acri per breve tempus sedato dolore lonum capientes convalescunt. VINO Guaiacino curatum Colicam cum Convulsionibus videlicet in AMATO LUSITANO *Curr.* 32. & *M. A. N. C. Ann.* 3. *Obsev.* 174. Hicce non ultimo loco addendum Spiritus Nitri dulcis quidam *** *Obsev.* dicitur *Aurum*, est summum HARTMANNI azeum, & ultimam reliquium, quem ipse describit in *Praxi Chymica*, imprimis si Spiritus Nitri dulcis colligatur, cum duplo vel triplo Spiritu Vini à Sulphuris aromaticis abstractis seu sublimis, miscetur. Hic Spiritus Anticolicus dosi dr. ʒij. ad dr. ʒij. in vehiculo appropriato calido propinquant, nobilissimum est remedium in Colica Flatulenta biliosa, adeo ut etiam in Tympanite suam faciat egregie officium, praesertim, ubi vagae phlogosae aut affusionis corpus alligant, & capere blandius solor; sic enim ed melius operatur. Vehiculum appropriatum est imprimis decodum Radicis Heleni, vel Decodum Tripi Tauri.

Modus praeparandi est, si spiritus dicti redificati bene in quantitate poterint miscetur, misit in Balneo Mariae probè digerant, digesti datus vel ʒij. viciis corroborent, donec periculisimè uniantur, & sic fit egregia Spiritus *camellus Nitri dulcis Anticolicus*. Locupletius Vinu vulgaris melius sumitur Spiritus appropriatus, v. g. Spiritus Chymilla torfermentatorem paratur, aut oleum Spiritus infusio species Carminativis digestum, & tandem in B. neo aliquoties corroborat; sic enim rapie secum iusticia Carminativum aromatica, i. e. salina volatilia olea ut per alumbicum, & ita cum Spiritu Nitri sanus it efficiet & melior.

Hicce annumerat, & ab HARTMANNO commendatur, Spiritus Terebinthinus, & Oleum eius, quod adhibet egregie sanefit, & nobilissimum hinc cum vo paratus Balsamus Sulphuris terebinthinatus praemissis est egregius in Colica contumaci, etiam Convulsiva: unde quidam commendat sequens Oleum compositum ad Colicam:

℞. Olei, seu Spiritus Terebinth.

Sac. Nup. 30. part. aequal.

Infundantur Flores Hyperici digerant per diem & noctem, exprimantur, & ita cum Floribus novis peragatur donec Oleum rubundum fiat.

Huius Dosis gutt. xij. xv. ad ʒij. in Brevis sumptum, est in Colica Humorosa expectissimum.

Unum adhuc observetur de Perforata, i. e. Hyperico, si sic digeratur in spiritu Vini per mensem supernatantibus eius Oleum in usu Chirurgico externo, & Medico interno praestiosissimum. Sapient! fat.

Spiritus Carminativus cum Nitro, Tartaro & Spiritu Vini, de quo superius locutus sum, ubi de Cardialgia, est nobilissimus planè Tormentibus Abdominis, Datur probè redificatus à dr. ʒij. in quocunque vehiculo calido pro praestantissimo auxilio; in Gelida similiter commendatur.

Praeterea Testes equini erificati, pulverisati, & propinati ad ʒij. cum Pulvere Seminis Apis ʒij. laudatissimum est

est experimentum FONSECÆ Anticolicum in L. 1. Conf. 57. (sunt Archæus Papa): qui Pulvis Testiculorum equorum in Aqua Liliorum convallium, addito parum Croci, exhibitus, excellens est experimentum contra Colicam, polychrestum ZWELFFERO.

Pudendum seu Priapus Tanti, five ejus Ratura, five Decoctum, experimento egregie comprobatur est à ZACUTO LUSITANO L. 3. Præparanda adhibere. 32. in Colica Convulsiva, quam, ut & Dysenteriam, curat & præservat. Dosis ad ʒi. in Vino Malvatico, vel Decocto Heleni. Similiter commendat Podendum Cervi BARTHOLINUS Cap. 6. My. 50. Puligo pulverisata, & cum Aceto destillato mista & bibita calide, Raticm Dolerem pellere dicitur. Similiter etiam Spiritus urinosus Puliginis aliquando felici cum successu fuit propinatus: quæ remedia & in Galla ab alro, & Passionibus Hystericis, & Pleuritide dec. egregie conveniunt, dum acidum in hîc malis potenter corrigunt. Saccharum Saturni in Colica à nimio acido, remedium est singulare, si ad ʒi. iij. vel iv. cum alio propinquetur: in Saccharo enim Saturni magna vis medica latet.

Denique Stercora Animalium sunt remedia aliis omnibus, si non antecederent, saltem tamen acquiranda. Hic præ cæteris parabilibus remediis, licet sordidum, addatur Stercus equinum recens, ab Equo avena passio, cuius succus cum liquore quocunque appropriato, in specie Cerevisia calida expressus & imbibitus, imperande, quantum possibile, quietem, & expectandum sudorem, singulare & presentaneum est experimentum contra Colicam, imprimis Convulsivam, non secus ac contra Suffocationes Hystericas (vid. RIVERIUS l. 10.) habita tamen, si fieri potest, ratione sexus, itaut succus ex Equo propinquetur masculo, ex Equo vero femine. Loco hinc Stercus Catti exsiccatum in aere, in Vino resolutum & edulcoratum, hinc percolatum, aliquando Magnæ Anticolicæ rellitit. Non cedit huic Stercus lupinum experientia confirmatum contra colicam ex quacunque Causa natam, dosi ʒi. ad ʒi. Vid. PANAROLLUS Præpar. 3. Obscrv. 36. HARTMANUS in Praxi Chym. par. 12. item FORESTUS l. 21. Obs. 25. in Scholio, AMATUS LUSITANUS Cap. 3. Curat. 12. item RIVERIUS Cap. 1. Obscrv. 59. & 66. & tartarum apud omnes Antidotes in magnis laudibus versatur Stercus Lupi, præmissio Clystere. Hinc etiam Aqua destillata ex stercore Bovis junioris à ʒi. propinata laudatur. Sic succum stercore columbini cum Lactæ expressum laudatam videbitis in VELSCHIO, Hænar. 3. par. 32.

Sic merus sit, quod in Pareni transeant Tormenta Abdominis, clystima blanda Alvis stimulantia est; interde verò salia volatilia, ut sal volatile Urimæ, spiritus salis Ammoniaci simplex & anisatus, Liquor coram Cervi succinatæ, in specie ex Tartaro & spiritu Tartari volatili, propinata; expectato sudore sunt convenientissima, quia non tantum acidum Nervos vellit corrigunt, sed Pareni præcavent & curant; expectetur post usum eorum sudor, que apparet, paroxysmus, si non plane, sensibilibus tamen tollitur. Spiritus Tartari volatilis legitime paratus (quod volatilior, eo melior; variz enim sunt eius præparatio: felix est, qui optimum habet) est excellens remedium pro curanda Pareni per sudorem. Obiter moneo: ex Facibus Vini sit volatilior spiritus, quam ex ipso Tartaro, modò rectè destilletur, & super caput mortuum relictur.

Vel
ʒi. Spiritus Salis Ammoniaci an. ʒi.
ʒi. Laudan. spir. Longellati ʒi.

Mixtura Dolores sedans.
Pro dosi propinquetur gutt. 14.
ʒi. Spiritus Salis Ammoniaci an. ʒi.
succinatæ an. ʒi.

M. D. S.
Spiritus Dolores sedans.

Ut cura colicæ convulsivæ magis illustraretur, Exemplo declarabo. Juvencus 16. vel 17. annorum corripitur Tormentibus abdominis gravissimis, circa & infra regionem umbilicalem, simul subindo præcordia occupantibus, dicebat: vomere ipse aliquando ad Cor. & velle ipse Cor sufficere: Alvis pertinaciter erat clausa, Umbilicus interiora versus retractus, abdomen contractu durum: terribis erat durum; & san- sum, non poterat urinas dare; terribis erat durum; & san- sum, non poterat urinas dare, quia malum viscera contraxerat: hinc enim Urinæ emissio diffilis; nec quicquam enim audet ad premere, quoniam totum abdomen dolcat.

Die solis pro aperiendo Alvo, simulque sistendo nonnihil urgente dolore:

ʒi. Lapid. Camer. præp. ʒi.

Laudan. hyss. gr. v.

Stamm. sulphurat. gr. iij.

Miscendo pro Pulvere.

Habitu: sed frustra. Propterea eadem die propino, quas alias jurant.

ʒi. Arcan. dupl. gr. xv.

Stamm. sulphurat.

Trechb. Alband. an. gr. i.

Misc. in Pulvere.

Hinc sub nocte habebat aliquot ides, sed sine levamine.

Die Lunæ aspectum Clyma Emollientis, & Carnisæ aliquotulæ, sed parum profuit; inde pro sistendis Tormentibus, & leniendis Spasmi partium abdominalis.

ʒi. Aqua Fœnicul.

Misc. an. ʒi.

Spiritus Salis Ammoniaci ʒi.

ʒi. Cui ʒi.

Syrup. Curat. Aurant. ʒvi.

Misc. in Pulvere.

De hac vespere & nocte pro labris capiebat, simulque abdomen indoratum inungebat sequenti Linimento.

ʒi. Olæ Chamaen.

Cumin. an. ʒiij.

destillat. Anis. ʒi.

Miscendo in Linimento.

Nox paulo erat quietior: sed mane omnia recrudescebant symptomata; unde die Martis ad compescendos spasmos:

ʒi. Emplast. de Galbano q. i.

Malvatorum cum l. q. Olæ Sœciet.

F. Emplastum inferendum abdomini.

Die Mercurii omnia erant in eodem statu, & cum vix possetur, ut saltem bene aperiretur Alvus, quoniam præmehat versus grænum.

ʒi. Lapid. min. lazar. ʒi.

Auri fulm. gr. iv.

Miscendo.

Unde post aliquot horas, si. ferè successus habuit; hinc vespere:

ʒi. Sui Sœciet.

Unguenti potab. rub. an. ʒi.

Miscendo in Linimento.

Hoc inungebat largiter Abdomen, quod emollitum nonnihil fuit cum euphoria.

Die ergo Jovis, cum corpus videretur sufficienter evacuatam, ad convulsivum dolorem sistendum,

ʒi. Cinna. Anisimati ʒi.

Laudan. hyss. gr. iij.

M. E. Pulvis.

qui præparabatur in Aquâ, & usurpabatur egregio cum levamine.

Die Veneris pro abstergendis rebus in Intestinis, & leniendis istis, quæ remanet eorum contractura:

ʒi. Olæ Lini.

Rapar. an. ʒi.

M. pro Clystere.

Qui egregie consulti, multa viscida evacavit cum levamine; unde vespere modo dictis Pulvis repetitus soltem quietam reddidit.

Die Saturni tandem, cum partim convulsio Dolorem, partim clyma me certiorer reddiderit, quod MACGEO acida seu pontica in recessu peccaret, ordinari sequenter Potionem Lavativam appropriatam; si licet enim bus, ter & supinis quotidie excerneret liquida sponte sua, tamen sine debita euphoria erat, quia non evacuebatur, quod evacuum erat, sed hæc excretiones erant saltem effectus præmissorum Lavativorum, quorum occasione propter irritationem, fluida serosa ciebantur, semine morbofo, Multo pontico, firmiter hærentes. Propterea

ʒi. Aqua Menth. ʒi.

Cumin. Anisati in decol. ʒi.

Tartari vitriolati ʒi.

Stamm. præp.

Trechb. Alband. an. gr. i.

Syrup. Ref. sol. ʒiij.

Misc. pro Potu.

Hinc 4. vel 5. vicibus crevit, plenario cum levamine.

Æger alias levi de causa hæc affectus erat obnoxius. Peccabat in eo forse Acidum ascerum, unde & Lavativa parum operabatur, & hunc Acidum asceri occasione in subitè viscido Colica hæc Convulsiva excitata fuit.

Quam post diem aliquot intervallum subinde aliquot vespere recurrebat, sed id mane Liquoris Martis Solaris gutt. xij. ad xv. à meridie spiritus salis Ammoniaci gutt.

xx. ad xl. aliquandiu acceptis cum leuamine.

Novi studiosum iuvenem, Colicam convulsivam verno tempore ejusdem anni patientem, quæ typum Febbris intermittens tertiana servat; Diei enim æger, *paci deliquit*, & interrogatus, quid patiatur? respondet: circa *sexta angustia*, ac *si vomitus esset*; cui huius & integram palmam fascibus intrudit, summoque conatu Vomitus, uti subinde frustra, provocat: hinc oculos torquet, sudores frigidi syncopeque, tremoreque membrorum exspirat, & quidem semper altera diebus motum repetit. Tunc pathema ex qua causâ proderit, initio nesciebam: Interim ex inspectione urinae, eandem Pavonis representantis, confirmabam de latente febre, adeoque præscripsisse & in paroxismo hunc Pulverem.

℞. Chamab. Antimonii gr. xv.

Salis vol. Sacris. ℥℥.

Laudan. opiat. gr. i.

M. f. Pulvis: cujus unguinum erat:

℞. Aqua Zylisyr. Langii ℥i.

Ceraf. nigr.

Lil. convall. cum Vin. an. ℥℥.

Myrica Culear. ℥i.

Cera. Cer. cam. sal. vol. ℥℥.

Misc.

Syrupum nullum addebam, quia dolia ferre non poterat, sed capiebat in hac mistura Pulverem ante paroxysmum, sub paroxismo aliquot cochlearia vehiculi solius ingurgitavit. Hinc præmissis Glymate Liquorem Coræ Cervi succinatam continuavit, & ita repetito ejus usu malum in prima ejus herba truncatum fuit, ægerque restitutus est. Similiter quoque mixturam ei præscripsi:

℞. Aqua antifebris.

℞. Sambuc. an. ℥℥.

Spina Culear. ℥i.

Lumbr. terrestr. volat.

Arcan. dupl. Myrsinæ an. ℥i.

Syrupi Salsatyr. Paracel. ℥℥.

M. pro Potione.

De Opio & opiatâ res clara; unde etiam secundum Veiores meriti Theriaca & Mithridatica propter Opium usurpata fuerunt contra dolores Abdominis: & sunt egregia remedia ad d. l. in Viro propinata, ubi aperta prius fuerit Alius: loco quorum sufficit nobis Laudanum opiatum & Laudanum hyssericum; nam Laudanum opiatum est generale & universale remedium & anodynum. Loco Laudani hyserici

℞. Extrall. Zedæ. gr. xii.

Caffæ. gr. vi.

Laud. opiat. gr. iv.

M. f. pulvis No. 36. pro 3. doibus: S.

Pilulæ dolores sedantes pro 3. vicibus.

Cæterum notum est, variâ esse Opii præparationes, & quibus omnibus vobis commendo eam, de qua *suprà in Prælegomenis* dixi.

Si ab *Errata externa* fortè dolor colicus ortos fuerit, possunt interius præscribi Absorbentia, Laxativa & Opiata mixta: e. g. utilis erit sequens Pulvis:

℞. Lap. Calc. præp. ℥i.

Stann. sulphur. gr. lii.

Laudan. hysser. gr. iv. ad vi. (vel Laudan. opiat. gr. i. vel ii.)

Olei distillat. Coriæ. Aurant. gutt. ii.

M. f. Pulvis pro una vice.

℞. Decoct. 3. de 3.

Capiantur in vehiculo calido.

Grana integra Piperis cum spiritu Vini propinata in colica post crapulam, vel Cerevisiæ vitio, præcedente frigore contrariam, commendat HOFFMANNUS de Medicamentis officinalibus; Cruditates enim ædidas Piper optimè destruit.

Potè quadruplex est differentia Dolus Lumbaris: inter quas dolorem Lumbarum Nephriticum optimè curat Terrehithina, & omnia Medicamenta ex ea parata, ut Balsamum sulphuris terrehithinatus, quæ etiam sunt optima in dolore mesenterico.

Etiam ipso *dolus colicus* quæ cum algore, tunc cum ardore affligit: dolor, qui cum frigore affligit optimè curatur additis appropriatis oleis distillatis aromatum, aut aurantium, &c. In *Alia* adduntur Nitrate, maxime spiritus Nitri dulcis Anticoctus.

Hicce Internis, quantum possibile, succurrimus doloribus Abdominis:

Inter *Externas*, quæ applicantur abdomini, ad compe-

Tom. II.

scendos dolores colicos, & Illicos, eorumque spasmos & convulsivos motus, eminent *ex suprà laudatis Staphisagris distillatis* olea cocta & destillata, ut oleum Anethi, Chamomillæ, Rutæ, Amygdalarum dulcium, Laurinum, oleum destillatum Baccarum Lauri, Juniperi, Corticum aurantium, Macis, & omnia, quæ intus sumuntur: e. g.

℞. Olei Anethi per coll.

Chamom. an. ℥i.

destillat. Chamom. ℥i.

Anethi.

Carvi.

Camini.

Panic. vel Zedæ. an. gutt. vi.

addatur

Corporis pro Balsamo q. l. pro libitu:

M. S.

Balsamum Externum.

Vel

℞. Olei Anethi.

Chamom. an. ℥i. vel lii.

destillat. Chamom. vel Menth.

Angel.

Camini.

Rutæ. an. ℥℥.

M. S.

Oleum Distillans.

Vel cum Oleo *Nucis expressæ, Balsamæ*, vel cum *Tacamahæba Emplastum.* Vel

℞. Olei Anethi.

Chamom. an. ℥i.

destillat. Anethi.

Chamom. an. gutt. ix.

Carvi.

Camini an. gutt. vi.

M. S.

Singulare Oleum contra Colicam.

Item in Colica Convulsiva:

℞. Olei distillat. Sacris ℥i.

Spica ℥℥. vel an. p. æqu.

M. S.

Oleum Externum contra Colicam.

Illinatur largiter regioni Abdominis, in specie umbilicali, & fovendo desuper latere calefacto, effectus expectatur.

Oleum quoque corticum Aurantium cum oleo destillato Angelicæ, vel Aoiis sociatum, & umbilico illitum in Colica convenit:

Vel

℞. Olei Laurini ℥℥.

Caffæ. pulveris. vel spul. olei ℥i.

M. f. Linimentum: S.

Unguentum contra Colicam.

Quod umbilico innundum non est inconveniens, imponendo laterem calefactum.

℞. Olei Laurini.

Anethi.

Chamom. an. ℥℥.

Galban. Paracel. ℥i.

destillat. Sacris ℥℥.

Carvi.

Camini.

Turkian. an. ℥℥.

M. f. Linimentum. S. utantur.

PARACELSUS feliciter usus fuit Zibetho: vel Zibethum umbilico innundum cum oleo Nucis Moschatæ, addendo parum olei destillati Macis, egregiè convenit. Loco hujus *Balsami Zibethi* MYNSICHTII in *armament. pag. 79.* egregiè commendatur; vel Balsamum Apoplepticum, quod Zibethum ingreditur, umbilico illinatur, & desuper laevetur. Pinguedo Cati systris, uti in Epilepsia interna est nobile, ita in doloribus convulsivis Abdominis est egregium: sumitur asservata, & depravata, & illinatur probe regioni umbilicali. Jubeat quidam differentiam ferre observare, sed tamen non adeo necessarium est: non vulgare est medicamentum, plurimum in recessu habet. Quibus placet Zibethum addere, remedium magis efficax habet.

Horum loco excellit contra omnia Tormina abdominis Galbanum, in specie in Convulsiva Colica atrocere; unde etiam egregium est Hyssericum, umbilico applicatum, sive Galbanum in forma Emplastri sit malassatum cum oleo succini, vel spicæ, vel alio appropriato, vel Balsamus Pcurialis externæ Abdomini insillatur, vel Emplastrum

X

strum matricale de Galbano malaxatum cum oleo destillato succini, quod optimum est ad spasum convulsivum, regionis umbilicali applicetur: Vel

℞. Galb. in spiritum Vini non rectif. soluti ℥i.
Olei Chamom.
Rutacei an. 3℔.
Crocii gr. vi.

M. F. Linimentum: S. ut suprà.

Vel Galbanum simpliciter lento igne liquescentem, cum part. iiii. olei Jascini, & part. i. Olei Spici malaxatum, inducitur Alina & applicetur, quod optimum est. Oleum destillatum Galbani compolitur, seu Galbanum Paracelsi, de quo vid. SCHROEDERUS, ubi de Galbano, SENNERTUS de Colica, & HARTMANNUS in *Praxi Chymiar.*, umbilico illitum nobilissimum est, & expectissimum in Colica quacunque, speciatim in Convulsivis Abdominis Dolentibus. Vel

℞. Galbanum Paracelsi ℥i.
Olei destillat. Succini. ℥i.
Spici ℥i.

M. pro Lin.

Variant autem descriptiones huius Olei nobilissimæ.

Interim huius defectu & Oleum destillatum Succini, vel solitariam, vel partem iiii. cum Olei Spici parte i. mistæ, commodè contra diuersos dolores umbilici illiniri possunt.

Horum loco Oleum Saponis commodè adhiberi potest, quod egregium in his affectibus est, ob penetrantiam alcalinam, qua destruit acidum: nempe destillatur Sapo cum Calce viva, vel cum Cineribus Ossium calcinatum, ut destruat eas acidum, per retortam: cuius Olei ita destillati gutt. iiii. vel iv. umbilico illiuntur, pro Cura Colicæ torminosæ. Vel dissolvatur Sapo in spiritu Vini ad mellaginem: massa cum ana Calci viva destilletur, & cohobetur aliquoties. Hac ratione acquiritur Oleum externum ad affectus dolorosos & alias partes nervosas, quod in Arthritide frigida etiam laudatur. His addatur Oleum Petreæ album, quod multum in recessu habet: quod non tantum Abdomini illitum, sed & regionis Lumbari, in specie in Dolentibus Lumbis, Nephriticis & meletericis, est egregium sileas & compescens Dolorem.

Emplastrum denique ex gummate Tacamahacæ, vel solo vel cum Emplastro de Mellillo mixto, & cum Oleo Chamomillæ, vel aliis Carminantibus malaxato: vel Tacamahacæ cum Balsamo Peruviano malaxata, & imposita, est bona. Vel

℞. Galban.
Tacamah. an. part. i℔.
Bals. Peru. part. i.

F. l. a. Emplastrum, S.

Emplastrum Dissolvens.

Aliàs statutum etiam est Emplastrum ex Baccis Lauri, uti, & Emplastrum Carminativum stylui cum Emplastro Nicotianæ mixtum. Stercus foetum Cataplasmati instillatur calidè applicatur, laudatur à RULANDO; Cataplasma verò ex stercore equino cum oleo Rutaceo, experimentum est JOELIS & AMATI LUSITANI.

Tandem Sacculi & Fomenta in Aqua & Vino, aut La-

te cocta in Dolore Abdominis Scorbuto, calidè applicata. Abdomini conveniunt: v. g.

℞. Summ. Ispiciami.
Fior. Sambuci an. M. ii.
Chamom. M. ii. ad iv.
Bacc. Junip. rat. 3℔. ad 3℔.

Includantur Sacculo, probe interpellato, qui Vino calido, aut Lacti vaccino vel capris immersis aut ebullitis, cum linteis multiplicatis calidè Abdomini applicatur, & sæpius reiteratur: maxime enim egregium est in Colica Scorbuto.

℞. Rad. Lauri.
Rusp. an. M. ii.
Summ. Anethi.
Cent. min.
Fior. Cham. Rom.
Sambor. an. M. ℔.
Rad. Angel.
Levistic. an. 3℔.
Bacc. Lauri 3℔.
Juniperi 3℔.

Sem. a. Calid. maj. an. 3℔.

Concil. & contul. coq. in Vno, in vase clauso:

D. S.

Fomentum Externum.

Vel

℞. Summ. Anethi.
Herb. Mentha.
Ruta.
Fior. Chamom. an. M. ii.
Bacc. Junip.
Sem. Fenn. 10. ℔.

Incil. & contul. includatur Sacculo: S.

Sacculus pro Fomento.

Vel

℞. Summ. Anethi.
Fior. Cham. an. M. i.
Rosmar.
Salv. an. pug. ii.
Sem. a. Calid. maj. an. 3℔.

Incilia & contula dentur: S.

Species ad Fomentum.

Hæc pertinet Sacculus Avemacæ calidè applicatus:

℞. Avem. part. i℔.
Bacc. Junip.
Sem. Cereidri an. part. i.

Contula mixta, includantur Sacculo.

Item sacculus ex milio calidè abdomini applicatus, egregiè conducit. Catellus Melatenis Colica afflicti appositus, anodynos est. Lapis Nephriticus Amuleti instillat appensus mirifice contra Colicam laudatur.

Extra Parosyrium Martialis profunt: Maie nempe datur solutio Martis cum succo Pomorum, vel in robustioribus liquor Martis solaris, & vesperti spiritus Sala Ammoniæ anistatus. Profunt etiam Diuretica cum Carminativis mixta: vid. WILLISIUS de *Anima bruta*, pag. 397.

Hæc sufficiunt de Colica & Passionibus Colicis: Pergo ad

alia. Sit ergo jam

S E C T I O XII. DE SITU INTESTINORUM MUTATO.

UT ritè fiat Contentorum in Intestinis distributio, & convenientis Excrementorum effusio, necesse est, ut hæc debitum observet situm; qui est ut naturaliter Interitis colligantur à mesenterio, utpote cui connexæ sunt, simulque Vertebis Lumborum, imprimis superioribus, suspendantur & annectantur; exterius verò eadem ritè à Peritonæo, tanquam in bursa, continentur. Quòd si verò mutetur hic Intestinatorum situs ex loco tali naturali in alium, fieri nequit hoc sine insigni Tumore, qui Tumor ab Intestinis, extra locum proprium prolapsis, communiter Hernia dicitur.

C A P U T I.

De Herniis.

Hernia Germanis est *Bruch*; Græcis *Kéla* vocatur (T).

Fit

(T) *Kéla* apud Veteres Tumor omnis dicebatur; frequentius passim usurpant capiti de Scroto Tumore, quem Herniam & Rancem Latini vocant. Eustathius à *κείω*, mulceo, per anaplasiam derivari putat, Suidas, *κείω* magis propriè, à *κείω*, laxo; est cum Hernia Peritonæo relaxata. Jo. Harnarus à *δέρω*, liguum, quod Tumor hic dicitur prolapsus.

Fie hoc, quando Bursa Peritonæi in quodam loco aut emittitur aut relaxatur, tunc per laxatum aut ruptum Peritonæi locum Intestina elabuntur, & ita Herniam inferunt: quævis vero hæc Bursa Peritonæi est integra, tamdiu Intestina in naturali loco permanent. Intestinis his, uti notum est, tanquam linteum vel iudæum superdratum est Omentum, similiter uti Intestina à Peritonæo colloctum: hoc ipsum simili ratione, aut cum Intestinis, aut ab his rupto aut laxato Peritonæo, decedere potest: unde *Evisceratio*, vel *Evisceratio* dicitur.

Definitur, quod sit Prolapus aut Intestinum tumens, aut Omentum, ex limitibus Peritonæi, dependens aut à Valvula, aut à Laxatione.

Gravæ est Prolapus, qui ipsa pertinet, tanquam ad genus superius, ad Morbos Situr mutati.

PARS AFFECTA.

Pars affecta partem est Peritonæum, quod variis in locis laxatur, partem sunt Intestina & Omentum, quando situm sunt mutante; unde Peritonæum aut plene rumpitur, aut dilatur: Intestina ergo saltem tertia, jejuna, ileon, una cum supra inserto Omento, in Hernia eis prohibi possunt, crassa enim, quia nimis firmiter coarctantur, immobilia sunt.

Lora, in quibus ordinarij lœsunt, aut Peritonæum rumpitur, sunt varia & frequentissima hoc fit in ejusdem Processibus circa Inguina, per quos in Scrotum descendunt Vasa Spermatica, ibique convolvuntur in Testes; & postea est Umbilicus. Nam in his duobus locis facillime aut laxatur, aut omnino rumpitur Peritonæi Membra fibrosa, seu Bursa; unde etiam ratione Partis Affectæ hæc duæ sunt primariæ Herniarum Species: nempe *Externalis*, seu *Hernia Scrotalis* aut *Inguinalis*, dum Omentum vel Intestina per Peritonæum Peritonæi ad Inguina & Scrotum descendunt & *Omphalocele*, seu *Hernia Umbilicalis*, quando Intestina vel Omentum per partem Peritonæi, egingentem Vasa Umbilicalia post partum præcisa, laxant & dilatant, itaut hæc Peritonæi parti extendatur circa circiter dictam, Umbilicum, ædem modum accida Hernia Umbilicalis & Omphalocele.

Hernia Scrotalis est vel *Perforata* seu *Complexa*, vel *Inherens* seu *Incompleta*: *Inherens* est Hernia Inguinalis seu *Bubonocèle*, quando intestinum in Inguinibus, seu regione Buboni, est tantum Tumor ab Intestinis prolapsus, & super Osse Pubis hærentibus: quæ si successe aliter descendunt in Scrotum: est *Hernia Scrotalis Perforata*. Illud vero, quod per Peritonæum latum prorumpit, est vel Omentum, vel Intestinum, vel Intestina nunc conjunctim, nunc separatim. Quod si descendit solum Omentum in Scrotum, est *Omentum*; si vero non tam Intestina sola, descendunt, nunc Omentum, per Peritonæum ruptum, dicitur *Externalis*.

Hæc duo loca, Umbilicus & Processus Peritonæi, sunt serè, per quæ ordinario & frequenter fieri Herniæ, non autem sunt sola, nam etiam in aliis locis Abdominis Peritonæum laxatum ruptum aut laxatum dicitur Hernias, observantur hoc primum *BARBETTE* in sua *Chirurgia* §. 1. cap. 71., quod etiam alius in locis, nunc supra & infra Umbilicum nunc in lateribus longè supra Inguina, item à parte posterioi circa regionem Lumbarem ruptum aut laxatum Peritonæum inferat Hernias; quæ, quia rariore, ab imperitis Chirurgis tanquam Abicelles traditi solent, non extra pœriculum ægri. Refert etiam *alios* hoc exemplum Herniæ, ubi per Processus Peritonæi laxatus & ruptus fuit Hernia, ubi Intestina non in Scrotum delapsa, sed juxta Scrotum ingentem tumorem ex laxata eadem induxerit: Idem *BARBETTE* observat rupturam Peritonæi juxta Spinam Dorsali, & ibidem ex Intestinis prolapsa fuisse Herniam: Sic etiam *BARTHOLINUS* Gen. 2. lib. 55. observat

Tom. II.

etiam Herniam supra regionem Umbilicalem, mox infra cartilagem costiformem ex ruptura Peritonæi, quæ est similiter ingularis, atque vulgaris, non tamen continenda, quia potest occurrere in præsi: sic ex Utero rupto Intestina prolapsa observat *SCHENCKIUS* l. 4. Obs. pag. 650. de Intestinis ex Utero prolapsis: Simile exemplum *NANZELIUS* habet in *Anal. microscopica & macroscopica* pag. 705. de defectu Intestini in capacitatem Uteri, ex rupta Uteri cervicæ, quæ Intestina etiam in Uterum prolapsa loco Secundinæ ab imperito Chirurgo necum extraxit. Observandum tamen hic est, ne præternaturalis Testiculi situs falso habeatur pro Hernia: Nam interdum Testiculorum alter non semper in Scroto hæret, sed Olli Pubis incambit; sicut interdum plane intra Abdomen retrahitur, & Tumorem inferit. Non ergo ille Tumor ex Testiculo confusatur cum Bubonocèle, vel Abicelle illius loci, de quo *SCHENCKIUS* in *Obs.* pag. 541.

CAUSÆ.

Causa Herniarum præcise latet in ruptura aut laxatione Peritonæi: hinc omnia, quæ quocunque modo aut rumpere, aut succellere laxare, aut dilatare possunt quodam loco Peritonæum, induunt naturam *Causarum Remotarum*. Ruptura in Omphalocele, aut alius spæcibus est frequentior, in Scrotali vero est rarior, quoniam rupta Procellu Peritonæi intra Muculorum cœcæ Intestina libidini, & ita saltem Inguinalem Herniam faciunt, cum eadem succellere per dilatatum Peritonæum, tanquam per demonstrata vestigia facili in Scrotum descendunt. Hinc tales Causæ Intererunt sunt paucæ & raræ. Interdum fœdè character hereditarius, nam hereditarij Parentes hereditarij generant Fertus. Aliquot exempla videbitis in *HILDANO* Gen. 3. Obs. 71. Fuit etiam interdum Hernia Intestinalis ex nimia & violenta *Purgatione*, teste *PLATERO* in *Obs.* ubi subministrat exemplum Herniæ talis, ex usu & nimia operatione Purgantis ab Empirico propinxi. *Ætas* quoque *Infantilis* & *Senilis* ob Peritonæi ténacitatem hic confert aliquid: Herniam etiam à primo ortu reiert *HILDANUS*; & *SCULIETUS* Obs. 60. P. 2. *Armenius* *CHIRURGUS*. *Conjunctio* Umbilici *Hernia* ex Matris repentina Imaginationis impressione maxime, Uplurimum *Causa* *Externalis* *Hernias* inferunt, ut sunt *Mors* & *Saltus* nimis fœ: v. *Dispositio* quædam *Fœtus* causa fuit Herniæ Inguinalis, & coniequerent Scrotalis, apud *IOB* v. *MECERN*. cap. 66. pag. 297. quia olim *fœtus* in loco movetur, ut quæ *Vires corporis* fuerint, etas ex *impressione* in loco movetur, ut quæ *Vires corporis*, & *Ætas* post *Externalis* non sine dolo in *Scroto* habuit. Similiter idem observavit Herniæ insignè augmentum ex *Umbilici* p. 181. Hernias etiam inferit *Clamoris* nimis: unde ratione continui & citius Infantes facillime sunt herni: item fortis *Stramentis*, *Tassis* nimis, &c. inferunt Hernias: vid. *SCHENCKIUS*, ubi notum ponderosâ *Baptista*, *Equitatio*, *Saltatio*, &c. *PLATERUS* refert ex impetu *Tussis* corruere illam Herniam l. 3. pagin. 712. *Difficilis Partus* subinde Hernias, imprimis Omphalocele, seu Herniam Umbilicalem, inducent V.

DIAGNOSIS.

Quod signa *Diagnostica*. In omni Hernia adeit Tumor præternaturalis: interdum tamen Tumori soli non est fidendum. Itaque causi sumus in cognoscendis Herniis, ne decipiamur, & Tumorem ex præternaturali tunc, simileque Herniam patemus: si enim Tumor præternaturalis adeit, & in Scroto ossus Testiculi, Tumor non dependet ab Hernia: Sic *Obs.* pag. 55. refert *MARCHETTE* pag. 104. ad Villium quendam, Bubonocèle laborantem, accellisse Bubonocèle, quæ Bubonocèle ratum est Bubonem Venereum; quapropter sectionem administravit: quia fada, Sec-

X a cu

rus. *Quoniam autem* uti fuit Intestina & Omentum; hinc Enter cele dicitur *Hernia Intestinalis*, Epiplocele, *Hernia Omenti*: & si fuit hæc pars præternaturalis, morbus vocatur Enterocéplocele. Ratiore erò hic unde sit prolapsus, Bubonocèle dicitur *Partu* *Inguinis* *Ramus*, Omphalocele Umbilici *Regina*: rursus Tumor in *Quatore*, seu *Aspera Arteria* evolvitur, *quantumvis longe* ab *Hernia* distet, vocatur à Celso lib. 7. cap. 12. Bronchocèle, *Herniarum* quædam tamen varium est ratione *varia* materia quæ *Scroto* *Tumore* *allargis*: Sic si Tumor *carneus* sit dicitur *Sarcocèle*; si *apulus*, Hydrocèle vel *Hydrocèle*; si *transiens* *Pneumatocèle*; si *varicosus* *Ramus* sit, hoc est dilatatio *variorum* quibus *Telles* *concrexantur*, appellatur *Ciclocèle*; atque ad hæc ex materia *Tumorem* efficiunt *permixtum*, tunc *Hydrociclocèle*, tunc *Hydrociclocèle*, tunc *aliter* *Ramus* *denominatur*. De aliis his *Herniarum* speciebus non loquimur hic A. noster, quoniam qd Intestinum morbus non pœssuntur abbi de iis opportunitate form erit.

(V) Inferunt etiam & Bronchocèles: quæ forma confusæ mulieres, in ipsi discessi Partis angustis, ne scilicet ab hoc deformi morbo præterito, vestium, quibus pelvis obducitur, solummodo præcedunt, atque alios quos antequam celli partem comprimentes, illius relaxationem, si qua ex conatu fieri possit, opportunitate præcedunt.

cui loco Paris emanavit. Itaque præter Tumorem occurrere in Diagnostico: Tumor herniolum nunc incrementum, nunc decrementum pati, nonnunquam etiam placet aboleri.

Aliis Hernia incipiens facili cognosci potest: nempe Tumor, ubiqueque locorum sit, mollis, sæpe indolens apparet: dum æger in dorso jacet, Intestina & Omentum prolapsa sponte in cavitate Abdominis recipiunt, & Tumor totus utplurimum disparet. Imo resupinus ægrus, ac elevata nonnullis cruribus & natibus, interdum cum murmure intra Abdomen reabsorbetur; eredo verò arguo Tumor talia reddit, accrescit & præuberat: etlique utplurimum sine dolore, nisi aut Intestina inflammata, aut Flatibus aut Stercoro indurato repleta, sed in angustiore foramine inclusa Intestina, irritationis & doloris occasione subministrant.

Iubendus etiam æger, ut tussit; hoc etenim factum, quando aliquid in Scrotum descendit, crepitum observamus.

Præterea Omentum & Intestina semper digitis possunt repelli, nisi aut Flatibus, aut Excrementis indurata id impediant.

Hernia confirmata iisdem cognoscitur signis, in specie, si succellere magis magisque incrementum capiat: item, si Cuius præcedentes potuerint eandem inferre: Vid. SENNERTUS.

Factam Herniam quod attinet: est malum hinc periculo, si reponitur; si verò non, sed in loco rupe vel laxato hærente Intestina, tunc periculum est non leve, licet observatum sit sæpius contrarium.

PROGNOSIS.

In Prognosi, quod diuturnior, & quod maior vel minor, quædam periculorum aut levior est Hernia.

Confirmata est curatu difficilis, præsertim in Adultis, in quibus rarissime habet Chirurgica operatione curari possunt: in senella Infantium præte facilius succedit negotium.

Si ea Hernia superveniat Vomitus, non adeo desperatus, quàm si ea alii casus: vid. M. A. N. C. ann. 6. & 7. Obs. serv. 44. SENNERTUS in Praxi, ubi de hoc p. 242. Rina sunt pericula, quæ ex Herniis ingruunt: nempe Colica & Motus Hæmicus, occasione Intestini irritatorum in loco prolapsi, sive irriterentur à Causa externa, Frigore, Confusione, &c., sive à Causa Interna, repletis Fæcibus, Flatibus, &c. Delinde fit interdum, ut Intestina prolapsa inflammantur, & inflammata Gangrænam incipiunt, & de æger moriatur: quæ exemplum habet HILDANUS ex Epileptice demortui, Obs. 73. Cæter. 2. Si Hernia subito ticta, & exaggravata gravi dolore. Singulis superveniat, aut illos, paucissimi evadunt: TULPIUS saltem l. 3. Obs. 13. contrarium habet exemplum de herniolo Vomitu stercoreo seu lico, qui evasit: Nam si intercutit ægri, aut lico, aut Intestiniorem inflammatorum Gangrænam moriuntur.

Rarum est, quod Intestina prolapsa & inflammata suppurent, & suppurata extrorsum versus aperiantur, ita ut Stercoris, & interdum ipsa assumta Alimenta per aperturam prodeant: de quo HILDANUS in Observationibus, item JOB VAN MEECKERN.

CURA.

I. In Cura omnis Herniæ tres scopi sunt attendendi:

1. Ut reponatur Intestina, & Omentum prolapsum in situm naturalem.
2. Ut repolita Intestina in situ naturali firmetur, ne deinde excidant.
3. Peritonæum ruptum aut laxatum consolidando, quod in Senibus aut aëtuosis fit, in Junioribus & febricitantibus facili, debitis Subligaculis partem affectam comprimendo.

Pro scopis melius obtinendis observandum:

I. Chylorum usus non negligendus, quando Flatibus vel Mutura Intestina crassa occupant, vel Alvus contumacia est, & Symptomata gravia egrum torquent: Consecratur HILDANUS l. 6. Obs. 73. sic enim Intestina crassa abstergentur, & facilius ex Intestinis tenuibus in eadem derivantur excrementa, & sic remouentur impedimenta. Purgantia autem cauent.

II. In Hernia Intestinali cordatus Medicus semper Flacciditatem habet, & proinde nobiliorum Carminantium & Precipitantium usum quam sedulo observet, cum talium causa & inde proditum Flatibus mirè exasperent Hernias.

III. Herniæ à Frigore, præsertim subitaneæ, solent se-

ri lethales: irritata nempe Intestina dolore, hinc ipsarum de duritie concipiunt quæ insequitur ileos: vid. VEL-SCHIUS in Herterii. 2. pag. 6. item M. A. N. C. Ann. 6. Obs. serv. 93. pag. 154.

IV. Cautiones in Repositione manuali observandæ sunt, quas imprimis suggerit PANAROLLUS in Repoli. & Cura Herniarum Part. 3. Obs. serv. 49. quæ omnes perquisi sunt laudabiles, excepta fecunda, ubi frigida intra & extra commendat.

Cautela sunt sequentes:

I. In Intestini non debet Chirurgus sæpius manus admove, sed cautissimè & tenuissimè trahat Intestina, ne impetu se contactu Intestina, dum dolent, irriterent, & sic spasmodi, dolerent, & cum dolore inflammatione, incenduntur, nade difficultas Repositio.

II. Abstinere jubet à rebus calidis tum intra quàm extra, quoniam inflammationem accelerant, ex qua corruptio & mors. Frigida verò probare non possum, quia sunt periculossima, quia Tepida aut subcalida interne & externe utianda Remedia.

III. In dolentem ægrum collerare, ut pedes altiores fiat quàm caput.

IV. Cibi omnes solidi fugiendi, & tantum rebus liquidis utendum est.

V. Partis dolenti applicare possamus Omentum Aquæ sassafras tepidum, & angere manus cum Oleo Amygdalarum dulcium, vel imponendum simul Urganatum, idque saltem tepidum, non frigidum, applicare.

VI. Adversus Chirurgus facili aut spontè Intestinum egredi hinc remedium absque ulla manu vi: nam si sæpius admoveant manus irritatur Natura, & rectè desperato, sanguifluum primitus ea trahit, successivè in intradendo: si Dolor impedit, tunc illiusmodi blandi loca herniæ velæ manus tum Oleo appropriato, ut Oleo Hyperici, cum Oleo Amygdalarum dulcium, Oleo Chamæmilla, Oleo violaceo, & similibus blandis, cum aliquot guttulis defillati cupulædam Carminativi avariis.

VII. Abstinere tandem ægrum à Vitis, etiam si deceptus sit (loquitur de Vitis Italici si militari, de nostrate alter pronunciandum.) Id tamen animadvertendum est: quod si in Stomachi incides dolorem, succedendum est, ut manus capiat Vitis parentis 3.

Conf. quod Herniarum Curas HILDANUS, hoc superius citato, SCULTET. in Arm. Chirurg. Tab. 39. & HARMANUS de Herniis.

Utergo reponatur Intestina prolapsa, hæc ipsa conveniente corporis situ resupinato (quod primario intelligendum est de Hernia Umbilicali & Inguinali, secundario etiam de reliquis) cruribus, & natibus nonnullis elevatis, ut Intestina naturali quodam impetu per situm naturalem retrocedant, adjuvanda sunt: aut si sponte retrocedere non Intestina prolapsa, comprehenduntur Intestico calibus manu sinistra, dextra verò, & quidem digito indice & pollice inieuncto Oleo Sulphuris Rosædi, per rupturam intraduntur. Notetur tamen, non proficuum esse, sæpius Intestina prolapsa manibus palpatæ si liquidum hoc modo & dolor & Hernia augetur. Simul autem impolumenta, Flatibus imprimis, stercorea, & hinc Intestiniorem aut tactum induratum removenda. Induratum hæc Intestiniorem non præcavet est si fecibus induratis, quales vi resupervent in Intestinis tenuibus, quæ lommotio proderet solent, sed potius ex membranis tensione, & ipsamodico Intestiniorem asfectu talis durities oriri videtur: crassa enim ob firmam compactionem non possunt probari, nisi impetu suo. Ergo irritatio ista, duritiei occasio, blandis foveatur externa resolutione, internis Aromaticis carminantibus, Intestini amica, & tensione restituitur eorum, & Flatuum generis impediendibus, assensu: de quibus in Cælia.

Pro diutis igitur impedimentis remouendis interne convenienter quatuor Semina Calida maiora, quocunque modo sumpta, speciatim probè contusa in Vitis rase clauso ebullita, & calidè posita, addendo interdum porum Lapidulum Cancrorum preparatum, de quibus vid. HELMONTIUS Tract. de Flatibus, externè verò Fomenta, Uguentia, Cataplasmata Anodyna, Carminantia, & blandè Emollientia. Usurpanda sunt Emollientia in indurata Fæcibus & Intestinis; Discurientia in Flatuum præsentia; Anodyna in irritationis molestia plus modis doloris, & hinc duritiei urgentia. Ingredientia per se patent: Vegetabilia Carminantia cum Lacte coquantur, & vel in forma cataplasmatum, vel Lac decoctionum cum Lintels multi, licitis tepidè herniolo loco imponendum.

2. Flor. Chamæ.
Meliss.

Sem.

Sambur.

Vorbis. an. M. 3.

Rad. Angel. 35.

Sem. Foenugr. 35.

P. l. a. Deculap c. l. q. Lallip.

D. 3.

Epithema extense lesiens.

Intestina si sint refrigerata, foveantur lincolis calidis. R. VERIUS applicavit Spiritum Vini inflat fomenta calidè, & sic reliquit Herniolas: vid. *Cent. 3. Observ. 8.* Aliis imponuntur Intestina & Omenta calida Animalium, v. g. Canis, Vervetis, Vitali, in specie Omecum Agni calidatj tepidè admodum commendatur: Vel

34. Ovi infus. Chamom.

Sulphuris Rosat. an. 35.

dehill. Anethi.

Chamom. an. gatt. viij.

M. D. 3.

Oleum Externum leniens & dissolvens.

Jum Litus blandus cum Oleo Amygdalarum dulcium, Hypericis, Chamomillæ, Liliorum alborum tepidiorum Intendum Focis est Lixivio acris, Semine Camini, & paucis Vini Malvatico, hoc crado exceptis, admoveatur. SOLENERANDER f. 4. *Consil. 13.* cum expertissimum commendat contra Intestina prolapsa sterus ovillum ducti Lacti bubula, vel capillis incolatum: Colatura in forma Focis; remaneat verò blandi Cataplasmatij Scroto calidè, & caeterivo, post sufficientem fomentationem, imponenda, donec Intestina tractabilia fiant: hoc enim remedium SOLENERANDER, uti loquitur, sæpius utile reperit, ubi non potuerunt reponi Intestina propter Flatuum copiam, & Facum duritiam, aliquoties se, ubi res vix desperata, Intestina laxata reposuisse, & ubi frustra alia adhibita fuerint: vid. *Cent. 3. Obs. 10.* ubi spero omnia habet, quæ sunt necessaria ad Curam Herniæ. Fidem facio, me aliquoties illo Focu, cum res videretur in principiis esse, prolapsa Intestina reposuisse, astera frustra tentatis aliis, addendo semper Spiritus Vini aliquam portionem; partem enim emollit, partem dolorem sedat, partem dicitur: conf. HILDANUS C. 6. *Obs. 1. & 70.* Simul Clymata Emollientia & Carminantia injiciantur, ut evacuat Intestina crassius, Reddo & Colo, facilius Intestinum tennim, quippe quæ in Hernia prolabuntur, Contenta, vel flatulenta vel humorosa, eo pergere possint, infusumque Intestina leviter irriterent, & liberant se à Facibus: deinceps exinaniam Reddo & Colo, paratur quoque spiritum vacuum Intestinis reponendis.

Exemplum Clysteris Emollientis est hoc;

34. Herb. Anisoli.

Malva.

Pavaria.

Flor. Sambur. an. M. 3.

Rad. Alth.

Lil. alb. an. 35.

Sem. Anis.

Lini an. 35.

Coq. in l. q. furis Carnis vital.

Colatura 35. adde

Terachin. cum viell. Ovi solat.

Mell. Mercatilis. 35.

M. l. Clyma: 3.

Clyster Emollientis.

Si verò nimium diu prolapsa fuerit Intestina, itaut jam inflammationem suscepit, indicatur Curatio modo præscripta in Deo.

Præter dicta quæ applicantur Intestinis prolapsis, five in Scroto, five Umbilico, conveniens est, ut regioni Lumbari, ubi nempe mediane Mesenterii appenditur Intestina, quædam applicentur, quæ Nervos ad Mesenterium delatos hirmat & relaxant, & sic mediantibus his Intestina prolapsa quæ retrahantur, quæ inter eminet Emplastum, cuidam Medico secretissimum, HOFFMANNI an. M.M., cujus descriptionem vobis communicabo;

34. Gam. Ammotic.

Galban.

Sagapen. an. 35.

Terachin.

Cera virg. an. 35. seu 35.

Magni. arsenical. 35. gr. xv.

Rad. Ari 35.

Gummata solvantur in l. q. Aceti defillati, & coq. in forma Emplastri, intermissis postea reliquis speciebus.

Extendatur Emplastum super alutrum, quod Dorio & Lumbis applicatum, Intestina valido tractu in locum naturalem redire possit: epas effectum vidi mirabilem.

Alias etiam hujus loco Pinguedo urina, quæ quibusdam tamquam secretum, & Lumbis illata ad retrahenda Intestina, item, quæ adhuc mollior est, Pinguedo crinacea commodè applicari potest: loco hujus Pinguedo Leporis Dorio vel Lumbis illata, & hinc Exuvia Serpentum superimpositæ, admodum retrahunt, & Intestina retenta firmant. Aut talia si non sufficiant, subinde ad Chirurgum accedendum sit, & aperture loci herniæ Intestina reponenda, ipsæque locus consolidandus, quæ facillimè interduum sine remedio curari possunt Herniæ (X).

Ut vero reposta Intestina in loco firmetur, idque per Peritonæi, vel laxati vel rupti, quantum possibile, Consolidationem, præter Corporis Quietem summè necessariam, interdu conveniunt omnia Remedia Vulnerariæ, & ex his parati Pulveres, Potiones, aut Essentie Traumaticæ five Vulnerariæ, quæ semper Carminantibus temperata: sicut Senior quidam berniolus, qui etiam pedisagrum passus, per aliquos septimanas Quietè & Vulnerariis ulius, Hernia curatus fuit: adeo ut continuus in dorso decubitus, vel vera Herniarum Panacea, etiam in Senibus: vid. etiam HILDANUS *Cent. 3. Obs. 54.* ubi refert Monachum Senem heruolam, laborantem per longum tempus Arthritide, hæc remittente, liberatam esse ab Hernia. Similiter Vulneraria inter eminet Perfoliata: refert enim SOLENERANDER *loc. supra citati* de quodam, Perfoliatæ usû ab Hernia curato. Deinde Symplytum majus, & omnes reliquæ Consolidatione speciei, Herniaria, quæ est laudatissima HOLLERII Plasta, ab eo quocunque modo ad Herniarum Curam commenda tur, five deoquatur, five Pulvis affinitur, aut quocunque modo usurpetur. Herniaria igitur & Perfoliata præ cæteris commendantur: sicut Herniæ quamplurimum curatæ referuntur in VEISCHII *Medic. Cent. 3. Obs. 76.* Pulvere Cochlearum, quarum loco Cancrosum Lapilli subitui possunt, & Seminis Perfoliatæ 35. Rad. Ireu 35, mibis cum Trag. Aromat. 35; loco herniolo Pinguedine asneria inuncto, & linteis, Malliche & Thure suffusa, suppositi. De usâ quoque Perfoliatæ & Consolidæ Saracenice cum Xungia Gallinæ, Mellæ, & Butyro Malali egregio, vid. in M. A. N. C. Ann. 3. *Obs. 306.* 347. ubi hic laudatur;

34. Sem. Perfol.

Fol. Consol. Sarac.

Perfol. an. 35.

Filicella.

Rad. Consol. maj. an. 35.

Sach. possid. 35.

M. l. Pulvis.

Detur mane in Jusculo, Vel

34. Herb. Herniæ.

Perfoliat.

Flor. Hyperic. an. M. 3.

Rad. Symp. 35.

Coq. in l. q. Aqua comm.

Colatura 35. adde

Syrup. de Symp. Fern. 35.

M. D. 3.

Potio sanans.

Vel

34. Herb. Herniæ.

Bibb.

Perfoliat. an. M. 3.

Rad. Sigill. Salem.

Symp. maj. an. 35.

Sem. Nubur.

Hyperic. an. 35.

Incisio

(X) Merbadum hujus Operationis videtur est apud celeberrimos Chirurgo: accuratè illum describit Jo: Bapt. Verduc, Traité des opérations de Chirurgie. chap. 8. Notandum autem est, quod igitur in Scholio, nonnulli quædam acciisse, ut post factam sectionem in Inguine, Inguinem prolapsum, Inflammatione in Gangrænam vergere præberent, detestum sit: facta autem esolatura, adeoque Inguinem perforato, facilius materia per foramen apertum prodierit. Id autem non omnino lethale fuisse observatum est in nonnullis; non congruenter foraminis Intestini labis cum blava vulneris à Chirurgo facti, ne facrum parvis veluti per Fistulam, seu potius Anam artificialem, educi posset, agri vitium immixti transgrederent, accedente exquisito semper Dieta regimine.

Incis & contusis abunde

Vini rubri Menf. j.

Stcut per nodum in loco temperato, ne Vinus scescat.

D. S.

Poclo Vulneraria.

Mane & vesperi deinceps hauriat xger ad Zij. cum uisq. vcl altera culp. cultelli Lap. Cancer. preparator.

Vcl coqu. Species prædictæ in Lq. Cerevisie fermentaria.

Zj. Herk. Alchimil.

Herniar. an. M. j.

Rad. Consl. mal. Zij.

Sem. Nigburi. 3j.

Coqu. in f. q. Vini.

Calatuma 3ij. D. S.

Poclo pro aliquot vicibus.

Quæ hauriat unâ cum Lap. Cancer. preparator.

Sic ex Vulnerariis illis, quarum notitiam præsuppono ex Materia Medica, sunt Cataplasmata lesionis loco imponenda.

Zj. Aqua Charsel.

Herniar. an. 3j.

Aceti Vinj.

Lap. Cancer. prepar. 3j.

Antimonij diaph. 3j.

Syr. de Symp. Fern. 3vj.

M. D. S.

Poclo sanans pro aliquot vicibus.

Deinde hic imprimis etiam Vulneraria Plantæ sunt in usu, quæ inter præstantissima sunt Millefolium, Plantago, & Ceranium Rupertianum, Ruloræ, &c. Sic Senecio Nasburgii nulli cedit in hoc puncto, exterius pariter & interne usurpatur: idque hoc ex fundamento, quod acrimonia sua caustica uberiorè alimenterium affusum excitet, quo ipsa Peritonæum cò facilià consolidatur. Est adhuc Medicus Piquan, qui Pueris heroicis quamplurimos restituit propinquo interno Semen Nasburgii, in Vino, sive sub forma Decocti vel Porus, aut etiam Cerevisiæ medicatæ; cerevisiæ vero applicando Fustum Pellis vel Cutis Anguillæ, oblitum cum Albumine Ovi. FORESTUS lib. 23. Observ. 15. uti etiam FONSECA lib. 2. Consil. 36. patitur quam expertam hæc describit Herniarum Curam hoc modo:

Zj. Pulv. Sæp. Nasburgii:

Subij. 3 probè cum Albumine Ovi, extendit super altam, & apponit ad Herniam, oque removet, donec ex se decidat. Felicem vidi succellum.

Vel

Zj. Herk. Herniar.

Sem. Anis. an. Zij.

Nigburi. 3j.

M. f. Pulvisgras utrorundum cum Balsamo Sulphuris. Pertinet etiam hu. Ceratum Scupii ad Hernias Intestinales experum, simuliter ex Semine Nasburgii Descriptio sequens est optima:

Zj. Gum. Carana. p. ij.

Sem. Nigburi. p. j.

Subigantur cum Lq. Terrebiniha colla, & f. l. a. Ceratum, quod impositum, & durius contusatum Herniam Intestinalem brevi ferè sanat.

Sub usâ tamen huius Emplastri Alvus semper sit fluida, ne sub nimio conatu egerendi, Hernia aggravescat: maxime autem sivat, si sumatur singulis diebus mane, & vesperi Semen Nasburgii pulverizati cum Vino rubro 3j. per aliquot septimanas, & hæc Curam tanquam expertam commendat FONSECA. Post Semen Nasburgii est & Radix Sigilli Salomonis, cuius Decoctum in Vino aliquandiu continuatum singulariter etiam à FORESTO l. 37. Obs. 15. ad Herniarum Curam commendatur, ubi refert de quodam, huius Decocti Popu, per tres septimanas continuatè, à Ruptura curato. PARACELSUS Folia Betonicæ & Samiculæ albæ deponit in Vino, & propinavit pro Hernia curanda. Aquæ Vulnerariæ dictæ, Vini medicata Vulneraria, item ex Plantis dictis paratæ Conservæ & Elixentia, imprimis Elixentia Herulatiæ, Symphyti, sive Sanguis Symphyti, Fiores Hyperici, &c. crebrius usurpantur: condicunt. Item Pulvis Lumbicorum terrestrum, & ex his parata Elixentia, similiter convenit in Hernia.

Quod atinet Externa, sunt eadem Adstringentia Vulneraria, loco Rupturæ aut lationis imponenda, eaque pro intentionis varietate multiplicia: v. g.

Zj. Poll. Auguill. salu. vel terpen. q. f.

Liquor. Ferri. q. f.

Coqu. ad consistentiam Emplastri aluta superinducendi.

D. S.

Emplastrum pro Hernia.

Sic Decoctum Pellis arietinæ cò viscositatem & lentorem, cum aliis resinosis tectum in Emplastrum, multa præstat: etiam Succus Heniariæ cum Farina Falarum Rupturæ applicatur, & a FABRO ad Hernias præ cæteris commendatur: item Essentia Serpentum contusa, & ex his paratum Emplastrum prodest: quidam iussent Rupturæ applicandum, ut uti alii dicant, quod regioni Dorsi admotum, firmet Intestina. Singulare quod obtinet & omnibus præstetur Oleum Laceratorum ad curandas Hernias fusi illita, cujus insignia concolia & usus videbitis in FONSECA l. 2. Consil. 36., & huc ZWELFFERO in Pharmas. Reg. p. 266.

De cæteris fusinde in usâ sunt Cerata multiplicia, composita ex Pice navali, cui tanquam corpori, & basi additur Mosche, Thur, Bellum, Gummi Ammoniacum, Caranna, Terrebiniha, & similia: quibus etiam addi solent Sanguis Draconis, Bolus Armena, Crocus Martis adstringens, Hæmatites, Vilcum quercinum, Terra sigillata, Vitrioli dulcis &c. Magna quidem promissione, sed læpissimè expectationem fallaci præstant. Magnetem etiam quidam addunt: nemo autem credat Magnetem ob virtutem ita dictam attractivam Ferri, hic aliquid præstare, siquidem nulla sit tractio in tota Natura, nec Magnes vim suam exeret, nisi directus sit versus suum polum (Y): iam verò notum est, Magnetem militem Emplastri nonnulli pulverizatum. Itaque prothelo non video, quomodo virtute sua possit aliquid præstare in repositione Intestinelorum & consolidatione Rupturæ: Si ergo Magnes lo similibus aliquid præstaret, hoc ratioo particularum Martialis ferer. Emplastria talia videlicet apud HOFFMANNUM in Thef. Pharm. pag. 69. & apud ZWELFFERUM.

Mulier quædam medicastria phores Herniolis egregiè curavit Emplastro facta ex Resina, Pice, & Lactibris coctis pulverizatis. Hæc diu probè permitta ac subacta crasse inducuntur super altam, & ita applicatur. Illinatur quoque locus crebro Balsamo Sulphuris Rulandj, aut Balsamo Sulphuris Hyperici, cuius preparatio talis est:

Zj. Olei Camma. p. iij. vel iv.

Zj. Olei Terrebini. p. j.

Infund. Fiores Hyperici: exprimeatur, novem Infundendo, donec Oleum rubicundissimum fiat: Hinc infund. Flores Sulphuris, ebulliat balneo igne: quo illinatur locus herniolis: aut miscetur cum Emplastro ad Rupturam.

Pertinet hoc & Emplastrum Disulphuris Rulandj: Vel

Zj. Emplast. cyatra Ruland. 3j.

Disulphuris Rul.

Pici Naval. liquis. an. q. f.

Malax. c. Lq. Olei Ovi. aut Hyperici, aut Bals. Sulphuris: inducatur super altam. Herniæ applicandam. S.

Emplastrum pro Hernia.

Applicetur quam calidissime xper perferre potest, nec removeatur prius quam sponte decidat: ubi deciderit, Balsamo Sulphuris, eodemque calido, pars probè inauguratur, & iterum Emplastrum recens imponatur, quamdiu necessarium fuerit. Vel

Zj. Emplast. contra Rupt.

De Toracach. an. q. f.

Malax. c. Olei deffill. Succi, vel Hyperici, inducatur super altam.

Non inconvenientis videtur Mucilago Radioli Symphyti majoris, quæ inflat Cataplasmata impolita merito à ZWELFFERO extollitur; uti & ejus Decoctum impropositum Hernia multum in recessu habet: quo etiam facit Cataplasmata Mucilaginosum in Pharm. Reg. pag. 312.

Præterea Oleum Mallicichum, Myrrinum, Hyperici, Terrebiniha, & Spicæ conveniunt; imprimis Oleum vitellorum Otorum à quibusdam singulariter commendatur, sunt quibus suspensa veli buisummi Externa Pinguia & Oleosa, quia nimis laxat & ad maiorem Peritonæi dilatationem peccat. — m. suggerant: hæc non adeo inepto consilio jubent recipere Acetum deffillatum acerrimum, in quo Lithargyrium solutum, cui ipsa lineæ intiocta repositis Intestinis superimponatur, ac probè fomentetur ulque ad consolidationem: uti etiam quodam inguine commendant Emplastrum, quod sit ex Gummi Ceralorum nigrorum in Oleo

(Y) Magnes non solum trahendi Forum exeret, in quocunque situ sit respectu ad Materiam solam: alia pars sunt Magnetis proprietates, quæ ab eo sunt dependent.

leo Hyperici dissoluto, adjecto Pulvere Thuris & Mastiches, hocque diu, donec fiat Emplastrum seu Ceratum loco affectu calide applicandum pro consolidatione. Balismus falsi Gemmae commendatus est insignior ab HARTMANNO in *Praxi Chymicar. c. de Hern. p. 310*. Eius descriptio est manca; primaria & genuina est haec: Dum Sal Gemmae ita preparatum, & ad fluorem redactum est, prout vult HARTMANNUS, affundatur ipsi Spiritus aut Oleum Terabinthinae ad eminentiam trium digitorum: digeratur aliquandiu, huc abstrahatur, cohobetur postmodum aliquoties, donec Oleum Terabinthinae evadat rubeundissimum, quod Oleum rubrum abstrahatur ad consilientiam aequalem, donec scilicet Balismus elegans in fano remaneat, qui est versus *Balsamus Sali Gemmae* ad Hernias decantatus.

Ceterum cum his ipsis Externis necesse est, ut simul suspensus debita Subligatura, quibus subijci possunt Emplastra.

Observetur hic sedulo: ut quaecunque Emplastra firmiter adherere desinant, novo opus sit, subligaculum non removeatur, nisi prius Corpore posito ad situm superius locatum. Nam utut per biensem spatium Emplastro usus sitiens, tamen de novo institienda erit curatio, si semel prolapsus iterum stanti aegro intestina. Subligaculum talium Ideam & descriptionem apud PARÆUM in *Erp. Chionegis*, io HILDANI *Observ.* & JOH. van MEECKEN videlicet.

Curam Hernia Magneticam videbitis in M. A. N. C. *Ann. c. 63. Observ. 105.*

Locus tum de Situ Intestinelorum mutato, eoque imprimis, quando Omentum, vel intestina teatosa decidunt in Scrotum vel Umbilicum, & dant Hernias: Distum etiam fuit, quod crassa non possint prolabi, ut deor Hernias. Nihilominus singularis & molesta mutatio est, quando Intestinelum Rectum eminet per Anum, & vocatur Ani Procidencia.

C A P U T II.

De Ani Procidencia.

ANI Procidencia fit, quando sub Faecum excretionem Intestinelum Rectum ita prominet & protruditur, ut non possit rursum sponte retrahi intra corpus, aut hinc retrahatur, mox incipiat deorsum prolabi. Fit autem hoc nunc cum, nunc sine Doiore, vel cum vel sine inflammatione, ounc cum vel sine Tumore, nunc cum Hæmorrhoidibus affectus vel non.

PARS AFFECTA.

Jam autem naturale est, quod in omni Alvi Excretionem Intestinelum Rectum aliquantisper protrudatur, sed facta Excretionem idem Intestinelum & Musculi Levatoribus deorsum factum retrahatur, itaut Excretionis alius sit compolitus, & ex Podicis extrusione & Podicis retrahitione constet. Quando itaque illa protrusio naturalis excedit, retractio vero naturalis deficit, tunc concoligit necessario affectus, quem vocant Ani Procidencia.

CAUSÆ.

Duplex ergo hujus Ani Procidencie est Causa.

1. Est quidem nimia aut frequentissima aut violenta Ani excretio, & ita fibrarum Musculorum Levatorum aliqua lesio & laceratio.

2. Est Musculorum Levatorum plura minus resolutorum deficientio retractio. Quae nunc scorum, ounc jostrum accidunt: v.g. a Calculo Vesicae, & irritari continui per consensum Intestinelum Rectum, ac ad continuam protrusionem stimulari possunt. Quia etiam talio occasione a crebriori Excretionis conatu in tantum extendi ac relectari possunt Musculorum Levatorum forma, ut pertinet Alvi hinc foveatur protrusio, qualis Procidencia in Calculo Vesicae duobus astringit ordinata esse solet.

Nimium & frequentius aut violentius extruditur Anus propter quancunque seria & morifica ita intestino Recto hærentia, quæ omnis illud Intestinelum continuu vellicat & stimulat, à quo simul continuo irritatum Intestinelum se contrahit indolens, & foras protrahitur: unde hoc ipsum sepius protrusum in tantum tandem elabatur, ut re-

trahi deorsum oqueat; hinc imprimis Tenesmus & Dysenteria interdum Ani procidencia interuot; it. io Diarrhoeis superueot Ani procidencia; item Clysteres acriter, aut etiam suppositoria nimis stimulantia, inducunt non raro hunc affectum, uti hæc refert PANAROLLUS *Perr. t. 06, 23*. Stercora dura, aut excrementa viscidula io Intestino Recto hærentia, ac difficulter excreantur, ut se dicam, continuo stimulo & continua protrusione etiam procidere faciunt Anum; conatus enim ille expellendi est tanus, ut per hunc protrudatur Intestinelum Rectum: quod etiam facie subinde difficilis partus, dum Parturientes omni conatu & relecta respiratione motum excretorium inferiora versus moluntur, quæ occasione cum Faecum per anteriora, simul Anus per posteriora, non raro exsternitur: quale exemplum habet AMATUS LUSITANUS *C. i. Curat. 93.* & GABELCHOVERUS *Cent. 1. Curat. 71*. Hæmorrhoidibus dolentes anum continuo stimulant, item oimium fluentes, pariter ad hoc malum disponunt: Item Calculus Vesicae Vitorum, per consensum continuo irritat podicem, ita ut crebriori egrediendi conatu anus subinde grauius prociat, de quo iam dixi.

Quando ita protrusus est anus, secunda Causa, ompe Musculorum Levatorum impedita retractio, accedit propter constitutionem eorum Paralyticam; five hoc fiat vitio ipsarum Fibrarum in Musculis mortuorum; five fiat vitio Nervorum ad Musculos dictos derivatorum, de quo *fos late, ubi de Paralyti*. Facit hoc suo modo percussio fortior, seu Causa ab alto super Os Sacrum, ut Vertebrae Lumborum, ubi Nervalli derivant, quæ Paralytici horum Musculorum, Nervorum ratione, inducit: item si nimis conatu anus semel protrusus ductus intra hæret, ita ut Fibræ Musculorum Levatorum retrahentes omnia laxentur aut flaccideant, similiter procidencia ani subinde chronicam inserunt; Fibrae enim in toto solute & quasi paralytice inopunt retractioem ani: scuti intestina prolapsa, dum nimium refrigerantur ab aëre acido acro, Musculorum Fibræ resolvuntur, quæ etiam Excrementa serotina aut aquosiora copiosius vel crebrius per anum excreta, Intestinelum Rectum, & Musculorum Fibras laxantia, ut nequeant intra corpus retrahere Anum, etiam lubinde hoc malum inserunt.

DIAGNOSIS.

Quod attinet signa Diagnostica: sunt facilia; & per sensum patet: Causas ex antecessoribus faciliè possumus harolari.

PROGNOSIS.

Quod Prognosis: Ani procidencia per se ordinariè non multum habet in recessu, & pro Cautarum varietate, vel facilius vel difficilius Curam admittit: nunc etiam periculosum ounc magis periculosum esse solet; oñi enim subito aut repente curatur, interdum io periculosum aoi Tumorem terminatur.

Io specie duplici in statu periculoso fit: vel cum Inflammatione, vel Paralyti Musculorum; Ani Procidencia cum inflammatione non raro tandem Gangraena subsequitur: si conjuncta cum Hæmorrhoidibus, vel Tenesmo, sic, difficulter curatur; thronica enim fit interdum: Ani Procidencia, quæ orta est à Paralyti, vel nimia resolutione Musculorum Levatorum, difficulter curatur, quia repedit licet semel ano, tamen quando deorsum exsternitur cum excrementis, malum faciliè recidivat.

CURA.

Quod Curam: duo sunt notanda:

1. Anus prolapsus est reponendus; &

2. Repositio probe firmandus, ne tam faciliè prolapsus. Repositio est facili, sique imprimis Manuum ope, quando Indice digito blandè intrudimus, vel quando Lintherum cum Decodo adstringente, vel Vino calido, prout necessitas postulat, obrium, circumvolvitur Indici digito, & huius medio anus intruditur. Quando ita repositum est Intestinelum, paries extendere debet coxas & erum, & ita extenso, quousque potest, corpore, vel supra ventrem, vel etiam supra alterum latus, quomodo potest, quietus jacere debet, ut ita repositus melius firmetur Anus.

Uo vero Repositio melius faciliatur, considerandum prius: an quædam adiut impedimenta, Repositionem vel impediant, uti sunt Stercora dura, aut Sordes in ano, aut ani prolapsi Inflammatio; vel recidivam minuantia, uti

ut si sunt Aoi nimis diuturna refrigeratio, vel Mascularum Levatoriorum paralytica constitutio: quæ ipsa prius ante Repositionem removenda sunt, adeoque *Lac. Ductilioris Merba Mellis*, vel *Florum Verbasci*, vel *Florum Sambuci*, in forma Clysmatis applicetur, & foveatur Anus, ut emolliantur Stercora indurata, & removeantur, alias recidivum malum. Si vero casus sit Sordes aut Mucus acrior intestinum stimulus, hoc prius abluendum & eluendum est Fomento adstringente & blandè adstringente: pro quo loco conveniunt, quæ modò insinuatæ fuerunt, vel horum loco Decodum Foliorum Quercus, Florum Verbasci, Cicerum rubrorum, Parietarie, &c. cum Aqua ferratorum paratum usurpetur, quo abstergantur Sordes adhaerentes. Si vero adit Inflammatio, vel etiam Tumor intestini proptus aut similium, quibus præsentibus impossibile est, intestina debite reponere; Inflammationi præcedenda, applicatione Focus emollientis & discutientis; ad quos Focus usurpatur imprimis Folia & Flores Verbasci, Meliloti, Chamomillæ, Sambuci, Malvæ, Violarum, &c. quæ coquantur nunc in Lacte, nunc in Aqua ferratorum, nunc in Vino rubro adstringente, v. g.

℞. Flor. Sambuc.

Chamomill.

Hyperic. an. M. ℞.

Refert. rub. p. ij. vel iij.

Sambuc. Albulch.

Melilot. an. M. ℞.

Coquantur in Lacte vel Vino rubro:

In Lacte, ubi Dolor, in Vino ubi Tumor durus & renitens; ubi vero Tumor inflammatorius, in Sero Lactis: & hoc Decodo anus tumefactus & inflammatus subinde fomentetur ac foveatur, donec omnia illa pathemata cessaverint.

His omnibus remotis impedimentis, reponendus est anus illudmodò prius cum Oleo Rosarum, vel Myrtillorum, superasperio Pulvere Galliarum contusarum, C. G. ulso & Mastiches Pulvere ana; sic enim adstringitur anus, meliùs firmatur, quò minus recedere & excidere possit. Præterea ad firmandum anum prolapsam in suo loco, conveniunt etiam remotis impedimentis suffusæ ex Seminibus & Floribus Verbasci, Floribus Chamomillæ, & Resina Abietis: v. g. quod adhuc melius est, insinuaturs Suffusæ KESLERI, quæ describitur in suis *Centuriis Præparum C. 4. num. 15.*

℞. Albulch.

Sarcini.

Mastich.

Thuris.

Myrrha an. ℞.

M. pro Suffusæ S.

Pulvis singularis ad Suffusum.

Excipiantur Anus in tella perforata:

Hoc factio loventur aut illantur, vel cum Pinguetudine cervina liquefacta, vel cum Oleo Ovorum, & ita intruso Ano zger probe extensis pedibus lateri incumbat.

Ut vero firmetur anus plùs minus repositus, faciliùque etiam reponatur, multum confert tale Emplastrum calidissimè regionis Oculi Sacri luperius, aut etiam Lumbis applicatum, quod ita paratur:

℞. Gum. Opoponac.

Singap. an. q. ℞.

Liquefacta calide inducantur super alutam, & Emplastrum, & applicetur, quantum fieri poterit, calide.

Alias contra ani procedentiam, & firmandum intestinum Rectum HARTMANNI Experimentum in *Praxi Chymiatr.* est: Alter quærens bene calefactus & Mastiche illitus; cui, quàm calide ferre possit ager, per bonæ quadrantem insistat; quin etiam loco Mastiches, sola Medulla cervina aut hircina liquefacta, & ita intestino prolapsu, una hoc blandè reponendo, & hinc illita, simili ratione applicata confert: siquidem solum Serum cervinum, aut etiam hircinum, liquefactum & in intestino Recto prolapsu illitum, una hoc blandè reponendo, & hinc simili modo insistendo, procedentiam ani recentem curare solet.

Loco pinguetudinis harum etiam fixentur Flores Verbasci in Butyro non salito, fixa bene transcoleantur, quo ipso simili modo Anus innungatur. Cui alius præterea remedium habetur Cinis Scabæborum pilularum, qui intestino subinde prolapsæ insuperfus, & hinc illud intestinum denso repositum mirè firmare solent.

Quod si fiat, ut Hemorrhoidibus incitæ sit, vel etiam sequatur exs procedentia ani, optimum est Oleum Mastiches, in quo bullierint Scabæbori: quod Oleum illitum prolapsu est convenientissimum & specissimum: Secuti, si in eodem Oleo Mastiches bulliant Flores Verbasci, egregium est specissimum ad Procedentiam Ani ex Tenesmo. Iræritis aliis, insigniter conveniunt Succelli sequentes:

℞. Furf. M. i.

Fel. Mellefol.

Flor. Verbasci, an. M. ij.

Insuantur Sacculo interpersati, coqua. in an. Vini & Aeni, & applicentur tepide Podici, ut perficere Anus firmetur.

Conveniunt imprimis, si post Partum difficultè malum natum fuerit: Vid. GABELCHOVERUS *Comar. 1. Oberr. 71.* Loco Aceti, vel Vini, aut similis liquoris conveniunt, etiam decoquantur in Aqua ferratorum, quæ potenter adstringit, & anum firmat.

Repositus ita Anus si non remaneat, ut firmiter loco suo retineatur, præter conveniensem corporis situm, ad corrigendam Meliculi Levatoris resolutionem, simul appropriata nonnulla Aromata conveniunt: v. g.

℞. Flor. Chamom.

Balaust. Flor.

Ambur.

Fel. Salsiv.

Lauri an. p. ij.

Nuc. Cupress.

Gallur. contus. an. p. iv. vel vj.

Cort. Granator. ℞.

Coquantur in Aqua vel Vini & alijbique: applicentur & insuperant pro Focu.

Quod si post Repositionem firmato etiam anus remaneat color aut etiam rubedo in Ano, ac ulceris superveniat Inflammatio, aut etiam aliud gravius symptoma, recipiaturs Aqua Plantagin. in qua solvantur & Saccharum Saturat. & ita anus hoc ipso blandè fovendus est: aut loco buxæ supradictæ Fomentis adstringentibus utendum.

Hæc de Situ intestinum motato.

S E C T I O XIII. DE CHYLI AD RELIQUAS PARTES MOTU ET DISTRIBUTIONE LÆSA.

SEparatus ita in duas partes Chylus beneficio Bilis & Succi Pancreatici, eius subtilior & tenuior ac fluidior pars alterius per crassam intestinum bombicynam, & parolus intestinum ita configuratus, ut cremorem hoc lacteum saltem admittant, crassiores verò partes his poris non proportionatas, imò etiam flatus & aerem excludant (de quo videatur L O W E R U S *Tract. de Cord. pag. 352.*) in Vasa Lactia insulit, & leniter ab illis absorbetur, restantibus ejus parte viscidâ sub specie Muci; pars verò crassa excrementaria sensim sensimque ad Intestini crassa motu eorum peristaltico abigatur, ubi sub forma Stercorum excluditur, dum in Recto intestino constituta mollis & pondere idem ad sui excretionem stimulant; quæ tantò est ma-

jor, quò Fæces sunt fluidiores, tantò minor, quò eadem crassiores.

Motus autem Chyli ex intestinis ad reliquas partes quomodò, & per quæ fiat Vasa? semper admodum controversum fuit, modo etiam tanta dubia de Organo Linguæficationis & Nutritum partium oborta fuerint. Veteres GALENI Scēdores ex intestinis attrahi à Venis Melancholicis Chylum statuerant, & ad Hepar transire, in Cruorem & spiritum naturalem elaborantur; inde & Facilitatem naturalem in Hepate collocantur, & simul contrarium chyli & sanguinis motum in Melancholicis fecerunt. Juvenes verò postea anno 1620. d. 23. Julii à GASPARO ASELLIO Trivisus Venis Lacteis, à colore & proprietate contenti liquoris

quos fœdissimè, per has ad Hepar motum Chyli promovere creberrimè, de quo ASHLIUS *Traité de l'usage du lait*, item WALAEUS in *Tract. de Chyli & sanguinis Mater.*

Cum autem JOANNES PLEQUELIUS *Disput. Annot. 1641*, tria autum observatione confirmatum suum scriberet, hęc casu, inventum Receptaculum commune in Bestiis, nam cum Ductu Thoracico, et eo usque ad Venas Asillares protulit, divisagisset, & BARTHOLINUS loco huius Receptaculi, Glandulas suas Lumbares in Homine de monstrasset: creditum omnino fuit, partem Chyli easdem ad Hepar per Lactea circa ventem Portas tursum tendere, ipsam verb transire ad Chyli Receptaculum per reliquas Lacteis deferri, cui quo per Ductum Thoracicum in eamdem venosam Asillarem finitram infundatur, ut cum sanguine redeunt per venas ad cor mittatur, item in mulieribus Lacteis qualiam mœterem ad Uterum deferre Chyli partem pro nutrimento Fœtus, & ramulos quoddam, licet nondum visos, a Lacteo Thoracico ad Mammas Lactis materiam chylosum deferre probabiliter summat fuit, uti serosam materiam ad Rines deferri, ex his sub Unius forma post possum asserendum: videatur PERCULINUS *Traité de Receptac. Lumb.* item BARTHOLINUS *Traité de Lactibus thorac.*

Sedulus Anatomorum tandem usque eo processit, ut à BARTHOLO DARE, RUDBECKIO *Serie*, & OLIVIO *Angli*, ferè eodem tempore, hęc diversè sententia, circa annos 1652, & 1659, Vasa Lymphatica inventa fuerint, qua occasione simul observatum fuit, Vasa in Mesenterio ad Hepar protensa non esse lactea, sed esse lymphatica, serosam materiam ex hepate educunt (si licet omnia reliqua lymphatica per viscera & artus dispergi, ex circumstantia corporis ad viscera Thoracica & tandem ad Cor, seu commune centrum, & liquorem concentum revolvunt), unde nihil Chyli ad hepatis castrum, & omne Receptaculum commune, & tandem circa finitima indeque Cor Singulationis Organum unicuique proclamatum fuit, huius creques in Singulationis negotio à BARTHOLONO celebratis, quod opinio communi Medicorum applausu, passimque, uno itre oculis, aperte, requebatur hinc patet: vid. BARTHOLINUS *de vasa Lymphatica*, item RUDBECKIUS *de vasa Glandul. ferat.*

Legit hepaticum eladem, dum fuit ex inspecto ipsi sentitur appropinquat LUDOVICO BILSHIO, *Philosopho*, qui à tenebris adolescentie 10. annorum ætate usque ad senectutem ingentem Anatomiam operam dando, præter artu sciam Codem verum condidit, & incrementum emendationem, anno 1660, de inventis divulgat, Alimentum Chyliam transmittit partem separationem inotius alit uti in Inestibus, ratione Vascorum Lacteorum & Mesaliorum diversis, ut in communiter sic dicta Lactea pars subulis tenuior, quæ Roris per angulos meatus transiit, & ad Receptaculum commune transferatur, unde per Vasa (communiter sic dicta Lymphatica, & ab ipso vero, ob Rorem contractum, Vasa Rorifera appellantur) sursum partem in cor & reliquis partes, partem verò deorsum, uno verbo, in omnia membra, deferatur: crassior verò eius succi ex Inestibus pars propriè Chyli dicta, in Vasa Mesenterica sanguifera ingreditur, ad hepatis amandandam, pro suscipiendo ibidem sanguinis rudimento, quod absolvat tandem in Corde: ita in BILSHIO non tantummodo hepatis antea sepulchrum de novo reficitur, & Venarum Mesalium manus devehendo Chyli dicarum denuo renovet, sed etiam Rorem suum, abulis lympham appellatum, in Vasis Roriferis ex centro, h. e. Receptaculo, ad circumferentiam corporis quaquaversum moveri astringit, quod omnibus, qui Vascorum Lymphaticorum mentionem fecerunt, omnibus contrariatur: ipsos commemoratores pro materia Saliva, Urine, Synoviae, Lactis, pro nutrimento Fœtus, & aliis etiam pro nutrimento partium spermaticarum Rorem hunc assumunt, ut videri potest apud DEUSINGIUM *Epistol. ad Bartholinum de Hepatis Receptaculo*, item in *Appendix Excerpt. de Nutritione Corporis elaboratione*: CASSIUS item videtur, qui hæc BILSHII Afferit *Bartholinus Helmontii Disputatio* accommodat. Sed hæc BILSHII opinionem refutat videlicet præter omnes alios: Anatomicos apud JACOBUM HENRICUM PAULI in *Anatomia Anatomia Bilshii*, item à BUYSCH in *Traité de valvulis vasorum Lymphaticorum*.

Ex his quid verum sit? hærere potius, quam statuer concessum est: probabilis interim videtur, Chylum ex Inestibus, in Vasis capiemini, à hærere per Mesenteric Glandulas incedere ad Receptaculum commune (quod in Homine non constituit Glandulas lumbares Bartholinianæ).

Tom. II.

nam: hic enim saltem sunt vicarie Glandulæ magnæ Mesenterii Brutorum, sed in Homine itidem membranofum, sicut in Bruto, reperitur: vid. WARTHONUS in *Adnographia*, item RUDBECK in *Tabula Anatomicis*, quæ in *Bartholinii Mœse sursum Anatom.* reperitur: item DIEMERBROOK *anatom. pag. 87.* & ceteri: ibique cum lymphæ ex interioribus ramis ascendente permisceri, dilui, & sic ulterius constituto pulvisculo motu per Ductum Thoracicum in venam Asillarem finitram infundit, ibique cum lymphæ ex superioribus ramis descendente denuo permisceri, tandemque in cordis dextram Ventriculorum infundit.

Ceterum aquosiores Alimentorum partes in primis quoque visis Chyli fecerunt, & æqueam eam sanguine permiscuntur separari, citæ potestatem in hibernis, licet ut assumptæ sint, sub urine specie excreto persudet; Vili & Diabete, Acidularum potatio, Alimentorum cum urinis citæ excreto, odor urinae violaceus ex Terribilissima, odor etiam ex comelæ croco, color sanguineus ex succo opuntia, Vici Indies omnes: per per quæ vias citæ hæc derivatio ad vias urinarias pertingat obstruam est. Probabile videtur, Chylum copiosum per Vasa lactea in Mesenterio ad Glandulas delatum, & ibi partem quandam secreti nonnullis ab inestibus apocis materia, & quod hæc postea cum serum chyli, per vasa fusi generis ad partes urinarias amandetur. Hinc rectè clamare videtur HELMONTIUS: Dicitur urinam potus ab urina cruris fecerunt, quæ nempe illa in Mesenterio à Chylo, hæc lo remissus à sanguine fecerunt: & quæ urina potus vid. etiam DEUSINGIUS in *Differet. de Dispositione Alimentorum pag. 146*, & in *Appendix pag. 311.* & 124. item MESIERI A. N. C. ann. 3. obs. 3. p. 4. & anatomic. ad hæc obs. p. 192. obs. 7. in Schol. p. 134. obs. 157. pag. 248. de nova via Sieri ad Rines; & obs. 162. p. 266. item BARTHOLINUS *Cœst. 1. lib. anat. 62.*

Hæc non generaliter ex sanguine, sed ex Chylo, vel materia chylosa, probum vides in DEUSINGIO *Differ. de Lactis*, item in CHARLETONI in *Quæstion. Excerpt.* item in CORNELIO CONSENTINO *Program. 6.* item SCHNEIDERO *2. 3. de Canalic. 2. 3.* Fœtum quoque per os & per Placentam uterinam materii loco huiusmodi chylosi, quæ quæ primus similiter Ossum uterinum concrevit, vides in HARVEI *de Generatione Animalium*, item in DEUSINGIO *de Gressu mœteris*, item in CLAUDIO M. GOURVE *Tr. de Nutritione Fœtus in Utero*. Sed non hæc portiones Chyli per huiusmodi liquorem per vasa Lactea, vel etiam hinc finitima, apud tamen capitis, ad hæc partes deferuntur: an verò ex Chylo cum Sanguine permixta nondum subacta, sed adhuc cruda, & copiosa Sero delata, ad hæc partes delata, in Mesenterio ad singula magis dabantur. Posterius tamen verum videtur: id quod similiter de materia feminis proxima intelligendum venit. Quæ ratione laudatur hinc Chyli in Inestibus separari ulterius per vasa lactea in corpus distributione P. & qui inde sequuntur Affectus? vides in SYLVII *Præxi L. 1. cap. 16. pag. 192. & c. 17. pag. 200.* Cum autem Affectus hic vulgò veniant nomine obstruendum Abdominis viscum, & morborum chronicorum, hinc fit

CAPUT UNICUM.

D E

Obstructionibus Abdominis, & Morborum Chronicorum Ortu.

Impeditur Chyli distributio.

1. Quando nulla fit in intestinis Translocatio, idque duplici ex causa.

2. Quando obducta & oblitata sunt Intestina à copiosa Muro crasso & viscido, immoque obducta officia vasorum in eorum: quæ obstruendum inquit.

3. Fluxus Cæcici species: sic enim Excrementa chylosa excrementur: de quo superius, ubi de Cæcico affluente.

II. Fit ita ut omnibus obducta Translocatio, quando per Diarrheam aut Dysenteriam abacta Inestium interna tunica, sequuntur hinc inde Cicatriculæ, quibus simul obducitur pori seu officia vasorum Lacteorum in Inestibus.

Y

22

ut fuit Ani nimis diuturna refrigeratio, vel Mulciorum Levatorum paralytica confusio: quæ ipsa prius ante Repositionem removenda sunt, adeoque *Lar Dissolvens Meris Milioli*, vel *Florum Verbasci*, vel *Florum Sambuci*, in forma Clysmatis applicetur, & foveatur Anus, ut emolliant Stercora indurata, & removeantur, alias recidivat malum. Si vero causæ sint Sordes aut Mucus acrior intestinum stimulant, hoc prius abundum & eluendum est Fomento albigente & blandè adstringente: pro quo scopo conveniunt, quæ modò infusata fuerant; vel horum loco Decodum Foliorum Quercus, Florum Verbasci, Cicurum rubrocorum, Parietarum, &c. cum Aqua ferratorum paratum usurpetur, quo abstergant blandè Sordes adherentes. Si vero adit Inflammatio, vel etiam Tumor intestini prolapsi aut similium, quibus præsentibus impossibile est, isceitina debite reponere; Inflammatio prius arcenda, applicatione Focis emollientis & discutientis; ad quos Focis usurpantur imprimis Folia & Flores Verbasci, Melliloti, Chamomillæ, Sambuci, Malvæ, Violarum, &c. quæ coquantur nunc in Lacte, nunc in Aqua ferratorum, nunc in Vino rubro adstringente; v. g.

℞. Flor. Sambuci.

Chamomill.

Hyperic. an. M. ℞.

Refar. rob. p. ℞. vel liq.

Summ. Albiflor.

Mellilot. an. M. ℞.

Coquantur in Lacte vel Vino rubro;

In Lacte, ubi Dolor, in Vino ubi Tumor durus & renitens; ubi vero Tumor inflammaturus, in Sero Lactis: & hoc Decocto anus tumefactus & inflammatus subinde fomentetur ac foveatur, donec omnia ista pathemata cessaverint.

His omnibus remotis impedimentis, reponendus est anus allineatus prius cum Oleo Rosarum, vel Myrrillorum, superasperio Pulvere Gallatum confusum, C. C. ullo & Masticis Pulvere ana; sic coim adstringitur anus, meliusque firmatur, quò minus recedere & excidere possit. Præterea ad firmandum anum prolapsum in suo loco, convenit etiam remotis impedimentis Suffus ex Seminibus & Floribus Verbasci, Floribus Chamomillæ, & Resina Abietis: v. quod adhuc melius est, instituat Suffus HESLERI, quem describit in suis *Centuriis Proreum* G. 4. num. 15.

℞. Albaltri,

Succini

Mastic.

Thuris.

Myrrha an. ℞.

M. pro Suffu: S.

Pulvis singularis ad Suffitum.

Excipiantur Ano in sella perforata: Hoc factu foveatur aut illinatur, vel cum Pinguedine cervina liquefacta, vel cum Oleo Olorum, & ita intruso Ano arger probe extensis pedibus lateri incumbat.

Ut vero firmetur anus plius minus repositus, facilliquè etiam repositus, multum confert tale Emplastrum calidissimè regionis Olli Sacri superiori, aut etiam Lumbis applicatum. quod ita paratur:

℞. Gum. Opopæas.

Sagapæ. an. q. ℞.

Liquefacta calidè inducantur super alutem, f. Emplastrum, & applicetur, quantum heri potest, calidè.

Alias contra ani precipitentiam, & firmum intestinum Rectum HARTMANNI Experimentum in *Praxi Chymicæ* est. Affert quædam bene caletida & Masticæ illius; cui, quàm calidè ferre possit arger, per bove quadrantem inhæat; quæ etiam loco Masticæ, sola Medulla cervina aut hircina liquefacta, & ita intestino prolapsio, una hoc blandè reponendo, & hinc illita, simili ratione applicata confert: siquidem solum Serum cervinum, aut etiam hircinum, liquefactum & in intestino Recto prolapsio illitum, una hoc blandè reponendo, & hinc simili modo insidendo, precipitentiam ani recentem curare solet.

Loco pinguedinum harum etiam siccantur Flores Verbasci in Butyro non salito, friza bene transcoleantur, quo ipso simili modo Anus iungatur. Cui alius præterendum remedium habetur Cinis Scabæborum pilularum, qui intestino subinde prolapsi insperfus, & hinc illud intestinum denuo repositum murè firmare dicitur.

Quod si fiat, ut Hemorrhoidibus iuncta sit, vel etiam loquatur eas precipitentia ani, optimum est Oleum Masticæ, in quo bullierint Scabæbori: quod Oleum illud locessino prolapsio est convenientissimum & specificum: Sicuti, si in eodem Oleo Masticæ bulliant Flores Verbasci, egrum est specificum ad Precipitentiam Ani ex Tenismo. Irretitis aliis, iniquiter conveniunt Sacculi sequentes:

℞. Furf. M. ℞.

Fel. Mellis.

Flor. Verbasci. an. M. ℞.

Insuatur Sacculo interpassato, coqa. in an. Vini & Aceti, & applicentur tepidè Pudici, ut pericula Anus firmetur.

Conveniunt imprimis, si post Partum difficile malum natum fuerit: Vid. GARELCHOVERUS *Centur. 1. Obs. 71*. Loco Aceti, vel Vini, aut simili liquoris convenientis, etiam decoquantur in Aqua ferratorum, quæ potenter adstringit, & anum firmat.

Repositus ita Anus si non remaneat, ut firmetur loco suo retineatur, præter convenientem corporis situm, ad corrigendam Mulculi Levatoris resolutionem, simul appropriata nouacula Aromata conveniant: v. g.

℞. Flor. Chamom.

Balaustior.

Ambr.

Yel. Salvie.

Lauri an. p. ℞.

Nut. Cupress.

Galliar. confus. an. p. ℞. vel vj.

Cort. Granat. ℞.

Coquantur in Aqua vel Vini chalybeatè: applicentur & usurpentur pro Focis.

Quod si post Repositionem firmato etiam ano remaneat calor aut etiam rubedo in Ano, ne ulterius insuperent Inflammatio, aut etiam aliud gravius symptoma, recipiantur Aqua Plantaginis, in qua solum est Saccharum Saturni. & ita anus hoc ipso blandè foveendus est: aut loco huius supra dictis Frumentis adstringentibus utendum.

Hæc de Situ intestinorum mutato.

S E C T I O XIII. DE CHYLI AD RELIQUAS PARTES MOTU ET DISTRIBUTIONE LÆSA.

S'eparatur ita in duas partes Chylus beneficio Bili & Succu Pancreatici, eius subtilior & tenuior ac fluidior pars altera per crassam intestinum bombicam, & populum intestinum ita configurata, ut cremorem hunc laudem saltem admittant, crassiores vero partes bis poris non proportionatas, imò etiam status & ætem excludant (de quo videatur L. O W E R U S *Tracl. de Cord. pag. 212*). In Vasa Lactea insuit, & leuiter ab iisdem absorbetur, resstante eius parte viscida fusi specie Muci; pars vero crassa excrementitia sentiens sensimque ad Intestina crassa motu eorum peristaltico obligatur, ubi fusi horum Stercorum excluduntur, dum in Recto intestino confusa molesta & pondere idem ad sui excretionem stimulant; quæ tantè est ma-

jor, quò Feces sunt fluidiores, tantè minor, quò eadem crassiores.

Motus autem Chyli ex intestinis ad reliquas partes quomodo, & per quæ fiat Vasa, & semper admodum controversum fuit, unde etiam ex his dubis de Organo sanguificationis & Nutrimeto partium orta fuerit. Venere GALENI Scilatores ex intestinis attrahi à Venis Melares Chylum statuerunt, & ad Hepar transire, in Crurum & spiritum naturalem elaborandum; inde & Facilitatem naturalem in Hepate collocant; & simili contrarium chyli & sanguinis motum in Melares fecerunt. Lærenti vero postea anno 1650. d. 23. Julii à GASPARO ASERIO *Twinsii* Venis Lacteis, à colore & proprietate contenti liquoris

quorundam; per has ad Hepar motum Chyli promovendi crederent, de quo ASELIUS *Traité de Vrais Laësis*, item WALAEUS in *Tract. de Chyli & sanguinis Motu*.

Cum autem JOHANNES PLEQUELIUS *Disquis. Annot. 1694*, tritum antiquum observationem confirmatum suum noviter, licet calis, invenit. Receptaculum commune in Bruto, vas cum Ductu Thoracico per os utique ad Venas Axillares protensa, disjungitur, & BARTHOLINUS locum illius Receptaculi, Glandulas suas Lumbares in Homine demoustrasse, credendum omnino fuit, partem Chyli transire ad Hepar per Laësa circa venas Portae tursum tendens, partem vero tempore ad Chyli Receptaculum per reliqua Laësa deferri, ut quo per Ductum Thoracicum in sanguinem venosum Axillarem infundatur, ut cum sanguine redeant per venas ad cor mittatur, imò in mulieribus Laësa qualem meliorum ad Uterum deferre Chyli partem pro sustinendo Fetus, & semilibus quoddam, licet nondum visas, a Laësa Thoracico ad Mammas Laësa materiam chyloam deferre probabiliter fluxum fuit, ut servam materiam ad Rines deferri, ex his sub Urina forma post pulsum excreandum; videtur PECHLINUS *Traité de Receptac. Lumb.* item BARTHOLINUS *Traité de Laësis thoracica*.

Sedulas Anatomorum tandem usque eo processit, ut à BARTHOLOIN *Diss.* & RUDBECKIO *Obser.* & OLAVIO *Anglie* fere eodem tempore, licet diversis locis, circa annos 1694. & 1695. Vasa Lymphatica inventa fuerint, qua occasione simul observatum fuit, Vasa ex Mesenterio ad Hepar protensa non esse Laësa, sed esse lymphatica, servam materiam ex hepate educunt (si licet materiam reliqua lymphatica per viscera & arces dispergi, ex chylo immixta corpore ad uterum Thoracicum & tandem ad Cor, cum commune centrum, liquorem contentum revolvunt) & inde nihil Chyli ad hep. convehit, & omne Receptaculum commune, & tandem cor infundit, indeque Cor & Sanguificationis Organum unicum proclamatum fuit. Hepatis exequis in Sanguificationis negotio à BARTHOLOIN celebratis, quae exipio commentum Medicorum applausu, paciscenti, uno inter nullia, aperte reprobaturibus fuit per p. vii. BARTHOLINUS *de Vasis Glandul. hepatis*, item RUDBECKIUS *de Vasis Glandul. hepatis*.

Loquebat hepan suam claudere, dum navis ex imperato ipse invenit, LUDOVICO BILSIUS, *Tabell. Hepatis*, qui à tenebris adolescentia in anorum aetate usque ad seculum ingruentem Anatomiam optant dano, perit artificium Cava verum condidit, & sacrum etiam fecundum, anno 1666. in invenit divulga, Alimentum Chylum etiam materiam prae separationem inutilis ad utilit. in laetibus, ratione Vasaum Laësaum & Mesenteriorum divisi, ut in commune sit dicta Laësa per subhis tenoreque indit Roris per angulos meatus transduceret, & ad Receptaculum commune transferatur, unde per Vasa & communiter sit dicta Lymphatica, ab ipso vero, ob Rines contentum, Vasa Rostera appellantur) sursum partem in cox & reliqua partem, partem vero deorsum, uno verbo, in omnia membra, deferunt, transire vero eius fucci ex Intestinis pars propriè Chylas dicta, in Vasa Mesenterica sanguifera ingreditur, ad hep. amandant, pro suscipiendo ibidem sanguine rudocato, quod absolvere tandem in Corde; ita ex BILSIUS non tantummodo hep. antea sepultum de nova resuscitare, & Venarum Mesenteriarum munus devchendo Chylis dictum denud. renovet; sed etiam Rorem suum, alvas lympham appellatum, in Vasi Rostera ex centro, h. e. Receptaculo, ad circumferentiam corporis quaquaversa moveri alicet, quod omnibus, qui Vasaum Lymphaticorum mentioem fecerunt, omnino contrariatur. his commentatores pro materia Salivæ, Urinae, Synoviae, Laëis, pro nutrimento Fetus, & aliis etiam pro nutrimento partium spermaticarum Rorem hunc assumunt, ut videri poterit apud DEUSINGIUM *Explicat. ad Bartholinum de Hepatis Reformationem*, item in *Appendice Exercit. de Nutritione Corporis* elaboratione; CASSIUS item videtur, qui huc BILSIUS *Afferre* *Exemplum Helmontii Digressio* accommodat, sed hanc BILSIUS opinionem refutat videtur praevis dices alios Anatomicos apud JACOBUM HENRICUM PAULI in *Anatomia Anatomia Bilsiana*, item à BUCHS, in *Traité de valvulis vasorum Lymphaticorum*.

Ex his quid verum sit à biariolati potius, quàm fluxuere concessum esse, probabiliter incertum videtur, Chylum ex Intestinis, in vasa laësa expulsi, à laësis per Mesenterii Glandulas succedere ad Receptaculum commune (quod in Homine non continent Glandulas lumbares Bartholinia-

Tom. II.

ae: has enim saltem sunt viscere Glandulae mesenterii Brutorum, sed in Homine item membranosa, sicut in Bruto, reperitur: vid. WARITHONUS in *Adnographia*, item RUDBECK in *Tabulis Anatomicis*, quae in *Hemphostio Melle aurea Anatom.* reperitur: item DIEMERBROOK *anatom.* pag. 17. 3. de vasis, ubique cum lymphæ ex inferioribus ramis accedente permisceri, dilui, & sic ulterius continuato pulso notu per Ductum Thoracicum in venam Axillarem sinistram infundi, ubique cum lymphæ ex superioribus ramis decedente deinde permisceri, tandemque in cordis dextrum Ventriculum inflovere.

Ceterum aquosiores Assumtorum partes in primis quoque vias ex Chyli iterant; & antequam cum sanguine permiscantur seorsim, citata potulentiora in bibionibus, sed ut assumpta sint; sub urinae specie cæcra persuadet; Uri & Diabetes, Acidulorum potatis, Assumtorum cum urinis cita excreto, odor urinae violaceus ex Terribilissima, odor croceus ex comeli croco, calor sanguinis ex succo opuntii; Fici Indici omnes: fed per quæ vias cita hæc derivatio ad vias urinas pertingit obscurum est. Probabile videtur, Chylum copiosum per Vasa laësa in Mesenterio ad Glandulas delatum, ibi pari quadam secretionem nullis hæc nulli aposita materia, & quod hæc postea, cui serum chyli, per vasa sui generis ad partes urinaria amandatur. Hinc rectè clamare videtur HELMONTIUS 2. Dicitur urina potius ab urina crurios secrete; quæ nempe illa in Mesenterio à Chylo, hæc in renibus à sanguine secreteatur; de qua urina potius vid. etiam DEUSINGIUS in *Differet. de Depuratione Alimentorum* pag. 246. & in *Appendice* p. 331. & 334. Item Melliell. A. N. G. ann. 2. obs. 3. p. 2. & annotat. ad hanc obs. p. 392. obs. 24. in Schol. p. 329. obs. 57. pag. 247. de vasa vasa Seri ad Rines; & obs. 168. p. 248. item BARTHOLINUS *Cent. 1. Hist. anat.* 68.

Laësa non generatim sanguine, sed ex Chyli, vel materiæ chylois, probatum videtur in DEUSINGIO *Differ. de Laësa*, item in CHARLETONI in *Quoniam Exercit. 3.* item in CORNELIO CONSENTINO *Proleg. 6.* item SCHNEIDERO *2. p. de Cæcra*, & 3. Fetus quoque per os & per Placentam uterinam nutriti succo huiusmodi chylo, ut qui proutis similiter Ovi uterinum concrevit, videtur in *Exercit. HARVEI de generat. Animalium*, item in DEUSINGIO *de Crassi microscopi*, item in CLAUDIO M. la GOURVEE *Tr. de Nutritione Fetus in Utero*. Sed ut hæc perhas Chyli pro huiusmodi liquoribus per vasa Laësa, vel citia huiusmodi, apud tam exposita, ad hæc partes referantur, an vasa ex Chyli cum sanguine permiscere antequam secedat, sed aliis cruda; & capitis Sero dilata, ad hæc partes delata, in Chyli separata à reliqua massa, dubium est. Possibile tamen verum videtur, id quod similiter de materia feminis pro vasa intelligendum sciat. Quæ ratione laësa in Mesenterio in Intestinis separati superior per vasa laësa in corpus distributa & qui inde sequuntur Affe-ctus? videtur in SYLVII *Præf. L. 1. cap. 16. pag. 192.* & c. 17. pag. 200. Cum autem Affe-ctus hic vulgo veniant nomine obstructionum Abdominis vicerum, & morborum chronicorum, hæc sit

CAPUT UNICUM.

D'E

Obstructionibus Abdominis, & Morborum Chronicorum Ortus.

Impeditur Chyli distributio.
I. Quando nulla sit in Intestinis Transcolatio: idque duplici ex causa.

1. Quando obdola & oblitata sunt Intestina à copioso Muro crasso & viscido, simulque obdola officia vasorum Intestorum: quam obstructionem sequitur.
2. Fluxus Coelici species sic eorum Excrementa chylosa excreantur: de qua *superius*, ubi de *Calicia affe-ctio*.

II. Fit læsa aut omnino abolita Transcolatio, quando per Diarrheam aut Dyenteriam abas Intestinarum interna tunica, sequuntur hinc inde Cicatriculæ, quibus simul occluduntur pora seu officia vasorum Laësaum in Intesti-

Y

nahatias; idque fit imprimis, ut dixi, in Dysenteria, quæ tenuia affligit Intestina; tunc pariter Fluxus illius Cordici species est, quod à SYLVIO aliquoties in sectionibus Cadaverum fuit observatum.

Denegatam hanc Chyli Translocationem necessarium est ut sequatur corporis Atrophia ac Tabes; quæ tamen minoris est momenti, quando ex prima causa oritur, ut *infra parabolæ et Methodo Medendi*; sed posterior ex occultione pororum fuit orificiorum Vasorum Lacteorum, ac Cistricibus post Dysenteriam vel Diarrheam ex crassa tunica Intestinalium, imprimis tenuium, relictis, nullo modo est curabilis, sed tabidum ægrum interimit.

Quod si fiat, ut jam transeunt Chylus, & derivetur in Vasa Lactea, tamen si superius Vasa Lactea, circa Glandulas Mesenterii in specie, obijciatur impedimentum, ulteriorem Chyli progressum impediens, etiam laeditur & impeditur debita Distributio.

Hæc Obstructio fit imprimis à Chylo ipso nonnihil viscido, aut, quod frequentius est, à Pituita seu Mucos intestinali resoluto, in Vasa Lactea pulso, ac ibidem demum coagulato; id quod fit v. g. post Exercitium nimium, dum corpore bene calefacto subito ingurgitur Potus frigidus; à calore enim Exercitii & Motu prius liquefactus Mucus ac attenuatus, in Vasa Lactea propulsus, supervenit haustus frigidi demum congelat & spissificat, & ita Vasa Lactea, ac Glandulas Mesenterii infestat.

Quando ergo Chylus in Venis Lacteis late invenit Impedimentum, & nihilominus tamen novus continuus succedit, Vasa Lactea insigniter distenduntur, & cum inflata sunt suis Valvulis, fit, ut tunc in Mesenterio copiosius ubique appareant Vesciculæ; quæ exempla non parca observata sunt. Quod si vero Venæ Lactea ruptantur; quod facile fieri potest, tenuissimum enim est illarum tunica; tunc Chylus effunditur in cavum Abdominis, unde oritur certa quædam Ascitis particularis species. vid. SYLVIVS L. n. ubi notabilis imprimis sunt ea, quæ de Ascite ferunt; itaut Ascitis propriè dicti, seu particularis Abdominis Hydropsis, & in quo pedes non simul intumescent, adeoque confirmatæ universales Cachexiæ proles non est, speciatim quod subito interdum generatur ex Causis occasionalibus, iis præsertim, quæ à SYLVIO memorantur, frequentissimum occasionem existimam talem Chyli per Lactea effusū flagrantem; sicut non negarim, & aliis ex causis in aliis Abdominis Visceribus vel locis, Lymphaticis ruptis, & Lymphæ extravasatione; & hinc Asciticam intumescendum superne posse, simili ferè ratione curandam, atque de illa ex Chylo effuso differit SYLVIVS, de quo suo loco *Nota*, ubi de Lymphæ rupta impeditur.

III. Tandem, si nulum in ductu Thoracico, vel ab Obstructione, vel Laceratione, hæreat, fit cum morte Animalis, licet lenta, & est ferè mulum incurabile. Hoc item in loco occasione Obstructionis Vasorum Lacteorum consideranda sunt Obstructiones Viscerum Abdominis, & in specie Mesenterii, item Hepatis, Lienis, Pancreatis &c. nempe apud Veteres Prædicos duo ferè sunt *sanæ Morborum Chronicorum*, nempe *Antipræxia viscerum*, & eorundem *Obstructiones*.

Quod attinet *Antipræxiam viscerum*: de hac superius dixi sub Chylificatione lasa, etiamque rejeci in *Institutionibus* (7.). Dicunt: fontem Morborum Chronicorum esse inæqualem Imperium, stomachi nempe frigidum, & Hepatis calidum. Rationem fonnunt ex eo, quod observant in Praxi deficientem Chylid, unde argumentantur Imperium stomachi: item quod patientes conqueantur de Phlegmi five Robore faciei, etiam derivant, ex ætuatione Hepatis: hæc Antipræxia viscerum, stomachi & Hepatis, statuitur primarius fomes Morborum Chronicorum. Porò dicunt, patere, quod ex his sint difficilis curatio, si scilicet valium proficere stomacho calidis, nocens Hepati, et si volumus Hepati proficere frigidis, nocemus stomacho: idco in specie eos ad incurabilem catalogum referunt. Sed hoc estatum aperte falsum est, si stante enim sanguinis circulo, impossibilis est talis viscerum Contrarietas; nempe omnis Intolerantia Partium dependet à sanguinis & spirituum calore, ita ut etiam cor ipsum per se frigeat, nisi à spiritibus, & sanguine calido cito calefaciat. Si ergo spiritus, & sanguis proportionaliter distribuuntur ad Viscera, proportionali Calore etiam Viscera fomentantur. Interim hæc Antipræxia non confundenda cum Robore inæquali partium, & deinde cum accidentario quodam visceris culesum Fervore. Scilicet debilius subinde

ratione Balsami sui seu spiritus infest observatur Viscus præ altero; id quod & in Partibus externis non rarum est, à quacunque occasione lasum, & hinc debilitatum fuerit viscus aut Pars: v. g. Brachium, in quo duo gestantur Funiculus, aut quod aliquando gravius incantum fuit, restitutum denso, debilius ac minus robustum, flaccidius, frigidius, sub tempestatibus mutationibus irritabilius, præ altero observatur; hoc vero Robur inæquale nulla Partis Antipræxia est: Sic ubi adfuit Rola, in Parte affecta Robur partis ita debilitatur, ut facile ob debilitatem Partis Rola recurrat in eodem loco. Robor hoc Partis lætæ inæquale oritur ex vido Fibrarum, quæ totum Partis naturalem cuique Robur constituunt: His enim labefactis, Pars ob earum laxitatem & toni resolutionem, flaccida, mollior & debilior fit. Quod accidentariam visceris Intolerantiam: accidit interdum, ut Viscus quoddam fervidus reddatur, quam naturaliter esse debet: sic v. g. Renes interdum æstuare, aut Hepar intensius fervere observatur: id quod fit propter præternaturalem quasi spiritum acidum infusum, cujus hostili præsentia visceris Intolerantia supervenit: hinc impedimentum actionis propriæ, non autem eam aliis visceris Antipræxia aut Contrarietate; unde & non Refrigerantibus, sed spiritum infusum evellentibus, hoc est, Acium corrigentibus, curandum: de quo vid. HELMONTIVS *Traff. Retenem*.

Quod alteram originem Morborum Chronicorum, Obstructiones nempe vasorum malaricarum, quæ viscerum in hypochondriis: sanè nihil otusum in Morbis Chronicis quibusvisque, quam Antipræxia viscerum, & dein Obstructiones, & Influxus Vasorum Malaricarum, Hepatis, & Lienis &c. Hinc nullas est Rulicis, nec Vetus, qui non sine huius de Oppilatione Ventrum Malaricarum. Unde ordinariò origo Febrium Intermittentium, Continuarum, & Cachexiæ, Mali Hypochondriaci, Scorbuti, Icteri, Pothematum Abdominis, & similium Affectuum Chronicorum, qui sunt, & eorum portus & Medicorum scandala, aut à Pituita viscida, aut à succo terrestri Melancholico, derivatur: idque tam in Schola Galenicorum, quam Paracelsitarum, & aliquorum modernorum, in specie eorum Consultationibus, à quibus passim etiam Oppilationes, & Influxus, à Tartaro hinc inde coagulato fidei, insculcatur.

Cæterum heu Qualitates Occulte Physicorum sunt asyla ignorantie torum: ita simili ratione dicere audeo, quid etiam tales in Abdomine viscerum Obstructiones, & Antipræxia viscerum spiritus sunt velamen, quo ignorantiam suam palliant Medici. Ob id nonnulli Prædici, adhuc insistentes veterum vestigiis, dubitare incipiunt, an demum revera tales viscerum Obstructiones, quales ascensum: vid. HOFFERUS in *Notæ Medicæ*, pag. 130. item HORSTIVS L. 4. *Obferv.* 44. p. 239. & *Notæ*, non rectè docet HORSTIVS, postquam dubitasset de Obstructionibus, quod plurima Symptomata vulgariter adscribantur Mesenterii Obstructionibus, quæ tamen spiritus habent aliam originem. Equidem duo imprimis sunt, quæ saltem videntur hanc Hypothesin: quorum alterum hanc Opinorem reddit probabilem, alterum eandem reddit inculpabilem. Probabilem hanc de Obstructionibus Vasorum Malaricarum Hypothesin reddit, quod in diſſis Morbis Chronicis quamprimum Abdominis Symptomata, Tormenta ventris, Phlogos, Alvi Durus, &c. in quibus videtur esse impeditus Hemorum motus, ætiam mælia sint, præsertim cum circa Hypochondria affligant: et si alia quædam pars sit affecta, semper tamen præcedant, conjungantur, aut subsequantur Abdominis passionibus. Quin etiam, quod subinde in Morbis chronicis confirmatis Scirbi & Scratomata in Mesenterii Glandulis, item in aliis Abdominis Visceribus sine inventa: Unde facile possunt persuaderi, impliciter esse in Mesenterio talem Obstructionem & Influxum. Alterum, quod inculpabilem reddit hanc Hypothesin, est, quod fons per Antipræxiam non adeo potius deregat: Cùm enim præsupponat Influxum Vasorum capillarum, quæ ordinariò post mortem colabuntur & reperiuntur clausi; hinc post mortem nulla sitis accuratior inquisitio institui potest: sed potius hoc, aut à aliis Medientium errores, regit terra. Sed in istis Vasis aut Visceribus, quæ continuis liquorum transitibus abluunt, v. g. in Venis aut Arteriis, Vasis item Lymphaticis & Lacteis, Hepate & Liene, &c. Obstructio talis fieri nequit sine liquoris transcurantis reſſignatione & collectione, & hinc partis tumore, aut ruptis Vasis, liquoris contenti extravasatione; quæ mala, tumor aut extravasatio, necessariò & semper comitari debent quavis Obstructiones. Et revera, si occur-

perpendimus negotium, impossibiles sunt tales Obstructiones in Corpore humano; si autem quidam temerarij, aliter explicentur ocellum est (A). Res ut patet accuratius, tres imprimis consideremus Canales & Meatus, in quibus Obstructio fieri possunt.

I. Sunt Vasa sanguifera, Arteriae & Venae, quae invehant, & revehant.

II. Vasa Lymphatica & Lactea, quae ex uno loco invehunt in alterum.

III. Sunt Pori & Meatus Partium Continentium, eorumque particulares Ductus, per quos nunc continui, nunc interrupti est liquorum transitio; primarij quidem Viferum, Hepatis, Lienis, Pancreatis, Pulmonum, Renum &c. secundarij Glandularum, ac tertij Partium Carnosarum.

Quod si in his locis debeat fieri Obstructio, tunc sane necesse est, ut Homines in motu impediti flaguet, hinc pars laesumelatur, & oriatur vel Liquoris stagnans conservatio, aut rupta Vasis, Liquoris in motu impediti in vicina loca extrusio. Et

I. Quidem in Vase sanguifero, ubi est in aliquo Vasculo obstructio, necessarij impeditur Sanguinis motus. Unde Sanguine hoc in illa parte impedito, primò fit eius stagnatio, ex stagnatione tumor parvis, hinc capillarum Vasorum ruptio: his ruptis, Sanguis vel extra Corpus, vel in quodam Corporis cavitate, extravasatur, & hinc necesse est inflammatio, flante contravaso Sanguinis circuitu; si vero sit impeditus motus in Arteriis, & tunc adeo continui pulsatio; si vero in Venis, & tunc est remittentia & distensio.

II. Ubi in Vase Lacteo aut Lymphatico fit Obstructio, similiter fit Lymphae transitus in motu impedito, ita ut per Vasa Lymphatica non aliorum commoveatur, nec ab his reseretur Lymphae ex Parte; unde hinc in Parte conservata debet tumor serosus: si vero jam absorpta sit, adeo ut in motu per Vasa ex horum Obstructione impeditur, crescere solet Lymphae in his Venis, à qua Tumor vel Obstructio, unde à Lymphae stagnante fit Vasorum distensio, tandem ruptio, & ita Lymphae necessaria effusio. Lymphae illa effusa in peculiari cavitate dat Hydropem particularem, v. g. Hydrocephalum, Hydropem Pectoris, Palpitationem Cordis ac aquae Pericardii abscissio, Ascitem partium Abdominis, & similes alios Hydropes particulares; effusa vero Lymphae in poros Partium solidae, quo tantum Partem illam infar spongiam tumefacit, adeoque Tumores oedematosi & serosi exiunt pro varietate Lymphae variam originem ducunt.

III. Obstructiones, quae dicuntur fieri in ipsis Visceribus, aut Partibus Continentibus, etiam suos dant Tumores, indeque vel Inflammationes, vel Abscessus, vel Scirrhus, nec sine his contingere possunt. Cum enim Meatus & Pori earum in hanc finem sint contructi, ut aliquid transeat, necessaria ex illis obstructio non potest non fieri interdum Liquoriatransientis stagnatio: unde Pars necessaria intumescit, & tumefacta per suppuracionem degenerat in Abscessum; aut ubi materia stagnans inspissatur aut indurascit, sunt Tumores duri, plus minus indolentes, & ad tactum remittentes; qui ex sanguine in partibus sanguineis dicuntur Scirrhi; ex Lymphae vero in partibus glandulosis dicuntur Scirrui vel Scrophulae. Talia coagulo & induratio materiae obstruentis ordinatio fieri solet ab Acido, tubificente, aut in sanguine plus minus vitioso, in specie

Tom. II.

crudiore, atque crassiore, aut in Lymphae viscidiores in quocunque loco obstructio: hinc sensim lesionesque partes subleves volant & evanescentes, quae ipsae alias temperatae aut Acidum: his difficilis materia sive languis sive Lymphae, sensim inspissatur, & à resistentia Acido ita firmius coagulari & induratur. Quod autem addit tale acidum in abscessibus, per se patet ex supputatione: quod infert tale acidum in Scirrhis & Scrophulis, ea eo est manifestum, quod hi Tumores, si convenienter tractentur, ita, ut acidum eorum vitiosum contrahat effervescenciam, facillime in Cancro calcaverit & depalescent tam Scirrhi quam Scrophulae degenerent: hinc eorum adeo est necessarium, ut sumis accurati v. g. in Cura Tumoris Mammarii, quarum Glandulae scrophulosa, ut ita dicam, faciliè dant Cancrum.

Patet ex dictis, quid habendum sit de Obstructionibus; nempe nullo modo universaliter esse negandas Obstructiones; hoc enim absurdum esset: absurdum tantum tollendum, & imaginariis illis Obstructionibus superstructis Morbis aliud fundamentum quereendum. Nam & doctus Cholestochus, non minus quam ipse ductus Pancreaticus, in Coelica passioe occlusa Valorum Laetorum, ubi hanc in Iustellia, tubuli Renum, Uterus in Nephridio, &c. solvendi reperitur obstructio, subiequentibus exinde variis symptomatibus. Melesenterij item Obstructiones esse reperiuntur, una cum Glandulis eius induratis, cum subiequentes Corporis Miacae, similiter hinc inde prolant exempla, & plurima Praedictorum experimenta loquuntur: Abscessus quoque omnes & Scirrhi necessarij Obstructiones praesupponunt. Verum in Febribus Intermentibus, etiam Cachexiis, Hypochondriacis, & similibus Morbis Chronicis, saepe omnino omissi adeo, quod Obstructiones arguit; maximus enim est error in Praxi, ut illud, quod est Produendum morbosum, habeatur pro Causa Morbi. Quod si verò in his Morbis Chronicis jam inveteratis tandem superveniant Tumores Viferorum scirrhi, aut Inflammationes, v. g. quando Quartanae inveterat, malo Hypochondriaco confirmato, &c. comitem se sinit Scirrbus Lienis, aut Idem Scirrbus Hepatis, Hydrops proderunt, aut in Cachexia confirmata deprehenduntur Glandulae tumentes & Scirrhi Melesenterij; quæstio adhuc est de tali Tumore & praesupposita vera Obstructione, an sit Causa & radice talis Morbi? an veri potius sit Produendum morbosum? Vulgo quidem putatur, ex Tumorebus illis Morbos oriri: falsum est: tales enim Obstructiones, & inde nati Tumores non sunt Causae radicales talium Morborum Chronicorum, sed solum Produca morborum, sive talia, quae Morbo jam facto tandem superveniunt. Hinc enim in talibus Morbis Chronicis, eorumque principio, aut nunquam, aut rarissime Obstructiones & Tumores tales adeo esse solet; sed hi ipsi Affectus Morbis illis confirmatis superveniunt, adeoque cum Effectus tales Morbos inveteratos sequuntur; adeoque ex Morbo sunt, non verò ex his Morbi. Et quidem Scirrhus, aut similes Tumores quod attinet; in his integro quidam ramus, aut huic annexae Visceris partes, omnino oppellatur, & in talem topum coguntur; unde per eam cellas penitus contentorum tractio, adeoque successu vicini rami pedetentim dilatati evadunt muncere fungi videntur: sic si totus quidam ramus ex Vena Portae in Hepate, aut si quidam ramus ex Splene, aut si Glandulae Melesenterij & Colli scirrhefiscunt, tunc totus ille ramus aut Glandula inepa fit suo usui; inde dum nulla amplius fit tractio, Scirrhus generatur, quem nullus Tumor, nulla Inflammatio sublequitur. Sed quid de talibus Obstructionibus Partium Abdomi-

Y 2 ois

(A) Tamen si ejus jam sententia, ut quamparum Morbi, praeteritur Chemicis, salis Obstructionibus saepenumero tribuatur, quoniam à lapsu Pericardii & reliquorum Viferorum similibus reverà dependant; nihilominus laudè impossibile esse in Corpore humano Obstructionem credituram. Brevis haec impossibilis esse existimo, ut si vasorum praeteritur angustiorum & variè contentorum cavitate, vel à causa externae comprimeretur, vel interna contraheretur, adhuc angustior reddatur, aut si liquore praeterfluente crassiores & viscidiores evadant; hinc fieri possit infarctus, adeoque Obstructio. Quod autem, ut omnino Obstructiones praescribat, docet hic Auctor, Obstructiones fieri non posse sine liquoris transiensis stagnatione, & coactione, atque adeo sine partibus tumore, per ruptis hinc vasis, fieri debet liquoris effusio & extravasatio. haec ratiom intelligendum esse existimo. Ex Obstructionibus quidem sunt fieri stagnationes & tumores; imò ex stagnatione Obstructio & tumor: Verum si Obstructio ex ratione valde & firma sit, non superari à liquoris praeterfluente impetu nequeat, vel si liquore, qui obstructum sensim superare nequeat, aliorum transiens non possit; tunc quidem vasa rampa poterunt, ac liquoris fieri effusio & extravasatio: hinc ex effuso & extravasato Sanguine, Phlegma, ex effusa Lymphae, Hydrops & Tumores oedematosi; atque in Visceribus ipsis si jam stagnationes, prius Abscessus, Inflammationes, Scirrhi, aut animalia alii Tumores. At si Obstructio levis sit, ut liquoris transiens non omnino impediatur, vel possit bi per conjuncturas aliter, & omnino pervias canales uterius trajici, ut illorum circuitus impedimentum minimè nanciscatur, tunc Symptomata, quae times Auctor, nequaquam supervenire debent, ut patet. Poterunt tamen liquores ex lente motu majorem crassitiam & visciditatem adipisci, ut late universo Corpori communicata, Chronicorum Morborum causam evadant. Quod quidem nec Auctor ipse noster in sequentibus negare audeat. Quod autem sentiamus si de illis, qui negant Venarum praecipue Obstructiones, ex eo, quod fluitare Sanguine ex Venis angustioribus in ampliores, impossibile sit illis, remanere aliquid potest posse, diximus tom. 1. col. 183. lit. K.

his pro fundamento Morborum Chronicorum habendum sit et eruditè explicat LINDANUS in Colleg. manuscriptorum super Praxis Hartmanni cap. 266. de Morborum Inflammatione §. 243. ubi de hoc affectu ita inquit: *Credite hoc mihi, nam faciet hoc Praxis videre: illi Morbi & vitia, quæ passim attribuantur Obstructionibus Mesenterii atque hepatis. Viderunt, sunt reuera affectus Ventrículo intestinis & non hinc habentis, laborantibus filiatæ cruditate vel corruptione, imprimis Sapis in hoc casu acida. Revocate hoc ad animum, qui Praxis aggredimini, Vtrumque hoc Medici differant, ut possint in Purgationibus nihil præferant, agitent non esse Obstructiones Mesenterii. Deinde postea aliquis magis infamasse, quam velle tollere Obstructiones Purgantibus? Præterea in Cadaveribus non quando reperitur Mesenterii Obstructionis, nisi simul Scirrhum & Corpora morbi longius dista emaginatam, ubi totus Sanguis miri coarctus Scirrhum Mesenterii & Obstructionem generat. Quid in Purgantia præderunt? corrigite igitur ut corroboret Ventrículo, corrigite se emaginat Obstructionem, & tollite omne malum. Natura satis satis providet, ut talia Mesenteria possint obstrui, scilicet accuratissime præstat Chylum per filamenta bombicina: unde videmus Chylum per Venas Laticas simplicissima infusa aqua transire, adeo ut Sapis spiritus laticas, si non loqui liceat, transeat, quam aliquis corpore: at vero quomodo ibi fieri poterit Obstructio, præsertim in hepate, minor ramus deferre in amplius? argui Obstructionis ob materiam, ubi ex magis in primis non deservit. Ego, inquit, talia Obstructiones, Affectiones Melancholicas, Hypochondriacas, &c. cura, curas Ventrículo. Hæc LINDANUS. Et sane rem ita habere, confirmat quotidiana experientia: ergo hujusmodi Obstructiones & Antipræxia Viscerum sunt a se invicem ignoratæ. Certi sunt, quod nullum reperietis Morbum Chronicum esse Viscerum Insistit derivatum, in quo non primaria Morbi radix & origo semper hæreat in Stomacho & primis viis, atque vitiata Digestione. Nempe Digestio prima in Ventrículo, & post per se in Intestinis plus minus Iafa, sunt fusi animum Absterger Chronicorum, tam ex Antipræxia, quam Obstructionibus Viscerum vulgo derivatorum; nam id dicunt adesse Antipræxiæ Viscerum, tota causa est in Stomacho & Cruditate acida: item quod supponit adesse Obstructiones, vitium est post Cruditatem Stomachi acidum in vitiata Digestione secudæ. Nam si committitur error in Digestione prima, non corrigitur in secunda; si committitur in secunda, vitatur tertia, scilicet Hæmatodes, & sic fit Sanguis cacochymicus. Læsiões hæc sunt vel vitio Obstru, seu Externæ externæ, vel vitio Fermenti digesti in Stomacho, aut vitio Succorum, Biliis aut Pancreatice, vitiorum, quorum multiplex alteratio secunda mater Morborum talium esse solet. Speciatim Biliis vel parvis vel interitis fovere, & contumaces quæ reddere solet hos ipsos Affectus; unde ametria Chyli, dystraxis sanguinis, Partium nervosarum multiplices dolorosi affectus, arguuntur ex vitio Acido primarium vitium propullulare solet, demones semper Acido, seu vehiculo plus minus Stomacho aut vitio, eoque semper vario, ipso etiam magis vel minus volatili aut fixo; unde vitiorum imprimis Acidum tantum in omnibus Chronicis reperietis Morbis. Unde etiam Biliis exandorum talium Morborum consistit in Vomitorio, quibus & Febres Intermitteutes, & Malum Hypochondriacum, & omnes Affectus Melancholici, Cachexiæ item, necessarii sunt primitus aggrediendo. Conveniunt ergo Remedia tam generalia Alterantia, nempe Acidum Corrigentia & Absorbentia, vitiosum Alterantia, etque Evacuantia, & hinc Stomachum & Bilem balsamicam aromaticam vi restorantia, quam specificæ, speciales fapores acidos enervantia, & specialia vitia Humorum emendantia, quæ imprægnata sunt Sale alcali, aut fixo, aut volatili acri, aut volatili oleoso: qualia sunt v.g. Aromata, Antiferbentia, Apertoria dicta: hinc etiam est, quod v.g. Martialis & Saturnina in dictis Morbis sit adeo usitata ut tales ægros ad Acidulas, seu sacra anchoras, solemus ablegare, quæ turgida sunt Primo Ente Martis. Jam vero Martis concretum terream, habens pro subiecto Terram quandam bolarem, quæ beneficio Sulphuris acidi coagulat in corpus Martiale, per se simpliciter adstringit, & omnia ex co parata faporem habent adstringentem. Gulae omnia ex Marte parata, si sint sicca five liquida, semper reperietis, quod aptum habent adstringentem in lingua; unde Mars, Lacchalybeum, Potus chalybeatus, & omnia Martialis, in Diarrhoea, Dyscoecia, & in Alii quibusvisque Fluxibus, Hemorrhagiis, Viscerum atoniis, &c. conveniunt, quæ ipsa tamen etiam in Malo Hypochondriaco propinantur. Dum ergo per se semper Mars adstringit, quomodo in talibus malis ex Obstructionibus suppositis*

conversant, & quomodo aperire queant? dubium remanet. Petimus nobis aperire oculos HELMONTIUS in Parad. de Facultatibus Spontanis, cujus vestigia laudabiliter imitatur TACHENIUS in Hipp. Chym. rep. 26. ubi agunt de Marte, qui duo totum sunt in eo, ut offendat Martem per se semper adstringere, per accidens, vero in dictis Morbis Chronicis aperire; (vid. LUDOVICI in Phleg.) quatenus ratione loci texture terrestris propullant abhorret in se fapores vitiosos aridos, austeros, ponticos, aluminosos, alioque similes salis corrosiva, five, ut vocat HELMONTIUS, sylvestria, in Stomacho & Intestinis obstruunt; quibus abhorret, dum agunt in Martis corpus suum terrestris, omne suum vitiosum faporem & omnem excessivam qualitatem omnino emunt & deponunt, & vitrosicam & absterivam acquirit naturam: id quod fit propter mætionem ex corpore evacuat, & morbum tollit, & sic convertit in omnibus Morbis Chronicis.

Patet ratio est cum Saturno, cuius Saccharum, & ex eo parata cum Vini spiritus Tindura, revera sunt egeria, in Melancholici Hypochondriaci, Affectibus Scorbuticis, aut similibus: quibusdam Crystalli ex minera cum spiritu Nitri parati, loco Sacchari in usu esse solet.

Dum autem ab his Martialibus, ut & Saturninis, Remediis abstrahit sunt Salia vitiosa in his Morbis, conveniunt salia tam Animalium quam Vegetabilium volatilia, quæ hæc Salia alterant, & simul vitiosum Mucaginem vitio Stomachi enatam attenuant, deinde resolvunt, ac fluxilem faciunt, ut facilius corrigi, aut evacuari, antequam sanguis assimilari possit: unde etiam Purgantia præter hæc allianta conveniunt, imprimis ad detergendum, ut, quantum fieri potest, crassos ac picuosos succos evacuent, in quibus inspurpat talia, quæ colorem insidunt, ac vitiositatem coarctant.

Præter vitia ista, & præternaturalia acido-acres fapores, in istis Morbis Chronicis vitio Stomachi pronata, simul videre est, quod non raro est dicta vitiosa Stomachi Digestione ipsa quoque Massa Sanguinea cruda coadurata, & Mucosa acido crasso ac vitio im prægnata, unde ex tali Cacochylia necessarii superveniat Cacochymia. Hinc in talibus subiectis, ubi gravis fuerit Ventrículo vis Digestionis erratum, aut nonnullis Cruditas acida, si Venam secundo mittatur sanguis, (quod an rectum sit, non dicam, præsuppono saltem) observatur ut plurimum eadem extravasata & jam coagulata superariare Mucum quandam album, plus minus sublidum, spissum, & multis modis variegatum, quod in Sero natum revera nihil aliud est, quam Chylus crudus vitiose digestus, qui cum non possit debet fermentando assimilari sanguini, & spiritus acris, sub forma talis succi ac Muci vitiosi ipsi confusus inest, Fermentationis ægotium impedit, hincque Cachexias, talesque Morbos Chronicos, aut ac corrigitur ac evacuetur, adeo contumaces reddit, speciatim Mulieres ad Chlorosis disponit: hinc etiam tales vel fusi motu de difficillima Respiratione conseruatur: scuti Mulieribus, talibus Morbis correptis, ordinario Mensium fermentativa turgescentia & effusus supprimunt.

Revera ergo prima radix seu origo plurium Morborum Chronicorum, qui derivantur ex Antipræxia Viscerum & Obstructionibus, est ex Digestione prima in Stomacho vitiata (ubi assumpta loco Chyli laudabilis salis volatilis, degenerant & transmutantur in liquorem vitiosum, aut siam aut alia fapores vitiosos inquinant), & Itæa perfectio in Chyli in Intestinis, & separatione Fæcum; quæ omnia prius ex Stomachi Cruditate acida ac corrupta, & succo Pancreatice vitio, unde ad fapores, & Salis respiciendum est.

Quæ jam dixi, hæc omnia confirmant Symptomata, & Remedia juvenat & nocentia. Symptomata si probe examinentur, omnia possunt deduci ex Cruditate acida; hinc enim Rudus acidi, Flatum ortus, & deficientis Appetitus; hinc Effervescencia & Phlogosis ex vitio Succorum, in Intestinis marmura, Alvi Status, Tormina, & ex Biliis vitio Effluviis oriuntur. In specie hæc confirmantur paucis & Necrosis: Remedia enim in genere quæ conveniunt in hujusmodi Morbis Chronicis, aut, ut tantum communi sensu loquar, quæ conveniunt in Obstructionibus ab Acidis natæ, sunt vulgo, sed male, sic dicta Apertiva, proprie vero Acidum, alioque vitiosos & præternaturali in corpore succos acres, & inde vitiata sanguinis Crassum, indeque derivata præternaturalia vitia Biliis, Lymphæ, Succu Pancreatice, Digestionum errore fuma-

ta, corrigentia, emollientia, & in flatum naturalem reducenda, viscidum attenuantia, flatumque resistentia, &c.

I. Quæ ex Regno Vegetabili hæc usurpantur, sunt triplici in ordine: vel Acris volatilis, Antiforbica dicta, vel Aromaticæ oleosa, vel Amarantha, Hepatica dicta, Vulneraria solum diuretica, & similia, conveniunt. Conducunt autem talia in talibus Morbis Chronicis, non quatenus penetrant dictas Obstructiones, sed quatenus partim amaritue sue, acrimonia volatili &c. quæ in recessu habent Sal volatile plus impuante vel oleosum, contraria sunt viscosi Salibus, aut lipotibus acidis in stomacho, & primis viis, & ipsi Mafsa Sanguinea hinc inde obstruuntur, quoti d'la Alimenta precipitant, nam Alcalia omnia precipitant Acida in geocere, aut eadem alterant, aut in salum transformant, & ut plurimum per Urinam evacuant; partim Bilem intertemperant, & acriter oleo Sal volatile temperant, Talia Vegetabilia, quæ Obstructionem resipiunt, & stomachum resistent, vel verbi gratia Radices quinquæ Pericetes: non sunt Radix Apii, Foeniculi, Altrapagi, Petrofelinii, Rulci, item Radix Rubra tinctorum, quæ est egregia diuretica, Eryngii, Enulæ, Cichorii, Taraxaci, Sale volatili egregie coadunata; Arum Chelidonium majus, Levisticum, Radix, Fumaria, Radix Graminis, Filix, Polyopodi, Fragaria, Curcumæ, Alari, Pimpinellæ: Alari Radix in substantia assumta, aut in Vino decocta, est egregium Vomitorium; in Aqua verò bullita d'g Potum Diureticum, & carativum Febrium, & Morborum Chronicorum, teste HELMONTIO & ZWELFFERO. Præterea conveniunt MARMABUM, quod in Scirrhus Hepatis & Lienis commendatur, Hyssopus, Artemisia, Abinthium, Centaurium minus, Cardus benedictus, Agrimonia, Chamædrys, Scolopendria &c. His jungitur etiam, quam vocant Itali *Achilleam*, quæ est nihil aliud, quam species Galioptidis minoris (B). Coadunata hæc Sale temperato mixta, quod temperat blandi Acidum & istud ad vias urinarias deferret. De Floribus Geniſiæ res est nota. Corticem Fraxini, Tamarici, Radicum Capparis & similes: Semina Calidæ minoræ, uti vocant, Nigellæ, Dauci, & similia; item Cicuta. Nam Radix Cicutæ quidam curavit Obstructionem Hepatis, pulverem epus à Zp. ad Oij. propinato: decoquitur etiam, & decoctum adhibetur. Sabina non Mulieribus solum esse dicata, sed etiam Infantibus, quos vocant, Viscerum. Inter Aromaticæ oleosa, Acidum temperantia, in usu sunt Galanga, Rosmarina, Salvia, Fœniculum, Mencha, Semina Calidæ majora, Levisticum, Abthium, & similia amara, plus minus obfocata.

Omnia hæc revera operantur virtute salina volatili oleo-urina, quatenus Acidum destruant, & Bilem intertemperant. Item tollitur tales Affectus per Temperata, v. g. per usum Lactis, per Passulas, & similia, quæ vitiosos sapores obstruunt, & ita Morbos corrigunt.

Quoad Acris, attenuantia viscidum, conveniunt hæc omnia Antiforbica, & Antihypochondriaca, qualia sunt imprimis Nalturium, & amos Nalturium species, Cochlearia, Pericaria, quæ apud Modernos maxime est antimariatica, Piperitis &c. Operantur ratione Salis volatilis oleosi, quod destruit Acidum, eliminat fordes primarum viarum, & Sal scorbuticum temperat & corrigit: Item semina Sinapi egregium est in Scirrhis, uti & Erucæ.

Jam hæc Simplicia Vegetabilia duplici modo usurpantur; vel Cruda, vel Præparata: Cruda fumantur, nunc Recensita, quorum vis consistit in Sale volatili, sed facile dissolubili ad imitationem HORSTII cum feto Lactis probe depurato; nunc fices, quæ sunt quasi oleosa, & quorum vis medicamentosa in concreto quasi concentrata est.

Quoad Præparata: autem fucci, Decocta, Spiritus per fermentationem, Essentie, & Extracta, parari solent; v. g. Essentia Fumarie composita, Essentia Abinthii, *Essentia Myrrhæ* cum Spiritu Vini tartaroso, seu cum Tinctura Tartari, *Essentia Albarbi storacica*, cum Spiritu Cochlearie parata: item Noduli ex diâs simplicibus Vinoinfusi.

Adduntur his Gummatæ quæcunque, præsertim Ammoniacum, Sagapenum, Mastiche, & hinc Galbanum & Myrrha, quatenus hæc Pituitam viscidam aut vitream, seu Mucaginem acidam, hinc inde Insistentia & stomacho penitram, resolvunt & obhergunt: & certum est, quod Gummi Ammoniacum in Scirrhis Viscerum, & similibus, ab Insarctu verò utris Affectibus nullis aliis cedat Remediis: potest summi in formâ Pilularum, vel saltem potest Purgan-

tibus addi: vel ex Viridi *Aria* & Gummi Ammoniacum dissilicetur. Specitus acidus volatilis & penetrantissimus; vel quidam recipiunt Spiritum Viridi *Aria*, & in eodem dissolunt vel extrahunt Gummi Ammoniacum, quæ est *Essentia Agria*.

Ex diâs in specie in usu esse solent *Essentia* & *Extracta*, si nempe Spiritus per fermentationem propriis assiduitur ipsi Vegetabili, aut ad imitationem ANGELISALÆ eius succo impillatur, ut enim fit v. g. *Essentia Abinthii*, & Succo Menchæ impillatur tum Spiritu Menchæ per fermentationem factum; ex succo Baccarum Sambuci impillatur, affuso Spiritu Florum Sambuci vel Baccarum Sambuci, fit egregia *Essentia contra Erysipela*; ex succo Fumarie impillatur cum Spiritu Fumarie paratur *Essentia Antidysenterica*. Idem potest fieri ex Antiforbicis, Nigellæ, & Cochlearia.

Hæc ipsæ tamen Essentie quæcunque ratione parentur, non exhaustiunt totam crasim medicamentosam Simplicium; post extractionem enim talis modis Effluvia, multum virescentis in eis adhuc reident. Nam utut videatur, Cochlearia vim consistere in Sale volatili, quod in superficie hæret; notum tamen est, quod multum intus Salis ficiat, ut ita dicam, quod affusus Spiritus Cochlearie per Succo impillatur non elicit. Præferuntur ergo his *Essentia Geniſiæ* dictæ, paratæ ex eorum Spiritu inflammabili, per fermentationem paratæ, & spiritus eorum triolo volatili per purtillationem passus; qui duo junguntur in debita proportione cum Oleo simpliciter destillato, & sic mediante digestionem diuturnâ, & repetita cohobatione coeunt invicem in *Quarta Essentia* dicta, ex Sale volatili, Oleo, & Spiritu coadunata, & crasim totius mixti optimè referentes. Salia volatilia in forma Camphoræ ascendant cum sapore simplicium.

Quoad Spiritus Vegetabilium Antiforbicorum, quæritur, quomodo sint parandæ? cum vis maximam partem consistat in sale volatili. Respondetur: Urzota crasim Medicamentis servetur, sunt prius per fermentationem, qui resaturatur Antiforbicis recentibus, ut ita per fermentationem pars fixa, volatilis hæc, & per repetitam cohobationem simul manifestetur vim volentem; qui etiam *Essentia* fixa admodum sunt conveniunt, nempe ex d'is Vegetabilibus paratæ; v. g. Sal Geniſiæ, Fraxini, Abinthii, Centauri minoris, Cardui benedicti, Borifmarinæ, & similia, quæ omnia virtute sua saporosa, & absteriva, uti quælibet Alcalia, Acidi destruentia & Diuretica, diâs Morbus, ab Obstructionibus vulgo natis, moderantur.

Præ cæteris inter talia eminent imprimis Tartarus, qui egregium est simplex, & Vegetabile concretum, ad quod Medici, tanquam ad sacram anchoram, confluunt in Morbis Chronicis, imprimis ubi laborat stomachus, non ut aperiat Obstructiones, sed ut fœdes varias primarum viarum eliminat, & vitiosos sapores succi Pancreatici & Fegmenti digestivi corrigit; unde usurpatur nunc Cremor, ut & Crystalli Tartari, ut vehicula fervide. Quod verò hujus aciditatis quibusdam fit suspecta, utur in se insignem vim habeat incindi, attenuandi & resolvendi, prætereaque Urinam cicodi: tunc conveniens est, ut Cremori Tartari addatur Sal Tartari, vel recipiatur Cremor Tartari, aut Tartarus crudus, & pro suspecta ista aciditate temperanda miscetur cum dimidio salis Tartari, (quod privilegium dicitur ad resuscitationem Metallorum) dissolvitur blande in Aqua fervida, post fermentationem filtratur, & in loco calido evaporent; sic evadit sal tertium egregie Diureticum, & nobile Digestivum salium egregium: vel addi possunt Lapilli Cancrorum, aut similia subiecta, quæ vim talinam accunnt, aciditatem vero nonnihil temperant.

Pertinet hæc Terra foliata Tartari, & Liquor Terræ foliatæ Tartari, qui egregius est in omnibus morbis Chronicis; quo etiam facit Tartarus Vitriolatus Tamen, egregium & universale Digestivum: similia nature sed est Tartarus Vitriolatus BARTHOLETTI in Tr. de Reformatione, quem vocat *antipneumothoracicum*: item Sal Digestivum Hypochondriacum ex additione salis Tartari ad sal Ammoniacum in preparatione hujus spiritus. Non eedæ his Arcanum Myrsinæ, seu Panacea Myrsinæ, facta ex Alcali Nitri, saturato nonnihil à spiritui Vitrioli, in Hypochondriaci, Scorbutici, Febribus intermitteutibus, remedium sanè singulare, blandum sanum concilians. Ratio hujus rei videtur hæc: quod nempe sal alcali Nitri imbibit nonnihil de Sulfure Vitrioli suo anodyno, utur parum sit, à quo derivanda videtur vis eius blanda hypotica. Sed juxta hæc ex Tartaro paulo exiora, imprimis conveniunt volatilia ex Tartaro, spiritus nempe epus, & Sal volatile; non autem spiritus communis & phlegmaticus, sed per se acerbior resaturatus.

&c.

& à capite mortuo rite volatilatus: nobilissimus est in Morbis Chronicis quibuscunque, & similibus affectibus, Obstructionibus vulgo tribuitis, quatenus vitia Digestionis primæ & secundæ propter vitiosos succos corrigi, & eliminari; est enim de natura salium alcalium volatilium, saporis virtutis, & qui ablergit quascunque sordes in corpore vitiose enatas; præterea quodcumque acidum destruit, illudque per vias urinarias abegit. Verum Tartarus crudus propter copiosum Oleum parum suggerit spiritus, imprimis si probè redificetur. Facies ergo Vini succedivè exactæ desillandæ sunt, ut in superiorem mensuram; hæc ipse enim rite desillatæ dant spiritum Tartari urinolum volatilem, & egregium Sal volatile saporis urinoli, instar glaciæ Alembico copiosè adhærens, uti ego vidi, redificatione ulteriori depurandum. Loco horum spiritus *Germinebus de tribus*, ex Tartaro, Nitro, & Vini spiritus per retortam tubulatam paratus, quem superius aliquoties commendavi, instar omnium & nobilissimus est: Est enim reverà nihil aliud, quam spiritus Tartari volatilium, qui sunt in Chronicis affectibus, & imprimis Hypochondriaci pathematibus, nobilissimus & exactissimus est: sed circumspiciendè præparandus, si debet fieri volutis & penetrans: transit simul Sal Tartari volatilium in forma crystallina; & alio redè procedatur, omnia dissingit. Mixta vidi, quæ hic præstitit. Tandem ipsum Oleum Tartari succiduum desillatum, coactans ex Sale volatili, per acidum proprium concentrato, & in oleiforme corpus redacto, debet cum alcali proprio commixtum & digestum, imbibendo acedatens nimium, desillando suggerit spiritum, & Sal volatile nobilissimum in Chronicis affectibus. De Sale Tartari notum est, quod, si quid aliud, hoc ut egregium incelsum. Verum cum sit fixæ naturæ, & relinquitur Romachi digestionem, ob id melius est, si volatilietur: Sal Tartari enim hanc volatilisationem efficiturandum *Liquoris Alkaliæ HELMONTII*, ut ipse fateatur in *Traité de Médecine*, inquit: *si non possumus pervenire ad Arcanum hoc &c. Modi*, quod præparationem, sunt varii: Quidam mediante Vini spiritum Sal Tartari nonnulli desillant, & sic *Sulfurum Samsch Paracelsi*, Arcanum in Uiceribus, de quo videtur *HELMONTIUS Traité de Médecine*, & *Thiers*, *LUDOVICI in Traité de Sale Tartari*, *DAVID Van der BECK Tr. de eodem*, & *LANGELOTTI op. de Princip.* In specie autem Volatilitate tartarus præ reliquis volatilibus præminetiam habent in eo, quod Acidum nostrum peccans frequentissimè ea potulentis, imprimis viscosis, aut fermentando in viscosam acedentiam redactis oriatur, quibus Volatilitas ex Tartaro, utpote epistimum cum Vino prolapsa, optime resiliat, ita destruant, & cum Urina evacuant, atque evocant.

II. *Ex Regno Animalis* per vii Medicum in Morbis Chronicis convenient partes Animalium duræ, salibus volatilibus turgide, Ossæ, & Cornua præparata, Lapilli Cancrosum, Marina, & in specie Testis Cochlearum: quæ Marina præ aliis singularem habent vim alcalinam, quæ omne Acidum mutant in salium: imò calcinata dant Calcem vivam, quod alias partes non faciunt, exceptis Testis Ovorum. Hæc ergo convenientissima sunt in Morbis Chronicis pro destrutione Acido, cum primariò ea Acida viscido dependant: Imprimis salia eorum volatilata, aut spiritus urinoli. Omnes enim Animalium partes suggerunt copiosum sal volatile urinolum, quod elegans est in Morbis Chronicis, saporis vitiosus destrouendo: Talia sunt v. g. Spiritus & sal volatile Cornu Cervi, Spiritus & sal volatile Sanguinis humani, spiritus & sal volatile Viperaurum, Succini, Urinæ humane, ratione salis volatilis, quod est in spiritu salis Ammoniaci. Nam Urina humana ad Chronicos hoc affectus, utut fœdiora, est tamen exactissima: vid. *SOLENNANDER Conf. 12. Tr. 1.*, qui dicit quod resiliat, & egregius humilissimus in Obstructione hepatis, & Lienis, horumque partium Tumoribus, sepi præstandum dedit Urinam propriam, idque magne se felici cum successu. Melius autem est, si citram præparatur ex Urina immediatè spiritus, aut mediante Sale Ammonico. Loco horum omnium in specie esse potest spiritus salis Ammoniaci adjectione custodiam Alkali salis, sive sit Sal Tartari, sive Cineres clavellati, sive Calx viva, paratus: natales hic habet fixas ex Urina humana, & nihil est aliud, quam sal & spiritus Urinæ humane depuratus, nimis odiosus. Fit enim Sal Ammoniacum, quando colligit sal commune cum Urina humana; nam sic Sal commune imbibit Sal Urinæ, & sic fit sal Ammoniacum. Jam verò omnia Alia habentia sese jungunt & uniant cum Salibus fixis, quæ volatilibus: quod ergo additur Alkali fixum, Acidum salis commune illud sibi uniat, & dimittit ea de Sal volatile, seu spiritum Salis Ammoniaci, qui est spiritus Uri-

ne. Duplex autem est spiritus Salis Ammoniaci: nam si paratur adjectione Alkali fixi, habetur spiritus Salis Ammoniaci urinoli, sed participans adhuc nonnulli de Acido, idem etiam in crystallis abie: si verò paratur adjectione Calciæ vivæ, acquiritur spiritus simplex urinossissimus, per se nunquam coagulabilis, & in pluribus differt à priori, & hinc optimus est pro usu externo in affectibus nervinis, si Calciæ vivæ & salis Ammoniaci addatur Sulphur, potest præparari spiritus Salis Ammoniaci rubicundus instar sanguinis. Spiritus salis Ammoniaci cum Sale Tartari paratus, si rite compungatur cum Oleis desillatis, (quæ sunt Salia volatilia concentrata à proprio sulphure) huius sal volatile erripit Oleum, & desillando se coagulat in butyraceam massam, & eandem vult Salia oleosa elegantissima, de quibus molli dubito, quin multa audivissis secundum SYLVII experientiam.

Dico spiritum Salis Ammoniaci coagulare Olea desillata: raris est, quia in Oleis desillatis est copiosum sal volatile; sunt enim, ut dixi, nihil aliud quam Salia volatilia concentrata in pinguedine sui sulphure; unde fermentata, & desillata dant spiritus ardentes. Cum ergo sit in his Sal volatile, compungit se cum Sale volatili Salis Ammoniaci, dum Oleum præcipitatur à phlegmate essentiali, & sic fit tale corpus butyraceum. Sive ergo spiritus salis Ammoniaci solutarius, sive oleosus factus, vulgipetitur, perinde est, utraque tamen ratione, uti quascunque lebes interminentes cerro sanat, ita nobilissimus est in diutis hinc Chronicis, Hypochondriaci, Scorbutici affectibus, & Cachexiis.

Vulgo etiam spiritus Bovis insigniter commendatur in affectibus Hypochondriaci, Splenicis, & Hepaticis, & eandem paratum decoctum vel Effluentia Splenis Bovis: Dico autem Morbos Chronicos habet QUERCETANUS in Pharm., & *JOSEPHUS HARTMANNUS & ZWELFFERUS*. Effluentia hæc Splenis Bovis cum spiritibus Fumarie, Mellis, aut spiritibus Cochlearum parata, præter viam antiscorbaticam, experta est in morbo Virgineo ex Obstructione Menstrui arto; est enim exactissima in provocandis Menstruis: si coniungitur cum Effluentia Martis aperitiva legitime parata, fit egregium remedium in affectibus Chronicis, & Hypochondriaci, vulgo Obstructionibus attributis, it. ex suppressione Menstrui natis; non quidem ratione Splenis Bovis, sed in ingreditur appropriatum. Adduntur his Lumbri terrestris, qui non cedunt aliis Remediis in vi diuretica & aperitiva: Item Forniceæ, quæque his per putrefactionem earum paratur spiritus volatilis urinossissimus, egregie diureticus, & imprimis in affectibus Scorbutici optimus & polychrestus; qui mediante Urina, salia vitiosa acidia imbibit, & præcipitata foras educit: In specie spiritus Lumbicorum, præter quem vix habetur par Remedium in Arthritide vagâ scorbutica. Rudi Mineræ Lumbri coacti infunduntur Vino cum Radice Amorceæ, aut ipsi Lumbri decoquantur coacti; quod Insulium, aut Decoctum bibitum simili est effi egregium in his affectibus.

III. *Ex Regno Minerali* cæteris frequentius usurpantur Mars at Martialis, ac horum ratione Acidulæ, item & Saturnina: utraq; quatenus destruit salia vitiosa in primis viis, & aceditates peregrinas aborrendo edulcorant, ea cum facibus nigris eliminant, conveniunt. Verum cum operentur talia, quatenus acidia vitiosa destruant, ob id attendendum est, ne extra corpus sub eorum præparatione nimis saturentur acidia, aliis nullius sunt virtutis & efficacie, & sic frustraneus erit eorum usus: Mars enim semel acido saturatus extra corpus, instat pulveris tantum accebie in corpore, & quomodo assumptus fuit, prohibet. Hinc Creon Martis saccharinus, qui fit, quando Lamina ferrea illimitur acido spiritui Vitrioli, vel Oleo Vitrioli, seu spiritui Sulphuris, qui illam corrodunt in crocum, (vid. *SCHROEDERUS Pharm.*) pessimus est & inutilis usus, utut fit basi Pulveris Cathartici Quercetani: nam ab acido spiritui Sulphuris penitus corroditur, & ita saturatur, ut ne aqua Fortis quidem attingat eandem; unde nec in corpore potest dissolvi, sed in stomacho residet tanquam terra mortua, & potius nocet, quam proderit. Ideo co collimandum, ut Medicamenta Martialis sub præparatione cum minimo, quantum possibile, eruantur acido, & quidem talibus, quæ stomacho nostro sint amica & convenientia, & quæ superari possint à Fermento citri, ita ut solutus Mars tantum à salibus vitiosis corporis saturetur; spiritus autem minerales vix nimis acidi, utpote Martem adeo imprægnant, nec superari possint à Fermento stomachico. Unde in stomacho rubicollis potius convolvit Limaturâ ipsa Martis crudâ, simpliciter pulverisata, & aliquota Olei imbibitione à rubigine præservata; vel in iis, quibus panis tenerior & salis-

fensibilis est Stomachus, usurpatur imprimis in forma li-
quida, quæ præparationes eo collantur, ut redigatur in cor-
pus vitriolicum, tunc enim fit, ut Mars præcipitetur in
Corpore, sic præcipitatur absorbet acidus copiosus succos
in primis viis. Unde Limatura Martis recens infundatur in
Succos acidulos Vegetabilium, e. g. Succum Radicis Ci-
chorii, Succum Pomorum Borifordanorum, Cydoniorum,
Mullum, vel Succum Aceris, & Acerosellæ, vel Deco-
dum Tamarindorum: Infusum hoc Marte probè impræ-
gnatum, infusetur in Extractum, quod vel ita usurpan-
tur, vel cum spiritu Vini, vel Cochlearium. *Tinctura Mar-
tis liquida* extrahenda: quæ nullo modo reliquatur Digestio-
ni, & optima est in Morbis Chronicis.

Tinctura Martis cum Spiritu Pennis parata, est egregia. Hoc
videm observetur de *Crocus Martis spiritibus*, cum paucis li-
quatis Acido. Optimus modus est, si Mars introetur cum
Succo Cichorii depurato, exponatur Soli, donec abeat in
Crocum subtilem: vid. PANAROLLUS: qui Crocum, cum
ab Acido corrosivo non sit saturatus, magnam obtinet vim
salia sylvestria in Corpore absorbendi.

Quid dicendum de *Crocus Martis spiritibus cum Salibus*? Fit
semper Lixivium ex salibus Vegetabilium fixis, quod Lixi-
vium affunditur Marti, unde Mars corroditur in Crocum
Martis apertivum cum Salibus. Vix laudem meretur, pro-
pterea, quoniam Salia ista fixa in Lixivio aggradiuntur Mar-
tem, & tunc Aqua solvit proprium Martis acidum, Salia fixa
se solvant cum Acido, & ita abeunt in tertium Sal fixum:
Nun hoc tertium Salium, cum in se sit saturatum, neque Aci-
dum neque Alkali corrigat, & ita Crocus Martis apertivus
cum salibus vix laudabilem habet in Corpore usum.

Sed hæc tantum mea est conclusio, an vera sit? con-
funda experientia.

Substituimus hædenu in Remediis ad Obstructiones Vilce-
rum directis, aut iis, quæ in Obstructionibus vix stomi-
chi ortu laudantur. Recensui etiam, quæ ex Regno Vegeta-
bili desumuntur, & progressus salis ad Regnum Minerale,
& de Marte didici, quod semper adtingat per se,
aperiat præ accensu, hinc opus esse ut cautè & paucissima
Acidis præparetur: vid. PANAROLLUS *Pentec. 5. Ob-
serv. 32.*

Præ aliis Præparatis nota est *Tinctura Vitrioli Martis*
ZWELFFERI, aut hæc ipsa in forma fixa, seu *Sal Mar-
tis compesum*, ex ana. Vitrioli Martis & Terræ solatæ
Tartari (*humectatur, & deinde faciat*) in Marbis Chronicis
nobilissima. Dosis 30. 30. vel 40. gutt. bis in die, ma-
ne jejunio stomacho in vehiculo calido, vespere in vehiculo
frigido ante coenam, pro subspiciis tenerioribus, quia est de-
bilibus, & plus operatur ratione Terræ solatæ Tartari, quam
ratione Vitrioli Martis; Unde huic vel simplicissimam,
sicut tamen efficacem, Tincturam Martis præferre vellem.
Modus hæc simplices sed non inelegantes Tincturas Martis
parandi, describit DRAWIDZUS in *Tr. de Scorbuto deli-
cioso* *secl. 8. de Dolore Pectoris facili*. Ex hæc Extracta &
Tincturæ Martis legitime parata certè mirabilis præstant.
Melior in usu est *Liquor Martis Solaris*, qui fit ex Minera
quadam in locis argillosis, composita ex Marre & Sulphure,
reperitur in Hallia iuxta pagum *Almsradt*, & prope
Saalfeldiam, ut & Hamburgum circa pagum *sholen*: Ex-
posita aëri, verno & autumnali tempore efflorescit in Vi-
triolum Martis dulce, quod beneficio Roris mullis per o-
lam non vitreata elixivium, filtratum, & depuratum,
constituit Liqueorem Martis Solarum, qui elegans est in
affectibus Chronicis, in quibus videtur Martialis. Nul-
la alia de hoc præstant velligia, quæ in GLAUERO
in *Tr. Olæum Vitrioli dulce*. Licet autem scopum is non fer-
iat, tamen medicamentum est nobilissimum: si Minera
cruda destillatur nondum aëre resoluta, copiosum dat sul-
phur, Caput mortuum trahitur à Magnete, quod signum
sufficiens Martis: sunt etiam, qui ex eo tantillum Auræ eli-
ciunt. Ex Capite mortuo destillatum nullum elicitur Sulphur,
& si aëri exponitur, nil Vitrioli dat: Minera cruda
autem efflorescit in Vitriolo, quod destillatum nullum dat
Sulphur, sed Phlegma & Spiritum Vitrioli, Liqueorem ta-
men hunc appellare possumus Acidulas concentratas, quia
quod acidulas præstant flos baulii, idem præstat hic Li-
quor sub guttularum usu.

Hoc ipso Liqueore possumus pervenire ad Inquisitionem
Acidularum: nempe Minera hæc si immiscetur Aquæ & co-
quantur, nunquam quid evanescit; libero verò Aëre expo-
sitæ, Sal universale Aeris omne Sulphur Minera solvit,
Sulphur dissolutum mediante spiritu acido rodit admodum
Mineræ Martis, donec coeat in Vitriolum. Jam ergo,
quod attinet Acidulas cogitantes Aquas dicto sale univer-

sali imprægnatas, quæ præterfluit Mineram Martialem,
solvere dictum sulphur, quod solum sulphur rodit Mi-
neram Martis, unde Liquor talis Martialis. Talis Minera
ab Aëre eluitur in Terra. Acidula sativæ, & hic Liquor
sunt usum Ess, confans præstant virtute diuretica & vir-
tute acidum destructiva, Mars, qui ex Acidulis præcipi-
tatur alias cadit, dissolvitur ab acido corporis, & solum
sub forma secum eliminatur. Si Martialis non satisfaci-
unt, ægros ablegemus ad acidulas non Artificiales, sed
Naturales, in dicta Antipneia Viscerum. Vina etiam
Martialis, seu Mars in Vino extingatur, seu Limatura
Martis recens, vel sola, vel cum Cinnamomo, Vino Rhe-
nano aut Malvæ infusa, continuato usu fuit egregia
volarilis enim & subtilis Vini aer nunquam interimitur,
quin rodendo Martem, eisdem fusculem Crocum in se ab-
sorbeat. Hinc si addantur nonnulla vegetabilia appropriata,
v. g. Cochlearia, Fumaria, Abunditum, Chelidonium
majus & minus, Feniculum, &c. cum Cinnamomo &
Zingibere, eandem evadet Vinum Medicatum Antiscorbuti-
cum. Nam & Aqua ferrariorum pro pauperulis est egre-
gium.

Verum quoad legitimum Martialem usum, observetur.

1. Sub Martialem usum semper operam esse dandam, ut
Abus evitetur aperta.

2. Si extraxerit Alio modo evadant insignitanti aut attemen-
tati, signum esse legitimum operationis Martialem.

3. Blanda Mars Corporis promovendam esse operationem
Martialem: si non sunt nigra, quæ excernuntur,
signum est, quod minus operatur.

4. Inter ipsa Martialis habendum esse defectum: ut nempe
observetur Acidum humorolorum præcans, an sit ac-
erius & volatilius an vero mitius? item conside-
randa constitutio Ægrotum, an fortis, vel nimis
delicata? Nam quorum Orificia stomachi sunt fen-
sibilia, si minus fuerint Martialis cruda, sed talia
falsum Tinctura Martis liquida, Tinctura Vi-
trioli Martis *Zwelferi*, aut Iuxta Martialem cum Vi-
no uti paranda sunt: Quorum vero robustius ac Minus
sensibile Orificium stomachi sensum, hic Mars
crudus præparatus, Liquor Martis solaris, similia-
que, commodè præparari possunt.

Pergo: post Martem nobilis est Saturnus, cuius Saccha-
rum, & ex hoc cum Vitriolo Martis, & spiritu Vini pa-
rata *Tinctura Antiscorbutica*, revera, uti notum, egregia sunt
Remedia in Malo Hypochondriaco, Melancholico Hypo-
chondriaco, Scorbuto, & imbutis Chronicis affectibus,
imprimis cum vitio Iplenis junctis, qui vulgo Obstructio-
nibus attribuitur. Ex hoc Saccharo Saturni methodo con-
fecta fit Spiritus, quem vocant *Spiritum Saturni*, & multi
insigniter in Iplenis commendant affectibus: sed sub hoc
spiritu insignis later impolitus, qui enim nihil aliud, quam
Vini spiritum regnerat ex Aceto, cum quo paratum fuit
saccharum Saturni, quod ceruum est. Quibdam etiam
Crystalli ex Minera Saturni cum spiritu Nitri paratæ,
Sacchari Saturni locum in u. esse solent, quæ Crystalli præ-
ter hoc, quod in Febribus ardentibus, item Pestè, egre-
gium præstant refrigerium, ut cum vulgo ita loquar, et-
iam in affectibus Chronicis, Hypochondriacis, & hinc
ortu Melancholici, præ cæteris conveniant, & etiam hoc
in stomacho radicatos Affectus, & Obstructiones talis tri-
butos, insigniter curant & sanant.

Queritur: quæ ratione Saturnina operetur.

Respondetur pari fere ratione cum Marte. Per se Mars
semper adstringit: gustate saccharum Saturni, & aperte
aluminositate & adstringentem dulcedinem percipietis.
Corrigunt ergo & dulcescent præternaturales aciditates: si
enim assumantur crystalli Saturni, Acidum saturatur ab
Alcali, Saturnus precipitatus arripit ad se potenter Acida,
quæ dulcescent & eliminantur cum fecibus: non autem
potest quatenus æstus Iplenis corrigit, sed quatenus dul-
cescat, & virisio flos invertit. *Jupiter* etiam & Anti-
scorbuticum *Petræ*, item Diaphoreticum *Joviale streperdi*,
similiaque in dictis Morbis Chronicis conducunt.

Hæc est Materia Medica, quæ in genere in Morbis
Chronicis, ex Obstructione vulgè derivatis, revera ex
acido vitio nati, convenit, hoc est, Cachectis omnibus,
Idiæ speciebus, Leucophlegmæ & Anæmæ, Malo
Hypochondriaco, Scorbuto, Menstruorum defectibus, Fe-
bribus Intermittentibus, & similibus, in quibus illa vulgè
aperire dicuntur, reliqua vitiosa Salia morboia, ordinari-
ter ex cruditate stomachi oriunda, corrigere & emendare
solent. Verum artificium Chronicis huiusmodi Affectus
rite curandi consistit in eo, ut tempore intermiffas, nec
nimis

magis precipitando Curam, crabrones irriteris; h. e. temperatis Remediis succedat insillamus, ut acrimonibus commoti acrores p. n. succi, effervescendo, & partes nervas irritando, varia symptomata inducant: quibus imprimis moderatus corporis motus simul accedat.

Legitima ergo apud Methodus his ipsis est, ut ulgescant.

1. Digestiva; hinc
2. Pomatoria, vel blanda Laxantia pro removendis impedimentis.

3. Preparata sic corpore, Martialis, ut promptius aborbere & imbolere queant vitiosa Acida: Quibus
4. Interponantur, non Purgantia proprie dicta, quae insigniter tales agros, & tandem frustra vexant, & subinde periculosa symptomata inferunt, ex acriorum & effervescentium succorum ad Intestina provocato influxu: sed blanda potius & per epioria Laxantia, & quae leni stimulo Intestina modeste irritant: Et

5. Subjungantur Alterantia asmarica, in specie volatilia, plus minus amara.

I. Inter Digestiva, reliquis ferè præmittenda, in specie Laxativa, emineat impius Salla Salis, aut nonnihil uritula, succos acidos attenuantia, & acris omne blandè temperantia; qualia sunt Tartarus vitriolatus Tachau, sal Ammoniacum, sal Hypochondriacum, Arcanum duplicatum, Liqueor Terrae solatae Tartari, Tinctura Tartari, Tinctura Coriarii Reguli Antimonii, Tinctura Vitrioli Martis & vitrioli: v. g.

Tart. vitriolatus. ʒij.

Sal. Albus. an. ʒi.

Liq. Cant. præp. ʒij.

M. f. Pulvis Digestivus, vel

Tart. vitriolatus. ʒij.

Salis Albus. an. ʒi.

Liq. Cant. præp. an. ʒi.

M. f. Pulvis.

Div. in 4. vel 6. part. æquales. 5.

Pulvis Digestivus.

Capiatur semel vel bis in die.

Liq. Terra sol. Tartari ʒi.

D. 5.

Essentia Digestiva.

De hoc espasus arger bis vel ter in die ʒo. vel 40. guttas, mane nempe in vehiculo calido, meridie biborio sote prandium, & à meridie in frigido vehiculo. Vel

Tinctura Armoniacæ fer. par. ʒi.

D. 5.

Tinctura Digestiva.

Capiantur de tali bis gutt. ʒi. mane jejunio stomacho in vehiculo calido, meridie & circa vespem in frigido.

Paratur autem sic Tinctura Armoniacæ ex feris: si sumatur floriz Reguli Antimonii cum Nitro & Tartaro parati, ad hac calidæ, & infundantur in spiritum Vini reddictum, sic fit Tinctura Tartari, quamzèssimo ob Alcalia sua imbibita.

Liq. Terra sol. Tartari ʒi.

Tinctura Tart. antimoniat. ʒij.

M. 5.

Essentia Digestiva.

Dosis 40. vel ʒo. guttas, bis vel ter in die.

Quod II. actinet Pomatoria: hæc sunt nota ex Antimonio, quæ sunt optima: præstant autem liquida sicci, & si opus est, coarctentur.

III. Martialis ex suprà dictis sunt engolia: five suspensur Arturialis, nempe Tinctura, Croci, Infusi Martialis; five Naturalia, ut sunt Acidula. In horum tamen usu aliquandiu peritendum est, ut radiculis corrigatur causa morbilica: in specie Liqueor Martis Solaris continuatur ad 3. 4. ulque ad 6. vel 7. septimanas, ascendendo quot. 10., 12. ad 20. vel 25., & descendendo, bis in die, mane in vehiculo calido, à meridie in frigido. Si non sufficiant, hauriantur Acidula naturales in loco natali.

Hicæ Marzialibus interponitur subinde blanda Laxantia, succellæ, & ut vocant, per epioria evacuantia, quæ scilicet alterant, & precipitantur fides beneficio illorum Medicamentorum subinde leniter educunt: Nam in Morbis Chronicis violentè purgando nil præsumas, sed Morbos deteriores reddimus. Si Alvus ordinario fluit, bonum signum est; si verò interdum tantum fluat interponantur dicta Remedia per epioria Purgantia: vid. WEDELIUS de Med. facult. pag. 46.

Hæc inter eminet Rhabarbarum, quod alia Anima parit dicitur, blandum est Laxativum, & amara sua liqua corrigit & acris Balan, additis simul Salinis, v. g.

Rhabarb. el. ʒi.

Arcan. dupl. ʒij.

M. f. Pulvis: 5.

Pulvis Laxativus pro una vice.

Vel fiat Electuarium ex pulpa Psylliarum cum Rhabarbaro pulverisato, recipiendo ad quatuor uncias, Pulveris Rhabarbari ʒi. & ita sub forma Electuarii aliquandiu continuando.

Notum Dofum inglarium quotidie bis, est remedium ad Cachexiam, & quatuor idem species commendatissimum, unde HELIDÆUS PADUANUS facit Pilulas ex Rhabarbaro pulverisato, & ex Gummi Ammoniac in Aceto dissoluta, & hæc fuerunt ejusdem Pilulæ, optimæ in Morbis Cachectis.

IV. Si quid aliud ex Purgantibus mediocribus convenit, imprimis sunt Gummata, in specie Gummi Ammoniacum, cum Laxativis mixta: Talia sunt Pilulæ de Ammonio Quercetis, item Pilulæ de Ammonio Dosis de quibus videtur SCHROEDERUS: vel Rivieri, vel Morimani, quæ satis sunt commendatæ & utiles, stem Pilulæ Aperientes Tillymanni:

Alia facit. ʒi.

Gummi Ammoniaci Aceto solut. ʒi. vel ʒi.

Tart. vitriolatus. ʒij.

Cum Tinctura Martis f. Pilulæ.

De quibus num. ix. x. vel xj. xv. ad xx. capiuntur hora una vel altera ante coenam.

Nempe pertinent hæc omnes Pilulæ Usuales, seu Doficæ dictæ, quæ sub cursu Curationis Morborum Chronicorum omni septimana simul capiuntur, in specie subula Martialis: v. g.

Gum. Ammon. in Aceto solut. ʒij.

Martis rici parat. ʒi.

Alci. lac. ʒi. xv.

Maffich.

Myrrha an. ʒi.

Extr. Trach. alband. gr. viij.

Com. Essentia Martis. f. Pilulæ: 5.

Pilulæ Emollientes & aperientes pro aliquot vicibus

Vel

Gum. Ammon. cum Aceto sol. ʒi.

Alci. lac. ʒi.

Maffich. el. ʒi.

Myrrh. el. an. ʒi.

Extr. Trach. alband. gr. xv.

Cum Essent. Martis. f. Pilulæ minores: 5.

Pilulæ Aperitivæ pro aliquot vicibus.

Dosis gran. xv. ad fenum ʒi. singulis 14. diebus, vel singulis mensibus usque pro sub decremento Lunæ.

Maff. ʒi. de Ammon. Querc. gr. xv. ad ʒi.

Extr. albus. gr. xv.

Alci. lacid. gr. iij.

Stem. Silphur.

Extr. Trach. alband. an. gr. iij.

Cum Tinctura Tart. aut Pilulæ. D. 5.

Pilulæ Stomachales Laxativæ, semel in septimana usque.

Prescripi aliquando, ubi per se la influentia est Purgatio, imprimis Extra Gum Helicorum nigri: v. g.

Extr. Helic. nigri. gr. xv. ad ʒi.

Trach. alband. gr. i.

Gummi Ammon. cum Aceto sol. ʒi.

Stem. sulphur. gr. iij. el. iv.

Cum Tinctura Tart. aut Pilulæ: 5.

Pilulæ Stomachales pro una vice.

Vel

Gummi Ammon. in Aceto solut. ʒi.

Stem. sulphur. gr. iij.

Extr. Trach. alband. gr. i.

Cum Ess. Cant. purg. f. Pilulæ: D. 5.

Pilulæ Stomachales pro una vice.

Prescripi aliquando Hypochondriaco, Colica hypochondriaca laboranti, sequentem Formulam, à qua assue illa lassitudine cum ingeni levamine purgata fuit:

Aqua Ment. ʒi.

Gum. Ammon. cum Aceto sol. ʒi.

Tart. vitriolatus. gr. xij.

Stem. rici gr. iij.

Syrup. de Pom. Reg. Sap. ʒi.

M. f. Pulvis: 5.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

Portio laxativa.

Faciunt huc *Pilulae* ex Gummatibus SYLVII ex *Praxi Med.* l. 1. cap. 5. §. 34. cap. 7. §. 52. & cap. 14. §. 50. cap. 34. §. 110. & cap. 35. §. 16., quæ multum contribuant ad evacuandum in his Morbis. Didarum *Pilularum* aliquot capiat æger mane jeiuno stomacho. Item *Mercurius* dulcis in his Chronicis Affectibus, in specie Splenicis, cum Extracto Heliebri nigri est egregius, qui cum sit tenuissimus, uno vel altero grano Extracti Trochilorum Albandi ad acuendum, hac forma:

℞. *Mercurii* dulcis. gr. xlii. vel xv.

Ext. *Helieb.* nig. vel *Mass. Filal. de Ammon.* Querc. gr. xv.

Troch. Alband. gr. li. vel lii.

Cum Ext. *Alfush.* l. *Pilulae.*

Quibus etiam gستا una, vel altera *Olei de Stillari Camini* addi potest: §.

Pilulae Stomachales pro una vice.

Item *Pilulae* convenienter permiscuntur *Chalybeata*, *Vitriolum Martis*, ut ex *Pilulis Sylviani* patet, vel Extractum Martis sequenti forma.

℞. *Extracti. Helieb.* nigri,

Murr. an. gr. xv. vel li.

Troch. Alband. gr. li.

Stomach. sulphur. vel *resat.* gr. lv.

Cum *Essent. live Tinctura Mart. liquida*

l. *Pilulae*: §.

Pilulae Chalybeatae Purgantes.

Sic in forma Pulverum debent dari *Laxantia*, (dico *Laxantia*; nam §. aut a. sedes sufficiunt; possunt tamen subinde repeti:) dantur imprimis cum Salibus digestivis, v.g.

℞. *Tartari vitriol.* ℥b. vel gr. xv.

Stom. sulphur. vel *resat.* gr. li.

Troch. Alband. gr. li.

Oli. de Stillari. Anisi (ratione odoris & saporis) gutt. ii.

M. l. *Pulvis*, D. 3.

Pulvis Laxativa.

Hic Pulvis interdum septies, interdum duodecies laxat. Faciunt huc etiam *Passulata*, in specie eorundem Decocta, imprimis cum Martialibus usoranda, in Subjectis paulo fictioris constitutionis. Convenienter etiam asurpantur *Infusa ex Folis Senae* cum sale *Tartari*, quæ sunt rubescenda, & omnis tæter sapor est correctus, cum & sine *Rhabarb.* vel misca cum Gummi Ammoniac, & *Purgantia* alia.

Oster mox, quod nunquam Sena propianda in quacunque forma, nisi addatur stimulus salinus, in specie ex *Tartaro*: Ratio est, quia alius non purgat, sed tætem ad hereticendo parietibus intestinorum dat formam: si tamen addatur stimulus, blando & benigne, sufficienter tamen, evacuat. *Infusum Senae* sit tale:

℞. *Fol. Senae* sicc. ℥b. ℥b.

Sen. Anisi (con corrigens) ℥b. vel ℥i.

Sal. Tart. ℥i. ad ℥b.

To fund. in l. q. *Aqu. simpl.*, deor in loco tepido per noctem.

Coler. ℥iij. vel iv. adde

Aqua Cinnamon. ℥iij. vel ℥b.

Syrup. de Chlor. cum *Rhabarb.* ℥b. vel q. v.

M. D. 3.

Portio Laxativa.

V. In genere tandem dicitur aliquandiu continuatis sit accessus ad Alterantia aromatica, etque vel simpliciter talia, vel simul plura minus Laxantia. Faciunt huc imprimis Noduli Vinofundendi, qui ipsi parantur ex Simplicibus, nunc at idis, quæ sunt quasi oleosa, & quorum vis medicamentosa in concreto quasi concentrata est: nunc vero ex recedentibus, in his omnes, quorum vis in sale volatiliiori, fit facile dissolubili, consistit. Alteratibus his Purgantia infundunt apta permiscuntur: Non enim omnia Purgantia convenienter, ut infunduntur, qualis sunt, quorum vis purgans consistit in parte reosola, quoniam Refinum non attingit: Aqua: Quotum vero vis purgans consistit in parte mucilaginosâ, ea possunt infundi & subministrant suam vim liquori aqueo, seu Vino. Sic dabo exempla: Radix jalappe non purgat, etiam totum causticum esse infusi haurias, Gummi Gutte, Mechocacti, & similes Plantæ resinose nihil valent in Nodulis. Contra Radia Eulæ, Heliebri nigri, Folia Senae, Radia Irees nostratæ, Rhabarbarum & similes, commodissime infunduntur: hæc vim purgantem communicant Aquæ, & Vini, quæ consistit in parte mucilaginosâ, & sale Volatili, Sic assumant.

Tom. II.

tur Herba sicca, infundenda, de quibus sub excitatione non multum perit virum, seu salis volatilis: Uode Plantæ Aromaticæ, quoniam sal volatile oleum cum se fixius, ut plurimum quod coarctat ab oleo, commodè possunt infundi. Possunt autem infundi Radia Angelicæ, Fœniculi, Levistici, Helenii, et item Herba Filicis, aut Scolopendria, aut potius ex Aromaticis Herba Majorana, Rosmarinori, Mentha, Absothio, Agri, Taraxaci, Centaurii minoris, Cardui benedicti, & cum his Passula, imprimis Corinthiæ: item omnia, quorum sal volatile concentratur in proprio concreto; Semen Erucæ, Sinapi, Dauci, Carvi, Baccæ icidem Juniperi & Lauri, & similia: v.g. sit Nodulus Alterans ex ficis:

℞. *Herb. Alfush.*

Mentha.

Rosmar. an. M. j.

Rad. Fœnic.

Levisti. an. ℥b.

Galang. ℥b. vel ℥i.

Zedair.

Zingib. an. ℥iij. vel ℥i.

Cori. Aurant. ℥b.

(vel *herb.* & *Cori.* Curi an. ℥i.)

Cinnamon. ℥iij. vel ℥i.

M. per Nodulo Vitis infundendo: §.

Nodulus ad Vinum Stomachale.

Quod vel simpliciter ita bibitur, capiendæ quotidie his semper ante primum una vel altera hora bonum haustum.

Alius Nodulus aut Vinum medicatum ex recensibus *Pygaltilibus* in quibusque Hypochondriacis:

℞. *Herb. ros. Chelid. maj.*

Cochlear.

Nasturt. aquat. an. M. l.

Rad. Ascorb. ros.

Aromat. ros. inoff. an. ℥b.

Caryoph.

Cinnamon.

Zedair. an. ℥b.

Sen. Anisi.

Fœnic.

Sal. Tart. an. ℥iij.

Inciat & confusa includ. *Nodulo*. §.

Nodulus ad Vinum.

Quibus tamen subinde adhuc *Spiritus*, & *Salia* volatilia infillari solent, v.g. *Spiritus Salis Ammoniaci*, *Spiritus Tartari* volatilis, *Spiritus Carniæ* de ribus, *Liquor Cornu Cervi* facinorosus, *Essentia de Infuso Aromatum*, maxime volatilia oleosa, aliaque similia, addendo de talibus omni haustum gutt. 10. ad 40.

Item Nodulus Alterans, Laxativus ex Herbis recensibus:

℞. *Herb. ros. Cochlear.* M. li.

Alfush.

Chelid.

Fœnic.

Nasturt. an. M. j. vel l.

Fol. Senae sicc. ℥b. ℥b. ad ℥i.

Rad. ros. Ascorb. veri, vel *Zedair.*

Aromat. an. ℥b. quoad ad ℥i.

Helieb. nigri trad. ℥iij.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

(violenta enim est, propterea etiam in hac dosi datur:)

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul. an. ℥i.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

M. per Nodulo Vitis infundendo: D. 3.

Nodulus Laxativus.

Sal Tartari stimulat est, & modicam reddit idoneam pro Purgantibus extrahendis: possit loco ejus addi *Cromer Tartari*, sed Sal Tartari est melius.

Capiatur subinde omne alter venient, & laxabitur blande corpus. Dabo alios exemplum ex Alterantibus sicis & Laxantibus:

℞. *Herb. Alfush.*

Helieb.

Chelid.

Fœnic.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥i.

Sen. Anisi.

Fœnicul.

Sal. Tart. ℥iij. ad ℥b.

Infus. prop. ℥iij. vel ℥i.

Zedair.

Zingib.

Cinnamon. an. ℥

Zingib. prop.

Calang.

Zedair.

Zingib. an. Zil.

Pafful. min. Zil.

Sal. Tarr. Zil.

Includ. Nodulo. S.

Nodulus ad Vinum.

Ad Alteratam dicta Aromata pertinent etiam Ellis Proprietata sine acido, Tinctura Tartari composita, & Ellis Antiscirrhicam abstraham.

Zf. Alis succet. Zil.

Cum. Ammon. Zvi.

Myrrh. Zil.

Craei Zil.

Infundantur cum l. q. Tinctura Tartari acerrima, mediantes digestionem diuturnam extrahatur Essentia composita.

Dosis ad 30. vel 40. gutt. bis lo die propinanda: Vel Ellis Antiscirrhicam laxativam:

Zf. Alis.

Myrrh.

Cum. Ammon. an. Zil.

Craei.

Caryophyll. an. Zil.

Rad. Helios. nig. crad. Zilii.

Pulp. Calypsoth. Num. 1.

Pulverisatis grosso modo adde

Sal. Tartari Zil. ad Zil.

Affunde Vini spiritum non dephlegmat. q. l. digerantur

per diem & amplius. Nunc

Zf. Sal. Ammon. depur. an. cum Sal. Tartari:

Addatur illis, & parum Spiritus Vini non dephlegmati,

saltem q. l. ad solvenda Salia, digerantur, filtrentur.

Dosis 40. gutt.

Tinctura Tartari composita paratur sequenti modo:

Zf. Alis succet. part. iii.

Myrr. r. off. part. ii.

Craei part. i.

Extrahantur cum Tinctura Tartari acerrima, probe digerantur, & filtrantur.

Quo etiam pertinet Essentia Myrrhæ, Essentia Absothil, Vincoctio, præsertim ex Succis inspissatis cum Spiritu Cochlearie parata.

Sic generaliter Morbi Chronici ex vicio Digestionis primæ, & secundæ curantur.

Quod si huiusmodi Chronicis Affectionibus subiecto Obstructiones revera tales, tam Melenterii, quam Lienis ac Hepatis, ac inde supervenientes Tumores dum ac scirrhi, talique remittentes & indolentes, vel in Glandulis Melenterii, vel in Hepate, vel Lienis, aliæque similes deprehendantur; nascuntur pariter hi ipsi ex Acido viscido, cuius hostili præsentia fringuntur fibre, elaudantur pori, ac ordinarius fluidorum transitus plura minus impeditur, unde HIPPOCRATIS magni Lienis & Tumores Viscerum superveniunt. Revera ex talibus præsertim Melenterii Obstructionibus ac Tumoribus, subinde oriuntur aut saltem pertineant ter forenter Chronici Morbi, mirabilibus ac subinde difficultat explicabilibus Symptomatibus, illique quotidie variantibus, supari. Et quidem Microcerium, si quidem in parte affectum sit, differtur cognoscere potest, cum in profundo ferè itam est; supervenire tamen solet aliquando, molli tamen, & sine fluidi contenti indicio, Abdominis tumor, Evacra Alvi liquida, subinde varia, Dolor obfcurus, interdum plura minus gravatus in profundo Abdominis percipitur, & Agri successivè emaciat videntur, nec nisi, ubi longius processerit malum, tactu Tumor remittens tandem cognoscitur, imò interdum vix ante cadaveris apertione observabilis est.

Lienem verò, aut Hepat si affigant Obstructiones & Tumores, Dolor gravitatis simulque alvus, plura minus tenuis, in eorum regione percipitur, interdum quoque, si majores sint, iniquitatem. Dolores quidam, inam vagi, vane diffunduntur, nunc densè exasperantes, nunc modo his Visceribus conveniunt, sed Intestinarum sequuntur affectiones. Agrorum alium floridus faciei color perit, ac Splenetici, obfcuri, lividi, & quasi plumbei apparent; Hepatici verò ad viridum flavorem ferè declinant; Urinæ crudæ subinde variantes exoriantur, etque ferè pauciores; tandem Tumor hydropem ipsiusmodi vitæ sine imponit. Deteriora hæc sunt mala, si Lien affectus Hepat in sui consortium traxerit: cum omnis ex Splene refluxus Sanguinis immediate perat perit. Recentia hæc

mala, ac inde successivè succurrentes Chronici Morbi, nunc Hypochondriaci, nunc Scorbici Affectus symptomata, imitantes, adhuc curabiles sunt: magis verò confirmati, ac præsertim, ubi jam in Scirrhum abierint Tumores, incurabiles existunt.

Curandi ratio ex supra dictis sponte patet; nempe per Interna Acidum corrigentia, humorem flagrantem plura minus viciatum incidentia & resistentia, & per epicias evacuatione, primum decunt; quibus & Externa emollientia ac attenuantia locanda. Martialis ergo ante perfectum Scirrhum sunt optima; hinc enim Aquæ Martis ætantes Lienis abstrahuntur decuntur: sed ubi ad Scirrhum degenerant, nocent plurimum Martialis. Rationem, eamque satis exactam suggerit TACHENTUS in Hippocr. Chymico Clav. pag. 151. & 152. Hinc Gummi, præsertim Gummi Ammoniacum & Galbanum, & plura alia, ex his concinnata Remedia sunt optima: item Tinctura Tartari, spiritus Tartari, ac alia quævis salia volatilia, sed potenter & orebilia usurpata. Hinc quilibet vulgè Agnoscitur, quilibet Antiscirrhicis & similia, alias Agnoscitur, item Hepatici, vel Splenetici dicta, locum inveniunt; cum quoad rem fideli, seu Experimentum omnes conveniant, sicutem quoad Theoriam, seu experimentorum per causas scirrhium, differant.

Externæ conveniunt, tales partium Abdominis Tumores, plura minus Scirrhum minitantes, emollientia Gummi, in specie Ammoniacum, Galbanum, Sagapenum, Bdellium, & similia; hæc enim mirè incidunt, & emolliunt viciata crassa atque tenacia. Jungantur his Vegetabilia ad Narcoticorum partum propriis accedentia, v. g. Nicotiana, Cicuta, Hyoscyamus &c. etque iis parata Emplastrum varia, v. g. Emplastrum Splenetica dicta, quæ usuprium sunt ex Gummi Ammoniacum, Galbano, Sagapeno, &c. cum succis Pinarum appropriatarum, nempe cum succis Nicotianæ, Mado-dracæ, Cicutæ, Bryoniæ, Radicis Cucumeris agrestis & similibus: nam, quod obiter monito, singulare quid obtinent succi Plantarum Narcoticarum &c. imò ipsum Opium præ talibus emolliendis Tumoribus doris scirrhosis partium Abdominis, quibus & alia illis Tumoribus appropriata locanda sunt: videatur DOERING Tract. de Opio cap. 5. Hinc Emplastrum de Nicotiana est egregium: v. g.

Zf. Extract. Nicot. per decoll. part. p. iii.

Opti in extract. radall. part. i.

Cum Terribusina, Oleo Nicot. & p. p. p. p. p.

L. Emplastrum.

ZWELFFERUS egregium Cataplasmum ad Scirrhos Lienis ex Nicotiana descriptum in Pharm. Reg. alt. Editionis p. 313. Hinc etiam in Officinis præstant Unguenta, & Emplastra Splenetica. Conveniunt etiam usuprat, Emplastrum Spleneticum Agnoscitur ex part. ii. Gummi Ammoniacum in Aceto soluti, part. i. Succis Nicotianæ, part. i. Refine, & Terbiuchine, & Succis Ebuli, cum Oleo de Capparis, & sufficiente quantitate Ceræ mellis, paratum Item Emplastrum de Cicuta cum ana Gummi Ammoniacum in Aceto dissoluto soluti missum, quod super altum inductum, & applicatum parti dolenti, non est inconveniens, malaxatum cum Oleo Succini.

Præsertim præsertim, Emplastrum alia de Ammoniac parata: item Emplastrum HEURNII, ex Cicuta & Gummi Ammoniacum, quod descriptum SENNERTUS in Praxi l. 3. p. 4. cap. 6. de Scirrho Lienis pag. 491., malaxatum cum Oleo Phosphorum, Succini, &c. Pertinet hoc Emplastrum Sennerti de Cicuta, quod in omnibus Tumoribus Abdominis est egregium, Descriptio autem hæc est:

Zf. Nicot. Cicuta M. ii.

Fler. Oculi M. i.

Cum. Ammon. (quod est basis) Zil.

Coquantur in l. q. Aceti destill. ad Gum. Ammon. dissol.

lutionem: Colaturæ adde:

Succ. Nicot. vera Zil.

Zila Zil.

Iterum leniter coque ad humiditatem consumptionem;

tandem adde

Rosin. Plai.

Terribusina an. Zil.

Syrup. elem. Zvi.

Myrrh. Zil.

Oli. Capivi.

Coras. q. l. pro consistentia Emplastri.

Faciæ hæc etiam Emplastrum Carminativum SYLVII in

Praxi lib. 1. cap. 14. §. 36., quod in se etiam egregium est in

hæc.

huiusmodi Affectionibus, ubi externa opus est applicatione.

Composita est haec:

℞. Gum. Galicani,
Radii.
Ammon. an. ℥℥.

Opil. Thebaic. ℥i.

Dissolve in *Aceto destill. iterumque inspissa: adde*

Cera citr.

Coloph. an. ℥i℥.

Thuris.

Myrrha rub. an. ℥i℥.

Bals. Peruv.

Ol. Nilioph. an. ℥i.

Terra. ℥℥.

destill. Caro. ℥℥.

Terebinth. Persic. q. s.

M. pro Emplastro.

Quod insignes habet vires in doris Tumoribus partium

Abdominis emolliendis & resolvendis.

Item Emplastrum de Rana cum Mercurio Hyemis dictis, in calidus, irritis saepe aliis, est egregium, qualia etiam variis scirrhis hinc inde Abdominis Tumoribus commodè applicari valent: Vel ad liquefaciendam & emolliendam Pustulam viscidam;

℞. Gum. Ammon. in Aceto squill. solat. ℥i.

Tacamahac.

Emplastr. de Mastig. an. ℥℥.

Sol. Ammoniaci ℥i℥. vel ℥i℥i.

M. Lentis igne coque in consistentiam Emplastri. S.

Emplastrum Resolvens & Emolliens.

Extra in forma debita applicetur Scirrhis, vel Hepatis vel

Splenis caudè, & praestit effectum speratur.

℞. Empl. de Melilot. ℥i℥.

Galban.

Gumm. Ammon. in Aceto sol.

Asperges. in Aceto sol. an. ℥i℥i.

Tacamahac. ℥℥.

Ol. destillat. Chamomill. ℥℥.

Cera gutt. v.

M. f. Emplastrum: S.

Emplastrum Dissolvens.

Vel

℞. Emplast. de Rana cum Merc. dupli.

Splenet. an. q. s.

Malaxetur cum Oleo destill. Sucinae, aut alio,

Induc super alatum in forma debita.

Derur absque sindone: S. ut anteq.

℞. Empl. de Rana cum Merc. ℥i.

Gum. Ammoniac. in Aceto sol. & inspiss. ℥℥.

Opil. in Aceto sol. & inspiss. ℥℥.

M. f. Emplastrum.

Malaxetur cum Oleo destillato Juniperi, vel Philisoph. S. ut anteq.

℞. Empl. de Hydrysam. ℥℥.

Gum. Ammon. vel Galban. ℥i℥.

M. f. Emplastrum: S. ut anteq.

Malaxari possunt talia Emplastra usui tempore cum Oleo destillato Sucinae, vel, quod melius, ut in ingratum fetoris, Oleo destillato Gummi Ammoniaci, aut Oleo Tartari: nam quando destillatur Gummi Ammoniacum cum Viridi Aëris, post Spiritum volatiliem prodire solet Oleum ampyreumaticum foetidum, sed penetrantissimum, quo etiam Emplastra & Unguenta fiat admodum penetrantia. Loco huius tamen in Tumoribus duris, & ad Scirrhum inclinantibus etiam Oleum Philisophorum, Saponis, vel Cerae potest recipi.

Ante verò horum applicationem non incommodum fuerit, praemittere Inundationem partis à Pustula viscida infusae cum Oleo Laurino, Nicotiana &c. cum Oleo destillato Philisophorum, vel Gummi Ammoniaci tactu permixtis: item Unguentum Martiacum purgans commodè adhiberi poterit, si diti Oleis diluam.

BARTHOLETUS Tract. de Respiratione commendat Siuapissum humidum, quo utitur in Lienis infarctu & chylorum Induratione: Fit nempe ex Siuapi cum Urina coctulo & applicito inflat *Cataplasma*: Non est inaequant, nam si volatilis Urinae potenter penetrat, onitum cum sale volatili Siuapi Seminis (C).

Hinc de Morbis ex Obstructionibus, aut veris, aut falsis & putatis ita dicitur.

S E C T I O XIV.

DE RESPIRATIONIS VITIIS.

Circa Sanguinis permixtus in Vena axillari sinistra, pergit in Truncum Venae Cavæ descendens, & ita in dextrum Cordis Ventriculum, ex quo per Arteriam Pulmonalem seu Venam Arteriolem in Pulmones derivatur, & in suo transitu alteratur: ex Pulmone vero per Venam Pulmonalem, seu Arteriam Vespigam transferitur in finistram Cordis Ventriculum, Antequam autem Sanguis ex dextro Cordis Ventriculo pervenit ad finistram, pro acquirenda debita sui perfectione, ac novis debet fermentationis suscitabulo, ut abire queat in Spiritum, prius alteratur per Aërem Respiratione attractum: adeo ut hanc Respirationem sit tanti momenti, ut citra hanc perfectam, & pro Corpore gubernandam sufficiens Sanguis minime generari possit. Hoc ut fieri possit, dilatari debent Pulmones, ut Aëre Pulmonalis Sanguine infusa mediante illorum dilatione possit transmittere Sanguinem in Venam Pulmonalem. Quia Pulmonum dilatatio cum non fiat in Fœtu, dilatati Pulmones non possunt recipere eundem: propterea tota Sanguinis massa transit partim ex Vena Cava per Ovale Foramen in Venam Pulmonalem, & ita in finistram Cordis Ventriculum: partim verò ex dextro Cordis Ventriculo ex Arteria Pulmonali per Canaliculum Arteriolem in Arteriam Magnam, ita ut Sanguis non ambos Cordis Ventriculos permeet simul in Fœtus circulatione, sed alterutrum. Vid. HIGHMORUS in *Disquis. Anatomic. & SCHWAMMER-*
Tom. II.

DAM de Respirat. Facit huc Experimentum anatomicum, v. g. si in Pulmones ex corpore exsiccato flaccidos per Venam Arteriosam injectur liquor: quæ nihil transiit, simul ac verò Pulmones inflari continentur, promptè per eandem Venam injectis ferur liquor. Ut ergo traiciatur Sanguis, dilatandi sunt Pulmones. Verò dilatatio ita fit ita, quid scilicet replentur Pulmones, quia dilatantur: non verò dilatantur, quia replentur: i. e. Aër irruens Pulmones dilatat ac distendit, non verò Pulmones distendi Aër inhaerent: ita ut dilatatione Pulmonum & ampliorum Vasa, quæ recipiunt Sanguinem, & amplientur Veliculae simul, donec Aër irrumpens eadem distendat.

Dilatatio Pulmonum immediate sequitur motum Thoracis: de quo MOEBIUS in *Fundament. pag. 101.* item HIGHMORUS c. 1. ubi & Pulmonum motus aut Thoracis est animalis, dependens à Musculis, primario à Diaphragmate, secundario à reliquis Musculis Thoracis, nempe Triangulari, Subclavio, & Intercostalibus. Hinc Thoracis motum epique dilatationem sequitur Aëris ambientis propulsio, propulsio per Os, & Nares in Pulmones irrumpit, & ita horum dilatatio: nam cum nullibi sit Vacuum, sed omnia plena, necessarii ubique datur Motus circularis. Considerat hic SCHWAMMERDAM vir. lxx. CHARLETON in *Exer. 1. & in specie in LAMSWERDE contra Seleuam mordaciam, Respirationem nempe Schwaammerdamianam Respirationem*
Z. 2. Sub-

(C) Curandis huc solum vitiis familiarissimum & non solum ad obstructions tollendas, sed ad Tumores Abdominis firmiter emolliendos ac resolvendos, officiosissimum remedium, Balnea nempe ex Aquis mineralibus parata. Inter haec primum locum habent, quæ Gurgitelli nomine in Insula Aëria calidissima traxiuntur: secundum dicuntur, quæ trahuntur à Puteolanis, easque Subveni homini appellamus. His vulgo æstivo praesertim tempore, scilicet ad Morbos omnes Chronicos in Viscerum Aëria, seu morbi Obstructione pendentes, Petris Tumores, etiam duri horum Balnei emulsi solent: Notandum autem quod si Tumores hi cum duritie dolore quoque a tumore habent, solent ex immoderato praesertim horum Balneorum usu, fermentationem acquirere, & supereminente febre in suppurationem transire, non sine maximo agerum discrimine. Quod quidem in Praxi accuratissimi animadvertendum est.

Substantia Pulmonum à MALPIGHIO deprehensa fuit Vesiculosa, quod scilicet ea sit contexta ex copiosissimis parvis Vesiculis angularibus, simpliciter membranaceis conflatis, & sibi invicem coarctis, hinc inde eam Fibris motricibus pro earum vel dilatatione meliori, vel contractione doctis; quod necessarium; alias non fieret Sanguinis circulus: quæ Vesiculæ ab Aere per Asperam Arteriam irruente instantur & dilatantur, à contracto vero Thorace denovo compressæ, Aerem receptum iterum remittunt; vid. BARTHOLINUS *Traclatu de Pulmonum Sanguinis & Motu*. Non enim sufficit, ut dilatetur semel, sed novus inspiratur Aer necesse est; Huius vero Aeris portionem ipsam finis Cordis ventriculorum nra cum Sanguine ingredi in vivensibus, credit SCHWAMMERDAM. citat. *Tracl. item BARTHOLINUS Cnt. a. Appl. p. 481. contra Highmoream Tracl. sept. citate*. Aeris illa in Pulmones dilatatos irruptionem vocatur *Inspiratio*: eruptio vero, *Expiratio*.

Necessaria admodum est Respiratio, cum hac deficiente omnia intereat Animalia. Non tamen refrigerium Cordis & sanguinis, aut huius à nitro Aëre Sale condensatio, aut similis alia circumstantia primarius eius est finis, cum talia in Calore Viventium naturaliter constituunt, aut in Somnibus vel Cachecticiis tepescente, nullum locum inveniantur. vid. MARCUS AURELIUS SEVERINUS *de Respiratione Vitæ*, & MALPIGHIUS *de Rospito*.

Sed potius usum Vitæ nostræ simpliciter necessarium Aer inspiratus sanguini præstat: id quod confirmat (1.) Pulmonis parenchyma vesiculofum, quasi Officina aut linguaticationis, aut Sanguinis renovationis. (2.) Sanguinem in Pulmone est, ut de novo quasi vivificetur, intermedio temporis, dum ex dextro Ventriculo Cordis ad sinistrum pergit, per intermedios Pulmones prius circumquirit: & (3.) ut Terrellis Animalia Pulmones habent, ipsa possident Aquaria Branchias, eorandem vicarias: Quæ omnia necessarium planè circa Sanguinem per Vitæ cursum, Respirationis usum inveniunt.

Verus ergo Respirationis usus esse videtur, quod nempe Aer inspiratus & sanguini permixtus necessarius sit ad eam sanguinis vitam resuscitationem, & ultimam epi perfectionem, quam in pericordia acquirit, & eujus gratia continuato motu per Pulmones, tanquam instrumentum, fertur: nempe hinc Inspirationis usus est, ut attenuet, resolvat, & volatilet sanguinem, ut ita hic & promptius spiritus fiat, simulque apud reddatur pro omnimoda sui, sine ulla capitis mortui remissione, per poros distillatione; conf. ROCHAS *de Aquâ Mineralibus cap. a. de Aquâ sulphureâ*, & BOYLE *de vi Aeris elastici*. Facit hoc Aer ratione salis sui universalis, dissolvens texturam sanguinis salino-sulphuream, tanquam dissolutum ita rarefacientem, ut hinc promptè in Spiritus volatiles Vitales aëreo - salinos abeat: simul etiam ratione dissoluti & cum salibus volatilibus agitati sulphuris, insignem ipsam in Sanguine excalescentiam excitat: vid. HOCK in *Micrographia*, ubi de Carcinikar: adeo ut rectè afferat WILLIUS, Aerem inspiratum sanguinem primario incendere. Conferatur hic quod supra de Spiritibus dictum: vid. WILLIUS de hac incensione in *Respiratione ad Highmoream in Dissert. de Accensione Sanguinis*, NEEDHAM *de fermento Putri in cap. de Balneis*, contra. Willisum. Aer enim mensuri vicem obtinet ad corpora sulphurea comburenda, reinvienda: vid. HELMONTIUS *Tr. Blas humanæ*. Huic primario Respirationis fini & alii secundarii accedunt, ut:

- I. Promota sanguinis circulatio per Pulmones, hinc omnia ea, quæ rapidiore sanguinis reddunt circulum, etiam erebriorem & altiore procurant Respirationem.
- II. Pulginum ea præcedit hinc Expiratione exclusio.
- III. Facum alvinarum, ut & Fetus ex Utero excreto.
- IV. Excrementorum ea Pulmonibus per tussim rejectio expirando.

V. Vocum probatio beneficio Laryngis, quæ instat Fibularum Musicæ, seu pneumaticæ per Expirationem Vocem format.

Duplex autem actus constat Respiratio: Inspiratione & Expiratione. Si Pulmo ab Aere irruente dilatatur ferè, & Aer comprimit substantiam pulmonalem, sic *Inspiratio*; Expiratio vero, quando iterum Aërem elidat.

C A P U T I.

De Inspiratione lesa.

- Aeris illa in Pulmones dilatatos susceptio, seu *Inspiratio* inditibus tribus modis:
- I. Quando omnino cessat & aboletur, sed pils minus deficiit, seu suffocatur, ut fit in *Suffocatione diffusa*.
 - II. Quando non est sufficiens ordinarius hinc Inspiratio, & propterea fit solito, p debito frequentior & celebrior, & ita quasi succit in *frequentiori Respiratione*, de quo vid. SYLVIVS *Prax. l. i. c. 12. p. 12*.
 - III. Quando depravatur, seu cum labore se diffuciat fit, ut in *Dyspnoa*; de hac magis proptè cap. 2.

A R T I C U L U S U N I C U S.

De Suffocatione.

Abolitæ Respirationis, seu Suffocationis pils munda imminens Causæ sunt multiplices; ea triplici tamen fandiende fonte, quatenus Respiratio, seu Aeris admittio & reciprocario tollitur: vel

- I. Vitio *Diaphragmæ*, Aerem non transmittentem, ut Palati, Gulae, Laryngis: vel
- II. Fit vitio *Pulmonum* rianis configurationum, & Aerem extrinsecus irruentem, non admittentem: vel
- III. Fit vitio *Musculorum & Thoracis* ad Respirationis negotium requisitorum, Thoracem & consequenter Pulmones & alias partes non legitime dilatantium ac moventium, & ita Aerem non sufficienter impellentem, unde ob varietatem huiusmodi variis hinc defectus sunt,

M E M B R U M I.

De Suffocatione à Viis interclusis. In specie de strangulatis, & submersis, & imple

Quod actio nem Causam, nempe *Vias clausas*, non admittunt hinc Aerem, quando eas vel extrinsecus vel aliquis singularis, vel intrinsecus illud adheret.

Extrinsecus scilicet offert in specie *Strangulatis*, quæ à Laqueo injecto angustantur Fauces & Bronchia, & congesta Larynge intercludunt omnino Aeris transitu; quod fit in Suspendis: in quibus potendum, quod subest si stringitur Larynx, & angustatur Vasa sanguifera, in momento omnis sensus & motus perit, in specie senilis.

Ratione Causæ extrinsecæ fit etiam *Suffocatio*, si pils ob *Submersione in Aquam*, partem quatenus Aqua replet Fauces & Laryngem, partem quatenus impeditur Aeris admittio. Nam il, qui intereunt in Aquis, partim intereunt propterea, quia non possunt attrahere Aerem, partim quoniam Aqua stringit Pulmones, vel replet, vel linguam præstentem coagulat, ut suffocati intereant. (D)

Porro

(N) D. Jo. Cont. Beckerus anno 1704. libellum edidit Cæcilie Hallorum, sus tractus, Paradoxum Medico-legale de Submersorum morte sine pota Aqua, aliquot eadæ verum sectionibus detectum, & è principis Mechanicis illustratum. Experimentis obsequio primo, Animalia quæ Aquis submersa moriuntur, nullum de Aquam passis, vel eam Pulmonum vesiculas sufficere: nam Casuæverum scilicet nec Ventriculorum, nec Thoracem Aqua replentur, se deprehendit utat: quod autem Activum remanens residet, minime Aqua efficit Aer, qui scilicet enitum facile sui parat. Constat dein Mechanica legibus ostendere, hanc possibiles esse, ut Aqua Submersorum Pulmones vel Ventriculos subeat: etenim cum quis mergi cupit, tunc ex mortis mora moram non edat Inspiracionem, ut pils Aer omnino replatur, Aqua autem fauces obstruat, ac Epiglottidem premat, non solum viam sui in Tracheam præcludit, sed impedimentum quoque facit Expirationis: hinc conclusus Pulmonibus Aer, & in calore majorem vim elasticam acquirat, non solum non facit, esse inquam, adversus Epiglottidem, ut illam elevet, sed loca omnia, in quibus continetur, sunt summe dilatata, præcipue autem Asperam Arteriam: ex huius dilatatione comprimitur meatus Pharynx, hoc est infundibulum illud, per quod exhalantia & præstantia in Oesophagum illabuntur: ex quo mori non gressu quidem Aqua Oesophagum subire parat.

ut

Potest ad angustationes Viarum pertinere Tumores in & circa Collam, Strume internae, Inflammationes internarum partium ad Fauces pertinetium, five sit Inflammatio, five Tumor Fascium, Tonsillarum &c. five sit Inflammatio ac Tumor Musculorum Laryngis & Glulis in Aegina, five sint alii Abscessus & Tumores, in vicinia Laryngis geniti, qui omnes Laryngis dilatationem impediunt, & angustationes deperatas atque Suffocationem inferre possunt.

Pertinet huc varia & multa Aegria, quae vel quacunque ratione in Fauces, five in capite Oelophagi ratione nimis mollis, five in Larynge haerentia, occasionem praebere possunt, quod minus sperit quae Laryngis rimula five Epiglottidis, unda necessario sequitur Suffocatio. Tales sunt Boli grandiores, qui uti implent Fauces, & obstruunt Pharynx, hic necessario inferunt Suffocationem, si non occurrunt talibus: dum v. g. BARTHOLINUS Centur. 1. Hyster. Anatom. 11. ex labio deglutit Linguae bubule frasso Suffocationem fulgentem notavit: sic FORESTUS lib. 15. Observat. 31. refert nonnulla talia exempla ex comestione Bolorum, non parum suffocantur; ut quidam ex frusto Carnis lino induratae in Gula haerentis; quidam ex frustis Pomorum non rite masticatis, suffocati sunt fuerunt; alius ex frusto Tabaci &c. Quae interea haerentia, ratione irritationis sensibilissime difficultem Respirationem, aut pertinetiam ab Epiglottide clausura efficiunt, & ita Suffocationem inferre possunt. Pertinet huc inopia Deglutitionis rerum mollium, vel Epiglottide nimis elevata in Alperam Arteriam irruptionem, quae quod ioter eisdem & loquendum deglutitionem interdum contingit, indeque uocem vel alterum Arteriam Alperam ramum obstruunt, & Suffocationem inferunt: hinc Suffocatio a deglutito Phasolo in Alperam Arteriam illabente refertur in M. A. N. C. Anna 2. Observat. 253. pag. 240. Sic SUMPCHENIUS lib. 2. Observat. de sebre de Matrone mobili, fumptura Pulvis, quamvis in Alperam Arteriam attraxit, & inde ferè suffocata fuit. Plura videb. L. 2. & MARGELLI DONATI Hyster. Medici. mirabil. In genere quaecunque Laryngis & Epiglottidis motum debent ad dilatationem impedire possunt, Suffocationem minime: unde etiam Pili Epiglottidis casu involuti strangulationem inferre possunt. Conter. FORESTUS lib. 15. Observat. 31. videb. BARTHOLINUS Cylia Med. pag. 314. Sicut Uvulae alia suffocati fuerunt: Suffocatio ex Pyro crudo improvide deglutit mentionem facit RHODIUS Hyster. pag. 95. Facit huc etiam Polypus Nasium, ubi caro fungosa excrescit in internis Nasium, qui interdum nimis excrescit non tantum Nares obstruit, sed interdum quaedam crura in Fauces protendit, & unde non leve suffocationis periculum imminet; de quo & quae Carum loco plura habebimus. Sic & Struma, interea circa Jugulum abscondita, Suffocationem observat PLATERUS lib. 1. Observat. 273. Pertinet huc raris casus, dum ex prolapsu Palati, respirationem & periculum Suffocationem imminere notat TULPIUS l. 2. Observat. 31.

Haec est prima Causa, quando vitia Viarum sit Suffocatio.

DIAGNOSIS.

Quod signa Suffocatio si oritur a Vitiis interclusis, res est facillima, & per se patet.

PROGNOSIS.

Prognosis sub Aquis Suffocationem omnium optimè explicat ALBINUS in Tr. periculi. Nempe spei salutis nihil deficit:

1. Si Sanguinem ex Ore vel Naso erigunt.
2. Si Os habent apertum inflat moribusque.

CURA.

Quod Curam variat huc pro Causarum Antecedentium ratione.

Quando Vitiis affectum, quae non transmittunt, tunc impedimentum ex Vitiis est antecedens: sic v. g. Suspendis Laqueus solvendum, Vena secanda, Frictiones artuum infundenda, Spiritus liquida infundenda, in loco calido fo-

ponendi: Conf. Methodus revivificandi ludrici vel scilicet Suspendis in WEPFFERO, Tract. Observationum de hoc affeetu in Aegria pag. 182. ubi elegans est exemplum de Ancilla, quae per annum diem suspenda fuit Osonae: item BARTHOLINUS Cent. 2. Epil. 96. p. 717. HORSTIUS lib. 2. Observat. 5.

Sub Aquis Suffocati, ut ex Oris faucibus revocantur & resuscitantur, docet HELMONTIUS Tract. Deventi idea §. 50. item BARTHOLINUS Centur. 8. Hyster. 61. Neap. pelatis pedibus, inclinato corpore, concutendi sunt; ut huiusmodi Aquae effluit mure: vel reponantur supini inclinati capite percutiendo pedes, & ita revocando quantum possibile vitam. Huius encephalitis addatur Methodus BORLEI, l. 1. qui Suffocatis talibus Panis affati micis Spiritu Vini calide imbutas admovent, calque saepius repetat; & hanc ubi reviviscere incipiunt Aegri, pro alteratione corporis interna extrigenda, propiuntur Sudorificis spiritibus: vel interiore FORESTUM lib. 15. Observat. 36. propinando calide Decoctum Fiorum Chamomillae in Cerevisia factum, evadendo in lecta ludendo; qui ipso etiam in. Inc. Puellum duorum annorum in Aquam Saponeis iorum delapsam ferè mortuam leni Vomitu curavit. Plura de Submersis conf. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Observat. 20. pag. 30. Observat. 75. pag. 104. Observat. 76. pag. 105. Observat. 85. p. 125. Observat. 125. pag. 162. & Observat. 130. pag. 173.

Quando in Fauces exeat Boli, istorum descensus promovetur concussione in Dorso, ubi est via Oelophagi, ac propiuntur Lubrificata, ut Oleum Amygdalarum dulcium, quod assumatur in Aqua appropriata, & Mucilago seminis Cydoniorum, FORESTUS loca supra citata frustum Carnis sumo indurata in Gula haerens leni deglutitione Calidam, cuius beneficio lubricatum fuit Oelophagi iter, ad ventrem promovet: sic Suffocationem imminuentem ex frustis Pomorum non rite comminatis, per lambitionem Oxytellis squillitici, incisus sic frustulis, & sponte ad Stomachum delabentibus.

Præ ceteris observatum est a FORESTO, quod ex potu Aquae Fortis Fauces ferè occlusae, exhibita Mucilago, feminis Cydoniorum lambendo deglutita, curatur fuit: Veli in grandiori malo intermitur PLATERUM Observat. pag. 316. & quae Officula Glulis infusa, unde dolat & ardet, & per coactionem Laryngis spiritus angustia, per Cataplasma, maturans & suppurans applicatum, facta suppuratur, & cum pure Quicquid excretionem promovet. Si hoc non potest fieri, maturare res est extrahenda instrumentis Chirurgicis, vel promovenda ex Vomitus artificialis, succedente Medicamentum lambendo, vel Vomitus maturis digitis procuratur, Si res deglutita haerent in Larynge, aut Bronchiis Alperae Arteriae, maturare excidendo est Tullis, vel promovenda violenta Secernatio, ut sic illa res excipiat ab irritatione, & provocatur Vomitus, aut huius conatus efficiatur per Fauces (E).

MEMBRUM II.

De Suffocatione ex Gas variarum rerum

Secunda Suffocationis plura minus imminenti Causa est in Pulmonibus infarsit, aut Aerem irremptentem suffocationem non admittentibus: quae pertinet non tantum variis Mucus viscidus Pulmonum bronchia obdum, ut in Asmatice contractis; item Excretionis in Pulmonibus natae Aeris introitus impeditur. In specie tamen substantia Suffocatio interdum imminet vitia Pulmonum, quando sanguis quacunque ex ratione vitiosa flagrat, & Serum impositur in Pulmonibus, colore nimis replet, & ita Respirationis octogium insigniter impedit, ut angustia tales suffocantes consequantur: sic PANAROLLUS Ann. 2. Observat. 43. exemplum habet Suffocationis ortae ex nimia Sanguinis abundantia, & ita nimia Venarum turgescencia a Sanguine copioso ac turpido, & quo Sanguinem per Pulmones motus fuit impeditur. Ad Suffocationem propter Pulmones eviemtem etiam referri solent: ubi frequentissime, quae ex Exhalationibus, seu Gasibus

ut in Venarum defendat. Moratur igitur Animal Aquae submersum, non quod Aqua Venarum & Pulmones infarsiat, sed ut eo tantum, quod respirare non possit. Hae est Beckeri sententia, ad hoc quam vulgare experimentum rescribere videtur, quod scilicet, qui Aquae submersi, undam tamen mori sunt, pedibus suspensus, ut Aquam, quam submersum evomeret, sicque resuscitaret.

(E) Commotionem est Boli, Carnis frusta, Officula, & similia faucibus haerentia, adque Spiritus interclusum, Causa de terra aliquantulum incursa in gulam immisa, deprimere, & verius Oelophagum deturbare.

Aer, ut reddi vocat HELMONTIUS, Multi à Cerevisiarum, aliorumque Liquorum fermentantium & effervescentium, ac Parietem recentium à Calce via recentem incrustationem, Animalibus imminet; Item quæ inspiratio Fumo Carbonum acetosorum, item ex Gas metallicis in Metallis suis originem ducunt: Item quæ ex Putris & Crysipis fubterraneis, Lactis pluvialis oculis, ex Fornicibus Lithantracum diutius oculis & subinde exhalant; quæ etiam famosi hausti Odores, Fumi minerales acidi volatiles, ut Antimonij, Sulphuris incendi, Spiritus Vitrioli, Aquæ Fortis, & similes Fumi aut Vapores, utpote quæ omnia subitaneam plura minus Suffocationem, vel ejus saltem periculum inferant. Exempla quamplurima obvia sunt: De Gas ex effervescente Mullo, & fermentata Cerevisia suffocante res mira est: In Cellis enim vinariis, quando fermentat Cerevisia recens, & effervescent Mulum, si qua ingrediatur eum Faculis arentissimis, illa illas exstinguit, ut ne scintilla remaneat.

Quæstio jam est: *quæ ratione talia Gas vegetabilia vel mineralia, seu Fumi exhalantes, tam subito Animalia quæcumque pugnantia ac ardentissimas Facies exstingunt?* an Sanguinem in pectoris afficiendo, & ad sui coagulationem & consequenter flagrantem in Pulmonibus dispoſcendo, ita ut ægri Catarrho Suffocativo sanguineo intereant? an vero ipsi Fumi & Gas saltem Spiritus Vitales & Animales afficiunt? quos vel insular Candelæ extinguendo, *narcosi & futuri afficiendo, ad regimem corporis inepti reddunt, quæ ægri quasi apoplectici intereant?* Præter pro aris & focis proximis defendit SCHNEIDERUS l. 2. de Catarrhis a. z. l. 2. lib. 2. ubi confirmat fumi hypobæstis, quod nos ipsi percipimus, hauriendo tales Fumos sylvestres, angustiam in Thorace, & Præcordiis, & subitè difficultatem Respirationis, quibus percepta non turbetur statim Caput, sed prius Pectus: ubi nihil ad se redeunt, plerumque Vomitus exerceant, & micata multa sponso vel arte, ex Naribus & Ventriculo rejiciuntur: & in specie, quid ægri à affectu possit curantem nunc Pleuritide, nunc Peripneumonia, nunc Rauce diem, nunc Febres, nunc Tabes, aliaque similia symptomata, ut plurimum eam ipsam circa Os, & Sanguinis & Pulmonum nota nata, iolectia sunt: Ut etiam simul Lethargus vel Apoplexia invadat, aut ad se redeunt debent interdum, non tamen esse signum prius affecti Cerebri, quin potius Spiritibus Vitalibus, his Fumis imprægnatis, ad Cerebrum promissa supervenire tale symptoma, non vero proprium Morbum continere: quæ quæ conf. SCHENCKIUS in observ. quæ habet ex BARÆO. Posterior vero HELMONTIUS, alique defendunt. Multi, quæ inter & MARCELLUS DONATUS, volunt imprimis affectum esse Cerebrum. Fundamentum erroris est in eo, quod puerum Veteres Respirationem atque Aerem in Cerebrum per Os Griseiforme, dicunt ergo hos Fumos per Naris atrahit & promittit per Cerebrum, atque ita Spiritibus Animalibus lethargicos interni affectus, HELMONTII Hypobæstis confirmant aliquæ symptomata, nempe à tali Gas inspirato affecti, Carotearum vel Apoplecticozum insular se habent, & prius Vertigine caduca, seu tenebrosa correpti concidunt; hinc insular demortuum absque pulsu aut saltem via sensibili, toti frigidum, quasi Syncope correpti, jacet: hinc & Vomitus subinde in principio adest, excitatio vero nunc Lethargus, & nunc Delirium refert, modo ex Somno provocantur, evigilat quasi somnolentes.

Ex his duabus Hypobæstibus posterior magis probabilis videtur, ut suo modo cum priori conciliari debeat, eum nos improbabili videatur sententia, reverè suffocari ægros tales, & ex alteratione subitanea Sanguinis per Pulmones circulantem, hinc Spirituum Vitalium incubata extinctione, & continuati radii cum Spiritibus Animalibus interfectione, omnia ista mala oriri videntur. Reverè ex una parte Suffocationis subitaneæ, & impedito Sanguinis tam fermentativo quam circulatorio motu, videtur species; ex altera tamen parte affecti sunt Spiritus Animales, & consequenter Systema nervosum. Et reverè Apoplexiam, & quidem postquam, prout HELMONTIUS eam in Tr. de Lib. distinguit, refert symptomatum concursus, cum Apoplecticorum insular & jacet, atque in vitam revocandi sine ægri. Nempe, sicut Gas tale in momento mirabiliter extinguit ignem quemcumque Candelæ aut Faciæ, ut ne scintilla superminuat, destruendo activitatem Spiritus, seu Salis nitro-seris, à quo conservatur Ignis & Flamma: (Gas metallicum satingit Lampades Metalliflorum, ut ne vestigia maneat: si soffores hoc vident, volant, ne preant, dicendo: *Vapor insurgit*) ita simili ratione tale Gas inhibet alterationem Sanguinis ab ægri inspirato, beneficio illius

Salis Inducendam, unde subitaneæ Fermentationis Sanguinis defectu universum Spirituum tam Vitalium, quam Animalium, Systema turbatur, & in fomite quasi eclipsi patitur; simul tamen certo sapore afficitur, & narcosi quæ paverina inquitur. Spiritus generatur ita nobis per Fermentationem mediane Aëre, cum accensione, ut enascatur Gas saltem volatile limosum, quod vocat Spiritus, qui à Gas extitit aut inquinat infertur partem suffocationem, partim Apoplexiam sanguineam positivam: vid. SCHENCKIUS. Confirmat hoc & Carnis, tales enim plures Carotici jacent, vel Apoplexia tacti. In specie tale Gas inspiratum graviter Ventriculorum affligit, & epos occasionem Vertigines, & similia Capitis symptomata inducit. Illustrat hæc etiam, quæ in specie MAYOW Tr. de Mors. & ap. p. r. Nihil aëre cap. 7. & l. & BOYLE in sua Machina; pariter nempe Aëre ad Ignem & Vitam Animalium esse necessarium; & ut Aëre alteratio aut defectus subitè Ignem extinguit, ita etiam Vitam tollit: quod cum fiat ab Aëre vitium, reverè ab Respiratione plus minus vitiatum tales ægros simul ledi apparet. Percipitur talis ægri angustia Præcordiorum, quasi suffocatio mori in principio, non quasi Aer crassus Pulmones nimis replet, ut ex crassitie Respirationis ineptus sit, sed mos videtur extingui Spiritus Animales, & suffocari taliter affecti; quoniam ex hostili præfectio Aëris vitati inspirati, Pulmones & Thorax se stringunt, ac minis pro admitendo Aëre se dilatare volunt: hinc mos sub primo talis Aëris inspirato Pectoris angustia; vitatio postmodum Sanguinis fermentativo motu, ac superveniente hinc Spirituum Vitalium subita eclipsi, & hypobæstis Syncope, etiam Spirituum Animalium deficiencia in motu, indeque Vertigo, Sensus & Motus abolitio oriens, propter interruptum summe necessarium radiolum Spirituum ætærum, pari ratione atque Suspense in ipso, quæ contrahuntur Carotides, mox eadem symptomata supervenient, propter interceptum Spirituum continuatorem. Interim tamen adhuc dubium refert, *Quomodo hoc Gas inspiratum Sanguinem in Pulmonibus atque Spiritus animalis alteret?* Sane Gas hanc motum fermentativum Sanguinis insular motus ignem, mos extinguitur, Spiritus Animales frigere, manifestum est: sed quæ vi hoc præfert? queritur, non Sanguinis coagulatione, quam alii hic incantant, minus falsificat. Sane Gas ista omnia sunt nature volatilis sulphureæ, unde obviunt & hebetant vim Salis nitro-æreæ, à quo ut conservantur Flammæ, ita conservatur Fermentatio & Spiritus-fecundia vitalis in Præcordiis. Quod Gas tale fit quodammodo de natura sulphurea, patet ex Carbonibus, quorum incinerum Sulphur, minerali similimum, benedico Lixivii & Alkali fixi eliciendum, dissolutum exhalat, Gas hoc constituit. Ita Gas metallicum aut minerale, soffores insular, præter odorem sulphureum, quem spirat, Arsenicis ab omnibus dicitur esse curum, quod Arsenicum crudum & volatile Metallum Sulphur est.

Quod denique Gas ex Cerevisia vel Mullo, aliisque liquoribus fermentantibus, exhalat, etiam fit sulphureæ volatilis nature, patet ex affectu ineptitudo, sopore & narcotico, quem insular ægri, quasi Spiritus Vani uberior se ingurgitantes, qui Spiritus Vani sulphureæ nature est citra controversiam. Ab hoc Sulphure-volatili etiam via narcotica Gas horum inspiratorum deducenda videtur, liquorem & narcotici Opil in ejusdem Sulphure volatili fundata est, sicut tales per Gas exhalans affecti, non secus ac affecti per Opata nimis induci per Calorem durantur. Hæc demonstrant, quod ejusmodi Gas pollet æli sulphurea superflua, unde partim Apoplecticis, partim Suffocatis intereant tales ægri, & magis sunt affecti Spiritus Animales.

C U R A.

Contra hæc mala, vel imminente, vel etiam jam afflicta, nempe contra Gas, aut tales Fumos inspiratos, Fumus nempe Carbonum, Aërem Cellarum aut Puteorum, duo primarium obtinent; nempe *Aërem & Carbonem*. Notum enim est, quod Aërem quibuscumque Narcoticis, ipso etiam Opio, fit contrarium, eorumque correctivum, non secus atque Calorem, ideo, ut refert NARDIUS in *Necessis Genial. lib. 1. pag. 76*, quod à Fumo Carbonum Somnolentia solo calido vapore Aceti Naribus suscitetur, fuerit curata. Hinc Acida admoveantur Naribus, Acetum scilicet rosaceum, ruacum, aut simplex cum Calore, aut Aqua Hirundinum cum Calore: vel hanc Moduli ex Nigella & Semine majoranæ, quæ infunduntur Aceto, & applicantur Naribus, utque fricantur Tempora: aut infunduntur in Os unum alterutrum oleum Aceti: item imponitur Epithe-

ma ex Aceto Scroto & Telluris. *Acerum* *Sticticum* *lousdillum* secretum fuit D. LANGII, ex Vitruolo artificiosè calcinato, & cum Aceto destillato, quod asperum est in Morbis Soporosis, Leithargo, Caro, Cataphora, & similibus Catarrhis Affectibus: imò etiam in Affectibus ex fumo Carbonum, & Gas sivelesti suffocatis existendiis.

Talibus ergo *Ægri*, præmissis in specie *Humis*, idque ed potenter, quæ magis Caroticorum aut Apoplecticorum infar jacent, infundatur *Acerum*, & cum Aceto quocunque parata remedia, idque coactantur; vel etiam *Acerum* *Calorem* *milium*, vel *Acerum* *infusum* *Calore* *diſto* modo usurpatur, quod in talibus Suffocationibus à Fumo Carbonum & Cerevisia effervescente est egregium. Non solum convenit in suffocatione à Gas minerali, sed tantum vegetabili: Scilicet, ubi haustum Gas sivelesti, & malum gravius, infunduntur Vomitoria liquida commodè cum Spiritibus, cum Spiritu Theriacali, simpliciter aut camphorato, aut Aqua Apoplectica, aut Effluvia Calore, aut similibus missa, ut simul extingatur Gas malignum & ejiciatur: nam mirum est, quantum excutitur *Ægri* per Vomitoria: Simul etiam *Respiratoria* infundenda Naribus. Item la *Acerem* exportatis sunt *Ægri*, Os deducendum, continens Venus facientes, Facies erodere Aqua frigida adspargatur, hinc Acida & Calorica conducunt, Calorem enim convulsos in corrigenda erudicatio & virulentia Opii, in quo est tale Sulphur narcoticum, ut in Sulphure Carbonum, & in effervescentium Vegetabilium fumis & vaporibus: similiter incidit sanguinem congestum; copioso enim Sale volatili est imprægnatum: v. g.

Æ. Aqua Menth. ʒi.

Acri Theriac. ʒss. vel ʒvi. ad ʒi.

Castor. ʒss. ad ʒi.

M. D. S.

Potio ad Caput infundendum.

Cochlearim affumatur, præmissis vel subsecutis Vomica.

An larga Venæ sectio conducat ad imitationem PANAROLLII? fere dubito; nisi forsitan in Plethoricis, aut Obesioribus, in quibus natura tardior est sanguinis motus, pro quo melius promovendo conducit, seu locum invenit: vid. PANAROLLUS *esse* *lors*. Plura de his videb. in SENNERTO l. 1. *Præterea*, ubi de *Cerep.* p. 656, item SCHENCKIO ex *Parsi* p. 317, l. 2. *Obſervat.*

MEMBRUM III.

De Suffocatione Convulsiva.

Tertia denique causa suffocationis hæret in Nervis & *muta spirituum Animalium*, non moventibus Musculis, Thoracis aut Laryngis motui dicatos: Hinc etiam fortè Apoplexia tædi non tantum infar strangulorum suffocati intereunt, propter deficientem Thoracis & Pulmonum motum; sed præterea quoque in Syncope, & similibus pathematibus, deficient sanguinis & spirituum in Pulmonibus motu. Tandem propter Nervorum cessantem motum, ex spirituum Animalium defectu lethalis suffocatio supervenit, quando ex resolutione Nervorum paralytica cessat partium Respirationi infervientium motus; e contra suffocatio imminet ex spasmo aut Convulsione Muscularum & Nervorum, Respirationi infervientium: ver. gr. dum Mulieres Hyſtericæ, aut viri Hypochondriaci (perinde namque hoc est, uti habebimus *sur loco*) interdum suffocari videntur, in quibus Nervi parvi Vagi & Intercoſtales spasmo affecti, qui, uti omnia Viscera interna Abdominis, ita in specie Musculi Thoracis & Laryngis coſtringunt; percipiunt enim tales *Ægri* angustiam Faucium, quasi ligore strangulatur, idque ex Convulsione seu Spasmo Muscularum, Laryngem imprimis, & hinc Diaphragma moventium, quibus convulsus Larynx stringitur, & Epiglottis claudicatur: tales *Ægri* plura minus suffocantur; quæ stridura nihil aliud est, quam Convulsio Muscularum, & partium nervorum.

Quod talis suffocatio imminet sit ex Nervis, redit hoc derivat exindo WILLISTUS in *suis scriptis*, imprimis in *Ann. Cerebr.* cap. 10. & in *Descriptio. Nervor.* cap. 36. ubi redit quamplurima (non omnia) Morborum Hyſtericarum symptomata à tali Nervi Intercoſtales Spasmo, & contraſtura deducta.

Nec solum WILLISTUS Ratius hanc Convulsioem, sed reperit etiam in SOLENANDRO *Conv.* 22. de diffiſili & periculossimo affectu in Musculis Laryngis & Aspera Arteria, ubi sæpius imminet suffocatio, idque, uti redit de-

cidit & differt, ex Convulsione Laryngis: uti similiter singularem Laryngis Convulsioem, & inde natam suffocationem, habet BARTHOLINUS *Cent.* 4. *Epist.* 77. p. 454. In paroxysmis Epilepticis, item Virorum Hypochondriacis sæpius imminet periculum suffocationis, quod subito perit & redit: suntque hæc mala cognata admodum Asthmæ Convulsivæ, (*de quo infra*); subito ut dico accedit, & recedit, sine omni materis sensibilibus accessione & recessione: nempe in talibus casibus semper affecti sunt Nervis, ique vel Laryngem, vel Diaphragma moventes. Peritque hoc, quando ex Venenis nonnullis assumptis, in specie ex Fungis ob id dictis strangulatoriis, quemadmodum proſtant exempla, fulsade oritur suffocatio. Nam & hæc similiter ex affectu Nervis, indeque Laryngis, & Diaphragmæ Convulsione: uti probabile est. Facit hoc etiam singularis *Obſervatio* Pl. ATERII in *libr.* 1. *Obſerv.* pag. 171. de imminente suffocatione ex Coito, de Rustico alias robulo & ſano; qui, quoties cum Muliere non habuit, semper in suffocationem quasi lethalem incidit: imò ipso aliquando fuit in eo hac domitica adeo sedulus, ut in ipso actu animam capere vellet. Novum namque est, quod *Cicras* rectè appellatur *Epistola parva*, propter quasi Convulsioem quandam in tali actu, quo efficiuntur Nervi: unde ex simili convulsivo affectu Nervorum, Thoracem moventium, talem suffocationem in Coitu natam fuisse, probabile est.

Hæc sunt Suffocationes Convulsivæ.

SIGNA.

Quæd signa sunt petenda ex eo, quod simul alia coincidunt symptomata, quæ Mulierem vel Hyſtericam, vel Marem Hypochondriacum ostendunt: item, quod huiusmodi suffocationes paroxysmatim repetant, nec continuè affligant, ex levisima causa redeant, & sine materis cuiusdam sensilis excretionis demum cessent.

CURA.

Pro Cura talis suffocationis Convulsivæ, in Paroxysmo eadem in genere conveniunt Remedia, quæ in Passionibus Hyſtericis, aut Affectibus Epilepticis in usu sunt: quæ inter eminet Castoreum, Effluvia Calore, Calorica & Salia volatilia, in specie Liquor Cornu Cervi fuscini, spiritui Salis Ammoniaci simplex & anisatus, Sal volatile Succini, & etiam Oleum destillatum Succini, item Salia volatilia cum Camphora, & ipsis sociata Opata: uti imperſerim *auditis* *Cap. de Affirmis Convulsivæ*, & videbis in WILLISTO de *Morb. Convuls.* p. 314.

Æ. Aqu. Menth. vel *Falegi*, vel alius *approp.* ʒiij.

Castor. ʒij.

Opi ʒss.

Spiritus Sal. Ammoniaci ʒi.

M. D. S.

Potio ad Respirationem.

Vel

Æ. Aqu. Menth.

Fler. *Sambor.* an. ʒij.

Spiritus Sal. Ammoniaci ʒss.

Effus. Opi cum alcal. par. ʒss.

Syr. Corri. Aurant. ʒiij.

M. S.

Potio ad Respirationem,

Deur cochlæarim,

Æ. Aqu. Menth. ʒiij.

Spiritus Carminis de trit. ʒij.

Lapill. *Caner.* *prop.* ʒss. vel ʒij.

Laudan. *Hyſter.* ʒss.

Syr. Corri. Aur. ʒij.

M. D. S.

Potio ad Respirationem.

Sit ex Fungis sit malum, hocum Alexipharmacum est Oxytel squillitum, vel solum vel cum Theriaca propinandum, præmissis pro circumstantiarum ratione, Vomitorio. Conf. de Fungorum medela TIMÆUS *Pro Cudendicis* in *Cal.* p. 311. Item PANAROLLUS *Præter.* *Obſerv.* 43. aliique. Conveniunt etiam Spirituosa camphorata, Spiritus Theriacalis camphoratus, &c.

CAPUT II.

De Respiratione Depravata.

Læditur Respiratio, quando eadem depravatur, ita ut nimis crebra, difficilis, laboriosa, ac non raro cum inigni conatu & anxietate, ac in qua subinde imminere videtur Suffocatio, perficitur; nempe in *Dyspnoea*, cujus primus gradus dicitur alii *Anhelitus* impliciter, & fit, si ægri frequentius & crebrius respirant, qualis Respiratio eorum, qui distentur cursu defatigati sunt. Secundus gradus dicitur *Anhelitus affectuatus*, si frequenti ac summo cum labore Respiratione ducitur, ut nisi fiat, Suffocatio imminet: qui ubi adeo ingravescit, ut ægri non possint amplius supini jaceere, sed cognoverit *stridit*, seu erecti respirare, subleati aliis de modum expanso pectore, oritur tertius & deterius gradus, qui *Orthopnoea* vocatur: de quorum Orthopnoeicorum erecta Respiratione HELMONTIUS Tract. Tæxi & *Asthma*, item *Catarrh. Delirium*, §. 43. lit. F. Nam simul ac tales Orthopnoici incumbunt in dorso, imminet Suffocatio: simul ac verò erecti respirant, levamen percipiunt. Omnia autem hæc in genere Asthmatis nomine vocabo (F).

ARTICULUS I.

De Asthmate.

História Asthmatis hæc est: scilicet adest in omni Asthmato Respiratio frequens, equa laboriosa & difficilis, cum anxietate circa præcordia, ut anxios nesciant, ubi levamen potest percipere: adest sæpè Tussis, interdum crebra & molesta, interdum non; interdum adest Stertor, interdum sibi omni Stertore Orthopnoea laborant.

PARS AFFECTA,

Subiectum & Pars affecta sunt Pulmones.

CAUSÆ.

Cum autem Asthma sit multiplex, idcirco Causa proxima omnis *Dyspnoea*, & *Orthopnoea* est deficientis admissio & reciprocatio Aeris, propter expansionem & contractionem Venarum plus minus debentem, quæ insigniter impedit Respirationem tollit, & hinc anxietatem & angustias, ut & Suffocationis periculum infert: si ve Pulmonum, si ve Thoracis, si ve aliarum partium impedimento, hoc ipsum evenit. Notum namque est, quævis expendantur & contrahantur debet Pulmones, tamdiu esse Respirationem liberam, simul ac vero aliud impedimentum se offert, addebat difficultatem respirandi, anxietatem & similia, nec legitime Sanguinem circulari.

Veteres, multique ex Modernis, unam saltem Asthmatis speciem sibi concipiunt, ab obstructione & compressione Bronchiorum dependentem, & si sine manifesto Pulmonum infarctu Asthma contingat, Vaporibus & Flatibus, ab aliis Visceribus adiacentibus, hoc tribuant, ficut SYLVIVM quoque egisse, ex *Stripsis* ejus constat. Pro diversa tamen Causæ morbose natura, ejusque diverso situ, HELMONTIUS Tr. Tæxi & *Asthma* §. 12. Asthma dividit in *Humidum*, & *Siccum* & WILLISIUS in *Parh. Cerebri* in *Pneumonicum*, & *Convulsivum*; imò ex his duobus Mixtum addit: vid. *Pharm. Ratiom.* P. 2. h. 3. c. 12. Mellioris ergo doctrinæ gratia in genere secundum citatos hos Auctores, qui primi nobis in hoc puncto oculos aperuerunt, dividam in *Humidum*, & *Siccum*, seu, ut alias vocantur, in *Asthma Manifestum*, & *Occultum*: *Asthma Humidum*, seu *Manifestum* est illud, quod à materia quadam vitiosa fovetur, ut ab ejus presentia, moru ac occasione oriatur, ab ejus verò excretionem, aut vomitu, aut quoqueque modo facta remotione & promotione, idem cessat. Idcirco etiam tale Asthma Humidum frequentius conjunctum habet Tussim, simul Stertorem, Expectoracionem copiosam, & Serratam, sed tamen non semper. Dantur enim Asthmata Hu-

mida, ubi nec Tussis nec Serratitas adest, sed conqueuntur de difficili Anhelitus interno, interdum certis quibusdam Paroxysmis exasperatur: Interim tamen, si imminet Paroxysmus, fit succussus, & Ægri percipiunt longè ante Paroxysmum ex conservata materia peccante; dum cessat Paroxysmus, fit cum sensibilibus materiæ peccantis remotione & excretionem. *Asthma vero Occultum*, seu *Siccum* est, quod citra præsentiam talis materiæ, frequentissime ex sola Convulsionem partium, Thoracis & Pulmonum motui intervientium, in specie Diaphragmatis, oritur, unde & sine sensibilibus materiæ excretionem cessat.

Primum *Asthma*, manifestum seu *Humidum*, ratione soci & loci morboi, est duplex: nempe oritur interdum ex Pulmonibus, hinc *Asthma Pulmonale*; interdum, aut quidem serè *impis*, oritur ex Stomacho & primis viis, esseque *Stomachale*. *Asthma Humidum*, quod fit ex vitio Pulmonum, est multiplex: frequentior causa est Mucus crassus viscidus, tenax & mucilaginosus, quævis alii vocant *Pneumum viscidum*, nunc salsus, nunc acidus, nunc viscidus, ex deficientem naturali, & depravata præternaturali Pulmonum nutritione natus, qui ipse succussus in proprio Pulmonum parenchymate, maxime in Bronchiis eorum, conservatur, & hærens, non raro impedit Aeris ingressum & egressum, & ita vitiat Pulmonum dilatacionem & contractionem; vel Pus in Vomica, Abscessibus Pulmonum, Empyemate, Pleuritide vel Seram copiosius inundans Pulmones; vel Sanguis in motu per Pulmones plus minus impediens, vel ob abundantiam, vel ab acido coagulationem, vel ob nimiam turgescenciam & quali ebullitionem, vel ob vitium cachecticum. In Stomacho & in primis viis est vitium, si Mucus crudo & inde natis Flatibus obducatur: item si ab Hydropoe Abdomen nimis occupetur.

Siccum seu Occultum Asthma fit vel ratione conformationis in Gibbosis: item ob cruda Tubercula. Grandines, Calculi, &c. Bronchi obidentes; ob deglutita Pulmones obstruunt; item propter deficientem Pulmonum nutritionem, indeque horum corrugationem & exsiccationem, sive ratione Convulsionis Nervorum & Musculorum Respirationem intervientium, Diaphragmatis, Laryngis, aliorumque; vel denique ratione Fibrarum propriarum Pulmonum nimis stridarum ac contractarum, Vascularum dilatacionem impediendum; idque coincidit cum Causis Pulmonum HELMONTII. Specialius parò hæc explicanda veniunt: *Asthma*, quod fit ex vitio Pulmonum, & oriturimum intelligitur sub Asthmatis mentione, vel per *Ergasma*, vel per *Metastasia*; per *Ergasma* vitio nutritionis propriæ depravatur; per *Metastasia* vitio materiæ ex Sanguine, vel immediatè vel ex alio loco mediante Sanguine aut Lympha, ad Pulmones depositæ.

Per *Ergasma* igitur fit Asthma, quando vel vitio Aeris aut vitio aliorum inspiratorum, v.g. in Metastasis solioribus, vel alia quacunque ratione, irritantur Larynx & Aspera Arteria, ita ut exinde harum partium latus digestio, & nutrimentum proximum degeneret in liquorem serosum mucosum, aliaque ratione corruptum. Præter inspiratorem etiam Lympha consideranda est, quæ uti continè hærere dicitur Asperam Arteriam, ita, si ab Aere inspirato aut quacunque ratione latus, exoritur, aut alia via vitietur, & in specie, si aeris, salsi, aut plus minus acidi reddatur, aer ionia sua erodendo Pulmonum tervem substantiam, nutrimenti ejus depravationem, & ita succorum crudiorum ac mucilaginosorum conservacionem infert. Nempe hoc est, quod PETRUS JOHANNES FABER in *Parh. tradit*, scilicet excrementa in Pulmone ab ejus alimentis inextricata & abundancia, esse causa Grandinis, vel Lapidis, Tartarique coagulati, si indurcant. Quod si verò aliud sit liquidum, oriri Asthmata, Tussis, & Catarrhos suffocati vos, si scilicet liquidum hoc excrementum in lentam, glypticam, & vitream mutetur visciditatem, verum produci Asthma. Hinc frequens imprimis hoc est lit, qui in Mineris metallicis sunt occupati, ut qui Mineralia, Aquas Fortes, Antimoniæ, & in specie Mercurialis, trahant, & in laboribus Chymicis versantur; inspirant enim tale Gas, seu Pannus acrior & malignus cum Aere, ita inquisit digestionem Pulmonum, or loci assimilationis alimenti proprii hoc ipsum degeneret in varii generis excrementa: uti de hoc eleganter differit HELMONTIUS Tract. Tæxi, & *Asthma* §. 44. Pertinet hoc etiam quæcumque materia inane prope Pulmones hæret, & liberum eorundem motum impediens, ut fuit

(F) *Primo est spiro: bene* Dyspnoea, spiritus difficultas: *Orthopnoea*, Orthopnoea, cum erecta servata spiritus ducitur, *Anhelitus*, anhelitus & suspirium: *anab* de, ab spiro? *anab* de, quod est constrictio corporis, calorem asilare, ex Eulathio. *Harmato forti* ab *an*, cano; *anhelitus* enim sibilum edentes canere videtur.

imprimis Abcessus & Apoplemata, Vomitus Pulmonum, quod ob Pus genitum, vel pulmones corruptos, inferunt Asthmae asthmaticos. In omni Pulmonum Vomica difficilis est Anhelus, Vid. POTERIUS l. 1. c. 17. & RIVERIUS c. 58. §. 2. Sic namque DODONEUS, ex quo etiam SCHENKIIUS & alii habent Auctores, refert in Obs. 19. exemplum Asthmatici mortui, cujus in pulmonum inferiori sede & bassi, quia Septo transverso incumbit, reperti sunt Abcessus duo insignes, in utraque parte unus, à quibus inundati pulmones materia purulenta Asthma lethale induxerunt: Vid. HILDANUS c. L. m. 19. Hinc etiam Pöbelius, item Empyematis, ut plurimum sunt Asthmatici, & frequenter Orthopnea interuenit, propter Pus, quod vel in Empyemate in cavo Thoracis fluctat, vel propter Pus, quod unum alterumve latus pulmonum inundat.

Per uicinas sunt Humida Asthmata pneumonica variis ex causis: v.g. dum Felices custione interdum solvuntur per decubum in pulmones materie in sanguine coctæ, cum copia reiectionis, præsertim mediante Tussi, omnia postmodum levatur mala. Quin & Serum in corpore copiosius quocunque casu occasionali retentum, ut fluxiliore sit sanguinem, ita etiam Asthmata talia inferre solet: unde hinc inde Observationes prolant, ex Galieno Seris evacuationibus suppressis, obortum Asthmaum: vid. RHODUS Cærese. 1. Obs. 27. de Orthopnea ingenti, oborta ex Sero sanguinis, quo pulmones & ejus circumiacentia loca repleta fuerunt: id quod patuit per solutionem, quoniam intra 24. horas fuit levata per excretionem 36. librarum Urinæ. Nec Serum tantum, sed etiam sanguis ipse, non solum quocunque occasione in cavum Pectoris effusus, sed quocunque ratione in suo motu impeditus, ac in Vasis pulmonum flagram, aut tardius per eos circulatus, quo etiam impeditur subinde ebulliens aut turgescens, Asthma ac Orthopneam inferit: sicut graviter talis affectus dicit Catarrhim Subacutum ex sanguine: de quo supra. Confer. WILLIUS Pharm. Rational. p. 2. pag. 259. Hinc et. quod post Curium seu Motum vehementiorem simus quodammodo quasi sustineret Asthmatici, quoniam sanguis per motum rapidum ac veloxem per Vasa motus, vi tam promptæ circulari potest per Pulmones ex dextro Cordis Ventriculo in sinistram, quæ nonnihil subsistat, ac in pulmonibus hæret; unde tale Asthma, seu diffusio pulmonum nonnihil impedit, quia non sufficienter & debite potest circulari sanguis: Unde videmus etiam, quod Malisibus, quibus suppressi sunt Menes, item V. ut, quibus suppressus Hæmorrhoidum fluxus, Asthmata supervenire soleant: quia in talibus sanguis copiosius recentis abundans hæret, & quodammodo circa pulmones flagrat, & non facile potest circulari. Quid vero in sanguis mensuri & hæmorrhoidalis suppressione sæpius se impedita circulatio in pulmonibus, patet, quod talibus tam frequens symptoma est Sputum cruentum, seu sanguinis. Cathedrici porro ad unum omnes ex levissimi corporis motu sunt Asthmatici plus minus, quatenus in his sanguis crudus, ex cruditate Ventriculi acidæ, & quasi semichylus ex defectu digestionis primæ, diutius hæret in pulmonibus, tardiusque in istis movetur, propter tardiores ac Aere rarefactionem & alterationem, propter glutinosam paulo consistentiam, ratione quorum mensuri levis motu per pulmones circulari potest. Unde ceteris motu sanguine sub corporis motu, facilius circa pulmones subsistit, ac Asthma tale inducit.

Facit hoc, quod ex Terrore, in quo sanguis admodum ad similem sui in precordis flagnationem disponitur, Orthopnea lethalis oborta fuerit: teste FORESTO l. 16. Obs. 49. 10. In genere quicquid sanguinis circulum circa Præcordia, vel per pulmones quocunque modo sufflammat, Asthma inferit; hinc quocunque materia, aut in pulmonibus, aut in sinistra Cordis Auricula coagulata, flagram;

Tom. II.

Dyspnoeam lethalem inferit: ita RIVERIUS Cærese. 1. Obs. 81. tale exemplum habet ex Dyspnoea mortui, in quo post mortem reperta fuit materia viscida coagulata in sinistra Cordis Auricula, à qua impeditus sanguinis motus dedit Dyspnoeam lethalem (G). Facit hoc, quod Pons subitaneis frigidi polli labores, aut corporis nimium incalcescentiam, aut etiam Lotio corporis in aqua frigida poli nimio æstu, Asthmata inferant; quæ in talibus poli nimium æstu aut motum, Massa sanguinis infingenter attenuatur, dissolvitur & fluxilis redditur: ita subito vero rei impemis frigida, vel Potu, vel intempestiva applicatione rei frigide, sanguis grui moros factus in pulmonibus flagrare, & ita necessarii Asthma inferre solet: de quo RULANDUS in Thes. pag. 112. ubi refert Dyspnoeam jam suffocantem, & ferè lethalem ex haustu copiosa Aquæ frigidissimæ, ob ingentem scem in intestino Canicularum æstu excitatam, per Vomitus Aquæ Benedictæ subito restitutam. Simile exemplum Asthmatis, excitati ex Potu frigido, & Balneo frigido, habet etiam GABELCHOVERUS c. 3. Cur. 17. & 18.

Tandem & Hydrops Pectoris Asthmata gravia inferre solet.

In genere quicquid in pulmonibus, vel sanguinis motum, vel Respirationem graviter impedit, Asthma inferit, quæ Inter primatum obtinet Mucus ex depravata pulmonum nutritione oriendus.

Ex modo dictis obiter duo observanda sunt:

I. Sanguinem, Lympham, Serum, & Materiam vitiosam quavis in Pulmonibus, quæ Asthma tale inferunt, non dissolvere ex Capite, nisi falsis putantur Majores nostri, sed omnem istam solummodo ex Vasis, vel sanguinis vel lymphaticis, eo inferri, five fiat immediatè, five mediatè, mediante nempe Alimentis degeneratione, aut Lymphæ alteratione.

II. Asthmata hæc Humida eo esse vel graviora, vel perniciosa, quo magis Materia peccans armoniosa sit, aliavè pulmonibus nimia impressio, hos aut Alperæ Arteriz ramos irritaverit, ac ita eorum fibras el pertineatque sui contradictiones stimulerit.

Ceterum Asthma tale Humidum, seu Manifestum sapit hæc in Symptomata & primis viis, quam ipsi Pulmonibus: ut plurimum enim talium stomachus, nisi manifestum sit in Pectore vitium, ex Cruditate acidæ & viscidæ, repertur infarsus Materia crassa, plus minus viscidæ ac machinosa, &c. Placibus generandis apta: (confer. L. 1. §. 1. ANUS, & GABELCHOVERUS lib. 4. Obs. 4. & 5.) quæ ubi quocunque ratione fuerit agitata, turgescere & quasi inflari incipit, sicque gravia & periculosa admodum dicit Asthmata, per paroxysmos subinde assurgentia: unde etiam in tali Astmate ægri conqueruntur de angustia Præcordium quæ Collis nobis, dicunt: Non posse se expedire: partim quia nimia distentione Ventriculi à rubus copiosis Succis & Placibus onerati, impedit istarum Diaphragmatis motum deorsum versus, quod tamen ad pulmonum distentionem maxime est necessarium; unde etiam tales sunt Asthmatici imprimis post pastum, dum etiam Alimenta vitiosa fermentatione turgescendo, distentionem istam Præcordiorum, indeque Diaphragmatis motum impediunt: partim vero, quia Diaphragma ipsum quodammodo simul in consensum trahitur ex irritatione Stomachi, ut eius Contrusio tandem, & hinc perverfus sub Respiratione motus sequatur; ita ut arbitretur plura esse Asthma Humida, quæ radicantur in Stomacho, quàm in pulmonibus. Id quod apprime confirmat GABELCHOVERUS Cærese. 4. Curat. 20. & Annotatione: quod scilicet illi, qui Asthmata sint obnoxii, ferè habeant Ventriculorum frigidum, imbecilem & flacculentum; quoniam in talibus ex vitiosa digestionē conservatur mæstigia, & cruditates

A a

ac-

(G) Helvetius Humida Asthmata, ex Pulmonum infarctis pendens, casum ait esse sanguinis crassum, quo densus acrim per est in Venis & Arteriis pulmonem refluens, finit ut per orandem vasorum poros viscidum Serum extrahatur, quod Bronchiis & Tracheæ Arteriæ adhaerens libere Aere transire obicitur; atque hinc Respiratione ambula & suspensio. Hinc præcipua ad curandū hæc Morbum curatus Indicationes ait esse, sanguinem subtiliorem, viscidiorumque reddere, atque crassum subiremprimis vias subtiliorem educere. Pro primo scopo attingendo, præcipua remedia esse ait, Sublime, seu sale acido fixo utantur, sapientia & ad 3v. usque singulis diebus, exhibere, ac Tabaci fumo familiarissimi uti. Nicotianæ enim partes salina, ut A. ait, vis fo bras vellaciter streant excitant; atque insuper saliva volatilibus (suborta quibus plura pollet, cum Aere in Fecula: pulmonum dilata, spissiter sanguinem, & viscidum Serum incidunt, atque ad excretionem disponunt. Sublime vero Nix hic passim pro fustis utitur: quare hoc Morbo affectus ad Forum Vulcani (vulgi Solitaria) prope Patetia mittitur, ubi incensa fulvis sublimis minera, per hians per foras in loci montis rimas, non sine fragore transpercutitur fumum emittit, quo salis insectus per non mediocrem spatium Aer, Asthmaticis, Phthisicis, Empyematis, aliisque Pectoris morbis obnoxii, non leve offert emolumentum. Quibus autem eorumdem non illi illic adire, terra eadem subspora, quæ antiquè montis plantis facies, hinc translata usui est: aperta enim estia, concavum leno igni superimponimus, ut sensim liquefacto, cubicalum, ubi per boream autem alteram agere agros, tenuissimum fumo campis.

acide. Hoc sunt æstimationem est de omni Asthmate Humido-pituitoso, aut Palmonali quom Stomachali: in talibus Asthmate ex vicio primarium viciū ipsius etiam adsum Flatus, qui insignitè Dyspnoeam antecedunt. Sic qui laborant Cruditatis acida Stomachi, & qui exinde originem ducunt, dourpntici & Hypochondriaci, sæpius post pillum, puerumque perserpunt, difficultatem patiuntur Respirationis, itaque saltem vicio Digestionis primæ Cruditatis acida, & indeque nato viscosissimo Humore Flatum, & rejicere solent tales Ægri multa vitia per os, quæ ipsi non tam ex Pectore, quam ex Stomacho, eriti solent. Confirmat hoc, quod Vomitu præsertim epistimodi Asthmata laborantes levius habent. Refert RULANDUS in *Tafel. Prax. pag. 112. & 119.* de curale Asthma per Vomitus, dum repetit Picuatæ Jectæ cum Bile permixtæ sint aliquot libras. Item SYLVATICUS in *Centur. 2. Conf. 49.* oblietvæ Asthma singulis noctibus recurrens cum suffocationis periculo, à quo non prius Æger fuit immunis, quam succederet sponte Vomitus alumporum & matorum pituitosæ sc. TIMÆUS in *Epist. pag. 122.* refert Asthma contumacissimum, & nullis cedens remediis, vehementer eandem provocato Vomitu curatum immo scio aliquo Scorbuto, qui, quando post pillum vel haustulum Viti haariunt, brevi hnt Asthmætiæ. Talem Asthma ex Flatus, & Hypochondriacum dicitur à RIVERO *Asthma Nictum*: effluat inde saum ex coctissimis Uguis Mali Hypochondriaci, quando Ægri à pilla, aut interdum mane, dum respirant in lecto accurrant, conseruatur de difficili Respiratione, propter impedimenta circa Hypochondria; est enim ex Stomacho, & Hypochondriis, partim Flatus, partim à Materia viscida in Stomacho & vicinis regionibus hærentibus, dilatais & oueratis. Hydropsici denique confirmati tandem etiam sunt Asthmatici: partim propter librum Diaphragmatis motum impedium, partim propter dilatos Musculos Abdominis, Thoracis dilatationem, & sursum versus elevationem sui sublationem impeditens; partim propter copiosius retentum Serum, crasin Sanguinis vitia, & acrimonia sua Pulmones nonnihil relicans; hinc etiam & suffoculos tandem reddunt Hydropsici.

Asthmatici interdum pariuntur Stertorem in Fauibus, & Pusio, & huius medio Materiam viscidæ excretionem, qui Stertor vultu signum habetur infarctum pulmonem: sed observari, quod etiam in Stomacho infarcti à tali Mucco talis Stertor & Tussis aduenit, ut vultu adscribat Pulmonibus. Distinguit autem faciens est Stertoris: Quidam est ex Pedore, si vitium hæret in Bronchiis Pulmonum, vel ramo Alperæ Arteriz; tunc enim Aer recipere materiam quatit & conculcit, unde Stertor ex profundo auditur: quidam est ex Fauibus, si scilicet circa Membranam Pituitariam posterorem Mucus copiosus est in conbatate Laryngis & Epiglottidis, & quali oblinuit. Reverè ergo Stertor iste amnis oritur ex Lympha viscidior, ex Membrana Pituitaria postleriore copiosius erudata, quæ in ista fimbria hærens, seu reciproco Aeris motu circa caput Laryngis agitata & commota, talem Stertorem seu Dyspnoeam superficalem infert, similem illi, qui in nocte à nobis dorso incumbetibus auditur, *qñas in Gusture*, ubi precipitatur Somus.

Hæc est prima Differentia Asthmatis, scilicet Manifesti & Humidi, cuius dixi materiam viscidam imprimis, & ut plorizum hætere in Stomacho, rarè in Pulmonibus, nisi sit ex vicio sanguinis non ritè circulati.

Alterum Asthma, Stercorum nempe, seu Stercorum ab HELMONTIO dictum, ut istud, quando circa alium fomitem materialem, vel materiam sensibilibus cupulam accessionem, aut recessionem, aut excretionem, Patetymos & subitè incipit, & etiam subito cessat, non verò successivè tale Asthma mirabile, neque per Expectorationem, æque per Vomitoria, neque per Purgantia, solet levati, sed hæc videtur corpus purificatum, pertiactiter rames perissit. In vadit nunc periodicè, nunc vagè, vel propter motum Aai, ut, ut terrorem; vel propter motum Corporis, ascendendo in alium: aliquando durat, & cessat sine manifesta causa, iterumque advenit levissimè ex causa: Ægri eripiuntur Asthmate momentaneo, sunt alii fani, donec Patetymos veniat. Varia huius Asthmatis Exempla admodum curiosa vid. in HELMONTIO, *Tract. Asthma, & Tussis, §. 41.*

Differentia Causalis horum Asthmatum est varia. Nempè.

I. Vitiæ Conformationis partium ad Respirationem pertinentem; hinc enim omnes Gibbosi fere evadunt tandem Asthmatici; aut etiam, qui alias male conformatam Spinam

doti, quæ impedit Expirationem pulmonem legitimum, obtinent; Quæ etiam facit Sterni ex Collarum notarium vitia conformatio, orta ex Sterni cum Collis ad inferiorem reflexione; quæ exemplum refert SCHENCKIUS in *Observat. ab de Respiratione, seu Differentia respirandi*: Item cruda Tubercula aut Grandines, similitique, variz excresecant in Bronchiis pulmonum: Tumores scitiboli in pulmonibus, Calcoli itidem, vel intra Bronchia pulmonum successivè geniti hos ipsos obstruunt, & ita liberum Aeris commotum impediunt, quæ Asthma ratiore observatiois HELMONTIUS l. 4. §. 43. vocat, & inter Humidum & Siccum ambigere pronuat, vel etiam extra Bronchia incumbentes eadem angustantes: aut alia concreta prænaturalia, sive in patentibus pulmonum, sive in Bronchiis pulmonum hærent; talia etiam Asthma, sero coacta & incurabilia infert solent: vid. FORESTUS lib. 17. *Observat.* 10. item HELMONTIUS *Tract.* supra citato §. 93. ubi Exemplum habet Asthmatis lenticis, ex Calculis punctatis in pulmone & Bronchiis reperitis sic à Scirrhus pulmonum Asthma in M. A. N. C. *Ann. 3. Observat. 662. pag. 474.* SCHULZIUS: & Calculus Alperæ Arteriz aut tunc comprimitur Asthma lenticis notat KERRINGIUS *5. quæst. Observat. 72.* singulari etiam est Exemplum TULPII lib. 2. *Observat. cap. 7.* de Dyspnoia admodum duratura cum tussis, orta ex potamine Nervi Avellanæ, capiti Alperæ arteriz inherente.

II. Huc itaque primario, Asthmata Sicca inferunt Conuulsiones Nervorum aut Musculorum, Thoracis motui, & Respirationi inferiuntur, Diaphragmatis in specie, & Laryngis aliorumque, vel per se, vel per contentum, ut cesset, aut debilitat motus Thoracis dilatatoris & constrictionis, quo cessante Asthma adeit; Nervi enim irritati convulsivum motum in Musculis erant, unde hi ipsi convulsi Expirationem ritè percipere nequeant, in specie Diaphragma, ubi tali convulsivo motu affectum fuerit, Asthmata talia vocat HELMONTIUS *Sicca, & caducum pulmonum*: WILLISIIUS in *part. nervi, de morbis convulsi. cap. 12.* item *Pharmac. Rat. p. 140.* vocat Asthma convulsiva: quia à convulsivis partibus respiratoriis interviuntur, à quacunque causa coactingens, oriuntur: LINDANUS vero in *Colleg. medicæ super. Hartmannus* Asthma tale sicum omnino optimè appellat Crampam, seu convulsivum diaphragmatis. Nulli tamen horum latitudinem affectus debet exhaucire: in genere, atque ad specialia transire, dico, talia Asthmata esse Asthmata convulsiva. Ac apud veteres alium est de his sententiam quod Theoriam, ut ut qui attestat prædicos legit, plurima hinc inde talium Asthmata, tam occultorum quam manifestorum, reperiant exempla apud eos. Attamen omnes ferè veteres prædicos, excepto HELMONTIO, & WILLISIO, sui præconcepis hypothetibus occæcati, unum saltem speciem Asthmatis, sibi concipiunt, & Asthmata talia convulsiva ex mucos pulmonum, & infarcti Alperæ arteriz: est sine manifestilo pulmonum infarctu coniungit, & vaporibus, & flatibus pulmonum, vel alia ratione derivare volunt, ut ut ipsi, interdum videntes difficultates, ultrò fateantur, quid sufficiat se extricare non possint: legatur HELMONTIUS, qui plura habet exempla. Præter Asthmata talia sunt in PISONE *Tract. de morbis à Cellivis serva oris pag. 192. & 122.* ubi talium Asthmatum originem ex hypochest per serum, frustitatem tamen conari, explicare nititur: item PLATERUS in l. 1. *Observat. pag. 161. & 172.* cum videret, quod non possit conciliare tam suspensa exempla cum infarctu pulmonum, dicit oriri ex catarrho, quod subitè ex capite in pulmones, & Thoracis musculis derivatur: item JOHANNES COLLE, *Medicus Italus, in Tr. Consiliorum Medicarum pag. 159.* idem, & similitum Helmontianis refert exemplum, in quo tandem nolens volens fateri cogitur, oriri tale Asthma à præavo motu pulmonum & constrictione, seu à stictum & Fuligine copia. Ipse SYLVATICUS talia Asthmata ex vaporibus, & flatibus, & intestinalis oriundis, & pulmones replentibus derivat. Multa exempla talia recenset SCHENCKIUS *pag. 334. & 237.* ubi *Observat.* item MARCELLUS DONATIUS in l. 4. *Medicæ med. mirab. lib. 3. cap. 12.* RIVIERUS *cent. 3. observat. 15.* FONSECA l. 1. *conf. 12.* item BENEDICTUS SYLVATICUS *cent. 1. conf. 60.* Hic SYLVATICUS de l. simile Helmontianis habet exemplum, ubi casus est syncope epileptica, cui coniungitur est Asthma non sine suffocationis periculo, nuchè imprimis, ubi supinus iacebat ager, affligens propter vaporem quandam, quem sentit ex ventre inferiore ad superiora delatum, & ad fauces: Vid. quoque *conf. 6.* SYLVATICI *sem citati* de palpitatione

Cordis cum Syncope, simulque angustia & difficultate spirandi ex virio Hypochondrii insitit.

Sane incipit mori, cum Venere viderint, moveri Thoracem per tot & tam insignes Muculos, quare tantopere & frustra se macerant in Asthma hoc periclitando, nullamque respiciunt ad hos Muculos habuerint: Revera enim frequens Asthmatis Occultus Causa haeret in Muculis convulsis, primario quidem in Diaphragmate, secundario in Muculis reliquis; unde pro variata Muculorum est varium. Cerebrum hanc sunt Althama, eorumque Exempla imprimis in HELMONTIO, & hinc in WILLISIO *de sensu* locis possunt videri. In Diaphragmate quidem consilio recte urget hanc LINDANUS, quod talis Asthmatici conqueantur omnes, & se sentire ingentes dolores & angustias circa Collas notas, & difficilem constrictionem insitit Zone circumspiciat in ista regione, ubi Diaphragma annexum est: id quod hanc violenta Diaphragmatis deorsum versus constrictione & convulsione, quod ita convulsus dat talem sensum constrictionis; unde postmodum & reliqui laterales Muculi, five Inspirationis five Expirationis inferiunt, simili ipsa correpti, gravium malum reddunt, ut plurimum tamen convelluntur, qui Inspirationis videntur infervere. Exemplum talis Asthmatis Convulsivi manifestum habet HOBOKEN *Tractatus de Anat. Senectutis in Dipt. pag. 314.* ubi Ager rectus fatus fuit; si vero supinus, totus Thorax cum impetu convulsus fuit fursum, ut Respirationi insisteret; convulsi fuerunt omnes Muculi, qui dederunt Asthma periculissimum.

Facit hanc difficultatē Respirationis in iis, qui patiuntur *Thoracem dorsi contractum*, & quasi cingulo circa Collas notis confixis, difficultatē admodum respiciunt, propter Nervos ex Vertebra subaxillares procedentes, nonnulli comprehendunt & hinc scissiles irritant. Item pertinet hoc Asthma Convulsivum & Occultum Mulieribus, seu *Myricum*, quod in Viris vocatur *Asthma hypochondriacum*; nam in Myricis. Pueris in praeter varia symptomata alia, saepius insignis est respirandi difficultas, ita ut aeger ante momento insilicet inspirandi, quod tribuit HELMONTIUS ad hunc regiminis Uteri, in Viris Splenis vitium, cum tamen simpliciter oritur a Convulsionibus, vel Diaphragmatis, vel Muculorum Thoracem moventium, vel Muculorum Laryngis consensum Nervi de tendentia, unde loqui non possunt. Patres hanc afflicti cetera sunt Muculi Respirationis, asperitatem Inspirationis, inferiunt; five sunt Diaphragma, five Thoracis Muculi externi, aut Intercolles; five Muculi Laryngis & Fascium. Exemplum tale, quod insignis hanc facit, habet HORSTIUS lib. 5. *Observ. 32.* de Muliere hystrica, gravi Asthma afflicta. Curavi Studium, Francum, tali Asthma afflicto, qui simul erat periculis hypochondriaci omni nocte sub media nocte recurrebat, percipiebat in Abdomine marmoream; evigilando reterebat, *consequi se ipsi in aëre durabat per horas, donec loquens evigilaret, tunc discutiebatur; conquebatur quasi circulari circuiret: Per Vomitoria, Martialis, & Volatilis, in specie per spiritum Cassia-natum continuatum curabatur.*

Facit hanc rara & notata digna THONER *Observ. lib. 2. Observat. 2. pag. 94.* nempe obliquis illa constrictione Laryngis & Fascium, (cum quasi laqueo angustia illas partes sentiant) & Orthopnea, cum suffocationis periculo ob Fanguis summo confixis, una cum aliarum partium vagis Convulsionibus, excutitur ex *Prothymia laryngum*, quibus excretis Orthopnea & partium Convulsionibus cessant. Quando ergo jam inferunt in Convulsionem aliarum partium, certum est, quod Convulsio Thoracis similiter de Asthma & Orthopnea. Vitium hic querendum est in Nervis, infque imprimis parvis Vagi & Intercolles. Afficiuntur autem hi Nervi, vel in exortu in Cerebro & Cerebella circa radices, vel in progressu circa varios eorum Plexus, nunc superiores circa Pedus; nunc, idque frequentius, inferiores, nempe Mesentericos; vel denique in ipsis Muculis, quibus intercurrent: Confer. WILLISII *Pharm. Rational. p. 2. p. 241.* Utriusque possunt Exempla: Ubi afficiuntur Plexus in Abdomine, aut Mesenterici, aut Lienales, aut similes Nervi, cum quibus conspiciant saepe rami parvi Vagi & Nervi Intercolles, ubi antecedit vel adiunt simul Mesenterici & intercolles Convulsionem, quam Umbilici inferiora versus violenta constrictione, & totius Abdominis constrictione, aliaque ejus symptomata sequuntur, in specie murationes, borborygmi, subinde quidam verniculationis sensus uno altero in Abdominis loco: vel percipiunt tensiones Hypochondriorum, & similia praeputia alia, quibus Mulieribus in Pulsionibus Myricis, & Viris Hypochon-

driacis solent esse frequentia: Exempla curiosa videb. in HELMONTIO. Ubi verò radix mali haeret in Capite circa radem Nervorum, ibi sine tali sensu in Abdomine, fore gravius Vertigo, alteratio in Capite ante paroxysmum, aut alia Capitis pathemata, quae motum inordinatum spirituum in Cerebro innuunt, solent esse adiuncta. Quae denique ex ipsis Muculis afflicti sunt, pro Muculorum varietate diversa sunt. Puerum observavi 11. annorum, qui quamvis vespere, praesentem in pulsu, tam crebra ac violenta Respirationis inordinatio afflictebat, in eo malum saltem oriebatur ex Diaphragmate afflicto; idque, ut videbatur, per consensum Ventriculi: nam Vomitoria propinato ferè in totum cessavit malum.

In specie, cum huiusmodi Asthmata Convulsiva, quae maxime ex Nervis & Muculis afflicta oriuntur, incognita sint apud Praedicos; notetur, quod multiplex admodum varietas in his observabilis sit, idque tribus imprimis in Causis:

1. Propter texturam & tractum seu distributionem plane singularem *Nervi Intercolles & parvi Vagi*, qui duo Nervi cum submalleis suis Nervulis in Thoracem & Abdomen, praesentem movendis membris, ac partibus etiam Colli, Thoracis & Abdominis, & ultra mirabilem sui structuram, & distributionem, & pluribus Plexibus hinc inde diversimodè locantur, & hinc per consensum mutuum varios ac insignes spasmos ac motiones, etiam remotioribus in locis excitare valent: vid. WILLISII in *Anat. Cerebri*: quae ratione Nephriticis quodam diffinitione Respirationis laborantibus, hinc non raro Asthmata Convulsiva incurrere, quorum fomes latet in Abdomine, ibidem afficiens Nervos, ex quorum consensu Thoracis pathemata, ut in Hypochondriaci notam est. Adeoque mihi rectè in quovis Asthma, vulgò ad pulmonem saltem habetur referre: sic enim ex *Med. p. 339. & 468.* habet, ut & Orthopneam insignem ex Calculo Renum, quod deturbato Respiratione libera reddit. A Nervo Intercolli tamen etiam forsure dicitur: Visculae saccharae, ita ut, prout dicitur funiculi magis vel minus conflunguntur vel laxantur, Visculae istae sunt pro Aëre potentiores vel minus receptivae.
2. Causa secunda est varietas & multiplicitas *Masculorum mirabilium* duplici motu, dilatationis & constrictionis, tam Laryngis quam Thoracis, intervencium, & tam in anteriori quam posteriori Thoracis parte situatorum, una cum Diaphragmate; qui omnes cum variam structuram & distillum motum, & hunc vel dilatationis vel constrictionis Thoracis intervencium, obtinent; hinc suis peculiaribus habent functiones, & suis miras alterationes, mirum non est, quin Muculis afflicti diversimodè, etiam functionum sequantur laesiones, & tam insignis varietas circa Asthmata Convulsiva observetur.
3. Tertia Causa est *duplicitas Motus*, universalis nempe & Motus uniuscuiusque Muculi in specie. Duplex est Motus Thoracis dilatatorius in Inspiratione, & constrictionis in Expiratione, qui se habent nonne activè nunc passivè: His Motibus dum varii Muculi diversimodè intervencium, sequitur, quod hi duo Motus variè iundi, & variis modis tam in Expiratione quam Inspiratione vitari possint. Facit hoc periculosis exemplum HOBOKEN *supra allegatum*.

Idud verò, quod in Asthma Convulsivo afficit Nervos, tam in eorum radice, quam progressu; ut plurimum est Aetiam vitiosum plus vel minus auctum, Nervis, uti notum est, inimicissimum: In specie sub forma *Lymphae crassae*, acidæ, five in Plexibus Abdominis, five in Plexu Lienari, five in alio loco, in Abdomine conservato, five in Cerebro aut Cerebri consolis prope Plexus Choroideos, Nervos vellicat & irritat, eoque in spasmos deducit (spasmo contractus Muculos in familiem spasmodum & alium redit). Hinc Scorbutici, Hypochondriaci, Mulieres Myricae &c., non raro tali affliguntur Asthma: non secus ac si, quia quodlibet Mercurialis pro Cura Lisi Venere male sunt tractati, aut ferè ipsi Cura Aëri incautus se exponebant, his subinde Nervorum impressionibus vitiosis Asthmata Convulsiva sunt familiaria: Confer. HILDANUS.

Pertinet pariter hoc Arthritica confirmati: & in quibus vel rariis vel difficilis Paroxysmi Podagrici superveniunt, in talibus huiusmodi Asthmata solent insperare. Exemplum

plum referam: Victor senex, sepius aliis Arthritide affligit, cum Paroxysmi huius requiem concessisset, sensim difficilis supervenit Respiratio, quae interdū etē tolerabilis: Elebat moderatē, satis interdū etē vegetus, sed postquam cum cubitum levasset, nunc imminente somno, nunc cum eum alterative horam dormivisset, ex improvviso antea praecedentem suffocantiorē superveniebat, unde nisi suffocari vellet, mos coquebat ē ledio allurgere, mensaeque assidere crederis, ubi altam, aethalem & densam agbat Respirationem, atque per tres, quatuor pluresque horas, donec malo successe remittebat, cum tantilla saltem materiei viscidæ refectione, ipse lectum repetere, & lectum postmodum dormire posset. Interrogabatur interdū exacte, ubi percipiat impedimentum Respirationis? Monstrabat regionem, quae circumscibitur Colla Nothis, in specie Hypogastricum, quasi ibidem fortissimè conflingeretur: In ipso Paroxysmo dicebat, se percipere *sufuram* in Abdomine, tandem subito accidere somnum quemdam singularem in regione Epigastrica; quo facto, malum breviter remittit, & lectum repetere potest. Tragedia haec omni modo recurrebat, varia incassum fuerunt adhibita: optatum erat, ut post cibum parcam, ingrederetur Paroxysmo, Theriacē vel Mitridatē, quantum caput culiculi culpis, caperet, quod paroxysmum vel sufflaminabat, vel insigniter levabat. Interim pro variate tempestas vel gravior vel lenior erat. Tandem cum post aliquot septimanas Chiragra Brachii & Manus superveniret, modò dicti paroxysmi cessant.

Affluata haec Convulsiva seu Sicca sepius solent esse hereditaria, non secus ac Convulsionēs Epilepticae graves, unde cum subinde sunt hereditariae, tedeunt etiam quodammodo, sequuntur tempestuam mutationes, & Ephe-meridum loco Aegris interveniunt, atque nunc vagi, nunc ut plurimum periodicis inferunt paroxysmos, certum tempus reculas obducunt, imprimis tempore vespertino infestant intermedio tempore Aegri sint maxime laesi, & etiam cessant sine sensibili remotione materiei. Verum interdum est aliquid, licet parum, Muci emittant, quae non Causa peccati est, sed est conatu Respirationis circa Laryngem & Fauces aliquid colligitur, quod evacuatur. Ubi cessaverint aliquid, facile per multiplices occasiones externas, v.g. per arduandam, mutationes tempestuam &c. recidivam incurant.

III. Tertio loco Asthma Occultum oritur vitis Pulmonis, aridi & flaccidi reddit, instat membrana corrugata & excitate, idque propter deficientem concordem nutritionem, unde in talibus subiectis ex tali excitatione, ariditate, & candidia Pulmonum, necessarii oriuntur Asthma. Exempla non sunt rara: praeter ceteris vid. RHODIUS *Casus*. 2. *Observat.* 21., ubi habet aliquot exempla Asthmaticorum, ex tali ariditate & flacciditate Pulmonum mortuorum: Sic SYLVIVS *L. Prae. Med. cap. 24*. Exemplum habet simile de quadam Emphysematica, in quo post mortem aperto, in dextro latere reperit fuit Emphyema aequum, ex Seris & Puris permixtum, cuius lateris dextri Pulmo totus arefactus, flaccidus, & tabe confectus repertus fuit, quod ipsum rectè adscribit impedire nutritioni Pulmonum: Vid. quoque a. 22. p. 302. Quod etiam disponit crebrior Nicotianae Fumus, immediate afficiens Pulmones, eoque plus minus ad atrophiam disponens, non vero caput immediate alterans.

Hoc etiam facit Affectus, quem vocant Germ. *die Bergkucke*, qui est Asthma, ostiendum ex inspiratio *Fumus Montanum*, Ictericis graviter Pulmonum nutritionem: Metallum enim, & qui Aquas Fortes, Ginnabarin, & Astringentem conficiunt, uno verbo, qui continuo exhalationes Arificiales, Virtuosas, Mercuriales, alioque metallicas Vapores, & Carbonum Fumes per nares atque os atrahunt, rari de integritate Pulmonis, atque Respirationis sui graviter queant, quidam observant esse in secliosis Cadaverum quosdam Artificum, Pulmones adeo fuisse excosatos atque flaccidos, non secus ac si fumo indurati essent: vid. BARTHOLINUS *Crit. 4. Epist.* 25. Et quidem primario Asthma oritur ex vitio Fibrarum ipsarum Pulmonum conflatarum, & pertractarum coarctularum, atque ita debiliam Vascularum expansionem impediunt. Stridura ista pulmonum ferè est sensibilibus, quando nempe qui Odorem acido-sulphureos, v.g. Spiritum Natri aut sulphuris accendunt, vel Butyrum Antimonii, Aquam Fortem recentem, spiritum salis Ammoniaci generosum, ac similia odoretenus haurit; mox enim halitus suspenderit, Fauces & Thorax conflinguntur, ac spiritus intercipitur, angustia percipitur intra Pectus, & denegata Respiratio, in qua Thorax per se salvus, ob internum autem impedimentum se expandere nequit, sed propter pulmoem Fibras admodum sensiles, oc-

casione inspirati obiecti, & Odoris exotici quasi conflatus, & inde difficile redditum Inspirationem, a motu cessat: Pulmonum enim Fibrae nervae, atque propter obicium Pulmonum motum, non tam sensiles, quam matricae, & speciatim conflatae sunt, propter quem finem & Pulmo huius Nervis instructus est. Fibrae istae, pios stringuntur nimis aut contrahuntur diversimodè, praeterea si irritatae convelluntur, Viscula Pulmonum membranas stringendo, angustiores, & pro Aeris incipiendo ineptiores reddunt, adeoque sui stridura Asthmaticum Pathema internot; quo sensu ferè conciliari potest HELMONTII *Stridura perarum Membranae Pulmonis*, aut saltem doctrina, quae huc superfluit, hoc modo intelligibilis explicari potest. Huius Exemplum vidi super in Stannario, qui coquebatur de Cingulo circa Pulmones oborto, unde Aerem non intro-mitti. Sed totum hoc dogma saltem est: hoc verum est heri: Fibrae nervae, quae cogens viscera Pulmonales, convelluntur, quas stridit non sit receptus Aeris, & tunc cessat Respiratio. Stannarius alius optimè sanus erat, noctu circa horam 12. percipiebat difficile anhelum, senescentia aperiens, assiduebat mentis: si volebat ampliat Thoracem, non poterat, durabat nique ad horam quartam vel quintam. Nempe hoc est Asthma Siccum, quod HELMONTIUS explicat seu infusum sub nomine *Cadaver Pulmonum*, id est, in tali obitu & occidit peros Pulmonum, per quos tranfire debebat Aer: unde huiusmodi, sequitur Asthma tale: utit ejus primaria Hypothesis, quod nempe Pulmones sint immobiles, & saltem Cribri instar per quod tranfiret Aer, se habeant, falsissima sit: hanc enim destruit & Anatomae, & sufficiens infringit BARTHOLINUS *Tract. de Strid. & Ipsi Pulmonum*. Sicut & contra VILLISII Hypothesis non omnimodò amplectenda, quae Pulmonibus propriis Nervos, propriumque istud Motum attribuit; unde has convulsus, inquit, & sursum ad Fauces quasi protrahit, sequitur tale Asthma: vid. *epi. Pathol. Cerebr. de Morb. Convulsivo*. Verum & haec Sententia contrariatur Anatomae, cum Parenchyma Pulmonum sit inextensibile per Motu proprio. Dum ergo vult VILLISIIUS oriri Asthma Convulsivum a Convulsione Pulmonum, falsus item est, uti HELMONTIUS, cum ex falsis Hypothesis non possit non sequi falsa Conclusio, nisi hoc de Fibris Viscularum Pulmonales colligantibus intelligere velimus. Videtur tamen se ipsum postmodum corripisse, dum in *Op. Postum*, nempe p. 2. *Pharmac. Rationel.* ubi de Asthma, de tali pulmo-motu nil memorat, sed saltem in Nervis & Musculis convulsis acquirit.

Undecunque igitur irriteretur, aut male afficeretur dista Fibra pulmoem, five fit Acidum internum, five externum, eas irritans, corrugans & conflingens; five sint spiritus metallici; five Aer externus, inclementior aut impior inspiratus; dista Asthma exinde oriri potest.

Res ut pateat, consideremus ista, quae ad legitimum Pulmonum Motum, & huc Aeris recipiendū sunt:

1. Legitima partium Mechanica conformatio.
2. Muscularum instrumentalium motu; & Nervorum Muscularum motum, mediante spirituum animalium influxu, diriguntur confusum.
3. Observandae sunt Fibrae ipsae nervae Pulmonum, tam Membranae undique pulmoem cingentes, quae a huius ad ipsas Viscera pulmoem, pro illis tunc colligendis, hinc inde distendit; quae Fibrae pro Fibrarum aeterna motu saltem contrariis erunt instructae, adeoque conflingere saltem & coardare Viscula pulmoem, sed ulla alia ratione moveri poterunt. Nempe de his Fibris in *Epist.* ad Amicum refert MALPIGHIUS, in pulmoem unum observari non indiguum consideratione. In Raris enim & Laceris exteriori reticulari adell Plexus est canes Fibrae, ita ut sit mirus Musculus, complices singulas Cellularum huiusmodi; & in Telsidine, praecipue interius, etiam huiusmodi reticulari Musculus mirus observatur. Idem etiam Plexus carnes circa pulmoem in reliquis perfectis Animalibus patet, si extremitates lobulorum turgide adduc & molles praesentantur, tunc enim caro aliquid tunc rubet & turgit. Conferatur etiam, quoad has Fibras, LAMSWERDE *Tr. de Respiratione Schwanenwardum. Exspirat.* pag. 35. Ac iunc ab his Fibris *Cadaveris huius Pulmonum* HELMONTII, vel eorum Spasmus rectius, derivari videatur.

Secundum tria haec considerata, etiam triplex potest explicari Asthmatis Sicci Differentia oritur.

Tandem haec suo modo videtur pertinere Asthma non rarum, quod inaequantur suppeditat aut male curatum Scabum.

hiem; Vid. HILDANUS *Centur. 3. Niffer. 39.3*, ubi obfer-
vat Affhma lenthale ex repulfa fciabie, aut eum, quando
poff Ulcera interphale claufa fequitur Affhma: fiquidem
ex fciabie tetropulfa ordinario Difflentis Refpirationis, in-
terdum periffa fuffocato fuperuene folet; fe LINDA-
NUS in *Colleg. Jurg. Hartm.* ex Serpentine tetropulfa Affhma
periculofum natum obferuauit; & ipfe etiam Affhma Con-
tullium ex Podice fciabio vidi. Malum videtur tunc effe
complicatum, natum partim a fermento fciabie acri, Pul-
monum fibras vellitante; & ita ad fortiores contratturas li-
miflante; partim ex fanguinis acri hinc viciata, in debito
fermentationis motu ac textura deprauata, ac quali caecedi-
ca reddita: v.g. fanguine i ferro nimis folto & liquoato à Mer-
curialibus, five in Unguentis five alio modo adhibitis, &
tunc Pulmones, tunc copia tum ac timonia, & gravante, unde
& Affhma Pituitofum nimis fupervene folet.

Et *Alimentum* exordium inquit vixit roget. *Et* *Alimentum* observandum, materiam rectam per *as* in *Athma* internum effectum mali, nempe in *Athma* Humoso; internum vero effectus, nempe in *Athma* materiarum, qui constitutionis sunt succulentioris & humidioris, & quorum sanguis, & *Lympha*, mollioris quali ac minus firme reature, alterari facilius, & in variam formam mutari potest. In talibus enim ex crebriori pulmonum agitatione, & *Aëris* per asperam arteriam reciprocatione, subinde copiosius pulvis *Lympha*, per glandulas in asperam arteriam effusa, in mucus coit, in paroxysmi convulsivi excitatione efficiendum. Hinc ulterius in omni *Athma* etiam immorulo, ad motum Thoracis, plus minus liberum vim impeditum, semper recipiendum: nam ratione spirituum, & irritationis cuiusdam circa Pulmones (sensu, ut plurimum in Paroxysmo) convulsivi concurrunt; unde & per huius ratione plus minus malum intenditur, ac talis causa opiata internum leniunt talis Paroxysmi.

Notandum plerique: quod difficilis ista respiratio, quae

tam in totis hinc munda in flatu, quam etiam in illius sicce principia adeo, non sit semper, aut faltem non folam, a pulmone infarctu, aut Catarrho, aut fimili quodam morbo, fed frequenter, et oritur ex irritatione pulmonum, & hinc Fibrum earum contrahit, & inde impedit plus munda eorum expansione. Signum mihi erat, adeo talem irritationem, quoties *Æger* vel loquens, vel validius infpirans, tuffire cogebatur: Nam in talibus cafibus, propter crebriorem *Æris* reciprocationem, irritati magis pulmones talim concitabant magis, unde difficulterem refpirationis magis ex fimplici pulmonum irritatione, quam materie preceantis confervatione, ortam iudicavi: Hinc tali in cafu ex opiatu, v.g. ex *fpiritu* folis *Ammoniaci* anifato, cum Effentia opii mifto, femper levamen obfervavi; non folum materiem tuffis violentiam, fed etiam liberorem fenu refpirationem, & illius tuffis remiffionem fenfi. Hinc etiam fenfu doloris compressi, & gravati, & tuffis. Quare, five profundo pulmonum, non fenfu, a copia materie, fed fæpius a Fibrum pulmonum in particulari quodam loco irritatum contritione, quam compressi aut gravati talis dolor fubinde infequi folet.

Observandum denique est hoc: quando iam tales convulsiones, vel musculorum, vel Fibularum pulmonalium, dant Althema, quod tunc utplurimum simul & tardior languinis circuitus per pulmones esse solet; ad ut ex impedito plus minus eies motu, non tantum insignis in præcordiis anxietas, & majus imminens suffocationis periculum addit: ac præterea tunc in casu rubor malarum ac faciei, Vasorum in collo major inemulcescentia, aut sensilis etiam arteriarum pulsatio, adeffe solet.

Affluens est ratione causarum vel humidum, vel siccum: illud ratione partis ab humore irrigatur vel stomachale, vel Pellerale: Hoc vel vitio pulmonum, vel vitio Nervorum, vel utroque simul.

Morus nigrescens, ex deficiente & depravata pulmonum nutritione natus.

Par in vomica, Abscessibus, Empyemate, Phthisi.

Serrus, *Pulmonox copiosus* abundant.

Sanguis in motu impeditus per palmones; vel ob abundantiam; vel ab acido coagulationem; vel cachecticum vitium; vel ob nimiam turgescenciam, & quasi ebullitionem.

primis vult, mucro crudo, & inde natis flatibus obsecris: item
opieis.

informativis; in Gibbosis, ob cruda Tubercula, Calculos, utrinque Bronchia obidentes, Res deglutitas illa obstruente.

finis Muscularum Respirationi interuenientium, Diaphragmatis, &c. aliorumque: ut in Hypochondriacis & Scorbuticis.

la, vel exsiccati, vel corrugati, vel, ob Fibras proprias nimis
tas, contracti & angustati: *Caducus Pulmonum*.

DIAGNOSIS.

Quod attinet *signa*: Althma ipsum se manifestat sponte. De Causa tamen est inquirendum, quomodo dignoscenda sint? est oritur error in praxi. Necesse ergo est, ut attentius sit Medicus ad cognoscendas althmatum liccorum, & humidorum differentias, quas ex plurimum circumstantiarum collectione saltem desumere potest. In specie althmatum, quae sunt ex viis conformationis, item quae oriuntur ex maco, aut materia pulmones loundante, ferè solent esse continua: aut licet videatur interdum remittere, tamen levissima occasione data graviter recrudescunt: Id quod etiam verum est, si vicium sit ex pulmonum corrugatione, & laesa nutritione. Reliqua althmata periodicè, nunc latet, nunc viget, periodis recutere solent. Et quidem *althma humidum* esse vel *visu* *fuscescenti*, vel *visu* *pulmonum*, *re-gendi* *potest* ex causa antecedentibus, ex hypochondriaci symptomatis, & pectoralibus magis urgentibus: item si paroxysmus adit cum hæterore, aut cum nulli, aut etiam cum copiose materie in aut post paroxysmum reiectione: ita quidem, ut hoc ipsum fiat cum levamine *Ægri*.

In asthma autem humido (scilicet) manifestum est, quod cum causa continetur in crassius in Bronchiis pulmonum, respiratio est difficilis cum sonitu ex profundo, etoque sterterente, & tussis, pituitae plus minusve excretionis, quae quod magis ex-cernatur, et magis Affectus immittitur: si vero materia peccans sit in substantia pulmonum, viz talis adeo fontis, nec nili succedat, ideoque non adeo copiosae, per tussim aliqual rejicietur. Sin tamen est vitium humorale in pulmo-nibus, aut in ventriculo, asthma folet esse continuum, quod semel etiam curatum, antequam deus repetat, suc-

cellivi incrementi signa prodit.

Urunt autem sit continuum, subinde tamen et aperiatur, idque praeteritum velipari ac nocte, quo tempore omnes Aegri asthma humoris affecti peius habere solent; quod tamen omni afflatis ferè commune est, ut vespertinus ac nocturnus tempore acerbior affligat: item quod motu corporis semper aperiatur; item quod pro aëris mutationibus melius vel peius habere solent Aegri. Signa asthma manifesti quilibet potest facile cognoscere.

Quod affirmata verò fecit, convulsa, et speciatione eadem pulmonis: ea eo fieri se produnt, quod sine fine continuat inter dum plenum intertrant, paroxysmaticum repetitur, ita quidem, ut subito inchoent, licet etiam subito cessent, sine ulla fomitis materiali, vel praesentis vel antecedentis, veligio, aut manifesti refectione: ea improvviso enim irruit in Aërem, aliis optine respirantes, atque evanescent citra ulla respiratoris nocumentum, aut debiles admodum, plus minus tamen, Aëri esse solent: saltem difficile est huiusmodi, ubi laetant fomes et sermoctum, seu spina, Nervos hostili sui praesentia irritans, et ad spasmos provocans.

Porro nullus humor, nullus aer, aut nulla Tuffis, item nulla humores excreto ade in talibus afflicta, ut sit subinde huius coactus (et sic) exardantur: quod si aliquid excreuit, aut secerat respicit, hoc fit in fine, et parum est, duo vel tria sputa, et non amplius: notum talis modis potest ipsum circa fuites obsumam Aegri anxi- tatem, non autem quod sit causa morboſa. Multum utpla- rimus inspirant, sed parum expirant, si sint convulsi. Mus- culi expirationis infirmiores: contrarium fit in affluato humore, in quo non sufficienter possunt respirare.

Quoad *signa diffinitiva*: si malum originem à Capite du-

cat, adeo vel antecedit. Vertigo, dolor capitis, sensus fluctuationis in capite, & similia capitis pathemata: si vero est in abdomine, adiunt rugitus, murrura, ubi ligatura circa collum prodit.

Quod si diaphragmatis musculi, aut loca vicina sint affecta primario, semper accedit ingens dolor in illis 2002 in ista regione, ubi annectitur diaphragma collis noctis: Sin Musculi Thoracem moventes afficiantur, conquiescent ægri in paroxysmo de leuio, quasi universus Thorax firmius confringeretur, ac comprimeretur: Si Laryngis & faucium musculi affecti sint, suffocationis, quasi laqueo in collo, sensum habent ægri. Si palmo constrictus primario sit, inexplicabile quoddam impedimentum Respirationis experientur ægri.

Ultimo affliguntur frequentius, & atrocius in asthma convulsivo ægri tempore vespertino aut nocturno, circa primas noctis horas, donec recedat, seu in somnum incidant, quo obrepente reliquam noctem, & sequentem diem sine ulla difficili respiratione pertransigunt, donec tandem, si malum aliquandiu latuerit, aut periodicè, aut erraticè, subitò, vel ex levissimo in se resibus Non-naturalibus errato, repetit paroxysmus. Imprimis à causis quibuscunque procatacticiis, v. g. à levi motu corporis, aut à levi exacerescencia, aut humilibus, in momento ferè concitantur; & sicuti subito sunt, subito etiam desinunt: quod tamen contrarium fit in asthma humido, quod succellivè fit, & etiam succellivè, removendo causam seu materiam, curatur.

Fomes asthmae convulsivi, ubi præcisè beret, symptomata, vel antecedentia, vel adiuucta aliarum partium, ferè commonstrant. Plura videb. in SENNETO & RIVERO.

PROGNOSIS.

Quod attinet *Pregressu*: asthma omne tam per se, quam in progressu morbi supervenientis, semper est periculum & grave, maxime in morbis acutis, in specie in malignis, in quibus unum ex funestissimis signis est.

Periculosiora sunt tamen occulta quam manifesta: Item Invetrata: siue sint humoralia, nam hæc ferè insignem pulmonum lationem arguunt; siue convulsiva, nam talia epilepticum in quodam Nervorum Plexu radicatum fomitem præsupponunt. Ea quidem asthma occulta, in specie convulsiva, & caducus pulmonum, frequentius occurrunt in Praxi, quam humida.

Asthma invetratum quodcumque rarè perfectè curatur, quoniam vel levissimo Diætae errore, vel alia peccata, subinde recidivat.

In febre acuta supervenientis asthma, siue in cursu, siue post morbum acutum sequatur, semper est valde periculosum: unde etiam à RIVERO *Prax. Med. I. g. c. v. letale* dicitur, & Asthmata superveniant Pleuritidis seu Peripneumoniam.

Asthmaticis omnibus aliquando iux tum hoc morbo laborantibus utriusque Cachexia, insignes tumores pedum oedematosi, & tandem infestioris corporis tamor quasi hydrocæ, supervenit, & sic moriuntur (H).

Hæc de signis: Pergo ad

CURAM.

Imprimis autem considerandum est: an asthma sit morbus primarius & solitarius? vel secundarius & complicatus? hoc est, an superveniat Phthisici, Empyrici, hypochondriaci, hysterici, scorbutici, aut similibus? Ille primarius in specie curandus venit: si vero sit affectus secundarius, præcisè non curatur, nisi in primario sublato morbo, adeoque tunc ad morbum primarium respiciendum est, nisi interdu paroxysmi graviter urgent, & nam sanato vel sublato morbo primario, & hoc symptoma cessat.

(1.) Asthmata ergo, quæ primario consistunt morbos, curanda sunt, & quidem in genere, quantum possibile, libera de sufficiens respiratione procuranda.

I. *Impedimenta*, aëri libere accessum, & recessum per pulmones denegantia, removendo.

II. *Respirationis organorum inordinati motus* plus minus convulsivè compellendo.

Ratione prioris: aeris ambientis ventilatio, erecta sessio, alvi subductio, venæ sectio, potiones sanguinem attenuantes, clyst. mutum circulares promovenetes, viscida, pul-

mones infarciencia, incidentes, spirituosæ, blandæ dulces pulmones demulcentes conveniunt: interdum etiam vomitoria utiliter administrantur. Ratione posterioris: antispasmodica, anodyna, volatilia, &c. sunt optima.

(2.) In specie Asthma humida, aut 2102* à viscido moco genitum, curatur:

I. *Materiam* peccantem viscidam attenuando, & dissolvendo.

II. Tandem ita preparatam per convenientes vias, vel siccato, & tulli, vel vomitu, vel fecellu ejiciendo: &c.

III. *Id quod restat* in specie extra paroxysmum, removendo, & novum preventum maturè impediendo: adeoque vel pulmonibus latis, & vulneratis, appropriatis pedoralibus, si asthma humida vitin pulmonum fuerit, vel stomachi digchi prima sedulo redibanda, si bujus errore nata fuerit.

(3.) Asthma fixum similiter curatur in paroxysmo, & extra paroxysmum.

In paroxysmo quidem (1.) *Conformationis vitia* difficillimè curantur: Exacerescunt tamen, Tubercula, aut Graudines, beneficio spiritus sulphuris per campasam succellivè assumi posse, sunt qui asserunt.

(4.) Asthma convulsivum & nervosum & musculare vitia curabitur, radicitus somitem ejus corrigendo, respiciendo præsertim vices, in quo lateat. Inspecie.

I. Paroxysmus imminens suspendendus per opiatia: vel

II. Idem præsens silendus per volatilia, & capterata, item mineralia antiepileptica, & similia, acidum, nervis inimicum corrigentia, nunc solitaria, nunc opiatia temperata.

III. Recursus paroxysmorum præcavendus vociferatiis, vel brachiis, vel suchæ, vel semoribus applicatis pro nervorum vel sidi varietate: etiam fantasti interdum inveniendi.

(5.) Ex propria Fibrarum Pulmonalium fibrillata natum asthma curatur:

I. *Causam* irritationis, quantum possibile est, corrigendo & removendo.

II. Opiatis sensum volucrationis sedando.

III. Appropriatis simul vulnerariis & Balsamicis, pulmonibus succurrendo.

(6.) Extra paroxysmum vero (1.) curatur, primarium morbum curando, & paroxysmi recidivam prævertendo: Pro his scopis ritè obtinendis

Notandum I. In paroxysmo asthmae humidi vomitoria omnium esse optima, ita ut hæc vel morbi in principio, paroxysmo gravissimè assiliente, adhibenda sint, etiam quando maxime videtur urgere suffocationis metus, quoniam interdum mirè sedant; nihil enim æque paroxysmos asthmae humidos curat, quam vomitus: Hinc omnes cordati præstici semper in asthma vomitoria insurgunt, & subinde gravissimorum paroxysmorum, Vomitionum propinatorum usu levatorum, observationes prolant. Nec est, quod eandem metuat suffocatio: inanis hic est metus; nunquam tale quid observatum, in humida nempe æqualiter evacuat materiam vomitus, siue in pedore siue in stomacho hæreat. Notum namque est, quod in omni vomitu simul fit insignis constrictio Pedoris, & quid per motum Gulæ sursum simul moveatur aspera arteria, & ita simul ea ventriculo & ex pedore sit evacuatio; unde per Phthisicorum, quod in pulmonibus fluctuat, sæpius opinio & felicitas per vomitoria evacuatoria, & talia etiam id, quod Bronchitis pulmonum fortiter impadum est, certè & felicitè decurrit: quin etiam expectorantibus remediis commodè remedia vomitoria, sed in immunda doli, possunt permisceri, ut situm stimulos expectorationem, non autem vomitum inferant: vel præstici relaxantibus, & attenuantibus viis propinanda, & ita stomacho, & palmis viis occurrentibus, id enim, quod in hæret, vix melius ac per vomitoria evacuat. Exemplum per vomitoria, in paroxysmo propinata, feliciter curatum prolant hinc inde in Authoribus: imprimis RULANDUS quamplurima habet in *Theat. Med. pag. 103. 109. 112. 116. 117. 120.* & sic porro: In *Crat. 3. Cap. 96.* refert de Orthopæia periculossima, curata subito solo vomitu libarum viii. pinicæ lentæ & crassæ cum Bile permixtæ: Et hæc etiam est methodus POTERII, qui visibus adhuc stantibus in Asthma propinat vomitorium, nti

(H) Asthmatici conformati ferè semper in Hydræ in Pleuritis, vel Pulmonem transmittit. Ex Libris enim horum morbo, adeoque ex diffusi Sanguinis per eos transita, Lymphæ uberiori in locis secretis: hinc quod impedimentum quoque uberioris Lymphæ motum, Lymphæ autem ingurgitientia, stranguantur, & tandem ipsa supervenit: in Lymphæ effusione, & Hydræ.

nei videbitis in *Centur. 2. cur. 16. & 45. item cent. 3. cur. 22.* ubi etiam curavit asthma periculosissimum ex vitro mem-
brum deventum beneficio vomitorii, in paroxysmo pro-
pinati: Sic TIMÆUS in *Epik. p. 22.* Asthma refert peri-
culosissimum & consummationem, nullis cedens remediis,
tandem provocato vehementi vomitu curatum: vid. etiam
PLATERUS *lib. 1. obs. p. 152.* HOFFERUS in *Herc.*
Med. p. 112. & HORSTIUS in problem. Dand. 4. q. 5. pag.
50. HARTMANNUS *Pr. Chymiar. pag. 134.* RIVÉ-
RIUS *l. 7. par. cap. 1. & PÉTRÆUS obs. l. 1. Diff. 18.*
Imò Narura ipsa. monstrat interdum periculum ulcus vomito-
rium: sic SYLVATICUS *cent. 3. Cap. 43.* refert
asthma singulis nodibus recurrente cum suffocationis peri-
culo, à quo non prius exger fuit immuni, nisi sponte sibi
caderet vomitus tam assumptorum quam materiam pituitos-
am. In specie in asthma sicco, ubi radix mali est in hy-
pochondriis, vel abdomine, à his irritis, vomitus convet-
nit extra paroxysmum, rarior in paroxysmo, præsertim si
súrsum merenda pathemata Hystrica obdierint; ceteris
tamen extra, quam in paroxysmo. Et ita quidem in pa-
roxysmo asthmatico vomitus fuit optima, utpote quæ sub-
le à præsentato vitæ discrimine liberant: Purgantia
vero per inferiora in paroxysmo non conveniunt, quin cum
potius insigiliter exasperant. Inter vomitoria ad hunc scopum
usuala sunt partim Antimonialia, partim quæ ex ni-
cotiana parantur: nam hæc sunt appropriatissimum ad tale
asthma remedium, atque materiam vicendam ex flamma-
ta, & ex pulmonibus evacuant; Aqua nicotianæ ad 3i. da-
ta, vel syrupus nicotianæ sumptus ad ecchleasiam duce-
re, præmovere vomitum: nam do sunt syrupi ex nicotiana,
vomitus, & alteram: Imò lio fuma Nicotianæ per
tubulum attracta, & gutture hausa, potentem vomitum
per asthma curando movet. Deinde succus expressus
pulvis treos nostratis ad 3ss. vel 3i. ad 3ii., prout est va-
lido, vel minus validus, in hydromelice vino pro-
priatus, tam ex ventriculo quam pulmonibus ortam Ortho-
pneum desperatam eviravit, teste PLATERO *obs. l. 1.*
pag. 175. movet vomitus violentus, & feculentus, qui ipso
ab eodem commendatur in dysipnea, ab hydropse pecto-
ris enata. Facit hac vomitorium secretum FREITAGII
ad asthma & emphysem, ex HEURNIO, quod habet in *para-
phr. medicorum c. 20.* descriptum: & *Vinum Americanum* HE-
URNII, ex Helleboro albo, quod proflat in SCHROE-
DERO *l. 4. p. 239.*

24. *Stellebor. albi crasi et cont. 3ß.*

Qui affundit

Vini perissem, vel *Hyssop. 3i.*

Digere exponendo Soli;

Hæret infusi cochlear unum.

Valde dissolvit & movet vomitus, idque sine insigni dif-
ficultate; si vero semicochlear cum aliis laxantibus exhi-
beatur, præclarè alvum sine vomitu educit; mistum, vel
lodiatum aliquot guttas huius infusi additas, Emphysematis
expectorationem copiosè movet; Hinc præstantissimum
remedium ad asthma & emphysem est hoc:

24. *Papul. mundas. 3iv.*

Rad. Liquirit. raf. 3i.

Mell. desjumat. 3iii.

Sacchari Candi 3v.

Vini *Hyssop. 3vi.*

Bulliant, ut fiant tollat conditi: cui tantum admiscea-
tur acidi, seu spiritus sulphuris per campanam, ut gra-
tiam acquirat saporem, hinc aliquot guttas Vini illius
Hellebori insillenter.

Teneantur in arte masticandæ passule, vel quoties cas-
dem in os receptus est, gutte duæ trevè insillenter de
quo Infuso, idque speciatim in asthma humido, ubi ma-
teries resolutione & expectoratione opus est. Remedium hoc
cum secretum habendum vult FREITAGIUS.

His tamen vel commodè præmittenda, vel adjuvenda
sunt expectorantia remedia, quæ acidum corrigere & vi-
ciditates illas attenuare & resolvere valent: quæ primaria
sunt ea, quæ ex gummi ammoniaco præparantur, ut po-
tioneula *Bronneri*, item syrupus nicotianæ, & similia:
c. 6.

24. *Selle ammoniaci 3i.*

Spec. Diatrium 3iij.

M. f. Pulvis:

Dir. in 3. partes equaliter: S.

Pulvis Digestivus.

Vel si materia sit nimis viscidæ.

24. *Aqua pulmon. vitæ cum succo Nilot. 3ß.*

Syrup. de Japok. 3iij.

Stec. per lorum. Infus. par. 3ii.

Spiritus Sulphuris gutt. xv.

M. S.

Potius Confortativa ad Pectus pro a. vicibus.

Notandum II.

I. Pus, si asthmatis causa, evacuantum, vel per ex-
pectantiam, vel per *Paracelsi Theriac.*

II. Asthenia vel alius consolidandus.

de quo infra, ubi de Pleth.

Notandum III. in paroxysmo asthmatis, cuiuscunque, spec-
tationis humidi, in quo sanguis in motu, fuit simul per pulmo-
nes, vel præcordia plia munda sufficiat.

I. Ad vomu festinant præparandum, ut sanguinis co-
piæ immineant, & ejus liberior motus nonnulli
juvetur, adeoque sic in specie in asthma, vitio
sanguinis coati, locum obtineat; minis in reli-
quis.

II. Sanguis coagulatus dissolvendus, de quo ubi de casu
ab alto.

III. Vitium cachecticum emendandum, de quo, ubi de
Cachexia.

IV. Solæ evacuationes revocandæ, v. g. Menstru
protrahendi, aut si heri nequeat, fructus in regione lo-
ci, constrictæ excretionis vicini, laudandi.

V. Torpescencia quælibet, acidum effervescentes abse-
rentibus, aut blandis diaphoreticis, aut copiam san-
guinis immittentibus, corrigenda.

Notandum IV. In nullo paroxysmo cuiuscunque asthma-
tis purgantia conveniunt, imprimis propriè sic dicta, seu
fortiora, quia cum potius exasperant: quod observarunt usa-
nimitè omnes prædici, quia agitant corpus, & succos con-
tinentes & symptomata morbi peiora faciunt; nisi forsitan ad
imitationem POTERII purgantibus opata in paroxysmo
addent velimus: de quo vid. *cent. 3. c. 22.* Nam opata sedant
paroxysmum, & symptomata, quæ aliis purgatione in-
ducuntur, dum interea pilule laudabiliter operantur; vid.
cap. citatum, ubi egregie de notatu digna habet. Facit huc
monitum SCHOLZII in *ens. 92. In asthmatis*, dicit, *ut
ligentia cavendum, ne dentur sicciora Rivanensis, à quibus
commoveretur & agitentur materia, & sequæ fluxiones augerentur;*
videmus enim homines aliquot saepe post purgationem multum
exspuere, & emungere nates sape à matam materiam: quæ
magis hoc illis accidere posse, quibus spæssè, & quidem centum-
flucibus ad pulvis menter. Alias post sedatum paroxys-
mum ad præcavendam recidivam, ejus quæ sunt reliquæ
morboe, ad eas exhaustas conveniunt evacuantia que-
cunque moderata, in specie pilule, quibus semper gummi
ammoniacum addendum venit: v. g. Massa pilularum de
ammoniaco *Querretani*, item massa pilularum de hiera cum
Agarico, multa cum gummi ammoniaco: c. g. FREITA-
GIUS has habet pilulas:

24. *Massa pilul. de agar. 3i.*

Gumm. ammon. 3ß.

Truch. Alband. gr. ii.

Extr. Cinnamon. (oil valet) gr. iiii.

Com *Extr. Croci*, vel *Emule* sunt pilule: quibus etiam
gutta una vel altera olei dissillati *Anisi* addi potest.

Vel

24. *Gallban. cum Aceto sol. 3ß.*

Extr. Truch. Alband. gr. ix.

Diagrid. gr. iiii.

Cum oleo dissillato carvi & pilularum tribus defusis.

D. S.

Pilule solventes pro 3. vicibus.

Ubi asthma ex viscositate, conveniunt hæc pilule:

24. *Massa pilul. de agar. aut Hier. cum agar. & viasid 3i.*

Gumm. ammon. aceto squill. sol. gr. viii. ad 3ß.

Extr. truch. Alband. gr. i. vel iiii.

Cum *Spiritu Anisi* vel *Aqua Asthmatis* & pilule:

D. S.

Pilule purgantes pro una vice.

Pilule cathartice Poterii similiter sunt experte contra asth-
ma. Nec negligendus est in tali casu mercurius dulcis, cum
scammonio sulphurato acutus, quem RIVIERUS inter-
dum sub nomine *Calomelanos* usurpat: vid. *cent. 3. obs. 28.*
c. 31.

24. *Massa pilul. de ammon. Querretani gr. xv.*

Mercurii dulc. 3i.

Extr. Truch. Alband. gr. ii.

Oleodissillati. Anisi gutt. ii.

Cum c. q. *Spiritus Anisi* & pilule.

D. S.

Pilule pedibus resolventes.

Vel

Vel
℞. Pulv. min. iung. 3i.
Tartari viridiat. ʒss. ʒi.
M. S.

Palliat laxative pro duabus vicibus.
 Item prodest aliis Oxy mei de Nicotiana Sporeani pur-
 gans: vel possunt fieri Vina Medicata spississima aromatica
 ipsoactivi evacuatoria &c.

℞. Herb. Anthei,
Mentha,
Salvia an. M. i.
℞ol. Soc. flos. ʒss. Syl. vel ʒi.
Rad. arumet. ʒss. ʒi.
Tinct. oxyr. recent. ʒss. ad ʒii.
Florem.

Astri veri,
Angelic. an. ʒi.
Zedoar. vel galang. ʒiij.
Cinnamon. ʒi.
Paffol. min. Syl. vel ʒi.

Infund. in Vinu Mosci li.

Maniatur cochlear qu. v. semel & his, ut laxet.
Notandum ʒ. Si asthma causa est serum, hoc evacuandum
per urinum, vel sudorem, vel vomitum, vel vomitorium confectum, vel
per funiculum pedetentim.

Notandum ʒ. Si asthma in asthma convulsivo, & sic-
co, tam in, quam etiam extra paroxysmum, non negligenda
sunt: nam si recte adhibitis, interdum asthma praeca-
vetur, aut horum paroxysmi saepe sedari possunt, maxi-
me si ex volatilibus sint praeparata. In asthma humido
etiam sanum locum habent quodammodo: id quod confirmat
SCHOLZIUS supra citato loco inquit: Multum prodest se-
der, qui et saltem ex aquositate cellulas dilatat. Provocari
potest decocto Cinnae calide assumpto: facit quoque ad ea-
peculationem, & pizante in pectore incisionem. Scio quod-
dam decocto ligni Sassafras usos pro potu quotidianum in vigore
huius morbi, & alios id saltem loco Vini in principio pulsus
assumpsisse, & caude eximiam opem sensisse.

Notandum ʒ. Si vitium sit in stomacho, vomitoria, &
emulsiom aromaticis, ac digestiois viis, praesertim cru-
ditatem acidam egergentia, conveniunt: utpote cura metho-
dica circa stomachum, & malam Hypochondriacam in-
situenda.

Notandum ʒ. Si Opia multum conferunt, praesertim res-
pectu pa. oxylini. Quando enim nimis spirituum impetus,
& hinc inordinata pectoris motiones, item quorumcumque
in corpore contentorum fluidorum nimis motus ad pectus
urgente, operit his omnibus opata tunc administrata, praer-
ferunt appropriatis permixta, multum conferunt. In asth-
ma quidem humido, quatenus materiae peccantis motus
& excretionem suffulminat, suspecta videntur, cum
magis incalescit, & quod inspicitur materia peccans: Ad
nimiam vero paroxysmi ferociam mitigandam, quia concitatio
spirituum impetu per accensum quasi exacerbat, optima sunt.
Tutiora autem sunt in asthma sicco, tam
ante paroxysmum, eundem praevocando, quam in paro-
xysmo, eundem misuendo. Conferatur WILLISTUS in
Pharm. Rational. part. 1. pag. 190. part. 2. pag. 247. Talia
sunt essentia opii, Theriaca ac Mithridatica syrupus Dia-
codium Montani. Nempe in quovis paroxysmo asthmae
tam humidi, quam siccis, spirituum impetus, & hinc concitatio
fingulis ac lymphae motus ad partem probe at-
tendendus, et si nimis, opiatu nonnulli suffumigandus.
Docuit hoc veterum experientia praedicta: hinc FONSE-
CA ibi. conf. 85. inquit: Articulus in paroxysmo asthmae
& difficultate respirandi suffocative damnos committitur curatio-
ne, quae si averteat materiam, quae fluit, quia hic modus
cursandi agitatur magis illam, esse potius habendam functionem sit,
quae incassum, praesertim si fuerit tenuis. Deinde calidus Symp-
laxum de Papavere Dia Codium, & deinde ad opiatu, quae est
Philonium Romanum ad ʒi; quam etiam Galenus videtur lau-
dare curantem Catarrhi suffragantem: Deinde adhibet emulsi-
onem de verberis dactyl & super scapulam: hoc ratione inquit
opiatu evasione. Illi vero, in quibus praecessi evanescunt, di-
spersionibus, & materiae agitantibus, perferunt: quia certe ve-
re praesens praesentat, ut multi etiam experientia comprobant est.
Quod Philonium majus, seu Romanum vid. ZWELFFE-
RUS animadvert. in Pharm. Aug. pag. 61.

Notandum ʒ. Quod asthma à causis particulari orta,
ut à scabie retropallia, & ulceribus oculis, ac sumis met-
allicis, & mercurialibus, particularem requirunt medendi
Methodum. Asthma si oriatur ex Scabie retropallia, tunc
omnes moventes elix lapia, ut iterum appareat scabies in

extima cute mediastibus sudoriferis, in specie volatilibus
 & hinc appropriatis, nempe Remediis ex Heleno, cum
 castro, & elentia, fumaria, & quique essentia simplici
 vel composita, Extracto Theriacali, decocto Heleno, &
 feniculi, & similiter, item Antimonio diaphoretico, cum
 Salibz fixis, & volatilibz misto, massam sanguineam
 purgando, Scabiem demum capillitibus, nisi enim Jones
 Scabie demum sub cute desigatur, omnis cura erit frustra-
 nea, in quem finem etiam vesicatoria, fomentis, & bra-
 chiis applicata, optima sunt. Quod si nullo modo possit
 reprodus scabies, in tali casu immutandum est ZACUTI LU-
 SITANI egregrum iocendum, qui talem egrum cum alio
 scabioso in eodem lecto collocat, ut ab hoc fermentum scabi-
 e huius malignum & ulcerosum hauriat, & ita demum scabies
 introducatur.

Notandum X. Si à Fumis Metallis, in specie mercuriali-
bus oriatur asthma, tunc nil in horum cura perficere
cum ordinariis ad hunc afflicti remediis, nec expugna-
tur, sed potius appropriatis ex mineralibus & metallicis
remediis effluenda: hinc Mercurius dulcis, item mercuria-
lia sua (quae fixiora, eo meliora), Benzosticum solare, tur-
perchem minerale, item Cinnabaris Antimonii, Antimo-
onium diaphoreticum, ac similia in nra sunt: Exempla ta-
limum asthma ex fumis metallicis, imprimis mercuria-
libus, curatum, vid. in HORSTIOL 7. skf. 55.

Notandum XI. Si Dyspnoea oriatur à subtili frigida potu vel
frigore admisso, praetertim post cibum, imprimis condu-
cunt, quae sanguinem grumulosum solvere valent; in quo
puncto succum Bellidis in Vino propinat. D. MICHA-
LIS: vid. MINDERERUS in sua Medicina militari. Accet-
aria ea Bellide in aestate laudat DEODATUS in Panch. Hy-
gief. 13. cap. 22.

Remedia ergo alia appropriata, quae conveniunt in asth-
 ma humido, eoqz ex pulmonum aut stomachi vitio,
 aut mucilagine erassa, viscidis, & stantibus, utpote quae ordi-
 nario fere nomine asthmae intelliguntur, sunt imprimis
 Incidentia, Attenuantia, Expectorationem promoventia,
 &c. plus minus aromatica, stomacho, & pulmonibus
 amica, v. g. Helenum, quod est insigne pectorale, mar-
 rubinum album, seu pralium, & nigrum, Hyssopus, &
 cypissi Veneris, Ros solis, Tussilago, Scabiosa, Pulgemon,
 Calaminta, Acorus verus, Cardus benedictus, Sature-
 ja, Crocus imprimis, item Folia, & Flores Rosmarini,
 de quibus vid. Experimentum BORELLI in ont. 4. vif. 46.
 qui flores vel ejus folia coquere iubet cum Vino optimo, &
 melle ad dimidiat partem consumptionem, & capere ante som-
 num, dicique mirè conferre. Porro conveniunt veronice,
 Radia Raphani, Ari, Zingiberis, Zedoariae, quae sola
 mirè levat dyspnoeam comella, sicut & Aqua seu spiritus
 Zedoariae multum conferunt ad liberandum pectus a
 sabbia, & liberando spiritum procurandum: item prodest
 radix Vitis albae, seu Beryoniae, cuius succus artificiosè
 prolebus, praeterea vim laxativam, singulares hic habet vires
 contra asthmae: dissolvit enim, quicquid grumulosum, &
 coagulatum est in corpore, & pectus liberat, quem videtur
 praeparatum in HARTMANNI *Ph. Chymicae* pag. 95. Hic
 addatur Helenum, optimum Antiasmaticum, quocum-
 que modo usurpetur, imprimis pulverisatum, & cum melle
 in Elecinarii formam redactum, in asthmae stomachi
 multum conferre. Radix ari acris, vel vino infusa, &
 pota, vel lentè in umbra siccata, ut retineatur sal acerrimu-
 m, & pulverisata pro expectoratione etiam egregia est,
 cum Vitis assumpta. In genere quoque recentior elix radix, &
 ex ea parata remedia, eo sunt meliora propter sal acerrimu-
 m, quod aliis, si verulior radix, avolat: e. g.

℞. Pulv. Rad. Ari ʒss.
Div. Flor.
Cinnab. Antimonii an. ʒiij.
Flor. Sulpuriz.
Mix. pulv. ʒss. an. ʒi.
M. f. Pulvis.
Pulvis pro Expectoratione.

Dosi ʒss.

Commendatur etiam à multis saecula ari, sed est siex nulli
 ponderis: Si radix hac praeparatur cum aceto, castra-
 tur. Omnes saecula, Irazos, ari, Beryoniae, quae alias vulgò
 in affectibus pectoris, in specie in asthmae, commendantur,
 seu frequentiae omnino rejicienda, quoniam omni usu,
 omnique facultate omnino sunt destituta: vid. ZWELFFE-
 RUS in animadvert. ad Pharm. Augst.

Ex his fiat Vinum medicum pectorale tale.
℞. Herb. hyspi,
Rosmar.

Flor.

Flor. Rapor. an. M. l.

Rad. Iros Flor. 3℔.

Aristol. rotum.

Ligustic. an. 3℔.

Zedair. 3℔.

Curcor. pingv. n. viii.

Semin. Urtica 3℔.

Anis.

Fenicul. an. 3℔.

Ex ipcis & contus. & *Molulus pro Vin. Menf. ij. D. S.*

Nodus ad Vinum Pectorale. Vel

3℔. Herb. Marrub. M. ij.

Cum. Alifash. vel Hyssopi.

Karfinar. vel Virna. an. M. l.

Rad. Enul. 3℔.

Iros Flor. 3℔.

Imperator. 3℔. vel 3℔. ad 3℔.

Zedair. 3℔. vel 3℔.

Enfal. min. 3℔. vel 3℔.

Sem. Anisi.

Fenicul. an. 3℔. vel 3℔.

Hæc ipsa incisa includantur *Nodus*, infundendo *Vine D. S.*

Nodus ad Vinum Pectorale.

De quo *Ager* bis vel ter quotidie hauriat bonum haustum.

Vel coquantur in Aqua addito *Melle*, & ita fiat post

colaturam *Hydromel Pectorale. S.*

Vel decoquantur in Aqua vel *Vine*, & cum *l. q.*

Sacchari fiat *Syrupus Pectoralis. S.*

Syrupus Pectoralis.

Vel cum Aqua, Aceto, & Melle pro *Oxymelice Pec-*

torali. D. S.

Oxymel Pectorale.

Aut additur decoctioni *Oxymell. squillit. q. l. pro gratia*

saporis. S.

Potio Pectoralis ad Respirationem. Vel

3℔. Herb. Hyssopi.

Marrub. an. M. ij.

Rad. Enul. unc. ij.

Sem. Fenicul. unc. 3.

Anis dr. ii.

Terra sol. Tartari 3℔.

Aqua simpl. 3℔.

Mellis despum. 3℔.

Coqu. in vase clauso in igne despumetur, & addatur

Cinnam. 3℔.

Cum Oriem. 3℔.

Coletur pro *hydromelice Pectorali* resolvente & Inci-

decende. D. S.

Hydromel Pectorale.

Convenit imprimis Senibus, Asthmate Humido laboran-

tibus; addi potest pro luitu *Syrupus Nicotianæ*. Juniori-

bus propter metum Febris, Scorbuticis aut Hypochon-

driacis propter fermentationem, cautè præscribitur. Vel

3℔. Herb. Scabios. M. ij.

Heder. terrestr. M. l.

Rad. Enul. unc. i. 3.

Iros Flor. 3℔.

Sem. anis.

Fenicul. an. 3℔.

Coqu. in *l. q.* Aquæ simplis. Colatura 3℔. addè

Oxymell. squillit. q. l. pro gratia saporis.

M. D. S.

Potio Pectoralis relolvens.

TABERNÆMONTANUS in herb. Decoquum Botryos

commendat, quod cum Oxymelte dari potest. Oleum seu

Liquor Sacchari, tam simplex, quam compositus, qualem ha-

bet RIVIERUS *Prax. l. 7. c. 1.*, similiter tanquam exper-

tum commendatur in Paroxysmo: vid. etiam PETRÆUS

l. 1. Differt. hermes. l. 1. §. 44. Sed in genere moneo, fugien-

dum esse abusu Sacchari & Saccharatorum, Mellitorum-

ve in omnibus Morbis, speciatim in Asthribus Pectoris:

Saccharum enim, propter facilem effervescentiam, ac hinc

flatusulentiam, multos exasperat Morbos, quorum radices in

primis vis latent: imprimis Febris, post hinc Scorbutum

& Malum Hypochondriacum deterius reddit. Tandem ut

in Phthisici, Tussiculosis & Asthmaticis familiarissimè

præscribantur Sacchara, in simia tamen copia malum po-

tius aggravant, quam leniunt, viscidiora reddendo excre-

menta, & putrilagine & corruptelam Pulmonum magis

intendendo. Imprimis de onocamentis Sacchari in Asthribus

Pectoris vid. GARENZIER in *Tract. de Tab. Anglia*,

ubi dat Exemptum tale: si quis singula hæc Carui recipiat, &

Trem. ij.

nam ex his Sacchara adspersa, altero non confusa, & per
nillum relinquat, man. invenit omnem patridum corruptum, al-
tero non saccharato sine nova exstente.

Porro Essentia Croci in Asthmate multum commenda-

tar, item: Essentia Helenii & Ligni Salsitris, item Essen-

tia Radicis Iros Florentinæ cum Spiritu Anisi parata. Con-

venit etiam Aqua seu Succus Raphani recens expressus, qui

cum Saccharo est egregium incidens, relolvens & expecto-

rans. Modus est quando Raphanus recens in taleolis inci-

sus, & Saccharo adspersus, inter duas parvas exprimitur, vel

quando comminatur Raphanus, & cum Saccharo multas ex-

primitur. In omni Tussi & Asthmate, Respirationem lædenti-

bus, hic Succus potentissimus est expectorans, omnem mu-

cum ubique relolvens, tam in Pulmonibus quam in stoma-

cho. Convenit istidem Acetum & Oxymel, nunc simplex,

nunc compositum, & squilliticum, quod Veteres in frequen-

ti us habuerunt: imprimis Aqua Cinnamomi cum Oxymelle

scillitico mista, est egregia in Senibus; & hanc ipsam in

Paroxysmo commendat RIVIERUS *Cent. 3. Olserv. 1. &*

Obs. 21. ut & Prax. Med. l. 7. c. 1.

3℔. Aqua Cinnam. 3℔.

Oxymell. squillit. unc. l.

M. D. S.

Potiuscula respiratoria.

Propinetur coctilem, præsertim in senibus: ac sanè

Oxymella talia præstant ferè Sympus de Hyssopo, de Ho-

lenio, de Erythmo Labell, de Macrubio, Tullilagine, &c.

D. SCHOENFELDER *Hyssop. & Car. 44. pag. 174. inquit:*

Vidi. & presens sui non infima nota Malieri, paroxysmo asth-

matico confusa, de reposita faust. ut fameret Aceti Ruta,

quod statim supra iunctum cubili in promptu erat. cocti. ii. &

ita quasi miraculo quodam paroxysmus sedatus est. Notæ sunt

aliæ Aquæ Pectorales & Asthmaticæ spirituosæ, quas inter

frequentior est Aqua Asthmatica Imperatoris Rudolphi, quæ

est Spiritus Vini aromaticus, Sympus de Macrubio, de

Abulmho Myrsinæ: & speciatim Aqua resed. destillata,

& Sympus Nicotianæ: ex multiplici infusione paratus,

atque sic magis a vi vomitoria liberatus, est perquam u-

tilis: imprimis EPIPHANIUS FERDINANDUS in *bi-*

her. Med. Mirab. hiber. 41. & 32. hanc Sympus seu di-

vinum commendat remedium, ad Mocum in Asthmate;

& Pus in Empyemate evacuandum: sed necesse est, ut vis e-

jus emetica mediante diuturna digestionè infringatur. Pro-

pterea FERDINANDUS ita præscribit.

3℔. Fel. Talcæ. unc. l.

Bulliant in Aquæ doli. lib. ii. ad consumptionem me-

dietatis, addendo in fine

Fel. Malvæ.

Brassæuf.

Volat. an. M. ij.

Coletur, & cum Sapa milc. & calidissimè detur pluries.

Idem FERDINANDUS in *2p. Conf. 41.* sequentem Sy-

rupum seu singularem in Asthmate laudat.

3℔. Talcæ.

Taffi. an. M. ij.

Cum aqua coque ad tertias, & adde Sacchari *l. q.* pro

Syrupo, quem non satis potest laudare.

Et quidem ratione Salis volatiliss. acerrimi Oleum eius est

vomitotium, sed ejus Sal volatile est egregium in affluu

Pectoris. Utraque ratione Nicotianæ: nam dum adhuc in-

struda est virtute vomitoria, convenit in Paroxysmo pro

Vomitotio; postmodum ubi hæc est infra, ejusmodi tamen

Sal volatile acre insigniter expectorat; unde PETRUS

JOHANNES FABER insigniter commendat aquam Nic-

otianæ ad asthma, præmisso Purgante, ad unc. iv. cum A-

qua Cinnamomi, & gutt. iv. vel vi. aut x. Spiritus Nitri in-

stillatis. Essentia Per. cum Spiritu Vini exacta, & Melle

excepta, egregium est expectorans.

Præ cæteris asthma Humidum vix melius habet Remed-

ium, tam in, quam extra Paroxysmum, quam Gummi

ammoniacum in Vino, vel aceto, vel alio liquore approp-

riato acido dissolutum; oil namque aque relolvit, & ex-

pectorat mucilagines viscosas, ac tartarum, uti vocant, Pul-

monum atque stomachi & primarum viarum, quam Gum-

mi Ammoniacum, quod ipse felici us præscribo. In asth-

mate certè vis habetur per remedium: datur a 3℔. ad 3℔.

vel 3℔. In aceto, vel liquore appropriato acido dissolutum

hinc balsa est commendatissime Potiuscula BRUNNERI ad

asthma in *vine Crassili Conf. 14.*, cupis descriptis est hæc

3℔. Gummi Ammoniac. 3℔. vel 3℔. ad 3℔.

Vini Rhen. unc. li.

Aqua hyssopi 3℔.

M.

Bb

De

Detur pro una doli, ubi necessitas arget; vel pro duobus doli.

Hanc Potiunculam multi Auctores commendant, quos inter est etiam TIMÆUS in *Cal.* pag. 96. & MIGHAELIS, qui feliciter ea usus est. Ingrata quidem est, sed admodum in Paroxysmo Asthmatis Humidi convenit; addi potest Oxymel quillitum: c. g.

24. Aqua Hyssopi 3ij.

Gum. Ammoniac. cum Aceto sol. 3i.

Spiritus Cochlear. 3b.

Oxymel. quillit. 3i.

Syr. de Eryf. Lebel. 3ij.

M. S.

Potio ad Respirationem.

Detur in Asthmate Scorbuto. Vel

24. Aqua Hyssopi.

Vern. an. 3ij.

Cinnam. 3i.

25. Zedair. 3b.

Gum. Ammoniac. cum Aceto sol. 3i. vel 3ij.

Oxymel. quillit. 3i.

M. D. S. ut suprà.

Hujus occasione paratur etiam Spiritus Asthmaticus B. DOMINI D. MICHAELIS in Asthmate Humido expertissimus. Vocatur etiam alias Spiritus Viridis Eris compansus; vel Spiritus Gummi Ammoniaci compansus; v. g.

24. Viridis Eris aut Cryf. Viridis Eris 4. Acetapar. 3iv.

Gum. Ammoniaci 3b.

Sulphuris sicc. 3b.

Mixta destillentur cante ex Retorta in arenam, aliam enim sumpt vitra, aut tota massa in receptaculum praeiit: prodit Spiritus acutus admodum volatilis, & simul Oleum foetidissimum & penetrantissimum: Spiritus separatur ab Oleo foetido, reconditur per Alembicum, cui Nidulus ex Cruce impositus sit.

Spiritus hic rite paratus mirabilis est ad incidendam, attenuandam, & dissolvendam quancunque massam viscidam, in quocunque loco stabantem, & tallendum Asthma; sive per se in Aqua Asthmatica Rudolphi, vel alio vehiculo oleo inflammabili conveniente; sive etiam additis aliis, e. g. Elisir Propriatatis &c. usqueperit. Oleum redissicatum inservit pro malaxatione Emplastorum; pro Tumoribus duris scirrhosisque Scrophulis viscerum aut partium externarum. Dosis Spiritus est i guttur, xxi. ad xxx. in vehiculo quodam, vel Aqua destillata, aut diluatur cum Spiritu Hyssopi, Essentia Helenis, & fiat Mixture coctionem utiurpanda: c. g.

24. Aqua Hyssopi.

Fior. Papav. vir.

Astmat. an. 3b.

Spiritus Astmatici. 3b.

Oxymel. quillit. 3i.

M. D. S. ut antè.

De hoc in Paroxysmo, q. pl. capiatur; sic enim convenit in dissolvenda & attenuando mucos.

24. Aqua Fior. Papav. 3ij.

Astmat. 3vi.

Spiritus Astmatici 3b.

Syr. de Nicot. 3b.

M. S.

Succus respirativus pro aliquot vicibus. Vel

24. Ag. Hyssopi 3i.

Meniba 3i.

Astmat. Rud. 3vi.

Spiritus Viridis Eris dr. i. vel dr. i. ad dr. ii.

Syr. Nicot. dr. vi. vel Oxymel. quillit. unc. i.

M. S. ut antè. Vel

24. Aqua Astmat. Rud. 3iv.

Spiritus Astmatici. Mich. dr. ii. vel iij.

M. D. S.

Aqua Asthmatica coctionem sumenda. Vel

24. Aqua Hyssopi.

Meniba.

Cinnam. an. 3i.

Spiritus Gum. Ammoniac. cum Aceto Viridis Eris, dr. 4.

Syr. Nicotian. dr. vi.

M. S.

Potio Asthmatica. Vel

24. Ag. Hyssopi 3i.

Astmat. Rud. 3i.

Gum. Ammoniaci cum Aceto quillit. sol. dr. i.

Spiritus Astmatici. Mich. dr. iij.

Syr. de Hyf. dr. vi. vel 3i.

M. pro duabus vel tribus doli. S. ut antè. Vel

24. Aqua Fior. Papav.

Astmat. Rud. an. 3b.

Spiritus Gum. Ammoniac. cum Aceto Viridis Eris dr. i.

Oxymel. quillit. vel Syr. Nicot. 3i.

M. S. ut antè. Vel

24. Ag. Fior. Papav.

Hyssopi.

Astmat. Rud. an. unc. iij.

Spiritus Astmatici. dr. i.

Oxymel. quillit. unc. i.

M. D. S. ut antè.

24. Ag. Fior. Papav. unc. iij.

Amifrob. Darnar. unc. i.

Spiritus Astmatici. Mich. dr. i.

Cochlear. dr. iij.

Esent. Cruci.

Rud. Rud. andr. 3b.

Rud. Rud. Enol. dr. vi.

M. S. ut antè. Vel

24. Ag. Hyssopi unc. i.

Vern. cum Vno unc. ii.

Spiritus Viridis Eris vel Astmatici dr. i. ad dr. iij.

Syrup. Nicot. dr. iij.

M. S. ut supra.

Usurpetur coctionem:

Hic Spiritus missus cum Elisir Pediculi D. D. MICHAELIS admodum commendatur ab eodem contra Asthma & similes Pediculi Affectus. Descriptio illius Elisir est haec:

24. Herb. Pedum. Ital.

Caphal. mont.

Marrub.

Hyssopi.

Erugina.

Rosella.

Veronica.

Statice.

Tussilag. an. M. i.

Fior. Eucali.

Scabif. an. p. iij.

Rud. Enola.

Tussilag.

Aristol. runda.

Brui Fior. an. unc. i.

Morbo.

Malick. i.

Cruel. Orice.

Succi Liquirit. an. unc. i.

Cinnam.

Cardam. an. an. unc. 3.

Bonneti q. (egregium est in affectibus Pediculi.) unc. iij.

Syrup. unc. 3.

Alyp. Michal. dr. ii.

Sem. Nefari.

Orice an. dr. iij.

Incisa & contusa irrorentur cum spiritus sulphuris: infundantur in spir. Hyssopi, Heloni & Rosella: digerantur & extrahantur: In liquate filtrato dissolvatur Extratum Pediculi, & servetur pro usu.

(Extratum Pediculi Michaelis est Succus Tussilaginis, vel Plantaginis inspissatus.)

Hoc Elisir cum dimidia parte Spiritus Asthmatici permiscum, & ad guttas 40. 30. vel 40. prupinatum, est excellens Remedium: c. g.

24. Elir. Pediculi. dr. ii. vel iij.

Spiritus Astmatici. dr. ii.

M. S.

Elisir Pediculi, & Asthmaticum.

Alii solummodo spiritum Gummi Ammoniaci cum Erugina destillantur miscunt cum spiritui Ausi vel Zedairae, & ita similiter egregium Remedium habent contra Asthma. Quidam locum spiritus Asthmatici laudant etiam spiritum Nitri dulcem; c. g.

24. Ag. Astmatici. Rud. unc. iij.

Spiritus Nitri dulc. dr. iij.

M. S.

Aqua Asthmatica coctionem sumenda.

Nounulli recipient Gummi Ammoniacum, & miscunt cum aliis, aut faciunt exinde Loch, vel Electuarium, quale videb. in RIVERO Cent. 3. Obf. 23. c. g.

24. Gum. Amma. in Vno sol. dr. i. vel dr. iij.

Oxymel. quillit.

Syr. Rad. Eucali.

Marrub. an. unc. i.

M. S.

M. S.

Succus Asthmaticus pro aliquot vicibus.

Cui etiam pro lubu addi possit *Aqua Hyssopi* ℥iij. vel iv. ad imitationem *Brannenmanni Mixtura*: item *Spermatis Ceti* ℥ss. vel ultra.SCHÖNFELDER *Curat. lib. 2. pag. 230.* sequenti modo laudat:℥. Gum. Ammoniaci *Aretz* ℥ss. ℥ij.*Extr. Cret. Di.**Syr. de Præf.**Hyssopi.**Osmell. squillib.* an. ℥ss.*Vini Rhenani* ℥iij.*Aqua Asthmatic.**Aur. Langii.* an. ℥ij.*Spir. verum.* ℥ss.

Misceantur.

Observetur tamen hic, ne nimis sit usus vel abusus dulcium, & saccharatorum, ut ordinariè usurpentur vulgariter; admodum enim nocent Pulmonibus & stomacho, & quodammodo ad Phthisin disponunt.

Dictum *Elixir Pedonale* etiam cum *Spiritu Salis Ammoniaci* anisato misceri, & ad guttas 40. vel 50. propinari potest. Vel.℥. *Aq. Hyssopi* ℥ij.*Verum.* ℥ij.*Spir. Sal. Ammon. anis.* ℥ij. vel ℥ij.*Syr. de hyssop.* ℥ij.

M. D. S.

Potio Pedoralis. Vel

℥. *Spiritus Salis Ammon. anis.* ℥ss. D. S.*Spiritus aperitivus ad Respirationem.*

De quo capiat æger 30. vel 40. guttas ter in die: mane in vehiculo calido; à meridie biborio ante passum in frigido; vespri, post moderatam cenam; sub intrinseca lecti, æternum.

Vel

℥. *Spir. Carmis. de trik.* ℥ij. D. S.*Spiritus resolvers.*

Eodem modo usurpatur. Vel

℥. *Tinctura Tartari* ℥ss.*Spiritus Salis Ammon.* ℥ij.

M. D. S.

Tinctura resolvers.

Usurpatur eodem modo.

Elixir Proprietatis *Paracelsi* & ipsum insignis est efficacie in Asthmate pro varietate preparationis à guttis xv. xx. ad xxx. propinatum. De Oleis Seminum Pedoralium, ut Oleo destillato Anisi, Salvie, Rosamarinii, in hausta Vini propinandis, nihil dico, quoniam sunt alias satis nota. Facit huc suo modo *Dissolvent* istud ad Asthma expertum & utilissimum FRANCISCI JOELIS L. 3. *Prax. sect. 1. cap. 5. p. 15.* cuius basis est Radix Zedoariæ, quo ipso in asthmate & Orthopnea facilitatem Respirationis sæpius restituisti se asserit. Prescripsi est hæc:

℥. Rad. Zedoar. ℥ss.

Gumm. Ammon. ℥ij.*Fl. sulphuris* ℥ij.*Creti* ℥ij.Contus. eos. in *Hydromel.* ℥ss. l. (nam mediocri Mellis usus præferendus est usui Sacchari) ad medias.

D. S.

Potio Asthmatica bene circumagitanda.

De quo potius sæpi in die cochlear. l. & ii. propinetur. Nam sola Radix Zedoariæ nisi levat Dyspnoeam, & comedatur, eodem docente JOELE. Loco Radicis Zedoariæ alii laudant radicem Zingiberis, & scilicet huius ℥ij. in ℥v. Aquæ communis coquitur ad consumptionem ℥ss. & hinc aliquantulum sacchari ac Mellis addatur pro potu ordinario. Ab ista Potione Jussie non abluat *Potio Brunneri*, qui eam tanquam Panaceam in Paroxysmo commendat, ubi alias sedari nequit. Compositio est hæc:

℥. Rad. Zedoar.

*Afaci.**Dest. Flor. an.* ℥ij.*Glycerin. rafa* ℥ij.Coque in Aqua *fact.* ad consumptionem tertie partis*Celastræ* ℥. unc. viii. in qua dissolve*Gum. Ammon.* ℥ij.*Osmell. squillib.* unc. l.*Syrup. de Præf.* unc. l. vel unc. ii.

Misceantur.

Juxta dicta Sulphur, & in specie Spiritus Sulphuris scidus per campanam paratus, in Aqua appropriata ad gra-

Tom. II.

tam aciditatem propinatus, admodum commendatur à Prædicis ad allevandum Paroxysmum Asthmatis Humidi: Miscetur cum Aqua Florum Raparum, cum Aqua scabiosæ, Hyssopi, Symplo Helonii ad gratum laporem, & propinatur tam in, quam extra Paroxysmum: addatur, si placeat, Syrupus de Nicotiana: cuius Mixturæ cochlearia aliquot subinde hausta insigniter attenuant, abstergunt, & rasilis expectatione promovent. Vid. de hoc THONERUS, necnon HORATIUS AUGENIUS, item BRUNNERUS in *Conf.* 34., ubi hic necit ferre, quomodo sufficenter commendare debeat hoc flagrum acidum sulphuris in Aqua appropriata: *se vidisse*, inquit, *ad decem horas paroxysmum asthmatis periculossimum effugium, cui propinatum Ol. sulph. in Aq. Hyssopi miraculi instar celsiteris opem.* Imò ab omnibus Authoribus commendatur, tam ad malum præcavendum à Recidiva, quam Paroxysmum imminuendum: licet aliis extra Paroxysmum crebrius Florum sulphuris usus, uti & Potus sulphureus Pulmonibus optime confert. Varie possunt fieri Mixturæ hujus Olei Sulphuris, imprimis ad imitationem *Misturæ Brunneri*:

℥. Aqua rad. Ruæ.

*Flor. rapar.**Scabios.* an. unc. l.*Spir. Rad. Angel.**Zedoar.* an. dr. ii.*Syrup. Nicot.* dr. vi.*Spiritus sulphuris.* q. l.

M. D. S.

Potio Pedoralis.

Vel

℥. *Aq. Flor. Rapar.* unc. iv.*Cinnamon. cum Vino* unc. ss.*Syr. Nicot.* unc. l.*Spir. Sulph.* q. l. pro subelli acore.

D. S.

Potio Asthmatica.

Vel

℥. *Aq. Fœnicul.**Hyssop.**Flor. Rapar.* an. unc. l.*Spir. Zedoar.* dr. vi.*Sulphuris* q. l.

M. ad gratum laporem: S. ut supra.

Commendo Aquam Florum Raparum: nam de hac BRUN-

NERUS c. l. dicit: quod hæc Aqua cum Cræso, & Jussie *Mis-**ture mixta, miraculis Asthmaticis restituit Respirationem.*

Vel

℥. *Aq. Hyssopi.**Nicot.**Verum.* an. unc. l.*Spir. Zedoar.* dr. viij.*Syr. Rad. Helen.**de hyssop.* an. unc. ss.*Sp. sulph.* per camp. q. s. pro grato sapore.

D. S. ut antea

Nec inolegans est *Mixtura Lindani*,℥. Rad. *ross Fl.**Liquirit.**Tussilag.**Flor. Violæ.* an. unc. l.*Rad. Imperat.* unc. ss.*Helen.* unc. ii.*Sem. Fœnic.**Anisi* an. unc. ss.

Omnibus crassificat concisus affunde

Aceris occurr. ℥ij.Maceræ & digere per triduum: *Celastræ* addde*Sacch.* ℥ij.*Spir. sulphuris rectif.* unc. ii.*Vini Malvaris.* ℥ss.

M. &erva diligenter.

Dosis mane & vespri cochli. ii.

Facit etiam hic *Potus sulphureus Helonius*, sulphure accento & suffuso probe imprægnatus, qui optimus est pro Potu ordinario Asthmaticorum, & Tussificationis, & similium: vid. *Temulus Pessis*, & *Tr. Tussis & Asthma in fac.* & *conf. CNOEFFELII* elegantissimas *tab. de Cura fibr. epidem. malignæ.* pag. 96., qui eam spiritu sulphuris etiam gummi Ammoniacum miscet, quod addi potest, nisi laper molestus fuerit: c. ss.℥. *Aq. Flor. rapar.* unc. ss.*Hyssop.**Verum.* an. dr. vi. vel unc. i.

B b 2

Spir.

curatur: item pag. 270. Asthma convulsivum refert per Salia volatilia curatum.

Ex diſſilis loquentes concinnari poſſunt formulæ: e. g.

℞ Pulv. Epil. Marci. ℥i. vel anisimial. gr. iiii.

Cinab. Animoni gr. ii.

Sal. volat. ſuccia. gr. iiii.

Laudan. opiat. gr. i.

M. f. Pulv. s.

Pulvis pectoralis ſedans. Vel

℞ Tinctura Tartari comp. qſ.

Spir. carmin. an. ℥i.

℞. qſ. ℥i.

M. D. S.

Mixtura aſthmatica coſtlectim ſumenda.

Doliſ 40. gutturæ. Vel

℞ Tinctura ſulph. vel ℞. Catarrhal.

Liq. cor. Car. ſucc. vel Spir. Sal. amm. an. ℥i.

℞. qſ. ℥i.

M. D. S.

Eſſentia Pectoralis. Vel

℞ Aq. hyſſop. vel ſenſib. ℥i.

Aſthm. 36. vel ℥i.

Spir. Sal. amm. ℥i.

Syr. de hyſſop. ℥i. vel ℥i.

M. D. S.

Potio Aſthmatica. Vel

℞ Aq. hyſſop. ℥i.

Pern. ſpirital. ℥i.

Spir. Sal. amm. ſimp. vel an. ℥i.

Syr. de hyſſop. ℥i.

M. D. S.

Potio Aſthmatica. Vel

℞ Ovi Amygd. dulc. ros. exp. unc. ℥. ad ℥vi.

Spern. Cui ℥b.

Croi gr. vi.

M. D. S.

Oleum aſthmaticum & pectorale.

Hic Remediis utitur interdum interponitur, interdum poſmittitur vomitus, præterit ubi ſigna mali hæret in abdomine, & ſuprà monſtrum fuſit; niſi hyſterica pathema coſtlectim ſint, in quibus caſu præoccur. Interdum dico; non ſemper; vid. D. BOYLE l. c. pag. 270. ubi reſert exemplum talis aſthmatis convulſivi per vomitum curati; unde ipſe non deſinit, quod tale fuerit, tamen circumſtaſtæ ſatis aperte monſtrant. Huc pertinent olea deſillata pectoralia & nervina, ut olea deſillata Aniſi, Salvia, Roſiſmarini, Succini, Terebinthine, &c. que aſthma convulſivum colluunt. Caravi aliquando tale aſthma ſiccum viſu pulmonem, eorumque contricta eorum, aliis quamplurimis irritis, recipiendo:

℞ Olei deſillat. ſuccia gutt. viii.

Aniſi.

Terebinth. an. gutt. iv.

Sacchar. albiff. ℥b.

Miſcebatur pro duabus doſibus.

Harum una capiatur mane, altera à meridie, unde mirabile levamen ſequenti nocte percepti. Hinc poſtmodum:

℞ Olei deſillat. ſuccia. ℥i. ad ℥b.

Aniſi.

Terebinth. an. ℥b.

Miſc.

Doſis erant viii. vel x. ad xii. guttas, quæ in vehiculo calido, & interdum etiam à meridie in hauſtu quoque frigido, capiendas; laſando intermedio tempore ſubinde alvum per puſſulas minores laxatas, unde paroxyſmus nocturnus hinc miſciſſimus; altera die emouet, & patiens ſine expectoratione convaleſcit, ac poſtmodum ſitis commodè ſe habuit. Cum his parata ſalia volatilia oleoſi erunt optima.

Caravi hæc faciente etiam ſilimenta externa anodyna, & emollientia, Pectoralia aliis dicta, loco quorum fuſſet ſolum oleum Amygdalarum dulcium: vel ad imitationem WEDELI.

℞ Ung. ſorb. v. dr. iiii.

Croi pulv. verſ. ℥b.

Ol. deſillat. aniſi.

Fruct. an. gutt. xv.

M. f. Linimentum: S.

Ungueum Pectorale leniens.

Vid. WEDELIUS de med. Compoſitione pag. 180.

Vesicatoria quæ ſcapulis aut brachiis applicata ſubinde multum opus præſtant, tam irritatione moleſta ſpiritus influentem morbum divertendo, quam feri acrioris, præterit ſcorbutici, talis aſthmatis crebriorem ſomitem derivando aut avertendo.

Mulier ſerè 30. annorum, cui tamen adhuc ſubſtant Menſes, laborabat Tertiana intermittente ordinaria, ſed die vacuo torquebatur aſthmate convulſivo gravifſimo, veſperi poſt horam 7. ex improvio ſuperveniente, & ad 4. niſque matutinam perſeverante; dies vero paroxyſmi febrilis erat vacuus abſque tali aſthmate, quod ſaltem die à febre vacuo veſperi aſſigebat. Et quidem primò nulla tuſſis aderat, nec ſaltem levis & inanis præcedebat; ſecundo ſeratus ſeu materie excretio nulla; aliquando quidem ante paroxyſmum die illo, quo veſperi rediturus erat, viſcida quædam mucoſa exſerebat, ſed maxime nec ante poſt eum: tertio ſubſtatur paroxyſmus ſuccedente ſine ſenſibili materie evacuatione, incoabat ſubito ſine illa cauſa antecedente. Symptomata erant reſpiratio diſſicilis, imò ingens hinc Cordis palpitatio, anxietas præcordiorum gravifſima, motus convulſivi in brachiis, & ſcapulis, extremorum Frigus, Sador varius, præterit frigidus, in paroxyſmo aſſigebat; ſueto Paroxyſmo liſſendo omnium membrorum, calor corporis, pulſus celer & frequens aliquando ſupererat. Ex quibus facile erat concludere, paroxyſmos hos reverà eſſe de aſthmate ſiccò ſeu convulſivo. Fiſta & curata febre, periodum ſuum tertianam obſervat paroxyſmus aſthmaticus. Tentata vaſis, imprimis volatilia, Liquor cornu Cervi fuſciſſimus, ſpiritus Carminativus, eſſentia calſtrei, ſpiritus Lumbicorum terreſtrium, ſperma Ceti cum croco, emplaſtrum ex Tacaſama, & galliſano pro præcordiis: ſed incaſum omnia. Malum non erat hyſtericum, aut ex abdomine vel hypochondriis: in his locis quæta omnia, caput ſine labe, ſaltem peduſioniverum diſtingi, Faucesque occludi videbantur, niſi monſtri ſoniſus ſpiritus ducere poſſet. Præceſſerat gravis Cephalalgia, hæc exceperat Febris, quæ cum per oſtium duraveſſet, adſciavit hoc aſthma. Suſpicatur acceſſu maxima Cephalalgia quod intererat, utique ſub motu febrili reſoluendo aut nervos intercoſtales derivatum, unoquoque vel alterum huius nervulum aut ſaltem plexum compaſſe, unde illic lacrymæ: Urinæ cruſſæ cum copioſo ſedimento quali ſarſinaco, & ſilibus ſcorbuticis admodum copioſis, unde & ſcorbutus deſiteſcebat. Supervenit dolor, & tumor humerorubens ſubito omiſe, propter applicationem Hirudinis urgoſum, à quibus certum levamen ſperabatur: ſed obſtinate renuit; unde pro horum levamine;

℞ Mucil. ſem Cydon. cum ſperm. Ranae, extr. ſucc. i.

Syringis vini præb. camphor. dr. iiii.

Sacchar. Saturni. dr. i.

Miſc.

Quo linimento bene humectatum applicabatur crebrius.

Aliis ergo irritis, ordinata ſunt duo Veſicatoria ampla, utrinque prope Corpus applicata die vacuo: die vero paroxyſmi bilioris ſote hunc;

℞ Far. Lycopod. dr. b.

Pulv. Epil. anisimial. gr. ℥. ad gr. ii.

Miſc.

Quorum uſo per triduum omni veſperi continuoſo, eva-

luit paroxyſmus penitus, ita ut exade convaleſceret.

Scopus erat veſicatoris doloris ratione divertere motum ſpiritus, an forſas de acri ſcorbutico ſimal evacuat: quid poſſet: non adeo attodebat, dum ille pulvis interre præternaturali ſpiritus impetum liſpando paroxyſmos levaret, ipſa natura ſub ſtatū ſuò racato quod ſupererat corrigere, & ita etiam ſaltem fuſſet. (1)

Habuiſſum ſum aſthma humida, & aſthmata coconvulſiva, ſeu talia, quæ impediunt motum pulmonem, ſive coconvellatur Thorax exſpirando, ſive coconvellatur inſpirando: Pergo ad alia Inſpirationis linc vitia, quæ inter non ultimum eſt ſingularis.

Melite 1. Muii 1718.

SERRAſſIMUS Dominus Sacre Religionis Hieroſolymitana Magnæ Maſſer olim conſiſſabator, Reſtoriam Melita miſſum hic ſubſcribere, eique Caſſibus, cum aliis Proſſoribus hic habitans, argui à Me hunc temporis ſeripſum, ſuperaddere.

De Singultu.

Singultus est *Respiratio*, seu potius *Inspiratio violenta & interrupta, cum impetu ac cum sono ingratum*, & dependet a lubricitate ac vehementi Diaphragmatis deorsum versus contractione, & revera Convulsione. Percipimus enim omnes, quod singultiendo cum impetu inspiramus, & quod tunc simul regio Ventricali antrosum versus moveatur, sicuti hoc alia fieri solet in omni ordinaria Inspiratione. Dum ergo Diaphragma violentius & cum impetu deorsum versus contrahitur, Ventrículus & Abdomen necessario antrosum versus propelluntur; & ita cum subitanea Inspiratione Singultus efficitur. Veteribus aliis Singultus flaccitur affectus Stomachi irritati: sed parum considerat: Nam & ipse HIPPOCRATES, & GALENUS in *Comment. Super Aphorism. 3. sect. 7.* aperte statuit, talem Stomacho esse Singultum, qualem Nervis Convulsionem. Imò hinc inde Auctores Prædici aperte comparant Singultum Convulsioni: sed cujus partis? nempe illius partis, quæ Inspirationi primario interviit, & talis pars est imprimis Diaphragma, quod scilicet convulsim violentius, & cum impetu deorsum trahitur, Singultum infert: adeoque primus, qui hanc sententiam quod Singultus sit affectus Diaphragmatis, defendit, est PLATERUS: à partibus etiam dat SYLVIVS: Conf. idem defendens MAYOWIVS *de Respirat. pag. 292.* Nec desunt Argumenta, quæ hoc ipsum persuadent, quod Singultus primario oriatur à Convulsione hujus contractione fibrarum Diaphragmatis versus inferiora, modo consideremus, quænam circa Singultum sint observabilia?

I. Quod confirmat, est, quod non omni tempore voluntarius singultus fingitur. Hoc aperte innot, non Stomachi esse adhesionem, in quo nullus est motus volutariorum: sed necessario affici partem, quæ voluntate nonnulli subiacet imperio. Et quidem cum faciamus Singultum inspirando, innot talem affici Muculum, qui pro voluntatis imperio Respirationem, vel adhesionem nullam potest nonnulli mutare. Jam nullas talia est Muculus in toto Respirationis negotio, quam Diaphragma, quod Respirationi primario interviit, & Nervus Cerebri & Cerebelli constat: unde Diaphragmate convulso, sit Singultus propterea cum via alteratione pro voluntatis imperio possimus etiam Respirationem variis modis mutare. Primario ergo in Singultu lesum est Diaphragma.

II. In omni Singultu percipitur motus vehementer Abdominis circa regionem Epigasticam extrosum versus, quod non potest concipi alio modo fieri, nisi quod Diaphragma ex coarctate nimia aliquantisper (non in totum) planius reddatur, omnia Abdominis contenta deorsum ut extrosum premat, & in specie Ventrículus ipsi proleione innot. Nam cum hoc fiat saltem inspirando, & in omni Inspiratione Diaphragma moveatur deorsum, patet, Diaphragma saltem in Singultu esse affectum.

III. Nullus potest Singultus fieri, nisi inspirando, id est, aërem atrahendo, & ita Diaphragma deorsum versus movendo.

IV. Sæpius curatur Singultus sola Inspiratione continuata, & quam longissime inhibita Expiratione. Jam ergo si esset motus expulsius Stomachi in Singultu, Inspiratione potius aggravaretur malum, quam curaretur: Ratio, quia in inspirando Diaphragma comprimit Stomachum, unde potius irritaretur ad Singultum, quam quod exinde malum levaretur: imò ex contritione liberum sequeretur Vomitus.

V. Notum est, joco interdum, imò sæpius, curari Singultum: Id quod innot, non aliquid naturalis, sed potius voluntarii, & secundum rationis ducum alterius partis, primario in Singultu affectus; quæ in Inspiratione non est alia, quam Diaphragma.

VI. Ad hæc Sternutatio superveniens Singultui hunc solvit, i. e. curat, teste HIPPOCRATE *Section 7. Aphorism. 53. Methodus. Academi. Nat. Curat. Ann. 3. Observat. 238. pag. 216.* & WEDELIO *de Medicamentorum Facultatibus pag. 222.* Ratio, quia forti Sternutatio, adeoque sub forti illa expiratione, concussum Diaphragma ex se dispellit, non minus quam cum Stomachi orificio, quod istud antea irratat. Sternutatio enim revera est motus Diaphragmatis, & oppositus motui Diaphragmatis in Singultu; dum enim singultu inspirando, sternutatus expirando, hinc Diaphragma convellitur, & sic Singultus contrario motu per Sternutationem tollitur.

VII. Nimii Animi motus, v. g. Ritus, Terror, Ira, & similia parietem, curat singultum: adeoque ratione spirituum animalium, qui à fortiori objecto commoti & alterati mentis vacant singultui a variato enim motu eorum, qui influunt in partes molles, variat etiam partium motum. Exempla talium ab Animi motibus, e. g. terrore Felix, Muris, &c. coram habet VALERIOLA *Observ. 4. lib. 1. pag. 123.* utut alias etiam non sint rari: Sic si quis attentius personæ, quam amavit, & à qua redamatus fuerit, recorderet, Singultum tolli, experimentum in vulgus notum est, ob eandem Spirituum animalium revocationem, à Diaphragmate unicum ad cerebrum: Alii immisso cerevisiæ cultro, eundem huiusmodi non inspiratio adeo deglutunt: Nonnulli hinc costringunt arctissime minimum digitum &c.

VIII. Ad hæc absque Stomacho affectu, Hepatis Inflammatio sæpe ducit singultum exitium: quia Hepar inflammatum parte sua convexa immediate contingit Diaphragma: patet, verò convexa Stomachum. Unde tunc continuus hujus Diaphragmatis motus molestiam creat, ratione cujus irritatur continuus ac stimulat, ut convellendo singultui, hinc.

IX. Observatur etiam non raro singultus in Morbis Convulsivis, v. g. in Passionibus Hystericis.

Singultus ergo fortalis, ut dixi, consistit in contractione violenta & convulsiva Diaphragmatis inspiratoria. (X)

CAU.

causæ sunt, ex illis, quæ præterea poterit. Peritur ergo singultus ex Gutti Juniperi, Symplicis, Succine, additis etiam: cavilla Subhoris, quæ quidem hanc igni insperguntur, ne faciem erant vehementem, potius ad Tussim excitandam, quàm ad illam tempus etiam aperient, sed vultu inflexu excepta siccioribus præis imponantur, ne huiusmodi vix perceptibili per aliquam classem conclave deambulantes illas interius per semel hanc Serenissimum Principem diffundatur.

Cibus tenuis sit, & parvus, non à Carnibus, & salsioribus cibis paratus, sed ad fortioribus, Juscula, & liquida vergens, præsertim qui circa hoc sumitur: ne scilicet hoc difficiem illius, nullis præsertim tempore, digestum, vinislongue in Ventrículo imi ventris fermentationem, Alimentsa Paraxysmum excitent. Quod si cum dormiamus in Serenissimum Ager, Carnis Jusculum addita radice China, Sassa parilla, rubea Eboris, & Cornu Cervi, Folis Tussilaginis, & Pulmonaria maculata, æque item Piperis decortica paratum, cæca vicem supplet, nullum excogitari poterit nec opus, nec efficacia medicamentum. Maxime huius vel alterius Carnis Jusculum, sed aliæ alterationem medicamentum additamentum, exhiberi poterit, vel Chocula calida potus, à quo non ablueretur, sed ratione veteris consuetudinis, tam etiam quia in præcipuo illius constituit obsequium quam illi, & pinguem substantiam agnoscimus, quæ tantum abest, ut possit Tussim curare, vel Dyspnoeam inducere, quin potius utriusque male aptissimi remedium potius est.

Potius talis concedatur quævis Ventricali, sed passim consuetudini congruat, & si Vinum bibat illud Aquæ diluam permittant, ne capax tenet, vel aërem Cibus inspiratur. Quod ad Simulacrum, Excitetur, & Animi parietem administrationem potius, id enim medicamentum quandam ut ferret aquam est. Cætera quæ adversus Hepatandis em, vel Scorbuto afflicto addideri possunt medicamenta hic præterea superfluum, quippe quod pro illorum velle usque influendo quæperrima requirentur, quoniam notitiam desideramus. Sufficit ex hic innuere, quæ in Serenissimum Principem ab erantibus verbo vindicemus pro nostro modis excogitare paratum, reliqua in Præscriptis, quibus illius Curatio honorifice demandata est, committimus.

(K) Et si non negem in Singultu affici Diaphragma, imò quod ejus convulsione violenta inspiratio rediatur; atque negare quoque non possum, irritantius ortum læpsim esse in Ventrículo, & fortasse in ejus orificio, sius Diaphragmatis contentum, quod Stomachus appellatur: videmus enim frequenter mi ex aridiori cibi fructu, vel viscido plerumque huius orificio adhærente, Singultum excitari; communicatio nempe irritantius in ejus Diaphragmatis, ab fibrarum communium nexum. Sic quævis non ne

genius

C A U S Æ.

Causa hujus violentæ Diaphragmatis Convulsiois est semper id, quicquid ad violentiam, non tamen durantem, sed interruptam subinde et reciprocam contractionem, Diaphragma irritare et vellicare stimulare valet. Hoc ipsum, quod ita irritare valet Diaphragma, ut sitis contrictus fiat Convulsio, interdum, & quidem sæpius, hæret in Stomacho, officio nempe ejus superiore, quod Diaphragma perforat, ipsique in transitu firmiter satis conneditur; unde vulgo falsum putatur Singultum Stomachi esse affectum. Pertinent ergo hæc imprimis Alimenta, aut Medicamenta nimis acris assumpta, vel alia quæcumque: Sic quidam loco Balsami Sulphuris assumens Oleum Viterioli, exinde in gravem et periculolum incidit Singultum, quatenus Orificium Ventriculi & Diaphragma fuerat laesum, de quo refert BARBETTE in sua Praxis lib. 4. cap. 2. pag. 236. Sic fuscus Panis quantitate nimia comestus & illico devoratus, Singultum concitaret dicit FERDINANDUS in Hæst. Medie. Conf. 43. Item in Febribus Continuis Ardentibus post Intemperatum & intemperatum Juleporum acidorum, & Emulsionum refrigerantium usum, non raro Singultus sequitur, saltem Vini potu curandus; uti hoc habet SCHENCKIUS l. 3. Observ. Alia itidem Ventriculorum Intensa alacritas, in specie refrigerantia, Singultum inferunt: sic enim TIMÆUS in Galienicis in Caf. lib. 3. Caf. 5. pag. 225. acient Singultum gravem & contumacem ex potu copioso Aquæ frigide & Natri, quatenus Stomachum affecit: sic Singultum oblatum per bimenses æ nimio Aquæ frigide haustu post æstus observavit RIVERRIUS Morb. Insuper. Obs. 1. Hæ enim & similes causæ, Stomachi orificium superius cum impetu vellicando & stimulo, simul etiam Diaphragma facillimè irritant, quod irritatum nititur excutere rem molestem, adeoque convellitur sub Inspiratione, & ita Singultum inferunt.

Sed præter occasiones tales Externæ, & ex Internis Singultus supervenit Stomacho affecto, sive per Essentiam afficiatur, sive per Consensum: Per Consensum v. g. in Vulneribus Capitis, in Nephritis, in immenso lico, in Hernia graiori, quibus sæpius, utut effusio omni, Singultus supervenit. Per Essentiam afficitur Stomachus, dum ab acriori quodam plüs minus viscido succo, intra rugas prope Orificium superius hærente, originem ducit, cujus expellendi nam singultus iniquatur. In specie in Febribus Ardentibus apte Maligis interdum singultus supervenire solet, idque inter utrumque ex stomacho, ex Causa Maligæ graviter affecto.

Raro, quod ex affectu Orificio superiori superveniat singultus, seu Diaphragmatis Convulsio, est contusus stomachi cum Diaphragmate, quia stomachi Os superius facili transit, non per circuitum nervum Diaphragmatis, ut fert communis opinio, sed per hujus Musculum posterosum, ibique idem firmiter satis annectitur. Conferatur novæ ac accurata Diaphragmatis Anatomie CASPARIS BARTHOLINI, cujus epitomen videb. in BARTHOLINI Atl. Medie. Hæst. volam. 4. pag. 24. Unde si aliquod pertinet vellicat Orificium stomachi, facillimè simul vellicatur Diaphragma, eique fibræ musculares nervæ, & eandem sequitur Singultus.

Præterea plures aliæ etiam Causæ, quocumque modo Diaphragma afficiens, sive in hoc ipso, sive in Pectore hærente, ad singultum disponere possunt: ut v. g. Hepatis Inflammatio in parte gibbosa, ubi immediatè contingit Diaphragma, singultum inferit, uti jam superius dixi. Quæ etiam pertinent Conformationis vitia, Luxatio semper Colarum inferiorum, dum Collarum interius ad Ventriculum versus detorset, ut iis adhereret Diaphragma, Causa fuit singultus trimestris, quarum repositio ejusdem curatio existit, teste SCHENCKIO in lib. 3. Observantium; item contumax singultum est in præfessione undecimæ Thoracis Vertebra observavit RHODIUS Centur. 2. Observat. 61. Infantibus & Junioribus magis voracibus frequentes singultus contumaces, idque imprimis æ Pineta viscidæ acidæ, pertinaciis stomachi Orificium obdentes, unde etiam non raro chronicus & admodum diuturnus talis esse solet singultus. Ea Arthritis non amplius Arus afficiente singultum desperatum observavit VELSCHIIUS Hæst. 2.

pag. 20. Purgationes effluens subinde Singultus malo omni sequuntur, ut notat HIPPOCRATES 2. 7. Aphor. 41. Singultum non raro est, Convulsiones aciores insequi Purgationes. Tandem Febribus sæpè continuus, aut in statu periculoso, aut in quibus jam Convulsiones imminet, supervenit; partim ex pellente affectu stomacho, partim ex spulitis jam immensibus, seu ultimo Naturæ conatu. Denique ipis Morbis Convulsivis, vel universalibus vel particularibus, per consensum Diaphragmatis simul afficiuntur subinde supervenit singultus: huc etiam Passioibus Hystericis subinde singultus supervenire observavi.

Hæc de natura singultus.

Rara item singultus qui vult Exempla, qualia non paucæ prostant, adeat MARCELLUM DONATUM in lib. 4. Hæst. Med. Mirabilia c. 5. item SCHENCKIUM l. 3. Observ. BARTHOLINUM Cent. 2. Hæst. Anatom. 4. lib. 3. Singultus quatuor annorum continuo; item Cent. 3. Aphor. 61. de Muliere adeo graviter singultante, ut per biennium a Dæmone obsessa crederetur; quibus addatur BARTHOLINI Alia Medica Hæst. lib. 3. Obs. 21. & lib. 4. Obs. 73., in quibus reteritur singultus periodicus annuam in Virgine recurrent, & toto die affligens, somno cessans, uce nisi larga Venæ sectione in brachio curabilis.

D I A G N O S I S.

Quod attinet signa Diapneusis: singultus per se patet & cognitus facillimus est; vel instantibus quoque notat: saltem curiosis fit Medicus in perscrutando Causis remotis, seu fonte morbofo, an hæreat Causa irritans in stomacho? an in alio quodam loco, ut ejus diversitate Curam tunc temporis variare queat.

P R O G N O S I S.

In Prognosi observandum, quod singultus ex Causa externa, vel manifiæ, vel vitio Assumptorum, vel vitio Excretorum, sit affectus levis, missa periculosa.

Singultus autem quicunque supervenens Vomitus, aut Purgationis nimie, Diarrhææ, aut Dysentericæ, sæpius & utrumque periculosus est, quia imminens Convulsiones epilepticas, in talibus Morbis supremum lethalem, innuit.

Superveniens etiam singultus Inflammationis Hepatis vel alius Visceris, malum pronunciat, ut hoc habet nosse HIPPOCRATES lib. 5. Aphor. 58. & lib. 7. Aph. 18. Exemplum hujus, quod singultum ex Inflammatione Hepatis lethalem esse confirmat, refert AMATUS LUSTANUS Centur. 3. Curat. 30. Vid. Dissert. D. REINESII de Inflammatione.

Pertinaci Alvi suppreffioni aut etiam Morbo Ilico, aut etiam repetitæ & contumaci Herniæ, aut etiam in alio Intestinum periculosis Doloribus, supervenens singultus admodum periculosus esse solet; innuit enim imminens Vomitus hæcortis lethalem.

Singultus in omni continua Febre & Morbo acuto periculosus est, nisi fiat instante Crisi per Vomitus: hinc PLATERUS l. 2. Obs. pag. 203. rectè asserit, singultum Febribus Ardentibus non in principio, aut circa statum supervenientem & perseverantem, plerumque esse Mortis præsentium; quod tamen non æquè universaliter verum est, contrarium apparet in HORATIO l. 2. Obs. 25.

Distiguatur ergo singultus: nam qui in Principio Morborum acutorum supervenit, minus est periculosus; qui autem in statu cum aliis gravioribus symptomatibus sit, periculosus & sæpè lethalis est. Singultus enim in principio Morborum acutorum oritur ex turgescentia in primis viis, unde Vomitus superveniente cessat singultus.

Singultus sæpè diuturnum malum est, & Agrotumque subinde per plures dies, menses, annos cæc affligit, interdum penitus incurabilis observatur, in quo casu occultum quoddam Conformationis vitium, Os Ventriculi aut Diaphragma, aut Nervos afficiens, ferè sufficit solet.

C U R A.

Quoad Curam: in hac duo sunt consideranda:

I. Causa

genus Stermationem esse mutam contraxissimam Diaphragmatis; agere tamen non possimus, irritationem Nervus prius fallam, eam esse, ex qua Diaphragma ad contraxissimam expirationem multierum excitatur. Et quædammodo ex repetita Stermatione expellitur Nervus id, quod irritationem faciat; in ea tem repetita Stermatione remanet & Stomacho, quod maxam inferret, & Sinibus cessat: in hac sibi cavens fatetur quoque Author noster num. 6. dum Hippocratis Aphorismum exponit, & mox in sequentiis manifestissimè docet.

I. Causa proxima & occasionalis, quae irritat Diaphragma ad Convulsionem, est removenda; &

II. Materia remota ipse irritatio scilicet diaphragmaticus est tollendus, ut consequenter epistimodi contractura convulsiva remittat.

Ex quae vulgaris Aniculae sunt Remedia, compressio Thoracis, Respirationem omittam, &c. omitta. Dico potius: ad singultum compendiosum ratione indicatio- nis posterioris ingluiter commodari Opium, & quolibet Opata ac Theriaca, sensum irritationis tollendo, acque hinc natum impetuosum Spirituum ad Diaphragma motum, similiter impediendo, & sic Diaphragmatis spasmodum supprimendo. Nam Opil & Opiorum usum felicem omnes omnino depradicant, inter quae euphoris frequens est Theriaca, Mithridatium, Philonium Veterum, & Laudanum opiatum, vel simplex, vel hyssericum, quod ad- junc- to Caloreo singultum est: Sic HORSTIUS *supra* & *loci* r. 1. 1. 1. Singultum pertinacem admodum, Fe- bri continue circa finem supervenientem, curavit recipiendo

Conferve Rosae. 3i.

Theriac. Androm. 3℔.

Laud. opiat. gr. ii. vel iii.

& miscendo.

Hinc GALENUS similiter commendat Opata: sed eam- dem misere obet cum Appropriatis, & quidem scilicet, nempe cum Caloreo, Galanga, Zingiber, Caryophyllis, Ma- lliche & similibus: Hinc etiam ad singultum, item Vo- mitum & similia, talem ferè Bolum capere commendat TIMAEUS *pro Galienis*.

3℔. Theriac. Androm. 3℔.

Ligni Aloës 3℔.

Ol. deffillat. Mac. gutt. ii.

Laud. opiat. gr. i.

Misc.

Loco Ligni Aloës alia Appropriata possunt addi, in spe- cie Caloreo, Semen Aois, &c. Hinc aliquando ad imi- tationem TIMAEI felici cum successu talem praescripi:

3℔. Theriac. Androm. 3℔.

Laud. opiat. gr. i. ad ii.

Ol. deffillat. Anis. gutt. ii. vel iii. vel Sem.

Anis. 3℔.

Mastic. gutt. i. vel ii.

Cum Sines Cydoniorum sint Bolus.

Eleduarium contra Singultum pro una vice.

Talibus enim Opatis, uti rectè dicit GALENUS, fem- per admiscenda simul erant Appropriata Singultui dicata Ro- media: qualia sunt in specie Cionomomum, Aqua Galangae & Mastichina, Caloreo, quod uti in Morbis Convulsivis est optimum, ita & hic a GALENO & Veteribus insigni- ter commendatur; five interius assumatur, five solummodo Naribus admovetur. Semen Aois, et coque parata Essentia, Spiritus & Oleum; item Spiritus Salis Ammoniaci anis- atus, & similia quocunque modo assumpta ad Singultum sunt commodatissima, quae etiam externe ikericulo Cordis applicari & illi possumt. Zingiber similiter ad Singultum commendatur, si scilicet pulveretetur, vel in India condi- tum assumatur; sic enim tanquam euphoris non ultimam, ingluiter Singultum sistere dicitur.

JOEL in omni Singultu ceu praesentissimum com- mendat Coram Cervi usti 3i. quocunque modo osorpeti. FORE- STUS alias habet Julepum, quo ipso aliquoties feliciter usus est contra Singultum. Compositio ejus est hac:

3℔. Herd. Mand. M. l.

Sem. Anis.

Anethi,

Cervi,

Psiccoli,

Sigatur Frigid. maj.

Papav. albi an. 3℔.

Perillata,

Lactuca an. 3℔.

Flor. Cardui p. l.

Liquirit. r. 1. 1. 1.

Coque in sufficiente quant. Aquae comm. (melids in Cerevisia, aut vino) pro Bi.

Decodum coctum, & aromatizetur cum

Syr. Diacry. frig.

Diacryd. Alb.

Diatrum Jussal. an. 3℔.

Abbedo

Syr. Viol.

Aetref. Clivi,

Rosae, an. 3℔.

Tom. II.

M. D. S.

Jalapum.

Ubi verò pertinacius fuerit malum in Corpore robusto, ut quando ad aliquot septimanas, interdum menses, per- sistit haerere in stomacho, & quidem imprimis, ubi non suf- ficiunt & conferunt Opata, ante omnia praemittatur Pur- gatio, & quidem Vomitus ex Antimonialibus, ut huius medio eradicetur fomes morbosus & Ventriculo, praeter- tim quando talis consummatur singultus ex Pituita, ut vo- casor, vitrea, superior stomachi Officio firmiter impada, oritur; hac eim Vomitorio sublati sponte cessat malum. Quibus verò iocunda sunt Vomitoria, & opus est, ut fiat per ioteriora Purgatio, datae sunt imprimis Aloëticae, ut Pi- lulae ex Aloë, successu Macom tollentes, vel sola, vel cum grano Laudaci opati misce: aut si malum fortius haer- ret, Purgantibus miscetur Mercurius dolcis, adeque ad imi- tationem RIVERII *Cenr. 3. Observ. 42.* ubi curavit singul- tum molestum, sapienti quodidè per annum recurrentem; per *Catamelano Targueti, i. e. Mercurii dolcis 3. xvi. & Dia- grid. gr. viii. misa invicem; sicut RHODUS Cenr. 2. Observ. 80.* Singultum septem dierum cum Hiera, cum Oxy- melle data, excretis 3℔. Pituitae, finastum referet.

Peracta Purgatione vel Vomitu, dum laquei stom- achis, ad coosuetudinem singultus penitus tollendum, pro- pinquatur Remedia ex Zedaira, Corticis Acanthioem, Chamomilla Romana, &c. B. D. LANGIUS curavit sin- gultum decem dierum ex Humoribus crassis, tuicis Ventr- icali impactis, beneficio Salis Vatrioli ad 3℔. in Vino Malva- tico dati, quo maxime Pituitae vitreae copia exclusa, sin- gultus plane cessante. Pro corroboratione dedit bis:

3℔. Zed. r. 1. 1. 1. vel 3℔. aut Zed.

3℔. 3℔.

Ol. deffillat. Cinnam. Mac. vel Anis.

vel Caryoph. gutt. v.

M. pro Pulvere.

Propinquetur in Aqua Menchae spirituosae, & ita denab ro- borabitur stomachus.

Vel ad imitationem SYLVII data est talis Mislura:

3℔. Aqu. Menchae 3℔. vel 3℔.

Vino Martialis 3℔. vel 3℔. Theriac. simpl.

aut camphorae. 3℔.

Conf. Alkermes. 3℔.

Laudan. opiat. gr. ii.

Syr. Menchae 3℔. vel 3℔.

M. D. S.

Potio Confortativa.

Pertinet haec etiam Mislura sapiss ad singultum experta Cydoniata cum Estrado Zedairae, & Laudano opato, in M. A. N. C. *Ann. 6. Obs. 149. pag. 210.* Nempe

3℔. Mei cydon.

Tiellura Rosae, an. 3℔.

Zedairae, Zedairae, gr. xv.

Laud. opiat. gr. ii.

Ol. deffill. Cort. Aurant. gutt. iv.

Syr. Cydonior. 3℔.

M. D. S.

Potio Stomachum confortans.

Decor cochlearum.

Vel

3℔. Aqu. Menchae 3℔.

Spir. Theriac. camph. 3℔.

Anis. 3℔.

Laud. opiat. gr. ii.

Syr. Cinnam. 3℔.

M. D. S.

Potio Confortativa contra Singultus.

Quibus Mistris, ubi semel statas & erustiones stom- achis adfuerit, ubi interdum in singultu reperitur, & sto- machum ingluiter distendunt, commodè Spiritus Nitri, vel simplicis gutt. vi. vel viii. vel potius Spiritus Nitri dila- cia, aut etiam Spiritus Nitri theriacali a 3℔. ad 3℔. addi possit: aut si adpanda sine Pathemata Syphetica, loco Confectionis Alkermes, Extractum Calorei admisceri potest.

Externè in quocunque Singultu in specie expertum est Cataplasma Myrsinell ad Singultum, compositum est Fermen- to acri, Pulvere Menchae, & aliis aromaticis, malaxatum cum Oleo Calorei, impositum regioni stomachali; vix enim datur efficacius inter Extrema contra singultum Re- medium, quo multi feliciter & cum somno successu ura- tur: vid. *Descriptio in MYNSIGHTII Armentis. Sect. 38.* Simile est Cataplasma Schmeckii, quod tanquam certum & probatum ad singultum commendat: *Compensum* habet in

C c Thel.

Thef. Med. 2. Serris. 12. & est hac:

*℞. Sac. Lauri.
℞. rad. 15ss.
Mentha 2℥. i.*

Pulverista subige cum *Farmaciis* aeris quantitate
Ovi, impone patitur, affunde *Asterem fervens*, & cal-
dissime cum ligno triangulari impone regioni Roma-
chi & Praecordiorum, si existeret, deinde cum Aceto
irretoret & applicetur.

Deinde convenit etiam externe contra Singultum Em-
plastrum de Galbano crocatum *Myrsineis*, cujus descriptio-
nem videbis in *Artem. Chym. lib. 37. pag. 521.* Item Olei
Acellarii Anisi guttas aliquot Umbilico, aut Ictericulo Cor-
dis illic, in usu esse solent. Panis etiam calidus lotio ob-
volutus, Venterculo applicatus, efficax est Remedium ad
Singultum compescendum: efficacius si Vino Malvatico,
vel alio generis irroratus fuerit, & ita applicetur regioni
Romaticali. Quidam cum Spongia, aut Pano calido appli-
cant Venterculo totum humidum, saluum ex Aceto calido
valde scri, collo cum Galbero, Piperis, & Sinapi.

Hec in genere.

Pro varietate autem Causarum ad Singultum dispen-
tium etiam modo dictis Generalibus Specialia quidam ad-
miscenda sunt, v. g. si Singultus oritur a *Cruditate Stomachi*,
aut a vitata Digestione, tunc, praeter Vomium, & Pulve-
re Aloetico cum Laudano opiato misce conopias, uti sunt
Pulula poscare; item Pilula Mara-collige, Mallichine,
item Zingiberina, Elettaria Zedaira, Elixir proprietatis
cum Spiritu Aquili mistum, Elixir proprietatis cum Spiritu
Salis Armoniaci; item Elettaria Abinthii, Elettaria & Spi-
ritus Malliches, Elettaria Melissae & Pulegii, &c. nobiles
quoque sunt.

Singultus & irritatio si fiat ab *Humoribus acris* eprovisi-
tis ac ardentibus, plus minus effervescentibus, tunc supra dictis
Appropriatis in specie addantur Abstergentia: qualia Cry-
stallus preparata, Ebur ultum, vel Corpus Cervi ultum;
item Lappi Caecurum; qui abstergeat omnes corollas
humores: item Terra Solaris, Sigillata, Bolus Armena:
item Lappi Peracarum & Carpopium, Pulvis Absterbens
Widerli, cum Opiatis misce: in specie Pelliculae interne
Romaticae gallinae calcinate & pulverisate, & in Aqua,
succo & Sympo Portulacae uterpare. Singultum supradic-
tum ex assumpto acris, e. g. Oleo Vitaeoli haudo existi-
mus, BARBETTE curavit hac Mixtura in *Praxi* praer-
scripta:

*℞. Sacri Sempervivi. may. depur. 3℥.
Plantagin. an. 3℥.
Mell. Ovi Num. 1.
Syr. de Syrral. 3℥.
Laud. opiat. gr. ii.*

Miscendo, & cochlearim affundendo.
Huic Mixturae putassem simul deussae addi, aut Lappillos
Cancrorum, aut Cornu Cervi ultum, aut Terram sigilla-
tam, aut similia, Acidum praeponit abstergentia. Ad hujus
ergo imitationem

*℞. Aq. Endiv.
Plantag. an. 3℥.
Sacri Sempervivi. may. depur. 3℥.
Cornu Cervi viti. depur. 3℥.
Lappil. Cancr. prepar. 3℥.
Terre Syll. 3℥.
Laud. opiat. gr. ii. vel lii.
Syr. Portulac. 3℥.*

M. D. S.

Portio contra Singultum.

Si *Suppessus* addit *venit affampel*, vel *Maligantia* in Singultu,
v. g. in Febre Maligna, modo dictis Appropriatis & Alexi-
pharmaciae ex Terra sigillata addatur Aqua Cordis Cervi,
Cordialis *Herardi Saccini*, Aqua Cinagomum cum Vino, &
Cydoniata, Syrupus Corticum Citri, Pulvis Analepticus
Almopari, Laudanum opiatum, vel Extractum Theriacale,
& similia Maligantiae appropriata; ad imitationem RIVE-
RII *Curtis* a. *Observ.* 78. qui conitium singultum in Fe-
bre Maligna compescit per Emulsionem ex feminibus qua-
tuor Frigidis majoribus cum Lapidis Prunellae 3℥. Laudanil
opiat. gr. ii. Sacri Nartum Animoniacum ad 3℥. est con-
ventionissimum.

Ubi Singultus est *conspicuos* *Melancholici*, aut *Hyper-
stis*, Est ipse per Salis volatilis, Calorem, & Opium cu-

ratiss, simul Singultus evanescente solet.

Si Singultus est *Symptoma* Affectus cuiusdam gravioris, ut
passionem *Stomaci*, *Febrem dentis*, &c. sponte equidem,
Morbo primario curato, Singultus sponte cessat, quia tamen
partim insolentia, partim mali omnis est Symptoma, pro-
pterea simul *Soporificis*, & blanda Opia cum Affectu gri-
mario Appropriatis, ut videtur de Singultus & Affectus pri-
maris imolueantur, iungenda erunt.

Si Singultus sit a *nimia Refrigeratione Stomachi*, la specie, si
post nimium calidum est Haultu copiosissimo oritur Singul-
tus, qualem Singultum misce oblationem per bimeltem ducen-
tem observat RIVIERUS in *Observ. Morborum Infebrum*,
nam, uti vocat, *Observ.* 1. optimum possumus est, ut ad imi-
tationem eius instituat Balneum Aquae dulcis, in quo
Plantae Nervine incoctae sunt, cui laetetur Ager: quo con-
silio RIVIERUS Aegrum ex nimio frigide Haultu singul-
torem, alius omnibus fecit iratis, curavit.

Hec de Convulsione Diaphragmatis Inspiratoris, seu Sin-
gultu sufficiunt: sequitur

ARTICULUS III.

De Incubo seu Epistole.

Inter Affectus praenaturales Inspirationem laedentes
peccat etiam *Incubo seu Epistole*, (L.) qui & ipse re-
vera est nihil aliud, quam Pectoris Affectus, impedita nempe
ac difficilis Respiratio, in specie sustinuitur Inspiratio,
dormientibus imprimis ac dorso incumbens, cum in somno
quodam ponderis Praecordis prementis ac suffocationis
imminentis obveniens, cujus occasione vigilis, quia talia
desirere somnantes, vasis subinde sui de quoson aut re cer-
ta, aut etiam de persona iocis, superincumbente narrare
sunt Epistole affecti.

Est nempe complicatus Affectus Abdominis Incubus, quoniam
ipso Aegri rite explicare nequeat: propterea constituitur in
quibusdam Sedes in stomacho, abalis in Pectore, ab aliis
in Capite; Symptomata ferre tali gerique per multum insequen-
tur:

- I. Laeditur Respiratio, maxime Inspiratio: Hanc
- II. Insequitur sensus, aut scilicet metas, imminenti
frangulationis.
- III. Est depravata Loquela, dum loqui nesciunt Incu-
bo affecti, led gementes, queruli &c. sunt, aut
sonum silem incoctum, rectum botum, aut
silem sonum grave prelorem: unde & vo-
cati parum aut nihil respondent, & serpe im-
mobiles iacent.
- IV. Adest insignis Anxietas Praecordiorum: &
- V. Denique Somnium supervenit rei aut obiecti ali-
cujus, nunc certi nunc incerti, Thoracem
prementis, & quasi costringentis: Quibus
- VI. Accidunt maculae rubrae, lividae, caesulescentes,
Artus imprimis pingues, & mane postmodum
apparentes.
- VII. Expectantibus, dum omnia cetera evanescent
Symptomata, Corporis tremor, & non raro
Diaphragmatis vibratio celerissima & violenta
superest, una cum totius Corporis lassitudine,
atque *Wanderi gerit* *Warren*.

C A U S A E.

Quoad Causam & fendi modum Incubi: quos vulgo pro-
fe uat, omnibus nota sunt, scilicet incusant Obstructionem
meamum Cerebri, ac principio spinalis medullae, & Vaporis
crassis ex Abdomine eo exhalantibus, unde impeditur
Spiritus animalium influxus illa Symptomata superveni-
ant, obque hanc rarissimum Incubus ad Affectus Capitis ordi-
nariis refertur: vid. SENNERTUS l. 1. *Prax.* 2. l. 1. cap. 29.
p. 11 de Incubo. Hic tamen in *Paraphras.* pag. 113. hanc sen-
tentiam mutat, et Incubum esse Affectum Respiratoris
hanc cum insignis gravi afferit, sicut jam fuso tempore
FERNELIUS & PLATERUS insulsum hanc Vere-
rum Opinionem reverterent, dicendo, Morbum hunc pri-
mario ad Affectus Thoracis & Respiratoris lites, secun-
dario ad Affectus Capitis pertinere. Nempe hi ipsi Causam
proximam statuerent Humorem crassum, melancholicum,
vel pituitosum circa Praecordia harentem, quo Hamore qua-

(L.) Epistole ab *incubare*, infilio, superfluo: quod Incubo affecti insistentem sui videntur, vel corpus quodcumque fal-
se imaginatur, alii ab Epistole quodam dictum volunt, de quo Homerus Odyss. 11.

quocumque ex causa commoto aut rugiente, Diaphragma & Pulmones exornantur; unde & balatius Vaporibus Vos opprimunt, & denique tandem Cerebrum percutitur, Spiritus in malis concutitur & miscetur, unde somnium tale ingratum: cum quibus etiam concidit PETRI JOANNIS LABAI iententia in *Paral. cap. 7*. Sed adnotandum ille Vaporum ex primis viis ad Caput ni que, & quicquid illis imperitavit, & talis obstat iudamento, & facili est solutio.

Adnotatur Morborem quidam, in specie SCHNEIDERUS in *Libro speculativo de Cerebr. cap. de Cerebr. Mor. pag. 246. ubi in Dif. de Epilepsia*, & per consequens etiam de Incubo, un recte Incubum ad Convulsiones species refert, in specie talem, in quo Thoracis Musculi Hominis, somnum capiunt, ita adiacent, ut respire exinde laboriosum.

Res ut patet paulo clarius, ordine procedendum: scilicet Causa Incubi proxima est omne id, quod liberum Thoracis, & in specie reciprocum Diaphragmatis motum interiora verius in unum impedire possit: hoc autem ita primario quoad Respirationis negotium impedit, secundario etiam reliqui Musculi Inspirationi intervenientes in motu impediuntur; cum notum sit, quod Diaphragma sit primarium instrumentum Respirationis. Quicquid ergo primario libero Diaphragmatis motum, secundario reliquorum Musculorum, interire possit impedimentum, est Causa Incubi.

Idem, quo Thoracis, & speciem reciprocum Diaphragmatis motus impeditur, hoc facit & vel quatenus est Causa exteriora & Obiectum quoddam, Diaphragma opprimens, & cuiusmodi motus deorum verius relaxandi, & coritur exinde Incubus Accidentaliter, & quasi leviter; vel laetior Diaphragmatis motus vitiis Nervorum evidens, & Musculorum Thoracis motui solent vitiari; id quod fit in *Incubo Habituali*, utpote gravius, & qui firmiores egi radices, & ex eadem dispositione interna radicata plus minus, vel usque, vel difficilius egrum afficit.

Incubus Accidentaliter fit, quando liber Diaphragmatis motus taliter impeditur, propter impedimenta in primis viis ac Abdomine, moris eius deorsum resistit. Hinc inter imprimis est Stomachus: qui vel copiosis Alimenti infunditur; vel Materia viscosa aut mediocrius impingens, aut Flatuum copia, de quibus Imperit, ubi de *Insistione Stomachi* aut Potu nimio & Cruditatibus differunt, Dorio incumbit Diaphragma magis luctum repellit, & eundem inferiora verius motum impedit, ut non inspirari fieri possit, unde etiam reliqui Musculi cessant. Propterea HILDESHAM in *Spicil. de Affe. Curis Spicil. 6. pag. 434. inquit: Quis scire cupit quid sit Incubus? in alio tantum comedit Copiosius, et superbiat Viam facit. Hinc raro Incubus afficitur, qui laetitia huiusmodi Thoracis, aut qui laetitia amant Cognam; & contra Pueri non aliter, ubi nimiam, & immoderatam eorum ingurgitationem, familiaris esse solet; unde etiam lapsus est Crapula, & Roritate, & nimia Voracitate in Cena Incubus affligit; sed talia saltem inducunt Incubum Accidentaliter, levem, & facile dissolubilem. Nam si dormiant in latere, & elevetur Caput, possimus praecavere talem Incubum: quo magis enim supini jacentes, eo minus comprimunt Ventrículos Diaphragma, & contra.*

In Habituali vero, ac continuo Incubo, quatenus habet Causam quandam in Corpore latentem, ad Nervos imprimis respiciendum venit, ut notum, qui Respirationi intervenit, & imprimis Diaphragmatis motui, eo quod virtus adhuc respiratorii prohibetur: adeoque ad Nervos Paris Oculi, unde & Intercoastales progrediuntur, & qui ex Cerebello primas radices habent, hic imprimis respiciendum, ut recte asserit WILLISIUS in *Anat. Brutorum* p. 2. ubi de Incubo, & notabili Observatione fundamentum Habituali loci in parte Capitis politica circa Cerebellum confirmat LOWEUS *Traff. de Cordis pag. 157. de quodam Nobili*. Adeo, ut respectu Canis revera Nervorum Affectus fit Incubus Habituali; sique vel Paralytica, vel Convulsiva, i. e. qui vel ex denegato plus minus Spiritum animalium laetum, propter impedimentum quasi obstructionis, & in hoc binc Musculorum resolutione, vel ex impetu quoque Spiritum per dictos Nervos propter irritationem quandam infusa, & hinc Musculorum spasmus, oriatur. Prius Veneris, & adhuc suo modo WILLISIUS hoc allegavit, ubi Cerebellum affectum esse putat, ut Epileptas quasi Lethargos fit Cerebelli, item LOWEUS hoc allegat asserunt: Posterius vero affirmant Moderos: vid. SCHNEIDERUS *loc. allegat*. Et ob id à quibusdam, in specio Aralibus, Incubus Epilepsia nocturna, item Epilepsia parva, propter Convulsiones Musculorum

Thoracis, qui similiter sunt in omni Insula Epileptico, vocari solet; unde in Epileptici Respirationis est difficultas, & ipsa apparet cura Os: quo nomine vocatur a RODERICO a CASTRO *Traff. de Epilep. cap. ult.*, quia Incubus confirmatus in Epilepsiam degenerare tandem solet. THOMAS in *Qualibus lib. 1. in Capitulo lib. 2. Cap. 17. refert Incubum*, cuius Hystoria, prout describitur, ferè perit, ad Male quasi Paralytica eundem esse referendum, nihilominus in Epilepsiam tandem letaliem deit. Contra RHODIUS *Crat. 1. Observ. 54. refert Exemplum Incubi* Vigilantibus obveniens, qui in Apoplexiam terminari observatus fuit: sicut ex Hystoria infra narranda patet Exemplum Incubi ad Epilepticos Morbos obveniens, Terrian utrumque, ut in variis casibus, nempe tam Paralyticum, quam Convulsivum, in Incubo locum habet; sicut non rarum est, Paralyticum cum ipsius, & contra, subinde permutari, ita quidem ut Causa Incubi, Acutum semper peccans, Lymphæ mediis ad Cerebellum delatum, nunc irritando Nervos Respirationi intervenientes, ac Cordis motum dicat, Affectus spasmodicos: nunc Spirituum motum nonnihil infirmatando, leviores Affectus Paralyticos inducat: hinc etiam Cura eius specialis ferè Remedium Antiepilepticum perficitur. Revera ergo Incubo infestante laborant Nervi Diaphragmatis, & hinc reliqui Musculi Thoracis motui intervenientes, qui convelli impediunt motum Diaphragmatis dilatatorum, unde necessario Respirationis difficultas supervenit.

Verum cum idem Nervus ex Intercoastali profectus, Musculos Thoracis movens, etiam ex eodem trunco fasciculum pro motu Laryngis subministrat; hinc est, quod consequenter a Nervi Intercoastali irritatione Musculus convulsus, simul etiam convellatur Larynx, qui exinde sentiam Strangulationis, & postmodum etiam Loquelæ impedimentum, ut saltem Sanum inconvulsum, qualem Epileptici alias etiam edere solent, subsidie gremiandum, efficit; & cum etiam simul sub Respirationis defectu immixta plus minus evadat Sanguinis Circulatio: ob id ab eodem insula Pulmones auriatatem insignem Præcordiorum inducat: sicut dum evigilat tales Aegri, Cor insigniter palpat, quod tellur Motum Convulsivum; & cum hæc omnia sunt imprimis in Somno facile eius occasione Anima Rationalis, talium rerum occia, occipit Somnium quasi ponderis, necesse cum, incumbens. Notum enim est, quod ut, in quorum Visceribus lemmialis Genitura turget, indeque Genitalia nonnihil titillat & vellicat, ordinario occidunt Somnia Veneris, cum voluptuosa Genitura excretionem. Uti ergo tangentia, & erupio Genitura dar Somnia Veneris; simili ratione motus Diaphragmatis & hinc Thoracis impeditur dat Somnia, & Imaginationis compellens & confusus os Thoracis à se superimpedita: Somnium tale vagum applicat interdum certo candore Subiecto, unde tali Affectu laborantes certum sibi Obiectum imaginantur: quando enim conjueruntur, sicut super *Præter*, tunc est determinatum, & sic imprimis occasione Sanguinis flagrantis in Præcordiis: sic nimis premi imaginantur a Verula ingrata, quale exemplum habet SCHENCKIUS *pag. 129. & seq. lib. 1. Observ. de Sacrifici*, qui putavit, se comprimi a Verula, quam vidit & conterritavit. Hæc ratione FORESTUS Incubo affectus putat, Pectus suum comprimi a Canis nigro, unde respirare non potuit, ut ut Fœmina videret ciliis nonnum fallax; uti de se refert *lib. 1. Observ. 51. Simile fecit exemplum habet ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Præ. Adm. pag. 82.*, quod mediante Antonione per superiora & inferiora curam fuit. Hinc recte dicit VINGENTIUS ALSARIUS à CRUCE, &que ex auctoritate GALENI, quod Epileptici sit quidam quasi in Somno Epilepsia, cum eadem, ut ut leviora, perperantur in Incubo, dum quiescent, qui patienter Camialis Morbo correpti, cum vigilant: utrobique scilicet respire respirant, & non incommoda profertur, Vitium Imprimis est in Nervis, in specie in Nervi Intercoastali, sive in eiusdem radio, aut exortu in Cerebro & Cerebello, sive in uno alterve epi Pleca, antequam scilicet fasciculos Thoracem moventes hinc inde distribuit, lascitio in specie à Lymphis plus minus veri acida, subtili tamen, unde Respirationis Symptomata, hinc cetera consequuntur. Exemplum Incubi ex Nervi in exortu affectu allegavi *supra ex LOWEUS de Cordis*.

Alitig Incubus in specie Dormientis: nihilominus non mirandum, si in ipsi etiam Vigilantibus oriat, nullum impedit, quod minus & in his Diaphragma, & reliqui Musculi etiam interdum convelluntur: refert enim RHODIUS *la. item SMETIUS in Mæ Med. de Incubo pag. 547. Observaciones incuborum Vigilantibus obvenientes*. Adeoque formaliter ad Affectus Nervinos partium Respirationi inter-

vientum, nunc Patalyticis, nunc convulsivis, referendus Incubus; materialiter seu subiectivè magis subiectum constitutivum Melancholicæ, ut vocant, affligere solet. Hypochondriaci & Scorbutici impetibus familiaris est Incubus, & quidem speciatim inclinatus ad Melancholiam Hypochondriacam, sicuti alijs Affectus viti convulsivis frequentes sunt Hypochondriaci; unde etiam istud facile talis pectoris potest obvenire convulsiva constrictione. Imò est Hypochondriaci talibus ad Scorbutum declinationibus derivanda videntur Maculæ, quæ eorum cutim pingunt, hæ ipsæ enim ut Scorbutici familiares sunt, ita etiam erinde, dum declinante Incubi parvisimo aliquo interdu extendunt prorumpit, illæ Maculæ, Germ. *des Alo knopen*, originem habebunt.

Pæterea Vermes Abdominis in Pueris inferente Incubum, sicut hi ipsi hostes ad horrendas etiam Epilepsias, aut convulsiones, eodem admodum disponunt: vid. SENNERTUS I. 2. Præf. p. 2. cap. 19. pag. 179. Rarum est, Romæ observatum fuisse Incubum Epilepticum, quod ex CÆLIO AURELIANO refert SENNERTUS I. 2. Sicuti mirabilis est Affectus, quem recenset FORESTUS I. 2. Ohf. 52. medius inter Incubum & Epilepsiam tertio quæ die rediens, & ita periodam tertianam observans, Nodulo ex semine nigro Pæonia Cerevilli immisso curatus. (M)

DIAGNOSIS.

Quod atinet signa Diagnostica: parent ex relatione Ægri. Possunt etiam hauriri ex concomitante cum Ægri. Taliter enim affecti, imprimis noctu profundo somno oppressi, solent fieri anxii & queruli, gementes, ræucent & inconditum sonum aut bostum profertentes, jacent immobiles, ita ut neque manum neque pedes moveant, parum aut nihil vocati respondent, & cum impetu, & exasperatè de nimia anxietate cordis & lassitudine conquerantur, & vacia de rebus præcordia prementibus referunt.

PROGNOSIS.

Quod atinet Prognosis: Incubus accidentaliter ex se & Causa externa nil habet in recessu: Habitualis vero subinde prodromus est Epilepsie, imprimis in Junioribus; sicuti in Senioribus minatur Apoplexiam & Melancholiam.

Quòd si Incubo nocturno iungatur subinde Vertigo diurna, Prognosis est eo certior, & maius periculum.

Si Incubus, dicit SENNERTUS, accidit pariter dormienti, parum vigilanti, deterius est: quia Epilepsia propinquat: Et rursus deterius, si post exitum somni fuerit frigidus, tremor Cardis, spasmus, aut syncope sequatur.

CURA.

Quod Curam in Epileptis: si est Accidentalis,

1. Evacuanda est Stomachus & primæ viæ.

II. Ordinetur bene Dieta; & speciatim laetior cœna & subitaneus post passum decubitus vitetur.

III. Propinanda Medicamenta Volatilia necesse plius minus Antiepileptica, seu convulsionibus appropriata.

Habitualis seu Confirmatus Incubus ad modum Mali hypochondriaci, Melancholice Hypochondriacæ, aliorumque Morborum Chronicorum, curari debet: nempe per Digestivæ, præsertim Martialis, hinc per Evacuantiæ, quibus subjungantur Volatilia, ac Antiepileptica.

Inter Evacuantiæ primatam obtinent Vomitoria Antimonialis. Modus adhibendi omnibus est notus. Si inferius laxare volumus, utat Vomitus sit optimus, fiat hoc mediane Extra-Ordo Hellebori nigri, & Mercurii dulcificati in forma Pilulari, quæ in Epileptico Insultu sunt expectatæ: c. g.

℞. Extr. Mellis, nigri.

Mercur. dulc. an. gr. xv.

Scamm. sulphurati gr. ii. vel iii.

Extr. Trachil. Alband. gr. i.
Cum Oleo distillato Sacchari I. Pilulæ.
Adipergantur Succino preparato.

D. S.

Pilulæ Cephalicæ & Stomachales.

Alijs infestis etiam Sennata sunt in usu: item Massa Pilularum Officialium de Lapide Lazuli commemoratur à quibusdam: ZACUTUS LUSITANUS lib. 7. Med. Princ. Nipper, in Ohf. cap. I. commendat Aloë, ut optimum in Epileptis confirmato Remedium; quæ Pilulis majoribus, quibus exempti sint acini, indatur Ciceris parvi magnitudine: quorum Passularum nonnullæ cum ℞. distillæ Aloë semper duabus horis ante passum assumptæ, certè dicuntur curare Incubum ac Vertiginem, modò aliquandò continentur, docec Ephialtes planè eradicitur. Loco hujus Remedii etiam Pilulæ Aloëphragmæ juxta ZACUTUM LUSITANUM similitudine ad 3. vel 6. usurpantur possunt: præservant non tantum Ephialtem, sed etiam assumptæ sunt cœnam Digestionem juvant sine metu insignioris laxationis. Quòd si fortitè laxare debeat: grana uno alreore Magisterii Somnolenti accuri possunt. Loco harum Pilularum substitui possunt Pilulæ sine Cura Cyriaci Weberi, quæ de descriptione videbitis in Pharmacop. Augustinæ Class. 6.

Premissa Purgatione sudorifera volatilia post univervo Corpore abstergendo, & sanguine ventando sunt maxime proficua. Inter Appropriata hic convenientia præ cæteris palmam refert Pæonia mas, cujus Radix, Folia, Semen, & Flores sunt frequentissimi in usu; five Radix debito tempore collata infundatur potal; five epi Pulvis, five grana Seminis Num. 15. usurpentur: five ex his parietur Emulsiō; five ex Floribus fiat Tinctura, & aliquandò continuatim usurpentur. Hæc adiunguntur nonnulla alia in Epilepsia usitata, ut Flores Stoechados, Lavendulæ; Anthon, &c. à quibusdam Amaragdis præparata tanquam singulare Specificum contra Somnia turbulenta, Pavores nocturnos, & contra Incubum, & in Infantibus & Adultis insigniter commendatur. Alii cubitum ituri præservantibus grata ab Incubo, Theriacam exm Aqua Pæoniæ assumunt; vi enim opiata convulsivos ipsalinos sistit: loco ejuus etiam Elctroaccharum Rosmarini, Succini, Salviæ, Lavendulæ, Cinnamomi, Anisi & similibus suis introitu ledit, præcedente cœna parca, assumpta commendari solet.

Aniūm enim appropriatum in Incubo remedium est; Semen scilicet ejus paulo largius sub introitu ledit prægreffa parca cœna assumptum, cum etiam Oleum ejus præbet egregiè in curandis Somniis treulenta & turbulenta, sub introitu ledit, ad aliquot guttas cum aliis permixtum & assumptum, unde etiam Infomnia turbulenta, & Pavores nocturnos Puerorum idem Oleum potenter fulere solet: item Spiritus Carminativus de tribus, vel Spiritus Salis Ammoniaci anisatus, à gut. xxx. vel xxxv. vespri post moderatam cœnam sub introitu ledit: Vel

℞. Tinctura Tamaris 3℞.

Spiritus Salis Ammoniaci 3℞.

M. S.

Tinctura resolvens.

Usurpetur eodem modo. Vel Olei distillati Anisi, aut Balsami Sulphuris anisati, gutt. 6. vel 8. sub introitu ledit capiantur, & Æger jubeatur minis dorso incumbere: unde pavidis Anisæ sunt convenientissima.

Quòd si foris in Paroxysmo Medicæ vocaretur, ita ut medio noctis quasi Orthopnoicus spiraret Æger, Vomitorium præstribatur. Sed si hoc jam aliquot dies nocteque ante præscripsum sit, aut suspicio sit magis Flatulenta, quam præcise Humorosa peccare, præstribatur Glycima, simulque Mixtura volatilis aromatica: c. g.

℞. Herb. Anisæ.

Rospi an. M. j.

Flos. Chamomill. M. ij.

Bacc. Laur. 3℞.

Salis Tartari 3℞.

Coqu.

(M) Perim quidem est, Incubi causam Diaphragma & Organa Respirationis offidere; ac quod propriè Incubum confirmis est Isomniis morbofi species: cum nempe qui dormiens ex immoderato Respirationis saltu, in Semivivum incidit, qui de pendere præmi falso imaginatur; facillimum autem est, ut ex partium corporis in Somno varia efficiantur, varique motu nervis & spiritibus commoveantur, hæc vel illa Semivivum idem in motu excutiant, vel volupente, ut in seminis turgente, vel molle, cum corpus maxime affectum est. Imò quandoque ex est Spirituum Cerebri incalensis avastibus, ut levissimæ corporis motus maximam in illis excitentur impetibus: quæ hac ratione potius dormienti à calice illius magis se vultures confusum levantur. Quod autem Incubus propriè ab Isomniis confirmatur, & ex evidenti est quia est dormienti Respirationis quædamque diffundens paratur, nisi Somnium accedat, Incubus non prohibetur. Vigilantiam autem Incubi à Rhodio & Smeteo relati, nefcio qua sensa ratione Incubi vocari possint, quoniam nullus vigilanti est passus causam; & insuperabilis Imaginariis error, qui ad Incubum constituendum necessarius erroris est, ut confiterentur patet.

Coqu. in l. q. Ag. simpl.

Culicula unci. x. adde

Elæsi. de hirs. cum agar. ʒi.

Olei diffillati Terrestrius ʒi.

M. pro Clystere. S.

Clyster Abstergens.

Vel

ʒi. Ag. Hyssopi ʒi.

Mentha ʒi.

Cinnamon. unc. ʒ.

Spiritus Sælis Ammoniaci ʒi.ʒ. vel dr. ii.

ʒyr. Nux. unci.

M. D. S.

Potic pro Capite & Stomacho.

Capiatur cochlearim.

Vel

ʒi. Ag. Hyssopi unci. ii.

Mentha unci.

Cinnamon. dr. vi.

ʒyr. Affusum. dr. ii.

Oxymer. squillæ. unc. ʒ.

M. S.

Potic relaxans pro capite, & pectore.

Quomodo Insanæ tradendi, videb. in WILLISIO de Anim. Brutor. pag. 148.

Coronidis loco Histæris incubi magis ad Epilepticos, quàm ad Paralyticos affectus referendi, subjungam. Puella scilicet anoror Cachectica, & cui nondum mentis fluxerunt, indeque nonnihil asthmatica, ex narationibus crebrioribus ferre. seu famulæ, primò imaginationem Incubi concepit, eum ab illa impetu rediit, & jam nocte incubo corripit, & illud mali ab alio concitatur. Quam ut hanc ipsa dimissit, illa tamen mox ab hujus discessu incubo corripit, & semper omni nocte præterea hora secunda incipit quiritare; hinc mox sensu & motu privata jacet, donec successit, ut ad se rediret, quo tempore sudore madet, & hinc inde in corpore maculas magnas rubæ, præsertim in femoris parte carnosa observat. Hæc quavis nocte eodem præterea tempore rediunt. Ego suspicabar Incubum esse reverà convulsivum in subiecto Hypochondriaco cachectico: Dedi Tartari emetici gr. iiii. qui parum operabatur, & hinc quavis mane de pulvere Cachectico, seu Croco martia aperitivo largam dolin, prohibendo acida. Successus fuit, ut post aliquos dies noctes, quo incubus tardius affligeret, hore tertis, hinc quartæ, tandem quinta matutina, tandem per biduum penitus desiceret; quo transacto, hora quinta matutina liquidum, cuius vis cum copia mucosæ rejectit, non rediit incubus. Suis at Eliæ proprietates impossibiles continuaret, certus, modò primæ viæ à cruditatibus acido-pituitosis essent liberæ, & hinc menses comparerent, eam pancreatice validioram.

CAPUT III.

De vitii expirationis læsæ.

Vitia interdum, quæ Expirationem lædunt, sunt imprimis

I. Sternutatio, quando exspiratio fit cum impetu & insigni labore.

II. Tussis, quando Exspiratio fit interruptum, & cum sonitu.

Quo etiam faciunt

III. Præter vitia, quando alæ erumpunt non legitimam, sed vitiatam vocem proferit: nam solummodo exspirando, dum aer tenet Laryngem, fit Vox, nullo modo inspirando.

ARTICULUS I.

De Sternutatione.

Sternutatio est vitium singulare in aeris expiratione contingens, & quidem nihil aliud, quàm motus convulsivus

muscularum pectoris Expirationi intercurrentium, & ita reversa est affectus Pectoris, in quo motus convulsivus, post aliquam inspirationis inchoaræ suspensionem, subito & magna, sed mox iterum cessante, vi per nares & os aer una vice expulsi, unde sonus rarus excitatur. Omoiū consensu dum conjuncta sunt in Sternutatione, nempe sensus quidam certæ cujusdam mollescentiæ in naribus, conjunctus cum violenta Thoracis compressione.

PARS AFFECTA.

Pars proximè affecta, seu id, quod Sternutationem dat, sunt muscoli Thoracis, ejus constitutioni, & Expirationi dicati speciatim Diaphragma, & musculi intercostales interni, & abdominis. Diaphragmæ duplici consistit motu, dictum exspirationi & inspirationi, quo convulsivè quid patitur.

Forma Sternutationis consistit in motu convulsivo muscularum exspirationi dicatarum, & diaphragmatis: id quod patet in specie, dum voluntarij extrinsecus ejusmodi Sternutationem, quod necesse est fieri à musculis voluntatis imperio subiectis,

Jam verò cum, & inspiratio, & exspiratio sint motus mixti, uti præsupponit ex Physiologia, ob id eundem motum dormientes citra voluntatem omniū, & vigilantes verè determinamus; Et ipso contactu percipimus semper simul in Sternutatione non solum cum impetu conflringi Thoracem; sed etiam diaphragma moveri sursum, simulque subito abdomen comprimi ab ejus musculis, & hinc à contentorum sursum motu diaphragma intra Thoracem cogi, indeque postmodum regionem illius inflexi cinguli, ubi connectitur costis nuchis diaphragma, dolere. Unde & in partu difficili, ut secundularum retentione, præterea est Sternutatio, dum à muscularum abdominis substantiæ constitutione exploduntur contenta à sicci & contrario in Hæmorrhoidibus eadem vocet.

Parti affectæ etiam adnumeranda nares, quatenus eæ, & specialiter earum membranae interiores, sunt leniles, & facilius irritantur Sternutationem faciunt.

Causa intrinseca hujus convulsivus est in specie quicquid valet irritare membranam Narium internam superiorem: Nulla enim aquam fit Sternutatio cordis, in qua non membrana illa sensilis, nares internas luccingens, vellicetur, & quasi in crispationes creatur, & quo siccò, demum pectus consequenter per consensum irritatur, & ita convellitur. Quam lenilis sit hæc membrana, sentimus, quando ex grænores pili, qui subiles & acuti, Naribus intruduntur, unde acuta titillatio in naribus percipitur; quo membrana narium insigniter movet verius nervos, & totum systema. Expectimus in his effectibus mirabilia, qui per odorem excitantur; in quodam ex odore quidam totum laryngem patiuntur; vellicetur enim ab objecto aeris nervorum connexus, qua ratione irritationem hanc nervorum sequatur convulsivus ipsam Thoracis.

Fundamentum hujus consensus est quædam per Plexus connexio furculorum quorundam aerorum paris tertii, & quartæ ad Nares producentiam, cum pari Nervorum Vago & Intercostali, Thoracem moventium: Nervus ergo ipsius ad nares dimissus, occasione Membranae vellicatæ impulsu fortiori, adeoque secundum eorum ductum irritatus, & ita ipsam correptus, simili ipsam convelluntur Nervi Thoracem moventes, & exinde diaphragma aliquando propter Inspirationis protrahentem deprimitur, sed mox cum impetu & forti motu sursum propellitur: vid. WILLIS in *Act. cerebri*: sicuti & eævis musculi inspirationi intercurrentes magis tenduntur, sed mox superveniente contrario ipsam nervorum, & muscularum Expirationi intercurrentium, Sternutatio supervenit, adeo ut rectè BARTHOLINUS Sternutationem leviorem Epilepsiam nuncupet in *Art. Med. Hæmorrhoid. vol. 2. pag. 49.* (N) Certè quo sensibilibus est ista narium membrana superior, eo propter faciliorem irritationem promptius sternutamus: hinc Itali ex crebriori pulveris sternutatorii abusu, & hinc membranae crebrius irritatæ, sed à copiosiori lymphæ affluente minus sensilis fuisse culpa, minus sternutare solent, cùm non germani ex cantillo corum pulveris odore crebrius sternutare soleamus. Quatenus ergo Nervi Narium membranae leniores in cujusdam Plexibus jun-

(N) Quoniam furculi Nervi quinti paris juxta divisionem Willisianam, in varias faciei partes differuntur, & præcipui furculi Ophtalmicus dicitur in Oculo musculis & glandulis inseritur; quoniam insuper ex eodem Nervo quinti paris, furculi unus aut alter eueniens, cum furculo altero Nervi sexti paris conjunctus, candicem formam Nervi intercostalis, qui in mediis imique Ventris Viscera propinquat, natus; hinc motus eueniens Willisio videtur non solum consensum faciei partium inter se, sed & hanc cum rebus corpore: atque inde rationem reddit, cur visio Sole Sternutationem edebat.

junguntur cum plexi intercostali, extensus fit consensus. Mirabilis cunctis est sacculus, oris, & Narium cum nervis intercostalibus: similes sere est ratio, ubi videmus, quod ex titillatione circa diaphragma oritur motus in facie, qui vocatur risus, hincque titillati voluntarie ridemus. Interim ultra præviæ talem irritationem, interdum & convulsivum quid esse, & etiam per consensus aliarum partium, per consensum vellicandi thoracem, excitari polle steruationem: vid. curiosa Historia illustrata in M. A. N. C. ann. 3. observ. 138. pag. 247, ubi referuntur in Ancilla steruationes 100. in uno parasyloio, eoque singulis 24. horis periodicè repetentes. In his, ubi sunt crebriores & vehementiores steruationes invicem, ad nervos conspiciunt respiciendum. Plura de steruatione cuique natura conf. MARTINUS SCHOENIUS; item SCHNEIDERUS Tr. de Offe crivis-farmis, & de specie de Catarrhis, ubi de Catarrho narium, quem vocat steruationem; item WILLIUS in *Parthol. cerebri*. Certum ergo est, nullam fieri steruationem, nisi irriteret membrana narium.

Irritatio illa membranae narium intus variis fit modis interius & exterius. *Externæ* nunc sunt odores fortes; sic post odorem Majorene, Rosarum, Basilici, nonnulli steruant; Acidum ut tumo etiam steruationem excitat; nunc pulveres in aëre volantes inspirati; nam: sunt medicamenta paulo acrisa naribus insufflata, ne nasuturum. Facienda autem est differentia pro ratione membranae narium plus minus ignitis, vel non, & eius texture plus minus delicatae, vel non, vel si ab obiecto externo alius movetur: hinc odor Rosarum huic steruationem excitat, alius non. Quod pertinet ad causam steruationis artificialia, in quibus, vellicata membrana narium, & irritata, steruatio promovetur: qualia sunt, quæ sunt ea Majorena, Liliis consualium, radice Hellebori albi, Euphorbio, foliis Nicotianæ, Gallicæ, Eula præparata & per cæteros omnibus, quæ sunt ea Vetrolo ad albedinem calcenat. Interim lympha membranae narium alias naturaliter humiditas, paulo acris imprimitur si fuerit: hinc Coryza frequenter steruationes præcedit, quia Lympha suo-acidior vellicat membranam narium. Præcedens hæc steruationis signum est læsionis & exortationis Membranae interius Narium à tali vitiosa Lympha.

Paret ex his, in omni steruatione cerebrum esse infensum, non vero concussus, ut vulgo dicunt. Concussus fuit caput, sed sine cerebri concussione. Paret etiam, quod ea, quæ steruationem eliciuntur foras, primario sunt ex facibus & naribus, interdum ex pectore, a pectus arteria, & pulmonum Bronchus, ex naribus, & facibus quædem, quando idemque sunt membranae præstatur à SCHNEIDERO de Catarrhis primarius descriptæ, continentem talem plurant Lympham, quæ nunc ex glandulis postillat membranas concussas, vid. SIENO de glandulis secundariis, & alii. Quæ Lympha, ubi fuerit concussio, aut etiam ipsius, quod hæc adæo inspirato, cum impetu per laryngem erumpens obfuscula illa molesta, & humores ibidem hærentes removet & eperit. Quod si quid hæret in bronchiis alperis arteriæ, aut larynge, illud simul steruatione expellitur. Hinc in morbus pulmonum, Pleuritide, Peripneumonia, steruatio mala est, auctore HIPPOCRATE; ad putram verò in bronchiis pulmonum coactam potenter expellendam, quæ tunc reijci non poterat, steruationem conferre, docet GALIENUS; videatur RIVIERIUS, ubi de *sternatione*. Unde etiam remedia steruationis, quæ ex narium concussis hæc humores seculos, plus minus vellicat propere emulgent, nihil ex capite emulgent, nec cerebrum pœgnet, fed tantum ex membranis narium, præsertim pœgnetaria superiora, sublatrice glandulas haurient; simili ratione atque Apoplegmatismi nihil omnino ex capite, fed immediatè ex glandulis Palatinis Sublingualibus, & maxillaribus; mediatur verò ex massa sanguinea, emulgent, & haurient. Interim mucus fœmit impactus in stomacho, etiam steruationem excita vit.

Fit interdum, ut corpus etiam steruationem promoveat vid. BARTHOLINUS *Centuria 5. observ. 19.*, ubi refert, se observasse in quibusdam copiosam steruationem post coitum celebratum, Quo etiam pertinet AMATUS LUSITANUS; qui dicit, quod quidam, qui à Venere aliquandiu abstinerat, ad præta pulchra muliere, fortiter steruatur: Vid. *cur. 5. observ. 4. in scholia*. Item inspectio solis steruationem excitare, vid. MOYO *lib. 1. de Sale Nitro &c.*

Paret ex dictis etiam steruationem esse motum quandam singulari contrarium; nam in singulis cum impetu inspiramus, seu diaphragma convellitur deorsum; sicut in steruatione cum impetu aspiramus, & diaphragma convellitur

sursum. Porro in singulis fit sonus clarus & ingratas propter apertum Laryngem, in steruatione fit sonus rauus & stridulus propter occultum nonnulli laryngem, & propter impedimentum Narium.

DIAGNOSIS.

Signa Diagnostica per se patent.

PROGNOSIS.

Quod attinet *Signa prognostica*: steruatio à causa externa, nisi crebrior ut, non mala est.

Copiosior, frequentior, violentior, sine causa manifesta crebrior repetens, est mala, & interdum letalis, utot leve videatur malum; graves enim nervi systematis affectus epileptici, aut convulsivos, aut in ætate grandævâ apoplecticos & Paralyticos, portendit: conf. HORSTIUS in *observat.* pag. 290. ubi habet steruationem admodum dubiam in Puella, & dicit, quod steruatio nimis frequens & vehemens semper ferè innotat subsequestem mortem; quod confirmat HILDANUS *cent. 4. observ. 11.* de steruatione letali in puerpera observata, quæ cum aliquoties steruasset, expiravit.

Interdum ex suppressa steruatione per artem oborta est Epilepsia.

Uterius steruatio nociva est oculis; sic enim ex steruatione nimia Cæcitatem nonnunquam abortum refert HILDANUS *centuria 5. observat. 24.* ubi etiam ROLFINGIUS in *differtis. Anatom.* pag. 3254. Ob id causi nimis in oculorum affectibus cum steruatiore, ne ræcor reddamus eos, quibus debemus visum conservare. Potius ergo Erchiana in oculorum affectibus, & epilepsia conveniunt, in quibus etiam sunt optima; minus steruatiore: Conf. BARTHOLINI *Alia Med. Hafnien.* vol. 2. pag. 243. 251. & 303.

Postmodum per accedens steruatio in mulieribus per accedens aliquid habet in recessu: nempe promovet Menfes, partum disicilem, Molam, fortiter totum abdomen commovendo, & fortiter universum ferè nervorum systema concutendo; quando enim ita concutitur abdomen, insigniter sanguis circa uterum stagnans promovetur & commovetur: Vel sicla tali concussione motus & vibratus uteris sponte eiaculat sœrum. De mecibus vid. HILDANUS *cent. 3. observ. 51.* De partu verò, ubi etiam de stranguria uteris, audiendus est HIPPOCRATES *lib. 5. epidem. 35.* Vid. M. A. N. C. ann. 3. *observ. 138.*

In nimium autem frequentibus mensibus, & in gravidia periculosa est fortis steruatio.

Denique steruatio post usurpata sternuatiore fortis non succedens, malam signum est, speciatim si hoc fiat in apoplexia, aut Epilepsia, & similibus affectibus; signum enim est, totam vim animalem esse prostratam.

CURA.

Quod attinet *Curam*: hæc consistit in eo, ut narium vellicatio, & hinc nunc impetuosus spirituum motus, & sic causa Thoracis convulsio, tollatur. Removenda ergo in steruatione est

- I. Causa membranae narium vellicans; & hinc
- II. Sensus irritationis obtundendus.

Unde odor opii alarumque Narcoticorum, vel Laudanum opiatum ipsam assumptionem, est optimum ad steruationes nimias. Exemplum habet ZACUTUS LUSITANUS de steruatione continua, per osum Laudani opiatum curata. Primum frequens odor fœmit opii; ubi verò hoc nihil profecit, interius adhuc Laudanum opiatum: Item oleum Rosaceum cum opio imprægnatum interitibus naribus illineendum. Ocyum commendat AMATUS LUSITANUS, ut & eius succum. Cæterum notum est, quod fit Planta foavis & optimi odoris, ut præbibus sit illam provocare steruationem, & ob id potius abstinentum est ab Ocyo in steruatione. Tandem semen Feniculi, & Anisi Aceto infusa naribus pro odoratu admoveantur. Lac tepidum, vel cum Aqua suaveolente temperatum, etiam per naribus abluendis, seu elendis iacebat, est optimum; præsertim si steruatio occasione externa, inspirato scilicet acrisi steruatiore, fuerit excitata: vid. HORSTIUS l. 5. *observ. 51.* Item FORESTUS, item BARTHOLINI *Alia Med. Hafnien.* vol. 2. pag. 166. Loco Lactis tepidi cremæ Lactis, & mucilaginis seminis Cydoniorum, vel Psyllii, cum Aqua Nymphaeæ extracta, Naribus infusa conducit.

In Cura ad primum Morbum, cuius symptoma est aphonia, aut faltem ad eam causam antecedentem, respiciendum, ut hinc remedia facilius praevidi symptomatis fiat curatio. Pro quo curando, ad laryngem, & eius musculum ac nervos recurrere imprimis respiciendum, tam eorumdem paralyti undeque natam, Iussus ex nimia humectatione, quam ipsam ex nimia irritatione removendo: Interdum per Volatilia aromatica & nervina, alias Cephalica dicta, e. g. spiritum salis Ammoniaci cum essentia calidiori & oleo succia mistum, & destillatum, liquorem cornu Cervi succinatam &c., subinde sudorem simul provocando, & etiam pyralium multicatoris promovendo. Imò in contumaciiori malo, praesertim paralytico, Diata sudorifica, ea Lignorum decodis iolentenda venit. Hinc etiam succuli ex nervinis aromaticis, spiritu Vini irrocati, exteriore collo applicandi; vel spiritus Apoplectici cum spiritu Lumbicorum, vel Formicarum eodem in loco calidè cum linteis multiplicatis applicandi, aut olea decoda servina, Succini, Lavendulae, Rutae, Joviperi, cum Theriaca permixta, aut cum Balsamo Peruviano subacta, ibidem frequentius illinenda, aut etiam essentia Calidiori, vel solitaria, vel ista sociata, sedulo admovenda; oleum imprimis spicae Linguae illitum in Loquela assidue egregie convenit; intetec etiam cum spiritu Vini.

36. Merk. Salu.

Aurascan. M. J.

Sem. Brucia.

Singap. 3i.

Coq. in l. q. Ay. simpl. in vas. clauso.

Colatura Bi. addo.

Spir. Carafur. nigr. 3vi.

Sol. Ammoniaci 3i.

Melle anthel. 3i.

Misc. pro Garganis/mase in aphonia, Laryngis affectu,

post paralyticorum apoplecticorum: 3.

Gargatima.

Interne spiritus Vini, cui flores Lavendulae infuso, echinostem propinquant. Pro quorum omnium meliori succissa, ubi circumstantiae aliae permittunt, & veniēdo sub Lingua interdum infunditur potest. Vid. M. A. N. C. Anno 3. obren. 351. & WEDELIUS *diffusat. de Hae. sectione cap. 1. pag. 71.*

MEMBRUM II.

De Raucedine.

EX minoribus causis fit vox nonnihil imminuta, seu depravata, quando nempe diversimodè, & non naturali modo sonat Vox, quod fit variis modis. Praepono nempe hic notitiam ac constitutionem Fissulae Pneumaticae, cuiusque capitis laryngis, ut & musculorum laryngis ceu vocem formantis, h. e. *Pneales*, qui sunt, focus ex larynge simpliciter emissus, & oris certa amplitudine, maiore vel minore, abique nova allisione variatus; sicut, dum partes oris, speciatim Lingua, Vocem varia allisione, & inflexione modificat, *Crescunt* sunt, & consequenter proprie sic dicta loquela, seu Vox articulata efformatur. Jam ergo ut notum est, quod per Fissulam Pneumaticam in longitudine & latitudine, humiditate & siccitate, &c. alii qualitatibus & circumstantiis prout variat, varius formatur etiam sonus, nunc gravis, nunc suavis, nunc clarus, nunc stridulus, nunc raucus; ita simili ratione cum nostra Fissula Pneumatica, seu Alpera Arteria, & Larynge comparatum est, similibus ex causis vocem variatè; dum nunc est ampla, nunc angusta, nunc est sicca, nunc humida, nunc alio modo viciata, varias etiam ac varias voces per expirationem profert: Speciatim quando est sicca & arida, proferit vocem claram, ac sonum, quem speciatim in Febribus acutis stidentibus vocamus clangoriam: ubi verò larynx & alpera arteria est nimis humida, tunc fit Vox rauca: fit eadem simul obscura, & quasi Interrupta, quando non tantum humida, sed etiam mucilaginis crassa invasata est alpera arteria. Cùm ergo aliae Vocis depravationes vix cadant sub medicis curam, imprimis agam de Raucedine.

Roditur Vox rauca, quando aer expiratur per alperam arteriam & laryngem nimis humidis, ac nimis madais, unde sapè in diuturna loquela Vox raucelica (P): quia quod plus loquitur, uti copiosior emulgetur saliva in os; ita propter motum laryngis copiosior Lympha emulgetur illa occasione in laryngem, unde haec uberius effusa tandem raucedinem infert. An aliquid inter ponendum iis alperam arteriam ingreditur? negatur. Vid. SCHNEIDERUS.

P A R S A F F E C T A .

Pars affecta in raucedine est alpera arteria, cuiusque Larynx; Larynx enim primario format vocem.

C A U S A E .

Causa Raucedinis Praesens interna est in specie nimia assilio lymphae tenuis & moderatè glutinosa, quae per alperam arteriam transiit, eamque cum larynge, alias naturaliter humectat & imbut, ac partim ut ab aere inspirato, vel inclementiore, vel variis effluviis permixto, defendat, partim ut, obique eandem planam reddendo, Voci formandae aptiorem reddat, & oriatur haec ipsa ex glandulis iuxta Anulus Laryngis sitis: de quibus praeter BARTHOLINUM in *Epist. vid. SCHRAEDERUS in observat. pag. 199.* Quibus addatur membrana glandulosa interius cingens alperam arteriam: de quo WILLISIIUS in *Pharmac. Rational. part. 1. pag. 17.* Quod si lympha haec majori copia coinfundatur, & nimis humectet alperam arteriam, & laryngem, hoc modo omnis raucedo oritur, ut in aliis Instrumentis Pneumaticis Fissulae humiditas dant raucum sonum.

Obiervanda est *Diffinitio* raucedinis, vel recentis vel inveterati: Illa à lympha simpliciter tenui, nunc mitiori, nunc acriori, nimis saltem humectante: Haec a crassiore, mucosa, tegmine squolo obducunt interius brachium nascitur.

Causa Remota excitata, habet convenientiam cum Tussis nempe est irritatio laryngis, cuius occasione copiosior lympha contingit effusio: live fiat irritatio a causa externa, live interna.

Quod *Internam*: Raucedo subinde solet oriri occasione aeris inclementioris inspirati, fumi sulphuris accendi, & spirituum acidorum inspiratorum, aut effluviarum actuum aeri permixtorum; unde etiam sabunde Tussim nunc praecedere, nunc comitari solet raucedo. His & suo modo distinctior sermo aut loquela, vel Vociferatio intensior, aut Cachinnus distorsior, & vehementior addi possunt: quia quod plus loquitur, eo copiosior emulgetur saliva per valva falvata: & per glandulas, ratione motus linguae: parili ratione per motum Laryngis Alperam Arteriam, copiosior lympha provocatur, quae dat Raucedinem: Item facit hoc Potus nimis maxime acidulus. Potus Vini rancus quodam facit, quatenus successivè fauces irritat, etiam consequenter ad Laryngem effunditur Lympha, unde Raucedo.

Internam ad raucedinem disponit seu irritat laryngem affectus Catarrhalis, Lympha acrior, salior, aut acidior, quacunque occasione vel viciata, vel ad alperam arteriam delata; quae titillando & irritando, oborsione lymphae effusorem, & ita raucedinem concitat. Talis autem raucedo vulgè Catarrho tribuitur, & proprie *Brachum* dicitur, qui nullatenus à capite desiliat putandus est, quod vulgè opinionem, sed ex propriis laryngis & alperae arteriae glandulis effunditur, & frequentissimè à causis externis provocatur. Interdum tamen etiam in vitio exteri non oritur. Facit haec exoratio partium alperae arteriae inveterarum ex lympha simili acris: id quod in his Venetis obtinet, quae sirpius gravem & duricem raucedinem infert. Multum confert constitutio variam, & faciem ad raucedinem: Coryzae autem emittunt vocem raucedine praeditam nonnihil: sicut foetibetis ob acris serum facile raucelcunt. Tussis erodit, praesertim in qua acris plus mihi materia ejicitur, irritando laryngem, & hinc copiosioris Lymphae infillationem provocando, ad raucedinem disponit; hinc Phthisis, item Empyemati, non raro raucelcere solet. Omnes haec causae moderate, aut quae faciliè corrigibiles sunt, levius inferunt raucedinem.

Quod

(P) Hinc semper ex Laryngis hactenus Raucedinem fieri putatum est; etiam si ex nimia siccitate Ghitis alpera reddatur, vel ex nimia vociferatione veluti laetetur, Vox rauca fit: ex his patet, quae infra de Vocis Instrumentis notabimus.

Quid si verò gravior, & contumaciore raucedo fuisse, ita ut vel copiosius lymphæ continuè effusa tandem spissescat, ut fieri potest tempore hyemæ, vel alio modo vitietur, & in mucum degeneret; vel occasione irritationis laryngis, & uberioris lymphæ effusionis, tandem successive læta aspera arteria, & larynx simul suum astringimentum proprium, sub assimilatione alienarum, profundant, illudque in cavum asperæ arteriæ deponant; qualem gravium longè, & periculosum redditur, & hinc subinde mucosa spissa Oris expectoratione agri reddere solent: hinc apud prædicos prior raucedo à Sero tenui & acri, posterior verò à materia pituitosa, orti dicitur. Unde & imprimit in Invetrata tali raucedine, aut in diuturniori malo, ad pulmonem vel maxime respiciendum erit, cum larynx occultam vomica Pulmonum hinc insequitur, ut rellè observatum fuit in BARTHOLOMÆO, *med. Historiæ*, vol. 2. pag. 193.

Reliqua vocis vitia, aut sunt vox Tremula, Intercepta &c. videntur in SENNETO lib. 2. præf. cap. de Vitiis Vocum.

PROGNOSIS.

In Prognosi: Raucedo à Causis externis nihil mali inolevit; Invetrata verò, aut quæ à Causis internis læsionem infert asperæ arteriæ conjundam habet, in specie in Senilibus, aut quæ per ætatem & diutius continuatur, vel sumitur; recidit autem levi, & Tussim chronicam, aut periculosa Phthisis infert; sicut & Branchia, & Coryza in valde Senibus coctionem non admittunt: vid. HIPPOCRATES *de Aëre*, aph. 40.

Phthisis autem raucedo conjuncta eandem exasperare solet; quæ enim ob suppurationem Phthisos, & Peripneumoniam hæc, serè sub mortem futuram fieri solet.

CURA.

In Cura attendendum ante omnia, ut causa remota, irritans asperam arteriam, & hinc propinqua, removeatur; sic sponne cessat: unde, quoad proximam, observandum imprimis, an raucedo ab æsterna vellicente fauce, vel interna causa indicatur? deinde, an lymphæ humectans mitior, an verò acrior fuit? Id quod puncta Tussis ostendit: Item an recena vel inveterata sit? hoc est, an simpliciter à lymphæ tenui acri, & copiosiore nimis, humectante asperam arteriam? an verò simul à mucosæ crassiore & viscidioris, ex degeneratione Alimentis oriundo, & laryngem irrullante oriatur: id quod partim ex sensu majoris vel minoris trisillationis, partim ex excretis per os, quæ secretæ, vel tussu rejiciantur, manifestum est.

Raucedo igitur *Raucedo* à causis externa emittit, ac remota, per opiatam, Lenientiam, Temperantiam, irritationem & hinc lymphæ effusionem sistendo; à causis vero interna, à lymphæ cupiositate, per sudorifica Catarrhalia ex sale volatili Succini, quolibet corporis contenta atque etiam Lympham muosificantiæ, & ordinarium motum ejus promovendo; & hinc per temperantiam & opiatam, acrimoniam lymphæ irritantem domolentia tollitur, quæ maturè mariscitur sudoriferis; sic enim magis tunc est, præmissis, si opus fuerit, purgantibus talibus, quæ sibi feri forma evacuare solent, quæ in specie sunt gummi gutta, radix Jalapæ, Cortex radicis Eulæ, Elaterium, Ebulus, & Sambucus: de quibus infra, ubi de vitiis Glandularum: Nec multum hic refert, licet inter purgantia nullas habeatur delectus, quia præmissis omnia evacuant. Invetrata verò raucedo per Incidentia, & hinc expectorantia, optimè levatur. Raucedo si sit à lymphæ tenui, & à causis æterna, fauces vellicente, parum vel nihil perire excoerit: si verò sit Invetrata, ubi mucus copiosus irrullat laryngem, asperæ crassa visciditas plius minus copiose per secretam, & tussim expectoratur: pro quo scopo intantum vomitus etiam necessarius est. Quod si ulteriores in corpore radices habeat malum, v. gr. Luem Veneream, scorbutum, vomitum pulmonum &c., ad hæc primaria cura dirigenda, simul tamen symptomati, scilicet raucedini, succurrendum.

In raucedine ergo recenti à lymphæ nimis acri, tenui & copiosa, conveniunt temperantia, Incrassantia alia dicta, quæ acrimoniam lymphæ leniunt, & succos plius minora lubricant: Item opiatæ, & similia, præsertim Papaverina: unde Sympus de Papavere, Diacodium Monachi cum Baculo Liquiritiæ usurpans, silencia opti, Theriaca, &c. conveniunt. Inter temperantia convenit admodum Glycyrrhizæ epusque Sympus, & alia medicamenta ex ea, Sympus Violæ, de Jupabit, quem RULANDUS, & DODONÆUS valde commendat; Osmum Sacchari, tam sim-

plex quàm compositum; Macillag indiciæ Albæ cum Saccharo, Jucula Avenacæ cum palliis: sic Diacodium Monachi, item scabiosæ Sympus, vel mulli, vel cum Rob Passularum subacti, cum Baculo Liquiritiæ assumpti, omnibus locis Incrassantibus & expectorantibus præstant: Vel

M. Syr. Papav. alb. ʒi.

Mell.

Glycyrrhizæ.

de Sympus (qui est optimus in tepali Lymphæ) aa. unc. ʒ.

Rob. Moræ. ʒi.

M. D. ʒ.

Succus contra Raucedinem.

Capiatur successive lambendo cum Glycyrrhizæ; egregium enim est.

M. Syr. Diacod. Mon. ʒi.

Mell. vel Rob. Passul. ʒi.

Ros. Liquirit. ʒi.

Diluantur cum pauco Aqua Scabiosæ.

M. D. ʒ.

Succus ad Collum.

Balsamum Sulphuris amiatum aut terobinthinatum, vel solum, vel cum Saccharo in formam Pulveris subactum, est quoque expertum in lymphæ copiosiore, etiam viscidioris; cumque hoc raucedinem, quæ ad aliquot annos duraverat, curavit RIVIERUS: item flores Sulphuris in ovo forbill assumpti sunt egregii, temperando lympham catarrhalem & prætervando partes Pneumonicas ab erosione vel exoriatione. BORELLUS *anat. 4. observ. 27.* concinnatum haustu sumi Florum Sulphuris, cum Salviae Folii per os excrepi, restituit, parum experientiam sequenti observat. 19. habet. Si quid aliud, sperma Ceti expertum est ad raucedinem, à ʒi. ad ʒi. vel ʒi. aliquot vicibus assumptum. Quidam raucedinem contumacissimam aliquando afflicti alii irritis per ʒi. Spermatii Ceti, una vice assumpti in vehiculo calido, tandem fuit liberatus: vid. *differs. de Symp. Ceti cap. 2. §. 11.* Item Rapæ earumque decocta cum saccharo simpliciter vel candidato merito commendantur à TIMÆO in *Essai. lib. 2. Quest. 12. p. 100.* perquam egregium est temperativum, ac quælibet ex Rapis dulcibus, live recentibus live siccis, parata remedia. Pallule idem elegantes sunt ad raucedinem, tam majores quàm in specie minores; unde Rob Passularum est egregium: item decoctum passularum cum Aniso non contentandum est in raucedine incipiente remedium; cum quibus Passulis Erythrum decoctum erit medicamentum præterendum syrupo de Erythmo Lobelii; quo etiam spectat decoctum SIMONIS PAULI in *Quadrup. Botæ. pag. 44.* JOEL confirmat, Myrrham in ore detentam raucedinem tollere: Vel

M. Succ. Liquirit. ʒi.

Myrrhæ d.r.

Tragac. ʒi.

Sacch. penid. vel Canar. unc. ii.

Cum Aqua Rosar. & Morilli in ore tentandi, & successively deglutienti: S.

Morilli ad Os & Collum.

Vel sunt Rosule:

M. Spæ. Diacod. simpl. de ʒi.

Tragac. d.r.

Flor. Sulphur. ʒi.

Ros. Cret. gr. vi.

Cum l. q. Sacch. in Emuls. Papav. sol. V. Rosule, successively deglutienti: S.

Rosule ad Os & Collum.

In raucedine verò inveterata, aut ubi jam mucus viscidus, vel lymphæ crassa; peccat, tunc Incidentia, Resolventia & expectorantia priusquam obtineant. Præ cæteris convenit Sympus de Erythmo Lobelii expertum in Raucedine, alias *ant. 1624.* Sympus contra Raucedinem appellatur, mediante quo raucedinem desperatam hic curatè asserit LINDANUS & SCHULZIUS in M. A. N. C. *ann. 3. observ. 153. pag. 275.* ubi simul descriptionem eius, ubique alia obviæ, adiungit: vid. in specie SENNETUS *2. præf. p. 3. cap. 3. pag. 360.* Compositio hæc est incoacta farrage ingredientium variorum: Bases est Erythmum cum semine, quod gustu prodit suum sal volatile; tora planes imprægnata est tale volatili acri penetrante antikorbutico, seu simili illi, quod reperitur in plantis Antikorbuticis, ratione cujus egregie incidit, & dissolvit mucum in raucedine inveterata. Sympus hujus loco conveniunt Pallule minores, aut earundem pulpa, cum semine Erythmi coactulo probe subacta, quæ dantur remedium sufficiens ad raucedinem curandam, & reliqua ingredienda sine periculo possunt omitti.

D d 2

Differentia Vocis quædamlibet notari possunt, tum in finis, tum in moribus Animalibus, Et I. Vox (quædamlibet) est Sonus quicunque vel est Gravis, vel Acuta. Gravis dicitur, quæ Aeris raris vibrativibus agitur formatur, quæque respondet Sono chordarum crassiorum, & minus tenforum. Acuta vero producitur à crebris Aeris vibrationibus, & respondet Sono chordarum exiliorum, & magis tenforum.

II. Vox vel est Alta, Vehemens, & Magna, vel Submissa, Debilis & Ealigna. Alta dicitur, quæ magis Aeris raris creatur, atque ad magnam distantiam propagatur, respondensque Sono chordæ vehementer arca compressæ. Submissa vero appellatur, quæ minus Aeris raris redditur, & respondet Sono chordæ vix à arca conata. Unde videtur differunt inter Vocem Gravem & Submissam, atque inter Acutam & Altam: potest enim Vox Gravis reddi & finalis Alta, & contra Submissa edì & Acuta: quædamlibet possunt crassius minisque tensum chordam vehementer arca rari, & sic Gravem simulque Altam reddere Sonum; & è contrariis si chordam exiguum maximisque tensum vehementer arca comprimitur, Sonum reddemus Acutum quidem, sed eodem tempore Submissum.

III. Vox vel est Articulate, h. e. modulata in modis à levi, duri, molli, & reliquarum aris partium sita pendens: hanc inflexam, & dicitur propriè Loquela vel Sermo, ad Animæ conceptus exponendi aptissimè apta: vel non Articulate, quæmodum illam effertur, cum simplices vocales literas pronunciamus.

IV. Vocem integram, Plenam, & Propriam appellamus, quæ nulla industria, sed simpliciter & naturali instrumentorum apte operis, præsertim canentium, elicimus. Contrà vero Dimidiatam, Fallam, & Falsam Vocem dicimus, cum consensu ali quo, & industria quodam instrumentorum nō illam existentem reddimus, præcipuè cum cantantes tonis illis uti volumus, quos Plena & Propria Vox præstare nequeamus. Hanc vulgè Vocem di Falsetto appellamus.

V. Fallam aliè sensu appellamus Vocem, quæ consonantem iustamque harmoniam non reddit, quare Dissonantem vulgè vocamus, nulla enim industria ad harmoniam concurrent illam reducere possumus. Non sicut ac Citharistæ Chordas quasdam Falsas vocant, quod illi quædamlibet tenso, harmoniam reddere nequeant. Contrà vero Vocem Consonantem, & quæ ex illis tonis, & tonorum partibus reddi, appellamus Vocem Iustam.

VI. Vox vel est Clara & Lenis, vel Rauca & Alpera: vel Firma & Stabilis, vel Tremula & Clangosa, ut in aeris: quæ differentias melius mente concipimus, quàm verbis exponimus. Ægrotudo quæque est Vocis, quæ in exprobris vel in febribus Hippocrates appellat: quæ vocabula licet similitudinem Vocis significent, vulgè tamen ab Interpretibus pro Lingua, atque Vocis, hæsitantia somniantur.

ARTICULUS II. De Organo, Formatione, & Causa Vocis.

Galenus in fragmentis libri de Vocalium Instrumentorum dissectione cap. 5. ait, in omni dilata trita esse requirenda, Antilem, Instrumenta, & Materiam: exemplo ducto à Leberis vel Concha fabrica, in qua Aristoxenus est Faber ararum, Instrumenta Malleus & Incus; Materia vero ipsam Æta, ex qua Leber vel Concha conficitur. Sic in Vocis formatione ait, Antilem esse Animalem facultatem, ex eo nempe quod Ven voluntarii edatur. omnibus insuper constat Vocis Materiam Aerem esse percipiendam: quoniam autem à voluntate pendens instrumentum functionum Instrumenta sunt Nervi & Musculi; hinc inferri Vocis Instrumenta Nervi esse & Musculos, Aerem respirantem hæntem percipientem.

Et sane quomodo omnia constet, Vocem edì non posse absque Respiratione, imò absque Expiratione propriè dicta, h. e. Aeris è pulvere expansio; hinc inferri licet Vocis Instrumenta ut esse, quoniam ex Expiratione, h. e. Thoracis contractis præteritur. Neque autem dignum est, quod ait Aristoteles cit. 5. de Anima cap. 5. neque inspirando, neque expirando, sed cohibendo Vocem creati: qui dicitur dū quærit inveniunt, sed inveniunt, illi autem exire. Etiam ad Vocem edendam quædamlibet Aeris inspiratio non sufficit, ita & ipsam simplicem vulgarique Expiratione sufficiens non est: affluens enim expiramus, nec semper tenam Vocem emittimus. Respirare ergo ad Vocem edendam ut Aer Expiratione edendū rapidius exeat, ac velocius motu celerat: quod fieri nequit absque eo, quod Aer in exitu à Larynge nimbis cubileatur, ut ait Aristoteles, ex causa veluti quodam Diaphragmati, & Musculorum Respirationi intercurrenti.

Verum quævis Instrumenta Respirationis omnia ad Vocem formandam concurrant, inquisitione tamen dignum est quidnam inter hæc sit præcipuum illius Organum, in quo nempe propriè creetur Ven: nam nemo dixerit Diaphragma Organum esse Vocis, est si jure concedat Diaphragmati motum ad Vocem edendam necessariū esse.

Præterea hic loci libere juveniam referre, qui putant Vocis Organum esse vel Linguam, vel Uvulam: nam suis evellat membra hæc ad Loquela potius facere, sin Articulatam Vocem, quàm ad simplicem Vocem edendam: Lingua enim & Gorgulione distincti Vocem emittunt, est non loquatur: ni ad hic afferre velimus, quoniam graves atque pauci Scriptores mentionem faciunt, de motu nullo absque Lingua loquentis: imò inter Recentiores Jacobus Rolandus Chirurgus Salerniensis Differentiarum edidit, Aglossotomographiam inscriptam, in qua suis prosequatur Historiam Pueri Variolentem vi præter Lingua orbi, qui tamen non solum existens, expulsa, absentia in ore colligata, & deglutita, verum etiam perficere exæctis loquatur: etenim Oris Lingua distinctum mirabili Natura solertia motum acquirere conformationem, in Lingua deficientis aliamlibet promissi supplementum ferre patet.

Quæ maxime inter quod Antiquis, tum Recentioribus Medicis & Philosophis viget opinio ad fuit, quod Trachea Arteria Vocis præcipuum Organum reputaretur: illi præsertim confirmata arguuntur, quod Trachea Tibia, vel Fissula (Instrumentum nempe ad Sonum edendam Vocis butana analogum) quæmaximè assimilaretur: ac prout quædamlibet Aer ex ore Tibicini propulsus, per Tibiam cavum transiret, Sonum producit, & vel auctum vel gravem, pro varia Tibia amplitudine vel longitudine, ita quæque Aer è Pulmonibus animalium expiratione exiliens, per Trachea cavitatem excurrentem, Vocem crearet, motu gravem magis acutum, prout major vel minor esset Trachea ipsius longitudo & amplitudo.

At quomodo hæc opinio vulgè & veluti classi oculis recipiatur, ut scilicet Vocis Organum Trachea Arteria existantur: nihilominus Galenus primus inter Antiquos I. c. & in libro de usu partium plurius, atque inter Recentiores Fabricius ab Aquapendente, illam tanquam falsam rejiciunt, atque Organum Vocis non tam Tracheam, quàm Glottidem esse reputant. Hanc tamen opinionem in lucem veluti produxit Cl. Dionysius Dodartius Regia Academia Scientiarum Socius, qui naturam & proprietates Vocis minutissimè perscrutatus, Acusticam Scientiam mirum quantum ultra Antiquorum apud ac Recentiorum metas præterivit. Ex his Cl. Aulicis momentis quædamlibet ad nostrum institutum faciemus excerptum.

Et reverè quomodo Vox novis in Expiratione h. e. in exitu creetur: quomodo Aer Sonum parere nequeat, nisi cum per angustissimam velicem motetur; sane Aer ex extremis Pulmonum vespertis transiret in Branchia semper majora & majora, & ex his in Tracheam adhuc ampliorum, quoniam nulla premere angustia, Sonum formare non poterit. Quæprimam vero in cavitatem Glottidis rimam impigit, velocitatem & vibrationem illam acquirit, quæ respiratur ad Soni & Vocis formationem. Sic videmus Ventum per angustam fenestram chortæ rimam propulsam, Sonum vehementer parere, ac ab hominibus sublimè audientibus edì, sola leviorem & duriorem compressione, ut aer per arctam rimulam velocissimè propellatur. Quid adeo verum est, ut si Aer velocissimè per Tracheam motetur, dilata tam Glottidis, Sonum non parit, sive inspiramus, sive expiramus: opus præstamus. Hinc canentes est Aerem in Pulmonibus prius commovunt, parci ac longo temporis intervallo pro-

pillamus, ex eo tantum quod per angustiam Glottidem propellimus, Vocem & variè modulatum reddimus; contrà verò in ipso alia causa, est velocissimè & veluti numerata temporis Aerem attrahimus, adeoque hic per Tracheam velut ipsi moritur, Vox non creatur, ex quod Aerem per aperturam suam Glottidis rimam admittimus. Est ergo Vocis Organum Glottis non Trachea.

Neque dicat Tracheam concurrere ad Vocis formationem, (quod nec negavit & ipse Galenus) ex eo nempe, quia Trachea structura, ex utroque cartilagine, & levibus muscibus fabricata, ut patere videtur; semper enim aperta est ad liberam Aëris motum, atque materia est quæ compellat ad respirandum est aperta, summum enim habet similitudinem cum tubis, ex quibus Fissulae fontem componitur. Præterquam quod ex Cilli seu Tracheæ longitudine Animalium Vocem metiri solent: sic Aëris fluctibus & Cyclo Vocem maximam, & productum Cillum ducuntur. Neque inquam id obijciat; nam peculiaris Tracheæ structura potius facit ad Respirandum h. e. ad liberum Aëris ingressum & egressum, quam ad Vocis formationem. Et quantum concedat velimus Alpera Aëris rubum apertum esse ad respirandum; id tamen vocis esse posse, si Aer Vocem produceret tam è Glottide in Tracheam descendit, quam admodum Sonum producit, cum è Fissula lingua in Tubum resonantem immittitur: ac Aer in Animalibus Vocem producit, cum Trachea longitudinem emittit, sub angustiam Glottidis: adeoque Trachea ad respirandum aptius ad Vocem efformandam conducere nullo modo potest.

Ea tamen ratione Trachea ad Vocis (si vera Vox ea sit appellanda) resonantiam concurrere poterit, si scilicet Aer maxime impetu exierit interfectus ferat, per Glottidem prout naturam & spasmoticè coarctatus, ut in Tullii Convulsiva experitur, in qua non solum Aer interruptè extra pectus propulsus Sonum edit, sed etiam qui per convulsam Glottidis rimam agit attrahitur. Notat Dodartius quod Sonus hic ab Aëre inspirato in Testiculis producat, acutus est ad Quintam consonantiam: hinc fortè Testes Compellunt, Quines, Gallici appellantur. Quod verò ad Aëris fluctibus rimam, in tantum Cilli, & Tracheæ longitudine ad magnitudinem & resonantiam Vocis facit, ut quantum in eis Glottidis rimam non est in summatæ Tracheæ, quantum admodum in Brachiis; & reliquis ferè omnibus Animalibus, sed in illius parte infima, ubi nempe in Bronchia dividitur: Nil mirum ergo si Aer è Pulmone Bronchiis immediatè propulsus in Cym Glottidem, Vocem creet, quæ prædictæ & versatè (ut inquit Bartholinus in Cyclo anatome) Trachea trahe virescunt acquirat, & quantum vocem resonantia excedat.

Ratione igitur tantum erit credere usum Tracheæ esse Aerem è Pulmone excipere, atque Glottidis exhibere, ut ex veloci per angustiam rimulam ipsius transfluat Vox efformetur. Ad primum Trachea comparari poterit ductibus illis, qui in Organis Musculi Potestatis Aerem in Follibus ciliatim ferunt ad Tubum seu Fissulam per Soni generationem. Nemo minus dicere audeat, Sonum locum Organum creari in ductibus Aerem sequentibus potius, quam in Fissulatum formandis Aerem excipientibus.

Si quod autem instrumentum resonat in Vocis lumina prædilectum requiratur, hoc habet esse Trachea, ut est jam prædictum, sed nunc hoc præstabit ad Oris & Nasum cavitate: hinc Canalem externum vocat Fabricius ab Aquapendente, ut è Canale intus, seu Trachea distinguat: ut nempe Aer per rimam Glottidis velut trachea Sonum, quem Vocem appellamus, producat; Vox autem hic ex innumeris reflexibus in cavitate Oris & Nasum conueniens, majus robur, vim & sonorem acquirit. Quod ex eo præcipue fieri videtur, quia si partes hæc Catarrhi specie, quam Bronchitis, vel Coryza appellant, afficiantur, Vox raris redditur & insulari. Reflexionem Canalis hujus exterioris ostendit evidentissimè instrumentum illud exiguè ferrum, longè obliquè præditum (Trompe à laquais Galli vocant) quod parvi dentium tenetur, ac manu lingulam ferientem, Sonum creant ad maximam distantiam exaudientem: ex eo autem Sonus hic maximam acquirit vim, quod in ore cavitate resonat, ac variè lingua motu temperatur, etenim extra Orispassum, Sonus nullum reddit.

Quod igitur per ore habendum est, quod vocis recipitur, Vocem nempe Nasu redditam infirmum esse; quoniam potius credendum est Nasum ad Vocis resonantiam & sonoritatem quantummaximè concurrere; compessus enim Nasus, ut Aer per ea non transiat, cantumque modicum & valde insensum redditur Vocem. Inis si veram fati volumus, ad Vocem continentem usque ferri Nasum, quoniam Oris ipsius aperta disposita; nam insensibilis cantumque Nasibus clausi & aperti Oris, quidem Ore confusio, paulatim tamen remanensque Nasibus. Ad Vocem igitur, præterit humanam, formandam, Instrumentum sibi comparavit Aristoteles, quod Aer affluere aëre imitari non est aëre, nempe confusum ex Glottidis rimula, atque angustia hæc cernit: Fancion, Oris, & Nasum, in ejus cavitate & studio corpora varia consistuntia & figura differentia, quorum variè flexibus, variè, & nobis inextinguibilibus Peris reflexiones, ad illius undulationem & concinnitatem facientes, creantur. Inis, quod magis mirum est, solum hoc Instrumentum Homo non solum humanum reddit Vocem, verum Vocem omnium fere Animalium animalium, ut omnino notum: quoniam & servus Hippotus, refertur de la Cérda comm. in Echog. v. viii. Ergo exuperabat sonum Arenæ, Tibiæ, Buccinæ, Clastici, Cornuum, Organorum, adhuc Sceloporum sibilis, Aëris tinnitus, bombæ cunctæ, ut si quis audiret duntaxat, neque videret, putaret hæc mera instrumenta, non humanam vocem audire.

Quam ergo confusam Vocem in angustia Glottidis creari, quæri hic poterit, quibusnam instrumentis Glottis confingatur ad Vocis productionem? Et quomodo vulgo respondeant Anatomi, Glottidis rimam à Larvæ Musculis temperari; hæc tamen id concedendum esse existimat cit. Dodartius. Nam cum esse demonstrat passim Musculum Laryngis, hæc externam sit uteremur, ut ipsorum alio ad Vocem creandam nequaquam concurrere posse: Nam si suspensam ore musculorum Laryngis centrali longitudinem Glottidis, h. e. Cartilaginei Thyroidæ, nempe anterioris, ad præterit posterum Arytenoidis accelerat (quod impossibile est, quoniam Cartilaginei hæc foveat sui adherent in eo), necessariū sequitur Glottidis sibi relaxari, adeoque & aëre abesse, quare prodele ad Vocis productionem. Præterquam quod Glottis brevitas latius redderetur, adeoque nulla Aëri foret angustia, ad primum nulla Vox. Quod si suspensam ore Muscularum angustiorum reddi Glottidis, facti quæque debuerimus, tantum illius longitudinem accedat, quantum latitudinis derivatū est, adeoque idem semper Aeris exitus, atque aëre nullus Vox: præterit quoniam etiam Di darsunt, quod Muscularum Laryngis ad omnemmodum clausuram pervenire non possit Glottidis. Illorum igitur usus erit, ut externi Laryngis totum solum moderetur, interni verò in crassura Pulmonum eventumque expellant.

Quantum autem singula Membrana circulerit, quoniam intervallum cunctis Glottidis, in Laborem solum duplicemur, ut quoniam duplicatur singularem singuli continentur Functus ex sensu sibi confusi, quoniam crassie Glottidis labia aliquantulum assurgunt; hinc potius laudatur A. M-tum contractionis & dilatationis Glottidis unice pendere ab actione fibrarum prædictorum Funiculorum, quæ si contrahantur, tensura reddunt Glottidis Labia, & ad se implent magis accedentia, contrà verò si relaxantur, & leviter relaxantur Labia Glottidis, & aperta.

Neque dicat fibræ, hæc cunctæ h. e. musculi non esse, sed alibi, adeoque ad motum voluntarium perveniendum ineptas, quoniam dilatantur adeoque breviores capere esse non possunt. Nam quid implicat fibræ hæc carnes non esse, & tantum posse dilatari, adeoque contrahi, esse minimam, parit sensibile enim fibræ, vel alia fortè, exiliore parti habere possunt (est mihi notum quoniam fuit per fibrarum muscularum) in quo spiritus animalis branteat, illis dilatare, ac prout breviter quoniam. Erit sane exigua hæc tensio & contraxio fibrarum, ex quibus Funiculi Glottidis componuntur, sed exigua profecto requiritur ad Labia Glottidis capientia, h. e. ut ab exigua Aëris Elapsione transiret sensum ad arcum Elapsionem angustioris, hinc, & minus curata, ut adhuc contraxione discederet in duas lineas rectas, ferè tangentes, breviter omnibus arcibus prædictis.

ARTICULUS III. De Vocis humanæ Tonis.

Tonus Græcè vocabulum est, Tensionem significat, à verbo tēno, quod est Tendo; quoniam autem chordarum præcipui varia Tensionem variè creant Soni gradus; hinc fallitur est, ut variè hi Soni, vel Vocis gradus, seu Tensiones, Toni à Musicis

Musculi appellantur. Quare Romanum Vocem tunc dicimus variis Tonis inflecti, cum illam variis intentionibus, h. e. transire ex acuta in gravem, vel ex gravi in acutam, modulamur. Quorinus ergo hoc fecit, quomodo id fiat, ut Vox varias has intentiones vel remissiones, seu Tonos acutos vel graves acquirat: non leve munus acquirat.

Quoniam Organa ad Vocis formationem definita analogiam habent cum Instrumentis Musicis Aeris immixtis sonum reddentibus, quoniamdam præcipua sunt Fissula vel breviores vel longiores, talis Flauti & Hautbois appellatur; hinc poro merito Tonorum causam in his & similibus Instrumentis requirenda, ut ea Instrumentis Fissula humanæ aptari possit.

Componitur Fissula prædicta ex Lingula quadam, duabus transmissis lamellis ad motum & tremorem æqualem constantem atque ex Tubo variis foraminibus perforato: quare Lingulam Ori aptantes, atque Aerem per ejus rimulam in Tubum immittentes, ut Sonum creamus, utemur in variis Tonis modulamur, prout variis digitis foraminibus aptantes, Tabam reddimus brevior vel longiorum; h. e. acutiores Tonos formamus, breviori reddito Tubo, graviores vero, cum plura foramina obstantes, Tubum producamus efficientes: Tubi enim longitudo & foraminum apertura determinatur.

Hoc pectus certum est Lingula Satum & Lingula præcipue pendere; nisi enim Aer in ipsum rimulam immixtus lamellis tremorem & vibrationem imprimeret, haud Sonum produceretur: immo Lingula & Tubo Fissula separata Sonum ex Aeris immixtione reddidit. At Tremorem variis modis & Tubi varia longitudine pendet: nam Aer in Lingula angustia agitatur: transiens in Tubum, illius interius parietes percussit, atque alibi concutit licetis ipsius fibræ per longum dispersas, tremoreque illis impartit, unde Tonus exoritur, gravior si fibræ sint longiores, acutior si breviores.

Et quoniam Lingula sola abique Tubo Tonum peculiariter & proprium, atque & Tubo non dependentem educit; attonem illius Tonum ad variis Tonorum productionem, qui ex longitudine Tubi oriuntur, non facit: ut ex prælo eruitur. Sufficit enim si propriis Lingulae Tonum cum Tone Tubi differantiam non pariat, sed tantum proportionem habeat harmonicam sicuti remanet. Constat ergo Tonum Fissularum Musicarum, qui Flauti vel Hautbois appellantur, (ut & in principali Registro, ut vocant, seu Serie prima illarum Fissularum, quæ Organi Musicæ pneumaticæ constituentur) non à Lingula sed à longitudine Tubi pendere. Sunt tamen & quadam Fissula, quæ Tonos reddunt variis ex varia longitudine Lingula, h. e. lamellarum, ex quibus Lingula constituentur: ita ut si longior sit Lingula, gravior; si brevior, acutior creetur Tonus. Tubi autem longitudo non ad Lingula longitudinem accommodatur, sed sufficit si ad eam aliquam remanet harmonicam proportionem educit. Hoc erigimus utamur in Serie illa Fissularum Organi Musicæ Pneumaticæ, quæ Registro di Voce humana talis appellatur. Denique & in Organo eodem Musicæ Pneumaticæ sunt Seriei quædam Fissularum, quæ Registro di Trombe & Cornetti appellantur, in quibus Tonorum diversitas: quæ pendet à mensura Lingula, & longitudine Tabarum.

Quoniam ergo Tonorum diversitas in quolibet Instrumentis pendet à sola Tubi longitudine (ut in Hautbois & Flauti) abique alio Lingula adferuntur, in aliis à sola longitudine Lingula, ut ad Tonorum varietatem in Tubi longitudine concurrat (ut in Registro di Voce humana); in aliis denique & à Lingula, & à Tubo æque concurrentibus dependet (ut in Registro di Trombe & Cornetti); videndum est, an ad Vocis humanæ Tonos efformandos, Fissula & Glottidis actio simul, an illarum concurrat.

Si hæque L. de Fissula Pulmonum, nempe Trachea, sateri debeamus, quid quomodo ad ea proprii Sonus non formatur, nec Tonus ab eadem formari poterit. Illud tamen ad id probandum sufficere possit argumentum, quia si Trachea Tonum moderari valeret, nonnulli varii sui longitudine modaretur, hoc est longior salsâ gravem Tonum formaret, brevior acutior. Hoc autem ex factum experientia testis: nam sculis crummi in Cantationem cultu motum Laryngis descendit in quatuordecim Tons, ascendit in acutiores: ergo in Voce præcipue brevior redditur Trachea, cum longior efficit debet; & contra in Voce acuta Trachea producitur, cum debet contrari.

Si hæqueur II. de Canali exteriori ad Aquependente appellatur, nempe de spatio seu cavitate ab ipsa Glottide ad Narium & Labiorum extremitate producta; videtur fortasse poterit illam ad Tonorum diversitatem facere, ut nempe Aer propulsus ex angustia Glottidis, alio nempe Sonum creat, variis reflectionibus in Cavitate Ori & Narium patitur, atque alio intentionibus illis & remissionibus motus succipit, quæ requiruntur ad Tonorum varia discrimina: Præterquam quod Canalis hic exterior post & longior & brevior reddi, ad variis Tonorum mutationem; Nam cum Larynx deprimitur, tunc spatio ab eodem ad extremitate Labia longius efficitur, adeoque Canalis hic exterior oblongior saltem, apertius redditur ad Grætem: Tons redduntur; contra vero quæ ab eodem Larynx Canalis exterior brevior efficitur, eam dispositionem acquirat, quæ necessaria est ad Tonorum acutiorum generationem.

Attonem esse credere velimus, Canalis huius exterioris resonantiam, motum, & variam longitudinem, vel amplitudinem concurrere ad Tonorum gradum; haud tamen credit Dodartius Vocis Toni proprii in hac cavitate creari. Nam si illum comparare velimus Fissula, Hautbois, appellatis, aut illi, ex quibus Seriei principalis Organorum Pneumaticorum constituentur, impropria erit comparatio. Nam quoniam ex dictis Toni in his Instrumentis distinguuntur à longitudine Tubi, quoniamque nequeunt in Canali exteriori hominis differantia longitudinis necessaria ad Tonorum discrimina; facilius erit Vocis humanæ Toni in hac Cavitate haud distinguere posse. Nam si v. g. ut Tonus acutissimus reddatur, requiritur Fissula Organi pneumatici quatuor digitis longa, et Musici æstimates, in Tonum reddatur Octava gravior, requiritur Fissula, quæ longitudinem habeat octo digitum; & si adhuc duplici Octava gravior requiritur Tonus, Fissula ad longitudinem sexdecim digitorum affigere debet.

Quare si in Voce reddamus acutissimum, requiritur distantia Glottidis ad Labia, hoc est longior in Canali exteriori digitorum 4; ad reddendum Vocis Octavæ vel duplici Octavæ graviorum (quod multis famulatur est) requiritur longitudo Canalis exterioris digitorum 8. vel 16. Nullum autem unquam fecimus, Canalem hunc ad eam longitudinem pervenire posse. Haud ergo Voce humanæ Toni pignè poverit à Canali longitudine, quomodo in Fissula Hautbois & Flauti appellatis.

Gignitur fortasse hæc obfcuri modis, quæ gignitur Toni in Fissula, ex quibus componitur Seriei illæ Registro di Voce humana in Organo Pneumatico appellata, de qua supra. Et sane id quoniammaxime variis consensum videri poterit, si notetur propterea, quoniam habent Fissula illa Seriei Organorum quodam longitudinem cum longitudine Canalis exterioris hominis. Longissima Fissula huius Seriei in Organo non excedit longitudinem sex digitorum, & si minorem distantiam ab extremitate Labii ad Laryngem, cum homini depressa est, ad eandem mensuram sex digitorum illam pervenire debet. Quomodo denique ergo ope illarum Fissularum in Organo Pneumatico Toni consensum, & quidem Toni humanæ Vocis respondentem (unde Seriei di Voce humanae rursus); ita quæque variis longitudine Canalis exterioris in homine variis Tonorum discrimina consensum poterimus.

Nihil tamen minus, est hic vera proprietas esse videtur; attonem falsa esse apprehendimus, si cum Cl. Dodartio mutemur, Toni in Fissula illius Organi Pneumatici haud à Tubi longitudine pendere, sed potius à longitudine Lingula: Lingula enim est in his Fissula quæ determinatur, & proportionem harmonicam ad invicem respondentem, longitudinem habere debet: hæc sit in Fissula huius Seriei non excedens longitudinem sex digitorum, sit ad æqualem Fissula Seriei principalis, quæ longè est pedis 8. Toni autem in Fissula Seriei di Voce humana à Lingula pendet, non à Tubo. Haud igitur Canalis exterior in homine Toni gignit, comparative delinquit à distantia Organorum Pneumaticorum Seriei.

Sed dices: etiam remota aliis temporarum, quomodo Toni in Fissula Seriei di Voce humana, esse non in Tubi; gignuntur tamen in illarum Lingula; ita quæque Vocis humanæ Toni, esse non generantur in Canali exteriori, in ipsa tamen Glottide, quædam Lingula mensuræ præstat, generantur.

Sed respondet citatus Dodartius neque id sustineri posse; nam si in his Fissulis Lingula Tonus producit, id non facit nisi varia sui longitudine; Glandis autem laetitia labii nulla est crassitas, nisi minus linea, hoc est duodecima digiti partis: quomodo ergo in illa tam longitudine, & variis ejusdem longitudinis diversitas considerari possimus, quae necessaria sunt ad Tonus generandi genus? Haud ergo Glandis erumpere poterit cum Lingulis Fissularum di Voce humana ad Tonus generandi.

Quomodo igitur Vocis humana Tonus neque in Fissula Pulmonum, neque in Canali exteriori, neque in Glandis ejusdem Lingulae reperitur, creatur, & reliquos est in illorum generandi ex ipsius Glandis vario hiatu, & Laborum ejusdem tensione eruitur. Et quidem quoniam jam probatum fuit, Vocem non formari nisi à Glandis, quomodo igitur Tonus non fuit nisi ejusdem Vocis modificatio, sequitur bene evidenterque Tonus formari non posse nisi varia Glandis modificatio. Quare si Glandis modificatio consistit in varia rectitudine & accensu Laborum ipsius, hoc est in varia latitudine & angustia rimae, Tonus Vocis eruitur ex varia amplitudine rimae Glandis. Quomodo igitur nequeat Glandis: Labia ad seipsa accendere, nisi Fibra, ex quibus constituntur, tendantur, & breviores evadant, & contra Labia Glandis ab invicem recedant relaxantur Fibrae, hinc jure merito inferre debemus, Vocis humanae Tonus videri pendere ex varia tensione Laborum Glandis, atque ex varia erundam hiatu.

Quapropter quomodo videlicet variam Chorda tensionem variis Tonus creare: japponez yura passus, variam Laborum Glandis tensionem variis quoque Vocis humanae Tonus formare: & quomodo tandem Chorda magis tensa, adeoque velocius vibrata tendens agitata, acutiores Tonus producit, minus vero tensa, atque adeo rarioribus vibrationibus mota, generat Tonus graviores, ita Labia Glandis magis tensa secl, & velocius vibrata, acutius Tonus, si verò laxa evadant, & minus velociter vibrarentur, graviores edunt Tonus. Quo mechanismo Vocis humanae Organum Instruimus. Chordarum ergo representatio, comparari poterit.

Simili quoque varietate quomodo videlicet Lingularum variam aptitudinem in muscibus Instruimus, facere ad variis Tonus pronunciationem, eruditum jam est, variam Glandis hiatum variis Vocis humanae Tonus tensionem esse. Et quomodo tandem cum Lingula lamella propius reddatur, ut Aer velocius iter illius moventur, Tonus creatur acutior; ita à simili arctius Glandis Labia, atqueque Aer per angustiorum rimulam velocius moventur, Tonus Vocis redditur acutus; contra vero majori fissa hiatu Glandis, atque adeo lentius moventur per illum Aer, Vocis humanae Tonus graviores creantur. atque id communis est inter Instrumta musici Pneumatica, hoc est Aer sonantia, & Vocis humanae Organum.

Quod si quare quare minor Glandis hiatu acutiores producat Tonus, major vero hiatu graviores? Respondendum, in minori hiatu Aer cum transire velocius, & vehementius, adeoque crebrioribus vibrationibus imprimere Labia Glandis: contra vero in majore hiatu, Aer minus velociter & minus vehementer transiit, imprimi variis vibrationibus Glandis Labia, adeoque Tonus graviores produci. Hac quidem major velocitas & violentia in motu Aeris, consideranda praecipue est in ipso exitu à rimae Glandis; illi enim, qui per Pulmonem & Tracheam moventur, non fortis extrahuntur, pacate morantur, & paratissimi etiam cum evolvantur Glandis Tonus edunt acutiores; velocius enim Aer minus accedit ex angustia rimae. Sic in Organis Pneumaticis, Aer evis in Fissulis plene ex compressione pendens extrinsecus, moveatur, attamen cum Fissularum ejusdem hiatu, velocitatem acquirat, & quidem majorem in ejusdem exitibus, ad Tonus autem produciuntur, minorum vero in ejusdem majoribus, ad Tonus graviores evadunt. Quomodo autem in Fissulis artificialibus aqua in Hydris, seu Reservoiris hiatu hiat, maximum tantum velocitatem acquirit, cum à fissularum in apertum aerem prodit, & quidem majorem à minori hiatu fissularum; minorem vero à majoribus prodit.

Glandis ergo hiatu, & ejusdem Laborum contentu sufficit ad Tonus generationem, atque ex quod ad Epiglottidem, hoc est ad Glandis operculum recurrant: quomodo enim Epiglottis variam Glandis hiatum temperare possit, nihil minus quomodo & Vocis & Tonus praedictum satis satis quare explicaverimus, atque Epiglottidis asperitatem, frustra illum in subsumum recedant: praeterquam quoniam scimus adeoque Epiglottidis ejusdem esse, Glandis rimam per necessitate claudere, ne aliquid maxime simul cum Aer in Tracheam & Pulmonem intraret.

Quapropter autem ex Analysis ejusdem hiatu infirma satis operis consistit, Tonus vocis humanae variari ad varia Glandis apertura, & ipsius Laborum tensionem pendere; autem & Experimentis quare idem confirmari poterit. I. Minorem Glandis hiatum observamus in Larvæ Puerorum, Mulierum & Eunuchorum, qui acutiores Vocis cantare sunt apti; contra vero Glandis rimae magis aperta est in Masculis, praeterquam Viris jam satis, & ad generationem accedens, & magis adhuc aperta in his, qui tam plene Musica partem, quam Bassum appellant, cantare possunt. II. Unusquisque in seipso manifeste deprehendere potest contrarium hiatum in rimae Lingulae, cum à silentio ad Vocem transiit, & cum à Vocis ad Cautum: quoniam semper angustiorum & angustiorum fessum animadvertit, cum ad altiores & altiores Tonus tendit. III. Videmus manifeste aperituram Lingula in Thibia graviter diviti, Fragitum, vel Hautbois di Bassi appellationem, majorem esse, quoniam in Thibia minor, Hautbois proprio aëli; quoniam subicit hae Tonus acutiores, illa graviores redditurus. IV. Sunt Tibicini, qui sola Lingula, atque alio Thibi, variis Tonus creant, hoc solum artificis, quod labii Oris lamellae Lingulae varic compressione, variam reddunt illius hiatum. A primo ergo ad ultimum cessat, Tonus à variis Glandis hiatu pendere, variis autem hiatu Glandis ex variis ejusdem Laborum tensionem.

Sed quoniam, erit qui variam hanc Laborum tensionem, variisque Glandis hiatum ad mensuram reducere poterit id satis non solum intercompositum fuit, sed & interminata Imaginatio humana censura transcendere videtur. concipere enim debet non exiguum Glandis latitudinem in Tons & Tonus partibus correspondere, ut vel ad minimam illarum varietatem, Auribus innotabit, rimae majorem vel minorem latitudinem, ac Labia majorem vel minorem tensionem arguant. Reus Natura mirandus (si ita loqui licet) sic composuimus, sed crasse & minus exacte ad portensum admirationem evincimus, existimavit Dodartius. Illud tantum innuimus.

Potamus maximam Diametrum Glandis in Tono maxime gravi esse longitudine linea, hoc est duodecima partis aëris digiti (reservat est minor): posse ergo quod Cautum, Vocem ad Dissipationem, hoc est ad duplicem Oscillationem, ascendere posse, quoniam quilibet Oscilla dividitur in sex fere Tons integros, pauca quoque debemus Diametrum Glandis in 12. partes dividi, quoniam utraqueque singula duodecim Tons, in duobus Glandis comprehensibilis respondet. Unusquisque Tonus in 9. vel 11. mensuris partitur, Cautum appellatur, primum dividitur, sed exactius in 49. particulis, quae Hepemetricae vocantur: haec multiplicata per 12. Tons, efficitur per duplicem Oscillationem fere 604. Hepemetricae. Singularum Hepemetricarum quatuor partes exilite à Aere designantur, si namque ex una Chordarum ad unumquemque sonitum, ea parte auferatur, quae quarta partitur Hepemetricae respondet: sed ex ablatum dunt singulas Hepemetricas in 2. partes dividimus, Erat ergo spatium Glandis dividendum primum in 12. Tons, hinc in 604. Hepemetricas, modo in 1204. semi-hepemetricas, Ulterius quoniam singuli Tonus, & Tonus partes fessit & fessit reddi possunt, atque quoniam id manifeste varia Glandis latitudine, ad eandem Tons partem non accedunt, explicari non possunt, ut inferre aucter bimus: fessit singula Tons partes necesse diversitatem subire debent, his Vocis moderantibus, quae innumerabiles sunt, respondendum: fessit singula grana ad quatuordecim reducantur: quare partes Diametri Glandis, quae erant 1204, multiplicata per 4. debent 4816. adhuc extiterit particulae. Demum ex eo quod omnia haec diversitates in exigua Diametri Glandis sepponebantur maximum accessum dunt diametri Laborum; hinc sequitur quod gradus in motu accessum divisi aequaliter debent inter duo Labia, quod scilicet ad hoc ad Diametri Glandis, non 4816. partes ex recentibus particulis angustius evadat, debet dividendum huius particulae non Labia, alteram dividendum alteri Labii tribui. Quare numerus 4816, duplicandus est, adeoque evadat 9632. Debemus igitur consistere latitudinem Glandis, quae vix ad duodecimam aëris digiti partem pertingit, divisi in partes 9632. (ita juxta Musica regulam nec etiam equaliter concipere debemus, sed semper minores & minores), quoniam manifestum necessarium successum, innumerabilem per harmonici salubri exacte mensuratur Glandis Labia, in tam varia Vocis modulatione, quoniam in velocissimis commutationibus, expeditur.

Sunt

Sunt hæc quidem mirabilia; sed à illic mirabilia superius. Quomodo hæc descriptio latitudinis Glottidis facta sit in partem addi-
minuta; adeo tamem concideri debemus, ab illa enim accuratior in Causa observari, quam minimi successus vel defectus ab
enacta dote fieri videtur. Concedendum tamen est singulas particulas ex 963. viis perire ad 324. partem Diametri animi
capilli, vel ad 54. partem animi filii ferici. Ex comparatione, Diameter Glottidis seu animi linea, æquivalens Diametri 25. capilli-
larum: quare descriptio 963. per 25. descriptio 384. quid nempè singula particula, in qua latitudo Glottidis dividenda est, respon-
det 384. parti Diametri animi capilli, Atque insuper quom. Diameter animi capilli à quali sit Diametri septem filiorum ferici-
larum, descriptio 384. per 7. 54. quid tempore particula descriptio Glottidis singula respondent 54. parti diametri animi filii ferici.
Quæ exiliata & tamem videmus periri. Musici una aeris expiratione (qua quædamque extenditur ad datus & tres Batturas, ut
videntur), minutissimè huius Tonus partem, velicissimè Vocis excessu, aerem atque iterum pertransire, obsequi quo quid à mensura
dilatationis & ressonis Glottidis vel minimè recedant. Sed hæc iam miraculorum sint. Quod autem fieri omnino superius &
Summi Naturæ Audientis compatentia diffusi aperire videtur est, quod omni hæc dilatationis & ressonis, sunt ipse Fibram
muscularum, transmittentis & detententiam, hæc autem inflexus & extenuatur pro vtroque accessu & recessu Spirituum animalium
in Cerebro detententiam, vel in Musculis anæpensis accedentiam; Spirituum autem animalium motus quæcumque à Mente sic var-
iate determinatur, determinatur tamem obsequi eo quod Mens emittit instrumenta, quibus nititur ad motus hæc mirabiliter peragendi.
Ipsæ Materiam ipsam tandem tempore conficere & debemus incumbentem, ut Spiritus animalis dirigat ad Manuum digitum, ut ipsi
Cervicis musculi membra tingeret; ad Aures; seu sunt Harmoniam percipiat; ad Oculos; ut tota Musica in ebore apertis inspicere,
tam ad Vocem modulandam, tam ad Clericis, & fortasse etiam aliorum Instrumentorum, sonum dirigenda, tum ad verbi
gratia subscrispta legenda; ad Organum Vocis & Lingua, ut eadem verba profertur; & denique ad Glottidem ipsam carissandam & di-
lataandam, pro varia Tonus modulatione. Hæc omnia ad certum trapperi numerum & mensuram, plurimum etiam aliud
complectitur, peregrinum. Scilicet quæcumque est creaturæ rerum natura, ut quæ carui prima, & nullibi non erit, sunt, si attentis
natis & Mente introspiciatur, in personissima Divina Omnipotentia mysteria mihi introducant.

ARTICULUS IV. Varia ad Vocem pertinentia Phænomena exponuntur.

Primum Phænomenon est, Quia ratione fiat ut Vocem vel fortius vel debilius reddamus, invariato ejusdem Tono.
Solutio videtur prima aspectu facili: quid nempè cum Aerem per Glottidem fortius propellamus, fortius Vocem reddamus,
cum vero lenius & minori cuncta Aerem expellimus, debiliorem Vocem creamus; quantum vero sit lenius sive velox Aeris per Glot-
tidem transire fieri possit, invariata latitudine, & Labiorum ressonis; hinc fieri posse videtur, ut Vocis vis mutetur, in-
variato ejusdem Tono. Quod confirmari exemplo possit: Clorda dixit pulsat, fortius vel debilius reddere possit sonum, si fortius vel
lenius pulsaverit, dumtaxat eandem semper fortis ressonem. Verum enimvero hæc facili explicari non est, ac primo aspectu vi-
detur. Nam cum concipimus Aerem per Glottidem veliciter moveri, concipere iterum debemus ejusdem Labia majorem ressonem ac-
quirere, atque veliciter vibrationes pati; quare necessarii hinc sequitur, Vocem intensius debere, & ab alio Tono affici debere.
Contra vero cum Aer lenius per Glottidem transiit, tunc Labiorum ipsius tenuis immixtus debet, à tropica vibratione rarior eva-
det; debet ergo Vox remitti & ad graviores Tonus descendere. Hoc autem est præter hypothesin, nam supponimus Vocem forti-
orem ac debiliorem reddi, invariato Tono, quod experientia quotidiana & curio promissa constat, nam Vocem modulatur
ad unum Clorda datus, pulsamus ipsam fortius & lenius redire, obsequi eo quod vel minimè ab unum Clorda recedamus. Quod
autem ex veliciter Aeris per Glottidem transiit, Vocis Tonus acutior reddi debet, & ex tardius ipsius motu, graviores; patet
innumeris exemplis. Si Aerem in Fessula & Tibia viciniora propellamus, aperit deprehendimus illam sonum ad Tonus altiores
elevantur, ad altiores pariter, & contra. Utinam si necesse sonum productum in Fessura rima à Pectus per eam veliciter
transiit, vidimus sunt acutior sonum reddi, cum Aer vehementius rima percutit, graviorum vero, cum vis Pectus im-
minuat, hæc est cum Aer per rima minor veliciter transiit, in quo experientia notamus apertissime sonum simul esse & ac-
tiorum & fortiorum, cum nempè magis urget Vritus; contra vero efflatæ Vocis impetu soni & gravior simul & debilius evadit.
Quare item accidit debet in Vocis lautiora produtione: hoc autem est falsum, nam Vocem acutior quidem sed debiliorem si-
mul reddere possumus, quædammodum sonum graviorum, sed fortiorum. Alter ergo Quæstio insolvenda. Quare ut Vocis fortitudo
ac debilitas expellatur, ad Aeris transiitum vim, atque ad ipsam Glottidem dilatationem & contrictionem quoque recurramus,
hoc modo, Sonus pendet à velocitate: Tonus à gradu velocitatis Aeris transiitum per Glottidem, & ab inversa vibra-
tione: Fortitudo Vocis pendet à quantitate Aeris actus: Debilitas à quantitate Aeris immixta. Ad hoc ergo ut Vox reddatur forti-
or invariato Tono, debet ageri Aeris quantitas, sed conservari ejusdem velocitas, adeoque tandem vibrari Labium Glottidis.
& contra ad hoc ut Vox reddatur debilius invariato Tono, debet immitti Aeris quantitas; sed conservari ejusdem velocitas,
cum ipsam vibrari Labium Glottidis. Sed quomodo hæc conciliari poterunt? Non aliter sunt, nisi posse quod Glottidis dilata-
tur, ut majorem Aeris quantitatem transire permittat, & contringat, ut transiit præter minorem Aeris quantitatem & quidem
ad eam transiit dilatatur, quæ requiritur ad eam gradum fortitudinis, quo Vox est reddenda, & contringat ad eam magni-
tudinem, quæ necessaria est ad transiitum à forti ad debilem, invariato Tono. Cum ergo invariato Tono Vocem fortiter reddere vo-
luimus, hanc sufficit si majorem quantitatem Aeris in Pulmonibus propellamus; erunt inde non tam fortis Vox sequetur, quàm
accidit, non sicut ac ex vehementiori Pectus Tonus rima in Fessura fortis simul & acutior redditur. Requiritur ergo ut ad ma-
jorem quantitatem Aeris in Pectore propulsi accipiendum, Glottis laetior parietur, ut major Aeris quantitas per ampliatam Glottidem tran-
siretur, hanc velocitatem majorem accipiat, sed quam prius habebat semper conservet, ut conservet Vocis Tonus. Adeoque quod
fortiter reddere volumus vocem, est amplius facere debemus Glottidem. Contra vero cum invariato Tono Vocem debiliorem
emittere volumus; hanc sufficit si minorem quantitatem Aeris propellamus; nam quomodo minor quantitas Aeris per eandem rima
minor veliciter moveatur, immixta Aeris transiitum velocitate, immixtur Tono, adeoque Vox & debilius, & gravior simul
redditur; non sicut ac ex debiliiori Pectus Tonus rima in Fessura debilius simul, & gravior creatur. Quare requiritur ut minorem
quidem Aeris quantitatem in Pulmonibus propellamus, quod facit ad Vocem debiliorem reddendam, sed requiritur quoque ut Glot-
tidem aliquantulum contringamus, ad eam sicut antea, quæ requiritur, ut minor Aeris quantitas transiit, quom per argu-
mentum rima transiit, conservet eandem velocitatem, adeoque conservetur in labii Glottidis idem vibrationum intervallum, ad
hoc scilicet, ut iam quoque Tonus conservari possit. Rem analogis plenas exempla illustrat. Fossis Artibus in Siphunculo
Aquam reddit e.g. ad altitudinem quævis palmorum, quæ altitudo respondit pressioni Aquæ in Hydrostatico, ipsi Respondere con-
tineat: Sane si hæc Aqua (nec fortassis alia Aqua) dilatatur, Aquæ & Siphunculo ultra altitudinem quævis palmorum effusetur,
& contra à immixta quantitate, altitudo pressione Aquæ in Repositorio contenta, Siphunculo Aquam reddit eadem altitudinem quæ
vires palmorum. Quod ergo requiritur ad hoc ut Aquæ & Siphunculo semper ad eandem altitudinem exiliat, sive altitudo, sive im-
mixta pressione Aquæ in Repositorio contenta ad Nil aliud nisi ut ad eandem Aquæ pressione, Siphunculo amplius reddatur, immixta
vero pressione Siphunculo vocales angustior quod sit eandem proportionem habet pressio major Aquæ ad majorem compræssionem ejus-
dem Siphunculi, semper Aquæ & Siphunculo ad eandem altitudinem emergit nisi non semper eadem quantitas, & proposita apertu po-
terit, si singulam, Pulmones effi Aquæ Repositorium, & Glottidem Siphunculum; ad majorem ergo Aeris & Pulmonibus quantita-
tem, adeoque pressuram, aptanda est apertio Glottidis, ad minorem vero quantitatem, & pressuram, rima angustior reddenda, ut
nempè semper invariatus servetur Pectus Tonus, est Vocis fortitudo, & debilitas mutari possit.

II. Phænomenon: Unde fiat, ut quidam Cantantes Falsum edant Vocem. Pectus Vocis minime intelligimus Vocem disor-
dinem, & Tonus exacte non reddimus, adeoque ad harmonici concertus ineptiam, quædammodum Art. 1. expellimus. Eam est
Causam

Cassata prout Dodartius, quod Labia Glutidius inaequaliter sine confusione quoad magnitudinem, crassiem, vel tensionem: quare sit non aequi vibratur; adeoque cum unum edit vibrationes apertae ad Semi-tonum, e.g., alterum edit vibrationes apertae ad Tonum integrum: Hinc restat Tonus, qui medius est inter Semi-tonum, & Tonum integrum, adeoque prouti dissensus. Non dissimilis ratioe Gloridus quidem ex ipsius fissa, Falsa à Citharis appellatur, quod nempe Falsa, ex quibus componatur, aequaliter non sunt, sed quaedam eriguntur, vel minus tense, quaedam remissiores, vel magis tense.

III. Phenomenon. Unde oritur Vox Falsa, seu Fissa, quam di Falsetto vulgo appellamus, prout nempe illam distinguimus à Voce Plena, & Propria? In Fissa hac Voce tria sunt notanda. I. Tonus, quod nempe Fissa Voce Tonus illi acutior est, quam Propria, & Plena Voce edere haud possumus. II. Sonus, quod scilicet Voce Fissa sonitior non amittit, imò in quibusdam sit fortior, quam Plena: III. Vis, ex eo nempe quod Fissa Voce vis debilior plerumque sit, est in aliquibus fatis vehementer observatur. Quod ad I. pertinet: Quam Toni in Voce Fissa similes sint Tono, qui Pueri cum pueris aetate confusis reddunt, credere debemus Glutidum in Voce Fissa similem reddi, quod fieri potest, Glutidius Puerorum: quoniam autem magnitudo Laryngis, & longitudo Glutidii immutari non posse, credendum quod illius rimam angustius aliove reddi, & Labia quippe tensiora: imò rimae aliove angustius reddi debet quam in Pueris: nam cum longitudo in Adultis immutari non possit ob firmam naturam extremorum, ut angustius reddatur hiatus, Labia magis accedere ad inopem debent, quàm in Pueris, in quibus Glutid angustius est, quoad triplum diametri dimensionem. Quod ad II. attinet, nempe ad Soni Suvavitatem, notandum, quod quoniam Pueri saepevis perspicui erant ab aere per Nasum patiti, quàm per Os transiente, ut prius dictum; quoniam insuper nempe, Laryngem in iis, qui Fissa utuntur Voce, quantaevism elevari, atque etiam Caput retrorsum inclinari; facili negotio credimus Aërem parcius Glutidum in hac Voce exspulsum, maxime ex parte per Nasum propelli, adeoque nobis succurrat illi decedere debere. Quod si Canalis hic superior in quibusdam exaltius se conformatur, Fissa Vox Plena facilius est poterit. Denique quod ad III. attinet, nempe ad Vim Vocis Fissae: debilior Fissa Vox redditur ob minorem aeris quantitatem, per angustior emissum Glutidii hiatus transluentem: imò ex Laryngis fortiori elevatione angustius quoque redditur ipsius Tracheae longiori fissa dimensione, quare pariter per ipsam Aeris transitus. Id aperissime notamus in rubina ipsi, cum post Plenum Vocem, Fissam reddere voluerint: Laryngem quoniam notabiliter elevamus, Faciem quoque latitudinem minorem reddimus, Ciliis proclivius, & passim Caput retrorsum inflectimus. Atque parcius à Pectore propellimus, si qui autem sunt, qui Fissam Vocem etiam maxime timentis rati, ut cum Laryngis naturalem dispositionem obviunt, ut postquam illum elevarint, & Glutidum caritativius, facilius habere angustissimum Glutidii rimam aliquantulum dilatare, ac cum majori Aeris quantitate ad eam mensuram tempore, ut postea eodem tempore acutissimam simul, & fortissimam Vocem creare, iuxta ea quae in solutione primi Phenomeni dicta sunt.

IV. Phenomenon. Unde tanta Glutidii Vis, ut resistere possit adioni Musculi, qui infimi Ventris, & illorum qui Thoracis cavitatem coarctant, cum nempe post copiosam inspirationem, expirationem comprimimus, & Aer in Pectore contrahente exitum denegamus. Hanc difficultatem vocem Glutidii, & illius magnitudinem mirari, ipsiusmet resistent. Et quidem maxime fatis est Vis praedictorum Musculorum, praesertim in difficili Faciem deprimere, in Pectus, in venterum Muscularum, atque quicquid pectoris elevatione, in hernia sine accidit, ut postquam illum elevarint, & Glutidum caritativius, facilius habere angustissimum Glutidii rimam aliquantulum dilatare, ac cum majori Aeris quantitate ad eam mensuram tempore, ut postea eodem tempore acutissimam simul, & fortissimam Vocem creare, iuxta ea quae in solutione primi Phenomeni dicta sunt.

V. Phenomenon. Cur à Pueritia in Adulescentiam transientes Vocem graviores acquirunt; Eunuchi verò, & Mulieres acutam Vocem conservent? Cassa fatis erit Seminis tempore Puertatis generatio: quod quoniam in Testibus febricitari, negare tamen non possumus, ab eo autem quodam tenuissimum universi Corpori communicari, cuius non solum Larynx, & reliqui liquores valentius veluti redduntur, sed & partes ipsae Solidae robur, & firmitudinem majorem acquirunt, unde hoc aetate cum Puerum ortu, novam veluti naturam induere videntur Homines: quod haec dedit opinionem quoniam de Seminis per universum Corpus circulatione. Quamquam ergo partes Solidae Corporis ex seminali aëre effluat solvuntur redduntur; nil mirum si & Larynx ipse incrementum, & firmitudinem majorem acquirat, adeoque Glutidii rimae amplior, longiorque evadat: quapropter Vocis asperitatem amplius, & solidius reddere, patet Causa Vocis gravioris, & firmioris, Pubertatis aetate superveniens: quae quoniam Eunuchi, & Mulieribus non accidit, Vox acuta, quae prius gaudebat, in eis conservatur.

VI. Phenomenon. Cur quidam suavitius loquentes insuaviter cantent, & contrà? Solutio oritur ex discrimine, quod est inter Loquentis Vocem, & Vocem Cantantis. Loquentis Vox simplicis Glutidii à laryne creatur: ad Cantum Vocem etiamdem requiritur non solum Glutidii motus, sed & consensu Musculorum Laryngis, quarecum illam certe quodam modo se sustinent, libereque. Imò notat Dodartius in Voce Cantus, consensu eodem Tono, observari Undulationes veluti quibusdam, quae hancquidem sunt in Voce Loquaci, nisi ex Morbo: Nempe harum Undulationum minimi intelligi tremores illi Vocis, Trill vocem appellamus, qui etiam Cantantes praesertim in Cadentis, quos vocant, sed suavitatem illam Voce asperitatem, quam Lyciticae, Fadicinae, & ipsi Thibetici imitantur, non alia industria, nisi leni digitorum Gloridus temperantem, vel serena claudunt, non tremore, atque illam Modos Cantantibus appellant. Comparatur haec Undulatio à Dodartio fibrillationi: aliam quoniam Artem, quae quodque in eodem hoc Aeris superbia, velutissimae, & vix consensu aliam murem sustentant. Sic quoniam superentem Canantem Vocem Undulationes quodam velutissimas habere, quae trahunt à libratione veluti Laryngis, quod Musculorum illum sustentant. Quod evidentissimum observatur in iis, qui vel ex vitio, vel ex Morbo, Laryngem libere haud valent, cum cantare velint tremunt eadem Vocem, Undulationibus subiectis variorum constantem. Si ergo tantum discrimen est inter Loquentis, & Cantantis Vocem, fieri potest, ut quoniam cum habet Laryngis, & Glutidii consensum cum simplex Glutidii motu, & minimis vix requiritur, nempe cum loquatur tantum vitiis, asperissima sine vicia ad Loquentem Vocem etiamdem, adeoque hic suavitius loquatur. Si verò cum Glutidii artificiose modulata, major vis, & Laryngis sustentata, ac libere requiritur (ad Vocem nempe Cantum credendum) instrumenta sunt incepta, vel ipsiusmet vitiis, hic cantantur incepti, & infusiores, ac contrà fieri potest ut cum Glutidii, & Laryngis minimum edat vim, & veluti stissa sint, sit quoque veluti flaccida, & nimis aperta ad Vocem sonum reddendum: contrà verò cum sustentem illum acquirunt, sustentantemque, & vitiis qua requiritur ad Cantum, & illam Undulationem redduntur resistent, & magis apta ad clivorem sonum edendum: hic fatis Hemo Logolea quidem Vocem ingratam habebat, Cantus autem gratissimus.

VII. Phenomenon. Quiniam sit Mechanismus, quo sola Labiorum compressione ingentem Sibilum edimus? E n hic quae da Vocis in Labiis Glutidii formatione dicta sunt, facile erare possumus, quoniam Sibilus in Oris Labiis creari quoniam: quod ex Labiorum Oris dispositione conspicimus in Sibilu intelligere communius possumus involutionem consuetudinem Labiorum Glutidii

tibus in Voce. Quare quum in Sibili voluimus Oris Labia contrahi, scilicet reddi, atque alibi offerant rimam angustam exadare; facili concipiuntur, Aerem per hunc hiatum vehementer propulsam, Sibili sonum producere. Tenui autem in Sibili temperatior sonum varia Labiorum tensione, adeoque celeritate vibrationum, quum paululum ferente Lingua, quæ ad Labiorum hiatum diversimodè applicata, solum elapsam muta, tunc amplior, tunc angustior reddit. Ob analoga ergo Labiorum Oris cum Labiis Glottidis in Sibili & Vocis formatione, vocat Dodartius hiatum Laryngis Glottidem Voalem, hiatum vero Oris Glottidem Labialem. Iam et ad ipsam Glottidem Linguaalem, hiatum nempe, quum quidam artificum faciunt, applicantes adeo ut in Palatum duo latera apicis Lingue, & per exiguum rictum inter Lingua & Palatum relictum, Aerem celeriter propellerent, Sibihi vehementissimum producunt. Hoc ita ad Sibili generationem sufficere simpliciter Glottidem Labialis, vel Lingualis hiatum, absque ullo Concavo Corpore Instrumenti, quod quidem necessario exigitur in quovisq; Soni productione. Quotiesque vera esse poterit ætiamque Opinari non solum Platonis, sed ipsius Anaxagoræ dictis: Sonum esse impressionem Aeris fortiter vibrati ad versus Aerem solidum; intelligi quecentem.

III. Phænomenon. Quia ratione quidam Claudo Ore, & Vocem reddente Ventre, loquantur: quare *εγγενήσιν*, *Εγγλημυθισιν*, seu Ventri loqui appellatur. Hæc enim memini & ipse Hippocrates Lib. 5. Epidemior. Lib. 5. quædam Circule. nec quidem, qui clausi Oris Vocem, & quidem articulatam, reddentes, plethorica imponunt: immo sunt qui Danurum in ipsi loqui cæcendunt. Exemplum vide in Ephemeridum German. Decade 1. Anno 1. Observat. 26. in calce Scholii, apud Bonnetum in Med. Septent. Lib. 2. Sect. 12. pag. 473. atque in Anatomia Pract. Lib. 3. Sect. 24. Obser. 47. in Scholii, atque alibi. Recordam tamen *Εγγλημυθισι* ipsi Vocem veram non reddere, sed tantum sonum quendam inaudientem, quem exordium nimis Pulsus vocat interpretatur. Riolanus Pluribus tribuit in duplicatura Omnes conclusi: illam tamen irritat Glottidis Tract. de Partibus continentibus cap. 16. num. 20. Quotiesque autem Ventris loco & Pileorum intertallo Flatus conclusi sine, si comprimentur, atque & hoc in locum per angustam foratam transiunt, seu, & quandoque Voci similes parere possunt; Quod fortassis quatuorque Gravidis Mulieribus contingit, illas, atque afflicte; inducit, ut credunt, Fasces in Utero contractum Pileum edidisse: cuius rei Exemplum præstat apud Aulcoris, ac singulare refert Bartholinus Cent. 1. Milia. Nem impossibile quippe esset, ut aliquis pili Inspirationem, artificis, vel habitus quidam, Glottidem claudat, atque Aerem intra Tracheam, & Pulmonum Brachia in ratione ageret, ut Vocem obstrictam nutiri posse, atque adeo videatur & Pileore loqui, ac præinde Stethomythos, vel Sternumythos appellandus.

IX. Phænomenon. Cui Tortura afflicti quandoque Vocem amittit, & Palpebras claudentes obdormire videantur? Notat Hilandus casum huius Phænomeni, quod vulgo ad Segures referri solent. Cum Brachia sua sunt trahitur, & Corpus appropinquat proprio pendere illa summo dissensit, sunt Musculi & Thorace ad Brachia tendentes valde in quoque distenduntur, unde summa Thoracis ipsius compressio, adeoque Respiratio impeditur, evitat. Eadem ex causa compressio quoque pectus Musculi Laryngis externi, & Nervi Recurrentes ad epistoma Marum dicitur: nil mirum ergo si Vex deficiat. Quotiesque ex eodem Hilando, fecundum per Nervorum Colli compressio quoque possit, ut illorum compressio Palpebras emicere possit, & claudat; ita ut homo sine respiratu, sine Voce, ac Oculis clausis, videatur Sonno preberari.

X. Et nunc Phænomenon, quia ratione fieri nunquam possit, ut Vocis humane Sono Scephi vitæus frangi possit? Effloria huius Phænomeni apud multos Auctores legere est: penitiam tamen de illi Tractatum conscripsit Daniel Georgius Morhofius, inscriptum Stenose & Anacæsthesi. Oculis quidem Anstrophocentesis, Nicolaus Petterus nimis, Scephum vitæum præcipui videri quoniam alteri tradit, ut illius pedem suis manibus robustè cinxerit: licet ipsa, ore suo Scephi media parti admo- vit, Vocem fortissimam, & distantem reddidit, Scephum ipsum cum strepitu frangebat: idque ratio spectat, quæ in experimentum fuisse per quatuordecim 25. Scephi semel hora spatio confregit, Telles autem: quatuordecim habuit, sed præcipue Serenissimum Magnum Hetrurice Ducem quem apud Banovis inspiraverit. Simile quid narrat Daniel Baroli, del Suono Tratt. 3. Cap. 8. de Cornelio Meyero, Belgæ. Sani præ Phænomeni explanationem recurramus et ad Tremorem, & Vibrationem Aeris à Voce impressam, ac Scephi vitæo communicatam, quæ si imma, vel talis fuerit, ut Firmum ferre illam non possit, frangi necessario debet, non solum, ac si malis percuteretur. Quod Vex, quædammodum & rictus Sono, tremorem non solum Aeri, sed circumstantibus solidis Corporibus imprimat, patet ex ut, quæ de natura Sani debili dicta sunt, & experientia suadent quæplurima: Sic ad certum Sonum Organum Musorum, quibus in Ecclesiis utitur, scemta, & abactu, mox ad ipsum Tremore tremere sentimus, nil dicam etiam multumvis videram tremorem tunc temporis aliquemodò percipere. Nil mirum ergo si Vocis vibrationis Sono Scephi præcipue admo- tremore quoque communicaret; præterquam quod tremorem hunc manifestè deprehendimus ille, qui Scephum vitæum manibus suis tunc tenebat. Ut autem concipiatur, quare non omnis Vox Scephum frangere queat, & ut non omnis homo idem præstare possit, quod Nicolaus Petterus, vel Cornelius Mayerus? animadvertendum huius operationis artificium in dubio consistere, ut nempe non quicunque, sed certus Tonus Voce reddatur, atque ut Vox hæc agnata, vehementer, diuturna, & non interrupta sit. Tonus Vocis reddenda refert Oculis ex ipso Sono Scephi, huius enim Sonum prius explorat, deinde Vocem reddat ad Diapason, h. e. ad Octavam accitorem. Hoc cum exactè observare, tremor, & quidem maximus, Scephi supereminet: cuius rei ratio ex illi quæ prius dicta sunt manifestissime patet: quare si hoc exactè Tono Vox vehementer, diuturna, (ad tres nempe battatas), & non interrupta reddatur, ex assiduo, & furi tremore Scephum tandem confringetur. Quid si curat alius Tonus ab exposto diverso reddatur, vel nullum, vel solis levis Scephum tenebat, adeoque frangi non poterat: qui enim Scephum manibus tenebat tremorem non sustinebat, nisi ad Tonus prædictum Voce reddidit, quædammodum non ad quæcumque Sonum Organi Musici Pneumatici scemta tremant, sed ad certum, & determinatum. Sic nec frangitur Scephus, si Vox debilis erat, sensim remittebatur, aut fortassis aliqua ratione interrupta.

Tenuissimè et, an Tube Sono eodem Scephi contractu accidere potuisset? Sed rei ex voto hanc successu, nam hanc reposita fuit Tube Tonus ad Diapason Scephi exactè reddens, nec qui Tube contraxerit contracti impetu, & Tono ad tempus præ Phænomenon requisivit, Scepho ergo per in Aqua et addita ad temperandum illi Tonus, quo nempe confusio efficit cum Tube Sono, & reposita Tube canente Tremor Scephi accidit rari, ut Aqua gutta circumpropolia in gram spargeretur, sed non tantum, quantum ad Scephi fructum requiritur: præsertim quum Aqua portione edicta Scephi Tonus variationem patiebatur, adeoque cum Sono Tuba proportionem amittebat.

ARTICULUS V. De Voce Morbis.

Morbis humane Vocis hic à Viis in quibus distinguimus, hanc enim hoc hoc de Voce Exili, Obscura, Aspera, Cla- gosa, Rauca, & similibus; præm à prime & secunde, & à primigenia Organorum visiva constructione dependens, sermo erit; sed tantum de Morbis huius Vocis ex Causa præternaturali supervenientibus breviter tractabimus.

Ladit Pra præternaturali, vel cum obdormit, vel cum intermittebat, vel cum depravatur. Ab lita Vox dicitur Gra- cæque & ætali in sua Obtumescencia, qui Morbus quatuor ex Hippocrate vulgè cum Apoplexia confunditur, nu- tante nam Senectute lib. 1. Practice cap. 4. & Spigelio lib. 2. de Semiterna cap. 16. mediis afflicti videntur inter Apoplexiam, & Epilepsiam, quid si nempe Morbi Causa interior fuerit, in alterumque Morbum ager incidi: Aphonia enim præbent cadum veluti Apoplexiam, aliter sensu & Voce, hanc autem Morbi præterit in Apoplexiam, non convalescentur ut Epilepsia. Huius morbi Causa tribuenda sunt & deficiit Spirituum Animalium, ut interceptum illorum Nervorum, qui ad Organa Sonitus, & Laryngem pertinent. Id autem pendere potest à Spirituum animalium Nervos, ut rei extraneis permi- scum.

De Tussi.

Iusta Raritudinem etiam sub Expiratione contingit Affectus frequens admodum & latus communis, qui vocatur *Tussis*. Opus quidem Naturæ, h. e. insolentia adiosis, cecidit propter materiam morbosam, i. e. adios extraneam, quæ non fit, nisi adie materia Naturam irritans adeoque est bonum signum malæ causæ. Est autem Tussis Motus Convulsivus expiratorius Thoracis, in quo non tota, sed pluribus simul ac interruptis vicibus, fit Aeris, interdum & Contentorum in Aspera Arteria vicialis locis, per Os expulsiõ, cum violenta admodum Corporis convulsione. Omnis nempe Tussis fit, dum Musculi Thoracem stringentes, & Aerem sic expellentes non blando ac naturali modo subsident, sed potius violentè simul & convulsim, ut in interruptis vicibus, contrahuntur, & quodammodo convelluntur; ita ut rectè a quibusdam Tussis referatur ad Motus Convulsivos expiratorios Thoracis, non autem ad veras

Convulsiones. Adhuc alias complicata actio in Tussi, ex stridura nempe aliqui Larvæ ob strictionem, & ex forti & vehementi Aeris ex Thorace effusione propter vehementem hanc contractionem. Utrumque occurrit in Tussi, exinde enim exsurgit ille sonitus, qui in Tussi percipitur; si Larvæ non stringitur, ut Thorax fit exhaustus & vehementer expiraretur, non tussimus, sed fit strigitur, sonitus, ac vera Tussis adhuc. Notum est alias, quod Tussis pume sit voluntaria, pume verb coacta. Cum enim Tussis fiat per Musculos, imprimis Diaphragma, qui Musculi Thoracis certo modo obediunt voluntati, hinc fit ut pro voluntatis imperio variè Expirationem alterare, & sic etiam Tussim provocare queamus, quatenus scilicet Inspiratio & Expiratio est actio media seu mista, partim animalis, partim naturalis, & extenu cor modo à nobis determinari solet. Non raro tamen notentur admodum contumaces hunc Tussis, quæ sunt præternaturales & considerandi Medicis sublimæ.

CAUSÆ.

Causa Præterita est irritatio Asperæ Arteriæ, ejusque motum, sive hanc per eamdem viam per contentum, à Spirituum

Nature, atque adeo ab Ebrietate, quædammodum à Cafa ab alba, Cæli luxuriantia, aut Spinalis medulla in loco compressione De Ebrietate mentium facit Hippocrates 3. Aphor. 1., de Cafa ab alba Galenus 1. de locis affectis 4., ubi narrat non ex altero, ex Strumam excisione Vocem amitti. quid nempe ex incana operatione Nervos Recurrens excisus sacris, simile quid habet Am. Lusitanus Centur. 2. Curat. 70. Quibus in Calfas patet, Abstinere, seu Obviamferentem supereminere posse alijsque Sensum lesione. Absteri quoque potest Vox deficiat Materiam, nempe Aeris deficientis ex vultu Tracheæ, vel deficiu Thoracis, cum scilicet hic intret, & notabiliter perferatur, ac per Pulmæ ultra circuitu translat per Respirationis Opus deficiat posse. Vocis immutatio hinc similis esse potest Causa, fit nempe Spirituum influxu hanc immutatio tollatur, sed equum ex parte præterquam quod aliqua tunc, vel tunc quædam alius, Larvæ, & Glutidum comprimit, potest Vocem morbus immutari.

Depressæ nempe Vocis causa sunt Differentia, à quoque variæ eandem Differentiam Causa. Vox igitur quædamque Tremula ex virtutis nempe imbecillitate, vel Spirituum Animalium ad Organa Vocis defendendum non immutari, quæ ratione videtur summi debiles, & Acuta Febre prelorent, hanc firmam, sed maxime Tremulam ridere Poem. Item quoque accidit magna Timoris percellit, qui quædammodum universi Corporis tremunt, ita & Vocem hanc firmam prætere possunt.

Depressæ quoque Vox præter naturam si Abrupta, vel Effracta sit, ut loquitur Hippocrates lib. de Coacis prænotionibus. Fit hac præcipue cum Organa Respirationis hanc promptæ, & successivè moventur ad Aeris præparandum, sed interruptæ, & morali interruptis, Exempla habemus in Organi muscis Pneumatijs, quorum Efflata Solum interruptum redimus, cum Felles Aerem in illas impellentes non successivè comprimunt, sed interruptæ, & interrupta præstent.

Clangoris quoque Vox præternaturalis differentia dicitur, quæ stridens, sed ærea, & sonora est, ac similis Vocis illius Animalium, quæ Cellam habens prælorent, ut Græci, & Asperi, hanc obferunt in Febribus ardentibus, & in Pleuritide pume, quæ à nimia siccitate Larvæ, & Asperæ Arteriæ pendet, non immutari aut Galenus 7. de Usu partium cap. 7. & 1. Prothet. cap. 3. text. 3. & 17.

Depressæ præcipue Depressæ Vocis differentia est Raucedo, quæ Græci dicitur *ῥαυχή*, Latine Raucedo, & Raucitas, Persicorum quoque *Ravit*, Commotæ inter Cataractis specie, quæ Fauces, Guttur, sed præcipue Larvæ afficitur, aqua Vox ejusmodi depressatur, ac gravior, & ingratæ redditur, ut mollium non tam levis, quæ audientibus hanc parum pariet. Hic negotium ex illis est, quæ magis intelligimus, quæ verbis explicamus. Raucitū Vox cum Gutture, scilicet interior membrana humore multo mensis, sive à Catarrho, & Diffusionibus, sive ex materia à Pulvere frequenter repletione, ut in Polypis, & Empyematis. Fit quoque Raucedo ex corruptione eandem partium, & præcipue Labiorum hanc, ut in Læ Gallica, vel ex eandem asperitate ex vultu aut, & afflata viciatione, quæ rariore inter Fauces & Asperæ Arteriæ cavum Aer frigidi inspiratione attrahit, vel sicca & vaporibus, siccis, ac pulvere inquinatis, in & Aqua frigida, vel Vini meracioris potu. Cui non minus est illud Virgilii,

... Vox quoque Mærin

Jam fugit ipsa: Lupi Mærin videre priores?

quid nempe ei, quem Lupi prius afficiat, Vox deficiat, vel Raucæ reddatur, unde Adagium, Lupus in fabula, cum superveniente eo, de quo sermo fertur, silentium fit. Sicut tamen hoc magis nota, quæ nota.

Prognostica ex Voce Læx quædamvis loquitur apud Hippocratem in Coacis. Vox Effracta ex Hypercatarrhi periculatorem portendit; quædammodum si cum Voce Tremula Alvi fluxus in morbis acutis copuletur. Raucedo confirmata vix sanatur: quæ ab Empyemate, vel Polypis fit, mortem tentandam, Aphonia Apoplexiam, vel Epilepsiam parere solet: si cum Singultu copuletur, lethalis.

Curatio Morbum Vocis præ variis eandem Causis, variis esse debet, Quare Aphonia his remediis indiget, quibus Apoplexia, vel Epilepsia: si à Causa præterita oritur interna, quædammodum in Voce Tremula, Abrupta, vel Clangoris corrigatur, Spirituum Animalium copia, vel casus restituenda Cardiacis, & Nervinis medicamentis, vel Organa Vocis Remediandis, sunt demonstranda.

Raucedo quoque variis suspicitur Causationem, si ab humiditate Catarrhalis ortum trahat, Gargarismata excruciant, Massæcatarrhi, & Salivæ variis adhibenda, Eundem solum habet Sympus de Erysimo Libellus, Massæcatarrhi communis Tabaci summi, & similia. Cum asperitas Gutture indurata est, conducunt Lenientia, & Olea, ut Decocta ex Caricis, Uvae passis, Melle, Glycyrrhizæ, Succo Bælli æ, atque Tabaci ex Diacodis, Succo Glycyrrhizæ infusum, Saccharo pendulo, etc. Si crassa Purina partes obstruat, ex aqua erant Oxyptili distillatum, Sympus de Erysimo, Acetum rosatum, & quæ his sunt affusa. Hæc omnia medicamenta vel sub forma Electuarii, seu Lambicis, vel Tabellarum vago adhibenda, ut scilicet nempe deglutiantur ad hoc scilicet in partes Gutture, seu Larvæ illas ite aut eandem obstruere possunt: ut credere velis cum Hippocrate lib. de Conde, & quædamvis præferunt ex Anacardioribus Mælinis, posse medicamenta lenia quæ ex parte in Asperam Arteriam illam, unde Arterica dilla sunt.

Duo denique silentio non sunt præterenda, 1. Quod ad Raucedinem valde præsumendum expertum sit medicamentum, Choccolate gelida non parvi affertur, fortasse, quod Gutture partes longè morbo exasperatæ ac calidissima frigida præstet, & parva oleosa, quæ variis Causis, nempe temperetur, & leniantur. 2. Quod legitur in Historia Academiæ Scientiarum, anno 1700. pag. 33. Virginitatem quæ fit Raucedinem subitè tollere (res ad modicum tempus) per se pume Decocti Vulnerariæ: quare vultum cor repletum se non à spissitate, Vocem in maripia se circumferre dicitur. Item medicamentis generis alius juremenco fuisse, ait Dn. Lemery, ibidem, anno 1701. ubi plures sensum se fuisse faveatur, sed de his satis superque præ rei occasione.

videtur imperi in Motum Convulsivum adto. Afficiuntur igitur hi à quavis irritatione, quæ liberam Respirationem impedit, in quocunque etiam sit Respiratio Organo, in Pulmonibus, Visceribus, Diaphragmate, Ventriculo, Hepar inflammato, &c. frequentissimè tamen occasione irritationis Alperæ Arteris, vel sine tali occasione prævis ex solis spasmi & motibus convulsivis, tam ex primario affectu, quam ex consensu cum aliis partibus nervis, in Tussi nempe Convulsiva: sic enim quædam Anatomici, unde fit, quod Auricularis membrana interiore, stylo vexata, oritur Tussa inanis? ac rectè dicunt, fieri per consensum propter irritationem, & hinc aliquem spasmus Plexus Nervi Auditorii cum Nervis Intercoastalibus, præsertim illis ad Alperam Arteriam derivatis, & sic fit Tussis inanis, vellicata Auricula interna. Sed hæc est Tussis naturalis, sic etiam observatur labiade Tussis Convulsivæ præternaturalis, seu quæ interdum, sine vicio partium Præconcentricarum post Epilepsiam aliaque Convulsionem, per simplicem Nervorum & Musculorum Thoracem motum & contrahentium Spasmodum sunt observabiles. Exemplum talis Tussis Convulsivæ de Virgine Epileptica afflicta, ex tali Nervorum circa principium in Cerebro Irritatione, videlicet in WILLISII *Patholog. Cerebr.* *lib. de Morbis Convulsivis*, ubi de Tussi Convulsiva: quævis & hi Spasmi modo ex partibus Respirationi intercurrentibus primario affectu, modo per consensum cum aliis partibus nervis contingant, ratione cuius tales Tussis Convulsivæ cum aliarum partium Convulsionibus conjungantur, Hypochondriacis & Hystericis frequentes sunt, in genere ita, quod viciis nervi generis ex acido præternaturali, imprimis Lympha acida, obnoxii sunt: potissimum Infantes nimis tussiendo interdum quod partes Respirationi intercurrentes in convelluntur, ut Respirationi quasi interrumpatur, suspendatur, aut pervertatur, quod vulgo apud nos vocant: *die kleben aufen*: vid. WILLISII *Phar. Rationat.* P. 2. *lib. 1. cap. 6. p. 61.*: sic & HILDANUS C. 1. *Ob.* 66. mentionem facit Tussis Ægrum interfecit, quæ fortè fuit Convulsio vehemens Diaphragmatis. Tales Tussis Convulsivæ non secus atque alii Morbi Convulsivi, Epileptici affines, non solum sunt Chronicæ, sed etiam Periodicæ.

Sed omnis his merè Convulsivis, illam in specie consideremus Tussim, quæ Causam Materialem, Respirationis Organa afficientem agnoscit, præsertim eam, quæ ex prævis irritatione Alperæ Arteris originem ducit, adeoque tam Laryngis, quam Bronchiorum cum appendicibus vellicabilis seu lobularibus, ut vocat WILLISII *loc. allegato* p. 1. affectioem sequitur, seu, ut HELMONTIUS loquitur, Tussis oritur sensu noxi, infestantia Laryngem à sui principio usque ad Pulmonem profunditatem, five mediatè five immediatè eadem afficiuntur; ad quem posteriorem modum & Ventriculus acri Lympha vellicatur, & Diaphragma multè a seclum, speciatè vel concurrunt. Facit hæc Exemplum BARTHOLINI C. 6. *His.* *Anat.* 97. de Tussi per annum inveterata in Vacca, in qua post mortem salvis Pulmonibus inventum fuit Jaculum Diaphragmati insitum, à quo continuo irritatum Diaphragma non potuit non talem Tussim inveteratam & continuum inferre, sicut & Hepar inflammatum Siccam Tussim comitem habet. Huc facient & Tussis à Vermibus in Alpera Arteris, quarum Exemplum habet ZACUTUS LUSITANUS l. 2. *Prax. adm.* *Observat.* 36. & BENIVENIUS *Obs.* *cap.* 67. Infantes interdum gravi Tussi laborant, ubi acculatur Stomachus: sed non videtur: potius Vermes Stomachum vellicant, ut rectè dicie JENNERTUS l. 2. *Prax. cap.* de Tussi, & FORESTUS l. 16. *Observat.* 2. in *Arch.* quod vellicato sequitur talis Tussis inanis cum Moribus Convulsivis, & Epilepsia, & sic potius videtur ex genere Tussis, per consensum & motum convulsivum ex Nervis excitare.

Pars verb *Afflicta* à Causa occasionali materiali est

I. *Larynx & Alpera Arteria* admodum sensibilibus, vellicata & lacrita, in specie, quod tunica internam, eandem levissimam; Pulso enim est insensibilis: Vel

II. Est *Oesophagus & Stomachus*: quorum, ille nempe oesophagus, Alperæ Arteris à hic verb, Stomachus, Diaphragmati est continuus & connexus: Vel

III. Denique sunt ipsi *Musculi* moti, aut nervi ex motu.

Causa Remota irritat & Tussim provocat, est quicquid Musculos aut Nervos Aspirationis dicatos irritare aut vellicare potest, five hoc fiat mediatè five immediatè: ista enim vellicatioe Fibre tam Musculorum quam Nervorum crispatur velocem ac rapidum Spiritum motum ac infusum

excitant, de quo *plura*, ubi de *Convulsivis* sive necessitas contra dicti Musculi Thoracem contrahat, & prout irritatio est interrupta, etiam interruptus seu subsultorius Tussis est motus.

Fit ista irritatio, ut disi, *nunc per Affectionem*, omne per *Consensum* per Effluentiam, quando vitium, quod Tussim concitat, aut est in ipsa Nervis, aut est in Musculis: Per Consensum verb, quando alia quædam pars, cui Nervi Intercoastales, Thoracem fringentes, continentur, afficiunt; & sic mediantes aliove vellicantur Nervi, unde Tussis: e. g. si scapitatus Arteris, & Tussis talis per consensum fit ratione Nervorum, excite semper Tussis fœca.

Jam verb consideranda imprimis *Differentia*, dum Tussis l. *ratione Moti* est vel *Sicca*, vel *Humida*, quando concussio illius spe, & aeris est violenta, Hamores, ut Sanguis, Pus, Mucus seu Pleuris, Lympha, & similes liquores per Os excreantur, ex quocunque loco proveniant talia: *Sicca* verb Tussis est, quæ magno ac diuturno conatu parum aut nihil excremit, sed irritio tussiendo coarsa Corpus universum flagrat, quæ Tussis Inani seu Sicce continetur non raro graviores, tam Corporis, quam spiritus hypochondriorum aliarumque partium Dolores contrahentes & plura munda lacerantes oriuntur: Imò hæc ipsa Tussis Inani Hæmæ, tam testinales, quæ etiam Scroli vel Telium Tumores, excitantur: sicut non raro comit illa aliquando Urinæ, aut etiam Alvi Fæces, involuntario protruduntur: qualem Tussim graviores ac vehementiorem, *Tussis Terribis* secundum HIPPOCRATEM appellare solent.

II. *Causa Irritante* ratione oritur Tussis vel à Causa Externa, vel à Causa Interna: Utroque Tussim, tam Siccam, quam Humidam, & quidem pro fœci moraræ occasionali ratione, vel Pedoralem vel Stomachalem excitare possunt.

Causa Externa sunt, vel Inspirata, vel Assumpta. *Inspirata* sunt Aer inclementior, præsertim hybernus, Fumi minerales aciores, Fumus v. g. Nari vel Sulphuris incensæ, & eorum Effluvia. Hæc & similia pertinet ad *intellimam* Tussim inferiur; quatenus particulis acidæ ac corrosivæ inlinguntur aculeatæ, nunc simpliciter Alperam Arteriam, nunc simul Membranam Præsternam inferiorem prope Faeces sitam, afficiunt & irritant, quibus irritatis oritur Tussis, quam aliquid continuatur, & Pedoris angustia, & quasi compressus ac gravatus circa Pulmones sensus, cum aliqui Respirationis difficultate, insequi solent: quæ omnia Symptomata non materie collectionem, sed irritationem Bronchiorum & Pulmonum, inlinguntur; ex horum enim aliqui contractura & gravatus ille sensus, & hinc Respirationis aliquid impedimentum sequuntur, de quo *suprà*, ubi de *Alperam*. Ratio: quoniam Nervi ad caput Laryngis & ipsi Alperæ Arteris Bronchia delati, oriuntur ex eo Nervi Intercoastales fœculo, à quo ipsi Thoracis fringuntur & contrahitur: Sarculo ergo illo ad Alperam Arteriam protrahit, & irritatione in spasmodicas protrahiones acta, hæc continuatur ad Musculum istum, qui Thoracem stringit, & sic Thoracis contractio & Tussis.

Pertinet hæc Tussis *Intellimam*, quæ ex Gasacido inspirato in tales Tussis incidunt. Pertinet hæc Tussis Epidemica communiter grassans in plurimos, five Benigna fuerit, ut fit communiter tempore hyberno inclementiori, five Maligna, quæ necesse comitanda est cum Febre Casarialis maligna, Germ. *Mit Fiefl Fieber*, ex singulari Astris inquinamento à pluribus contrahit. Non desunt Exemplis: Imprimis apud SOLEANDRUM, ex quo etiam allegat SCHENKIUS l. 2. *Observat.* de Tussi, habetur Exemplum Tussis admodum feræ, Romæ epidemicè grassantia.

Assumpta sunt quæcunque vel per errorem in Alperam Arteriam delata, hinc vel miserrima gutta Potus, vel mica Panis, aut simile quid, est irritatio concitat Tussim pertinet ad modum dicitur ratione: vel mediante Oesophago & Stomachi orificio superiori Alperam Arteriam afficiunt & Notum nempe est, quod Alperæ Arteria, ubi desinit annuali Tracheæ, & coniungit Oesophagum, fiat membranosa, unde revera & facillime cum Oesophago continetur irritatur, & ita per consensum dat Tussim. Nec desunt Exemplis: sic e. g. quando insueti bibimus Vini Spiritum acrorem, ac aliud spirituosum acris, vel quando assumimus admodum acris maxime acida, tunc eo tempore, quo transeat Oesophagum, utut clausit fit Larynx, nihilominus tandem vellicando Alperam Arteriam, Oesophagi ensali coniungunt, Tussim, nunc levioris nunc asperioris, efficiunt.

Inspirata vel Assumpta hæc, quatenus inferunt Tussim, primo dant Tussim Siccam simpliciter ex irritatione Laryngis

gie eorum, in ipſe ſi Hyeme Aer inclementior, irritantur ſimul Nates, ſtenemus aliquandiu; tuſis vero hæc aliquandiu continetur conſequenter ex leſione partis ita irritatæ tandem fit Humida, & Materie præter ierolæ, tandem mucosa; Expectoratio acquiritur, quæ interdum eſt copioſa, ut Tuſſis Chronica oriatur. Communis hic ſent Fabula, deſiſſare talem Materiam ex Capite in Laryngem, quod falſum eſſe non enim ſalcem in Larynge & Bronchus Pulmonum, ſed in ipſo etiam Pulmone ſuccellivè colligitur, hinc evacuat. Næpæ primò uberior Lympha ex irritatione tranſudat in vicia loca, quæ potenter in condensationem in Mucum plus minus crallum & viſcidum. Quod ſi graviter ex irritatione diſtortum fit iſteſo, & phlegmonodes plus minus ſit diſpoſitio, vel etiam aliquando excoriatio; ipſum Nutrimens diclarum proſimum, maxime Alperæ Arterię & partium circa Fauces conſtituarum, in debita aſſimilatione impeditur una tranſudat, & ſuccellivè alteratur ſub Muci pitiſſimæ forma evacuat; quod in Naribus dicitur Coryzam, in Fauibus Tuſſim Humidam. Hinc ordinariò duo tempora in tali Tuſſi diſtinguere ſoleo: Quandiu enim eſt Sicca, Tuſſim à Catarrho recti eſſe aſſerunt, Materiam adhuc Cradam evacuationi ineptam, hinc Remedia Conſequentia, ſeu Incraſſantia diſta, reverà Anodyna & Temperantia aſſerunt: Deinde dum eſt Humida, & Mucus externi incipit, Materiam coſtam aſſerunt, adeoque Incidentia pro facilienda Expectorazione uſurpant; hinc ſuper tales Tuſſes ab Inſpiratione ſupervenire. Mucus ergo ille varius, nunc inſipidus, nunc acris ſaliſ, nunc ſubacidus, non eſt Cauſa morbiſca, ut vulgò putatur, ſed potius eſt Productus effectus, qui oritur ex vicioſa aſſimilatione vitiantur Alperæ Arterię, quæ ipſa aſſimilatio Nutrimenti vitiantur, quando Alperæ Arterię à vicio externo plus minus læduntur. Mucus hic ſi hæret in Bronchis Pulmonum, incramus Mucosa, viciſſima copioſa, genita obſtructionem huius partis, inductam ab Aere inclementiore, unde talis ſuccellivè de novo pignitur, & interdum Tuſſim Chronicam admodum gravem interit; dicunt: *Catarrhum ipſi eriditſe ſuper Pulſum*; ſed omnis ex Pulmonibus generatur & nalcitur. Sic ex acidis Fumis metallicis inſpiratis talis Tuſſis oritur; falſum enim eſt in tali tuſſi à Cauſa externa recentem talia mucosa ex Sanguine deponi à Natura in Pulmones, æu excrementa præternaturalia: non ſunt ſane ex Maſſa Sanguinea, ſed ſunt in Alperæ Arterię; quod proprio exemplo didici. Aliquando etiam ſanſimilis, & palſum Clyſtem ex Antimonio, Nitro, & Sulphure per Retortam, ſed ex ſententiis igne ſumpſerat Retorta, unde ingredientia ſulphurea copioſum Fuſum acidum eructabant, ex cuius Inſpiratione incidiſſimo tempore ſuaviſſimo, in Coryzam & Tuſſim per quatuor ſeptimanas pertinaciter durarent, in qua copioſe admodum Mucilaginis per Nates emungebam, & Tuſſi per Os reſpicebam: quæ non deſiſſabant ex Capite, nec nulla patebat via; nec erant in Maſſa Sanguinea, nec in Corpore, ſed ſebant in luminitate Naturæ & in Alperæ Arterię, ex Acido iſto inſpirato hæc partes lædente: unde primò copioſior Lympha alluebat, poſtmodum ſuperveniente diſpoſitione phlegmonode & aliquali excoriatione diclarum partium, earum Alimentum proſimum in talem Mucum copioſum degenerabat, donec irritatione ceſſante, indeque Lympha copioſa affluuſu deſiciente, & per Vulneraria reſiſtiſſis partibus læſis, Alimento non amplius degenerante, omnia illa Symptomata ceſſarent. Hoc nempè eſt, quod ſunt Confuſioſis tribuit HELMONTIUS Tr. *Cuſus Errant*; qui dicitur præſentibus, cas ab externorum Inſpirationum injuriis deſendunt, quibus læſis & hinc errantibus, privata illorum locorum Digellio vitiantur, & Ros nutritivus in talem Lympham, ſeu liquorem, ex Mucum crallum & viſcidum, pervertitur, quod ipſum inerruſſis ac vellacæ Alperam Arteriam tempore hyberno, dicit illas contumaces Tuſſes. Quæ omnia faciliè ex dictis conciliari poſſunt, per Cuſodem diclarum partium Spiritum Initum, & hinc Inſuſtinent intelligendo. Ex tali Cauſa externa genitæ Tuſſis nunc ſunt Proprie, nunc verò Spariæ, ſeu Epidemicæ, prout quodcumque grave Aeris vitium Inſpiratione plures læſerit.

Cauſa interna, quæ Tuſſim interit, etiam nunc Humidam nunc Siccam excitant. Et quidem Tuſſim Humidam quod attingit: illa dependet à Cauſa Interna ſemper à materia nonnihil viciſſa, plus minus acris & ſaliſa, quæ ſubſiſtit vel in Alperæ Arterię & Pedore, vel in OEſophago & Stomacho. Illam vocamus Tuſſim *Preſentalem*; hæc *Stomachalem*.

Humida Tuſſis Preſentalis oritur variis ex Cauſis.

1. Eſt Mucus viciſſus ex degenerazione Alimentis proſi-

mi, vel Pulmonum vel Laryngis, natus, ſive ledatur Alimento harum partium alimentatio occasione Cauſæ externæ ſive interncæ. Quæ pertinet Abſceſſus & Ulcera Pulmonum, Phthiſis, vel quando à Sanguine, niquiſe ſero accipitur eroſio Pulmonum parenchymæ, aut quando à Lympha acriori excitatur Larynx aut Alperæ Arterię, adeoque diſſilis in locis poſtmodum Nutrimenti proxiſi aſſimilatio impeditur; quæ Nutrimens tale pro ſuſceptione varia actionem in variam Mucum, Sordes, Paracrocias, &c. degenerat, & ita irritando Pulmones & Alperam Arteriam, Tuſſim Humidam interit, in qua copioſe talis præternaturalis Excrementum eliciuntur. Pertinet hæc Tuſſis Humida, (quæ Morbus Acutus & Febris Ardentes inſequitur,) quæ fit quando, nullibi apparente Crudi & recentem febriſſa Maſſam ſanguinem coſta in Pulmonibus hinc inde deſigunt, &c, ſive in ſtatu ſive declinatione Morbi, ex Maſſa ſanguinea depurata deſponantur, hæc etiam Humidam Tuſſim cum copioſa Materie reſeſſione conſtituit, cui Phthiſis ſupervenit, niſi maturè curetur. Facit hæc etiam Sanguis in Caſu ab alio in Pulmonibus collectus, & alſi Affeſſus, qui Pulmones inundando irritat Alperam Arteriam, & Tuſſim Humidam à Cauſa interna interit: item Inflammatio Pulmonum & Pleuræ, in quorum præſuppo Tuſſis Sicca, in incrementum ex Lympha & Sanguine miſta, & inſuſta temperatura ternam Muſculum conſtituentibus, etiam Tuſſim Humidam obſervari ſolet; quin & in hyperpneſia Pleuritide, & Peripneumonia purulenta, non ſecus ac in Pulmone exulceratione: item tuſſis in Emphyſemate Pulmonum obſervabilis, in qua copioſa Puriſſima hæc partes irritat, & Tuſſi reſpicitur. Hinc falſum eſt, Mucum itam à Materia, quæ ſubſiſtit tuſſi humida reſpicitur, deſiſſare ex Capite in Pulmone Bronchia: cùm aliam longè, camque variam, fortiaſur originem.

Obſervandum etiam, falſum eſſe hypotheſin vulgarem, quod ea, quæ in Tuſſi humida uſuſſimo aut ſecando per Oſeſpirationem, omnia ſint ex Pulmonibus. Falſiſſimum hoc eſt, quod omnia ſint ex Pulmonibus, niſi adſit diſſilis Reſpiratio; cùm talia per Bronchia tranſeant, & ſic Anhelum liberum impediatur; ſed ea, quæ maximo cum difficultate & cum Anheluſa iuncta, ſunt ex Pulmonibus, quidam verò ex Membrana Pituitaria poſteriore; via enim copioſa, & Mucosa ex Pulmonibus poſſunt reſeſſi circa diſſilientem Reſpirationem. Omnia, quæ incramus ſunt ex Fauibus imis: quæ ex Membrana Pituitaria poſteriore frequenter Mucosa eſciuntur: quæ ſubſiſtant in ſtomacho, ſuccellivè per oriſcium ſuperius ſolant in OEſophagum, ubi ſarſum incramur, donec tuſſi per Os eſciantur. Multi ſunt, qui mane evigilantes multa copioſa eſciunt, nunc cum, nunc ſine Tuſſi: Pedus eſt innocens: ſed ſunt ex Stomacho reliquæ ex alimentis non rectè coctis, & ſub forma Materie pitiſſimæ ſorti Sereſis eſciuntur, quod ſignum primarium eſt Morbi hypochoſtriaci. Falſa eſt hypotheſis, quod ſtertor præſens audiat ex imo Pedore: Interdum Stertor ex Pulmone Bronchiis plus minus inſarſis, atque ſe audiat ex imo Pedore, cum diſſili Reſpiratione iunctus: ex Fauibus eſt, ſi Membrana pituitaria poſterior copioſam oruſat Lympham, vel viciſſam vel mucosam.

2. Præter talia Mucosa, aut etiam Aqua, quæ ſunt ordinaria reſeſſa, etiam varia Extraordinaria nonnulla reſciuntur. Sic Vermes cruciformes inſarſi Encarum per Tuſſim reſeſſos vidit ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. *Prax. Admirand.* Obſervat. 36. item BENIVENIUS Obſervat. cap. 77. Deinde Lapides non raro ſunt obſervati tuſſiendo excreti, qualia Exempla impriſis ſunt in BORELLO C. 2. Obſerv. 67. & ZACUTO LUSITANO lib. 1. *Prax. Admir.* Obſerv. 55. & 56. de *Calculo magno*, Tuſſi poſſeſſa. Imò in Ulcere Pulmonum ejuſdem Abſceſſus, in Tabæ Pulmonum ſtrullula, integri Venarum rami ac ſurculi, frequenter obſervati fuerunt reſeſſi. Sic TULPIUS lib. 2. Obſervat. cap. 12. habet ſurculum Venæ Arterioſæ expectoratum: ſi item cap. 3. obſervavit Venam ex Pulmonibus reſeſſam: Sic introſus Pulmonum Lobos cum Suffocationis metu Tuſſi reſeſſos obſervat TULPIUS lib. 1. c. 14. etiam item BENIVENIUS in Obſervat. cap. 88. Mirum eſt, quod interdum obſervatæ fuerunt Tarandæ, in Utericis & Vulneribus Thoracis uſurpate. Tuſſi tandem per Os eſciunt; unde Moderni Chirurghi Tarandæ alligant filum: Nam tales Tarandæ Tuſſi reſeſſas habet idem TULPIUS l. 1. cap. 15. item HILDANUS C. 2. Obſerv. 46. item C. 6. Obſerv. 32.

Ex Stomacho & OEſophago affecto oritur Tuſſis Humida, dum copioſa mucosa Lympha ex Membrana Pituitaria, quæcumque occasione in Stomachum ſuccellivè deſcendunt, indeque

OEophagum, & Oesicium superius irritant, & hinc motu Alperam Arteriam afficiunt, simulque in stomacho conservata primam Digestionem turbant, indeque Cruditas acidis occasionem praebent, gravem Tussim Chroniciam interit, quales Tussis non tantummodo Senibus sunt familiaris, sed etiam Junioribus. Saepè frequentissima est Tussis ex stomacho urtata, ut patum attendant a Praedictis; semper quando vitium haeret circa Oesicium superius, quod conneclitur Diaphragmati; nam sic saepè Tussis obtinetur alio conneclente & pertinet, ut dum tunc ingruit, conatus tussiendo primo quodammodo, tamen non remittit ante Vomitus aut resolutionem Mucilaginis viscidam. Humida autem Tussis ex stomacho oritur interdum, sed satius ex progressu erratae Diatae, & Digestionis indecunq; facto impedimento, & congesta hinc Mucosa salso, Oesicium vellicante, & mediata ac per consensum Tussim provocante, cum Materie viscidae excretionis ex profundo, & ipsa Aegri hoc facitibus, stomachi regione elevata. Sic LQ-TICHIUS Observat, 244. de Periodica aetate Tussibus ex debilitate Ventriculi refert. Plures sane in Praxi Tussis Humidae vitio stomachi enatae observari solent, quam vitio Pedoris; & quidem dum Oesicium superius graviter vellicatur, simul Diaphragma erinde afficitur, & ad tussendum stimulat; vel dum simul OEophagum vellicatur contiguum illi Alperam Arteriam per consensum afficit, ac in Tussim

procreat. Tussis talis Humida stomachalis rari est per protopthiam, sed ferè semper per denteropthiam. Oritur nempe simpliciter ex vitio vel lesione Membranae Pituitariae posterioris, sive ab Aëre externo inspirato male afficiatur, qua occasione ferè Coryzam canendum sequi solet, sive interdum Lymphae acrioris per Membranam hanc transcolatam, eandem irritant & plus minus excoerant, vitio accidat: talibus enim occasioem per hanc Membranam copiosae Lymphae spissior, & nudaum simul Nutrimetum quidem proximum pederent per OEophagum in stomachum destilat, node irritatur huius Oesicium superius, indeque turbatur Digestio prima, & hinc primitus Tussis sicca, hinc gravius cum copiosa Materie viscidae reiectione, imò non raro super veniente Vomitu, nunc Pituira, nunc Alimentorum ingesta. Et quando in Tussi tali, tam incipiente, quam confirmata, Aegri vellicationem quandam circa faucium loca superiora, ubi nempe est Pituitaria Membrana posterior, percutiunt, hinc Aegri tales Materiam saltem ex Capite deluere existant: Dicunt: *se sentire cum super Pulverem cadit*: monstrant locum Sternum, percipiunt tussitionem in faucibus: desinunt per OEophagum descendere inflammationem, & conatus vomendi facit sub Tussi; sed hae oriuntur ex copiosa Lymphae viscida Membranae Pituitariae posterioris delatam ad stomachum, quae hanc Tussim interit.

Tussis est vel $\left\{ \begin{array}{l} \text{ratione Modi, & Excretionis nunc Humida, nunc Sicca,} \\ \text{ratione Causae,} \\ \text{aut a Causa} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Externa Inspirata &c., datque Tussim utriusmodi Pedoralem,} \\ \text{primò Siccam, postmodum inveteratam Humidam.} \\ \text{Interna, dat vel} \end{array} \begin{array}{l} \text{Humidam} \left\{ \begin{array}{l} \text{Pedoralem.} \\ \text{Stomachalem.} \end{array} \right. \\ \text{Siccam.} \end{array}$

DIAGNOSIS.

Tussis Humida per se patet ex copiosa Materie reiectione.

Prohè autem distinguendum venit: an Tussis Humida sit ex Tussione? an ex Stomacho; an Nervis? Differentiosis Signa sunt haec:

1. Irritationis seu titillationis locus, ubi nempe Aegri simulum ad Tussim cogentem primò percipiunt, ac in Larynge, aut Alperam Arteriam, vel Pedore, vel interius circa regionem Scrobiculi Cordis; Nam posterior locus Tussim stomachalem, priores Pedoralem innuunt. Jubeatur Aegri profundius respirare, & enim mox tussire incipiet, & vitium est in Pulmonibus; locus si in stomacho.

2. Respiratio laesa, quae in Tussi Humida Pulmonum vitio est difficilis. Impossibile est, ut Tussis Humida sit vitio Pulmonum, nisi laedatur Respiratio, & non reddatur difficilis. Tussis autem omnis Humida, si est sine laesa Respirazione, non est ex Pulmonibus, sed faucibus: interion tamen etiam in Tussi stomachali inter esse laboriosa, sed ita, ut Aegri tunc regionem stomachi monstrant.

3. Sonitus in tussiendo Locum affectum monstrat: hoc nempe sonit. fons in sonitu Tussis, quot sunt loca, in quibus Materia later; sicut etiam variat pro Materie excretionis natura. Quid si Sonitus non adeo superficialis, sed est quasi ex loco profundo, & ex imo Pedore; it. quando Aegri percipiunt gravem in Praecordia, Tussis explorandus est in stomacho, & tunc simul consequentur Aegri de dolore atrociorum, imò percipiunt ante Tussim ibidem vellicationem quandam, & ita Tussis ex profundo loco hausta etiam indicat affectum stomachum. Ubi verò sonus est quasi superficialis, monstrat affectum Alperam Arteriam; item interdum quicunque ex cavo Thoracis procedit, & quem brevi post sequitur excretio, tunc simpliciter malum haerent in ipsis Pulmonibus & Bronchiis.

Sonit. ex profundo quasi rarus, et rariolus, Pulmones affectos dicit, qualis in Empyematibus cadit; et Symptomata, quatenus vel exicit Pulmones, vel quatenus simul Empyema in Pulmonibus movet.

4. Tussis stomachalis percutitur affligit, ut subinde, praeterit in Infantibus, Vomitus, nunc Materie pituitosae, nunc Alimentorum ingesta super veniente, locus ac in Tussi Pedorali feri solet.

5. Obstantur hoc Antecedentia: si nempe praecesserint Causae laedentes Pulmones aut Alperam Arteriam; vel si praecesserint Causae, quae Stomachum laedere possint, ex illis de loco affecto concludi potest.

6. Adversus quorq; Symptomas consideranda sunt. Nam ubi adstet Apehia, Appetitus prostratus, sensus ho-

machi gravatus, intensior Tussis, vitium est in stomacho; Aegri ipsi digito intento monstrant Locum affectum inter Scrobiculum Cordis, in regione stomachi prope ejus Oesicium simulum, se sentire inquietos conservatum & lenibilibet molestiam ferat rejeclam Materiam ex stomacho per Gulam sensum sentiente atteri; non est improbabile, impetum eum ex succo Rapsani hausto paulo post copiosissime rejeclant mucosa.

Ubi verò exacerbetur, aut continuò affligere solet noctu, aut ubi simul conjuncta est Febricula quasi nocturna; aut alia pathemata Catarrhalia, ratione Lymphae nimis alperae per illam Membranam Pituitariam excretis; aut ubi adjucta signa Phthisica, ostendunt Tussim Pedoralem.

De Tussi ex stomacho orta nullus Praedictorum aliquid habet, praeter LINDANUM in *Materia medica* Med. pag. 331. ac praeterea super Hartmanni Praxis Chymiatricam expressio dicit: *Miki est compertum pluribus Observationibus, perquamque Tussim esse ex ventriculo: ubi autem Materia laesit, ea modo procedat, an Sano dicere possum, qui variatur pro Materia & Locis conditionibus. Si Materia est tenuis, autus est Sucus: si salis & tenuis, & in Ventriculo delitescit, ferientem Tussis est, in qua vix aliquid exegit, licet cum summo tenore tussant. Certum est quod dicit, plerumque Tussis pertinens fore vitio Ventriculo, dum Materia vellicans est in vagis ejusdem circa Oesicium superius.* Hanc LINDANI Sententiam illustri ac notabili Exemplo confirmatam videb. in M. A. N. G. Ann. 6. Obs. 6. pag. 16.

Causam Internam etiam interdum Tussim Siccam inferunt; idque ibidem, quatenus afficiunt vel Alperam Arteriam & Bronchia Pulmonum; vel quatenus afficiunt stomachum & OEophagum: ut talis Tussis Sicca interna inveterata subinde degeneret in Humidam, sicut spissior, ubi de Causa externa, monitum fuit: Et illas Tussis Siccas communiter Praedicti deducunt à Materia nimis tenui, acri, ferola, &c. Tussim verò supra tractatam Humidam uriri dicunt à crassa.

Tussis Pedorali sicca ex affectu Alperae Arteriae & Laryngis oritur, imprimis à vitio Lymphae, nautateller obliterata dicta loca: Haec enim ex vitio Catarrhali & sterit praeternaturaliter acrior, salio-acidior, sive praevia ostensa occasione, sive proprio Naturae motu Lympha ita alterata, insignem Tussim inferre solet, quatenus per Glandulas circa Fances, item circa Laryngem & Cartilagineas Alperae Arteriae sitas, & ad internorum huius tunicam effusa, continuò vellicat Laryngem, Alperam Arteriam in se admodum scissilem, & Pulmones nimis vellicat, & ad Tussim talem, Glandularumque, successivè Humidam, provocat; Glandulae enim hae, ut superius monui, pro humectatione Membranae continuò transudant Lympham pro faciliiori formatione Vocis.

Tussis

Tuffis talis, quæ in specie *Catarrhalis* dicitur, potissimum affligit tempore vespertino & nocturno usque ad medium noctem, i. e. solet vesare. Egrotis tempore nocturno à 7. et 8. usque ad 4. horas, tempore diurno quasi silet; imò concurrens sæpe Febricula quædam levis plus minus intensus, in quæ Agri interdum satis commode se habent; à meridie autem & apparente vespera vagis horripilationibus vexantur, quas ingruente nocte infrequentius mitis totius Corporis, non tamen adeo intensus, sed plus minus moderatus, præsertim Capitis, & hinc reliqui Corporis, donec reverente Aurora Febricula denot cesset. Hinc etiam non raro accidit, ut etiam sub æstu illo febrili, Artuum lincinationes & dolores vagi non assigant, ex Lymphæ acido sapore, partes nervosæ vellacant, orinandi. Hinc iudicium præstare certum est, febrem vitiis Lymphæ, vel acidi vel salis, uti suo loco habebimus: Nam Febris ad junctam, vespertino tempore moderate & epidemicè affligens, interdum ad Febras Catarrhalis Lymphaticas lentas vitis Lymphæ naturæ, pertinet.

Tuffis talis Catarrhalis originem ducit ex Lymphæ vel salidioris, quæ uti in Massa languinis Febrim talem plus minus lentam excitat, & sub Cute Pusillam, i. e. Laryngem & Alperam Arteriam irritando, Tuffim siccam infert. Non rarum tamen est, Tuffim talem siccam nocturnam etiam sine Febre affligere, pariter ex Catarrhali vitio Lymphæ oriundam. Idem Catarrhis deprenibus à Capite tribuant Auctores eam; sed post HELMONTIUM *Traët. Catarrh. deliramenta*, imprimis SCHNEIDERUS de Catarrhis caliginem excussit: Hic enim in eo estensus, ut dicat: excrementa tuffidum rejeta in Toffi tali Catarrhis tributa, tam sicca, quam, quæ successivè supervenit, Humida, transudare ex Sanguine per Tunicas, quas vocat Pituitarias, seu colatorias. Verùm rectius STENO observavit, quod post has Tunicas, committitur Pituitarias Schneideri ac alias similes, per quas serosa Materie fit transcolatio, sitæ sunt corporis Glauclæ, quarum orificia huc in istas Tunicas Pituitarias, & ita Lympham in illas cavitates effundat: ad hoc, dum dicit SCHNEIDERUS, in Coryza transudare Mucum per Tunicam seu Membranam Pituitariam superiorem, interne Nares succingentem; in Tuffi vero transudare mucosâ rejectione per Membranam seu Tunicam, Alperam Arteriam invellentem etc., potius quam STENONE dicendum, sub his Tonicis latitare Glauclæ, suam Lympham per illas eascentes. Hæc obiter.

Quando ergo illa Lymphæ est præternaturaliter acrior, salior, acridior, aliore simili plus minus corrosivo sapore imprægnata, non potest non fieri Tuffis, quia vellatur Alpera Arteria. Salis fit Lymphæ ex concursu acidi & urinosi, uti ex Pathologia, patet.

Ad has Tuffes ex Lymphæ vitio genitas pertinet etiam Tuffis, quæ præcedit Variolas & Morbillos, idem Sicca & admodum molesta, necnon ea, si Variola Pulmonem & Alperam Arteriam obident, cujus exemplum habet L. OTHIUS in *Observat. pag. 143*; item quæ Infantibus ea male curata Scabie, aut ea Tinea Capitis, aut Achoribus quavis modo repulis, nascitur. Hæc ritè tractatè curari possunt, ut non hant Humidæ; si minus, Tuffis etiam Humida supervenit, ex supradictis rationibus; imò & Phthisis Variolis successivè secuta observata fuit. Facit etiam hæc Phthisicorum incipientium & Scorbuticorum Toffis Sicca, eaque admodum laboriosa; & quæ vulgò à Destillatione Capitis orti dicitur, etiam ab hac origine docet, quando nempe ex Lymphæ acrioris, maxime acidi, sudore per Glauclæ, confusis circa Laryngem & annulos Alperæ Arterię, inundant Pulmones: præcedente tempore ex dictis causa Tuffis fit Humida diu & usque cum difficili anhælia; & dum Pulmones excoarctantur, ac procedente ulteriori malo, evulceratur Alpera Arteria, ut Phthisis perfecta Pulmonalis eam inlequit solet, dum primò ex notissimo vitio Mucus, ulterius ex procedente corruptione Materie purulenta, tandem in perfecta evulceratione Pus geminum, tuffendo excoarctatur.

Radia mali, unde talis Lymphæ vitiosa generatur, Tuffim talem Catarrhalem, præsertim nocturnam inferens, est in Ventrículo; errata nempe Digestionis ejus, & hinc deficientis in Ictericis ejusdem perfectio; quibus in locis Chylus vitiosus salis, aut acido-salis genitus, sui talem, mediante Lymphæ varietate, ac speciem, quavis occasione coarctatur, Pulmonibus afficit. Ratio, quare Tuffes tales vespertino ac nocturno tempore magis exasperentur, adhuc intricata est. Universale aliis est, quod Morbi à Seri ac Lymphæ vitiis oriendi his temporibus magis exacerbari soleant, ad quod ipsam non parum videtur conferre

prohibita plus minus Transpiratio insensibilis, vespere ex remissione tempore diurno minor copia procedens. Observata etiam fuit Tuffis sicca vitio Pulmonum, quando vane Caleuli, vane Excrementis, aliisque in Bronchiis Pulmonum Tuffim inferunt. Resert SCHENCKIUS in t. 2. *Observat.* Tuffim siccam admodum diuturnam ex irritatione continua capitis Laryngis, propter Calculos in Tonsillis genitos, qui irritando dederunt Tuffim.

Quod si verò Causæ Stomachi & Oesophagi interne inferrant Tuffim siccam, vocari ultimum solet *Tuffis Farina* in qua gravissimè, etiam continuè & interruptè vicibus, tuffant: si incipient tuffere, via remittere solent. Oriuntur ex Materia salia acri, præsertim tenui & subili, raro crassa, pertinacissimè Stomachi Oesophagi superius vellacant, istudque rodente: nihil hic excernitur, interdum etiam tantopere urget, ut pertinaci Tuffi, & concussione Stomachi Vomitus sequatur, & facile Partem afflictam præter dicta, situs profundus, locum irritationis in Tuffi, & supra allegata declarat. In specie Infantum Tuffis quæcumque, si non à Causa externa, semper fundamentum in Stomacho habet, five Humida five sicca, post Vomitus cessat, Respiratione libere, nihil ejicitur Materie: ergo est Causa in Stomacho. Accedit & hoc, quod festinat circa Præcordia & circa Stomachum gravitativè quid, & sic Tuffis præcedit & circa Pulmonibus. Imò habeo jam tale Exemplum: Est hic Jævois, qui aliquando bene inebriatus domum rediens noctu non bene lectus dormivit, & in tantum Ventriculi incidit lacerum, ut percipiat compressione Stomachi, cum Tuffi accipit, i. e. quæ Tuffi præcedit vellacationem in scrobiculo Cordis: unde quando ejicit talia mucosa, sunt ex Stomacho ex vitata digestionis: male, inquit, Gulum esse quasi insarctum mucus, nam dum lex concutitur Stomachus, irritatur Diaphragma, & materia mucosa sensum sensumque sursum vergit, ut Gula quasi insarctus videatur. Quæ etiam pertinet in SCHENCKII *Observat. pag. 137*. Tuffis nova Infantis Loretii grassans, *Quinta dicta*, in qua etiam Ventriculus afflictus fuit. (R.)

Pertinent hæc illæ Tuffes, quæ non rarò in principio Paroxysmorum Febrim Intermissionem una alterare hanc Paroxysmum antecedunt, & font simpliciter ex Irritatione Orificii Stomachi superioris, aut ex motu inchoato Fermenti febrili & motu Humorom, Succi Pancreatici & Bilioli, circa Intestinum Duodenum, à dicto Fermento febrili agitatorum; unde Tuffis per Ventriculi confensum cum Diaphragmate circa Paroxysmorum principium contingere solet: & quidem tales ordinari ferè sunt Hypochondriaci, seu in quibus abscidat acidi in Stomacho. Tales enim Tuffes sunt, quas quidam contrahunt, dum in lectis Aerii liberiore exponunt circa regionem stomachicam, exinde facile fit, ut pertinas Tuffis stomachalis superveniat.

Senes sæpius quodam Tuffi laborant, eaque Pectorali, si vitium est ex Aere externo inspirato; si verò citi talem externam læsionem Senes tuffidore exacerant copia vicidua, & simul conservatur de Dolore plus minus compressivo in scrobiculo Cordis, ordinari vitium Stomachi subest: solet, natum ac subleventur ex defectu Digestionis, præcipue in Senibus.

De Arthriticorum Tuffi res etiam intricata videtur: observavi aliquosque Arthritidis obnoxios, si hæc aliquandà inducias dederit, quod tales facili occasione Tuffim, cumque Humidam, incurant cum sensu molesto circa scrobiculum Cordis, ac difficili plus minus Inspiratione, quæ symptomata superveniret Podagra leviter & quasi sponte evanescent. Reverti stomachalis videtur Tuffis, cum fides Podagrae reverè in stomacho cadit.

Interdum variz Tuffium Differentiæ subinde complicantur, itat ut dispositio Tuffi Humidæ facili superveiat Tuffi Convulsivæ. Si in Femina gravida, aliis epileptici pathematis obnoxia, gravem Tuffim stomachalem patiente, observavi, quod aliquando per plures dies Tuffis huic Humidæ, propter vicissitudinem materię laboriosæ, validissima Convulsio Pectoris superveniret, cum gemituque Asthma Convulsivum, ita ut Agri subinde suffocatio videretur, quod adstantes non flosset pro Catarrhi suffocatio habebant. Sic patitur Tuffis Humida, tam stomachalis, quam Pectoralis, ferè complicari ac simul affligere possunt.

PROGNOSIS.

Prognosis facilis est. Fundamentum ejus ex varietate Causarum efficientium, Subjæctorum patientium, & utriusque adjuncti.

adjuclum Circumstantiarum defumi solet.

Tussis frequens nimis & diuturna non raro ad Hæmoptysin dispoit.

Tussis ferio, tam in Infantibus, quam etiam Adultis, Maribus Heriam, in Prægnantibus Abortum causat.

Tussis Sicca nocturna in iuberdo, quod ebiles habet Pulmones, minuit Phthisin, quatenus ex continua Pulmonum constrictione, & Lymphæ acrioris in coram parenchyma translatione, tandem erosione, & ita Ulcus Pulmonum, & hinc Phthisin, quæ ex Catarrhis oriri putant, infert.

Capiti debilitato admodum nociva est Tussis; uti etiam in, quibus affecti sunt Oculi.

Tusses Senum diuturnæ non maturantur, dicit HIPPOCRATES Sect. 2. Aphor. 40., adeoque difficillimè curantur.

Tussis Hydropi superveniens, malum est: vid. HIPPOCRATES Sect. 6. Aphor. 35.

Tussis à Causa externa nihil habet in recessu, & sine periculo est; quæ vero à Causa interna, sive sit pectoralis sive Stomachalis, Phthisin minatur, ac eandem incipientem offendit.

Scorbaticis frequentiores Tusses sunt suspicæ, ne ex partibus sersatis Phthum contrahant.

Interdum Febribus Ardentibus, imprimis curatis, & in declinatione non rùm purgatis, aut indicatis, supervenit Tussis Humida ex metallis matæ morbosæ concocit: si ique tali casu, si rectè procedat expectoratio, bona est: si nimis, & non in tempore succurrimus Aëro, periculum imminet Phthisos, aut periculosa Althousis.

Tussis omni Humida infertur inæquæ Pulmonum, periculosa est Phthisos metum.

Tussis graviter affligens Phthisicos, ubi subito cessat, signum periculum est.

Tussis Stomachalis Humida Cruditates, Atrophiam, Talem, &c. minatur, ex vitio Chyli, consequentibus plus minus Lympham, tandem etiam Pectoralem infert: quod etiam iuxta modum de Tussis Sicca Stomachali verum deprehenditur.

C U R A.

In Cura attendendum ante omnia, ut Tussis Morbus sit primarius? an vero secundarius? quæ v. g. phthisicorum, Pleuriticorum, &c. Nam hæc primario Morbo habito, vel sponte cessat, aut sedatur. Interdum attenditur Naturæ motus in tali casu, ut promoveatur, si sit parvus, in phthisica v. g. & Purulenta, vel inhibeatur, si sit nimis, ut in Tussis feria cerebrum mani, & ita alterum temperetur.

In hac verò Cura Tussis ex utroque

1. Ane omnia removere ad Causa irritans, seu ad Tussim stimulant; &c.

2. Silenda est vellatio ut irritatio.

Qui duo scopi ut per variare Causam variant, ut plurimum tamen ad remotionem Causam melius Remedium non est, quam Vomitus, qui in quavis Tussis est profectus, in contumaciore verò, præsertim Stomachali, est necessarius, sicut quo Tussis Chronica tunc non potest curari, qui uti convenit in Tussis recenti, ita sine eo Tussim in veteratam curare admodum difficile est. Quæ verò per secundo scopo vellationem sistant, sunt imprimis, uti notum est, Opiata, in specie Appropriata mista.

Alias Materia medica in Tussis tribus sere generalibus Capitibus absolvitur: nempe *deaffiantibus*, *incidentibus*, & *Ballamici Pulveraria*.

Deaffiantia sunt Opiata ac Temperata dulcia, quæ tussim à Mæretia tenui & ferola, & inde ortum irritatoris sensum, sistant, ac remelicans mitigant, & ita Materiam vellatentem ad consentiant moderatam per meliore Expectorationem dispoit; unde ab effectibus *deaffiantia* dicuntur.

Incidentia sunt, quæ in Tussis Humida Mucum glutinosum per meliori Expectorationem dispoit, & attenuant, ac mobiliorum reddunt.

Ballamici Pulveraria, quæ notiam excretionem Bronchiorum, aut Pulmonum, aut Stomachi emendant, ut ulteriores progressus maturæ inhibeantur. Sed cum hæc Methodus sit confusa, & non quæ accommodabilis, meliorem & distinctiorem tradam.

Opiata in omni Tussis recentia, certum est. In horum tamen usum observetur.

Not. I. Quod non conveniant, ubi peccat Materia viscida quia Opiata sistant peccantem Mæretiam, huiusque resolutionem & excretionem sistant, & consequenter eandem

quasi tenacem, Tussimque quasi contumacem reddunt; notum etiam semper conveniant in Tussis Humida, sive in Stomacho sive in Pulmonibus fomes sit: solum quidem hæc Opiata Tusses, sed tantum palliativè, & recedunt, quando fomes superest, nisi præmissis probe Universalibus; tunc enim commode ulterius possunt cum aliis ad remotionem uberioris Materie generationem, Unde speciatim in Tussis Recenti, in Tussis Sicca, eaque imprimis nocturna, item in Tussis à Lymphæ acris salis vel acida conductur, adeoque tunc imprimis, conveniant, quando Prædicti dicant, Tussim oriri ex Mæretia tenui ferola, quæ iocraftida, & ita eja excretio facilitanda sit: pro quo scopo semper usurpant Pilulas de Cynoglossa, quæ ingreditur Opium & Hyoscyamus, sed ingreditur hæc funt nimis crudæ.

His itaque præmissis, Tussis *Pectoralis Sicca à Causa externa* inducitur, qualis Tussis tempore hyberno ex *Aere inclementiori*, vel *sub laboribus Chymicis* accedit, optimè tollitur per Opiata maturè adhibita, sive sit Laudanum opiatum, sive sit Theriaca, sive Symplicium Papaveris c. g.

2. Conf. Tussilag. 3l.

Laud. Opiani gr. ii.

M. pro Bolo: S.

Saccharum visperitum pro una vice.

Capitur biborio ante coenam.

Imprimis si quis latus à frigore hyberno, ut imminet Coryza, maturè potest curari sic:

2. Theriac. 3l.

Ol. dissilatis. Anij.

Succin. aa. gutt. ii.

M. D. S.

Theriaca Catarrhalis pro una vice.

Capitur iuxta formam Boli cum sudore.

Conveniant etiam Pilule de Syrtace Sylyti. Item in Tussis oria à vitio *Aeris æsterni hyberni* ulterius Decodum Radicis Zedoaricæ in Vino, vel Decodum Radicis Helenici in Passulis in Vino Malvarum calidè haustum, & sudor expectetur; sic Tussis evanescit & facili curatur. Alibi non impro facium, dum Juniperi Bacorum M. ii. coquant in Corryza ad consuspensionem tertie partis, & Decodum calidè hauriant, expectato sudore: sic talis Tussis cessat; vid. RIVIERIUS in Praxi: Item Tinctura Bacorum Juniperi MYNSICHTI, in Amment. Chym. Sect. 5, descripta, convenit. Præsertim autem optimè immovent cum Causa externæ, in specie Aeris inclementioris vel hyemalis insulturn, Ballama odorifera ex Oleis distillatis, v. g. Applethica, vel Anisiatum vel Socinaturn, largitur Naribus ultra: item Olea distillata Anij, Macis. Sufficit Succin, Gummi Ammæ, &c. Nam talis largi illatio aerat Aerem introeuntem, ut non Fauces vel Alveum Arteriarum ledat, Certissima hæc est præservatio: hoc modo me præservo ab omni Tussis & Coryza, sed maturè hæc sit. Ubi metuenda Coryza, immittetur HELMONTIUM Tract. de Affm. & Tussis, paromus Sternutatorum ex saccharo & Pulvere Arteriarum ledat, addendo aliquot guttas Olei dissilatis Caryophyllorum. Talis loca Sternutatorum tempore visperito sufficit in Nares; sic tollitur omnis noxa. Furibis in Vini Spiritu maceratas commendat HARTMANNUS ad præservandam Tussim in Praxi Chymica.

Quid si à Mineralibus contraxerit fumis sub laboribus chymicis inspiratis oritur noxa Tussim inferens, optimum est Panis largiter Batyro illitus, aut laborem assumptus, sic acrimonia inspirata obtunditur, & Tussis ac similia præcavetur; sicut etiam post alterationem iam nonnihil indolentiam, Theriaca, & ejus medio provocatus sudor, promptè eam tollunt: in indolentia hæc non, non curatur melius, quam per Pulveraria & quidem Pectoralia, si decoquantur in Cerevisia.

Not. II. Quid si eadem Tussis à Causa externa nata, diu jam fuerit inveterata, ut jam ejusmodi copia mucosa, adeoque reddita Humida, curatur ut reliquæ Tusses Humidæ, præmissis nempe Laxativo, in specie Vomitorio, conveniant Opiata cum silentia; hinc subjungunt, ut sit Tussis Pectoralis, Vulneraria & Appropriata Pectoralia, noxam indolentiam demum corrigentia, & inde Nutrimenti aut Sanguinis in ea factam degenerationem silentia. Vel si Tussis fuerit *Amachialis*, noxa curatur Aromatica Stomachica: v. g. si quis Hyeme contraxit Tussimqueque neglexit, sic Humida, & recedunt viscida in magna copia; dicunt, aerem Catarrhum ipse super Cor exsiccasse: sed falsum est; non est Causa morbi sed Productum morbosum: falsum idem est, quod expectemur Expectationem, sed si inveterata Humida sit, quatenus latius occasionem præbet, ut Nutrimenti vitietur, Vomitus optimus est, sive sit Sicca sive Ho-

Humida, sicut Tussis Chronica tunc non potest sine Vomitu curari. Vespert propinanda sunt Opia, ut caveatur generatio: si sistitur, tunc deinde infuso à Tussi antecedente indulta Appropriata curanda. Si in Pulmonibus pars est affecta, ad eligendam nosam, ne malum recidiver, Vulneraria Pedoralia sunt usurpanda; ubi exsistit in specie Hedera terrestris, Chamaemelum, Veronica, Scabiosa, Helenium, equalque Radix, Tussilago, Lignum Salsifias & similia. Hæc decoquantur in Aqua, vel Cerevisia, in qua melius de Decoctum calidè bibatur bis, vel ter quotidie, sic infuso sistitur, consolidatur, & alia mala superveniencia præcaventur. Si Tussis est inveterata Stomachalis, ubi ob læsionem Membranz Pituitariæ posteriores in Stomacho Mucus copiosus collectus, post Vomitoria, Appropriata Stomachica usurpanda, ut Mencha, Elixir Mentha, Proprietatis, Pedorale compositum Zedoarie, &c.

Not. III. Tussis Humida Pedoralis, quatenus constituit Morbum, curatur Materie crasse vel Cause irritantis evacuatione, adeoque per Incidentia, Attenuantia, Relolventia, atque Expectorantia dicta, interpositis præsertim Vomitorio, vel moderato Purgante, (nam rarius profuit hic Purgantia,) & tandem per Pedoralia & Vulneraria, læsionem in Bronchijs & Pulmonibus obortam tollentia, & ulteriorem progrediunt, aut recidivam faciliorem præcaventia.

Conducunt ergo hic pro Scopo insidendi & expectorandi Succus Raphani recens cum Saccharo Candi, Acum ejusque Radix: item Spiritus Athmaticus, Gummatum, in specie Ammoniacum, & ex eo parata Remedia liquida, & in genere omnia ea, quæ supra in Aethmate Humida, item rursus in inveterata, fuerunt laudata: item Marrubium album ejusque Decoctum, Helenium, Hedera terrestris in Tussi à putrilagine Pulmonum, Myosotis, Zingiber, &c. SCHROEDERUS laudat egregiè Decoctum Calami aromatici, Porri Croci, Radix Ireos Florentinz, Tussilaginæ, Zedoarie, Veronica, Scabiosa, Mentha, Rosmarinus, & modo dictorum Flores, Nicotianæ ejusque Sympus, & Oxyssel Nicotianæ in Tussi ex Lympha crassa; atque ex Melle, Scordii & Heimeni Pulvere paratum Eleosuarium Item Acetum Scilliticum, Oxyssel simplex, & Oxyssel squilliticum compositum, cui incensum Marrubium, Boeris, ejusque Succus & Sympus, Sympus de Erythimo Lobeli, alia dictus Sympus ad Remediandum, Elixir Pedorale Michæalis vel Wedelii cum Spiritu Gummi Ammoniaci, vel Salis Ammoniaci anisato, quæ potenter incident: nam Anisum est singulare Pedorale, ubi est incidenda Materia crassa. Conveniunt etiam Vegetabilium dictorum Conservæ, & sic porro. Vulgo commendatur Aqua Pulmonum Nitium cum Plantis Pedoralibus destillata: sed quo jure i velis, quia Viri Pulmones parvi sicut.

Pro expectorando ergo Mucos, quocunque in loco illi hæreant:

M. Aqu. Hyssopi *℥ij.*
Athmat. Rad. Zvi.
Gumm. Ammon. cum Aceto sol. ℥ij.
Syr. Nicot. Zvi. vel ℥ij.
M. S.

Potio Pedoralis contra Tussim.

Est Mixtura egregiè expectorans. Vel

M. Aqu. Hyssopi
Tussilag. an. ℥ij.
Athmat. ℥℥.
Gumm. Ammon. cum Aceto sol. ℥ij.
Oxyssel. squillit. ℥ij.
Syr. Nicot.

de Erythim. Lobel. an. *℥ij.*

Hyssop.

Tussilag. an. Zvi.

Spir. Nitri dulc. q. l.

M. D. S.

Potio contra Tussim.

Vel

M. Aqu. Hyssopi
Scabios.
Oxyssel. squillit. an. ℥ij.
Syr. Zanth.

Nicot. an. ℥℥.

M. S.

Succus Expectorans pro aliquot viciis.

Vel

M. Aqu. Fœnic.
Hyssop. ad. ℥ij.
Athmat. Zvi. vel ℥ij.

Oxyssel. squillit. ℥ij.

Syr. Nicot. Zvi.

M. D. S.

Potio contra Tussim.

Vel

M. Aqu. Hyssopi *℥ij.*
Veron. ℥ij.
Athmat. ℥℥.

Oxyssel. squillit. ℥ij. ad ℥℥.

Syr. Nicot. Zvi.

M. D. S.

Potio relaxans contra Tussim.

Vel

M. Aqu. Hyssopi *℥ij.*
Veron. ℥ij.
Athmat. ℥℥.

Spir. Sal. Ammon. ℥ij.

Syr. Nicot. ℥ij.

M. D. S. ut supra.

M. Aqu. Hyssopi *℥ij.*

Veron. cum Vitis ℥ij.

Spir. Vitæ Aeri, vel Athmat. ℥ij. ad ℥℥.

Syr. Nicot. ℥ij. ad ℥ij.

M. D. S. ut antea.

Ursupantur cohesivum.

Pro scopo Vulnerario Pedorali convenit Sulphur, ejusque Flores: item Balsamum Sulphuris, quæ sunt nobilissima, live sit, Terebinthinatum, live, quod melius, Anisatum, aut Juniperatum, aut Succinatum. Talis aliquot guttæ, vi. viii. x. ad xii. & xv. semel vel bis in die, in vehiculo calido, vel Ovi vitello, optimè conveniunt ad eluendam nosam Pulmonum, aut cum Balsamo Sulphuris hæc Elzofaccharum: item Bennoel, Antisepticum Pæonii, Antimonium Diaphoreticum, & Vulneraria Pedoralia supra laudata. Prostant etiam hinc inde Pulveres Pedorales, & Pulvis contra Phibidum, qui conveniunt in Tussi ex vitia Lymphæ v. g. Pulvis Pedorale D. Michæalis.

M. Rad. Arl. præp. ℥ij.

Dios. Flor. ℥ij.

Mag. Bennoel. ℥ij.

Flor. Sulph. ℥ij.

Antisept. Pæ. ℥ij.

Sacchar. ℥ij.

M. l. Pulvis.

De quo Dosis à *℥℥.* ad *℥ij.*

Vel

M. Rad. Dios. Flor.

Flor. Sulph. an. ℥ij.

Antimonii diaph. ℥℥.

Laud. opiat. gr. lii.

Elzofacchar. Fœnic. q. l.

M. pro Pulvis Dosis ℥℥. &

Pulvis Pedorale.

Vel

M. Pulvis Pedorale. Mich. vel Ludov. ℥ij.

Antisept. Pæ. vel Antimonii diapher. ℥℥.

Laud. opiat. gr. l.

Elzofacchar. anisat. q. l.

M. F. Pulvis. S. ut antea.

M. Lap. Cæur. præp.

Flor. Sulph. an. ℥℥.

Laud. opiat. gr. l.

Ol. deßill. Anis. gett. l.

M. l. Pulvis.

Pulvis Pedorale contra Tussim.

Vel

M. Raf. Liqui Saffr. ℥ij.

Maceretur in

Aqua fontan. Mens. ii.

Adde

Herb. Heder. terr. vel Veron.

Pulmonar.

Scabios. an. M. l. vel li.

Pastul. min. compus. ℥℥. vel ℥ij.

Sen. Anis.

Fœniculi an. ℥℥.

Coq. invicem ad tertias, in fine Decocti addendo

Rad. Liquirit. raf. ℥ij. vel lii.

Calutana D. S.

Decoctum Pedorale.

Vel

M. Herb. heder. terr.

Veron. an. M. l.

Myrsi.
Marrub.
Palmarum.
Tussilag. an. M. 3.

Flor. Esula.

Stachis. an. P. ii.

Rad. Enal.

Dr. et Flor.

Sem. Cartham. cont. an. 3vi.

Rad. Mithracan. altiss.

Pufful. min. an. 3i.

Incisa & contus. D. S.

Species pectorales.

Ex his in *Aqua decoctis* potest fieri *Decoctum pectorale*: vel possunt coqui cum *Hydromella*, & per *Manicam Hippocratis* aliquoties colari, & usurpari his vel ter in die, pro urgentia affectus, mane haustus calidas, & a meridi hincio ante cenam, & sub intrinseu lecti: S.

Decoctum pectorale.

3i. Herb. ros. Virg.

Heder. terr.

Stachis. an. M. l.

Cherofol. M. 13.

Rad. Ligu. Saffor. 3i.

Coq. in f. q. *Aqu. simpl.* addendo in fine decoctionis

Pufful. min. compans. 3i.

Rad. Rad. Liguir. 3i.

Ebulliant iterum leniter: hinc, dum fervent adhuc, suspende in nodulo *Cannam. alab.* 3iij.

Calatara 3iij.

D. S.

Decoctum pectorale.

Vir juvenis Tussi Humida Pectorali gravissima laborabat, ipso *Aegro* alais *Scorbuto* existente, contrahe ex inclementia Aeris externa, Morbus jam aliquandiu duraverat cum Tussi crebra, Materie viscidæ copiose reiectione, itant jam in *Hum* esset, *Ager* proitus decumbebat, uerat simul Palus febrilis, Sador contumax, Respiratio nonnulli difficultas, Dolores Spine dorii urentes, Uris paucissima, recurrent interdum Lipethymus, praesentium si Exsiccato nonnulli cessaret, Philogios vagæ, & subinde recurrentes Anxietates, Dolores lancinantes in artubus post Tussim, &c. Mala hec omnia ex Lymphæ confluence præternaturali oriebantur, quæ vitioso sapore scorbutico acido infecta omnia illa symptomata, praesentem irritando Aiperant arteriam & Pulmones, tussim, ex Pancreato verò effusa, & effervescendo in prima viis cum cæteris contentis, Philogios, Anxietates, &c. insubacbat. Vocatus die Solis pro Tussi, cum maximo urgente, praescribo Expectorationis gratia:

3i. Aqu. Fœnicul.

Hyssop. an. 3iij.

Athanas.

Syr. Nect. an. 3vi.

Oxymel. squillit. 3i.

Mile.

Capiebat cochlearin.

Pro cæteris Symptomata vagis, ex radice scorbuti natis, tollendis praescripi:

3i. Spir. Cermis. de tribus 3iij.

Dosis 40. gutt. quotiescumque libuerit aut symptomata urgeant. Usum hujus Spiritus multum laudavit: Potione vero ista multa expectoravit.

Die Lunæ pro Expectoratione continuanda Succum *Raphani* recentis expressum, cum Saccharo temperatum, crebrius haustibus jussit, & sumptum istum continuare.

Die Martis, cum Mucus cum Productum morbosum maximam partem esset evacuatus, & nonnulli difficillima poci Muci heret reiectio, Tussis verò continuaretur, eoque ob imane conatum doloris Praecordis, ad infusionem irritantem tollendam praescripi:

3i. Aqu. Fœnicul. 3iij.

Athanas. 3vi.

Syr. Diacod. Mont. 3iij.

Mile.

Crebrius accipit, praesentem quando Tussis laboriosior urgebat, hinc bene dormivit, multumque laudavit remedium hocce.

Die Mercurii interdia Spiritum Carminativum; vespere verò & noctu, quantum supererat de Potinacula, capere jussit.

Die Jovis, cum multum colesset, parum rejiceret, non gravis fuisset: pro Lymphæ coarctata, & irritationis praeterea.

Tom. II.

tium Spirituum lenitione:

3i. Spir. Sal. Ammon. anis. 3iij.

Essent. Opii 3i.

Mile.

Affluens ter de die dos 40. guttas, mane, circa vesperam, & tempore ingruentis somni: primus quidem acrior Spiritus Fances ledere vias fuit, postmodum verò usu continuato admodum profuit, Tussim instantem inane mox remittendo, Humidam verò in expectorandum promovendo, & tuos misimè laboriosam reddendo: unde aliquandiu continuato hoc Spiritu convalescit. Sed cum praematurè Frigori externo drouo se expulisset, adeoque Recidivam periculofam paucereat, optime contulit sequens Potio:

3i. Aqu. Stachis. 3iij.

Athanas. 3vi.

Lep. Cæter. prepar. 3iij.

Essent. Sulph. 3i.

Syr. Diacod. Mont. 3iij.

Mile.

Quæ Potio mutatis mutandis egregiè, praesentem vespere & noctu, profuit, eumque reliquit.

Tussis Humida Stomachali, ex humida viscidâ Materia orta, curatur, praemixto Artemisano & Vomitorio, Aromaticis nonnulli temperatis Stomachicis, reliquis Materie peccantis incidentibus, attenuantibus & resolventibus, & stomachi tonum restaurantibus. Pro purgationis scopo Vomitoria Antimonialis equidem nota sunt, quæ nunc per so Evacuationis scopi usurpantur, aunc supra dictis Portionibus in minuta dosi adduntur, pro promovenda Expectoratione. Similè cellor, quod ex usu Vomitoriorum se minimè novum observaverim. Pro scopo purgandi per inferiora convenit Massa Pilularum de Hiera cum Agarico, vel Extractum eius, addito Gummi Ammoniac in Aceto soluto, quod resolvit Mucum, ut edemelia possit evacuari, adjuvatum cum Extracto Throchilorum Albani: c. g.

3i. Mass. Pilul. de Hiera cum Agar. gr. xii. ad xv.

Gum. Ammon. Aceto sol. 3iij.

Extr. Trach. alband. gr. i. vel ii.

Ol. dissolut. Anis. gutt. ii.

Cum Essent. Gummi. Ammon. F. Nilot. S.

Pilulæ purgantes pro pectore & stomacho.

Similibus pilulis serinam tussim a pinguis Vaporibus, in Muliere aliquando coravi. Vel

3i. Mass. Pilul. de Ammoniac. Querc. gr. xv.

Hier. cum Agar. gr. viij.

Extr. Agar. gr. v.

Soll. Sulph. anis. gutt. ii.

Cum Essent. Gum. Ammon. L. Nilot, usurpandæ imprimis in Tussi ex Materia crassa & viscidâ, post Febres acutas non raro obvenientes: S.

Pilulæ pectorales & stomachales.

Quia etiam his ipsi Mercurius dulcis commodè potest addi, quem usurpat RIVERIUS cum Diagrido: vid. *Crit.* 3. Observ. 31.

Vulgè pro scopo Purgationis usurpant Agaricum in Infuso ad 3iij. cum Oxymelne, sed ignavum est simplex. Potius Extractum ejus cum aliis. Quidam Semen Carthami ab 3iij. ad 3vi. infundunt: aut etiam ea hoc semine à 3iij. ad 3iij. elegans Emulso purgans fieri possit.

Opiata ac humilia in Tussi Humida, ubi Expectatione opus, non conveniunt: excretionem enim impediunt, & hinc materiam evacuandam crassiores ac viscidiores reddunt. In hoc tamen, ubi maximam partem evacuata est Mucilago, & crebrior Tussis inanis & repetens, anapneum aliquid ejiciatur, superest, in talibus ad vestigia Inflammationis irritantis delenda, commodè cum aliis Papaverina usurpari possunt, ut nempe his omnia irritatio ex crebrior frustanea tussis suspendatur; interea verò Materia expectoranda praeparetur, ut minori labore excremetur: v. g.

3i. Aqu. Stachis. uncij. i.

Athanas. dr. vi.

Flor. Sulph. 3i. ad dr. 3.

Syr. Diacod. Mont. 3iij.

M. S.

Potio contra tussim.

Pro incidenda Materia viscidâ & crassa, praeter ea, quæ supra de asthma ex stomacho oriendo dicta sunt, imprimis conducit haec potio admodum experta:

3i. Aqu. hyssop.

Tussilag. an. 3iij.

Athanas. 3vi.

Oxymel. squillit. 3i. vel dr. vi.

Syr. de hyssop.

F f

Nile.

Nict. an. 3vi.

M. D. S.

Mistura contra Tussim pro aliquot vicibus.

Addi etiam potest pro molliori incisione & faciliore rejectione spiritus Nicti dulcis, aut salis dulcis q. pl. pro grata aciditate. Hæc mixtura subinde coactilem sumptu expectorat egregie. Vel

℞. Aqu. hyssop.

Tussilag. an. 3ii.

Ablumac. 3℞.

Gumm. Ammon. cum aceto squillit. sol. 3ii.

Oxy mell. squillit. 3i.

Syr. Almon.

Tussilag.

de hyssop.

Eryf. Labell. an. 3ii.

Spir. Nicti, vel sal. dulc. q. l.

M. S.

Succus contra Tussim pro aliquot vicibus.

Vel

℞. Aqu. hyssop.

Mentha an. 3i. vel 3℞.

Ablumac. 3ii. vel 3vi.

Cinnam.

Oxy mell. squillit. an. 3℞. vel 3i.

Gumm. Ammon. cum aceto squillit. sol. 3ii.

Spir. ablutat. vel salis dulc. q. l. pro grato sapore.

M. S. ut nec.

Elisir Peccorale D. Melchioris cum spiritus Ablumacico mixtum, uti in Ablumacico, ita in Tussi à Bomacho, notum est, quod sit egregium: e. g.

℞. Elisir. Peccor. Melch. vel Propr. 3℞.

Spir. Gumm. Ammon. 3i.

M. S.

Elisir Peccorale contra Tussim: 40. guttas.

Item

℞. Rad. Art. ascer. non prop. 3i.

Spir. Dia. 3vi.

Rex. Rad. Helenii, vel Zedoar. 3℞. ad 3℞.

Cum Sacch. in Ag. Favis. vel Menth. vel Scabios. sol. q. l. fiant Rotule, adpergendæ cum Ol. de illat. Spic. S. Rotule contra Tussim.

Vel

℞. Rad. Art. non prop. 3℞.

Gumm. Ammon. in aceto, sol.

Maslich. elat. an. 3i.

Tartari vitriolat. 3℞.

Cum f. q. Sacch. in aqu. Menth. sol. F. Rotule.

D. S.

Rotule Peccorales contra Tussim.

Admuerandum hæc Mulierum Euphorion, quod est:

℞. Sacri Raphan. express. q. pl.

adde

Sacchari Cand. parum.

Mirabiliter resolvit in peccore & Bomacho, atque expectorat.

Pro altero scopo, Bomacho nempe Appropriata, sunt Elisir Bomachale, Elisir proprietatis, quod cum & sine acido in Vino Emulato usurpatum, egregie commendatur. Elisir quidem cum acido in principio videtur exasperare Tussim verum, modo continuatur ad tempus, neminem spe sua frustrabit. Egregie etiam à STOECHEO commendatur Decodum Zedoarie cum Vino paratum. Elisir Menthe aciculatum cum Spiritu sulphuris, Tinctura Tartari acris; vel sola vel cum Spiritu salis Ammoniaci simpliciter aut anilato, Malvaticum Juniperinum, & Elisir & Extradum Helenii, quod est peccorale & Bomachale: item Elisir Croci, & Chocolata, compositum illud esotium in tali Tussi aliquando Liquorem Terræ foliatæ Tartari, item Tincturam Vitrioli Martis Zuvelferi pro debita rugarum eius expansione, proficua observavi. Conveit etiam premixtis præmittendis, tam in Tussi peccorali, quam Bomachali humida, uti etiam suo modo secæ, Eleduarium, quod sit ex

Mach. Scord. M. ii.

Ealy. M. i.

Flor. sulph. dr. iij.

Hæc omnia subtilissimè pulverisita; vel sola, vel addito Laudano opiato, cum syrupo Diacod. excepta, subinde deglutiantur ad silendas tales Tusses.

D. S.

Eleduarium peccorale.

Not. IV. Quid si sit Tussis secæ nocturna Peccoralis, adeoque Catarrhalis, sive à Lymphæ vitio orta, que vel/salsæ aut per Glandulas ad Alveum Arteriam in Larynge & Bronchiis exiunt, vel acida, que sæpe, si inveterata, conjuncta cum Febre Catarrhalis: Talis curatur & præservatur, aut præmissis aut omnia Vomitorio, per volatilia sudorifera, Opiatis missa, vel per imprimis assumenda, interdum sudorem imperando, quem Lymphæ vitium catarrhale corrigit, blande discutit, & vellacitas irritationem sustinet: v. g. spiritus salis ammoniaci simplex vel anilatus, Liquor Cornu Cervi succinatus, à gutt. 40. ad 50. & alia, quæ Lymphæ vitium corrigit & tale sistunt, quibus adjungenda Elisiria Opii, vel alia Opata & papaverina, quæ mirè talem Tussim sedant, & præsertim conducunt, si Febri Catarrhalis juncta fuerit: Unde & Veteres Philonium contra talem Tussim, item Syrupum Diacodion, ad fuerunt. Nobis verò Opata imprimis sunt in usu, eaque permixta imprimis talibus, quæ acrimoniæ Lymphæ salum uti acida temperare, corrigere, ac mitigare possunt: v. g.

℞. Spir. salis Ammon. anst. dr. iij. ad dr. ii.

Elyent. Opi dr. 3.

M. S.

Spiritus peccoralis: 40. vel 50. guttas pro una vice, sumatur bhorio ante cenam, & si opus, ante introitum lecti. Vel istis premixtis Appropriata Peccoralis, imprimis Balsamica olea sulphurea, Lympham corrigentia, & notam partis eluentia, usurpentur, quæ etiam interdum sola sufficiunt: v. g. Flores sulphuris, qui jam à CELSO contra Tussim peccoralem à Lymphæ acris sunt commendatum Remedium, ut eorum 3i. liquoris mane in Ovo sorbili accipitur: conf. Theophrastus RULANDI p. 109. Spexat liquidus; Benzoe, & Flores Benzoes in Ovo sorbili, sperma Ceti, Oleum de stillat. Anili, Periculi cum saccharo, Balsamum sulphuris anilatum; Tinctura sulphuris, quam habet WILLISIIUS in pharmac. ration. P. 2. p. 113. E. g.

℞. Tinctur. sulph. dr. ii.

Elyent. Opi dr. 3.

M. D. S.

Essentia peccoralis.

Dentur pro dosi 40. vel 50. guttas, bhorio ante cenam, & si opus ante introitum lecti usurpandæ.

℞. Spir. salis Ammon. succia.

Tinctur. sulphur. an. dr. i.

Elyent. Opi dr. 3.

M. D. S.

Essentia peccoralis contra Tussim.

Dratur 30. vel 40. guttas pro dosi.

℞. Aqu. scabios. unc. ii.

Flor. Papav. errat. unc. iij.

Tinctur. sulph. WILK. dr. iij.

Syr. Diacod. Mont. unc. iij.

M. D. S.

Succus contra Tussim.

Vel

℞. Aqu. scabios. unc. ii.

Menth. unc. i.

Spir. salis Ammon. anst. dr. iij.

Spir. Nict. unc. i.

M. S.

Mistura Peccoralis.

Conveniant item Succinata omnia, Myrrhata, & reliqua, que vulgè Interasiantia, seu propriè tenuem & acrem Lympham temperantia appellatur, v. g. Lac, Violæ, Glycyrrhiza, Jubaræ, Passiole, Radix Iroos Florentina, Helenii, borumque Decodum, & Herba Veronica, Scabiosa, item Valneraria peccorala, ut Veronica, Hedera terrestris, &c. Syrupus de Jubaris, Rosarum, Scabiosæ, Loch passulorum, Decodum Raparum, quod est egregium, & ex hoc Decodo paratus Syrupus, qui egregius est in Tussi inveterata. Hordeta etiam sunt in usu, ubi est Lymphæ acida & salsa, quam temperant: hinc BORELLUS Casar. 4. Olyf. 39. refert de Tussi, Macie & Agropyria, Hordetorum vis curatis: item Caricæ cum Spiritu Vini compozæ, species Diuresis affatæ, Pulveres Peccorales variis, semen Papaveris, Syrupus Papaveris, Amygdalæ dulces, & pilule de Cynoglossa; loco quorum Moderni usurpant Laudanum opiatum, mixtum imprimis cum spermate Ceti, item cum Succino; vel, quæ meliores, Pilule de Syrace, &

& ad Tussim Schröderi, quarum Descriptiones videbiles in
eius Pharm. lib. 2. cap. 73. Num. 6. & 7. pag. 252. Admodum
elegantia sunt Pulvis de Styace Syphi in Tussi Sicca nocturna
citra Febrem, ad temperandam Lympham salis & aci-
dam optime, quas recte dicit, posse subditi Pulvis de cy-
nogliffa. Compositum est succinea & descripta in Praxi lib.
1. cap. 30. pag. 184.

℞. Syr. calami.

Succ. Liquirit. solut. & infus. seu Extracti
Liquirit.

Olibani,

Myrris,

Opii Thebaici, extra. seu Laud. opiat. an. 3℔.

Croc. Oritani, ʒi.

Cum ℥. q. Syr. Papav. alb. F. Mass. Pilul.

Obseruetur hic de Succo Glycyrrhizae, quod sepius solet
adulterari, idque variis quilibet ac pulveribus pro ponde-
ris augmento: unde dum propinquas Succus Glycyrrhizae
pro temperanda Lymphas acida vel salis, malum aggravat
malum: reperitur in 3℔. Succu Glycyrrhizae una alteravo
drachma quilibetiarum. Ubi ergo volumus esse cauti, præ-
scribimus Succum Glycyrrhizae Hispanicae; cuius defectu
℞. Succ. Glycyrrh. in Aqua Myrti solutus, qui filtratur &
inspissatur. Dum enim solum purum filtratur, quilibet remaneat,
& sic habemus succum purum & gratum. Verum in inspissi-
ficatione exactus observetur ignis gradus: ubi enim vel levis
excedit, sic succus amaricans & empyreuma contrahit, quod
etiam est nocivum. Vel

℞. Extr. Sulp. suberis, gr. xii.

Croc. gr. ii.

Myrr. elect. gr. iv.

Laud. opiat. gr. i.

Cum Essent. Succi. F. Pilula. S.

Pilula vesperinae contra Tussim.

Vel

℞. Succi. prepar. 3℔.

Myrrh. elect.

Sol. vol. Succi. an. gr. v.

Extr. Croci gr. ii. vel iv.

Laud. opiat. gr. i. vel ii.

Ol. deffillat. Succi. gutt. ii.

Cum Essent. Opii, vel Ligu. Sassafr. vel Succi. L. Pilula,
biuario autem censum sumenda.

D. S. ut supra

Quod si Pilula sit molesta, loco earum habet Rotulas
has SYLVIVS loco citato nam & ipsum Saccharum in tali
Tussi convenit.

℞. Sem. Myrsinani alb.

Papav. alb. an. 3℔.

Thuris,

Myrrh. rub. 3℔.

Croc. op. 3℔.

Succ. Liquirit. infus. 3℔.

Succ. Alb. fass. cum Mucilag. Alth. 3℔.

Cum Tragac. in Aqua Ros. distil. 3℔.

M. & Rotula exigua.

Harum unam subinde jo ore detineant Aegri, ac sensim
deglutiant: quod si aliquid de Laudano opiato admisceatur,
esset eo melius. Vel

℞. Spec. Diatr. simpl.

Trag. fr. 3℔.

Flor. Sulp. 3℔.

Extr. Croci gr. v.

Cum ℥. q. Sacch. in Emulsi. Semina. Papav. alb. solut. F. Ro-
tula, adspargenda aliquot guttulis Ol. deffillat. Anisi.

D. S.

Rotulae Pectorales contra Tussim.

Vel

℞. Spec. Diatr. alb. 3℔.

Flor. Sulp. 3℔.

Laud. opiat. gr. iv. vel v.

Cum Sacch. in Aqua Scabif. solut. F. Rotula.

D. S.

Rotulae contra Tussim.

Quae crebrius sumenda.

℞. Flor. Sulp. 3℔.

Benicari,

Succi. prepar. an. 3℔.

Thuris,

Cumini. Arab. an. 3℔.

Extr. Croci 3℔.

Laud. opiat. gr. iii.

Cum Sacch. in Aqua Ponic. sol. 3℔. F. Rotula, adspec-

Tom. II.

gendum cum Ol. deffillat. Anisi. S.

Rotulae Catarrhales.

Vel

℞. Flor. Sulp. p. iii. vel iv.

Spec. Diatr. p. i.

Cum ℥. q. Sacchar. F. Rotula.

D. S.

Rotulae Pectorales contra Tussim.

Vel

℞. Spec. Diatr. simpl. 3℔.

Bot. Armen. prepar. 3℔.

Succ. Liquirit. depur. 3℔.

Cum 3℔. vel iv. Sacchar. in Aqua. Flor. Papav. errat.

solut. F. Rotula.

D. S. ut antea.

℞. Spec. Diatr. f.

Tragac. an. 3℔.

Flor. Sulp. 3℔.

Extr. Liquirit. 3℔.

Laud. opiat. gr. v.

Cum ℥. q. Sacch. in Aqua Scabif. solut. F. Rotula vel cum

Mucilag. Trag. F. Trochisci.

D. S.

Trochisci contra Tussim.

Vel

℞. Extr. Liquirit. 3℔.

Sol. Rad. Iros Flor. 3℔.

Sacch. alioq. 3℔.

Cum ℥. q. Mucilag. Tragac. in Aqua. Form. sol. formen-

tur Trochisci: S. ut antea.

℞. Conf. Flor. Zaul.

Myop. an. 3℔.

Spec. Diatr. simpl. 3℔.

Antib. Peter.

Flor. Sulp. an. 3℔.

Benicari 3℔.

Cum ℥. q. Sacch. in Aqua. Myop. sol. F. Morfali: S.

Morfali Pectorales.

Vel

℞. Conser. flor. Anthur.

Beroni.

Calend. an. 3℔.

Succi. prepar. 3℔.

Myrrh. elect. 3℔.

Benicari,

Thuris an. 3℔.

Cum Sacch. in Aqua. Serpili. sol. F. Morfali, irrorandi cum

Ol. deffill. succini: S. ut antea.

Vel fiat Pulvis temperam seu incrassans.

℞. Rad. Iros flor. 3℔.

Flor. Sulp. 3℔.

Ol. deffill. Anisi, 3℔. ad 3℔.

Fructus gutt. xii. ad xv.

Sacch. op. 3℔.

M. D. S.

Pulvis Pectoralis.

Dosis 3℔. detur bis in die; & convales, si lapsio est in Pe-

lore.

℞. Spec. Diatr. alb. 3℔.

Flor. Sulp. 3℔.

Laud. opiat. gr. iii.

M. & Pul. pro tribus dosibus: D. S.

Pulvis Pectoralis pro tribus dosibus.

Vel

℞. Flor. Sulp. 3℔.

Rad. Anod. Laud. gr. iv.

M. D. S.

Pulvis vesper sumendus pro Catarrhis.

Vel

℞. Pulv. Præparat. Laud. gr. xiv. ad 3℔.

Laud. opiat. gr. i.

M. & Pul. pro una dos.

D. S.

ut antea.

Ad Tussim difficilem noctu tantum per quatuor vel quin-
que horas assigmentem, cum Febre Catarrhali & Coryza,
præmissis Universalibus ad temperandum Serum acre.

℞. Sperm. Croci gr. xiv. vel 3℔.

Laud. opiat. gr. iii.

M. & divid. in 2. part. aequal.

Una pars hora pomeridiana quinta, altera pars hora de-
cima vespertina sumebatur, & optime proficit.

℞. Sperm. Croci 3℔.

Succi. prepar. 3℔. vel 3℔.

Myrrh. elect. gr. viii. ad 3℔.

℞.

Laud.

Leod. opiat. gr. iv.

M. f. Pulvis.

Dividatur in 3. vel 4. part. equal.

D. S.

Pulvis Pectoralis.

Capiatur mane & vespri, biborio ante vel post cenam

Vel

℞. Spem. Cer. ℥i.

Flor. Benz. ℥i.

Myrrha.

Sal. volat. Sarcin. (est egregium in omnibus vitiis Lymphæ, quoniam blandè temperat & eam movet) *an. ℥ss.*

Leod. opiat. gr. iv.

Misc. f. Pulvis.

Divide in 3. vel 4. part. equal.

D. S.

Pulvis vespertinus.

Capiat Ager unam partem iturus cubitem.

Vel

℞. Spem. Cer. ℥i.

Flor. Benz. ℥i.

Leod. opiat. Lang. gr. lii.

Ol. dehill. Succin. gutt. ij.

Misc. pro tribus dosibus:

D. S.

Pulvis Catarrhalis.

Assumatur vespri ante cenam.

℞. Flor. Sulph. ℥i.

Benz. ℥ss.

Leod. opiat. gr. ii.

M. f. Pulvis capiendus biborio ante cenam;

D. S.

Pulvis vespertinus.

Vel

℞. Capill. Camer. prepar. ℥i.

Sarcin. prepar. ℥i.

Anticoll. Pot. ℥ss.

Cinnab. Animom. ℥i.

Leod. formen. gr. iv.

M. f. Pulvis.

Dividatur in 4. part. equal.

D. S.

Pulvis contra Tussim & Catarrhum.

Vel

℞. Spem. Diacord. simpl.

Flor. Sulph. an. ℥i.

Anticoll. Pot. ℥ss.

M. f. Pulv. ubi materia tenuis salsa usurpandus.

D. S.

Pulvis Pectoralis & Catarrhalis pro aliquot vicibus

Vel

℞. Conserv. Rosar. rub. ℥i.

Anticoll. Pot. ℥ss.

Flor. Sulph.

Spem. Diacord. an. ℥i.

Cum Syr. Diacod. f. Electuarium;

D. S.

Electuarium Pectorale Catarrhum temperans.

Faciunt hoc Electuacchara, maxime ex Oleo Succini, quæ in talibus sunt nobilissima. Syrupus Diacodian Montani, & Syrupus scabiosæ, vel missi, vel cum Rob. Psalliarum subacti, cum baculo Liquiritiæ assumpti, & ita pedestem depluti, etiam hic egregium sunt Remedium, omnibus Loch inersantibus & expectorantibus præterendi.

Hæc conveniunt ad temperandum Lympham falsam. Verum cum admodum imprimis solent esse *Febris Catarrhalis*, ab eadem Lymphæ acrimonia nata, ad hæc simul respiciendum est. In Tussi ergo Sicca cum Febre Catarrhalis:

℞. Aq. Scabios. ℥iij. vel iv.

Affumat. ℥ss.

Liq. Cora. Ceru. farric. vel Spem. Sal. Amm. anif. ℥i. ad ℥iij.

Syr. Diacod. Mont. vel Papav. alb. ℥vi. ad ℥x.

M. D. S.

Potio contra Tussim & Catarrhum.

Capiatur imminente Paroxysmo, & post mediæ noctem, expectando blandum Sudorem.

Vel

℞. Aq. Scabios.

Serpill. an. ℥iij.

Spem. Salis Ammon. anif. ℥iij.

Liq. Cora. Ceru. farric. ℥i.

Syr. Papav. simpl. ℥i.

M. pro tribus dosibus in Tussi Sicca Catarrhalis.

D. S.

Potio Pectoralis pro duabus vicibus.

Aliis ad temperandum Lympham falsam & acidam præprimis Opiata ac Papaverina, & dicta ex Spermate Ceti & Succino conveniunt, imprimis Gummatæ macilaginosa, qualia sunt Tragacanthum, item Gummi Arabicum: Radices etiam subdulces, imprimis Glycyrrhiæ, Althææ, Heleni, & similes: c. g.

℞. Spem. Diacord. ℥iij.

Pot. Rad. Alth.

Succ. Liquirit. an. ℥i.

Leod. opiat. gr. vi.

M. f. Pulvis. S.

Temperans Pulvis Pectoralis.

Vel

℞. Aq. Scabios.

Loch seni & exopri ℥iij.

Spem. Diacord. simpl. ℥iij.

Succin. prepar. ℥i.

Syr. Diacod. Mont.

de Jussu an. ℥i.

M. D. S.

Leniens Succus Pectoralis.

Item

℞. Aq. Froie. vel Scabios. ℥iij.

Affumat. ℥vi.

Syr. Diacod. ℥ss.

M. D. S.

Leniens Potio Pectoralis.

Vel

℞. Aq. Flor. Papav. arv. ℥i.

Syr. Papav. simpl.

de Jussu an. ℥ss.

M. pro duabus dosibus: S.

Leniens Succus Pectoralis pro duabus dosibus. Vespri unam biborio ante cenam, & alteram sub introitum lecti fumendo. In hoc.

℞. Mass. Pilul. de Succ. Cras. gr. xvi.

Extr. Agar. gr. viij.

Trach. Alband.

Scamm. sulphurata an. gr. ij.

Cum Essent. liqui Sassafr. f. Pilule. S.

Pilule Catarrhales & Pectorales.

*Not. V. Quid si in Tussi Sicca Chronica, affligens pedus & à Lymphæ vicio orianda, adeoque Phthisis plus minus imminente, dicta Sulphurea balsamica, novam elegantia, non sufficiant, & Tussis fiat continua, & postea incipiat ejici Mucosa materia ex Ulcere Pulmonum; in tali casu pro Lymphæ correctela optima fuit Decoctum Lignorum Sudoriferæ, maturum tempore usurpanda. Talia præservativa matutina sunt Decoctum Guaiaci, imprimis Ligni Sassafrati egregium enim est in affecla Lymphæ catarrhalis; vel Decoctum hujus aut Radicis Chingæ cum Pailulis: mediamentis quibus & corrigitur Lympha, & per Sudores evacuato latice morbofo, eosque subinde repetitis & aliquantulum continuatis, optime curantur hæc ipse: vid. quæ *interius dixi de febr. Hæc quantum valent, vid. LOTICIUS Off. l. j. c. 10. Off. l. j. p. 233. & PISO de Colic. fer. p. 184. Vespri beneficio Opiatorum solutus violentus Tussis.**

Externæ

℞. Capiv. Allu Num. j.

Cum l. q. Pingued. porci. contendantur in formam Unguenti.

D. S.

Unguentum Pectorale.

Hoc vespri ante lecti ingressum prope ignem plantæ pedum illinatur, quod per tres dies continuandum.

Vel fumatur fumeo Pinguetio Lucis pilicis.

Not. VI. Si fit Tussis sicca ferina spasmatica, &que inveterata, curatur præmissio Vomitorio, maxime tamen instituta, partim per Opiata, partim per Temperata, acie, orificium ejus vellicans, corrigentia: qualis sunt Flores Sulphuris, Palliæ, & omnia ex Palliis, Decoctum Raparum. Liquiritiæ & ejus Succus, Decoctum Heleni uni cum Palliis Corinthiacis, cum Vino Hispanico vel Malvatico paratum; & postmodum Saccharum album addatur pro lubet, & cognatur ad consentitum aliqualem Syrupi. Dos: mane & vespri dotur coch. i.

Hoc Remedium Adulorum Tussim præmissio Vomitorio misce sedat: in Infantibus abique Vomitu à LINDANO laudatur. Interdum etiam de Syrupio Diacodi, vel pro ratione circumstantiarum Essentia Opii cubito duo aliquantulum addi potest. Egregium est Remedium ad talem Tussim

lin ferinam, vitio Stomachi ortam. Vel

*℞. Tinctura Tartari compof. ʒij.
Spir. Sal. Armon. anif. vel alius vol. oleof. aromat. ʒi.
Zaff. Op. ʒss.*

M. D. S.

Elitrix Pedorale contra Tuffim.

Dofis 40. gutt. mane, & meridie, & fub introitum ledi, in quocunque vehiculo, expectando furorem.

Addatur his Decodum Raporum, quod certè eft egregium Remedium, fi Rapum fit recens vel efufcatum, & in Tuffi Sicca omni, vel Catarrhali vel Pedorali vel Stomachali, nobilis, quod egi aliis irritis vidi optimum.

Pertinet huc Exporifon: fcilicet Paffula aut Ficus cum Spiritu Vini combulli, velfperi in Tuffi ferina Sicca et Stomachi vitio cum Tuffi, fuperveniente afperitate Fancium, Phlegmi, vel Raucedine, cum Tuffi Catarrhali & Chronica.

Potèd convenit Glycyrrhiza, epafue Succus, imprimis Hippocifus; necnon Elecharium Heleni cum Melle, & cætera fuprà in Tuffi Sicca laudata. Sic facit huc Exporifon AMATI LUSITANI *Cons. 6. Curat. 90.* recipiend.

*Sulphuris erudi, aut Flor. Sulph. (perinde enim eft) ʒʒ.
Flor. Benz. ʒij.*

Quæ in equalium Pulverem redacta propinantur dofis ʒij. in Ovo forbili mane & vefperi, & fub introitum ledi, aliquandoque continuatur. Videtur etiam RULANDUS in cæcis, qui Viro ætiorum 40. Tuffi vehementiffima & Affhmate affiduo, Pulverem hunc pefcripfit. Benzolè fanè rectè vocatur Balfamus Pedoris, & in morbis aliis Pectus affligentibus reverè eft egregium Remedium, unde Effhmia Benzolè, cum Effhmia Croci atque Effhmia Succini mella, in Tuffi ex Pectore affeetu orta, erit egregia. Vel

℞. Paup. Pafful. min. ʒʒ.

Flor. Sulph. ʒij.

Cum f. q. Syr. Papav. fimp. F. Elecharium.

D. S.

Elecharium Pedorale.

Capiatur pro lubitu ad confectendum Tuffim ferinam.

Locu Flurum Sulphuris communis quidam commendat *Floris Sulphuris faccharæus*. Modus præparandi eft, ut fumat.

*Flor. Sulphuris comm. part. ij.
Facchari part. j.*

Capiat marta Viriali ad pondus omnium.

Sublimatur hæc invicem in Flores Sulphuris faccharæos: fed communibus multo deteriores, & nullius ufus funt.

Quidam omnes Tuffes curavit per Pomum excavatum Melle rofaceo impletum, fuprà prunas pofitum, & ita fub noctem devoratum. Sed Tuffi hæc ferina, modò præmiſſus fuerit Vomitus, ut plurimum fponæ evanescere folet, tantilla Temperata potest affumit.

In genere Tuffi Humida ferè ut Affhma Humidum curatur: Tuffis autem ficca fimili ferè ratione atque Affectu Catarrhales levatur.

Superest Tuffi Nervorum seu Convulfive, quæ curatur ut alia Convulfiones epileptice, & imprimis præmiſſa Univerſalibus, per Salla volatilia & Succinata, quæ Inter Liquor Corru Cervi fuccinatæ eft egregia: unde etiam DAHOYLE in *Philof. Experimentalis* in Tuffi quocunque etiam inveterata, sola folet commendare Salla volatilia, v. g. Spiritum & Sal Urine, item Spiritum Corru Cervi, aut Sal Corru Cervi, tanquam fingulariffima & expertiffima.

Nos. VII. Cùm *Pæcus* fup fubinde Tafo, & Lympha acriori plàs minus excutitur, rubentes & quadammodo inflammate, ob id acrimoniam blandè Temperantia & Incrassantia dilata, item Dulcia plàs minus Fauces lubricantia, & lenientia conveniunt. Hoc occasione dedit errori, qua-

fi talia in Afperam Arteriam penetrarent, & ita Expectorationem promoverent, quod falum; ne guttula enim tranſit in flate naturali. (8) Snet autem talia, Paffulata, Succus Glycyrrhizæ, Syrupus Violarum, Rolarum, de Junjabis, Tullugianis, Scabioſæ, Liquiritiz: item Syrupus Diacodion *Mentari* cum Syrupo Scabioſæ miflus, & cum baculo Liquiritiz guttulus, fubinde fupradictæ, & fimilia ex Remediis fuprà tranſcriptis parata:

℞. Syr. Diacod. Ment. ʒvj.

Mell. Pafful. ʒij.

Extract. Liquirit. ʒi.

Diluantur cum pauca *Aqua feabif.* in confistentiam Lach.

D. S.

Succus Pedorali contra Tuffim.

Vel interdum Glycyrrhizæ recens continèd maceratur; fic enim oboluntur Fauces & lubricatur.

Pertinet huc *Liquor*, seu *Oleum Janchari*, ex Saccharo & Spiritu Vini, uti habet HARTMANNUS.

℞. Spir. Bacc. Juniper. vel hujus loco Viniſpiritus Sulgaris,

Olei defillat. Bacc. Juniper. an. ʒij.

Sacch. alb. ʒij.

Milceatur.

Incedatur Spiritus, & remaneat Saccharum, quod vocatur *Oleum Sacchari*: cui addo parum Extracti Croci & ulterius fuccessefè lambendo.

Convenit maxime fi Tuffis affligit ex fqualore Aëris fci vel fqualidi, & inde orta Raucedine. Quidam laudant, fi modo cohobetur Spiritus Vini, fed non magna eſt difſentia. RIVERIUS facit *Oleum Sacchari* compoſitum, dum Spiritum Vini imprægnat Appropriatis Pedoraliſis. Hoc *Oleum Sacchari*, fi extenſiſſimè diluatur & applicetur, Loco hujus Olei facchari ſunt, qui recipient Ovum ad duritiem coctum, & exemplo Vitello Albumen induratum faccharo replent, ita nonnulli perſuadent, & in eam ſanſpendant, & ita fit *Oleum Sacchari*, quod arbitror non eſſe inconveniens. RHUMELIUS in *Herm. pag. 137.* faccharum Cæſtrium laudat.

Potèd etiam extenſe aliquid plantis Pedum addi, fcilicet autè lechum Lucii pilcis Pinguedi, Viniſpiritus, Spiritus Menthe, & fimiles.

Fit interdum, ut cum Tuffi conſuncta ſit Hæmoptiſis, ſeu ſputum ſanguinis: in tali caſu FORESTUS commendat ſyrupum Myrtillorum l. 6. *Off. 30. in ſcholia*, imprimis ſi cum Decodo Paffularum, cum ſpica aromatizato, aſſumatur.

ARTICULUS IV.

De Catarrho Suffocativo.

Affectus ex hætenus dictis, nempe ex Affhmate, præſertim ficco, Tuffi, & Raucedine complicatus, diverſimodè tamen, ita ut nunc hoc, nunc illud ſymptoma obſervari videatur, ſiquè vel ſubito irruat, vel aſ improviso exaſperatur, nunc continuus, nunc remittens, & vel periodicè, vel incertis intervallis repetens, & quidem ſuffocatiſſimis periculum plàs minus inferens, cum ſtrepore, materie vel pauce vel nullius reſeſione, *Catarrhus Suffocativus* Germ. ein *Stuckfluß*, vulgò dicitur, addè ut vulgus in genere quancunque Reſpirationem ſubito difficiliorem reddatam & ſuffocatiſſimis minantem, in ſpecie 6. cum Tuffi conſuncta fuerit, nomine Catarrhi ſuffocativi appellare ſolet; dicunt, *cæcidit ipſi Catarrhus ſuffocativus*. Hinc fit, ut Affhmata Occulta interdum recurrentia, item Affhmata Hu-

(S) Antiqua ſani ſui de Potu quæſti, æu in Ventriculum per Oſophagum, æu in Pulmones per Tracheam deſcenderet. Quævis autem hæc ſententia, tanquam falſa rejiciatur ab Hippocrite, ſive Polybo 4. De Morbis, cum nempè falſum ſit, Potum uni-verſum poſſe Juxta Reſpirationem per Tracheam in Pulmones delabi, ſi enim vel guttula in Glottidæ rimam irruat, Tuffu vehementer excitatur, ætiam Hippocrates iuræ, vel quicunque doctor fuerit libelli de Cordis, concedit ætiam potus peritrem, veluti claudum per Glottidæ rimam illapſam, ſenſim Juxta Trachea parietes dilabi poſſe, aliſque ex quod æris motu impedimentum faciat: ætque hæc varice luvore quondam perſeſa Trachea treis & duricia reddatur. Itæ æu humorum luvæ de Cordi veluti thibi ætque in ætiferentis remedium exſeſi. Id confirmat Hippocrates curiſſi Experimente. Si qui enim Aquam cordis luvæ, aut rubrica temperatam ſibiæu Amilum, maciæu ærem ſui, incurſo nempè & munditæ minime dilato, præbet, deinde bibiunt: Guttur reſert, æu calore ſolem ſtimulum reſerit. Quidquid ærem ſui de vitæte hujus Experimenti poſſus exallat infenſionem non vulgaris Cibringit æt adverteſi, idem Hippocrates ſeritæſi quia Sanguis ſuæu Obſervationem æt curatam ætior: hæud & vero ællem crediderim, Etlegimus, & quæ Linclius forma ſuæu deſcribitur, poſſe non ſolum Laryngem ætque Carſillogium moldeſcere, & lubricitæ reddere, verum & ættem Tracheam ſive intrinſecus, ſive extrinſecus, ob Oſophagi ætiferentiam, humiditate quædam blandi perfundere, ut ad ærem, quæ in Pulmonibus, ætæque Bronchiis continetur, exitum ætque evadat.

morosa, imprimis vesperi graviter affligentia, sub hunc causam veniant & confundantur; item Tussis ferine, in specie nocturna, graviter affligentes, imprimis cum excretion copiosiore facili conjuncte, sub a quibusdam trahantur. Catarrhus tuus dicitur & preconceptus, quasi subito ex Cerebro præteritum fiat Humor Serolus plus minus Pituitosus, qui Bronchia & Pulmones replens, Suffocationis periculum intendit. Sed paucis rem explicat LINDANUS in *Colleg. manuali*. Sæpe Hartmann, Prax. Chymica, dicens: Maxima de tussis nascitur historia, nil obscurius hoc de Catarrhus Suffocativus dicitur: Nam ista dantem cum affluat salivam, & quomodo Materia vel phlegma vel serosa, & Capitis potius in Pulmonem, per riuam Arteriam, & Epiglottidem affluant, transit, quam per Oesophagum, &c. Alii igitur verò cautions per Venas a Capite deterrit tales Humores, hinc deponi in Pulmones, replere hos & Asperam Arteriam, & Suffocationem ita inferre putant. Sed ridicula has de Catarrhus Suffocativus Hypotheses non solum dicunt, diffundunt tamen cum cetero, qui Catarrhi Suffocativi nomine veniant apud Auctores. Unde in tali iudicio & preconceptis hypothesibus, per ignorantem Medicos confirmatis, hic non invehendum; Propterea triplicem Catarrhi Suffocativi putant, Aëthari Convolvis contradii, Differentiam facio, prout in Praxi observare tam mihi contigit.

I. Differentia prima est Catarrhus Suffocativus ex Pulmonibus effluens, ex hostili Acido inspirato, vel itius penitus, illis propterea de inhiante, irritatis, hinc secundum proprias fibras fortis in stringentibus; unde Suffocationis imminet necessitas, non prius cessans, donec Lymphæ uteroris investigatione irritatis illud præternaturale, & ex eorum muto coactu concretum Mucosum factum, ablutum & absterge foris, cuius Exploratione Morbus solvitur. Remaneat tamen subinde veligum in illis fibræ, ita ut levi occasione reavatum Spasmodum, & Spiritum occulsionem minuentur.

Mulier quædam hac Catarrhus Suffocativus laborabat: principium mali erat frequent Alaudam affatus, quatuor sub alatione, & cum huius irratione, & undique Pinguetudinis in carbonem degeneratione; & hinc tumens elevatione factum fuit, ut ipsa primo Tussim aliquam, sed siccam & profundam, seu ex imo Pectoris experta fuerit, quam aliquando ex improvviso ardior Pectoris & Fuscum angustia, & post aliquot dies perfecta Orthopnea secuta fuit, in quo statu continuo ultra modum videbatur suffocanda, ita ut levi aurt commotione, aut pauci apertione mox Suffocatione imminere videretur, donec successiva Expulsiōne Mucosam glutinosa ac perquam viscidam eperere, tali resolutione successivè liberius respirare, & sic tandem ad sanitatem reducere cepit. Manifesta tamen veligum in Pulmonibus impressum, ita ut facili & quavis Causa angustiam Pectoris sentiret.

Circa huius Affectus Etiologiam observandum:

I. Causam remotam esse Acidum viscidum ex Butyro, & Alaudam Pinguetudine aëreosa, exhalans, cum Aëre inspirato Asperam Arteriam, & hinc Pulmonibus undique inhaerens.

II. Hoc irritat inimica sua præsentia, idque tam acrimonia, quam adhesion glutinosa, tanquam fuligo camini; undique in Pulmonibus ductibus adherens ad Bronchia & Pulmones, unde primo Tussis, eaque sicca, hinc ex irritatione illa Lymphæ uteroris affluens; ab utriusque gravior irritatio, unde superveniens continua fibrarum Nervorum in Pulmonibus stridura, & coarctatio coarctiva.

III. Duravit hoc tamdiu, donec tam Lymphæ, quam Nutrimenti proprii affluxu Pulvis illa adherens, resoluta, & ex utriusque successivè concretum novum, ob moram & exitum missionem seu subactionem, spissum, tantum, glutinosum, &c. gelatum fuit.

IV. Huius medio Fulgido sublata, irritatio sedata, contratura Pulmonum hinc remissio reddita fuit; unde liberaliori paulo Aëris accessu & recessu materia ista sub paroxysmo genita, cum Pulgione involuta, commota, protrusa, & sic per Bronchia fursum ejecta fuit.

V. Manifestum tamen veligum ex Pulmonum nutritione propria seu privata, plus minus levis, adeoque contrada hinc Pulmonum debilitate, & fibrarum tali constitutione, quæ facili in Spasmodum agi possit; unde vel levis occasione extensa Pulmo irritari, fibræ contrahi, & hinc Affectus profilio memoria revocari solet.

Pertinere hoc videtur defunctum quorundam plus minus robustorum Catarrhus Suffocativi, cum Epilepsie metu junctus; dum v.g. simpliciter creberrima Thoracis phlegma & dialole, cum sevi vel nulla Tussis, continuo suffocari videntur; idque ipsam etiam eventum subinde ita, ut tali spasmatica affectione Pulmones confligunt, & Thorax contrahi ita videtur, ut & Respiratio libera & Sanguinis per Pulmones circulus impediatur: hinc Facies eorum rubicunda esse solet, & præcedere talem Affectum per aliquot dies vel Rarcedo levis, vel Tussis: Conf. de tali Infantum Suffocatorio Affectu HILDANUS Casuario 3. observat. 10. item SCHENCKIUS in *Observat.* pag. 149.

CURA.

Ut itaque talem Affectum in Adultis Opiata & Attemperantia, vulgo *Interfascia* dicta, optime levant, etiam Paroxysmos, ita & talibus Infantibus Thoracis, item Sperma Ceti, &c. in vehiculo calido propinata, observantur prædicat: cum eorum Afflatus Humida, item Tussis Humoralis præsertim ex Stomacho in Infantibus non raro, imprimis per Nicotannam, item per blanda Emetica, curari debeat.

II. & III. Differentia Catarrhi Suffocativi revera est

Catarrhus Suffocativus vix Laryngis.

Laryngis nempe affectus ad Bronchiam pertinent; quando subito Respiratio difficilis redditur cum admodum sensibili Laryngis irritatione, nullis, mordet, indeque superveniente Tussis, eaque facta violenta, cum exacerata in principio paucos, in progressu & de hinc copiosius, tamen cum levamine, Quæ in principio Paroxysmi ejicitur, ferè sunt tenuis, pauci, & serena; quæ in progressu Paroxysmi sunt crassa, viscida, & copiosa, quæ dicitur cocta: auditur inter eam Stertor & Sonitus, interdum Rarcedo adest; aut præcedit, aut sequitur, vesperi & noctu plerumque altigit; dum enim dolor incumbit patientem, exacerbat: præcedit interdum dolor Capitis & partium Colli vicinarum, semper juncta est titillatio Laryngis, &c.

Ex didis alicui Catarrhus hanc Suffocativum, potius loquendum, esse Affectionem Laryngis, in quo hac de Caput Asperæ Arteris, in specie Epiglottis, affectus primario; huius enim & Epiglottidis & Laryngis irritatio, & hinc semper insequens perturbatione stridura, seu clausura Laryngis, ob irritationem huius, consistit. Jam verò, si in ipso Larynge hæreat malum, & sic erit Affectus similis hanc Broncho cum Rarcedo, & sic superius extra Laryngem, scilicet in ambitu aut superius Epiglottidis incumbens Causa peccans, erique tunc Catarrhus Suffocativus; qui pertinet ad Catarrhus Membranam Pituitariam posterioris Schneideri. Deinde ulterius: nempe potius est, si tantum Aquæ aut Cerevisie guttulis, aut mica saltem Pluvii vel inspiratione Laryngis ingrederetur, quod hanc admodum sensibilem irritando; mox facit eam convulsionem, seu perturbationem ab Epiglottide occulsionem, & Suffocationem. Quanta enim Respirationis difficultas, Tossis, Stridore violenta, nisi impetiorum Tussis mox insequens illa denud eliminet? & quo diutius sit illa irritatio, eo plus Pituitæ postmodum excrevit. Hæc Symptomata, quæ superveniunt, exactissime delineant Catarrhum Suffocativum vitæ Laryngis. Nam tunc talis morula Patit Laryngem irritat cum sensibilitate, irritata convellitur, inde ex stridura difficilis Respiratio & Suffocatio: tandem supervenit Stridore, qui non est eadem in Larynge, nec est Causa illarum angustiarum in Larynge, sed mica: inserim tamen est Produdum quali morbolem; fit nempe de novo ex irritato Larynge, ex Lympha alterius affluente ad locum affectum; Unde ex quacunque Causa interna, si similis sit in Facibus irritatio, tunc similis subito imminet Tussis, stridura, vel Suffocatio, & similia Parhenata.

Causa ergo irritans, quæ laesit huiusmodi subitaneum pathema, est respectu laryngis vel interna vel externa. Interna usurpationem est affectus feri, vel lymphae acrioris, nunc fulforis, nunc in specie acrioris, ad bronchum delatum, & tunc titillatio adeo acrimonia lymphae acidioris ad laryngis interiora late, quæ deficiat ob lesionem à causa externa ab incrementa Aëris introducta, tuncque pars lesa plorat copiosam lymphaem, nunc salivam, nunc acidum, & effuse quæ Catarrhus Suffocativus nihil aliud, quam quasi rancido subitaneus à hinc irritatur larynx, stringitur Epiglottis, unde metus suffocationis subitaneus. Proinde autem talia rancida inter duos, singulis nobilibus repetant: quale exemplum apponit hic facit, quod habet RIVIERUS *onc. 3. observat. 19.* Hæc nempe causa respectu laryngis externa, talem Catarrhum suffocativum inferens est, Imprimis lympha viscosa, glutinosa & copiosa cuspis quoque asporis, ex membrana pituitaria polsterore & inferiore ad Fances copiosius delata, & subito inviscens quasi laryngem, & Epiglottidem liberam totum impediens; unde mox suffocatio imminet, Tussis, & copiosa materiem viscidam sputat, cum sensu leonem in Faucibus: effuse affectus revera Catarrhalis, nempe visio membranae pituitariae posterioris, quem describit SCHNEIDERUS *lib. 9. de Catarrh. cap. 2. sect. 2.*, & eisdem est naturæ cum affluente humido, cum tussis Chronica, Imprimis stomachali. Exasperatur hic affectus lubinde vesperi & noctu, & frequenter per se subito ex prægressa causa externa, imprimis ab aëre inclementiore, aut maligno, aut variis effluviis spirituum acidorum mineralium imprægnato, facta alteratione, vel ex tussis diuturna & chronica oritur, uti patet in exemplo HILDANI *Cas. 6. obs. 1.* ubi habetur talis Catarrhus suffocativus. Subolefecit hoc PLATERUS, unde Catarrhus suffocativum angustiam intra fauces ar, & Catarrhus non ad pulmones, sed ad fauces delati animadverte, *lib. 1. obs. 185.*

Est ergo Catarrhus hic suffocativus propriè dictus affectus cognatus tussis ferine & rancidini graviore, indeque complicatus est plura symptomata.

CURA.

Catarrhus suffocativus à causa externa curatur eodem modo ac rancido recens, seu tussis nocturna secca, v. gr. per vomitoria, & post per opiat, ac similia alia Temperata, incrassantia dicta, i. e. lymphaem acrem, in specie acidam, temperant; vel si minus in principio convenient vomitoria, præmissa Clymate, per sudorifera blanda, lymphaem motum & materiem corrigentia, hinc per opiat irritationem faucum tollentia, & lenientia. Incrassantia sunt passillæ, Glycyrrhiza, Tragacantha, Gummi Arabicum, Thus, Jujubæ, Symplicis de Jujubis, Violarum, Papaveris, Scabiosæ, Liquiritiæ, &c.

℞. Ag. scabios. ℥iij. (vel Ag. scabios. menthan. ℥iij.)

Affluat. Radolph. (est Vin) spiritus

composit. aromat. ℥iij. vel iv.

Syr. papav. simp. ℥iij.

Violar. ℥ss. ad ℥l.

M. & coelestium capiat.

D. S.

Potio ad respirationem coelestem fumenda.

Vel

℞. Ag. scabios. ℥iij.

Affluat. ℥vi.

Spir. Salsæ Ammoniaci anisat. ℥i.

Syr. Papav. alb. ℥i. vel huius loco Diacod.

Ment. ℥ss.

D. S. ut aut.

Vel

℞. Ag. menth.

Scabios.

Serpill. an. ℥i.

Affluat. ℥vi.

Spir. Salsæ Ammoniaci anisat. ℥iij.

Syr. Scabios. ℥ss.

Syr. Diacod. menth. unci.

M. D. S.

Potio Catarrhalis ad Respirationem.

Vel

℞. Symplic. Catarrh. ℥iij. vel ii.

Spir. Salsæ Ammoniaci anisat. ℥i.

M. S.

Essentia Catarrhalis ad Respirationem.

Si asperior fuerit mistura propter spiritum salis Ammoniaci, omitti potest.

Exempli loco sit puer 10. annorum, constitutio ferè asthmatica, facies naturali erat tumidior, dormiebat aperto ore & cum stertore, obnoxius subinde erat aliquali Tonsillarum tumori. Hic vel est simpliciter Aëris frigidi nudo capite suscepcione, vel ex refrigeratione extremorum post Corporis motum, & exercitium, proximè insequente aut certe altera, in Catarrhum suffocativum dictum incidit, ita, ut suffocandus omnino videretur facies intumescere, & ex rubro cæruleo ferebat, Tussis crebra, sed inanis, & sub qua nil, præterquam tenuis, & pauca lympha evacuebatur. Interrogabatur: *quomodo isti esset in paroxysmo?* dicebat semper: *stirillam infusa Gula;* nempe erat affluens laryngis, ex lympha acri vellicante natus, occasione Causarum in motu debito impedita. Cum evanisset paroxysmus, Febris aliquot dierum lenta supererat, Tussis frequens, & potentem copiosius mucum, crassum & viscidum, per aliquot immediatè insequentes dies excrevit, & sic morbi solutio. Rediit tamen sæpius paroxysmus, quoque speciatim hyberno vel verno tempore, rarior esset. In paroxysmo affluens Inungebat verticem Alismæ Succini, brachia fortioribus ligaturis constringebat. Prescribebam mixturam sequentem, ut Irritationis sensum & hinc laryngis contrahacum sic lenirem: nempe.

℞. Ag. scabios. unci. ii.

Affluat. unci. 6.

Syr. Diacod. menth. ℥iij. ad unci.

M. D. S.

Potio pro Respiratione.

Item

℞. Ag. scabios. unci. iii.

Spiritus salis ammon. anisat. ℥iij.

Syr. papav. alb. ℥vi.

M. f. Pnis coelestem fumenda.

Externè in regione laryngis, ubi portus titillationis & contrictionis sensum percipiebat, cum lentis calidis applicari, & simpliciter reiterari jussit.

℞. Ag. artical. ad unci. ℥iij.

Spir. Card. ser. nig.

Lil. convall. an. ℥i.

Extrat. spir. ℥ss. ad ℥l.

Mistura applicanda.

Hicæ brevior reddebatur paroxysmus. Finito verb paroxysmo prescripsi:

℞. Ag. scabios.

Serpill. an. unci. 6.

Affluat. ℥vi.

Syr. scabios. ℥iij. vel dr. 6.

Syr. affluat.

Scabios.

Violar.

Papav. vel de Jujub. an. dr. vi. ad unci. 6.

Miscendo.

Potio, præbè agitando, crebrius hausta crebriorem tussim, & materiem copiosioris ejectionem prævenit, quatenus Irritationis in larynge sensum, & fluxionis causam removit, & acrimoniæ lymphae temperando, lesionem laryngis & hinc mucæ excretionem inhibuit.

Tandem eo crebriore nimis recidivam in subiecto phlegmatico, seroso chyllo abundante, lauebatur brachio sinistro fonticulis, unde nec crebri adeo nec adeo graves postmodum redierant paroxysmi. Circa annum decimum quartum densè claudere cepit sterculicam, cum spes esset, ex alteratione corporis, & notabili habitus æque immutatione, etiam hanc affectionem immutatam iri.

Si malum est à causa interna, curatur ut affluens humorum, vel Tussis Chronica; Imprimis stomachalis, nempe per vomitum, & deinde per attenuantia, & mucum viscidum Incidentia, & consequenter insignem creaturæ & resectionem causantia, vulgò *Expectorantia* dicta, v. g. succum Raphani recentem, Symplicum, & Aquam Nicotianæ, quæ nobilissima, spiritum Asthmaticum, Oxytel squilliticum, radicem Ari, gummi Ammoniacum in Aceto solutum & cum Aqua Erysimi præparatum. Aquam Asthmaticam Radolph, spiritum Asthmaticum Domini D. Michaelis ex Viridi Aëris, & gummi Ammoniaci, & similia.

℞. Ag. Symplic.

Mencha,

Nicotiana an. unci.

Affluat. dr. vi.

Oxytel. squill. unci. 6.

Syr. Nicotiana dr. vi. ad unci. 6.

M. f.

M. E. Petit. S.
Potio refovens pro Respiratione,
Capitulum cochlearum. Vel
Zn. Ag. Hyssop.
Stachis. an. ʒiʒ.
Aethusa. ʒvi.
Cann. amom. in acet. ʒiʒ.
Syr. Stachis. ʒi.
M. D. S.

Potio refovens pro Respiratione.

Ex dictis patet: Opata & his cognata anodyna, & hinc attemperantia, alias *Interaffaria*, in paroxysmo & suffocando & praetervento primatum obtinere, etiam ex vulgata aliqua hypochondria: Lumen enim nonnulli ex humoribus, motu, & hinc loco peccantibus oriri solent Pathemata talia, humoris vero locali motu nullo ferantur in corpore, nisi benefici spirituum animalium, mediantibus Fibris illos moventium; a spiritibus autem praeternaturaliter moveri non solent, nisi hi promoveantur ab obiecto mollesco vel praeternaturali, hoc est, nisi pars quaedam sensus irritetur; manifestum est, quod, quae irritationis sensum tollunt, & spirituum impetum sopiunt, etiam praeternaturales humorum motus retinere, & partium inchoatos spasmos curare valent; in quo puncto primatum ducunt anodyna, ut clausum est. Quid ergo *Clysters* prouent, in talibus Catarrhis suffocativis suppositis uti solent, sique acriter? Res clara est, quod nil valent, per accidens saltem, primas vias evacuando, & sanguinis & abdominis viscera in motum concitando, & utroque modo pectoris angustiam nonnulli fullevando, saltem ex indirecto prodesse. Quid *Tussis* suffocativa adquam, tanquam ad sacram anchoram motu concingunt. Per se nihil prodest, nisi in graviore paroxysmo, & ubi pulmonum reciproco motu plus minus impedito, motus sit ne gravior circa pulmones sanguinis flagratio superveniat, pro liberiori sanguinis circulo conciliando hanc intermedium influentia veniat.

Uterius capiti, Nucha, & Vertici Balsama, Emplastra, Cataplasmata, suspensoria dicta, ex mallice, Succino, Tamarindis, Caranna, Fleme, & similibus aliis imponuntur: item ex Fermento, ex ovis ad nutitum coctis, ac similibus, pro suffocando Catarrho defluente: Sed conatu sanandi, & ridiculo veratut aegri sine fructu, cum in capite non sit mali radix. Item Vescicatoria Cervicis, Scapulae & similibus locis pro loco divertorio applicantur male itidem, nisi interdum per accidens, ubi affirmatis convulsi quidpiam adest, in quo casu Vescicatoria Brachia applicari possunt.

Hic IV. loco affectus peculiaris insinuerandus venit, & qui modernis, antiquatum illam de feri catarrhalis ex capite defluxu sententiam recipiuntibus, Catarrhi suffocativi nomine venit: estque ille *Catarrhus suffocativus vicio sanguinis*, de quo eruditè tractat VICENTIVS BARONIUS *l. 2. de catarrhis*, & SCHNEIDERUS *l. 2. de Catarrhis*. a. ubi de *Catarrho suffocativo*, qui omnes, & cum his LINDANUS, rectè dicitur: Catarrhum subito suffocantem, aut suffocantem minantem, nil aliud esse, quam sanguinis quatuor ex ratione in Pulmonibus flagrantem, seu quod oritur ex impedito sanguinis in pulmonibus circulo; dum nempe sanguis copiosus ex dextro cordis Ventriculo in pulmones effusus non promovetur ulterius, sed in pulmonibus flagnet; qui sanguinis flagratio non tantum est, go huius affectus, sed Peripneumoniae paries ac pleuritidis, unde etiam quidam *Sanguis* vicio appellatur.

Sanguis hanc vicio accidit tam in syncope Cardiaca, veteribus dicto affectu, quam in syncope ordinaria graviore, in qua tamen deficit motus spiritus. Plerumque ergo qui

hanc Syncope Cardiacam ignorant, ad Catarrhum impetuum suffocativum delabuntur. De hac Syncope Cardiaca, Veteribus ne dicta, optimè in lectione illorum veterum CASPARUS HOFFMANNUS *monstrat* in *Method. Med. lib. 3. cap. 30.* ete eam, cum, cerebro nihil passio, sanguis ad Cor tam vehementer affluit, ut omni spiritui via ad cerebrum intercludatur. Hinc infert, non omnes, qui subito moriuntur, Apoplezia mori, & sepe causam frustra ab Aromaticis quæri in capite, cum sit in Thorace; ita, ut hic Catarrhus suffocativus, & Syncope Cardiaca sint unum idemque, cum oritur ex sanguinis impedito motu circa cor in pulmones. Hinc ex his fundamentis SCHNEIDERUS *l. 2. pag. 197.* definit Catarrhum suffocativum, quod sit ille Catarrhus, in quo sanguis plerumque copiosus, tum de Venæ Cavæ trunco descendente, tum maxime de eisdem Venæ Cavæ trunco descendente, in Cor, & hinc in pulmones conferent & celeriter fluit, necnon & interdum in Musculos Thoracis. Quomodolibet enim in apoplezia imminente sanguinis arteriarum, nempe Carotidum, in cerebro ita in imminente Catarrho suffocativo sanguis Venarum in pulmonibus, tam faciliè, quam infernè, cum impetu ac violentia moveatur, ac inde sublevisit. Conf. WEPFERUS *Tract. de loc. affectu in apoplezia* pag. 163. & 202. item SCHENCKIUS *in observat.* pag. 128. ubi prolixius differtur de Syncope Cardiaca, in qua concreto in venis sanguine *Ægri subito moriuntur*. Similes nempe, quoad externam faciem, affectus sunt apoplexia, & Catarrhus suffocativus, ita ut hi affectus subito confundantur, aut etiam simul in ægris adit. Nam ut in Catarrho suffocativo sit sanguinis flagratio in pulmonibus; ita in illi similiter, qui apoplezia moriuntur, tandem similis sanguinis in pulmonibus supervenit flagratio. Hinc in apoplezia mortui Vasa pulmonum distenta, & rupta interdum, ex sanguinis impedito motu, in præcordiis reperiuntur, reterente hoc non tantummodo FRACASSATO in *Essai de verba de Malighium*, sed etiam CORNELIUS CONSENTINUS in *Prognostico*, inquit: quid sit, qui moriuntur apoplezia, eodem modo intereant atque strangulati; quod admodum appositè dicitur. Nam in strangulati, sanguis injecto collo, subito perit sensus & motus, ex impedito sanguinis in Carotidibus motu, & succedente Respirationis abolitione. Ne autem confundamur, merito adhuc urgeo ingentem hanc confusionem, quando quidam Catarrhum suffocativum à sanguinis flagratione in pulmonibus, & Catarrhum suffocativum vicio Laryngis, distinctos vel se affectus, confundunt, quod facit SCHNEIDERUS *l. 2.*, ubi promiscuè allegat Auctores, & promiscuè facit Chaos.

Est itaque Catarrhus talis affectus ad Peripneumoniam suo modo accedens. Huius exemplum videtur repositæ Mulier illa Catarrho suffocante intercepta, quam refert PLATERUS *l. 2. pag. 187.* Ceterum hic interdum, ut etiam in paroxysmo Catarrhi suffocativi cum Tussi, copiosè *Materia viscida*, imò non raro *spumosa*, per eos excretio contingat; Nam hac tradendū esse inter Auctores maxime hinc inde ventillatur Aphorismus HIPPOCRATIS 43. *lib. 1.* Dicit enim hic: *Ex his, qui strangulantur, & submerguntur, nec tamen sunt mortui, non redeunt ad vitam, quibus spuma circa os apparet* (1). Hic valde dilabuntur Auctores, quod intelligant per strangulationem? Optimum est sententia eorum, quos inter est LINDANUS, qui dicitur: intelligi per hanc Catarrhum suffocativum; nam, ut dixi, in eodem apparet spuma, & non raro reicitur mucus, & Materia viscida. *Novissimus* nempe est Angine species, *Cynanche* dicta, ab ulcere in interioribus laryngis, fauces occultante unde Angine *spuma circa os apparet* malum desperatum est: sicut & CHRISTOPHORUS

(T) Quam Epilepsiam paroxysmum præcisi Spumam feri semper in ore habere, nec tamen mortem obire; manifestum est: Hippocratem magisquam de Epilepsia in hoc Aphorismo sermonem habuisse. Porro igitur de his hominibus illi, qui in suffocationem ex syncope, vel ex Apoplezia ex quodam vehementi incipiente, cum ingenti Pulmonum & partium circumferentia compressione, ita ut sanguis trajiciatur & Respirationis quæ impeditur, strangulati videntur. Hi enim tam in vitam referantur si spuma circa os apparet: signum enim est a quo corpore illi Vasa spumantia, ut Aer veluti per simulatæque eductus, salivarium rurem in eis ferit effluens exagitur, cum equo permissus, spumam creet: ex tanta autem spirituum Organorum lassitudine, quoniam sanguinis quoque circuitus maxime retardatur, difficile est ei passio quis in vitam revire. In Epilepsia vero spuma generatur, non ex vicio Pulmonum vel Cerebri (hæc enim vicia in Epilepsia ferè semper bene habent); sed ex causis cum convulsione Manubialis, & Facialis, quæ sit Aer in ore contentus non saltem quoad minima permittatur, unde spuma ortum trahit: hoc autem laudè labat si signum erit, ut est manifestum. Obiter hic monito, prima verba huius Aphorismi, Tui convulsiones & convulsiones, quæ verè, Qui strangulantur & submerguntur, verum accuratè est interpretari, Quia strangulantur & animi deficient, non potest ex verbi significatiōe verbi interdu: si autem submerguntur, Dissolutos, ut appellat velis, qui ferè convulsione, seu strangulati, detractis laqueis suffocant, jamjam moriuntur, viribus repositis in mortis convulsibus redeunt, quæ Cellius, detractis ex suspensio, vocat: Relictis autem est Auctor iussit, qui *Novissimus* vocat Angine speciem seu Cynanchem, ab Ulcere nescio quo, interiori Laryngis & Fauces occultante, ortum.

RUSſſ VEGA l. 7. de Art. Med. cap. 1. refert, duos Viros: sentinas & patens cernofos equitantes, prae se ferre ftragulat spumam ex ore emiffisse.

Mucus hic & Materia viscida primo dedit occasionem impolurum Scholarum, quod nempe talis Mucus ab Materia spumescens, per Laryngem in Pulmone decidens, sit Causa Mortis; quod tamen falsissimum, cum potius sit productum morbum, quam Causa Affectus. Verum ostendit omnino illius ex duplici fonte; Spuma illa copiosa, quae ex talibus affectibus aut mortuorum Ore effluit, omnis est ex Pulmonibus, facta per agitationem ab Aëre inspirato: si enim acidus Liquor in Canis Venam injicitur, ejulmodi spuma, vel eadem Symptomata sequuntur, atque in ejulmodi suffocationis Catarrhis. Quod testatur Exemplum Canis, cui olim per Chirurgiam Insuloriam 51. Olei spiritus Sulphuris per campanam in aqua dilutus fuit in Venam Ceralem infusus, unde Canis post hujus injectionem per semiborales & succedens, admodum anxie respirabat, semperque difficulter, itaut tali Catarrho suffocativo tandem moretetur: antequam suffocaretur, & etiam post mortem copiosissima spuma ex Ore & Naribus effluit: imò facta aperture Thoracis intus Pulmonum parenchyma, omnia Vasa Aëre Arteriae, totus etiam Truncus, Fauces, Nares & Guttur erant infarsa hac spuma quasi viscida: bullae extraxit & alteras in tabula tandem abierunt in liquorem rubicundum, laceratum, laturae caruam similem. Facta ulteriori inspectione, Pulmones erant repleti sanguine nigricante & erassissimo, itant hic Canis exstinctissimè manifestavit Tragediam Catarrhi suffocativi; cujus rei habes testes: Nam ab acido sulphuris coagulatus sanguis subsistit, unde ab aëre violentius inspirato crebrior si fuit Respiratione & sanguis hinc facta concussione, mutatus fuit in spumam, quae replevit hae partes: vid. Diss. de Catarrho Insulor. l. 1.

Spuma ergo in iis, qui laborant Catarrho Suffocativo, & quae tandem supervenit Apoplexia graviore affectus, etiam ex pulmonibus esse videtur; Mucus vero & Materia viscida non sub forma Catarrhi in Capite refluunt, sed est ex Larynge. Fit nempe spuma ex sanguine in pulmonum Vasa stagnante, ab Aëre reciproco motu impetuosisus haulto, crebriori Respiratione nonnihil rarefacto & attenuato, & ita in spumam reoluto, sicut Cerevisia agitata in spumam abit: quae ipsa spuma repleta Arteria Arteria malum potius exasperat, quam levat. Ubi tale signum apparet, rectè signum lethale censetur, & raro, si spuma illa sit in Malis percutis, evadunt; hinc rectè dicit HIPPOCRATES in Aphor. allegato: *Quibus frangulatis spuma circa se apparet, si intereunt.*

Quod attinet Mucum, qui in tali caso efficitur, illum dial ex Larynge, & revera nil aliud est, quam Lympha paulò viscidior, ex Larynge tunc uberius emissa, & in tantis angustis mediante crebriori Respiratione cum Aëre elevata. Nam Larynx & Alpera Arteria interius Membrana obducit, ordinatio humectatur a Glandulis, posterius circa Cartilagine copiose haerentibus, quae ordinario transudant Lympham tenuem, plus minus aërem, plus minus viscidum, in Alperam Arteriam, pro ejus & Laryngis humectatione ad meliorem Vocis formationem. Hinc quando in Febribus Ardentibus absumpta est illa Lympha, Vox fit rauca.

Stagnante ergo sanguine in Pulmonibus, & impedito nonnihil circa Alperam Arteriam, ex anxietate Aëri copiosior Lympha crassa & viscida emulatur in Arteriam Alperam, cujusque loca vicina, etiam per Membranam Pituitariam Inferiorem emittitur, quae est materia ipsius Muci sub hoc Affectu reperti, & vulgò habetur pro Pituita ex Capite deplente.

Inter Causas Remotas, quae tali flagnatione & coagulatione, aut uberiori influxui in Praecordis fuit pulmonibus, hinc Catarrho suffocativo, occasionem suggerunt, a SCHNEIDERO l. 2. allegatur variè; primum Aëris obstruendum vitium, ratione cujus & Epidemicum ac Malignum hunc Catarrhum interduum esse, pluribus deducit: Nec ultima est, quod post nimium Exercitium aut Motum concallescendo Infligitur Corpore, adeoque sanguine attenuato, subito ingurgitatur bullas aëris frigidae, a qua repentinam locum fuit suffocationem: propter quod quoniam in Exercitio & Motu sanguis attenuatus & rarefactus rapide acceleretur circulator & aërius, a subito vero Aëre frigido potu ingurgitatur sanguis subito ad eam coagulationem disponitur, binoque flagnando in pulmonibus & Praecordis facile suffocationis periculum inferit: Id quod patet, quia a tali Causa non raro fiant Pleuritides, unde suffocationis periculum.

enlum. Exemplum talis casus habuit aliquando Dn. D. MICHAELIS in Coquo, qui eam distius ac vehementius circa focum & ignem incaluisse coependo, a foco abegressus, subito copiam & frigidissimam Cerevisiam hausit, unde tantam spirituum angustiam, & in praesentanea suffocationis periculum incidit ea coagulo sanguinis: Curavit tamen hunc Coquum beneficio Sueci Florum Bellidis cubra recentem expressi, Notum enim est, quod focus hic singularem vim habeat ulcerariam, ac imprimis sanguinem granulatum, & ab acido coagulatum dissolvendi; unde etiam hic sanguis sanguinem ex potu Frigidæ semicogulatam, congruatum, deinde relolvendo, suffocationis periculum removit: Coni. Medicina Militaris MINDERERI in qua videbitis Accuriam ea Bellide, & ad hujus imitationem instituit Curam hanc D. MICHAELIS, sicut Flores Bellidis alias nobles sunt in Pleuritide.

Faciunt hac varia exempla suffocationum talium similiter oriturum ab obstructione Vascularum in Pulmonibus, & impedito sanguinis motu per eos: quae imprimis est illud, quod habet MAUROCORDATUS Traill. de Motu & Vita Pulmonum cap. 40. pag. 11, ob Calculum in Arteria venosa enatum: sic Pulpus Cordis, seu excreta carola in sinistro Ventriculo Cordis nata, quatenus sanguinis motum per pulmones inhibet, suffocationem inferit, de qua BARTHOLINUS Centur. 1. Epil. 16. pag. 61. RIVIERUS Centur. 1. Observat. 11. WILLIAMSUS tentia Hypochymum pag. 15. & MALPIGHIVS de Pulpe Cordis. Quo etiam fuit Cartilago Venae Pulmonalis truncum occidens, qualem MAYOWIVS de Pulsa Cordis vidit.

Sed propinquiores Causae talis Catarrhi Suffocativi sunt quadruplices.

- I. Sanguis nimis abundans & turbatus, qui propter rarefactionem uberiorem in Pulmonibus majas partem occupat, adeoque tardius circulat, tandem verè flagnat.
- II. Est Sanguis paulò viscidior seu pituitosus, hoc est Chylis crudior infusignatus, ad motum tardior, adeoque flagnationi aptior: quo pertinet observatio RIVIERI Centur. 1. Observat. 11. de suffocatione ea Materia viscida pituitosa, in dextra Cordis Auricula reperta. Conferatur Observatio parallela in MAYOWII Traill. de Motu musculorum pag. 99.
- III. Obstructio Vascularum in Pulmonibus a Calculis, &c.
- IV. Est interduum Sanguis ab Acido viscoso, aut Aëre nimio frigido post alium subito inspirato, aut denique quacunque alia ratione coagulatus & infusignatus, qui uti Pneumoniæ & Pleuritidem, ita quoque talem suffocationem inferit.

Rectè namque dicit LINDANUS in Coll. in Pr. Chymicis, Hartmanni: *Nihil quicquam post esse asperius, quam sanguinem tam repentinam deditionem viscidam ac pituitosam materiam extempis in asperam arteriam circa rursus, ac unde suffocationem imminuentem; quin potius per paulas vias in gulam ipsi contringat exierit.* Ergo videt, dictam Suffocationem non esse a Catarrho, sed esse à flagnatione sanguinis. Quo pertinet Terror subitaneus, ex tali sanguinis tali subitanea Suffocationem inferent. Pulsus hinc est deficiens, interdum parvus, creter & frequens.

DIAGNOSIS.

Catarrhus hic suffocativus in specie cognoscitur ea dolore Pectoris gravativo, difficultate Respirationis. Voce rectè intercepta, periculo suffocationis, anxietate Aëri, interdum Tussi, non semper, & saltem, quando simul Vasa Laryngis Lympham uberius effundunt, Pulsu tardiore & rariore ex tarda circulatione sanguinis, & quodammodo firmante vel vermiculante: hinc qui Catarrho tali suffocativo oppressus est, ægeritè spirat, & Anima cum spiritu ferit. Nonnunquam Membrana Pituitaria SCHNEIDERO dicta, quae obducit subiecta Corpora glandulosa, plures Humores rejicit, quos Serosa & hermatatione rejicere solemus.

Coincident fere hæc ipsa cum Apoplexia Signis, nisi quod in hac suffocatione Aëri ægeritè spirent, in Apoplexia vero debilius, abolitis tantum animalibus efferis, nihilominus plus minus respirant. Arteriae pulsant, utus Pulsus sit durus, nec ea spirandi difficultatem vexantur: in Apoplexia fortè vero via Vix nullam manifestum adeit indicium, neque deficiunt aut exinde male habentis Respirationis adiunt Signa; sicut & Pulsus subinde frequens & vegetus percipi solet: in Syncope vero communi pulsus est fere nullus.

P R O G N O S I S.

Quod *Prognosis*: res est clara, periculum esse plenissimum hinc Affectum & Strangulatio enim cum spuma maxime est infesta, ut dicit HIPPOCRATES. In Morbis autem acutis omnia jugulat: propterea maturanda est Cura.

C U R A.

Totus focus in curando Catarrho Suffocativo, seu Syncope Cardiaca est, ut *promoveatur sanguis flagrans per tracheam*: id quod fit vel immittendo ejus Quantitatem, vel resolvendo Remediis Internis ejusdem Congulationem, & denique blanda Sudorem eundem attenuando, & fluidiorem perficiendo, sicque liberare ipsi Matrem promovendo. Adeoque ea Remedia primò se offert Venæ sectio, in Catarrho suffocativo opturimùm necessaria, in Brachii quatuordecim infusura, & per conditione infusuri satis larga: Nam occasio est præcepta, & nil citius ac potestius sanguinis circulem morum immutare, eundemque accelerare, & stagnationem impedire potest, quam hæc ipsa. Hinc etiam Cucurbitula cum scarificatione hinc inde affigenda. Obiter moneo hic, quod vulgò Clysters infundi, Strangulatoria & Garagarismata, item hectica, Linthus adhiberi, Frictiones Brachiorum & Pedum, Ligatura fortis &c. infatigat, atque Empyria & Cataplasmata Capiti, quoniam à Pituita ex Capite dependente ortum ducit, credunt, applicari solent: sed hæc certe, ut rectè dicit LINDANIUS, sunt laus fœdiorum Mulierum, anilia inventa, ac inanissima, & Medico rationali non imitanda; quia sæpè feliciter tunc moriuntur. Agri subinde tamen ante aut post Venæ sectionem Clyster acutus pro eluenda Alvi iniectione, non est inconveniens. Vomitoria, quæ hic à quibusdam insigniter laudantur, pariter sunt inepta; & ipsoque dubitant RIVIERUS inquit: *In vomitu Catarrho vix esset Vomitorium*: Et FREITAGIUS in *Arteria Mediceum* dicit: *In Catarrho graviore esse periculosa Vomitoria*. Adjunct quidem Exempla feliciter propinatorum Vomitorium; verum hic sublece dicam impollicitum: Nam copiosa Materia viscida insert impollicitum, ut habeantur talibus angustis afflicti pro Catarrho Suffocativo laborantibus: quos potius conveniunt saltem in Catarrho suffocativo ex vitio Lymphæ, de quo supra, aut in Asthma fortiori, factio ex stomacho, aut ubi suspicio simul osti, Mucilaginem viscidam infusile in stomacho, aut etiam hæerere in Pulmonibus, idque foveat malum, aut Causæ remotæ instat esse; quali in casu propinatorum Vomitorium in forma liquida optimum & divinum osti Remedium. Iam verò cum Asthma stomachale pro tali suffocatione habeatur, hinc factum est, quod dicitur conferre Vomitoria in Catarrho suffocativo. In sanguinis verò errato nihil iuvat, quin potius administrata Venæ sectione sanguis flagrans vel citò dissolvendus & attenuandus, vel blanda diaphoresi in rapidiorem circulum cogendus. Internæ Remedia sunt Aquæ Asthmaticæ, ac Pecciores dicitur spirituosæ, imprimis Temperatæ & Anodyniæ militat mitioribus. Præ cæteris optimè hic conveniunt Sperma Ceti, dosi a ʒi. ad ʒi. in Aqua Hyssopi cum pauca Aqua Asthmatica Rudolphi, vel Cerevisia calida aut alio vehiculo calidè propinatum, quod in deplorato Catarrho Suffocativo pro sanguine congruato denudè resolvendo fluxilemque reddendo est nobile, & ab omnibus Medicis laudatum Remedium, ad quod tanquam ad sacram anchoram consurgunt: vid. SCHENCKIUS, RANGHINUS, & SCHMUCK Th. 2. Servet. Med. 19. Mirabilia unum facit, cum probè testis sit Agger: Etiam in Catarrho suffocativo infansum exquisitissimum Remedium D. PETRI à CASTRO dicitur, ad Psi magnitudinem, vel tennicula ad ʒi. in Lactis materio dissolutum, propinatum; unde etiam est singulare Vulnerarium, ubi est sanguis coagulatus. Pancia autem est origo bubæ Spermaris Ceti. Revera autem est ex Capite Balastrum, non verò ipsum Cerebrum, sed materia pinguis in capite Balane contenta, quæ exinde desumpta per lacum fe-

taceum traicitur ob nimiam pinguedinem: materia resiliens: per Liavium forte, ex Calce viva cineribusque clavellatis paratum, depuratur. Formula potest præscribi talis:

ʒi. Aqua Hyssopi ʒi.
Sperm. Ceti ʒi. ad ʒi.
Syr. de Hyssop. ʒi. ad ʒi.
M. D. S.

Dissolvens Potio pro Respiratione, pro una vice.
Potio hæc propinetur pro una dosi, quæ admodum dissolvit sanguinem coagulatum.

Probè etiam conveniunt Mixture à Lapillis Cancrorum cum Acero defillato paratæ, expectando sudorem, quæ promoveat liberum sanguinis circulum: item saliva volatilis sanguinem resolvenda, & per sudorem blandam ventriasta, v. g. Ammonium diaphoreticum cum sale volatili cornu cervi, sale volatili Succii; vel spiritus cornu Cervi essentialis, item Liquor cornu Cervi fœccatus à gun. ut. ad xxx., qui est egregium sudoriferum, & in hoc casu admodum proficuum: Unde conducunt etiam Remedia à Mixture à SYLVIO prescriptæ Th. 2. Med. Prax. cap. 20. §. 2. pag. 180. seqq. ubi de motu sanguinis per pulmones impeditis: Quibus adiungat Characellum, Scabiosa, Bellis minor, Veronica, & similia: item omnia ferè Vulneraria sunt egregia in hoc Catarrho suffocativo, propter quoniam iular Alcalicorum solent absorbere Acidum coagulans sanguinem: ac omnia Remedia, quæ alia in casu ab alto usurpari solent, promovendo simili, quantum possibile, sudorem; quin & ubi Macilago viscida hæret in stomacho, aut Tussis, & Materiz per Laryngem transudans superveniat rejectio declinante Parotismo. Commode etiam Expectatoria usurpari possunt, inter quæ Raphanus, & ex hoc expressus succus cum pauco saccharo, vel alia inde Medicamenta parata, egregia conveniunt in hoc casu. Molesti finè latent artana sub hac Planeta, utpote cuius sal volatile est Vulnerarium omnibus aliis præferendum. In ipsa quoque suffocatione est commendata.

Datur Sympus ad ʒi. ad ʒi. sed legitime sit preparatus, siia Vomitus movet, in MELICHI Dispositario pag. 168. laudatur iemen Nallurli. Radia Ari, & succus ejus, sal volatile acri prægnans, insigniter conveni: Vel Acetum: in quo macerata fuit, commendat HELMONTIUS contra casum ab alto in congruam sanguine resolvendo. Hinc simili ratione conveniunt in Catarrho suffocativo, quoniam flagrantem sanguinem in Præcordiis dissolvit. In vulgari usu sunt Osmey Iquiliticum, item Acetum Iquiliticum, quæ tamen minus potentia: Gummi Ammoniacum itidem valde conveni, si dissolvatur in pauco Aceti, & propinetur in aqua Hyssopi: Unde spiritus Gummi Ammoniacum Acetum paratus etiam cæteris paribus est egregius. Mixture hunc in usum potest fieri talis:

ʒi. Aqua Hyssopi,
Scabiosæ, an. ʒi.
Succi Ari ʒi. vel Acet. infus. Rad. Ari ʒi.
Spir. Gummi Ammon. cum Viridi Mxi ʒi.
Syrup. Nivæ. ʒi.

M. F. Pæis, subinde coctionem usurpada.

D. S.

Potio Resolvens.

ZECHUS etiam in suis *Consiliis* & MERCURIALIS commendat in Catarrho Suffocativo Gummi Ammoniacum, si propinetur cum Osmey simpliciter, idque felici, uti dicunt, cum successe. Nota est etiam Potio Brunneri ex Gummi Ammon. ad ʒi. in aqua Hyssopi & Vini Rhenano. Hic etiam aqua Asthmatica Rudolphi, quæ est spirituosæ, & in Officiis prostat, permisceri potest. Hic Remediis commode etiam adducunt ex croco parata Medicamenta: Nam crocus est egregius in Catarrho suffocativo, & FREITAGIUS in *Arteria Medice*, inquit, quod Orthopneus infallibile Remedium fit. Et certe, uti crocus est anima Pulmonum, ita sanguinem sualem ac tenuem facit: ut tacem vires insigniter resoluas in croco, &c.

S E C T I O XV.

D E

CHYLI IN SANGUINEM TRANSMUTATIONE, SANGUINISQUE FERMENTATIONE LÆSA.

Quod attinet Chyli cum sanguine confusi decentem Assimilationem: ea supra dictis notum est, quod deferatur Chylus in Receptaculum commune, ut ex hoc in Ductum Thoracicum, confusus cum sanguine in Venis Aaillaribus tenens semperque subigatur, & tandem successively alteretur, ac Vitali spiritui imprægnatus in sanguinem muretur; quæ actio, speciatim *sanguificatio*, in pulmonibus inchoatur, & tandem per continuum motum, tam progressivum, quam localem, & agitationem cum Massa sanguinea absolvitur. In hoc eodem sanguificationis negotio Cor, ipsoque annecta Vasa, se habent purè passivè, & locum solum his liquoribus pro motu & transitu meliori concedunt; adeo ut Cor solum Antiam munere in Machina hac Hydraulica fungatur. Sanguificatio siquidem non est actio Organica, sed saltem Similaris purè; adeoque, propriè loquendo, nullum Corporis Viscus Organarum sanguificationis nomen meretur, sed Cor solum Vas erit ad Officina, in qua talis insignis mutatio succedere peragi solet: uti CHARLETON in *Observatione Animal. pag. 51.* & speciatim GLISSONIUS in *Anatomia Hepatis* habet.

Est enim reverà Cor nil aliud, quam Musculus compositus, ita quidem, ut semper Ventriculus propriè Cor appellandus sit, cujus appendix est sicut dextere Ventriculus, propter pulmones solentemque subigatur, & insar pulmonum, quæ in certa quantitate sanguinem vehit, ut per pulmones fiat melior & commodior sanguinis preparatio, pro substantia maxime necessaria ad Viam ab Aere altèrante, antequam finitimum Cordis subat Ventriculorum. De Structura & Fabrica Cordis vid. elegans LÖWENI Trajectus de Cordis, SCHNEIDERUS de *Cardio*, & ECCLESIASTES cap. ult. vers. 6. *Antequam rumpatur salubris arteria, & rumpatur vena aurea, & convenerit hydra sub iustem, & confringatur vasa propria cisternam.* & SACHS à LÖWENHEIM vocat Circulum sanguinis Oceanum Microcosmicum, quoniam tunc ECCLESIASTE cap. 1. vers. 7. *Qui omnes torrentes sunt ad mare, & mare non est repletum, ad locum, unde torrentes proficiscuntur, illuc ibi revertuntur.* ita etiam sanguis in Corpore nostro.

Chyli in sanguinem transmutatio, & sanguinis spiritusificationis, via alter præterquam per Fermentum aëneum, mediante quo chylus perfecit subigatur, & in maturum sanguinem mutatur, fieri videtur, ut dicitur in *Institutionibus*, de quo confer. KERGERUS Traict. de *Fermentatione*, item DEUSINGIUS Traict. de *Nutrimenti animalium Generatione Cap. de Sanguificatione*. Saltem dubium est, à quo Fermentatio hæc sanguinis permotiva chyli primario dependat: an nempe oriatur à fermento quodam spirituofo salino-volatili, in sinistro cordis Ventriculo radicaliter stabitante, chylum sanguini assimilante, & sanguinem in spiritum volatilifacientem id quod affert BACKIUS Tr. de Cordis, HELMONTIUS hinc inde in suis scriptis, in specie *Spiritus Vitalis, Sitis humanæ, Sanguinis digressio*; quo etiam facit sententia CHARLETONI, item GLISSONI *laci supra citatis*: An verò sanguis ipse, prout in se Principiis fermentativis, in specio salinis & oleosis volatilibus turget, & chylum permixtum transmutatur, & successivo sibi assimilare valeat? sic hoc afferunt NEEDHAM de *Fermento Tuto cap. de Bilechale*, LÖWENIUS de Cordis, item suo modo SYLVIUS in *Diffinitione de Sanguificatione*, ubi ostendit ex Hopate, & Lympha acida descendente cum sanguine et Vena Aaillari, talem ea utrinque concutit Effervescenciam oriri vult, à qua chyli in sanguinem transmutatio, & sanguinis vitalis calefactio primario dependet.

Pro decisione consideranda prima sanguinis generatio, quæ absolvitur à spiritu Genitali Maria cum spiritu Genitali Feminæ in Ovo iunctis: qui ut totum Ovum fecundat, & in eodem generationem, & formationem partium quarumcumque absolvit per Motum; ita ab hoc ipso spiritu, calore incubantis Gallinæ adjecto, eorum sanguinem primò producti impossibile non est: ita ut hic spiritus, dum movet particulas minimas Liquoris in Puncto fixante, easdem suc-

cessivo motu ita alterat, ut ex propriis texturæ materialis aptitudine, sponte quasi in talem Liquorem rubicundum abeat, qui postmodum novæ materiæ dispositus appulsi, & repetito per Cor, aut ejus rudimentum transitu, ab ipso spiritui Vitali, ex dicta materia continuo se multiplicante, ulterius augmentetur; adeo ut sanguis ipse, Vitali spiritui & Principiis fermentativis salinis imprægnatus, chylum in sanguinem muret, qui in pulmonibus ab Aere inspirato atqueatur & volatilifatur, unde insigniter spiritusificatur, & propter salino-sulphuream mixturam incalciscit sanguis, & vitali quasi calore incenditur. Ob id enim toties per Cor transit omnis sanguis: ut

1. Languidus & effluvia, spiritibusque depauperatus, in pulmonibus beneficio Aëris inspirati denuò existitur.
2. Ob id chylus tam longo tramite ex Intestinis per Ductum Thoracicum ad Glavicas ulque ascendit, sanguini permiscendus, ut eo propiè via ad Cor & pulmones deferatur.

Promoveatur insigniter hæc sanguinis Fermentatio, & consensuenter chyli Assimilatio ab Aere in Pulmones inspirato, cujus medio & attenuatur & volatilifatur, & propter sulphureo-salinam mixturam incalciscit, ac quasi vitali calore accenditur, Chylus autem sanguini permixtus confusus in Subclavis attenuatur, solvitur & subigatur, cumque coad cordis dextram Ventriculorum deferatur, ea quæ in pulmonibus erumpit; ubi tota Massa sanguinea, tam ex sanguine, quam chylis permixta consistit, per hos tradita, ea inspirato Aere penetratilis eius subesse, & mixti testatur salino-sulphuream dissolvente, insignem & maxime substativam Alterationem subit, dum insigniter rarefit, indeque intensiorem acquirit calorem, & ad volatilificationem ulteriorem insignem aptitudinem, simulque propter Salia ipsius dissoluta & rarefacta in Imperium abit Fermentationem, sub qua particule Massam sanguineam componentes, imprimis Acide & Urinose, in se invicem agunt, mutuique concursus se subigere, & tandem cum particulis sulphureis una permixtis localefcere, & propter salium volatilium cum sulphureis testatur rubescere incipiunt; Spiritus enim & Salia volatilia aënea, si cum spiritibus sulphureis digerantur, tinctorum suppeditant rubicundissimum; vid. DAVIDIS *Methodus BECKE Medicæ & Experimentæ circa Rerum Naturalium Principia*. Quævisque sanguinis in pulmonibus inchoata Alterationes continuatur, donec ad finitimum cordis Ventriculorum deferatur, eoque eo per Arteriam Magnam in universum corpus, quævis nempe ab Aere suscepta Alteratio persistit in eodem: chylis verò portiones una permixtis sub isto fermentationis motu, & simili motu una substat & permixta, pedecentim ita alteratur, ut tandem sanguini assatè assimilentur, permovente non leviter faciliorem Assimilationem chyli cum sanguine, Bile chylis in Intestinis permixta, ratione cum sulphuris & faciliorem cum sanguine unione, & faciliorem in tinctorum rubeam exaltationem acquirit; pari modo, ac Salia volatilia cum Oleis dissoluta dant colorem rubrum. Dum hæc ita sunt in sanguine, partes eius tenuiores ac subtileiores salino-volatiles oleosæ, cum Quarta quædam Effluvia, à crassioribus liberata, commodis ibi extrahant, magisque adimento Aëris volatilifatur & attenuatur, ac ita in veros spiritus Animales & Vitales perducuntur; adeo ut illa inspiratio Aëris fit causa, sine qua non possit fieri sanguificatio, sanguinificatio spiritusificatio.

Cæterum chylus unico per pulmones & Cor transitu in sanguinem abire nequit, ob brevem, quem ibi necit, motum: hinc evenit; quod si Cani saginato post 4. vel 5. passu horas sanguis detrahatur, hic refrigeratus chyli indolentia ingentem copiam coagulo Cruoris supernatantem exhibet; si verò jejunum Animal, aut plures horas impasum simili modo tractetur, nihil chyli in Cruore apparebit, sed serum nudum aqueum, quod tamen coagulatum, dære solet Gelatinam laicam, & nuc copiosius, nunc minus

copiosum, prout plus vel minus Chyli in partium Nutritio-
ne & sanguinis Assimilatione fuerit assumptum; vid. *LO-
WES RUS Traité du Cœur* pag. 222. & 229. item in *Wind-
hildius pag. 44.* id quod etiam facit spiritus Nitri dicto
sero insalutatus. Pertinet hac Gelatina illa alba, quæ Ve-
næsectione emissio sanguinis humano non raro supernatur, &
vulgò *Purpura* vocari solet, revera tamen Chylus est nondum
perfectè assimilatus; Unde etiam proflant res Observatio-
nes sanguinis albi instar Lactis ex Vena secta emissi etiam
in lanis Homines, ob Chylum scilicet nondum ritè assimi-
latum; vid. *RHODIUS Cœnt. 1. Obs. 36.* item *Cœnt. 3. Obs.
32.* *BORSELLUS Cœnt. 1. Obs. 75.* *SCHNEIDERUS lib. 3.
de Cataractis pag. 101.* &c. Observavit etiam *Dn. D. FRI-
SIUS*, sanguinem Venæsectione emissum per 3. vel 5.
vel 6. dies nunquam coagulatum, in Homine perquam sa-
no, nunc Muliere. Pro vario ergo usû & habitudine res
rerum Nonnaturalium, prout hæc ipsa sanguinis Fermenta-
tionem vel intensiorem vel remissiorem reddunt, ita etiam
Chyli sanguinis Assimilatio nunc celerior, nunc tardior erit.
Lympha evaporata relinquit Gelatinam chylum. Massa
ergo sanguinea per varia rura tam chylo constat, quam
sanguine propriè sic dicto, adeoque ex chylo in se homo-
geneo & univoco univoca Fermentationis actione nil aliud,
quam univocum etiam Sanguificationis generabitur liquor.
Falsum ergo est, quæ quatuor Humoribus omnino inter se
differentibus, quatuor Elementis, & quatuor Qualitatibus
primis, quatuorque Temperamentis analogice constare san-
guinem; Nam & differentes istæ partes, in quas separatur
Massa sanguinea Venæsectione emissæ, post sui coagulationem,
non adhuc inique sanguini, sed partim ab alteratione
per Aerem induta sunt) (al. ostium aëreum sulphur san-
guinis foras præcipitat, partim à sanguinis emissæ corru-
ptione & incipiente putredine; conf. *LOWES Traité du
Cœur* pag. 155. item *HELMONTIUS Traité des Scholæ
Humoriferae* Decept. Cap. 1. §. 45. & 47. item *FRACAS-
SUTIUS Epistolis de Cerebris* pag. 377. & 378. Vnde ergo sunt
omnes speciales res sanguine emissæ, prædictiones & rudia;
Optimam autem utilitatem Tonicioribus & Medicis afferunt.
vid. *BRUNONIS Nota super Testis Judicium de Sanguine
Venæsectione emissæ.* Sanguis enim in se licet homogeneus, &
per totum simile, in unoquoque tamen Homine peculiarem
& singularem usum habet Cras, ex radicali eius constitu-
tione, & sub Generationis primordialis missione oriundum, à
qua omnis Temperamentorum, ut vocant, diversitas & Idio-
syncrasie quamplurimas dependent; quæ sanguinis constitu-
tio, & inde orta attributa in Colore & Consistentia unicuique
propria, cum à nemine cognosci possit, sicut nec de san-
guine Venæsectione emissæ, so multum, vel parum à stata
naturali declinet, indicari potest; imprimis, cum brevi post
quæ corruptionem & putredinem notam extraxerit, qui
in Vasis adhuc fluctat, omnino facti dissimilis.

Chylus legitime ac naturaliter constitutus totus abire in
sanguinem apud natum est in Sanis; quod si verò hoc non
contingat, sed vel proprio vel sanguinis vitio depravatur,
partes eius excrementitias per Fermentationem separantur
à partibus reliquis, & quasi præcipitantur, seroque imbi-
bitæ & ab eo absorbentur partim per poros Cutis, parum
verò per Urinarias vias seceduntur, quæ in Sanguinem Urinis
claris & optimè aliis coloratis, circa fundum subsidere so-
lent. Præsupposito, fermentari contiùo Massam sangui-
neam, istaque fermentatione chylum successivè & repeti-
tus multis circuitibus sanguinari, sanguificari hæc, & ipsa
etiam *Massa Sanguinea Fermentatio, duntaxat imprimis leditur
modis* nempe vel *vicio Chyli*, vel denique *vitiis ipsius Sanguinis*.
Vitiis Chyli leditur, quando ineptus est, ut eandem hæc
sanguis per Assimilationem fermentativam: vitiis verò san-
guinis inepti, quatenus sibi laudabiliter non assimilatur Chy-
lum.

Primaria, & ferè ordinaria *Causa quorundam vitiis Chyli*,
hinc enim Cacochylia est Cacochymiz mater. Chylus enim
ex eo fermentando fiat laudabilis sanguis, debet esse salu-
to-volatilissimè subdulus, & consistenter tenuioris Lactis, seu
potius Seri Lactis tenuioris, simulque sulphure Bilis rubineo
sufficiens, licet insensibiliter propter admixtum Acidum,
quod omnia reddit pallida, tinctus, ut hoc ipso sulphure fa-
cilitas uniatur sanguini, & promptius incalcescat: debet etiam
chylus legitimus à scoris fæculentis in Intestinis esse sepa-
ratus: conf. *SYLVII Prædis P. 1. cap. 18. & 19.*

His tribus ergo in specie fontibus Chylus peccat, & ab
ipsis Cacochylia dependet: nempe
1. Dum non sufficienter digeritur & attenuatur, nec de-
bitè volatilizatur in stomacho.

2. Quando non ritè tingitur à Bile, ejusque sulphure oleoso.

3. Quando non ritè seceduntur à scoris beneficio foccorum
& Felis & Pancreatis. Hinc præter alia peccata in sto-
macho, frequentissimum simulque gravissimum vitium
Chyli est, quando non ritè digerendo volatilizatur, sed
est nimis hæus & viscidus, &c, quod eo pejus, ab it
Cruentitate Acidum; unde origo quamplurimum
Morborum Chronicon ex stomacho: Nam talis Chy-
lus vitatur Massa Sanguinea inguiscitur, immouitur
eius Fermentatio, & insipiscit, deinde talis succo
insalutari partes Solidae potius, quam revera na-
turatur.

Porrò cum insigniter variant & Bilis & Succus Pancreati-
cus in sua Crasi, facile patet, variam etiam Chyli in to-
talis à Fæculibus esse secretionem, nunc laudabiliorem, nunc
pejorem; unde nunc vitiosus, nunc laudabilis Massæ san-
guineæ Chylus transmittitur; de quibus *suprà*.

Hæc sunt Causæ, quæ ledunt Massam sanguineam vitiis
Chyli.

Massa Sanguinea vis leditur sanguificatione, quando ipsa
Massa sanguinea debet à naturali ac debita Crasi seminali,
unicuique individuo propria ac peculiari. Nam certum est,
unumquemque Hominem singularem ac sibi peculiarem ob-
tinere Massam sanguineam; quæ proprietates & singularis
Crasis ex Particularum seu Principiorum naturalium com-
positionum varietate & Crasi resultat: Unde tam multe Sy-
crasies, Idiosyncrasies & Proprietates emanant. Dependet
hæc Crasi Massæ sanguineæ formaliter, ut dixi, à Parti-
cularum seu Principiorum naturalium Massæ sanguineæ
compositionum ac de invicem habitudine; radicaliter verò &
essentially dependet à Parentibus, à quibus sub Conceptione &
prima Corporis Formatione, ratione Spiritus Genitalis,
in fœtum transplantatur. Uti enim idiosyncrasie morbi &
Crasi viriosæ communicatur à Parentibus, ita simili ratio-
ne Crasis naturalis fundamentum etiam ex Semine ejusque
fœturi vitali petendum.

Hæc inter Principia materialia, quæ componunt sangui-
nem, & ejus constitutum Crasim, eminent Particulæ salinæ,
Urinum, & Acidum volatile, intercedens sulphure
seu Oleo temperato invicem misce, à quibus continuo &
nunquam interrupto, simul tamen blando Fermentationis
motu, sanguificationis fermentum, iodeque eius in spiritus
transformatio & Chyli Assimilatio dependet. Denique
hoc præter, beneficio fermentationis nempe, à quod est he-
terogeneum in tota Massa sanguinea, excluditur & separa-
tur, ut per convenientiam crasim transformatum ex Corpore
evacuetur. Vitiata ergo sanguinis Cras, & salum debita
evacuata proportione, vitatur etiam & depravatur naturalis
ac vitalis sanguinis Fermentatio &c., vitatur Chyli Assi-
milatio, ac denique vitatis finci Massæ sanguineæ in-
quinaat, Fermentatio hæc leditur ac vitatur multis mo-
dis, in genere nunc.

1. Cum quodam excessu, vel periculosa quodam Effervescen-
tia: id quod dependitur in Pulsi Magni, Celeri &
Frequenti, cum insigni ut plurimum Corporis incal-
lescentia & ardore, ut imprimis in Morbis Acutis sub
Febris Ardentibus, Pleuritide & similibus obvium
est: nunc.

2. Vitatur Fermentatio Massæ sanguineæ, cum quodam
defectu, unde Pulsus Parvi, Rari & Tardi percipiun-
tur, Corpori debet debet Calor, totum Corpus est
torpidum & frigens, & insignis spirituum percipitur de-
fectus; id quod in Chronicis Morbis, Cachexiis, &
similibus apparet: nunc.

3. Variis modis depravatur Fermentatio, quare Pulsus tan-
tumnon iohis mutatur, ut fit in scorbutis, Malo Hy-
pochochondriaco inveterato, Paroxysmis Februm Inter-
mittentium, Passioem Hypericorum & similibus, in
quibus multiplices Passioem Inæqualitates perei-
piuntur.

Pro varietate ergo istarum in Fermentatione Massæ san-
guineæ differentiarum quamplurimas leasiles Corporis mu-
tationes oriri solent: ut Corporis nunc calet, nunc frigit,
nunc puller, nunc rubet; Alvus nunc est elaxa, nunc laxa;
& similia Symptomata, quæ Hypochochondriacos & scor-
buticos in horas fatigant.

DIAGNOSIS.

Signa, quibus suo modo proxime cognoscitur Fermenta-
tio sanguinis laesa, sunt *Pulsus & Urina*: Ille statum san-
guinis fermentantis, & eandem intra Arterias ebullientis,
ostendit: s de quo vid. *SYLVIIUS lib. 1. Prædis cap. 16.*
Hinc verò statum Sanguinis ex dicta Fermentatione resul-
tantis

eantis declarat. Fallit tamen atrumque interdum. Nam, ut caeam de Febribus Malignis, Pusillus subinde mutatur ratione Spirituum animalium Cor movementi; hinc enim in Animi Affectibus insignis est Pusillus mutatio, quatenus immediatè barrent in Spiritibus animalibus: Simus ergo cæteri, ne neglectis talibus fallamur. Urina vero fallit, quia duplici est: nempe Urina Potus, & sanguinis. Jam Urina sanguinis licet monstrat signa clara sanguinis, tamen ob admixtam Urinam Potus minus alteratur, item propter admixta varia, ex læsione partium urinariorum enata,

CAUSÆ.

Causæ itaque, à quibus vitatur hæc Sanguinis Fermentatio, sunt omnia ea, quæ efficiunt, ut Salia ita, Acidum & Urinum, debitam non observent harmoniam vel proportionem, nec cum reliquis particulis texturam. Quomodo vero, & quibus modis Sal volatile Urinum seu biliosum, Acidum seu melancholicum, in Corporis Animalis succis, & hinc in sanguine altentur & vicentur, supra dictum est, ubi Fundamenta generalia tradidi: item patet hinc inde in lib. 1. *Præfati* SYLVII.

Inter Causas vero, quæ Salia aliando sanguinis crasin lædunt, emittunt varia *Contagiosa*, quæ eunt præternaturalia Fermenta Massam Sanguineam inquinant, & imprima omnia extrinsece hærent, sive immediatè cum Aëre insperant, sive mediante certo fomite Corpori admoventur. Miasmata enim fermentando Massam sanguineam turbant, in eaque hoc modo se multiplicant; unde postmodum malorum Contagii Corpus affigunt, & se ulterius propagant. Si quid aliud, sicut *Contagium* ex Corpore morbofo aut Aëre hausta, Massæ sanguineæ Ratum insigniter turbant: Quibus & Vitiis, sanguis depravatus aut perfectum intervientum, labes ac neglecta officia accedunt. Ab omnibus his Massæ sanguineæ textura ac Crasis plus minus præternaturalis redditur, quia atteritur Salia, quæ eandem novis quasi saporibus addificant, & ita Fermentationem turbant.

Quoad *Causas Remotas*: Fermentatio sanguinis vitatur, si præcellerint hæmorrhagiæ: unde non rite peragi potest. Ea læbetatit etiam Viceribus potest vitari sanguis, quando illa se legitime non habent. Obstructiones ibi & scirrhi, aliaque mala adinut, unde consequenter defectus Fermentationis oriuntur.

Sanguine ergo his modis ita vitatu, aut viciosis Fermentis inquinato, adeoque saltem debita proportione corrupto, non tantum Chylus perversè affinitatur: sed propterea quoque totum Corpus ac quilibet ejus partes exinde plus minus inquinantur: qualis namque sanguis, talis etiam est totius Corporis habitus vel status; quod sanguis tunc modo est calidior, modo frigidior. Exinde omnia ea sunt, quæ de Temperamento partium Vitali earumque Intemperie vulgo dici solent, ut illorum ratione hic ad hunc vel illum Morbum inclinet: v.g. dum quidam ratione Temperamenti ad Morbos Melancholicos, Chronicos; alius ratione Temperamenti Cholericis ad Affectus Acutos febiles dispositus dicitur. De his Temperamentis, quæ originem ex Elementis deducunt, nihil dico: Nam Temperamentum & Intemperie fundamenta sufficiuntur sunt destruda; Quæternio semper Elementorum & Caloris Nativi Monarchia. Quæternioem expluit BOYLE in *Tract. de Qualitatum Originibus* & Calidi Nativi Monarchiam HELMONTIUS, qui vincit, quod scilicet Calor non efficitur, sed dispositivè tantum cooperatur. Nam, quid propriè Temperamentum sit Vitale, opinio explicat MARCUS MARCI P. 2. *Philos. vet. reg. Sol.* 4. pag. 131. dum inquit: Per Temperamentum non intelligi primas Qualitates, non hanc symmetriam: Verum consuetudinem corporis radicalis, ex qua velut effluat procedunt illa Qualitates, cuius radicalis constitutio potissima vis est in Sanguine, qui est proximam substantiam Animæ, ac primum universi, cuius præterea Corpus univèrsale videtur substantiam, utamque ex eo participare. Humidum vero radicale aut Languis est: ut vult HARVEUS, cuius ratio in ea radicatur. Et corpus sanguine delictum consilium ferit, nihilque in eis manet de Temperamento. Hæc sunt MARCUS MARCI.

Hæc ita se habere putet ex legibus Circulationis sanguinis, & æquali etiam sanguinis distributione in Partes proportionaliter facta, quæ omnia ea sanguinis Crasis, & hinc dependente Mora fermentativa, & inde oriendis Proprietatibus variis, tam sanguinis, quam Corporis, proximè deducenda sunt: quædam enim debita manet sanguinis Crasis, & hic debita Fermentatio incalcet, non potest non

etiam Corpus, ejusque Partes omnes æqualem & proportionatam habere Temperaturam. Unde patet saltem esse illam *inequalem Temperiem calidam Hepatis & stomachi frigidam*, quæ uti nihil possit fingi insalutis, ita tamen in Practicorum & Consultationum libris nihil occurrit frequentius: quin tamen in tali ut plurimum, si non semper, vitium est in stomacho. Sanè, dum sanguinis nimium incalcet, v.g. ex Motu, vel Febre, &c. omnes partes intensius calent; dum in Natura, vel Senio, vel Morbo, tepidior existit, similem Temperiem Vitalem, nempe Infusum, quolibet Partes experiuntur. Tanquam paradoxum Caliditatem sanguinis nimiam, Acutus præferim in Morbis notabilem, consideremus, quæ quidem ex audio Motu fermentativo omnium derivanda venit, sed primariò ob Acidum volatile, intensius cum Alcali oleo ebulliens, adeoque à Bile naturaliter seu subjectivè, ab Acido formaliter seu effectivè: dum verò minus fermentet & est Intemperies Frigida, id fit ex abundantia Acidi; itaque eo magis, ubi Chylus viscidus Massam sanguineam imprægnat. Propter & Aromata, & similia Calefacientia, Salia volatilia oleosa, Spiritus Vini, Olea destillata, &c. Calorem Corporis accedunt nonnulli ratione volatilis Acidi, communicabilis Contentis Corporis colli, itaque assimilabilis: e contra Acidum Mineralia Calorem temperant & imminuunt, ac per consequens refrigerant; id quod fingendo Acidum intensius, nobis non communicabili, Motum Humorum & Acidum volatile subugando, præstant; unde cessante debito fermentativo Motu, Caloris temisio observatur. Sed eo ipso, quo nobis non assimilabilia aut Contentis communicabilia existunt, Remediis, imo, sub inconcinnis dosi, Venenæ naturam affumunt, & hinc alterata in Corpore nostro plus minus, per vias urinas eliminantur. Hinc in quibus Acidum huius quasi, adeoque Constitutivis nostris præternaturale, casuperat, ut in Hypochondriacis, Melancholicis, Menstruis deficientibus, præsertim cum concursu Pituitæ viscidæ, & defectu Bili acrisioris, frigidiores observantur; adeoque variabile Acidum spirituosum, Contentis nostris communicabile, & quod horum fermentativum Motum promovere potest, quo plus adivum existit, eo intensius Calorem observatur, e contra Acidum huius, quod subigit & sgit illud Sal volatile acidum, & ita Contentorum fermentativum Motum plus minus inibet, Frigidior & imminui in sanguine Caloris Affectus existit. Cæterum omnis rerum Calor spontaneus ubique loquitur Motum intensiorem particularem minimam formaliter, Acidum verò agentis in Terreo plus minus alcalinum effectivè: in ipso igne adveniendi vias ab Acido reversa, oritur: Calcis vivas incalcit ab Acidi advivente dependet.

Hinc in omnibus Morbis Intemperies Calide mirè commendantur Acidia volatilia, qualia sunt succus Citri, Ribii & Berberis, Acetolæ, Acetofellæ, & Rubi idæi: Spiritus Salis, Nistri, Vitisii; Hepaticum rubrum, & similia Acidia; propterea quoniam Acidia præ cæteris corrigendo Sal volatile oleum, simulque Massam sanguineam blandè condensando, Effervescentiam nimiam inibent; e contra in Intemperie Frigida, ubi sanguis minus fermentatur, commendantur Aromata Salia volatilia oleosa, uti sunt omnia Aromata, Spiritus ardentes volatiles, Extracta Vegetabilium amarificantium, & quæ sunt similia ista.

CURA.

Quoad Curam, quæ Massa sanguinea, ejusque Crasis læsa, & consequenter ejus Fermentatio mutata, propter Salia à naturali constitutione degenerantia, corrigatur aut emendetur, ea fit per Remedia virtute salina operantia; in quo negotio imprimis observetur sapor specificus Crasis sanguinis plus minus vitatus, ut proximè per specificum Remedium curari queat. His de Remediis supra in *Gen. ratibus*, ubi de Dypticata sanguinis corrigenda est, diximus, & in specie confecti potest SYLVIIUS lib. 1. *Præfati* cap. 18. 19. 25. & 26. quæ meretur de hac materia ut legatur, modo corrigatur fundamantalibus ejusdem Hypothesis dubia, aut verius manifestis falsis, de motu Bili in sanguine sursum ad Cor, & bujus alcaline cum occurrente Lymphæ acida Effervescentia dēlectur, & saltem illorum mutacionum aut alteracionum operationes Chylis & sanguini plus minus immutatis applicentur, tunc egregium ulum per facilitanda Praxi habere possunt.

C A P I T U L U M

De Febribus in Genere,

Ad vicia sanguificationis lesæ, om̃ effectus ejusdem, pertinent suo modo Febres quæcunque, quarum doctrina maxime necessaria, & tantumnon fundamentalis; cum nullus detur Morbus ferre, qui non sit conjunctus cum Febre, adeo ut in proverbium abiit: *Nisi sine Febre mori?* Dicitur autem *Febri* à *Febru*, quod à *Ferreo* deducitur (V), vid. SENNERTUS de *Febribus* c. 3. German. dicitur *das Fieber*. Quò communior autem morbus frequentiorque est Febri, eò incitationem esse ejus Theoriam, & consequenter empiricam in plurimis esse Praxin, confirmat scriptorum Medicorum diffusio; ita ut ne binos quidem exstare sibi consentientes in hoc puncto inveniatis, ut propter ab alio in eisdem erudiiti poësis, quàm sanctantiam meam proferre, aut alios informare vellem, in qua tamen doctrina petra tractando me ita geram, ut propter amplitudinem materię non tẽam tempus refutationis illorum, quæ Authores hinc inde dicunt; sed ea, quæ fieri poterit, brevitate, spoliata omnium parvum studio, quæ nostra sunt, h. e. Practica, imprimis considerabimus, pro Theoria Hypothesin eligendo talem, quæ mihi videtur probabilis, & Praxi facilius accommodari possit, adeoque præ cæteris Medico utilis existit. Quid si tamen quis alius memet ipso accuratius rem attingit quod Theoriam & Praxin, ut SYLVIIU vestigijs insistant, horreo, Ego reliquis ferè omnibus anserpon vobisquæ commendo eum, qui certè solus, & facile, & accuratè tradat Febrium doctrinam, & quæ dicit in Theoria, sunt talia, quibus Praxi facillima & quàm mannalis & ocularis poësis sufficerit, ut in omnibus mihi non sitisfaciat (X) Videtur *quis Præcisè* legique possit GRAFFIUS de *Sanct. Pansæntis*, ubi quendam habet ex Hypothesibus Sylviani de Febribus; item *privatum Collegium SYLVII* *causam cum Tr. Hoffmanni de nro Lente* &c., quod quidem non vult per suo cognoscere. Et verum est, nimis confusè tractant omnia in illo; interim tamen plurima continet SYLVIO digna.

Definitur autem Febri, quòd sit *Altit Formamentum Massæ Sanguinis depravata*, in qua talis *Massa Sanguinis Crassa depravatur*; unde *non Corpori multa prominent incrementa*. Dependet autem a Fermento quodam naturalibus planè incongruo: Vid. KERGERUS de *Formamentis* 3. c. cap. 3 pag. 333.

Loco Genitis posita est *Altit depravata Formamentum Massæ Sanguinis*, quòd sensu Febri non referenda inter Symptomata; qui vero hoc Genus dupliciter, illè definit Febri per Morbum Inciternum. Nam quædam Fermenta à naturalibus aliis subintrant in sanguinem, necesse est, ut hæc ipsa Massa sanguinea etiam degeneret in alienam a naturali Temperie. Hinc per diversitate Fermenti febri varia etiam est *Massæ Sanguinis Dylcrasia*, Quare in immenium prolapsi sunt errorem Vereres, indifferenter designantes febres per *Inciternum Calidum*. Nam, uti verum sit, in multis Febribus deprehendi Calorem quendam excessivum, attamen experientia constat, sæpius contingere Febri abique notabili Calore, ut *infra* patet.

Inter omnia *concomitantia Symptomata* immorietur, nullum magis univèrsale occit, quàm *Pulsus variabilis mutabilis*. Et speciatim Febrium præcitant ex nullo melius potest cognosci, quàm ex *Pulsu nimis Frequenti Præternaturali*; Febri enim eadè monstrat. Dico autem, Pulsum debere esse *Præternaturalem Frequentem*, nunc magis, nunc minus, magis scilicet in Patayim Intermittentibus habemus liquidem & Pulsum nonnquam Frequentem in Junioribus, sicut &

præter hunc, nonnquam Frequentem post usum Vinu generosioris, itemque post Motum Corporis & nimia exercitia observamus. Ubi vero citra manifestam Causam Pulsus assiduis Frequens, à Causa istarna Præternaturali ortus, rectè signum Febrium Pathognomonium quærunqueque flaturit, cui postmodum adjuncta Symptomata varia certam Febrium speciem determi nant. Hæc est sententia SYLVII, quam, sicut frustra, renicere coarctat DEUSINGIUS, juratus SYLVII hostis, in *Tract. Difficilis Anti-Sylviani de Signis Febrium Pathognomonica*, ubi manibus pedibique vult resellere doctrinam SYLVII, sed frustra laborat. Constat autem hæc præter Praxin SYLVII boni 291 *Differentias de Febribus*. Attamen in Febribus Malignis non video, quomodo negantem hæc sententiam Sylvianam SYLVIIUS possit nominare holitem in Praxi; siquidem ad ipsum quotidie exasperimur, Signum Pathognomonium esse, quod nisi soli convenit Morbo, quò poito, ponitur Morbus. Accedit utiprimùm *Celeritas*, unde Celerem Pulsam cum inseparrabile cuiusvis Febri Signum, & quod quocumque alio potest, fuisse PIENS de *Febribus* P. 1. C. 2. pag. 12. Magnitudinis & vehementie ratione variat, quò major, eò melius siquæ laudabilis & æquib in sanguinis fermentative surge-feracitate ac spirituositate, Vehemens pariter spirituum infinitam vigorem unguens, namque rejici debet, adeo ut Magnus & Vehemens Pulsus semper animam reddat Medicum, in quocunque febriatam finem fuerit, sicut Parvus & Debilis nonnisi vel pericula argit, sub constitutione, vel Maligna in Febri adesse solet, & usque in partem lobefactuosam sanctam habere adest. Dura in quodam observatur in Febribus, idè anapnu fualio omne, quæ semper tensionem ipsomoditam Membrarum, in quodam loco pòs minus lataram aut intellatur, & hinc Arteriarum in dilatazione remittunt, & fibrarum aliqui spatio sequitur: unde in Febribus cum inflammatione partium Membrarum junctis, v. g. in Pleuritide ordinariè observatur, quòd & in Febribus quibidam Malignis, in quibus spiritus animales & genus nervosum magis afficiuntur, in quibus etiam citra sensibilem, de qua conquiri possunt Agri, molestiam. Pulsus plus minus Durus advertitur, pelmo utipar modum omne, cum Deliria Convulsiones & Moriem utipus inequali observari, semper bonus est Pulsus Mollis, generis nervi nimis mutatum habent, ac spirituum animalium debrium motum effluens, & ferè cum dolore aut tedi dolore notum esse solet; & tali est Pulsus utipus tualia in Febre sperari possunt: unde & Pulsus Undosus dictus, est Magnus, Vehemens, & Melli compositus, ordinarius immetisti Sodoris prodromus esse solet in Febribus; cum in Pulsu Duro val nullum, vti talem, qui abque euphorica, quali per vim Naturæ prodit, Sodorum obtinervi, & sicut & feras cutanas in tali casu tedi, poroque contractores hunc esse arbitrat; nisi Pulsus talis insigniorem partem consilium inflammationem sequatur, tunc enim Sodoris prodici & utiprimùm Pulsuum mutationes inferentes eliciantur. Communiter sapient Authores, Calorem præternaturaliter autum esse *Unionis Febrium*, eorumque, signum proprium, debnitens eandem per Calorem in Cere accensum, & hinc in *Sanct. Corpus per Arterias diffusum*. Verum rectè hoc negat SYLVIIUS, cum dicit Calorem nimium nullo modo esse de formalis ratione Febri, quia nec soli, nec omni, nec semper Febri conveniat.

Quæritur primariè in omnibus Febribus observabilia sunt Symptomata:

1. Mutatus Pulsus.
2. Frigus, Horror & Rigor.
3. Celer seu Altit plus minus Intensus.
4. Unda mutata, tum secundum Liquorem, quàm secundum Contenta.

Quod attinet *Frigus & Altit*: hæc non constitunt Essentialia Febri, sed ejus saltem viæ Producta, seu consequentia

(V) Febrem quidem à *Paritate distam voluit*: verum à Febrio as, quòd est Lustrare, Purgare, Hinc, ut ait Fe-
 stus, Februarius mensis distus est, quòd tum em hoc anni mensis, flammis ferventibus populus februatur, idè lustretur ac
 purgaretur; quæ etiam tempore populi passulis sacrificij circa sepelira, ac ensis facibus, cerejque incensum eret. Similiter
 quon Febri Calore voluit lustretur corpus, & sanguis universus ab inquinamentis, à quibus Calor accensum est, expurgetur;
 morbum hunc Febrem distam esse à quibidam creditum est. Sic ali Bellum Naturæ adversus Morbum Febrem appella-
 tur. An autem id semper verum sit, dicunt Practici. Utique autem Vox Febrio & Febri ab uno Ferreo ortum habet: nam
 quædammodum adhibet & ferventibus flammis populus februatur; ita Febriticantem corpus fervidum & quonque esse depre-
 hendimus. Hinc non immerito Febri, quæ est summo alla Ardens vulgi dicitur, & Hippocrate passim visum esse appellatur.

(X) Vera quidem sent, quæ de Sylvio Delebo ad Febrium doctrinam spectantia, dicit hic Auther, nec quod reliquos
 Morbos expectandis curandisque accuratissimè est, si quis alius, Scriptur Sylvius; nisi nimirum sui Triumphantis sustinentis
 fluxum sapissimè in transperum ageret: quod vitium familiarè est iis, quæ præcepta ingenua Hypothesi omnia per fas reser-
 va accoutumare nuntur.

questia symptomata) itant nunc consensum, nunc separatim, unum solitarie dominatur. Originem ducunt à duplici sale activo, Acidum nempe de Urinolo, quod fermentando & effervescente intensus Æstus inducunt, majorum vel minorum, prout oleosa magis seu pinguis & volatilis Mulla sanguinea extiterit: e.g. spiritus Vitrioli, si cum Oleo Terebinthinae destillato miscetur, Effervescentia per intensissima cum Ardore fumoso, propter sal volatile in Oleo Terebinthinae concurrente cum Acido Vitrioli, uti exposui *suprà*, ubi de Seda.

Æstus ergo omnis occasio est: ab Acido, sanguinis Crasim immanitate, & inde fermenti: ut in ejus Motum, hinc spirituum alterationem, & majorem incalcescentiam & fervorem inducunt; cum ipsi spiritus, forsitan certi volatilis ac subtilis acris ratione, caloris sensum in Animalibus undique diffundunt, quod tamen ulteriori considerationi relinquo. Et quidem ex Febres, in quibus sanguis simul alteratur, & ad Motum insigniorem fermentativum præternaturalem disponitur, intensiore Æstu committat esse solent; promissior, quæ primariæ ex spirituum alteratione accidunt.

Peccare autem in intensiore corporis Æstu, adeoque in Febribus, primario Acidum, probatur, partim, partim illustratur sequentibus.

1. In *Paludibus & Ulceribus*, & hinc dependentibus Febribus symptomatice, Vinum & quilibet Acidum nocet: quia Inflammationem in Vulture, & Æstum febrilem in corpore inveniunt. Quæ omnia præservantur & curantur interius per Lipillos Cancrorum & similia, & per externa Saturnina Acidum imbibentia. Eri enim Saturnus Chirurgorum Patronus, Vulturem & Ulcerum pathemata ab Acido enata curant, non secus ac caput mortuum Vitrioli Vulturem corruptionem tollit, ac loquatur HELMONTIUS, Acidum imbibendo & corrigendo.

2. *Pneumones, Anginae*, & quælibet Inflammationes Internæ, tam in principio, quam in progressu, ad suppurationem tendunt, Febrem continuam acutam juncunt habent, h. e. Æstum continuum intensum, jam vero Morbi hic extra controversiam ab Acido originem ducunt; hinc per Acidum absorbentia remedia promptissime curantur, v.g. Dentem Apri, Maxillam Lacil pilicis, saliva volatilis quælibet, Stercus equinum, &c.

3. *Erysipelas*, aliæque sponte sua, & a causa interna enatae Inflammationes cum Æstu & ardoris manifesto sensu, & non raro gravi juncta Febre cum externo ardore & ruboris perquam sensibili indicio, ab Acido originem ducunt; hinc præter internam modò dicta, similia exterò conducunt, Acidum illud absorbentia, v.g. creta, Cera, Antimonium, & Epithemata Saturnina, Lac virgine &c.; ablati per hæc in Erysipellate Acido, juncta Febria pariter evanescunt.

4. *Intermittentes Febres* ex causa viciata stomachi Cruditate originem obtinent; hinc Alcaia etiam, tam fixa, quam volatilis, ut sal Abinthii, & spiritus salis Ammoniaci, quam Testacea, ut Ostracodermæ, & specifiicum febrile *Cradis & Streptoligæ*, quæ illas curant, & Parosyllini Fermentum acidum tollunt; in Quartana speciatim Martialis & Saturnina, intensius Acidum absorbendo, conveniunt.

5. *Febres Catarrhales* dicuntur à Lymphæ acrimonia originem ducunt, quæ quod acidior fuerit, eo intensiorem Cephalalgiam, feriam magis Tussim, hincinationes Artuum graviores, & speciatim intensiores Æstuationes vespertinas, & nocturnas, & febribus infert: Unde & Volatilibus, spiritus salis Ammoniaci, imprimis anisato, Liqueore cornu Cervi succinato, optimè curantur, acidum Lympham corrigendo, item Opiatis vitiatum Lymphæ motum suspendendo.

6. *Parula* non secus ac *Morbili*, intensissimum Æstum juncunt habere solent, qui erumpentibus illis cessare confuevit. Acidum aurem in Variolis peccare, præter Symptomata ab Acidi acrimonia & erosione nata, v.g. suppuratio cutis, in foveas erosas, interdum Ossium caries, Pulmonum exulceratio; cura per Absorbentia, per Invertentia, saliva volatilis, Tincturam Antimoni, &c. abundè confirmat.

7. *Arthritis* quælibet præsertim vaga, & hinc etiam fixa, nisi hæc nimis inveterata fuerit, cum febrilibus Symptomata plius modis ingruit, & præter Æstum, in vagâ subinde ardorem insensum, Pulsum celerem & frequentem excitat, scilicet Acidum, uti in Arthride dolores excitat, ita & Æstum & ardorem infert febrilem.

lem, unde & Acidum devictum, dolores evanescunt, & ardores extinguuntur. Confer. TACHENIUS *Hippocrate Chym. Edit. 2. pag. 417*.

8. *Febres illæ, quæ ex varicella vel trachia Adultorum, vel Acheribus Infantum oriuntur* continuæ & subinde admodum periculose sunt, in Infantibus etiam stuporinum cum Diarrhoea juncunt, ab Acido salis phlegmatis viciato originem habent, adeoque superiora confirmant.

9. *Febres læta* quasi Hæctica, ex *Utriusque* pusculam internam, speciatim Pulmonem, nata, & à Sanie purulenta originem habent, id confirmat. In Sanie autem purulenta acce imprimis considerandum, & hoc visiosum, sed acidissimum hinc læta sanguinis Crasim vitatur ejus Fermentatio & Æstuatione.

10. *Infantes* ferè Termina patiuntur ex Acido Lactis vitiatum, cujus teiles sunt Excreta viridia, item semipurulenta: hæc si diutius durent, loquatur Æstus febrilis totius corporis; interdum satis continuas quoque itidem occasione Acidi excitate superveniunt Convulsiones: sed destructo Acido in primis viis per Absorbentia & Volatilia, omnia ista cessant.

11. *Urine* videtur id illustrare. Hæc in Febribus intensius tunc & perquam rubre observantur, & quod intensior verat Æstus Aegros, eo magis flammam & rutilantem contrahunt colorem, alii turbentur. Declinant Febre, ac deservescunt Æstu, naturali citrino colore denudè apparent. Intensorem hunc colorem ab Acido esse, mechanica Chymica docet, cum ab Acidis infusillatis, spiritus Vitrioli, Nitri, Sulphuris, Salis, etiam Aceto, Urine intensius rubescant, quæ ab Alcali, Oleo Tartari per deliquium, Lixivio Cinereum clavellatorem, &c. aut nonnihil palliescant, aut saltem nullam in colore mutationem patiuntur. Scorbaticorum Urine subinde intensissime tinctæ sunt abique febrili Æstu, ab Acido saltem laesurante, Urinam ita alterante.

12. Symptomata, quæ à *Vitiis abusu*, v.g. Rhenani, accedunt, ex Acido tartareo volatili imprimis originem ducunt, v.g. Oresis, Æstus Corporis, Cephalalgia, Pulsus febrilis, &c. similia ferè Symptomata Febrium; hinc spiritus salis Ammoniaci, vel Pulveres Precipitantes, Os Sepiæ, vel Lac ipsius illa compescit.

13. *Æstuationes vagæ & phlegmæ*, quæ Hypochondriacis assilunt, ex Effervescentia in primis viis, ab Acido primariè excitata, originem ducunt. Hinc Precipitantibus dilutis, Corallis, Eboræ Alcalibus fixis, &c. ferè curantur, & correctio Acido emendatur.

14. Similia observare possemus in Seda sed *Ardore Stomachi*, Æstus ille ardore unde, nisi ab Acidioribus causa hoc Precipitantibus correctio, Soda etiam e-voicit.

15. Considerationem etiam meretur, quod TACHENIUS in *Hippocrate Chym. cap. 28. Remedia Hygientia Calida*, Acido prædominante, Frigida verò Alkali superante dari assilunt. Sanè calida omnia, resinosis substantiam obiectæ, eamque acrom, in qua vis calefactoria residet, adeoque oleosa substantia ab Acido concentrato gaudent. Hinc Resinosa vel liquescentia in Oleo, vel destillatione resoluta in spiritum ardentem, intense calefaciunt. Porro Oleum destillatum cornu Cervi aut Terebinthine, in forma propria assumpta, calidissima sunt per digestionem verò cum alcali fixo in aliâ volatili mutantur, quod macrum (purum) necolestum, nulla caloris vestigia exhibet, calido i.e. pingui acido in salio suo remanente. Sanè sæpius observavi in Febribus intermittentibus Æstum & Ardorem ex usu spiritus salis Ammoniaci simplicis, aut Parosyllini exhibiti, motum remissile.

16. Illustrat negotium nonnihil, quid Ardoris ille sensus, qui post *Combustionem* ab ignis subtilis remanet, sit ab Acidi spiculis, in parte læsa relictis. Unde per Saturnina, per alcali Animalium, Sperma Ranarum, Urinam humanam, spiritum salis Ammoniaci, &c. promptum levamen & refrigerium.

Videtur ergo Æstus arri occasio aliter ex Acido præternaturali, volatili tamen, seu tali, quod sanguini commensibile nonnihil naturalem ejus Fermentationem turbare, & cum particulis alcalinis & oleosis præternaturali quasi Effervescentiam constituere possit. Sub qua & ipsiusmodi *genio acris* quasi, hincque calidiores & fervidiores existunt, à quibus cum sanguine per universum Corpus ex Præcordiis Calor diffunditur.

Equidem plures ex Bile Ardens rationem, tam naturalis, quam præternaturalis icterilis, derivare amant. Sed (1) an a Bile oriatur Ardor iste? dubium est. (2) Posito, ex Bile cum ætri; quæritur, quæ ratione fiat? an magis ab eius Oleo, in recessu Acido velatit impregnato, an verò ab Alcali (siquidem id extra Artis opem Bili formaliter possidet) ejus origo fit? Unde (3) in Febribus Intermittentibus, quæ quædam sunt Continuae sunt, quos Paroxysmos habent, Amara, Resinosa, Bili magis analoga, & hinc Alcalia volatilia tam profusa sunt. (Y)

Observetur autem hic *Galeria duplex* in Febribus Differentia.

1. Est vel Humidis, vel Siccis,

2. Est vel Acuti, vel Aleti.

Humidis seu Vaporosis aliis dictis semper melior est Siccio. Oritur à junctâ Copiosa Transpiratione, quæ setè prælopiunt Cutem mollem, & ejus fibræ minus sunt tensæ, & offendit talem febriem in sanguine commotionem, quæ copiosè succedat, & mediante Sero emittantur particule heterogeneæ separatæque ejus oculæ.

Conterarium fit in Siccis Calor, quo Cutis arida & quasi squallida deprehenditur, ac inordinatam particularem in sanguine Fermentationem, & insigne consensum spirituum, præsertim animalium, præternaturali impetu ubi pluris minus stringente, innotuit. *Milis Calor*, vel Aeris seu mordax, Crasso sanguinis & spirituum loquatur, qui minus acrioribus particulis salinis, præsertim acidis effervescentibus turbidus, Mitiores; in copiosioribus aut acrioribus istis fit impregnatus, Aerem, ad talem mordacem, tanquam si igneæ particule tacti se infundant, Calorem reprobent.

Frigus, Roror & Rigor, nonnisi gradualiter differant. Frigus quod attinet: non rarum est, quod Febriçantes conquiescant de Frigore, & multo magis de Horrore, utut ab alio calidi obveniant; ut licet extremæ Manus partes, Pedes & Nasus, Frigus adhuc contrahant, inter pallescant, ac Ungues livescant, Corpus tamen ipsum calidum plura minus observatur: nempe membranarum saltem partium pathemata hæc tria sunt, quæ ab Acido febrili vellicata Motu convulsivos patiuntur. Unde porborum gradualis Differentia, si leviores sunt, & via tali appellatione digni, in quibus saltem fit Cutis aspera, *Frigoris* sensu interdum imponitur *Ægro*; si graviores sint, ita, ut sensibilibus convulsionibus quantantur Membra, & per consensum simul omnium afficiantur Musculi, *Rigor* existit; modio modis hic habetur, *Roror* dicitur. Sane interdum tam gravis est Rigoris infusus, & tanta convulsiva Membrorum extremorum & totius Corporis convulsio, ut Epileptica similes concutiantur. Frigus hoc oritur ab Acido, dum Acidum, quamvis suo modo præponderat, coagulando Sanguinem, & ejus motum quodammodo sistendo, & quidem primario vellicando partes nervas membranarum Corporis solvi, in specie circa Præcordia, horum spasmos & convulsivam vibrationem inducit, quæ sub forma Frigoris, item Horroris percipitur, ut in Quartana.

Afficiuntur autem sub hoc Rigore qualescunque sensibiles Membrane, non Panniculi saltem carnosus, quæ plurimorum est opinio, sed etiam aliz quævis Membrane, tam Abdominis quam Viscerum inferiorum, Venteris nempe, Intestinatorum, Mesenterii &c., & aliz quævis. Cum enim sentiendi vi possent excutiri, si ab Acute, in specie ab Acido, irriterentur, Rigores sunt. Nam, quod obiter innotuit, omnes Membrane comparat & colonium sistent, quatenus oriuntur ex Membrana Cerebri, undè & omnes cum Cerebri Membranis consensuunt; si nempe una illarum convulsivè quid patiatur, totum nervosum genus in consensum trahitur: de quo Membranarum consensu vid. *Aureus in Tractatu Anatomia Cerebri Willisiana annexo*. Hinc in Colicis Doloribus Rigores frequenter accidunt. Abscessus itidem quilibet interal, dum rumpuntur, & ita Membranas, quæ eas ambiunt, perloquunt, Rigores superveniunt. De hoc vid. pluribus tractati P I E N S Tract. de Febribus Part. 1. cap. 7. pag. 394. & sequ. Sane Rigores & Horrores, qui Intermittemibus inchoant Paroxysmos, nonnisi ea Præcordia, seu partibus Membranarum in primis visis affectibus excitantur, ut rectè docet FERNELIUS *Parthol. lib. 4. cap. 10. pag. 241.*; quod etiam de illa asserendum, qui in Principio Febrium Continuarum contingunt. Illi verò, qui

in Continuarum Febrium cursu, tam Benignarum, quam Malignarum, accidunt, & præsertim circa statum Morbi asfigunt, ex irritatis & hinc qualitatibus Membranarum cæternis, interdum & subcutaneis, setè contingunt, & in Febribus Benignis Sudoria, præsertim critici, prænotantur sunt; in Malignis verò Excretionis intercurrenæ, Purpuræ, Pustularum & similibus sunt indices.

Ea dictis patet: attendendam esse naturam, & efficaciam Salium, eorumque motum consensum fermentativum, & Effervescentiam, cum ex hac Salium activitate & mutua actione, utat instrumentaliter, tota Febrium Theoria & Praxis deducenda sit: Cons. nobillem POTERII *Encheiridion lib. 1. de Febre. cap. 23. pag. 29.* ubi Salia infusa in Maltâ Sanguinea reperibilia, quæ consua infusum Effervescentiam concipiunt.

Nam ergo de Effentia Febrium Calor, sed tantummodo Symptoma consequens utplurimum Febrium: sicuti hoc urget HELMONTIUS §. 4. cap. 1. Tract. de Febribus: Ubi producit Cæternas Febres, quæ citra Sitem, & manifestum Calorem acciderent, i. e. quæ ab initio, ad finem Vite quoque, abique Calore suam peragere progrediuntur: sicut & in Principio Continuarum Febrium & Paroxysmorum Intermittemium Horror & Frigus invadat Ægro, nullo præterente Calore. Nec convenit soli Febri Calor, cum alias etiam multis in Affectibus interdum Calor, utat non semper ad sit Febri; quin & dantur Febres Malignæ, in quibus nil minus quam Calor est molestus, cum Pulsu astuprimum Frequenti & Debili, Parvo & Tardo; quæ tamen sunt omnium pessime & letales: contrà necom est in Febribus Intermittemibus, Calorem & Frigus promiscuè apparere solere. Nec omni convenit Febri Calor, quæ dantur etiam Febres planè Frigide, quæ Frigore & Rigore plus minus molestæ sunt, abique Assuetudine superveniente. Paradoxon hoc videbitur multis; Exempla tamen aliquot videlicet in SYLVII Disp. 9. de Febribus §. 13. pag. 167., quod nempe observati sint Ægri, & sua & adstantium consensu febriçantes, atut ipsi nihil unquam Caloris, neque ante, neque post Paroxysmum accesserint, frustra se opponente D E U. SINGIO in Disp. 1. Anti-Sylviano §. 52. Cons. de tali Febre Frigida BARTHOLOMÆUS Crenor. 3. Ep. 293. 296. 302. KERGERUS de Fermentatione Sect. 3. pag. 229. & HELMONTIUS loco jam citato. Nec rarum est, Febres Intermittemes distoratas sola Frigore, & aliqui Rigore flatu temporibus invadere, sine eo, ut nullum vel levissimum veligium Aëlis superveniat. Quinimo in lediosis Venerum lumbide etiam Exempla prolata observatarum Febrium Frigidarum non tantum in HIPPOCRATE, sed etiam AVICENNA, qui AVICENNA affirmat, dari Febres Frigidas abique Calore; loca AVICENNAE & HIPPOCRATIS allegata prolata in ROLFINGIO de Methodo curandi & recurrendi Febres in genere cap. 13. pag. 636. 757. Et ipse tamen GALENUS jam suo tempore observat Horrores & Rigores febriçales abique ille subsequente Calore, uti videbitis allegatum in Observationibus SCHENCKII lib. 6. Obser. de Febribus pag. 636. & 757. in specie, aliisque Prædictis; quinimo similia Exempla in Praxi quotidie occurrunt. Exemplum Febri calis Frigide & mihi aliquando contigit observare mense Aprilis hujus Anni in Viro Scorbuto, quales sunt utplurimum hujus febriçantes, quod Exemplum pro meliore fide hic lubet adducere.

Erat hic Artifer, qui laborat perfecta Tertiaia, seu recurrebat Febri tertia quæque die, anticipando semper duabus Horis cum nullo subsequeute Calore. Quod cum irratione Subiecti, patiens erat insignis Scorbuto; Paroxysmus ingruerat maximo cum Rigore, & gravissimo Horrore, ultra horam integram durabat, postmodum, cum deberet succedere Calor, nullus omnino appareret, quin loco Caloris, atrocissimi Dolores totum Corpus onnesque At rurs cruciabant, in specie regionem Dorsi lumbarem, in & circa cæterum Mesenterium, & Femora. Cum his Doloribus sensim solvabatur Paroxysmus circa omnem Calorem & Attorem; circa cujus hominem subinde Materie viridissima, tæterrima tamen & amaricatis supior Vomitu eiciebatur. Urina erat insigniter turbida, pallida & crassa, cum copioso sedimento, simulque arenulis, seu potius salibus scorbutois, matule affinis: Paroxysmi observabant ordinarium typum. Vocatus ego, cum jam ab Uxore purgatus esset, curavi eundem

(Y) Nescio quidem an d Bile Aëlis Febribus oratur; & si d Bile, adhuc dubium est puro, nam d Bili sibi acido, an ab illius alcali. Utud tamen certo scio Ardentium Febrium maximum Calorem, atque intensissimum Corporis Aëlis Acidissimum potius maleri, & compesci. Invisi Antifebrilis remanet numerus, boni parca inventus ex Acidis Strophilibus compescit.

eundem atemperando acidum ¶ de rationibus plura, ubi de
intermittente Tertiana: v. g.

℞. Tartari vitriolati ꝑ.℥.v.

Lapilli Cancri ꝑ.℥.xii.

M. l. Pulv.

Propinabatur ante paroxysmum, qui tunc erat quartus.
Post hoc remedium, & frigus, & dolores insigniter remi-
nuerunt, & quidem blando iodore fuscioribus, absque tam-
en insigni incalcentia corporis, potius erat sudor subfrigi-
dus: Post paroxysmum, & sudorem Vomitus ordinarius
sequebatur. Die intermissionis propter radicem scorbuticam
prescriptum est:

℞. Spis. sal. ammon. ℥i.

Cochlear. ℥i.

Misc.

Hujus mixturam recipiebant 30. 40. vel 50. guttas bis in die
intermissionis, mane & vespere, semper biborium ante pu-
lum, & die sequenti paroxysmum tantundem, biborium ante
paroxysmum, in liquore tepido. Paroxysmus subsequens
idem habebat frigus ingens absque calore: sed dolores in-
signiter remittebant. Die ergo intermissionis continuave-
ritur spiritum: tertio paroxysmo ad quem vocatus, præ-
scripti:

℞. Salis alijum. ℥i.

Lap. Cancri ꝑ.℥.v.

M. s.

Mixturam Sal Febrile.

Affusum per biborium ante paroxysmum, & sic paro-
xysmus non amplius rediit.

Die intermissionis continuavit dondu mixturam spiritus
Salis Ammoniaci, & cum adhuc semel per meliorem sanita-
tis confirmationem Salis Abisimii cum lapillis Cascorum
tempore paroxysmi simpliciter, ubi non apparuit febris,
sicque egger convalescit.

Certum ergo est dari febres frigidæ: utur hoc multis vi-
detur paradoxum (Z). Et verè etiam similes febres absque
calore infestas videbimus in ZACUTO LUSITANO lib. 4.
medicor. p. 168. lib. 1. & etiam lib. 3. p. 168. lib. 1. p. 168.
pulsus autem mutatus inquit naturaliter, quando vel spi-
ritum autem Cor movemur, vel actum sanguinis in
precordii turgentiam, & fermentationem, occasione
cuius Cor nonnulli irritatum spiritum provocat motum,
hinc lapsus vel frequentius se contrahit, & ita pulsus fre-
quentiorem facit; hinc etiam ex fermentatione præternatu-
rali sanguinis irritatum cor dat pulsus frequentiorum, qui
insultu febrem. Ex irritatione igitur frequentia & colericæ &
ex impetu spirituum vehementia, & sanguine irritato plus
minus turgente magno: de quibus infra suo loco. Ve-
hementis pulsus semper bonus estimandus, qui robur spi-
rituum movemur offendit, licet etiam nonnullum ex irri-
tatione sanguinis & spirituum fiat, conatum expellere quod
nosum est, ut initio dolorum, & in conspectu Critico, ut lo-
quitur POTERIUS lib. 1. cap. 17. de febribus.

Oritur ergo, seu potius consistit febris formaliter in fer-
mentatione sanguinis præternaturali, eoque insigniter depravata,
seu, ut ahi loquuntur, disproportionata, subinde simul in-
signiter acta, adeoque interdum ejus quasi effervescencia,
eius occasione & alterantur spiritus, & rarefacti magis im-
petuosiores & intensius localiscentes redduntur; unda à
fermento peregrino, nunc sanguinem, nunc spiritus, nunc
utrumque immediate afficiunt, quo depuretur massa sangui-
nis, aut separetur, quo ipsi hostile de præternaturali exis-
tit, id quod confirmant omnia circa febres observabilia: in
specie pulsus, ætus, Diarrhoea in his frequentes, nonni-
per actum massæ sanguinis motum explicabilia. Uti enim
sanguis naturali fermentatione volatilis in spiritum, &
restituitur assimilando chylum, & depuratur per fermenta-
tionem, foras excrementis per urinas ablegando: ita
ubi vitiosus fermentatur, ipsi præces naturæ ebullit ex effe-
vescit, ut inde motus insignis arteriarum observetur, & cre-
bra pulsus præsent est febris.

Omnia igitur febri est motus naturæ, seu, ut aliis di-
citur, quædam ejus ludæ, quæ spiritum plus minus altera-
torum: opæ id, quod hostile seu inimicum & conomus an-

Tom. II.

mali existit, eliminare fatigat.

Pro hujus fermentationis præternaturalis varia ratione
varie febrium differentia, varique iis adjuncta sympto-
mata reverè oriuntur. Quod consistit febris in tali sangui-
nis præternaturali fermentatione, consuetur prater SYL-
VIUM WILLISIIUS de febribus, item KERGERUS
Tract. de Præternaturali febribus cap. 3. pag. 231., item
CÆSAR MAGATUS in Considerationibus Medicis Qua-
simo 1. pag. 17., item ZIEGLERUS Tractatus de Fermenta-
tione, & SCHOCKIUS in suis Tractatus de Fermentatione
cap. 25., qui negat quidem febrem esse fermentationem,
sed effervescentiam: Verum vos non terreat SCHOCKI-
US, potius criticum agens quam medicum, adeoque con-
tendis magis satisfacere Philosophis, quam Medicis. Sed
hæc obiter.

Quid autem febris essentia reverè consistat in tali præ-
ternaturali sanguinis fermentatione, multa confirmant quo-
tidie circa febres observabilia. Et quidem.

1. Ex obvia frustanea recentium horarum facili oritur
febris propter insignem horum fermentescibilitatem,
& intermentes simplices sunt duplicata; hinc etiam
nonnullorum diuturnas, & dyentericas inducunt: Imò
liberata aliqui à febribus, & fructibus horis, aut
eorum kinamatis ex eorum succis paratis, aut po-
tuleis facili fermentescibilibus, nimis delectetur, fa-
cile pati solet recidivas, unde & scorbutici ex usu pru-
eorum, vel succis crassis expressis facillime Amicco-
butionem Nalburii, aut Cochlearis utentes, propter
horum Fermentationem febres intermittentes incur-
runt.

2. Hinc est, quod prohibita Transpiratio introducitur fe-
bris, quæ poris clausis vitiosa Salis coarctatur, ut ne-
queat evadere. Nam id, quod alias transpirat, ubi
supprimatur, necessarii regurgit in massam sangui-
neam, quæ evadit ad turgentiam usque infarcta, ta-
lem fermentationem, & effervescentiam concipit, tan-
dem in febrem ardentem erumpit. Nam hoc certum
est & SANCTORII, quod anno die naturali, seu 42.
horarum spatio, plus aspiresimus insensibiliter, quam 15.
dierum spatio per alvum deposuit, aut per urinas
reddidit.

3. Plura febres oriuntur ex contagio æstivæ infesta-
tis. Nemo vero naturam Contagiorum melius poterit
explicare, quam is, qui naturam fermenti & fermen-
tationis in contagio concepit. Dum enim sunt febres,
quæ sunt contagiorum multiplicativum, suum vim ob-
tinent beneficio fermentationis, facile apparet, quod fe-
bres producant, in simili fermentatione consistant. Vid.
KERGERUS, qui satis est elegans, uter Theoria
adhuc sit manca. Nam in fermentatione respiciendum
ad Salia, Urinam feracem & acidum, sine quibus non
fieri potest explicari.

4. Veterum Putredine, quam tanquam causam febrem in
febris hinc putredinis dicta adducit (vid. SENNER-
TUS cap. 1. de febribus) non potest concipi, nisi cum
WILLISIO, SYLVIO, cæterisque innumeris recen-
tioribus per fermentationem massæ sanguineæ expli-
ceatur.

Facile nobiscum potest conciliari POTERIUS, qui præ-
reliquis Veteribus lib. 1. de febribus cap. 25. Febrium ellien-
tiam satis concinne exposuit, ubi asserit: ubi in massa san-
guinis substantiam spiritus salis cupisdam cum dulcedine quadam,
& aliam tandem amarum: quo substantia amba alia sui frigi-
ditate, & talis nihil quicquam caloris percipiunt. Ad ubi
terris vase permixtum, tantus calor ex fervore excitatur gra-
dus, ut vix modo manibus contineri possit. Sed, quod magis
adhuc est, ex utroque materiam & frigiditatem exco-
ritur, ut nihil magis, quam bellum, excitari possit. In hoc consistit
vix quidam iter ut utroque spiritus, non sine gravissima qua-
dam ex. Quatenus igitur per putredinem subtiliter Mater
quidam inoffensivæ fermentationis, dependens à reactione Salium
diversorum contrariarum, facile poterimus consentire cum
Veteribus: quatenus verò per putredinem subtilitelligit
motus quasi plane destructivus, in quo partes contrarie in

H b

tan-

(Z.) Quid si diuersi frigidæ impellat Febris, Febris veras non esse, sed morbum Febris à diametro oppositum?
Sane si Morbum ex causa præter naturam sanguinis fermentatione Febris vulgo vocamus, hanc causam ratiore Morbum ex
inimicitia & quasi deficiente sanguinis fermentatione pendemus, Febris quoque vocamus appellabimus. Nonnullum enim
ex partem internarum necris, atque hinc ex totius Massæ sanguineæ gangrenæ, Corpore universum rejecti, imò frigi-
dum sudore perfundimus, cum Pulsus variis prout quæ calidioribus, agere ad mortem tendente: hunc Morbum, deficiente
suntasse propriè vocamus, Febrim, & quidem Leipyrium vel Malignam, dicimus: Iure-ne an injuria, dicam accuratio-
res Medici.

tantum concitantur, ut corporis praeputii structura penitus inverteatur, ut loco exempli in Ikenam HELMONTIUS produci Gangrenam, extenuis locedimus à Veteribus. Redde de ea aliorum HELMONTIUS l. 2. cap. 2. de Febribus: omne putridum esse mortuum; Cruorem autem atrum, humidum, viridem, non testari sui corruptionem seu putredinem, sed solius effervescitiae aut turbulenta fermenta signa praebere: quondam enim corporis partes vivaces sunt, putredo proprie dicta locum suum habere potest. Hinc v. g. SENNERTIUS l. 2. ut statuit & explicat adhaec febres putridae per putredinem; tamen in eorum explanatione hinc inde fermentationis, Ebullitionis, & Effervescitiae vocabulo utitur, quae cum putredine confundit; imò, ubi graviore controversie dirimende sunt, semper ad effervescitiam, Turgescitiam, & ebullitionem confugit, ut huc quasi per transitum viderit, quod iam dictum est. Conf. etiam PIENS de febribus pag. 236. par. 1. Rem exponit simili maxime accommodato seu adhaerente praedicta HELMONTIUS, delirio de Vico turbato, dum vis florer, non enim corripitur idem, quippe subleto turbine, repleverit sponte; vid. §. 28. cap. cit.

Utrum quod attinet; Tinctura haram intantum ab acido praedominante, & hinc ceteras particulas magis concentran- te, originem ducere supra insinuat fuit, ubi de ardentibus: & ab hoc acido plus minus exaltato aut enervato, & saturato etiam collodis, & crudis materiae moribundae in sanguine ratio, ac in urina loca dependent; de quibus infra ubi de Signis.

PARS AFFECTA.

Subiellum febri primarium, seu pars affecta in omni febris, non sunt Vala maiora & minora, non Cor, non aliud quoddam Viscus, sed omnes febres sunt in massa sanguinea, & spiritibus insitis, qui vitiosa massa sanguinem sem fermentatione, & omne maiori vel minori Ebullitione, quam circulatione alterati, omnia illa pathemata inferunt, quibus febricitantes corripuntur: vid. HELMONTIUS §. 29. de febribus, qui etiam §. 28. hoc illustrat Exemplo suo, delirio à Spina querna digito insisa. Sanguinem afflicto, praeter alterationem pulsus supra notatam, & sudor, hinc quo nulla febris perfectè iudicata esse curata dici potest, & coctio ac eradica materiae in sanguine continet, perque urinam manifestatur, & iterum febribus facile supervenient, & alteratio insignis sanguinis, quae post absolutas febres observatur, eod. magis, quod diuturnius febris extiterit, tamen indolem aciem exinde acquirere reddi dicitur à MAJOW tract. de Cordis pag. 259. confirmat: unde etiam ex urina & pulsu tam elegancia in febribus benignis habemus hanc Diagnostica, & Prognostica, quatenus scilicet haec immediate sanguinis Fermentationem, & inde peculiarem eius statum ostendunt, quod fieri non potest, nisi in febribus simul massa sanguinea afflicta fuerit. Spiritus vero insitis simul laborare, confirmat opus istius, qui spirituum solando impetum, Intermissionem paroxysmos omne penitus siliu, omne saltem postponere notabiliter, & minis hinc assidue facit. Tandem, quod pariter in Contionis obicit, quorum serocum & mitigare, interdum panibus extinguere autem: vid. BARTHOLINUS Cras. 2. §. 18. 24. Urat autem palliativum saltem fit remedium subleto, eo ipso tamen, quo insigniter febres mitigari ac mutari eadem illa, spiritus saltem alterando, & effervescendo observatur, & spiritus simul affici in febribus manifestum evadit. Ad haec, qui gravibus, etiam laniantibus, corripuntur undequeque natus doloribus, aut distans persequerantibus, febribus exinde patiantur symptomata, qualia in continuis mitioribus contingere solent Dolores occasione, in motum nimium additis & inde alteratis in suis proprietatibus spiritibus insitis, à quibus solus tunc febris dependet. Nec obstat, Ephemeram aut lyaccham fere patrodine vocari tales febres; eo ipso enim, quo Ephemeram tales natus seu plurium dierum à spiritibus afflicta, & adeoqueque alteratis, unice dependere concedimus, spiritus in febribus alius quoque multo magis affici, negari non potest. Id quod magis confirmant Maliginae, spiritus magis quam sanguinem alteratos, quae tunc etiam, ubi orine sanorum similes existunt, oec adeo insignis, pro ratione scilicet pessime habentis acri, à statu naturali eo pulu mutatio observa-

tur, adeoque sanguis minis alteratus notatur, tamen agros facillime trucidare solent, spirituum magis affectorum causa. Inguisatio tandem, quatenus in concilianda febre valeat, cum miculatoletate aut horrore acri, finis sibi facile similem febrem contrahit, aut dum ludicris & ridiculis Amuletis Intermentibus subinde figuntur, ex sola imaginatione spiritus saltem afficiunt, per le acutissimum est.

Ex dictis hactenus patet, nec Calorem nec frigoris esse de sensu febrium, aut rationem eorumdem formalem consistere; sed saltem esse symptomata febri supervenientia, non secus ac fies, & Cephalalgia eadem comitari solet. Idem autem est calor in statu sanitatis temperatus, qui in febribus nimis corpus calefacit, idem efficitur, idem bendi modus; idem subleto recipient, saltem in gradu maiore omnia. Patet etiam, non cor, aliave partem quandam solidam esse subleto febrium primarium, nec Vala, aut maiora aut minora, sed sanguinem & spiritus. Non ergo nego interim, dum massam sanguineam, & spiritus pro febribus habeo, quia illa quaedam pars seu quoddam Viscus possit esse focus febris, in quo haerere solet causa febris; sic enim certum est, focus febrium omnium intermissionem, imprimis quartanae, ubi scilicet fermentum febrile, esse stomachum; sic viscera eulcerata fontem continent febrium Medicarum: sic quoque in febribus symptomatice ulcerum & volemum, aut immediate afficiat sanguinem, focus tamen habent in parte ulcerata vel vulnerata.

Non confundantur tamen focus morbosus cum receptaculo producti morbi; sic enim Chronicis febribus subinde supervenient tumores, & v. g. Quartanae diuturnis Lienis tumor supervenire solet. Interim universalis est Morbus febris, cum sanguinis & spirituum ratione totum corpus affligit necessario, adeoque ratione partium solidarum iam denominatur, quas tamen omne qualiter nunc inaequaliter affligit. Hoc fit ratione circumstantiarum accidentalium, prout fermentum febrile, aut corporis humores vel febrili motu plus minus alterati, aut eorum producta humorum morbofa, &c. aptiora sunt, ut unam, vel alteram partem magis vel minus afficiant: Ipsi etiam partes solidae, vel coenato vel acquiescente vizio, quo imprimis peritum robur inaequale pertinet, magis vel minus dispositi sunt ad succipiendam ex causis praedictis alterationem seu immutationem; pro talium enim circumstantiarum ratione accidentales illi febrium differentiae, continuatur quidem in Phlegmalem, Effluens (A), Elodea; intermissionem vero in Tactalem, Delirium, Aphorismum, &c. oriuntur. Forsan etiam & huc reforesca velet & febris illa continua, in qua Lateris hostri totius afflicta, & dexteri frigus; vid. BARTHOLINI Aila Med. Hist. & Notam. 2. pag. 237. item febris illa Brachii dexteri particulari quotidianae in M. A. N. C. ann. 3. obs. 203. pag. 181.

DIFFERENTIA.

Quod differentiae febrium reales:

I. Febri, ratione considerationis Causae, & inde acquiescenti Morbi, est vel Benigna vel Maligna. Maligna febris est, quae patientem in vadit cum summa vicium prostratione, neque adeo est diuturna, neque impetum etiam deducit cum excretionis aliqua notabili: Benigna contrario se habet modo. Febris est vel Contagiosa, vel non Contagiosa, quae per insipit.

II. Febri ratione Temporis vel Durationis, & Modi afflictionis, est vel Continua, quae sine intermissione & continuo cursu pergerit; vel Intermitte, quae certa habet intervalia, in quibus patientis quies conceditur.

Febris Continua ratione generationis est vel Primaria, vel Secundaria: Haec vel Causata, vel Symptomatica. Primaria est vel Continua, Symptomatica, quae, pulu hinc exandescit ordine, ab initio ad finem sine ulla remissione pergerit; vel Continua plus minus periodica, Symptomatica, quae nunquam quidem intermitte, atque certo tempore exandescit etiam habet sensibilem: Eadem continua, saltem curfus seu motus febris, est vel acuta vel lenta.

Febris intermitte subdividitur in

1. Quotidianam.
2. Tertianam.
3. Quartanam.

(A) Nisi Aliudem Febrem intueri hic voluerit Auctor, forsitan Effluens erit Pululosa Febri; Effluens enim vocatur Rulanda, pululosa bullarum vel squamarum inflar, Curam obducens, quae Paracelsus Squamulas pediculosas appellat, & Forestus ad Epiphyridas refert. De Aliode autem, Pemphigode, Elode Febri, aliisque insensibilibus vocabulis insignitis, infra sermo habebitur.

3. *Quartana*, tanquam Species frequentissima.

Quintana est, cuius accessio quilibet die redire solet. *Tertiana* est, quæ tertio die redit; de qua notetur cautela WILLISII cap. 4. de *Febris*, quod aliquando hujus Paroxysmi sunt diuturniores, ad 24. lere horas protrahi, simulque Accessiones suas præoccupantes, unde *Apyrexia* spætim sæpe nycthemeri (B) unius est. *Quartana* est, quæ extenditur in quartam diem, seu in qua *Apyrexia* est bidua.


Præterea etiam observant sunt alie Species *Februm* Intermitterentium rariores: sic v. g. observavit *Quintana* TULPIUS L. 3. cap. 52., sic HIPPOCRATES l. 2. sect. 3. Tra. 11. meminit *Quintana*, *Septima*, *Nonna*, &c. *Octava* in quodam Seno observavit FRANCISCUS VALLESIUS *Conservat. Medicor. & Philol.* Plures videbitis raras & vix credendas *Februm* Species in SCHENCKIO lib. 6.

Deinceps ulterius *Febris Intermitterentium* juxta BARBETUM & alios est vel *Simplex* vel *Duplex*: *Tertiana Simplex* est, quæ singulis diebus ternis saltem redit: *Tertiana Duplex*

est, quarum una primo die incipit & tertio redit, altera vero secundo incipit, & quarto redit. Tanta tamen varietas in unaquaque *Februm* classe insinade observabilis est, ut certis eam Classibus includere impossibile sit.

Quæstio est: quid sit sensendum de *Februm* *Diffinitionibus* Veterum, qui eas diviserunt in *Synochum* simplicem & *Putridam*? quarum illa credita est saltem inhabitare spiritibus? hæc vero ipsius *Humoribus*. Ideo breviter ex præmissis *Synochum* simplicem, seu *Febrim* hærentem in solis spiritibus, plane non dari, facile probat & evincit potest. Nam motum aliquem in sanguine puro (excipio *Febris Maligna* & *Contagiosa*, in quibus sanguine existente puro, spiritus animales à Miasmate maligno afficiuntur & alterantur) excitatum à Motu aliquo nimio, non dico dignum nomine Morbi, uti præmonitum. Jam verò si per *Synochum* simplicem Veteres non intellexerunt motus tales, profecto non video, quid haberint, quod *Febrim* vocitarent. Non putridam. Nam, uti superius demonstrarum est de Causis, reliquæ *Febres* omnes dependent à certo aliquo fermento: ubi itaque fermentum fermentans, ibi etiam necessariò fermentatio; quæ concurre cum Veterum *Putredine*.

Febris omnis in motu Spirituum influorum præternaturali, & hinc Contendorum pariter commotione nimia (tam locali, quam intestino seu fermentativo) consistens, distinguitur



III.
Ratione *Moris* seu *Causas* Morbi, & hunc ineptentiam *Durantiæ*, *Febris* sunt vel

IV.
Ratione *Permutationis*, *Febris*

V.
Ratione *Idæ* Morbi, *Febris* est vel

VI.
Ratione *Modi affligendi*, *Febris* est Morbus vel

VII.
Ratione *Efficiæ* vel

Immediati, qui est vel

Mediari, qui est vel

Acuta: v. g. *Maligna*; *Continua Sanguinea* omnes tam *Ardentes*, seu *Solitarie*, quam *Comitæ*, cum *Inflammatione* partis *lenilioris*; item *Symptomatis* tales; *Tertiana* *intermittens* legitime; *Lymphatica* quædam; sed rarius sunt hæc *acutæ*.

Lenta: *Mellia* quælibet, tam *Primaria*, seu per se incipiens, quam *Secundaria* seu *Symptomatis*; item quælibet alia (præter supra infirmata), *Symptomatis*, *Lymphatica Catarrhalis*, *Tertiana Melle*, *Quotidiana Cephalica*, quæ tere sunt *Lymphatica*; *Quotidiana* quælibet, *Intermittens* *arritica*. Plures hæc pertinet, quæ a quibusdam male ad *Hæticas* referuntur, si in illustiori sensu hoc nomen accipere velimus. Quo pertinet illæ, quæ in *Cachecticis*, item *Virginitibus* *Chlorot* laborantibus observantur; vid. SENNERIUS de *Febris* pag. 149. & 107.

1. *Maligna* tandem fit *Baniga*; & contra *Baniga* facile degenerant in *Malignas*; *primario* quidem *Continuæ*, rarius *intermittentes*.
2. *Continua* fit *intermittens*, & contra: ut *Causis*, *Tertiana*, & contra.
3. *Continua Solitaria* fit *Comitata*, & contra: si *Ardenti Syncho* supervenit *Inflammatio Hepatis*, aut si *Pleuritis* evanescat, superflua sola *Febris*.
4. *Continua* fit *Symptomatis*, tam *Benigna*, quam *Maligna*: v. g. si per *Metallica* materię superveniant *Lumores*; & hinc *Abcessus* & *Ulcerata*.
5. *Comitata* fit *Symptomatis*: *Essentialis* cum *Pleuritide*, hæc non bene curata, ex relicta ipsa tæpe fit *recidivans Symptomatis*; item eadem *Febris* ob *Inflammationem* suppurantem, item ob inequens *Erysipema*, fit *Symptomatis*.
6. *Intermittens* natus *speciei* in aliam degenerat: v. g. *Tertiana* in *Quartana*, & contra.
7. *Simplex* fit *Composita*, & contra: *Tertiana Intermittens Simplex* fit *Multiplex*; *Continua Ardens* fit *Periodica Tertiana Continua*; quælibet *Humoralis* male tractata fit *Symptomatis* in *Phibisi*.
8. *Acuta* fit *Lenta*; v. g. *Continua Fixioribus* male curata fit *Lenta*.

Analogia seu *Conveniens*, ratione *Mutationis*, *Moris*, *Symptomatum* & *Proprietatum*, sibi ipsi: v. g. *Tertiana Intermittens Rigore*, *Ardore*, *Sudore*, &c. *Paroxysmum* absolvit, &c. Tales fere sunt omnes *Legitimæ*; item *Simples*, item *Compositæ* ejusdem *Speciei*, sed separate: item *Compositæ* plurium *Specierum* per se consideratæ, nisi aliud quid adveniat.

Anomala: v. g. dum *Sudor Paroxysmum Intermittentis* præcedit, vel dum affligunt *intermittentes* sine *Rigore*, aut quædam sine *Æstu*, &c. tales vero sunt *Noctæ*; item *Compositæ* diversarum *Specierum*; item ejusdem *Speciei*, sed implicite.

Propria, seu *Singularis*, seu *Sporadica*; dum hunc vel illum *Febris* quædam affligit, eaque plus minus diveria.

Communis, seu *Universalis*, seu *Epidemica*: v. g. *Tertiana* *Æstivæ* seu *Vernales*, *Quartana* *Autumnalis*, *Catarrhalis Hybernæ*, *Variolæ*, *Petechiales*.

Massa Sanguinea deperat per heterogenei secretionem; v. g. *Variolæ*, *Petechiæ*; vid. SYDENHAM *Method. Med.* pag. 15. & 17.

Massa Sanguinea alterata in aliam & quasi novam texturam, seu in novam *Diathefin* immutatio; v. g. in venantibus, peregrinantibus.

Mors, hinc *Febris* *lethalis* ex depravata *Massæ Sanguineæ* & *Spirituum* crasi.

Salus in *Febre* si-
lubet; & qui-
dem vel

Perfessa: colla & excreta *Materia*, & sub huius tegmine *Fermento* *febrili*, sicque *resistit* *Massæ Sanguineæ* & *Spirituum* Crasi naturali.

Imperfetta: vel *baso præpoterè* *Fermento* *febrili*, unde *Recidiva*; vel *Crisi* *imperfetta* *soluta* *Morb*, vel *Febris* in alium *Morbum* abeunte; v. g. in *Intermittentibus* & *Continuis* *Fixa* *morbum* *passant*, unde *Recidiva*, vel *Acutum* in *Leniam* plus minus *Hæticam* abire faciente; item *Variolæ* non rite excrete *Phibisi* interdum post se relinquant; item *Febris* in *Isterum* transiit, tunc *Symptomatis*, tunc *Criticum*.

CAUSÆ.

Cum ergo *Febris* consistat in *lassa sanguinis Fermentatione*, & omnis *Fermentatio* dependeat à *mora spirituum ordinato*, & duplici *Sale*, *Acido* & *Urinoso*, facile patet, quod *Causæ* *Februm* in genere erunt omnia ea, quæ *Gravem* *Salium* *harmoniam* & *proportionem* *laxare*, *Gravem* *Massæ* *sanguineæ* *naturalem* *pervertire*, & *talem* *Dyscrasiam* *seu* *talem* *heterogeneitatem* & *disproportionatam* *texturam* *particularum* *componentium* *plurium* *aut* *pauciorum* *inducere* *possunt*, ut exinde *Salium* *advivare* *vitiata* *Fermentatio* *præternaturalis* *excitetur*; Unde & *mediante* *tali* *Effervescencia* *Massæ* *Sanguineæ* *coquuntur*, & *particulæ* *salinæ* *vitiolæ* *sanguinem* *insolentem* *excitantur*. Hæc ipsa in gene-

re, quacunque fuerint, *Fermentum febrile*, *naturalis* *placit* *innoctum*, in *Definitione* *appellare* *possunt*; cuius occasione *nempe* *sanguis* *præternaturalem* *Fermentationem* *concepit*, & *spiritus* *simil* *insingit* *alterantur*. Immediatè *tale* *Fermentum* *Sanguinem*, & *hoc* *mediante* *spiritus* *afficit*; seu *contra* *immediatè* *spiritus*, & *his* *mediantibus* *sanguinem* *inquinat*.

Tale *Fermentum* *est*, v. g. quod ex *insensibili* *Transpiratione* *prohibita* & *retenta* *Febris* *subinde* *accendit*: *Tale* *Fermentum* *est*, quod ex *libera* *quodam* *interiore*, v. g. *Phibisi* *Pulmonum*, *Febris* *inducit*; *Tale* *Fermentum* *est*, quod in *Erysipela* *aut* *Pleuritide* *Febris* *Acutam* *infert*: *Tale* *Fermentum* *est*, quo *Stachis* *venenosa* *Febris* *periculosam* *subinde* *excitat*: *Tale* *Fermentum* *est* *Lymphæ* *acidit*, *Febris* *Ca*

Carathalem indocens: Tale Fermentum est, quod ex *Fru-
gum horum* abitu subinde febres nos muldat: Tale Fer-
mentum est; quod *Contagii* sub tegmine nos inquinat: Tale
Fermentum est, quod ex *ulso* Roci *horrida* ac facile alterabilis
in primis viis, *sepius* Febrem Intermittemtem excitat.

Fermentum tale nunc extrinsecus nobis communicatur per As-
sumptum aut Insuperatum varietatem; quo & Contagia
periculis: *nunc insuper generatur*. Vix tamen febrem altera-
tionem inducent talis, nisi volatilis plis minis naturae, &
Spiritus & Sanguini commiscibilis fuerit; sine hac enim
conditione varium quidem immutationem, & tamen fer-
mentativam turgentem febrem in Sanguine concitare
non valebunt. Nam *Axina* infallibilis philosophorum est
Nulli movetur a se ipso. Hinc quidam Veterum accuserunt,
praeter putredinem, causam aliquam Febrium, *Motum, Con-
tactum, rei calidam, porum Christi confusum*, &c. *Moti cor-
poris* nihil aliud acculerant, nisi Fermentum aliquod. Nam
posito, Motu quodam concitari Febrem, *profecto* hoc nun-
quam observabitur, nisi in Corpore, cuius Fermenta jam-
jam sunt inquinata particulis naturalibus Fermento incongruis,
quae a Motu nimio ad agendum excitantur; sicut habello
excitantur scintilla sub cineribus latens: alias eoque
omnes Operarii v.g. Melliores, Tristiores, pugiles, &c. ob
Motum nimium prolaberetur in Febrem, cum tamen con-
flecterentur, horum Fermentationem nimiam in Massa
Sanguinea nos remittere, Corpore ad quietem composito
Deinceps *rerum Calidam Contactum* itidem nos excitabit
aliquo Fermento Febrem. Nam uti constat ex physiologia,
Calor non est nudum aliud quod Recollacem, sed omnino
constat ex Effluviis calidis. Quarens itaque Effluvia ista
Fermentis ossis sunt incongrua, quos nos animadvertit,
adde hic Fermentum aliquod? hic verò sunt congrua, isti
motus non concitant Febrem aliquam, sed saltem nimiam
aliquam Sanguinis Fermentationem, quae in Corpore poro
cessat, cessante. Effluviis calidiorum infuso. Ad hec
itaque concludo: Febri nunquam oriri aliq. certo quodam
Fermento, Fermentis ossis incongruo. *Constitutionem
porum Corporis* quod attinet; nunquam hæc observatur,
nisi Corpore nimiam præternaturaliter constituto. Nam Cor-
pore rite disposito, semper *quasi* porus sui patuli, ut per hoc
continuo evacuetur partes ceræ, non excrementitiae, sed
revera Massæ Sanguineæ Effluvia laudabilia: Itaque hic talia
Effluvia jam Corpore discedere nequeunt, necesse est, adde-
re etiam aliquam Massæ Sanguineæ præternaturalem ita-
tutem.

In specie, quoad itera generum Panemtem febrem: Speciatim
ad primas vias respectu habendus, quarum errata Fermen-
to quidem digestivo acido volatili ex Ventriculo impragna-
ti, & interius Sanguini commiscibiles, defectu tamen de-
bitæ digestionis & perfectionis in primis viis, quæ in salium
volatilis abire debebant, non adeo homogeneæ assimilabilia
exsunt, quo inordinatam Fermentationem citius vel tar-
dius inducant. Imprimis Ecce datiores & digesti difficilio-
res in stomacho distatis recteque primum hic locum obti-
neant, quippe degenerat in liquorem aliquod viscidum,
nunc aperit acidum, nunc aciditatem aliquam visciditatem
sua celant.

Nocum hoc imprimis est ex Febribus Intermittemtibus
Tertianis &c. somitem simpliciter in primis viis habentibus;
Continuarum verò, præsertim Benignarum plurium,
par omnino est ratio, si erratum primum viarum sangui-
nem seu Lympham inquinat, & extenuis Fermenti insuper
continuum Fermentationem in Sanguine efficit. Siquidem
Intermittentis febri paroxysmi quilibet integram quamdam
Benignam, per crisi Sedoris insistentem, febrem Contin-
tuam representant. Unde non rarum est, ex Intermitte-
nte Tertianam continuam fieri & contra, Ardentem Continuum
in Intermittemtem terminari: & compari hæc duo debet,
ut in Continuis Periodicis obvium est. De Hemoribus certis
in Corpore extravasatis, & hinc fermentantibus, res est
comperis penes eum, cui perspicuum, Febres Traumaticas
originem suam tanquam a Fermento Febri nancisci ex Hu-
moribus extravasatis & putrescentibus in Ulceribus, & Vul-
neribus, & quocunque Sanguine extravasato.

**Fermentum hoc in Benignis videtur esse apud plures minis
auctora** (ut ex his, quæ supra de *Allo* Corporis, Rigore
&c. dicta sunt, & infra de Utriculo dicetur, probabiliter con-
cludi potest.) Imò etiam in Maligna, sed in his acris, vo-
latilioribus & penetrabilioribus, ratione quarum proprietatum &
Spiritus tam promptè commiscibile existit, adeoque ad

Veni naturam, quæ in immoderata infigni simpliciter
confidere videtur, propius accedit. Non autem semper im-
morum peccatum copia aut moles, seu, ut vocant, fibura
hanc Fermentationis lesionem inferunt, sed sufficit
interdum Mafura quidam fermentativa, vel inspissata,
vel alias in Corpore relicta.

Imprimis Aer versus Fermenti fibrilli indeo naturam,
quippe qui turgit Effluvia valdeper fermentativa platu-
rum tenellorum recentium. Porro alivis aer itidem Fer-
menti fibrilli ichema fuscipit, quatenus Effluvia copia al-
calis uno repletur. Autumnalis demum, & hybernas non
rarò quoque fibrilla Fermenti perfrangit agit, quatenus Ef-
fluvia in se te continent falio-acida.

Ceterum Effluvia animalium putrescentium, v. g. Ca-
daverum humanorum pisciumque, adeo sunt efficacia Fer-
menta fibrilla; ut sepe patetiaior sepius similitudo multo-
rum mortalium exemplo.

Eiusmodi Effluvia, si ex Corpore fibrilli discendum, & in
Corpus itam fuscipiantur, veniunt nomine Contagii, Græ-
cis *μωρδισμ* neque etiam videtur improbabile posse, ex a-
lris continud de cedere Effluvia, quæ pro diversitate aspe-
ctuum, aliorum, &c. planè sunt incongrua fermentis
humana quæ factu, ut plurimum propinquior Febres Pe-
rientialia: Quæ Effluvia fortissimè scelestig HippOCRA-
TES per sumum vi dicit (C)

Fermenta hæc cum sint activa, & undique per Contenta
Corporis diffusiva, Odorem ad insar facile admodum to-
tam Massam Sanguineam, motum saltem aequale perversen-
do, in fermentationem præternaturalem excitare va-
lent, vel Spiritus influus, eorum texturam vitando, inhe-
re possunt; quod non tantum in Contagis fuscipit, sed etiam
Intermittentibus diuturnioribus, manifestum est. Ta-
lia enim fermenta, v. g. Contagia, sunt spiritus in Ma-
lignis, quæ vel Spiritibus, vel languori, se infundunt,
nunc citius nunc tardius potentiam suam alterativam exerce-
cendo, febri occasione fuggunt: Adeoque minimam
subinde est, quod peccat in fibrillis, seu Materialis Causa
quod tamen fermentationis medio multiplicabile existit;
onde Intermittentium infignis diuturnitas, Continuarum
verò Malignarum copia Contragium spirituosorum. Rem
Exemplo quasi simili nonnulli declarabo: In febre Contin-
ua sunt Paroxysmi Intermittemtium Massa Sanguinea est
similis Vini, aut generoso Musto fermentelesibili, quod fer-
mentando se ipsum deperat & periclit. Nam Vinum, ut
variis constat particulis salinis, imprimis tamen ex Sale ejus
alcalino seu arisolo & acido fit fermentatio, in qua fer-
mentatione infignis turgentia percipitur, quæ median-
te separantur & ad fundum soccescè precipitantur partes
disproportionatæ non bene miscibiles sub iecum somine, vel
per superius Vasis orificium excluduntur, quo factu ex recupe-
rata debita particularum textura Vinum quiescit, laudabi-
le ac periculum existit. In turgentia istius simile quod ob-
servamus occurrere. Nam & ibi particule heterogeneæ
in Massa Sanguinea coacervatæ, mediante tali Effervescencia
seu fermentatione separantur, & quasi precipitatæ Sero in-
volvuntur, cuius medio nunc per Urinas sub forma Sedi-
menti eractantur, nunc sub forma Sedoris emittuntur, nunc
sepius certo tempore mediane Naturæ motu critico per
alium locum evacuantur: adeo ut Vinum lorum naturam
exatè exprimat: hinc v. g. fit, quod non raro febri super-
veniat Icterus, quando nempe fermentum febrile & vitio-
sa falia per modum Efflorescentiæ defugant intra Cutem
Interim tamen observandum, quod hæc ipse fusculeutia,
fermentatione critica separatæ, non solum sine recrecentia
Corporis morbosa, sed etiam partes ipsius Massæ Sanguineæ
nutritivæ sub tumultu isto fermentativo alteratæ, muta-
tæ, simul precipitatæ, & a reliquis separatæ, & quæ ita vel
per Sodorum, vel per Urinam & alias vias foras emittuntur,
non sicut enim ex Sodore artificiales per motum, exerci-
tium &c., non Sorem parum aut recrecentios saltem
particulis commixtum, est quod emittitur, sed etiam ex ipsa
Massa Sanguinea copia particularum utilium, Fermentationis
aucto motu attrite, hinc in salium mutatae, & ita reliquis
mixtis miscibiles factæ, una excluduntur; ita etiam in So-
dore Intermittemtium Massa Sanguinea sub Paroxysmo in
tantum seu plis minus colliquis propriè substantiæ una
jelluram facit. In Intermittemtibus quod sunt paroxysmi,
tot sunt Febres quasi particulares, in quibus pot. Frigus vel
Horrorem, turgentia fermentativa & Effervescencia
Massæ Sanguineæ, in qua materæ Coctio peragitur, acci-
dit,

(C) Tū dicit seu Divinum Hippocratis volū obfcuram habet fignificationem; ita ut in varias auctores poff. Galeum
interne fententias accuratior, vel de Animi perturbationibus, vel de aeris in Morbis producendis ut, interpretentur:

dit, quibus peractis sequitur in fine eorum, quasi quadam Crisi, facile copiosius Salar et Urinæ fluxus.

Quandiu ergo Sanguis Crasis unicuique Homini propria, dependens fundamentaliter ab Acidis et Alcali, formaliter ex proximitate in Spiritu vitali, propinqua est, tandem fermentatur blandè & spiritusale Massa Sanguinea; simul ac verò laeditur eadem, imprimis si congerantur particule solum facile fermentescibiles, et non ita cum integra Massa miscibiles, cum tot fermenta particularia, sunt fontes pro Febre, & turtida, ubi fermentata incipiunt, Febrem inducunt.

Causa Remota in Febribus variæ ac multiplicis ex Rarum Non-naturalium vario usu & abusa sunt derivandæ. Proclivis in Febrem vulgò dicitur Calidi & Humidi; quod rectè rejicit POTERIUS 88, a. de Febribus cap. 15., quin potius dicit, omnia corpora æqualiter ferè disposita ad Febres esse, imprimis ea, quorum Poræ sunt obstruæ, & qui Crasæ sunt dediti: per hæc enim laeditur Sanguis & Spirituum Crasis, & oritur Dykrasia; per Poros obstruæ conseruantur Salia excrementitia, ad turgescendum scilicet fuscitandum in Massa Sanguinea jam aucta disposita. Notabile tamen est, quod si, qui laborant in Argenti vivi solis, raro Febribus affligantur, & quod si, qui Mercurii Unguento peracti fuerint, ad longissimum tempus viæ febribus corripiantur, teste POTERIUS l. 1. febr. c. 15. Nec obstat quod PANAROLLUS Paræ. 5. Obs. 39. refert febrem periculosissimam ob Hydrargyri inundationem ad Pestem & Anilias contra Pediculos; nam forsitan febri occasione Inflammationis in distis locis ematæ inducitur.

Multum autem hic præstat, imprimis in malignis contagiosis, *Animi Pathemata*, ea quorum sensu imprimis Motus & Pavor hic magni sunt ponderis. Interim tamen nunquam ego credo, ex hisce solis posse oriri Febrem, nisi jamjam quadam Fermenta ignava circumfluent Corpus, quæ a talibus commotionibus Animi, Spiritus animales alterando, ad operandum irritantur: E. g. Ello Febris Maligna Contagiola, quæ ortum ducit ex Fermento ea Aere, & in Aere oberrante, itat varias personas hoc Fermentum afficiat, frustra tamen, ob legitimam Spirituum animalium, Massæ Sanguineæ & Fermentorum Crasin si itaque ex personis jam quadam Pavore percellatur, novum est, spiritus animales alterari & prosteri, totaque Massam Sanguineam immutari, ob motum Cordis immotum; in hoc ipso Fermento contagiolum certò certius vires suas exeret. Quapropter hic facio scæssum ab HELMONTIO, Pellis Canalem proptere acutissime Archei Pavorem. Constat tamen ea Pavore posse oriri Variolas, Morbillos, Pectechias, Morbum Hungaricum, Sordorem Anglicum, Pestem ipsam &c. Quæro itaque, quidnam hic determinet Archem Pavore periculum, nisi accedat Frædo quadam determinata, scilicet Fermentum quoddam contagiolum per Aërem volians, certaque subiecta, & in his Spiritus animales & Massam Sanguineam, ob materiam prædispositam inveniunt ac fuscitatum, efficiens & alterans.

DIAGNOSIS.

Quoad signa in genere Diagnostica: superius dixi, quod sit Pulsus frequens: Calor verò, qui in Febribus interdum adest, tantummodo symptoma superveniens, non verò necessarius ipsis semper conjunctus, utat ut plurimum non minus quam suis affligat ordinario Ferbricantes: Adest Cephalalgia; item interdum adest salispa dyspnoea, & alia symptomata variæ: Appetitus nunquam est naturalis; aut enim est nimis, ut hoc sæpius observari licet in principio Quartanæ; aut plane est depravatus, ut hoc expeçitur licet in Mulieribus, aut etiam est plane proditatus, v. g. in Ardentibus & Malignis nonnullis.

PROGNOSIS.

Prognosis febrium in genere ex Pulsu & Urina desumitur.

I. Pulsus quidem in omni Febre est frequens, nunc magis, nunc minus; minus scilicet frequens in paroxysmo Febris Intermitentis innuit ceteris paribus vires adhuc validas, & Cor insigniter irritatum: Oriatur autem à Cordis vehementiori irritatione, propter Sanguinis nimiam & depravatam turgescitiam, unde Cor crebrò dilatabitur, Ar-

terique distenditur: Sin simul est Parvus, pessimum Signum est & ferè, fatiscens dicitur.

Rebus pariter Spicuum Influensium vigorem inferens nunquam rejici debet, adeo ut Magnus & Vehemens Pulsus semper animosum reddat Medicum, in quocunque Ferbricantis statu fuerit, nrat varia urgeant Symptomata, five Benigne, five Malignæ sint Febres, & quo vehementior, maior & æqualior est Pulsus, eo melior, & signum laudabile & æqualibus Sanguinis fermentativæ turgescitiae & spirituscentiæ; quo minor, eo periculior, in specie in Intermittentibus & Malignis, ubi est polissimum Signum: Magnus enim Pulsus æqualem Sanguinis turgescitiam, & qui optime occupatus fit in excremandis Incontinentiis, denotat (D); de viceversa Pulsus Parvus debentem Sanguinis turgescitiam, & omnia infania portendit, quia indigne virum labefactionem iudicium habere solet.

Durus interdum observatur in febribus, sed nunquam fasullo omne, quin semper tenensorem spasticam Membrarum, in quodam loco plùs minus itisurum aut infestatum, & hinc in dilatatione Arteriarum renitentiam, aut fibrarum aliqualem spasmus sequitur; unde in febribus cum Inflammatione partium membranarum iudis, e. g. in Pleuritide, &c. ordinari observatur. Deinde etiam in febribus quibusdam, præsertim Malignis, in quibus Spiritus animales, & genus nervolum magis afficiuntur, in quibus etiam citra sensibilem, do qua conquei possunt Aëri molestim, Pulsus Durus plùs minus observatur, pessimo ut plurimum omne, cum Deliria, Convulsiones, & Mortem iniqui obiter varium.

Semper bonus est Pulsus Molle, generis nervoli mäsus mutatum habitum, ac Spirituum animalium debitum rotum offendens, & ferè cum Madore, aut levi Sudore pemptus esse solet, & tali ea Pulsu sæpius fusta expectari possunt in febre; Unde & Pulsus Undatus dicitur, ea Magno Vehementi & Molli compositus, ordinarius Sodoris imminenti prodromus solet esse in febribus, cum in pulsu Duro vel nullum, vel qui abique euphoria quasi per viam Naturæ prodit, Sudorem inferre avertim; scilicet & fibrarum curæ in tali casu tendi, porique contra contractions hinc esse arbitror; nisi Pulsus talis indigne partis cuspidam Inflammationem sequatur; tunc Sodoris enim proficui, & ut plurimum pulsuum mutationes inferentes, efficiuntur.

II. Quoad Urinam: hanc idè sub eam febrium inspicere debemus, ut habemus Signa Colicis & Cruditatis: ubi enim exhibuerit suo tempore Signa Colicis laudabiliora, imprimis in febribus Continuis, faustum est Signum; v. g. verò non, periculolum.

Signa Colicis sunt, quando Urinæ Claræ redduntur Turbide, Crasæ, & continent vel Encoerum, vel Sedimentum; quæ ipsa quò sunt copiosiora, eo sunt meliora.

Urina, quando est Cruda tamdiu Morbus est suppelus, quoniam adhuc in æquilibrio ad Mortem vel Salutem hæret Ager.

Per Cruditatem verò intelligitur talis Massæ Sanguineæ ejusque Humorum status, quo Sanguini permixti & uniti naturalem ejus fermentationem visalem turbant, & in effervescentias febriles eam concitant: id quod imprimis particularum salinarum à debita crasi deficientium existit culpa, Causa verò est eundem separatione, & è reliquis particulis per fermentativum motum quasi precipitatio, aut recrementa & heterogenea Salia, cum effusa, inflat cuspidam Capitis mortui à sero imbuta & diluta, per eerts Viscerum cribra & quasi filtra secerit, & hinc per naturæ consensum vias & vacui possint, adeoque particulæ tales fermentando, à reliqua materia inflat secum separant, & cum Urina excreant in fundo subsident, Colicis signa perfectè suppeditantur.

Hinc scilicet in febribus Acuturum Principio Urinæ sunt Claræ, Pellucidæ, Tenues, plus minus Turbide, & abique sedimento excrementum, quo procedente Morbo in Incremento sunt Turbide, Crasæ, & in statu omnino copioso sedimento, seu faciles fundum matulæ preceutibus, saturatæ; unde hæ Colicæ, illæ verò Crudæ appellantur. Cruda sunt, quando nil lecoritum, & in Sanguine adhuc omnia permixta; Colicæ, quando jam facta separatio, Quod si enim mediante fermentativo motu facta successit catastrofe & separatio fibrarum quasi feculentiarum, Urinæ Crasiores magis Contentis saturatæ, & que sponte Turbatæ prodeunt, adeoque inchoatum Colicis afflic-

(D) Magnus ac Vehemens Pulsus quocunque ad eam magnitudinē & vehementiam gradum accedit, ac Vibratus dicitur, qui Duro Pulsu valde affinis est; adeoque internam Inflammationem, aut Pleuritidē, vel prodromus vel comit existit.

effundunt. Quod si Turbida manant, adhuc ingentem motum & inordinatam Fermentationem & confusionem in Massa sanguinea innant: in verò Turbida clarescere, & ad suum contenta dimittere incipit, Signum progressus ulterioris in Coctione ostendunt, ac in Misto fermentante: Vid. KERGERUS de Fermentatione. Exemplum eruditatis quasi simile fit, Melli filtrato per chartam emporicam; Nam, quamvis in fermentante Liquore omnia sine coctis, si transcolatur per filtrum quodcumque, massa turbida transiet; Fermentatione verò absoluta, Facies separatur ad suum, & Liquor clarus transit, Faeces resistent. Idem fit in cruditate & coctione sanguinis: Quamvis in eruditatis flata omnia sunt coctis, Urinae excernuntur Tenues, Rubrae, Clarae ac Perspicuae; quando verò in statu coctioniscrementa prænaturalia à succis prænaturalibus sunt separata & precipitata, vocatur coctio, seu quod Materia morbifica fit cocta, ac Urinae apparent Turbidae, Crassae, frequentes cum copioso Sedimento. Constat SENNERTUS lib. de Febribus pag. 215. ubi de Coctione & Cruditatis: cum quocumq. SYLVIVS lib. 2. par. cap. 33. §. 16. Hinc applicandi hic sunt Aphorismi HIPPOCRATIS, nempe Aphorismus 21. 22. 23. & 25. sect. 1., ubi legitur evacuandi per quoscunque vias rationem docet, & in specie Coctis, non verò Cruda evacuanda docet. Nam dum omnia sunt coctis & cruda, nihil potest evacuari cum supbia, sed potius totum Corpus saltem turbatur: id quod fit v. gr. in Principio & Incremento Febrium: Unde Purgantia, sudorifica & Diuretica sanguinem in Principio aut Incremento, atque cum coctionis Signa in Urina apparent, sunt adhibenda; quod observatur in omnibus Febribus continuis & intermittentibus benignis. Quando verò omnia sunt coctis, & à se invicem separata, commodè tunc edici possunt: id quod fit in fine incrementi & statu Morbui, cum Natura hoc agit, quae nunquam cessat Evacuacionem criticam, nisi omnia cocta sit Materia; sicut & in Febribus intermittens nunquam sponte erumpit sicut aquae Urinae, nisi in fine Paroxysmi, dum prius Materia morbifica in Paroxysmo est cocta, & efficitur per sudorem vel Urinam.

Probat ergo coctionis & cruditatis ratio in Cura Febrium Benignarum observanda est, pro legitima instituenda evacuacione. In Malignis Febribus alia est ratio; in his enim coctio & cruditatis locum non obtinet, quia mox Precipitantibus & appropriatis Alexipharmacis Sudorificis in Principio adiungenda sunt: sicut Natura mox in Principio Malignarum secunda vel tertia dicit Petechias, Pustulas, Bubbles, Carbunculos &c. expellere solet.

Ab ista superius Cruditatis & Coctionis universa Crisim in coctionis dependet ratio, quae in Precipitatione quaecumque Focum, substantia ex Massa sanguinea Exclusionem, & vel extra Corpus, nunc cum Sudore, nunc cum Urina, nunc cum sanguinis ipsius Excretionem, vel in quendam Corporis focum congelione, in Tumorem ac Abscessum, consistit, ipsi separatis locutionis prius critici exclusionis locum, ex facta ibidem aut in vicinia irritatione, varia Symptomata occasionaliter condecernitur: dum verò, q. Sudores Criticos Rigores repetiti; Haemorrhagias Criticas Agrypnias, Deliria, Narium pruritus, Oculorum splendores, Cephalalgias, Obaditiones, &c. praecedere solent: Nam secundum HIPPOCRATEM, lib. 2. cap. 2. ubi ait: Crisim, gravitas. Hinc semper observari, quando in Febribus, praesertim continuis, Urinae sunt Crudae, tamdiu res Aegri in statu exsistent ambiguo: Quando verò ad aliud Signa coctionis, semper quolibet fuita possunt omnino; itur non meminerim, vel lesisse me, vel observasse, cum coctionis signa quocumque interissem. E contra, quae coctis iam plus minus apparet Urinae, si recedant denud, semper periculum portendunt: si nempe sedimentum, quod primis diebus subsiderat, deficit, ut si Urinae Crassae intensius tinctae pallescere, & teniores excrescere incipiunt: id quod nunc per Calicis externas, Vini generosi potum, Iracundiam, Pastum paulo copiosorem, praesertim Carnium vel simulum, nunc per Causas internas ac deficientes Naturae motu, & dominio Calicis morbificae evenit, Cursum Puerperarum Purpura afflicta, praecedebat omnia modocriter, die una Urina crassa intensè tincta turbata, & Sedimentum deponere incipiebat; Interit etiam Purpura utcumque erumpere, coctionis Signa augmentabantur, ipsa Aegri comode se habere: Sed die 15. cum non praegravata fuisset inquietas, mane Urina excructurata Pallida, Tenuis, via Citrina, ex improviso Delirium, convulsiones, & circa meridiem Mors. Quod hic subito factum, quod interdum succedit, & serò aliquo diebus evenire solet. Propterea

reà rectè POTERIUS de Febribus cap. 43. Coctionem Præmaturam, & Universalem esse debere, aliter, Verò quidem quia uti rursus fallitur Medici, opinantur, Iteram esse Coctionem in Urinis, ex cruda Humore in fundo coram subsiderata, quasi verum sit Sedimentum. Continuum etiam debet esse Coctio, ut fide sit: Fit enim aliquando, cum non ex toto Humor à Natura separatur, ac nunc apparet Coctio, veluti autem desinuat Coctio, debet etiam esse Universalis & totius Massa morbifica Coctio: Frustrum namque in parte quodam Coctio sollicitur, Merbis in reliqua corpore crude existunt. Hinc POTERIUS.

Opus hoc coctionis solius est Naturae, & hanc inflorescens Crisim, quam Arte adjuvare non possumus, saltem impedimenta Naturam gravantia removere valeamus. Motus hic Naturae circa coctionis negotium in eo consistit, ut Acidum fermentativum morbum, unde Febrii oritur, corrigatur & temperetur, adeoque in salium, aliarum particularum additione mutatum, ex Massa sanguinea extrahatur: id quod mediante Fermentationis motu accidit. Cruditas enim, & ardor omnium particularum in sanguine uno, & hinc procedens acrior Effervescencia febrilis, ab Acido dependet, quo dominante ignescit Fermentatio, nulla Secretio fit. Dum verò per medium coctionem quasi Acidum febrile Fermentum succit ab Alcalibz atrepta fatiatur, in salium mutatur, & sic ex compositis sanguinis solvi, i. e. liberari, incipit; etiam alia particulae heterogeneae, nec sanguini debite assimilabiles, ab Acido tamen violenter colligatae & quasi concentratae, simul ex sanguine extrahuntur, & hinc ex his liquore Fermentationis modio (qua partes anibiles rite coctae, non unibiles feceruntur) precipitari solent, coctio & copiosiorum cum Urina consentum Excretio accidit. Conferatur SYLVIVS lib. 3. §. 14. sequens. Hinc etiam in Febribus Malignis, si Urinae sanctorum similitudine excernuntur, Signum periculosum est: scilicet Spiritus infusus imprimis esse affectus, & ipsam Massam sanguineam à Fermento Maligno citrà insigniorem Fermentationis epas turbacionem corruptam, & in extensa sua vitia significante, modo & cum minore Ardore tales Febres compositae esse solent, summa virium potius prostratio, & nervi generis Symptomata magis urgent: Iis tamen in his etiam Malignioribus coctionis verae signa se exhibere incipiunt, bene sperare Medicum jubent, & si salubres sint tales, in hoc, coctione Materie morbificae, quaeque Signa in Urina, terminari afolescent.

Febribus simplicibus supervenit Icterus, qui vulgò juxta HIPPOCRATEM sect. 1. Aphor. 62. ante leprum diem statuitur periculosus: quod tamen non adest universale; sicut hoc non solum SENNERTUS annotat aphor. lib. 3. par. 3. c. 2. pag. 240. sed etiam ex HORSTIO lib. 1. Obs. 13. patet, ab Icterus salutaris quarta die in Continuum obvenit; & BARTHOLINUS Cras. 3. Hysp. 4. Icterus salutare in Quarta ante septimum supervenire docet.

Ea se Icterus est motus Naturae, per desumptionem nempe Massae sanguineae generis; fermentando enim Massa sanguinea desumptas lordes sicut intra Cutem, & colorem dat Ictericum.

Hic superveniens tertia, quarta vel septima die est sanguis, prima verò aut secunda, vel sexta aut octava die superveniens, ut ex se non fit pravius, minus est tutus: quia est Icterus Symptomaticus, quo frequenter moriturus Aegri, eum prior it Criticus. Ergo praeter signa coctionis plura minus jam praegravata, optimè negotium hoc decidit CASTRO supra citatus lib. 3. cap. 20. pag. 220. & sequens. Nempe etiam die quarta Ictericum cum Rigore esse bonum signum, quia Critica fit; item Ictericum sine Rigore ante septimum accedentem, ut Symptomaticum, si sequatur Evacuatio aliqua, per Alrum v. g. Urinam, Aegrum liberare: quae pluribus c. I. videntur.

Inter lethalia signa, quae certò Mortem praenunciant, nullum observavit JOHANNES STEPHANUS in Operis. Medic. Mistell. pag. 449. quod pluri fit momenti, & plus pollet, frequenter & insulsi Manuum admodum ad Nares, sine ulla materiei effusione, ubi enim Aegri febriantes identidem Manus motant ad Nares, quasi lordes exempturi, aut Nares emundandi, si nihil tale fiat, pernicissimum est Signum.

C U R A .

Methodum moderandi quod spectat, in cura Generali attendendum, an Febrii fit Benigna? an verò Maligna?

1. In Febribus Benignis vel temporis usurpanda Praecipitanda dicta, vel specifica, quae Fermentum febrile acidum volatile, specifici tamen saporis, corrigere, alterare

rate, & enervate, seu quasi fixere, & hinc in saporem & texturam minus altivam mutare, indeque fermentationem febrilem compellere, & sordes effluere, ac crassa Malle sanguine viciata separare, & quasi ad suadum precipitare valent.

2. Materia vitiosa peccans, Fermenti talis vel vehiculum aut Fomes (mediante quo v. g. ex primis viis, fluidis corporis contentis, speciem sanguinis, promiscuetur, ut in Intermittebus aut continuis benignis); vel Productum ab ipso fermento ex naturalibus Corporis contentis fluidis, per horum fermentativam alterationem generum (v. g. quousque Ichori in Variolis) ab iis, praevisis à sanguine, separatur.

3. Utrumque, qua data porta, imprimis per periphleam cutis, eliminatur.

Opus hoc est vel *solus Natura*, vel *solus Artus*, vel *utriusque simul*. *Solus Natura* opus est haec cura, dum coliosis Materiam morbosam, & hinc salda Crisi, expedit. Unde in Veterum Methodo medendi Medici agebant *Spontaneos Naturae*, observando quotidiani Signa & Tempora, & hinc expectando Crisim, quibus ritè se habentibus, Morbus judicabatur, & salvabatur. *Artus* *Solus Artus* opus est, quando Remedia Specifica Antifebrilibus Fermentum febrile excoriat, & corrigitur, ut quod superest, sponte sua & absque morbo conatu evanescat Natura. (E) Talis sunt v. g. Specifica febrilis Intermittebus, ut *Febrifugum Riverii*, aut *Specificum febrile Rergeri*, in Quartana specificum febrile seu China China (tempore recipiendo China China 56. Sals Ammoniaci 31.) aut *Melancholi*, Diaphoreticum *Paracelsi*, quarumvis febrilis thymozom.

Artus & Natura opere simul curantur in Methodo haec. nus communiter recepta, qua Natura, fermentationis sanguinis febrilis medio, laudabiliter agenti & coequenti, Antifebriles qui formant, impediunt illius, sordes & fomites primarum viarum removendo. Hinc aut *Temperantia*, aut *Absorbentia*, aut *Diaphoretica*, veluti *Præcipitantia* dicta, aut *Aggravantia* alia, utramque facili paginam in febrilibus: sunt enim talia, quae in genere fermentationis, aut vitiosae effluentes Humores, sui miscela compellunt, mitigant, & plura minus enervant, Dyscrasiam sanguinis corrigit, adeoque minus Acidum destruendo, nunc Alkali corrigendo, motum omnem fermentativum supprimunt; sicque vitiosiorum & heterogearum partium exsolutionem, & à reliquis separationem promovent, utrumque ejus effectus expliciter, & hinc nata gravissima symptomata, metum & impetum Naturae plura minus frangunt, mitigant. In quem hinc in genere *Præservantia*, *Purgantia*, *Opisthorica*, & *Diata* vix observandi veniunt.

Præcipitantia vix ex Chymicis est desumpta; Nam sicut præcipitando separantur contenta in Liquore quodam, ita propter analogiam Præcipitationis vocabulo utuntur Medici, quando Præcipitantibus, aut rectius Absorbentibus, Effluvia Materiae sanguineae compellunt; & heterogearum partes separant & præcipitant; quod alias etiam vocant *Cogitare*. Hæc sunt, quæ in febrilibus Intermittebus simul atque continuis, præmittuntur, ipsas Digestivorum cum alia ante Parosyrium. Digerunt enim se corrigit & temperant saliva in primis viis, & in salivam mutant, habentque vim alterandi Massam sanguineam, corrigendicis crasim, & præcipitandi Excrementa quæcumque Massam sanguineam turbantia in febrilibus. Præcipitantia hæc sunt vel saliva urinosæ, vel Metallica fixa, Antimonia, nunc secreta, nunc vulgaria. Antequam aliquis inchoatum in febrilibus, talia præmittenda:

Digestivum Febrile ad imitationem speciei febrilis *Riverii*.

21. *Cromer. Tartari 3ij.*
Coralli. rub. præp. 3ij.

M. F. Pulvis
Div. in 3. partes. 5.

Pulvis febrilis alterans,
Vel

22. *Arcani. dupl. 3℔.*
Aurimorp. diaphor. 3℔.
Sals Abstrahit gr. vj.

M. f. Pulvis pro 2. dosibus 3.

Pulvis febrilis resolvens.

Auxiliatrices hæc operis formis Naturæ rectè agenti, h. e.

quæ fermentationis medio coliosis ritè molitur pro futura Excretionis. *Sed quid agendum Medicis, cum viciata est Natura?* h. e. cum crassa adhuc materia Excretionis Symptomaticas in principio aut incremento insitit eadem irritata, five turgens plura minus materia peccans, aut alia dicitur, five non? *Consilium* dant agere Naturæ, unde & subinde debilitant. Agunt tales Excretiones, & absque euphoria sunt, quas tamen, ubi supprimebantur Arte, periculum est, ne impetu contentorum intra corporis coarctum, fiat irritatio in partem aliquam nobilem, adeoque exitalem Vitis calamitatem inferat; verò, si pono febrim continuam indigemus, sed benigniorem (utnt Malignam reversa eadem sit ratio, in quibus tamen magis ad Malignitatem, præmittimus, si spiritus potissimum accipiet, respiciatur) cui, crudis adhuc existentibus Urinis, due tercia, quarta & quinta supervenit Diarrhoea, aut Hemorrhagia Narium crebrius repetens. Excretio hæc reverè est Symptomatica, debilitatur. Agere, franguntur vires, periculum est, Aegrum vix superaturum Morbum, aut ad statum cum ista excretionis perduraturum. Quid si supprimitur hæc copia, ex Diarrhoea impedita Febris intensior, Sitis, Cephalalgia, Deliria &c. metuenda erunt: si Hemorrhagia Narium sistatur, eodem, ac præmittimus Deliria & convulsiones. Quid igitur agendum in talibus casibus? Variè decernant hic Prædicti, in promovendo, in sistendo sit talis Naturæ motus? Omnium optimè mihi videtur negotium decidisse STEPHANUS RODERICUS GASTRENSIS Tract. *Quæ ex Salsar lib. 2. cap. 10. pag. 119.* Decisionis nucleum pauci comprehendam. Inquit: *Omnis evanescit insensibiliter saliva, in tempora potest.* Et enim debita fuerit tempera, h. e. in die decurtoria, non amplius Symptomatica, sed Crisica dixerunt. Nihilominus peccat vel in sale tempera, vel simul cum temperis vitia habent vitium qualitatis, aut quantitatis, aut utriusque. Si qualitates & quantitatis simul sit vitiosa, omnino damnoosa est, si quantitate tantum, quantitas vel excedit, & tunc est inhibenda, vel desistit, & tunc non suspendenda; servant Artus præceter, & adhuc sub radice lit est. Si qualitates peccaverint, decreto HIPPOCRATIS Sals. 2. Aphor. 2. damnetur. Nam cum non purgantur talia, qualia purgari oportet (quod idem est, si si dicatur, quæ possunt in qualitate non curare, nec lenius tolerari. Prædicti si non consentiant, non sunt proficua, nec leniter, non sunt cum vitio insensibile. Et tandem solius temporis peccatum sit, non autem omnino qualitatis, neque valde magnam quantitatis, tunc posse aliqui radicare, tunc certum est, quod quod certissimum. Da debentem ergo ex quantitate, sub radice, lit est, HIPPOCRATIS consilium Sals. 2. Aphor. 29. cum morbi incubant, si quid moriendum videtur, mori. Uti GALENUS esse voluit, si, in principis rognant, quod minorem sem saltem materiam facilius Natura possit conquirere, si dignum vocantur transire in principia ad futuram colliationem, sunt ipsas autem etiam non colliationem se. Et autem fieri potest cum utilitate ad Arte, aut quæ majorem agitationem partium corporis, multo minus sit à Natura, à talis operantis minor summi agitatio, Hæcenus GASTRENSIS.

Hinc & Excretionis Symptomaticas interdum Morbum solvere, observatum refertur in BARTHOLINI *Ad Med. Practicam*. Vol. 4. pag. 202. Interdum Medicis, five sistentibus, five promovendis observaverit hujusmodi Evacuationes, semper Arte peccans Temperantibus, & *Intermittentibus* curare, sedulas insistat. Siquidem tam Materiam morbosam Turgescentiam, quam Excretionis Symptomaticam, semper sequuntur nimiam Materiam occasionalem, seu fermenti quæque vehiculi, acrimonia, tam benignam, quam malignam, five quæ ex aucta Effluvia, five ex irritatione partium sensibili, & hinc nato motu contentorum vitiosa, five ex utroque ocri dicam Turgescentiam, aut Excretionem Symptomaticam, sanè utique principale peccans erit Acrimonia nimia.

I. In specie superius insinuata Auxilia generalia quod attinet, ut *Vena Chirurgica* imprimis se obstat *Præservatio*, de corpore ubi quæritur. Ea supra posita fundamenta per se patent, insinuant citæ Venæsectionem intercedere adhibum, in omni febre eam insinuant, cum per se ferè nil in febre curanda conferat Venæsectio, utcumque quo effectus explicentur. In Intermittebus nullus usus est; Præcipitantibus enim solis & Evacuantiibus curantur; imò si in his fecerit Vena, procurare, ut fiat magis chronica; & 6 mille nichil curande essent, nunquam Venæsectionem insinuem.

II. In specie superius insinuata Auxilia generalia quod attinet, ut *Vena Chirurgica* imprimis se obstat *Præservatio*, de corpore ubi quæritur. Ea supra posita fundamenta per se patent, insinuant citæ Venæsectionem intercedere adhibum, in omni febre eam insinuant, cum per se ferè nil in febre curanda conferat Venæsectio, utcumque quo effectus explicentur. In Intermittebus nullus usus est; Præcipitantibus enim solis & Evacuantiibus curantur; imò si in his fecerit Vena, procurare, ut fiat magis chronica; & 6 mille nichil curande essent, nunquam Venæsectionem insinuem.

(E) Quid hic præmittit *Antich*, postea quodque *se* à sua Arte opera curari, haud facile erit; qui necesse, nullum esse Antichem quæcumque vim, qui non concurrente Naturæ opo, & superari quærit febre. Tunc nullum evocare poterit; Medicamentum, quo sub, invita, ut ita dicam, Naturæ, Morbum quæcumque debellare valeamus.

In Continuis verò tantò & cum diffinitione procedendum, quia in Ardentibus sæpius subest malignitas. Jam verò in Malignis fecere Venam sibi inde *Agnum* vulgare. Io Ardentibus verò propriè dictis, iisque Benignis, non incongruum est Venæsectionem administrare, utut non semper necessariam esse observaverim; si enim in Febre Benigna maturè instituat Vomitum, negligi potest Venæsectio. Verùm cum in Continuis Ardentibus subinde lateat Malignitas, propterea in administranda Venæsectione cautissimè sit Medicus, adeò ut, ubi secunda Vena, in primo Principio administrat, tertia enim vel quarta demùm die eam instituisse non raro periculosum est; & quò malignior febris, eo minus locum habet. Convenit ergo pro accedens saltem Venæsectio interdum in febribus Ardentibus Continuis Benignis, in subiecto juvenili, & qui laudabili Chymo, ac generoso Vitâ, præsertim in Pecu, utuntur, aut Subiecto aliis Vomitu abhorrente; aut in quo consuetæ quædam Sanguinis evacuationes artificiales sunt suppressæ; tempore Vena & Æthio, in subiecto Plethorico, tam vero, quam apparente, ut in quibus nimia Effervescentia aut Ebullitio sanguinis, adeoque orta spirituum excundescencia interitus observatur, vel si forte alie circumstantiæ eam suscitent, in primo tantum, ut dixi, Principio. In quibus verò Subiectis Effervescentia & Ebullitio Malignæ Sanguinis minor est, in his Venæsectionis nunquam facit ert. Nam rectè dicit ZACUTUS LUSITANUS, Venæsectionem interpellantem, Causam Mortis esse in febribus Ardentibus, lib. 3. *Præc. adu. Observat.* 37. Et venio sane, cui nisi sit Venæsectio? Dicunt quidem, ut ventiletur Massa Sanguinea, & supprimatur Calor: sed parum Refrigerationis sperandum, & merum est effugium, cui contrariatur Praxis. Nam ubi est infensus calidus Sanguis, & in Vasis coarctatur, vis Ebullitio potest habere ipsam sufficiens, tunc sane, quando aperimus Venam, potius Ebullitionem angemus, quia majas acquirit spatium pro Ebullitione (F). Cauti ergo sumus in Venæsectione in Febribus Continuis. Conf. hic HELMONTIUS de Febribus, ubi de Venæsectione, hinc GNOEFFELIUS in *Met. Med. Febr. Epidem.*

II. Ex Parte Pharmacæ in genere se offerunt Evacuantes, five sint Vomitoria, five Purgantia in specie sic dicta, five Sudorifica, five Diurctica, & hinc Symptomatum argentum sedativa Opata. Equidem & horum omnium alius sponte patet.

Evacuantes quidem Purgantia nulla sanè per se Febribus conducunt, nisi in Declinatione, adeoque correcto Fermento febrili, & cocta Materia, ac sedata Ebullitione. Præsertim enim alius propinquant, turbantque Massam Sanguineam, irritantque Partes solidas, & quicquid evacuantur, absque euphoriâ erit, cum non evacuetur tunc tempore, quod evacuandum esset, nulla facta attilis ab immixta segregazione. Confirmat hoc Experientia, quæ ostendit, post repetitas etiam purgationes, eodem tenore pergere, interdum gravior affligere Intermitteutes. Costuæ verò magis exasperantur ipsæ: id quod manifestè ostendit, non attingere purgantia radicem morbosam, sed Medicos, & Ægros deludere. Quid si aliquando à purgante Remedio cesset Febris, hoc etiam rarum, ita summè accidentarium erit, sub liquaminibus illis, quæ conficiunt & evacuant purgantia, una forsitan exhausto Fermento febrili, aut acrioribus Amariçinis solutis, v.g. Scammonio aut Colocythidæ vi alterante correcto eodem, vi solutiva propriè nil operæ conferre. Sanè in omni Evacuante in Febribus instat Cynosiformis Aphorismus obviandus HIPPOCRATIS: *Colla medicari oportet, non frada* (G). Per hoc medicari intelligit quæcumque Evacuacionem, five sit per Urinam, five sit per Sudorem, five per Alvim. Hinc it in Principio præscribenda propriè purgantia, Vomitus saltem tunc convenit. Natura hoc monstrat, quæ nunquam, nisi sul juris est, instituit Evacuacionem, adeoque nec Crisin, nisi cocta sit Materia. Imitemur ergo Naturam tasquam Ministrî, & nunquam Evacuacionem instituant, antequam perfectè cocta sit Materia morbifica. Interim haec prima vis Althergentia, & hinc præsertim Diaphoretica, quovis ferè Febri statu & tempore, nisi forsitan Crisis quædam infans aliud

Torn. II.

monest, optime adhibetur; vera tamen & propriè dicta purgatio non convenit, præterquam in Statu aut Declinatione.

Primas vias Evacuantes, in quibus ferè Rabolatur fomes morbosus, sunt vel Vomitoria, vel per inferiora Lacuantia. Illa ex omnibus evacuandi generibus tantumnon in omni Febre locum inveniunt, imprimis in principio, sicut ipsæ Vomitoria interdum etiam mix in principio radix morbofa quasi una falce demeritur: id quod resistit febilit, faciliùs dehisce curatur. Intermitteutes febres sine eo difficulter curantur. In Continuis Acutis, & Lentis, ibi in principio, hic etiam in progressu, sunt optima: imò non rarum est, quod Malignæ exiade, sed primo insula adhibito, malum levatur: vid. SYDENHAM in *Traët. de Febribus*. Ergo, qui apti sunt ad vomendum, oec in quibus aliquid obstat item quibus vel Hypochondria suspensa, aut rugitus in illis est, aut Nausea, vel Rudidus tectis amaricanibus, item Cephalalgia vel aliquali Vertigine vexatur, in febrium principio optime, imò sæpius necessario, Vomitu & evacuatur.

Quæ verò per inferiora laxata Alvim in febribus, sunt vel insecta Chymata, vel assumpta Pharmacæ. Chymata familiarissima in febribus locum habent, & imprimis per levando Æthio, & aliarum, præsertim Capitis, per consensum plurimum partium Symptomatis, & hinc Abdominis pathematis propriè mitigandis conducunt. Eia saltem Conditiones observantur eorum alium prohibentes.

- a. Evacuacionem, præsertim Criticam, vel hanc saltim analogam, per alias vias influere tentat: unde v.g. in fine Paroxysmorum in Intermitteutibus, Natura criticum quasi Sudorem tunc moliente, perpropere impetuntur.
- a. Quando Eseretip cutanea in febribus Malignis, vel expectanda est, vel imminet, vel jam adest, & facta fuit. Hinc in Variolis, Morbillis, Purpura, Petechiis, &c. minus conducunt, nec, nisi summa necessitate urgente ad eadem, eademque saltem lenissima, & tamen cautè, sit accessus, potius quantum possibile, dictis in Affectionibus vitentur.

Per Os aliamerò sunt blanda Lacuantia, præsertim Salibus digestis sociata & acuta, & ultra primas vias hand penetrantia, ex Tamarindis, Rhabarbaro, Insulo Senato &c. & hæc speciatim in Principio locum inveniunt.

Sudoriferorum usum ipsa nobis Natura monstrat. Cum enim in Febrium fine Natura sua sponte copiosus Sudores movere incipiat, itat nulla Febris perfectè citra Recidivæ metum curari, aut judicata dici possit, nisi Sudor in Declinatione provocatus fuerit; ob id, apparentibus Collisio signis, Sudorificis sunt optima: sicuti in toto eorum decursu Præcipitatio sunt utilissima, quæ cum liberam & copiosam Transpirationem promovent, æqualia non solum effectus sunt sudorificis, sed proper operandi modum illis etiam præferenda: dum sine insigni viarum iactura successivè, & citra vel Contentorem gravioem agitationem, vel Continuum partium molestem Irritationem operantur, ac heterogenas fermentativas periculosas in Massa Sanguinea hærentes discutiant & excludunt. Nempe, ut supra insinuatum, minus periculosè illi decumbunt, quibus in febribus Cutis humidæ aut madida percipitur, quam quibus arida aut secca est. Cæterum in sudorificis obviatur, quod non semel, sed quoties opus est, propinentur: Nam prima sudatione tantummodò movetur Massa Sanguinea potius, quam ut integrè evacuetur. Iteratè ergo tubide sudorificis, insititenda est demùm Massæ sanguineæ perfectè purificatio. Certè vulgus indocuum non raro imminet, aut jam increscentes febres, etiam Continuas, repetito sudoriferorum, eoque promissio uia non raro curat. Sem er tamen observandus criticus Naturæ motus, ne impediatur; perada Crisi sudor iteratè tunisissimè est, quæ omnis metus Recidivæ tollitur. Eligenda autem temperata, non acria, nec aromatica, aut resinosa, sed vel fixa Absorbentia, communiter Præcipitatio dicta, vel Volatilia non oleosa, aut non calida, in Maligna verò in Principio, & toto Morbi cursu, utramque faciet, paginam Alexipharmacæ & Sudorificæ, Malignitati in

II

specie

(F) Annus depre Venæsectione Vasa sanguinea, & liberum reddere Sanguinis ebullitionem, remedium quondam erit? Forasq; liberari redditâ Sanguinis fermentatione, etiam adultis Corporis calore, poterit Præcipitatio, seu Colla caustica morbifica, premiis fieri, adeoque Morbus superari.

(G) Sed cum hoc Aphorismus juvenibus est & aliis typum Hippocratis: In principis Morborum, si quid tibi videtur movendum, move, &c.

specie resistens, sequendo nempe Naturæ dudum, quæ terti quartæ quævis die erumpere facit Pectechis seu Pusillus, nunc Bubones, nunc Abscessus, &c. Hæc ipsa tamen, prout plura vel minus simul Effervescencia febrilis urget, utrius Absorbentibus Appropriatis, in specie Sulphureis Mineralium fixis, socianda sunt; in Principio quæ temperatioribus, in Incremento, & statu fortioribus; siquidem in Malignis nulla Creditatis aut Coctionis haberi potest ratio, utpote quæ in talibus locum non obtinet, utut in Declinatione eorum subinde aliquid Materie coctæ simile, in Urinis Aegrorum occurrere solet. Quod si minus ad sudandum Corpus dispositum fuerit, tutissimum est Sudorificis addere Opiata; quæ, uti alias quasque Excretionem fusiunt, ita promptissime sudorem promovunt, & Naturam ad faciliorem per sudorem evacuationem disponunt. Sed de hæcenus dictis Remediis vid. HOLTROFF Tract. de Error. Medico. cap. 12.

Opiata quod attinet: per se non conveniunt, per accedens intendam ad mitiganda atrociora Symptomata, imprimis subinde urgentia, usurpantur; alias Naturæ motum impediendo Febres quidem interdum fiunt, sed aut gravius cum Recidiva, aut Chronicis alienis Morbis superveniunt metu. Unde, quando adhibentur, solum in Incremento fiat, non in statu, ut Motus critici plius minus impediatur: non in Principio, ne Naturæ conatus inchoatus sufflaminetur; & hoc in continuis. In Intermittebus verò, præmissis præmittendis, vel ante Paroxysmum ad inhibendum Febrem, vel in Paroxysmo ad sopiendam graviora Symptomata: utrinque nonnulli Appropriatis, vel Absorbentibus, vel Diaphoreticis permixta.

III. Denique ex Fente Diænetice petita Præfida quod attinet. Satis interdu ordinario Symptoma Febrium est, & oriri dicitur à Calore; quod tamen irritat HELMONTIUS, idque jure aperto; quin potius à defectu Salivæ, & à Sale alcalico liaviali Facibus in Paroxysmo adherentibus; hinc in Febribus Scorbuticis, tam Intermittebus, quam Continuis, Sitis est interda, aut tali Siti admodum insequentur ægri. Ratio, quia sal falsum scorbuticum vellicando Fances illam excitat. Hinc etiam, uti rectè dicit HELMONTIUS, aliquot gutta Spiritus, seu Ruginis Sulphuris acidis plius levant Sitim, quam integra mensura Aquæ frigidæ simpliciter sufficit, aut Potus cuiusdam. Nunc ergo ad Calorem, hæc ad Sal falsum vel liaviosum erit recipiendum.

Saccharata quæcumque in omnibus Febribus insigniter noceant, cum saccharum & Mel, Condita, Syrupulata, aliaque Dulcia, sunt admodum fermentativa, adeoque Fermentationem præternaturalem inducant, & ita malum exacerbent. Conf. imprimis de sacchari, & Dulcium nota in Febribus HEINRICUS ab HEER Obs. epid. rar. 3. Item PANAROLLUS Penitentie 2. Observat. 12., ubi similiter Dulcium & Syrupulorum usum in Febribus perstringit.

Vinum vulgè pessimo consilio interdicitur Fabricantibus, quod tamen optimum est: Nam in Intermittebus haustus Vini aciduli, speciatim Rhenani vel Necarini, non nocet: five die Intermissionis affomatur; five etiam in Rigore Paroxysmi, dum Vires nimis prostratæ apparent, propinetur: quia hoc rescitit Aeger: sicut & in Febribus continuis Malignis, & in ipsa Pelle, generosus Vini haustus Remediis locum obtinet, quippe quod ita ignitatem coarctet, stomachum languentem mirè recreat, & pro conservandis & restitendis Viribus summe laudabilis est egrægium: id quod etiam suo modo in Febribus Continuis verum est, sed moderate. Quoad febres verò Continuas Benigniores, in Casu, Tertiana, continua, Hemitritica, &c. Vini adhiacere tutius est, nisi adeo Vomitus, humana Virium prostratio, & Syncope. HIPPOCRATES in omni febre Vinum porrigit: Naturæ enim nostræ Vinum est amicum, & Vires insigniter restituit, prætereaque Acidum ejus stomacho in omni febre laboranti perquam gratum, non raro etiam Urinæ fluxum promovet salubriter, habito tamen delectu: conviciant enim imprimis Vini acidula, & acutata tamen, alba, debilia & aquosa, ut loquitur POTERIUS de Febribus P. 2. cap. 26., non pro Potu ordinario, sed pro Appetitu Aegri, & ratione Virium. Nil magis Sitim in febribus tollit, quam Aci-

dom. Vina autem dulcia & pinguis, qualia Hispanicum & Malvaticum, minus locum obtinent: nempe vi fermentativa Vini, ejusque Acidum Ardentius in febribus nonnullis suspecta sunt, nisi in casu, quo Medicamentum vire solet. Uicous Vini debilis haustus plus Sitim solvere solet, quam dimidia Cerevisiæ mensura. Equidem vulgè dicitur, Vinum calorem inferre, & sic Febrem augere, ratione spiritus sulphurei volatilis: Verum absurdum hanc esse sententiam, ex superioribus patet, cum potius tamen spiritus volatilis, cujus in haustu integro Vini via est, vel Sitim continetur, quam ejus Acidum, stomacho & Viribus deest sit amicum. Sanè, quibus nocet Vinum in febribus, mos ab eis usu documenta percipiunt; nempe mos Philogoni & Aëruationis incrementum, non ob spiritum ejus inflammabilem, sed ob Acidum. Talibus igitur interdendum Vinum, vel mos superingessis absorbentibus vis eius restringenda.

Quoad Potus alios: Cerevisiæ, aut Potus alius confectus alius, non rejiciendi sunt, nisi amor sit molestus, aut Aeger eos horreat. Omnes opterrimus febricitantes, in specie in continuis, recusant Cerevisiam; quia tunc deficit Appetitus, & in stomacho digestio prima plus minus: Ob id Cerevisiæ talis assumpta in stomacho mos coarctatur & cadaveritatur, ac nidorem stomacho mollem contrahit, indeque mollem ipsi eaciat, node mos caustica ejus & abhorrentia sequitur: hinc simplex, tenuis & aquosus Potus, faciliè transiens, Ventriculo amicus, nec cum ladens, est optimus. Apperetur propterea subinde febricitantes Cæcæm, seu Cerevisiam secundariam, vel alios simplices aquosus Potus, item ejus trarrem germanum, Kæuterling, qui ipsi non denegandi sunt: saltem, quoniam facile Flatus in stomacho Hypochondriacorum generant, & stomachi tonum laedunt: propterea, ut corrigantur nonnulli, & stomacho reddantur magis grata, blandæ Acidæ insillanda erunt, Saccus Citri nempe, Cydoniorum, aut alius similis: item Tinctura Florum Bellidis, Cyani, Rosarum, Violarum, cum acido Phlegmate Viteroli paratæ; Spiritus Minerales, tum simplices & dulcificati, tum compositi, Glysti, quatenus bi salia acris lixivialis & nidorosa acra, quasi alcalizata, in stomacho corrigunt, præcipitant, & in aliud esse transmutant, nec non sub capiosiore Potu Stomachum ejusque robur conservant: c. g.

3j. Flor. Rofar. rubr. M. ij.

Infunde in Aquam Spiritu Sulphuris blande acidulatam, stent in loco calido, donec Tinctura emergat: Hæc percolata sumatur, addendo:

Syrupum acris, Citri, vel Berberum,

vel Rabi Idæi,

& F. quævis Julapæ,

S.

Juleps Confortativus.

Vid. Myofebili Decallum Citri.

Vel

3j. Pomor. Citror. an. iij.

In taleolas distilla compingantur Sacc. albe:

Coq. in l. q. Aqu. simpl.

Colatura B.ß. adde

Succi Citri rec. 3iij.

Flor. Rofar.

Papav. errat. an. M. j.

Spiritu Salis acis patum.

Stent in loco tepido in Infusione ad extrahendum Tincturæ. Colatura D. S.

Juleps Cærius Confortativus.

Sic quoque Aquæ in formam Julepi aciduli præparari potest: Item Nitrum Antimoniatum dissolvatur in Potu, nisi Ventriculi tonus debilis, Nausea, &c. inhihent.

In Intermittebus Potus tales aciduli non prius, quam post Frigus aut Horrorem, affligente Aëre, non tamen una vice, possunt admitti: potius tunc primum Potum calidum plius nimis medicatum affumant, cætera moderate Frigidi largius superbibant, ut largius promoveatur Sudor. PANAROLLUS & LANGIUS an suis Epistolis perstringunt eos Medicos, qui scientibus Aëris omnem lubrahant Potum in continuis Febribus, cum tamen in his largius sit præbendas, modo fiat cum regimine (H) nempe

(H) Hæc sunt visum omnibus ferè Medicis erit, qui exente etas jam senile, ante ne Medicinam in hac Urbe fecerunt; omni enim denegato febricitantibus Aquæ Potu, Vini ejusque Spiritu, spiritibus Medicamentis, Febrium omnium Curationem aggrediebantur. Nunc temperis tamen, ut fieri in rebus humanis afficit, profus in curatione curantur; nam non solum Febri, sed quocumque Morbo afficit, ingratibus Frigida potibus, atque nullo discrimine ferè,

tempore in Continuis continis sunt, creberrima quidem, sed quancunque vice parvis, nec nimis frigidus potestinger Potus, sique supra dicto modo scidulatus, ne nocet, & nimis laxat stomachum. Item in Febribus Continuis Malignis optime interit per Potum ordinario nullum ex Aqua simplicis, seu Crocino, seu Rosmarino part. ij. Vin. part. j. vel saltem dimidia, quatuor, & sexta; quibus addit ment. is. commixtus addatur Remus Cicerum in talibus diffusus, & est Potus suavisissimus & convenientissimus. Cui pro subito addatur Gelatina Ceruus Cervi 3j. add. 3j. sic appropriatum magis reddetur. Aliis quoque Serum Lactis bene depuratum & succo Citeri, vel Aento nonnulli acidulatum, in Febribus continuis Benignis, item in Intermittentibus Scorbuticis & Hypochondriacis, Potus est optimus, nisi largius Aiyus inhiere. Sed depuratum esse debet Serum, ne pars viscosa remanens exasperet malum, Cum Remo Citerio in talibus initio parietur, & continet etiam in Morbis Malignis continuis, laxat Aiyum, & temperat sal scorbuticum, & hypochondriacum peccans. Vel in forma Julepi.

M. Seris Lactis 3ij.

Succi Citeri rec. 3ij.

Flor. Bellid.

Sapum. extract. an. 3ij.

Ebulliant vase clauso, donec tingerantur.

Calamag. addit. parum Sarchari.

M. D. S.

Julepi Aperitivi.

In specie spiritus Sulphuris cum liq. Aquae communis propinetur, qui praeiter alia comoda, & copiosum sudorem movere solet. *VID. RIVIERUS Oculor. 1. Observor. 19.*

PIENS de Febribus Par. 2. pag. 21.

Quod viliam ordinatio parum in Febribus Continuis appetunt Aegri, eo id Fabricantibus nequaquam ad Alimenta nimis cogendi sunt, ac nil, quod ipsi paucant, potestingerum illud HIPPOCRATIS: Capere impura (quasi piamur fuit FEBRICITANTIA) qui piamur impura, et magis huius; quia Alimenta quaecunque in Febribus, quae citra appetitum & eam nimis alimuntur, non digeruntur, sed in stomacho calido & languido potius putrescunt, & ferunt febres augent. Laudabilissimum est HIPPOCRATIS Aphorismus 65. *lib. 7. si quis cibum feblicitantia dederit, ut fons robor, fit laborantia magis fit:* Unde in Febribus praeserim Continuis, tenuis Vidus est optimus; & qui magis acuta est Febrix, eo tenuior se siccior convenit Dieta. Unde, licet ad plures dies Aegri jejuni iaceant, perinde erit, nec anquam vidi Fabricantem fuisse peremptum, sed potius, si quid ingeritur, Febrix exasperatur & supervenit enim Cardialgie & alia Symptomata. Nam in Alimentis appetitus paucissime rationem, quantum, & quale, & tempus. Unde consilium est ad Cibum non cogere, vel postulare Aegros; nec voluit HELMONTIUS hos Aegros a Morbis debilis aburgere. In specie Carnium erat, ut avertatur in Fabricantibus, ita nocet his (f); item si fuit viscidior, imprimis in Febribus Intermittentibus, studiose vitandus. Præterea quoque horum, quoque in parva fermentescibilia, nociva sunt: nam omnia, quae augere aut indolere possunt Fermentationem praeferantur in Febribus, nocent. Summatim. Quia Fabricantem se tenuis, parca, neque plus Aegris obducatur, quam ipsi appetunt: frustulum Panis Vinum intinctum, Juleps, leves Pulveres, & ad summum Ova sorbida in Teben, quancunque, tam continua Benigna, quam Maligna abunde sufficiunt; Juleps intermedium Avenace, & Pulvis ex Pane & Cerevisia, magis conducunt, in Intermittentibus vero ingruentem Paroxysmo stomachus fit vacuus; quicquid enim in stomacho comprehenditur sub Paroxysmo, corrumpitur, ac piovit attenuatur, ut Aegri diu ante Paroxysmum cibentur, si forte et appetant Cibum.

Quia Corpus, tam externa in Vigiliis, quam interna in Dormientiis, est optima: sunt, quod quiescentibus Aegri (nisi hoc ex omni modo vium prostratione fiat) & minus sicut, et melius est si tam, & est melior est Febrix, ac benignior exi condicio: eorum si sicut fuit

Tom. II.

Aegri, inflandus, membra inordinat agitantur, suspicibus, &c. eo peius.

Somnus semper bonum signum est, nempe naturalis; praeternaturalis autem comosus, qui malignis interdum supervenit, malus & eundem. Aliis quoque arcendus Somnus est Aegris, ubi enim in Somno rellita Natura, nec perturbatur spiritus, optime suo sanguine muneat, & Codonem materiam ex citis absoluit, unde & Arte in Incremento Morbi, moderate tamen, provocari potest. Ut taceam, abierim ferre esse insensibilem Transpirationem, ac interdum sensibilibus sudatibus sub quiete Somni esse solet.

Et haec de Febribus in genere sufficiant.

CAPUT II.

De Febribus Intermittentibus.

HActenus in genere locutus sum de Febribus, dicimusque fuit Febres consistere in Turgescencia ac Fermentatione sanguinis praeternaturali vitiose aucta & depravata. Jam observandum: quid haec Fermentatio Febilis sit, & sine intermissione fatiget Aegros, donec depravata Malla sanguinis, quae per Grati Naturae beneficio precipitata & segregata heterogenes excludat, aut adjuvamento debita Evacuatione artificiali insinuat, imprimis per sudorem eadem expellat; aut illa Effervescencia febribus est praeparata, suis interstitiis distincta, quibus elapsa novus Insultus, & quasi nova quaedam Fermentatio redditur. ut in genere Febrix omnis aut sit Continua, aut Intermittens. Haec vice de Febribus Intermittentibus, de specie, quod attinet Febres Intermittentes sunt, quae poli intervalle sunt brevis, non longius, diversa redeunt Paroxysmis, tempore interduci aut omni Febre penitus vagantur. Unde, dum Febrix de genere est Morus spirituum praeternaturalis, & sanguinis fermentatitiosa & depravata, seu agitata eisdem insidiosis, atque plurimum cum Calore & Siti, aliisque praeterea vasis Symptomata mellea, quibus Economia animalis varie perturbatur, hinc Febrix hinc eermittens erit interpolata, ac quasi asperata nullo sensibilibus Fermentatio. Revertenda autem est Febrix inae Symptomata Alimenti depravata spirituum & Malla sanguinis, qui vero malum dehaere per Morbum Intermittentem, hi possunt respectu Qualitatem, anstrem secundariam tunc interperiem Calidam, nunc frigidam, vel secundum Qualitates nostras primas, Intemperiem Acutam, vel Siliam, vel Amaram, aculeatam. Unde pro sanguinea Paroxysmorum accessione ac interstitio diverso, Febrix haec diversae quoque interduci nomina. ut Quotidianae, Tertianae, Quartanae, &c. Nam si quoties novus redit Paroxysmus praecedat, in proportionem respondens, (haec enim est cautela in Cura Quotidianorum) dicitur Quotidiana; si vero hoc contingat tantum alterius diebus, & una dies fit vacuus, dicitur Tertiana; si poli duos demum intermissionis dies revertantur Paroxysmi, vocatur Quartana &c. si licet praeter Quotidianas, Tertianas, & Quartanas etiam dantur Quinanae, Sextanae, &c. Mibi sane contingit videre Febrem Quotidianam, singulis diebus Venetis circa vespertem redeuntem, quam, praemisso Vomitorio, spiritus salis Ammoniaci breviter proligari. Exempli saltem febrem Quotidianam, Quotidianam, & plurimum aliarum, videb. in SCHENCKIO lib. 6. Observ. de Febribus, Quotidianae febres, quae Febres Malignae singulis moribus tantummodo redeunt, quae exemplum in Juvete observatae annotavit SCHENCKIUS, est eadem: idem Exemplum observavit LINDANIUS in Muliere, quae toties, quoties mensuram pabulorum purgationem, ordinario per tantum feblicitate, imo dantur etiam Febres Amplexaria, seu singulis annis certo tempore redeuntes; hinc Febrix, quae die Natalis, quotannis affligebat, & tandem etiam exstinguenda, fuit tolerata vid. SCHENCKIUS c. 1.

Febres haec nunc sunt simplices, nunc ex pluribus Intermittentibus sunt. Compositae, quocumque nempe non uno & sim.

Ille, passim plausum ferere bonum vult, non solum explet, sed ignoranter docuit. De hac Melli Methodo inferri debuit, impetum ob assu: sufficiat tamen hic monitum, tantum ab Aegri potu adhibendum Febriquantum, praesertim poli primis elapsis diebus, fere semper narium esse: Febrix enim adhibenda exacerbat Corpus, hanc Equam mellea, in quo Caput, fere, & Vires ipsi primo confusae, oportet reddere.

(f) Patet hinc quoniam granatibus male confusae mstrati Maliciale, imo & naturalis Medici, qui Fabricantibus primis etiam Morbi debilis, Carnem melle melle paratam, de vasis sanguinis conditum, rellant stomacho, per vasa mendum exhibent.

pilii Paroxysmo. sed duplici aut triplici vice Periodos febriis absoluitur: Tales sunt, ver. gr. *Quotidiani duplices, triplicis*, quoties eodem die duo trefve proportionate varia successively sibi respondentes producantur Paroxysmi. Dantur *Tertiana duplices, triplicis, item quadruplices*, ex tunc Tertiana compoſita; ſive in Tertiana duplici eodem die bini, ſive alternis diebus ſingulis revertantur Paroxysmi, ſicut in Tertiana triplici nota die bini, altera unus tantum obſervatur Paroxysmus. Id quod etiam de Quartana ſimiliter obſervatur: Contingit enim, ut aeger uno die ſi immittitur à Febre, & deſus ſequentibus paſſetur Paroxysmos ſingulos, atque tunc eſt *Quartana duplex*: Quia & contingit, ut quotidie nova recurrat Paroxysmus, hoc tamen ordine, ut primus in proportionate durationis, aſſiſſionis, ſymptomatum, &c. reſpondeat quarto, quartus ſeptimo, ſecundus quinto, quintus octavo, tertius reſpondet ſexto, ſextus nono, & ſic conſequenter; & tales ſunt *Quartana triplicis*. De his vid. SYLVIVS l. 1. Prax. cap. 27. §. 13. & ſeq. & SENNERTUS Paralipomen. pag. 175.

Et his amplexibus de *Febribus Intermitentibus Quotidianis* adhibere oportet, impetum, ut dicitur? hoc eſt, an deſat talis febris Intermittem, quae quoties ſimili tempore accurrat, ita ut ſecundus Paroxysmus primo, tertius ſecundo, quartus tertio, &c. exactis ſint ſimiles; ſive in incremento accreſcant; ſive in ſtatu ſimpliciter conſiſtant in Declinatione ſimiliter decreſcant, Paroxysmi horum utplurimum ſunt horarum octo, intermiſſio 16. ſunt, qui affirmant, tubide ad haras 24. extendi Paroxysmum, ita ut Continuus ſimilis appareat. Multi affirmant, multi negant: Qui affirmant, GALENUM producant: Qui negant, producant Experimentum. Cum enim in Schola Galenicorum preter ſanguinem tres fluantur Humores; à ſile deſervantur Tertianam: à Melancholia Quartanam; hinc accerſit à quarto Humore, Pituita, voluerunt ſequitur Quotidianum produci. Qui negant, uti dictum, producant Experimentum, quod tribuunt obſervat ſine talis febris; Quare etiam à BARBETTE omnis Quotidianam creditur Tertiana duplicata. Sed verior eſt ſententia affirmativa, ut ut certum ſit, raro obſervari Quotidianis Intermittemes: vid. tamen RHODIUS *Comment. 3. Obſervat. 3. & 5.*; ubi Exemplum habet de *Febre Quotidianis Intermitteme 4. an. etiam*; à ſile GARELICOVERUS *Comment. 6. pag. 137.* obſervavit ſeſquidigitur ſingulis diebus hora certa uadentem. Verum deſciuntur interitum Medici. (ſicut ſatur, quod ipſe ita fuerit deceptus,) ut, quando febris quoties recurrit, potuit eſſe Quotidianam; quae tamen ſæpius eſt Tertiana duplex, ut in principio ſingulis diebus eodem tempore & eadem proportionate recurrant Paroxysmi: eventus deſcripti, ſuſſe Tertianas duplices, cum vel Tertiana prius ſimplex fuerit; vel interitum tales ſimuliter ita, ut uno die Paroxysmi coſeſſet, alteris poſtmodum diebus recedentes; quod clarum Exemplum, ſuſſe Tertiam duplicem; vel ſi quidem, ut unus Paroxysmus tubide ſoleat poſſe ponere, altero ſtatum tempore obſervare, quae ſimiliter obſervatur, ſuſſe ſecundam Tertianam duplicem; quae deſcendit quando ſit, ut Paroxysmi ſe mutuo inſequentes non habeant eandem ſe ſe ſuicem proportionem, ratione nempe temporis inſequenti, aut ratione durationis, aut ratione comitum ſymptomatum: ita talibus caſibus ubi non reſpondet ſecundus primo, tertius ſecundo, & ſic porro, ſed Paroxysmi in tali caſu tertius reſpondet primo, quartus ſecundo, quintus tertio, & ſic porro, ſimiliter eſt febris duplicata: Tertiana, ut quicquid invadens. Interim eanti ſonus in deſcriptis Quotidianis non miſui arbitror, ſimpliciter negandas eſſe, cum nulli appareat ſpæritatatis ratio; quin poſſint, ſicut Tertium in Quartana, ita & hæc in Tertianis facili mutari poſſunt. Sed æquum totum pendet à Conſuetudine, unde ordinata iſta Febrium ſit Periodus; quae quilibet licet in obſcuris, etiam præſens de Quotidianis Controverſia ſerò in ſuſpenſis manet.

Sed præter hæc ſcitur certa Periodo affligentes, obſervantur etiam febres Intermittemes, quae nullam Periodum obſervant, ſed plane incerto tempore redeunt & affligunt; quales ſunt *Irregularis*, vel *Irregula*, item *Erratica* communiter, HIPPOCRATI *Planeta*, dicuntur (K); & verò ea ſcitur originem ducunt.

Erratica ſunt, quae quidem aliquam Periodum habent, ſed ita, ut videantur non habere: ſic v. gr. bodie invadit hora duodecima, perendie ſexta matutina, curſus perendie veſper ſexta, rurſus perendie hora decima, &c. ita ſunt, quae plane nullam Periodum obſervant, neque

tempus accedendi vel recedendi habent; quibus aliquando per noctes diſſipant aliquos in ſeptimana remittit, & tunc redeunt ſit mori Tertiana, mori Quartana &c., utque communiter hæc dunt promiſſe ſuſcipiunt.

Hæc Febrium Intermittemium, quomodo affligant, & ſucceſſivo ſymptomatum ordine Paroxysmos abſolvant, optimè enarrat SYLVIVS l. 1. cap. 30. §. 23. ad 26. In genere tamen triplici primario ſymptomate, quoque indiſtinguendo, præcedente ſcilicet *Frigore*, ac *Horrore*, vel *Rigore*, unde Germani dicunt, *des Kalte*, & ſubſequente *Calore* plus minus intensio totius Corporis, adeoque emanante *Sudore* largo, moleſtus fuit hoc ſignis.

Hæc tria verò primaria conſtituunt ſymptomata Paroxysmum, quæ ſæpe ſemper, ut utplurimum in Intermittemium Paroxysmo præcipi ſolent, aut præcurſus ſignificatiorem varietatem nunciant, nunc alterum ſymptomata, vel abundantè vel deſiciente ſoleat, & ſecundaria quali ſymptomata ſuperveniant. Præcipuum nempe *Ægri* ante Paroxysmum febrium Intermittemium (in totam curam deſcribam Periodum) *Officiationem & Paſſionem*, quæ & *Laſſitudo* *Animæ* univerſalis ſubinde eſt moleſta: hinc non deſineſcit ſuſcepti ſunt in *Laſſitudo* *Corporis*: Hæc moleſtis ſubſequitur plerumque Corporis quædam ſens *Refrigeratio*, quæ Refrigeratio, quod bene notandum, ſervior ut ſaltem præcipit ſimiliter eſt in regione Lumbari, itat in Dorſo ſurſum & deorſum tepere videntur: Unguetis impugnetur Paroxysmus ſunt lividi aut capſuli. Frigus in Abdomine ſentitur, hinc magis, magisque totum Corpus, & in ſpecie extrema Dignorum, Manuum, Nafus, Manuum refrigerantur; conſequenter *Ægri* circa regionem Lumbarem de ſenſe ſacrationis. Frigori huſus eſt nunc levis *Horror*, nunc gravis *Rigor* conſuetus & quæſitus Membra, ut Patientem Epileſia affligi videntur; durante Frigore Dolores ſubinde nunc rodentes, nunc lancinantes, moro Dolores vagi Artus affligunt, nunc alia Termina & Marmor inſolent Abdomen, donec tandem remittant, nunc immoſitate quod bonum, nunc, quod poſſit eſſe, ſucceſſive & certo intervallo, & incipiente frigore. *Pallor*, uti eſt frequenter, ita ſit inguente *moror*, ſit etiam *debilis*, interdum ſum debilis & exiguus propter fermentationem ſanguinis immutata, ut viſa digitis præcipi queat. In hoc frigore, ut remittente huius frigore, ſubinde *Accidit* circa *Præcordia* ſolent affligere *Ægri*, unde tunc ſenſus *ſenſationis* Frigus mutatur in *Calorem*, cum quo calore interdum ſit, quæ rarius, aut ſaltem non adeo vehementer, arguit in Frigore. Cum Calore *Pallor* ſit continuus frequenter, ſenſim ſit *moror* uti *debilis*: Ubi enim in *Corporis* ſenſationis *Pallor* eſt parvus, ſigam ſeri eſt ſolus Febriſ *Maligæ*, ſummaque virium proſtrationis, ideoque non parvum imminet periculum. Calori autem accedat *Lingua arida*, *Reſpirationis*, nonnquam *Capſus Dolor*, ac *Ægri Tempus* & *Culſus* pulſatilis, *Ægri*, non raro quæſitus in Paroxysmo gravitatem *Delirium*. Hinc remittente iterum nonnihil Calore, *Sudor* emanare ſolet nunc copioſior, nunc parior, cum quo Paroxysmus evaneſcit, itat hoc ceſſante nihil amplius morboſi in *Ægro* reſtare videntur, aut ſaltem *Urina* ſequitur copia excreta, inſequente tunc ſerò Somno vario, nunc magis, nunc minus quieto, Somniis variis moleſto ac turbato. Notandum tamen, in Tertianis magis affligere *Æſum*, in Quartana Frigus & Rigorem, in Tertianis maiorem *Satim*, in Quartana maiorem *Artuum Laſſitudinem*, quæ & eſt poſt Paroxysmum ſolent affligere. Hinc eſt quidem modus ordinarius, quo ſolent invadere Febriſ, ſubſequente tamen obſervatur ſubinde amalia ſeu deſcriptio in Paroxysmi à conſuetudine hoc ordinis: ſic enim ratione ſymptomatum dantur Febres ſimpliciter *Ægri* vel *Frigitis*, ſeu tales, quæ affligunt cum Frigore aut Horrore, quem autem nullus aut omnino levis inſequitur Calor, uti in Febribus *frigidis* *** etiaſi appare ſolet, de quibus *apud*: Contra etiam dantur Febres Intermittemes ſimpliciter *Calorem* ſeu *ardorem*; idque in ſpecie Tertiana, via Quartana, quæ circa Frigus aut Horrorem uſtat, mori à Calore & Ardore gravi inchoant, qui Calor etiam interdum poſt Paroxysmum ſubinde durat, ut ſaltem leviſ admodum ac pedetentim remittit. Rarum interrim eſt, inverſi horum in Paroxysmo ordinem, itat *Caſus* præcedat, ſequatur Frigus, &c. vid. PRIMEROSIUS de *Febribus* l. 1. cap. 4. pag. 98. Unde pro huiusmodi ſymptomatum variationis ratione in Paroxysmo, plures *Arduales Intermittemium Differentiæ* emergunt, dum dicuntur Febres *ambigua*, quæ ſæpe ſemper, impetis in Ter-

clanum principio, corripiant vomitus; raris dejectionibus ordinariis; *Stomatia*, quando siue nimis ac extrordinarij urget, idque tam in frigore, quam Calore, quod in scorbutis subinde solet errare; *Stomatia*, quibus conundia fames gravior, & sanguis iniepiabilis, idque facilius inchoate paroxysmo, aut saltem eodem continuatur; Febris *Cardiaca*, quae cum molesta Cardialgia coniuncta sit; *Terminis* seu Colicis, quando in principio paroxysmorum, aut saltem in statu, subinde Terminis ac doloribus abdominis sunt molesta; *Anaestis*, quae imprimis cum infania anaesthetia, praecordiorum angustia, & hypochondriorum tensione sunt molestae, quae symptomata emitti Flatus vel Rectus alleviant nonnulli, quales Febris *Anaestis* iis, qui malo Hypochondriaco sunt obnoxii, solet ut plurimum contingere; *Tegitales* (qualem ipse vidi) quae inchoate paroxysmo cum gravi Tussi solent esse molestae; ita his est tussis, & in qua parum, aut omnino nihil, animi recusat; Item *Dolus*, quando nempe in paroxysmo, imprimis in declinatione subinde delirium adesse & recurrit; vel declinatione dico: nam enim est, ut in principio Maris ad delirium: Vld. MARCELLUS DONATUS *lib. 1. de mirabil. lib. 1. cap. 14.* qui observat Delirium Melancholicum in Muliere *Quarta* laborante, quod Delirium Melancholicum singulis Paroxysmis mox in principio reddit, remittente vero paroxysmo & ipsum remittit, & intermitte; & hinc inde etiam plures tales, aut etiam aliae in praedictis occurrunt, in specie prolatis in SYLVII *praef. l. 1. §. 7. & sequen.* Quibus additae febres *Hystericae*, l. c. quae in paroxysmo consueverunt sunt cum pædectis *Hystericae*, imprimis cum suffocatione hypochondriaca; quae exemplum videbitis in M. A. N. C. *anno 1. observ. 193. pag. 195.* & *Terminis* superius in M. A. N. C. *anno 1. & 3. Append. pag. 45.*

Observandum hic est, diversissimè Febres degenerare, & in invicem quasi transmutari: V. g. frequenter observari febres intermittentes ordinario modo stilentis, quae post aliquot Paroxysmos, abque frigore, & rigore praevio, solo calore agris fuerunt molestae: E contra nonnulli Tertianae intermittebant, quae in principio fuerunt simpliciter ardentes febre calida, sed post aliquot paroxysmos reverè in typum suum ordinarij frigoris, & Caloris transmutatae sunt: sicut frequenter occurrit, ut intermittebant Chronicæ mutant formam, & declinant solo horrore aut rigore crucient aegros, absque æstuatione superveniente.

Utque autem Febres Intermittentes Continuae Benignae frequentissime sine, observantur tamen intermittebant malignae periculose, ita dicit, quod iussu febrium malignarum continuatum cum pulso parvo ac debili, insigni virium prostratione, summa Cordis anxietate, inquietudine, in principio paroxysmi affligunt, internum Bæmatematum vel Pæchochorem erumpente, & similibus fœnibus symptomatibus, sapida sunt letalia. Dubium quidem hic quibuscum occurrit: An dantur Febres intermittebant Malignae? Siquidem has ipsas vias ac ne viz quidem naturae sufficere posse videtur, quia turbas caeteras continuas, vimque inferat corpori, nonnulli aegri, ferèbunt. Sanè, si graffia febres Febriles malignas etiam in intermittebant omnia eadem symptomata observantur, quae in aliis tunc temporis frequentioribus continuis, & contrariis occurrunt, ac praeterea in casibusque intermittebant paroxysmo incrementa Calore pulsus non est magnus, sed est parvus & debilis, eret & frequens, signum ferè solet esse intermittebant malignae; imprimis si reliquae modollegatae sint conspiciant. Reverè non negandum videtur, eam Observationes Malignitatis in Intermittentibus Febrilibus indices non raro in praedictis occurrant, aut ab his mutatae nomine *Pæchochæ* vocentur: Consil. JULIUS CAESAR CLAUDIUS *Relat. 2. SENNERTUS de Febribus l. 1. cap. 16. pag. 481.* ubi de *Tertianis* MENOTIUS *de Febribus Malignis* *pag. 30.* Sic exempla talium Tertianarum & aliarum intermittebant Malignarum, praeter GALENI testimonium, videbitis in EPIPHANIO FERDINANDO *lib. 15.* de Febre Tertianâ primo mti, quae postmodum omnia maligna, & pestilentialia facta sunt; quia, & tales tertianae malignae videbantur sunt in RHODIO *qua. 1. observ. 9. & 10.* in qua convalescenti maculae lividae prompserunt: ita maculas pæchochales in febre tertiana observavit MARCELLUS DONATUS *lib. 3. lib. 1. de mirabil. cap. 14.* Quis, & tertianae duplices primo, & contagiosae epidemicae, & deinde etiam simplices, sudoriferis imprimis curatas, videbitis in SALMUTH *cap. 3. observ. 3.* Item tertianam duplicem malignam curatam in RIVERO *cap. 3. observ. 78. ann. 4. ob-*

serv. 1. & 15. Item aliam similem malignam Bernardo *lib. 1. de febribus curatam* idem habet RIVERO *cap. 3. observ. 36.* & *observ. 4. Pacheco ann. 4. pag. 260.* Nec solùm Tertianae, sed & quartanae malignae observatae fuerunt; vld. in MARCELLO DONATO *cap. 1. lib. 1. cap. 6.* item quartanam malignam habet HORSTIUS *l. 1. observat. 193.* & 194. Additae his FEHRIUS *Tract. de Scorb. pag. 731.* ubi intermittebant pæchochalem malignam, recenset; imò de Peste Londoniensi testatur HODGES, eius febrem nonnullam per paroxysmos, quavis ut plurimum sagis, afflixisse. Denique antedum Epidemia grassari solet febres Intermittentes, sive vitio Aëris, sive alimentorum contrahantur. Exempli viti in WILLIS *de febr. item BARTHOLO-*

NO C. 2. lib. 36.
Hæc in genere de febribus Intermittentibus, earumque variis symptomatibus.

CAUSÆ.

Hæc Febris omnes Intermittentes cuiuscunque sint Typi, & quibuscunque sitae sitae sint symptomata, epidemiam tamen omnes sunt naturae, & essentiae in radice; cognoscunt enim eandem omnino Causam, Focum, & fieri modum, sive sint tertianae sive Quartanae, sive sint simplices, sive duplices & diversificatur solum pro subiectorum, & hinc certarum quorundam Circumstantiarum ratione; secundum rerum Naturalium, Non-naturalium, & Praeter-naturalium varietatem, & quibus etiam Causis post-modum tanta diversitas symptomatum in his emergit febribus: Unde etiam eundem modum mediandi ratio in aëmbus ubi eademque in methodo medendi generali, saltem accidentibus symptomatum diversitas nonnulli observetur.
Pater hoc ex eo, quia sunt faciem permutabiles, quibus permixtio non deprehenditur, & ubi inter hibernis symbolum, seu quoque invicem symbolizantur, h. e. quae essentia conveniunt: Sic non raram est, febrem primò simplicem fieri duplicem, febrem Quartanam fieri Tertianam, & Quartanam quoque in Tertianam subita mutari; & vicissim Tertianam in quartanam, si dem utrobique perniciosas symptomata, argere videntur, utramque ab eodem humore generari, ut loquitur PIENS *qua. 31. de febribus lib. 96. & 194.* Nempe praesupposito spirituum motu & impetu, seu universalis efficiente motuum, cum animalium, quàm praeter-naturalium morborum, adeoque febrium causa proxima materialis seu occasionalis investiganda, quae ratione radicalis originis & foci ventriculum & primas vias, ratione vero alterationis primariorum, & inflexionis massae sanguinis speciem afficit.

Arbitror ergo Causam hanc proximam esse fermentum, prope naturalem in Ventriculi genium, quod subinde massam sanguinis alterando ratione motus fermentativi immutat, & partes nervas primarum viarum vellicando, & ratione acrimonie hostilis, occasionem de praeter-naturali spirituum motui, & hinc ceteris omnibus symptomatibus, quorum complexus paroxysmum constituit, suggerit. Fermentum hoc, cum admodum activum, saltem est proleptis, & quae acida; Constituit enim in hoc, & supervenientia symptomata; & cum eademque intermittebant Continuis, Continuis quoque, tantum causam omnium febrium Intermittentium remotam, fabricari puto in stomacho, & primæ viæ, ex vitia nemp ventriculi digestionis immutata, vel depravata; sive in fermento digestivo, sive in alimento assumpto, hæret vitia. Occasione enim digestionis levis & Acido fermentativo naturali facile praeter-naturali fermentum emergere, sequi in alimentorum reliquiis, stomachi rugis invicem, inferere, & ita fontem febrium intermittebant pro pluribus paroxysmis recurrentibus suggerere potest; uti hoc patet ex appetitu praeternaturali, qui in his tertianis potenter etiam abolit, imprimis vero circa paroxysmum imminuitur. Notum namque est, nonnullis antea liquis ex usu rei averitæ, vel ipsi aliis horridis, incisive brevi post in febrem; sicuti e contra ex usu rei appetit intensior ac sumptus, ut apparet etiam noxia, & diuturnis correpti febribus opem nonnulli fuerunt. Confirmat hoc, quod febrer recidivare facias, aut eadem adhuc decantes insigniter ranciores aut citius duplicare solet. Non raram etiam est, quoniam si curare in his febribus sola pertinet ac fluxu lentia, ceteri alii curantur excessivo potu, sequente vomitu, sive liquore largiore, & profusore sudore, quod Germani expriment *Galenus* *de febr. aufzuehender oder verlorren* / Exemplum passim sunt obvia; Quædam saltem eundem: Novi hic Mu-

Mulierem, quæ ultra tres menses conficta fuerat cum Tertiana, sub longi Medicamentorum abusu: ipsa denique correpta appetitu Halecem, illum, medico licet non conuincere, avidè devoravit, & exinde præter spem & opinionem febrem curata fuit. Novi hic aliam mulierem, quæ naturaliter avefcerat Calem: huc cum claus, & ipsa necienti auxilium cæci cum aliis diebus fuisse oblato. Ipsa hevi post nausæ correpta, & vomitus mox subsequenti, febre tertiana 17. hebdomada afflicta, à qua nec ipsa potest corari, nisi quod aliquando intensè similiter appetente Halecem, quo comestio ipsa similiter sua evasit. Facit hæc exemplum WIERI in *observat.* de quodam, qui, 31. Hæmorrhæis semitosis etatis, liberatus à quartana evasit. Sic novi hic virum, qui estu Aqueillæ, quæ naturaliter abhorret, & nonnulli iuvicis comederat, in febrem tertianam, ultra quadrantes anni durantem, incidit. Ut plurimum in mutatione Vitiis peccatum Febres producit.

Remanet ergo: Causam omnium febrium intermittentium oriri io homacho ex vitio digestionis, prout, ejusque certa eruditæ acidia: hinc rarum est, quod tales febres sint epidemicæ vitio Aëris, vel vitio Alimentorum contrariæ, qualia exempla videlicet in SALMUTH à. a. RIEDLINI *observat.* 23. & 24. WILLISII *Traictatus de febribus cap. 3. pag. 127. cap. 16. pag. 244. cap. 17. & de quarta Epidemica cap. 6.* item io BARTHOLINO *cert. 2. lib. 2. cap. 36. ut supra notavimus.*

Non ergo putandum est, ex diluio Visceribus afflicto, ut falsiquidam dicunt, diffidias etiam exurgere febres, dum tertianas ex vitio hepatis, & Biliæ, quartanas ex vitio Lienis ac Succi Melancholici, Quotidianas solum ex stomachi vitio oriri volunt. Dicit: At observatur labes talium viscerum, in aut io quartana Scirrhi, io tertiana Icterus siveus conspicitur. Respondeo: In principium harum febrium hæc viscera ut plurimum esse salva, & sana, utque diuturnis redditibus his febribus, aut pertinaciter resistebant illis, subinde Viscerum talium Tumores aut Scirrhi, præsertim in quarta, nempe per ægentiam nimis, seu paroxysmum cohibentia, superveniunt, & adeoque non ex causa radicali, sed potius hinc Tumores, & viscerum labefactiones sub diuturno febrium curio, tanquam producta morbo ex causa falsæ Sanguinis Crasi superveniunt certum est. Interim concedo facile, in factum iam sporadicum Viscerum, item alia corporis vitia, v. g. suppreffa mensura, & ægravare aliunde rursus febres, & oblationes reddere, aut crebrius se facilius reddere occasione subinveniente, propter Cachexiam sive habituale, & dyscrasiam in Massa Sanguinea repositam, & etiam sanos ad eandem disponere posse, ut sunt quædam exempla Quartanarum, post suppreffionem mensuræ ortum; ita tamen, ut ipsæ febres sibi, & salum morbum auctor, fabricetur in stomacho; nempe io huius Digestione prima, nec totius corporis fundametalis, indigatur turbata; uti notum est in Mædico suppreffis infestis nauseam, Vomitu. Præsertim, & similia stomachi vitia. Quod si ergo in stomacho vitiosus digestio Chylus, aut licet non digeratur vitiosus, si tamen vitio succorum, Pancreatici, & Biliis, non rectè separatur à fecibus alvina, & ex postmodum infundatur sanguini, non potest rectè nec convenienter eidem assimilari.

Ex hoc fonte ergo ut plurimi alii exurgunt morbi, ita, ubi massa sanguinea per se exitis facile fermentativa suo sponte effervescit, v. g. io juvenibus biliosis, ebriosis, &c. aut à quocunque data occasione, aut Compulsi, aut Irm, aut suppreffis infestis Transpirationibus, aut fermentatione præternaturalem disponent, aut denique si ipsa Chylus non rectè solutus per se fuerit nonnulli fermentativus, v. g. ex fructibus horæ, æt pota non rectè defecata, ex dactylis &c. tum facile massa sanguinea his heterogeneis non rectè assimilata particulis, in quibus ad primarias facultates salinas semper versipendunt, turbida, data tali occasione in fermentationem vitiosam erumpit, sicque febrem paroxysmum concipit.

Quod ut pateat, observandum: vitium istud concoctionis consistere imprimis in Chylis non rectè soluti veluti ac temperato; sed potius acido ac vitioso nonnulli, pès modis, prout diversimodè variatur digestio. Unde diversimodè pollandum variat febris, accedens illi atque alia in omnibus subiectis sanguinis crasi. Sæpius juo, & interdum ad turgescentiam usque impleta, massa sanguinea talis materia vitiosa tale assimilata; tunc pars illius materiam vitiosam in sanguine compendit naturalem omni fermentationem data occasione turbat. Unde cum sic acidi ap-

viscidæ & particulas massæ sanguineæ, salinas volatiles ac oleosæ quodammodo obrutæ, sanguinem ad aliqualem coagulationem disponent aut inspissat, & ita notabiliter sanguini Fermentationem imminuit. Unde ingruens paroxysmus pulvis sit minor, licet etiam debilis præter debilem fermentationem sanguinis, interdum via observatur, utut Cor depravatus sanguinis Fermentationem irritatum frequenter se contrahit, sicque pulsum frequentiorum edat. Turbata ita sanguinis fermentatio, tunc illa ejus fermentativa non rectè invicem agunt, nec partes ejus oleosæ ex mora fermentatio debitu calore concipiunt, calor sensim deficit corpori, & frigis succedit, quia & turgescente sanguine, & hinc confusæ ac perturbatæ spiritibus animalibus & vitalibus, Lassitudo sanguis perhendit artus. Dum verò materia peccata seu fermentum febile delitescens, ex errore primæ digestionis gæstum, exaltare se incipit, plus minus vellicat partes nervosæ, & membranaceas ratione aciditatis hollis, hinc coram spasmus, Frigus, Horror, & rigor, modo major, modo minor succedunt: Io rigore enim primario vellicatur Portio, hinc carnosæ, & scet universum membrarum corpus, in specie abdominis, systema, unde & frigus intusque, imprimis in abdomine & lumbis percipitur. Quæ nempe membræ quæcumque totius corporis continuatæ & conjunctæ membranis cerebri involutis, adeoque facile pars una alteram per contentum, & ipsius afficere potest: vid. D. KROON in *parvo Traictatu de morbo Melancholico in suo Traictatu Willsi de nervis, & infra, ubi de Cephalalgia*: Unde oritur Muscularum motus, v. g. Muscularum Labia moventur, & sic fridit dentium; musculorum dosum elevantur, unde illa elevatio ledis, Germanicis: *die fröhlen, daß ihnen die Zähne klappen*, und daß sie immer in der muer dem Bette in die Höhe springen. Hinc & io horrore & rigore, qui revera nihil aliud sunt, nisi membrarum convulsivi motus, (nam quod in musculis est motus convulsivus, id in membranis est rigor,) dum ita spasmus concutitur partes membranosæ, unde Luncinationes ac alii dolores lombares mententerici, sicut & io extremis partibus Luncinationes artuum vagæ oritur, etiam stomachus, & intestina, & his conensa. V. g. Cholericæ, & Pancreaticæ velluntur, & ob illi contenta sua quocunque modo coarctata convulsiva mora coagula ægræ, ex quorum plus minus naturaliter constitutum concursu orimunda effervescencia, non tatum varia abdominis symptota contingunt, sed hæc illa effervescencia & regurgitando in stomachum, eundem in principio, & incrementum siveque ad crebras & violentas illas vomitiones.

Ubi tamen non est putandum, materiam totidem, nunc assimilant, nunc vitiosissimam, latuisse in stomacho, & semper esse motum; Nequequam: sunt potius hæc ipsa succorum Pancreatici & Biliis invicem commixti.

Fermentum interim hoc febile sanguinis permixtum simul & vitiatum sua naturalis viæ motum fermentationis pervertit, hinc spirituum vitalium debitum emulsionem & volatilisationem aliquantisper falsamorat, necnon debitam localisationem eadem primitus impedire potest: (sollat Vini denso ebullitione patentes, turbati tuæ videtur massa sanguinis; hinc enim io hanc pulvis parvi, minimeque vehementer esse solent.) donec ipsa fermento cum sale volatili oleo sanguinis ad præternaturalem effervescenciam committat, atque per tempus corpus incandescentia illa insignis, cum sanguinis Turgescentia, alba, & ardore, pulsi magno, frequentiore, vehementiore, & celeritate, donec materia fermentativa vitiosa omnis solutæ, & in hanc sive in Vini præcipitatur, quæ, & à reliquis partium consortio liberata, Seroque copioso per Balneum ætenuum imbibit, & copiosè exhalat. Aut, a quod frequentius, effluvidio quasi crasso exhalat, & ita massa sanguinea aquatilis ac naturaliter denso fermentans, & febri omnis remittit, se intermiscit, idque tandem, donec similibus recentioribus fermentabilibus in massa sanguinea adhuc hærentibus denso ex parte maturata, & turgescentiam concipientibus, novis redeat paroxysmus. Hinc etiam in *Barrovis calidæ æræ* sanorum est similis, vigore adhuc fermentationis mora, quæ post paroxysmum collecta crassa, turbida ac copiosa sedimento coacta, solet erigere. Quæ Tragedia tandem durat, donec massa sanguinea omnis depurata ac quasi defecata evadat.

Ex dictis noto: ex acido, & si le volatili urino, in sanguine quasi effervescere, totam paroxysmorum histosiam esse explicandam; ita quidem, ut sequi, horrore, & rigore ipsique

ipſaque Febriſ, primariò dependet ab Acido vellicante membranas Abdominis parietibus, ſpeciatim Stomachum & Inteflina tenuia, quò convulſivo impetu quantuntur, & in conſenſum rapiunt cæteras membranas partes. Simile quid obſervamus in aſſumptioe rerum Ventrículo inimicarum, v. g. Medicamentorum amarificantium &c., quibus hauſtis aſſiſcitur Ardeum, & hinc genas nervolum, Rigorem experimur ſimiliſſimum Horrori febrili; unde Germani: *Er erſchauer ſich durch*. Acidum autem in Intermittentibus vellicans teſtatur tallum Febrium Cura: (1) Per *Aſtricta vel Aſtrictoria*, ſua aut volatilia, uti ſunt ſal Abſinthii alcaliſſimum, ſal Tartari, nunc ſolum, nunc cum Oleo Baccarum Juniperi deſtillato aſſumptum. (2) Quòd Rigore & Frigus potentiffimè ſedentur per *Olea deſtillata*, in ſpecie Caryophyllorum, tam intus aſſumpta, quam extra. Præcordia illita, penetrando enim ſuo ſale volatili oleoſo deſtrunt Acidum, vellicant partes membranoſas Ventrículo & Inteflinorum, & mirabiliter Rigores ſopiant: ſicuti & aliis in uſu eſt hoc Oleum penetrantiſſimum, ut Spinam doctiſſiſſimam emet inuaginandam jubeat, quod etiam non culpandum erit. (3) *Opia*, ſedulitate partium, & inde dependentes convulſivi Motus ſopientia, cõſiderè Rigores placent.

Culæ Paroxyſmorum verò & *Ætus* in Febribus ordinariè ferè urgens, quòd ſit ab Acido Fermento in Maſſa ſanguinea, per viciorum & inordinatam Fermentationem cum ejus ſale volatili oleoſo, ita quidem, ut Acidum miſis prædominetur, teſtatur quòd Acidus, imprimis *Nitratuſ*, ut Nitrem antimoniorum, Nitrum viſciolaſum, i. e. Arcanum duplicatum, ſpiritus Nitri doleſci, &c. optimè *Æſtuationes* compellunt, figendo & coherendo tam Acidum volatile, quam ſal volatile oleoſum acre, indeque natum Efferveſcentiam intenſiorem, & ita nimis tumultus compellendo.

Obſervandum ulterius: quòd viciata Sanguinea Maſſa ex viſio Digefſionis primæ neceſſariò etiam vitiorum primariò poſt Maſſam ſanguineam *Suæ*, *Biliſe* & *Pancreatice*, quibus in Paroxyſmo uteritur in Inteflina effluſis, adeoque plus minus in Intefſtiniſ efferveſcentibus, & ex mixta miſcela teſtatur ac ſaporem plus minus præternaturalẽm acquirẽtes, quæſtioribus Abdominis oriuntur Symptomata, v. g. *Anxietaſ*, *Præcordiorum*, *Vomituſ*, *Taſſiſ*, *Aſthma*, *Sitit*, *Stomatit*, *Hypochondriaca* & *Hæſtæſia* Symptomata, *Termine*, *Rugæ*, & *Borborygmi* Inteflinorum, itemque *Inſuſioneſ*. Et propter hæc in Cura Paroxyſmorum, horum ſuccorum ſimul maxima habenda eſt ratio, cum ab iſdem indiſtingui Paroxyſmi circa eorum principia exſpectari & aggravari ſoleant, quæ, qualiſ ſint, & quæ ratione partim à ſucco Pancreatico, partim à Bile, horumque vitia miſcela, oriuntur? optimè expulſicæ videatur S Y L V I U S in *Præſi citato loco* cap. 30. Utut Efferveſcentia viſ ſufficiat, cum pluriſima ſint Problemata maximè neceſſaria, quæ ex illa non poſſunt reſolvi.

Certum iterum eſt, ab iſis viciatis, ac in principio Paroxyſmi in Intefſtina effluſis, atque vehementer invicem turgelſcentiam inducentibus, non tantummodo aggravari Paroxyſmum, ſed multa etiam Abdominis Symptomata induci; qualiſ jam ordine recenſebam. Nempe ab utriſque acrioribus Vomitibus crebriſſis repetentes originem ducunt: à ſucco Pancreatico acidiore, & Bile minus uleſo, intenditur *Friguſ* Abdominiſ & circa *Lumbes* in latere dextro, ubi Intefſtini Duodeni inſinguntur duſtus: ab utroqueque acriorum intensiori Efferveſcentia *Ætus* ab *Arde* in Abdomine moleſtiſſime naſcitur, ut *Ægri* tales ſubinde dicant, & moſtrent locum ſub Hypochondrio dextero: *ac hinc ſu in Salu*: Ex iſdem ſocioribus non parò *Flatuſ* Hypochondriacum, item ex Flatibus ſubſtẽtibus *Intumelſcentia*, *Inguinidines*, & *Præcordiorum Anxietaſ*, & imprimis, ſi ſimal afficiatur Stomachuſ & Intefluſ: diſſentis plus minus Hypochondriaciſ diſſentit *Reſpirationeſ* ſe indiſſentit *Anſiæ*; item *Doloruſ* ſub *Cõſti* *noſtriſ*, &c. naſcuntur; quibus Symptomatiſ medetur Clyſma aut ante Paroxyſmum, aut in principio paroxyſmi applicatum. Quic Febribus Intermittentibus malè curatiſ ſoleant ſupervenire Termina Abdominiſ, diſſent eſt, ubi egimus de *Variis Abdominiſ Doloribuſ*. Acidum in Corpore abundans Felicem inducit Febrem, Cætera Symptomata, ut *Cephalalgia*, *Aſthma*, *Dyſtria*, *Reſpirationeſ* diſſentit, *Sitit*, &c. ex ſanguine ſtagnante, ſpirituſque animalibuſ inæſtibiſ caleſcentiſ, indeque fortiori agitatuſ & perturbatiſ originem ducunt. Ariditas Lingue ob conſumptionem Lymphæ ſalivaliſ Linguum humectantiſ. Quòd ſi adſit Saliva, eaque ſimul ſalis ſalis, inſigniter intenditur *Sitit*.

Obſervanda etiam hiæ eſt *Differeſtia Febrium Intermittentium*, v. g. *Tertianarum* in *Nuchæ* & *Legitimæ*. *Legitimæ ſeu Equivæ* et paræ & ſincera Bile ſeci vulgo dicuntur, in qua Rigoreſt inguinis, Corpus veluti pungens, *Sitit* & *Ætus* magnuſ, Vomituſ biliſ &c., Accetio loquiffima eſt 24. horarum, ſeptem Circuitubus ad ſummum judicatur: primuſ eſt debiliſ, ſecunduſ fortior, &c. quartuſ fortiffimuſ, poſtea paulatim remittit. *Ternana* verò *Nucha* dicitur, quæ ex Bile cum Pituita, ſen, ut ego interpretoſ, ex Materia vellicataſ permilla oritur, Accetioſes ad 16. vel 22. horas extenduntur, raro 14. Circuitubus ſolvitur, ſæpiuſ ad aliquot Septimanæ eacutit, Calor in ea miſis pungens eſt: vid. POTERIUS de *Febribuſ* lib. 1. cap. 27. Uto nomine: *Tota ratio Differeſtiæ conſiſt* ſimpliter partim in *conſtitutione Maſſæ Sanguineæ*, partim *Fermento febriliſ plus minus libere ac impedire*: Liberum enim nec impedimentuſ, adeoque acriuſ, potentiuſ quidem agit, & graviuſ inſert Symptomata, ſed citiſ ſaturat & enervatur Febriſ ſinem impoſit: Impedimentuſ verò vel proper Fomiteſ, aut vehiculum, cui inhæret, viciſſimuſ quæ tenuiſcuſ, adeoque, ut vulgo vocant, Pituituſum, vel in ſubjecto, cuiuſ Maſſa ſanguinea aliique ejuſ Humoreſ temperatoſeſ, chyloſioreſ, adeoque viciſſioreſ exiſtunt, minus ſe exereſe poſſet, adeoque mitiori quidem Symptomata, ſed diuturnioſeſ Paroxyſmuſ, Febrileſque etiam magiſ Chronicuſ ſolet inducere.

Quicquid ſit de *Differeſtia Febrium* in *Nuchæ* & *Legitimæ*, ſaltem ex diverſitate Paroxyſmorum modò enarrata colligere poſſumus, quòd, quò acriuſ eſt, & volatiliuſ, adeoque aciviſ Fermentuſ febrile, ob acutiorem, h. e. breviorẽ, ſive graviuſ Symptomatiſ ſignatuſ, inducere Febrem: contra quò inertiuſ eſt & minus activuſ Fermentuſ tale, id quò in ſpecie evenit, quando pro Fomite, in quo ſoludatur, habet Humorem viciſſimuſ & glutinoſum; quò minus acutiam, ſed diuturnioſeſ, & mitioribꝯ committat Symptomatiſ ſore Febrem. Ex quo etiam Quotidianarum præ Tertianarum & Quartanarum præſertim diuturniſaſ æſtimanda; itant, quò diuturnior ſit Febriſ, ob viciſſimuſ magiſ ac glutinoſum Fomiteſ Fermenti in primis viſi exiſtere, putandum eſt; indeque in *diſtinctione magiſ Aſtrictoria*, valde *Præſtantiſſima diſta*, in *diſtinctione veri ſeu Chronicæ Inſidentia* & *Aſtrictoria magiſ exactiſſima*.

Queritur autem ulterius: *Quare Febriſ Intermittentis nefeſſe ante Paroxyſmum non ceſſet*? Hanc Quæſtionem ut ſolvamus, atcedendum eſt

1. Ad ipſum *Reſponſum*.

2. Ad ipſum ſtatutum *Reſponſum Tempuſ*.

Reſponſum quòd attinet, præluſſum Fomiteſ morboſum primariè viſio Digefſionis primæ radiciſ in Stomacho, ſecundariò in Maſſa ſanguinea, itant primo Paroxyſmo non totuſ eſciatur & ſubſigatur, quin potiùſ reliquiſ habere inſtar fermenti ſe multiplicantiſ. Fermentuſ dum diu, hoc ipſo non magnam materiæ moleſem induſum, ſed interdum minimam quoddam Maſſam, activuſ tamen & penetrantiſ, indeque efficiatur alteratiſ; Unde etiam SENNERTUſ de *Febribuſ* non ineptè aſſertit, quoddam *Mieſem fermentativuſ* hætere in Maſſa ſanguinea, quò revoceſt Paroxyſmuſ febrileſ, & quò à POTERIO dicitur *temperariuſ febrileſ*; itant non ſit talis Focus, nempe Materia viciſa, in Corpore ſua Maſſa ſanguinea. Nempe Fomeſ in Stomacho fermentatiſſimeſt, in Maſſa ſanguinea verò poſt Paroxyſmuſ iniquiſſimè quædam, licet minima, ſuperſeſte videtur; unde Fermentuſ illo in Fomite tantuſſim ſaltem odorem ſpirante, reliquiſ hiſ commotiſ Paroxyſmi recrudelunt. Verum quare tam ſtatutiſ horiſ, & tam præſiſ *Tempuſ*, recurrit Paroxyſmuſ: adeo ut in certitudine ipſa Horologia ſuperet, nec interdum dimidiuſ horuſ quadranteſ anteſpect, hoc eſt quòd à nemine huic uſque convenienter explicatuſ fuit; ſicut & alarum omniuſ Periodorum rationeſ non obſcuriſſime. Nam nulla Morbuſ fuit, qui non obſervatiſ fuerit periodiè affligentiſ: ſic v. g. Cephalalgie Periodicæ obſervatiſ fuit.

Interim tamen *Cauſa huiuſ Periodi* adhuc ſub tenebruſ inſidiæ eſt ſepulta; & licet ego ultra 30. diverſa Authorum Opinioneſ collegimur, nulla tamen eſt ſufficiẽſ: quæſt enim eroluſ, tot quoque videt reſiſtantiſ: quædam ſunt ridiculæ, nonnullæ ex ruto abſurdæ; ac proin hoc dubium non etiam in medio reliquimur. Interim puto, *Cauſam huiuſ Periodi* Febrium addo certæ & ſtatutæ in interno Archeo, per certam ideam meditateſ conſiſte.

re (L) Hinc, præsertim in Febribus Diuturnis, non semper videtur adesse talis Materia morbificans perennis, ut in principio interdum accidentarii simul adferit, uti jam etiam CELSIUS monuit, cui natura tunc et Consuetudine videtur Febrem continuare, videturque hoc confirmari Experientia ex eo, quod tales Febres Diuturnæ sine subinde levissimæ, imprimis Quartanæ itaut Paroxysmus admodum tolerabilis ultra horam unam alteram non daret, & sit maxime tolerabilis, Ægro interea optimè habente, cum interim tales Febres non ad annum, non ad biennium, sed ad quinquennium & decennium, imò ad 30. annos duraverant. Exemplum Tertianæ per 30. annos durantis recenset SPIGELIUS De Febre Semiternaria lib. 2. cap. 13. & BALDUINUS RONSEUS Epist. 13. pag. mlii 30. item WIERUS in suis Observandis aliquot Exemplum Quartanarum ultra 30. annos durantium, & similiter mentionem facit Febri 3. mensium RIVIERUS Consue. 3. observ. 49. & sic porro. Quis ergo ex ionie adeo copioso tantam Febrem diuturnitatem vellet derivare? quin potius credendum, aut Consuetudinem, aut Mialma residuum Diuturniorum febrium inducere Paroxysmos. Unde etiam subinde tales Febres citra notabilem Materie peccantis excretionem, v. græ per Terrorem, aut similem subitaneam Alterationem, & Motus Corporis vel Animi curari solent: Sic ex Terrore subitaneo Quartana aliquot annorum & ferè incurabilis fuit curata, ut refert BOYLE in Philof. Exper. pag. 219. Vid. etiam VALERIOLA lib. 2. observ. pag. 123., ubi refert Quartanam continuacillimam, multisque remediis etiam non curabilem, quæ subita Ira & exasperatione Ægri fuit curata; item SCHENCKIUS in observ. de Sene Quartana afflicto, qui sub Aqua demerulis fuit curatus. Hinc est, quod Opia tales Febres cubè & certo curant, cum Consuetudinem talem naturalem turbent: & quomodo quæ subinde currebant tales Febres per Amoleta ridicula, aut Acris rubicunda, extrinsecus admoda? Sic refert SALMUTH Fæn. 3. Obs. 81. pag. 364. de Tertiana Diuturna curatis per Amuletum, factum ex Charta lineæ inclusa, cui fuit inscriptum:

Kin Tuckelsta, nad ire Marder-Her

Sind beyde vor das Keltz gut.

Id est:

Pellissimum Vulpinum & pilus ex Martis pellibus, contra

Frigus optima sunt remedia.

Item TIMÆUS sive Galdenbach in Cas. 20. lib. 8. de Quartana cum Scheda curata: *Feri Felis gale gate supponi* id est: *Cure crassa dat bene pelula.* In his solam alterata Imaginatione Cura fuit peracta, & nulla fuit Materie morbificæ seu Fomitis fæcia Excretio sensilis.

Imprimis tamen obiter servetur in Regione colli, ut habetur ratio semper Mali Hypochondriaci vel Scorbuti, quippe his neplurimum de jungunt Febres: Et uti Scorbuto est Proctus, ac omnibus ferè se afficiat Morbi; ita etiam non raro Febribus Intermittentibus, sicuti interdum Continuis se jungit, easque insigniter exasperat. Periodi Paroxysmorum in talibus interdum sunt vagæ, modo anticipantes, modo postponentes: Nam, ubi adesset Febri Erratica Intermittens, ubi semper debet esse suspicio latentis Scorbuti, adeo ut dubitem, an Febri sit Erratica, quæ non sit in

Scorbuto, & Fomitem habet in Stomacho. Interim fit interdum, ut etiam in Abcessibus partium occultis, v. g. Melenterii, subinde Rigores quidam cum subsequente Phlogosi plius minus intena accendant, & schema Tertianæ, & quidem Erraticæ, exhibent: id quod evenit, dum membranosa substantia ab acris acido velleantur, unde & in ruptura Abcessuum partium internarum talis Rigor vel Horror subinde supervenit: hoc ipsum tamen raro fit, cum contra Scorbuto & Hypochondriacæ Intermittentes sæpiusdiu occurrere soleant. Scorbuto etiam præsentiam in Febribus Intermittentibus, ut & Contionis, arguunt Anxietates Præcordiorum, Dolores lancinantes Artuum, aut etiam Dolores vagi Abdominis aut convulsivi, ante aut in Paroxysmo, aut in Frigore aut in Calore attigentes; quibus tamen ut plurimum in principio aut in incremento Paroxysmi Vomitus Materie nunc flavæ, nunc viridis supervenit; uti etiam Macule quædam in Paroxysmi statu & sine fe exhibere solent, quæ quidem rarissime Petechiales sunt; frequenter tamen macule illæ, nunc livide, nunc rubide, nunc majores nunc minores nunc cum Sudore efflorescentes, post Sudorem verò deorsum evanescunt. Arteriarum etiam quæ rubræ, facili tamen friabiles, in sano Manu hærentes, & undique percutibus epulæne se affigentes, in febribus quoque complicatis Scorbuti sunt Signum: Nam sunt falsa concreta vitæla acido-salis, crystallisata, sunt friabiles, non duræ, ut Calculolorum. Quod si verò defuit hæ Arteriarum, sæpius in superficie Urinæ talium Febre Scorbutoica afflictorum Grulla pinguis adesset, aut hæret in his sedimentum crassum copiosum, & quæ turbidiorum, febrendo sanguine quasi atque incarnato colore nonnulli stigmata in tali casu sæpius etiam, imò ferè semper, subest Scorbuto, ut alia Signa tacent. Continuacillimæ sunt autem vix cæteris tales Febres Scorbutoicæ, & quæ vix curari possunt, nisi subdito Fomite Scorbutoico; alias enim vel septies recidant.

Febres Chronice, si modò cum frigore affligant, modò cum Horrore, abcessus Melenterii, &c. latet.

Febres Periodice nunc statè redeunt hora, interdum etiam nunc citius, nunc tardius redeunt: & dicuntur anticipare, itaut si hodie Paroxysmus febribus Tertianæ Intermittentis Patientem invadit hora pomeridianâ tertîa, tertio die invadit circa meridiem hora duodecima præterpropter; quod autem ut plurimum accidit in Principio Febrium Vel dicuntur postponere, itaut hodiernus Paroxysmus eveniat circa horam tertiam pomeridianam, redeat circa septimam pomeridianam diei tertii, idque ut plurimum in Morbi Declinatione. (M)

Anticipation talis vel Postpositio res ferè habet Causas.

1. Robur Spirituum salubius vel debilius.
2. Fermentum febrile magis vel minus activum in volatilitate & æritimonia.
3. Fomitem fæc vehiculum materiale magis vel minus viscidum, magis vel minus copiosum, &c.

Ex his Recursus varietas deducenda, atque pro Causarum modo dictarum ratione, etiam *Pregnavis Anticipationis aut Postpositionis* instituitur.

Præ cæteris Typum mirabilem habet MARCELLIUS DO-

(L) Sæpius fortasse suspexit, si Anter ingens confusione contentus, si Causam Perishoriam Febrium Intermittentium verè sentire, band suam opinionem subjunctisset, de Archivo nescio quo per certam Idem modificato, Intermittentibus diuturnas forent.

(M) Animæcessive hic dignum est, Febres illas, quas vulgo Anticipantes, vel Postponentes appellant, quod citius, vel tardius illarum redeunt Paroxysmi, non semper tales dicendas esse, diuturnos temporis anticipantis vel postpositantis, ut inquitur, sit semper æquale: etiam huiusmodi Febres esse anticipare vel postponere videntur, quod singulis successivè diutius citius vel tardius invadant; nihilominus si calculus exacte ponatur, statim semper temporibus redeunt, utriusque post idem semper temporis spatium ab eorum ad aliam Paroxysmum. Exemplum res erit manifestæ, & primò de Febri Anticipante dicta. Si quæpiam primò Febri corripit hora Italica 20., secundo die hora 19. tertio hora 18. quarta hora 17. & sic porro; Febri hæc citius vulgo Anticipans, citius enim secundo die quam primò, citius tertio quam secundo, & sic deinceps, corrigere videtur. Veritas hæc falsum est, nam si interius temporis spatium, quod intercedit inter primam & secundam Paroxysmum, inter secundam & tertiam, inter tertiam & quartam, semper æquale erit, spatium nempe 23. horarum: etenim ab hora 20. primò diei ad 19. secundam, inter hora 19. item ab hora 19. secundam diei ad 18. tertiam, atque ab hora 18. tertiam ad 17. quartam, semper idem exactis temporis spatium, scilicet 23. horarum, Febri quæ hæc modo invadit, quovis vulgo dicatur, & videtur Anticipans, tamen verè non est, utque quæ semper æquali spatio 23. horarum redeat. De Febri vero Postponente similis erit calculus. Curpiam quæ de Febri primò die hora 20., secundo hora 21. tertio die hora 22. quarta hora 23. & sic deinceps, videtur sane hæc Febri Postponente dicenda, similis enim diebus, tardioribus horis invadit. At hæc item falsum est, nam febris huiusmodi Paroxysmorum intervallum habet semper horarum 23. ab hora enim 20. primò diei ad 21. secundam, ab hora 21. secundam diei ad 22. tertiam, ab hora 22. tertiam ad 23. quartam, & sic deinceps, semper intervallum inter spatium 23. horarum. Febri ergo hæc Postponente dicenda non erit, quippe quæ semper statim redeat Paroxysmorum intervallis. Hæc Animæcessive magnam lucem offert Aphorismo 30. 4. Secti ubi Hippocrates habet: Quibuscumque Accessiones sunt, quæcumque hora febris dimiserit, si possit eadem quæ antea hora correperit, iudicium habent difficile, quæ quom aliam commentaretur, quæ modo dicta sunt admodum.

DONATUS lib. 3. *liber. Medic. Mirab.* cap. 24. de quadam Febre, quæ prima vice diei hora prima, secunda vice hora secunda, tertia vice hora tertia, & sic successivo usque ad primam horam noctis; deinde ordine retrogrado à prima hora noctis ad vigesimaquartam diem; hinc à vigesima quarta ad vigesimaquartam, vigesimaquartam & ad aliquid ad primam horam diem (nam MARCELLUS DONATUS fuit Italus, unde ad Horologium Italarum hoc Paroxysmus observavit) usque dum penitus extincta fuit.

Unum adhuc queritur, *Unde fiat, ut Febris Inter se invicem transmutetur*, iam simplices, iam compositæ? Fit enim, ut Tertiana in Quartanam, Quartana in Quotidianam, Tertiana duplex in Quartanam, & sic porro, degenerare observetur. Ceterum hoc confirmatur, quod Febris Intermittentes non differant essentialiter & modo fieri; sed saltem quibusdam circumstantiis, & nunc impetibus, sive promovere aliquid activitatem Fomitis morbo; quæ omnes probè consideranda sunt Medico.

Quod autem attinet *Febrim Multiplicationem*, quando *simplex fit duplicata, triplicata, quadruplicata*, &c. (nam RHODIUS cap. 8. *Observat.* 15. habet Quartanam duplicatam, quotidie ter invadentem) notantur hæc ipsæ ex duplici fonte.

1. Ex errore Cura.
2. Ex errore Diææ.
3. Ex errore Cura;

1. Quando Medicus vel Adstantes propinant præpòstere, & nimis intempestive, aut aundum præmissa Vomica, *Spesie Febris*, imprimis *Spesie*, tunc enim optime multiplicentur Febres: Sic ex *Spesie Febris Strabulbergi*, & *Crisi*, quæ alia fuit moritur laudes, intempestive adhibitis, multiplicatur Febris cetero, ita ut simplex fiat duplex.

2. Inconsideratus Operantis usus (de legitimo *Infra*) ante Paroxysmum, non raro etiam Febris multiplicatur: stat enim hæc tantummodo omnes Febris Intermittentes curent, tamen si non præmittantur præmittenda, simplices redduntur duplicatæ, vel ad minimum distrahuntur.

3. Aerum, præsertim Aromaticum resistens, præsertim Vegetabilem, aut ante *Crisin* signa, quæ ipsa movent quidem Causam materialem, sed non promovere resolvendo, efficiunt, sed non servant Fermentum febrile: Talia scilicet, præsertim in Quartana, multiplicat Febris. *Viginti* enim est, *Quartana* in principio *blendi* est tractanda, *simplicis* in duplicem, aut triplicem, aut etiam Constantem leuam mutatur. Ac tandem

4. Quando *Agri* volunt, ut subito quæcumque ratione abigantur Febres, tunc loco simplici facit duplex aut triplex emergit. Modi sunt vari: in hoc tamen omnes conveniunt, quod certo modo figant & fiant activitatem Fermenti febrilis; unde concludendum erit, Fermentum febrile quasi divisi & successivè inferre nunc duplicem, nunc triplicem Paroxysmum.

II. Errore Diææ exasperatur vel multiplicatur Febris, quando *Agri*, v. g. imminente Paroxysmo, non habent Stomachum vacuum, vel ante absolutum perfectè Paroxysmum præmature aut nimis avidè, imprimis Carnes, comedunt; vel quando Intermittens diè copiosior Alimentatissima, cum per Vires intemperantiam Morbo semper nova materia suppeditatur, uti eruditissimè diffinit RONSETUS l. 4. *Natura enim corpora*, iuxta HIPPOCRATEM, quæ magis *nutritur*, et magis *lesio* vel Siderem fluxum suppressum; vel in, aut ante Paroxysmum Lacticia bibunt; vel fructus bonos, aut alia similia facili fermentescibilia quocumque Morbi tempore assumunt: hæc enim sine pessimo notæ, & corruptione sui facili foveat febres, easdemque magis Chronicas reddunt; item ex usu nimis Plurimum internum multiplicatur febris, & quæ sunt bajulmodi Causæ alia.

Recidiva crebrius febris, aut degeneratio in alios Morbos, plus minus Chronicos, aut Lentos, Interum, Chloresim &c. ferè oritur (1.) Ex perversa Cura, quando fitis vel copiosius vel maturius usurpat, concentratum fuit febrile fermentum. (2.) Quando *Agri* redeunt Appetitum, huic alim indulgent, cum in quanto, quam quali peccant. (3.) Quando nimio Potu frigido, præsertim Aquæ cum Vino, aut Juleporum, sub cursu Morbi, vel Paroxysmi tempore, nimis refrigeratur Venter; tunc enim levi ex occasione ob Cruditatem Morbus recidit.

Tom. II.

Hinc BECHERUS quater ex hac Causa Recidivam patiens, curabatur per Pulverem ex ana Lapidum Cancrorum, Piperis albi gr. 12. cepit in haustu Vini Hippocrii ante Paroxysmum. (4.) Quando Febris intempestive tollitur, tunc aliud quid agens quasi Natura, fermento febili alios Affectus, vel Recidivam, si potest, excitat.

DIAGNOSIS.

Quod attinet *Signa Diagnostica*; primariè haurienda sunt ex paroxysmis. Si enim paroxysmus primus invadit cum Horrore & Algore aliquomodo, cui succedit fitis, & Effusus ingens totius Corporis, hic verò paroxysmus tertio die repetat, certissimum adesse Tertianam.

Si cessante paroxysmo patiens iterum surgit, confusæque peragit manera, Tertiana est exquirit; si vero cessante paroxysmo patiens nihilominus conquetur ad Appetitum prostrato, Cephalalgia, Lassitudo, Agrypnia, vel somno saltem turbulento, adesse Tertiana debet vel Quartana cum remissione.

Paroxysmi si singulis diebus redeant certis horis, attamen iidem, v. g. diè primo hora decima, & tertio iterum decima; secundo verò diè hora quarta, & quarto item quarta hora, certissimum Tertianam duplicatam esse.

Signa Paroxysmi imminenti sunt; lobatana Lassitudo, Ociatio, tæpis faciei & Laborum pallor, Unguam pallor cum subsequente livore, nonnquam etiam Abdominis dolores, Ructus, nonnquam.

Paroxysmi tempore est frequens, in juvenibus magnus, creber, fortis; *Urina* est crassa aut vitida in Tertiana exquirit ad rubedinem inclinata.

Reliqua ea, quæ dicta sunt, per se patent, impellunt quoad Scorbutum.

PROGNOSIS.

In *Prognosi* primariè attendenda est natura Febris, secundariè ratio *Urina*.

Quoad naturam Febris: quæcumque Intermittens *Maligna* & *Fefida*, est pessima nocte & periculosa; quævis enim evidentes habeant intermissiones. Agrocrotos tamen non raro è medio tollitur, ut docet RIVIERUS in *Præli de Febris*.

Benigna sunt absque periculo, minisque periculosa Quartana, quam Tertiana, utot costumiores & distrahiores exsistat; cum contra Tertiana Interitum fit gravior & brevior: Quæ, ut rectè dicit HIPPOCRATES lib. 4. *apud* 39. si *Legitima fuerit*, septem ad summum Circulis finitur, modo *Agri* fuerit obsequem, nec hic, nec Medicus, errorem committant.

Tertiana, quæ magis est Noctua, quod magis micis & lentæ, ed est diuturnior, curata difficilior ac periculosa. *Legitima* septem circulis finitur. Noctæ verò ut sunt frequentiores, sic magis periculosiores, & curatu difficiliores, quæ subinde ultra 14. periodos extenduntur; quoad vero nec illo tempore curantur, concludendum est, errorem vel ab *Agro*, vel à Medico committum fuisse.

Utut autem *Benigna* periculosa non sint, si tamen vel ab *Agro* vel à Medico error committatur, in lethales Morbos degenerare possunt, ut rectè dicit WILLISIUS de *Febris* cap. 4. pag. 139. Facile enim sunt curabiles, quæcumque ea fuerint, etiam Quartana, modo tempestive aggradiantur, & Viscera interna sint salva.

His præsuppositis; si Febris in Principio non occurrat, ut plurimum evadit Chronica; quod verò diuturnior est, ed magis ad Cachexiam disponit.

Speciatim tamen Tempus durationis ex *Urina* aliquo modo cognosci potest; in quibus Cruditatis ac Coctionis observatio, utot non adeo necessaria sit, ac in Continuis Acutis, tamen propter evacuationem & hinc Specificorum legitimum usum imprimis observanda.

Omnis enim Urinæ in principio solent esse tenuis; quod magis successivè crassescit, ed tutius aut etiam brevior innuitur Morbus.

Imò dicant: si in principio Urina sit eruda, paulò verò post Nubeculam albam habeat, seu Encorem, bonam esse; quarto enim Paroxysmo terminari Febrim: si verò Urina sit pæva, rubicunda, sine Nebula seu Encoremate, vel non perfecta Coctionis signa se offerant, quod tunc ad septimum usque Paroxysmum extendatur Febris, aut præter Febris longitudinem invita solutio, cum motu nempe Recidivæ, vel Febris in alium Morbum diuturnum degeneratio metuenda sit.

K k

Obfer-

Obferuantur hæc in Urinis aliquandiu post Paroxysmos collidæ: nam omnes, quæ in Paroxysmo excernuntur, crassæ esse solent; in Paroxysmo enim mediante Fermentatione fit Coctio, quæ eo finito, ceu facta in Urinis se exhibet.

Si in Tertianæ secunda Accessione omnia fuerint fortiora, in tertia verò remittant, quarta Accessione Febris penitus cessabit: sin verò in quarto Paroxysmo omnia sint graviora, adeoque Morbus sit in statu, & in quinto Symptomata remittant, septimo Morbus finietur.

Febris Tertiana, quamvis *autipax*, tandem est in Incremento; postquam verò postposit, adest ejus Declinatio. Quando copiosi Sædres nascant post Paroxysmos, interdum in Urina vix Sedimentum appareat, & res est ubique sine suspitione: contrà, si contrà.

Convulsiones in Paroxysmo febili non sunt ita metuentes, uti in Continuis & Malignis.

Febribus Intermitteatibus quibuscunque superuenientes *viscerum* quorundam *Spiritus*, vel *Tumores* his cognati (quod fit in Febribus diuturnis male curatis) inuadunt, & ferè Hydropsen, aut Icterum lethalem tandem superueniunt inuadunt, aut Chronico quasi cachectico vitia succedunt eueruantur.

Intermittentes in genere quod magis in Typo sunt commutantes & minds variant, ad diuturniores solent esse; contrà, si variant & anteipant, ceteris exilunt solutionis.

Primus in Intermitteatibus Benignus, siue in Principio fit, siue in Statu, optimum signum est; inuadit enim valorem Naturæ.

Quoad *Quotidianas*: cum longe sint, & à Fomite pernaci foveantur, interdum non vacant periculo. Nam, cum Venterculus ferè insigniter afficiatur in hac febre, & ipse Sanguis crudus, ac ferè aquosus constitutus sit, facillè, qui ea detinentur, in Cachexiam, Hydropsen, ac alios periculosos Affectus, item in Carum ac Lethargum, dilabuntur.

Quotidiana diurna nocturna est periculosa, cum tempus medium deficiat.

Diuturna est febris Quotidiana, & durat dies noctesque 40., nonnunquam ad aliquot menses: quod citius tamen signa Coctionis se exhibent, & Paroxysmi breuiores sunt, ac in principio eorum *Primus* adit, breuiter ac salubriter promittitur eventus.

Si *visæ* & *Apparuit* in Quotidianis valdè deiciuntur, Accessiones sunt longæ cum nullo Sædre, parua salutis spes superest.

Soluantur Quotidianæ frequenter Vomitis & Dejectionibus viscidis, uti pinitosis, tum per Dolores Articulares, metastasi ad Articulus facta.

Si *Æger* in Quotidiana quotidie somnolentior evadat, ac gravitatem quandam circa Caput sentiat, Carum seu Lethargum asuturum notat: V. FORESTUS lib. 3. Observ. 21. ubi plura de hoc arguuntur.

Quartana quidem omnium est tutissima propter longa intervalla, ea accidente tamen, quando multiplicatur, vel quando ob etrorem *Ægri*, aut irritationem Medicamenti exasperatur, degenerando in alios Morbos, periculosa esse solet.

Quartana *Senilis* plerumque est lethalis, iis præsertim, qui Isaacelimum annum transgessit lant.

Quartana longissima est omnium febrim, & ferè ad aliquot annos extenditur: MASSARIUS vidit Romæ Matronam, quæ 22. annos ea laboravit. Ut plurimum tamen ultra annum non exprogitur.

Quartana si est *essens* in Typo, vel ad interitum, vel ad graviora tendit Symptomata: in vero fuerit *essens*, ad salutem vergit, & subinde motu veluti critico evacuat.

Quartana si fuerint *invenientes*, Medicorum scandala sunt, & raro, nisi circa anni mutationes, nempe circa Solstitia & *Æquinoctia*, solvantur; his enim Anni rempobus subinde curantur, tam sponte, quam etiam Arte. Primus terminus est proximum Solstitium, seu initium quarti mensis, quo si non solvatur, extenditur ad proximum *Æquinoctium* seu septimum mensem: Impius Quartana Autumnalis extendi solet usque ad *Æquinoctium* Vernali, quo præterito, ut plurimum cessat sponte.

Quartana *Æthica* fuit brevioris Autumnalis: hæc verò sunt admodum longæ, imprimis si ad Hyemem vergant.

Mulieres etiam Quartana diuturna correptæ, dom gravide sunt, sponte ferè liberantur.

Diuturnior talis Quartana, si *Ægri* non erant obervent regimen, præsertim quoad Potum, ut si conjuquantur, aut superveniat perniciosa cupidum Visceris Affectus, *Ægrotos* in Hydropsen, aut contumacem *Scorbuto* conijcit: hec Corpora ad Medicam & Tabem deducit.

In omni Intermittentæ, si intermissionis die constet Appetitus, bonum est, si prostratus, malum: sicut & dejectiones in Quartana Appetitus malum est signum, & raro tales evadere solent HOEFERUS in *Horulis Med.* pag. 293.

De Urinis Quartanariorum refert JOEL, quod extra Paroxysmum sint aqueæ, ac tenues & pallidæ: sed die Paroxysmi magis ad obscuram flavescendum vergant, & ante solutionem Febris ut plurimum turbidæ & aigre excernantur.

Nigræ ergo Urinæ in Quartanis cum euphoria *Ægri* salutare sunt signum, imprimis sub cursu Morbi; inuadunt enim Coctionem violorum Humorum, utut in aliis Morbis sit periculosa: in vero hinc agenda fit Virium prostratio, lethale est; labacit enim jam Natura.

Modus eventus Intermitteatium est, quod vel trahantur in Febrim Continuum, vel male curatæ abeat in Febrim Continuum Acutam; vel Medicam interdum, sed rariùs, ad Mortem deducunt; vel per secessu succedunt curantur, nunc per Inediam, nunc per sudores, quæ solutio omnium tutissima, ut Urinis copiosas. Quo etiam modo peruenit Pulvis & Ulcusculis, subinde in Malignis in Labis & Naribus, & alio erumpunt; de quibus videt WILLISIIUS: utut non solvant febrem, tamen ut plurimum omnes erumpunt; inuadunt enim fermentum eliminari in Paroxysmo febili per recolligentem se Naturam. Nam & SALMUTH refert lib. 2. Observat. 2. Tertianas Intermitteat per Inflammationem Laborum eritiam aliquoties finitas; seu artificialiter, dom legitima Evacuacionibus, aut sudores editione curantur. Sicut etiam Icteri die critico, Paroxysmo quarto vel septimo, & cum euphoria *Ægri* superuenientes variis, vel nigri, vel flavi, interdum Tertianæ & Quartanæ solvant, *Aphorismus* HIPPOCRATIS 62. Sect. 4. est verus; videt BARTHOLINUS Cent. 3. lib. 4. qui observat Icterum in Quartana salutare ante 7. superuenientem. Sin vero post 10. in Principio appareat, conjunctaque graviora Symptomata habet, malum prognosticat, scilicet Naturæ subversionem.

C U R A.

Superest nobis *Methodus medendi*, cum Materia Medica & similibus, quæ pertinet ad Curam febrium Intermitteatium. In hac ergo eo imprimis recipiendum est:

1. Ut fomes Materie morboz in stomacho & primis viis resolvatur & removeatur, *Indiditibus*, *Abstergeantibus*, *Rosacanthibus* &c.
2. Ut fermentum febile, & inde nati Paroxysmi febiles, debitis *Appropriatis*, alias diis *Specificis*, evertantur & tollantur, Fermentationem inordinatam febilem corrigendo, & precipitando, hinc per convenientes vias, quæ ipsa vergit Natura, in speciem tamen per Sædrem, evacuentur. Et
3. Ut Symptomata varia, sæpe in eorū argentia, maturè removeantur aut mitigentur, in specie Rigor, Calor, & Sitis. Et
4. Denique *Dyscrasia Sanguinis* reliquorumque Corporis fluidorum, ac *Atonia Viscerum* sub cursu Morbi superuenientes, *Alterantibus* debitis corrigende & restituende.

Difficili copis satisfaciendis conueniunt optimè *Medicamenta Salina*, tam Artificialia Liqvalia, nunc acia seu pura, nunc temperata seu composita salia, ex Acido & Alkali constantia; quàm Salia naturalia, in Medicamentis Febrifugis insigniter amaris ac acerbis, sale volatili nunc acriori, nunc oleoso turgentibus, latentia. Uno nomine: sufficienti Febribus Intermitteatibus curanda *Alcalia*, & que ad horum naturam propius accedunt: talia nempe, quæ Acidum destruerent & Vicidum incidere valent, siue Volatilia, siue Fixa. Nempe præmissis quibidam Digestivis salinis, v. g. Terebro Vitriolato, aut Sale Hypochondriaco, insistant aut Paroxysmum *Imminuat*, intereum repetendos, quippe sine quo Quartanæ curare impossibile est; Aut si hoc minus consultum fuerit, die Paroxysmi insequentem tempore antecedente sat *Purgare*. Præmissis talibus Universalibus vel per superiora, vel ubi opus fuerit, per inferiora Purgantibus, utipotent *Diaphoretica*, tam vulgaria, quàm *Appropriata Specifica febrilia*, ante Paroxysmum, diebus intermissionis eadem Digestiva & primas vias

Altera

Albergenia, & postmodum *Appropria Alterantia* aromatica, vulgo *Aperientia* dicta, v. g. Effluvia Abinthii, Ellicae Febrile, Ellicii Proprietatis, Spiritus Carmineatus de tribus, &c.

Pro talibus ergo scopis legitime obtinendis observentur, quodam Cautela; quæ scilicet Cynofuræ sint. Ante omnia I. Observetur, ut *maiores Cura*. Intermittentes enim omnes incipientes facillè curantur, ut ultra 3. vel 4. Paroxysmos non durent; si invaleverint, sunt contumaces. Quod autem diutius duraverint, ut contumaciores ordinario fieri solent, & ed magis Ægrum, ejusque Humores ac Viscera laedunt, & Cachexiam aliquæ mala post se relinquunt. Maturetur autem Cura secundum dictam Methodum, motum Naturæ promovere, non autem cundum impedire.

Observe. II. *Vna sessio* est inutilis apud nos ad curandas febres Intermittentes: Nisi febres tales ferè diuturnæ magis sunt, ac certè Paroxysmus Venesectionem Insequens suppurans gravior esse solet, & diuturnior reliquis antecedentibus: Et cui usui Inisteretur eadem? Stas quod plura surget Æstus, ex celerior prolapso Naturæ opus in sudore, remittit sic Æstus, Ægerque percipiet levamen. Interim prout casus variat, contingere potest, ut aliquando per accidenia necessaria videatur Venesectio; quædam BALLONIUS lib. 2. Epidem. & Ephemer. Confit. Afr. an. 1779. pag. 269. & ex illo BONSTUUS in Phleg. Medicinæ pag. 196. Tertianam ad intermissionem Venesectionem lethalem supervenire sponte nimia excretionem observavit. Salvatella sessio à quibusdam à Quartana commendatur, incerta tamen ex ratione: Interim tamen BALLONIUS ed. l. p. 196. Quartana diuturnas per Salvatellæ sectionem curatas observavit.

Observe. III. *Moxima* ac *Vomitiva* in omnibus febribus Intermittentibus insigniter sunt proficua, speciatim in Quartana, in qua præ cæteris auxiliatur; Unde etiam in gravioribus repeti possunt. Certe namque est, quod raris curandis Intermittentibus, inprimis Quartana, consistat in Vomitu, ut dicit FREITAGIUS in *Aerora Medicinæ*. Propianda sunt hæc ipsa, vel una alterave, aut tribus horis ante Paroxysmum, ut cum Natura oppugnet febrem, quo sic ante Paroxysmum negotio suo fungantur. Quod si verò vires Ægri, hinc Febris & Vomitus labori non videantur sufficientes, diè Paroxysmum proximè antecedente propinquent. Mox enim hoc Natura ipsa, quæ seipsum ingrænuè Paroxysmum per Vomitum se exonerat. In primo Febrim principio præprimis conveniunt, nec nocent interdum in progressu, vel ipsa etiam declinatione; sic enim Chronica ac contumaces febres repetita ebaustrunt. Inducunt in specie, quando Ægri conqueruntur de somnibus, aut amaris aut nauseabundis in ore, præsertim dum mane evigilant; Nam tales signores oriuntur ex stomacho, & sæpe contumaces reddunt febres: Aut quando iniquat, se perferentem quidam angustias aut molestias in Præcordiis, & monstrant regimem Epigastrico-hypochondriacum, Jægitationes, Cardialgias, Ructus, &c.; aut quando Nauseæ vel Vertiginis, tam in, quam extra Paroxysmum Ægros verant, &c. Interdum in principio Paroxysmi moventur Humores viscosi in primis viis ad Os Ventriculi; & refert PRIMEROSIUS de Febris lib. 3. cap. 2. pag. 194. Videmus Convulsiones & Cardialgias singulis Paroxysmis enasas ex illis crasse, quæ cunctis illis vomitum sedabant. In his & similibus causis Vomitoria in specie sunt necessaria. Quod si Febris contumaciior quodammodo affligit, repetitum Vomitorium propinquant in flammæ est valde proficuum: Hinc refert RULANDUS Aquam suam benedictam, quæ maxime est Antimonialis, tanquam catholico commendat Febrifugum, quo Febres nullis Pharmacis cedentes eradicantur fuerunt. Nec quonquam deterreat, quod Ægri sponte sua in Tertiana subinde vomant; Nam talis Vomitus subinde est Symptomaticus, acrimoniam succorum in primis viis commotorem & effervescentem Insequens, adeoque verò est Symptomaticus, ac raro sufficit: In quo casu, si cætera respondeant, etiam Vomitorium, sed blando, sufficiens Vomitus promovendus. Inprimis utilis est Vomitus in Quartana, itaut vis Febris, in qua fit utilis, & quidem si necessarius videatur, per intervalla Instituantur. Cautione tamen opus est, ne Ventriculus aliè debilitatus adhuc plius debilitetur. Peracta Vomitione, Confortante aliquo, Vino generoso, Aqua Cinnamonum cum Vino, aut cydonista, aut limili, extra vel

Intra usurpato, Stomachus roborandus, aut tumultus ab Emetico excitatus sedandus per Opuscula blanda, Electuarium Dialcordii, Theriacum v. g.

Æ. Aqua. Rubi Idæi ℞.

Cinnamon. spirital. ℞i.

Conf. Alcohol. ℞b.

Laud. opus. gr. i.

Syrup. Papav. simpl. ℞ii. vel ℞iii.

M. D. S.

Potio Confortativa.

Vomitiva desumuntur ex triplis Reges: Pigeatili, Animalis, & Mineralis.

Inter primas Pigeatili primò excellit *Astrum*, (N.) quod nulli edito, & ceu singulare Febrifugum Antiquarium commendatur à STROBELBERGERO Tract. de Febrim Cura. Ufus ejus est, ut propinetur Radix pulverulenta mediocriter (minutissime enim Sudorem tantum movet) à ℞b. ad ℞i. aut ℞iv.; præscribitur cum pascuo Pipere, aut gr. viii. vel i. Salis Ammoniaci, in haustu Vini calidi, aut Aqua vel Decocto Centaurii mixta. Aut Cardui benedicti hora una antelera ante Paroxysmum: bene be regat Æger in lecto; sic enim & Vomitus, & post hunc largus Sodor simul sequitur. Et certum est, omnes Auctores commendat Alarum Vomiturium contra Quartanam.

Alio modo præparatur Alarum, & quidem, ut fiat Vomitorium admodum blandum ex Folis Alari: affusum Folia ejus viridia & succulenta bene crassa, aut madore nocturno & diurna purgata, No. viii. x. ad xii. ad summum: hæc folia convoluta incidunt ad modum Tabaci in longa segments (non minime, quia tunc vehementius dicit Vomitorium): Insulant per noctem in Aqua Cardui benedicti ℞iv. ponendo in locum tepidum. Mane colatur Infusum per lentum raram, & datur vel per se, vel cum ℞b. Cynostis simplicis, sic hinc alla molestia Vomitus movet. Si Vomitorium hoc debet esse potentius, tunc

Æ. Alari Folia recentia No. ix.

Contertitur cum pilulis ligneis in mortario marmoreo, affunditur stillatum.

Oxyel simplis ab ℞b. ad ℞i.

Idque terendo tamdiu, donec solia in liquidum & potabilem fucum fuerint coacta: tunc addatur Aqua Card. bened. ab ℞i. ad ℞iv.

Miscetur, & fiat haustus satis potens ad vomendum, in quibuscunque Intermittentibus, in specie in Quartana.

D. S.

Potum Vomitoria pro una vice.

Vel Folia recentia trita cum Vino exprimantur, & succus propinetur, qui valide Vomitus cie.

De Alaro obiter noto: quod hac ratione præparatum sit Vomitorium; Decoctum verò in Aqua simplicis amomæ amittat vim vomitantiæ, & potius sit appropriatum Remedium Diureticum, Febres Quartanas solvens.

Post Alarum est *Aqua Rosacea*, quæ ab ℞b. ad ℞i. propinata cie Vomitus, uti videri potest in HARTMANNI Praxi Chym. cap. 23. de Febre Tertiana.

Denique Radix Vinæstici & ipsa commendatur tanquam Vomitorium in principio Intermittentium: ut

Æ. Rad. Vinæstici. ℞i.

Con. in l. q. aquæ & Malt.

Calatura ℞b. vel ℞i. detur uti: excitat Vomitus blandum, & postmodum etiam Diaphoretic.

D. S. ut supra.

Verum omnibus quibuscunque Vomitoria præferantur merito Vomitoria Antimonialia rite parata. In Infuso Calis Vomitoris Rosolandi vel Infusatur Crocus Metallorum ad gr. viii. in Vinum Rhœnanum aut Albulicum ab ℞b. ad ℞i. vel ℞i. prout tamen mitior vel etiam fortior est Crocus Metallorum plius mihi, (nam variæ præparationes). Vinum probè literatur potest sumi: e. g.

Æ. Mercurii Ræ gr. v. ad vi.

Infund. in Vinum Rhœnanum vel Albulicum q. l.

Secut in loco tepido per noctem, mane

Æ. Filtratur ℞. ad ℞i. vel ℞i.

D. S.

Vinum Emeticum.

Item Tartarus Emeticus Myrsicini & Endosici potest dari in substantia: & quidem Myrsicini a gr. ii. ad gr. iii.; Endosici verò a gr. iv. v. ad vi.: e. g.

K k 2

Æ. Tarr.

(N) Excellitior Astro de Radix Ipecacuanha, quæ ad ℞b. vel ℞i. in Infuso ex Rina, vomitus & aliquos secus blam. movet. De hac Radice Tom. 4.

℞. Tart. Emet. Myrs. gr. ii. vel iii.

Salis Armon. simpl. aut depurati gr. xii. ad xv.

vel Lep. Cancer. prop. vel Sacchar. gr. viad 3℔.

M. S.

Pulvis Emeticus.

Detur in vehiculo clido.

Vel in forma Pilularum:

℞. Mass. Pilul. de Trias Rafi gr. xv.

Tartari Emet. Myrs. gr. ii. vel iii.

Scammon. sulphurat. gr. i.

Cum 2℔. Coar. min. f. Pilula: 3.

Pilule Vomitorie pro una vice.

Oxyfacherum Vomitorium, seu Syrupus Vomitivus à 3℔i.

ad 5℔i. potest propinari in Aqua appropriata, vel vehiculo

appropriato ante Paroxysmum: c. p.

℞. Aqu. Card. bened. vel Cent. min. vel Mentha vel

Pamar. 3℔i. vel 3℔.

Syr. Emet. Angeli Sala 3℔i.

aut Syr. Rubi Idæi emet. 3℔.

Nicotiana 3℔i. ad 3℔i.

M. D. S.

Succus Emeticus.

Capiatur per dosi.

Multi commendant Sal Vitrioli Vmivum à 3℔i. ad 3℔.

sed ego horreo; quia remanet aliquid subinde, quod in totum

destruit Ventriculum. Optima ergo sunt Vomitoria An-

timoniola.

Fortissima Vomitoria sunt Rumenta Unguim humano-

rum, quæ ipsi funduntur Vino: Colatura semitur, & violent-

issimos Vomitus movet, adeo ut omnibus Militibus & Ru-

sticis propinari queat propter nimiam violentiam. Fuit

Sequentem Caffens KNOEFFELII.

Observe. IV. Purgantia pulvis effusoria seu fersoria, præ-

sertim Purgantia, in Principio Intermittentium Febrium

esse nociva: turbant enim Massam Sanguineam, & dum

eruda adhuc est Urina, nil noxi expurgant, sed vires de-

bitant, & Febrem effusorem reddunt. In Progressu

quidem nonnulli ejiciunt, sed simul colligescunt Cor-

pus; ideo sunt nociva: Imò Febri Intermissis in Conti-

nuam per inceptam Purgationem degenerare potest; Adhò

in genere potenter Purgantia, præsertim acriora Vegeta-

bilia, in Febribus Intermittentibus sunt vitanda: Confer.

SEPTALIUS in Animadversio. lib. 3. pag. 104. Imò in

Sutu etiam, ubi copiosa selementa operant Urinas, si vio-

lenter Purgatio fuerit instituta, insigniter debilitat Aëros,

& Paroxysmos infrequentes aut graves, aut certe Febres

diuturniores reddunt. Possunt hæc Febres curari sine ulla

Purgatione per inferiores (certis conditionibus), cum quid-

dem Vomitus in Principio ex primis viis, aut sudor post

Paroxysmos, aut in Declinatione universalis erumpens suf-

ficiunt, quicquid heterogeneum est, ex sanguine expur-

gant. Quòd si in Principio aut in Progressu Morbi, ubi

contumaciore videtur febris, instituta videtur purgatio,

idque vel 6 Vomitoria locum non habeant, vel ob Vomito-

riem impeditam, vel ob suspitionem Excrementorum in sto-

macho aut Intestinis Rabelatione, sit ea lenia, ultra 3. vel 4.

aut 6. sedes non proritas: id quod in omnibus, præsertim in

Quartanis, observandum est.

Quædam Purgantia ex Antimonialibus aut Mercurialibus de-

sumenda sunt. Nam hæc dum evacuant, simul corrigunt

fermentum & fermentum Febrile; adeoque appropriatissi-

ma sunt, quorum defectu mitiora Vegetabilia, in specie

Senæ & Rhabarbari subtilius possunt. Imprimis ab initio

leviter tractandum sunt Quartana, nullumque sorte Me-

dicamentum in eorum Principio adhibendum; quia hæc ex

simplici non raro duplicem & triplicem faciunt Quarta-

nam. Imò observatæ fuerunt Quartana, quæ ab adhibitis

Remediis diuturniores & contumaciore reddita fuerunt,

ita, qui abique Medicamentis reliqui inierunt, citius reco-

alescentibus. Vid. BALLONIUS in Phary Med. Novæ

pag. 198.

Optimè nunc Purgantium in Quartanis determinat

BALLONIUS Sætra loc. pag. 196. Nempe levioribus in

initio utendum: Coctia quando est materia, ac jam aliquis

ex parte mitigari cepit, locus valentioribus esse; quoniam

Humores tenaces, crassi, viscosique leniorem vim effu-

gunt &c., qui prolisus hoc negotium explicat. Propinan-

tar convenientissimè tertio vel quarto Paroxysmo absolu-

to, idque Intermissionis die in Tertianis, in Quartanis

verò die ante Paroxysmum; vel etiam Purgans propina-

re ipso Paroxysmi die, sed ita, ut effectum sum ante

Paroxysmi invasionem compleat: de qua vid. notabilis locus

in DECKERS Comment. in Barthele Prælix p. 106. Imò in

contumaciore Febre etiam Appropriatis filinis incidenti-

bus, & abstergentibus Remediis permittit Purgantia ante

Paroxysmum propinari possunt, in specie Scammonium,

quod tunc sere Alterantis simul vicem obtinet, (speciatim

in Quartanis ante Paroxysmum simul cum aliis propina-

Purgantia: vid. BALLONIUS Sætra loc. pag. 229. HOE-

FERUS in Hæc. Med. pag. 191. Hinc enim in Recidivis

Appropriatis abstergentibus & abstergentibus Scammonium

additum felici cum successu usurpavit. Purgantia talia sunt,

ut dixi, mediocria; Fortia aut acriora nocent; sufficient bla-

ndiora primas vias à fordibus inde haurientibus evacuan-

tia. Conveniunt igitur quæcumque Purgantium Formis,

speciatim tamen Digestivi salini Pulveris, aut Infusa Simu-

l cathartico acuta.

Sufficit vel solus Tartarus vitriolarum, grano uno vel al-

tero Purgantia cuiusdam acutus. Dabo Exempla; sit Pul-

vis Purgans mihi aliis in frequenti usu:

℞. Tartari vitriolati gr. xii. ad xv.

Scammon. sulph. gr. iii.

Troch. Alband. gr. ii.

Ol. dissil. Anis. gutt. ii. vel Ol. Caryoph. gutt. ii.

M. F. Pulvis, qui 5. vel 6. sedes

blande mover: S.

Pulvis Purgans pro una vice.

Vel

℞. Crem. Tartari, vel Tartari vitriol.

Pulv. Jalapp. an. 3℔.

Mag. Scam. gr. vi.

M. F. Pulvis. S. ut antè.

Vel

℞. Crem. Tart. 3℔. vel gr. xxiv.

Pulv. Jalapp. gr. vi. ad 3℔.

Ol. dissil. Caryoph. gutt. i. M. S.

Pulvis Aperitivus.

Vel

℞. Pulv. Hyss. rubr.

Tart. vitriolati. an. gr. viii.

Scammon. sulphurat. gr. v.

M. F. Pulvis: S. ut antè.

Vel

℞. Crem. Tart. 3℔.

Pulv. Jalapp. 3℔.

Ensat. Troch. Alband. gr. i.

Ol. dissil. Anis. gutt. ii.

M. F. Pulvis: S. ut antè.

Vel

℞. Crem. Tart. 3℔.

Arcan. dupl. gr. xv.

Pul. Jalapp. gutt. vi.

M. F. Pulvis: S. ut antè.

Vel

℞. Red. Jalapp. 3℔. ad gr. xv.

Nutri persif. gr. vi.

M. F. Pulvis. S.

Pulvis Purgans.

Vel

℞. Pulvis Jalapp. gr. xv.

Scammon. sulphurat. gr. iii.

Nutri persif. gr. iv.

Sal. Tartari gr. ii.

M. F. Pulvis. S. ut antè.

Quod Infusa: ex omnibus optimum est blandum Infu-

sium Senæ cum sale Tartari, acidum vitiosum corrigent-

em, quod non tantum RIVIERUS lib. 1. Observ. 19. 40.

lib. 2. Observ. 66. lib. 3. Observ. 32. & Cent. 4. Observ. 14.

sed & alii quamplurimi Auctores, in specie in Quartana

commendant; vel solitariam, vel cum Helleboro nigro,

aut ejusdem Extracto in Quartanis, aut cum Rhabarbaro

in Tertianis sociato: c. gr.

℞. Fel. Senæ. fusc. 3℔. vel 3℔.

Sem. Anis. contus. 3℔.

Sal. Tartari 3℔. ad 3℔.

Infund. in f. q. Aqu. Card. bened.

Stent in loco tepido per noctem: mane

℞. Colatura 3℔i. addo

Aqu. Cinnamon.

Syrup. de Pom. Rg. Sabor. 3℔.

M. S.

Potio Laxativa.

Quæ potio 4. vel 5. vicibus purgat, est coloris elegantis-

simi, & saporis minime nauseosum.

In Tertianis additur Rhabarbari 3℔. & immittitur do-

sis Senæ.

Vel

Vel

℥. Fol. Senn. *fine* ℥ij. ℥ij.

Rad. Helleb. nig. crud. ℥ij.

Zingib. an. ℥ij.

Sal. Tartari ℥ss.

Ebulliant leniter in Sere Lactis per subfident. depur.

Colatura ℥v. adde

Tinctur Tartari ℥j.

Syrup. Pumar. simp. ℥ss.

M. S. ut antè

Vel

℥. Fol. Senn. *fine* ℥ij. ℥ij.

Crim. tartari ℥ss.

Infund. per noctem in ℥. q. Aqu. Card. bend.
Stent in loco calido; mane facta blanda ebullitione,
coletur.

Colatura ℥ij. adde

Syrup. de Cichor. cum Rhubarb. ℥ss.

M. D. S.

Potio purgans pro una vice.

Vel

℥. Fol. Senn. *fine* ℥ij. ℥ij.

Sal. Tart. ℥ij.

Infund. in ℥. q. Aqu. comm.

Stent in loco calido per noctem; mane

℥. Colatura ℥ss.

D. S.

Potio Aperitiva.

Vel

℥. Fol. Senn. *fine* ℥ij. ℥ij.

Helleb. nigri crud.

Zingib. an. ℥ij.

Sal. Tartari *acerr.* ℥ss.

Incis. & contul. indantur Modale, infundantur in

Aqua ferventis ment. i.

Et vase clauso reponantur; ut blandè frigescant: post-
modum Infusum in crella asservetur.De hoc semper duabus horis ante Paroxysmum, necnon
diebus intercalaribus, bonus haustus calidè assumatur, im-
primis in Quartana.

℥. Crem. Albusch. M. S.

Fler. Crat. min. p. ij.

Rhabarb. el. ℥ij.

Rad. Helleb. nigri. ℥j.

Cinnamon.

Sal. Tartari an. ℥j.

Infundantur in Aqua sumaria:

Stent in loco calido per noctem; mane

℥. Colatura ℥ij. adde

Syrup. Rolar. *felus*. ℥ij.

M. pro una Vig. S.

Potio purgans pro una vice.

Vei Extradum Helleb. juncum cum Extr. Martialis,
in forma Potionis pericribi potest:

℥. Aqu. Card. bend. ℥j. vel ℥ij.

Extr. Mart. *aper.* ℥j.

Trach. Alband. gr. ℥. vel ℥ij.

Syr. de Fem. ℥ij.

M. S. *Fein* S.

Potio purgans in Quartana.

Vel

℥. Aqu. Card. bend. vel Mosch. ℥ij. vel ℥ij.

Cissam. ℥ss.

Cann. Ammon. cum Acet. solut. gr. xvi. ad ℥j.

Tart. vitriol. gr. ii. vel ℥ss.

Scamm. sulph. gr. ℥ij.

Extr. Trach. Alb. gr. ℥. vel gr. i.

Syrup. Rolar. vel de Fem. solut. ℥ij.

M. S.

Potio Emolliens Laxativa.

Quod si pilule placeant, usurpetur Extradum Catholi-
cum Androsaci à gr. xv. ad ℥j.; item in eadem dosi Extra-
dum Panchymagogum Crati; item Extradum Helleb. nigri,
& acutum cum aliquot granis Scammonii sulphu-
rati. Alias etiam Pilule tartareæ Quercetani, item Pilule
de Ammonico Quercetani, & similia alia nota conveni-
rent: c. g.

℥. Mass. Pilul. de Amm. Quercetani vel Tartareæ.

exisdem gr. xv. ad ℥j.

Extr. Albusch. gr. vi.

Scamm. sulphurat. vel Extr. Trach. Alb. gr. ij.

M. F. Pilula. S.

Pilule Febriles purgative.

Vel

℥. Mass. Pilul. de Ammon. Quercetani gr. xv.

Extr. Card. bend.

Albusch. an. gr. iv.

Neri antimoniaci gr. vi.

Scamm. vulsat gr. i.

Cum ℥. q. Essentia Martis i. Pilula. S. ut antè.

*Vel

℥. Extr. Panchym. Cralli gr. xv.

Martis cum Saci. Fem. gr. xij.

Tartari vitriolati gr. vi.

Scamm. sulphurat. gr. ℥ij.

Cum ℥. q. Essentia Martis i. Pilula: S. ut antè.
Omnium optimum Purgans, præsertim in Febris Chre-
sis, est Mercurius dulcis: c. g.

℥. Mass. Pilul. de Tribus Rafs,

Mort. dulc. an. gr. xv.

Scamm. sulphurat. gr. ℥ij.

Extr. Trach. Alb. gr. i.

M. i. Pilula. S. ut antè.

Vel in forma Boli:

℥. Conserv. rosar. ℥ss.

Mort. dulc. ℥j.

Scamm. sulphurat. gr. v.

M. i. Bals. S.

Suecharum Purgans.

Vel

℥. Mort. dulc. gr. xv.

Tartari vitriolati. ℥ss.

Scamm. sulphurat. gr. ℥ij.

Cum Conserv. Rosar. i. Bals. S. ut antè.
Egregium hic est Mercurius dulcis, quia viscida, pitu-
tosa, cruditates chylosas, & inde Lymphæ vitia imprimis
evacuat; Scammonium verò acerbis, & uti vocant, Bi-
liosis, expurgando in primis viis conducit. Pertinet hæc
præsertim contra Quartanas contumaces Mercurius dulcis
cum Mercurio vitæ mischus ad imitationem. HART-
MANNI Praxi Chym. lib. 1. cap. 4. §. 1. Vid. CARDI-
LUCCIUS Officin. Sanis. pag. 25. Sicut & Batyrum Anti-
monii in substantia sympum etiam est conveniens Purgans
in Febris: (adest enim aliquod de Mercurio Vitæ.)
Nam quidam propinavit gutt. ij. Batyri Antimonii in hau-
stu Vini, & quidem Quartanarum, & citra ullum incom-
modum Alvum solvit: tursus stupor gutt. v. in Vino, &
purgatus est, & sudavit, Febrisque soluta fuit. (O)Pertinet hæc Specifum Empiricum pro Febris Intermittentibus, præsertim in Tertianis, vel simplicibus vel
compositis:

℥. Mechasar. alb. ℥ij.

Grana Piper. albi no. xij.

Lap. Cancr. trap. ℥j.

M. i. Pulvis.

Div. in 3. part. aqu. D. S.

Pulvis Febrilis Aperitivus.

Propinandus in haustu Vini calidi, imminente Paroxys-
mo, expectando semper Sudorem largum; plures Febres
diuturnæ hoc ipso curatæ fuerunt.Pertinet huius Pulvis Camisi de Warwich; præsertim ad-
ditione Martis correctus, ante Paroxysmum usurpatus,
optimè confert: ad cuius imitationem

℥. Crem. tartari gr. xv. ad ℥j.

Scamm. sulphurat. gr. ℥ij. ad ℥ss.

Antimon. diaphor. gr. vi.

M. i. Pulvis S.

Pulvis pro una vice.

Vel

℥. Antimon. diaphor. ℥ss.

Mag. Scamm. gr. xxiv.

Crem. Tartari gr. ix.

M. i. Pulvis.

Div. in 3. part. aqu. S.

Pulvis febrilis Laxativus.

Vel

(O) Obiter fani est A. errum, quæ non in principio hujus Observandi, dixerat, nisi scilicet esse in Febris
Intermittentibus Purgantia fortia; nunc crescere oritur ab Helleb. & Calcytride, & Scammonii, sensus ad Mer-
curium dulcem, Mercurium Vitæ, & ipsam Batyrum Antimonii gradum facit: sane hæc hæud inter mitiora Purgantia
referantur.

- Vel
 24. Crem. Tartari 3i.
 Animom. diaph. 3i.
 Scamm. prop. gr. vi.
 M. F. Pulvis.
 Div. in 2. part. 3.
 Pulvis Echerilla.
 Vel
 24. Pulv. Cornuti 3i.
 Trach. albid. gr. i.
 ai. destillat. Mentis gust. 3i.
 M. F. Pulvis. 3.
 Pulvis Laxativus.
 Vel
 24. Pulv. Jalapp. gr. xii. ad xv.
 Animom. diaph. non edulcor. gr. vi. vii. ad vii.
 M. F. Pulvis. 3.
 Pulvis scholis Aperitivus.
 Vel
 24. Corall. rub. prop. vel Lupul. Cuscut. prop.
 Salis abfch. vel arena. dupl. 3i.
 an. 3i. gr. xii. xiii. ad xv.
 Scamm. sulph. vel prop. Breudel.
 gr. ii. vel lii. ad iv.
 M. F. Pulvis. 3.
 Pulvis Febrilis Laxativus.
 Detur aote paroxysmum Vel
 24. Salis amon. gr. xv. ad 3i.
 Pulv. Jalapp. 3i. ad gr. xv.
 M. F. Pulvis. 3.
 Pulvis Aperitivus.
 Vel
 24. Arcan. dupl. 3i.
 Animom. diaph. gr. v.
 Corall. rub. prop. gr. 3i.
 Pulv. Jalapp. gr. vi.
 Scamm. sulph. gr. ii.
 M. 3.
 Pulvis Laxativus.
 Vel
 24. Arcan. dupl. gr. xv.
 Animom. diaph. 3i.
 Scamm. sulph. gr. iv.
 M. 3.
 Pulvis Aperitivus.

Egregie conferunt, praesertim si mox in Recidiva capiantur, item.

24. Raffal. min. laxat. 3v.
 Tartar. viriat. gr. vi.
 M. 3.
 Pulvis Laxativus.

Obferv. V. Clysteres ad alleviendam Paroxysmorum aequam, ubi copiosi flatus aut Borborygmi, aut Ardore Abdominis, aut Dolores in centro Mesenterii circa Vertebrae lumbares, aut Angustiae in Praecordis, quae Sudorem arpe impediunt, sunt insigniter proficui, item in Ventriculi Symptomatibus, ante vel in Paroxysmo, v. g. Vomitu nimio, Anxietatibus, item gravibus alio Symptomatibus, ex acrioribus & mordacibus aetuginosis Suctis ad Ventriclem delatis, difficulter vomentibus, h. e. Orisficio Stomachi superiori robusto instructis; id quod eo magis observatur, ubi Alvus alia obstruata, aut Faecra indurata sunt, uti istud subinde evenit in Hypochondriacis & similibus. Fiant saltem ex leniter Abstergeantibus aut Carminantibus cum Sale Tartari acutis, in Scorbuto vel Febre Scorbutica, ubi Dolores Abdominis convulsivi aut Lumborum graviores adsint, ex Lacte idem salubriter sunt, vel solo, vel solvatur in eo Saccharum aut Mel, adiectione Vinelli Ovi; mirae Symptomata tollunt: sicuti & in Hypochondriacis & Hystericis, ubi urgent varia Symptomata, Clysmata talia ex & cum Terebinthina maturae injecta multum conferunt. Dabo Exemplum Clysteris carminantis seu blande Abstergeantis,

24. Spec. Carmin.
 Emulsiat. an. M. 3.
 Salis Clo. Clevellat. 3i. ad 3iij.
 Stor. Reg. Animom. 3i.
 Coq. in f. q. Aqua simpl.
 Colaturae 3viii. adde
 Elat. Bacc. Laur. 3i.
 Ol. destillat. Tereb. 3i.
 M. pro Clysmate: 3.
 Clyster.

- Vel
 24. Spec. Carmin. vel Emulsiat. M. 3i.
 Niri carter. 3i. vel 3iij.
 Coq. in f. q. Aqua simpl.
 Colaturae 3ix. adde
 Elat. de Bacc. Laur. 3i.
 Ol. destillat. Anacard. 3i.
 Vinell. Ovi No. 1.
 M. f. Emulsa.
 D. 3. ut supr.
 Vel
 24. Flor. Chamom. M. 3i.
 Baccar. Junip. 3i.
 Sem. Anis. 3i.
 Coq. in an. Aqua & Urina humana.
 Colaturae 3viii.
 Adde
 Elat. Levitic. 3i.
 Ol. destill. Baccar. Junip. vel Terebinth. 3i.
 M. f. Emulsa: 3.
 Clyster contra Flatum.
 Vel
 24. Herk. Chamom. Rem. M. 3.
 Fel. Lauri.
 Flor. Sambuci an. M. 3.
 Rad. Angel.
 Levith.
 Sem. Anis. an. 3i.
 Coq. in f. q. Aqua simpl.
 Colaturae 3ix. adde
 El. de Bacc. Lauri.
 Levithi an. 3i.
 Niri carminom. 3i.
 Ol. destill. Angel.
 Bacc. Lauri.
 Ruta (multa omnique faciunt in Flatibus
 haec) an. gust. iv.
 Vinell. Ovi No. 2.
 M. pro Clysmate.
 D. 3. ut supr.
 Vel
 24. Fel. Lauri.
 Flor. Sambuci an. M. 3.
 Flor. Cham. M. 3.
 Rad. Levith. 3i.
 Sem. Foen. graeci vel Eli 3i.
 Coq. in f. q. Urina humana & Aqua simpl. ana p. 2v.
 Colaturae 3ix. adde
 Elat. Niri. cum Agar. 3i.
 de Bacc. Lauri 3iij.
 Ol. destill. Angelica.
 Carvi.
 Rata an. gust. iv.
 M. pro Clysmate: 3.
 Clyster contra Flatum.
 Vel
 24. Herk. Abfch.
 Card. bened. vel Cras. min. vel ovum, vel
 Ruta Cr. an. M. 3.
 Rad. Euphy 3i.
 Levith. 3i.
 Bacc. Junip. 3i.
 Sal. Tartari 3i.
 Coq. in f. q. aqua simpl. aut Seri Lactis.
 Colaturae 3viii. adde
 Elat. Niri. cum agar. 3i.
 Mell. rosat. 3i.
 Niri. vel Salis amon. vel Salis Comm. 3iij.
 M. pro Emulsa: 3.
 Clyster Febrilis Abstergeant.
 Vel
 24. Flor. Cham. M. 3i.
 Herk. Mentha M. 3.
 Baccar. Junip. 3i.
 Coq. in f. q. aqua simpl. & Urina. hum. an. part. 2v.
 Colaturae calide applicetur.
 In struere fiat Clyster ex Lacti:
 24. Lact. caprill. vel vaccini 3ix. ad 3iij.
 Adde
 Mell. Rosat.
 Rutae. an. 3i. ad 3iij.
 Vinell. Ovi No. 1.
 M. f. Clyster, &

applicetur pro duabus vicibus; S.

Clyster pro 2. vicibus.

Semper hora una vel altera ante Paroxysmum Clysteres instituti sunt, & sic operantur cum euphoria Aegri.

Obierv. VI. Rarissime aut ferè nunquam, nisi interdum per accedens, Febres Intermitteutes solis Universalibus, ut Purgantibus, Vomitoriis, Vemericificalis, aut similibus cedunt; quibus si administratis, alia insuper Alterantia Appropriata, seu Spiritus, aliis Febriofugis data, requirantur, quæ firmamentum febrii contrigunt, malam Crasin Maltæ Sanguinem emendant, & inquinamenta à Paroxysmo relicta resolvunt, etque per Diaphoreticis blandè excludunt, aliis in pejus truit malum. Experientia testatur, Diaphoretica in Intermitteutibus plus pizillare, quam Purgantia, vel quæcumque alia, monstrantur hoc Natura in hac Paroxysmi beneficio sudoris facientis tragœdian; et quæ sunt partim communia, præsertim Salina, tam fixa, quam volatilis, nempe quorum vis in destruetio fermenti febriis acidi, etque per sordorem exclusione ferè consistit; uti v. g. Chinas China contra Tertianas, item Misera Crallii contra Tertianas, &c. quæ viderè dicuntur præcipitare, figere, effervescitiam filare, &c.

Eligenda autem sunt Diaphoretica pro varietate Symptomatum in Paroxysmi distinda: in specie Aromatica nimis acris, etiam Theriacalia, vitanda sunt, ubi intensior Aëther affligit Aegros, utpote in quo casu fixa magis conducunt: vid. BECHERUS *Phys. febrium*, lib. 1. pag. 193.

Ac siquid Febres Intermitteutes tunc curata potest dici curata, nisi per sudorem succellere sinierit.

Obierv. VII. Quicunque autem febres Intermitteutes prædicare velit, cum cavere oportet, ne Corpore non prius purgato, per quæcumque loca id fiat, à Diaphoreticis & Spiritibus initium faciat, maxime in Principio; quia potius præmissis Universalibus tantummodo hæc exhibeantur; qui aliis specificis incompetibilibus subijctis, quales sunt Stramonium, Timal, Myofyllis, aliaque Terrena, Febres rede compositas Vomitoriis ferè premittit, tunc possunt ea deindari. Sic e.g. BECHERUS ex usu Pulveris ex Eboro sinegit, & Antimonio diaphoretico in medio Paroxysmo modo duplicatim incurrit; sicutur ex parte, non ex toto fermentum febrii, unde quæ altera medietas motu inchoato pergit, dum altera, sequente demum die, volatilis quasi deorsum facta, Naturam irritatam Paroxysmum Rerumulat. Bene observandum est progressus febriis ad statum volatilitatis fermenti febrii in ordinario febrium motu per Frigus, Aëthem, & Sudorem; quamdin exurent fermentum, Frigus orget, & contumax est febris; quamdin resolutum & volatilitatum, Aëther, donec saturatum mediocriter Sudore dimittatur. Hinc Intermitteutes Ardentes, omnium brevissimè reddè trahit, & quod majus frigus, eodè discurritur Paroxysmus, aut Febrii ipsa ut in Quartanis (P): hinc Aromata in statu prolixe, attenuando, resolvendo &c.

Obierv. VIII. In omnibus Intermitteutibus febribus, aliis, quæ Periodicis Morbis, Ager ante Paroxysmum, & in eo, neque Cibum neque Potum assumat; sed necesse est ut stomachus sit vacuus. Quicquid enim Paroxysmus in stomacho involet, hoc omne, Digestionis primæ in Paroxysmo penitus deficientis errat, in scias febrii, novo somiti interveniens corrumpit. Alvos tamen utilissimè associatur ante Paroxysmum, vel per se, vel speciatione injecto, si opus est, Enemate, ut autè monui.

Obierv. IX. Medicamenta Febriofuga semper, non præsertim, sed instante febre, & ita ante Paroxysmum exhibeantur, una vel duabus vel tribus horis ante eum; vel in vehiculo calido; vel, si non placet, in haustu Vinæ Absinthiacis; vel alio medicato, promovendo deinde sudore (si enim in non sequitur in fine Paroxysmi, accedant Cephalalgie), idque repetatur sepius in duobus, tribus vel quatuor Paroxysmis, licet non amplius redierit Paroxysmus suo tempore, ut sic Junius viribus cum Natura operentur. Ingruente autem sudore in fine Paroxysmi, non nimis fragilis contemner Ager, ne Animi deliqua incurrat; ac vires nimium exhaustantur.

Obierv. X. In Tertianis Perniciosis seu Malignis miscantur semper Alexipharmaca; quales sunt Antimonialis fixa, item Bezoardicum Minerale, maxime Martiale & Joviale: quia magnum periculum subest. Interim tamen, cum

febris Maligna simulare possit Tertianam, cautus sit Medicus, præsertim cum Lingua sit aspera & nigra, osiumque virium nimia & subitanea prostratio; (ex Lingua multa petuntur signa, imprimis in Concanis & Malignis) Foras huc respicit JOHANNES TOLL in *Praxi Schenckiana* pag. 390. dicens: Cum Paroxysmus Tertianæ est cum malis accidentibus & delirante Cordis, ita, ut pariter à materia venenata esse, doctor Isidoro in Paroxysmo semelati Ciri aliquo grana, & videlicet effectum mirabilem &c. Nempe Immo semelati Ciri additis Appropriatis Alexipharmacis & Abiortivis, non foret inanis.

Obierv. XI. Spiritus Salis ammoniaci volatilis (modus parandi est omnibus notus) universalè est febriofugum, & repetito ulu præparis raro fallit in Quartanis, aliisque Intermitteutibus, sive Aëther addit, sive frigus, unde spiritus hic in genere Spiritus Antiquariorum vocatur. Loco ejus enim ipsum Sal Ammoniacum deputatum, seu ejus flores, vel loco ejus Sal Catholicum, convolvitur præmissis Universalibus, seu uno altero Paroxysmo jam delapso, si vel 36. ad somnum (est enim acerrimum) propinquantur. Verum obiter noto, non facile, nisi pro substantia ulu esse præscribendum Sal Ammoniacum conjunctum cum Silibus Litivialibus suis: Ratio, quia alius est Sal Ammoniacum avolat omne Sal volatile, relicto Sale suo Acido, quod fe jungit cum Litiviali, & fit Sal tertium fissum. Ipsa Febres Scorbucæ etiam spiritus Salis Ammoniaci mitigat, in quibus cum alia vel dimidio spiritus Cochlearis opemè permiscetur. Usurpari potest tam ante Paroxysmum, si rite paratus fuerit, à 36. ad 36. prout acrior vel debilior fuerit, quam etiam die Intermissionis ad gutt. xx. xxx. vel xxxix. bis in die in Aqua quadam appropriata. Locu hujus Galenicus in simplici febre Intermitteute & scorbutica succos aut Decocta Absinthii, Cardui bened., Centaurii minoris, & similibus Plantarum febriofugarum amaricarum, Sale volatili oleoso acris præmixtum, ad imitationem RULANDI usurpare solent: loco quorum spiritus Salis Ammoniaci longè melior est. Pro hoc scopo

℞. Spir. Salis Ammon. 3ii.

D. S.

Spiritus Febriis resolvens.

Datur 30. vel 40. gutt., vel pro 2. dosibus.

℞. Spir. Salis Ammon. 3i.

℞. Op. gutt. xv.

M. pro ana dōi ante Paroxysmum.

D. S.

Essentia Febriis pro una vice.

Vel

℞. Spir. Salis Ammon. simpl. 3iii.

Liqu. Cornu Carui succis. 3i.

M. S.

Spiritus resolvens.

Repetatur aliquoties.

Vel

℞. Aqua Card. bened. vel Pamar. 3i. ad 3i.

Spir. Salis Ammon. 36. ad 3i.

Liqu. spirit. r. 16. vel 12. vel 8. Op. gutt. viii.

Syrup. Card. bened. 3ii. vel 36.

M. pro dōi. S.

Potio Febriis pro una dōi.

Vel

℞. Aqua Card. bened. 3i.

Carmis. 36.

Spir. Salis Ammon. 36. ad 3i.

Ol. dissolut. Caryophyll. gutt. ii.

Syrup. Card. bened. 36.

M. F. Potio assiduenda ante Paroxysmum.

D. S. ut antea.

Mirè convenit, in specie si cum Affectionibus Abdominis hypochondriaci gravioris hæ Paroxysmus.

Vel

℞. Aqua Card. bened. vel Menthy 3i.

Spir. Salis Ammon. 36.

Liqu. Caner. prep. vel Corall. rubr. prep. vel

Antimon. diapher. 36. ad 3i. 36.

Ol. dissolut. Caryophyll. vel Sassa. gutt. 16.

Syrup. Card. bened. vel Cortis. Aurant. 3i.

M. S.

Potio Febriis pro una vice.

Addi

(P) Major Frigus hic non est intelligendum, quod intensus & brevius est; sed potius extenuatus majori morbositas: etenim in Praxi videmus ab intensiori sed breviori Frigore breviores Febrium Paroxysmi provenire, & curari. Sic Quartanarum Paroxysmi qui levi corporis refrigeratione, sed satii prolixe aggradiantur, omnino brevissimi observantur.

Addi etiam potest *Liadani opiat* gr. j, si Frigus urget.

Pro varietate circumstantiarum in febre scorbutica permiscetur cum Spiritu Cochlearis, repetatur, si opus; scilicet eum operatur. Vel

℞. *Aqua Card. bened.* vel *Cera. min.* vel *Menth.* ℥j. vel ℥ij.

Clenam. ℥ij.

Spir. Salis Ammon. ℥j.

Antimon. diaphor. gr. xvi.

Syr. Card. bened. vel *de Beten.* ℥ij.

M. D. S. ut supra.

Vel

℞. *Salis ammon. simpl.* vel *depur.* gr. xv. ad ℥j. *Cerall. rubr. prop.* vel *Lapilli. Cane. prop.* vel, (quod melius) *antimon. diaphor.* vel *antidist.* *Petril* ℥ss. gr. xii. ad gr. xv.

M. D. S.

Pulvis Febrilis.

Detur ante Paroxysmum, addendo unam vel alteram guttam Olei caryosidum destillati, v. g. *Caryophyllorum*, &c.

℞. *Salis Ammon.* ℥j.

Antimon. diaphor. ℥ss.

M. f. *Pulvis.*

Detur 3. *destr.* S. ut antè.

Vel

℞. *Aqua auriscentat.*

Cardal bened. an. ℥ss.

Spir. Cochlear. vel *Sal. Ammon.* an. ℥j.

Lapilli. Cane. prop.

Syrup. Febril. *Strobelbergeri* an. ℥j.

Liad. opiat gr. ii.

Syrup. Scalyrh. *Petril* ℥j.

M. S.

Mistura pro aliquot vicibus in Febri Scorbutica,

In forma Pulveris:

℞. *Salis ammon.* ℥iv. vel ℥ss. ad ℥j.

Div. in 4. part. xq. S.

Sal Febrile pro 4. vicibus.

Vel

℞. *Salis ammon.* gr. xv.

Lapilli. Cane. prop. ℥ss.

Liad. opiat gr. j.

M. S.

Sal Febrile.

Detur ante Paroxysmum.

Vel præscribatur *Sal Ammoniacum* cum *Sale Abinthii* vel aliis Fixis, cum *Absorbentibus acidum*; illudque in *Hypochondriacis Temperantibus*.

Obs. XII. Præter Spiritum salis Ammoniaci *Salis Fixa* seu *Cineritia Vegetabilium*, *Cardui benedicti*, *Fumariz*, *Centaurei minoris*, *Abinthii*, *Artemisiz*, *Imperatoriz*, adeoque quilibet *Alcalia* omnes Febres Intermitteutes, imprimis *Quartanas* & *Febres Scorbuticas* tollunt vi *Sudorifica*, si *Quartana* ℥ss. ad ℥j. imò ad ℥ss. ante Paroxysmum dentur, imò horum ℥j. adjuvum vel *Antimonium diaphoreticum*, *Antihediacum Petrili*, aut *Flores Antimonii diaphoretici*, aut *Flores Sulphuris*, quos *HOFFMANNUS* pro *Tertiana* periculè curanda in *Clavo* pag. 370. commendat, his vel ter ante Paroxysmum in *Aqua Centaurii minoris* vel *Vino cum Sudoris eruptione propinandum*: item *Lapilli Cancrosum* præparati, qui & ipsi turgent sale volatili temperato, aut *Coccolia*, *Mater perlarum*, aliæque conereta *Terræ*, & quidem dimidiata ab illa dosi, pro circumstantiarum tamè varietate varianda, raro salunt. Nempè & interdum, ut nimis citò propinatus Spiritus Salis Ammoniaci, aut ubi adhuc nimium adest Frigus, minus prodest, & tunc in subsidium vocanda *Salis Fixa*, & ante Paroxysmum propinanda, continuo Spiritu illo Intermissionis tempore. Nam ubi magis urget frigus & Rigor, quam Æstus, *Salis hæc Fixa* utilissima sunt convenientiora, simulque fortiter *Sudores* movent, nec facile febrium duplicaturam admittunt: sed ubi excedit Æstus, spiritus Salis Ammoniaci convenientior, quod per subitaneum sudorem Æstum mitigat; item *Tartarus vitriolatus*, *Potio Crochana*, & *Gentia*. Minc in febrilibus frigidis si utramque absolvent paginam, & *BARBETTE* in *sa Praxi* *salia fixa* incinerata in *Cura Tertianæ* & aliarum febrium Intermitteutium longè præfert usui *Chion* *Chion*, itaque tam tutiora & promptiora sine *Recidivi* metu: item volatilia *Salis ammoniaci*, *Spiritus Urinæ*, hæc hujus loci *Spiritus Salis Ammoniaci*, *Sal volatile Cornu Cervi* aut *Viperarum*, quæ in *Quartana* ℥ss. ad gr. xii. propi-

nari, vel commode aliis permisceri possunt. Præscribendi modus est hic:

℞. *Cerall. rub. prop.*

Salis abinth. ℥ss. vel gr. xv.

Liad. opiat gr. ss. ad gr. i.

Ol. destill. Caryoph. vel *Ess. Juss.* gutt. ii.

M. f. *Pulvis.* S.

Pulvis Febrilis.

Detur ante Paroxysmum.

℞. *Salis abinth.* vel *Card. bened.* ℥j.

Cerall. rub. prop. vel *Lap. Cane. prop.* vel *Antimonii diaphor.* ℥ss. gr. xii. ad gr. xv.

Liad. opiat gr. i. vel ii.

M. f. *Pulvis.* S. ut antè.

Hora una vel altera ante Paroxysmum in vehiculo calido assumantur, expectando post Paroxysmum *Sudorem*.

Vel

℞. *Salis abinth.* ℥j.

velat. *Cornu Cervi* gr. v.

Liad. opiat gr. ii.

M. S.

Sal Febrile pro una vice.

Vel

℞. *Salis abinth.* gr. xv.

velat. *Cornu Cervi* gr. iij.

Cerall. rubr. prop. ℥ss.

Ol. destillat. Caryoph. gutt. ii.

M. f. *Pulvis* ante Paroxysmum assumendus. S.

Pulvis Febrilis pro una vice.

Item contra *Quartanam*:

℞. *Salis abinth.* ℥j.

Lapilli. Cane. prop. ℥ss.

Antimonii diaphor. ℥j.

M. pro 3. *destr.*

D. S.

Pulvis Febrilis pro 3. vicibus.

Vel

℞. *Salis abinth.* ℥j.

Lapilli. Cane. prop. ℥ss.

M. pro 4. *destr.*

D. S.

Pulvis Febrilis.

Vel

℞. *Cerall. rub. prop.*

Salis abinth. an. gr. xv. ad ℥j.

Sal. salina gr. vi.

M. f. *Pulvis.* S. ut antè.

Detur ante Paroxysmum.

Do Auro sublimante vid. *HOEFFERUS* in *Novi. Method.* pag. 292.

℞. *Cornu Cervi* sicc. ignis ℥ij.

Salis Card. bened.

Cent. min. an. gr. viij.

M. f. *Pulvis.*

Div. in 3. partes. S.

Pulvis Sudoriferus pro 2. vicibus.

Vel

℞. *Salis abinth.* gr. xv.

Antimonii diaph. ℥ss.

Cerall. rubr. prop. gr. xii.

Ol. destillat. Sassafras gutt. ii.

M. f. *Pulvis.* S.

Pulvis Febrilis.

Vel

℞. *Antimonii diaphor.*

Salis abinth.

Card. bened. an. ℥j.

Ol. destill. Macis gutt. ii.

M. f. *Pulvis* pro 2. *destr.* S.

Pulvis Febrilis pro 2. vicibus.

Vel

℞. *Lapilli. Cane. prop.* ℥j. ad ℥ss.

Antimon. diaphor.

Salis abinth. an. ℥ss.

M. D. S.

Pulvis Febrilis.

Vel

℞. *Salis abinth.* ℥j.

velat. *Cornu Cervi* gr. v.

Lapilli. Cane. prop. ℥ss.

Liad. opiat gr. ii.

M. f. *Pulvis.* S. ut antè.

Detur ante Paroxysmum.

HELMONTIUS commendat ad vim febrilem Salia ex Plantis Cephalicis, Majorana, Salvia, Rosmarini, &c. sed non fixa, verum volatilia, in Tract. de Febris §. 4. sed non omnibus licet adire Cortinum, ut possint habere Salia Vegetabilium volatilia in forma secca: intermissa sub forma Olei possunt adhiberi.

In forma Potionis.

℞. Aqua Card. beand. ℥i.

Salis Absinth. ℥i.

℞. Card. min. ℥i.

Lapilli Cancr. pp. vel an. diaph. ℥i.

M. f. Pulvis.

Potio febrilis pro una vice.

℞. Aqua Card. min. ℥i. vel ℥i. ad ℥i.

Salis absinth. vel Card. beand. ℥i. xv. vel ℥i.

Lapilli Cancr. pp. ℥i. vel gr. xv.

Syrup. Card. beand. ℥i.

M. f. Potio ante Paroxysmum assumenda.

S. ut ant.

Quod si urgent Rigor, guttae ij. Olei dissoluti Caryophyllorum vel Nucum Javanicorum addantur.

Item ante Paroxysmum convalescentia haec Potio Sylovi co- chleatim assumenda:

℞. Aqua Perisph. ℥i.

Spir. Theriac. ℥i.

Sal. volat. fusca ℥i.

Syrup. Card. beand. ℥i.

M. S.

Potio febrilis cochlcatim sumenda.

Vel

℞. Aqua Card. beand. ℥i.

Theriac. ℥i.

Salis absinth. ℥i.

Spir. salis ammon. ℥i.

Syrup. Papav. evan. ℥i.

M. D. S.

Potio febrilis pro aliquot vicibus.

Obs. XIII. Quod attinet Salia Salis fixa seu duplicata, quae constant ex Alcali & Acido, ut Tartarus vitriolatus, Arcanum duplicatum Myrsicis, Sal Hypochondriacum digestivum, Nitrum antimoniatum, Item Tartarus vitriatus Bartholoni, quem vocat Ioh. Aldephyrus aduocato, seu Sal Tartari imbibitum cum Spiritu Nitri: nam & haec Salia fixa utilissima Vegetabilium cum Spiritu Salis aut Nitri coagulata in Salia Salis crystallina, misce in omnibus Intermittentibus conveniunt & imprimis in Principio morbi tanquam Digestiva & Absorbentia anteveritalia valde utiliter usurpantur: imò in continuatis sollicitudine super febres profligantur. Eiusdem enim Intermittentis pro subtergendis primis viis, & removendis purgatis, si quis subit, homine febrili, multum valetur has quocidie & gr. xv. ad ℥i. & ℥i. in appropriato vehiculo usurpata & ideo de Intermittentibus Vomitoria danda sunt, maxime Sal Hypochondriacum digestivum, quod Digestivum Quartaarium vocat SYLVIVS.

℞. Salis Hypochondr. ℥i.

Absinth. gr. v.

M. S.

Sal live Pulvis emolliens.

Vel

℞. Salis ammon. depur. ℥i.

Nitri antimoniati ℥i.

M. div. in 2. part. p. p. S.

Sal Digestivum pro vi. vicibus.

Mane in vehiculo calido, & vesperi in frigido expiando, uti ante Paroxysmum commodè etiam propinari possunt.

℞. Arcan. dupl. ℥i. gr. xv. ad ℥i.

Lapilli Cancr. pp. vel an. diaph. ℥i.

M. f. Pulvis.

Pulvis pro una dos.

Detur ante Paroxysmum, & etiam repetatur die lateri, missionis his: egregie prodest, copiosam precipitat montem.

℞. Arcan. dupl. ℥i.

Antimon. diaph.

Lapilli Cancr. an. gr. xiv.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. part. p. p. S.

Pulvis Alterativus.

Vel

℞. Arcan. dupl. gr. xv.

Tom. II.

Lapilli Cancr. pp. gr. xij.

Ol. dissol. Bass. Junij. gutt. ij.

M. D. S.

Pulvis febrilis Alterativus.

Vel

℞. Arcan. dupl. gr. xv.

Salis absinth.

Citrull. rubr. pp. an. ℥i.

Lend. spiss. gr. i.

M. f. Pulvis.

Pulvis febrilis.

Vel

℞. Arc. dupl. Myrs. ℥i. vel ℥i.

Salis absinth.

Lapilli Cancr. pp. an. ℥i. vel ℥i.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. vel 3. part. p. p. S.

Sal febrile pro 2. vel 3. vicibus.

Detur dos ante Paroxysmum, & de Intermittentibus loco Digestivi: Conveniens est in febris Intermittentibus

Scorbaticis, item, ubi nimis urget febris:

℞. Lapilli Cancr. pp.

Arcan. dupl.

Salis absinth. an. ℥i.

Sal. volat. fusca gr. xij.

Lend. spiss. gr. ij.

M. f. Pulvis.

Div. in 3. part. p. p. pro tot dosibus.

Pulvis febrilis pro 3. vicibus.

Semper dosin usam hora ante Paroxysmum assumenda.

℞. Theriac. flos ignis.

Arcan. dupl. an. gr. xij.

Aurif. sal. gr. vj.

M. S.

Pulvis febrilis.

Vel

℞. Crem. Tartari ℥i.

Tartari vitriolati ℥i.

Spir. lous. Sulp. gutt. iij. vel iij.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. part. p. p. S.

Pulvis Alterativus.

Pertinet hac Potio specifica Febrifuga Crellii, quam R. I.

V E R U S toties ante Paroxysmum usurpavit cum felici

successu: formula est haec:

℞. Aqua. Cichor. ℥i. vel iij.

Spir. salph. vel Sarsilla gutt. xv. ad ℥i.

Salis absinth. ℥i.

M. S.

Potiancula.

Proptercur dubus horis ante Paroxysmum: hac ipsa septies curvat quampliciter febris, imprimis Tertianas, felici cum successu. In imbecillibus Subiectis immixsi potest dos ingredientium. R I V E R U S creberrimum ejus fecit experientiam, ut videre est in Observ. ejus Cent. 1. ob- serv. 20. & 26. Item Cent. 4. Observ. 2. 12. 15. 25. & prox. lib. 17. cap. 3. LUDOVICI in Pharmac. Mixturam hanc extemporaneam loco Nitri vitriolati commendat, & sanè non coarsumenda est. Commodè etiam Lapilli Cancro- rum, Antimonium diaphoreticum & similia addi possunt.

Observ. XIV. Salia Nitrosa, & cum Nitro parata omnia Medicamenta, optime effere Atores nimis cum paucis vel nullo Rigore, in Paroxysmo, ut etiam ante cum ad- ministrata: imò Spiritus Nitri dulcis in declinatione Paroxysmi, aut finito jam Paroxysmo, sensibiliter febres miti- gat. Praeter haec, Nitrum antimoniatum, Nitrum vitriolatum, seu Arcanum duplicatum, aut Panaces Hol- stenianum, petide est, prae ceteris in Scorbaticis conveni- ent, adeoque febres Scorbaticas optime tollit: hinc in fe- bribus Intermittentibus cum nimio Aestu.

℞. Nitri antimoniati gr. xv.

Salis Ammon. gr. vi.

M. f. Pulvis ante Paroxysmum propinquus.

D. S.

Sal febrile pro una vice.

Vel

℞. Nitri antimoniati ℥i.

Arcan. dupl. Myrs. ℥i.

M. D. S. ut ant.

Detur ante Paroxysmum.

Item

℞. Nitri antimoniati ℥i.

Arcan. dupl. ℥i. vel ℥i.

L I

Art.

Antihell. Ferul. gr. 12. vel xij.

M. pro 3. doſibus. S.

Pulvis Febrilis refrigerans.

Dentur ante Paroxyſmum.

℞. Niri antimonij ℥ij.

Cornu Cervi ſine igne ℔.

Antimoni diaphor. gr. viij. M.

Div. in 2. part. æquo. S.

Pulvis Febrilis pro 2. doſibus.

Vel

℞. Arren. duplicat. gr. xij. ad xv.

℞. ſigna igne ℔.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis febrilis refrigerans.

Propinentur duobus horis ante Paroxyſmum, aliquot die-

bus repetendus, præſertim, ſi urgent diebus Intercalaribus

Phlogicoſis.

℞. Arren. dupl. ℔ij.

Salis volat. Sueri. gr. lv. ad ℔.

M. pro doſi ante Paroxyſmum. S.

Sal Febrile refrigerans,

Vel

℞. Niri antimon. ℥.

Antimon. diaphor. ℔.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis Febrilis refrigerans.

Capiendus ante Paroxyſmum,

℞. Arren. dupl. ℥. ad ℔ij.

Cerall. rub. prop. vel Antimon. diaph. ℔. ad ℥.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis Reſolutivus.

Obſerv. XV. Acido, æq. q. talia Febriles Intermittentibus prævenire? dubito. Sane ex iis commodum adeo ſingulare haurire viſ potui; nec niſi interdum, dum nimis urget Æſus, pro hoc nonnihil compoſcendo, mediante ſuſtatione Humorum efferveſcentium convenire ſolent: x. g. ſi in Febre Intermitteſcente Rigori intenſior ſuperveniat Æſus, vel cum clamora ſiti punctus, vel cum difficili Sudoris eruptione, vel quando ipſa Febris Intermitteſcens tota eſt Ardens, vel quando Febris Intermitteſcens plus minus Ardens in Continuas degenerare velit, optima ſunt, declinante poſtea Paroxyſmo, aut ſaltem non ante ejus Statum; ſuoc ſub ardore Paroxyſmi, & inde nata gravi Anxiæte, ſequens Mixture conſert:

℞. Agn. Card. bened. ℔ij.

Menth. ℔.

Antimon. diaph. ℥.

Laud. opiat. gr. i. vel ij.

Syr. Card. bened. ℥ij.

Spir. Niri dulcis q. l. pro grato ſapore.

M. D. S.

Potio Refrigerans & Conſortans:

Uſurpetur coſtlectum in ipſo Paroxyſmo.

Vel

℞. Agn. Rubi Idai ℔ij. vel dupl. Agn. & Card.

bened. ℔.

Sueri Rubi Idai ℥ij. ad ℥ij.

Antimon. diaph. ℥. ad ℔.

Syr. Antif. Citr. vel Rub. Idai ℥. vel ℔.

Spir. Niri dulcis q. l. pro grato ſapore.

M. D. S. ut antè.

Hauriatur ſubinde coſtlectum mirabiliter: Ardorem compoſcit, Silem minuit, Sudorem provocat, &c:

Vel

℞. Agn. Flor. Papav. err. ℥ij.

Antimon. diaph. ℔. vel ℥.

Syr. Flor. papav. err. ℥.

Spir. Niri dulcis q. l. pro grato ſapore.

M. S. ut antè.

℞. Agn. Card. bened. ℔ij.

Pumar. ℔.

Sueri. prop. vel Antimon. diaph. ℔.

Syr. Card. bened. ℥.

Spir. Niri dulcis q. l.

M. D. S. ut antè.

Detur in Paroxyſmo & ante eundem, ſi Æſus nimis urget inſecum ſcilicet in eo obſervari.

Præter Acida itidem conveniunt in Paroxyſmo Miſtura

ex Lapillis Cancrocrum cum Aceto: æ. g.

℞. Agn. Card. bened.

Cichor. an. ℔.

Aceti Vin. ℥ij.

Spir. Theriacal. ſimpl. ℔ij. ad lv.

Lapill. Cancr. pulverif. ℥.

Syrup. de 5. Radic. ℔.

M. S.

Potiuscula.

Capiant coſtlectum.

℞. Agn. Acetif.

Pumar.

Menth. an. ℔.

Aceti Rubi Idai, vel Sambuci. ℥ij.

Spir. Theriacal. ſimpl. ℔. ad ℔ij.

Lapill. Cancr. prop. ℔. ad ℔.

Syr. Carr. Aurant. ℥ij.

M. f. Potio coſtlectum uſurpada.

D. S.

Potio Refrigerans & Conſortans.

EA quoque proficua, quando Anguſtia de Anxiæte præ-

cordium, item Pleuræſia & Hypochondriaca Abdomi-

nis Symptomata nimis urgent.

Item

℞. Agn. Acetif.

Rub. Idai an. ℔.

Cinnamon. ℔ij.

Aceti Rubi Idai ℥ij.

Lapill. Cancr. prop. ℥.

Antimon. diaph. ℔.

Syr. Pſilor. ℥.

M. D. S.

Reſolvens Potio Febrilis.

Vel

℞. Agn. Card. bened.

Radic.

Compoſitæ an. ℔.

Aceti diſtill. ℥ij.

Spir. Niri dulcis. ℔.

Lapill. Cancr. prop. ℥.

Antimon. diaph. gr. xv.

Syrup. acetif. Citri ℥ij.

M. D. S. ut antè.

Vel

℞. Agn. charafol. ℥ij.

Aceti Vin. ℔.

Cerall. rub. prop.

Lapill. Cancr. prop. an. ℔.

Laud. opiat. gr. ij.

Syrup. Medor. ſorap. ℥.

M. S.

Reſolvens Mixture Febrilis.

Vel

℞. Agn. Nader. ſorap. ℥ij.

Aceti Vin. ℔.

Lapill. Cancr. prop. ℔.

Antimon. diaph. ℔.

Syrup. Dilat. ℔.

M. S.

Mixture Reſolvens.

Vel

℞. Agn. Charafol. ℔ij.

Menth. ℔.

Cinnamon.

Aceti Vin. an. ℔ij.

Lapill. Cancr. prop. ℔.

Syrup. Fguleuſi ℔ij.

M. D. S.

Reſolvens Potio febrilis.

Obſerv. XVI. Opium, & ea hoc legitima fermentationis paratum Landanum, æquo omnia Opia, illegitimo uſu omnes febres Intermitteſcentes pertinaces reddidit, & æconera legitimo uſu citò tollit, mixturæ Continuas: (ſi in Opio enim multa hærent.) Certiſſime eſt proficuum; eſt enim ſenſim ſollicitatione & motum tremulum. Sed in Rigore necſſe eſt, uſurpetur præmiſſis Univerſalibus, Diſſolventibus & Evacuativis, ut ſic prima viæ & ſecunda liberentur, id-que imprimis duobus in caſibus.

1. Quando Paroxyſmi ex Conſuetudine potiùs, quàm

ex Tomite morboſo perſiſtencia eſt.

2. Quando graviora quædam, aut etiam moleſtiora Sym-

ptomata, durante Paroxyſmo aſſigunt Ægro: Fri-

gus iſtigniter mitigat & Rigores.

Nequaquam autem Opia ſolam, ſed ſemper cum febrili-

gus oſtatis quacunq. forma admiſceantur, quorum forma-

las paſſim dedi. Aliis metus eſt, ne citò nimis & ſolita-

riè uſurpata ſimplices fibros reddant duplicatas, aut triplic-

atas,

catas, aut sopiendo febrem, graviores recidivam postmodum inferat: Id quod etiam faciat fixa terra, v. gr. specifica ex Cochleis marinis, aut austere periarum calcinatis, quae etiam nimis aut intempestive propinata febres duplicant. E. g.

℞. Accen. dupl. Myrsicini ℥i.

Salis Alkali. ℥ss.

Laud. spir. gr. ii.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis Febrilis.

Detur ante paroxysmum in Vino abanthite.

℞. Elisir febril. ℥ss.

℞. Ess. Opii dr. ℥.

M. S.

Elisir Febrile: 40. usque ad 50. gutt.

Vel

℞. Tinct. Tartari comp. dr. ℥.

℞. Ess. Opii dr. ℥.

M. S.

Tinctura: 40. usque ad 50. guttas.

Observat. XVII. Cephalalgia raro post paroxysmum, ut interduos febres, est molesta, nisi suppressus in paroxysmo sudor eadem inducat: sit tamen in febribus nonnullis, imprimis scorbuticis, ut in primis paroxysmis valus omnino sudor promanet, sed declinante iam febre hic vel sponte postmodum erumpit s. itant nocte dieque tales acri incedunt cum salute sudoribus quasi diffundunt. Ergo pro Cephalalgia tali, vel sudor patientis expectandus, vel blando Epithemate Camphorato calido dictus dolor mitigandus.

Observat. XVIII. Psittacaria vel Nuchis, vel Carpis Manuum applicata, Febres Diuturnas optime exhaustiunt, speciatim rigor ex eorum usu cessare solet: interdum penitus cessat febris. Applicandae die intermissionis, ut ita eorum operatio praevenerit paroxysmum: Nam & Sympliciteri *Empellum febrifugum* vim nonnulli causticum, certe intus rubificantem, obtinet. Sic quoque POTERIUS lib. 2. de febribus cap. 23. pag. 109. reicit, quod in *Quarta diuturna Velicatoris Carpo* admoda interdum ita profusa. Quo etiam facit hoc modo *Salvatoria Mercurialis*, *Rosmarinus* subinde rideunt carnos, ut hoc revera videtur remedium ipso morbo gravius: Confer. BALONIUS in *Boniti Phas Med.* pag. 626. & 633. item PIENS de febribus part. 2. pag. 173. Notabile est, alias eos, qui aliquando intermittentes laborant, promptissime salivare, etiam ex aliquo granis Mercurii dulcis propinata. Hinc ad praeveniendum talem Salivationem purgatio promouenda, vel fortis sudor repetitus imperandus.

Observat. XIX. Intermittere Diuturnas, praesertim tertianae duplicatae, item continuas paulo diuturniores, ita videntur alterare sanguinem, & inde derivatum Lympham, ut crassior, viscidior, & glutinosior eorum evadat textura; unde convalescentes tales adhuc febriles Lentas subinde experiuntur, aut saltem *Appetitus* aliquandiu infansio omne non debet redi. Febriculae tali optime praemissio interdum *Emetico*, Mucum primarum viarum eliminant: per *Sal Ammoniacum* occurrere possumus: e. g. dedi ejusmodi pulverem ante paroxysmum in diuturnis febribus, ubi metus adit Medice, summe proficuum invenit, & Medicam avertit.

Vel

℞. Accen. dupl. gr. iij. ad gr. xv.

℞. Ess. Opii dr. ℥.

M. S.

Pulvis Febrilis.

Detur duabus horis ante paroxysmum.

Anorexia vel per Abinthium vel Cencaurii minoris continuatum qualemunque aliquid usum tollitur.

Observat. XX. Diuturna feleres, item quae per copiosam Aboritionem, aut calcinata Terra diluata usurpata, curata fuerunt, vix sine insigni Viscerum laebe, aut multiplicitate hinc resistentibus symptomatis, solent evanescere; unde & Colicæ, & Hydrops, aut pedum saltem Tumor, aut Cachexia subinde non infrequenter. Talibus malis & praecaveatis & curandis optime intersit Abinthium in Decocto, Essentia, Succo, Extracto, &c. frequentius usurum.

Tum. II.

(Q) *Pecus calidus est declinante Paroxysmo quondam sudorem provocat; non ex eadem frigida Potus, exatq. Paroxysmi itam, cum sensus alius defuerit, Agrotantibus omnino interdicens: ita frigida, praesertim ex nivata Aqua Potentilla, aut tempore exhibuit, non solum expellat diu refrigerio acri placidius conquiescant, sed sequentem copiosum sudorem, minima vi Corpori salta, facillime perfundunt. Hoc vobis Alterativa vocantur, & nostris hic calidioribus regionibus, assidue praesertim tempore, non solum utilis, sed appropinquat necessaria experimus. Satis igitur est uti, quod Fimo, & Cerevisia, ut frigidioribus vel assatis Germanis, in omnibus Febris Auctor praescribit.*

parum, aliaque congrua Amara. Sant *Cracum Tumor admanus* ordinario Chronico intermittentes supervenit, praesertim, si copiosius biberint acri, & parum sudaverint, vel si copiosius post curam febris cito se igrurient: sed parum in recessu habet hic Tumor; interne etiam multiplicitate *Abinthii* usu, externe vero *Chilidii* majoris recessis, plantis pedum admotione, facile abigitur.

Observat. XXI. Dum iam febris remittit universaliter, aut etiam alio tempore intermissionis die, vel etiam post febres Chronicas, maxime prolatae Alterantia ex Febrifugis Vegetabilibus, ut praecaveatur vel curetur Cachexia sub cura morbi enata: ut *Essentia Abinthii tartarizata*, vel ex Abinthio, Centaurio minori, radice Enulæ, aut cum spiritus tartarizato composita, Cardui benedicti, Centaurii minoris, Li- quor Terra folia Tartari, Tinctura Tartari, Tinctura Antimonii, Spiritus Cochlearia, Tinctura Stomachalis, Elisir Febrile Myrsicini, vel DD. Mithacis, Elisir proprietatis eam & suis actio, item parum cum spiritus Salis Ammoniaci, Elisir Cachexia, Tinctura Tartari composita, spiritus Salis Ammoniaci, Camphorae, similisque Alterantia, quae Acidum infirigunt & Bilem acuat, Massæ sanguinea Crasin emendant, & Stomachum corrigunt, propinentur: idque bis in die, mane jejunio stomacho, & vespere, ad iij. 30. vel 40. & 50. & 60. guttulas in liquore appropriato: v. g.

℞. Essentia Abynth. vel Card. bened. vel Cracum, vel Tinctura simpl. aut comp. vel Elisir febril. vel Propr. flos acido unc. ℥.

Spiritus Salis Ammoniaci dr. ℥. vel dr. ii.

M. S.

Mistura Febrilis.

Vel

℞. Essentia Abynth.

Card. bened.

Cracum, min. an. dr. i.

Spir. tartar. dr. ii.

M. S.

Mistura Febrilis.

Dosis 30. vel 40. gutt. Detur bis die intermissionis.

℞. Elisir febril. D. Mith.

Propr. an. dr. ℥.

M. S.

Mistura Febrilis & Stomachica: 40. guttas.

Vel

℞. Tinctura tartari acc. dr. ii. vel iii.

Elisir Propr. flos acido dr. ii.

M. S.

Resolvens Tinctura Febrilis: 40. ad 50. guttas.

Vel

℞. Elisir febril. D. Mith.

℞. Ess. flos. comp. dr. i.

M. S.

Essentia Febrilis, 40. guttas.

Vel

℞. Tinct. tart. acc. dr. ii.

℞. Ess. flos. dr. i.

M. S.

Essentia Febrilis.

Vel

℞. Tinctura tartari acc. dr. ii.

Spir. Carm. dr. i.

M. S.

Resolvens Tinctura Febrilis.

Observat. XXII. Uti in intermittentes febribus ante paroxysmum & in eo Stomachus fit vacuus, ita tempore Accessionis aliquidam est ab omni Cibo, & Potu; si enim acri bibere porum frigidum, magis urgetur Horor, & Rigor. In ipso tamen efflu, Calore urgente, aut paroxysmo jam nonnulli declinante, & maxime quando sudoris erap- pin insat, potus paulo largior, non tamen nimis frigidus, sed calidus, concedendus venit, isque quam calidior, eo libe- rior; praenavit enim hic egregie sudorem, & promptius cedit Febris. Interim pro Pota singulariter convenit Vinum & Cerevisia albiatizata in omni febre intermitente. (Q) Quod si merus Scorbuti, Viscum Cochleariae, vel etiam Vinum quoddam ex Alterantibus Aromaticis medicatum

L. I. 3

cum

cum presentia Abundat, spiritu Cochlearum, & similibus de intermissionis, vel declinationis paroxysmo usurpandum. In Quarta tamen paroxysmi libendum est; nihil magis e nimis iohes has contumaces reddit, quoniam nimis potus in paroxysmo, idque ratione Lientis sicilicet eorum contrahentur. C. R. A. T. O. plane in paroxysmo quantitas potum interdicta, quod maxime cautioni conferre adest. Certe crebrior, praeteritum Cerevisiae, potus diuturnior reddi- ta has iohes, in paroxysmo febris ingurgitatus, Mucum in primis vis, & hinc fermentum febris in fonte aug- getur, adeoque confutum est, a potu ut abstinent, quoniam dissolvibile est, aut saltem non potius bibat, quam infus dissolvatur: & quidem bibant potum calidum, & si melius sebus suis consilere volunt, hunc primo potui, aut saltem rebus, uni alterive nimis calido insillatene spiritum facis Ammoniaci simplicem ad gutt. 40. ut huius vis magis corrigatur oza a potu illata, ac simul largius promoveatur iohes; in fine tamen Paroxysmorum non interdicen- dus est potus.

Potus ordinarius sit vel Aqua, vel cerevisia tenuis, vel secundaria cum Vino Absterge medietas; aut saltem cum simplici Vino ita correcta, vel, quod his praesependum, Sy- rum Lactis probè depuratum, praeteritum in febribus, cui etiam commodè de lacte Cistri aliquantulum insillari pos- set, aut loco horum decoctum Tamarindorum cum Pul- veris egregie convenit. Julepia Refrigerantis locum non habent, ubi calor proprius est configurationis xgri, & vel qualitati materiae coequentis &c., multo minus, ubi mi- nor est. In talibus casu facius est, si vis addat, concede- re potum alias confutum: sic quia Vino adfectus, nec in totum interdicendum, quia consuetudini aliquandam, & magnum peccatum foret, ab uno extremo ad aliud proba- bilis. Quod si vis nimis ureat, simulque visus gravior oratur, commodè potui Nitrum, vel simplicem depuratum, vel antimonium addi potest, super quod nil melius desi- derari potest, si autem diachmas quotidie habere sit li- cetur. Si accidat, ut dato Nitro urina cum tanto ardore intermitatur, vel xger liberalius iningat, bono ita animo. In intermittentibus pure ardentibus muendi sunt xgri, ne nimium potum ingurgitent, aut quoties libet. Prae- stat quidem potum liberiorum concedere, modo de in expe- ctare, aique dum sentiant, omnem ex Ventriculo abiisse: si verò xgri sint incedentes in hoc passu, optimum est, ut potum calidum bibant: si enim calidum bibent cum Ni- tro dissoluta, Calor magis resorbetur, & temperatur, a potu autem frigido magis incalcescit, quod videtur, cum ex am- pliatione assumat, & frigidum bibimus: verba sunt L. IN- DANI super Harnemannum: Et imprimis convenit tunc potus impetratus cum spiritu Natri ductis, ut insillat Julepii propinquet tunc insillat ex Floribus cum spiritu Sulphuris acidulatum: &c.

26. *Flor. papaveris.*

Rosae, an. M. S.

Infund. in f. q. vel Dist. Aqua, comm. aut fer. Papav. errat. aut Ser. Lactis depurati: acidulatur leniter cum spiritu Sulph. per campanam: sicut in loco calido ad ex- tractionem Tincturae: Colaturae adde

Syrup. de Julep. 3i.

Volar. 3i.

M. pro Julepo: S.

Julepus Confortans.

Vel

27. *Confero. Aterell.*

Flor. Ros.

Tunic. an. 3i.

Affund. f. q. Decoll. rad. Strazany. cum coram Corvi, vel Aqua, approp., dissolv. in Mortario cum pistillo, vel indantur Cucurbitae clausae ad usum vel alteram ebullitionem: Colectur vel filteretur tepide,

D. S. ut antè.

Vel

28. *Confero. fer. Ros.*

Flor. Ros.

Tunic. an. 3i.

Pist. an. 3i. ad 3i.

Succi Rithum 3iv. ad 3i.

Affund. f. q. Aqua simpliciter vel destillata cujusvis, dis- solvantur in Mortario lapideo cum pistillo, clausoque vase leniter ebulliant.

Colaturae 3i. adde

Tinct. fer. Bellid. q. l. pro grato sapore,

M. D. S.

Julepus Refrigerans.

Ad imitationem HOFFMANNI in Claus. pag. 400.

29. *Rad. Aterell.*

Tamarind. an. 3i.

Coqui. in f. q. Aqua fontana:

Colatura 3i. infundantur

3i. Ros. rubr. cum fer. Nixi dulci feror. M. 3ii.

Sicut in loco tepido: Tincturae colata adde

Syr. Rithum.

Julep. an. 3ii.

D. S.

Julepus Confortans.

Vel

30. *Aqua. Aterell.*

Cichor.

Endiv. an. 3i.

Succ. Cydon. 3i. ad 3ii.

Tinctur. fer. Bellid. 3ii.

Syr. Rithum.

Syr. Volar. q. l.

M. S. ut antè.

Vel

31. *Aq. fontana 3ii.*

Tinct. fer. Bellid. 3ii.

Syrup. Rithum.

Rubi Idai an. uncil.

Spir. Neri q. l.

M. D. S. ut antè.

32. *Aq. fontana 3ii.*

Citronum. unc. 3i.

Succ. Citr. res. unc. 3i.

Spir. Neri parum q. l. pro grato sapore.

Obiter. XXIII. In declinatione paroxysmorum, si sym- ptomata iger, coeperunt leniter: alioquin, nisi beneficio Naturae non erumpat sudor, ante Paroxysmum quantum non provocetur, idque in Tertiana: postmodum apparentibus Colicis signis in fine paroxysmi ceatur, & calidis lin- teis fricanda abluatur, ut et melius fiat. In quarta ante Colicis signa non possunt, nec Arte proficiendi sunt. Quod si ante talia signa sudet quartanosi, equi- dem non opprimendus est, alias graves dolores abdomi- nis infestare solet; de quo vid. BALLONTUS in Bonet's Phars Medica pag. 199. Et sine quolibet specifica mediate sudore febrem profligare solet.

Obiter. XXIV. Frigore febrium quatuorque, earum- que Rigoris, Horroris & Tremoris, omnium optime compe- sciunt Aromatica, praeteritum flos Olei vel Euphrasi forma usurpata: v. g. mirabiliter Frigus, & rigorem curant oleum destillatum Caryophyllorum, Cinnamon, Macis, Baccarum Juniperi, Menthae, &c. externè regioni pre- cordii vel stomachi applicata: Specialissime autem Oleum destillatum Caryophyllorum, & Cinnamon ad guttas 5. vel 6. acutissime penetrant, & sunt fere ponnihli caustica; unde addita reliquis speciebus internè mira faciunt: imò intus assumpta cum appropriatis, quoniam etiam exter- nè ingruente paroxysmo regioni stomachali, Spinae dor- si, & plantis pedum probè inuncta, applicato praecordii latere probè calefacto: vid. SYLVII Praxi lib. 1. cap. 30. §. 142. Oleum Petae quoque prodest contra Rigorem ictericum, cujus guttae aliquot ante paroxysmum propinan- dae: Qui usum ejus internum navesant, externè regioni Sinuathali insillat, Dila Olea sequenti modo praeparantur.

33. *Balsami Peruv. vel Olei destillat. Bacc. Junip.*

Ole. destillat. Caryoph.

Mac.

Succin. an. 3i.

M. D. S.

Balsimum Febre calefaciens Stomachum,

Immagur dicto modo.

34. *Olei expressi Nuc. musch. 3i.*

destillat. Bacc. Junip. 3i.

Caryoph.

Macis an. 3i.

M. pro Balsimo, Praecordii dicto modo inungenda,

S. ut antè.

Vel

35. *Olei expr. Nuc. musch. 3i.*

destillat. Caryoph.

Macis, vel Citronum. an. gutt. xvi.

M. D. S. ut antè.

Vel

36. *Olei expressi Nuc. musch. 3i.*

destillat. Bacc. Junip. 3i.

Enc.

Succini ℞.
M. S. ut antè,
Vel

℞. Olei defill. Bacc. Junip.
Rosimar. an. ℞.
Caryoph. ℞s.
M. D. S.

Oleum Febrile calefaciens.

Inungatur dicto modo; qualis insensio etiam interdum regionis Lumborum, aut plantis Pedum etiam applicari potest; imò etiam later calefactus plantis Pedum applicatus Rigores etiam solet imminuere.

Intra hæc huius Symptomata optime corrigant Salis fixa, Extracta Aromaticæ amara, Extractum Centaurii minoris, Gentianæ cum aliquot guttis Piperis, Olea destillata seris, & quilibet Opuscula hinc Mixtura ex Theriaca cum specifico Strobilbergeri egregia, præstituta in casibus, quando Intermittentes omnem Calorem deponunt, & solo frigore molesti sunt, seu cum Algore hant.

Item

℞. Salis Alstheri ℞.
Mentis perlar. præp. vel Toft. Ofr. præp. ℞s.
Piperis albi pulv. gr. vj. vel gr. viij.

M. pro una doſi, horum una aut duabus ante Paroxyſmum assumenda.

D. S.

Pulvis Febrilis calefaciens.

Sic etiam in Febribus Intermittentibus Chronice, in quibus ordinariè magis Rigor urgetur solet, velius Grana Piperis viij. xij. xv. id. xx. in grossa frustula coccia in haustu cochlearis Aquæ Virgæ simplicis vel infusæ assumit, aliquot horis ante Paroxyſmum, fuscio cum succello imò continuata coram eis, Quartanam quocumq; curant; si autem tendit, aut Paroxyſmum iam insitante assumentur, Ælius gravissimè incenditur. Non igneus adhucenda sunt, ubi solus vel maior Ælius urget; potius verb si Algor adeit juvenem novi 17. annorum, qui 70. grana leviter coctis præuna doſi ante Paroxyſmum assumptis, & Febricemant; aut post aliquot noctes diebus ex haustu Cerevisiæ secundariæ frigoris redierit, Piperis tamen usû continuato se iterum curavit: c. g.

℞. Salis Ammon. ℞.

Piper. albi gr. viij.
M. f. Pulvis: S.

Pulvis Febrilis calefaciens,
Vel

℞. Salis Ammon. ℞.

Piperis albi præſep. pulv. gr. xvj.

M. pro Pulvere; S.

Div. in 3. part. S.

Pulvis febrilis resolvens.

Vel

℞. Salis Ammon. gr. xv.

Caryoph.

Piper. albi an. gr. v.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis febrilis calefaciens.

Vel

℞. Mentis perlar. præp. vel Toft. Ofr. præp. ℞s.

Salis Alsther. gr. xv. ad ℞.

Ol. defillat. Caryoph. gutt. ij.

M. f. Pulvis: S. ut antè,

Vel

℞. Salis Alsther. ℞s.

Cordell. rub. præp.

Toft. Cinchar. præp. an. ℞s.

Ol. defill. Bacc. Junip. gutt. iv.

M. f. Pulvis pro. defillat.

D. S. ut antè.

Vel

℞. Salis Alsther. gr. xv. vel ℞.

Capit. Cæcor. præp. vel Ammon. deſph. ℞s.

Laud. opiat. gr. i.

Ol. defillat. Caryoph. gutt. ij.

M. f. Pulvis: S. ut antè.

Capitur ante Paroxyſmum, inungendo simul dictis Oleis præcordia.

Vel

℞. Arion. deſp. Div.

Eleos. ſim. præp. vel Lap. Cægor. præp. ℞s.

℞s. longi gr. xvj.

M. f. Pulvis:

Dir. in 4. par. equal. S.

Pulvis Febrilis.

Uſurpentur duabus vel tribus horis ante Paroxyſmum.

℞. Tarcari viridat. cyſſall. ℞.

Lapill. Cæcor. præp. ℞s.

Piper. longi gr. xvij.

M. f. Pulvis pro 3. doſibus. S.

Pulvis Febrilis calefaciens & resolvens.

Vel

℞. Spicif. Febril. Cordell. ℞s.

Salis Alsther.

Croc. min. an. ℞s.

Ol. defill. Caryoph. gutt. ij.

M. pro 3. doſibus: S.

Pulvis Febrilis.

Vel

℞. Aqua Card. bened. ℞.

Extract. Gent. cum Spir. Vinifalt. ℞.

Salis Alsther. ℞. vel Spir. Salis Ammon. ℞s.

M. f. Potio. S.

Potio Febrilis pro una vice.

Vel

℞. Aqua Card. bened. ℞. ad ℞s.

Clova. ℞. ad ℞s.

Extract. Gent. ℞. vel ℞s.

Sal. vel Ammon. gr. xv. vel Spir. Sal Ammon. ℞s.

Syr. Card. bened. ℞s. ad ℞s.

M. f. Potio.

D. S. ut antè.

Propinquetur bihoris ante Paroxyſmum, moderatè tegendo Corpus: Frigore magis urgete, ut in Quartanis. Extracta doſis augeri, item cum Extracto Theriacali acupotest: magis vero urgeto Ælius, ut in Tertianis ordinarius, spiciat: talis Ammoniaci aucta doſi permisceatur.

℞. Extract. Alsther. gr. xv. ad ℞.

Salis Alsther. gr. vi. vel ℞.

Ol. defill. Caryoph. gutt. ij.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Febrilis pro una vice.

Capitur ante Paroxyſmum in Rigore, ubi paucus Ælius loquatur regredi calefacient.

℞. Extract. Alsther.

Card. bened. vel Gentian.

Croc. min.

Rad. Imperat.

Theriac. an. gr. v.

Ol. defillat. Caryoph. gutt. ij.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Febrilis.

Capienda imminente Paroxyſmo, una alterave hora ante eundem.

Vel

℞. Extract. Alsther.

Card. bened.

Croc. min.

Theriac. (ratione Opis) an. gr. vad gr. vi

Ol. defillat. Caryoph. (ubi adeit Horror,

alius omittitur) gutt. ij.

F. Pulvis: S. ut antè.

Assumantur in Aqua appropriata ante Paroxyſmum: oil quim magis Rigorem febrilem imminuit, quem Oleum de-

Stillatum Caryophyllorum.

℞. Extract. seu Succi lappif. Croc. min. gr. xv.

Sal; Card. bened. vel alius Salis ℞.

F. Pulvis: S. ut antè.

Vel

℞. Extract. Croc. min.

Gentian.

Erdear. an. gr. vi. vel viij.

M. f. Pulvis.

Quibus etiam addi poceſt Laud. opiat. gr. i.

Id. S. ut antè.

Vel

℞. Extract. Alsther.

Gentian. an. gr. viij.

Theriacal. gr. v.

Salis Croc. min. ℞.

Olei defill. Bacc. Junip. vel Rosimar. gutt. ij.

M. f. Pulvis: S. ut antè.

Vel

℞. Extract. Alsther.

Card. bened.

Croc. min. an. gr. vj.

Myrrh. sloſſ. gr. ij.

Laud. opiat. gr. i.

M. f. Pulvis: S. ut antè.

Com-

Commode etiam hifce Febrilius Extrañis *Extrahitur* *Abundat* gr. ij. ad gr. liij. tam pro alterandi, quam pro lazandi scopo addi poffunt; utut fub debita diaphorefi levior laztatio accideret folet.

Obfervat. XXV. Ad Febrim Intermittemtem ardentem, permittit praxmittenda, nil melius eñt, quam *Sal ammoniacum*, vel *felitarium* *dyf* *3j.* ad *3j.* ante Paroxyfimum ufurpatum:

℞. Salis ammon. 3j. ad 3j.

Antidoti. Pteriti 3j. ad gr. xli.

M. f. Pulvis ufurpandus ante Paroxyfimum; 3.

Pulvis Refrigerans.

Vel

℞. Salis ammon. 3j.

Corall. rub. prep.

Antidoti. Poteri an. gr. vii.

M. S.

Pulvis Mitigans.

Certe nil magis *Æthum* Febrim Intermittemtem mitigat, quam *Sal ammoniacum*, aut ejus fpiritus urinoſus, & hinc etiam Arcanum duplicatum. Aliis aliquot Febres ordinario modo affligentes proſigavit:

℞. Salis ammon. 3j. ad 3j.

Corall. rub. prep. vel Lap. Caner. prep. 3j. ad gr. xv.

Olei deſtillat. Bacc. Jaq.

Mas. an. gutt. i.

M. f. Pulvis ante Paroxyfimum propinandus; 3.

Pulvis Febrilis.

Obfervat. XXVI. Poſt Rigorem ſubinde ſupervenientio jam *Æthum*, *Ægri* conſequentur de *infigni* Virum proſtratione, tum *Aspiratione* anhelu celari, frequentu & parvo, & graviffimo *Æthum* interu, aut quod contactum eternum nimia afluare ſolent. Talibus in *Æthum* Paroxyfimi vel fpiritus ſalis Ammoniaci quocunque modo propinatus, vel *Mithra* cum Aceto & Lapiſſis Cancroſum ſupra inſinuata, bono cum ſuccellu propinatur.

Obſervat. XXVII. In Paroxyfimi Febrim Intermittemtem ſubinde graves *Cardialgia*, *Stomachi roſus*, *Præcordium anguſtia*, *Suffocatio imminens*, *Fames nimia*, *ſimiliæque nimis aſoleſia* Symptomata, *Inquietudinem*, *anxiſtatem*, & *inſignem corporis ſtigmationem* intercata, ad ſunt; idque imprimis in Hypochondriaca, Hyſterica & Scorbutica. Curatur beneficio ſpiritus ſalis Ammoniaci vel ſimplicis vel oleoſi ſaſti; vel exteru per Linimenta, vel Emplaſtra ex Tacamahaca, vel ſola, vel cum Landano *Craſſima* miſta, cum Oleo quodam deſtillato ſubſtitu, nempe *Aneli*, vel *Succini*, vel *Meuthe*, vel *Balfamo Peruviano*, reg.ñi *ſtomachi applicata*; ſcilicet enim compedunt, praxmittendo ſimul vel Vomitorio pro circumpreſtantiam ratiore, vel applicando Clyſmata.

Obſervat. XXVIII. Notitia digna eñt BALLONII locus in *Beneti Pharo Medicorum* pag. 173. *Puella Febre Terſiana jam menſem laboranti, ante Paroxyfimos dextri Hypochondrii & Cruris dolores, Calore extenſo quieſcebat: quid hoc rei? niſi Purgatiſſima anteverſus, hoc miſerum Alſiſum.*

Obſervat. XXIX. In Cura Quartanarum, uti & quorumcunque Morboſum Chronicoſum, Medicus teneat Hypochondria, an adſit Tumor aut durities, Scirrhus capſulam Abdominis Viſceris, Hepatis, Lienis, aut etiam Melencoterii in ſpecie inveterata ſi fuerit. In tali caſu ordinario Scabiles ſupervenit. Querat etiam, an adſit Scorbutus? an multi adſint Flaſti? ut certus fiat de Malo Hypochondriaco: & Intermiſſionis die his Tumoribus maturu occurrat; niſi enim curantur, vix ſolent Febres curari, vel reſolvant. Item an Viſcera reliqua, imprimis Pulmones, ſint ſalva? Facio hoc, tunc demum Inſtituat Prognofim & Curam.

Obſervat. XXX. In Quartana contumaci locum habent *Acidula*, ſed Ventrículo & Viſcera ſunt robuſta, ſeu in optimo tono conſtituta; aliis enim nimis debilitantur *Ægri*, quod in omnibus Acidula obſervandum. Quod ſi nimis debiles ſint Patientes, conveniunt potiùs Remedia tartalia Arte præparata, ut etiam Acidula Artificialia; de quibus videb. GABELCHOVERUM *Craſſur*, & *tartar*. I. ſicuti etiam in Hypochondriacis, Scorbuticis, pleuriticis, Hyſtericis &c. Febre Intermittemte laborantibus, Martialis ante Paroxyfimum ſane uſuſſicima; e. g.

℞. Effusi. Alſiſti 3j.

Solus. Martis cum Sate. Prem. 3j.

M. S.

Tinctura Aperiens; ꝑe. gura.

Obſervavi ego Quartanam Chronica ſimulata Martialis præparata ante Paroxyfimum ſumpta ſola ſaſſe co-

ratam. Mulier juvenca ſterilis, hypochondriaca, & ſplenetica, ratione hereditariæ maternæ Quartanarum, cum inſigni dolore Splenis in Hypochondrio dextro, quociens frigigus ngeret, etiam urgebat dolor, & quod intenſius frigus, eò intenſior dolor, & contra. Proxiſſimo Vomitu ſibi capere die Intermiſſionis Induram Tartari ſimplicem cum Elſtri Proprietatis ſine aceto à gutt. 50. bis in die; Nam alia amara Febrifuga quælibet fugiebat; Interdu etiam Interſuſſionis die, qui Paroxyfimi diem præcedebat, capiebat Pulverem, ex *Salis Ammon*, gr. xv. *Pulv. Jalappæ 3j.* Miſc. Sed hætuſſima omnia ſine levamine. Precedente morbo necelle erat, ut toto die Paroxyfimi, circa quartam ſiletem pomeridianam repetentis, jejunia maneret; aliis vomitus, præcordium anxietates, graviores dolores & rigores potiebat. Hinc ad imitationem Obſervatorum quartandam RIVERII, ipſa hypochondriaca & durioris alvi exiſſente.

℞. Fel. Senn. ſine ſp. 3vj.

Salis Tartari 3j.

Infunde in l. q. Aquæ comm.

Stent in loco tepido per noctem; Mande

℞. Celſura 3j.

adde

Opint. Effusi. Cinnamon. 3j.

M. D. S.

Potio Lavativa pro una vice.

Capiebat omni mane haſtuſum, unde aliquoties viſſena evacuabat, idque ſaltem Intermiſſionis diebus; etenim die Paroxyfimi propter ſupra enarrata Symptomata nihil tentare poterat: Sed cum Splenia vitia, Scirrbum, ſimiliæque mala metuerem, ob id ordinavi:

℞. Solus. Martis cum Sate. Prem. 3j.

Capiebat omni mane gutt. 30. a quod cum etiam die Paroxyfimi faceret, commode admodum cum pauco Splenis dolore habuit, ſed continuo licet Remediis aliis idem levamen continuare noluit, propterea:

℞. Liq. Martis Salar. 3j.

Dabantur 30. guttæ omni mane: bene contulſe, alvum apertam ſervavit, interpoluit ſubinde haſtuſum ſuperioris Inſuſi Sennati: ſed Febris conſtans permansit, quoniam ex cauſis aliis ſupervenientibus ſimplex Quartana ſaſta fuit triplex. Unde cum leniter trahenda eſſet, ipſa à Medicamentis abhorrente, dedi die, quo primarius urgebat Paroxyſimus.

℞. Salis Ammon. 3j.

Pulv. Epilap. antimonial. gr. ij.

Misc. pro Pulvere.

Cepit mande, vomuit aliquoties, & per alvum egreſſit.

℞. Corall. rub. prep. 3j.

Pulv. Epilap. antimonial. gr. ij.

M. pro Pulvere.

Cepit velperi hibiore ante Paroxyſimum, quem via perſenſit. Sequenti die hunc Pulverem iterum bis cepit, & nunquam vomitus ſecutus fuit, potius ſomolenta admodum evaſit. Tertio die pro tertio Paroxyſimo eodem Pulvere, ſed dimidiata tanquid doſi, accepit; unde Paroxyfimi omnes tres evaſerunt, qui etiam per ſea ſuccellive dies penitus non redierunt, ipſa integra omni nocte proſuſſe dormientes, ſed ſimul laſtitudinem inſignem membrorum omnium percipiente; propterea res mihi ſuſpecta viſa ſunt vi anodyna antimoniali non extirpante, ſed palliante Febrim; quod etiam eveniſſe docuit. Nam ex improvifio ſtaſi die ſtaſeque hora primarius Paroxyſimus cum vomitu, tuſſi & aſthmate convulſivo, ac repetentibus ſubinde epilepticis convulſionibus redit, quem etiam ordine caſteri inſecuti fuerunt: Hinc

℞. Ol. Tartari per diſtillationem 3j.

Capiebat a. guttas mane & velperi, tritioris autè Paroxyſimum. Item

℞. Fel. Senn. ſine ſp. 3j.

Rad. Solſol. nig. ſine prep. 3j.

Effusi cum prep. 3j.

Salis Tartari 3j.

Infund. in aquæ ſtrem. ſtenc in loco tepido per noctem; mande

℞. Celſura 3j.

De hac hibiota ſane bonum haſtuſum, velperi vèd Oleum Tartari, & ſita æternis vicibus continuando, Paroxyfimi brevi poſt evaſerunt, ſaltem primario illo adhuc nonnulli affligente; pro quo proſigando

℞. Extralli Gent. 3j.

Corall. rub. 3j.

Cum l. q. Ol. deſtill. Caryoph. & Pilulæ:

Quas

Quas cepit in vehiculo Rob Sambuci tribus horis ante Paroxysmum, qui non redit, continuavit sic adhuc 2. vicibus, die Intermissionis Oleum Tartari per deliquium bis aliquando assumendo, & ita convalescit.

In hoc Casu observandum:

1. Confusio Splenis cum Febre, dolore isto sub frigore urgente, revera splenetico exilente, simpliciter convalescit.
2. Martialis non solum Splenis vitio conducere, sed etiam impetum Paroxysmorum febrilium notabiliter reterere.
3. Anodyna quilibet pro radicali Febrium Cura nihil conferre, altum Spirituum impetum & notum Naturae cohibendo, Morbum palliare, quod, postmodum ab intensiori impetu resurgunt; unde etiam cum epileptica Convulsionibus educant Paroxysmi.
4. Lassitudinem post cessantes Febres Intermissiones superbitem, vel Recidivam, vel Cachexiam, interdum etiam Anasarcam, minari.
5. Chinchinam non propinavi; In splenetica enim hac maximeper necessitas, ligando Acidum febrile, concentrando etiam pariter Acidum in Spece peccans, adeoque viscetis huius Scirrhum, & hinc continuum agritudinem inducit.

Observat. XXX. & ultima. In Febris Chronicis, ac diuturnis Intermittentibus, ac in specie in Quartanis, difficultas licet Morbo, dñ Paroxysmi Typum Agrippati observare, & praesentem ordinari Dietam & Abstinentia Recidivam declinare; vid. BARTHOLINI *Acta Med. Hassiae* pag. 104. r. pag. 191. Nam interdum etiam post aliquot febres recedunt, & quidem graviore Paroxysmo. Non mox ergo desistamus à Febriliis, quae optima sunt praemissis Universalibus, ut Spiritus Salis Ammoniaci, Sal volatile Cornu Cervi, Sal volatile Viperae, & Succioi. Hinc & similes Cautele, si bene observentur, nunquam errent aliquem observabilis in Cura, sed satis eam reddere faciem atque securam. Quod si verbò illegitimè de vitio curantur, atque Paroxysmi impediuntur, seu Febris supprimitur, id quod fit, quando haec aut similibus obtundunt Permentum febrile, & in suo fomite quasi conceptatur, sanguinis fermentatio febrilis impeditur, & debita eisdem Targescientia suffumitur; unde quidem Paroxysmi cessant, & multa prava inequi solent Symptomata. Sane nil est, quod nocentius possit contingere Aegro, quam ista Paroxysmorum inhibito, quatenus materia illa vitiosa cum fermento concentrato mediante sanguine emulata, circulata & in Targescientia fermentativa impedita, hinc inde tandem affusa haeret & gravia infert Symptomata. Viscera reddit laetitia, imprimis infarci Lienem & Hepar, Colicis passiones infert atroces, Tumores pedum oedematosis, Altitudo & Tufles, Cachexiam, & insubie Hydrogen, insiduosum Attuum, idcirco difficulter curabiles, Cephalalgia diuturna, Febres Continuas lentas tanquam Hecticas, & familia Symptomata. Exempla nonnulla imprimis videb. in GABELCHOVERO *Casus* 1. *Curas* 43. item *Critica* 6. *Curas* 109. 110. 111. 112. & sequent. item M.A.N.C. *Ann.* 3. *Obs.* 89. pag. 149. ubi Tertianae pro Amuletum curata in gravem Patiemem Colicam & hinc illuc degeneravit. (A)

Facta est saepius mentio *Febris Intermitterum Intermittentium*, quae via utilis cedant Remediis, & sunt contaminatissimae, nec aliquid in illis praestari potest, unde saepius subinde recidivant Febres. Retulit D. MICHAELIS, quandam quinquies Recidivam passum fuisse ob Scorbutum febrile junctum, qui curato Febris plane cessavit. Talibus in Febris necesse est, ut Medicum aliis cum Remediis

febrilibus crebrius Specifica antifebrilia propinet, tam die Intermissionis, quam ante Paroxysmum permittit cum Specificis, si enim hoc non fiet, incassum laborabit. Emper in his Calibus imprimis Spiritus Cochlearum cum Spiritu Salis Ammoniaci, vel similia. Inter hac praestantissimum Remedium est Arcanum duplicatum Myrsinæ ad ℥i. vel solium, vel cum Lapidibus preparatis Cancrorum ℥ss. ante Paroxysmum, vel repetitum subinde die Intermissionis, & egregie confert; & similia aliis faciat; item Spiritus Cochlearum cum Spiritu Salis Ammoniaci ante Paroxysmum propinetur hoc modo:

℥i. *Aqu. Antifebris. Dancerellii* vel *Quercetani* ℥i. ad ℥ss.

Spir. Salis Ammon. dr. ℥. (plus minus, prout fortis vel debilis est)

Cochlearia ℥i. (in Officina admodum debilis: alias ritè preparati vix gutt. x. possunt propinari.)

Laud. opiat. gr. i. vel ij.

Syrup. Scalyph. Ferri dr. ij.

M. D. S.

Potio Febrilis Scorbutica pro una vice.

Praemissis Universalibus ante Paroxysmum propinetur, valde prodest.

Vel cum Spiritu Salis Ammoniaci eleganter permiscetur Arcanum duplicatum Myrsinæ in forma liquida: v. g.

℥i. *Aqu. Card. bened.*

Flor. Sambuci an. unc. ij.

Spir. Cochlear. dr. ij.

Salis Ammon. dr. ij.

Arcan. dupl. Myrsinæ ℥i.

Corall. rub. prap. gr. xv.

Syrup. Scalyph. Ferri unc. j.

M. S.

Mistura Febrilis Scorbutica, bene circumagitanda.

Vel

℥i. *Aqu. Menthae,*

Scorbut. Dancerellii an. unc. j.

Spir. Cochlear. dr. j.

Arcan. dupl. dr. ℥. vel ℥i.

Mag. Corall. cum Succo Citri ℥i.

Syrup. Scalyph. unc. ij. vel unc. j.

M. pro 2. dosibus ante Paroxysmum.

D. S. ut antè.

Convinit item Mistura hæc, quam in Tertiana Scorbutica continus probatam habeo:

℥i. *Aqu. Pebrif.*

Antifebris. an. unc. j. vel unc. ij.

Spir. Cochlear.

Salis Ammon. dr. j.

Mori vitralarii Myrsinæ

Lapill. Cancr. prap. vel Anim. diaph. martial.

an. ℥i. ad dr. ℥.

Laud. opiat. gr. iii.

Syrup. Scalyph. Ferri dr. vj. vel unc. j.

M. f. *Potio*, pro aliquot dosibus; S.

Mistura Febrilis.

Capiatur in Febre Intermittente Scorbutica continus, ut infringatur malitia Scorbuti & Febris. Vel

℥i. *Aqu. Pebrif.*

Antifebris. an. unc. ij.

Spir. Cochlear.

Salis Ammon. an. dr. j.

Orul. Cancr. prap.

Spicil. febril. Stralsburgensi an. ℥i.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr-

(R) Mentium hoc Authoris, in citis quàm par est cohibentur Specificorum Antifebrilium usu febrilis Paroxysmi, tamquàm quod Practico receptum est: ita non fieri in Intermittentibus praeter Febrem Curatam, aut secundam hebdomadam, & mensis praemissis Universalibus, & in specie Purgantibus, ausu ad Specifica confugere: id quidem rati, inemptive horum remedium non esse, sed Permentum febrile, adeoque vel ferociorem Recidivam inde erri, vel Aegrum in eam Viserum lahem necessitate incutere, ut Cachexia, Obstructiones, Hydropi, si fieri periculosis interius abessent, abmaxime evadit. Verum fortasse haud solido argumentis, nec infrequenter experientiarum robore sussistit, dissuadent ii, qui maturius quam fieri possit, ad Specifica febrilia devolvunt, ut Paroxysmi, quatenus cohibiti, æger à Febre liberetur. Tamen enim abest ut praecoci Antifebrilium usu fiat, ad ægri moram vel Recidivam aut alterius Morbi periculum, Permentum febrile, maxime vires acquiescent, quod patet hoc à Febrifugis maxime & iterati exhibitis inter & ignavos redditur, ægros ad novos excruciantes Paroxysmos praesens impetum. Quod si omnia tamdiu Medici securus negligat, majorem vim dato tempore adipiscitur, ac non solum major & ferier Sanguini & Corporis Organum in dies infligitur labor, ac dissiliet semper reddatur Febris extraneo: sed etiam à labefactis Sanguini & Visceribus nova immedicabilium nonnumquam Morborum progenies propulset. Utinam ergo, si hac vera sent, prima statim occasione, Intermittentis Febris Paroxysmum dignoscere possumus; hoc enim casibile, nec secundum expellentes; ad Antifebrilia maxime ægrius emulantes maxime adverteremus.

Syrapi Sceleris, ferri 3i.

M. S.

Mistura pro aliquo vicibus.

Item in Febribus Scorbaticis abique Frigore invadente, cum summo Ardore, extremorum laceratione, cum angustis Precordiorum & anarctibus cum flatibus conatibus, cum fructu præscripti hanc Potiunculam subinde habendam, ubi ad omnia respiciunt Symptomata:

*℞. Aqu. Mentha,**Jeniculi,**Fumar.**Carmineat. an. 3i.**Spir. Cochlear.**Itheriac. f. an. 3i.**Miri doli. gutt. xij.**Lapill. Cancr. præp. 3℞.**Laud. spirit. gr. 1℞.**Syrap. Corri. Aurant. 3vj.*

M. D. S.

Potio Febrilis Scorbatica.

Detur cochleatim in ipso Paroxysmo: valde prodest.

In Tertiana Scorbatica Gravidæ nono mense, cuius Paroxysmi cum graviore virium prostratione invadebant, sine ullo Frigore, cum Calore, & etiam sine Sudore terminabantur,

*℞. Aqu. febrifug. 3i.**Arti. sambucini**℞. simpl. an. 3i℞.**Spir. Cochlear. 3i.**Lap. Cancr. præp. 3℞.**Antimoni diaph. gr. xv.**Succ. Cydon.**Syrap. Acori. Citri an. 3i℞.*

M. pro aliquot dolibus.

Superiore Hyeme in Quartana Scorbatica atrocissima, cum Tussi, & hinc metu Phthisicos, hæc Potio admodum profuit in Paroxysmo assumpta, præmissio semper ante paroxysmum Clystere ex Lactis.

*℞. Aqu. Mentha,**Card. bened.**Charesol. an. 3i.**Spir. Cochlear. 3i.**Salis Ammon. 3i.**Lapill. Cancr. præp.**Arcan. dupl. an. 3℞.**Antisept. Poterii 3i.**Sacchar. Saturni gr. v℞.**Syrap. de Succo Gran. acid. 3i.*

M. l. Poena.

D. S.

Mistura singularis.

Quæ subinde hærebatur pro aliquot diebus: continuatur simul Spiritus Antiquarius: Tandem sequentia profuerunt:

*℞. Salis Abster. 3i.**Ocul. Cancr. præp. 3℞.*

M.

Div. in 4. partes.

Capiebat singulis diebus binas doses.

*℞. Aqu. Borrag.**Meliss.**Antisept. an. 3i.**Miri simpl. 3i℞.**Syrap. Rub. idæi 3i.*

M. D. S.

Mistura Febrilis Scorbatica.

Cochleatim assumatur die Intermissionis,

Vel

*℞. Elixir. febril. Myoficki,**Spir. Cochlear. an. 3i℞.*

M. D. S.

Elixir Febrile Scorbaticum.

Capiantur gutt. xl. bis in die Intermissionis,

Vel

*℞. Elixir. febril. vel Propriet.**Spir. Cochlear. an. 3i.*

M. D. S.

Mistura Febrilis Scorbatica guttatim sumenda.

Dosis à guttis 20. ad 30. valde prodest diebus Intermissionis.

*℞. Lig. Terre sol. Tartari 3i℞.**Spir. Cochlear. 3℞.*

M. S.

Essentia Febrilis Scorbatica, ad 20. guttas.

Vel

*℞. Spir. Salis Ammon. 3i℞. vel 3i℞.**Cochlear. 3i.*

M. S.

Spiritus febrilis resoluens: 30. gutt. pro una dosi.

Alias etiam Antisepticum Poterii (de quo supra, ubi de Hæmorrhia) cum Magisterio Coralliorum cum Succo Citri (reliqua Magisteria sunt nullius pretii) an. 3℞. & Arcani dupl. Myoficki 3℞. ad 3℞. & pro una vel duabus dosibus ante Paroxysmum usurpata, in Febribus Scorbaticis sunt egregia.

Vel

*℞. Arcan. dupl. 3i.**Salis Abster.**Lap. Cancr. præp. 3℞.**M. l. Pulvis. S.*

Pulvis febrilis Scorbaticus.

Propinatur in Tertiana Scorbatica, ubi Albus intensior aliquoties repetatur, donec Febris cesset.

Vel

*℞. Arcan. dupl. Myoficki**Mag. Corall. cum Succ. Citri an. 3℞.**Sal. volat. Cornu Cervi, vel Viperæ. gr. vi.**M. l. Pulvis.*

D. S.

Pulvis febrilis Scorbaticus,

Capitur in vehiculo sequenti.

*℞. Aqu. febrif. 3i℞.**Antisept. Doracellii an. 3℞.**Spir. Cochlear.**Salis Ammon. an. 3i.**Laud. spirit. gr. i.**Syr. febrifug. Ferri 3℞.*

M. S.

Aqua ad Pulverem.

In hoc ipso tanquam in vehiculo, capitur iste Pulvis, atque durante Paroxysmo, antea semper post Rigorem subinde de eodem capitur.

Serum Lactis, in specie Capilli, est Potus imprimis conveniens, dum talium febrium admodum urget ætus & Sitis, vel solum, vel imprimis cum Cero acidulatum nam & hic in Scorbato est egregius: Vel & affundatur Herbe Cochlearis & Nasturtii cum Pomo Citreo in calculeas inclis, & exprimitur pro Potu in Paroxysmo.

Vel

℞. Herb. Fumar. M. li.

Macera per noctem in Sero Lactis caprilli q. l.

Colatura bibatur.

*Succ. Pomer. Borsd. 3i℞.**Sacch. parum.*

M. S.

Potio Alterativa.

Haustur extra Paroxysmum.

Decodum etiam Tamarindorum ad dictas febres, sub forma Julapii usurpatum, est egregium, simul Alvum obstruam, quæ sæpius in Scorbato solet observari, blandè laxat, prætereaque Crasin Massæ Sanguineæ vitiosam temperat: v. gr.

℞. Tamarind. 3℞.

Coqu. in l. q. Sero Lactis

Colatura bibet.

*Tinctura Flor. Bellid. 3i℞.**Syrapi Refecti solut. vel Vinol. q. l. pro gratia fa-*

poris.

M. D. pro Julapii febrili laxativo, durante æstu.

D. S.

Julepus Aperiens.

Vid. MORELLUS de Mater. Medica. pag. 93. Vel

℞. Decodi Rafani min. in Sero Lact. depur. 3i℞.

adde

*Succ. Cochlear. præ refect. depur. 3i℞.**Citr. ros. 3i.**M. l. Julap. S.*

Julepus febrilis Scorbaticus,

Vel

*℞. Sero Lactis depur. 3i℞.**Decodi Tamarind. 3℞.**Succ. Citr. ros. 3i℞. vel 3i℞. ad 3i℞.**Syr. ex Sero Citri 3i℞. vel q. l.**M. l. Julap. S.*

Julepus Refrigerans & Laxativus.

Vel

℞. De-

M. Dorell. Scordium cum vino Carvi B. 3.

Tamarind. 3ij.

Tinctura Flor. Bellid. dr. iij.

Spiritus Ferri Philof. q. l.

M. D. 3. ut autē.

NA. Pocus Lactis in febribus Scorbuticis valde convenit, si aliquantulum Sacchari, vel spiritus salis Ammoniaci addatur: quotidie assumitur, mane dimidia mensura, *ala Med.* v. g. si Panxyismus est à meridie; si cessat antecodnam, in citra comedenda est *Fructus Mith.*

Ægyptii referente PROSPERO ALPINO lib. 10. de *Medic. Ægypt.* cap. 15. Potum quandam ex fermento & Aqua Rosarum parant, pro febrim, in specie Tertianam, Cura.

Alii, ut Silefii, Paloni, & quidam populi vicini, ex Branca urina & fermento Potam conficiunt, & *Barsib* appellant: Quod sanè Potus geoni non incommodum in febribus ferventioribus videtur: Decoctum faciat ex herba Sina, ut Decoctum colore flavum retineat, non paucum: Decodo fermentum addnet, & in loco tepido aliquot dies fermentari permittunt: Vid. KERGERUS de fermentatione *sect. 3. cap. 1. pag. 183.*

Ex supra dictis patet: quod in Cura Febrium Intermittentium, mos in Principio, præmissio uno vel altero Digestivi, *Pumaria* ante Paroxyfimum, aut die Intermiffionis blanda *Lanatus* propinanda: postea Intermiffionis diebus *Alvum* volatilis, vel Martialis, pro ratione urgentium Symptomatum: Paroxyfimi vero tempore Remedia hementati vi Acidis delictiva, & c. ut vocat, *Fructus Mith.* primatum obinet. Unde Remedia Alcaline prolapie tam volatilia quam fixa, & his cognata Acidia quocunque modo delincentia, ex omnibus tribus Regna ad Curam febrium Intermittentium adhiberi possunt. Hinc ratione Alkali volatilis plus minus, ut oleof, conveniunt Veterum *Simplicia Febrifuga Vegetabilia*, vet. *q. parvis Americanis*, plus minus Aromaticis, qualia in specie sunt Abinthium, Cardus benedictus, Centaurium minus, Chamomilla, Tertianaria (huius enim Decodo tam Intermiffionis die, quam ante Paroxyfimum propinato, Tertiana fuit curata: Vid. TABERNÆMONTANUS (S) Ulmaria, cuius Decodum, item Aqua destillata insigniet commendatur in Tertianis diuturnis, Taraxacum, seu Dens Leonis, quod est egregium; *Pumaria*, quæ etiam convenit in febribus Scorbuticis, & hinc Quartanis; Nallurtium, cuius Succus cum Vini albi 3ij. adhibitus Quartanam certè curat, modo in lecto Paroxyfimum iolentem expectet *Æger*, sudorem moveat, & purget. Convenit etiam Radix *Pinzacii*, Taraxaci, Chelidonii majoris, Gentiane, Zedoarie, quæ reverà præmissis præmittendis optima sunt.

Ufus horum est nunc in substantia sub forma Pulveris, nunc in Decodo amarissimo, nunc in Sacco recens expresso, nunc in Extracto, nunc, sique optimus, in sale fixo. In substantia Flores Centaurii minoris ad dr. i. pulverisati adhibiti insigniet commendatur ad erandas febres, quæ ratione THONERUS curavit Tertianam duplicem admodum refractariam, præmissis Universalibus, per Pulverem Herbe Centaurii minoris ad dr. i. in hulla Vini per 3. dies propinanda; Sudorem enim movet. Pertinet huc & Pulvis Cardui benedicti & c. Decopendi modum dicta Vegetabilia Febrifuga ostendit imprimis RULANDUS *Triflor. Trall.* quæ Decoda mediane vehementi Sudore quovis febres Intermittentes tollunt, modo, ut sapius monui, præmissa fuerint Universalia: v. g.

M. Flor. Cent. min. M. 3.

Rad. Aperi M. 3.

(nam Alurum in Aqua coctum omnem vim vomitatoriam amittit)

Copa. in C. q. Agn. simpl.

Huius Decodi calente Virge quotidie in lecto bene tota haust B. 3. & die multumque sudavit, quæ ad certum tempus continuato, à diuturna chronicaque febre curata fuit.

Porro

M. Herb. Card. bened. M. 3. vel ij.

Tom. II.

(S) Quam Tertianam vocat Tabernæmontanus, qd Castida palustris, vulgaris, flore caruleo, Tournef. Inst. 111. seu *Lysimachia carulea galeculata*, vel *Gratiola carulea*, C. B. Pin. 146. Descripserunt habet apud Joh. Bauhinum Hist. Plant. tr. 3. 431. sub nomine Tertianæ, alii *Lysimachia galeculata*.

(T) Cortex *Perruvianus*, quem Quin quoniam vel Cinchichum vulgo vocant, hanc præstantius & efficacius pro Febrium Intermittentium curatione, imò in universa Medicina habetur remedium, quicquid dicunt Medici quidem jurati illius: habet. De eo, pro & contra, in numeri conscripti sunt Tractatus, inter quos præcipui legi meretur Francisci Torti Therapeuti.

Rad. Aperi M. 3. vel 3ij.

Infund. per noctem in B. iv. Aqua, post decoqu. lento igne ad tertias.

Huius Decodi *Æger* omni mane jejunus in lecto atqde coopertus bibat unc. iij. vel iv. calide: accipiat semper 6. horis ante Paroxyfimum, & multum sudet, donec febriis repetito huius vis omnino evanescat.

Et certè huiusmodi Decoda ex paucissimis Ingredientibus præterenda longe Decodis Magistralibus, quæ ex mille speciebus combinari sunt composita: hinc vel sola Herba Centaurii minoris optimum est ad Intermittentes remedium, si ante Paroxyfimum adhibetur. HELMONTIUS tardarum febrium Medicamentum optimum vocat Alurum in Aqua decoctum: movet Urinam.

Alias etiam Chamamelon, ejus Decodum, item Aqua decocta ex ejusdem succo ad aliquot uncias adhibita, à multis insigniter commendatur ante Paroxyfimum.

In Succo ultrapantur v. g.

M. Sina, express. Abinth. ros. 3ij. ad 3ij. vel 3ij.

Accipitur in hulla Vini Abinthii aliquot horis ante Paroxyfimum & hoc aliquoties, & evanescit febriis.

Io Extractis usurpant dicta Vegetabilia Febrifuga sub forma Pilularum scum enim sint insigniter amara, ut tollatur amaritas, cum spiritu Vioi paratur Extractum. Talia Extracta sunt Cardui benedicti, Centaurii minoris, Theriacale, & quæ sunt alia, ex quibus faciantur Pilule, quorum Formulæ ex supra dictis patet. Capiantur immixte Paroxyfimo una alterave hora ante eundem. Usurpantur etiam hæc Extracta in forma liquida: nam Effluvia & Extracta differunt tantum ratione consistencie, recipiendo semper Effluvia Abinthii, Centaurii minoris, Cardui benedicti, Myrrhæ, & similes, crebrius, tam die Intermiffionis, quam ad dr. i. usque ad dr. ij. ante Paroxyfimum in vehiculo appropriato. Modum parandi præsuppono ex ANGELO SALA. Ad istas Effluvia ex Vegetabilibus Febrifugis paratis pertinet etiam *Elixir Febriis De. Dorellæ Michaelis*, cuius hæc descriptio:

M. Sina, Cent. min.

Abinth. ana M. iij.

Herb. Aperi. M. iij.

Fol. Aperi ana M. iij.

Herb. Pentaphyll.

Marrubii.

Ruta.

Cardui bened.

Scordii ana M. i.

Sinapis. Hyssop. 36.

Rad. Chelidon. maj.

Taraxaci.

Angelice.

Zedoar.

Centaurii.

Imperatorij.

Distammi albi.

Morsus Diaboli.

Pillulæ.

Abinth. ros. ana 3ij.

Caryoph. 3.

Pip. longi 3vi.

Zingib. 36.

Extrahatur cum spiritu abinthii, card. bened. & cent. min. & addatur Extractum febrile.

Dosis est à guttis 40. ad 50. die Intermiffionis ad alterandam viciosa Massâ Sanguinis Crasæ.

Loco talium Vegetabilium longè utilior est spiritus salis Ammoniaci, cui non cadunt ista Fina ex istis febrifugis parata. Pertinet etiam ad hæc Vegetabilia *china china seu cortex Peruvianus antipetivus*, seu *Sesquinarum* 1 Vid. Da. AMMANI *diffus.* Est cortex aromaticus, saporis acerrimi fere insular Cinnamonum, & deservit ex provinciâ Peruviana: Vocatur à quibusdam *Osmia India*. Genussum usurpandi modum vid. in BARTHOLINI *cent. v. 1189. anat.* 50. item in SYDENHAM *de Morbis acutis & Epidem. p. 98. sect. 1. a. 3. D. MONGINO Tr. de cura febrium pro viciosa ching (T). Datur à*

M m

3i. ad

Syrapi Stolemyrb. Ferri $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

M. S.

Mistura pro aliquot vicibus.

Item in Febribus Scorbuticis abique Frigore invadente, cum summo Ardore, extremorum lincatione, cum angustis Præcordiorum & anxiatibus cum flatibus convulsionis, cum fructu præscripti hanc Potius oculum subinde habiendam, ubi ad omnia respiciet Symptomata:

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Agu. Mencha*,*Tenaculi*,*Fumur.**Carminat.* an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Spir. Cucklear.**Theriac. f. an.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Niri dale.* gutt. $\mathfrak{x}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.*Lapill. Cancr. præp.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Laud. opim. gr. lb.**Syrup. Coric. Acorat.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

M. D. S.

Potio Febrilis Scorbutica.

Detur cochleatim in ipso Paroxysmo: valde prodest.

In Tertiana Scorbutica Gravidæ nono mense, cujus Paroxysmi cum graviore virium prostratione invadebant, sine ullo Frigore, cum Calore, & etiam sine Sudore terminabantur.

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Agu. febrifug.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Actifimbicini**Mixt. simpl.* an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.*Spir. Cucklear.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Lap. Cancr. præp.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Antimonii diaph. gr. xv.**Succ. Cydon.**Syrup. Acorif. Citri an.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.*M. pro aliquot doibus.*

Superiore Hyeme in Quartana Scorbutica atrocissima, cum Tussi, & hinc metu Phædus, hæc Potio admodum profuit in Paroxysmo assumpta, præmissa semper ante paroxysmum Clystere ex Lacte:

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Agu. Mencha*,*Cark. leuod.**Charfol.* an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Spir. Cucklear.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Salis Ammon.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Lapill. Cancr. præp.**Arcan. dupl. an.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Antibell. Petrii* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Sacchar. Saterni gr. vj.**Syrup. de Succo Gran. acid.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*M. f. Pein.*

D. S.

Mistura singularis.

Quæ subinde haurebatur pro aliquot doibus: continuabatur simul Spiritus Antiquarius: Tandem sequentia profuerunt:

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Salis Albinth.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Ocul. Cancr. præp.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

M.

Div. in 4. partes.

Capiebat singulis diebus hinc doses.

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Agu. Borræg.**Mellif.**Anticorb. an.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Mixt. simpl.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.*Syrup. Rub. idal.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

M. D. S.

Mistura Febrilis Scorbutica.

Cochleatim assumatur die Intermissionis.

Vel

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Elisir. febril. Myrsinith.**Spir. Cucklear.* an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

M. D. S.

Elisir Febrile Scorbuticum.

Capiantur gutt. xl. bis in die Intermissionis.

Vel

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Elisir. Febril. vel Propriet.**Spir. Cucklear.* an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

M. D. S.

Mistura Febrilis Scorbutica guttatim fumenda.

Dosis à guttis 20. ad 30. valde prodest singulis diebus Intermissionis.

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Liq. Terra sol. Tartari* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Spir. Cucklear.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

M. S.

Essentia Febrilis Scorbutica, ad 20. guttas.

Vel

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Spir. Salis Ammon.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ vel $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.*Cucklear.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

M. S.

Spiritus febrilis resolvens: 30. gutt. pro una dosi.

Alius etiam Antibellum Petrii (de quo supra, ubi de Hælica) cum Magisterio Coralliorum cum Succo Citri (reliqua Magisteria sunt nullius pretii) an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. & Arcanum duplic. Myrsinith $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. & pro una vel duabus dosibus ante Paroxysmum usurpata, in Febribus Scorbuticis sunt egregia.

Vel

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Arcan. dupl. Myrsinith.**Salis Albinth.**Lap. Cancr. præp.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*M. f. Pulvis.* S.

Pulvis febrilis Scorbuticus.

Propinatur in Tertiana Scorbutica, ubi Aëlis intensior: aliquoties repetatur, donec Febris cesset.

Vel

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Arcan. dupl. Myrsinith.**Mag. Corall. cum Succ. Citri an.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Sal. volat. Coran Cervi,* vel *Speran.* gr. vi.*M. f. Pulvis.*

D. S.

Pulvis febrilis Scorbuticus.

Capitur in vehiculo sequenti.

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Agu. Febrif. ubi.**Anticorb. Doracellian.* an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Spir. Cucklear.**Salis Ammon.* an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Laud. opim. gr. lb.**Syr. Stolemyrb. Ferri* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

M. S.

Aqua ad Pulverem.

In hoc ipso tanquam in vehiculo, capitur iste Pulvis, atque durante Paroxysmo, aut saltem post Rigorem subinde de eodem capitur.

Serum Lactis, id specie Caprilli, est Potus imprimis conveniens, dum talium febrium admodum urget æstus & Sitis, vel solum, vel imprimis cum Citro acidulatam nam & hic in Scorbuto est egregius: Vel & affundatur Herbarum Cochlearie & Nasturtii cum Pomo Citri in taleolas inciso, & exprimitur pro Potu in Paroxysmo:

Vel

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Herb. Fumur.* M. ii.

Mactra per noctem in Seris Lactis caprilli q. f.

Colatura addatur.

*Succ. Fumur. Dorsif. Riv.**Succib. parum.*

M. S.

Potio Alterativa.

Hamulatur extra Paroxysmum.

Decadum etiam Tamarindorum ad diætas febres, sub forma Julapii usurpatum, est egregium, simul Alvim obstruam, quæ suspensum in Scorbuto solet observari, blandè laxat, prætereaque Crasin Mælin Sanguinem vitiosum temperat: v. gr.

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Tamarind.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

Coqu. in f. q. Seris Lactis;

Colatura addit.

Tinctura Flav. Bellid. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Syrapi Refectifol.* vel *Violar.* q. f. pro gratia foporis.

M. D. pro Julapii febrili laxativo, durante æstu.

D. S.

Julepus Aperiens.

Vid. MORELLUS de Mater. Medic. pag. 33.

Vel

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Dorsif. Paffat. min.* in Seris Lactis. depur. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

addit.

Succ. Cucklear. per resid. depur. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.*Citr. rec.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*M. f. Julepus:* St

Julepus febrilis Scorbuticus.

Vel

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. *Seri Lactis depur.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Dorsif. Tamarind.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Succ. Citr. rec. dr. vj.* vel $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.*Syr. ex succo Citri* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ vel q. f.*M. f. Julepus.* S.

Julepus Refrigerans & Laxativus.

Vel

 $\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. De-

℞. Decodi. Scordii cum corua Corvi B. ʒ.

Tamarind. ʒiij.

Tinßberg Flor. Bellid. dr. iij.

Spiritus Viniculi ʒiij. q. s.

M. D. S. ut antè.

NB. Potus Lactis in febribus Scorbuticis valde coarctat, si aliquantulum Sacchari, vel spiritus falis Ammoniaci addatur: quotidie assumitur, mane dimidia mensura, v. s. v. g. si Paroxysmus est à meridie; si cessat ante coenam, in corna comedenda est *Frische Milch*.

Ægyptii referunt PROSPERO ALPINO lib. 10. de *Medic. Ægypt. cap. 55.* Potum quandam ex fermento & Aqua Rosarum parant, pro febrium, in specie Tertianæ, Cura.

Alii, ut Silesii, Poloni, & quidam populi vicini, ex Renaca urina & fermento Potum faciunt, & *Bavisch* appellant: Quod sanè Potus genus non incommo- dum in febribus ferventioribus videtur: Decoctum faciat ex herba Sina, ut Decoctum colorem flavum retineat, non punicum: Decodo fermentum addunt, & in loco tepido aliquot dies fermentari permittunt: Vid. KERGERUS de *fermentationibus* (p. 3. cap. 1. pag. 112).

Ea supra dicta sunt: quæ in Cura Febrium Intermittentium, mox in Principio, promissio uno vel altero Digestione, *Pomieria* ante Paroxysmum, aut die Intermittentibus blanda *Lactaria* propinanda: postea Intermittentibus diebus alterantia volatilia, vel Martialia, pro ratione urgentium Symptomatum: Paroxysmi vero tempore Remedia fermentati Acidi destructiva, & uti vocant, *precipitantia*, potissimum obtineant. Unde Remedia Alcalia propterea non volatilia quam fixa, & si cognata Acida quocunque modo destruantur, ex omnihus tribus Regnis ad Curam febrium Intermittentium adhiberi possunt. Hinc ratione Alcali volatilis plus minus, ut olei, conveniunt Veterum Simplicia *Volatilia Vegetabilia*, v. g. *quævis Americiana*, plus minus Aromatica, qualia in specie sunt *Abinthium*, *Cassidus benedictus*, *Centaureum minus*, *Chamaemilla*, *Tertianaria* (hujus enim Decodo tam Tertianæ die, quam ante Paroxysmum propinquo, Tertianæ fuit curata: Vid. TABERNÆMONTANUS (§) *Ulmia*, cujus Decodo, item Aqua destillata insigniter commendatur in Tertianis diuturnis, Taraxaco, seu *Dens Leonis*, quod est egregium, *Fumaria*, quæ etiam conveniunt in febribus Scorbuticis, & hinc *Quartanis*; *Nalturtium*, cujus Succus cum Vini albi ʒij. adhibitus Quartanam certè curat, modo in lecto Paroxysmus instantem expedit *Æger*, sudorem movet, & pergit. Conveniunt etiam *Radis plantaginis*, *Taraxaci*, *Chelidoni majoris*, *Gentiane*, *Zedoarie*, quæ revera præmissis præmittendis optime sunt.

Ufus horum est nunc in substantia sub forma Pulveris, nunc in Decodo amarissimo, nunc in Sacco recenti expresso, nunc in Extracto, nunc, sique optimus, in sale fixo. In substantia Flores Centaurii minoris ad dr. i. pulverisati adhibiti insigniter commendatur ad curandas febres, quæ ratione THONERUS curavit Tertianam duplicem admodum refractariam, premixtis Universalibus, per Pulverem Herbe Centaurii minoris ad dr. i. in hultu Vini per ʒ. dies propinando, Sudorem enim mover. Per cinet hoc & Pulvis Cardui benedicti &c. Decoquendi modum dicta Vegetabilia Febrifuga ostendit imprimis RULANDUS *Thesaur. Pract.* quæ Decoda mediante vehementi Sudore quasvis febres intermittentes tollunt, modo, ut sæpius monui, premixta fuerint Universalia: v. g.

℞. Flor. Crat. min. M. ʒij.

Rad. Atri M. ʒ.

(nam Aërum in Aqua coctum omnem vim vomitorium amittit)

Copa. in l. q. Aqu. simpl.

Hujus Decodi calentes Virgo quotidie in lecto bene tecta hausit B. & die multaque sudavit, quod ad certum tempus continuato, à diuturna chronicaque febre curata fuit.

Postea

℞. Herb. Card. bened. M. ʒ. vel ʒij.

Tom. II.

(S) Quam Tertianarium vocat Tabernæmontanus, & *Calidia palustris*, *vulgarior*, sive *Carula*, Tournef. Infl. 282. sive *Lymnæchia carula gabriculata*, vel *Gratiola carula*, C. B. Pin. 246. Descriptioem habet apud Joh. Bauhinium Hist. Plant. ex. c. 431. sub nomine Tertianæ, alibi *Lymnæchie gabriculata*.

(T) Cortex *Peruvianus*, quem Quinquina vel Cinchinum vulgi vocant, habet præstantiam & efficaciam pro Febrium Intermittentium curandis, imò in universa Medicina habetur remedium, quicquid dicant Medici quidam injuri illius hostes. De eo, pro & contra, in numeris conscripti sunt Tractatus, inter quos præcipue legi meretur Etançifici Torti Therapeuti.

Rad. Atri. M. ʒ. vel ʒij.

Infund. per noctem in B. iv. Aqua, post decoqu. lento igne ad tertias.

Hujus Decodi Æger omni mane jejunus in lecto arctè coopertus bibat unc. iij. vel iv. calidè accipiat semper 6. horis ante Paroxysmum, & multum fudet, donec febris repetito hujus usu omnino evanescat.

Et certè hujusmodi Decoda ex paucissimis Ingredientibus præferenda longe Decodis Magistralibus, quæ ex mille speciebus combinatae sunt compositæ: hinc vel sola Herba Centaurii minoris optimum est ad Intermittentes remedium, si ante Paroxysmum adhibeatur. HELMONTIUS tardarum febrium Medicamentum optimum vocat Aërum in Aqua decoctum: movet Urinam.

Alias etiam Chamæmelon, ejus Decodum, item Aqua decocta ex eisdem facia ad aliquot uncias adhibita, à multis insigniter commendatur ante Paroxysmum.

In Succo ulsi parantur v. g.

℞. Sant. express. Abinth. rot. ʒ. ad ʒij. vel ʒiij.

Accipitur in haultu Vini Abinthii aliquot horis ante Paroxysmum, sicut hoc aliquoties, & evanescit febris.

In Extractis usurpant dicta Vegetabilia Febrifuga sub forma Pilularum, cum enim sint insigniter amara, ut tollatur amarities, cum spiritu Vini paratur Extractum. Talia Extracta sunt Cardui benedicti, Centaurii minoris, Theriacale, & quæ supra alia, ex quibus formantur Pilule, quorum Formulæ ex supra dictis patent. Capiantur immo- nente Paroxysmo una alterave hora ante eundem. Usurpantur etiam hæc Extracta in forma liquidæ: nam Essentia & Extracta differunt tantum ratione consistencie, recipiendo nempe Essentiam Abinthii, Centaurii minoris, Cardui benedicti, Myrrhæ, & similes, crebrius, tam die Intermittentibus, quam ad dr. i. usque ad dr. ij. ante Paroxysmum in vehiculo appropriato. Modum parandi præsuppono ex ANGELO SALA. Ad illas Essentias ex Vegetabilibus Febrifugis puratas pertinet etiam *Essent. Febrium Du. Diderici Michaelis*, cujus hæc est descriptio:

℞. Summi. Crat. min.

Abinth. ana M. ʒij.

Herb. Atri. Maris.

Rad. Atri ana M. ʒij.

Herb. Pentaphyll.

Marrubii.

Rosa.

Cardui bened.

Scordii ana M. ʒ.

Summi. Hyperic. ʒss.

Rad. Chelidon. maj.

Taraxaci.

Angelice.

Zedoar.

Gentianæ.

Imperatores.

Distamni albi.

Morus Diaboli.

Fulicis.

Archeleus. rot. ana ʒij.

Caryoph. ʒij.

Sp. longi ʒvi.

Zingib. ʒss.

Extrahantur cum spiritu abinthii, card. bened. & cent. min. & addatur Extractum febris.

Dose est à guttis 40. ad 50. die intermissionis ad alterandam vitiosum Maltæ sanguinem Crasiam.

Loco talium Vegetabilium longe utilior est spiritus falis Ammoniaci, cui non cedunt Italia Fiaæ ex istis febrifugis parata. Pertinet etiam ad hæc Vegetabilia china abia seu cortex *Peruvianus antiquioris*, & *seu junioris* 1 Vid. Dr. AMMANI *dispus.* Est cortex aromaticus, saporis acerrimi ferè inflar Cinnamonum, & deservit ex provinciis Peruvianis: Vocatur à quibusdam *Gentiana India*. Genuinum usurpandi modum vid. in BARTHOLINI cent. v. *Hybor. anatome*. 50. item in SYDENHAM de *Morbis acutis & Epidem.* p. 92. sect. 2. c. 5. D. MONGI- NO *Tr. de cura febrium per chinam chinæ* (T). Datur à

M m

ʒi. ad

3j. ad 3ij. probè pulverisatâ in haustu Vini calidi, v. g.

℞. China China 3j. ad 3ij.

Pulverisatâ minutissime iofund. in

Vini Rhœnani. vel Hîj. 3ij. vel vi.

Scent in infusione per noctem; mane probè mista ha-

stentur ante Paroxysmum.

Curat frequenter Quartana; & hinc etiam Tertianas

Chronicas aut duplicatas etiam opothas.

Vel

℞. Pulv. China China 3vj. ad 3j.

Rad. Gentian. 3ij.

Flor. Crœ. min. pag. lv.

Piper. long. 3j.

Salis Tartari 3j.

M. f. Pulvis: S.

Species in Vino.

Vel

℞. Corr. China China 3vj.

Garlic 3j. ad 3ij.

Comar. Crœ. min. M. j.

Cinam. 3ij.

Caryoph.

Lap. Cancr. an. 3j.

Sal. Tartari 3ij.

M. f. Pulvis, includendus Nodulo. S.

Nodulus ad Vinum Febrile.

Infund. in Vino Rhœnani, vel Abstinâ Mœn. 3j. Desi- bor-

us haustus una cum Pulvere. Raro fallunt, signa Co-

Quonis ubi percellerunt.

℞. China China subtilis 3vj.

Rad. Gentian.

Limat. Martis purif. an. 3ij.

Caryoph. dr. ij.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Alterativus pro una mensura Vini.

Bibatur post Paroxysmum, & diapas Intermitte[n]tes bis,

mane calidè & à meridie frigidè.

Alii, imprimis Medici Angli, famosum suum *Febrifa-*

gam hoc modo component.

℞. Vini rubr. opt. 3ij.

China China in pulvis. radall. 3ij.

Stent in loco tepido per tres dies & noctes, deo Li-

quoris decantari dentur unâ, præterpropter ante Pa-

roxysmum horis 4. vel in declinatione ejus. Hæc dosi-

continuat per 4. s. vel 6. dies quotidie, o[mn]e dum

febris remiserit.

Quo scopo obento Lenitivum exhibetur.

Vel

℞. Pulv. China China subtilis 3ij.

Lap. Cancr. prop. 3j.

Cardem.

Cubeb. an. gr. iij.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Febrilis.

Infund. tamen q[uod] Remedium, ut reliqua omnia simplia esse

soleat; node necesse est, ut ritè præmixta sunt Univer-

salia, & aliquoties usurpandum veniat hoc Remedium, &

itemque fugata Febris ejus usu, corpus adhuc semel, vel bis

leniter purgandum sit, aliter post unam alteramve septimanam

erit recidivans Febris.

Loco hujus, cum sit exoticum, arbitror, non ineptè

substitutâ posse Gentianam recentem amarissimam nostram;

& ejus Succum condensatum, cum Vino ad dr. i. hora

una ante Paroxysmum assumptum, febres Intermitte[n]tes

quasvisque feliciter curare. Unde etiam ejus Pulvis ad dr. ij.

vel tres, eandem cum China Chinâ efficaciam habere ar-

bitror; ut certum sit, China Chinam esse egregiam Me-

dicamentum, tam in Quartanis, quam in Tertianis di-

Vel

℞. Pulv. Gentian. subtilis.

Card. leuod. an. 3j.

M. S.

Pulvis Febrilis.

Ad hæc Vegetabilis Febrifuga pertinet: merito etiam
Myrrha, quæ ipsa ante Paroxysmum propinatur in specie
in febre Quartana à malis, & solet inigoiter commen-
dari: Et credo quod etiam in Febribus Scorbuticis suta-
rum sit o[mn]i contentendum Simplex. Propinatur ante Pa-
roxysmum à 3j. ad dr. ij. vel iolum, vel etiam secundum
Veterum Methodum cum *Cassia*, idque non inelegan-
ter. Utramque, *Cassiam* & *Myrrha*, permiscuit ad
3j. & propinatur in haustu Vini ante Paroxysmum.

℞. Myrrha.

Cassia.

Opopon.

Extoll. Gentian.

Albarb. an. 3j.

Cum *Mirbrida*, & *Succo Abstinâ* q. l. l. Pulvis sum.
xvij. de quibus horis duabus ante Paroxysmum 3ij.
per septem vel decem deglutiat, & hinc sudorem
expectat.

Alius etiam notum est, in quibuscumque febribus Inter-
mittentibus ante Paroxysmum commodè posse propinari
Myrrham simplicem, vel *Tyburam Benzoidum* ad gutt. ʒ. ʒ. ʒ.
40. ad 50. pro ratione circumstantiarum in Aqua Carabi
benedicti, vel Vini Abstinâ, præmixtis Universalibus:
curat enim illas per sudorem.

Pertinet hoc ultimum *Antimonium diaphoreticum*, in spe-
cie *Antimonium diaphoreticum Martiale*, quæ etiam ante
Paroxysmum usurpata febres fugant. Pertinet etiam
huc *Pulvis febrilis perlatas Timæi* Deicripito, quæ prolat
est ejus Medicamentis, est hæc:

℞. Antimonij diaph. dr. ʒ.

Margar. prop. ʒij.

Cinl. Camer. prop.

Cornu Cervinij, prop. an. dr. l.

M. l. Pulvis.

Propinatur in Aqua appropriata cum aliquot guttis Mi-
lloræ Simplicis.

Item pertinet hæc quoque nonnulla *Vina Terrea*, &
imprimis calcinata, vi præcipitata indigni prebita, *Fe-*
brifuga sarsilla var. 17. & 18. dila, qualis sunt v. g. Specifi-
cum febrile *Crælli* ex Testis oblongis Coccharum calcina-
tia, quale etiam est specificum febrile *Mœnchii*. Hæc Tes-
tas præparandi modum habet *ROLFINGIUS* in *Chym.*
Item specificum febrile *Strubbergi*, paratum ex Matre
Perlarum calcinata. Desi hanc eil à dr. ʒ. ad dr. ʒ. ʒ. ʒ.
hora una vel altera ante Paroxysmum in haustu Vini, vel
Aqua destillata, bis ac ter reiteranda, donec cesset Febris.
Usurpandi modus est:

℞. Aqua. Crœ. min. vel Torax. 3j. vel 3ij.

Cinam. dr. ij. vel dr. iij.

Specif. Febril. Strubberg. dr. l.

Antimonij diaph. gr. xv.

Syrup. de Card. leuod. dr. ij. vel Sacch. parum.

D. S.

Potio febrilis bene circumspicienda pro una dosi.
Loco talium etiam totan Cervi ullum & familia Ter-
rea ac alia Marina calcinata emmodè substitui possunt.

Pertinet huc spiritus falis coagulatus, spiritus Vitrioli
coagulatus, compositum etiam sal Antifebrile *Myrsinellii*,
& Alamen, à non paucis tanquam singulare febrifugum
februm Intermitte[n]tium laudatum, in specie *Megistherium*
Aluminis SCHROEDERI in *Pharm. pag. 324.* de quo conf.
etiam *HOFFMANNUS* in *Clave pag. 349.* Desi dr. ʒ. ad
dr. l. bis vel ter ante Paroxysmum propinatum usque profligat.
Novi hoc Remedio empirico diuturnas in Medici oppo-
brium febres fuisse curatas:

℞. Nuc. Mefch.

Nuci depur.

Alum. an. dr. l.

Misc. l. Pulvis.

Divid. in tres par. æqu.

Tribus successivè Paroxysmis, dum ingruunt, assuma-

peutice specialis ad Febres quasdam Perniciofas, impetrato ac repente lethales, una verò China China peculiari
Methodo ministrata. (Anales: Mutinæ, 1712. Quapropter præstat nihil hoc quam pascere dicere. Illud tamen notandum,
pro *Februm Intermitte[n]tium Curatio* me ea Methodo uti. quem *Americani*, à quibus remedium accepimus, non occurrunt: ut
scilicet imminente Paroxysmo drachmas duas cum semissis Corticis in pulvere[m] redacti, argui Vini albi 12. horarum spatio in-
fusi, cum Vini ipso exhibentur, hâque bis vel ter repetamus. Hæc emendatione Febris Intermitte[n]tes etiam duplici ratione
curantur. Ad Recidivam autem vitandam, purgare, si videatur, corpore, Cortex idem per plures dies mane et exhibendus, sed dosi
unius tantum drachma, vel dimidia, pro Aëri vel Merbri ratione. Notandum ubi Periculi vel Viscerum status expa-
laverit, dimidiam Corticis drachmam, ac Rhubarbari tantummodo, simul commoda adplurè dies exhibemus, sicque Februm pro
mitem omnino avocamus. Quod ad exhibendi tempus attinet, legi ac pende ea, quæ paulo supra lit. R. adnotavimus.

tur, expectando Sudorem & Febrem subsitit.

Sic Tartarum Aluminosum tinctum videbitis in ROLFINGII *Chymia*. Alii Aluminis bene depurati, vel Aluminis tincti *Myoficri*, quod videtur in MYNSICHTII *Artemia* pag. 19., aliquot grana miscuit cum aliis Pefibugis, & ita propinant. Alii ad usum febrem ita præparant:

℞. Alum. crud. ℞. j.

& probè calcinant in vaso, ut moris est: frustula calcinata & adhuc candorosi immittunt in *Acetum destillatum*, quod filtra per chartam bibulam, & hinc humiditatem maximam ex parte, si non omnem, per Alembicum abstrahant: Residuum in loco frigido in Crytalli concrevit, quæ a ℞. ad ℞. in Aqua Cardui bened. horis 2. ante Parosyrium propinquant, sunt satis proficue.

hæ ipse Crytalli dum concreverit, possunt tingi, si addatur Succus Baccarum Sambuci, qui eas tingit colore rubino.

Facit hæc & Sal Antimoni, & Saccharum Saturni, in Tertianis & Quartanis non inelegans eposporis:

℞. Corall. rub. præp. vel Lapis. Cancer. præp. ℞. ad ℞. Sacch. Saturni ℞. gr. xij. ad xv.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Febrilis.

Propinandus ante Parosyrium in Quartana contumaci in Decocto Cardui benedicti, sicuti continuu pulveris Lapidum Cancrorum usu, ad 14. dies in Decocto Cardui benedicti propinatorum, contumax aliquot mensium Quartana aliquando curata fuit.

Sal Antimoni commendatur in Antidoto Antipyretico non solummodo à POTERIO in *Append. pag. 596.* quod Sal desinit à 2. Pharm. *Spagy. cap. 12. de Antimonio*: abscondit inibi geminum modum Auther, ego verbò suspicor bene: *℞. Antimoni diaph.* (verba Autheris sunt *Silicium in sudorem reducere*) affundatur Acetum destillatum cum Spiritu Neri in tantum acutum iuxta mentem ZWELFERI pag. 310. *Ment. Spagy.* (solum in potorem dulcem reducere: facta diutina digestione in loco calido temperato, Antimonium diaphoreticum filtratur, filtratumque evaporet, quo facto reperies sal aliquod, vel saccharum, vel Vitriolum, sicut alia Vitriola parantur ex faturo cum Aceto destillato, & Marte cum sulphuris spiritu.)

Si lubet parare saltem subtiliorem & præstantiorem, solvatur saccharum illud in spiritu Vini, iterumque fiat evaporatio.

Hoc sal Antimoni, si cum Floribus Antimoni diaphoreticis conjungitur, nullum mihi est dubium, quin ex eo sit sperandum Medicamentum iugare Antipyreticum; siquidem constat ex Alkali Nitro, Antimoni floribus diaphoreticis, & Alkali etiam flos Antimoni; qua de re etiam omnino laudandum est præsertim *Antidoto Poterii*. simile quod sperandum etiam est de Auro fulminante, quippe quod in se continet Calcem Solarem alcalinam & Tartarum nitratum; nam utitur reverà Oleum Tartari cum spiritu Nitri; vel Aqua regia concrevit in verum Nitrum, atamèn mihi videtur in hoc Nitro Salia contraria voo ita penitus concreta, quare talis Tartarus nitratus adhuc pollet virtute aliqua Acidum absorbendi.

Verùm observandum est, quod hujusmodi hæc optime quidem curent, sed reverà poris superprimant febres Intermittentes; adeoque periculosæ sunt, nisi cautè, præmissis Universalibus, ac primas vias probè abstergentibus, admittantur, quia alia febres duplices & triplices, & subinde ex nonnulli contumaces reddunt: Et si hoc non faciunt, tamen agendo fermentum febrile, & hinc impediendo Turgescentiam febrem, vel palliative curant, vel symptica vi condensando nonnulli Miasm Sanguineum, sæpius in Visceribus Scirrhus ac Tumores relinquunt. Adhuc non semper tuta sunt, quia his Specificis seu Terreis semel curatis Febres subinde solent recidivare. Certè aliquoties observavi, ad horum usu si febres curatæ fuerint, vel diu languidæ fuissent Aegros, vel Tumores Abdominis hinc facillè faulce obnoxios: Appetitum insigniter prosterunt, & hærent in stomacho perturbant, digestionemque eius labeficiunt, ut ex febribus Intermittentibus Aegri fiant Hædici. Unde rarissimè, & nonnulli caute, usurpanda sunt Specifica febrilia; & si usurpanda sunt, pro dictis incommodis præcavendis propinquant non calcinata, sed filtrata vel simpliciter trita, vel prævia cum Aceto secundum MYNSICHTII in *Artemia* pag. 97., aut cum Lixivio forti secundum ROLFINGIUM l. 4. Extrahere: prius necesse est, ut limo quàm optime sit man-

Tom. II.

data; nec sola, sed cum aliis Sudoriferis, hoc modo:

℞. Aqua. Card. bened. ℞. j.

Specif. Febril. Strubelberg. dr. ℞.

Sal volat. Corn. Cerv. gr. vi.

Laud. opiat. gr. i.

M. S.

Potiuscula Antifebrilis.

Vel

℞. Card. bened. ℞. j.

Specif. Febril. Strubelbergi ℞. j.

(vel hujus, & Lapid. Cancer. præp. an. gr. xv.)

Syr. Salis Ammoniaci ℞. j.

Syrum. Op. gutt. v.

Syrup. Card. bened. ℞. j.

M. S.

Potiuscula Antifebrilis.

Vel

℞. Specif. Febril. ℞. j.

Salis Asyriaci ℞. j.

M. f. Pulvis pro 2. dosi.

D. S.

Pulvis Pebrifugus.

Dumtaxat tribus horis ante Parosyrium assumatur.

Addi possunt Olei assillæ, Caryoph. gutt. liij.

In Tertiana Myrica præmissa præmittendis cum sac-

cellu præscribitur:

℞. Cornu Cerv. usi præp. ℞. j.

Salis Asyriaci ℞. j.

Corall. rub. præp. gr. xij.

Extr. Caffæ. gr. v.

Laud. opiat. gr. ij.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. part. æqu.

Capiebatur ante Parosyrium aliquoties repetenda:

Item

℞. Trifol. Canch. præp. ℞. j.

Antimoni diaph.

Salis Asyriaci an. ℞. vel gr. xv.

Laud. opiat. gr. ij.

M. pro 2. dosibus.

D. S.

Pulveres præcipitantes Antifebriles & Uterini.

Capiantur ante Parosyrium.

℞. cor. cer. usi præp. gr. xv. ad ℞. j.

Lapill. cancer. præp. gr. lv. ad vij.

Salis Asyriaci gr. iv.

M. S.

Pulvis præcipitans.

Post Febrim præstigatam dandum est blandum Lavam die illo, quo alius Parosyrium redire solet: v. g. ex Malsâ pilularum de Ammoniac, addito Extrado Abñchil cum debito Rismalo: Nempe

℞. Malsâ. Pilul. de Amm. Quercetani ℞. xij.

Extr. Abñchil. gr. vi. vel xv.

Trach. Alband. gr. ij.

F. Pilula: S.

Pilule Laxativæ.

Vel si Recidiva fortis supervenerit, hæc præmissis præmittendis levat Sal Ammoniacum vel solum, vel cum Corallis præparatis, aut Antiephico Poterii miltum, ante Parosyrium usurpatur.

Potius ergo Salia Vegetabilium Fixa calcinata, quæ sunt resolubilia, & ex ipsis præparata Remedia, quæ etiam uti antea monui, à BARBETTE præferantur China Chinæ, seu tutiora, loco horum ut Calcinarum commende. Interim inter Fixa, Calcinata ac Marinis parata singularia sunt: sunt enim Infus Calcis vivæ, affusa Aquæ essentive, & sic consequenter Alkali fixum oculatum gerunt. Calcinate partes Animalium terree, ut Cornu Cervi usum, Pulvis Bufonium calcinarum &c. omni Sale sunt spoliata: unde præ his Calcinata Maris tutiora sunt. Denique Sulphur minerale etiam inter Febrifuga insigniter laudatur; & cerum est, quod Sulphur in Febribus Intermittentibus non fit contentendum Remedium, dosi ℞. ad ℞. idque aliquoties ante Parosyrium reiteretur; quicumque enim Intermittentes contumaces feliciter curare dicitur: Et erodo, quod verum sit. Hinc etiam Pulvis Pyritus Febrifugus est Miltum, quo utuntur in Castria ad fugandas febres Intermittentes non inepto consilio à dosi ℞. vel ℞. ad ij. in Aceto vel Vino acidulo ante Parosyrium: ratione enim Sulphuris, Nitri, & Alkali Carbonum, effregit. Facit hæc Pulvis Pebrifugus egregius D. Salmanni, cujus basis est in Sulphure. Delinquo sequitur.

M m 2 ℞. Ni.

℞. Niri fci ℥℥.

Flur. Sulphuris ℥ij.

Salis Amm. ℥i.

Santal. rub. pulv. ℥vj.

Sarc. albis. ℥ij.

M. f. Pulvis.

Propinetur à ℥i. ad ℥℥. ante Paroxyſmum.
Santalum & Saccharum poſſunt ſine poſſa omitti, &
tunc doſis diminuitur.

In Pelle & Febribus Intermittentibus, Vitriolum Cy-
prum à RODERICO FONSECA in *Conſult. Medicis*
Tom. 1. commendatur, & PETRUS BORELLUS Cent. 4.
Obſ. 77. in Febribus præſcribit: *Vitrioli Cyprii* ſuſum in
℞. iv. Aquâ infundere docet per horæ quadrante, & pro-
pinandas ſuadet hujus Aquæ ℥vj. mane per 6. dies,
duabus horis ante cibum.

Poſtremo notandum. Cùm Febres diuturnæ, imprimis
Quartanæ, ſunt etiam Febres aliæ Intermittentæ, raro
ſolent eſſe tales, ſ. e. diuturnæ, quin tandem accedat illis
vel Tumor, vel Scirrhus Viſcerum, in ſpecie Scirrhus
Lienis, vel etiam Meſenterii, tanquam Proſtratum mor-
botum, vel diſpſitio quæſi Mali Hypochondriaci; idcirco
tunc in omnibus Medicamentis ſimul ad ſplenem reſpicien-
dam erit, ut felicius eradicetur Morbus. In tali caſu non
omittenda Martialis, vel etiam aliæ Plantæ ſplenicas,
ſum *Febrifugis* miſta, pro curandis talibus diuturnis Inter-
mittentibus, idque imprimis diæ Intermiſſionis aut ante Pa-
roxyſmum. Conveniunt ergo Extradum Martis cum Sac-
charo Pomorum, vel ex co parata Eſſentia Martis liquida, mi-
ſta cum Spiritu Cochlearis, item Tinctura Vitrioli Martis
Evonſſeri, item *Sal Martis compoſitum Comaridii*.

℞. Viridi Martis.

Terra ſis, Tartari an. part. æqu.

Sub miſtura & tritura liqueſcit, exſiccetur blandi
igne; & nobile eſt.

Vel uſurpatur *Mari Tartariſato*, qui ſe paratur:

℞. Crm. Tartari part. ij.

Limon. Martis part. j.

Minutiſſimè tere in mortario marmoreo, bine adde
Aquam ſerventem, blandè exſiccetur, Aqua ſervida
itero tamdiu, donec fiat, Marte abſumpto à Cremo-
re Tartari, Pulvis ſubſiſſimus.

Item Crocus Jovis aperit cum Salibus, vel Limata-
ra Martis crudè præparata ante Paroxyſmum ſumpta, Anti-
monium diaphoreticum Martiale, & præſertim, ubi *Men-*
ſura ſupervenire velit. Non Quartanæ in ſpecie vix ſine
Martis ape debellari poſſunt.

De Opio ſuprà monitum fuit, quodd etiam ad Febrifuga
Remedia ſuo modo pertinet; unde & Theriaca, maſſimas
ſine virtutis continens ab Opio, ad Febrifuga referri
ſolet. Facit hæc antiquiſſima GALENI ſebris curandi
Methodus, qui ſuos Quartanarios curavit, primum propi-
nando Vomitorium, deinde diæ ſequenti dedit Sacrum
Abſinthii bibendum, denique duabus horis ante Paroxyſ-
mum dedit Theriacam, & ſic Quartanarios omnes cura-
vit GALENUS. Plura de hac Methodo vid. apud ZA-
CUTUM LUSITANUM l. 4. *Medic. Princ. Hſt.* 11.
Verùm cum cautela hac faciendum eſſe geſſimoneat Pra-
cticæ, ne impetivellè ante Coſſionem data Febrim multi-
plicet. Conf. BALLONIUS *Pharo Med. pag. 200.* HOR-
STIUS *Probl. pag. 15. Decad. 1. Qu. 9.* Nam modo ritè
precedatur, *Sueros Abſinthii ad ℥℥. ſum Theriaca ℥i.* in hau-
ſu Vini tribus horis ante Paroxyſmum, certo liberat à
quibuſvis Febribus Intermittentibus. Theriaca ad ℥i. aut
℥ij. in Febribus Teptanis Intermittentibus Chronicis ante
Paroxyſmum in haſſu Vini Abſinthici, expedando
Sudorem, experta eſt; vid. RIVIERI in *Obſ. Ego* ſubin-
de in Febribus Chronicis cum ſuccèſſu præſcripti cum Fe-
brifugo *Strahlbergieri* ita:

℞. Theriac. Andromach. ℥i. ad ℥i.

Spici. Febril. Strahlbergieri ℥i. ad ℥℥.

Salis Card. brom. ℥℥.

Olvi deſſill. Caryoph. (aderat unim horæ)

gutt. ij. vel iij.

Cum L. q. Symplicis Salsæpyris Fœſſi, de *Artemiſia*

vel de *Abſinth.*

F. Solus.

Propinabatur hora una vel altera ante Paroxyſmum,
præmiſſis præmittendis, & egregio conſulit.

Sic & Theriacæ ℥i. ante Paroxyſmum haſſu cum mo-
derato haſſu Aceti multum prodeſt, quando nimis *Æſtus*
ejus uſum videtur reſpicere, & mediantè Sudore Febrem
poſſigabit.

Sed hæc ſunt Febrifuga Particularia.

Dicens hic quoddam ſunt de *Febrifugis Catholiſis*, qua-
ſia reverà legitima ſub modèſti Methodo plura dantur;
adeo ut Salis fixa, & Sal Ammoniacum non immerito
huc revocari queant; ſicuti ſub perverſo uſu & inconſe-
quenter Methodo etiam optima Specifica ſaliunt. K. E. G. E-
RUS *Tract. de Vermibus, ſect. 3. de Febril. pag. 250.*
commendat ſuam *Febrifugam præſcriptam*, quo ſuſſicimè
uſitæ in quibuſvis Febribus Intermittentibus; præpara-
tioneſ autem rectior. Relatum eſt ab Amico, eſſe nihil
aliud, quàm Cremori Tartari partes iv. & *Coralloſam ran-*
torum præparatam partes ij., quæ exactiſſimè miſceantur,
& Pulvis doſis ℥℥. uſque ad ℥i. aut Div. ſam diæ Inter-
miſſionis, quàm ante Paroxyſmum, uſurpatur. Perſinet
hæc *Mercurius ſicut diaphoreticus Halowii*, ſed cuius præ-
parationem in Aranea ſibi reſervavit. Eſt autem reverà
Mercurius Principitatus ſtatui, tinctus cum *Sulphure Ro-*
ſæi fixo, parato beneficio Liquoris Alcaheli; quod catrahit
Sulphur Venetiæ, ut Mercurius eiſdem decurrat: Vid.
de hoc STARCKEY in *Microtechn. Angliæ*. Item D.
MOEBII *Sal Auriferis* hæc præterit; Nempe

℞. Niri et. part. ij.

Viridi al. part. j.

Fundantur in crucibulo: ſuſum ſolvatur, ſiltretur, &
iterum coaguletur.

Si autem Vitrioli Hungarici reſciptantur partes ij. &
Niri part. j. capſulo priùs per reſortum Gas ſylveſtri noci-
vo, reſiduum ſolvatur, ſiltretur, iterum cryſtalliſetur,
evadet *Saleſus Emulſio-diaphoreticum*. Vid. HOFMANNI
Clav. Pharm. Schraderi pag. 356. ſub Vitriolo.

Item pertinet hæc *Antiquariæ Febrifugæ Rorſii*, etiam
qualvis alias Febres curans, cujaſ plures hinc inde circum-
ſerantur deſcriptiones. Plures parare illud voluit ex *Auro*,
ſilice Arſimoniæ, & *Mercurio vivo*; quæ invicem via ſicca
præcipitantur in Aurum quoddam Vite, ſeu Mercurium
Præcipitatum Solarem: *Sed doſis* ſerè de hac deſcriptione;
nam Mercuriale quidem, ſed benignius, Remedium eſſe
exiſtimo. Et ſi rectè operandi ratio in eiſdem operationi-
bus obſervatur, facilè quæſiſcipari poſſet, *ſed doſis Mercurii*
dulcis procedere, cui *Sulphur Arſimoniæ* & *Aurum fulminans*,
interdum de *Stannomine* nonnihil, tanquam quartus Arbi-
trarius, additur; hinc etiam vomitum ſimul, ſecèſſum etiam,
atque ſudorem movere ſolet. Sed iſta ſuprà diſta Particu-
laria etiam ſufficiunt.

Hinc ſunt Ictegna, quæ ſubinde uſurpantur in Febribus
Intermittentibus.

Juxta hæc ſubinde etiam non incongruè quoddam *Exter-*
na, tam pro Febribus curandis, quàm pro *Æſtu* nimio,
aliſquæ Symptomatis in Paroxyſmo mitigandis, adhiben-
tur. Inter Medicamenta Externa, quæ *Æſtum* nimium
plantis Pedum applicata compellunt, excipit Epithema
ex Aceto roſaceo, cum Succo Sedi majoris, & Nitro, ana
q. ſ. miſtis, & ita applicatis; quale *Æſtum* febrilem indi-
gniter reſtinguit, & imprimis convenit, quando argret
pathemata Capitis. Convenit etiam Fermentum cum Ac-
ceto & Sale plantis Pedum adhibicum. Item Potentilla
ſeu Argentina, & Flammula recentè conſuſa, carpis Ma-
neum & plantis Pedum applicata, ad leniendum Calorem
& *Æſtum* Febrilium Intermittentium laudatur (V). Epi-
thema quoque ſicca *Aceto* & *Succo Sedi majoris*, ana q. l.,
addito Niri tantillo; quod plantis Pedum applicatum ad-
modum laudatur ad temperandum *Æſtum*, illa autem, quæ
Febres curant, ſunt varæ: Emplaſtra, Cataplaſmata, Un-
guenta, &c. vel Pulſui applicanda, vel Amuletorum for-
ma ſuſpendenda. Priora ſim habent cauſticam, rodentem,
& Cutem rubeficientem, atque Puſtulas excipiant, ut
ibi beneficio irritationis & vicularum Fermentum febrile
ſoras eliminetur, ad imitationem Naturæ pro Puſtulis La-
borem & alibi ſe levantis.

Alia ex Allio, Cepa, Ruta, Ranunculo ardente, Pla-
tagine vulgari & aquatica, Sabina, Croco, Mallice,
Terebinthina, Camphora, Pulvere Pyrio, Araneis & ex-
rum telis, & Oleo harum & Scorpionum, & ſimilibus
formantur Cataplaſmata, carpis Maneum pro Febribus cu-
randis applicata. In ſpecie:

℞. Al-

(V) Flammula vulgaris, quæ eſt Clematis ſive Flammula repens C. B. tantum abſt. ut moribus & pedibus
abſorta ſtans temperare poſſit, ut ait A.; quin potius amenti acritate quæ pollet (unde Flammula nomen), Corporis
membris quibus applicatur, ignis viſſigia impræmet.

℞. Aliam catuasam: addo

Cepas catuasas,

Cervi parum,

Mixta cum *Aere*, & in formam Cataplasmatidis subacta instat magni thaleri, ingruente Parasyfimo, carpis Manuum applicatur, ubi vala venosa & arteriola magna; & ita per Parasyfimum relinquitur, repetendo, donec Febris cesset.

His alii etiam *℞. longam addunt*, & non contentendam Remedium esse.

Quidam recipiunt Sonchum tritum, Sambucum & Plantaginem, hæcque cum Aëre subacta carpis alligant. Iheronimus Plantae Pedum plantis supposita Febris tollit, iuxta BORELLUM *Cerv. 1. Obs. 13.* Aliud Febrifugum Amulectum videb. ibid. *Obs. 32.* Radix Plantaginis appenda commendatur etiam contra Febris; hinc LOTHARIUS in *Obs. 32.* hanc Radicem commendat, ut applicetur à suis *Aegris.* Præ cæteris in Fuligine furni non inlegana est remedium, si scilicet hæc & Salvia contusa recens ana miscetur invicem cum Albamine Ovi, & applicetur carpis Manuum vel plantis Pedum, & egregiè Aësum contineat. Alii Fuliginem splendens, ut WILLIUS in *Febris*, cum Alio, Cepis, & Albamine Ovi miscet, Acceti nonnihil affundit, & ita carpis Manuum applicat, vel cum Theriaca subigit & Terebinthina, & applicatur Pulvis.

Angli habent Cataplasma Febrile ex Sale, Lupulo recenti, & pallidus maioribus. Hoc carpis Manuum applicatum in febribus intermittendis insigniter prodest. Facit hoc *Emplastrum ad Tertianas* imprimis usurpandum, quod sic ex

Mell. ℞i.

Mell. ℞i.

Terebinth. an. ℞.

(Terebinthina egregia est externè)

Coquantur Mel ad debitam consistensiam, & cum reliquis l. a. *Emplastrum*: extenditur super altum, & adspargitur nonnihil furfurum, ne nimis adherescat, & imponitur regioni Ventruculi, quando Febricitans intus est cubitus, ac, quamdiu placet, relinquitur.

Pertinet hoc *Emplastrum Febris D. Michaelis* externè applicandum, quod est egregium:

℞. Folij fursi Spiegel-Rus (egregia habet lilia) ℞i.

Terebinth. ℞i.

Tel. Aras. ℞i. vel barum & Araneas, maj. an. ℞.

Camphor. ℞i.

Olei Araneas, vel Scorpion. q. l.

M. f. Emplastrum.

Carpis Manuum utrinque magnitudine thaleri applicatur, gestaturque aliquandiu, donec Febris evanescat: Notandum ab Authore, quod hoc ipso quendam Senem ferè obogenarium Quartana laborantem sine alio Remedio curaverit.

Rectè additur Camphora: nam hæc ad dr. i. vel dr. ii. Saculo linteo inclusa, & in Scrobiculo cordis appenda, continuè gestata, donec exhalaverit tota, felicissimè febricitantes Tertianarios restituit. D. SCHROECKIUS frequenter in usu habuit in Tertianis, & Quartanis.

Præ aliis utiturque eff Oleum Aranearum, & omnia alia ex Araneis parata; nam & vivæ Araneæ majores cellularie instat Amuletorum suspensæ commendatur: mirabile enim in se habent Sal nitrosum ingruente diureticum: quæ Araneæ, & etiam ex ipsis paratum Oleum, basis sunt decantati *Emplastris Strobelbergii contra Quartanas*, quod describitur in SCHROECKII *Pharm. lib. 2. cap. 72. ubi de Emplastris*: sed desiderio est manca, Genium admodum prolixum, nisi habenda esset ratio temporis, communicarem. Carpis istud applicatum nonnihil vesicat, quod est signum legitime operationis, utur successivè evanescant. Loco hujus succedaneum non inconveniens est sequens, ad Quartanas etiam malignas, expertum *Emplastrum*:

℞. Terebinth. Venæ ℞i.

Cal liquefacte in aëreo cupreo iniciantur

Araneas, viv. majores, (Araneæ cellularie majores) No. xii. xl. vel xxx.

Agitentur probe cum spatula lignea, donec Araneæ ferè non amplius appareant: adde postea

Polve, corn. Rafas. exsic.

Rubet, exsic. an. unc. ℞. ad unc. i℞.

Tartari crudi unc. i.

Sabing dr. ii. vel dr. iii.

Olei Scorpion, vel simpl. vel Martialis q. l. ad justam consistensiam Emplastrum.

Agitentur probe omnia cum spatula lignea, donec f. *Emplastrum.*

Vid. *Thesaur. Pharm. HOFFMANNI pag. 65. No. 2.* Hoc, ut dixi, egregium est maxime in febre Quartana, & Maligna, propter Rufones, & Rubetas.

Præterea in Quartanis aliisque febribus diuturnis subinde consultum est, si suspicio sit de Tumoribus Viscerum, aut Splene affecto, Emplastrum quendam Splenis regioni applicare. In talibus casibus convenit Emplastrum de Cicuta, mixtum cum Gummi Ammoniac; imprimis Emplastrum ex Nicotiana; nam Nicotiana aliis per se ad Splenis Scirrhus, & Tumores externè est egregia. In hunc finem extractum ejus, vel succus inspissatus, & similis, cum Gummi Ammoniac in Aceto saluti ana permiscetur, & fit Emplastrum:

℞. Emplastrum de Nicot. q. l. part. ii.

Gummi Ammon. in Acet. sol.

Tartarum an. part. i.

Mixta malaxentur cum l. q. *Olei Phosphorum*; extendantur super altum, & dentur absque unctione: S.

Emplastrum Retinæ.

Item emplastrum carminativum Sylvii hic optimo cum successu applicatur, uti etiam Emplastrum de Rosis cum Mercurio, quod ibi egregium est. HELMONTIUS mentionem facit Emplastrum, quo ad Splenis regionem applicato, plurimos Quartanarios huc euralie assent: Compositio & præparatio non adeo constat: Quidam volunt, hanc esse: Ego verò non credo:

℞. Tabaci q. v.

Minutissime infuso affunde vini q. l.

Coque per medium horam in vapo clauso, postmodum coletur, & fortiter exprimatur, Colaturæ expressæ adde

Eurci infus. vel Extracti Nicot.

Mell. commun.

Cera.

Olei Nicot. vel Olivæ, q. l. ad consistensiam Emplastrum.

Applicetur tepidè regioni Lienis cum Oleo Capparum contra Quartanam, Vid. HOFFMANNI *Thesaur. Pharm. pag. 66. No. 13.*

Ubi simul adeit Dolor:

℞. Extr. Nicot. per decell. dicto modo par. unc. i℞.

Opil per distill. cum Vine in Extracti coq. rad. i℞. unci.

Cera ℞i.

Cum Terebinthina & Olei Nicotiana an. q. f. *f. Emplastrum.*

Facit hoc etiam *Cataplasma Myoficis Febrile* non inlegant, quod vid. in *Aram. Chym. feli. 38.*

Superest nunc Cura perverfa.

Caratians perverfa vocantur, quando Febris malè curantur, & præsertim interpeffivè supprimuntur, vel acce, vel remediis, illis eorum impetum silentibus. Hæ Curæ sunt infusæ: licet enim febris cesset, tamen iterum recidunt, & graviora mala, graves scilicet *Abdominis doctæ convulsivæ*, eunturacæ admodum, quales etiam parcin inducere valent, inferunt, quæ nulli cedunt remediis, & ad ileon inclinant; superveniunt Lassitudines Corporis, Cephalalgie horrendæ, & interdum asthma periculosa: idque evenit, si nimis maturè febris suppressitur, si mox in principio dantur specificæ ssa, quæ aut multiplicent, aut suppressunt febres, sed postea post suppressionem dicta mala atrocissima excitant (X).

In tali statu laxantia, & emollientia evascentia, hinc Anodyna sultem conveniunt. Laborabat mulier quædam Tertiana maxime frigida, cui tandem sssu, ut continuat Olei destillati Juniperi usu interire, & externè, Febrim tollerit, quod etiam evenit: sed supervenit tandem gravis Dolor Abdominis convulsivus, simulque præsertim Hypogastrum lacinias, & iogruenter gravatiss, unà cum retractione Umbilici interioris versus, & pertinacissima Alvi adftrictione. Purgantia parum operabantur, idque

(X) De Curatioribus, quas Perverfas appellat & vide quæ vix tenuimus lib. R. & T. Corporis autem impatiens sssu videtur sedulo Medicis, post colubim Amfichrilis Febrim, Purgantia ob Recidivæ metum; pro aggracatis modulo opertione exhibitis.

frustra. Mirabile etiam est, quod ex Cura Magnética propolere adhibita, non praesens praetendunt, dicta mala supervenire soleant: vid. M. A. N. C. ann. 3. observ. 89. pag. 155. Spiritus Salis Armatissimus maxime ex parte ea abigit, sed repetito usu. Cum autem frequentissime obveniant Colicæ convulsivæ, ut dicunt: *pari mihi aliquid in venas & me compingit, ne me scire valeam*; Alvus perniciatiter elasi est, quæ nec Clystima, nec forgoribus purgantibus movetur, Tormenta interea crudeliter perdurant; & Morbus flaccus periculosus exinde fit. Ipse observavi non referari Alvum, nisi per decoctum Psalliarum blandissime alvum laxantium. Hinc præmissio vel omisso decocto Psalliarum, ad mitiganda Symptomata Mulieri præscripsi:

*℞. Aqu. Menth. uoc. lib.℥.
Spir. salis ammon. ℥℥.
Laud. hyss. gr. v. vel opian. gr.ii. vel li℥.
Syr. Cort. aurant. dr.ii.℥. vel vi.
M. pro una vice.*

Cujus usui sedato omnimod. Dolore, ordinata fuit Potio Laxativa pulsatula. Cum superesset adhuc Dolor in Abdominis regione Hypogastrica dextra, & Tumor durus iostat parva laceratione ibidem tactui sese offerret (Y). Mixturam antea præscriptam reiterandam, & sequens Emplastrum applicandum jussi:

*℞. Gummi. Ammon. in ac. salat.
Emplastr. Marric. de galb. usq. an. q. f.
Miscl. cum i. q. Unguenti de Althæa comp.℥. l. a. Emplastrum inducendum super altum, irroandam cum Oleo Phosphorum.*

Applicabatur externè dictæ regioni, ut fortiter adhaerere, & ita curata fuit.

Ubi jam omnia fuerint sedata, ut tuta magis perisset Cura, in usu Abinthii, & Remediorum Abinthiacorum adhuc aliquandiu perpendum erit, utpote quæ affectibus, febribus supervenientibus (Z), imprimis malè curatis, optimè conducunt.

Nobilis Quartana duplicata affectus alio in loco ab alio Medico aliquoties acceptat Pulverem China-Chinæ: cuius ulu semper quidem evanuit febris, sed etiam rediit, idque aliquoties. In hoc per Cura præmissi:

*℞. Mercur. dulc. ℥i.
seam. sulphur. gr. iv.
Misc.*

Bene profecit. Hinc Pulveris illius Mercurialis (quem describit HOFFMANNUS in *Clavis Eboracensis* sub nomine *Antiquarii Rivanii* pag. 175.) ℥i. ad dr. Lindovian. Sed hoc parum evacuavit, mitigata tamen fuit febris. At, quia pulvis non evacuaverat, post quadragesim. Salivatio supervenit, ferè per octiduum durans, sub qua nihilominus febris contumaciter persistit. Hinc post repetita Vomitoria,

*℞. Ellic. febril. D. Michaelis.
℞. Ellic. Aliph.℥.*

Miscebantur pro dosi una, ante Paroxysmum assumenda.

Aliquoties hoc accepti, unde remissiones successivè Paroxysmi evanuerunt. Sed ipse admodum debilis reddi cepit, & manifestè quasi tabescere, tandem etiam paroxysmi febiles redierunt: Hinc intermissionis diè creberrimè & copiosè Effluentia Abinthii, Contusarii minoris, & Ellic. febrile missa usurpavit, ut tonum Viscerum, & eucrasiam Biliæ conservarem (A): Hypochondrii finistro applicavi Emplastrum de Nicotiana cum Gummi Ammoniaci, quia ibidem, & probe spinam maxime frigus ceteraque urgebant Symptomata: Diebus verò Paroxysmorum

*℞. Lap. calc. prop. dr.℥.
Sacch. saturni gr. xviii.
M. pro 2. dosibus.*

(Y) An Tumor hic, quem A. Cura Perverfa tribuit, ante Febrem egrem venaxi, & fortasse ipse Febri causa fuit, nec tamen conspicuus, nisi temporis tralla majorem molem nactus, redditi? (Z)

(Z) Supervenientibus, an præcedentibus? Nonnisi quæ reverà Affectus hi Febribus superveniunt, non ex perverfa Cura ut ait A. sed potius cum Medici Celsum expectantes, ab Antifebrilibus abstinent, adeoque Maribus causâ, vires in dies sumenda, solidae solidique Corporis partes labi, nulli hujus remedium usq. elucet, infirmis.

(A) Si Abinthium & Centaurium minus exhibui, cur non ipsum Chinachinam? facinus feni Febrilem quam recessit nostrates Plantæ: imò ad tonum Viscerum, & Biliæ eucrasiam conservandam, quod sapiebat A., tunc alium Curæ Perverbia præstatum invenire remedium.

(B) Observandum denique, nunquam Viscerum vitia, ex heterogenæ humorum infusæ pendencia, ad Colicæ excitandâ apta, in Corpore præstet, nec tamen dolores parere, si salo in Sanguiem veluti diversicula Febri excutitur; quoniam autem ficitur Febri, nec humores morbum severius dejiciuntur, hi in uno Venæ tubili sunt inclusa sciant, & Colicæ aliisque affectus producant.

Accipiendo unum mane, alteram verbè à meridie, duabus vel tribus ante Paroxysmum horis, quorum usu per aliquot dies & noctes continuato, febris evanuit.

Sed Alvi consumacia, & Excrementa admodum dura supergenerant, & labore dolores compressi sub Umbilico afflicte, unde Colicam Humoroso-convulsivam ex Acido vitico per Saccharum Saturni, & quique ætatem annuolam fixato, & condensato, contraxit: Pulsus quidem Laxativus ad dr. propinquis Alvi beneficium contemnavi; nihilominus Colicæ cum Cardialgia complicata, utraque lancinans, confistit, & graviter compressa supervenit, bin. urgente graviter malo ordinavi

*℞. Aque. Cassi. dr. ii.
pro duabus dosibus.*

*℞. Flor. Chamæ. Milii.
Sem. Anis. dr. vi.
Puls. Celcynd. dr.℥.
Comp. in f. q. feri Lactis.
℞. Calatr. Bi. uoc.
Terribilis in Vitis Ovi soluta dr. vi.
Mell. rosar. unc.℥.*

M. pro chymate pro duabus vicibus applicando. Sequenti die Pulsus Laxativus assumptus: Extra

*℞. Empl. Maric. de galb. part.℥.
Tucamah.
Balf. Peruv. an. part. i.*

M. & Emplastrum Abdomini inferendum, quo etiam Symptomata levata fuerunt.

Sensit nihilominus adhuc Colicam periodicam, per aliquot dies Paroxysmi consensu tempore recurrentem, sed levem, dicto Emplastro & usu Effluentis Calorei ac Abinthii tandem evanescentem.

Ex hac causâ observandum:

1. Salivationem Mercatalem, nisi fuerit insignis, & quæ diu ac copiosè evacuando universum corpus evacuet, non curare Quartanas, quod tamen observant PIENS de febril. lib. 2. pag. 173. Item ex BEL-LONII *Febris medicor.* pag. 200. 6. 6. & 659.

2. Si immutetur concentratur, & figuræ levementis febrile, puerit alia multiplici Symptomata, speciatim Colicæ convulsivæ gravem induci, Acido fixato partes sensiles saltem fortiter irritante, dum ex terræ mutatione fluida fermentare nequit.

3. Idem ferè esse peccatum materiale in Colicis inde natis cum fermento febrili, prout ex eo patet, quod Periodum febilem observent Colicæ aliquandiu, ut leviter affligentes. (8)

Vir ætatis consentiens laborabat Febre Intermitteute Tertiana Sæcubitus, cuius Paroxysmus cum bina vice fassuisset, diè intermissionis, scilicet diè 2. Junii, ordinato Pulverem Laxativum ex Nitro vitriolato, quod crebè quidem, sed sine levamine purgavit, nam intersequente diè 3. Junii eadem Paroxysmi vehementia, & cum Paroxysmus urgeret, gravissimos dolores Cæcum, & cum corporebant à Genis usque ad Popitem, speciatim in regione Tibiarum, ut ex illis misere lamentaretur: sed evanescite paroxysmo, & dolores bi penitus intermiserant, laus intermissionis diè nihil de illis periret; id quod manifestum est suam delicticentis Acrimonie febilitate, quæ sub paroxysmo commota illas turbas excitare solet. Post aliquot paroxysmos diè 7. Junii ordinò spiritum salis Ammoniaci, diè intermissionis capiendum: Cum verò semper ante paroxysmum per tres vel quatuor horas, gravissimas Anxietates præcordium sentiret, diè 8. Junii ante paroxysmum ordinò Vomitorium blandum, cuius usq. & omnes Anxietates remiserunt, & paroxysmus non rediit illa nocte: sed diè sequenti 9. Oculi subitè inflammatus cum intenso dolore conficitur.

Dis

Die 10. Janii nocte hora 3. redit paroxysmus cum frigore, & assu idemque illipatus, Dolor Crurum mediocriter vel nullus, Oculi dexter verò etiam altero mane admodum inflammatus, & acerbè dolens deprehenditur. Vocato ergo Chirurgo, Vesicæ præpe Nucham utrique excisandas jubeo, quibus copiosè plorantibus die 12. Janii nocte, cum expellatur paroxysmus, nullus rediit, saltem appetente mane xilus per aliquat horas mediocriter, hinc & Sudor: sed nullus Rigor vel Horror, nullus Crurum Dolor, mediocriter scilicet Vesicantibus his ita evanescentibus. Die 14. a meridie hora quarta gravissimi Dolores Oculorum redeunt, sed post mediam noctem cessant, superveniente mane levi paroxysmo, superiori simili. Die 16. hora 3. vespertina denud Oculi acerbè dolent dolente post mediam noctem, sed post hæc appetente mane levis, ut supra, redit Paroxysmus. Die 18. Junii, ut præcaveantur Dolores Oculorum ante paroxysmum urgentes, jus-6, accipient Semen Sinapi, & hocque contulerunt, & cum ipsius Vini infusum in forma Puncticulæ Carpi utrique pro revulsione applicarent: hujus usu factum, ut nulli Dolores percepti fuerint, & nocte sequente circa auroram paroxysmus egilis denud rediret. Sed cum Si-napismo illo Oculorum affectus ante paroxysmum cessa-ret, factum fuit, ut hinc post paroxysmum idem rediret: ob id semper mane, & vespere Sinapismum applican-do jussu, quorum usus non amplius redierunt Oculorum pa-themata, internis verò fixis potestatem Febri eva-nuit. (C)

In hoc Casu notabile est:

1. Dolores Tiliaram Scorbutici exstinctio superveniente Oculorum inflammatione.
2. Hinc ipsi præter constitutionem internam spiritus Salia Ammoniaci præbuit, Oculis debilioribus noxiis, non secus ac volatilia Antiforbica Oculis hebetant.
3. Vesicatoriorum usus revera efficax pro Rigore Februm Interni tentum compescendo.
4. Naturæ motus & impetus in Oculis, cum partem aliis debiliorem, tam ante, quam post Paroxysmos, sed per Sinapi usum in Carpo, avertendo delusus.
5. Quam laudare Remedium fit Vomitorium, si præcon-sultum Anxietates pluribus, horis ante paroxysmum urgent pro his sedandis.

Hæc de Febris Intermitteatibus.

C A P U T, III.

De Febris Continuis.

ARTICULUS I.

De Febris Ephemera.

Post febres intermittentes transiunt veniant febres continuae, i.e. quæ a primo suo invalido momento usque ad ultimum durationis finem continuè perdurant. Febris hujusmodi continuæ quociens blanda fuisse, & una die tantum durat, secundum durationis suæ rationem dicitur *Ephemera*, seu *valida diei naturalis febris*, Latius *febris diaria* (D). Quemadmodum si eadem per duas, tres, quatuor, quinque vel sex dies ita duraverit, & aliquo critico Naturæ motu solvetur, *diaria* seu *Ephemera plurium dierum*: item ulitato voca-bulo *Synochæ* non parvis, dici solet.

C A U S A E.

Causa in genere harum febrium Ephemeraum est per-versus usus 6. rerum Non-naturalium, quarum occasione excitatur sanguinis Fermentatio naturalis intensius auda, & plus minus turbata, adeoque Non-naturalis, ut corpus

ed usque incalcescat. Unde præter functiones leviter laesas pulsus frequentior solito ac major excitatur. Omnes ergo res Non-naturales, quæ sanguinis Fermentationem augere, & Effervescentiam excitare possunt, sunt Febri Dia-riæ Causæ. Sponte tandem evanescit, & blando Sudore ac madore prorumpente finire solet: pro quo scopi etiam blandum sudoriferum propinatum, Mixtura simplex, vel Tinctura Bezoardica, semel vel bis usurpata, luterum Curationem absolvit. Interim est Febri nullius momen-ti, & vel raro aut nunquam sub præxia Medicam cadit: pro uberiore tamen ejus explicatione consulatur SYLVIVS lib. 1. præter cap. 28. propter res sex Non-naturales bene ex-plicatas, PIENS de febribus p. 2. cap. 2. pag. 15. WILLISTUS de febribus.

Facile tamen in Corpore impuro, sed cujus Sanguis à debita Crassi plus minus declinat, & heterogeneorum par-ticularum miscela ad Fermentationem præternaturalem dis-positus, in Putridam valguè sic didam, seu Fermentativam præternaturalem, degenerare possunt. Quando ergo est me-tus degenerationis febri Ephemerae in aliam, sequens adhiberi possunt:

℞. Rosell. corvi cum Rad. Scorz. ℞i.

Succ. citri,

Cyden. an. ʒb.

Tind. Flor. Aquileg.

Rellid. an. ʒb.

Syr. Rubi idæi ʒi.

Spir. Vinial. q. l. pro sapore.

M. D. S.

Julepum Alterans.

Vel

℞. Rosell. corvi cum Rad. Scorz. ℞i.

Succ. citri res. ʒi.

Cyden.

Syrap. anem. citri

Rubi idæi an. ʒb.

Spir. Salis dale. q. l. pro Julepo.

D. S.

Julepum Alterans.

Vel loco Julepi fiat *decantum alterans & laxans*:

℞. Flor. Rellid.

Papav. errat.

Rosar. an. M. ʒ.

Tamarind. res. ʒb.

Coqu. in ℞i. vel ℞v. Aquæ comm. vel Seri Lactis depur.

am spiritui Viniali acidulati:

Decoctio ferventi adde

Conserv. Papav. errat.

Rosar. rub. res.

Spir. Vinial. dale. ʒi.

Stent in loco tepido per horas aliquot; Colatura

S.

Potio Aperitiva & Alterans pro aliquot vicibus.

De quo bibat ʒij per libitum, vel quotidie bis mane,

& horis ante cenam. Item

℞. Rad. Scorz. ʒb.

Rosar. corvi ʒi.

Liqui Sassafr. ʒb.

Coqu. in l. q. Aquæ, circa finem addendo

Corri. Aurant. ʒb.

Colatura edulcoretur cum Saccharo,

D. S.

Hæustus Alterans.

In ardore Corporis cum inflatione Abdominis præscripsi

cuidam:

℞. Aqu. Rencib. ʒb.

Carmiat. ʒi.

Spir. Vini dale. ʒi.

Syrap. cori. aurant. ʒb.

M. S.

Potiuscula Alterans contra inflationem.

Item

℞. Aqu.

(C) Urinem hæc *Austereilla Fixa* (quem Clinachinum) in principio Morbi præferit, deinde Vomitorium, vel Ca-tharticum præparat: fortasse nec Tiliaram nec Oculorum dolores tam miseri vexatus Ager, nec Febri per mensis integrum afflixisset.

(D) Ephemera vapores, Ephemera Febris, h. e. Diaria ab ipso die: unica enim die, seu spatio viginti quatuor horarum agram vocat. Hæc Ephemera vel Hemerobium illud Insistitum genus vocat, quod unicuique diem vivit: & Trimerum, quod adtertium usque diem vitam producit. Ephemera est quæque herba, de qua Dioscorides, Galenus, & Plinius, vel Cicuta species, vel quæcumque lesifera planta uno die interimens: sic Plutarcho *epiqueste* *epiqueste*, præ-fens Venenum, quod unus dies spatio necit.

24. Ag. Acetof.

Serranera an. 56.

Succ. Ciri 56.

Spir. Niri dale. 56.

Tinct. Flor. Bellid. 56.

Syrup. Zuk. Mii 56.

M. 3.

Potiuncula Alterans, cochleatim sumenda.

ARTICULUS II.

De Febribus Acutis Primariis.

Quod suprà factam divisionem, considerabo primò Febres acutissimas acutas, postmodum Lentas. Quod attinet febres acutissimas, quæ suam cursum cum impetu continent à principio usque ad finem, sunt vel primariæ, vel secundariæ seu symptomaticæ dictæ. Primariæ sunt, quæ per se Morbum constituent. Secundariæ superveniunt alii Morbo, à quo complicantur, quales v. g. Febres continuæ sunt in Pleuriticis, Peripneumonia, Erysipellate, & similibus partium Inflammationibus; item quales superveniunt Vulneribus aut Ulceribus gravissimis partium, imprimis internarum, quâ ratione Phibides ex Ulceratione cuiusdam Visceris nata ordinarij secum febrem comitem habere solet.

Primariæ continuæ melioris doctrinæ ergo dividuntur secundum SYLVII doctrinam & magnitudinem in acutas, vel non acutas seu lentas. Acuta sunt, quæ cum gravissimis symptomatibus brevi, & admodum periculosa symptomata sunt, quæ lentæ & successivè moderatis symptomatibus ægros affligunt. Illius exemplum est v. g. Causæ, Hujus exemplum sit v. g. hæcilia. Utræque in specie sunt vel simplices, alias continentes, seu continuæ, sic dictæ, ut hoc vocabulum Medicinæ Parentibus, in specie HIPPOCRATI, fuerit incognitum; vel Compuestas, alias continuas Periodica seu Sympt. Illæ sunt, quæ eodem tenore, eodem impetu, sine variatione, sine ulla exacerbatione aut remissione à suo principio usque ad ultimum & integrum sui cessationem perdurant. Continuum vero in specie seu periodicæ sunt, quæ continuè quidem in suo cursu ad finem usque perseverant, nihilominus tamen certo tempore, nunc tertio die, nunc, quod rarius, quotidie, aut quarto die, subinde exacerbationes quasdam & paroxysmos exacerbatos patiuntur, post quas Remissionem quidem, non autem totalem Intermissionem febri observatur. Talis Continua Periodica est inter Febres Acutas Continua Tertiana; inter Lentas vero Febres Catarrhalis omni vespere ferè suas exacerbationes habens. Reverè hæc nihil aliud sunt, nisi Febres Compuestas, ex Febre nempe Intermitteute sua Periodo observata, & Febre Continue, æquali cursu continuè promota.

Durant hæc Febres vel ascendunt, ita ut Ager prima die lenem Calorem præternaturalem sentiat, postmodum de die in diem augeat; vel secundò descendunt, ita ut primo die maxima Caloris, & Febri Symptomata Aegrum invadant, quæ postea sensim sensimque remittunt, donec in naturalem statum perveniant, & hæc Continuæ sunt, quæ eodem modo durant.

Acute Febres sunt vel solitariae vel comitæ: Illæ, quæ solæ & simplices Aegrum affligunt; comitæ vero sunt, quæ cum alio Affectu, in specie cum Inflammatione cuiusdam partis, continentur: quales v. gr. sunt Febres Pleuriticae, Febres in Angina corpeis, sive Febres tales veniant ratione Inflammationis, sive Inflammatio veniat ratione febri.

Utræque etiam hæc Ipse sunt vel Analoga, vel sepius etiam Malignæ, ex quo admodum periculosa: Analoga sunt, quæ ultra sui naturam nulla graviora constantia habent symptomata; Malignæ vero sunt, quando vires Aegri subito & præter talis Febri naturam proferuntur, & Symptomata occurrunt, quàm in tali Affectu fieri solet, graviora & insolentiora. Malignæ dicuntur ratione Homini mori, qui exteros se præbet amico, interperat verò semper de malo cogitant. Indicant hæc febres præstatio Virium sine causa manifesta, rarissime sunt Intermitteutes: sepius complicantur continuæ cum malignis, itaque propter etiam non raro confunduntur: imò sepius accidit, ut febri reverè Malignæ primis diebus formam Causæ, aut febri Resignæ præ se ferat, ac sua malignitate lateat. Proinde cauti sumus in erundendo Diagnostici, & Prognostici. De his jam non dico, quia sup. loco dabitur oc-

caso: Hac vice considerandæ sunt febres rursus acutæ primariæ solitariae, longas uno nomine considerabimus in specie.

S. I.

FEBRES ARDENTES,
Dixit Virgilio febres.

Uti in omnibus febribus, ita in specie in continua acuta, ratio habenda est duorum Salium, Urinosi & acidi, in Massa sanguinea, & fucis reliquis, motu multo concurrentium, & plus minus fermentativum aut effervescentium. Hujus Effervescentiæ occasionem nunc suggerit acidum, ut in febris Pleuritica, seu cum Inflammatione conjunctis, a. gr. Pleuritica, item in Febribus Catarrhalibus; nunc occasionem suggerit Sal volatile oleosum & alcali peccans, quod cum Acido effervescente Calorem per Corpus distribuit, uti fit in continua primariis, ardentibus dictis.

CAUSÆ.

Scilicet causa primaria Febrium continuarum non Perilodicum est nihil aliud, quàm talis Massa Sanguinis Dyscrasia, quæ hæc Sale volatili acris, sepius oleoso simul, (coque præternaturaliter vitioso seu corrupto, & consequenter Sanguinis naturam crasin turbant) quod ab aliis vocatur Nihil præternaturalis, adeo est tanta, ut vel levi accedente occasione talem Effluviem febrium præternaturalem, insar Viti generosius immanis ebullientis, tandem concipiat, dum Sal volatile seius aut oleosus uberius luxurians vitiosum cum Acido concurrit, & plus minus intente fermentat; unde insigunt incandescentes partes oleosæ (nam Calor consistit in Motu) tam efferturatum Ardorem & Aethem in totum Corpus distribunt. Unde ex Sal volatile abundante Calor acris & insigunt ardus observatur, idque eo magis quod magis oleosum fuerit Sal volatile Massæ Sanguineæ. Passim est admodum creter, frequens, & quo magis oleosus, adeoque occulte acida est Massa Sanguinea, eo erit maior, quatenus acrior propterea excitatur Effervescentia Urinæ: imò sunt crassiusculæ & plus minus turbidæ, præter longius vel propius absout à Strag tales Febres: Et quo magis oleosum fuerit Sal peccans, eo similitur magis tunc: quàm vero aquiliter effervescent Acidum naturale cum Sale volatili oleoso peccante, tamdiu Urinæ crasse se tenent, & intente tunc erant: quando vero successivè precipitatur Sal volatile oleosum peccans, seu Nihil ab Acido, Urinæ crassiores, turbidæ, & quæ pedecant sedimentum deponunt, externi solet: unde Codicinis Signa talia rectè dici solent.

Quando Massa Sanguinea à Fermento plane dissolvitur, itaut nulla Codicinis apparant Signa, Mora pressio est. KERGERUS Urinas fermentatas rectè dicit turbidas febricitantium: Nam, quæ fermentescunt acris, ex emuturbatione & ex agitatione perspicue tantum amittunt; vid. KERGERUS pag. 177. de ferment.

Causa Remota crasin Massæ Sanguineæ ita alterans, ut occasione levi data huius organismi Febellis, & spirituum influentia fervore, & impetu oritur, adeoque Fermenti præternaturalis vires occupant, heret imprimis secundum fundamenta suprà in genere posita, & quantum baculum ex Juvantibus & Nocentibus indicare peci, in Semachio & primis viis. Neque est obisum obli, vel sub diffinitione minus corrupti, vel in Duodecim à Nite effusa minus perfoli, sed videri ablati, ut sub liquidum fermentativum nidorosi plus minus amariacis acris, & plus minus oleosus forma, successivè Massæ Sanguinem insundunt, easque vires Fermentativas, & Circulationis leges subit, donec ibidem uberius & copiosius consensum, vel quacunque occasione externa excitatur, tumens ordinariam Sanguinis Fermentationem & Spiritualem naturalem turbat, indeque quâ coagellum Effervescentiam ita materia sanguini assuta, ipsoque inimica feceratur, & hinc exornatur, ut in Morbo nempe salubri; vel Massa Sanguinea ita corrupta & inquinata deficiat in effectu secretorio, ut tandem penitus immutata & sua testura, & Fermentatio vitalis, & Spiritualem, & ipsa Vita, cum illorum effectu, deficiat & Spiritualem, & ipsa Vita, cum illorum effectu, deficiat. Adeoque depuratur massa sanguinea in febre continente erat. Adeoque depuratur eadem in lethali, quâ scilicet salubri; penitus pervertitur eadem in lethali, quâ scilicet generosum Mustum fermentando se depurat, & Facrum secre-

ferreone, tanquam quidam Colone, in vinum generatum abijt: quod indeque ista fermentatione illa, in vappam aut situm aut potum ingratum, aliunde modis vitiosis transijt. Quod facile intelligibilis saltem reddenda, non autem explicandum barum febrium naturam, inserviat: nempe hoc ipsum Chyli vitium est quasi (metatis nempe mutandis) Stercoris liquidum feu Scorria, ex tenuibus Intestinis putrefactum velut transfusa in Massam Sanguineam, auidem irritando Archem febrem inferens, uti vult HELMONTIUS *tract. de Febribus* cap. 2. Sed hoc Stercoris, licet dicat HELMONTIUS non esse naturale, sed praternaturale, ex Chylo corrupto & nidiora, à Bile corrupta in Intestinis vitio *idolo*. Confirmat hæc illa *analogy* illa, quæ inter *Febrim Intermittentem* & *Continuam* talem intercedit, dum non saltem de facili complicitur, aut invicem permutantur, ut infra patet: sed quod unus est in Intermitteute Paroxysmus, hoc in Continua est Integri Morbi cursum. Nempe acidum primum vitarum fermentativum, sed sub digestionem aberrans, Chyli non rite transfusati & consequenter ac debili periculi medio, in Massam sanguinem delatum, praternaturalis fermentationis effi occallo; quod aliis naturalis modo Chyli lenificiens, hunc Sanguinem permiscibilis, & continuationis fermentationis adjuvens perfecte assimilabilem reddit: adeo nempe secundum VERULAMIUM in *Hist. Virg. et Moris* pag. 126. Stomachi robur fundamentum est ut reliquis Colentis, & omnes Succorum in corpore fermentationes seu saltem continuationes fermentationis in Stomacho inducant, ut loquitur SYMSON *Symptologia* pag. 30. &c.

Ex dictis hæc illa vis & operandi ratio Causarum remotorum promptè elicitur, cum tales febres Continuas Arduas imprimis soleant occupare Corpora juvenilia, in quibus notum, quod Bilis sit copiosa, seu Massa Sanguinea imprægnata copiosa bile volatili oleo, idque magis tempore Vernali & æstiva, Aëreque liquido, quod incalcescit Corpus agitât Massam Sanguineam, ejusque Fermentationem intendit; item Corpora eufura & eucha, & quorum Massa Sanguinea ob particularum fermenticibilium copiam & volatiliem acrimoniam intensius fermenti solet; eos itidem, qui utitur Vidu lauto, & Potu generoso, Spiritu Vini, & Vino generoso; item qui Vitam agunt sedentariam aut otiosam, aut Somno nimis fene dediti & similes: sæpè etenim multum huc facit Corporis habitus Plethoricus, Sanguine exaltante plus minus oleo. Quibus subinde accedunt Causæ Externæ quæ talem dispositionem movent, ut res procalatificas in actum secundum perorant; quas inter est primario Transpiratio Corporis intensibilis prohibita; Effluvis enim illis transpirabilibus suppressis Massa Sanguinea turgescit: Iracundia fervor, Acrum & volatilius abusus: hinc immerio sobitanea in Aquam frigidam post ædium Corpora disposita in febres Arduas coijcit, quatenus scilicet obstruuntur pori, quod observavit HILDANUS *Centur. 1. Observat. 95.* (visu Synochas plurimum dierum, seu non Putrida hinc oriat) & VALERIOLA *lib. 2. Observat. 6.*, qui habet Exemplum febris Synochæ periculossimæ ex pororum Catis obstruione: item ex nimio usu Aquæ Theriacalis in Animi deliquis infusus, febres Ardens observari fuit à SALMUTH *Centur. 1. Observat. 31.*, & licet idem SALMUTH *Centur. 1. Hist. 31.* observat febrem ardentem ex Theriacæ nimis quantitate exhibita, &c. Sed res est clara; quod magis enim dispositum est Subjectum, eo facilius oriuntur febres Arduas.

Hæc *Continuantes*, plus minus Acutis & Simplicibus, simpliciter febres febres Intermitteutes, adeoque

(§. II.)

Febres continuæ composæ.

REddè SYLVIO dicuntur, *Composæ* aut *continua Acuta* & *Intermittente Periodica*; ita quidem, ut sub febribus Continuis casu subinde affligent, & periodicè recurrens febribus Intermitteutes, exacerbationem periodicam plus minus intensam febribus Continuis inferre soleat, *continua hæc Periodica* apud maximam sunt tertiana, & quæ frequentiores, in quibus nempe sine intermissione febribus per-

Ton. II.

git, utat subinde exacerbetur, & ab illa exacerbatione deus remittat. *Continua* verò *Quotidianæ* rariis sunt acutæ, quin ferè sub casum Continuarum, sed reverà febrium Lentarum aut Sympliciarum veniunt. Febri huic in exacerbatione nonnunquam Animi deliquium vel Syncope solet immineere, ob quam causam tales febres alias *Synopsiales* occupantur. Omnium autem rarissima est *Continua Quartana*, de qua, in observata fuerit, multa adhuc dubitant, sicut & JOEL in *Præf.* (cui Veterano Prædicto jam septuagenario, & tamen in Pomerania, ubi ex Acido fixo viscido, seu Veterum Melancholia nati Morbi, indeque Hypochondriacum Malum ac Scorbutum frequentiores sunt, & ex quo hamore Quartanam derivant, viventi nunquam apparuit) in aut nullam aut rarissimam esse indicet. Quin & si aliquando occurrant, ad Lentarum naturam eas proximè accedere, allerit PIENS *de febribus* part. 2. pag. 94., aut cum Continua Lenta complicitur erunt. *Notabile* talis complicitatis Exemplum suggerit LINDAUS *super Hæmorrhæm*, dum dicit: *Idi: ego in hac ære* (nempe Amstelredam) *tres Quartanas cum Hæmorrhæa ex animi motu contraxi*: *Prima paroxysmus erat vehementer, secundus lenior, tertius lenissimus, quartus, qui respondens primo, iterum vehementer, &c.* Hæc Quartanas transiens remanens febribus Continua seu Hæmorrhæa ex motu æris. Principio non putavi dari Quartanam Continuum: sed postmodum deprehendi: effecti, ut omnes Quartanas cessarent, sed remanens Hæmorrhæa. Ego sibi Continuas Periodicas (Quotidianas & Quartanas) parvi effuso, nisi tertianas, quæ sunt frequentiores.

Continua in his febribus Continuis Periodicis est febribus fermentatio, ejusque effectus Pulsus mutatus, & Caloris intensio, & certa sua Periodo saltem exacerbationem, cuius iudicium Symptomata præbent, patiuntur; ita tamen, ut in his exacerbationibus ferè nunquam, aut rarissimè Horroris sensus percipiatur ob intensiorem Caloris sensum, & Motum, totum Corpus occupant, quin saltem ex Caloris & Arduis augmento exacerbatio sinistralis solet observari Conser. SYLVIIUS *lib. 3. cap. 31.* Ex Intermitteutes igitur & continuas complicitur continens Periodicæ, speciem tertiam acuta.

Causa complicitatis huius febrium Intermitteutium & Continuarum est, quod in Massa Sanguinea ad febrem Continuentem disposita est sale volatili oleoso copiosa ob errorem Dietæ & Stomachi erratum, alterius viscosi Succo congeneratur, qui Intermitteutes Periodicas inferant; cum & aucta, Massa Sanguinea ex sale volatili oleoso uberius effervescente, jam febrem Continuum patitur.

Huc pertinet febres Scorbuticæ periodicæ vagæ, Curæ difficilioris.

Complianatur autem tribus modis.

1. Dum febribus Intermitteutes in Continuum Arduum degenerat, & ita postmodum invicem perdurant, dum, præter somitem febribus Intermitteutes ejusque fermentum acidum, recrementa nidiora Massam Sanguineam errore Digestionis primæ inquinant, unde huius occasione Continua simul excitatur, sed Periodica.
2. Continens in intermitteutem alia, correctis plus minus Massa Sanguinea, & successivè succrescente fomite præternaturali Intermitteutis in primis viis, in specie plus minus Dietæ sub Cura febribus Continuis operam dent Egri.
3. Dum simul tales binæ febres locustant & peragunt, idque modo supra dicto, sive Simpliciter fuerint, sive Composite seu multipliciter. Notabilis est complicatio, quam refert PANAROLLUS *Cent. 3. Observat. 31.* pag. 99., nempe Tertianam Continuum duplicem cum Quartana lethalem.

Jam vero nobiliora quædam his Acutis in febribus, tam Continuis, quam Continuis Periodicis, occurrunt Symptomata, pro quorum varietate subinde variant, unde varia fortiantur nomina seu appellationes. Sic quædam harum febrium, ubi fuerit gravior *viscositas* (E), *vis* & *vis*, seu

(§. III.)

Febres ardentes.

Appellatur, cuius duo sunt quasi Pathognomonica Symptomata: *Albus* nempe & *Arduus* *Interfus*, & *Sitis* ferè

N n

(E) *Kærsch* in *opere*, & *vis*, Ardens Febribus, & *vis*, utro: quod ex præfatis pro nimia esse ardore videtur. *Kærsch* *opere*, Arduum-Stomachicæ vocat Diphtherides. Eit & Serpens Causas appellat, quod ab eo visus interpellis sui emittit interius febribus Acutis: hic item Serpens est, qui Diphtheria & *vis* & *vis* præfatis, incendio, & *vis* præfatis dicitur.

interdixit; Hinc frequentissime Continua Tertiana Periodica Causa nomen obtinere solet vid. SYLVIVS lib. 1. Pra. cap. 29. §. 24. & cap. 31. §. 5. Quibus primatis Symptomata huius accedit & Linguae ariditas, Labiorum fissurae, Capitis dolores, Delirium, & similia alia Symptomata, HORSTIVS vero in Problem. Doc. 1. §. 29. a. pag. 5. Veterum Causam hodiernam Febrem Hungaricam esse asserit. Urina in talibus Febribus est intermedium tincta, rubicundissima, in Incremento crassa, turbida, opaca, cum emaciatione, in Statio copiosissima sediments sunt in fundo matriae, quae Ardorem significat: si Urina prius densa, crassa, aut opaca, & subito iotense tenuis, portendit Deliria, Jactitationes, Anxietates &c.

C A U S A E.

Valde penitus causas agnoscat Causas, sed intendiores, & constitutiores Fermentationem excitantes, ac Febres Continuas Acutae aliae Unde ex volatili acriori acida, cum Sale volatili oleo interferunt Sanguinis Effervescentiam excitant, intensissimum illi Aëthi oritur; cum notum sit, nil magis effervescente & fermentando increscere, quam Salia volatilia oleosa: sic Spiritus Vitrioli mixtus cum Oleo sen Spiritu Terebinthinae, salino-volatili oleo, insigniter effervescente increscere solet. Hinc, dum sub ista Effervescencia insigniter turgescit, & ex sic dicam, etiolle Massa Sanguinea, non potest non Pulsus fieri minimus, & necessario frequentior, & prout Spiritus animales sunt constituti, imprimis in principio, simul robustus. Ardor talis, dum alkalificatur quasi Causa febrilis, ut loquitur HELMONTIVS Tract. Pylori Aëther §. 26., Simil adde latensam & cruciantem excitat; h. e. depravatam in Febre Fermentum stomachale, dum non apertum est ad consuetam Digestionem, in incrementum intolerabilem succedit finit quicquid in Stomacho fuerit, quod a Calore parit, & speciatim ad intentio Aëthi febrili magis alteratur, & quasi colligatum quo testuram alkalificatam oleum / ut quasi empyreuma contrahat, tuncis Ventriculi tenacitas impauctum, febrem Sini infert; non solum irritando & vellicando certo modo Membranam Stomachi & Oesophagi, & per consensum ipsas quoque Linguae; sed praeterea Massae Sanguineae insulam simul alterat Lympham salivalem, Fauces humedantem, etque subinde Sale volatili oleoso impregnant, ratione cuius taliter Aegrotantibus subinde gustus amarus in Lingua obvenire solet: unde intolerabilis ferè sitis, & quae Americanebus, v. g. Cerevisia lupulata, ex diu causis intenditur, nec nisi Acidis, praesertim mineralibus, corrigibilis est.

Alia differentia est in Febre,

(§. IV.)

Lippia.

Dista, in qua interiora uruntur, exteriora verò frigent: (F) de qua differantiam admodum quoad ortum & fieri modum Auctorum sunt Sententia. Quamplurimi ad secundarias, adeoque vel Comitates vel Symptomáticas, Febres referunt. testat omnium sit LINDANUS, qui super Hurmannum inquit, Febres Lippiae est Febre Aëthi, orta ex Inflammatione visceris interioris valde sensibile, de qua loquitur Apher. 27. sect. 4. HIPPOCRATES, & Apher. 72. sect. 7. de quibus notandum, (1) Febres has non esse intermittentes, (2) in talibus Algorem esse antecursum, & ardorem intercursum. Ubi per partes externas non vulgo dista manet, pedes, nates, labi aëriam, &c. intelliguntur; sed videretur corporis habitus. Alger autem non est talis Modus aut adhaerentia pulsatibus, sed Aëthi pulchro, qui se algere dicit, & regi videtur. Taper enim munda, nec est ex vi, qua in illis Febribus Ardentes adhaerere solet. Hae Febres brevis incrementum absque, plerumque intra triduum, quatuordecim, & sic non excedit, nisi statim ab initio hinc male preveniantur, hinc, visera alia &c. si quae accenduntur, non tantum prius importas, quam si partibus membranis inflammationis accendant, ut ventriculo, ilis, utro, vesica &c. solent enim iniqui de summo estu partis afflictae a lingua crassa algere, magna corporis adhaerentia, sicut sententiabilis, delirium,

perigilia &c. Hae LINDANUS.

Notanter dicit LINDANUS, parva sensibile Inflammatione valde sequi Lippiam. Pars enim non valde sensibilis, v. g. Melenterium inflammationum, Febrem quidem etiam Continuum, sed Lentam ferè plus minus inferre solet. Conf. SENNERTUS lib. 2. de febribus cap. 26. pag. 206. Sanè Praxicis experientia cumprimis consentiens est haec Sententia. Sunt & nonnulli, qui etiam primariam Febrem subinde Lippiam esse contendunt, quos inter non tantum est SYLVIVS lib. 1. Pra. cap. 29. §. 31. & 32. PRIMEROSIVS lib. 3. de febribus. 2. p. 264. sed etiam ex omnis liberali usu Praaxicis sagaciorum (Ger. der Rühbiker) eandem eamam, adeoque apparetur Primariam observatam à BORKICHIO in BARTHOLINI Ad. Med. Hippocratis. Vol. 2. pag. 205. Primaria talis, cum ratiocinatio sit, adeoque adhuc nonnulli dubia, & quoad finem rationem adhuc iocitosa, saltem Frigoris ratione ad genus nervorum membranarum undecunque irritatum, refluensurionem verò respectu ad sanguinem in praerogativam Fermentationem concitatum, hincque alterans indiget Spiritus, idque ex super dictis probabilissimè à sui generis Acido, respiciendum erit.

Potèr sunt.

(§. V.)

Febres continue cum prunella.

Dum in Febribus Continuis, imprimis in Causis, si tunc aëri, saepe Linguae & Fauces ardeant, eundemque concurrat Ardor ac Rubor obcurus. Unde tunc temporis simul Linguae quoque non tam arida est illi, sed praeterea etiam crassa non albescente, nec nigricante obdura; colore nigricante puniceo appareat tincta, nigrescentia uti vocant, qui Fauces ac Linguae affectus vulgo vocatur Prunella, Germanis die Braune, & aemulè dilargienda ab Anglia, utut vulgo confundantur. (G) Hae Febres cum Prunella vocatur Febre Hungarica, & non raro solet esse Epidemica: De quibus SYLVIVS lib. 1. Pra. c. 29. §. 26. & 33. Imo dubitant nonnulli, an deus Causas, cui non utrimque conueniunt sit Malignitas? Ipsa Salvis insecta Causa maxima videtur Febrium istarum, quae vocant vulgo die Braune, seu Febrium vitiis Fauces colore concolorantur: dum scilicet ista aëritas, & imprimis max gloriose reddita in Febribus, Mucilaginosis insillat agglutinetur Fauces & Linguae, cum Mucilago pedestem ab aëthi febrili calcinata quasi sit exsiccata, indeque ipsi partibus teneris perquam molesta & hostilis, has irritat & ardescit facit, itat mox Phlogosin seu inflammationem quasi dispositionem acquirant, unde Rubedo, Ardor, Dolor, Muci plus minus ipsi preuocant, tandemque fissurae Fauces & Linguae.

(§. VI.)

Febres colligativae.

Dista etiam hac pertinent: dum scilicet Febres hae Continuas accedit subinde Colligatio Corporis, quae notris in Provinciae sunt frequentissimae, propter colligativae seu colligativae dicuntur: scilicet tales, in quibus Corpus brevis tempore iniquiter consumitur & emaciatur, manum si bald versatam, dum Ros nutritivus chylosus, tum in Massa Sanguinea, quàm in Solidis partibus, dissolvitur & ipsa Pinguedo quasi obtunditur & colliguescit. Acidis hoc, idque creberrime, per Alivum, & tunc vocatur Diarrhoea colligativa, quoniam certo respectu possumus referre ad SYLVIVS Febres caeteras; in qua copia, expletum admodum fortida (qui sicut oleum subducant, adeoque & Pinguedinis pessimum colligativum notat, cum nihil aliud fecere soleat, ac olea seu pingua corrumpt, & ad putredinem vergunt) excrementa: ipsae per sudores, qui vocantur sudores colligativi, qui copiosius minus calidos, interdum plus minus glaciati excrementa: item per Urinam in Urina fauci glaciati, in qua Urina copiosa cum superstante propter dicta Pinguedine effunditur. nunc etiam iniquis in certis Corporis cavitate Humores colligati effluent, quo sensu sem-

(F) Anopura Antropus, & Anopura Antropus, dicitur Febre, in qua exteriora frigunt, interiora uruntur & aëthi non ardeat vixi non dicitur, ut ait Auctoritas, h. e. quod deficit aëthi, sed talis: vero enim est lippia, & vix ignis.

(G) Prunella Praaxicis est Angina, seu Fauces ruber; d Prunella ruber: d Prunella fuit & aliquibus appellatur Brunella d Germanis die Braune: hinc plantam adpressam hanc nomen natus Brunellum appellatur Brunell.

Temper oritur *Hydrops* quidam, qui frequentissimus est in Abdomine & Pedibus, cum superiorum partium Marasmo: nunc vero solo Ardore febrili, sine ulla excretionis le ostendere solet; idque tardius, dum nempe absumitur Ros nutritivus, necessarii Corporis emaciatur. De hac videatur sequens *Febris Hilaris*.

Febris hae Colligativae sunt omnium pessimae & Maximas proximae; quibus tandem in periculoso statu Convulsionis supervenient vel Deliria, & sic intereunt Aegri.

Definiri autem potest haec Febris, quod sit Symptoma Fermentationis Massae Sanguineae auctae, dependens a nimia Acrimonia Fermenti subtilis, unde oritur ootabilis Humorum laudabilium profluvius, omniumque partium pinguium resolutio.

De genere non opus est, ut multa differam.

PARS AFFECTA.

Pars affecta sunt partes totius Corporis Chylis ac pingues: nam reversa impossibile est, ut Os, vel Cartilago, vel Membrana, vel Fibrae in Corpore corruptantur, nisi hoc fiat per Putrefactionem aliquam, v. g. in Carie & Putre; hae etiam omnes Fibrae in singulis angularum venis reperire licet in Cadavere ad extremum maciato; imò, si Fibrae quondam annihilarentur, quæro quomodo possibile sit, ut Patientes tales tabidi sceleratissimi possint exercere omnes Musculos? cum consistit, panta vel compessa una altera Fibra Musculi, alias vegeti facti, aboleri totam actionem Musculi. Interim tamen facili largior, quatenus Succi pingues aptas reddunt Fibras quasvisque in totum expeditori, extenuis destructo Succo pingui pereperire Corpora varia locomoda.

CAUSAE.

Causa Colligationis talis partem in Subiecto patiente seu Succo nutritio chylis roscido, & inde nata Pinguedine, partem in efficiente etiam, consistit: *in patiente* quidem, si Succus iste testatur: rarioris, subtilioris, minusque ab Acido concentratae existit, hinc facilius resoluibilis & attenuabilis deinde esse solet. v. g. Carni aprugnae sub assatione nil omisso, ut plane minimum est, quod defuit; Suis vero domesticis Carui plurimum, eo magis, quo plus Adipe vel Carne abundat, ut loquitur GORRAEUS in *Debita. Medicina* pag. 319.

Texturam autem istam plus minus resoluibilem à certo comente Acido dependere, illustrat Experimentum illud, quo Olea per Spiritum Niteri acidum in Pinguedinis coisulentiam coagulare possumus, dum Alcalia e contra & Saccharum horum coisulentiam debitam penitus inhibent.

Causa efficiens attenuans, & Menstrum instar diffusivum, & hinc sereno vehiculo usque rediens, non est tantummodo Caloris motus, acut hic per liquefactionem deinde Pinguedinis multum valet, sed *Acrimonia spiritus, seu quædam haec Ferment subtilis* peccantis, penetrans, dissolvens, & nutritivum Succum ac Pinguedinem partium Solidarum, cuius coisulatione ab Acido occulto fieri solet, liquefaciens: simili ferè ratione atque acres quasi easdem partesque purgantem, aut Sudores ferentem reformans aerem &c. dissolvere & liquefacere asulent celibitas & roscitas nutritivas particulas; quo *Acrimonia*, ad quam *Acrimonia* classis, aut Aendorum volatilliorum, an Alcalium, an Salsorum, referenda sit, in medio hoc loco relinquo.

Hae etiam facit nimia Succu Bilis Acrimonia, quæ longiore tramite in intestinorum cavitatem influens, Chylum acrem reddat, qui in Massam Sanguineam translatam, eandem cum nutritivo Succo resolvit & colligescit, quæ nimium fermentando, & in sua textura faciendo, per Glandulas intestinales, Pancreas, & Vasa Biliaria excernuntur: unde frequentissimum Febris Colligativae Symptoma, *Diarrhoea* oritur; sentit & ipse huiusmodi talibus Cadaveribus Felis Veticulum plene exanimatum, & ad instar solli florum Papaveris tenuem observari.

Si verò nulla oritur Humorum extravasatio, oritur deum Sodor, qui tamen usque plurimum concomitatur & Diarrhoeam & Hydropem: quapropter, ubi Sodor Diarrhoeam & Hydropem non levat, res est maxime desperata.

Causa rarioris Febris Colligativae potest esse variæ. Imprimis autem ex rebus Non-naturalibus, multum hic valet Aeris constitutio Epileptica. Quod Potum; mirum in modum promovet Febrim Colligativam largior & fre-

Tom. II.

quentior Potus Spiritus Vini, qui depravando fermentum Ventriculi, adauget per oleositatem suam, siue volatili copioso turgidum, sal volatile oleum Bilis, eamque reddit acrem: quare ut plurimum eius potatores strenui tandem mortem opprunt ea Febre Colligativa. Idem eundem est de Fumo Tabaci nimium frequenter & copiose. Ex haustu nimio Aquæ frigidae, corpore prius nimium commoto, Febrim Colligativam fere aliquando contrahit juvenis 18. annorum. Quoad Alimenta: facile possunt ad febrim Colligativam dispoñi, nimium quantum, appetentes Aromata.

Ex rebus Præternaturalibus est Scorbutus, qui raro Patientem occidit abique Colligatione, imprimis si Patientis erit ætate provecus. Febris aliquando Colligativa ea Cancro Mammarum eum Diarrhoea observata est.

Colligativa enim hæc febris, ubi eum sensibili Excretionis est conjuncta, facili ter manifestat, & suam Causam prodit. Verum, ubi sine tali sensibili Excretionis subit Corpus quasi facit & colligescit, signum est Massæ Sanguineae admodum acris, ineptæ ad nutriendum; unde Pinguedo & Ros nutritivus partium Solidarum colligescit, nunc sensibilibus mediante Sero, nunc insensibilibus Halituum forma, foras succellit excrevit.

Diffingenda autem sunt hic, leota Emaciatia, in febris, ab eo, quod nos dicimus, Collapsus, in specie Fæmi, hinc autem a Colligatione, & hinc subiectione Emaciatione oritur. Hæc vesica spirituum influens deest, aut saltem deficiente vi elastica, & fibras & flamma partium in debito tono, & hinc intersticia porosa in debita dilatatione pro fluidorum quorumvis facilitate transmissio, debentem oritur. Hæc igitur vi cessante, vel ob Spirituum absolutam paucitatem, vel æquidem viam, cum constitutionem, vel denegatis plus minus eorum influxum, partes molles, præsertim faciei, colli, Nafis, acuminari, Tempora sacvari; Oculorum orbem profundiores apparere incipiunt, & in substantia Syncope correptis, aut Facie Hippocratica deformibus, manifestum est.

Ut itaque Colligatio subitanea neque hominū signum esse solet, pessimum tamen semper indicium est illa insidiosa partium mollium substantia, quæ unquam in Principio Morborum, hinc in eorum Progressu, interdum horum spatio contingere observatur, Spirituum influentium affectum gravem omnino innotens. Glutinosus Sodor est pessimus, in specie in Febris Malignis; ab Acido enim hic assimilatio Alimentis, hoc si destruitur ab Acri volatili, veniunt inde Sudores Colligativi, quatenus non potest assimilari Alimentum, hinc & in talibus Febris decedunt Pili ob illos denegatos Nutrimenta: vid. GARMANNUS de *Africani Mortuorum*, ubi habet de Pilis, quod sine quâ Vegetabilis.

Febris Febris Continuis & Continens hinc sequis supervenit Delirium, quod non leve, quod in Intermittentibus Scorbutis interdum observari est de grave, & ad favorem subinde Aegros disponens; idque nunc rarius, nunc tardius superveniens, & adstantes insigniter turbans. Hæc

(§. VII.)

Febris Ardentis Delira.

UTi vocant, vulgo *Morbus Capitis*, non raro sunt Epileptici; antequam soleant Vigiliæ peritissae, subinde Cephalicæ crudeliter, sequuntur vix conjuncta hæc Symptomata; tandem Convulsionem epilepticam.

Fat hoc, quando partem est Fermentum febrile, ut plurimum tamen maligno, speciatim ipsi Spiritibus animalibus, & hinc generi Nervos, circa interiores Capitis partes joimico; partem alioquin textura viciatur, adeoque motus debitus pervertitur, & genus Nervosum coctio vellicatur (unde intensior circa Frontem, quam alias Corporis partes, Aëus percipitur), partem ex calefacto per Sanguinem fortiter effervescentem Cerebro, Spiritibusque animalibus fervidioribus redditus, hic ipsi in Cerebro & Cerebelli inordinatè moventur & agitantur: hinc enim occasione tam perverti, quam continuat & inordinatè motus, Inquietudo, infliges Capitis Dolores, Vigiliæ peritissae, hinc gravia Deliria, & tandem Convulsiones superveniunt, quæ interitum Aegros.

Apud Veteres Scripsores Prædictis & horum Interpretes, plures adhuc Febris Acutarum Differentiæ annotantur, v. g.

Febris Pemphigodes.

L Atiōe *Ampullosa* dicta, (H) in qua tam Facies & Os, quam Caput & aliae partes Corporis, Bullis & Bullulis hinc inde protuberantibus interstinctis observantur; cujus notabile Exemplum videtur in M. A. N. C. Ann. 3. Observat. 56. pag. 93. & ZACUTO LUSITANO Prax. Admir. Observat. 17. Qualis tamen Bullularum elevatio & interstinctio potius Fermenti maligni cuiusdam, Cautico quasi Naturae motu, eum fove vehiculo ad instar Variolarum exclusi, effectus esse videtur.

(§. IX.)

Febris Typhodes, (I) item Helodes, (K) item Hydodes,

L Atiōis *Sudorifica* dicta est, in quibus statim primo die Aegri copiose sudant; Sudore ipso parum aut nihil allevante (quod aut eundem fuerint cum *Sudore Anglie*, ut asserit LANGIUS *Epist. 19. lib. 1.* dubitare licet) sive Colligativus, sive non, fuerit talis Sodor: illius, nempe Colligativi, Theoria ex supra dictis; huius verò aliquo modo mutanda ex SYLVIO *lib. 1. Prax. cap. 30. §. 49. & 114.* item *cap. 58.* intelligi potest.

(§. X.)

Febris, Afades dicta, seu Anxiosa.

Quando Aegri Anxietatis Cordis patiuntur, in qua ob Anxietates Aegri, decubitus eandem non ferentes, figuram jacendi serpilis variant, adeoque in lecto se jactant.

C A U S A.

Inter omnes Anxietatis Causas frequentissima est *per generalis afflicta*, quando nempe vel ad malignum quoddam Fermentum, vel à pravis, aut paucis, Humoribus, equi tunicis immeris, mordetur seu irascitur, vel ipsam in Intestina, in specie in tenuibus, flagrantibus, vel ad Stomachum delati, sub nomine Bilis porcosae contra Symptomata facient: Hinc Vomitoria in principio harum Februm instituta sunt optima. Praeter hanc tamen vel à *visu* intentionis, vel Organis materis ejusdem, vel Malignitas infirior, vel Imbecillitas in causa esse solet: de quibus in specie vid. STEPHANUS RODERICUS CASTREN-
SIS *lib. 1. cap. 21. Tract. Quæ ex Quibus.*

(H) Πυριγγώδης, vel πυριγγώδης Febris (alii πυριγγώδης, vel πυριγγώδης), de qua Hippocrates 6. epidem. 1. 29. *obscuram sanæ significationem habet.* Galenus in comm. interpretatur primo, Febrim spiritibus affluente: non aut eam esse, in qua tangenti manus spiritum quandam ex ætæratu corpore existentem, nunquam habentem, nonnullam ardem percipi: deinde post expostas varias vocabuli, πυριγγώδης, significaciones, ex Sophocle, Æschilo, Callimacho aliisque poëtas, docet Pemphigodes Febris eas esse intelligendas, quæ veluti semillares exhibentur, manuumque nostra circumsarum, imaginem reddunt; atque huiusmodi Febres ex duabus simplicibus compositas esse, scilicet, Flatulenti, acque Ignis. Reverà quoniam vulgaris vocabuli, πυριγγώδης, significatio sit, Flatus: hinc vulgus Pemphigodem Febrim, Flatulentam & Ampullosam interpretatur: eam nempe ferentem Pusculas vel Ampullos, magnos calore plenas, quibus universi Cutis desordatur, praefere. Quod sanè congruit verbis illis, quæ in aliquibus Hippocraticis criticibus C. 1. post πυριγγώδης leguntur, nempe *ἵλας ἴσχυς, ἢ ε. aspectus horrendi; & horrendum enim visu est, Febricitantis corpus multisque pusculis, scilicetque ampullis nudique commutari.*

(I) Tamen apud Hippocratem morbum significat, quem nesci quid ratione Stuporem attonitum interpretantur. Uti plures recentj species idem A. de internis affect. num. 42. & 43. atque singulariter cursum nimis depressum symptomata, & curandi modum. Quoniam autem πυριγγώδης sumum significat, ferentem iactantiam, ostentationem, fastum, insolentiam; curandi modum. Quoniam autem πυριγγώδης sumum significat, ferentem iactantiam, ostentationem, fastum, insolentiam; curandi modum.

(K) Ελαί est palus: unde ferre *ελαιώδης* appellatur Febris, quæ corripit ab prima statim die hanc Sane perferendam, quasi in palude vel lacu jaeretur. Sanè Febris Maligna de Colligativorum genere est Helodes, quam Sado-rem Anglicum cum Recensioribus appellat hic. A. Quoniam cum Typhode confunderi voluit, ut rectè, videant ubi, Reliqui Helotes Febris eadem est ac Hydodes, sanè ab *ἑλῶς*, Aqua, originem haberi; Febris enim est, quæ ex copio-
sum saltem, Aquosa dici potest.

(L) Ἄσος Fastidium ab *ἄσῳ*, satio, expleo quare Ase propriè dicitur fastidium satietatem consequenti: sicut de Pica Gravidarum intelligitur: Arcurus, *ἄσος* est, seu, labor multus, exoritur. Pusgo Anxietas audit, seu molestia & fastidium circa Cerebrum & Stomachum, quæ sapienter assignatur febricitantibus, ut nesciam loco stare. Quare Alo-
des Febris dicenda. Iam hoc præcipuè symptomata *Αγρευται* arguent.

(M) Δύτης, & Δύτης, Singultus, ad *δύς* Singultus: hinc Febris Lyngodes, Singultu commota.

(N) Φοβία propriè est Horror, & peculiariter Horror febrilis: à *φοβή*, fluctum fremitum. Febris Phricor-
deas seu Horrificas, Praeterea quidem, ad libidinem consilio vocabulo, Querqueras appellant.

(§. XI.)

Febris Lyngodes, ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΤΤΙΩΔΗΣ, seu Singultiva. (M)

T Alis est Febris, in qua *Singultus* cum Febre permanet, vel cum Febre per totum Morbum simul exacerbatur, Exemplum vid. in M. A. N. C. Ann. 4. Observat. 48. pag. 42. Ut plurimum est ex Ventriculo, sive per eustachiam, sive per consensum affecto.

Cujus Curam Carminativa, Castoreis, Cinnamonis, & Opistis. Sic HORSTIUS *lib. 1. de Febr. Obscrv. 25.* Laudat Opisti gr. liij. cum pauisillo Theriacis & Confer-
væ Rosarum cum succosib exhibuit; item applicavit Cucur-
bitam scarificatam super os Ventriculi.

(§. XII.)

Febris Phricodes, ΠΥΡΕΤΟΣ ΦΡΙΚΩΔΗΣ, seu Horrificas, (N)

CUI in toto Morbi cursu crebri Horrores & Rigores super-
perveniant, quales non solum in Suppurationis
partium internarum, sed etiam Febrilibus Compositis interdum
supervenerit solent: de quibus omnibus, me sciam agam,
vid. STEPHANUS RODERICUS CASTRO citato
loco, nempe *Quæ ex Quibus lib. 1. cap. 18. 19. 20. &c.*
Conferatur etiam ZACUTUS LUSITANUS, qui et
earum Historiam & Observationes pertractat in *Medicorum
Principum Histor. & Praxi Admiranda.* Plura Sympto-
mata, eorumque distinctionem, Historiam etiam harum
Februm exaltatorem, videb. in SYLVIO *lib. 1. Prax. cap.
19. item cap. 31.* ubi præter Historiam Morbi indicit.
Hoc potandum in SYLVII lectione: quod simul una vice
trahet Febris Biliosa & Lymphatica; non verò seorsim
illa tractamus.

Inter Febres Compositas pilis minus acutas primariam
sibi considerationem meretur.

(§. XIII.)

Febris Semitertiana, seu Hemipterica.

DE qua tamen variantes sunt Authorum Sententia, cu-
jus discrepantia, præter generalem Febrim Theo-
riam admodum intricatam, hæc tere est origo, vel nimia
Veterum veneratio, & in idem defendendi studium, vel non
rite observata multiplex tam Compositi Februm
mutas, quam Complicationis earum cum aliis Affectibus
varietas. Pulcherrima de Semitertiana ferè Sententia, esse
eam compositam ex duabus Febribus, Tertiana, & Quoti-
diana, quarum una fit Continua Periodica, altera verò
Intermittens, in qua ipsa, quoniam sub quovis Paro-
xyismi insultu Horror pilis minus perceptibilis sit, ob
id

id & Morbificam seu Phricodem hanc febrem vocat. *Præter* afferunt. Talis Semitertiana typum ac intermittente Quotidianam cum tertiana exhibet REGIUS in suis differentiis. Vir quidam robustus incidit matutino tempore in Horrorem totius corporis, quem infuscatus est calor multus, pulsus celer & creber percipitur durus; sub vespem ipsam eundem die lassus refrigerat totius corporis, post quam sequatur pulsus pulso infrequenter & celerior. Sequenti die calore illo perpetuo, & pulsu celeri ac crebro durante, leve frigus incipit, & calorque deinde incrementum, & pulsus increscit. Tertio die rursus mane exhorruit; & deinde incipit, & vespere remittente frigore, rursus incrementum calor. Quarto vero die leviter sub vespem rursus perpessus frigore incaluit, & pulsus increbuit.

Semitertiana vero composita ex Tertiana intermittente & Quotidianâ continua vid. in TIM. E. O. LIB. 1. c. 21. & 22. pag. 167. & sequ. Conferatur etiam HORSTIUS lib. 1. observ. 14. item RIVIERIUS in observ. de Morbis infrequentibus observ. 23. Sic Hemitertiana ex continua Quotidianâ, & quadruplici Tertiana vid. in RIVIERO centur. 4. observ. 23. Sic Hemitritarum ex continua minis acuta, & duplici Tertiana cum lingua vehementi, & Tumore in sinistro Hypochondrio, observavit PLATERIUS lib. 2. observ. 1. p. 312. SENNERTUS hinc duobus modis, & alium Semitertianæ typum addit, nempe illam, quæ ex intermittente, præsertim Tertiana, vel simplici vel multiplici, conjuncta cum febre symptomatice continua, inflammationem partis cujusdam interne insequente oritur, periusus ad hoc ipsum, speciatim per observationes SPIGELII in tract. de Semitertiana; v. gr. refert SPIGELIUS se in Juvene quodam Belgæ ex dylectetia in febrem Tertianam lapsu, & mortuo, per Anatomiam ejus inspectione factâ, intestina tenuia inflammata, illum vero Spasmo corruptum, ubi adheret Colo, & Ceco, invenisse. Confer. de hoc pluribus SENNERTUS lib. 2. de febribus cap. 31. pag. 323.

Observandum alterius hic occurrit: non raris febrem malignam esse, quæ Semitertianam typum refert; vel quia intermittente Tertianæ quocunque modo complicatur; vel quia ipsa Maligna vagu nonnulli exacerbationis moris Semitertianæ talis typum præsentat: Ob id FORESTUS lib. 5. observ. 14. & 16. Semitertianam has febri aliter, grassantibus febribus malignis, & Pellentibus. Nec refragatur SPIGELIUS cit. loco, qui tempore Pellis hanc febrem frequentissimam esse aliter; unde & SCHENCKIUS lib. 5. observat. Hemitritarum Pellentem pluribus describit. Quo facit & Hemitritarum malignum Bernardi curatus: vid. RIVIERIUS centur. 4. observ. 56.

PIENS de febribus lib. 2. pag. 283. complicationem istam minis admittit, sed Semitertianam illi aliâ esse aliter, quam febrem continuam Horrificam seu Phricodem cum multis rigoribus insequentem, vel plures intermittentes sibi invicem succedentes, & quæ substantantes: id quod libidine evenire omnino posse, probabiliter arbitror.

Observandum & hoc: uti male curatæ quæcumque ex causa Febres intermittentes in continuas Lentas facili degenerant, ita & tali Lentæ ipsi intermittentes complicata. Hemitritæ ita facili referre possunt: Sic enim Tertianam intermittentem exquisitam mutatur in Semitertianam refert FORESTUS lib. 5. observ. 13. & 16., & febrem Lentam tandem mutatur in Hemitritarum; item FORESTUS observ. 14. lib. 5. refert.

Sed omnes modo enumeratæ, & observatæ complicationes, & alia plures, ut facili fieri possunt, ita & Hemitritarum in genere se aliâ typum omnino plis minis variare, necesse est. Nempe si typum Pathognomicum interitalem sero esse solet, quando febres continuo quidem affligit, sed cum succedentibus rigoribus crebrioribus aut horribioribus, ubi rigores cum insequente intensiore aestu, Tumoribus, horrore vero, aut saltem perfrigeratio, cum mitiore incallescere, & Quotidianas febres intermittentes typum consiluisse dicitur. Jam ex superioribus patet, serentum acidum, assiduum quod vis acre, membrarum genus vellicum, horrores, & rigoris, item missam sanguinem iniquas, affluatibus occasionem suggerere. Quibus peremptis, de facili multiplicis typi, & complicationis Lentarum acutarum intermittentium primariarum, secundariarum, malignarum &c. in subleto patiente ratione Crisios partium concertatur, & constitutionis partium solida cum plis minis variantum, & modi, & hinc differentia pascunt; adeo ut uni cuidam certæ complicationis generi minis non præcise applicare debeamus. V. g. Semitertianam cum Variolis observavit SPIGELIUS de Semitribus, lib. 2. cap. 16. Nullis dubio, recurrentes apparent cum horroribus aut rigoribus Paratyphos al-

acri Variolarum fermento, partes membranæ vellicatæ; & in sanguine affluente, acedisse, & ita in subleto patiente ratione specialis contentorum infusoriarum quæ typum quandam repræsentasse. Pariter FORESTUS lib. 5. observat. 22. Febris horrida mentionem facit, cui accessit Erysipelas. Horrores hi non à speciali febri typus, sed ab acido Erysipelatis, vellicatæ subinde membranaceæ partes, occupant habuerunt.

Pro meliore compositionis talium febrium, imprimis notabilis est locus SENNERTI de febribus lib. 1. cap. 22. pag. 320., dum dicit: Imprimis compari oportet redius rigoris, horrores aut frigoris post epi: quiescent. Quod si plane tenentur, & simpliciter videatur febres, attendendum, an post plures sudores infrequenter? Nam si in Febre, quæ continua videtur, rigor fiat, & sudor non infrequenter, aut sero post plures rigores unus sudor, signum est febrem istam non esse simplicem, sed complicatam: Nam in Synocha rigor non apparet, nisi Crisi tempore, quam sudor sequitur. Deinde etiam pulsus febres compari: Adsum ex hoc: Nam quæcumque febres quædam continas videntur, si tamen sapienti fiat pulsus contrarius, illi avari paratyphi, musculique matris non indicium est.

§. XIV.

Diagnosi Februm Acutarum.

Signa febrium continuarum acutarum *Diagnosica* sunt facillima: Nam in genere calor intensus admodum, & sitis insolenter acuta, seu sero intolerabilis, sunt signum quasi Pathognomicum Febris ardens seu Causi; five sit febris ardens ac genere continens; five ac genere Tertianarum continuarum Periodicarum, petendo est. Incipit hæc febris primis post præcedentem aliquæ diem lassitudinem, & aliqualem capitis perturbationem, cum frigore, & rigore plus minus intensio, quæ quidam in principio harum febrium dependere videtur ex eo, quod ingruente febrili effervescencia, dum turgescere incipit Sal ejus volatile oleosum, hoc adhauc Acidis concurrente nonnulli impeditur, (nam in omni fermentatione acidum, & alcali præsuppono,) quin, & quodammodo adhuc subigitur, aut saltem in æquali proportionem detinetur, antequam effervescencia febrilem concipere possit: sub qua illa dum turbatur massa sanguinea, calor ordinarius nonnulli deficit, & ab acido in partibus necesse horrores aut rigoris febri inferitur: qui tamen non diu durat, quam superato tandem acido à Sale volatili oleo, hora una vel altera, immediatè insequitur incallescere ac æstus ingens totius corporis, ipsæ continuæ, eodem die persistens, vel similiter accrescens, vel similiter decrescens, usque ad finem status, sitis, Cephalalgia, & reliqua ex ordine symptomata.

Pulsus præterea semper deprehenditur frequens, celer, & in benignis magnus, qui semper bonus; inquit enim qualem consensum salum in corpore, & consequenter landabilem sanguinis statum. Si vero malignitas lubell, est celer & frequens, interdum inæqualis: in omni febre continua pulsus est celer & frequens pulsus. Nam Paradoxum est, statuere pulsum magnam in febre maligna; & paradoxum etiam, statuere in febre benigna parvum. Similis ferè celer, & frequens est pulsus, quem omnes in nobis ipsis percipiunt, dum ab insigni exercitio, aut vehementi motu nimis, concurrente insubili animi pathemate, v. g. ex fuga, ea imminente malo &c., Corpus incaluit. Vehemens est plis minus, pro virum cordis, à quibus dependet motus, vario robore, & calor quod est interior, magnumque sequitur Ebulitionem, et celerius & frequentius vibratur arteria.

Calor est iocundus admodum in his febribus, & vocatur, *Exuberans*, i. e. quando manu tangimus ægrum sub iocundo æstu, quasi subillis Mador percipi videtur. Et quidem, ubi massa sanguinea videtur magis temperata, & minis acris salina, calor est blandior; ubi vero eundem est magis salina, solet percipi simul acris nonnulli, & quodammodo simul morficant. Trina in incremento febrium intus est crassa, rubra, & succellivè turbida, apaca, cum enormitate in principio sine sedimento, cruda, aut saltem leviter cocta: in statu vero capiti admodum, & vasie sedimenta in fundum matule secedunt, quæ codionis signa exhibent, & ardorem significant; ideo etiam in coctione, & cruditate materiam morficant, & consequenter de salute, & morte, prognosis insiluitur: Probè igitur attendenda sunt urinae mutationes pro meliore prognosi.

Observandum tamen, quod quæ magis sudant ægri, ed minor sedimenti copia exinde solet in urina provenire: sicut etiam eorum urina, qui sunt constitutionis Biliosioris, ut vocant, aut qui laborant Scorbuto, aut qui inclinant ad Phibi-

Phlegmā, etiam levi Febricula intensē rubescunt, ob acritē, & acidiora plūs minus salia matiam sanguineam talium ingredientia: econtrā vero, quorū massa sanguinea est magis temperata plūs diutā, aut copiosā lymphā, aut succo dulci nutritio chylosa, eorum urinae minus iteasē, ceteris paribus, tingi solent, & crassiores, illarū verō tenuiores, obfervantur: hinc & pariter in illa naturaliter celeriores, & frequentiores, in his rariiores, & tardiores pulsus obfervari solent. Semper igitur Idiosyncrasia subiecti simul consideranda.

Si Urina in statu est tenuis, pessimum signum est.

Si Urina prava densa, crassa aut opaca, & subitē intensē tenuis, portendit Deliria, Jelligitiones, Anxiates, & ut plurimum Mortem.

Uris affligit intensā: saliva pauca, etque glutinosa obfervatur; Tussis, & insignes Cephalalgia, quas comitantur Agrypnia, ut plurimum juncta esse solent.

Si vero febris continua periodica fuerit, accensum typum exacerbationis eadem sepius prodit, an sit Tertiana, Quotidiana, an Quartana imo obfervare etiam fuerunt Tertianæ continuæ duplices: Vid. POTERIUS s. 2. not. 4. de duplici nempe tertiana, enotata à Falgure palatium inveniente, & quā de PANAROLLUS l. a. obfervat tertianam duplicatam continuam cum quintana lethalī complicatā.

Pergit tali cursu hæc febris, donec solvantur: id quod fit vel subitanea crisi, vel successiva ¹⁰⁰⁰ (O). Illa nonnisi in his Febrilibus accidere solet, idque frequentius in calidioribus Climatibus, & generosiore Vita Potione utentibus, & quidem vel die 7. vel 14. vel 21. &c. Rarissimaque nos, in specie eod. Alterantibus, Abstergentibus, & Diaphoreticis Crili subinde prævenimus: semper tamen, & necessariū motus Naturæ probè attendatur, ne eandem impediamus. ¹⁰⁰⁰ verò potenterem solvitur, dum cocta Materia, v. gr. per successivam urinæ excretionem, vel per sudores nocturnos erebris repentes, successivè excluditur. Quo etiam facit, quod eadem, præsertim plūs minus Acuta, solvantur per copiosam Expectorationem, Excretionem, & excretionem cum mediocri Tussi; sicut præsertim in Petechialibus copiosa na sanibus excretio, & quæ Pyralisima Morbum solvit: interdum successivè abscedit quodam in loco supervenit, &c. Nempe & ad hoc hæc in Febrilibus successivam excretionem materię mobilis inquit, Criles cum vi viant, tamen excretionis vel translationis materię coctæ fiat necesse est, nisi in lentum, aut hæcilem similem Acuta hæc Febris degeneret, aut ea materię coctæ, sed non debet, h. e. non sufficiens in salum mutare, eod. hæc, renortat fermentat: tunc impetu, recidiva sequatur.

In febre Colligativa totum corpus languet, notabiles adfuit Exacerbationes, sive per sudorem, sive per urinam, sive per alium, sive in certa cavitate colligetur.

Urina est rufa & gravis: precipitata verò monstrat copiosissimam sedimentum, in superficie autem ut plurimum pugnemum aliquam habere.

§. XV.

PROGNOSIS

Febrim Acutam.

Febris vel continua; vel continua Tertiana Periodica, seu acuta, sunt ambigui exitus: per se quidem minus periculosæ sunt, sed potius per se salutares, de facili tamen periculum superveit.

Has sunt periculosæ, quæ mor in principio, uti dicunt, ¹⁰⁰⁰ habent laborēs (est formula loquendi HIPPOCRATIS) usitata), hoc est, quæ nimis sunt acutæ, & ubi symptomata atrociora confertim, maxime circa regionem stomachi, confluerint ac mor in principio ingruent, & ad finem pergunt, quod universale est in omnibus febribus ardentibus.

Subitæ enim alleviati in Morbis Acutioribus est pessimus aciehallis: sic Medici non raro decipiuntur, nescientes, quid sit extremas Naturæ conatus? Vid. LANGIUS in M. C. pag. 143.

Quo mitiora Pathemata sunt circa primas vias, & regionem stomachicalem, eod. mitior, & salubrior est febris; ubi autem urget Nausea, adeit Anxiates præcordiorum, Cardialgia, & Diaphoretica, imprimis ubi adeit Colligatio

corporis, affectum plūs minus periculosum innunt; nam illæ proximè accedunt ad febres Malignas: Unde quævis Maligna Acute periculosa censenda sunt.

Probè autem attendendum, an in principio talis febris addit diarrhæa colligativa? an verò symptomatice?

Deinde cum febribus continuis ardentibus quibuscunque sepius complicatur Maligna, reddens tales febres admodum periculosas.

In febribus ardentibus benignis ¹⁰⁰⁰ est optimum signum, sive in principio sit, sive in statu; innuit enim valorem naturæ.

Uterius ¹⁰⁰⁰ alibi in principio magnus, vires dissolvens, aut ea materia insigniter corrupta indeque admodum fetens, periculosus est, & interdum mortem minatur; est enim colligativus, & simpliciter symptomaticus: si verò sine insigni virium labe contingat, & æqualiquid levancia percipit, non adeo est periculosus.

Sed autem colligativus, ita ut in habitu Corporis ægri post sudorem reperitur Sabulum, vel nondumque etiam in lecto Sabulum rufum, aliquoties obfervata est Caratio talium febrium.

Urina, quætenus subministrat signa Colligati, & Graviditatis, quod citius exhibet Signa Colligati, tutius est Afflictus.

Urina alba, aut pallida, & admodum eruda, in amellis febribus ardentibus admodum periculosa est, & plerumque mortem portendit.

Urina alba, tenuis, & clara, in febre continua ardente cum Desirio, lethale est signum, præter imminentes convulsiones.

Quanto urina rubicundior est in initio, tanto citius terminetur, cum signis bonis ad bonum, cum malis ad malum.

Illæ febres continuæ ardentes, quæ nullius evidentiam causæ vi, sed in corporis, & animi quiete præter expectationem exarcentur, graviores multo sunt, & periculosiores, quam quæ prægressum habent causam evidentem, v. gr. Motum corporis, æstus Solis, &c.

Quæ lethales futuræ sunt, vix in dies magis prosperant circa ullam criticam Evacuationem, aut si quidem exarcentur de minime decreto, naturæ satisfecisse vix exhibet.

In omni febre ardente semper adspicienda est Lingua, an sit humida, an vero aspera & arida, aut nigra, aut biffa, livida, & mucosa, vel alio modo vitiosè constituta, adeoque Prussella imminet: quod magis enim Lingua à statu naturali ad distas qualitates præternaturales declinat, eo gravius æstus interius, eo quo periculosior innuitur febris; quod autem humidior, & rubicundior naturaliter est linguis, eo melior spes affligit in omni febre ardente.

Quod ¹⁰⁰⁰ transiens evanescit: Febris Ardens Acuta circa septimum interdum, interdum circa decimum quartum finitur apud nos, quod & ad so. extendi solet; sæpe, ubi sunt magis acutæ, intra diem quartum solvitur; quæ in aliis regionibus ordinario septimo terminantur; rarius ad decimum quartum extenduntur. Unde in æstus HIPPOCRATIS, & prædictorum obfervatis, Regionum ac aliarum circumstantiarum probè habenda est ratio. Quando talia in principii morbi rubicundior, crassior, & magis vel minus turbida se exhibet, tanto citius terminantur hæc febres: unde si quarta die signa Colligati evidentia apparent, terminantur ferè de septimo; si verò conspicuntur talia signa septimo die, terminantur undecimo vel decimo quarto: Nam in Acutis imprimis obfervanda est Crisis. Facies turgida & subumida morbi longitudinem pronunciat, & secundum signa Colligati subinde citius vel tardius finitur.

Hæc Febris Acuta Continens vel à Natura curantur, vel Arte, & terminantur præfati vel ad Sanitatem, aut mortem, vel interitum. Præter exitum, & quidem præfati, fit, quando aut per Crisim substantiam, aut in successivam convalescentiam ægri, de quo supra: fit minus, invalescente quotidie febre, Agrypnia, Deliria; Convulsiones, &c. superveniunt, hinc morbi terminum ducit lineam. Fit autem Crisis, quando Natura lenient ad utilibus instilla, & præparat ad excretionem. Veritur enim Crisis in terminis eruditæ, & colligati; sequitur nulla Crisi solutari, nisi peracta exortione, speranda est. Natura noxia illa inquinamenta, sive separata, sive separanda, veniunt.

(O) Adverbiū sibi solvo, quasi Solutio; verbi significatio est quod Hippocratem & Galenum. His Lysis finitur prout apponitur Crisis: quoniam enim Crisi dicitur solutio morbi indicatur, Lysis contra significat finem morbi soluturum sibi esse constitutum.

medei rationem habentia, per varia loca expellit: Hinc *typhosa* circa Labia & Nares erumpentibus febribus defluit: quia ad Nalium plures Venae & Arteriae visum effugientes abeunt: & quia Labia peculiari sui generis raro & spongioso parenchymate consistit, vel sola Epidermide, vel haud densa Cure involta, per quae fermentum febri facili expelli potest. KERGERUS de *Fermentatione* pag. 239. plura habet: unde omnia remittunt Accidentia, & nihil soluit praeter aliqualem Virium debilitatem. Interdum per Crin fermentum febri ad ambum Corporis protrahitur, & Febris *delinens* *strobis* excitatur, quae propterea etiam, si ad interiora recedat, Recidivam parit.

Si vero *superflua* fuerit, obstruendum est, ut docet FERNELIUS *lib. de Febricis* cap. 10., Tertianam distorant atque Quartanam in atrocem cruciatum Colico immaniore delinens, qui nonnumquam & in Articulorum Dolores, & in Paralysin faciliat. Atque hic Dolores tamen consueti Accessionis tempore ferè evacuatur, priusquam circuitum retineat.

Observevit & BARTHOLINUS *Caus. 3. Aether. Anat. 50. pag. 100.* Dolores Ventriculi & Nauseam post febrem per vices soliti Paroxysmi diebus, solidae febri hora, multum amplius febri Calore insensare, quos Abhergentibus Medicinis, Julculis citatis & aëreosis reparavit. Fit hoc, quando abusu nimio Precipitantium seu Aborbentium Eorum superimittit impetus fermentatus Humorum & spirituum febrilis, unde Natura fermentum febrile non ex toto Corpore evacuare valet, sed fixato in tantum Acido morbofo, imperfecta Crisi ad Intestina vel Ventriculum transponit, & Recidiva aptitudinem periculofam denuo infurgit, & febris Acuta in Lentam, Hefticam similem mutatur.

Dum per Crin finitur, in nostro Climate quidem ratius, in locis autem calidioribus, Gallia & Italia, ordinario per Hemorrhagiam Narium criticam, rariis per sanguinis evacuationem per alia loca, solvitur: interdum etiam sudore critico, interdum Alvi fluxu critico, interdum Urinae excretionem, terminari notat. Exemplum sudoris critici post febrem talem Ardentem soluti dignum habet HILDANUS C. 6. *Observ. 77.* de quodam Viro robusto cum ardentissima & continua febre constitente, qui septimo die in sudorem adeo flavum incidit, ac si Croco tinctus esset, & quidem copiosissimum, ut coctura subcubica Aqua uberius extillaret, & linteamina omnia croceo colore insisteret. Exemplum vero Crises per Hemorrhagiam singulare habet ZACUTUS LUSITANUS *lib. 1. Prax. Aether. Observ. 16.* de febre Ardente ingenti per sanguinem copiosum fluxu ex Venula Gingivae interioris curatam, & criticam solutam.

Hæmorrhagia ut plurimum fit per Nares; hic ædem facta sunt per radices Dentium: non secus æque *lib. 3. Prax. Aether. Observ. 10.* observe hæmorrhagiam criticam per porum iuxta radicem Pollicis Pedis dextri, in interna parte iuxta apertum. Quin & idem ZACUTUS LUSITANUS Crin febri Ardentis per ipsum Sanguinem observat, *l. 2. Prax. Aether. cap. 6. Observ. 4.*

Curiosum est, quod refert PLATERUS *l. 1. cap. 16.* dum Delirans in febre Ardente Usorem per vim comprimimus, quæ extinguitur: Usor vero mox quoque eodem modo correptus à febre quidem sanata est, Mens tamen usquam ferè consistit.

Aphorismi HIPPOCRATIS 62. Sect. 4. non semper est verus: Viâ HORSTIUS *lib. 1. Observ. 10.* ubi Icterus solutus quarta die in Continua Febre obvenit.

Hæmorrhagiam Narium subinde precedere solet thnatus Aurium: in sanguine nempe turgesciente febrili est motu vehementiore Arteriarum, & sanguis in locis vicinis flagante, & Aurum interiore movente.

Signa locorum, per quæ contingit Crisi, videbitis in *definitionibus*: interm verum est Effatum HELMONTII de *Temper. No. 51. pag. 509.* Medicum debere negligere Crisim, quia prævenire solent melius fit. Verissimum hoc est, qui potest prævenire universalioribus & subtilioribus Remediis, faciat, mox in Principio vim Causæ occasionalis, seu fermenti morbofo evacuando, & Naturæ turbatae impetum sistendo. Verum eum hoc non in omnibus licitum sit, & generosum Remedium negotium hoc præsupponat, patiens Medicus sit Naturæ maiestati, & expectet Crisim, quam ut Naturam præstare turbet, legitimis Remediis illi succurrendo.

§. XVI

CURA

Acutarum Februm.

IN Cura harum Februm Acutarum & Continuarum Periodicarum, si unquam aliæ, Medicus sit Naturæ minist-

ter: cum enim deparetur Massa Sanguinea in iidem, adeoque fiat Sanguinis febrilis Turgescencia, ob Naturæ cupidam heterogeneam, ipsiusque Naturæ aversas secretionem, ut eius Cœlio & hinc Crises testantur, manifestum evadit, Indicationes geniales & veras in eo versari, ut sanguinis præternaturalis fermentatio iatra modum Naturæ propolitus conservetur, & sanguinum ratione, ut nec hinc plis æquo glicat seu intendatur, unde periculosa Symptomata inlequi solent, nec illius animus torquet finis deficiat, quia ratione Materiam Cœlio & Excretion impeditur, ac faciliè Lenta Chronica Febrilis dubii eventus impervient, ut patet loquitur SYDENHAM *Tract. Methodus curandi Febriles* *lib. 1. cap. 4. p. 12.*

Cura igitur febrium talium cum à sola fiat Natura, hoc saltem Medicis officium, ut illas, amicum debitis moderetur & adjuvet. Ante omnia ergo

1. Naturæ remedium sumus ex primis viis, qui consistit in Crisim, ac Chilo vitato, & si bile præternaturali corrupto, genitis.
2. Corrigitur *ab* Dyscrasia Massa Sanguinea, unde oritur febris Crispata, temperando & alterando sal volatile acre urinum plis minus oleosum, vulgo Bilem, & c. fermentum febrile, cuiusque Acrimoniam plis minus, indeque naturam febrilem allevando compescendo.
3. Cicurata Causa peccante, hæc ipsa simul per convalescentiam vias, quo vergit Natura, evacuanda, inter quas excellit blandus Sudor. Nam in omni Febre, blandam Diaphoreticam primario obtinere locum, nisi Crisim hoc negotium prævertat, seu nisi naturalis Excretio præveniat artificialium.
4. Symptomata in cursu Morbi magis magisque urgentia mitiganda.

Primum præstat Venæsectio, & Evacuatio: secundum vero Nitratæ Tertium Antimonialis fixa, Animalium potest duci, & c. *Quarta* in genere Anodyna, in specie moderatè Acidæ, aliæque Appropriatæ. Hic notetur probè LUDOVICI accuratissima Methodus medendi, omne in principio, primo vel omisso Vomitu, mox Volatile aliquod, v. g. Tinduram Bezoardicam, Mixturem simplicem, spiritu Cordæ Cervi, & c. pro circumstantiarum ratione cum Opio exhibendo: in hæc fiores Toræa alkalina: in Deciditione Cancerina, Corallina, & c. Hæc nempe Methodo non Crisim negligi Medicus, nec otiosum eum expectat. Hæc vero otios expectant non solum Vereres, quod præmissa Venæsectio Aquæ frigide largiore haustu saltem curare solebant. Ægros, motum Naturæ criticum observando, sed etiam Medicis plures Itali, & Galli presentim, qui post Venæsectionem & Clystima, sola tenuissima Diæta & largiore Potum exhibitione sanare suos in Aetate luxuriantibus spe Crises Vid. LANGII *Method. Curati. pag. 6.*

Pro his scopis tunc obtinendis observentur.

1. Canturium esse debere Medicum, ut pro Causa, *ut* alla Febris Continua simplici, acres præsentem Malignam, fit enim, ut sepius febri Maligna in primis diebus fuerant Causi tantum prædeserant, & sua malignitate latere. Præter Vires autem prostratas Pulsus denilis Malignam indicat, & frequentissimè sunt complicatae. Unde tutius est, adhibere mox in principio simul Appropriatæ Alexipharmaca Malignitati resistens. Nam dubitare nonnulli, an datur Causa vera seu ad ipsam Malignitatem? Si itaque certè conficit, Malignitatis metum adesse nullum, tunc denovo ad ordinariam ac consuetam Methodum tuto accessus fieri potest. Quamvis vero, levis licet, superest Malignitatis suspicio, Alexipharmata aut Bezoardica dilis simul instillandum erit, quæ uti sunt necessaria in omni: febribus, ita in Continuis landanda.

II. Dum simul propinquant Alexipharmaca aut Bezoardica, sub horum alio misioni Agere in principio ad Sudorem legendus erit, nisi facili & quasi sponte sequatur. Addebat simul sunt Precipitantia, & Dyscrasiam sanguinis pedetentim emendanda per quæ corrigenda, talia tamen, quæ Corpore ad blandam Diaphoretin succedere disponant, antequam perfedat & copiosius proficiat Sudor. Diaphoretici enim, ut in omni febre, ita in specie in Continua conservanda; sic enim Calor & Albus minor, & Cephalalgia, Vigilie, aliæque Symptomata minus desistere solent. Ægros, quia Sudor tunc temporis sine succellu est, & potius Vires præsternuntur, dum nempe omnia adhuc sunt cruda, nec quicquam separatum, nisi manifeste edinet signa Malignitatis, ut Contagii. Instillatur ergo sudor eliciat: Ideoque potissimum Tindura Bezoardica, aut Mixture simplex, seu specifiicum Paracelsi, in Peracutis harum Februm euperioribus ordinatum est, quatenus disponit Corpus ad aliqualem quodammodo. Comp-

potum est ex fudiciferis blandis, simul precipitantibus mella.

Obfer. III. In Febribus Aeternis, seu Continuis imprimis Potus concedendus est liberalior imo, quod maior est Siccitas, & intensior Aetor, ob magis indulgentem genio; Recte enim culpant PANAROLLUS, LINDANUS & LANGIUS in *Epistolis Medicis* eos, qui Aegris febrientibus omnem sibi potum interdiciunt. Obseruetur hoc silem: melius esse, ut frequentius & parcius bibant, quam ut una vice multum ingurgitent. Prius enim successe alterat, simulque madorem continuum conservat; posterior verò potum stomachi nimis labefaciat. Prostant line Exempla non pauca Pulmonum & reliquorum Viscerum omnino aridorum & exsiccatorum ex ardore febdis ardentis, ob denegatam potum: Vid. PANAROLLUS in *obser. Prax.* 4. *Obfer.* 8. Item alio loco habet *Obferuationem* febdis ardente mortali, in quo tam longam semelotum apparuit, Ergo si faret siccitas, liberalior Potus concedendus est Aegris, talique quem appetant, & quidem simplex emulsiq, non modo bre, modo ille, modo non nimis quantitate, nec frigidus ob stomachum ingurgietur, sed potius tepidus; frigidus enim nimis nociva. Interdum enim post alium potum tumores pedum inperuenire solet.

In febdis Potus habendus est ratio Effervescentie febdis plus minus temperanda & sedanda, & hinc Symptomaticum, speciatim circa primas vias urgentium, praefertim Alvi plus minus clausae vel apertae. Hinc Serum Laetis bene depuratum, & succo Citri ad aliqualem gratiam acidulatum, Potus reverè medicamentosus existit, modò Diarrhoea absit, sed potius intendit siccis urgere: Constat, PIENS de *Febribus Part. 2. pag. 466.* item SEPTALIIUS in *Animadvers.* 6. 12. pag. 98. Tandem & Consuetudinis rationem habenda est. Alia *Aqua fontana*, vel *Cerevisia fermentaria* bene parata cum dimidia Misi tenuiori, aut quinq, vel sexta parte Misi Rhemani mella, addendo melleum aut Sacri Civi No. I. Sacri Cydoniarum vel Alitum q. l. ad gratiam saporis, & Galathea Cerui Cervi super igne distill. Si, & acutè febrientibus gratissimum Potum suggerit. Aetia enim, imprimis his in Febribus, in Potu conveniunt, tum Moderata, in Aetia tempe nimio ac cum Camo, tam Vegetabilis, in Aetia tempe moderatior: Unde RIVERIUS *lib. 2. Obfer. 19. Aqua simplis* B. addit *Sp. Sulphuris* gutt. x. per potu ordinario. *Decocta Herbarum* hinc nomine Frigoris plures utuntur; quod nimis approp, cum Cruditatis stomachi stultitiae, easque Atoniam inferat. (P.)

Obfer.

(P) DE FRIGIDE IN FEBRIBUS USU.

Liberaliorem, & praefertim Aquam, Potum Febrientibus concedendum esse, notissimum super col. 499. lit. H. Notandum & hic, in Febribus esse intensiorem & densam siccitatem, non silem ob intensiorem fermentationem obfusam superflua humiditate, exsiccatione ferè induratum Corpus, frigida Aquam Potumque, post paroxyssi fluxum exhibitis, alterantur esse, ut vix hauriant, Aegrotantes: igitur ob auiditatem faciendum esse iudicandum, si lingua arida sit, urinae rubor, etas febrilis, auti tempus aetivum: & largius bibendum consuetudo fuerit. Hac enim moderata methodo, si fudet; fudet Febdis causam exterminat: superveniat, non sile sile, sicut Sanguinis fluxilitas, sicut in Febdis ferore deficiat, qualem sublevisia superflua conservat: quod assequi enim in Sanguine est, assidue prae natura leges scilicet dissolvit, sicut alibi dicitur, utque adeo fulphorem & olea illius partis ferè sola remanent: tenax redditur, non facile in coagula & capillaria Corporis immittit: ita uti trahent, atque circumsit obfusit, atque inde inflammationes, obfusit, congesta, non sine evidentiissima Aegrotantis perniciie, superveniant.

Hac methodo servum utitur, si pugnam primis Febdis distu sit Corpus, & Morbus sequam diem prodigiosus sit: hoc cum casu nullus esse poterit mutas, ne crudam humorum subura in primis viis Rhodis, ex modica cruda, & frigida Aquam ingurgitatione, episthor redit, atque adeo maiorem fermentationem aqueam, sensuam Febdis, cum ardentior adhuc aqua consensum, exciet. Verum si humor Febdis producat ad feridit & fermentidit sit, Bids neque ignis, ut in ipso fluxu Morbi principio, maximum autem, maximamque anxietatem pariat; non sine inflammationis vel apur ad partem aliam principia vix: tunc ad Frigida aquam, etiam incipiente Morbo, deveniendum esse existim: ne felices calidit, quod ferè potest, humoris ferocitatem impet, & partes principes tuncur, & pallis videri induci tranquillitas indicat remedia praferant, atque pro morbi causa depellenda accommodatior methodus indicat posse.

Faciit hoc Historia Febdis hoc moderandi genere, Divitiu praesente Namine, olim extru. Dominus N. N. anno 1797, quom ardore Sicrio in Apulia liore Napolim adventasse, ubi exalta Villis variae aas fuderen per aliquo dies digressi vixit, vigesima tertio tunc Angeli in Febdis, levi refrigeratione & effluatidit insolentem, incidit: viabatur & Lymphaticum genere, quippe quom calidit frigidaque aeris vicissitudines praesentem, ac maxima crudorem urinae copia emicabat. Sequenti die facci spente quamplurima fecerit, Febdisque aliquantulum se remisit: at circa vespem festum interfecta quip, ut vixisset vigiliam cum anxietate copularem, per totam noctem inferret: tunc quom injuria Cisternae facci Aegri promte disjiceret, turbata immolati Venenaliu, parum emata & fucera Bids emant, fluxu aetia molliora & venientia conatit: quare & re esse iudicari, nossem leviore medicamentum movere, ut videri probatum ferioris Emetics praesentem: tuncam igitur cum semole Oxyfachi simplici, tribus Aquam tepida aetia dilutam propinavi, quo facto ex charis pluvioque in gulam introfuit, concitata Venit, multa Bids viridis atque argentea copia paria facile est. Nullum hinc Aegri levamentum, non potius omnia eademque sunt. Febdis in immensum aetia, pulchrum tamen obfusit & inaequalibus: Corpus tepidit simul & medere, praefertim aqua frivem & pellis, corpus: annales vires ferè refulat, ut aetiam emellit, vel ad corpus morientem, videret, ipsi obfusit conaretur hoc illud inmodica jactitatione se devolere: anxietate maxima angustior, & pra Febdis distu spiondi diffidit videret praesent, ac peni sufficibat: oculi tremant, & non hinc emellit palpabilis class: faculteri, non vocant, hegemonica emant lesa, ut erum quom max experiret non esset memoria: super omnia tamen Febrientibus extrema anxiet erat, ut nec letem regimii spem exterritis concitacione scilicet per dolore videret Aegri, in maximo circa mortem casu in via diffinitione. Hi verum angustis aetia: ego pressit, quom emata hac jymptoma ferocissima Bids Venientiam laesam, indeque universum corpus infestum, accepto referenda esse credidit, namque ad Frigida liberaliorem aquam deveniendum esse temporis decrevi, na enim effusa Bids impetum carceri, corporis anxietatem inferat, ac praedidit aquam amulteri posse auxiliari. Eamque animi sententiam in praesentiu exemplum fui, juvenem Aegrotantem aetiam, caliditatem corporis temperantem, fervidam aetia tempus, atque vixisset Aquam potendi conatidit remittentem: praefertim quod nec crudorem humorum accretum in corpore latentem, ne phlogisum aliquid iam scilicet, nec maxiam impudentiam quomque, in corpore eperitui iam, suspicari nunquam potuisset. Quocirca vixisset Aquam per vim primè & modica quantitate, max recedat & aperit: iam oculis Aegri liberaliorem hancem exhibui, ipsa tertio iterum, cum repentina habuit facilitatem, nec sine assiduum sapore. Quomque illius Hippocraticis de int. aff. memò affert: Quom calor habuisset, liorea aqua frigida tinda apponito, qua parte se maxime ardere dixerit: hoc etiam remedi genus ipsi fui, liorea enim vixisset aqua moderata, propriis vixim mandis, affluant Venenaliu applicari. Hi praesentis illius inalefie corpus, non respicit, accedunt vires, verò, Aegri ex Orci sanctius eripi vixit est. Quomam autem Febdis allicum praefertat, tranche Paroxyssi vixit, alia etiam in hanc sententiam concorditibus Medicis) larga item Frigida potati praescripta fuit: non per sumum copiosu ematui fudat, cum jamina Febdis remissione. Verum quom deficiendi casus ac venis remota, haurit in vixisset delecti ac vixit sui per aetiam teneat hanc obfusit indicia, sequenti die Sympus de Cisterna Napolitai distu solent in pari quantitate Decocti hauriri, atque addita Rhubarberi SiB, exhibita fuit, qua Bids quamplurimam

semper cum leuamine deiectionis sunt. Febriis est leuiter ad spiritum usque, cum aliquo putredinis horis incrementum, Aegrum exacerbat; sed liberaliter Frigida potu semper concessa quantula est. Quam autem simul aqua tepida sub intermissione specie reuertetur, Chinachina exhibita prout exstat.

Hic Frigidum in Febribus a diffinitione Methodus uera fuit non est, & si si legibus quas supra inuenimus infirmatur, scilicet in Praxi eorum iure Aegrotantibus polliceri poterimus. Nouitatis potius speciem præferat ea Methodus, Frigidum non solum febriantibus, sed etiam quædamlibet aliis aggrauationibus affectibus exhibenda, qua ex Hippocrate, ut fertur, non malis ab hinc annis hac transgressa, reuoluendo primam aule ad primum reuocata sunt, mox sensim increbrescenti illius usui, adeo in uiguis transiit, ut nullum fore sit, in deperatam præsertim morbi, familiarium Medicamentum, quam Aquam iuxta illius Methodi canones propinare. Methodus est in febribus Aegrotantibus saltem ad triduum cum cibo omnino remouendo, sola aqua nix refrigerata edebatur, qua ad libram autem, & amplius, pro Aegri conditione, secunda vel tertia quoque hora, uelut diuina, nemini sit remouenda facta, exhibebatur. Præsertim remedium ex eo superius dictum dignissimum, si respiciamus Aegrotantis corpus fletu incalcescit incipiat, si pulsu voluere, & magis equaliter reddatur, sique Aegri aliquando resistit obferuatur. Facilius est Aqua transiit, adeoque in illius usu insistendum, ex eo conijcimus, si præcipui Urina multa & aqua excrementur: fletus fletus semper & Alius solui, non sine Aegri emolumento. Transactis triduo, Cibus, sed parca & non ualida maribus, ut Oua terribilia, Passilli & mica panis, uel quid simile, bis vel semel in die, porrigitur: concessa autem continua pro Cibi assueti consuetudine fuit, iterum ad Frigida potationem in multis diebus prolatanda deueniendum, qua qui Aegri in maiorem flatum euecti, et rariore & parciore fuit permittebant, alterius sensum concessa Cibo: omnino autem ad Carnium abstinendum.

Præsertim Frigida exhibenda Methodus (quam Dietam Aquam iure appellari potest eximiam) fuit nimis dispiciendum iudicamus, id est curare in omnibus Morbis, omninoque Morborum attributionibus cura impetu, ut quidem faciem, amplectendum esse negamus. Magnam fuit remedium est Dieta Aquæ: quare in illius administratione, quoadmodum in omnibus magnarum remedium usu, accuratissimi cautionibus procedendum, ne quod pro Aegrotantis salus instituitur, illius potius nocum moliat. Quædam quidem hic proponi possum, tam è patu Philosophica depræta, quoad huius remedi operandi modum, non etiam ex Therapeutica, ad rectum illius usum insistendum faciemus: uerum in nimis in longum distrahatur oratio, Mentis quædam ad Praxim faciendam necessaria, illorum breuiter adhibita rationibus, interserere censeamus erimus. Qui plura cupit adeo abstrahentis de hac re Tractatum concipere nostri & amici, Ch. Nicolai Lanzani, del vero Metodo di seruir dell'Acqua fredda nelle Febbrî &c. inscripam, a quo Cl. Viri Nic. Pio Garzelli Caroli Fl. Cafarsi Archiepiscopi dicantur.

Primum quidem memuerim in Febribus quibuscunque seu Benignis, seu Malignis, Aquæ Dieta tempore opportuno band est Morbi principium: tunc enim cruda tenaxque existens materia morifica, Frigida effusione crudius viscidiusque redditur, ac quoadmodum fermentum sine aqua asola uisorem fermentatiorem impertit, ita sapienter saltem est, ut in Febrii principio Aqua intemperatè exhibita maiorem fermentationem, non sine putredinis accessu, accendat. Aquam igitur est in transitu Febrii incrementum auersum, & feruente jam Morbo (ut Hippocratis uerba dicunt), cum scilicet materia illius feruente ex diuersa dissoluitur, particularum coarctationem quendam, uel si uariis aliqualem Crisim species, adepta, post copiosa Aqua exhibita, illiusque cum liquoris Corporis permixtione, uelut præcipit, sicera, aqua per accendatorem uiam detrahatur. Sic post Frigida iuste tempore exhibitis usum, Criticis, uel per alium, uel uia uia, euacuationem obseruare solent.

Præterea animaduertendum, band aliquis sana ratione Cibus omnino Aegrotanti prohiberi, cum Frigida usum aggredimur: Etiam Cibus non eodemque tempore cum copiosa Aqua exhibita, uel prout beneuolus nunquam in Febribus & Infectionibus subtilissimis permittitur, maxime putredinem concipere; uel saltem tenent Aqua substantiam inficiens, cum nimis aptam redderet, ut facili euellissima uiscera permeare, adeoque in extrema simul & intima Corporis digressi, aquæ fundi possit, ad fermentationem & præparationem maxime humorum molientes. Neque de Vita determinat ab hac Indicia tenendum est; Nam illam facile feruere Aegrotanti ex eo, quia facta ab aqua frigiditatem stirant omnino Corporis curuagione, necessarii Transpirationis negotium, ac æthiara redditæ Cui spiracula, quoadmodum impeditur. Quare quomodo non sit subleuata Corporis abfensio, minor erit assidue reparatio, seu Nutritio necessaria. Præterquam quod Aqua ipsa Nutritio efficacia assidue per se uersetur, si qui ubi sunt alimentorum reliquia (sunt autem semper impolita) se feruere rapi, atque per uiscerum Corporis diffunditur, portum Nutritio quod fieri potest consili. Post triduum autem Indicia porci Cibus est concedendum, ut prius manemus, & quidem nimis ex Carnibus, aut similibus paratus, ne in debili Putredine corruat.

Illud hinc euidentissimè inferri debet maxime, pro Aqua Dieta, naturalem & purissimam Aquam adhibendum esse; qua cuiusque destituta, uel calidius alterius corporis permixtione medicata auerenda est: quippe quid pura mutationem band facile suscipiat, & quomodo nullam adhibentem habeat putredinem puram substantiam inficiens, auersatissimè corporis comitibus premis prætergatur.

Illud quoque imprimis animaduertendum, Aquam ueniosam nixtam Aegrotantibus propinandum. Et nempè argumentum, ut Febrii aptum esse remedium possit: si enim in Febribus (saltem in qua Aquæ Dieta curari possit) Sanguinis morus localis aliquemodo retardatur, missum æthiara redditur; Aqua Nix refrigerata, ratione fluiditatis poterit Sanguinis morum localem immutatum restituere, ratione frigiditatis missum præter naturam additum solare. Quia & nixta Aqua liberaliter usuperit Calor ipsorum cum Corpori conciliari, quod quidem paradoxum uideri poterit, Nam si Febrii ex illorum genere sit, in qua resista pars uoluitur & spiritus, ad congelationem tendit massa Sanguinis, adeoque cum repositæ Corpus incipit, hoc casu copiosa Frigida potu, aqua exstant cum Sanguine permixtione, colidetur periculis ille Spiritum effluat, unde orti carperat conuersione, atque adeo Spiritus quoque euolare non possunt, Sanguinis effus periculis in non conuersione, illorum agitationem sine defecere incipientem adaugere, atque accedens Aqua liquere, Sanguinis fluiditas & calor hinc reuocatur. Calorem autem hunc ad Spiritum effluatium exhibendum, ab Aqua frigore præcavendo, pendere, ex eo uidetur est, nam Sanguinem jam à Corpore additum, uel in Corpore jam incrementum ut in tactu, frustra Aqua Frigida supereffusa, diuare ac coalescere saltem: defecit enim in eo Spiritus illi, qui est paucis in Sanguine jam ad conuersionem tendente, si illi diffusi aqua euolare Frigida effluat non sinit, sufficiens ad agitationem particulis in non tardis impediendum, adeoque ad fluiditatem & calorem restituendum. Hinc paradoxum hoc, quomodo scilicet Febriantibus corpus jam repositum Frigida supereffusa incalcescere possit: hoc enim indultissima Cui meatu infestis & angustis redditus Spiritum coarctationem nimis permittit, adeoque qui reuocatur expulsa ratione Corpori calorem feruere, qui repositi possit uidetur Antiquorum de Antipræstis doctrina. Aquæ hinc redi potest ratio, ex Sudo, in qua Aquæ Dieta uisum superuenit, raro nilu esse solas, per patens enim Cui parui simul cum Sudoris materia maxima quoque Spiritum copiam euolat, cum Aegrotanti languere. Quapropter non inopi quomodoque saltem fuisse uisum, Corpus frigido Sudore diffusum, remansit Stragulis, uentilatore perfuso, & contraria Nix perfundere, ad Cui spiracula euacuanda, Spiritum quoque resolutionem colidendum.

Quid si Febrii ex illorum genere sit, qua in nimia Sanguinis dissolutione fundata est, non nimis Aquæ Dieta locum in Praxi habere potest, & calorem ex excedenti fermentatione penè rephatam, reuocare ualeat. Aqua enim, præsertim frigida, salia acris Sanguinis massam siluicia usque particulas dispergit, siuere, & reuocare poterit: quapropter Sanguinis substantia

Obſerv. IV. In Principio & Curſu febrium Ardentium; ubi Alvus obſtructa eſt, vel non ſatis libera, conveniunt imprimis Clyſmata, aut: loco horum, Tamariſindorum Decocta aut Infuſa: Verum illa ſaltem lenientia ac blanda, & quæ Alvum tantummodo laxant, ſcorias recemectotas ac Intestiſia maturè eliminant, tamque coſtituto fluidum ſervant; idque præſertim duobus in caſibus:

1. Si urgeat Symptomata Præcordiorum & Abdominis: Item ſi Organiſmus Humorum ad Caput ferri quodammodo videtur.

2. Si nimia Aëruſtio & Ebulitio ſit Sanguinis, tunc commodiſſimè applicatur Eucmata. Conſer. SYDENHAM *Sect. 2. cap. 6. p. 27. & 29.*

Quibus & addatur Principium Martis præcepti, in quo ante Veniſectionem Clyſmate Alvas eluenda requit: c. g.

℞. Her. Cham. M. ii.

Her. Card. bened.

Velar. an. M. i.

Rad. Gentian.

Emulo an. ℥i.

Coq. in ℥. q. aquæ.

Celatur. ℥viij. adde

Elſſ. lenitiv. ℥i.

Miri aniamoniat. ℥i.

M. ℓ. Enema alvum & Emiliacæ:

D. S.

Enema Laxativum. Vel

℞. Her. Chamom. cum Her.

Card. bened.

Salu.

Rosa an. M. i.

Rad. Euly.

Leviſt. an. ℥vi.

Bacc. Jaap. ℥i.

Sal. Tartari ℥i.

Coq. in ℥. q. Aquæ: Celatur. ℥viij. adde

Elſſ. Her. cum Agar. ℥vi.

Mell. reſat. ℥i.

Liq. Ceræ Cervi ſectis. ℥i.

M. ℓ. Clyſma Revellens:

D. S.

Eucma Revellens.

Alvus verò, ubi ſatisfecit quotidie officio ſuo, nullo modo irritanda venit.

Obſerv. V. *Pomuria* non adeo neceſſaria ſunt, atque in febribus Intermitteſcentibus: adhiſcentis tamen ubi in Principio & in Incremento Morbi Nauſea urget, aut inanis vomendi conatus adeſt, ſapore amaricam, aut ſimiles Ritus adſint, ut vel ex Illis regurgitatione lo Romachum, aut recemectorum indorſorum in eodem collectione, Lipothymia aut Cardialgie imminant, vel Anæſtæ Præcordiorum iſoſines exinde accendant, conveniunt ſane eſt, Vomitorio in Principio aut Incremento hæc impedimenta remove, niſi vel Diarrhæam, vel graviffima Symptomata in curſu Morbi experiri velimus. Exempli gratia, in febris inter, propinato Vomitorio, mitigantur horrenda illa Symptomata, quæ ex Flumorum in Ventriculo locifque vicinis illavie ortum docent, imò vero & ſuccuſus in ipſis quoque incunabulis opprimitur Morbus, qui alias cum Aegri periculo increſcit & chronicus ſit, & ſic ſimil Remedia poſtmodum uſurpando eò melius operari poſſunt. Obſervavi ipſe tiepſi, quod ex oſſi Vomitorio Aegri non adeo gravibus Symptomatibus conſtituti fuerunt. Quod ſi ſed accerſis jam Incrementum Morbi adſit, nihilominus cætera ubi reſponderit, ac ſpeciatim ſi Vires à Morbo nondum attrito fuerint, etiam lo Incremento Vomitorium propinari poſſet: Conſer. hic accuratus & elegans SYDENHAM in *Methodo curandi Febris pag. 7. & 23. ſeqq.* Idque eò magis, ſi certè conſider, Febrim eſſe vel Benignam, tunc ſane, & ſi illa Indicantia ſuprà indicata adſuerint, vel eam eſſe Malignam, ſed ex Contagio extrinſeco hæuſa Romachum inefficace, non tumidus, nec tumidus hæ ſit Medicus, in talibus enim Vomitu præmiſſo, ſane omnia Symptomata toto Morbi decurſu ſunt mitiora. Obſervanda tamen ſunt *Vires* plus minus reſolue; item Vomitoria non ſec ſimis valida, ſed blandiora & in doſi minori, ne Corpus nimium commoveatur: in talibus enim Aegri facili multum & vehementer ſoleat evacuari, fluidioribus & mobilioribus Corporis exiſtentibus Contentis, ſecus ac in Intermitteſcentibus, in quibus, præſertim conſuetudinibus, validiora ſubinde uſurpando veniunt Vomitoria. Obſervatum tamque etiam fuit, quod in Aegris, quoſi alia Vomitoria non moverunt, illi in Febrilibus talibus impoſſitiffimè ſunt purgati. E.g.

℞. Crat. Metall. apothec. gr. viij.

Infund. per noctem in ſini Rhœni q. l.

mane ſiltretur, & pro doſi ℥i. addatur

Syrap. Cinnaom. ℥i.

M. D. S.

cræſſiſſima reddita Spiritus evolare non ſunt, adeoque calor in Corpore & viſa ipſa emperſcedunt. Hinc patet Aquam Diſtillatam licet habere poſſe in Dyſenteria, diſſipare morbis à ſentia humorum aſtricta pendemibus: cum tunc attenuata illorum ſententia, arctas ad ſummum gradum erecta in maxima periculo Agramen perdat. Fortiori ergo ratione, qua comparet Præſcribi Lactis ſerum in Dyſenteria exiſtent, Dista Aqua miſtini poterit.

Quomodo autem frigida & præſer nitare Aqua ea ſu poſſet, quam modo expoſuimus; verumtamen illud quælibet argere poterit Symptoma, pro frigida potius calida ſit exiſtenda: pura ſi internum aliquod Corpus, præſertim Thoracis, viſum, & per ſe Inflammatione obſtaret, periculum enim eſt, ne Frigida aſſumta vi Inflammatione adaugetur, aque in Gangramen tranſiunt ſent. Hoc igitur caſu oportuerit eò calida potius uti, qua per vires & moderate magis obſita diſſipet ex quo lo parti inflammata deſtruitur ſent, imò cum phlogiſtici humorum, poterit deſicientem fluiditatem Sanguinis & reliquis liquoribus conſtituta.

Animadvertendum præterea & illud eſſe oportet, quod Aqua frigida exiſtenda eſſent; gravius delinquit ſi minori quàm par eſt quantitate propinetur, quàm ſi excederet. Quam enim eo ſine Febricitantibus in talis ætate ſtatu exiſtenti Aqua exhibetur, ne in omne corpus diſſeſſa, mater reſeret, liquoribus matrem & fluiditatem naturalem imperitaret, ac membrorum omnium calorem roburque feveret; id præſertim nos ſuſtra pollicemur, modicum propinquant: Aqua quantitas, qua in Ventriculo & primis viſceribus iterum trahitur, tantum abſit, ne poſſit ulterius progredi, quàm potius cum maxis liquoribus ſi ſtagnantibus permixta, ulterius iterum purſationem promovet, Aegropo perniciem molitur. Opus igitur eſt, ne maxima quantitate & ſuſſectiſſe ingeratur, ad hoc ne copia viam ſibi parat, & veluti alterius Corpus univerſum immanet. Quod autem ex antecediis præſepalum, ſi poſt primam tranſactionem diem tranſiſſa Aqua ſigna per Urinam vel Alveum apparuerit. Quod ſi eorum nulla ex parte Aqua exiſtis patet, potius ab illius uſu ſuperſedendum, ne Vires ſententia: à reſentia inter: Aqua præſer abſtineatur.

Præſertim animadvertendum Frigida aſſum in his Febrilibus, quibus internæ diſſectus vel ſupparati, vel jam diſrupti, apparent item per quodcumque Corporis ſecernicalem pure conjunguntur, vel ſi ſeris membri aliquo: Necroſis ſignis ſuperſenerint; non ſolum uſum non eſt, ſed omnino noxium. Etiam ſolidorum partium vitia, præſertim ſi interna Ulcera ſunt & Gangrana, nequaquam poſſunt Frigida aſſumene: imò poſſunt ad ſphaceliſmum trahere obſervant: non ſecus ac manus & naſum per novati momenti iter ſacientium gangrana aſſi ſcriptum eſt, & non non ſemel vidimus, Quod ſi tempore potationis Dolores vel Tormina ventris urgeant, præſertim ſicuri atque, tunc ne Inflammationis locuſ atque, intermiſſo Aqua uſu, Clyſteres iniciantur, et Oleum Amygdalorum dulcimum propinetur, ad dolores ſedantur, alvumque laxantem: quo ſatis iterum ad aquam revertendum.

Juxta huc Caſum (qui Experiments ſæpius inſtituta primùm diſtillatæ & Rasin poſtmodum ſi non inſilla band omnino inſorma ſuſſi) Dista Aqua multoties eſt, ſebus exiſtis veluti ex inferius vidimus: nunquam præcepta ſe præſtrari ſumus, quod à Medicis ſentia, præſertim in minorum Medicamentorum adminiſtratione, non abſerret, nil enim adeo iterum in illa eſt, quod fallere etiam ataractiſſimis Præſores, ſape non poſſet, id tamen non verat, qui in eo ſtatu Febrim, quam prius deſcripſimus, ac conſerventibus deſerper circumſtantibus, Dista Aqua licet labor, veluti præſertim validiſſimis ſentem Indicantibus. Verum ſi in ſe Morbi vel Agramen in præſe numeris conſtitit, ne deſerper jam ſe præſer ſi ſentem tam; eſt nulla ſi talis Remedi Indicantia, imò ſi omnino contraindicantem, nihilominus poterit prudens Medicus, ſalve Preſcriptæ, & expoſita quilibet audendi occaſione, Aquam Diſtillatam ſi non præſer ſaltem permittere: juxta C. Celli conſiliu, quod ſentia ſi atque remedium experiri, quàm uſum.

M. D. S.
Vinum Emeticum pro una vice.
Vel
℞. Oxyfasc. smet. angel. folia ʒiij. vel ʒss.
Aqua Mentha ʒss.
M. S.
Potiuscula Emetica pro una vice.
Vel
℞. Tartari smet. hyssopifolia gutt. li.
Scam. sulphor. gr. i.
Sach. alb. gr. vi.
M. f. Pulvis: S.
Pulvis Emeticus pro una vice.

Vir vegetus & sanus, *Borbismus*, *teorioris* licet constitutionis, in convio vespertino genio plus debito indulserat, Baccho in specie litando; unde post noctem inquietam mane Vomitu copioso, & aliquot fecibus se exonerabat. Die alibi tertia frangida gravissima affligebatur, unde aliquot diebus intercedit languorem, & lassitudinem. Artuum insensum percipiebat cum aliqui fœti, donec aliquando sub mediu noctis post medicorem Horrorem gravi fluxu cum Cephalalgia intensa corriperebatur; jubebantur Vires prostrare, sitis clamoris, inquietudines cum pulsus frequent, celeri, magno, molli & vehementi. Urina intense tincta emissa successe per totam turbida, crassa, & copiosis contentis ubique saturata conspicietur. Circa meridiem vocatus febre continuam Ardorem Benignam indicabat, ideo præcipi p̄i:

℞. Ag. Rab. idai.
Actuato ʒss.
Antimoni diaph. dr. l.
Syrap. Papav. ʒi.
Spir. Nitri dulc. q. l.
Misce.

De qua Mixture capiebat cochlearum pro lubitu.

Si in principio primo vocatus fuisset, sine deliberatione moa Vomitorium dedisset. Verum, quia *Æger* hic teorioris constitutionis sub diebus ante invasionem Morbi Vomitu spontanee passus fuerat, hærebam, ne ex Vomitu proprio nato Hypercatharsis sequeretur, cum sine violentia non operetur, aut *Ægrum*, si cum Vomitoria tentare vellem, Viribus jamdum satis attritis, Lipochymia corripere, imprimis cum utiis jam turbida apparuerit, adeoque morbus non in principio, sed in incremento sit, quæ sanè dissuadet Vomitorium usum. Postquam autem ita *Ægro* die Solis propinquandam iustitiam militum jam dictam, vesperi eisdem diei rediens ægrum in pristino statu ostendebam, sed magis animum, cum fluctuationis sensu circa præcordia, consequenter simul, quoties de matura fumebat, se sentire agitationem insensum totius Corporis, præsertim Capitis. Delibetabam ergo, an Vomitorium conveniret? cum bujus usum argere instituebam.

1. *Ægrus* anxietas & inquietudo, quæ præcordia affecta indicabant, adeoque si Vomitus omitteretur, metus sit, ne symptomata dicta exasperentur.
2. Fluctuationis sensus, quem æger percipiebat in præcordiis; quod signum est, motum humorum per superiora iolare.
3. Exaltatio circa præcordia, quam æger, quoties de matura præscripta caperet, pati dicebat: quæ indicium est, spiritum Nitri dulcem cum Contentis primarum viarum effervere.

Hæc ergo Permittentia, & dissuadentia Vomitus dum occurrebant, necum delibetabam, an Vomitorium conveniret? Tandem neglectis dissuadentibus lenè Vomitorium præscripsi ex Tartari Emetici gr. ii., unde æger in vomitiones crebras incidebat cum copiosis Alvi dejectionibus, revera cholerica Pathematis, superveniente summa Virium prostratione, extremorum refrigeratione, & sudore circa frontem synoptico. His ita perseverantibus; cum æger non posset surgere præ languore, tantillum Vini adhibere, quicumque simul in lecto manere eundem, ut extrema incallescere, immo naribus admoveere Vinum jus- s. ut hujus odore reficeretur. Dehinc præscripsi:

℞. Ag. Menha.
Rubi Idai ʒss.
Cinam. dr. vi.
Spir. Theriac. camphor. dr. iij.
Succ. Cydon. ʒi.
Æsc. ambro. ʒss.
Misce.

Hæc Mixture successe ab ægro assumpta Vomitus, & Tuss. II.

Secus sedavit, eumque quietum reddidit.

Eatenus simul stomachum inani curabam Theriaca, vel sola, vel in Vino dissoluta. Post mediam verb noctem præscripsi:

℞. Ror. fine igne;
Antimoni diaph. an. ʒi.
Benzad. folia gr. xv.
Laud. quat. gr. iij.

M. f. Pulvis pro 3. dosibus.

Primum dosi post mediam noctem cepit, secundam mane, & tertiam vesperi. Ita atrociora symptomata ex voto evanuerunt.

Observat. VI. *Purgantia*, quæ talia, imprimis præparata dicta, seu quæ abulivè Eradicantia, vocant, ut plurimum nociva sunt in Febribus Continuis Ardentibus, nec nisi in declinatione morbi conveniunt, cocta scilicet prius materia, & sedata maxima ex parte Ebullitione febrili.

Sed tunc ferè est superflua & inanis, cum Materia cocta per urinas, & sudores eliminari solet, Quod si non fiat, aliquis & repetita blandior Purgatio, & quæ stimulo saltem motum Naturæ provocat, locum habet. In principio harum febrium licet frustranea, movent quidem flux turbam simum Corporis Contenta, sed non ritè promovere nociva, crudis adhuc omnibus existentibus, ac Vires nimium proferunt: In progressu verb morbi licet ferè nociva, aut saltem inutilis dictis ex causis: si quid tamen servandum videatur, in Principio secundum HIPPOCRATEM servandum.

Observanda tamen hic est Animadversio SEPTALII lib. 5. §. 4. pag. 88. Unis continas Tertiana respta sai, aut materiam sacratiss, aequam ab initio ante collicum medicamentis Purgantia evacuandum est; ita, cum quævisque Bilis acris ad Ventriculum transfundatur, & mordet, gravissima inferni pericula, & sæpi mortem, periculum, si æger ad vomendum natura incipit facit. Illa ut populeum respta symptomata, cum syrupo respta saluto, & sero lactis, vel sola, vel cum Tamarindis incoctis, purgare licet, &c. Ut enim in cursu Morbi Purgantia omnia sunt omittenda, tota tamen morbi decursu eo subinde simul respiciendum est, ut Alvus blandè ferretur argeat, & quidem imprimis, ubi æstus, & Cephalalgia urgent, quam sub Alvo clausa magis intendi solent: idque eo tutius fieri solet, quando nulla adeo suspicio Malignitatis. Nam in Febribus Malignis, imprimis cum excretionē cutanea, Variolis, Morbillis &c. junctis, cautiſsimè imus in Alvo aperienda. Intempestiva enim Purgatio ante Materiem Coctionem instituta, magna incommoda vehit: Vt enim finem suum non assequitur Purgantia, nihilque aut parum vitiosorum Humorum educunt, atque ita saltem eos agitant, turbant, confundunt (revera fermentant), unde ex Materia mota, & non evacuata in primis viis hærente, Tortura, Animi deliquia, Vertigines, & alia symptomata oriri solent; Vt si Medicamentum sortus fuerit, Corpus liquefacit, Vires debilitat, ut Natura postea facillius succumbat, Motum vel planè non, vel nonnisi longiore tempore vincat. Neque Purgantia neque Vomitoria febrilem fermentationem tollunt.

Pro scopo igitur Alvum aptam servandi convenit imprimis ferum Lactis, aut Gulex, aut cui iuxta SEPTALIUM L. 2. Tamarindum uoc. l. vel unc. iij. infusa fuerit. Quod si verò in principio harum febrium blandè purgare ante primas vias abstergere nimis est; tunc vel solitaria, vel cum pusillis, v. g.

℞. Crem. Tartari,
Pulv. Rhabarb. an. ʒi.
Stamm. prep. gr. i.
M. f. Pulvis: S.
Pulvis Laxativus.

Capiatur in vehiculo mane.

℞. Pulv. Tamarind. dr. iij.
Pulv. Rhabarb. ʒi.
Stamm. prep. gr. iij. vel iij.
M. f. Solas: S.

Eloquarium Laxativum pro una vice:

℞. Tartari vitriolati gr. vii. ad xv.
Stamm. sulphurati, vel resai gr. iij. vel iij. ad vi.
M. S.
Pulvis Aperiens.

Item infusum blandum ex Folis Senne cum Rhabarbaro in principio harum febrium, ubi non nimis celeriter moventur, tuè concedi potest: v. g.

Oa 2

℞. Rha-

feu humanitas effundat, & tunc dyrrhus Papaverinis opiatum convertit ad 3. cum alio exhibetur; additissimum raiu & blandissim, convulsione in specie in Febr. imprimis ardente, si cum cantillo Niri misit fuit. In febribus suis ardentibus motus furibundus optima sedulo Londano opiatum cum cantillo Niri, sed non debentur in abati, sed recte tempore adhibere, namque si spiritus animalis furibundus sit. Deinde in exhibendis opiatum non debemus exspectare; donec Spiritus planti absque fuit, & hoc consequenter nimis profusa; sed in tempore asperanda, cum Viri adhibet. Conf. WILLISII de Febribus cap. 10. pag. 127. In rebus semper desperatis ad Opia non est refugendum: v. g. imitari possumus POTERIUM & LINDANUM, qui aliquot Casu laborantes cum Dolo Ventriculi curantur hac Mixture:

℞. Aqu. Acid. vel Strabio 3j.

Succi Limon. 3℞.

Spir. Dia-Marg. fr. 3j.

Syrup. Papav. albr. 3j.

M. f. Potio.

Quam iple elegantissimus prædicte effectus: Vid. POTERIUS Cas. 2. cap. 50.

Vel imitemur SYDENHAM, ad tumultum ab Emetico concitatum sopiendum vel noctem vel hora somni blandum Anodynum propinquant: e. g.

℞. Aqu. Papav. errat. 3j.

Mistab.

Syrup. de Mecon. an. 3j.

Papav. alb. 3℞.

M. f. Mixture.

ut habet ibi. loc. pag. 25.

Propinquant autem semper Opia cum debitis Appropriatis mista, tam in Benignis quam Malignis, aut Appropriatis Alterantibus, aut Appropriatis Alexipharmacis, prout necessitas requisiverit, sic feliciter operantur; novissimæ vero solitaria.

Observat. XL. *Spissioria*, quando & quomodo in Febribus his Acutis applicanda, dum Caput & genus Nervosum nimis affliguntur: infra, ubi de Febribus Malignis, exponetur.

Remedia ergo, quæ in his febribus Continuis Ardentibus conveniunt, præter Vomitoria & Laxativa dicta, primarij sunt alterantia, quæ vel ipsam affellam ejusque causam occasionalem materiam respiciunt, vel Symptomata primaria, illa sunt Nitrum, & quæcumque Nitratæ Remediorum, imprimis Nitrum antimoniacum, & Nitrum vitriolicum, seu Arcanum duplicatum Myrsinij: item cum Nitro fixata Mineralium Sulphura, in specie Antimonialia, v. g. Antimonium diaphoreticum, tam simplex quam compositum, aut Martiale Landerij, aut Joviale Perrelli, seu hujus Antididonei, Bezardicæ mineralis simplex, hinc Joviale, Martiale, & Cinnabaris Antimonij, Sulphura Mineralium per se sunt egregia in talibus Febribus, multo magis Metallica per Nitrum fixata; Nitratæ enim, & cum eo parata Remedia fixa, sicut sal istud volatilis acce peccant, indeque nascuntur Orgasmi, & similes temperant omnem Acrimoniam fixiorem, & ubi sal hoc obtem fuerit, Oleositatem ejus coarctat, summiq; blandi per Urinam, & hinc per Sudorem evacuat. Hinc *absorbentia Animalia*, hijsque cognata Terra, v. g. Cornu Cervi sine igne, hujusque Gelatina cujusvis acris temperata, Ebor sine igne, Mastilla Lacini piscis, Unicornu verum crudum & sine igne, Lapilli Cancrætorum, Corallia præparata, aut horum cum succo Cetri Magisterii, Unicornu solite, Terra sigillata, &c. Hæc semper cum Diaphoreticis & Alexipharmacis recte fuisse per Fermentis febribus præparantibus KERGERUS Traict. de Fermentis cap. 231. sect. 3. cap. 3. Quin & salia volatilia Animalium illis ipsi committeri & moderata dosi subinde addi possunt; hinc enim sal volatile Cornu Cervi, & Liquor Cornu Cervi succinaturn, subinde cum alijs fructuæ ut usurpantur. Hicce ex Vegetabilibus Refrigerantia, & Harparia vixit dicta, itidem accendens, v. g. Cichorium, Taraxacum, Lactuca, & omnia hujusmodi, Plantago, Acetosa, Aretifolia, Portulaca, Fumaria, Flores Rosarum, Acacia, Borraginis, Buglossæ, &c. Ex quibus & similibus parata Duratia reperiuntur promiscue in Prædicoium Veterum & Recentiorum Scriptis, e. g. PLATERO, & SYLVII Præfati. l. cap. 19. item PIENS de Febribus par. 2. c. 2. & 3. &c. Quo etiam pertinet Remedia blandæ Pinguis, seu temperata Oleosa Vegetabilis, ut Semina Prigida majora dicta, expe his paratæ Emulsionæ, quæ nectis sua vel sal istud nimis acce blandæ temperant, & corrigunt, adeoque Effervescentiam acriorem plûs nimis f. hant.

Remedia, quæ Symptomata magis respiciunt, sunt imprimis omnia blanda Acidæ, Ælium, Strim, Ovis squalem, Virum diminutionem &c. mitigantia. Talia vel ex Vegetabilibus Regia sumuntur, adeoque mellea, vel ex Minerali, adeoque acrimia existunt: illa in Ælium minus urgente; hæc ubi intensior Ælius, nec subiecto Patientis alique circumstantiis proportionatus adeit, magis locum habent. Illa enim facilius in saltem temperatum diureticum in nobis alterantur; hæc contra furioris nature, & quasi firmioris texture, minus alterabilia sunt, quæ cæsa Acidæ potentiora Bilem & ejus Acidum volatile acce præcipitant & corrigunt, adeoque Humores alique effervescentes figunt, & inde nasas Æliationes nimis Pathematica mitigant.

Inter Acidæ Mineralia præferuntur speciatim spiritus Mineralium acidæ, tam simplices, primario Sulphuris, hinc Vitrioli, Salis, Niri, præ cæteris & cum dictis Spiritibus, aut spiritibus Vitrioli volatili purata Mixture simplex, seu Tinctura Bezardicæ: quam compositi, Chyli alia appellati, per retortam ex Sulphure, Nitro & Antimonio & similibus parati: sic sunt Spiritus acidæ volatiles admodum egregii; & Tinctura Vegetabilium cum Phlegmate Vitrioli, Spiritus proprio acidulo, Tinctura Bellidis, Rosarum, Violarum, Cyani, Aquilegiæ &c. Usurpentur talia Acidæ Mineralium in Julepis, ut & Mixture Alterantibus. Tinctura infillantur Potui ordinario ad 50. vel 60. guttas pro dimidia mensura.

Cæterum spiritibus istis Acidis prius præferuntur metitib spiritibus hijs medianter spiritus Vinæ dulcificati, quæ magis sunt temperati, & ita Economiam nostræ Animalis magis affines. Nam hæc suprema Lex sit Praxeos, quam etiam SYLVIIUS arguit, ut semper Temperatis infillamus, duplici ex ratione:

1. Quia nomen Corporis nostri Succo naturaliter sunt temperati.
2. Quia Remedia imtemperata, & nimis gradata nimiam acsibitantiam inferunt Naturæ mutationem, quæ nunquam est bona.

Propterea ergo præfero spiritibus delicatissimis seu temperatis ipsis spiritibus eradis acidis; sic enim minus alterant Corpus, & minores dant turbas: & certum est, quid potentius Ælium febrilem temperent, quam si crudi propinentur. Hinc Spiritus Salis dulcis, item Spiritus Niri dulcis, præstant nō interio, cum alijs misti, his ipsis spiritibus crudis. Ex omnibus illis spiritibus Sulphuris, hinc spiritum Niri dulcem, eligerem: Spiritus Vitrioli propter rancorem metallicum non semper est tutus.

Ex Vegetabilibus Regia conveniunt Fructus, imprimis succulentis, sapore acido & asiduo se manifestant, v. g. Cætrus, qui primatum obtinet & Malignitati resistit, epulæ succos expressis; item succos Ribum, Berberum & Cydoniorum, imprimis in Anxibus Alvi nimis, Rubi Idæi, Granatorum & similes alii. Addatur etiam Acetosa & Aretifolia, quarum succum expressum suavisimum præfero Syrupis cum Saccharo paratis, quia sunt fermentescibiles. Præ cæteris commendabiles sunt hijs per spontaneam refrigerantiam, post sulphuratum secundum HELMONTIUM deparati, & in loco frigido asservati. Tamarindis quoque hic apte convenerunt, quia sapore acidulo simul alterant, & Ælium leniunt, quatenus sal volatile oleosum destruant; & præterea Alvi obstructionem blandissime laxant: hinc etiam ZACUTUS LUSITANUS in febribus Syncopticis, seu cum Lipochymia coarctata, insigniter commendat Tamarindos in Aqua simpliciter decoctos, cum tales febres Syncopticas egregie leniant. Præter hæc etiam succos Semperivivi majoris, item ex Portulacæ & Plantagine parata Remedia commendantur.

Ex his variæ sunt Formule; præter usum enim Tinctura Bezardicæ, seu Mixture Simplicis in Principio Morbi, ubi subest metus Malignitatis, i guttis 50. vel 40. vel etiam 50. ad 5j. propinquant pro constitutione Ægri, ubi adhuc subest metus Malignitatis, conveniunt Julepi aut Mixture Acidulæ: v. g. o

℞. Durati Coru. Cervi simpl. vel cum Rad. Strac. (habita ratione circumstantiarum) 3i.

Succ. Cetri ros. 3j.

Syrup. Flor. Myrsin.

Mistab.

Papav. alb. (est egregius in his Febribus) an 3j.

Spiritus Niri dulc. vel spiritus salis dulcis q. l. per grato sapore.

M. f. Julepus.

Julepus Refrigerans & Alterans.

Han.

Habituatur de hoc pro Inhibita.

℞. Decoll. Corn. Cervi Bi. vel Biß.

Succi Cydon. Zi.

Syrup. Papav. alb. Zi.

Rad. Idæi Zi.

Spiritus Nitri dulc. parum.

M. D. S.

Julepus Refrigerans & Confortans.

Vel

℞. Decoll. Corn. Cervi cum Rad. Sparg. Bi.

Tinct. Flor. Rofar.

Violar. an. Zi.

Syr. Amel.

Flor. Symplic. an. Zi. ad Ziß.

Spir. sulphuris parum.

M. D. S.

Julepus Refrigerans.

Vel

℞. Decoll. Corn. Cervi cum Rad. Sparg. Bi.

Succi Berberum.

Rhizom. an. Ziß.

Tinct. Flor. Rofar.

Violar. an. Zi.

Syrapi acetul. Citri Ziß.

Spir. sulph. vel vitrioli q. l. pro grata aciditate.

M. D. S.

Julepus Refrigerans & Corroborans.

Vel

℞. Decoll. Corn. Cervi Bi.

Aliterans. M. Zi.

(vel hujus loco Galatina Cor. Cervi Zi. ad Zi.)

Syrup. Coraf. nigres.

Rhizom. an. Ziß.

Spir. Vitrioli q. l. pro grato sapore. S.

Julepus Aliterans & Confortans.

Vel

℞. Decoll. Corn. Cervi cum Rad. Sterz. Bi.

Citri Myrsinæ Zi.

Syrapi Corafar. nigres.

Rubi Idæi an. Zi.

Spir. Nitri dulc. q. l.

M. D. S.

Julepus Refrigerans & Corroborans.

Vel

℞. Decoll. Corn. Cervi Bi.

Tinctura flor. Bellid. Zi.

Syrapi Rubi Idæi Zi.

M. D. S.

Julepus Confortans.

Decodum Hordei alii stricribant; sed minus probu: quia est Pocu erudus, qui ut plurimum subinde excitat in-
flationes stomachi: ideo præloco hujc vel Aquam simpli-
cem, vel Decodum Radicis Scorzoneræ; Talla enim mi-
nis sunt eruda, & convenientiora.

℞. Aqua font. q. pl.

Vini patum.

Succi Cydoniar. q. l. pro grato acore.

M. D. S.

Haustus Corroborans.

Vel

℞. Aqua font. Bi.

Syrup. Papav. alb. Zi. ad Zi.

Rubi Idæi Ziß.

Spir. Nitri dulc. vel Tinctura Violar. Zi. ad Ziß.

M. D. S.

Julepus Refrigerans & Corroborans.

Vel

℞. Aqua font. Bi.

Succi Corafar. compof. Ludovici, vel alius sacri

apropos. Zi. ad Zi.

Syrapi Rubi Idæi q. l.

M. S.

Julepus Refrigerans & Confortans.

Vel

℞. Aqua font. Bi.

Syrup. flor. Papav. errat. vel Violar. vel

Sacch. albi q. l.

Spir. Vitrioli Zi. ad Zi.

M. D. S.

Julepus Refrigerans.

Vel

℞. Aqua Acetuf.

Sacch. vel Taraxaci.

Flor. Papav. errat.

Succi Berb.

Cydon. an. Zi.

Tinctura flor. Bellid. Zi.

Syrapi acet. Citri Zi.

M. S.

Mistura Refrigerans & Corroborans pro ali-

quot vicibus.

Vel

℞. Aqua. Bereng.

Ruglof.

Rubi Idæi an. Zi.

Cinnam. Zi.

Succi Citri rer. Zi. ad unc. l.

Compof. Alchem. Zi.

Syrup. Rub. Idæi unc. l.

M. S.

Mistura Confortativa pro aliquot vicibus post

sudorem.

Vel in forma Electuarii:

℞. Conf. Acorifol.

Pulpa Citri an. unc. l.

Flor. Tonic. unc. l.

Rub. Rhizom. Zi.

Conf. Alchem. Zi.

Cum l. q. Syr. acetul. Citri, vel

Rubi Idæi l. Electuarium.

D. S.

Electuarium Confortativum.

Convenit etiam Decollum Herbae & Radicis dentula ele-
gantis coloris & saporis grati, cui additur vel succus Aro-
gata caprellis & asservatus, vel succus Rubium sulphuratus,
& Symplic. Rubi Idæi vel Violar. q. l. pro grata & sapore Agri.
Exempla dedi supra, ubi de Jui.

Extemporaneis etiam Tinctura fieri possunt instar Jule-
porum saporis elegantissimi, quæ egregie profunt, utphu-
risimum ladose blando, sine maleficia tamen, Aegro conve-
nientiori.

℞. Flor. Bellid.

Rofar.

Tonic. an. M. l.

Infund. in Aqua camomyl. acidulata Spiritu sulphuris per

camp. Neot in loco tepido ad extractionem Tincturae:

Calatara ment. l. adde

Syrup. Rofar. vel Rubi Idæi, vel Viol. q. l.

M. pro Julepo egregio. S.

Julepus Refrigerans.

Vel

℞. Flor. Agalloge, vel Cyani, vel Papav. errat.

vel Rofar. vel Violar. (quocunque volueris.

nam omnes Flores cœrulei affuso Spiritu acido

dant Tincturam rubicundam.) Zi.

Spiritus sulphuris per campas. vel Vitrioli q. l.

pro grato sapore.

Infund. in Ziß. ad Zi. Decoll. Corn. Cervi, vel Radicis

Scorzoneræ, vel Rari Vitrioli sulphuris acidi in vase vi-

etro bene clauso: Stent ad aliquot horas, donec elicita

Tinctura elegans, cui transcolatur adde

Aqua Rofar. Zi.

Cinnam. Zi.

Syrup. Rubi Idæi vel Violar. vel

Jasmin. Zi. vel Ziß.

M. S.

Julepus Refrigerans.

Uvisetur pro Potu ordinario. Vel

℞. Flor. Bellid.

Papav. errat.

Rofar. an. p. l.

Isoroti cum l. q. Spiritu sulphuris, vel Nitri infund.

in Decoll. Corn. Cervi, vel loco hujus in Aqua Flor.

Papav. errat. Strabula, Taraxaci, etc. Ziß. Stent in

loco calido, donec extrahat Tinctura, cui filtrata ad-

de

Syrup. Rubi Idæi

de Julepo. an. Ziß.

M. S.

Julepus Refrigerans.

Vel

℞. Flor. Papav. errat. M. l.

Violar. M. l.

Isoroti cum l. q. Spiritu sulphuris, vel Nitri infund.

in Aqua Flor. Papav. Ziß.

Stent in loco calido per horas aliquot:

Cela.

Colatura addē
Syrupi Flor. Papav. erras.
Rubi Mei an. ʒi.
M. D. S.

Julepus Refrigerans.
Loco *Spiritus Sulphuris* & *Vitrioli Succī Vegetabilis* acidi afferri possunt. Vel

ʒi. Fem. Ciri in calcol. iuv. No. ij. vel iij.
Macceantur in Aqua feruida ʒi. addē
Flor. Papav. erras. M. i.

Ebulliant leniter: Colat. addē

Elasph. Ciri ʒi.
Syrupus pro Cito ʒi. ad ʒi.
M. pro Julepo.

Vel etiam ipsi *Tinduram* v. g. *Florem Bellidis*, *Rosarum*, *Papaveris erratici*, qui etiam *Spiritus Acidi dulcificati*, infunduntur *Possi ordinario*, sive sit *Cerevisia*, quam tamen propter amarorem reijciunt, sive sit *Cerevisia tenuis*, *Kewer* vel *Kauterling*, que ipsi sunt gratiores.

ʒi. Tindura Flor. Bellid. ʒi.
Aquileg.
Violar. an. ʒi.
M. S.

Tindura Refrigerans 50. vel 60. gutt. in libram unam *Potus ordinarii*.

Et ipsi *Spiritus dulcificati* præscribuntur hoc modo:

ʒi. Spir. Nitri, vel *salis dulcis ʒi. S.*
Spiritus pro Potu ordinario 50. vel 60. gutt. in libram unam.

Vel
ʒi. Spir. sal. dulc. ʒi.
Tindura Flor. Aquileg.
Bellid.
Violar. an. ʒi.
M. D. S.

Tindura Refrigerans pro Potu ordinario 60. ulque ad 80. gutt. in libram unam.

Iscedum loco Juleporum propinat *Decoctum Tamarindorum*, vel solum in *Aqua communi*, vel, quod blandius abstergit, in *Sero Lactis* v. g.

ʒi. Tamarind. vel Pulpa rorundem ʒi. ij. ad iij.
Coqu. in l. q. Aqua comm. vel feri Lactis depur.
Colatura ʒi. ij. ad ʒi. vel ʒi. addē
Succ. Ciri ʒi. vel ʒi.
Tindura Flor. Bellid. ʒi. vel ʒi.
Syrup. acrof. Ciri vel Rubi Mei ʒi. S. vel q. l.
M. S.

Julepus Alterans, & Laxans.

Capitur pro lubitu. Vel

ʒi. Decoll. Tamarind. cum Pass. ʒi. vel ʒi. ad ʒi.
Syrupi acrof. Ciri vel Rubi Mei ʒi.
Spir. Nitri dulc. parum.
M. S.

Julepus Aperiens & Alterans.

Vel
ʒi. Decoll. Tamarindorum cum Pass. ʒi.
Syrupi Granat. acid.
Ribium an. ʒi. S.
Spir. Nitri dulc. q. l.
M. D. S.

Julepus Alterans & Laxans.

Facit hoc elegans *Tindura Rosarum Fossiferi*, quam parat cum *Sero Lactis acidulato* cum *Pulpa Tamarindorum*, que blandè laxat, vel infusum *Florum* cum *Tamarindis* supra in *Febre Ephemera* præscriptum.

Ipsam certè *Serum Lactis* est *Potus* admodum conveniens in *Febribus*, imprimis, si melioris depurationis gratia acidulatur cum *Succo Ciri*, vel *Tindura* similiter appropriata; insigniter enim compositum est, & *Alvum* blandè feruat apertum, ratione *Salis nitrosi volatil*, quod in se continet. Vel

ʒi. Sero Lactis ʒi.
Succ. Ciri ret. ʒi.
Fl. Bellid.

Ebulliant vase clauso, donec Serum Lactis tingatur.

Colatura addē
Sulphuris parum, aut loco Florum tingentium
aliquot uncias *Hypericorum*, *Florum Papaveris erratici* & *Rubi Mei*.
D. S.

Julepus Alterans & Aperiens.

ʒi. Flor. Papav. erras.
Rubar. an. M. ʒi.

Infund. in *Seri Lactis depur.* cum *Spiritu Sulphuris leniter acidul.* *ʒi. S.* Stent in loco calido ad *Tinduram* extrahionem:

Colatura addē
Syrupi de Jopis ʒi.
Violar. ʒi.
M. pro Julepo. S.

Julepus Alterans.

Justa dicta in his *Febribus* optime conveniunt *ulceris* fixa nitrata, vel cum *Nitro fixata Mineralia*, & *Metallica*, *Effervescentiam* *Masse Sanguinis* optime compefcencia, & *Sal vitiata biliosum peccans corrigen*, & figentia, imperando plūs minūs *Sudorem* prout minor vel major arget *Malignitas*, aut etiam prout intensior vel remissior erit *Effervescentia febrilis*. Utissimum est v. g. *Nitrum præparatum*, seu beneficio *Lixivii acris* depuratum, quæ præparatio optima est; vel *Nitrum antimonianum*, Prodest ergo *Arcanum duplicatum* *Antisepticum*, vel *Nitrum vitriolatum*, & *Spiritus Nitri dulcis*. Nil magis *Ædium febrilem* compescere potest, quàm *Nitrum ipsum solum depuratum*; superat hæc *laxans*, inquit *POTERIIUS*, & nihil magis desiderat. Sumitur in *Decocto Scorzæ*, & ita sub *Infusa Potus ordinarii* propinatur. Loco *Nitri* solummodò depurati usitatum aliis est *Nitrum* cum *Sulphure communi* fixatum, seu *Sal Prunelle* dictum, quod nihil valet; optimum est *Antimonium*, i. e. *Nitrum compositum fixatum* cum *Sulphure Antimonii*, id quod fit in præparatione *Antimonii* *diaphoretici*, vel *Antiseptici Poterii*. Nam in tali *Nitro præparato* adest adhuc subtilissima pars *Sulphuris Antimonii*, adeo ut ratione hujus simul *Corpus* ad blandam *Diaphoresin* disponat, & simul *Sal* corrigit vitiosum. Propinatur ad ʒi. in *Aqua* quadam destillata, vel *Decocto* quadam, vel *Potu ordinario*, & assumitur ejus ʒi. spatio 24. horarum. Verùm sub forma *Pulveris* propinatur cum *Antiseptico Poterii*, & multi usus est, cum quo ego aliquoties cum successu præscripsi, modo abest *laxior Alvi* constitutio. Pertinet hæc *Antimonium diaphoreticum*, *Becardicum minerale*, tam simplicia, quam composita, cum *Nitro fixata*, maximè *Antimonium diaphoreticum Martiale*, *Antisepticum Poterii* ritè præparatum, coloris albi (coraleum enim nil valet) & *Becardicum* *invisale*, si per se destilletur cum *Mercurio sublimato* *Buxarum Joviale*, quod figitur cum *Spiritu Nitri* (vid. *SCHROEDERUS*, & *ZWELFERUS*) est egregium, & loco *Antiseptici* potest substitui; *Becardicum Saturninum*, *Cornu Cervi* sine igne, & omnia supra laudata *Abstergentia Animalia* terrea, quæ absorbendo nonnihil, & ad *Diaphoresin* disponendo corpus, autem *Effervescentiam* corrigit; e. g.

ʒi. Aqu. Rubi Mei unc. ij.
Rad. Scorzæ.
Succ. Cydon. var. an. unc. j.
Becard. Jovial. ʒi.
Syrup. Papav. albi, vel Rubi Mei ʒi.
Spiritus Nitri dulc. q. l.
M. D. S.

Mixtura Alterans, coelestium fumens.

Capitur coelestium pro lubitu, ut & *Febrim* temperet, & simul *Corpus* ad blandum *Sudorem* disponat.

ʒi. Aqu. Rubi Mei unc. ij.
Turaxan. unc. j.
Antimonii diaphor. dr. ʒi. ad dr. i.
Syrupi Ribium, vel Rubi Mei dr. vj. ad unc. j.
Spiritus Nitri dulc. dr. ij. ad dr. ʒi. vel q. l.
Misce. S.

Mixtura Alterans.

Vel ad imitationem *POTERII* *Emul. 2. n. 49.*

ʒi. Aqu. acrof. ʒi.
Antimonii diaphor. dr. ʒi.
Succi Ciri,

Syrupi Papav. nigri an. unc. j.
M. pro Potestate, aliquot vicibus assumenda: S.
Potiuscula Præcipitans, coelestium fumens.

Vel
ʒi. Aqu. Turaxani unc. ij.
Tindura Flor. Bellid. dr. ʒi. ad iij.
Cera. Cervi fuscæ dr. ʒi.
Anisell. Poterii ʒi.
Syrupi Flor. Papav. erras. vel simpl. unc. j.
M. D. S.

Ms.

Mixtura Alterans,

Vel

- ℞. Aqu. Rabi Idæi ℥i.*
Spir. Theriac. camphor. ℥iij.
Antimonii diaphor. ℥ss.
Bezoard. Tiviat. ℥ss.
Syrupi Papav. simpl. vel Rabi Idæi ℥i.
Spir. Nitri dulc. q. l.
 M. f. Pota pro aqua vel duabus dosibus haurienda, & repetitis vicibus, pro labie tamen.

D. S.

Mixtura Alterans,

Eger se disponat ad aliquem madorem, ut compescatur melius, & facili libenter Febres,

- ℞. Aqu. Rivi, decq.*

Sambuci,

Taraxac. an. ℥i.

Celastion Corno Cervi ℥i. ad ℥ss.

Corno Cervi sine igne ℥i.

Antihell. Pteridii

Antimonii diaphor. an. gr. xij.

Syrupi Papav. simpl. ℥vi.

M. D. S.

Mixtura Alterans, & Corroborans,

Vel

- ℞. Aqu. Scaramora,*
Taraxac. an. ℥ss.
Mist. simpl. ℥i.
Eleth. Diastard. Præparat. ℥i.
Corn. Cervi sine igne ℥ss.
Antihell. Pteridii ℥i.
Syrupi ex late Cere ℥iij. vel ℥ss.
 M. D. S.

Mixtura Alterans cochleatim fumenda,

Vel

- ℞. Aqu. Scaramora,*
Fior. Sambucian. ℥iij.
Antimon. diaphor. ℥i.
Bezoard. Mineral. ℥i.
Syrupi papav. alb. ℥i.
Spir. Nitri dulc. q. l.
 M. pro 3. dosibus, vel cochleatim, &

Mixtura Sudorifera pro aliquot vicibus.

Vel

- ℞. Aqu. Fumar. vel Fior. Sambuci ℥iij.*
Corn. Cervi sine igne ℥i.
Bezoard. Min. ℥i. ad ℥ss.
Extrac. Theriacal. gr. v.
Syrupi Cort. aurant. dr. iij.
 M. pro 3. dosibus.

M. D. S.

Mixtura Sudorifera pro aliquot vicibus.

In forma sicca Nitrate præscribi possunt.

- ℞. Nitri autimen. vel Nitri depur. ℥i. dr. ℥. ad ℥iij.*
Antihell. Pteridii, vel autimen. diaph. simpl.
vel martial. ℥i. ad dr. ℥.
 Laudani opiat gr. i. vel ii.

M. S.

Pulvis Corroborans & Refrigerans vespertinus.

Detur pro 3. dosibus in vehiculo conveniente, imprimis tempore vespertino. Vel

- ℞. Nitri antimoniat. ℥i.*
Corno Cervi sine igne,
Antihell. Pteridii, vel Antimonii diaph. an. ℥ss.

M. f. Pulvis S.

Pulvis Refrigerans, & Confortans.

Cui in suspicione Malignitatis, aut imminente Delirio Camphora gr. ii. addi possunt. Vel

- ℞. Corno Cervi sine igne dr. ℥.*
Nitri antimoniat. ℥i.
Antimonii diaphor. ℥ss. vel gr. xij.
Camphor. gr. i. vel gr. iv.

M. f. Pulvis.

Div. in 3. partes aqua. D. S.

Pulvis Refrigerans, & Corroborans.

Tempore vespertino loco Camphoræ præscribo Laudani opiat gr. ii. vel iii. ad iv. Detur in vehiculo conveniente, aut quocunque. Blandè movet Sudorem, & egregiè compescit æstum.

- ℞. Nitri depur. gr. xvi.*
Antihell. Pteridii ℥ss.
Sass. Saturnig. v.
 M. f. Pulvis S.

Pulvis Refrigerans,

Vel

- ℞. Nitri depur. gr. xv.*
Antihell. Pteridii.
Antimonii diaphor. an. gr. v.
Camph.
 Laud. opiat an. gr. i.

M. f. Pulvis S.

Pulvis Refrigerans, & Corroborans vespertinus.

Vel

- ℞. Arcani dupl. gr. xvi.*
Antimonii diaphor. ℥ss.
 M. pro dosi, S.

Pulvis Refrigerans, & Confortans.

Pulvis hic ita compositus interdum nonnihil laxare solet:

Vel

- ℞. Arcani dupl. gr. xij.*
Lapill. Caner. prep.
Ether. sine igne an. scr. ℥.

M. f. Pulvis S.

Pulvis Refrigerans & Confortans.

Vel

- ℞. C. C. sine igne, vel Pulv. Bezoard. Ludov. gr. xv.*
Bezoard. Jerv. vel Mineral. scr. ℥.
Camph. gr. i. vel ii.

M. f. Pulvis S.

Pulvis Diaphoreticus Alterans,

Vel

- ℞. Ether. sine igne,*
Antihell. Pteridii an. scr. ℥. ad gr. xv.
 M. D. S.

Pulvis Principians,

Vel

- ℞. Terra squillata.*
Bezoard. mineral. an. gr. xv.
Camphor. gr. ii.

M. f. Pulvis S.

Pulvis Bezoardicus Sudoriferus.

Vel

- ℞. Nicotina. fessil.*
Ether. sine igne,
Cinnab. Autimen. an. gr. viij.
 M. D. S.

Pulvis Alterans.

Vel

- ℞. Cinab. fessil.*
Corn. Cervi sine igne an. gr. xij.
Bezoard. Mineral. ℥ss.
 M. D. S.

Pulvis Sudoriferus Alterans,

Vel

- ℞. Pulv. Bezoard. ℥i.*
Antimonii diaph. vel Bezoard. Min. vel Cinnab.
Antimonii ℥ss. vel gr. xij.

Camphor. gr. ii. vel iii.

M. f. Pulvis S.

Pulvis Bezoardicus Diaphoreticus.

Vel

- ℞. Corno Cervi sine igne gr. xij. xv. ad ℥i.*
Antimonii diaph. ℥ss. ad gr. xij.
Sal. volat. Corno. rrr. gr. iv. vel v. vel vi.

M. D. S.

Pulvis Bezoardicus Sudoriferus.

Vel

- ℞. Corno Cervi sine igne gr. xv. vel scr. i.*
Antimonii diaphor. vel Bezoard. Min. ℥ss.
Sal. volat. Corno. Cervi. gr. iv. vel v. vel vi.

Camphor. gr. ii. vel Laud. opiat. gr. i.

M. f. Pulvis S.

Pulvis Diaphoreticus.

Vel

- ℞. Antimonii diaphor. martial. ℥iij.*
Bezoard. Min. gr. xv.
Laud. opiat. form. gr. ii.

M. f. Pulvis S.

Div. in 3. partes aqua. S.

Pulvis Sudoriferus.

Quorum usus capiatur tempore vespertino, alter post

mediam noctem.

Nitrum etiam depuratum, aut Nitrum antimoniacum pulverisatum dissolvatur in Potu ordinario, ita, ut iuxta LINDANUM ejus ℥ss. hoc modo intra diem naturalem commodè propinari possit, Pertinet hoc Sudoriferum ma-

ma-

simus *Fabii*, quod nobile est Remedium, item *Jaspur Diaphoreticus Beguini*, *Cinnabaris Antimonii*, & *Dolore Aluminis factherata*, seu *Alumen faum*, & quo nempe phlegma toties cohibetur, donec non amplius exurgat, sed omnia fixa maneat: uti habetur *Arctium* ad omnes Febres, etiam *Hedicas*, ita similiter egregium est *Ficus* in Febribus Continuis *Ardentibus* 3. Vid. *POTERIUS* de l. 2. *Pharmacop. Spagy. cap. 2.* Claretum verb & meliorem descriptionem habet antiquus *Chymicus DARIOTTI* in *Justaure suo Chymia cap. 24. pag. 245.*

Justa dicta, ubi ipsum *Sals pulvis* peccaverit simul nimis *Artemisia*, conveniunt subinde Emulsiones, paratæ ex *Seminibus* temperatis oleosis cum Remediis suis, quæ blandè temperant & obtundunt *Acrimoniam* istius *Salis* peccantis: sunt ordinariæ ex *Seminibus* 4. *Frigidis*, aut minoribus, aut minoribus: Item ex *Hordeis* ad crepturam cocto, ex *Amygdalis* dulcibus: v.g.

℞. Sem. 4. *Frigid. maj.* 3℔.

Papav. alb.

Amygd. dulc. ana 3℔.

Cum l. q. *Aque Rosar. l. Emulsio:*

cui addo

℞. *Opil.* 3℔.

M. S.

Emulsiō Temperans.

Vel

℞. Sem. *Papav. alb.* 3℔.

4. *Frig. maj.* ana 3℔.

Cum l. q. *Aque Calce.* vel *Nymphae.* vel *Rubi Idæi* & *Aque Temperavi* maj. (pro qualibet ℞. *Seminum* unc. i. *Liquoris* affusum, uti notum est) ℞. *Emulsio* cui circumstantiarum ratione addo.

Nitri Antimoniat 3℔. vel 3℔.

Antisept. *Poterii* vel *Antimonii diaph.* vel *Bezoar.*

min. 3℔. vel 3℔.

(vel *Antimonii diaph.* & *Antisept.* *Poterii* ana gr. xv. 3℔. ad 3℔.) edulcoretas parum cum *Rosul. Mannæ Christi* perlat.

D. S.

Emulsiō Refrigerans & Confortans, pro aliquot vicibus.

Vel

℞. Sem. *Papav. alb.* 3℔.

4. *Frig. maj.* ana 3℔.

Cum l. q. *Aque Flor. Papav. errat. l. Emulsio:*

addo

Eber. sue igne 3℔.

Antimonii diaphor. 3℔.

Sacchari parum.

M. D. S.

Emulsiō Refrigerans & Confortans.

Capiatur subinde cochlearium pro 1. 2. vel 3. dosibus

℞. *Amygd. dulc.* 3℔.

Sem. *Papav. alb.* 3℔. vel i℔.

4. *Frigid. maj.* ana 3℔.

Cum *Aque Acetof.* vel *Indiv. l. Emulsio:*

addo

Antimonii diaphor.

Bezoar. Minor. ana 3℔. ad 3℔.

M. D. S. ut antea.

Edulcoretur parum. Cochlearium usurpetur.

Non tamen crebris aut copiosis præscribuntur hæ Emulsiones, quia *Stomachum* nonnihil pessendant, eundem tonum ledunt, appetitum destruant, & ita crebriore usu nocivæ evadunt.

Hæc quoad Internas sufficiunt.

Externæ pro Symptomatum aliquâ mitigatione, imprimis pro compescendo *Æstu febrili*, & ad præcavenda *Deliria*, ac *Vigilias*, *Dolores*, *Coma* vigil. plantis *Pedum*, & *solis Manuum* applicandam est *Cataplasma* ex *Fermento pistorio*, cum *Aceto* & *Sale* impregnato; vel, quod melius est, *Cataplasma D. Michælis*.

℞. *Fol. Rutæ* var. M. ii. vel i℔.

Radix. Raph. insif. No. ii. vel i℔.

Salis M. i.

Fermenti acerrim. M. vel 3℔.

Aceti vini, vel *Rutæ*. q. l.

M. pro *Cataplasma* vel *Pulmento*, plantis *Pedum* nodis, vel *volis Manuum* ita applicando, & si exsiccatum fuerit, scopetodo.

Imò solus *Radix Raphani* in tucolas incisæ *Stomacho* *Pedibusque*, *Sale* & *Aceto* probè prius mundatis, applicato, insigniter conveniunt: quidam etiam *Occipiti*, applicant: *Raphanus* enim iritando succellit quasi struthendo

Tom. II.

derivare videtur. Pauperiores saltem recipiant *Linum recemtem*: huic *Aceto* probè permixtum, nudis *Pedum* plantis applicat. Succus *Cancerum* fluvialium ex *Cancris* vivis contulis recens fortiter expressus, instar *Cataplasma* plantis *Pedum*, & *Volis Manuum* applicatur, lubandè renovando, egregiè conducit ad temperandum *Æstum*: imò instar *Epithematis Fronti* circumligatus seu applicatus egregiè convenit ad *Cephalalgiam* tollendam, & inde imminuendæ *Vigilias* concussas, item ad præcavendum *Delirium*. In *Cancris* enim *Uvariis* multa latent, tam in *Febribus Ardentibus*, quam etiam in uls *Chirurgicis*.

Simplis dictum fuit, quod etiam dentur *Febres Deliria*, propter *Delirium* præsens ita dictæ: in tali *Delirio*, ut & *Agrypnia* & *Cephalalgia*, præter blanda *Andryna* aut *Optata* cum aliis appropriatis cautè & circumspicè usurpata, *Phasaram* *Raniarum* apertis subinde proleca exillit: ac sanè in *Morbo duntax Hungarico* seu *Febre Capitis*, earum scilicet & ratione punit *Præsentia*, & ratione *Capitis pathematum*, summè probens existit. Quorum loco & tali in Symptomate imminente, sat gravis urgere, cætera si respondeant, *Vina Frontis* scilicet à quibusdam institui solet. Forsan, ubi sub *Agrypnia* aut *Cephalalgia*, item *Frontis affusionibus*, periculum *Delirii* imminet, *Hirudinum* pont *Aures* applicari non inutilis foret. Aliis in *Febribus Ardentibus* etiam periculosissimis Obandito, sed non in principio, superveniens bonum signum esse solet: propterea, quia ex decubito aliquali *Fermento febrili*, seu, ut alias loquuntur, *Materiæ peccantis* ad *Glandulas Parotides* cæteræ partes alleviatur. Præter dicta istis in *Capitis pathematis* *Epithemata* non raro fructuose, sed calidè, aut saltem tepidè *Fronti* applicantur. Observandum autem, quod ejusmodi *Epithemata* Tempora simul tegere debeant, itaut ultra *Arterias* ibidem pulsantes pergant. V.g.

℞. *Aque auriti*, vel *Rosar*, vel *Ros. Sambuc.* vel

Perben. 3℔.

Applet. 3℔.

Philum. Rom. vel *Ros. Nicolai*, vel

Theriac. 3℔.

M. D. S.

Epithema externum,

Vel

℞. *Aque Ros. Sambuc.*

Perben. ana 3℔.

Spir. Theriacal. campher. 3℔.

Philum. Roman. 3℔.

M. D. S.

Epithema Resolvens circa *Caput*,

Vel

℞. *Aque Chamom.*

Ros. Sambuc. ana 3℔.

Applet. vel *Cephal.* ad extra 3℔.

M. D. S.

Epithema externum,

cum linteis multiplicibus tepidè *Fronti* & *Temporibus*.

Sed à nimio *Camphoræ* usû in *Agrypnia* abstinendum, quæ alias singulari est in *Deliria*. Vel hujus loco sequens Emulsiō, quam aliquoties felici cum successu præscripsi, applicari potest.

℞. Sem. *Papav. alb.* dr. ii. vel i℔.

Hyosc. dr. ʒ.

Aq. Spem. Ranar. 3℔.

Sempervivi.

Solani.

Hyoscyamæ affr. ana 3℔.

F. l. a. *Emulsiō*: addo

Campher. gr. vi. vel vii.

M. D. S.

Emulsiō externa circa *Caput*.

Vel

℞. *Muc. Persic.* 3℔. vel i℔.

Sem. *Papav. alb.* dr. ii.

Aq. Spem. Ran. 3℔.

Sempervivi.

Solani ana 3℔.

F. l. a. *Emulsiō*: addo

Campher. gr. viii. vel 3℔.

M. pro *Epithemate*.

Epithema circa *Caput*,

Vel

℞. Sem. *Papav. alb.* 3℔.

Aque Mentha,

P p

Apq

Aqua Vertens ana ℥ss.

F. l. a. Emulso: adde

Campora gr. iij. vel xij.

M. S.

Epithema Refrigerans.

Vel

℥ss. Sem. Papav. albi ℥iij.

Aqua Spem. Ruar. ℥iij.

F. Emulso: adde

Crati ℥ss.

Camp. gr. viij.

M. pro Epithemate.

Cui subinde etiam *Succus Caner. flav.* addi potest.

D. S. ut antea.

Disce Emulsionem aut Mixturam solam in forma Epithematis applicatam fronti; vel miscetur his ipsi ana *Succi Canerum flavissimum recens expressi*, & ita subinde fronti applicentur, sepeque renovetur, & egregie Delirium liberant: *c. ℥.*

℥ss. Aqua. Rosas.

℥l. Papav. erras.

Sambuci an. ℥i.

Succi Caner. flaviss. rec. expressi. ℥iij.

Spir. Vin. camp. ℥iij.

M. D. S.

Epithema circa Caput.

Vel solam etiam Aquam Rosarum tanquam eximiam commendat PIENS Traut. de Febribus. Item

℥ss. Unguenti Alabastr. vel Papav.

Sambuci. nigras. ℥ss.

Ol. express. Nuc. Maje. ℥ss.

Camp. gr. vj.

M. D. S.

Unguentum ad quietem.

Vel

℥ss. Unguenti Alabastr. ℥iij.

Ol. express. Nuc. Maje. ℥i.

Philos. Romani, vel Theriac. ℥ss.

M. S.

Unguentum Refrigerans Cephalicum.

Quo & si impetioris raptus quasi ad Caput metueatur, in specie ubi Excretio quancunque, imprimis cutanea, suppressa, dicta Capitis Symptomata inferunt; *Ulcuscula* hemoribus vel Brachiis applicata, & Enemata acriora, conducere arbitror.

§. XVII.

PRUNELLÆ CURA.

Prunellam quod attinet, quæ non raro adeit in his Febris in nimio Corporis ardore, seu cum Linguae rubedine, ardore & icabritie, hanc optime præcavent & mitigant Mucilago Seminis Pijillii, vel Cydoniorum, cum Aqua Sempervivi majoris extracta, subinde Linguae applicata, aut in Fasciis detenta: *Conf. supra* ea, quæ de *Siti nimia* dixi, & *M. A. N. G. Ann. 8. Observeat. 76. pag. 123. vel*

℥ss. Sem. Cydon.

Malos.

℥ss. ℥ss. an. ℥ij.

Cum *℥. q. Aquæ Spem. Ruar. f. Mucilago ad ℥ss.* cui addo

Salis Ammoniaci ℥i.

Aquæ Sempervivi. compof. ℥ij.

Succi Caner. flaviss. ℥ss.

M. D. S.

Mucilago Refrigerans.

De qua, quantum sufficit, in ore subinde detineatur.

℥ss. mucilag. Sem. Cydon. cum Aquæ Rob. Idæi extr. ℥ss.

Syrapi Portulac. ℥vi.

Nitri parum.

M. D. S. ut antea.

Detineatur in ore.

℥ss. Aquæ Sempervivi. maj. ℥ij. vel ℥iij.

Mucilag. Sem. Cydon. cum Aquæ Spem. Ruar. extr. ℥i.

Nitri depur. ℥i.

M. D. S. ut antea.

Convenit etiam speciatim, nisi aliquid obstat, matura Venarum Raninarum sub Lingua infuso, idque tunc imprimis, quando Tumores observantur, & metus est supervenientis & instantis Anginæ: sicut etiam in nimia Fancium Inflammatione Oris lotiones cum Nitro, tam cum quàm sine Gargarisatione, convenienter usurpant possunt, lastæ ex Plantagine, Laduca, Solano, Ligustro, Portulaca, Prunella & similibus, additis post Decoctionem Succis

Mezorum, Berberum, Citri, &c. aut similibus: quorum formula sequens præscripta est à SYLVIO l. 2. *Prax. cap. 29. §. 26.*

℥ss. Sal. Prunell.

Salis.

Frax. an. M. i.

Hand. integr.

Coqu. in *℥. q. Aquæ puræ:*

Calatura ℥ss. adde

Syrapi Dia-Idæi ℥i.

Lap. Prunell. (vel potius Nitri amon.) ℥ss.

M. l. Gargarisma.

Vel

℥ss. Herb. Prunell.

Salvia.

Scabif. an. M. i.

Flor. Raf. rubr. M. i.

Cort. Nuc. Jugland. unc. i.

Coqu. in Aquæ singl.

Calatura unc. viij. adde

Succi Sempervivi maj. unc. ii.

Rob. merz. unc. iij.

M. D. S.

Gargarisma Refrigerans.

Vel

℥ss. Herb. Prunell. M. ii.

Salv. M. l.

Albi Crati unc. ss.

Coqu. in ℥. q. Aquæ:

Calatura ℥ss. adde

Spir. Vin.

Rob. merz. an. unc. ss.

Mell. refat. dr. vi.

M. pro Gargarismo: S.

Gargarisma Resolvens.

Item

℥ss. Herb. Prunell. M. ii.

Salv. M. l.

Flor. malv. arbor. rub. M. i.

Coq. in *℥. q. Aquæ singl. vel Cerevis. secundaria.*

Calatura adde

Mellis parum.

Nitri. q. pl.

M. pro Gargarismo: S.

Gargarisma.

Aliis palmarum præperere dicitur, si

℥ss. Sempervivi. maj. compof. q. l.

Succi cydon. ℥ss.

Salis Ammoniaci unc. ss.

Diffolvantur, & ita invicem destillentur. Quæ ipsa

Aqua Fauces eluantur, & humectentur.

Cujus in defectu:

℥ss. Aquæ Sempervivi maj. unc. viij.

Succi cydon. unc. iv.

Salis Ammoniaci dr. l.

M. D. S.

Gargarisma.

Et dicto modo adhibeatur.

Item Succus Cancrærum flavissimum contraxerum expressus perquam egregius in hujusmodi Fancium affluencia est semper.

℥ss. Caner. flav. No. vi.

In mortario cum paucis *Aris Robi Idæi* contusi leniter exprimantur: adde

Succi Sedi maj. ncc. iij.

Rob. Nucem unc. l.

Nitri ammoniaci dr. l.

M. D. S.

Gargarisma Refrigerans.

Ex hoc ipso liquore fricanda Lingua.

Vel

℥ss. Aquæ Sempervivi. maj. ℥ss.

Succi caner. flav. rec. unc. iv.

Salis Ammoniaci depur. dr. iij.

M. D. S. ut antea.

Colluitur hoc crebrius Os, aut gargarisatur, aut tepide in Ore detineatur. *Vel*

℥ss. Aquæ caner. flav. unc. iij.

Sperm. Ruar. unc. l.

Semperv. maj. unc. i.

Phleg. Virid. variis unc. iij. vel unc. ii.

Syrapi Viol. unc. l.

Refat. rubr. unc. ss.

Nitri cum Alkali depur. dr. iij. ad dr. ii.

M. D. S. ut antea.

Noce-

Noctur. Nitri, vel Salis Ammoniaci simplicis loco esse quoque potest Sal Ammoniacale, quod vid. in *Colligie Chym. & Ludoicis*.

Alioquin observari in Morbis Malignis, dum Fauces sunt sicce & aridae, sine crasse pituitosa praesentia, optimum fuisse Remedium Hoff. *Aqua communis*, Mell. comm. cocti. 3. vel 4. Spiritus Vini Rhenani rectificati 3j. vel 3ss. Mistra usurpetur pro Oris resolutione.

Si post tales Oris collutiones in graviore malo mox Lingua denovo ardeat, tunc nil melius est:

℞. *Fructus Lardi non salis*, vel 3j. salitum fuerit, in Aqua Spermatiz Ranarum maceratur: hujus fructuum usum imponatur Linguae, & ite aliquandiu detineatur, emollietur exinde Lingua, & interdum crusta quasi coriacea separatur.

Loco *Fructus Lardi* contra talem *Ergasie scabritum* alla Piagula, v. g. *Butyrum non salitum*, itidem commodè usurpari possunt. Vel

℞. *Rapae* coquende; inde vasi ligneo, impone grave pondus: Liqueorem expressum instat Syrupi coque,

§. XVIII.

Febrium Continuarum Periodicarum

Cura.

Hæc ipsa Remedia & Methodus promiscuè tam in *Febribus Continuis*, quam *Conticis Periodicis*, usurpari possunt, nisi quod in his ad *Exacerbationem* vigintiannam magis respiciendum sit, adeoque tempore ingruentis Paroxysmi modo dicta, imprimis Antimonialibus fixis, simul ratione complicatae Febris Intermitteutis, praestigiis praeremittenda, subside adjuugenda sunt *absorbentia* & *alterantia*, supra laudata, in specie Corallia, Lappi Cancerum, Anthelidicum Poterii, Sal Cardui benedicti: item Nitrum viotriolatum *Myrsin*, quod solum ante Paroxysmum in Periodicis est egregium, Imprimis conducunt *Misturae* ex lubconeratis patate, l. e. ex Acidis & Terreis, quorum Formulae extant supra, conservando Corpus in Diaphoresi blanda, Alvumque liberam retinendo, aliisque pro Symptomatum varietate debet praestando,

§. XIX.

Semiterntianarum Cura.

Eadem ferè de *Semiterntianis*, aliisque similibus *Compositis* & *Complicatis* variè scribere, dicenda veniant. Sunt autem omnes periculose *Semiterntianae*, & tunc magis nunc minus Acutae, pro varietate nempe Complicationis & Compositionis variæ: unde & Cura specialis pro harum varietate varianda; attendendo, an *Benigna* magis, an *Maligna* fuerit eadem: an *simpliciter febris Composita* sit, an vero cum *Inflammatione* Partis cuiusdam vel nobilioris vel ignobilioris, sensilioris vel minus sensilis iuncta: quo nobilior aut sensilior Pars inflammata fuerit, eo gravis magis & periculosior erit Affectus, & cui altiore ope succurrendum. *Lenta* itidem, si *Intermittenti* iuncta fuerit, pro ratione originis, *lente* & *Prognosis* & Cura nonnihil modificanda; adeoque ea, quæ de febribus Intermitteutibus & Continuis iam dicta, ea & *Semiterntianis*, prout ad unam vel alteram talium prius accedant, accommodanda erunt.

In genere *Rigorem* & *Horrorum salust absorbentia*, *alcalia*, &c. *Aërum* verò eadem, *Diaphoreticis* & *Alvi* libertate iuncta. Si ista Periodo recurrant Paroxysmi, ante *Exacerbationem* possunt Remedia propinari.

Humiditas in plethrice sine optima: sicut, si cum *Inflammatione* iuncta, *Diaphoreticis* & *Indurificis*, cum *lento* verò *Salis absorbentia*, & *incideris*, ut sal Ammoniacum, Atacum duplicatum, &c.

Vix juvenis Febre Intermitteute *Lenta* typi Tertianæ duplicate affligebatur, quæ tamen revera Hemitritanæ quædam videbatur species: ex lesa Dieta, ipso Hypochondriace essent. Paroxysmi omnes affligebant saltem eum *Aëtu*, sine ullo Horroris velignis, lente & pedetentim incipiebant cum Cephalalgia, Hypochondriorum tensione, & Dolore Abdominis gravativo: *Aëtus* erat quod exterius tantum moderatè, Pulsus non adeo insigniter frequens, sed interiora eò magis urebantur, Cervicium tordebant, Lingua in Paroxysmo arida & liguila. Biduo ferè iam aggraverat: Die ergo Martis:

℞. *Corall. rub. prap.*

Arcum. dupl. an. 3j.

M. pro 2. *absorb.*

Tom. II.

Vesperi appetente nocte erat Paroxysmus. Die Mercurii ordinabatur Pulvis blandè Lavativus ex Tartaro viotriolato: vesperi denud capiebatur unam ex istis Pulveribus hoc de Paroxysmus quasi erat duplex, ante & à meridie Die Jovis:

℞. *Arcum. dupl.*

Nitri antimonialis,

Antibell. Poterii an. 3j.

M. pro 2. *absorb.*

Vesperi erat Paroxysmus unus. Die Veneris:

℞. *Spir. Nitri dulc. 3j.*

Apparebant Paroxysmi bini, mane unus, alter vesperi: si ique satis iocundè, terminabantur omnes sine sudore. Die Saturni:

℞. *Lap. Cancr. prap. 3ss.*

Salis Absorb. 3j.

Antimonialis diaphor. 3ss.

M. pro 2. *absorb.*

Paroxysmus erat duplex, à meridie; & hinc vesperi. Die Solis Vomitorium propinabatur, quod copiosè & mucilaginosè evacuavit: hac die melius Paroxysmi velligium apparebat, noctu levis quidam Insulatus, cum vesperi prius accepisset inquentem Pulverem:

℞. *Salis Ammoniaci 3j.*

Antibell. Poterii 3ss.

Mili.

Die Lunæ, cum merueret hac die Paroxysmus:

℞. *Aqua Card. bened. 3ij.*

Salis Ammoniaci 3j.

Salis Cancr. min. 3ss.

Antibell. Poterii gr. v.

Syr. Cort. Auranti. 3ss.

Mili.

Capiebat subinde coelestem; quia & lentus, & ferè vagus erat Morbi motus.

Redibat Paroxysmus circa meridiem ingens, Aëro admodum anxio existente, & de gravissimo Aëtu conquerebat.

Post aliquot horas vocatus reperio Aëtum in partibus externis admodum moderatum, neque etiam Pulvum respondentem Febri adeo anxio, ac de ea conquerebatur Aëter, ipso nunquam adhuc gravialis, ac cum tanto Ardore, ac tanta Cephalalgia laborasse affirmante; propterea

℞. *Spir. Sal. Ammoniac. 3j.*

Dosis gutt. 40. mox, & appetente nocte.

Primo huius usi intra mediàm horam interius Aëtus tepescere, Anxietates cessare, quin ad exteriora verso Aëtu, & Sudore facile empuente, Paroxysmi cessatio, nocte inscota quiescit. Continuatè integra Septimana hunc Spiritum, & levis saltem vestigia Paroxysmorum circa horam secundam pomeridianam patebat, quæ usu Spiritus salis Ammoniaci insequente sudore intra horam evanescebat. Sed cum hæc quotidie evenirent, Urina verò copiosum sedimentum habebat, Alvus verò clausa, ob id die Solis

℞. *Puls. linc. 3ss.*

Turr. viotriolat. 3ss.

Enly. Cachal. Martmanni gr. v.

Mili.

Capiebat, & hoc die nullus Paroxysmus apparebat.

§. XX.

Cura Causi.

Nil singulare requirit, saltem, quod *Mitratæ*, tum *stibi* quàm *Aëtu* ratione, imprimis conveniant, si in forma sicca in Potu dissoluta usurpentur, live Spiritus Nitri simplex, aut potius *absorbentis* ad guttas 50. in mensura semis Portionis affluatur v. g.

℞. *Nitri antimonialis 3j.*

Dissolvatur in Mensura vel Cerevisæ vel Potus ordinarij, ita ut 3ss. liceat dare die naturali, nisi liberior Alvus obstitierit.

Quid si accidat, ut dato Nitro non cum tante urdis mitratæ Urina, & liberalius acidis mepre, bene animo est, dicit LINDANUS. Spiritus Nitri usurpatur in *Jalepis*, item in *Peinatur*, quantum *Formulas* supra dedi.

Vel præscribitur Decoction quorundam Altram:

℞. *Rad. Scorzoner. 3j.*

Liquirit. 3ss.

Pol. Acetof. M. 3.

Flor. Violar.

Rosar. rubr.

P p 2

Don

Rorag. aa. p. ij.
Hord. M. l. vel ij.
Ref. Car. Cera. ℥. ad ℥℥.
Fasul. min. ℥.
Coqu. in L. q. Aqua simpl.
Colatura Ev. adde
Spir. Nit. vel Spirit. q. f. ad aequalem sa-
poris gratiam.

M. D. S.

Potio Refrigerans, & Alterans.

De hoc Ager subinde capiat in Causa, imprimis cum Phrenitide juncta.

In hoc pulu bonum etiam est Remedium Londinum opio-
sum, si tempestivè & prudenter exhibeatur, unam Calo-
ris vim refrænabit.

§. XXI.

Cura Febris Lypthie.

Utiplurimum periculosa admodum propter Inflammationes
Kryspolacas, Partes internas occupantes, instituitur per
Diaphoretica, tam abstergentia, quam Pulverilla Alcalia, Pena-
trantia & Dissolventia; quam medendi rationem infra, ubi
de Inflammationibus, in specie ubi de Phrenitide, habebi-
mus.

Malignarum Februm Curam infra tractabimus.

§. XXII.

Cura Februm Colliquativarum.

In his ad Acri colliquationem imprimis respiciendum, ut
hoc corrigatur: Si enim hoc neglecto Excretiones saltem,
que tantum sunt Prodiæ morboſæ, respicere, hæque
supprimere velimus, retentis istis mille malis multabitur
Ager. Ad Acri autem illud temperandum, vix ali-
quid convenientius esse videtur, quam Abstergentia, v. g.
Antimonium diaphoreticum Martiale, Terra sigillata,
Unioerum fissile, &c. Que eò videbuntur efficaciora, si
sociatione blandiorum acidorum, ut Succo Ribium, Berbe-
rum, Ceraſorum, Citri, Cydoniorum, &c. aliqualem
quasi austeritatem contraxerint: Hinc enim SYLVIVS
Spiritu Salis dulcem s. 29. §. 91. hndat. Unde & in Ex-
cretionibus nimia abstergentia, v. g. Tinctura Hammatitis,
&c. nunc & vespertini gutt. 16., vel Liqueor Stypticus ad
gutt. 20. adhiberi possunt. Forsan & Camphora, quodvis
Acri temperans, hic locum habebit. Inter Complicata Ele-
ctuarium Diaſcordii Praeparatum, juncto sicco Citri propina-
tum, præ aliis conducibile videtur.

I. Præter ea, quæ extrinsecus Vulneri conducibilia sunt,
internè egregia Mithra est in Causis Chirurgicalis polycephala:
v. §.

℥℥. Aqua hyssopi ℥℥.

Favie. ℥.

Spir. Theriacal. ℥℥.

Aet. Vini vel simpl. vel destill. ℥℥. ad ℥℥.

Lap. Camer. fluvi. ℥.

Syrup. Card. bened. ℥℥.

M. D. S.

Potio Vulneraria Dissolvens.

Vel in forma sicca:

℥℥. Lap. Camer. prop. ℥.

Extrall. Theriac. gr. ij.

M. D. S.

Pulvis Dissolvens.

Quibus etiam pro Partium affectionum ratione, vel Sym-
ptomatum veterum syndrome, simul alia appropriata ad-
di possunt.

II. Febres, quæ adfunt Inflammationibus gravioribus as-
sociata acidi vitiosi Sanguinis coagulantis, & ad stagnatio-
nem, indeque ortam Inflammationem disponentis, ex vitioſo
cum Sale volatili Effervescentis in Sanguine utplurimum
causantur. Febres hæc nunc sunt acuta, v. g. in Pleuritide,
Inflammatione Hepatis, Angina, Kryspalæ, nunc Lenta,
ut in Inflammatione prope fundam Mcasarum, &c. Curantur
hæc Febres simul & eadem ratione, qua Inflammationes
ipsæ, per attenuantia, acidum abstergentia, Pulverilla alcali-
na, Diaphoretica &c. de quibus infra suo loco, oempe, ubi
de Inflammationibus. Hæc ratione etiam Lactica, Eudivia,
Serum Lactis, Sempervivum, & alia Refrigerantia dicta,
Alcali volatili blando coactant, quæ Phlogosæ & Inca-
lescentias, ab Effervescencia Acidi acuti, corrigunt, &
ita per accidenſes refrigerant.

III. Quæ sanguinem intra Corporis cavitates, aut in ipsis
solidis Partibus, effusam & coagulatum insequi solent, & ex
acuta, putredinali corruptione antecedente, orimtur.
Conducunt sanguinem congruentem Resolventia, & Putredini
resistentia, qualis, præter Miltiam supra laudatam, sunt
Nellus minor, Scabiosa, Flores Hyperici, Chæresfolium,
Papaver rhæas, Antimonium diaphoreticum, non negli-
gendo simul Potiones Vulnerarias.

IV. Pertinent hæc febres istæ, quæ in principio Paroxyſ-
morum arteriorum usque ad Strum iterè observantur:
de quibus vid. SYLVIVS l. 1. Prax. cap. 30. §. 36. 310.
& 361.

Sed de febribus Symptomatis videbitis in specie pluri-
bus agentem SENNERTUM l. 2. de febribus cap. 26. p.
209. segg.

C A P U T IV.

De Febribus acutis Symptomatis.

Sufficiant hæc de Febribus Ardentibus, seu Continuis
acutis, illique Benignis. Pergo ad Febres acutas scan-
dalaras, hoc est, quæ non propriam substantiam habent,
sed à graviore alicujus Partis Affectu originem trahunt.
Dicuntur aliæ etiam Symptomatis, per quandam similitudi-
nem; quia

1. Ut Symptoma Morbum sequitur, ita & Febres tales
alium Morbum.

2. Sicut remoto Morbo remoretur Symptoma, ita &
hæc Febres.

Sunt equidem, qui Febres has in Continuas, & Symptoma-
ticas stridulis didas, dividunt, ut SENNERTUS de Fe-
bribus: illo nomine eas indigitans, quæ Inflammationibus
Partium juncturæ hoc cæteris.

Sed non opus est scrupulum in talibus facere. Sunt an-
tem hæc ipse Secundaria nunc acuta, idque crebrius, nunc
Lente, pro Affectu quem sequuntur, & Partium Affec-
tuum conditionibus: dum illi vel graviore vel leviores
sint; hæc verò, nempe Paræ Affectus, vel sensiliores, vel
minù sensiles; item vel nobiliores, vel quæ magis cum
Sanguine & spiritibus commercium habent, vel ignobiliores.

Hæc ergo inter Symptomáticas se offerunt illæ, quæ
Pulvera quodam insigniora sequuntur, (Febres Vulnerariae)
ab Acido in Vulnera oborto, Doloris, Inflammationis, &
hinc etiam febris auctore.

C A P U T V.

De Febribus Lentis.

Iusta Febres Continuas Acutas Bilioſas observantur etiam
Febres Continuas minù acuta, plùs minù Lente,
ita dictæ, quod continuè quidem assilant Aegros,
sed tardiore motu sua absolvunt tempora, hinc magis dila-
turnæ, minùque urgentibus ripant: Int Symptomatis, nec
Aetere adeo intenso fere vehementi moleſtæ, plùs tamen
minù acri mordaci; idque nunc magis, nunc minù tales,
prout variat Aegri constitutio. Illa magis propriè ita dictæ
Germanis plus stomachicæ Lentæ, & à comite frequen-
tior, nempe Contabescencia Corporis, Germ. febris Conta-
bescens, sin febrivind ſackig Darre-Fieber, vocatur. Hæc
verò minù Lenta, & nonnihil ad acutorem naturam acce-
dentes, graviore fere Symptomata junda habent, adeo-
que breviora tempora sua, absque tamen critico motu, suc-
cessiva saltem solutione percurrunt, quales Continuas Reso-
lutivas in specie dictæ. Sunt enim Lentæ omnes Benignæ
& Malignæ autem acuta esse solent, ut Petechiales per cæ-
teris Lentæ esse videantur. De Febribus his apud Prædi-
cos pauca prolant. Interim à Lymphæ imprimis continus
Sanguini infusa orti cum SYLVIO arbitror, quæ vitia-
ta Effervescencia Maffæ Sanguine præternaturali in-
fert, unde & à SYLVIO cap. 29. Lymphaticæ dicuntur:
quas inter emiaet imprimis heſtica febris, ex multis Causis
producta, de qua infra.

Jam ex Physiologicis præsupposito: Lymphæ, unde
communissimè derivantur hæc Febres, omnem esse dupli-
cis naturæ; vel Glandularum Congestiarum, quæ continuè
Maffæ

Massa Sanguinea: per Venam Axillarem iterum infunditur, vel Glandularum Conglomeratarum, quæ Duñi Thoracico, & consequenter Sanguini additur.

ARTICULUS I.

De Febris Lymphaticis glandularum conglomeratarum. In specie: De Febris Catarrhalibus.

Primo ceteris considerabiles sunt Febris Catarrhalis, Germ. *Fluss-Fieber*, quæ in principio & incremento Catarrhorum, v. g. Coryza, Tussis, Raucedinis, &c. subinde mollescit, dum Lymphæ Glandularum, primariò quidem Conglomeratarum, secundariò etiam Conglobatarum, circa Caput & Pectus confluunt, quæcumque et Causa (de qua ubi de Catarrhis) aeris et æstivæ, aut acutiæ, ac quali maritima, aliove modo vitiosa reddita, copiosius circa dicta loca effunditur, occasionem crebris suggerente ambustia, arde intemesta, aut aliis Objectis externis dictas partes irritante.

Talem Catarrhalem Lymphæ motum comitatur Febris ea alteratione Sanguinis à Lymphæ, & irritatione Spirituum influentium cum Ardore, roscens magis quam magno, mollescit, accidentibus simul hinc inde Lassitudine, & Lancinationibus Corporis variis. Lassitudo idem contemendens & plura minus lancians et Lymphæ derivanda venit, cum Lancinationes hæ in Artubus non tam sint, & sequantur sæpe semper Lymphæ vitiatæ in Artubus activitatem, & hinc inde flagnationem, ac sanè Lymphæ vitiatæ ac motus plures minus naturalis, præsertim Glandularum plura minus Conglobatarum, probè observandus vult pluribus in Febris, tam in Intermitteatibus, quam in Continuis, cum diversis Symptomata, Lancinationes in specie Artuum sub Paroxysmi, subinde urgences, haud aliam quam à Lymphæ vitio orti videntur, & tunc simul subinde subesse observatur Scorbutus, & inde Lymphæ præternaturalis alteratio.

Hæc ipsa Lymphæ Glandularum Conglobatarum, ubi in Glandulis Collæ ac Cerebri acrior, id est, tam salior, quam in specie acidiore, facta fuerit, ibidemque effundatur, tunc subinde Capitis Dolorem gravatum cum subsequente Coryza, Raucedine, Tussi (quæ omnes sunt vitia Lymphæ à tali causa) simulque Affectus infert, simulque imprimis inducit Febres Catarrhales dictas, Calore non tam vehementem & intenso, quam moderate & acri comitatas.

Videbitis de febre scorbutica, ubi de scorbutico agitur.

CAUSÆ.

Certum est, quod omnes Febres Catarrhales, tam cum quam sine Coryza aut Tussi, semper sint ea Lymphæ vitia acia. Febres hæ Catarrhales interdum sunt mitissimæ, circa vespem autem ordinariò exacerbari solent; unde etiam tales Febres sunt Febris Continua Periodica Quotidiana Veterum quam ipsam etiam FERNELIUS jam suo tempore sub Lentæ Febris nomine descripsit.

In his Febris Lymphaticis Lentis ac Catarrhalibus, cum Capitis perturbatione & Dolore gravato seu Graveditine, subinde levis humor & facile transiens, sed crebris repetens, mollescit est, (talibus est ac si frigida perturbantur), itaque imprimis interdum subinde repetit. Pulsus est continuus frequens & celer, vehementia & magnitudine moderata seu Exacerbatione in dictis conditionibus actus. Urinæ excrementum intensius tinctæ ac rubentes, sed quæ uno alterove die elapso mox crassescunt, hinc conturbantur & flavescunt, videnturque copiosius admodum deponere Sedimentum. Lassitudo gravis ac lancians

subinde occupat Artus. His subinde conjunctus est Calor, live ardor videri live aeris, circa vespem ingravescentem, ad medium usque noctem sæpe durans, interdum satis intensus, interdum paulo remissior: Post medium noctem autem successivè denud remittit, manequè Agri sunt debiles; durat tamen continuus levis sed obscurus Calor, qui omni vespere intensius, & insigniter subinde exacerbari solet. Lymphæ enim acidior vitiosæ in Massa Sanguinea effervescit, unde Caloris intensio, non tamen semper adeo insignis, & quidem circa vespem, quoniam tunc in convalescentibus omnibus poris Corporis, uberior Lymphæ Laticisque sèrasi impeditur Transpiratio, hæc nempe circa vespem ea aeris ob Solem occidentem alteratione indulta, & copia ejus & acrimonia augetur, aut testura seu constitutio ejus plus minus vitiatæ, unde etiam Febris tunc exacerbatio levis usque ad medium noctem sentitur. Durat ipsa Symptomata sub Coryza & Tussi gravioribus usque ad statum Mortis, dum nempe Lymphæ temperari & crassescere incipit, seu, ut vocant, Matris Catarrhalis cocta fieri, & spissior Mucus emungi, & glutinosior Pituitæ Expectoratio incipit; Acrimonia enim Lymphæ si corredda est, cessat etiam Febris.

Quoad Causas Removet febrium lentarum, in specie Catarrhalium: Illæ sunt, quæ ad Affectus Catarrhales disponunt. Interdum, sed rariò, Febres hæ Catarrhales, ac ipsi Catarrhi, sunt Lentæ Epidemicæ (cum communes, & in vulgus grassantes, ab Aeris communi impressione nate; nec, itaque frequentius, benignæ; nec, & quidem rariò, Malignæ, & tunc subinde arata quæ Malignæ, uti per Contagium suum Lymphæ & Corporis Humores in specie afficiunt, ita hæc consequenter facili animam dat Fermentationi Sanguinis præternaturali, & sic se propagare, & insigniter exacerbari videntur, & pertinere hæc videtur Morbus ille Epidemicus, cujus mentionem facit RIVIERIUS de Morb. infreg. Ofserv. 9.

DIAGNOSIS.

Diagnosi Februm dictarum ea hæcenus dictis Symptomatis patet: cum quibus conf. SYLVIVS. (Q)

PROGNOSIS.

Quoad Prognosi: Febris hæ non multum in recessu habent, uti Febris Continuæ Acutæ seu Biliofæ dictæ: faciliè curantur aut evanescunt, utut insigniter mollescit, interdum & vehementes sint.

Febres tamen Catarrhales Epidemicæ, & in specie Malignæ, subinde non sunt sine periculo. Equidem extenuantur nonnumquam ad 24. dios nocturnæ; raro tamen salutriter, sed Convulsionibus supervenientibus Agri moriuntur: contrà si non fuerint Malignæ nec Epidemicæ, leves sunt & faciliè curantur.

CURA.

Quod attinet Methodum morandi: Febris illa, quæ à Lymphæ Glandularum Conglobatarum vitiatæ, acri & acida oritur, adeoque Febris Lentæ Catarrhalis, hæ in multis cum Cura Catarrhorum vulgarium conveniunt, in specie eo dirigenda est, ut Lymphæ hujus corrigatur vitium, eaque per blanda Sudorifica ac Diaphoretica immutetur; idque eo magis, si Epidemicæ ac Contagiosæ; nam Febris Catarrhales Epidemicæ non carent Malignitate, uti ea debilitat Virtum, ea facili Contagio, et Vigilis, interdum levibus Deliriis supervenientibus apparet: Ut ordine procedamus, curantur per ea, quæ

1. Irritationem partium solidarum affectum, indeque natum Spirituum impetum, ac copiosorem Lymphæ effusionem sistunt.

2. Lymphæ præternaturalem Acrimoniam temperant. Et

Quæ

(Q) Haud tam manifestè patet Diagnosi Februm Catarrhalium, ut non possit quæcumque Melici in illarum dignoscendis falli. Sæpe enim fit, ut Malignæ catarragæ Febris sub Catarrhalium specie invadant, & incantur vel minus accurate se gerant Melicis subdole impostura. Malignum quippe Ventum non raro Lymphæ (quæ Catarrhorum fons est) pro subdole habet: atque adeo Febris, quæ sub Lymphaticæ seu Catarrhalis larva sese abdit, abjecta postmodum larva, h. e. aperta se prodere Venæ, manifestam Malignitatem ostendit. Nonnumquam quædam fieri potest, ut Febris primo incipiens reveret Catarrhalis sit, quæpsa quæ à causa Catarrhalis, atque à levi innocenti Lymphæ vitio fit vitia: verum quæm furor sit agnoscant Corpore aliqua latent usque adeo noxium, ut ad Venæ naturam adipiscendam aliud non expellet quæm mæum & agnoscant; occasione à Febris Catarrhalis desunta, mæum & agnoscantem acquirat, atque hinc novam Febris speciem exciet, quæ à Catarrhalis diversæ Malignæ profu indit, propria causa analoga, indet. Cui præsertim sui Practici in judicio ferendo de Febris nature, primis statim diebus statuerenda, ut Catarrhis indicis decepti, Catarrhalem omninè Febrim pronunciant, quæ vel Maligna in recessu jam est, vel mox in Malignam sit transitura.

3. Quæ Lympham temperatam per convenientes vias evacuant.

Pro priori scopo conveniunt imprimis *Opiata*; pro secundo autem *Salis volatile Alcalia*, aut *Marina Absorbentia & Temperantia*, & quæ vulgo *dearsantia* dicta, ut etiam Appropriata contra Catarrhos remedia, v. g. *Liquum Salfrastris*, ejus Decoctum, & ex eodem parata Remedia, *Essentia Catarrhalis cum Spiritu Serpilli*, *Succinum præparatum*, *Oleum distillatum*, & omnia *Succinaria*, *Flores Sulphuris*, *Asthelicum Pterii*, aliæque *Ancimonia* fixa. *Myrrha* similiter est elegans Remedium: ejus enim aliquot grana sapore suo balsamico acorem Lymphæ nimium temperant. *Camphora* quoque hic imprimis est usitata, quæ & blanda diaphoresi vitia Lymphæ imminuit; & similia. Præ cæteris tamen *Sal volatile Cornu Cervi*, *Sal volatile Succioi*, & ex his paratus Liqueor Cornu Cervi succinatos item Spiritus & Sal volatile Sanguinis humani, *Salis Ammoniaci anisatus*, nisi *Æther* sit nimis, & similia Opiatis mista: v. g.

℞. *Aqua Salis vel Scabiosæ*.

Serpillian. ℞i.

Spir. Salis Amm. anis. vel satcin. ℞i.

Syrup. Diacod. Moratani, vel *Pap. albi* ℞i. (vel loco hujus *Laud. opiat.* gr. ii.)

M. D. S.

Potio Catarrhalis pro aliquot vicibus.

Capiatur cochlear. aut exacerbationem vespertinam, & io hac ipsa, & exierit blandos Sudores.

℞. *Aqua Fynis*.

Fler. Papav. errat. ana ℞i.

Liqu. Cornu Cervi facin. ℞i.

℞i. *Opil.*

Maxill. Latipila. ana ℞i.

Syrapi flor. Papav. errat. ℞i. vel ℞i.

M. D. S.

Potio Catarrhalis, cochlearim sumenda.

Capiatur singulis horis cochl. j. expectando Siderem vesperti & nocti, tam imminente quam ingruente Paro-
nismo.

℞. *Aqua Serpilli* ℞i.

Liqu. Cornu Cervi facin. ℞i. vel loco hujus,

Spir. Corn. Cervi essent. ℞i.

Laud. opiat. gr. ii.

Syrapi Papav. albi ℞i. vel ℞i.

M. pro ana vice. S.

Potio Sudorifera pro una vice.

Loco hujus Mixture:

℞. *Liqu. Cornu Cervi facin.* vel *Spir. Salis Ammon.*

anis. vel Effens. Succioi. ℞i.

Effens. Opil. dr. ii.

M. S.

Essentia Catarrhalis.

Onis gott. 30. 20. ad 30. aliquot horis ante exacerbationem, & iterum ingruente nocte.

Vel

℞. *Theriac. Andromachi* dr. i.

Sal. volat. Cornu Cervi gr. vj.

Succin. gr. iij. vel iv.

M. f. Balas. S.

Electuarium Sudoriferum pro una vice.

Vel

℞. *Succin. præp.* ℞i.

Myrrh. essent. gr. v.

Sal volat. Succin. gr. iv.

Extrakt. Croci gr. ij.

Laud. opiat. gr. i.

Olei distillati Succioi gutt. i.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis Catarrhalis pro una vice.

Si fuerit Lympha nimis salia, ex, quam edulcorare, sunt usurpanda: v. g. ex *Glycyrrhiza*, *Ficibus*, *Jurabis*, *hordio*, &c. item Emulsiones *Papaverine*, *Opiata*, & cum Opio paratæ *Pilule de Strace*, aliæque, quæ io Tussi Catarrhalis allegata sunt.

Si loquela difficilis & Rorandi urgent.

℞. *Aqua Mentha* ℞i.

Cinnamon. ℞i.

Spir. Sal. Ammoniaci anis. dr. i.

Laud. opiat. gr. iij.

Syrapi de Passul. vel de Liquirit. dr. vj.

M. D. S.

Potio Catarrhalis ad collum.

Capiatur cochlearim.

Urgente Tussi Siccæ adhuc in principio, pro Lymphæ acrimonia temperanda, *Faucium & Alperæ Arteriæ* dolor irritatio silenda, & *Materia* incrassanda.

℞. *Aqua Scabiosæ* ℞i.

Athmar. dr. vi.

Syrapi Diacod. vel Papav. alb. ℞i.

M. D. S.

Potio Catarrhalis.

Capiatur cochlear. i. tempore vespertino, cum Opiatis. Vel

℞. *Aqua Scabiosæ* ℞i.

Athmar. dr. vi.

Spir. Salis Amm. anis. dr. i.

Syrapi Papav. alb.

Violar. ana ℞i. vel dr. vi.

M. D. S. ut antè.

Vel

℞. *Aqua Serpilli*,

Card. lra. ana ℞i.

Spir. Theriacal. camphor.

℞i. *Liqu. Sassafr.* ana dr. ii.

Liqu. Cornu Cervi facin. dr. i.

Syrapi Papav. alb. ℞i.

M. D. S. ut antè.

Pro *Faucium*, *Pharyngis* & *Laryngis* levi exaceratione conveniunt *Loch Passulorum*, *Syrupus Diacodion Moratani* *Violarum* &c. cum baculo *Liquiritiæ*.

Hæc Cura cum Decocto *Ligni Sassafrasis* tandem contineatur, donec perfectè silarur Febri.

Sufflaminata sic Febre, & impetu Spirituum ac Lymphæ sedato, si opus fuerit, blanda Laxatio institui poterit; v. g. ex *Mass. Pilul. de Ammon. Moratani*; aut *Mass. Pilul. de Succio Cratois*, acutis cum *Mercurio dulci*.

Vel

℞. *Mass. Pilul. de Sacra. Cratois* ℞i.

Sal. volat. Succin. gr. vi.

Ref. Jalap. gr. iij.

Extrakt. Trachil. *Alband.* gr. i.

Olei distillati Succin. gutt. ii.

Cum Effens. *Ligni Sassafr.* f. *Pilula*.

D. S.

Pilule Catarrhalis & Cephalicæ.

Quibus factis, reliquis iam incrassatis *Expulstantibus*, *Incidentibus*, ac similibus suis evacuandis: c. g.

℞. *Aqua Hyssopi* ℞i.

Athmar. ℞i.

Spir. Variati, vel *Athmar.* vel, quod melius

Cammi Ammoniaci depur. ℞i.

Syrapi Nicot. ℞i. vel dr. vj.

Emet. Angeli Salis (ut *Fauces & Præcordia* melius stimulentur) dr. i.

M. D. S.

Potio Pedus & Catarrhos resolvens.

Loco hujus Mixture *Succus Raphani expressus*, cum panco *Saccharo* temperatus, egregie incidit Mucum.

Lympha correctæ evacuatur, aut universaliter per *Diaphoretica* & *Diuretica*, aut particulariter per *Nares* & *Os*, atque hoc saltem io statu, cõsuetudine Febre, & codâ Materia. Ubi ergo *Diuresis* magis intenditur:

℞. *Liqu. Terraful. Tartari* ℞i.

Dosis 40. vel 50. gutturale bis io die.

Hiæcena dicta ut potentes, exemplis declarabo.

Ante aliquot annos grassabatur hic Catarrhus Epidemicus tempore Vernali circa solum Pentecostes, sique malignus & insimier contagiosus, itaut vi esset domus, in qua non aliquot ægrotarent: symptomata erant *Tol-
sa* admodum gravis cum copioso spitu, *Coryza* continuissima, *Cephalalgia*, *Dolores Dorsi & Artuum*, mox ingens Virium prostratio citra manifestam causam; quibudam superveniebat *Hæmorrhagia Nasium*; quibudam *Diærhæa serosa*, Cura, quæ tunc temporis instituebatur, optime sebat per sudorifera. E. g. mox in Principio vocatus præscripsi.

℞. *Aqua Fi. Sambuci*.

Card. boud. ana dr. vi. ad ℞i.

Spir. Cornu Cervi essent. f. *Sal volat.* pro d.

accut. dr. f.

Balis volat. Succin. gr. xii.

Laud. opiat. gr. i. vel ii.

Syrapi Fl. Papav. errat. ℞i.

Mista pro Potione Sudorifera pro i. d. g.

Capiatur Arg. & expectabat Sudorem, qui semper cum levamine fluat. Item

℞. *Aqua Mentha* ℞i.

*Spiris. falis Ann. anif. (quibuldam Ligu. Cor-
na Cervi facin.)* 3℔.

Laud. opiat. formos. gr. i℔.

Syrapi Card. bened. 3℔.

Miscebatur pro haustu.

Hæ ipse potiones repetebantur, expectando desuper sudorem.

Interdum conveniebat sequens pulvis:

℥. Sacconi catarrhalis gr.xv.

Specif. cephal. 3℔.

℞. Salinis gr. iv.

Miscebatur pro dosi.

Pro compescenda Tussi, incidenda Materia crassa, & adjuvanda Excretionē, præscribamus Pocum ex gummi Ammoniaco cum Aceto scillitico soluto, Oxy-melle scillitico, & Syrupis appropriatis Incidentibus, & Expecturantibus, cum Aquis Pedicularibus, & Spiritu falis dulci; quales *suprà*, ubi de Tussi, dedi. Pro Coryza & Capitis afflicto optime conveniebat Iunellii verticis cum Oleo Succini, aut applicabatur Emplastrum Cephalicum ex Emplastro de Betonica & Emplastro pro Regimine ana partibus æqualibus, cum Oleo Succini malaxatum.

Quibuldam afflicti Catarrhalis, in specie artus, cum dolore lamineant, vago aut quem patiebatur in artubus, affligebat: id quod præsertim lenibus erat familiare: tunc sufficiebat sudosiora Opiatis mista. Pro reliquis ergo Morbi expectandis, pro artuum debilitate, & eorumdem dolore, conveniebat hæc Mixtura, que ut plurimum Morbum curabat, penultima modò dictis. Mixtura erat hæc:

℥. Aqu. Lili. convall.

Serpilli ana 3℔.

℞. Ligu. Sassafr. 3℔.

Spiris. Cora. Cervi restif. 3℔.

Corna Cervi usi præp. 3℔.

Sal. volat. cornu Cervi 3℔.

Sacconi 3℔.

Laud. opiat. gr. i℔.

Syrapi Bism. 3℔. ad 3℔.

Miscebatur pro Potione.

Capiebat æger duo cochlearia pro Inhibu omni hora, blandum expectando Sudorem.

Vel

℥. Aqu. Mentha

Corna Cervi,

Aristicorba, ana 3℔.

Affluat. Radulphi (est spirit. comp.) 3℔.

℞. Ligu. Sassafr.

Spiris. Lumbri. terrestr. per purref. (propter

Dolores vagos) ana 3℔.

Specif. Cephal. 3℔.

Sal. volat. Sacconi 3℔.

Syrapi Fl. Tanica 3℔.

Miscebatur pro aliquot dosibus in formam potionis: de qua capiebat quater in die 3. vel 4. cochlearia.

Anno 1669. & 1675. cum gravaretur hic modis Multa febris catarrhalis Epidemica, non tamen Maligna, ex Lymphæ vitio orta, cum tagis artuum, & Dorso doloribus, Tussi gravi, Cephalalgia, Diarria, hæmorrhagia Nasium, Coryza imprimis, & similibus Lymphaticis afflictoibus, cum Calore lentu circa vesperam exacerbatur; utile fuit, ante omnia præmittere hanc Mixturam, expectando sudorem blandum:

℥. Aqu. card. bened. vel Serpilli,

Fl. Sambuci ana 3℔. vel 3℔.

Spiris. cornu Cervi affluat. l. e. cum Sale volat.

prop. acuat. 3℔.

Salis volat. Sacconi 3℔. vel gr. xii. ad xv. (vel

Ligu. cornu Cervi facinosa loco spirit.

Cornu Ceti vi. & falis Succini, 3℔.)

Laud. opiat. gr. i. ad ii.

Syrapi. flor. Papav. errat. 3℔.

M. l. Potio pro una dosi.

D. S.

Potio Sudosiora pro una vict.

Hæc subinde repetita proflixavit Malum, corrigendo

Lympham, & correclam per Sudorem evacuando.

Vel huius loco:

℥. Aqu. fl. Aracia 3℔.

Ligu. cornu Cervi facin. 3℔. ad 3℔.

Syrapi Diarad. Montani 3℔. ad 3℔.

M. D. S.

Mixtura sudosiora.

Capiebat pro una dosi.

Item profuit hic Pulvis:

℥. Sacconi præp. gr. ii.

Specif. Cephal. gr. viii.

℞. Card. solar. gr. i℔.

Laud. opiat. gr. i.

M. D. S.

Pulvis ad quietem.

Vel

℥. Sacconi præp. 3℔.

Specif. Cephal. 3℔. vel i.

Laud. op. gr. ii. vel iii.

M. pro 3. dosibus mane & vespere assumendis, S.

Pulvis Vespertinus.

Pru Tussi dum tempora consideranda erant:

1. Scilicet dum ea adhuc fira erat.

2. Quando humida evaserat.

Ubi ratione prioris, seu in principio & Incremento Morbi talia adhibebantur, quæ Lymphæ acrimoniam temperant, & ut vocant vulgi, Materiam treuem incrastant, irritationemque solunt: in processu vero de statu, Tussi nempe humida, in qua copia viscidæ reiciebantur, conducebat potio, incidens, viscidum Mucum attenuans, illumque expectorans, es Aqua Asthmatica, Oxy-melle scillitico; &c. qualia jam & *superius* de Tussi pellerat disti.

Ubi verò morbo antio ipsior Mucus Nares obstruere, tunc fuit optimum Oleum destillatum Anæ & Naribus illitum, quod quidem mordicat, egregie tamen cum ephasia Mucum resolvit. Loco cujus etiam crebrior Salum, & spirituum urisifurum odoratus, e.g. spiritus falis Ammoniaci simplicis & anisati, falis volatilis nitre, cornu Cervi, tempore præputius vespertinus repetitus, mucum resolvendo à Coryza liberat. Quibus non sufficentibus ultimum prædictum exiit:

℥. Pulv. Kellek. nigri.

Sacch. alb. ana part. æq.

Cum aliquot guttulis Olei destillati Caryophyllorum misce: id quod Pulverem naribus injiciebat.

Cum autem sub coryza dolor capitis invalesceret, optimum fuit Oleum destillatum succini illitum, vel quibus id nimis acre videbatur, ejus loco idem Balsamum Peruvianum illitum fistisicibat: item Emplastrum ex cerari pro Regimine usitati, & Emplastro de Betonica ana, malaxatum cum Oleo succini, vertici imponebatur.

Cum etiam suspicio esset, ex Tussi ferina præcordiis succedisse lesionem fuisse induclam, tunc pro inferenda nova illata, in Declinatione morbi præscripti Balsamum Solphuris terebinthinatum vel anisatum, vel utrumque simul, de quo quotidie mane in vehiculo calido guttas x. vel xii. recipiendas fuit, sic enim ejusdem Balsami vi lævis partium curata est.

Pro artuum afflictoibus, eorumque debilitate curandis, imprimis ubi doloris seu lamineationis artuum aderant:

℥. Aqu. feniculi.

Mentha.

Papav. errat. ana 3℔.

Affluat. Radulphi 3℔. ad 3℔.

Spiris. Lumbri. terrestr. per purref. 3℔.

Specif. cephal. 3℔.

Syrapi. Fl. Tanica 3℔. vel 3℔.

M. pro aliquot dosibus, aliquoties in die capiendis.

Extrema simul adhibenda habebitis *infra*, ubi de cura

dolorum.

Nobilis quidam juvenis laborabat difficili Respiratione cum Tussi gravissima, & frequentissima, reijciebat copiosissima, viscidissima, flavescens &c. subinde Cruore permixta: accedebat Febris intensa, cum summo aestu, omni vespere circa horam quintam vel sextam recurrens, usque post 10. nodis durans, quo tempore successe remittebat: incidebant hæc Exacerbationes successive sine ulla Frigoris aut Horroris vestigio, & quando affligebat, continuis sudosibus dissuebat. Symptomata hæc omnia intra bodui spatium contraxerat, erat Scorbaticus, indeque copia Salia scorbutica matule parietibus adhaerebant: Tussis erat reverà pectoralis es pulmonibus oriunda; quando tantillum non easclè calidum libere, mox sufficibat; si Pedus parum deindebat, Tussis itidem urgebat; quo largius sudabat, eo minus sordium expecturabat: Febris erat Catarrhalis essentialis occasione Acidi scorbutici nata, cujus beneficio despumata quasi massa sanguinea furdes heterogeneas intra Pulmones deponerat. Nempe quadras huc allertum PLATERI lib. 2. Obervatum pag. 273. Catarrhus & Tussis vehementissima in declinatione febrium evanire solet, præsertim versus hyemem in corporibus asthymicis, in quibus

bus non licuit *propter febrem acutam* suffocantes purgare. Occasio externa erant Exercitia varia Corporis, quotidie cum summo conata peracta, Sudore, qui tali occasione largissimus stillabat, nunc represso nunc retropulso. Metuebam Phthisis Pulmonalem in Subiecto nonnihil macilentio, aliis Cholerico Scorpitico, propter Acidum volatile acerrimum Pulmonibus inimicissimum.

Pro Cura.

℞. Arcan. dupl. ℥℥.
Maxill. lacii pfc.
Animonii diaph. ana gr. vi.
M. f. Pulvis.

Item

℞. Spir. Sals. amm. anif. ℥i.
Tinctura Tartari comp. ℥i.
Misc.

Capiebat 40. guttas his in die.

Item pro Æstiva vesperatino;

℞. Maxill. lacii pfc.
Arcan. dupl. ana gr. xv.
Misc.

Sed cum nihilominus omnia exasperarentur;

℞. Aqu. fer. Papav. rhoad. ℥i.
Spir. Sals. amm. anif. ℥i.
Maxill. lacii pfc. ℥℥.
℞. Sulphuris gr. xv.
Syrupi Violar. ℥i.
Misc. pro Potione.

Capiebat cochleatim: sed cum paucis successu, Febres vesperatins cum diutis Symptomatis quotidie exacerbatas, hinc

℞. Aqu. Papav. errat.
℞. Sals. amm. anif. ℥i.
Maxill. lacii pfc. ℥i.
Antibell. Petenii ℥℥.
Sul. vol. Maxill. lac. pfc. gr. ix.
℞. Sene. Opul. ℥℥.
Syrupi Violar. ℥℥.
Misc.

Potiones has à meridie appetente vespera, adeoque ante Paroxysmum, ut & antè in Paroxysmo, successivè capiebat, mane Elixir Proprietatis sine acido frè recipiendo. Assumpsit etiam hanc postmeridiam Mixturam, sed nimis coarctum: unde cum debilis esset, & aliquot noctes propter Tussis violentiam penitus non dormivisset, in talem Somnolentiam delapsus est, cum tanta Virium enervatione, ut vix loqui posset: propterea hujus loco antecedentis Mixtura repetita & usurpata fuit, utut Morbo in eadem ferè atrocitate pergeret. Quo ergo Febri vesperatins impetum infringere:

℞. Aqu. fer. Papav. errat. ℥i.
Arc. ℥i.
Maxill. lacii pfc.
Coral. rub. prep.
Antibell. Petenii ana gr. xv.
Syrupi Violar. ℥℥.
Misc.

Sed eodem modo nihilominus ferociebatur Febri, Tussim & Scretum paulatim remittebantur: Unde

℞. Amygd. dulc. amb. ℥i.
Sem. melon. ℥℥.

Cum l. q. *Aqu. fer. Papav. errat. f. Emulsio:*
adde

Maxill. lacii pfc. ℥℥.
Misc.

Antibell. Petenii ℥i.

Eduleorabatur pauco saccharo.

Egrèdè profuit, unde & eadem vespera repetita, & sequentibus diebus continuata fuit, vi temperativa, & acris acido-salis mitigativa hujus Remedii ope omni Æstiva febris penitus evanescente: nempe, uti in febribus Acutis, Ardentibus, ac similibus male ejusmodi Emulsionis usurpatur, cum vel nihil prosint, vel onerant sua temperante, & particulas volatiles aciores effervescentes quasi invascent, ex Acutis Lentas facere queant; ita, ubi Acri-monia salis, acido salis, maritatis, præsertim Lymphatico in subiecto peccat, & hinc partem Solidam rodendo plus minus afficiat, optimè prosunt tales Emulsiones. Subjuncto est maximam partem Morbo pro purificando Sanguine, alteranda Lympha acriori, & in specie resistendis Pulmonibus plus minus læsis, adeoque pro præcavenda Phthisi, ad imitationem WILL. Iſſ.

℞. Rasar. Santali rub. ℥i.

Liqu. Salsifr. ℥℥.

Macerata per 12. horas in Aqua comm. ℞. vii.

Coqu. ad consumm. Bis, hinc adde

Herb. heder. terrestr.

Conv. Hyssop. flor.

Herb. Veron. ana M.℥.

Rad. liquoris. ℥℥.

Sem. fenic. ℥vi.

Passul. min. cinquant. ℥i.

Coqu. ad remanent. ℞. vi.

Colatura D. S.

Potio Sanguinem mundificans.

De hac omni mane plenum balfum calidè bibit; item sub introitu lecti pariter; dum interè vesperi hanc quarta vel quinta ob febrilis vestigia caperet:

℞. Aqu. f. Papav. errat. ℥i.

Aphron. ℥℥.

Maxill. lacii pfc. ℥i.

Antibell. Petenii ℥℥.

Syrupi Papav. alb. ℥i.

Misc.

Item

℞. Maxill. lacii pfc. gr. xv.

Antibell. Petenii ℥℥.

Misc.

Quibus, & similibus Pulveribus à meridie, adhuc per aliquot septimanas continuatis, simul cum illo decocto eadem ratione crebrius repetito, perfectè denotè convalescit.

Ex hac sunt febres Lentæ Catarrhales ex Lympha acida Conglobatarum Glandularum, Affectum Catarrhalem conjunctum habentes.

ARTICULUS II

De febribus Lymphaticis Glandularum Conglomeratarum.

PRÆTER hæcenus dictas observantur quoque Febres Lymphaticæ ubi Lympha Glandularum Conglomeratarum, quæ in certam cavitationem suam effundunt Succum: inter quas eminent Parotides, & Pancreas, quæ similes ferè Lympham in Os, & Intestina, consequenter quoque in Massam Sanguineam evomunt. Peccat hæc ipsa Lympha, imprimis quando est plus minus viscidat, ac fæpidat, & acrior, aliòve simili modo vitiatat; tunc enim Saliva viscidat ac fæpidat fundam quidem continuam Ferbrim, Lentam tamen, Calore non ita forti molestatam, insert.

Febres hæc lentæ sunt Primariæ, tunc secundariæ: illæ, quæ per se incipiunt, & oculum alium Morbum sequuntur: hæc verò, quæ ex alio sunt Morbo, live ab alio, tanquam à sua Causa, immediatè dependunt; v. gr. vulgò Corruptionem Partis cuiusdam internæ sequuntur; live ab alio Morbo malè tractatè pro illius Degenerationem fiat, adeoque tunc enquam Primariæ per se subsistant; quales sunt, quæ continuas acutas, item intermittentes malè curatas sequuntur, suntque omnes febres longè ferè Periodicæ, h. e. quæ suis plus minus Periodis certis exacerbantur: idque vel (frequentius quidem) vesperatino tempore, sicque quotidianus typum repræsentant; vel ab omni passu, tanquam ad hostias febres revocantur. De his singulatim.

MEMBRUM I

De Febribus Lentis Primariis.

Quod febres lentæ primariæ, Harum levi, sed diuturno ferè, Agros apprehendat, insequente quidem calore continuo, sed non adeo intenso seu vehementi, prole in Acutis; utut subside in extremis morcadis plus minus acris, interdum tolerabili seu mediocri, tunc vel vesperi intenditur, & ulque post medium noctis graviter ariet, & abique sensibili quasi excretionem solvitur. Apperitur est prostratus, Alimentorum assumptionem insequitur Dolor gravitativus Stomachi; hujus, & Intestini interitus Inflatione ac Distentione, adest simul interdum quidam Torpor ac Somnolentia. Febres hæc circa vesperam, interdum post octavam demum, acasperantur cum Pulsi frequentiore, non tamen adeo magno, propter Lympham Sanguinis Fermentationem depravatam, per noctem ferè durat

ad meridiem sequentis diei, & tunc solent cessare: Interdum tamen citius affligunt. Salivæ huic modo vitiatæ si jundus fuerit succus Pancreaticus viciatus aut falsus, aut alio modo vitiosus factus, simul adesse solet anxietas circa præcordia, interdum Tormenta obscura, & Lancinationes Ventris. *Pulsus* est continuus celer, frequens, magnitudine, & vehementia moderatus, ad parvitatem tamen & debilitatem declinans. *Sitis* in his febribus interdum satis urget, & in specie ubi Saliva peccat, & Os est glutinosum, quia fauces, & Lingua lenta materia subinde inter obdura. *Urina* sunt crassa, intensius tinctæ, quæ facile turbantur, & subinde multum crassamenti seponunt. Adest simul *Lafritudo* totius quasi contandens, cum *Lancinationibus* artuum subinde juncta; interdum etiam *Cephalalgia* teniva & gravativa molesta esse solet. Omnia hæc Symptomata sunt lentiora, ubi acrimonia salina, aut vitioso sapore simpliciter Saliva, & focus Pancreaticus peccant; ubi vero visciditas simul præternaturalis adfuerit, mitiora quidem, sed diuturna magis, erant eadem.

Pluribus ad *Arteriarum* naturam accedere hujusmodi Febres *Lentæ*, non solum ea hædus sita relatione patet; sed in specie, quod *Acute* continuæ, & etiam *Intermittentes*, in *Lentæ*, tam has quam alias, facillime degenerant; quæ & in *Hæmicis* transeunt. Nempe *acutæ illæ* ex coactione Fermentationis lebilis impetu occasione acris & volatilis acris in sanguine aciore (ceteris hinc inde derivatis humoribus, & ipsæ acrioribus exsistentibus) originem ducunt: *Lentæ* contra ex remissione illi impetu ab Acido minus acris, aut in subiecto seu vehiculo viscidioræ ac glutinosioræ hærentes, ipsæ Corporis humoribus ceteris temperatioribus plüs minüs ac glutinosioribus, vel naturaliter vel præternaturaliter, exsistentibus.

Observandum enim est præbe Axioma: Chronicos contumaces, diuturnos, ac *Lentæ* morbores ex *viscidis*, *glutinosæ*, *tenaci* *Materia*, vel tanquam materia occasionali causa, vel tanquam remitte dependere: *Acutæ* vero, & cum Corporis perturbatione junctas, ab *acutæ* causa occasionali materiali originem ducere.

C A U S E.

Origo ergo *Lentarum* hujusmodi *Febrim* *Primariam* est imprimis in *Stomacho*, vel ex *vitiis* & *defectibus* *digestionis primæ*, dum ex hebetato aut alterato plüs minüs Fermento stomachali (undecunque id vitiis ortum fuerit) & Bile quoque mitiori nimique acris, Chylus minüs volatilis, sed viscidus, vitiosior tamen, aut acidus aut salio acris sapore inquinatus, Malle Sanguinem inhiatatur, quo ipso successivo Fomes febrilis talis congeritur, cujus occasione tandem Fermentatio, & commotio Sanguinis febrilis supervenit, (unde à sanguine pituitoso, seu à pituita acida, orti contumaces quotidianas afflicte Veteres,) salubriter cessans, dum illo fermentationis motu deputat vel Malla Sanguinea, & quicquid heterogenei permixtum fuerit, coarctat, & precipitaverit; ut cum urina vel successivis sudoribus eliminari queat. Cùm vero Chylus talis iuxta sanguinem etiam Lympham totius Corporis vitiares & inquinaret alterare solet, utpote in qua Lymphæ naturaliter Gelatina lactea seu chylola deprehendi solet &c., sanè talis plüs minüs alteratio, ac debitis usibus essequendis hinc necessaria inepitudo Lymphæ, foveret tales febres, & ita calor nonnihil auctior, pulsus ex irritatione cordis frequentior, propter sanguinem vero pituitosum, hinc immutatus, & depravatus eius fermentationem, parvi & debilis, ac reliquorum in eadem Symptomatum originem esse, probabile admodum videtur, sive per se & primario oriatur, sive alios demum affectus consequantur: adeoque revocanda hæc veniunt ea, quæ de febribus Lymphaticis differit eruditè SYLVIVS lib. 1. cap. 29. Sanè *Exacerbationes* *Vesperinae*, & *Cæles* circa id tempus ibidem graviores, ex Lymphæ alteratione illa primario orti videntur, cùm quilibet à Lymphæ orti Affectus circa vespere & appetente nocte fieri magis intendi soleant, ut in Febribus Catarrhalibus, simpliciter ex Lymphæ vicio natis, manifestum est, cujus exacerbationis ratio intricata hæc revocanda, quam *supra* de febribus Catarrhalibus dedii.

P R O G N O S I S.

Quod *Prognosis*: Febres hæ Lymphaticæ ex vicio Glandularum Conglomeratarum, in specie Salivæ, & Succul Pancreatici pendentes, seu Febres Continua Quotidiana, quod magis vel minüs Lentæ fuerint, eo diuturniores vel Tom. II.

minüs diuturniores esse solet; difficiles tamen ferè curatu, nec temper omni periculo vacantes.

Quo peiora etiam habent Lymphomata, eo periculosiores esse solent.

Puræ simul *Vesperinae* si sint longæ, cùm interdum ad 26. horas extendantur, *Mors* sunt *dolens* & *appetitus præstans*, ingens periculum subest.

Salubris hæc *Prædicta*, nisi cautè & probè tractetur, nunc in *Cæcæm*, si nempe acuta magis nonnihil fuerit; nunc in *Hæmicam*, cum qua magnam assimilationem habet, & *Lentæ* magis existit, terminari solet.

C U R A.

In Cura *Febrim* *Lentarum* vicio *Lymphæ Glandularum Conglomeratarum*, in specie *salivæ* & *succi Pancreatici*, quando bi nimis salis aut viscidis casunt:

1. *Refricetur* quasi *Stomachus*, cujusque *Digestio* restituitur.

2. *Visciditas*, ac *acrimonia salivæ* Lymphæ corrigenda.

3. *Lymphæ corruptæ*, ac *Crassæ* *pituitosæ* blandè evacuantur.

4. *Symptomata* mitiganda.

Prædictis *scilicet* *consequenda*:

1. Tam in principio, quàm in incremento hujus *Febris* *mitius* *Humoribus* optimè locum invenit, imprimis si Anæstetæ præcordiorum adfuerint, & Vires simul conflent; aut evacuantur per Alvum mitiora: E.g.

℞. Tartari emet. Myrs. gr. ii. vel iiii.

Salis ammon. depur. gr. vii.

M. f. Pulvis S.

Pulvis Emeticus pro una vice.

Per inferiora:

℞. Maff. Filul. de tribus Rus. gr. xv.

Aur. Filul. gr. iiii.

Sennæ. præp.

Trach. Alband. ana gr. i.

Cum *Tinct. Tartari compes. l. Pilule*: S.

Pilule Purgantes.

II. *Diuresis*, quia simul sunt *alterantia*, optimo cum successu applicari possunt. Nempe, ut loquuntur *Prædicti*, præmissis præmittendis, fundunt atque attenuant Sanguinem, & ita resiliunt plüs minüs naturalem ejus fermentationem, simulque crassa crudaque Excrementa, si quæ circa primas vias aut aliis in locis restiterint, dissolvendo abluunt, & remotioni aptiores reddunt.

Remedia itaque quæ corrigunt, resolvendo, & attenuando viscidis, & temperato illis, sunt imprimis spiritus Salis dulcis, valde egregius in tali causa, etiam in hædicæ; spiritus Nitri dulcis, item fialis Ammoniaci, Ntrum antimoniatum, Sal Tartari essentiale, Arcanum duplicatum *Myrsicellæ*, Tartarus vitriolatus *Tæcheu*, Terra foliata Tartari, ejusque Liqueor ad 40. vel 50. guttas bis in die semper biborio esse passum assumptus. Infusura Tartari acerrima & composita, Essentia Myrrhæ tartarificata, spiritus Carminativus de tribus, & spiritus salis Ammoniaci anisatus & cum quibus Antiephæcum *Poterii* commodè misceri potest. Hinc præmissis vel blando Vomitorio vel Laxativo;

℞. Sal. ammon. puri vel depur. ℥i. ad 3℥.

Antieph. Poterii ℥ss. vel gr. xv. aut xvi. ad ℥i.

M. f. Pulvis pro una aut duplici dosi. S.

Resolvens Pulvis Stomachalis.

Quarum una mane, altera vespere propinquetur, præsertim ante Exacerbationem.

℞. Salis ammon. depur. ℥i.

Gulag.

Zingib. ana gr. viii.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. partes æquales: S. ut antè.

Vel

℞. Arcan. dupl. 3℥. ad ℥i.

Antieph. diaph. ℥i.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. part. æqu. S.

Resolvens Pulvis Febrilis.

Una dosis sumatur ante prandium, altera à meridie hora 4.

Sic quoque Nitri antimoniatæ & Salis Ammoniaci ana conducunt etiam iniquiter.

Item hæc Mixtura egregiè profuit:

℞. Aquæ Menth. vel Card. bened.

Fauis. vel hyssopi ana 3℥.

Q. 9

471

Epist. Thieriacal. simpl. vel compo. 35. ad ii.

Salis dulc. 35. 36. vel i.

Antidoti. Pueri. 35.

Syrupi de hyssop. 35. dr. vi. ad unc. i.

M. pro 2. dosibus.

aut sabinde cochlearim hauriat pro lubitu.

D. S.

Potio Febrilis & Stomachalis resiliens.

Pro Mucō viscido, Fauces & Linguam incrustante, resolvendo & excrecendo convenit Cerevisia secundaria cum tantillo Mellis rosati, vel Aquæ, Acetum & Nitrum depuratum; vel Infusum Florum Malvæ arboris in Aquâ communi, acidulatum cum paucis spiritibus Sulphuris vel Salis, additis modico Syrupi appropriati, &c.

Ut res clarior fiat, exemplum *Quotidianæ Cerevisiæ melleæ* Læsa, sed ad acutius nonnulli accedentes, narrabo.

Virgo ætatis 14., & cui difficulter fluere solebant Menfes, negotia domesticæ assidue, nec adeo ordinata uteri Diæta, conqueritur de Artaum Lætitudinē spiritus quasi entandente, cum Cephalalgia interna, & Siti pedetentim aucta. His ita aliquot dies constitutis, corripitur aliquando à meridie Horrore mediocri per aliquot horas, quem insequitur vomitus gravis cum æstu mediocriter intenso, Cephalalgia gravissima, Angustia Præcordiorum gravissima, sine sensu: mane melius habet, Cephalalgia tolerabilis, Calor præternaturalis quidem, sed moderatus, ut & reliqua symptomata; sed à meridie, appropinquante vespere omnia sensim exacerbantur. Nox insequitur litem symptomatum, ac antecedit gravis contigit; sequenti tamen mane omnia demum remissa & mediocria, continuò tamen eadem urgent symptomata, quæ saltem vespertino, & nocturno tempore exacerbantur. A meridie vocatur præter hæc tunc enumerata offendi *Ægriam* Virgineam adhuc constantem, de Cephalalgia, & Lætitudine, præterit æriam, coequecentem: Calor deprehendebatur mediocris, naturalis tamen longè intensior, ilque continuus, non adeo acris vel mordax, qui vespri saltem incendebatur, & per noctem medium gravius urgebat: Pulsus erat celer, frequens, magnitudine & vehementia moderatus, ad parvum declinans; appetitus nullus, sitis intensa; Potum Cerevisiæ confectus horrebat, Aquam appetebat: Urina erat turbida, crassa, intensius nonnulli tinta, Fauces & Lingua Saliva viscida molestant. Premissa denotantia, partim, ut Adstantium pollentis satis feret, partim, quia Menfes non bene fluxerant (R), per aliquot dies noctesque varia tentabam: dedi ei Mixturas Alexipharmacas ex Antimonio diaphoretico, & spiritui Nitri dulci, imperando sudorem: sed frustra omnia. Tandem interim eodem morbus in eodem statu maneret, & tanta esset à latente Malignitate, Cruditatum putrefactionum in primis viis delirerentium suspitione commotis, præter ipsi Vomitorum sequena:

℞. Aq. Menthe unc. 5.

Syrupi rosei sal. dr. iiii.

Misc.

Cepit mane, sed sine Vomitu: aliquot secessus admodum torminosos habuit, sed cum tanto levamine, ut paroxysmi mitis fuerit, ac Cephalalgia, & æstus penitus evanuerint, nec redierint. Hinc præbui Lympham corrigentia, abstergendo primas vias, & resolvendo earum Cruditates acidas:

℞. Salis ammon. ʒi. vel i.

Dedi pro 2. dosibus mane & vespri.

Potro

℞. Salis ammon. ʒi.

Arcan. dupl. ʒi.

Miscebantur pro una dosi, ante confectionem exacerbationis tempore assumenda. Item

℞. Salis ammon. ʒss.

Arcan. dupl. ana ʒi. ad dr. ʒi.

M. pro 2. dosibus.

Quibus ipsis eum effectus motus febrilis sedatus, in fine Martii pro Lymphæ adhuc mellis corrigenda:

℞. Spirit. salis ammon. ʒss.

Dosis ʒo. gutt. iis in die, qui continuato usque Ceram absoluit.

MEMBRUM II.

De Febre Epiala.

AD has Lentas Febres pertinet & illa, quam Veteres GALENI Sedatores Epialam vocant, in qua *Æt. frigidæ calent & frigent*, vel, ut alii, in qua *interna calens, & exteriora frigent*. (S) Hanc cum *Quotidianis* coincidere, & ex *Cruditatis Pissalis* primarum viarum oriri putat BALLONIUS in *Emet. Phar. Med.* pag. 20. Sed merito solutam his modis definitam Epialam Galenicorum asserit LINDANUS, qui hoc nomine nihil aliud, quam *Febrem lentam*, seu Continuantem, Homotonomam, cum Calore leni humido ac molli, intelligit: id quod & appellationis ratio infirmat, de quo vid. PIENS de *febris* part. 2. pag. 91. Quod si unquam talis observetur febris, in qua frigus, & febres coincidunt, placet præ aliis PLATERII assertio: Epialam non constituere Febrem peculiaris speciem, sed esse Symptomata vel Intermittentium copulatarum, cum Horror altitius febris supervenit Calori aliteri, antequam dissolvatur, quod per *subintentionem* vocant: vel Intermittentium cum continua puncturam, cum Calore Continuum micat Horror intermittens: vid. PIENS c. I. Simile quid interdum apud Puerperas, aliove *Ægros Purpure* affectos, videre est apud nos, in quibus ante purpuræ eruptionem argente licet æstu, tamen si tantillum partem quandam extra lethem proferant, mor Horrore sensum in Corporis peripheria, interdum in ipsa quodæ lethi ingurgitamentum percipiant, dum scilicet acroteris particulæ salinæ sub Corporis communibus involucri delitescunt, & jam exacerantur, vellicatione sua talem Horrore sensum circa Panniculum carnosum inferunt.

PROGNOSIS.

Epiala lenis est absque periculo, sed duratione est periculosa; quia facili in Nervium transire potest.

CURA.

Epiala specialis Cura est ejusdem origine aut generatione facili haberi potest.

MEMBRUM III.

De Febribus Syncopalibus.

AD Febres Lentas referuntur etiam à quibusdam Febres Syncopales, in quibus *Ægri animi deliquio frequenter corriguntur*. Symptomata tamen hoc non Constantia plura minus Lentis adeo proprium est, quin & Malignis non raro superveniat; imò in intermittentiis paroxysmi febrium de observetur; Unde etiam ad intermittentiis *Diffinitionem* hanc referre visum fuit SYLVIO in *Prax. cap. 30. §. 104.* De cætero quibuscunque etiam febribus Syncopæ tales supervenient videntur habere *stomatichæ*, atque vel occasione Muci vitiosi, superius Ventriculi orificium obfidentis, & vitioso sapore illud cerebrum irritantis; vel ex aliquo Humore plura munda æruginoso in Ventriculo contento originem ducere: de quibus inferius plura, ubi de *Lipethymia*,

PRO.

(R) Utinam non frequenter accideret, ut ægrorum vel afflictorum morem gerens Medicus, ea præscribat Remedia, quæ fortasse si suis tantum & Morbo confideret, non præscripserunt esset. Hæc ratio in hac Virgine Venæflectum infirmam A. ut adstantium nempe postulat satisfeceret, satis memoriam Mensum emansum præteriret.

(S) Hæmorrhæ, Epistula, Febres Quotidianæ species, quæ rigorem simul & calorem præfert: quare præterea alia nomine appellatur: de ea Galenus 2. de diff. Febr. 6. Actius (serm. 3. cap. 87. Memini & Hippocrates variis in locis: Paulus Ægineta Epiala vocabulum dicit ad huc, h. e. maris metaphora deduci; mare enim principio tranquillum apparet, ac cum turbatur apperitur evasit. Eustathius per antiphrasin ad huc, clemens, mitis, derivatum existimat. Hinc Lindanum (ut infra notat A.) Febrem mollem, seu cum Calore leni, humido, & molli consuevit, appellat. De propria illius natura non conveniunt AA. Fortasse ista Lymphaticarum Febrium species, in qua ægri esse summo calore afficiuntur, si tamen ad frigus capendum vel pedem morantur, molle frigus sensu afficiuntur: ut de Purpuris advertit mon. A.

P R O G N O S I S.

Febris Synopalis, quæ talis, non est absque periculo; consideranda tamen & ceteris circumstantiis.

C U R A.

In Febris Synopali curanda adhibenda est ratio Causæ: Hinc *Uniorum verum* maxime à FORESTO lib. 3. Observ. 19. *febr. prole* dicitur, cum *Ux* in Paroysmi principio tempore Synco est propinatum: Nempe, ubi acres, aut atroxius succi Ventrículo lacerantur, Sic ZACUTUS LUSITANUS lib. 3. *Præcox Observat.* 12. *Febrim* refert *Synopalem* *motum* *suu* *medic*, obliuam, cum nulla proderent Medicamenta, per *Aquam* *cam* *Tamarindus* *destillat*, aliquandiu continuatam, refert curatam; nempe, ubi auctorius acres succi similiaque Contenta in Ventrículo hærent. Aliis nota sunt *spiritus* *volatilis*, vel *Althææ*, vel *Salsæ*, seu *Inflammationis*, ad *Synopalem* Curam, ubi nempe *viscidum* *plūs* *minis* *Flauentum* in Causa fuerit, non inconcinnum tamen est hinc monitum RALPHONII in *Phar. Med.* pag. 211. §. 83. *Lipothymia* *interdum* *prodest* *Febrim*; *Medici* *terribi* *quo* *symptomate* *ad* *Cordicæ* *propræ*, cum potius ad *Purgam* *Medicamentum* *favem* *se* *derivandum*.

M E M B R U M IV.

De Febribus Lentis Secundariis & Symptomaticis.

Suprà dictum fuit: juxta *Leontis* *Primarias* etiam *secundarias* dari, ex aliis Morbis quocunque errato non rite tractatis oriantur, & tunc tanquam Primarias solitarie existentes considerari. Non raro tales in Praxi occurrunt, & frequentius *Febris* vel *Continua* *Acuta*, vel *Intermittens* *Intermittens*, quando nempe *Præcipitatio*, ut vocant, seu *Abstinendum* *abusu* *nimio* (oder *Uano* *se* *hald* *verricken* *Wunden*) additum morbosum Fermentum præmutatur figuræ ac quasi retrahitur, & hinc cessante sanguinis Ebullitione febrili, heterogeneæ copiosæ particulæ, aliis præcipitandis seu concorporandis, remanent in ejus Massa; quibus ipsæ & obtunduntur particulæ ejus Salinis adhærenter, & laentes quodammodo evadunt, & Lympha simul, speciatim Glandularum Conglomeratarum, v.g. Salivarium & Pancreatis, vitætur, & glutinosæ, subindeque salis evadit. Quibus occasionebus *Febris* *Continua* *Lenta* oritur cum *Calore* *mediocri*, *Ægro* *interdum* *vix* *adeo* *sensibili*, nisi ubi suas *Exacerbationes* habent; emque ut plurimum *viscidum*, in quibus subinde *insensibilis* & *induratus* *percipitur*: *Pulsus* *est* *concordis* *celer*, frequens, mollis, magnitudine ac vehementia moderatus, ad parvitem declinans: *Vires* *prostratæ*, *Appetitus* *nullus*, *Or* *glutinofum*, ex quo copiosa viscidula subinde rejiciuntur; molesta *Præcordium* *gravat*, *Fluvius* *stet* *subinde* *materie* *liquidæ* *quasi* *pulsus*, nunc cum nunc *hæc* *laciniationibus* *latissimorum* *molestis*. *Urina* *crassæ* *copiosum* *crassum* *albidum* *soporentes* *sedimentum*, excretauntur, &c. & sanè plura in his observantur Symptomata, quæ eruditè SYLVIVS sub *Febre* *Lymphatica* *salivari* & *Pancreatica* explicat lib. 1. *Præ. cap.* 39. §. 1. & 14. Supervenient quoque tales *Febris* *Lenta* supra dicta Febrili, si post hæc curas *Ægri* *avidis* *alimenti* *ingerat*; quo modo ut non raro Recidivam sibi conciliat, ita, ubi depurata magis fuerit Massa Sanguinea, ex capite, & *ex* *radice* *Chyle* *non* *videt* *affinitati*, *Lenta* *saltem* *Febris* *gignitur*. Nec solis Febribus, sed etiam aliis Affectionibus, ex Acie viscidæ plūs minis nascis, in quibus vel intempestivè movetur cararina, & hinc in Massam Sanguineam & Lympham derivatur, vel non debet evacuari, de facili *Leontis* *tales*, quæ *hæc*, plūs minis supervenient Febræ: pro quarum tamen omnium Cura *Acidæ* *salis* *beccarii* *Corallis* *temperandæ*, *viscidæ* *atenuandæ* *laesandæ*, & *ex* *stet* *Exortis* *per* *Præcordium*, *Alvum*, *Urinam*, vel *sedem* *inde* *inducitur*, prout hoc ipsum Exemplis clariùs patet.

I. Juvenis 16. annorum præter propter laboravit *febre* *Terrile* *Intermittens* *ordinaria*, qua ferè subacta, cum jam largiter concedisset, subito concidit Appetitus, omnia Assumpta, etiam Potulenta, alieno sapore videbantur inquinata, & ipse gravamen quoddam, angustias & pressiones circa Præcordia sentiebat. Propinato ergo *Humore*, rejectaque copiosissima materie saburra, omnia ista Sym-

ptomata cum ipsa Febris evanescerant. Sed brevi post cum hrenuè ederet, denud eadem in Præcordiis putabat Symptomata, repetito Vomitu eadem rejiciebat Excreta, &que in magna copia; sed isosequebatur Calor iniqui vespere & nocte, obque ad meridiem alterius diei graviter attingens, cum Virum imbecillitate, Capitis Doloze Gravativo, propensione in Somnum, Appetitu dejecto, Saliva crassa & viscidula, Os & Faeces subinde agglutinæ & infascente: circa meridiem Calor remittebat, sed post eam recurreret, dido modo affligebat, donec a meridiem remitteret. Hic benè pensitatis, *febrim* *Quotidianam* *Lentam* & quasi *Lymphaticam* à SYLVIO appellatam, esse suspicatus sum, eamque non tam ex *Lympha* *Pancreatica*, cum nulla Abdomina adflecter Symptomata, & *Ægri* *quotidie* *naturaliter* *Alvum* *exoneraret*, quam ex *Lympha* *salivari* *quarum* *Glandularum*, in specie *Salivarium*, quæ crassa & viscidula, & acida præternaturaliter cum lit, unde & Saliva simili vitio affecta, talia Symptomata tam Oris, quam Stomachi inducat.

Propter

Antihell. Poter. 3℔.

Mori antimoniaci gr. viii.

Mic.

Præparabatur in duplo, fumendo mane & vespere dosim unam.

Æg. Mentha,

Potulenta an. 3℔.

Acid. destillat. 3℔.

Lap. Cancr. præp. 3℔.

Antihell. Poter. 3℔.

Spir. salis deli. gutt. xv.

Syrupi hyssopi 3℔.

Mic.

Hauriatur cochlearim, aliquantulum profuit. Hinc

Æg. Mentha,

Panic. ana 3℔.

Spir. Theriac. simpl. 3℔. ad 3℔.

Oxymell. scillit. 3℔.

Spir. salis deli. gutt. xv.

Syrupi hyssopi 3℔. vel 3℔.

Mic.

Captiatur cochlearim.

Post aliquot cochlearia hausta *Æger* *potentem* *dulcem* *nauseam*, de novo copiosa, crassa, viscidula & mucilaginosa vomit. Ut ergo Cruditates viscidæ mellia attenuarentur, Sella ex Lympha reliqua leniebatur, & Stomachus corrigebatur:

Salis Ann. depur. gr. xv. ad 3℔.

Dabitur in duplo, & optatè profuit.

Salis Ann. depur. 3℔. vel 3℔.

Antihell. Poter. gr. xii. ad xvi.

Mic.

Divis in 2. part. æquales.

Continuato etiam sic Sale Ammoniaci, *Æger* *tandem* *convaleuit*.

II. Similis erat *Febris* *lenta* ex acie viscidæ, Sanguinem & Lympham inquinantem, quæ affligebat Nobilem quendam. Hic post curas Morbosum Curatorem negligit; unde post aliquot septimanas corripit insigni Lætitudine, & omnium membrorum Corporis: accipit semper à meridie mor Calor præternaturalis, ita ut circa vespem non modicioribus æstuetur, usque post noctem mediam: massæ commotæ fatis habebat, *Febre* *tamen* *lenta* *Continua* *superfere*: dormit a nonnulli inquit, Os ferè siccat semper & glutinosum est, copiosus Mucus à meridie Fances opplet, sponte subinde vespere ad primum inclinat, quo tempore etiam admodum satius est, Alvus

Quod tamen ita universaliter vix concedendum videtur ; quin & ex perverso usu Rerum Non-naturalium , v. g. Tristitia aut Mores diutius prostratis, Excessibus præternaturaliter recentis, vitiis Assumpsit, aut latent morali dignis, *Naturam* oboriri posse, Prædicti observarunt.

Et alia *Hæma Ictæ* admodum *Fæbris*, et interdum *Agria* va-
fentibus. Nam *Colera ejus* est admodum *limba*, et quali-
tatem, quæ inter primo attractu valet percipitibus, unde
interdum raro de Calore consequuntur Agri, uræ, et diuelli
consecratur manus. *Colera morbus* et *radens* hic manifestus,
post est *empta* tamen *Alimenta dantes* vel tribus diebus *horis*
fit prodiu *Colera*, *limba nonnulli* acrior, et vehementior. De-
inde *Copula* succedit. Et infensibiliter emoluitur, et tunc,
si ulterius progreditur, Conspicimus, *sem* *Hæma Mar-*
moris vocati sunt, à Græco nomine *Mar* vel *Hæma* (V);
partim, qui Ventera crediderunt, stus falsis, hanc *Fæbrim*
inducere ipsi *Copula* Habitui; partim, qui hanc *Fæbrim*
ad Habitum, seu summum gradum pervenerunt, ut aut
plane nonnam, aut rarissime, Curam Medici admittant.
Desuper *Pæss* equidem est vehementior solitu, et frequen-
tius, parum tamen de debilis, simul et celer, et horqualls
con succedit, et claudens *limba* *Hæma* *progrediens*. Et hæc sunt
era quasi *Hæma* *Pathogenetica*, et primaria Symptomata,
quibus prænotibus *Hæma* *Primaria* conjicitur et ponitur
Nemo.

1. *Calor ipſi* Egro *occultus*, vix ſenſibilis, ab omni paſſu poſt aliquot horas auſus.
2. *Adhuc abſumptio & extenſio Corporis ſucceſſiva ſeu Marasmus*: &c
3. *Puſſus* rari, parvi, frequent, debilis, & ſubinde duri.

Hæc tria ubi observantur, audacter prononciandum est;
aut adesse, aut imminere Medicam.

De Febre Colligacione *suprà* dixi, quæ summus gradus est
Febriæ Heſticæ.

Symptoma, quod maxime vexat Aegros, præter Virium debilitatem, est *Marescas* seu consumptio, & *Marescus* interitum partium solidarum, cujus ratione *Haësis* perfecta in tres gradus vulgo solet subdividi.

Primus *Hefticus* *Febelis gradus* est, dum ipsa saltem roride, mucilaginosa & nutritiva partium substantia, quæ in Nutrimentum partium proximum abire debet, successivè absumitur, & quasi dispergitur.

Sarcodon griseus est, quando haec ipsa Substantia rorida iam in Pinguedinem, aut etiam in Saccum nutritivum partium solidarum mutata, & reliquis partibus consubstantiata, potestatem liquefacta, quasi densa confertur.

Tartarus vocatur eff. cum absumpto omnino isto Rore rosco, ipsi nuntia assimilato, ipsi semina partium fibrosa, seu ipsi fibres crescant tandem de exsiccantur, & hinc nocentur ac aridentur sensibus manifestam coarctant, & frigore tandem Scelera repræsentant pelle indu-

²De his videantur Praedici, in specie SENNERTUS de RIVERTUS.

Modus generandi hujus Febre est duplex: nunc enim est *Primaria*, et *per se* incipit, nunc est *Secundaria*, et *inter Symptoma* supervenit. Morbus tandem infertur, et ita *Non Symptomatica* sua Causa dictur, ita Febribus *Alia*, *per se* incipit, est, quae succedat octavo vitio *Reum*, seu *Neurasthenia*, i. e. gr. i omio Corporis Exercitio, Labore commotum, quoque, et *gula* primario fræ, et Tristitia et Morore Animi immoderati; quandoque i Vigilis i Curis multum profectis; subinde ab hecda discurrendo, interdum ab Exantematibus Corporis infertioribus; non raro ab illegitimo et perverso Thermaum ac Balnearum usu; insuper ab Alimentis pravi et parvi fucci non ritè in Stomacho digestis, et coarctis.

Hæc est Causa primaria, & vix sine Alimentorum corruptione oritur Hælica: quæ verò aliis supervenit Morbis *intra Symptomaticis*, ac cum iis complicatur, est, quando observatur supervenire Febris continua, aut intermittensbus contumacioribus ac vehementioribus, in

specie perverſe modo curatis, Sic namque inter alia HORSTIUS l. 2. Obſ. 34. obſervat *Hæmicam lethalem*, obſtat *ex reſtre intermittente*, per Speciem ineptæ & empiricæ curæ. Superſente etiam *Hæmicæ* ſæpiſſimè Vicerum pleniorumque, ſpecificiſſimè *ſanguinis, coſummatiſſimæ*, ut ſi Inflammationibus in Abſceſſu, *Ulcera degenerantibus*, cum quibus partium internarum tæſiſſimè, ſicut interdum etiam partium externarum Abſceſſibus Gra- vioribus ordinarij juncti *Hæmicæ*, qua ratione Publiciſ ſemper fuſe Hedici, ſic LINDANUS fuſe Martmanno non obſervavit *Hæmicam continuamſimè in Abſceſſe*, *Meſenterij* proſtravit; item *ex Ulcere*, qui in Carcinoma incidit; item *Hæmicam ex Ulcere Renis*; item obſervavit *Hæmicam in Fœmina*, ortam ex multitudine *Tumorum* Corpori laſuſorum, qui omnem humiditatem ac Rorem nutritioni abſumpſerant, quo tamen curata fuit clauſis de fanatis iſſis Ponticulis; quod obſec vetur contra Fonticulor, quos & *Lei Pontica* ſubinde *Pyſis Leuta*, *Hæmicæ* piſi mi- nidoſiſſimæ, ſociari ſoleat, ut ſub *Febre*, quo *Hæmicæ* ſimulat, later *Hæmæ Colliquæ* vide. ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Præc. animæ, Obſerv. eſp. item FONSECA l. 1. Capſul. 40. pag. 364.

PARS AFFECTA.

Vulgo dicitur: *Hæticum* in *Habitu Corporis* fundatum esse & radicaliter consistere; unde debetur *Calor gastræ naturalis in partibus solidis ac Crassitudinis incretae & refrigeris*, qui tamen non est: quin potius infatigabilem *Fervorem* alium radicatum in *massa sanguinea*, & quippe fermentatione nunc *Lympha vitiatæ*. Propterea enim he habent hi duo liquores, in specie ganguæ, ita se habet universum Corpus unde etiam particularia *Ulcera insigniora Tibiarum, Reum, &c.* quæque iniquantur. *Mallum sanguinem* circa loca necrosæ circumlatum, inferunt *Hæticum*; Vd. *PIENS de Febris Part. 3. pag. 46. & 51.* Unde etiam *Calor Hæticorum*, lentus imprimis, circa loca *Arcenarium* manifestior ac magis percipibilis sentitur.

Has inter Causas, quos modo numeravi, Remotas, ista
Hælica quæ *per se* incipit, adeoque per se totum alium Rerum
 Non-naturalium sequitur, semper est proximè & originaliter
 ex vitio *Gomachi* ac *Alimentorum*; nempe quando *Gomachi*
 Fermentum loco nativi sporis acquirat saporem falsum
 acremve, & ad digestionem pilis minus ineptum; hoc
 enim itidem alimenta in succum viscidum, falsum, acrem
 transfigunt.

CAUSÆ.

Causa *Proxime* nimis Febris in Melle Sanguinet et *Dysenteria* sanguinis humis acida *salva* et *asida*, cum nimis *viscificata*, seu glutinosa conijunda, quatenus nempe in huius Lymphæ Glandularum Conglobatarum redditur, et *cris* et *salis*: unde simul et Lymphæ facilius viscositas & glutinofitas, idque sensibilibus in Glandulis Conglomeratis, adeo fœle. Hinc in Hæclicis omnibus *saliva* non tantum panis cum ariditate Lingue & Fauccium, sed & *viscidis* nonnullis, simulque plius modis glutinosa percipitur (quævis Saliva), talis utperlim est Succus Pancreaticus: simulque sentiunt Stomachi putredinem propter Lympham viscosam deglutitam. Ab illa ergo acrimonia salina non blanda & aquabilis fit Fermentatio Sanguinis, sed potius depravata ingruit, simulque quodammodo immittit, ac consequenter Calor acris, lenius, ac quasi obfcurus existit: Conser. WILLISIIUS de febrior. Unde et spirituum in corpore diffusus, necnon languor totius Corporis, & successiva Virium debilitas superveniant, cum particulis fæcive Urinæ & Acidæ (inflammatæ Naturæ generalis) non debet invicem inestum moro concurrant, sed potius pauce & inertes saltem in tertium fassum coalescant partim, partim adhuc liberæ ab illa fæcile impediuntur, quod minus debet fermentum, quod potius ex vitio Fermentationis Melle Sanguinem Calorem nonnulli auctum quidem, non tamen insequens adeo, sed tantum acrem & quasi asperum indicant. Hæc

[illegible]

vitione concreta. Non raro, imprimis autem ubi in Corpore intermixta Emulcationes, Urine est additum Saba-lum copiosissimum.

Excrementa alvi in Hæclicis sunt diversa; Faeces quan-doque sunt duræ, imò sæpius in principio & incremento Hæclicæ interdum difficulter egeruntur; postmodum verò sunt admodum liquide, & redduntur copiosæ, dum nempe Stomachus omnino labefactus nec rite continet, nec debite concoquit Alimenta: In ultimo Hæclicæ gradu Fluxus alvi ferè est continuus, quæ omniuni pessima est, & Endæ Colliquævis singulis mediis ubertim prorumpunt, Ca-pilli etiam pedetentim defluunt, unde magis magisque Corpus emaciatur, ut illo Alvi Fluxu utpote maximum Hæ-dici intereat.

PROGNOSIS.

Quod attinet Signa Prognostica: in Principio Hæclicæ fa-cilè curatur, quæ verò magis est Chronica, quæ propolis accedit Tuli, eo difficilior curatur; i. e. quò propinquior est primo gradui, eo facilior; quò propinquior tertio, eo difficilior curatur: verius gradus plane incurabilis est.

Deinde Hæclicæ per se Morbum constituunt, & ex per-verso sex Rerum Nonnaturalium usu genita, facilior curatur, quam quæ à lahe Visceris interni orta est; in verò supervenerint Emulcationes interne, periculo est plenissi-ma.

Hæclicæ Febri Putrida, uti vocant, seu Intermittemi, aut Continua, vel aliis Morbo Chronico conjuncta, aut illas curatas immèdiatè insinquant, curatu est difficilissima, & plerumque lethalis, ægris contabescensibus.

Hæclicæ in Junioribus, Visceribus validis, cæteris paribus, facilior, in Adultis tardior & difficilior, in senilibus, quocunque se habeant modo, ferè omnium curatur.

Si adit Facies Hippocratica, quæ vocant, res ferè est desperata: Vid. GARMANNUS de Miraculis Mortuorum, ut & DUCHESNE D. LANGII de Facie Hippocratica: Ad hæc si accedat Lænteria ac alvi Fluxus, aut Pili decidan-tur, aut Pedes inflentur, Mors est præ foribus.

Quand Tempus evenit: notum est, quòd Morbus per se admodum chronicus nec centenasq. die Hæclicæ, tardus ac diffi-cilis, lentus, & qui subinde distans solet cruciare ægros, cuius longitudo ac difficultas utatæ & Corporis constitu-tione est metienda.

C U R A.

In Cura ab primùm respiciendum est: num Hæclicæ de-pendat à parvi aliovis Morbo, adeoque sit Symptomatica? num enim Cura ad illum Morbum, à quo subinde depen-det Hæclicæ, est dirigenda: Deinde considerandum: an Hæclicæ sit simplex, seu Morbus primarius? an verò compo-sita, seu Complicata cum quodam Febri Putrida? & in hoc casu tollenda prius Putrida, & hæc removenda Hæ-dici.

Si verò in se sit Morbus primarius, attendendum est ut

1. Armonia sanguinis & Lymphæ acido-salina temperetur ac corrigatur.
2. Ut Hæmorrhæ reliquorum, in specie Lymphæ, acido-tas & visciditas emendetur.
3. Stomachi digestio restituetur.

Hæc ut commodius fiat:

Observe. I. In Hæclicæ simplici, seu sine Febri Putrida, quam vocant, seu Fermentativa, complicata, nec Zvæu-olone, nec Vermifugione, nec Purgatione sunt instituende; hæc enim semper Vires debilitant, & Nutrimetum Cor-poris plùs minus depauperant. Sed potius mèdus Dieteticus ac Pharmaceuticus rite referendus.

Observe. II. Si tamen prima res Corporis, nempe Sto-machus & Intestina, Excrementis repleta sit, propter eru-duntur à debili Ventriculo proditæ, totò Purgatio una al-terave levis alterutra in principio institui potest. In Hæ-dici copiosissime Purgantia evacuant, sed plerumque in perniciem ægrotum; deficit enim Fermentum acidum Stomachi.

Observe. III. Imò si visio Stomachi (id quod sæpius, ut dixi, fit) oritur hæclicæ, convenit ante omnia Potus-rium blandum institui, si Vires adhuc sunt validæ. Au-dendum hic est LINDANI consilium, dum inquit: In-terventione Hæclicæ statim ad parvi afflicta cognitionem incum-

bere oportet, quæ cognita, ego facilius Hæclicum quàm Quarta-nam carabo; eruantur enim plerumque ex vitio Stomachi. Sic, inquit, carabo ante Potusrium, & hæc tam Elæxir propriè Hæclicum intra 4. dies: Sicuti Elæxir propriè in Hæc-li-cæ ex Stomacho singulariter commendat idem LINDA-NUS.

Observe. IV. Ioter Symptomata, quæ huic superveniunt Morbo, præcipuum est & quasi funestum Alvi Fluxus, ægros faciliè ad interitum perducens: Colliquævis enim est. Refræmandus ergo erit, utpote periculosus, matre & debite Remediis ex Cydonis, Roris rubra sicca, La-ctæ chalybeato, Uvæcora solisti & similibus: uti etiam Sudoris uberior effluus; quos Sudores optime compe-scunt Opiata in parva & probè subdola dosi, vesperti-no tempore usurpata.

Observe. V. Dulcia: uti Saccharata, & maxime Mellita, vitanda sunt: Talia enim sunt viscidæ & glutinosa, ob-tundunt Succos Corporis, Stomacho noceat, & illos vi-scidiores & glutinosiores, hinc inæqualem Fermentatio-nem, & ita Hæclicam deteriorè reddere solent.

Si ergo Hæclicum fuerit Symptomatum, ad primarium Mor-bum respiciendum esse dixi, considerando ante omnia si-mul Stomachum. Quòd si superveniat febril Intermit-tens, vel Continua Ardens, malè curatis, Hæclicæ ibi præmis-sio aut omisso Potusrio blando, utilissimum est Sal Am-moniacum cum Antihæclico Potusii mistum, secundum For-mulas, quas supra dedi sub febre Lymphatica ex vitio Lym-phæ Glandularum Conglomeratarum, Succi nempe Pancre-atici & Salivæ: propinquant, quod est egregium Rem-e-dium, curant Hæclicam præsentem, & præservans abul-teriore progressu: Vel

℞. Salis Ammoniaci depur.

Aniseoli, Poterii gr. xv.

M. D. S.

Pulvis Resolvens.

Si Abscessum, aut Ulcus, aut simile vitium Partium in-ternarum insequitur Hæclicæ, isto rite curato per Pulve-rem, per Remedia Sulphurea & Antimonialia fixa, item per Balsamum Sulphuris & similia, faciliè Hæclicæ curari potest, utpote sponte interdum evanescens, ut supra de Fe-brilibus Symptomatibus insinuatum fuit.

Balsamus tamen Sulphuris preparandus est non cum Oleis destillatis, v. g. Oleo Terabinthæ: haccum Juni-peri, &c. hæc namque Olea nimis sunt acris, & Febrem adaugent; sed potius elaboratur cum Oleis expressis v. g. Oleo Amygdalarum dulcium rectis expressis, Pincarum &c. quæ insigniter fuit nutritiva. Hinc Balsam Jun-gi poterunt aliquot partes Olenum destillatorum tempera-torum, ex quibus laudo Oleum destillatum Anisi, & hoc modo forsan paratur etiam Balsamus Viri Archiatri Hal-lenis KEILII GII. Notetur saltem, ut pro majore Tinctura balsamica extrahenda Ignis digestionis adauger-tur.

Porò conveniunt etiam Pinguedines Animalium, quo sensu Arungia canina multum præstat; cui tamen præ-renda est humana: item Butyrum Majale, &c. Ex Resi-nis multum hic præstat ipsa Terabinthina, si solvatur in Vitello Ovi, ut & Decocta Plantarum temperatarum, quæ vulgò vocantur Herbe Pulmonariæ, v. g. Tussilago, Plantago, Pulmonaria, Galiopter, alias Scrophularia, (X) &c. vid. SCHROEDERUS Pharmat. Medico-Chym. lib. 4. pag. 154.

Curato ergo primario Morbo, unde Hæclicæ dependet, & restituito Stomacho, ipsa Hæclicæ curanda venit. Id quod etiam tentandum est, si ipsa per se Morbum consti-tuerit, esse imprimis per Remedia Pharmaceutica, & præ-cipue Dietetica. Fani Chirurgicus nihil hic suggerit, nec Vermifugio, neque Fonticuli, neque Scarificationes; nec aliud quid conducunt.

Ex Pharmacia conveniunt Temperata, quæ saltem tem-perant, viscidum atqueant, & blandè corporis partes li-quidas humectant. Hæc inter eminet Ros Majalis quocun-que modo preparatus. Sunt qui ex eodem Spiritum & Sal essentiale parare volunt, idque in Hæclicæ valde pro-desse afferunt; commodè in Spiritu Roris Majalis pro-esse Ros infundi possunt Flores Violarum, Borraginis, Buglossæ, & exinde parata Tinctura sub forma Julepo-rum largire usurpari. Hæc vicarius est Ros Viridis volatilis, illud nempe Phlegma volatile roridum, occultè plu-

(X) Sunt sane quæ nemulus Scrophularia species Galeosidis nomen appellat; verum longè diversum Planta ge-nus est Scrophularia à Galeoside. Hic autem de verè Scrophularia nodosa foetida C.B. intelligendus est A.; ne enim ad propinquum negotium facere magis videtur, eamque major Botaniconum pars Galeosidem vocat.

Chianam, herpag. 308. Bk

Contund. in mortario marmoreo, exprime, & adde
Syrupi Elix. Pap. err.
Tinctur. 30a Syr.
M. S.

Singularis Potio, singulis duabus horis sumenda,
Elixera.

24. Ungu. Refrig. Gal. 30. 10. mart.
Acong. 30m. Bm.
Sacc. Saccari 30.

M. I. Unguentum, D. S.

Unguentum externum ad Spinae dorfi. Vel
24. Unguenti Refrag. affr. 30.
Carn. Cancr. Ruviat. cru. optiat. cancr. Syr.
Acong. 30m. 30.

M. S. uti suprà.

Sed ultra Pharmaciam, uti dixi, maximam partem per
Cura Heftica constituitur Digra, premissi necellario prae-
mitteendis, primas vias scilicet Abstergentibus & Munda-
ficantibus, Alimenta faeculeata & probè nutritientia sub-
ministrans, quæ laer excellunt Lac & quavis Lacticia,
atque Emulsionibus. Conveniensimum est Lac muliebre,
imprimis si ex ipsis Uteribus Nutricis fuisse fugatur, ne ab
Aëre alteretur. Exemplum habet FORESTUS L. 5. Obsv.
10. de Juvene Phthisi desperata laborante, qui si-
bi conduxit Nutricem, & Lac ex illius Uteribus fuisse;
ex quo non tantum restitutus fuit, sed etiam gravidam fecit
eandem (nam Lac muliebre stimulat ad Venerem) ne-
novum illi Lac defecit. Aliis Lac Aëne per ceteris in
Medicis Cora salubre est, cum sit ex Animalis longævo:
in nostro Cellario Lac bubulum ex bestia sana, & finis
pascuis gaudeat, commodè Hefticis ordinatur & præ-
scribitur; siue ipsum Lac usurpetur, quod communis est
ferentia; siue in specie sumatur Lac ebutyratum, à
PIENS de Febriliter P. 2. p. 61. laudatum. Interdum etiam
Serum Lactis subtili potest: vid. BARBATUS
de Sanguine & fero p. 110. Usurpetur autem maturè,
nec nimis tardè, sed necesse est Vires adhuc nonnihil
consent, & etiam Stomachus adhuc digerendo nonnihil va-
leat: his enim deficientibus non multum proderit. Lac
capillatum etiam est egregium, quod à quibusdam non sine
fructu usurpetur.

In usu verò Lactificationem observetur:

1. Ne Hefticæ adjuvata sit Alia Putrida dista:
item, ne addit Capitis dolor: item, ne Venter
fecat excrementis & sordibus acerbis, ex Dige-
stionis vicio matris: item, abest Hypochondrium
tenum. (Y)
2. Ut nihil ferè aut bibatur, aut comedatur aliud. (Z)
3. Ut paucò addito Saccharo Lactis coagulatio im-
pediatur: hoc id etiam sub usu Lactis Acidæ quæ-
vis fugienda sunt. (A)

Tom. II.

4. Ut assumatur Lac jejunè & calidum, adeoque vel
immodiacè ex ipsis Manibus fugatur, vel recentis-
simè multum adhuc calidum hauriatur, ne
alteretur ab Aëre, Lac; facillimè enim effalte-
rationis.

Primum etiam Lac alimentum sub tali Lactis Cu-
ra constituitur, ceteris nonnisi levioribus & facillè digestibi-
libus, sique paucis, assumptis. Ante omnia verò explorat
Medicus, an Eger Lactis ulum ferre queat: Medicum docet
JOEL in Praxi, ubi de Heftica: Siempe Ventriculo prius
leni Purgatione evacuato, exhibebatur Aëre iatro 30. vel 15.
Lactis, videlicet si probè conceptus; & nil miscebatur eo
sentias, nec possit assumptum Lac gravitas in Ventriculo sen-
tatur, aut Singularis excusetur, aut Nausea Viciaque sequatur,
nec Caler in corpore, nec Pulsus intendatur, tunc possit integra
libra manè & vespere preparari; possit assumptum autem Lac
nec violentius se commovere, nec dormire Eger. Utinam legi-
timum Digrae Lactis communicavi in Colleg. Schoderiani
no Pari. 2. Conter. SENNERIUS de Febriliter M. 3. a.
p. 351. JOEL in Praxi Tem. 5. pag. 37. & M. A. N.
C. Ann. 1. Observat. 141. Alimenta reliqua sunt omnia tem-
perata & boni succi, unde Pulvis, v. g. ex Oryza, item Ju-
scula Avenacæ temperata, & Hordeacæ in Scatu hefti-
co conducunt: de quibus BORELLUS Cent. 4. Obsv. 19.
qui multos Medicos tantummodò desperatos uli Hordeato-
rum frequenti restitutos esse affirmat: item Chocolata,
Amygdalæ, Nuclei Pinearum, Pitlaciarum, Semina 4.
Frigida maura, &c. Carnes Pullorum porcorum, Vitu-
lorum juniorum, Caponum, Gallinarum & Anatum, im-
primis Rana & Cocheles nutriturum; sunt enim, qui
lingniter commendat Ranæ, earumque Coxas, quæ Ra-
narum Coxæ frequentius eliduntur in Italia. Etiam Te-
stidines laudantur ad Curam Hefticæ, imprimis quidem,
quando prius nutritæ fuerint. Saccharo & Farina, & pos-
modum coquantur in Brodio Gallinarum non admodum
saluto: scilicet volunt, ut Testidines seu Limacinae
per aliquot dies nocturne in junio serventur, postea
Saccharo & Farina fiat nutritio duabus vel tribus diebus;
postmodum cum Aqua & paucò Sale coquantur, postre-
mò vero Jure optimo Galli aut Anatis preparantur; hac
enim ratione preparatè optimè in Heftica conducere di-
cuntur. Confirmat hoc AMATUS LUSITANUS Cent. 2.
Curat. 53. qui caravit quendam per Palloræm gallinæm
Testidines: numeratibus lagnaturum etiam, & potu in Lactis
assumi.

Canceri recentes fluviatiles solent esse admodum nutriti,
imprimis quorum Caro est insignis: certè Canceri fluviati-
les, rore alcalino nutritivi tardius, modò a Stomacho di-
gerantur, quocunque modo usurpari, imprimis si ex con-
tactus Succus eliciatur, conveniunt: subaquum cum Decocto
aut Succo Amygdalarum obtile fuit Alimencum medica-
mentosum: vel Canceream, Saccis expressis tum Antipyræ
100.

R

(Y) Canem; Lactis methodicè exhibendi habet Hippocrates 5. Aphor. 64. ex quo A. profectus decessit: ibi, Lac dare
caput dolentibus malum: malum verò & Febricitantibus, & quibus Hypochondria suspensa murmurant, &
Siticulosis: malum autem & quibus in Febribus acutis biliofus sunt Dejectiones, vel siccus Sanguinis multum deje-
ctio facta est. Convenit autem Tabidis dare, qui non valde multum febricitant, & in Febribus longis & parvis,
si nullum ex supradictis signis affuerit, & præter rationem consuntis. Accuratius loquor Aphorismi Commentarii iam le-
gere est quod Cl. Praetorem Luciam Tossi. Notandum tamen est, quod si juxta præceptum ab Hippocrate Canem, Lac
aggravandis exhibere velimus, nullus ferè heu: erat illud exhibendi; nam nullum ferè Tabidum Lactis egentem invenimus, qui
vel capite non doluit, vel hypochondria non habet suspensa & obmorituraria, vel siccum non palatur, vel biliosus quocunque
non exerceatur dejectionibus, vel dentem cum nunquam Sanguinis fluxus non acciderit. Quapropter nisi omnia simul hac
contraindicantia vitiata, aliqual pro Tabidis sublevari est arduum, adeoque Lac propinandum, etiam si unum vel
alterum ex recentibus ab Hippocrate signis obstat. Etenim nullum pro Tabidis nutriendis præstantius habemus prædicum, quàm
Lac, primum, & primum Corporis nostri flammis maxime analogum, nutritivum, exhibere. Legi meretur Fr. Bayle
Differatio de usu Lactis ad Tabidos reficiendos.

(Z) Cum nil aliud comedendum vel bibendum, nisi solus Lac, Egentibus conceditur, diæta Lactea dicitur, de
qua Præfati. Ut quid expertus sum dicam: Infans, vel in prima Paucitia constitutus, est jam à Lactis dispensi fuerit, &
cibi solidioribus afficeret capere, si in Tabem incidere, omni dentem cibo comode passus Nutricis sterna mammae ex-
gere, & Lactem Diætam cum nutrimento commo ferre; ut qui jam adhiberetur agri passus, omni præterito cibo & puer,
felo Lactis exaltè nutrir: me unicum vidi ad secundum diem Diæta Lactea ab ipso jam longare necesse.

(A) Qui apud Anglos primum mos innotuit, Lac cum Caffè convigere, simpliciter potare, jam in Italiam translatum est,
ut in quoniamque populariter consuevit hac potione transire. Reverè Duellum Caffè, Lactis primum in Ventriculo adhe-
re non parum facit. Solus & nulli Panis bucellum, vel Mentha sola viridis Lacti præmittere, aut si merui diæta Cl. Ba-
conis à Vertulamo methodum, illud per facillimum pulvere Mentha & Rosarum rubrarum referentem trajicere, diæta calidum
propinare. Illud tamen omnino vitare in Praxi debemus, tunc Lac egregie in Ventriculo coacti, adeoque exaltè Nutri-
tici negotium procurare, cum purgatis quod fieri potest primis Alimentorum officio, ut adhibetur indistincta, ut Lac in
vacuum omnino Ventriculo administratur, nec nisi in vacuum jam à Lactis Penetratione cibis quiescentem ingratum: in tempore
fuit ut nullum in Ventriculo manentem Lac potatur, adeoque nullum noxium saporem adferentem, in sanum dulcemque Chylum
mutaretur.

centi Majali non salis minus dat Butyrum Antilepticum quod compescunt Matres familias vocant die Krobo-Butter, id est, Butyrum Coarctum, egregium restitutum confirmatum: Conf. SACHSIUS in Gamallor. Sunt, qui commendat etiam Oleum in Hedica, quæ simili ratione bene conducit, si cas feret Stomachus. Sic LINDANUS *super Hartmannum* notabile habet Exemplum Hedice, Oleum usum curat: dicit sanguis fuisse Antileptici Virgine 20. annorum, quæ ex *Uterio Pulmonum* in Hedica incidit, & jam desperata salure per aliquot annos decubaret: dicit Ægra obvenere voluptas comedendi *officinarum*, unde cum ipsi graticum fuerit 22. præparatis Officis, his avidius confestim totidem iterum concessa fuerit: postea die cum Ægra senserit, quod ex harum nix le habet melius, plures fuerint oblata, & intra breve tempus magnum eorum quantatam comedit, ac ita brevi in totam ad Hedica liberata fuerit, supposito, & 2. libatos pepererit. Nempe in talibus habetur ratio Stomachi, eisque quoad Appetitum distantes, & quoad Digestionem operatio.

LANGIUS in *sa. Misellaneis* commendat Anguillem, ut comedatur ab Hedice, nec hoc videtur absum: Vid. *opus Misellani*, pag. 41., ubi videbimus eundem opinionem. Sed præstat sub Lactis usum Cæcium eorum intermittere, ne Lacti ad corruptionem detur occasio, quin Lactis sola pro Cura usurpentur. (B)

Quod si Fluxus Alii addit, imprimis crassa Alimenta conducunt, ut de Oryza, Pulvis farinacei, Lac chalybeatum præparatur.

Hæc sufficiunt de Febribus Continuis, ad quas pertinent etiam primario Febres Malignæ.

C A P U T VI.

De Febribus Malignis.

Februm in Benignas & Malignas communis est divisio, cujus *supra*, ubi de febribus in genere actum fuit, mentionem fecimus, (hæc enim nonnulli gradualiter differunt.)

Quo ergo attinet febres Malignas, seu Vires Malignas, & heas summum gradum, scilicet *Postulencia*, ita dicuntur propter similitudinem ab Homnibus Malignis, qui sub specie recti decipiunt. Nam apparenter sunt tales Morbi ordinarii, quoad externa signa aut externam formam apparent boni, in se autem reuera sunt pessimi, & gravissima Symptomata inferunt. Sunt autem hæc ipsa materialiter nihil aliud, quam Nomina, quæ fortissimi hi Morbi per Metaphoram, & in sensu Medico significant certam Causæ Morbosæ occasionalis seu materialis, & inde interram Affectionem statum & conditionem, secundum quam Febres ab ordinatis sui naturæ & incendi consuetudine, respectu nempe Corporis universi patientis, violentiæ agunt & peiores sunt ut quasi Venenæ naturam acquirant, & consequenter summum Periculum & Mortis metum inferunt, quæ peior conditio Causæ Morbosæ per vocabulum Malignam læt exprimi. Hæc ergo ratio non tantum Febres, tam Intermitteutes quam Continuas Acutæ, sunt Malignæ & Benignæ, sed etiam Malignas & Benignas communis est affectus nonnulli Morborum, ut interdum *Ure Arteriæ*, interdum Maligni: sic dantur *Angina Maligna*, *Plenitudo*, *Dysenteria*, *Cholera*, *Diarrhoea*, *Benigna & Maligna* & c. & c. consequenter etiam in aliis Morbis quidam sunt Maligni, quidam Benigni: In specie tamen in Febribus attendenda venit Malignitas.

Interim Morbi Maligni non idem sunt cum Contagiosis, dantur enim Febres Contagiosæ, quæ non sunt Malignæ, ut Scabies contagiosa sine malignitate, item Coryza, & vice versa Malignæ sine Contagiosis.

Ex his prædictis describitur Febres Malignæ. Jam ergo uti alius Affectus quivis, ita in specie illa febri nomen Malignæ acquirit, quævis *subitæ* ac *inexpectatæ* Vires *Arteriæ*

profrastrantur, aut Symptomata curantur majora seu longè graviora ac infolentiora, ac aliis in Affectu simili, aut in Causa ordinaria modo constituta ubi possum. Ex quibus sequitur fundamentum *Prægnantia febrium Malignarum*, tales scilicet Morbos maxime esse periculosos, aut speciatim Febres Acutas Malignas, adeoque subinde brevi ad Mortem terminari, vel repentina Symptomatum truculentia, quæ ratione idem ferè cum venenosis erunt. Sic verbi gratia Febri talis ex vitio Digestionis primæ sub auto Fermento febrili est *Tertianæ Intermitteutes*, si more alio solito omnia procedant, est Benigna; si autem in hac tanquam in Ardente subinde imminet vel crassa Animi deliquia, Convulsiones, Deliria, vel Ægros anxios admodum cum Pulsu parvo in vigore *Prolym* existere videmus, aliæque Symptomata in Tertianis gravibus longè, quam condicio Morbi requirit, & plane infolentia affligunt: tunc latet anguis in herba, significat enim Fermentum febrile ejusque Fomitens depravatam & corruptam, subest Malignitas, diciturque Tertianæ Maligna. Item in Tertianæ Ardente, si nulla addit Sitis, utut naturaliter esse debeat, suspensa est res, & Malignitas subesse dicitur: si in Causa adeo Sitis clamor cum crudis Fæcibus, rubra & squallida Liagua, præsumptio est Febri Malignæ: Item si Homo adhuc in neutralitatis statu est constitutus, seu appareat sumus, aut quippe Febre apparetur mihi correptus, secunda aut tertia die congregetur de maxima & subitanea Virium prostratione citra Causam manifestam, hoc subinde solet innuere & prædicere Morbum Malignum.

Vires autem primario proferri solent sunt imprimis Vitales, succedunt etiam Animalia & vitæ, ut pro Afflictum varia ratione nunc hæc, nunc illas magis, sunt atqueque simul affligi solent. Differentia tamen, ut in Principio Malignas cognoscamus, non adeo est cognita: lænet subinde Febres Malignæ in Principio, & leviores Morbi speciem representant, exercitatoreque interdum fallunt, unde etiam Malignæ & mali moris dicantur, nimis quantum tamen Vinibus & Vires insidiantur: Si enim tertia vel quarta die se prodit Malignitas, hoc nimium fit tardè, & occasio Medicinæ parandi præterlapta est. Unde finis causi in Febre Maligna materiam cognoscenda, ne in perniciem abeat Symptomata, quæ in febribus Malignis affligunt.

Cognoscuntur imprimis de Pulsu, vel mox in Principio nimis debili, vel subito nimis debilitato & parvo, qui Vires Animales & Vitales prostratas denotat: Quando Acidum est forte, Pulsus magnus, quando vero Acidum depressum est, & Alcali regnare incipit, fit Pulsus parvus. Pulsus magnus fit a Sanguine omnes Arterias dilantante, & hoc est a nimia Turgecentia & Fermentatione, quam Fermentatio ex majori concursu Salium est.

Symptomata illa, vel maiora vel minora, quæ ordinario in Malignis affligunt, sunt multiplicitas, adeo, ut nullum ferè fit Symptoma extraordinarium, quod non subinde in una alterave Maligna Febre observatum fuerit: v. g. *Hydrophobia* in Febribus Malignis observavit SALMUTH *Comment. 2. Hæc. 55.* item SANCHEZ in *Obs. Medicis*. Interdum Malignitas est tanta, ut partes nunc internas nunc externas *Sphæculæ* ac *Gnaginas* crepantes observare liceat: Conf. HILDANUS *L. 3. Obs. 92 & 93.* item SALMUTH *Cras. 1. Hæc. 7.*

Sed quæ frequentius ac ordinatè magis in Febribus Malignis observari Symptomata, sunt 1. *Subitanea Virium prostratio manifesta, angore ferè omniada prostratio*, quæ suspensa est Medico; ita ut etiam longè major in his Febribus esse solet, quam in aliis, & nunc in Principio Febri, nunc vixit tribus ac 4. diebus ante Decubitum, ac imprimis in Beachis ac Cruribus, percipitur talis Virium succedente defectus.

II. *Apparet mox in totum profrastrantur, cæc interdum Nausea & sibilum Ciberum succedit, & quædam aliqual Juiculi, vel tantillum Alimentis ferè Nausea, aut insigni Adstantium persufione* Ægri assument, semper bonum est signum, imprimis, si adhuc saporem percipiunt gentium

(B) Sicut ad exsiccum aridissimum Caput, nutriendum valent Testudines, Canes, Ranæ, Peisana, adeoque ab A. aliis aliis præparata. Si ex tamen referre licet quæ Praxi docuit, Hedica Febri detentis, aliisque tabescentibus, Balneis Aquæ dulcis, Lactis & Ateris in subditiorem mutatis, manifestissimè sublevari. Aerem nostrum Stabilessem, h. e. amantissimum aerem, quæ ab urbe Neapoli ad Minervæ promontorium, nostram Craterem effusam, consueperit Virescentis munitis vicinis, hincmense sublevari, commendat de vi assè Galenus, quæ ab aspe Græciæ Ægritudine munitis. Verum addam de inunctionibus rebus corporis, præsertim Spina dorsæ, ex Oleo & Cucurbituram seminatibus, & Argeali dulcibus expressis: in enim molliori redditus Cui, quæ in Hedica arida & exsiccata est, poterit & Transpirationis & Nutritivis negotium melius peragi, adeoque Morcos remedium fieri.

num, & non dicunt: *sepsis in hunc signum facit*: quod etiam valet si Pocum ordinatum, v. g. Cerevium lupulatum, ferre valeat, nec illam aversetur.

III. *Celer* non tam habet acrimoniem, quam alie Febres Benigne Fermentative seu Puritie, à nempe eadem generem Benignas & Malignas contrarium. Symptomata tamen sunt graviora: raro fortissimè intensus, atque in Febribus Continuis usitate seu Benignis, sentitur Calor, potius *invenitur ardens, exterioribus moderatè calidis*: interdum *Agri* dicunt, *ut in Corpore, & monstrant regionem* Stomachi seu præcordialem. Certe quando agri conqueverunt de nimio Calore interno, & tanta Causa partem interosam, utut externè parum aut mediocriter saltem caleant, pravam Malignitatis, & utplurimum Viscerum inflammationem, tandemque sphacelatorum signum esse solet, ut è Cadaverum seditiosis notum est. Unde facile patet: quare Febres Malignas sine exanthematibus nonnequam periculosæ sint, ac eæ, in quibus talis copiosissime erumpunt?

IV. *Sitis* circa Aërum rationem intensissima est, cum ardore Faucium, Lingua arida, iacta, &c. tantum commoget in Febribus Malignis Sitis, ut communem Febrium conditionem longè superet; & cum sitis in Malignis non solum esse tantus quatuor in Ardentibus, imò interdum adde mitis, ut agri de eo non conqueverunt, nihilominus tamen gravissime urget Sitis, Sitis cum Viribus prostratis, signum est, subesse Malignitatem. agri qui insigniter calescit, & tamen de nulla Siti conqueverunt, similiter Malignitatem adesse monstrant. Hoc an sit periculosum? vid. in *LANGII Method. Cur. p. 38. item in Zephale*. Quid si Pocum resingentem Sicis gratia potestus, non solum nihil prodest, verum etiam nihil Rehydrationem & anxiestatem pariat, & Lingua via abluta, scabra & arida deinde reddatur, inspicendum est de latente Malignitate.

V. *Somnus* brevis potè debilis, & gravis *Agrypnia* Aërum affligunt, eaque nunc sunt anxia, nunc absque anxietate. Hæc ex affectu Nervoso genere & Spiritibus animalibus: illæ ex Stomacho & Præcordiis malè habentibus nequidem ducunt: quibus Deliria & Convulsiones insaluberrime supervenire solet: interdum etiam citius quam Febris fert conditio, Deliria adesse solent, quæ semper innunt Malignitatem, & sic adrept tandem Mors. Rarum est, quod insomnolent observetur agri: quod si corripitur Somnolentia, est *Coma* viget.

VI. *Pulsus* in talibus Febribus, imprimis initio, suspensus Pulsi est similis, aut non multum ab eo discrepare videtur: postmodum tamen subitò debilitatur, fitque parvus, celer, debilis & frequens; subinde, imprimis in Statu talium Febrium, Pulsus est inæqualis; interdum mox ab initio Pulsus formicantè est similis, i. e. minimus & frequentissimus: deinceps etiam subinde in febribus Malignis est Pulsus. In genere, uti in febribus Continuis, quæ plus minus simulant Ardorem Benignam, Pulsus est parvus, celer & debilis, certo colligendum est, Malignitatem subesse, adeo ut, quando nonnihil magis calescit, vel quatuordecim à parvo nonnihil major evadit, semper bonum esse solet.

VII. Præterea agri sunt inquieti sine manifesta causa & anxii, & interdum *felligatio* insignis & major longè, quam satis febris inferit, adesse solet. *Inquietudo* illæ *anxia* non semper toto fit Corpore, sed nonne Brachium unum vel alterum movent, nonne Pedem agitant, ut extra lectum exserunt, nunc integumenta hinc iode trahunt aciesi, quare hoc faciunt. In Febribus Benignis frequentissime etiam sunt anxii & inquieti agri, utplurimum mox in Principio Morbi circa consuetum legitimum, frequentius in Incremento & Statio: Sedit habent in Stomacho, & ibidem angunt agros, atque tunc conquevi solent, si sentiant tantum Cordis angustiam: Interrogati, ubinam esset *ipsa illa angustia*? monstrant feroculumque Cordis, Respirations libera tamen, & non impedita existente: sed tunc vitium hæret in Recrementis variis, aut pituitosis, nunc, idque frequentius, viscerosis, aut biliosis, Stomachi ostentum superius afflicentibus: & si simul à Causa fuit malum, manifeste agri & suspici Vomitus palmarum.

VIII. *Interdum* quidam Medicamentorum paratum fuerit, denud evomunt, & excretoque Conventum nihil. Subinde conqueverunt in illis Anxiestibus: modo vomere possum, dicunt. Hinc simpliciter observari, quibusvisque Vomitorum in primo Malignitatem insulsa deedi, hi omnes Morbi casum, sive salutis sive letalis fuerit, quieti & tranquilli, summa etiam prostratione Virium existente,

Tom. II.

transigerunt, in specie si Contagium haustum fuerit, adeo ut hoc in calu omni in primis illarum auxiliis *primis* naturæ provocari. Anxiestates illæ etiam per Sudores veniunt, tamen Sudores cessantibus redeunt. Nempe hoc in calu non semper copiosa Materia peccans aut Sordium fibræ adest, quæ Stomachum afficiat; sed Effluvia illa Fermentæ fibræ maligna, quæ dum Sudoris modo diffunduntur, primæ viæ ac præcordia liberiora sunt: sed illo suppresso, eadem interiora verius ruunt, & Anxiestates intereunt; non locus licet ac Diarrhoea & suppreffa Diaporesi interdum oriuntur, & contra hæc nulla illa cessare solet.

IX. *Alvus* utplurimum pertinaciter constipatur: id quod ferè melius est, præsertim quando Excretio cutanea expellenda, quam si frequentius sit fluida, quod interdum fieri solet, & tunc Excreta liquida instar Fæcum sunt conspiciunt, utplurimum pessimè olentia; & effluque uno nomine semper Ruas talis Colliquatives.

X. *Urina* utplurimum Sanctorum Urinis similis, ita ut hæc in febre Maligna, qua tali, nullas patitur alterationes, quæ agri interdum intereunt febre Maligna correpti cum Urinis optimis & Sanctorum similis: vid. SCHENCKIUS L. 3. Obs. p. 378. idque tuoc temporis, imprimis quando primaria febris Ardens concurrunt Symptomata. Unde tales Urinæ præsentibus illis pravis Signis, certum Malignitatis indicium præbent. Quid si verò mutatae apparent, id non tam ratione febris ut Malignæ, quam ea Medicamentis aut Alimentis, aut ipso statu Maltæ sanguineæ ante Morbum, id evenit. Interdum Urinæ in statu turbide sunt, sed sunt tenues & crudæ, indeque vel parvo vel nullo Sedimento; simul etiam Color talium diluor est, qui tamen nil boni denotat. Unde Malignis in febribus coctionis & Cruditatis ratio ea Urinarum inspectione non habetur tanta, quanta in Benignis Interdum, RIVERO teste, Urina in Statio concorda apparet, licet ad interitum ruant agri. Interim tamen, etiam pessimè habuerit agri, modo tamen in summa Virium prostratione Urinæ excrementis crassæ, ac sunt turbide, & Sedimento plus minus copiosum, vel candidum, vel laceratum simileve, sed æquale, deposuerit, tamen semper bonum signum, & neminem cum tali Urina intereuntem observari: Quin & Sudores antea impossibiles, aut similes huic Excretionibus cutaneæ, sponte prodire solent. Contra in febre maligna, etiam melioribus Signis præsentibus, Urina tamen cruda & perniciosa, licet crassa & incensè tincta caesente, & ita perdurante, tamen nihilominus intereunt agri, utut etiam in tali clara Urina aliquid quasi Sedimenti flavolentis ferè sit natum videatur; hoc enim Chyli portuicula est, ex Assumptis cum Urina secreta.

XI. *Excreta* hæc Vesciæ & Alvi *secessus* frequentes, hæc gravi fœtore impregnata, Malignitatem pestilentialem interdum denotant.

XII. *Pecus* taliter agrotationis *sepsis* interdum esse terrea, & à statu naturali multum *mutata*, livida interdum aut plumbea.

XIII. *Cervicis* & *Parotidis* nervorum morbidæ seu male affectiones subitò insidue, neque legitimam inter se proportionem obtinentes, Malignitatem denotant.

XIV. *Capitis* Dolor intensus, in specie in Capitis summitate, affligit.

XV. Dum sustinet agri, *Sudoris* odor, imprimis in progressu, est quasi dulcis, qualem odorem spirant Cadavera vel Carnes Animalium, dum putredine incipiunt, uti frequenter observari. Satis notum est, naturalem Sudorem habere saporem salium plus minus urinum. Ego observavi in Muliere Terentia duplicata cum Arthritide vaga laborante, quod acridissimum Sudorem sedavit. Dubio autem, an unquam unum *Agnum* febre maligna periculosè correptum acidus Sodor observari sit?

XVI. *Uterus* non raro adest *differtus* Respiratio, idque specialim in illis Malignis, in quibus Excretio cutanea vel imminet, vel confusa est: hæc enim vel impedita, vel suppressa, Respirations supervenit difficilis, cum dicunt, *respirare ipsi in colla, neque ulla desiderare*. Quæ ferè ad Mortem appropriantibus supervenire solent.

Unde ad indicium Symptomatum variis variis tunc formantur appellationes Febres Malignæ, ut nunc *Febres Putredinales*, à Peterbit vel Maculis hinc inde se manifestantibus & Corporis Cætem tingentibus; nunc, ubi hinc inde erumpunt Tubercula minora rubicunda, *Morbilli*; nunc à Pulsi seu Tuberculis majoribus suppurantibus, ac crustam scitidam reliquentibus, *varicellæ*; nunc ab Ex-

R 2

formalis Venositas, Malignitatis aut Virulentie? (nam hæc tria sunt Synonyma) tam Morborum Malignorum in genere, quam in Specie Malignarum Febrium?

De hac Controversia in Specie 4. primarie præstat opinio.

I. Opinio docet: consistere Malignitatem in Febribus Malignis in singulari quadam Patre ad Corruptiorem Humorem, quæ Humore interiore Putredine quæ afficiatur, & ita totum Corpus putredine quæ reddatur. Verum eo ipso, dum non explicatur, in quo consistat talis Putredo seu Corruptio? aut quid per eandem intelligat? Sententia hæc neminem sapienterem reddit.

II. Opinio est WILLISII Tr. de Febrib. cap. 11. & aliorum quorundam Modernorum, qui volunt, in Febribus Malignis sanguinem dispartit ad Corruptiorem præternaturalem, ita ut hæc inde semi-grumulosus hæreat, sicque circulum naturalem turbet; unde etiam tam etiam superveniunt Symptomata. Quam WILLISII sententiam apprehendit D. JOHANNES DANIEL MAJOR in Tract. de Chelone. Infusoria, & hæc Chirargium fuit Infusorium superfluit. Confer etiam RIOLANUS Tract. Anat. l. 2. c. 27., qui in Febribus Ardentibus Malignis aliquoties vidit sanguinem concretum intra Venas insit Medullæ sambucine; quod etiam observatum à FERNELIO l. 6. Physiol. cap. 7. & SIMON PAULI in Paræphrasi de Febribus Malignis §. 2. Verum, quod raro aut non semper adit talis Sanguinis Coagulatio, non solum per Experimentum resistit asserit SYLVIVS, qui se observasse affirmat, sanguinem Venæsectione aut per Nares evacuatam vis coalescere aut coagulari, quin potius nimis fluidum, liquidum ac tenuem, apparere, & quæ sanguinis fluiditate potius, quam Coagulatione, febres Malignas deducendas esse asserit; sed etiam non inepetere rejecit CAROLUS LA FONT, Med. Doctor in Academiæ Avinionensi in Gallia, Tr. de Venæ Inflammatiæ natura & cura Diff. l. cap. 13., qui potius Naturam corruptam de natura artificiali causam Pessit, hinc & mutatis mutandis, febrium malignarum statuit.

III. Propterea ipse SYLVIVS in Præf. ubi de Febribus Malignis, item de Pessit, Malignitatis cuiusque naturam & Causam materialem in acrimonia nimia, non in litiola seu acrisia, non acida, consistere asserit: vid. Tr. de Luc Venærea §. 130. in Specie autem in febribus malignis peccare acrimoniæ talis volatilis acrisia nimis acris. Acidum nostri Corporis destruentis, atque sanguinem & Lympham dissolvens, & nimis fluidum reddens, atque ejus consistentiam naturalem destruentis; adeo, ne ex deperdita consistentia, ejus Turgescentia & Rarefactio in Corde impediatur, quin & spirituum Animalium generatio imminuatur; unde Hæmorrhagia Sanguinis, Hæmorrhagie, esse Signa Sanguinis nimis fluidi à Sale volatili acrisia dissolvunt: Confer etiam SIMON PAULI l. a., qui talis acrisia in sanguine radicaturum & fundatam statu febrium Malignarum Proximam Causam: Conferunt ex eo, quod Acida curent & præservent à Malignis, & quod Sulphurea in Febribus Malignis profint.

IV. Opinio est eorum Modernorum, qui Malignitatem febrium consistere volunt in Putredine, seu, uti vocant, Putredine ad Corruptiorem animata; cujus sententia Patronus est imprimis KIRCHERUS Tract. de Venæ Inflammatiæ Pessit, aliis elegantissimæ. Coassentit eidem LANGIUS in Præfatione hujus Scripæ & Diffinitione de Malignis, uti & AUGUSTUS HUPTMANNUS Tract. de vena Mortis imagine, item in Epistola de hac materia ad Petrum Johannem Fabrum Scripæ, & Tract. de Thermis Wolfenbüttelensibus. Vult nempe hi, in omnibus Febribus Malignis & Ulceribus Gangrenosis talem adesse putredinem sanguinis, ut eisdem copiosissimi & minutissimi generentur Vermiculi, qui ubique iturientes & Corpus laniantes tam varia inducant Symptomata, necesse est. Nec deest Experimenta: in Variis sanè minutissimis Vermiculis refert BORELLUS in suis Observatiolibus per Microscopium factis: Sic PETRUS à CASTRO in Pelle Neapolitana Buboones Vermiculis itantes, & Emphigæstra Buboibus applicata Vermiculis innumerabilibus repleta fuisse observavit: Sanè KIRCHERUS non solum in Epistola Pessit, sed etiam in Arte Magnæ lucis & umbra l. 11. Part. 2. Præfatus, 2. innumeratos Vermiculos minutissimos in quavis Febre putrescente, in Plantis putridis, Aceto, Lacte, Cadaveribus, Lignis, Fructibus, necnon in Sanguine Putrescente, in Cerebro Hominis, aliisque ejus partibus ac Putredine ortos per Microscopium observavit: vid. etiam Mandat. salubre. KIRCHERI lib. de Venæ pag. 107. Quinimò & HAUPTMANNUS per Microscopium in Spheculo ex Luc Venæ abortu observavit quam plurimos Vermes ad instar Limacum, Germ. Wie Schnecken, sed minutissimos, qui Carnem, non solum sicut Vermes Calorem, mori-

cantes erodissent ac consumpsissent, & unusquisque Vermiculus charum impositus brevi spatio 50. alios extra corpus rejecerit. In Pelle invisibilis, quæ totum Lufitaniam depopulationem reddidit, principio Morbi omnino Vermiculis nigram rotundum copiam per Nares manasse, observavit ZACUTUS LUSITANUS lib. 4. Med. Princ. Hist. 46. Reg. 41. ZAPPEFFUS in Differ. de Morbo Hungar. inquit. Ipse in corpore Diffusa laborantibus per Microscopium aliquoties observavi innumeratos Vermiculos, alios & rubros, alios magnitudinis æquantes, non vagabiles humatis. Item: in Paræphrasi hujus libi Pessit Mamma, quæ laborat Ulcere, multa remedia sed inefficem, fuerunt adhibita: tandem in suspitionem Vermicularum ex Lacte præsertim incidit. Crumorem suffragillum effluantem per Microscopium examinans, tunc aderant innumeri Vermiculi minuti, quales in Calce apparent, postea adhibitis Balsamo Pulvere cum panis Oleo Arsenici, Vermiculis associatis Virus brevi fuit coagulatum. Sic habitum Corporis vermiculorum cum Variolis & Pullulis vidit RHODIUS Crat. 3. Observ. 64. Confer etiam M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 30. pag. 147. & Append. ad hanc Annam, Ann. 2. annu. pag. 13. Ann. 6. & 7. Obs. 111. & Ann. 9. & 10. Obs. 130. pag. 305. Probabile ergo admodum videtur, sanguinem, præsertim maligni Putredinis, admodum vermiculorum coalescere. Sed hanc Opinione, & hinc Malignitatem derivatam, optimè ventilat MARCUS MARCI in suis Tr. Pessit. Præfatio Pessit Part. 4. Tract. l. 2. dum dicit: Annullus oris putredinis ac Vermibus, cum ipse Corruptio non adit, unde Putredo & Vermes? qui ipsi Putredinis præcedunt generari possunt? Idem est, ac si dicat: Vermes nunquam præcedunt Putredinem seu Corruptiorem Sanguinis & Humorum posse generari, adeoque potius effectus esse Corruptiōnis malignæ, quam ejusdem formalem rationem, ut revera. Eger possit corripit Febre maligna & etiam mori, antequam tales superveneant.

Ex his Hypothesibus certi quid determinare in quæstia rerum obscuritate, difficile est. Ut tamen id, quod magis mihi probabile videtur, dicam, arbitror: Febres malignas consistere in acrimonia involatilis, & final volatilis; hæc acrimonia fermentum & spirituosum, adeoque ita in penetram, & tam fluidorum Corpora texturam infigunt immutata, quam solidam fenestramque singulariter irritant, eoque formalem Malignitatis, vel, ut SYDENHAM loquitur Observat. de Morbo acuto Tract. 5. cap. 5., Malignitatem in Epidemici Morbi in partibus calidissimis & spirituosissimis consistere; itur Malignitas ad Putredinem naturam, quorum vis in acrimonia summa, sed minima mole sequitur alitua, coagulat, accendit videtur. SYLVIVS equidem cum Moderata quibetiam in Febribus Malignis Putredinem Sanguinis inchoatam, induratum ab Acrimonia laeviora seu alcalina, destruentis Sulphur Sanguinis vitale, intelligit; unde & ejus Consistentia & Fermentatio vitalis & Spirituosa debita deficit, adeoque ejus Putredo, & hanc Mors necessarii insequatur.

Atque hæc, quibus hanc Sententiam probabilem reddere conatur, sunt varia.

(1.) Quod Vita sit radicata & fundamentaliter consistat in solo sanguine, adeoque febres Malignæ afficiant primariis sanguinem.

(2.) Quod Rudia hæc vitalis, in solo sanguine supposita consistat in Crasi ejus feminali, in qua Vita vel sana vel ægra, vel longa, vel brevis, fundamentaliter deducitur; unde Crasi hæc feminalis in Malignis plura minus destruitur & pervertitur.

(3.) Quod Crasem hujus formalis ratio in Acido plagi, seu Sulphure & Alkali volatili, certa proportione in Massa Sanguinea unitis, consistat, à quibus & Textura seu Mixtio, & Fermentatio, & Spirituascencia ejus dependet; unde in Malignis vel Acidum sulphureum, vel Alkali, vel utranque afficiatur, & depravetur à Malignitate.

(4.) Sulphur Sanguinis, quod Acidum occurrunt gerit, Agentis; Alkali vero Putredine rationem habeat: unde magis in substantia sanguinis sulphurea affecta Malignitate consistit. Sulphur enim in Sanguine aliis vocatur id, quod Veteres Calidum Innatum vocant.

(5.) Afficiatur & alteretur proximè Sulphur tale Sanguinis vitale ac acrisia vel volatilis quodam Alkali, quod & Substantiam ejus dissolvat, & Acidum emvet, & Pingue imbibat; unde in Malignis acrisia volatilis Alkali peccare veridissimum esse.

(6.) Rationem vero istam, quæ Alkali dissolvat Sulphur acidum Concretorum, & quom ordinem sequatur Misti Solutio, esse Putredinem: Consistit nempe hæc in tali minimorum adione mutua, secundum quam Alkali prod-

minatur Acido, & dissolvit intimius Pingue, unde Mili destructio, & Fætor, aliaque subséquuntur effluvia. Patre-
da enim est ab Alkali, Fermentatio vero ab Acido.

Adcoque (7.) concludunt, Malignitatem Febrim con-
sistere in Putredine Sanguinis, inchoata ab Alkali acris vola-
tili, destruantem ejus Sulphur acidum vitale, indeque de-
scende ejus Texturam fermentativam & spirituosam.

Cum vero (8.) naturaliter Aer inspiratus sit universali
vitali turgens, quo conservetur istud acidum in sanguine ob
hoc facile universali coervatur, aut alteratur, aut inquinatur,
disponatur tam facile Corpora ad Morbos Malignos, vel
indecentem Inspiratione in ipsi propagantur.

Sed cum *acidula* potius passivæ se habent, quam activæ,
& ubique *acidum* ductum sequi solent; Nervorum etiam
partium Symptomata, v. g. Deliria, Vigiliæ, &c. in plu-
rimis perquam frequentia, potius ab Acido acris, quam U-
rinofo, videntur oriri; & consuetudo Partium vitalis qua-
rumvis, tam solidarum quam fluidarum, seu Veterum Ca-
ludum nativum, quæ in Malignis in specie oppugnantur, in
Acido volatili (quatenus IACHENII hædicos proba-
bilissimus, dum meliora monstrata novum sunt, hypochri-
stibus insidere placet) potissimum fundata sit, quæ nonni-
si à symbolizante, sed viruloso, & istud quæ subingant, vi-
tari potest acido. Remanet quoque in febribus Malignis,
imò ipsa Pelle usitata, ut Salia volatilia, Camphora,
sammum Alexapharmacum, Myrrha, & alia Resinosa,
quatenus acidum acre pinguedine balsamica temperant &
corrigunt; Animalium partes duræ, ut Coram Cervi, Ebur,
Ucornu, item Terræ medicatæ pingues, sulphure me-
tallico plus minus impregnatæ, hinc plus minus temperan-
do absorbentes, ut Terræ figillatæ, Bolus Armena, quæ
habet sulphura metallica fixa, ut Cinabaris, Antimonium
diaphoreticum, Bernardinum minerale, Joviale, & omnia
Ictericarum, Remedia Solaria, Diaphoretica, &c. quæ speci-
mum acidum volatili temperant & corrigunt, ac plus
minus figunt, deserviunt & absorbent, istudque fixant, &
quasi circumcurant, mediante ludare, una cum parte Cruo-
ris alterata, foras amandant; probabile reddunt, *Acidum a-
cerum volatile seu spirituosum patiri*, Malignum istud in
Febribus consistere, quæm Urinam seu Lichorem: Nam,
uti rectè dicit SYLVIVS, in Antimonium sulphur esse quod-
dam singulare ac mirabile, à quo mirè temperetur quodcum-
que acre, & imprimis figatur quodcumque salis vel acris.
Unde etiam Causus, aliaque hæres Corinæ Febres, tam
vicinæ tali Malignis, ut hæc subinde sub illarum regimi-
ne lateant, & illæ quoque promptissime in hæc degenerent,
quatenus facile fermentum febrium harum benignum seu
mitius, acris & volatili reddi, indeque Malignitatem
veram contrahere potest. Ut eadem Variolas, Pleuritidis
et alia similes manifeste ex acido natas Febris, sæpè ma-
gnas facies assumere possunt, sed si rectè hæc consideremus, mali-
gnitas hæcensis explicata nonnisi illas febres attingit, quæ
ex Contentis Corporis Humanis, Maligno tali fermento
inquinatis, oriuntur, quo mitiores, latem esse videntur,
cùm graviores ex infectis, & maligno afflatis quæ vitiatæ
spiritibus, primario oriri videntur, qui infecti exinde no-
tabiliter immutari, & plus minus fiderari, seu ex parte
morticari, Contenta Corporis, in specie sanguinem, pes-
simè vicantes, Malignarum Februm, & insuper Pestilen-
tialium, ipsique Pellis, fundamentum exiunt.

Nempe afficiuntur in Febribus Malignis, primario qui-
dem *Spiritus & Contenta Corporis*, utur secundario etiam a-
eres malignæ particule generis Nervosi partes quædam, v. g.
Nervicula, plus minus affligere solent.

Pro autem particularum fermentativarum non est di-
fferentia in proprietatibus & qualitate, ipsæ etiam Maligni-
tates quibusdam in Febribus magis *Humoris*, præsertim *San-
guinis*, inquinat, in aliis vero *Spiritus*, magis, inchoatæ
est, quorum prævio inquinamento & Maligni Sanguinem
plus minus afficit. Ut hoc patet, observandum, quod
Symptomata illa, inæz graviora & insolentiora primatum
ducunt nimia, & subitanea *Urim præstans*, tam ex *Ægri*
narratione, quam ex *Ægri* Pellis cognoscenda. Cùm ve-
rò omnis Vis Corporis, Vitiatur robur in Spiritibus li-
tum sit, quæpoterit in Malignaribus Febribus, præter Vi-
rium collapsam tam repentina esse, nisi Malignitas seu
Venenum primò spiritibus occupet, hincque immediatè do-
fluat, & his inquinatis Contenta cetera fluida, speci-
mum sanguinem, inquinat, ejusque Fermentationem, &
spirituosam hanc læda: id quod alterius contenta concu-
rentia Symptomata Februm Malignarum confirmant;
Pellis, nempe frequens, æter, parvus, uti in Febribus
Psychicis observari solet, Corpore adhuc ad Sudorem

disposito, qui deficientem Turgescientiam & Fermentati-
onem sanguinis defectu Spirituum moventium, qui non
sufficienter vibratur in Corde, & nunquam eius confusio-
nem, & in Fermentatione inordinatorem ostendit, unde
potius per Cor fluit, quam ex eodem turgescendo exillit,
Urina in Malignaribus, aut pessimo *Ægri* statu naturali-
bus similes subinde; item Agrypnia ac Delirium, Con-
vulsiones, cum animo fere sedens delecta, in talibus
Febribus citò ac frequenter affligunt, Contagium efflu-
ens & latens in istis non raro in diffusi, quod
salem subtilissimum ac spirituosum partemque temperet
telli, adeo testatur. Confer. hic in spec. VELI HU-
IUS de Uro Linc. pag. 112. & seq. Ac hæc piores Con-
guosiores, & speciatim Pestilentes, ipsique Pellis in spe-
cie, spiritibus inimicæ sunt.

Sunt autem *Spiritus*, Visum fundamentum, duplices:
vel *Vitales*, vel *Animales*, qui tamen multo magis & fon-
dionum circulo mutatis opes libi conferunt, & ad conser-
vationem sui ac totius Corporis intimè concurrunt. Probè
iraque attendendum; utrum in Malignis Febris magis *Spi-
ritus Vitales* cum Malla Sanguinea à Malignitate inchoan-
tur, an verò *Spiritus Animales* & genus Nervosum magis
afficiantur?

Spiritus Vitales, & hinc Malla Sanguineam, primariò af-
fectam esse, perorandum:

1. *Æstus* intensus cum *Pellis* celeri, frequenti, & par-
vo.
2. *Sitis* citata, *Fæces* acide, *Lingua* scabra, nigra
& filis.
3. *Calor* moderatus cum *Pellis* celeri, frequenti, & in-
æquali, mos libi ingressu Pellis apparent.
4. *Anxietas* & inquietudines, propter *Bilem* peror-
antem vel *inquinatam*, quæ in stomacho deli-
ciosis maxime molestias infert.
5. *Colligatio*, speciatim *Burns* Alii Colligativus, ad
insular Putredinem malignarum ex simili *Calo-
re* volatili acerrimo originem dicit. Hoc opprimet
Spiritus Vitales, & cum *Bile* commixtus Malla
Sanguineam attenuat, & plus minus colli-
quescere solet.
6. *Suder* subdulus & nauseosus odoris, qui Putredini
inchoatæ ætates, simili odori Cadaverum ex
inchoata Sanguinis corruptione, ab Acido vola-
tili acris oritur.
7. *Sanguis* nimis fluidus, tenuis & admodum dilutus,
difficilis, aut plæto non coagulans, qualem
SYLVIVS observavit: huc & SIMON
PAULI, qui etiam ex Acrionum volatili derivat
Febres Malignas, in *Paracelsi* de Febribus ma-
gnis, lib. elegantiissimo, pag. 12. & 25. sangui-
nem horrentissimi coloris Vena scita emulsum,
pessimum Morbi Maligni signum asserit: simile
etiam fæcet BRUNO in *foliis*, pag. 9. Veteres
dixerunt: si Sanguis Vena scita non concre-
scit, malum est; insunt enim defectum liberum
ex Putredine. Sufficit Venæ statum talis de-
fectum esse signum inchoatæ Putredinis in San-
guine. Observantur spiritus sine in Febribus Ma-
gnis, quod partes Solide dispositæ fuerint ad
Putrefactionem, teste HILDANO *Cræm.*, 5. Ob-
serv. 91. & 95. PANAROLLO *Præc.* 8. Obser-
v. 48. HORSTIO *Deacr.* 5.
8. Huc etiam pertinet *Stultitiam* Sanguinis per Na-
res, per Uterum, &c. in Febribus Malignis in-
terdum observari; vid. HOECHSTEDTE-
RUS *Deacr.* 5. Cap. 5.

Spiritus verò *Animales*, ac genus Nervosum primariò ma-
gis affectum ostendunt:

1. *Ardo* Capitis citra Frontem continuus, & longè
intensus, qui patet in reliquo Corpore.
2. *Pellis* dura citra Partes quædam membranose in
quædam Corporis regione nobilissimè affectam,
locali frequens, æter, &c. Tales Pellis cum du-
ritie tempore fulgent, esse solent.
3. Si cum Pellis *insolabilis*, h. e. magno, vehementi,
quali, frequens, & in plus minus intensio, tunc
semper *Urim præstans*, aut *Ægri*, aut *Su-
per* animalium defectus loi exat.
4. Si *Urim* patet à situ naturali recedat, aut re-
cedat, quæ Morbi *Ægri* quoque condicio requiratur,
insit, adeoque gestibus *æter* aut *æter*.
5. *Ægri* præstans causa manifesta.
6. *Ægri* præstans causa manifesta.

viscerali subinde elictura, tanquam vesicatorio aut caustico efflatus, deprehenditur: vid. BARTHOLINUS l. 1. n.

Foras & huc pertinet, *fluida, febra, vel plūs mīnis spūalīa sūnt Aegri fuerit, abiq̃ue vaporoso Calere, vel blandi Madoris vesligio.*

Talium, adeoque Malignarum febrium *malignarum*, quas spiritus afflando quasi adeo pessandis, *ratio à priori hauriri imperforabilis* existit, ipsa spirituum natura, & existendi ratione nondum exacte explorata. Sanè Conspectus magis activa ipso spirituosiora, & potentiora in ipsis imprimis agere, præter modo dictas rationes persuadet Imaginatio, quæ nomen spirituum ministerii, peragitur, & tamen efficacissimè Contagiorum receptionem promouet.

Ex hæcūis dictis lucem ferrebat: unde *Alas, & febris sanguinis Ebullitio* nuperius remissis in febre maligna observari, & vix nunquam ad gradum Ardentem asurgere solet, pessimo licet Aegri statu: Unde notata dignissimum est alterum SYDENHAMII *de methodo medendi. pag. 43.* quævis Malignitatem, quæ sanguinem adurit, sine insigniore febris Ebullitione periculosiorem longè esse: aut enim spirituum magis afflendorum, & quæ tyderatorum, quim turbatorum Humorum, est indicium: aut (altem in Humoribus, præsertim sanguine, si fermentativis malignis Miasmatis confusione, & in textura, & motu lotellis eorum inordinationem indicat, & ita Incalescentia quidem, sed internè saltem gliscens, non verò ad exteriora pergens, accidit, unde Natura quasi oppressa non potens est symptomata illa magis regularia exercere, quæ Morbo competunt. Conf. etiam ejus (SYDENHAMII) *observat. de morbis acutis* fol. 5. cap. 5. pag. 382. Sanè in istis Malignis, quæ cum Excretionibus cunctis contingunt, verè græ. Petechialibus, Variolis, Purpura, &c. tantum ubi, ut *Alas*, & sanguinis Ebullitio gravior Morbo sit indicium, ut potius, modò non nimis fuerit, promoveat insolent, & separationem, & excretionem producti illius morboi sub eadē deficiat, eadē hic econtra periculosius se habere solet, in quibus deficit magis Color, & Alutatio Corporis febrilis; unde & passius, & tardius Excretio talis cuncta procedere solet. Equidem in Malignis febribus, quæ ex interna Contentorum degeneratione oriuntur, item in Variolis, Morbillis, &c. Malla Sanguinea magis affici, & hinc etiam febrili acuta sanguinis Effervescencia agitari so-

let: sed in acutioribus Pestilentialibus, Peste ipsa, spiritus lussos imprimis affici, & quasi mortificari, aut necrofi affici videntur.

Causa ergo proxima Febrium Malignarum videretur esse Acidum volatile acre, seu spirituosum, aut malignum, spiritus Corporis nostri Vitales, & Animales cunctos, & plūs minus destruentis. (C)

Causa Malignitatis remotæ, præter sanitatem corporalem, sunt admodum variae: nunc *Externa*, nunc *Interna*, prout nunc epidemicæ, nunc non epidemicæ grassantur. *Externa* sunt, quæ forisfectis accedunt, vel insipita, vel Assumpta: Hæc sunt corrupta putrida inquinata, tam Vegetabilia, quam Animalia ægroantia: Inspirata sunt *Aër*, quæ vel Contagio putrefactivo ab alio Aëro inquinatus; vel Effluviis aliis malignis undecunque exhalantibus est infectus, ut sit in Constitutione epidemica plūs minus pestilentialis; vel Aër ab anni diversis Tempestatibus, imprimis Austro, i. e. calido & humido, ita alteratus, aut Sale ejus universalis balsamico omneium rerum conservativo plūs minus hebetato aut exerrato, Corpora nostra ita disponatur, ut facile, & quasi sponte in Putredines inclinent, & tales semper sunt Epidemicæ; vel denique Aër nimis quietus, aut in loco minus apto conclusus, qui subinde insigne vitium contrahit, ut ralem Aërem inspirantes possimodum quas Veneno assentur. Singulare Exemplum Aëris maligni habet RULANDUS *Tract. de febre hungar. cap. 8. pag. 231.* de febre maligna ex australi aere, ex ventilarum fragmentis, per aliquot annos quæsi. oborta: Sic ex fœtore Paludum, & rerum insularum putrescentium febrium malignarum Pestilentialium paucos ante annos Lugdun. Batavorum coact HELVETIUS in *Disquisitione* pag. 65. Et quæ frequentissimum Febrium Pestilentialium originem rerum talium corruptarum Frædines esse, jam diu observatum est: conf. DU-HAMEL *de afflicto. corporum* pag. 475. ubi, quomodo tales Frædines febres Pestilenciales inducant tractat. Unde, & post magnas hominum strages, & Corporum putrescentiam aut minus debet sepulchrorum putredinales Exhalationes, & in diuturnis Oblationibus aut Caltris non mutatis, ex varia collivie putrescent exhalantes frædi Odores, febres Epidemicas Malignas, quas Pestilenciales fuscitant Febres. Ut nihil hic dicam de Aëris subterranei, antè diu elatis, aperti, de Terra motibus, &c. crebrius Febres Malignas comites trahentibus. (D)

Quoad

(C) Si licet nomen de Febrium Malignarum Causa Hypothosim, post tunc tempore diversas exegitatas, in medicum producere, illud tē veritate non longi ablatere existimaverim: Tunc Benignas excutiri Febres, cum noxas quidem sed simplices Hæmor. b. e. homogeneas cunctis partibus, in Corpore abundas, qui ex æquatione, & cum reliquis communi febrem Effervescentiam excutit; hinc etiam si tenuis, & æquissimi maxime capax, Acutus, si crassus & minimi ad notam prout, Chronicas excutit Febres: quæ in Symptomata cuncta habetur, quæ analogiam cum acuitate vel crassitie Hæmor. pœcatis habebunt; ferocia nemp si d. tenuis, pœcior si d. crasso Hæmore dependant. estis utraque lethalis esse possit, si vel ratione maxima remittitur, vel exadente crassitie, virales functiones habebant.

Verum si Hæmor noxius Febrium faciens heterogeneus sit, & dissimilibus inter se partibus confusus, quævis scilicet quædam crassitie, quædam tenuis, quædam huius, quædam illius figura, adeoque quædam hoc Fermentatiis gradu, quædam illius capax: vel insuper si Hæmor Corporis, Secundariis appellatur, Lymphæ nemp, Salivæ, Sucus Pancreaticus, Biliæ, ac reliquis fermentatiis succi, band similis & sibi respondens crassim nati fuerit; tunc et Fermentatiis sacrum adeo diversum, atque ob æquationem particularem tam diversa indole præditum, unde perverfus quoque cunctis liquorum mixtus circulatori necessarii oritur, Febres sit, quæ propriè Maligna dicenda erit. Etiam si mixta fuerint æquationem ex propriè erit Maligna Febres dicenda, quæ Symptomata incorrespondentia adurit, quæ subile & variabilis. Acutissimi tunc insidiat; sibi nulla contradiotio erit hæc phænomena exponendi ratio, quæ si pœcatus nudi descriptæ Hæmor. noxiorum heterogeneitatem, adeoque variam in variis Corporis organis Fermentatiis, præsertimque per eadem Circulationem. Sic erit reddere rationem possimus, quomodi in Febribus Malignis: Urina cum Lingua non congruat, Lingua cum Sitis: quomodi exteriora frigere possint, interiora ur: quomodi in quibusdam Sanguis ad coagulationem, in aliis ad dissolutionem tendere videtur. non pendere possint tunc Pœcium differentia: cum quædamque omni sit Aegrotans, quædamque placidè quiescat, estque ad interitum curvat: denique ut, atque inter se tam dissimiliter Symptomata, quæ in Malignis Febribus d. Prædictis nantur, una pœta Hæmor. heterogeneitatem, adeoque tota fermentatiis, irregularitatem mixta circulatorii, explicari commode possint. Imo & hinc manifestum est pœt, quæ Maligna Febres: non variè d. Natura quædamque devincunt, aut ter inter se diversis ob Aëris adhibitis; pœcatorum nemp quæ superest. Hæc quidem totum intus concitus sumus, fortasse alibi, si dabitur occasio, uberius enarraturi.

(D) Hæc referendæ videntur Febres illa Malignæ, quæ Næ ab Aëris mutatione pendere existimamus, cum nemp? Canicularibus præsertim diebus, imò per totum Autumnum, iter facientes, atque ex una, est non velle diffisa, regione in aliam, quænam utraque Aëris subreptat gaudet, transietur, Febri, & quidem malignis cunctis Symptomatibus, non sine talibus vitiis discedunt, convalescent. Id quidem familiarissimum est in Italia, & maxime in Tracta Romano, & infra Regio Neapolitana, ut nemo de omni tempore iter quomodi brevis arripere ausu. Per reliquum vero Europæ iter facientes: hæc in cunctis non æquatur, cum singulis anni mensibus indifferenter, & immutis, ex una Cæli in aliam migrant: itam Traquebus quædam plerumque Italia tempore discoloris deridentur; est septembris ipsi, Aëris hinc per Italian, Canicularibus diebus, & Autumni tempore, maxime non negligentes, negligentia pœcatorum nemp capiti discrimini hauri.

Sunt qui Malignarum hæc Febrium Causam non Aëris mutationem esse existimant, sed potius in Vitiis ratione erro-

res:

res : qui enim tunc temporis iter faciunt, ab maximis Solis affluunt exaltatibus, parvi, & sapissimi putrefactum Aquarum, indolentem, fructibus boreis, fortassis immaturis acidisque, se ingurgitant, aqua neminemque ut diutius caloris incommoda lotura, nullam frigus sub diu dormientes, incuti capient : in Cassis Malignarum Febrium fortissimissima. Verum eisi non negem has Cassis sufficere ad Malignas Febres excitandas : si tamen qui exalta Villis ratione in itinere amant, non semper ab huius generis Febribus immunes sunt : praeterquam quid extra Italiam iter facientes, eisi eadem & fortasse magis affluant incommoda, eisi liberalius bibant, eisi ad fructibus non abstinent : Febrium tamen Malignis, ut in Italia, haud facile corriguntur.

Congruentius igitur ad trahendum noxas habitibus, quibus ea anni tempore facies Aer in Italia, & praecipue in Divina Romana, Regique Neapolitana. Ha enim Regiones abundant immaturis mineralibus & semimetallicis, Terra possimam superficem occupantibus, Alumine terreo, Vitruo, Nitro, Mercurio, Ferro, Sulphure, Aere, Bitumine, aliisque, i quibus Solis afflue caliditate particulae effluunt, quae per Aërem volantes hac illuc feruntur, ac sine invoco accenduntur, fermentantibus sapienter nonas facili negotio concipiunt. Nil mirum ergo si Aer his effluviis inquinatus, respiratio huiusmodi, ac prouta cum Sanguine commistis, Febres malignis stipatas Symplicibus inducere potius sit. Quid vel ex eo confirmari posse videtur, quoniam qui per Mare tunc temporis iter faciunt, eisi remotas petant regiones, dummodo ruzia litore distentiam, minimi potest malignis terrestribus effluviis infici atque inquinari. Sic terrestris iter ea tempore ea necessitate aggressi, ceteri sibi consuevit, non solum si accuratè mutatur ex Cassis Mineralibus, Aeris praeteritum maxime alexpharmacis adhibitis & suffragiis arcendum, sed etiam si melius potius tempore, quod interdu iter faciunt : quae enim Solis affluens elevata sunt ea fermentationis alla effluvia, accedente nocte ab agitatione desicere incipiunt, adeoque ad noxam Corpori inferendam minora aqua reddunt. Cavendum tamen est ne solum noxam praeteritum Autumnalem humiditatem, & densa spissaque Nebula, quae maritimo & vespertino tempore solet Aerem inficere, majus pariam damnum, quoniam ipsius Aeris diutius respiratio.

Denique videtur ad rei accedens confirmamentum, quod Aeris ha mutaciones tunc maxima esse definiat, cum post maximam Pluviarum, vitem, Boreales Venti spiraverint : ea enim ratione Aer à morbifici effluviis repurgatur pro respirante immixtus redditur. Utique autem cubilis terrestris repurgatur : nam Pluvia Autumnales solum Aerem majus inficere, nisi Boreales Venti subsequantur, & Aeris & Terrestrium corporum agitationem elabent : si enim post imbres Austri superveniat, nocent ubi ut Aer ab inquinamento repurgetur, quod potius ex aqua pluvia & Austri calore putrefactibus corporibus, praeteritum Ver garibulum, quibus anniveris Telluris superficies ab Rikate coarctata est, abundantius vi moriarum balneum adhibet, cum maxime iter faciuntum periculo. Nec contra Boreales Venti soli ad noxam mutacionis Aeris periculum eliminandum sufficere possunt : uti eisi quanteque Aërem terrentur, illud ab elevatis jam belibus repurgat, si deinde iterum decidant non frigefacti integri Aëre, nova effluvia ex fermentationis erantia, cum eadem iter faciuntum periculo. Aqua hinc saltem esse pura, car quantaque ablutur ea his Cassis Aerem emendandis sufficere, itinera ad Decembrem usque mensis, secuta & immixta non fuisse expens fuerimus : ut anno praeterito 1719. accidisse notavimus. Haud prouta ab re esse iudicavimus, si atque hac occasione, thibitum Medicam Febri salubris ex Aeris mutacione hoc loco subjungam.

Neapoli 23. Julii 1719.

Excellentissimus Comes de Gallas, Cosens Legatione apud Summum Pontificem jam Romae perfunctus, quem Regni Neapolitani Praetor renunciatus esset, invenit celatissim Julio, pulem undique classem, ut Aeris injuriis vitaret, ac corferis equis, hoc tellus est. Fortis quod Villam rationem haud satis sibi cavisse, imò in itinere sudore diffusis corpus non oportum ab inficere, sed potius frigus capasse. Neapoli tamen degen quima usque est valentia, saltem usque ad mediam Junium, quod tempore primam malitiam feb levis Febri illam tenaxit. Haec nate ita evasit, ut & contumide praevire, & à prouta amarissimam nostri Passagii iram invivere quoni gratia valeret. Septuaginta nulle eadem ferice hora ferio Febri accessu, cum Ventriculi & Abdominis anaxietate, quoniam combatantur bilis Ventriculi & Secis, ac die itea Coram atque, cum lvi dextri temporis dolore Aërem evertit. Quantequam autem tertio nocte, & sequenti mane omnia quontia vasa sunt : moribus tamen non solum in Urinis, sed etiam in facie & oculorum albu, incipientis icteri signa apparere coeperunt : Febri autem faciem à prouta exacerbatam fuit, cum Venia perionis sumi celi, sed Bile infici.

In hoc veratissima Medicorum Consilium (ut & Ego interfui) convocatum. Omnino ex fuit sententia : Febrem nemine duplici Teriana, non vera & exquisita, sed rubra, appellandam esse. Uterum primarium Morbum, à quo Febri oritur traheret, non reputandum, sed potius ipsius Febri, quae de Acutum genere erat, symptoma : cupe itaque quid haud à ubi Colicidibi obstruente salubis esset (facit enim Bilis colorem referrebat), sed à prouta Sanguinis, quippe Seris diatibet pendere. Febrem insuper cum inquisivimus, Symptomate, Illud, Bili corrupta & vitiole, namque Causa proxima, iribundum esse credidim fuit : ea enim quomodoque Ventriculom & Intestina coarctantur, Venia & Secis parietibus : ut cum Sanguinis massa permixta, febrem effervescentiam cum furo Urinarum & Coris calore conjunctim excutere potius erat : Morbum itaque alia plenum existimavimus : non rariis Febri, quae acuta quom esse & anxietatibus emittant, Uterum ante septimum manifestari : iam quod Excellentissimi Aegrotantis Corpus haud omnino sanum in hanc Febrem incidisset, sed ea Hypochondriaca afflicto an Scribam verget, quippe quid crura maculis efficeretur, gingiva corrose, & catu universa spantiosa quodam ptyrisa incutentur : Metum quoque multissim cura, ad regendum diffiditissimum quomodoque Remedium, quippe quod peribitaverat. Verum ea ex periculo imminere maximum juicavimus, quoniam Febri & deo illud Hippocratis praescribere videtur : quippe quae ab intemperantia & minus causa, Rema Neapoli scilicet, calidissim temporebus, Aeris mutacione, primem necessitatem desumpta : ab hac enim causa utras Febres utrimque Malignas esse, passim obtravimus. His itaque omnibus pensatis, namque sententia decretum fuit, obtemperandum esse Hippocratis consilio, ut scilicet in Morbi principie aliquid moveretur, ad rescindendum saltem materiam morbificam in primis vitiis laesum, ne majus copia in Sanguinem latravisset, Febrem itaque symptomaticam scilicet majorem redderet, & sera postmodum conferretur medicina, quae per longas moras invalidente morbo pararetur. Exalta deinde itentia expensum fuit, non Emetica purgandum esse Corpus, ac verò Dejectionis medicamentum : Quoniam autem magis invicemum Aëre accedere videbatur ex scilicet sponte Naturae facili, quoniam quarta exacerretur die facili per inferna quon per superiora evacuari posse humores indicatum fuit : & drom quomque jollis esse timor, ne humores furi Emetica agitati, atque effractus redidit, vel laesum visceribus imprimerent, vel in massam Sanguinis intradidit tracuclentem perirent Febrem, communi vote in eam itum est sententiam, ut Dejectionum potius quam Vomitionum exhiberetur medicamentum.

Paratum igitur fuit leve Catharticum, ex unciis tribus Sympis de Cichorio Nle, unciis quatuor Aqua tartarizata à loti. Quoniam autem post medium transillum nulle febri Paroxyssmus, Ventriculi & Viscerum anxietatibus commotus, à tertie haud dissimilis, supervenit, etiam cum Bilis aliqua desettione, non potuit Medicamentum nisi in Febri declinatione exhibi : Vin tamen cibivum vomitu rejectum fuit, sed materia crassa, & tenax simul taclia. Quoniam autem quae evacuandi argueret indicatio,

Quod vixit errata: nulli notus est, quam Patem sequi possum? Item eius Alimentorum nondum putridorum, praeteritum Carnium aliquo Salu comburent. Inhibe etiam islet esse Causa, ut quoniam Febris Maligna: Sic BORELLUS *Crat. a. Oculor. 35.* Febrim Malignam Epidemicam ex est Causa *Refluxum* agitantem obstruat notat. Item Potus Aquarum putridarum, aut illas Præsum herarum ceroporum, aut macta aura afflato- rum, fecundæ matres Morborum, speciatim Febrim Malignarum Epidemicarum, esse solent: Sic EPIPHANIUS FERDINANDUS *Hist. Med. 12.* notat Febrim Malignam lethalem ex est *Purgamentum*: vid. SCHEN- Tom. II.

CKIUS in *Obs.* Item Febris Maligna Petechialem ex est Causa cum Oleribus recentibus subnotat notat SIMON PAULI in sua elegantissima *Annotatione*, *pag. 3.* Et quæ sunt similes alia Causæ Remotæ, quæ malignæ censentur: de quibus vid. KIRCHERUS in *Sermonis Pesti.*

Interim Causa Remota multis videtur dubia, an & quomodo fiant humane Vita posse aliquod Putridi & Maligni & quod fiant in Corpore ipsi? quod tamen nonnulli ex natura Veterum non ite intellexit, originem duxit. Sed qui confiderat varias & febrem inconceptibiles alterationes Humorum in Corpore nostro secundum res Nonnaturales,

cuius, Rhubarbarum ad frangula quatuor, cum granis quindiesim Tarsari viriditatis, in semina pilulari, exhibendum. Quæ cum summo Venarum levamine Excellentissimum Laborum Bile & Mucosa deiecit: an quæ Febris & omnia Symptomata sic sedata sunt, si quæ placidissime summo sequenti nocte quiescent copiosè suavit, ut matutino videretur ferè à Febris emittitur.

Nihil tamen minus post quatuor dies meridiem graviter Febris invadit, quæ tempore equivoce citius, non à longo tempore sumitur, & Bili portio tunc à cuncta, cum aliquibus effluviis humoris fecundissimi: necesse à multis heras & pulsi debilius ex- passim, & Corpus emittit lassum, lassum calorem acquirat. Lapis de Gna aliquo alio fuisse affligens, Post Paroxyismi statum Species Duomargaritæ frigidi exhibita cum Aqua Cardui benedicti, ad Corporis refrigerium.

Remittente sexta die Febris tranquillior fuit habuit Excellentissimum Venarum: Urina, esse frequentius nulli secreta, declaratur observata. Albuginosa effluvia exhibita. Alvi sponte sicuti bilis primis redditibus, sed multo magis permixta: nulla autem appropinquante cruenta deiecit sunt: deiectionibus hæc bland dolor crevit, sed levis hypogastri molestia præibat. Sanguis cruentus nonnullum lotura carum fuit erat, sicuti videretur ruborem, exhibebat, hæc raro granulis infestis, cum mucilagine commixtus crevit. Cruentus huius Alvi fluxus, Bili quæque fecit aliquos interpellat. Quibus per totum mitem, & sequentem diem urgentibus, sensum pulsi debili restitit, & corporis vix: manifeste emittitur: postquam quoniam eadem nocte septima die Paroxyismi, cum prælix in principio passum contrahens, accessit. Ut quæ urgenti Symptomati vix personam occurreremus, Milla pilulari præscripta, ex Traga Amarisferica, Sanguine lepore, Crystallæ mœnans, Gummi Catechu, Xylitæ, simul Alviis magna Mathe, & Extrahit sicuti Hyperici excipit, compescit, per vices affluens.

Bis autem incassum adhibiti, & perseverante adhibendum Alvi fluxus Cruentus non sine maximo Excellentissimi Præregii languore, alii in Consilium vocati Medicina Professoribus, & Febris & Symptomati natura ad examen revocata. Lina præterea habuit, Bili corrupta portione in primis quidem vix contenta, in ipso Merbi principio, partem Naturæ, partem Medicamentum vi dejectum esse: bland tamen fere passus, ut quæ jam in Sanguinem invenerat perniciosa lotum portio, in venenalem naturam non degenerasset, ad Febrim Malignam accendisset: ex quo saltem, ut verulenta causæ vix experta Sanguinis massæ, volatili spiritus erhorat, & volui in omnemodum siccum vergeret. Hinc virium præcipue lassum oritur ducere: Diarrhoeam vix Cruentam, & profusam colligantem, vel hinc hinc Metastasis vix, & Crure & sinualem manebat: vel quod ex universi Sanguinis labeili fuisse, rubicundia ejus parte cum aqua sicuti permixta in Insensum rubum dilaberetur, arri. Quapropter quoniam igitur adhibita Remedia vix atque irrita esse expressit offensa: quoniam malum majores vires foveret, semper manifestum fere prodere, quæ à principio suspicari fuimus, Malignam, id consilii epum, in Frigida iusta die exhibenda tentaretur. Huius generis Remediorum in argumentum necessarium existimatum fuit: tum ut & Febris calore, & ut copiosius vix: nationibus, exsiccationem reddidit Corpus aliquatenus humectaretur: tum ut effusus Bili, à qua universa Merbi catastrophe, metu conpesceret, tum etiam ut fluidi frigidi quæ liquoris alione, venenalem colligantem Sanguinis vix dissepere, quod fere passus resunderet, atque ad perniciosa Diarrhoea, & extreme virium detrimentum, sicuti præfessionem audivit opus pisset, Incutire igitur ad vesperum die, singulis hinc Frigida exhiberi cepit, sed vix ad unius olei, quoniam majorem copiam non ferret Aegrotanti Ventriculo: nihil tamen minus, est Alvi Sero, Bile vel pallida vel fusca commixtionem, redare pergeret, bland tamen cruenta amplius deiecit. Hinc Corpus minus debet, passusque aliter vix: que observati, ac vix ita exordium.

Quoniam autem in hoc accipere vix itam non leve inter Demositas, Medicis quæ vix fuit de Frigida administrandi morbo contentione, (id enim acci: per Principibus agentibus sole, ut Aulæ tabulis in Medicum translati, malo illorum fari diffusis & studiis curarum foveant) recedendum ordinari Professoribus, namque negotium in committit fuit, quibus soli hoc Medicamentum genus adhibendi, privatum sui reservationem esse, tunc credidit erant. Nec tamen in inter se concurre: quippe quod & Ova servilia Aegrotanti ab uno exhibita, altero remittente. Ita, quod majus fuit, quoniam vix: aliter disti, enim temporis quoniam expiraretur, nona die Paroxyismi ingrueret, hoc ingre, iterum atque iterum aqua propinqua. Hinc vix: extempore vix: maxime Corporis lassando, exilates & obscuras passum, universi reper, non sine enigma quodam suavitatis atque levi mentis aberratione.

Iterum itaque accessit qui jam recesserat Professor, quoniam animaverterem, ex Urina portione & saturatiori calore, Aquam exhibuit minime in Sanguinem vix fere passus, atque præcipue fuit, vix in illo latere diluendi & emittendi, sed frustrati, ab eo prælix, quoniam vix: abstinendum, atque ad Analeptica, & Cordica consuegendum esse. consuevit. Et quoniam cognoscit (in Febris, quæ tamen Maligna, sub Tertiana tamen lotura fuit macta), in fere Gracorum Triplex præfessionem de Cortice Peruviano, aliqua variare, vel sub forma Infusit intervallo propinquare, vel Chylis in iuciendo: nihilominus nescio qua Auri Tinctura, de qua mira prædicabantur, ter exhibita, quæ lecta suavitatem, non sine gravi supposito Laboranti excutere, nulla sequens levamine, curavit.

Denique quoniam ad vesperum eadem die, vix, qui minime expellabatur, in vix: Paroxyismi, extreme stipata: virium languore, Corporis repositum, diffusibile sperandi, atque suppositum cum passum deiecit: omnia in præcipue re, atque ad incutendum iterum tendere, manifeste vix fuit. Et jam vix jam sequenti diei (15. Julii) Sele, Excellentissima Præcepta maxima animi essentia & vix excessu, non sine fuisse omnium huius Urbis & Regni Ordinum dula, & legum molestia.

Difficile eadem die Cadaver vix exiguum solidiorum partium habuit exhibita: Ventriculo atque in effluvia ex: fere in levi robore perfundebatur, intrinseca fana. Quæ pars Calen poligona, atque variorum vena: ostendebat, levi infusante apertum, nil nisi Pituitam instillatam, cruento dolore infestam, vix: vix: vix: Lien atque Hepar ab omni labe immunda: Cystis tamen fellea parum, sed facientem & artem omnino Bilem continens. Pulmonem huius vel nigricantem, vel eigeferentibus maculis confectum. Cerebrum, Cor, Renes, Vesica atque reliqua integritate fana. Bassum conditum Corpus lignis populi publici expellum: postquam fuit pemp ad sepulchrum elatum: deum optimi Præregii memoria magnifice parentatum est.

les, præsertim varia Absumpta; & Præternaturales, in specie in primis viis, ubi naturaliter Fœces segregatæ putredinem, & inde certum fœtorem contrahunt, & multiplices mæscelæ, & per Medicamenta quoque factas eorum mutationes, & exinde mirabiles texturas, ac hinc proprietates novas, ac planè singulares lipores oritur: itemque qui perpendit, quid in vivente Corpore Gangræne, Sphacelique sunt; in non dubitabit etiam, quin tam in Sanguine, quam in Solidis partibus Putredo, adeoque ut Ardentis graviores, ita & Malignæ miores, in Corpore, in specie ex propriis viis, suscitari possint. Nam & ita Homini Morbus venenosus non absque ratione quibuldam putatur. Sic verb. grat. Succus Pancreaticus & Felleus naturaliter constituit certum temperatum Succum confluunt, quorum alteratio, præsertim Pancreatico acriori aut acidiore existente, *Bilis emulsa* dicta, plûs minus hostilis, prout acrior seu mitior eadem fuerit, & ob pessima Symptomata, quæ interdum inferre solet, plûs minus Maligna oritur. Probat hoc ipsum quoque convenientia Febreis Ardentis acutioris cum Febre Maligna: Nam intensior Ardens, item que ab Iracundia excitantur Febres Acutæ, emque ex Bile vel nimis oleosa nate, acide volatili constanter, proximè subinde accedunt ad Malignas; aut saltem iisdem ac similibus sublevantur Remedia. Unde qui vitæ tenacioris, qui abundant Acidis, ut Melancholici, Scabiosi, &c. non adeo periculose corripit solent Malignis Febrilibus, propter Acidum potentius, Acidum volatile acere figent. Sed tales saltem sunt Privati. Nam que ab ætri communicatur Malignitas, aut à Contagio, aut epidemica quondam *Arde & Alimentorum alteratione*, nobis indicantur, adeoque in plures simul & epidemicè observantur gassari, plûs in recessu habere videntur.

Cavenda autem in genere febilibus Contagii seu Fermentis malignis, seu *Causa* Febreis Malignæ, confusio cum *Alterationibus Sanguinis aliorumque Humorum instabilitatibus*, in Malignis Febrilibus obvis, seu Productis morborum, ut plurimum *Sanguinem infusum*, prævia alteratione & affectione in Contagio seu Fermento maligno indulus: hinc enim *hoc sanguinis Coagulatio* à WILLISIO asserta, nec easdem omnia *Dissoluta*, quam SYLVIVS urget ad rationem Malignitatis formalem explicandam intersunt; dum hæc alterationes formalem morbo mediata, non levis ac *Humoris & Carbaculi*, putantur fuisse, v. g. in *Ægro Varioli* aut *Mercurii* correpto, & per totum Corpus iisdem incurritur, non putandum est, extinctis in Corpore tales sordes, quæ Febrim induxerint, & postmodum sub Cute depositæ Variolarum Pustulas & Saniem constituant; siquidem sanissimum subinde ex improvisi iisdem copiosissimum obducitur; sed à Fermento seu Miasmate maligno, interdum sub forma *Oculi contagiosi* hausto, Spiritus inquinante, & horum medio Humores afficiente, generantur illa in Corpore, donec unâ cum multiplicato Fermento contagioso, sed illorum Humorum, licet alteratorum, medio temperato & correcto, secerantur, & circa Glandulas intercutaneas desigantur. Qui igitur novit leve Fermentum moderare, subegre cibis, & dum adhuc in herba delitescit, ita etiam feliciter uberiori Exanthematum preventum potest præcavere. Par ratio *Potachium, Purpura, Rubrum & Anthraxum* esse videtur: sunt horum colores rubri, lividi, nigri, non quidem à maligno Fermento plûs minus caustico seu urinoso præcisè, sed à maiore vel minore mortificatione & necrosi Humorum vel Partium solidarum, quo Spirituum extinctionem, cuiusqueque etiam natus Miasma malignum fuerit.

DIAGNOSIS.

Quando aliquis incipit laborare Febre Maligna, Horor levis ac tardus præcedit, quem calor mox subsequitur, qui in Maligna, qua tali, tepidus est parvus vel nullus, adeo, ut de eo vitæ conquiritur solent: Ægri subitè verò *Virgæ* ingruit præstans instans: interdum oriuntur Deliria, Jugitationes ac inquietudines Corporis, Maculæ subinde ac Vesiculæ coloris & magnitudinis variæ in Corpore efflorescunt: Imò nulla sunt Symptomata Febrilis letæmia, quam non in hac vel in illa Febre Maligna observentur: adeo, ut etiam *Hydrophobia* in Febre Maligna observata fuerit: Exemplum refert SALMUTH *Crit. s. N. 52*, quin & SANQUEZ in *Observat. Med. s. lib. 52* similiter refert Exemplum Hydrophobia in Febre Maligna observatæ. Subinde Malignitas est tanta, ut patres nunc internas nunc externas *Sphacelæ ac Gangræna*

corruptas observare liceat: id quod interdum in Variola malignis contingere solet: (dico in malignis; non enim semper & omnes Variolæ sunt malignæ); SALMUTH post Variolam non redit expulsa observavit Gangrænam *Pænet. s. Observ. 70*.

Non autem una eademque Malignitas in quibusvis Morbis Malignis vel Venenosis est ratio ac conditio, tam Subjecti patiens, quam Symptomaticum hinc eorumque varietate; sed speculatio ratio in singulis Morborum Malignorum Causis distincta est. Alia enim est *Dysenteria Maligna*, alia Febrium Prechidialis, alia Febrium Malignarum sive Petechialis, alia Morbillorum aut Variolarum, alia Pellis, alia Purpura Purpuræ, alia in Catarrhis Epidemici, alia Morbus Canis rabidi, alia Luis Venereæ, alia Scabiei ferine, alia in Scroto ad gradum malignitatis devehit; adeo, ut de *Malig. ferri* vix possit iudicium, quin singulare quid subtile videatur. Sanè etiam non levis inter ipsam Malignitatem est Differentia, dum Febres Malignas quondam *sunt Ardentiores*, ob id *Phlogisticatae* dicite, quarta vel septima die ad summum incrementum; quædam contra *minùs Ardentæ*, ut quæ ad decimum quartum, interdum etiam vigesimum, extenduntur: cuius Differentiæ ratio partim est in *Causa agentis* maiore vel minore activitate, vel in *Subjecti patientis* apta vel inepta susceptibilitate; prout enim utrumque magis vel minus dispositum, eo acutior quoque & malignior existit Febrix. Hinc ob eorum rationem fere, ut Febres Malignas tales nunc Miliæres, nunc Virgæ, nunc Pauperes, nunc Divites, nunc Juvenes, nunc Adules, nunc Infantes, &c. solum affligant.

Ratione Symptomatum adiutorum, in specie in Ectectis, magna est Febrium Malignarum varietas, dum quondam cum certis & insignibus Cutis Efflorescentiis, quondam sine his, vel paucis admodum, quondam aliis Symptomatis stipata est.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: audita Febre Maligna pavescit Medicus, contremiscit: Ægri: siquidem omnes Febres Malignæ per se sunt *molestæ & fœpissimæ* omnia *et periculosa*; & quod periculosa cum Vivum imbecillitate concurrant Symptomata, eo magis portendunt periculum. In genere tamen omnium Prædicorum est consensus, Prognosis Malignarum esse incertam, & quantum sit prædictum in Prognosi requirere Modicum; cum mox & insperatè nunc ad Vitam, nunc ad Mortem terminantur: Nempe verissimum est, quod dicit HIPPOCRATES: *In Acuto sunt incerta Prædictiones vite & mortis*. Unde & GALENUS Malignas Febres *saeva ad iudicandum non habere tempora*, asserit; plurimi enim subito cum periculosissimis evadunt ignis; alii subito cum febribus à melius astantur.

Pulsus, quo magis magnus & æqualis est, & consuetum eundemque ritum servat, eo est melior.

Inordinatus verb, inæqualis, debilis, seu quasi retrocedens, periculosa est, in specie in Principio Morbi; quo maior etiam est Pulsus, eo melius, quo minor, eo deterius.

Si celer & parvus pulsus, aut formicans contigerit, admodum pravam omem est, ex quo vix emergunt Ægri. Nihilominus tamen Pulsus parvi non sunt tam mali omnes in Febribus Malignis, quam in Benignis.

Si etiam Pulsus inermis aut deficiens in Febre Ardenre Benigna ordinariè est periculosissimus: Interdum tamen in Malignis, cæteris paribus, non adeo malum, sicut dicit RIVIERUS, qui observavit in Juvene Pulsum intermittente quidem per multos dies, Morbo tamen tandem desinente. Nec Pulsus parvus, rarus, ac debilis, fed etiam similis sano cum aliis pravis signis portendit malignum Morbum.

Uterius Malignas Febres habent utplurimum *Agrypnias & Deliria* comites.

Delirium licet à Somno, vel spontaneo, vel per Medicamentum excitato, compellatur, non est metuendum, imprimis contumelium simul cum *capitis Sudore*: post Somnum autem tempeverans Delirium, admodum periculose est: iunxit enim Convulsiones, aut Mortem Ægri.

Variæ Colores ante Oculos apparentes, ac Objecta peregrini colore vestita, Convulsiones, Deliria, &c. Immo. Vixit Ægri Maligna Febre correptum, licet alia benè se haberet; dicebat: me indutum esse palli & veste cerulea; imò omnis niger color coruleus illi videbatur: Si-gnum hoc aderat mane, à meridie subsequēbantur Deliria

zium & Convulsiones, & tandem interibat.

Sarditas seu potius *Oxaliditas* in Morborum Acutorum principio periculosissima; in statu autem apparet salu-tem portendit, præcipue in Malignis. Et multos observa- vimus, dicit RIVIERUS, quibus in his Febribus in sta- tu supervenit Sarditas, aliis licet periculis cum Sym- ptomatibus, omnes tamen evaserunt. Nam interdum Do- lorum solvitur, interdum Grævis per Hæmorrhagiam Narium futuræ est indicium. *Quare autem Sarditas in statu salutaris sit?* modum determinatum est; forsitan ad Paracides Glandulas decubum quali quendam criticam, & successivam hinc diffusionem materiei peccantis innuit; siquidem & *Paracides Tumores* in Febribus Malignis & Pur- puratur lethales in augmento & statu Morbi; si vñb tantu- lum declinante Morbo apparent, salutares.

Urina in Febribus Malignis sanorum fuit similis, vel etiam perturbata & errata, tales permanentes malæ. Multi, *Cathus signis* in Urina apparentibus, sed demum recrudescerebus, sublatis sunt & medio. Urina tamen co-cta, laudabile habens Encephala, per aliquot dies conti- nuant, et in Sedimento fecum aliens, salutem certam perpetuè pollicetur.

Rarum est, quod cruda Urina Metallum materiei pec- cantis seu Producti morbi in Morbis Malignis felici e- ventu insinuet: Vid. BARTHOLINI *Alia Medica His- toria*, Vol. 4. p. 156.

Quo magis à statu naturali declinat, in specie si fuerit, eo majus periculum subest: item Urina pinguis & oleagi- nosa, nigra aut livescens, cum Sedimento vel livescens vel nigro, nisi hoc sit ex Medicamentorum usu, certum exitum portendit.

Narium Algiditas semper malum signum est, præsertim si cum Agrypnia sine manifestâ causâ, ardore Capitis, aut continuo magis aut intensius albis, sit conjuncta; præsertim si præ reliquis Corporis partibus Facies exalido rubore tin- gatur, raro tales evadunt: nempe Spina peculiaris (Fermen- tum malignum) Capiti quodam in loco aut eus membrano- sis partibus infixa est, cujus occasione hæc Symptoma ex- citatur. Hinc *Hystricia* Brachia aut Cruribus admoda, item *Raniarum* lectio, aut *Hirudinum* postea Antea appli- catio, subinde necessaria est.

Abi Fluxus quoquecumque tempore Febribus Malignis su- pervenientes pessimi sunt; & quo magis fuerint Excre- menta, & Fluxus sit colligativus, eo major Malignitas, & gravius periculum addit: in specie, si in Febr. Mali- gna post Excretionem cutaneam obveniat Diarrhœa, sum- mum periculum est, cum retrocedat Malignitas, & Mûlus Sagguine Fermentatio peccatis conturbetur; hinc eadem semper ferit lethalis exitus. Hinc quoque Sanguinis dejectiones quoquecumque in Febribus Malignis, siue Agri- gant siue deiciant cruenta, semper sunt admodum pericu- losæ; imò omnes lethales eas esse, pronunciat HOECH- STEDTERUS *De r. c. 6. 2.*

Graveolentiam Serâ ac Cruoris, licet raram, certam mortem denotat, observavit SCHENCKIUS in *Obser.* pag. 418. ex FORBISTO; utat aliquomodo contrarium Ex- emplum habet PAULI *l. a. cap. 1. p. 13.*

Si in *vola Manus* Agri percipiuntur *tenues, instillantes, & subulsi* Triduum; item si circa *Carpum*, dum Pul- tum tentat Medicus, *Tandem*, etiam quietis Dignitas, mo- veri aut subulsi videntur, signum sunt, certò imminere Convulsiones.

Meficus non venatio, aut *stercoris* collectio in Malignis fore semper *lethalis*. Rarissime tales evadunt, utat non semper desperandum: quæ exemplum vid. in M. A. N. C. *Ann. 3. Off. 169. p. 414.*

Tempus evanescis quod attinet: Acuti sunt Morbi Febres Malignæ, quæ tamen in nostro climas à septimo usque ad decimum quartum ferè suos terminos habent. Quod *Modum evanescis*: ferè modo quali eritico judicantur, nempe per Sudores: Quo pertinent Excretiones Cutaneæ, Pu- tularum peccatissimæ, &c. nunc per Metallum Producti nempe morbi, à Fermento quidem maligno geniti, ip- sum tamen Fermentum cicuratum & correctum in se con- stituentia, ad loca glandulosa transmissi, unde *Bubones, An- throci, &c.* originem habent.

Interdum Bubones circa Genitalia apparent, quibus die undecima erumpuntur omnia Symptomata levantur, & Febris evanescit; sit enim hæc Tumoris eruptio per Mo- tussam, seu translationem.

Hæc de Prognosi Febrium Malignarum: Pergo ad

C U R A M.

Quæ est duplex: *Præservativa & Curativa.*

Præservativa in Febribus Malignis & Epidemicis opti- me præstant Acida blandia, ut Acetum, in specie Acetum destillatum, Bezoardica & Alexipharmaca infusio Simplicium Alexipharmacorum, Radicis Angelicæ, &c. præ- rata: quibus si addatur Camphora, melior succedit; item Citrus ipsique fucus; item haustus largior Vini; de quibus quædam mane ante egressum & domo haustulus fum- pus egregie præservat, in specie si cum tantillo Camphoræ fuerit junctus: item Essentia Citri, Zedairum, &c.; hinc, quando Medici Agros, in Febribus Malignis vili- tant, in ore Zedairum gessant.

Præmissis ergo interdum Vomitorio, detur Tinctura Bezoardica, & hinc:

24. *Confero. Pulpa Citri 3i.*
Ellis. Diaphor. Frasef. 3ii.
Theriac. Androm. 3ij.
Flor. Sulphuris 3ib.
Antimoni diaphor. 3i.
Cisti Arab. veri 3b.
Spiritus Risor. 3b.
Syrup. Rubi Mei q. l.
M. l. Ellæbæarum. 3.
Electuarium Præservans.
Vel

26. *Confero. Flor. Anthos.*
Pulpa Citri.
Sardis ana 3ij.
Theriac 3ib.
Antimoni diaphor. 3iii.
Terra sigillat.
Cornu Cervi sine igne ana 3ij.
Bezoard. mineral. 3b.
Camph. 3b.

Cum l. q. *Syrup. Rubi Mei l. Ellæbæarum, interadum*
cum Oleo *Pessidentis* *Heinrichi.*

D. 5.
Electuarium Pessidentis Præservans.
Vel

28. *Aqua Cardui bened.*
Flor. Sambuci ana 3ib.
Cinam. 3b.
Actis. Mal 3v.
Ellis. Diaphor. Frasef. vel Theriac. Andr. 3ij.
Antimoni diaphor. 3i.
Bezoard. mineral. 3b.
Syrup. Card. bened.
Rubi Mei ana 3b.
M. D. 5.

Mixtura Præservans, cochlearim sumenda.
Item

29. *Confero. Pulp. Citri 3i.*
Theriac. 3ii.
Terra sigillat.
Cornu Cervi sine igne.
Antimoni diaphor. an. 3ij.
Cum l. q. *Sassari* in *Aqua Sardis* solut. l. *Morsilli*, in-
teradendi, tempore usui, aliquot guttulis Olei *Pessidentis*.
l. Heinrichi.

Morsilli Præservantes.

In metu Febris Ardentis Malignæ ex nimia Ira, hinc
forti Motione & Pœtu

30. *Elix. sine igne gr. xv.*
Spirif. Cephal. 3b.
Camph. gr. ij.
M. l. Pulvis 3.
Pulvis Præservans.
Vesperis sumatur.

Cura Febrium Continuarum Malignarum, quæ talis
1. Per Medicamenta talia instituenda est, quæ per
convenientes vias, speciatim *Endorem*, quem
Natura monstrat, non blandum, nunc copio-
sum, Febreis Malignæ Causam & Fomitum
Morbi, siue Malignitatem aut Venenositatem,
sive sit Sal acre potestativum, siue Miasma ali-
quid, mare & quantocius expellant & corri-
gant, *Bezoardica* aut *Alexipharmaca* aliis vocata,
circa quæ consulenda imprimis Experientia; pro
diversitate enim Febrium Malignarum diversæ
etiam Remedia Alexipharmaca plûs minus uti-
lia observata fuerunt.

2. Sunt talia, quæ Spiritus & Humores corporales, ne tam facile a Fermento maligno alterentur, sed hoc potius subigant quæant.
3. Symptomata, tam ratione violentie malignæ, quam ratione Febris Contentionis plura minus Ardentis, argueria malignanda.

Nam quoad Primum Indicationem: modò vel Acere acidum volatile malignum in Humores coarctum, vel Odor aut fræda venæ ipsa in Spiritibus susceperit, alterata & extincta foret, quod superest, facili ab hoste liberata Natura implet, dum spontaneo ductu in Malignis per Excretionem cutaneas, Bubonum, Anthracum, Pullularum, Macularum, &c. Venæ, coarctum prius, & vehiculo ierosi humores involutum, optime excludit.

Quoad Secundam Indicationem: modò Spiritus & Humores in sua naturali crasi & constitutione coarctentur, live præterea per Remedia ipsi sociabilia, Fermento autem maligno hostilia, tanquam quodam Balamo coarctantur, quo symbolizatio aut convenientia eorum cum aliorum Hominum Sanguine & Spiritibus hoc modò plus minus immutetur, & ita tam facili Fermenti maligni, præteritum epidemici aut contagiosi, susceperit impediatur, aut susceperit licet, confermentatio cum illdem, mutaque eorum alterati ita præcaveatur (in quo optima consistit Præservatio), quæ potius ita dispositi Spiritus & Humores vincere illud queant, h. e. corrigere & temperare, & hinc excludere, in quo Curationis veritas ratio; res omnia de facili impediatur. Nempe, ut testè PARACELSUS Tom. 3. Operum Fragmento de Peste hoc verum regimè præservativum aliter: *die vortum attraktivum bilden, das nichts ein laßt gehen*: hoc est, ne interpretor, ita alterari Corpus ejusque Contenta, ut in seipsa fiat ad Venæ aut Contagii susceptionem. Conferatur idem PARACELSUS de Peste lib. 1. cap. 3.

Hic modis nempe vel Fermentum malignum corrigende, vel balsamica vel mucinosa nostram spiritalem conditionem, operari videntur Remedia Alexipharmica, eoque per sui varietate pasci saltem alterant, sunt æmol utroque modo. Rem Exemplis quibusdam illustrabo. Præ cæteris decantata sunt Sulphurea, v. g. ex Aristoteli Regis Sulphur commune, cujus usu HIPPOCRATES ipse Pestem istam famosam Græciæ abegit, & Sulphur esse pro Aeris emendatione & pro Pocius medicatione perquam laudatum existit, non siccis se ejusdem in substantia usus, Sane Sulphur seu Odor Sulphuris uti quavis corruptionis & alterationis, ipsamque, HELMONTIUS testè, Sanguinis potestudinem alterationem præcaveat; ita simul odorem & frædentes malignis, contagiosis, pestilentibus, ignis insular tollit & extinguit Concreta Antimonialia sulphurea, debito & appropriato veneno suo maligno halitu per Ignis & Nitri vim exhausta, in Febribus Malignis saturantur quasi densis, dum absorbent similem malignum & venenosum Halatum seu Fermentum Febris Malignæ Antidotum. Terra piusque remperando & absorbendo Fermentum malignum acre, & illud ita corrigendo sic castrum. Campore peccatissimum substantia & odor effluissimus, ut pulvis insular eodis Corpus nostrum, etiam mortuum, & aere spirituosum quodvis temperat, & ita simul odorem malignum & pestilentem sui miscela alterat & enervat. Aqua sulphur, aut horum loco sunt Vegetabilium acidi, præsertim Citri; item Clysti mineralis sulphurati, penetrando & permiscendo sic uniendo, certo modo alterant Contenta Corporis, & hincem per suo modo testatur ita conciliant, quo modo tam Præservatio inferiorum, idque eo magis, si Alexipharmacia aromatica insula balsamica vim majorem acquirunt, quam per vehiculo plurius Remediis, præsertim Aromaticorum calidiorum, optime conducunt; quo etiam Pina grossæla acida pertinet ad animalium partes duræ, Cornu Cervillum, Ungula Aleis, Lapis Bezoar, Calculus humanus, &c. absorbent non solum Acidum, paribus Animalium hostile malignum & acre, sed simul & potissimum salia eorumdem volatilia & spiritus, crasi Sanguinis conservando, & per Diaphoræm ac Diuresin depurando, & ita suscepto maligno evacuando, simul conducunt; unde KERGERUS Tract. de Ferment. lib. 3. c. 3. pag. 350. Præcipitativa Alexipharmacia nescire conquevit. Alexipharmacia cætera Aromatica, Amaricantia, &c., v. g., Zedoaria, Baccæ Hedore, Juniperi, Lauri, Radix Angelicæ, Gentianæ, Myrris, Crocus, &c. eoque his & similibus concinatas Compositiones theriacales, per opium imprimis animatas, quod attinet, præteritum insuliferum modo laudatum, dum Aëum Corporis sui

ut, mediantes sui constitutione refinosa & oleosa intendunt, hoc ipso Sanguinis balsamicum vim, & spiritum vigorem ac robur conservare, impetum vero eorum una decumque intentionem solum facientia Opia debent refragare, ac contra malignum Virus ita deinde, & hinc, Acido præteritum cum vehiculo usurpata. Sed hæc in genere de Alexipharmacia delibata sufficiat.

Alexipharmacia hæc, ut supra dictis Indicationibus rite applicetur, obviarent sequentes Cautela.

1. Similitudo in primo Principio Februm Malignarum, idque eo magis, quo magis sunt Malignæ, & quidem tunc temporis, quando à causa Epidemica casura, adeoque à Contagio extrinsecus hausto, Stomachum imprimis inquinant & inficent, oriuntur, præ cæteris omnibus maxime conducunt, ut peccante libéra evacuetur, & Contagio sublati, Stomachus non affigatur à Morbo, & multa Symptomata maturè præcaveantur; sicut eadem etiam in Pestilentiali Constitutione ordinari solent. Urgent enim anxietas Præcordiorum, ingens dolor stomachi, nausea, conatus vomendi, & similia circa Præcordia molesta Symptomata, quæ stomachum & primas vias à susceperit Contagio afflicta innotant. Pariter conveniunt eadem Vomitoria, si ex privata Contentione vitio Febris Malignæ nata fuerit. Imprimis in Febre Maligna, de Morbo Hungarico, seu de Morbo Gallicensi participantem, in principio provocatus Vomitus (sepius illi salutaris: vid. R. U. LANDUS Tract. de Morbo Hungarico. Sed tempus obvenit, ut maturè fiat, necpe in principio, antequam quancunque Excretionem aliam, imprimis per Cautem & moliatur Natura; elapso enim primo principis simul etale est elapsa.

2. Vomitoria præ reliquis præferuntur Antimonialia, in minoritatem dosi propinanda, ne Corpus nimium moveatur: v. g.

℞. Ferri Antimoni hyaryric gr. vi.
Insul. per noctem in loco calido in
Vin. Rub. q. l.
Manc siletrur: ℞. ℞. adde
Aq. Cinna. 3 ℞.
M. S.

Potio Emetica pro una vice.

II. Sudorifica primatum obtinent in Cura Malignarum, utpote quæ optimè Malignarum expellunt: interdu tamen & hoc obitus determinantur regulis, ne quid nimis. Quod major est Malignitas, eo frequentius & copiosius provocandus est sudor, adeo, ut in Febribus Malignis Pestilentibus, i. e. in summo Malignitatis gradu, aut etiam in aliis Malignis, ad minimum ter in 24. horis sint propinanda Medicamenta Sudorifica. Alexipharmacia, testè Experientia Prædictorum; semper tamen habito Virum respectu, ne hæc ipse nimis exolvantur: Neque etiam lutea vel alia superimpositis Ager nimium effi contengendus, quoniam Experientia docuit, Ager interdum nimio Sudore exspirare; nimia enim & probula Sudoris effusio subinde minuit tura, & eorum nimis exhanerando Sanguinem incassat, & eorum debita inhibet. Unde, ubi cum mitiore Malignitate conjuncta est Febris Ardens, potentioribus Sudorificis locus non est, sed potius in principio Absorbentibus ac mitioribus Sudorificis, in progressu fortioribus, insulendum. Considerandum aterni simul in Sudoriferorum usu; an Corpus fit pericrabile, & an ad Sudorem dispositum? an verum non? Si illud, tutius & potentior propinari possunt Sudorifica: si hoc, cautius & mitiora, ac turbetur magis Massa Sanguinea, interceptis alicui blandis Acidis.

Sed Sudorifica inter non invis delatata est habendos. Tutissimum omnium sunt Salia volatilia, hinc Volatilia aromatica. Sed hæc ipia saltem in principio Morbi & incrementum conveniunt, in fluxu scilicet tutius usurpantur: ita quod præsertim in Volatilibus sulphureis ac remediis Theriacalibus observandum, ubi nonnisi in principio & incrementum Morbi adhibeantur, ac ubi minus urgeat Aëus; periculum aliis est, ne in fluxu novat turbas, in Massa Sanguinea intensiorem ætiam & ebullitionem, indeque varia Capitis Symptomata inferant. Videatur hic elegans locus LUDOVICI in Pharmacologia p. 337, & cum quo conferantur loca parallelia p. 247. 261. 280. 324. 325. &c. Nempe volatilia inter Sudorifica, ubi Febris parva intensior fuerit, Maxima convenientius locum habent; ubi vero hæc Febris remissior fuerit, Olea seu Aromatica adhiberi possunt. Et sicut hæc Aromatica propter æstuationem nimis & Phlogos circumspicere usurpanda; ita Salia volatilia propter

propter nimiam Sanguinis fusione, & nimiam facili supervenientem Hæmorrhagiam moderatè usurpanda; Videatur BARTHOLINI *Alia Med. Reginum*, Vilam. 4. p. 166. Nocuerunt omnibus moderatè interposita suble- de Analeptica blandè acida, nempe ex Succis Vegetabi- lium, in specie Citro ac Cydoniis; item ex Clystis mi- neralibus sulphureis; aut denique Mixture cum paucis Spi- ritu Nitri dulcis, & in specie Compositiones Theriacales cum vehiculo acido propinatæ & melius ac tutius operan- tur. De Theriaceo geniuo usu vid. SEPTALIUS in *A- nimadvers.* lib. 5. §. 53. A. 230 Post Sudoriferà talia Vo- latilia in principio & augmento aliquantè repetita, *Vi- ziera ex Animalibus*, aut *Antimonialia* usurpanda & conti- nuanda erunt.

III. Post omnem Sudorem provocatum, uti & in ipso. Suesens iam Sudore ne Agri nimis debilitentur, blandis Acidis Viribus depandis propiciatur, cum Malla Sanguine nimis sic, uti & à Malignitate malignoacri, dissol- vatur, sub *Jalapum* & *Mithridatum* moderatè acidularum imprimis cum & ex Citro aliisque paratarum forma usur- patis, quæ Malignitati resistunt, ac Corpus blandè ad Diaphoresin disponunt: quallia sunt Suerus Citro, Cydo- niorum, Acetum, ac Spiritus Nitri dulcis, qui pœm reli- quis acidis in Malignis convenientius palam auserit. hæc enim in declinatione Sudoris & post Sudorem porre- cta & continuata, Sanguini debitam consistentiam resi- stunt; ne Agros debilitatos egregiè reinvallant. Quin & in ipsa Sudoris tortura Acidis *Spiritu* & *Mithridatum* subinde applicanda, quæ agros debiles nonnulli animant: sic Vinum generosum, Acetum theriacale cum Aqua Caribæica temperatum, Aqua Apoclicka acida vel spiritus, cum Succo Citro aut Aceto diluta, & similia Naribus subinde ad adstantibus adjuvenda sunt, quæ etiam sub ipso Sudore coactiora doli possunt propinari: hinc Acidæ theriacales ac similes parum propinetur: unde & Venere Acidæ, cum Putredinis aut Malignitatis resisten- tia, frequenter his in Febribus laudantur, & idè Acce- tum & Spiritum Vitrioli allegant, utut Spiritus hæc me- ritò præterendus sit Spiritus Nitri dulcis: E. &

℞. Distill. Citro Myrsicini ℞i.

Syrupi Rabi Idæi q. l. pro grato sapore.

Spiritus Nitri dulc. parum.

M. D. S.

Jalapum Confectivum bezoardicum.

Vel

℞. Distill. Cernæ Cervi, vel Citro Myrsic. ℞i.

Succi Citro, vel Rabin.

Crassæ, acid. an. ℞. ad ℞i.

Rubi Diaboli. Præpar. ℞i.

Syrupi Rabi Idæi ℞i.

Spiritus Nitri dulc. parum.

M. D. S. *ad usum.*

Vel

℞. Aqua Galeæ.

Soraxer.

Cordal. Herod. Saxon. ana ℞i.

Succi Citro,

Cydonior. ana ℞i.

Spiritus Theriacal. camp. ℞i.

Tinctura Flor. Anglicæ.

Sym. ana ℞i.

Syrupi acetos. Citro ℞i.

Spiritus Nitri dulc. q. l.

M. D. S.

Mistura Confectiva bezoardica.

Et ejusmodi Mixture acidulæ, cum Elethario Diafor- di præferunt locum iuvent, quando per Salia volatilia paulo profusior Sudor fuerit profluxus.

Vel:

℞. Agar Borrag.

Rugos.

Rub. Idæi ana ℞i.

Cinnam. ℞i.

Succi Citro ℞i. ad ℞i.

Confell. Alchem. dr. i.

Corall. rub. prep.

Lapill. Cæm. prep. ana dr. ℞.

Syrupi Cinnam. vel alius dr. vj.

M. S.

Mistura Confortans post Sudorem.

Item Mistura SYLVII in *Praxi* l. 2. r. 9. §. 30. cap. 13. §. 33. & cap. 17. §. 13. cap. 30. §. 135. In forma Elethariæ.

℞. Confort. Accetell. vel Rad. Terræ.

Pulpa Citro ana ℞i.

Rob. Rabin dr. vi.

Confell. Alchem. dr. i.

Cum Syrap. acetos. Cit. vel Rabi Idæi q. l. l. Eletharium.

D. S.

Eletharium Refrigerans & Confortans.

IV. De Opia & Opiani expertum est HORSTII judi- cium in *Judicio de Chirac. Insufuria*, p. 83. Ea nempe, uti revera sunt Remedia polychreia, Ita etiam in Malignis Febribus quibuscunque urrague scilicet paginam: rectè sequidem administrata, & Alexipharmica mixta, Sudorem promovent, imprimis ubi propter nimiam in- quietudinem aut anæstetam agri prohibetur à sudore. Ut ergo talia præcaveamus, exhibeamus Opiana cum *Sudoriferis*, ut sic melius præcaveamus sudor, & magis qui- tæ reddantur agri: & quidem in incremento solum, dum ad statum properant, non in statu ipsi, vel ubi desinunt. Vires, convenient. Unde & Opium tam insigniter ex- tollit, & quibuscunque Compositionibus Alexipharmacis ad- deodum fuset LUDOVICI in *Pharm. sua modern.* pag. 276. & sicuti nunc VERULAMIUS in *Med. Vite & mor- tis*, p. 94. §. 32. Opium eximiam usum in Febribus ma- lignis prædicat. Nempe Excretionem egregiè promovet: Opium spiritus quoque, ne tam cito relaxetur, quasi correat, & gravata in Malignis symptomata mitiget: Vigiliæ ac Deliria præcaveat, ac impetuosus Hamor- riorum effluventium motus impedit & compescit, in specie horrendam ac temulentum capitis Sanguinis per Nares profusum sistit. Præter alia exempla hæc facien- tia videbimus TIMEUS à *Guldenklein* in *conf. lib. 2. cap. 25.* p. 177. ubi Maligna febris Ardens cum Sanguine et naribus profusio, tandem alius irritis Laudam: curata quod notabile est. Tale Exemplum etiam habetur in HOR- STIO in *obf. l. 2. pag. 12.* de Milite, Febre Ardens Maligna & Morbo Hungarico pestis afflicto, alius it- ritis Laudam opiato curato. Post *Sudore* etiam cum *Sale- tis* vel *Mithridati* Opiana propinata conducunt, ac quasi ro- boretur magis & quietior fiat ager; & magnum est com- modum, si inducitur somnus, modo rectè tempore Opiana adhibeantur: hinc & Theriaca, Mithridatum, & quod in Febribus Malignis bis præfertur, Eletharium Diafor- di *Præparati*, ab Authores, tam Veteribus quam Modernis, adhuc suum meretur laudem. Theriaca sola quidem aliisque acido adjuncta propinata in principio Febrium Malignarum, in specie cum fervore excessivo, seu efflu- ventia nimia prædantur, nonnulli eis suspensa, quoniam Theriaca per se sola nimiam Sanguinis turgescitiam, & per consequens nimium ætum, excitate soler. Opti- mum ergo est, ut tales Compositiones Opiatæ & Theri- scales aromaticæ, e. g. Theriaca, Mithridatum, &c. à dr. i. ad dr. ii. propinentur cum vehiculo acido, v. g. cum Aceto Vini, vel cum Aceti rursus, vel cum Aceto bezoardici aliisque similibus cochleari uno vel altero; sic enim longè melius ac potentius Sudorem movebunt, & nimis debilitant agri propter causam causam, nempe æ- tum, Theriaces & Mithridati loco Eletharium Diafor- di, cum temperatum magis, adhibetur, in specie in Alvi aliisque Excretionibus præternaturalibus. Moderni vel Laudam opiatum, vel Elethium Opil, aut hisus loco Elethium Theriacalem usurpant. Observandum tamen, ne Opiana adhibeantur tempore Crises; nam criticus motus impeditur.

V. Camphorata sunt Alexipharmica & Sudorifera optima, quæ præter vim Veneni correctivam simul ali- qualem vim Spirituum fixativam obtinent; unde imprimis in inquietudinibus, Vigiliis, & metu Delirii conveniunt; hinc & Vigiliæ & Deliria ipsa compescunt. Sed cautè ob volatilitatem nimiam usurpentur, cum non omnia subiecta ejus usum ferre possint: præferimus quorum Caput debile est, Literati v. g.; ac imprimis Mulieres delicatæ, quæ fortiori Odoriferæ assicere nequeunt, mirè abhorrent Camphoram, & in Passione Hystricam ea ejus usu incidunt, utut hæc in aliis sistat Paroxysmum Hystricum. In Mulieribus ergo his, Systema nervosum sensibus habentibus, cautè procedendum: sicut & in iis, qui Literati sunt, & quorum Spiritus animales sunt facili- tate mobiles & dissipabiles, his enim Camphora generalium nimis remedium videtur, nimis ferit Cerebrum, & nimis Spiritus animales exagitat. Alias in propriis di- ctis Febribus Malignis, præsertim Contagiosis, ubi subiecta eandem ferre queunt, inter Alexipharmica nunquam intermittenda camphora.

VI. Observetur, quod *Febrim Malignam non semper nec in omnibus sit una eademque ratio*; attendendum igitur semper ad Appropria Maligne Febri specialia Remedia: prout enim hic diversis se præbent Symptomatis, & nunc Continuae, nunc Intermitteutes videntur, æque peculiari Malignitatis gradu distineant, ita etiam earum Causas in ipsa radice nonnulli diversas esse probabile est: adeoque eisdem curandi non plane eadem est Methodus, sed pro varietate diducitur circumstantiarum subinde Alexipharmaca varianda & specificanda sunt: sic illa Maligna Febrix, quæ à *Contagio* aritur, magis requirit Alexipharmaca & potiora Sudorifica; quæ vero à *Causa laeva*, Humorum nre ipsius genita constituta constitutione, magis Temperantia, absorbendo Alacritas, & succelliva Diaphoretici Resolventia. Sic attendendam quoque, an *Massa sanguinea*, an verò *Spiritus animalium* ad *Hæmorrhagiam* systema magis affligitur? posterior enim in casu Volatiliora, subtiliora ac penetrantiora Opistia nulla magis conducunt; priori vero sonni Volatiliora aut fixa, Acidis blandis subinde temperata, conducunt, igitur propter specialem Febrium Malignarum differentiationem semper observandum, ut in specie huic Malignitati sumal Appropria per Experimentum cognita opponantur Remedia: v. g. in *Perioli*, *musculus*, & *Purpure* Myrrha aut Cauderum; in *Perioli* Semina expulsiua; in *Dysenteria Epidemica* Hepata Viperarum & similia.

VII. Observetur: nunc *massam sanguineam* magis, nunc *spiritum animalium* & *Hæmorrhagiam* systema magis affligit: ubi Ejectiones Cutaneas उपस्थित, item per alia loca exquilliones, contugit; hic vero Vigiliantur, Deliriorum, Convulsionum & similibus Symptomatum, cum Pulsi utriusque apparenter bono, est imperus.

VIII. Observetur: ad illud præferitur quid magis urget, esse respiciendum. Nempe interdum Febrix est purè, aut simpliciter Maligna; interdum verò est Complicata plura minas cum Febre Continua Ardens: aut verum sit, raram esse Febrem Ardentem, cui non subit modo major, modo minor Malignitas. In tali ergo casu complicati quasi sunt Morbi. Propterea attendendum simul sedulo est ad Sanguinis Motum fermentativum, cuiusque Ebullitionem febrilem, & inde dependentem Aluum, Cephalalgiam pulsatoriam, ac alia Symptomata Febribus Ardentibus communia, ut pro varietate Circumstantiarum possimus variare Medicamenta: Quod magis enim Aluum urget, eo minus Sudorificis Alexipharmacis volatiliora oleosis utendum est, ne Deliria concitentur; quo minus verò, eo tutius illa, præsertim in principio & augmento usurpanda, id est, ut vulgo Prædici dicunt: attendendum esse, an major Putredo febrilis seu Ebullitio in Sanguine, an verò maior Malignitas urget? ad illum enim, quod magis urget, dirigenda præsertim est Curatio, adeoque interdum magis ad Malignitatem respiciendum. In genere tamen semper, quantum fieri potest, utrique propiciendum: Sanè semper in Tugescencia febrili intensiore magis usurpantur Absorbentia, & Ebullitionem corrigentia, aut Salia volatilia Alexipharmaca iuncta, interponendo simul blanda Acida; Malignitati per generosiora Remedia Volatilia, & Absorptionem Corporis nonnulli lacerantia Theriaca, & similia Alexipharmaca; utrique per moderata Acida, aut Sulphura metallica fixa, verà, grat. Antimonialia, est succurrendum: nam hæc in Febribus Ardentibus & in Malignis febriè usurpata contrariant, quatenus Ebullitionem & Orgasmodum febrilem siliunt, & vi sudorifici Malignitati resistunt: id quod in genere in omnibus Febribus Malignis observandum est.

IX. In Cura Febrium malignarum diligenter Medicus inspectis Oculis, Linguam, & insistenti Manu Rerum, ostendit quidem, ut de futuro Delirio & Convulsionibus sequentibus possit iudicare; quando enim Oculi sunt fulgidi, rutilantes & quasi ignei, aut quando Aspectus ægrorum est ferus, Delirium plus minus furiosum certò imminet. Linguam verò considerat ac *Favet*, ut internum Causam, seu ardorem in Præcordiis, indeque ortam Præcordialem, vel Linguæ & Fauces excoctationem & exlcerationem, & alia similia Symptomata in morbo Hæmorrhagico frequentia, cognoscit; Linguam enim si fuerit mollis, humida, rubra, & Fauces non affligit Sitis, tunc Medicus fit securus; secus, si Lingua nigra, Faucesque cum Lingua atida & fissa cum adfusa Sisi appareant, tunc periculum adest, & imminet Præcordia. Atque denique seu Corpus consideret, an sint meruende Convulsiones? ubi enim percipit Medicus, tangendo Pulsum, quasi

traditionem quandam, aut subfultationes Tendium in Capis, licet Manus quiesca sit, certus fit Medicus imminere Convulsiones. Infalibile est hoc Signum.

X. Nihil esse exitiale, & Hominem Febre Maligna correptum, præsertim si intensior fuerit Malignitas, certius ac citius ad interitum trahit, quam quovisque, in *spis ingens* & *superflua Purpure per Aluum*, uti crebra Expectatione sufficienter comprobatur. Uti enim sonni funesto omine, laxa in talibus observatur Alvus, & Diarrhoea symptomaticæ aut colliquativæ perniciose admodum sunt in Febribus, ita quilibet etiam artificialiter institutus Purgatio, idque in specie, ubi à Contagio natum est malum; itam, ubi suspicio est, Contagium affurcam Excretionem; item ubi minus urget Effervescencia Febrix ac Aluum, quàm Malignitas. Caveant ergo Medici, ne omnibus in his casibus Morbi tempore propicietur Purgantia in Morbi curia.

Quod si in primis vis obstruere aperitend aliquid molierendum necessarium sit, blanda Clystera, cuque temperata, adhibeantur. Et hæc ipsi etiam, ubi Excretio Cutanea se offert, nonnisi castissime applicanda. Declinantem autem Morbo, aut devota pernicii, post 14. dies &c. blanda Laxantia non incommode conveniunt. Si quidem extensio, per primis viis absorbendum, in Febribus Malignis necessarium videtur, hoc vel Serum Lactis, præsertim cum Sacco Citri nonnulli acidulatum, vel Decoctum Tamarindorum folepit in debita quantitate additum, vel Nitrum animalium in Potu diluatum optime completit. Redde hic citat FALLONIUS *Pharm. med. pag. 175. In Malignis potius alteretur per Alexipharmaca, quàm per Purgantia tractandum*. In quod observandum contra Gallenum & Ralenum Praxim.

XI. *Visa* in Febribus Malignis, quæ talibus, nullum omnino locum invenit, adeo ut quo magis Febrix sit Maligna, eo magis noceat Venæsectio, idque eo magis, quæ tardius instituitur. Quid enim prodest, Sanguinem & Spiritum detrahendo foret aptiores maligno Fermentis panderè? Cùm enim in Malignis Natura sæpè per Sudorem se solat exonerare, certe Venam secando impediemus hunc Naturæ motum, & ad perniciem detrudemus Aegros. In specie in Febribus cum Excretionem Cutaneam, Mucularum vel Pulvularum, conspiciat, Venæsectio iudicia est lethalis, quia impedit motum Naturæ quasi criticum per Cutem factum, qui minime turbandus est. Equidem Prædici vulgares aliud fident: dicunt tamen eam in quacunque Febre Maligna administratam plus nocere quam prodesse, præsertim nisi in primo Morbi insultu infusatur; cùm fòda illa Refrigeratio ex Sanguinis detractione noceat: e contra affusio talium recrementorum, modo non sit excessiva nimia, Excretiones tales promoveat. Cauti proinde hæc in parte sumus, & cavemus à missione Sanguinis, præsertim si à Contagio Febrix Maligna fuerit nata; ubi pessima est, hæc ratione enim porta Contagii aperitur, ut integrum Massam Sanguineam afficiat, & Vires magis labefaciat. Sanè multorum annorum Prædici, R. D. MICHAELIS, nemini in Febribus Malignis Venam secavit, plurimis funestorum Experimentis cautior fides.

Sunt equidem, qui in Plethoricis Petechiarum, Morbillorum & Variolarum eruptionem Venæsectione maturè promovendi afferunt, sed hoc nonnisi raro evenit. Ubi tamen minor est Malignitas, admodum verò Febrix Ardens incessat, in Subiecto Plethorico ac Juvenil, & in primo ætatis flore consistit, vel alias Sanguinis missioni adfuso, in talibus casibus interdum, sed mox à primo principio, Venæsectio, cautè tamen & in parca quantitate, institui potest. Conferantur hic simul illæ Circumstantiæ, quas insinuat WILLISIIUS *Pharm. Rat. p. 389.*

Obijciat quis: largam nonnuquam in principio Petechiarum & Variolarum eruptionem accideri Narium Hæmorrhagiam, quæ vel Morbum postmodum levorem reddunt, & impetum Variolarum siliunt. Veram intereundum est: consideret tamen, an Hæmorrhagia talis sit Critica? an verò Symptomatica? si hoc, quod refertur Morbi præcipiat æger, hæc in parte Naturam sequi non licet? si verò Critica fuerit, & cum euphoria æger sit, probabile quidem videtur, ut in Sanguinis Orgasmo interitum Naturam, & sic Venæsectione administrandam habere possumus. Verum nec dum hoc licet facere, cùm Naturam non affeque possumus; ubi enim Natura insinuat Hæmorrhagiam, se ipsam levat, & si adest Scissidum Naturam

niam sanguineolentum in febris Malignis, pessimum habetur Equum & fuscissimum: unde neque tunc motum Naturæ perversè agens asseclat conceditur. Ego nulli Auctor ero, ut Venam faciat: & quidem in specie contra Venæsectionem & Purgationem in febribus Malignis acriter dimicantes videbitis TIMEUM von Goldentlas in *Rept.* p. 106. & p. 126. item BRUNNER in *Conflicto de Febre Hungarica*, & RULANDUM de *Morbo Hungarico seu Captraghi*, & similes alios Auctores, qui pertinaciter repugnant & Venæsectioni & Purgationem: vid. in specie in HORSTIO *Jussure* l. 1. *Offens.* in *Append.* qui tamen nonnulli à cautissimo imitandi sunt.

XII. *Cantharidum* & *Pescicarium* usum in statu febrim Malignarum est etiam utilitatis & commendatus, Carpis & Femotibus applicata: vid. HOEFERUS in *Herz. Med.* p. 258, qui horum utilitatem insigniter commendat; & imprimis in Italia & Gallia usurpantur. Utis verò legitimus & applicandi ratio consistit in eo, quod Vescicatoria imprimis conveniant in *Incremento*, vel *principio Status*, dum, vel graviora, imprimis Capitis & Animalis facultates, imminant aut urgent Sympptomata, ut Capitis Dolores excessivi, Convulsiones, graves & feroces Delirium, quod vel præcaveat, vel certo leviat; vel Naturam aliquam Excretionem moliri, ex eruptivis hinc inde, sed imperfectè, Maculis, à Doloris sensu in quadam parte, suppurio erupturi Abscessus est; vel quando facta sum Excretio quacunque ex causa denuò retrocesserit, tum imminuat Italos, subied Vescicatoria applicantes, & ita opus Naturæ, nempe Excretionem, promouentes. Locum etiam habent illi in Febris Malignis tunc, quando extrema frigent, Interiora verò uruntur: item quando Veterans aut alii soporosi urgent Affeetus, adeoque, uti suspicio est, ne vel Fermentum malignum magis Spiritus soiales, & genus Nervorum afficiat, vel quacunque ex causa Raptus Sanguinis aliorumque Contentorum ad Caput, ut loquuntur Prædici, fiat: vid. M. A. N. C. *Ann.* 3. *Obs.* 214. In talibus Calibus optimè Cruribus supra vel infra Genus, vel Brachii prope Carpos, aut prope Axillas, tandem etiam circa Nucham applicantur: sed hoc vix, nisi in Affeibus soporosis, aut ubi jam aliis in partibus applicata fuerint. Sanè talibus in calibus, tam in Remissione quam in Malignis Febris, conducunt; idque eo magis in his, quorum parior sudor aut Diaphoretica in istis non raro observantur. Arbitror, quod in Malignate maligno evocando, mediante Spirituum ad locum dolentem concitato impetu, singularem quid obineant: sic enim & *Bubones* alii *Tumores*, ut melius erumpant, optimo consilio applicantur: Quin & Vescicatoria talia, aut his paratæ Phocæellæ, expertum esse Peltis præservativum, habebimus fidei loco: Hinc & *Febris Incarnata* sua applicatione tollunt. Adeo non vix fuit in frequenti usu Vescicatoria: in regionibus tamen calidioribus multum applicantur.

Remedia inter Vescicatoria optima sunt vel Emplastrum Vescicatorium in *Pharm. Augstana*, vel Emplastrum illud Vescicatorium *Schneideri*. Interim notetur, si per Vescicatoria Pusillus excitari nequeat, desperatum malum esse. Cæterum audiat STEPHANI correctio, qui malè putat agere Medicos statim ad Vescicatoria properantes, cum ea tunc adhibenda demum sint, ipsos quidem Excretio fit Critica, sed impedita, itaut his ipsis juvetur Natura.

XIII. Quod *Dipsan* in Febris Malignis observandum: Temis hæc sit necesse est, & cum sepius summè subsidium Alimentorum eodem, nulla modo ad eundem extendi solent, quin Juscula aut Similia abundè, licet in parva quoque dosi, sufficiant. *Potus* sit vel Cerevisia fecundaria, vel etiam Aqua simpliciter, quæ leviter ebullierit, cum parte tertia vel dimidia Vini temperata, & infuso Pomo Citri cum Cortice, in talculis infuso, vel succo expresso medicata, quin etiam Gelatina Cornu Cervi recens parata, & super carbonibus liquida, largiter cum Potu sili, aut Cerevisia, aut alio ordinariæ, partim scopo Analeptico, partim scopo Alexipharmaco Sadorifero, admisce-ri potest: c. g.

℞. Aquæ sem. Biji. ℥i.

Vini Rhœnani. ℥ij.

Mixtis his addatur

Pomum Citrium nonnulli dissol. &

nonnulli expressi. N. j.

Gelæ. Cornu Cervi super ignem dissol. ℥ij.

M. D. S.

Jalepas Citrias Confortasæ singularis.

Hinc etiam Decoctum Citri *Myrsinæ*, addita ℥i. vel ℥ij. Gelatina Cornu Cervi, ad ℥i. convenientissimum in Malignis est Potus loco Jusculi. *Vinum generosum acidum* non nocet in Malignis, quin moderato usu Remedia confortant vices lubeat: Confer. RIVERII *Praxis*, & BARTHOLINUS *Cent.* 6. *Myr.* 7. Convenit etiam pro Potu Serum Lactis acidulatum cum Succo Citri. Nec inconveniens est Fumo Sulphuris medicari Potum quemvis ordinariæ, cum tale Sulphuris Gas ad extinguendam Malignitatem, & condandos balnissima vi Humores, mirè coaduat; cujus loco etiam Clysti Antimonialis sulphurei, vel Spiritus Nitri dulcis, vel Roris majus 30. ad 60. guttas in mensura dimidia Cerevisiæ, vel cupis ordinarii Potus utilisissimè instillari possunt: qualem Potum sulphurandi, & Clystos hos proficuos præparandi modum, videbitis in CNOEFFELII M. M. *Febris Malignæ Epidemias seu Peltissiales* pag. 96. Aliis & Nitrum antimoniatum à ℥j. ad ℥ij. in mens. 7. Potus ordinarii dissolutum egregie convenit, nisi vel Alvi liberior fluxus, vel Stomachi nauseabundi imbecillitas obstitit.

Quoad Alexipharmaca & Sadorifera, quæ in Malignis Febris imprimis conveniunt, eadem sunt in triplici differentia: nunc enim conveniunt simpliciter Alexipharmaca: nunc Alterantia, qualis Acids; nunc in specie simul Sadorifera, etque nunc Volatilia, sive Fia: quorum illa magis in Principio, hæc magis in Incremento & statu conducunt.

Inter Sadorifera autem habeamus rationem & seledum, ut scilicet in Principio Volatilia, ubi magis Malignitas urget, & fixa in Progressu, aut ubi Febris Ardens jungetur, adhibeantur. De horum, imprimis LUDOVICI in *Pharm.* p. 237. item 243. 261. 284. item in *Tr. de Sals volatili Tartari Præfat. Editiois secundæ*. De aciderum usu notetur, quod ea in toto cursu Febrim Malignarum, partim cum Julias, partim tunc Sadorifera, conveniant.

Volatilia sunt vel *maera seu salina*, sere frigida, vel *Aromaticia seu Oleosa*, sere amara calida. *Maera* illa sunt spiritus & salla volatilia uniuscuique ex Animalibus decomposita, Spiritus Salis Ammoniaci, Spiritus & Sal volatile Cornu Cervi, Viperarum, Tartari, Urinæ, Liquor Cornu Cervi succinatiss, Spiritus & Sal volatile Succini, &c. item Acetum, Succus Citri, Clysti sulphurei; qui tamen magis in Potu usantur, &c. *Oleosa* volatilia sunt Camphora, quæ omnino optima, omnia Aromaticia, Sudotifera, ut Zedoaria, Contaurium minus, &c. Rob Baccarum Juniperi & Sambuci; item Olea destillata, ut Succioi, Citri, Camphoræ, etque his concionatam Oleum Peltissiale *Majus*, Oleum destillatum Cornu Cervi, Tartari &c. Essentia infusa, & Spiritus Theriacales camphorati vel crocati: vid. ZWELFFERII *Manifæst. Herm.* pag. 430. Essentia Theriacalis aodyna, Elixir Alliacum, Peltissiale *Croculi*, Proprietatis, Essentia Zedoariæ, Scordii, Abinthii, Cardui benedicti, Croci, Baccarum Juniperi, Cinnamomi, Myrsinæ, Succini, Viperarum, Calloræ, Tormentillæ, Gentianæ, Rutæ, Vincetorici, Melissæ, &c. Acera Bezoardica, Zedoariæ, Tinctura Bezoardica, tanquam optima Alexipharmaca.

Fixa sunt vel *Mineralia*, vel *Animalia*: *Mineralia*, ut Sulphura metallica cum Nitro fixata, in specie Antimonium diaphoreticum, Aurum diaphoreticum, Cinoabaris nativa, Antimonii, quæ nobilissima, & à POTERIO Sadorifera *Peltissialis* nomine venit; & Bezoardica Mineralia quilibet, tam simplicia, quam cum aliis composita: in specie Bezoardicum Joviale RIVERIIUS in Febris Malignis commendat; & hinc Bezoardicum Solare: Terræ Mineralis sigillatæ, Uoicornu fossile, Tetra Solaris, Corallia, Flores Sulphuris, item Nitrum & Nitratum. *Animalia* suggerunt partes duras usas, tam temperatas quam usas, ut Cornu Cervi, vel Ebur cum vel sine igne, Cornu Cervi Solare, Unicornu verum præparatum, Lapides Animalium bezoardici, Pulveres Vipertini, & Bezoardica Animalia.

Temperata, & mediæ quasi naturæ, sunt Gelatina Cornu Cervi, & Semina illa Espulsiua dista, quæ in omni casu, speciatim in Febris Malignis, in quibus Natura expulsiuonem ad Cutem moliri incipit, polychrestis sunt in forma Emulsionis, ad promovendam istam Excretionem cutaneam, qualia Cardui benedicti, Napi, Aquilegiæ, Nallarii, Citri &c., quibus addi potest Myrrha. Hinc in Percechiis Variolis & Morbillis, Purpura, & similibus Excretionibus promovendis, mirabilis est Emulsio ex Seminibus Espulsiuis: vid. ZWELFFERUS

in Pharm. Regia pag. 309. ubi egregium habet Liqueorem Aleispharmacum; ad cujus imitationem folio præferebatur:

2j. Flavet. Cort. Citri 3j.

Sem. Aquilg.

Card. bened.

Napi an 3j. ad 3j. vel 3j.

Citri.

Amygd. dulc. an 3j.

Myrrh. elect. (que nobilis est vim balsamica) 4j. ad 3j.

Cum f. q. aqu. Rosæ & Scorzæ. vel Scabiosæ & Flor. Sambuci L. Emulsi ad 3j. vel v. parum edulcoranda, & subinde haurienda.

Huc etiam interdu Cornu Cervi sine igne 3j. & de Antimonio diaphoretico, vel de Beznardico Minerali 3j. vel 3j. & nonnulla alia addenda veniunt. Servat Corpus in blando calore, ut ita promovatur Exercitio. Sæpe hic Mader loco sudoris sufficit, si scilicet aliis debilitatur. Eger, vel non adeo vixit Maligialis, nec debet ad copiosiores Sudores cogi. Myrrhæ cum Seminibus & Amygdalis in Emulsionis formam redacta laudetur; superius tamen ratione ad strictè dictas Emulsionem ooo pertinet.

Ex modis dictis ferecenta alia continentur Composita: ver. gr. Pulvis Beznardicus Tennerii vel D. Michaelis, Rubens Pannonicus, imprimis convenientes, ubi fluxus Alvi simul adeat; Pulvis Saxonicus, Species de Hyacintho &c., quorum largissimum legemur videbitur apud omnes Scriptores. Pertinet hæc Compositio Theriacales aromaticæ, ut Theriaca, & Mithridatium, Electuarium de On. Orvietanum Kæleri casophorum, Confectio de Hyacintho &c. & prout hæc temperant magis Electuarium Diacordii Fracastorii ad 3j. vel 3j. propinquant; & quod magis laudandum, a SYLVIO correctum: que ipsa præter assultiones incrementum, quod inferunt, convulsiones cum Vehiculo acidum, in specie Aceto, vel simpliciter vel theriacali, aut succo Citri miscetur, & ita in Aqua Scabiosæ, Calendule, Cardui benedicti, & similibus propinquant. Et enim Theriaca mixtura salina oleosa volatilis anodyna & sudorifica, que & Spiritum influentium imperant spiritus, & Sudorem potenter movet. Jam verò, si loco Theriacæ reciperetur Spiritus Cornu Cervi essentiatum a 3j. ad 3j. vel 3j. & imprægnetur gr. i. vel altero Laudum opiat, vel Elleotice Opii guttis x. Remedium habebitur ejusdem valoris, ac Compositio illa theriacali. Subinde consuevit esse, ut fixa Volatilibus nonnullis accuerent ad promovendam Sudoris excretionem.

Ex Regno ergo Vegetabilis convenienter Radix Calagæ, Scorzæ, Zedoaræ, Gentianæ, Allii, Aritholochi rotundæ, Angelicæ, Succis, Chelidonii majoris, Valerianæ, Enulæ, (hæc Radici Decodum cum Floribus Calendule commendatur mirè ad expellendam Petechiam) Vincetoxicæ, Risoræ, Olsnici, Levistici, Uliariæ, Petalididis, Pimpinellæ, Pentaphylli, Contraryæ, Anchæ: Folia Diuiani Cretici, Galegæ, Cardui benedicti, Acetose, Scabiosæ, Scordii nostratis & Cretici, (quod fere omnibus præferunt in Curatione Maligiarum) Uvae inerviæ, seu Herbarum Paridis, Rutæ; Summitates Abinthii, Centaurii minoris, Cardui benedicti, Scabiosæ, Acetose, & similia; Flores quatuor Cordiales, quibus merito additur Flor. Calendule, Hyperici, Salviæ, Betonicæ, Aquilegiæ, Crocus &c.; Semen Acetose, Cochleariæ, Angelicæ, Melissæ, Aquilegiæ, Napi, Citri; Cortices Citri & Aurantium; Raccæ Juniperi, Uvae inerviæ &c. Omnibus palmam præcipit in regno Vegetabilis Camphora causè usurpata, mirabile concretum, quod & alcalis subiectis & acidis se sociat; Aleispharmacum omnibus superius, & verum Balsamum, tam in Præfervatione quam Curatione Febrim Maligiarum. Propter hæc omnibus Sudorificis & Aleispharmacis ad resistendum Maliginitati, quoties fieri potest, semper addenda, totam Maltam Sanguineam seu Balsamum tingit, potenter sudorem movet, ac vel in præcavendis vel mitigandis Deliriis, Aggrypnis, & Convulsionibus, Somnoque introducendo, vix præ habet Remedium.

Ex his ergo varia sunt Remedia, præter Aquas destillatas istorum Simplicium, v. g. Melissæ &c., imprimis Infusiones horum Simplicium Aceta fuor Beznardica, de quibus postmodum, ubi de Pelle: v. g. Radix Angelicæ, Scordium &c. Aceto infunduntur. Exemplum Aceti Be-

znardici sit TIMÆI Pao Goldenkroin in Cæstr. L. 2. Cap. ult.

Citrus totus est aleispharmacus, unde Cortices, Succus, & ex eo parata Remedia quæcumque, imò Acidulae in Cætro paratæ, nunquam omittenda. Pertinet hæc Syrupus Acetotizatus Citri, item Syrupus de Citro compositus, Decodum Citri Myrsinæ &c., que in Morbis Maligialis convenientissima sunt: ob id cum quibusvis fere Remediis tam Abhorrentibus quam Aleispharmacis, in Febrilibus Maligialis subinde aliquid de Citro propinandum, aut etiam post illa exhibendum est.

De Sambuco res nota est, quod ejusdem Flores, Spiritus Florum Sambuci, item Rodæ ex Baccis & Rod Juniperinum, sint egregia sudorifica pro Pauperibus, imprimis si cum Cornu Cervi sine igne propincentur; si cum potenter sudores movent. Liguum Sallustias, Decodum ejus, ut & Decodum Florum Sambuci, pro corpore Juleporum etiam egregie usus est in Febrilibus Maligialis; uti etiam Decodum Cornu Cervi cum Radice Scorzæ, & que sunt similia.

Ex Regno Animalis offert se imprimis Cervus, qui similiter totus est aleispharmacus & anipellificus, imprimis Cornu ejus, & ex hoc parata Gelatina, hinc Sanguis ac Cor primatum obtineat, & ex his preparata in frequenti sunt usui; unde aut Cornu Cervi sine igne, aut, quod melius est, Spiritus Cornu Cervi, Sal volatile Cornu Cervi, Sal volatile & Spiritus Sanguinis atque Cordis Cervi, &c. præ cæteris sunt in usu: hinc etiam Liguum cornu Cervi fuscissimum potentissimum est Aleispharmacum & Sudorificum in Febrilibus Maligialis: speciatim ubi mox in principio aut incrementum Affectus nervini, convulsionem aut Epilepsiam insinuat. Sal volatile cornu Cervi rectè sublimatum a gr. v. ad xij. vel xv. ad 3j. propinquant: Spiritus cornu Cervi a 3j. ad 3j. Liguor cornu Cervi fuscissimum ad gutt. x. vel 30, est enim satis potens. Pulv. Cervinum est vipers, cuius Sal volatile, item Pulveres viperei rectè parati, imò nomine Beznardici Animalis sunt optimi. De Lapide Beznar ex Dammar genere delinquit, tam Orientali quam Occidentali, res nota est, quam decantant sit in Pelle & Febrilibus Maligialis ob insignem vim sudorificam; de quo observetur, quod habet ZACUUS LUSITANUS & HILDANUS, quod non adeo in parva dosi ad aliquem grana tantum, sed ad minimum ad 3j. vel 3j. sit propinquandum, ut in virtute aleispharmacæ & sudorificæ ipsi nihil cedat calculus humanus, beznardicus & sudorificus, qui eadem dosi exhibitis longè melior est. De cæteris præter familiarissimum Lapidem Beznardicum sophisticatum, ejus nulli unicusque inspectus illud delat, adeo, ut in 3j. vix 3j. granuli latet. Quid? quod hic apud nos copiose, quam apud Indos invenitur, quibus tantum genus minus rarus est; vid. BAUHNUS de Lapide Beznar. ZWELFFERUS in Animad. ad Pharm. Augustinianam p. 65. etiam de eius sophisticatione scribit. Beznar facillimum videtur, in apud, ad ann. 6. & 7. M. A. N. C. p. 18.

Ex Regno Minerali in Febrilibus Maligiosis reliquis palmam præcipue Antimonialia Sulphurea, eaque reddita fixa; quoniam Antimonia Sulphur, de natura Solari nonnulli participes, Maliginitatem Salis volatilis peccantis figit, & fixitatem mediatum Sudore educit; hinc Antimonium diaphoreticum, alias notum, est singulari & vitarum Remedium; omnia quoque, que basem Antimonii agnoscunt. Unde etiam Antimonio diaphoretico nobiliora, Beznardica Mineralia, tam simplex a gr. vi. ad xij. quam Solare & Lunare, atque composita, in eadem dosi sunt optima. Beznardicum siveale est usitatum POTERIO cum Camphora, si propinquetur in Aqua appropriata in Febrilibus Maligiosis. Sed nescio, an non hinc cum Nitro fixatis prætorandum sit potius Sulphur Antimonii furore in hunc Cinnabrum Antimonii, ut ut ex non planè fixa sit, tamen ob Sulphur furore, in specie ubi convulsivi impetus simul urgent vel imminet, a gr. vi. ad 3j. vel x. vel aliquid genissimum Antimonii Sulphur, rectè cum Salo Ammoniacco sublimando paratum, sub nomine Tincturæ Antimonii sicæ; vel Sulphur Antimonii fixum, ex scoris Reguli Antimonii oculo arti-ficiali præcipitatum, in foliis Maliginitate & Epilepsia utramque faciunt paginam; ac reliqua Antimonialia Sulphura fixa, utpote ad Panaceas maxime accedentia: vid. BASILIUS VALENTINUS in Curia triumph. Antimonii. Facit etiam huc Sulphur commune seu Minerale, quod pro Pauperibus hoc locum Antimonialia Sulphuris suo modo substitui potest, cum magnam inter se habeant cognationem, idque vel crudè, vel cum Camphora affum-

sumptum; unde etiam conchavia Aegrotantium Sulphure ac Pulvere Pyritio suffumiganda sunt: indolium etiam & vestimenta io graviore malignitate hoc ipso fumo impregnanda. Potum etiam sulphurare jubet in Cura Febris Malignarum CNOEPHILUS I. a. Pertinent huc etiam Terræ Alexipharmacæ minerales, Bolus Armena, Terra Sigillata & familia, quatenus hæc ipse de sulphuro minerali plus minus participans. Succium & ejus Sal volatile est singularissimum, ubi genus nervosum à Malignitate est affectum. Spiritus Mineralium aciduli commodissime propiuntur cum Julepis: eminet præ cæteris Spiritus Nitri, nunc solus, onc, quod melius est, cum Spiritu Vini dulcificatus; & hinc Spiritus Salis, & Spiritus Sulphuris, qui est egregius. De Tinctura Bezoardica seu Mistura simplicis, cujus basin cum salio volatili constituit Camphora, & de Spiritu Theriacali camphorato, res nota est, quod egregie prosint, à 3℔ ad ʒi. propinata, Spiritus Fuliginis urinosus à 3℔ ad ʒi. quibusdam in secreto habetur in Morbis Malignis.

Ex his variæ & mille Formulæ, in Febris Malignis magis usitate: præscribi possunt: v. g. in Principio & Incremento præmissis præmittendis.

ʒi. Tinctur. Bezoard. rati parata ʒ℔.
D. S.

Tinctura Bezoardica pro una vice.
Sumatur in quocunque vehiculo, Stomacho vacuo, expectando Sudorem.

ʒ℔. Miste. Simpl. ʒi.
Liqu. Cere. Cere. facin. ʒ℔.
M. pro 2. dosibus: S.

Mistura Bezoardica pro duabus vicibus.
Item in forma Potiois:

ʒ℔. Aquæ Rati.
Rad. Scarcæ. an. ʒi.
Mistur. Simpl. rati parata ʒi.
Spiritus Fulig. rectif. ʒ℔.
Syrup. Scordii ʒ℔.
M. pro 2. dosibus: S.

Potio Sudorifica pro duabus vicibus.
Vel

ʒ℔. Aqu. Card. bened.
ʒ℔. Sambuci an. ʒ℔.
Liq. Cere. Cere. facin. ʒi. vel loco hujus Sal. volat. ʒ℔.
Syrupi Card. bened. ʒ℔.

M. pro doli, expectando blandum sudorem: S.
Potio Sudorifica pro una vice.

ʒ℔. Aqu. Card. bened.
Scordii 20. ʒi.
Liqu. Cere. Cere. facin. ʒi.
Pulv. diaphora. Ladreæ.
Antimoni diaph. an. ʒi.
Syrupi Scabiei. ʒ℔.
M. D. S.

Potio Sudorifica Bezoardica, pro 2. vicibus, bene circumagitanda.
Vel

ʒ℔. Aqu. Rati Idæi.
Scordii an. ʒi℔.
Antimoni diaph. ʒ℔.
Cinnab. Antimoni gr. xv.
Sal. volat. cere. Cere. gr. xii.
Camph. gr. ii. vel iii. aut Lond. op. gr. i. vel ii.
Syrupi card. ben. ʒi.
M. pro 2. dosibus.
D. S. ut antea.

ʒ℔. Aqu. Flor. Sambuci ʒi. vel ʒi℔.
Cere. Cere. fac. igne ʒ℔.
Cinnab. Antimoni gr. xv.
Sal volat. Cere. Cere. gr. ix. vel ʒ℔.
Syrupi Fœnic. ʒi℔.

M. pro 3. dosibus: S.
Potio Sudorifica Bezoardica pro tribus dosibus.
Vel

ʒ℔. Aqu. Rati. ʒi.
Cinnam. ʒi.
Cinnab. Antimoni gr. xii.
Antimoni diaphor.
Sal. volat. cere. Cere.
Succiu an. gr. v.
Lond. opiat gr. i℔.
Camphor. gr. i.

M. S.

Potio Sudorifica Bezoardica pro una dosi.
Vel

ʒ℔. Aqu. Flor. Sambuci.
Scordii an. ʒi℔.
Cere. Cere. fac. igne
Antimoni diaphor. an. ʒi. ad ʒ℔.
Sal volat. cere. Cere. gr. xv.
Succiu gr. vi.
Syrup. Card. ben. ʒi.

M. D. S.

Potio Sudorifica Bezoardica pro tribus vicibus.

Capiatur pro 3. dosibus expectando sudorem: cui, ubi gravior urget symptomata, commodè Lond. opiat. gr. i℔. vel ʒssent. Anodyna ʒ℔. potest addi.

Ubi Delirium imminet:

ʒ℔. Aqu. cord. Hæc. Sax. ʒi.
Cinnam.
Spiritus Theriac. camphor. ʒi℔.
Cere. Cere. facin. vel loco hujus potida Sal. vol. cere. Cere. ʒi℔.
Sal. volat. succiu ʒ℔.
Syr. Fl. Tonic. ʒ℔.
M. S.

Potio Bezoardica.

Hauriatur cochleatim.

ʒ℔. Aqu. scord. ʒi℔.
ʒ℔. Theriac. vel simpl. vel moderatè camph. ʒi℔.
Cere. Cere. fac. igne ʒi℔.
Sal. volat. cere. Cere. vel ʒ℔. ʒ℔. ʒ℔.
Onoff. Alchermes ʒ℔.
M. & Potia: D. S.

Potio Cochleatativa.

Cochleatim capiat, item:

ʒ℔. Aqu. Card. bened.
Galat.
ʒ℔. Samb. an. ʒi℔.
ʒ℔. Theriac. camph. ʒi℔.
Sal. volat. ʒ℔. ʒ℔.
ʒ℔. Diacord. Franc. ʒi℔.
Syrupi Card. ben. ʒi℔.
M. pro 2. dosibus: S.

Mistura Bezoardica pro 2. dosibus, bene circumagitanda.
Vel

ʒ℔. Aqu. Galaga.
Scord.
Cord. Hæc. Sax. frig. an. ʒi.
ʒ℔. Theriac. camph. ʒi℔.
ʒ℔. Tinctur. Flor. Aquil.
ʒ℔. ʒ℔.
ʒ℔. Diacord. Franc. an. ʒi℔.
ʒ℔. acotif. Ciri ʒ℔.
M. D. S.

Potio Sudorifica pro aliquot dosibus, item

ʒ℔. Aqu. Fl. Acac.
Samb. an. ʒi℔.
Galat. cere. Cere. res. ʒi℔.
ʒ℔. Theriac. camph. ʒi℔.
Cere. Cere. fac. igne ʒi℔.
Bezoard. Solar. ʒi. ad ʒ℔.
Extracti Theriac. gr. vi.
Lond. form. gr. ii.
Syrup. Fœnic. vel scord. ʒi℔.
M. D. S.

Potio Bezoardica, cochleatim sumenda.
Quando præscribimus Theriacam, Acetum dixi esse addendum:

ʒ℔. Aqu. Scord.
Rad. Scarcæ.
Aceti Vini an. ʒi.
Theriac. Androm. ʒi℔. (ubi Ethus urget,
ʒ℔. Diacord. Franc.)
Antimoni diaphor. ʒi℔.
Camphor. gr. vi.
Syr. Rati Idæi ʒi℔.

M. pro 1. aut 3. dosibus: S.
Potio Bezoardica pro aliquot dosibus.
Vel

ʒ℔. Aqu. Card. bened.
ʒ℔. Samb. an. ʒi℔.
T 2

Aceti Vin. Zi.
Theriac. Androm. (vel obi. Ethus nimis ur-
get, El. Diaph. Frac.) Zi.

Antimonii diaphor. Zi.
Syr. acetos. Ciri Zi.
M. D. S. ut antea.

Vel

Zi. Aqu. Pamar. vel Flor. Samb. Zi. vel Ziij.
Aceti Rutae. vel Scord. vel Theriac. vel Pfo-
ni Zi.

Theriac. Androm. Zi. ad Zi.
Antimonii diaphor. Zi. ad Zi.
Camph. gr. ii.

M. pro 2. dosibus: S.

Potio Bezoardica Sudorifica pro 2. dosibus.

Vel

Zi. Aqu. Card. ben.
Scordii an. Zi.
Succ. Ciri ros. Zi.

Theriac. Androm. Zi.
Bezoard. min. Zi.
Laud. op. gr. ii.

Syrapi Monba Zi.

Spiritus Nitri dulc. q. l.

M. pro 2. dosibus.

D. S. ut antea

Repetenda sunt talia aliquoties.

Zi. Aqu. Pl. Sambae.

Scabios. an. Zi.

Aceti Rutae. Zi.

Theriac. Andr. Zi.

Antimonii diaphor. Zi. ad Zi.

Bezoard. min. gr. xv.

Syr. Rubi Idai Zi.

M. pro 2. dosibus: S.

Potio Bezoardica Sudorifica pro tribus

dosibus.

Vel

Zi. Aqu. Card. bened.
Flor. Sambae an. Zi.
Liq. Cer. Cer. fuscis. Zi.

Antimonii diaph. Martial. Zi.

Cinab. Antim. Zi.

Syr. Papav. simpl. Ziij.

M. D. S.

Mixtura Sudorifica Bezoardica, cochlearium

lumenda.

Vel

Zi. Ag. Flor. Samb. Zi.
Aceti Pl. Samb. Zi. ad Zi.
Theriac. Andr. Zi.
Antimonii diaphor. Zi. ad Zi.

Syr. Card. ben. Zi.

M. pro 2. dosibus, pro eliciendo Sudore.

D. S.

Mixtura Bezoardica pro duabus dosibus.

Vel

Zi. Aqu. Card. bened.
Scabios. an. Zi. vel Zi.
Cinam. Zi.

Aceti Bezoard. vel Rutae. aut Sambae. vel Pl.
ni acetos. Zi. ad Zi.

Theriac. And. Zi. ad Zi.

Antimonii diaph. Zi. ad Zi.

M. D. S.

Mixtura Bezoardica pro aliquot dosibus.

Addi possunt etiam gr. iii. præterpropter Camphora:
capiat Ager hauriendo cochlearium subinde, itur Coc-
pus in blando maxeat madore, vel ubi major urget Ma-
lignitas, capiat pro tribus vicibus, expectando semper
Sudorem.

Vel

Zi. Theriac. Androm. Zi.
Antimonii diaphor. gr. xv.
Salis asphubli Zi.

M. pro una vel duabus dosibus: D. S.

Electuarium Bezoardicum.

Capiat in duabus cochlearibus aceti Vini.
Effervescit quidem, sed optimè Sudorem promoret, ma-
ximè in principio Febrium Malignarum, ubi observari egre-
gium olum, ac præcipue in Petechialibus.

Vel si Theriaca minus conveniat:

Zi. Conf. ex uno Cere.

Raf. rub. viridat. an. Zi.

Rob. Junperi Zi.
Elci. Diaphor. Frac. Zi.
Camph. Zi.

Com l. q. Syr. ex uno Cere f. Electuarium pro aliquot
dosibus: S.

Electuarium Bezoardicum.

Vel

Zi. Aqu. Rad. Scora. Zi.
Tencil. Cor. Cor. unci.
Aceti asphubli. vel simpl. Zi.

Succ. Ciri ros. Zi.

El. Diaphor. Frac. Zi.

Syr. Rubi Idai unci.

M. l. Potio pro tribus dosibus: S.

Potio Sudorifica.

Vel

Zi. Aqu. Card. ben.
Rad. Scora. an. unci.
Cinam. borrag. dr. vi.

Succ. Ciri ros. Zi.

Elci. Diaphor. Frac. dr. iii.

Syr. Rubi Idai Zi.

M. D. S.

Potio Bezoardica Sudorifica, cochlearium

capienda.

Vel

Zi. Aqu. Scabios. Zi.
Succ. Ciri ros. dr. vi.
Elci. Diaphor. Frac. dr. ii.

Antimonii diaphor. dr. ii.

Camph. gr. ii.

Syr. Card. bened. Zi.

M. pro 2. dosibus: S.

Mixtura Bezoardica pro du-

bus dosibus.

Vel

Zi. Aqu. Rubi Idai.
Scord.
Cardial. Nere. Saum.

Aceti Rubi Idai an. unci.

El. Diaphor. Frac. dr. ii.

Antimonii diaphor. Zi.

Bezoard. min. gr. xii.

Syr. Rubi Idai unci.

M. pro tribus dosibus: S.

Mixtura Bezoardica pro tribus

dosibus.

Vel

Zi. Aqu. Flor. Samb. unci.
Aceti Flor. Samb. an. unc. i.
El. Diaphor. Frac. dr. i.

Antimonii diaphor. Zi.

Camph. gr. i. vel ii. vel iii.

Syr. acetos. Ciri unci.

M. D. S.

Mixtura Bezoardica.

Capiat pro uno dosi, expectando probe Sudorem.
In Progressu morbi, & ubi Polartia, in specie Salphura,
cautius utrandu venit:

Zi. Aqu. Pamar. Zi.
Cor. Cere. fuscis. Zi.
Syr. mis. Zi. ad dr. i.

Antimonii diaphor. Zi.

Bezoard. min. Zi.

Syr. acetos. Ciri Zi.

M. pro 2. dosibus: S.

Potio Bezoardica.

Vel

Zi. Aqu. Scord.
Rad. Scora. an. unc. i.
Cor. Cere. fuscis. Zi.

Antimonii diaph. Zi.

Bezoard. min. Zi.

Syr. acetos. Ciri Zi.

M. pro 2. aut 3. dosibus, prout magis vel minus urget
Malignitas.

Zi. Aqu. Rubi Idai.

Ex Succ. Cere. nig. ana Zi.

Cor. Cere. fuscis. Zi.

Antimonii diaph. Zi.

Syr. Rubi Idai dr. i.

Spir. Nitri dulc. q. l.

M. S.

Potio Alterans Sudorifica.

Ufur.

Uſurgator pro 2. doſibus, expedando ſub moderatis temperatis ſudorem blandum.

Commodè huiusmodi Miſturis etiam Myrrha poteſt addi. In ſtatu cum Delirio.

℞. Aqu. ſimar.

Cardiſ. Her. Sax. frig.

Carduus, ana ℥i.

Cinnaſ. (ratione virium) ℥ii.

Beccard. min.

Cinnaſ. antimoni ana gr. xv.

Miri antimoniati ℥i.

Camph. gr. lii.

M. f. Potio pro aliquot doſibus: &

Potio Refrigerans & Conſortans.

In ſuprà ritare loco, & Traſſ. CNŒFELII iſigniter commendatur Miſtura de triſtaris tribus. Compoſitio eſt hæc.

℞. Mirt. de triſt. i. c. Mirt. ſimp. ℥vi.

Spir. de triſt. ℥ii.

℞. ſulphuris ℥ii.

Aqu. Fumar. vel alius alexiter. ℥li.

Syr. aceti. Citr. ℥i.

M. f. potiuncula pro ana doſi.

(Satis eſt potens & ita tam præſcribit CNŒFELIUS ſubjecta forſas habuit fortiora.)

Miſtura de triſtar, uti necum eſt, eſt Miſtura ſimplex. *Spiritus de triſtar* ſic componitur:

℞. Antimoni quintupla Miri parte in pulverem album fixati, & edulcorati: vel huius loco Reg. antimoni pulveris.

Sulphuris crudi pulveris fixati, ana ℥ii.

Miri puri. ℥vi.

Deſtilletur per retortam more ſolito, & f. *Spiritus de triſtar*, ſcilicet *Clyſtar*.

℞. Corv. Corv. ſus ignis ℥℥.

Antimoni diaphor. ℥i.

Cinnaſ. antimoni gr. xv.

Beccard. ſalar. ℥℥.

M. pro 2. doſibus.

D. S.

Polvis Beccardicus pro 2. doſibus.

Capiantur in ſequenti vehiculo:

℞. Aqu. Card. Her. Sax. frig. ℥℥.

Syr. Ther. camph. ℥i.

Syr. Nobi Mpi ℥vi.

M. D. S.

Potio ad Pulverem.

Vel

℞. Antimoni diaphor. ℥i.

Cinnaſ. antimoni ℥℥.

Camph. gr. v.

M. f. Pulvis in graviore Malignitate: &

Pulvis Sudoriferus Beccardicus.

Vel

℞. Pulv. diaphor. Ludov. ℥i.

Antimoni diaph. vel Beccard. min. vel Cinnaſ.

Antimonii ℥℥. vel gr. xii.

Sand. opior. gr. i. vel Camph. gr. ii. vel ℥ii.

M. f. Pulvis: S. ut anted.

Vel

℞. Ther. ſus ignis ℥i.

Antimoni Pulvis ℥℥.

Beccard. Ludov. gr. iv.

Camph. gr. iii.

M. f. Pulvis.

D. S. ut anted.

Vel

℞. Pulv. Bez. Bruneri ℥i.

Murr. oleoſ. gr. vi.

Camph. gr. ii.

M. f. Pulvis.

D. S. ut anted.

Vel

℞. Corv. Corv. ſus ignis ℥i.

Salis Card. brard. gr. vii.

Antimoni diaph. vel Cinnaſ. Antimonii ana gr. ℥℥.

M. div. in 2. part. æqua.

D. S. ut anted.

Vel

℞. Niri antimoniati ℥℥.

Beccard. min. ℥℥.

Camph. gr. iii.

M. f. Pulvis ad imitationem Riveri.

D. S. ut anted.

Tom. II.

Vel

℞. Pulv. rub. Pannon. gr. xv.

Miri antimoniati gr. xii.

Aur. diaph. Pulvis gr. v.

M. f. Pulvis.

D. S. ut anted.

Vel

℞. Corv. Corv. ſus ignis, aut, quod melius, Corv.

Corv. ſalar. (Corvæ Cervi incidit in

talcas, & ſit ſtratam ſuper ſtratam

cum Folis Auri) ℥ii.

Antimoni diaphor.

Cinnaſ. Antimonii ana ℥℥.

Sal. volat. Corv. Corv.

Succini ana gr. ii.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. part. æquales.

D. S. ut anted.

Quod ſi Convulſiones imminere vellet:

℞. Pulv. Bez. Mirk. vel Epilyp. diaph. Schrad. ℥i.

Cinnaſ. antimoni gr. xv.

Sal. volat. corv. corv. ℥℥.

M. pro 2. doſibus pro eliciendo ſudorem.

D. S. ut anted.

Mihi in Febribus Malignis cum Delirio aut Imminentibus Convulſionibus ſanariis eſt ſequens Pulvis, qui admodum conducit. Præſcriptio eſt hæc.

℞. Antimoni diaphor.

Cinnaſ. antimoni ana ℥℥.

Sal. volat. corv. Corv. gr. iv. vel v.

Succini gr. ii. ad v.

Camph. gr. ii.

M. D. S. ut ſuprà.

Potentiffimè Sudorem movet, ac ſimul Malignitati poſtcor reſiſtit. Hauriatur in ſequenti vehiculo:

℞. Aqu. ſer. Sambuci.

Scabioſ. ana ℥i.

Spir. Theriac. camph. ℥i.

Syr. card. brard.

℞. papav. rrrat. ana ℥℥.

M. D. S.

Potio ad Pulverem.

Quando Agyi ſunt inquieti, & anxietates habent nimias, cuilibet doſi Laudani opiani gr. i. vel ii. addi poſſunt, & operationem potenter promoves: vitandum tamen tempore Crifeos.

Vel

℞. Pulv. Beccard. Mirk. ℥i.

Cinnaſ. antimoni gr. v.

Camph. gr. i.

M. D. S.

Pulvis ſudoriferus Beccardicus.

Propſectur in diſto vehiculo.

℞. Antimoni diaphor. ℥i.

Cinnaſ. antimoni gr. xv.

Sal. volat. corv. Corv.

Piperac. ana gr. iii.

Succini gr. ii.

Camph. gr. iii.

M. f. Pulvis, ter in 24. horis repetendus.

D. S. ut anted.

Vel

℞. Antimoni diaph.

Cinnaſ. antimoni ana ℥℥.

Sal. volat. corv. Corv.

Piperac. ana gr. iii.

Camph. gr. iii.

M. f. Pulvis.

D. S. ut anted.

Vel

℞. Cinnaſ. Antimonii gr. xv.

Sal. volat. Cranii hum. gr. iv.

Succini gr. iii.

Camph. gr. ii. vel iii.

M. f. Pulvis.

D. S. ut anted.

Vel

℞. Cinnaſ. Antimonii ℥℥.

Antimoni diaphor.

Sal. volat. corv. Corviana gr. v.

Camph. gr. ii.

M. f. Pulvis.

D. S. ut anted.

Vel

℞. Cinnaſ. Antimonii gr. xv.

T t 2

Sal.

Sal. volat. cornu Cervi,
Piperis. ana gr. iv.
Campb. gr. iii. iv.
M. D. S. ut antea.
Vel

℞. Corn. Cervi sine igne ℥i.
Sal. volat. cornu Cervi gr. vi.
M. S. ut antea.

Vel præfribatur Pulvis ex tribus *Salibus Refractoriis* ex omnibus tribus Regnis, quem commendat in sua *Affirmatio*

℞. Beccard. mineral. gr. vi.
Sal. volat. cornu Cervi gr. iv.
Cord. brond. ℥i.
M. pro dosi.
Vel

℞. Cornu Cervi sine igne, vel Unicorni, veri præp.
Antimonii diaph. ℥i.
Cinnab. Antimonii an. gr. vi. vel viii.
Amyrh. gr. iii.
Sal. volat. Corn. Cervi vel Piperis. gr. viii.
M. f. Pulvis pro 1. dosi & S.
Beccardicus Pulvis sudoriferus.
Vel

℞. Elor. sine igne, seu Pulv. Diaph. Lad. gr. xv.
Antimonii diaphor. ℥i.
Sal. volat. cornu Cervi gr. v.
M. f. pulvis.
D. S. ut antea.

Capiatur in frequenti vehiculo:

℞. Aqu. Flor. samb.
Scabini. ana ℥i.
Syrup. papav. simp. ℥i.
Cord. brond. ℥i.
M. D. S.
Potio ad pulverem,
Vel

℞. Cornu Cervi sine igne ℥i.
Bra. Oris. vel Beccard. min. ℥i.
Sal. volat. cornu Cervi gr. iv. vel v.
Campb. gr. i. vel ii. vel Lad. opiat. gr. i.
M. D. S.
Beccardicus pulvis confortativus.
Vel

℞. Antimonii diaph. gr. xv.
Sal. volat. Piper. gr. vi.
Campb. gr. iii.
M. f. pulvis.
D. S. ut antea.
Vel

℞. Pulv. Diaph. Lad. ℥i. ad ℥i.
Sal. volat. cornu Cervi gr. vi. ad ℥i.
Campb. gr. i.
M. f. pulvis.
D. S. ut antea.

Cum patiente sentit calorem inactum, neque os capitis dolorem dormire possit:

℞. Elor. sine igne,
Antimonii diaphor. ana ℥i.
Sal. volat. cornu Cervi gr. v.
Campb. gr. i.
M. f. pulvis.
D. S. ut antea.
Vel

℞. Cord. brond. min. ℥i.
Terra sigillat. ℥i.
Thur. sigillat. gr. xv.
Lad. opiat. form. gr. iv.
M. f. pulvis pro 4. dosibus &
Beccardicus pulvis confortans.
Vel

℞. Pulv. Beccard. Min. gr. xv.
Beccard. min. ℥i.
Lad. opiat. gr. i.
M. f. Pulvis: S. ut antea.
Vel

℞. Corn. Cervi sine igne ℥i.
Antimonii diaphor. ℥i.
Beccard. min. gr. vi.
M. pro dosi, præsentis periculi.
D. S. ut antea.

℞. Beccard. animal. ℥i.
Solar. ℥i.

Lad. opiat. gr. i.
M. f. pulvis.
D. S. ut antea.
Vel

℞. Conferv. pap. Ciri ℥i.
Elor. diaphor. Frang. ℥i.
Antimonii diaphor. ℥i.

Com. f. q. *Succi Ciri f. Electuarium: S.*
Electuarium Beccardicum confortativum, pro aliquot dosibus.

De hoc crebrius *Eger* capiat pro lapsu, in vel extra sudorem, ut in continuo corpus servetur sudore.

Chirurgus quidam ex prægressis Ira, & Contagio, in Noloquio contracto, febri malignissima afflictebatur; motu extremi labores, h. e. *Alia* intensius, Cephalalgia gravissima, Inquietudo anxiosa, pulsus inæqualis, Vires prostravit, &c. intra paucas horas *Ægrum* predecebat. Ipse sponte sua post mediam noctem Venam secit: mane vocatus propter spirituum urgentiam in Morbo peracuto præscripsi:

℞. Aqu. ferd.
Cordial. Mart. San.
Rubi Idai ana ℥i.
Corn. Cervi sine igne ℥i.
Cinn. antimonii ℥i.
Sal. volat. corn. Cervi gr. xv.
Succin. gr. viii.
Lad. opiat. per form. gr. ii.
Syr. Flor. Tonic. ℥i.
M. pro 2. dosibus,

Acceptis, bene sudavit, & longè melius habuit, Nempè in Morbo adeo acuto, cum tam subitanea symptomatum invasione, blandè Anodynis nimis impetus spirituum nonnulli refrænuandus, ne dissipati hand sufficient pro statu Morthi, quin & quietior *Æger* nonnulli redditus facilius sudare queat, In incremento ergo Morthi turbis, circumspici tamen, usurpari debeat, Vespere præscripsi;

℞. Pulv. Beccard. samb.
Unicorni veri præp. ana ℥i.
Beccard. Solar.
Jervial. auc. gr. vi.
M. pro 2. dosibus.

Quarum unam appetente modo, alteram circa zurorem capiebat, hauriendo simul subinde pro habita de frequenti Mixtura:

℞. Aqu. ferd.
Pl. samb.
Rubi Idai ℥i.
Arcti Rubi Idai ana ℥i.
Elor. diaph. Frar. ℥i.
Syrup. arctof. Ciri ℥i.
Mik. pro potione.

Sudavit, dormivit, commodè habuit, & ita brevi talibus continuatis convaleuit.

Iuxta cum dictis Remediis alexipharmacis propter sitim, etiam interdum propter *Æthum*, item propter debilitatem *Ægrorum*, in q. post sudorem, subinde scilicet pro scopo alexipharmaco & alterativo: *Julepi* blandi aciduli confortantiori commodè propinquant, inter quæ emiser citrus, succus citri, & omnia cum citro parata, & spiritus nitri dulcis. Ordinatur ergo Decodum citri *Amygdali* supra insinuatum pro Julepo, aut Julepus ex decocto citri cum Radice *Coronariæ*, quem habet *FEHR* de *fermentis* pag. 61.

℞. Pom. Ciri pp. N. ii. c.
Incid. cum corticibus in taleolas tenues;
adde
Sacch. albif. ℥i.
Rad. feran. ℥i. vel ℥i.
Aqu. fer. lvi.

Coqu. ad tertias, & colectur. J.
 Vel Julepus ex decocto citri, cum quo Tinctura Rosarum efflenda, ad imitationem *TLEMANNI* de *Mor.* *Med. pag. 2.*

℞. Pom. Ciri N. ii.
In taleolas dissecta confregantur cum
Saccharo albo.
Coqu. in l. q. aquæ ad mens. ℥i.

Colatura frigida detur sola.
 Vel etiam cum ea, & *Succo Ciri Tinctura Rosarum* ex-
 tribatur, & cum *Syrupo de sicc. Ciri*, omisso saccharo, &
 gulcoretur.

℞. Decoct. Corn. Cervi cum Rad. feran. ℥i.
Tinct.

Finis. Pl. Aquil.

Peen. ana. ℥i.

Syr. acerf. citri ℥i.

Rubi idai (qui arandum commendatur

à GESNERO) ℥vi.

Spir. Nitri q. i. ad gratum laporem, & propi-

netur pro potu. S.

Julepus Refrigerativus & confortativus.

Vel

℥i. Decoll. corn. Cero. cum rad. scora. ℥viii.

Succi citri;

Cydon.

Tinctura flor. papav. prom.

Peen. ana. ℥i.

Syr. papav. simp. ℥i.

Pl. tonic. ℥vi.

Spir. Nitri dale. parum.

M. f. Julepus in Malignis cum Agrypnis & Delirio.

D. S. ut supra.

℥i. Decoll. Citri Myrs. ℥i.

Succi Granat. acid. ℥i.

Ribium ℥i. ad ℥i.

Syr. Rubi idai q. i. pro grato sapore.

M. f. Julepus S.

Julepus citrius Refrigerativus & confortans.

Vel

℥i. Decoll. corn. Cero. cum rad. scora.

Citri Myrs. ana. ℥i.

Aga. cinnam. ℥i.

Tinctura flor. rosar.

Tanic. ana. ℥i.

Syr. Ribium ℥i.

Chyl. ammoniaci sulphurati q. i.

M. S. ut supra.

℥i. Decoll. citri ℥i.

Syr. rub. idai q. i. pro grato sapore.

M. S. ut supra.

℥i. Decoll. citri Myrs. ℥i.

Gelat. corn. Cervi res. ℥i.

Syr. ceraser.

Rubi idai ana. ℥i.

Succi citri q. i. pro grato sapore.

M. f. Julepus.

D. S. ut supra.

Propinatur in specie, ubi Volatilibus sudor fuerit pro-

vocatus. Vel

℥i. Decoll. rad. scora. cum corn. Cero. ℥i.

Gelat. corn. Cervi. res. ℥i. ad ℥i.

Succi rubi idai ℥i.

Citri ℥i.

Syr. acerf. citri q. i.

M. D. S.

Julepus Refrigerativus & confortans.

Vel

℥i. Decoll. rad. scora. cum corn. Cero. ℥i.

Gelat. corn. Cervi. res. ℥i. ad ℥i.

Succi rubi idai ℥i.

Citri ℥i.

Syr. acerf. citri q. i.

M. D. S.

Ursupatur subinde intermedium necesse sudandus semper,

etiam in sudore. Vel

℥i. Rad. Nigell. ℥i. ad ℥i.

Copa. in q. Aqua. ℥i. ad ℥i.

Succi citri res. ℥i. ad unc. ii.

Syr. ex ruta citri ana. ℥i.

Spir. Nitri dale. q. i.

M. S. ut supra.

℥i. Decoll. rad. scora. cum corn. Cero. ℥i.

Gelat. corn. Cervi. ℥i. ad unc. ℥i.

Succi rubi idai ℥i.

Citri ℥i.

Syr. acerf. citri q. i. pro grato sapore.

M. S. ut supra.

℥i. Decoll. corn. Cero. ℥i.

Succi Granat. ℥i. vel ℥i.

Ribium ℥i. vel ℥i.

℥i. Dilect. Fros. ℥i. vel ℥i.

Syr. Rubi idai ℥i. ad ℥i.

Spir. Nitri dale. parum.

M. D. S.

Julepus Bezardicus bene circumagitan-

Vel

℥i. Aqua. fusa. ℥i.

in qua dissolv.

Gelat. corn. Cero. res. ℥i. ad ℥i.

Syr. Rubi idai ℥i. vel ℥i.

Pop. alk. ℥i.

Spir. Nitri dale. ℥i. vel q. i. pro gratia saporia.

M. D. S.

Julepus Refrigerativus.

Egrege etiam convenit infusum ex Floribus, cum spi-

ritu sulphuris sub forma Julepi propinatum.

Quibus placet, etiam Decellum Tamarindum usurpare

possunt, quando nempe Alvus sonnil liberanda vacat.

℥i.

℥i. Decoll. Tamarind. cum Falsal. ℥i.

Syr. acerf. Citri.

Rubi idai ana. ℥i.

Spir. Nitri dale. parum.

M. D. S.

Julepus Aperitivus.

Item

℥i. Aqua. Mentha.

Rubi idai ana. ℥i.

Succ. Cydon. vel Rubi idai ℥i.

Tinctura Fl. Bellid. ℥i.

Corn. Cero. fusa ana. ℥i.

Anisum diaphor. ℥i.

Syr. Rubi idai ℥i.

M. D. S.

Mistura Refrigerans & confortans, bene circumagitan-

da.

Vel

℥i. Aqua. acerf.

Rubi idai ana. ℥i.

Gelat. corn. Cero.

Succ. Rubi idai ana. ℥i.

Citri ℥i.

Syr. ex ruta Citri ℥i.

M. S. ut antea.

℥i. Aqua. acerf. ℥i.

Succ. Berber.

Ribium ana. ℥i.

Gelat. corn. Cero.

Syr. acerf. Citri ana. ℥i.

M. S. ut supra.

Pro viribus refocillandis:

℥i. Aqua. rubi idai ℥i.

Cordial. Nera. Sax. frigid. ℥i.

Succi Citri res. ℥i.

Conf. Alchor. ℥i.

Syrapi acerf. Citri; vel Rubi idai unc. i.

M. S. ut supra.

Inter Extrema ad promovendum sudorem non inco-

sum est, ut eo tempore, quo in Febris Malignis &

Pessimalibus internis proponatur Remedia Suavisera

Alexipharmaca, simul imponentur panis parvus recens &

calens ex furno extrahis, qui ablata crusta inferiora pau-

lulum excaverit (cuius Grana sicut vossische Nese gra's) & in

cavitatem Theriaca imponentur, hinc Vinum generosum in-

fundatur, & ita calide Umbilico imponentur; sit enim ca-

inde, ut panis, dum Ager sudat, Venenum malignum se

infundatur, adeoque interdum, ubi Umbilico adhæserit, co-

lore cereuleo imprægnatus eportus fuit, utpote quod di-

cunt certum Malignitatis signum. Panis remotus sepe-

liendus, ne alius Homini vel Bruto nocere possit.

Quod & functum illud symptoma, Nausea hanc nem-

pe horum, urgent in Febris Malignis quod interdum

venit, Epithemata Fronti applicata conveniunt, sed inter

alia Remedia confert Bala exsiccatum in ombra, con-

terus, & sub Axillis applicatus; quod ipsum Remedium

imprimis Variolis prodest.

Diarrhea si urgent, pulvis panonicus ruber a ℥i. ad

℥i. Item Theriacalis & Oplata cum Sudoriferis histeri-

bus usurpata sunt convenientia.

℥i. Corn. Cero. ubi prop. ℥i.

Bell. Arm. vel Unc. fuf. ℥i.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Adstringens & Confortans.

Vel

Vel
 24. Terra sigillata,
 Ceru. Ceru. sine igne an. gr. xli. ad xv.
 Bal. valat. ceru. Ceru. gr. vi.
 M. l. pulvis.
 D. S. ut auro.
 Vel

24. Aqua. 7l. Sumb. 3ii.
 Spir. Theriac. simpl. vel camp. 3ii.
 Ceru. Ceru. sine igne 3ii. vel qñi prop. 3ß.
 Terra sigillata. vel Ther. sigill. 3i.
 Syr. acuf. Ciri 3ß.
 M. D. S.

Potio bezoardica adstringens: capiat cochleatim.

Vel
 24. Aqua. 7l. Sumb. 3ii.
 Spir. Theriac. camp. 3ii.
 Ceru. Ceru. sine igne 3ß.
 Bezoard. min. 3i.
 Symplic. 3ii. vel 3ß. vel 3vi.
 M. pro 2. doibus: 3.

Mixtura Adstringens pro 2. doibus.

Quando stomachi symptoma, Vomitus, Cardialgia,
 &c. urgeat:

24. Tasmak part. iii.
 Bal. Peru. part. i.

Blando igne liquefacta malax. cum l. q. Theriac, exten-
 datur super alutam in forma scuti stomachalis.

D. S.
 Emplastrum stomachale.

Ad præcavendas Cephalalgia & Deliria, Epithemata
 capiti applicari possunt:

24. Aqua. Verben. 3ii.
 Spir. Mal. camp. 3i.
 Opus gr. v.
 M. l. Epithema.

D. S.
 Epithema circa caput.
 Cum lineis multiplicatis tepide applicetur.

Quando Vires sunt facies & arida, sine crustis pituitosæ
 præsentia, optimum observari remedium:

24. Aqua. cam. 3iiß.
 Spir. Vini rectif. 3i. vel 3ß.
 Mell. cochl. i. vel ii.

Mixta ulsperetur pro Oris collatione.

D. S.
 Gargarisma Refrigerans.

Hæc de febribus Malignis in genere.

C A P U T VII.

De Morbo Castrensi.

Variare Febres Malignas in specie pro adjunctorum
 Symptomatum impennis varietate, supra dictum
 fuit. Sic ubi in Febre maligna observatur intensissimus
 Capitis Dolor, una cum Affectibus Ventriculi anxiosis,
 in specie cardialgia horrida, vocatur *Morbus Hungari-
 cus* seu *Febri Castrensi*, cum imprimis in Castris inter
 Milites ex igualiore caltrotum oriri solet. Est Maligna
 admodum & consensiva præ cæteris Malignis Febribus,
 tria symptomatum acerbis affligentium stipata; nempe

1. Gravi cardialgia & Anxietate; hinc
2. Inolerabili cephalalgia, Agrypnia, indeque gravissi-
 ma Deliria; ac deque
3. Graviori Præcordia.

Quibus & Dolor sine Lassitudine Artuum & Osæcopæ (E),
 & subinde Atol sine se silent locare. Germ. die Hung.
 Krankheit, die Ungarische Krankheit, distinguendo Sacus,
 appellari solet, in specie de secundum Esperientium di-
 ctis: De hoc Morbo tractavit MARTINUS RULAN-
 DUS, aliique plures.

C U R A.

Si ergo Febri Maligna fuerit Morbus Hungaricus,
 præmissa Vomitus supra dictis Remediis curari debet, So-

docem subinde imperanda. In specie *Vimaria* in Morbi
 Principia sunt admodum necessaria: hinc etiam Vinarum
 Rasinarum seltæ, respectu nempe *Præcordia*; loco quarum
 Vinum *Francis* quidem locare amant, respectu habito ad
 Cephalalgiam & Deliria.

Remedia inter pro Julepo commodè interservit Decoctum
 cornu Cervi cum succo Cetri: pro Diaphoreticis spiritus
 Theriacalis camphoratus, Liqueur Cornu Cervi facci-
 parus, Eleduarium Diaconidi *Fracturæ*, Cinnabaris na-
 tiva & Antimoni, pulvis pannonicus rubens à 3ß. ad
 3ii. imprimis hac palvis *Wini* laudari solet, sudorem
 facitum pellens.

24. Pl. Salsparili 3i.

Succus albi.

Cornu Cervi sine igne ana 3ß.

Terra sigillata. 3ß. vel 3ii.

M. l. pulvis.

Propinetur cum Aqua Card. bened. vel cum Vino Ab-
 sine the, præprimis, si cum rigore ioculari affectus.

Quibus & Nitrum antimoniatum, præsertim in Potu,
 subinde addi potest.

Hungari sequenti utitur Esopistum.

24. Allii bulbos, quem spiritum Vini imbibunt &
 cocturando, & hac pulicula corpora Aggroarum suc-
 citer fricando inungunt, ac deinde linteaminibus be-
 ne cooperiendo ad sudorem compoñuntur; quo per-
 alia statim levamen acquiritur.

Contra Præcordia, quæ imprimis urget Morbo Hunga-
 rico affecto:

24. Semperviv. maj. q. v.

Contund. ac pro singula 3ii. adde

Salis Ammoniac 3ß.

Reponantur loco humido subterraneo, donec Sal li-
 quefactus, sit, hinc Liqueur expressus & filtratus, vel
 idem prius per Alembicum destillatus pro eluendis
 Fauibus & Collo adhibetur:

Vel

24. Aqua. Semperviv. maj. 3i.

Succi rindem 3ii.

Salis Ammoniac 3i.

M. pro Gargarismo.

C A P U T VIII.

De Febribus Petechialibus.

Quand in Febre Maligna hinc inde se manifestant
 Maculae corporis cutim tingentes, propriè *Pete-
 chia* & *Febri Petechiali* dicta, Germanis das
Plecksieber, præ aliis frequent; alias etiam Febri Pulica-
 riæ, Febri Leuculariæ, Icticulariæ, item Præcordialiæ, vo-
 catur.

Observetur tamen primariò, quòd sæpius quidem in
 Morbis Malignis erumpant Maculae, quæ constituunt Fe-
 brem petechialem, non tamen præciè signa Signa patho-
 gnomonica Febri Malignæ: Multi enim sunt Morbi, in
 quibus apparent Maculae Symptomata, ut ut præciè
 sint Morbi Maligni. Se interdum in Febribus Ter-
 tianis sub fine paroxysmorum subinde Maculae coloratur
 corpus aere sudore, quæ post sudorem evanescent, ut
 ut non adit Febri Malignæ. Ita etiam in Scorbutis, le-
 viores licet, subinde rubundis Maculae tingitur cutis, ut
 Agri ubi de Malignitate conqueantur. Habent hoc
 singulare imprimis Febres Særbusæ, ut Macula Pulicam
 moribus similes, interdum etiam graviores, in partibus
 erumpant, ubique tamen Malignitatis nota. tunc
 tunc maculae illæ maxime apparent in Febribus Malignis,
 petechialibus ideo dictis, quales interim Febres cum
 maculis comitant copiosissimis, præ aliis Malignis, cæ-
 teris patib, magis videatur lente, minisque acuta, pe-
 riculosa tamen esse solet, Agrique ad tertiam aliquis
 etiam seu ad 40. diem incant, & desiciunt, acrum conva-
 lescent? an vero perant?

Symptoma hæc Febrium, præter reliqua cæteris
 malignis communia, sunt insignis lassitudo totius Cor-
 poris, Dolor eius contondens & lancinans universalis. Di-
 cunt Agri: *langere ista omnia membra, & ossa ista, ac si*

(E) Osæcopos, & Osæpopos, & c. Ossa tundens vel frangens: ab istis, Os, & osæ, frango. Epith-
 em Doloris, qui Frangitivus dicitur, quod ille videatur veluti frangi Ossa.

fufigari offent. Vires simul mot languide prostratæ. Febre nihilominus miti adhuc existente: Nam Calor non adeo vehemens est in toto Corpore, minime mordax, quam in Ardente etiam mitiore: ferè tamen veespertino tempore intendi observantur; imò interdum in principio tam mitis est, ut *Ager* vix se aggrore sentiat. Hinc supervenit interitum et continuus Dolor ac Capitis Dolor gravitativus, ut nesciant, ubi sit: Agrypnia, Anxietates, & Jactitationes Agrorum; in principio facili, in progressu difficiliore, in statu plane non fidant, vel sponte, vel Medicamentorum ope: interdum interdum quiores, noctu anxiosi magis redduntur, & gravius affligi solent. Inde, præter ea, quæ *suprà de Causa Febrium Malignarum* dixi, Lympha simul ad Acido volatili acri peccante insignis ingulari, colligo & exilimo: hinc enim est Exacerbatio veespertina & nocturna, sicut & difficultas Sudoris inde derivanda veniunt. Subinde Alvi Ritus variorum fumosorum, utpote foetidiſſimorum, excretorum supervenit, quæ omnia & aliis Malignis sunt communia; saltem quod *Macula* raro quartæ *ſapies circa ſeptimum, erumpere ſolent*, præsertim circa Pedus & Scapulas; hinc & Abdomen, & Crura; tandem etiam Brachia iisdem tinguntur; *ſpecies ordinariæ libere effluſæ.* Maculae hæc non solum externas, sed etiam internas partes affligere solent, celsæ CASTRO *de Pyſte* pag. 76. Interdum non Macula solum, sed etiam *Miles* in his Febribus apparent: vid. MAJOR *Differt. de Chirurg. Insul.* p. 260. Deliria quoque & Convulsiones frequentissimè in statu superveniunt, quæ tempore etiam in Morbo salubri, & multo magis in declinatione, quasi Pyralis quidam, h. e. copiosæ Salivæ, mucosæ, eaque continua ex Ore & Faciliis, cum euphoria Agri excreta. Continua ferè esse solet hæc Febrix: hinc rarum est, Intermittemtem eandem fuisse observatam à FEHR *de Scortis* pag. 72.

Confundit interdum *ſcilicet Pulicum morbus* cum Petechiis. Ut ergo isti commodè distinguantur in Petechiis, sciendum: quod Pulicum morbus seu maculae in centro suo habent punctum ruberrimum, morbus vestigium, quod deficit in Petechiis: Præterea Pulicum morbus apposita ſarina Lupinorum, cum Aceto aut Oxymelito subacta, subito evanescunt; Maculae vero Malignæ seu Petechiis applicata, nequaquam. Autore ZACUTO LUSITANO lib. 3. *Prax. Admir. Observ.* 14. Maculae hæc in Morbo salubri efflorescentes interdum rubent inſar Pulicum morſum, hinc pedetentim pallent, flavescunt, sicque evanescunt; & quæ magis rubicundæ sunt, eò meliora sunt eoræ; contra, quæ ex rubore livescunt, seu, ut alias loquuntur, plumbei coloris sunt, vel quæ nigrescunt, à Belgis *Paper-Kruis* dicunt, hæc ipse omnium pessime sunt: & quod magis tales, eò deteriori sunt conditionis, quia hæc extinctionis seu destructionis Spiritus Insiti notitiam ingerunt. Nempe sicut Acida corolliva paribus mortificando, vegeto adhuc Spiritu, Colorem primo rubrum, hinc Spiritu deficiente album efficiunt, penitus verò extinctione Spiritu & putrescente parte nigrum Colorem inferunt: ita quod major est Virulencia Malignitatis, Indeque superficie Cutis major vel minor Mortificatio, eò etiam Color magis vel minus lividus aut nigricans esse solet. Mortificatio enim hæc in extinctione seu destructione Spiritus Insiti consistit, quod vegeto rubent partes cutaneæ afficiat, deficiente eodem, ad nigredinem vergunt, ut in Gangrana ac Sphece notum est: Unde & Petechiæ veluti insulæ: Elcharum simul indolentes observant fuerunt: vid. M. A. N. C. *Ann. d. Indoct.* III. pag. 146.

G A U S E.

Petechiales hæc Febres ferè primitivæ ex corruptione interna Continentum oriuntur, adeoque, tam Malignam Sanguinem alicuique Humores, quam Spiritus, virulencia sua afficiunt: Sanguis nempe corruptus, & à Fermento acido volatili acri Putredine inquinatus, & ob id à reliquo Sanguine separatus, Seroque imbutus, huius vehiculo (dam Expirationi omnimodè ineptus est) sub Cuticula cum Glandulis malis reſidit, & ibidem iterum Maculas infert. Contagioſæ tamen admodum sunt, ipſo, tamen Contagio minus spirituosum, minisque activo existente, ut latere aliquandiu queat, antequam se exerat. Interdum epidemicè grassari observantur: Vid. FEHR *l. 1.*

P R O G N O S I S.

Quoad Prognosis. Febrix Petechialis, quod magis blanditur, eò magis nocet sæpè cum omnia pacata apparent,

Mors imminet; sæpè Morti vicini præter expectationem evadunt. Alias periculosa valde est Morbus, quod plures moriatur, quam evadant, annotante HORATIO AUGUSTINO 7. l. 1. 5. & SENNERTO *de Febribus* p. 537.

Maculae purpureæ quæ plures, quæ majores, eò benigniores, item si criticè erumpant, Naturæ victoriam præstunt; contra verò, si contrario se habere modo.

Quod si sit, ut retrocedant, ingens periculum imminere solet.

Quod magis lata, copiosa, & bene colorata, nempe rubicundæ seu languineæ sunt Maculae, eò melius Signum virides enim & flavæ Maculae sunt deterioris; cæruleæ, lividæ, & nigrae sunt omnium pessimæ, cum virum debilitat magnum periculum portendunt, Malignitatis mortificantis indices; colore autem Cictrum magis sunt periculose.

Macula pauca, Febre magis ingravescente, & Urina crassa existente, ferè sunt Infales. Macula, quæ subito disparuit aut reſtat, periculossimæ.

Criticè dixi erumpere debere Maculas & Pusillas: Nam, quæ ante Signa aliquis Colationis erumpunt, aut quæ inordinatè paucæ, neque bene coloratæ produnt, eæ periculossæ sunt: motum enim Naturæ coactum innotuit, læpiusque recurrit. Quod magis cum Macularum eruptione Colationis Signa apparent eò melius. Erumpere ergo debent copiosè & bene coloratæ, die 4. vel 7. vel 10. 11. 12. &c. præcedentibus aliquibus Colationis Signis.

Hæmorrhagis parca suspensa; larga in incrementum, die critico, aut indicatoria, erumpens, bona; post Maculas verò jam efflorescentes suspensa.

Excrementa Alvi nigra & fetida, sunt periculosa.

Quoad tempus Evadendi: minus quam alie Malignæ acutè esse solent, sed lentè quasi sua tempora percurrunt, ita ut in Statu 6. 8. & plures dies eodem tempore persistant Agri, antequam vel in melius, vel in deterius fiat mutatio: Vid. D. BURSER, Physicus olim Annæbergensis *de Febre Petechiali*.

Quoad modum Evadendi: Qui Morbum non negligunt, & statim his initium utuntur Remediis commodis, facili interdum liberantur, nonnunquam 11. 12. aut 14. die: ita verò Curationem differunt, & Aerem liberiorum non devitant, distilla decumbant, sæpius succumbant. Interim tamen, si omnia rectè procedant, nec Vires adeo fuit prostratæ, ferè intra 14. dies Acutorem morbo cessant.

Solvitur epidemè interdum per Criticam Hæmorrhagiam Naturæ, vel Sudationem, vel Urinam, quod tamen raro apud nos contingit, quin successivè apud nos per Diaphoresin autem evanescere solet. Interdum etiam Metastasi Prædelli morbi seu Materie colæ in quendam locum ſinitur: sic per Apſtema in Testibus Febrem Petechialem terminari aliquoties observavit ROLFINGIUS.

Reſcurſus seu retroſſus Mentiorum & Pusillarum fit ita: Maligna malignum volatile enim Morbi figuræ & quæ præcipitatur, & intra Cutim ac Cuticulam deponitur: sed ex Sanguinis effluſione ferociore, dum novum fit perficere huius, fit, ut retrocedat, & præsentanea Mortem interdum infuset, ad quod malum simul contribuit ambuſus Aeris frigus.

G U R A.

Quoad Curam Febrium Petechialium: nihil singulare obtinet, sed eadem indicationes atque *ſuprà circa Febre Malignæ in genere* infirmæ fuerunt, etiam hic speciatim observari aut applicari debent vel possunt: Saltem observentur hæc Cautela:

I. Vomitoria in Petechialibus præ aliis Malignis maxime proficua esse: cum mori à priori principio graves Anxietates solant prehendere Agros, quæ curam, eorum incrementum præcaveat, & ita longè quietiores reddere possunt Agros, propinata maturè Vomitoria. Purgatio, nisi in primo ferè principio, nocet, Experientia teste, quod alias ad Diarrhozam de facili proclives sint Petechiis laborantes, quæ maxime esse lethalis. Quin & apparentibus jam Petechiis, aut Maculis, à quocunque humore abluendum, & ne quidem ad Clyſmata aut Suppositoria facili esse succedendum, ne impediatur Naturæ motus.

II. Praeparatio nullius usus est, cum Febrix ipsa minoris sit conditionis, magisque urgat Malignitas, ut MENJOTIUS *de Febre Mal.* eam tamquam remedium, Naturam antea aliqua parte levans, commendat. Lethalem eam docet esse FORESTUS in Schol. *Observ.* 36. l. 7. Noticiam verò ostendunt BARTHOLOMÆO *lib. 1. de Hæmorrh.* lib. 2. pag. 190.

III. *Sudorifera* ergo primum ducant, speciatim in Principio & Incremento, dum adhuc sudare possunt ac solum *Ægri*, unde sub illo tempore Volatilia, in specie Theriacalia, rusticissime adhibentur: in Progressu vero Morbi ac Stata Fixioribus saltem indulgendum, devictis jam prioribus Malignitatis atrocis, jamque, quod reliquum est, Natura operante. Quod si gravior sit Malignitas, ad minimum ter in 24. horis portigenda sunt Remedia. Observanda tamen hic *Caute* 8. quam *supra* in *Cura Febrium Malignarum* in genere insinavi, ut pro varietate Circumstantiarum possimus variare Medicamenta, propinando nunc Abhorrentia, nunc Sudorifera Volatilia; nunc sola, nunc nulla invicem cum Acidis. Sudor autem non excitetur nimis, quin Virium semper habeatur ratio, propter quem respectum, nec linteis nimis vel stragulis opprimendus est *Æger*, sed tolerabiliter saltem coartandus.

IV. Observandum: an Pectechiarum eruptio sit Morbus? an Productum morbum? an Excretio Symptomatica? an verò Critica? quod Pectechis isompetitivè, b. e. symptomaticè potius quam criticè erumpentibus, non insistentium sed nimis per Sudoriferis, sed potius Effuscentiam nimiam sistendis, adjuvatis simul Alexipharmacis, utendum. Hinc enim rectè JOHANNES STEPHANI in *Operibus Medicis Decad. 9. Conf. 6.* inquit: Minus sunt sperandi illi, qui quancunque Crise efflorescentiam Pectechiarum nomine dignantur, etiam si aut Febri sit intermittens, aut in se minima. Pectechie enim genuinæ sunt Symptomata Febris Pestilentialis, conjuncta cum fervore sanguinis. Hæc ergo, dum Criticæ sunt, nempe, quando dis quarta, vel septima largiter erumpunt, id quod fit cum *Ægri* aliquo levamine, promovere debent blandis Sudoriferis, quæ inter nihil melius est Emulsiōne ista ex seminibus lupæ nominatis Expellentibus propinata. Ubi verò Pectechie in principio vel incremento quidem erumpunt, sed ipsarum, & sponte crantiscunt, itaque debilitetur *Æger*, tunc excretio erit Symptomatica; ubi negleximus Sudoriferis validis potius cum temperatis Acidis Alexipharmacis feror Sanguinis refræniari debet, & coque patris Excretionem promovemus, nisi facta sufficiente Precipitatione Sanguinis, Sudoriferis debitis earum proventus promovendus.

V. Apparentibus jam Pectechis, abstinendum non solum est *Ægeri* Laxantibus, sed etiam Clystima cautè, nec nisi blanda, atque nonnisi necessitate urgente, lascienda. Maculis autem jam apparentibus supervenient fortè Alvi Fluxus, hunc cautè est tractandus, & non adeo subito, nec simpliciter supprimendus, nisi aut copia exeserit, aut Maculas retrocedere faciat, aut sensibilibus *Ægri*um debilitet: Est enim intentum quodammodo Naturæ motus evacuationem materię sensibilibus molientis, & ob id non incautè supprimendus; idque præsertim, si Affectus non tam ex Contagio, quam interio spontaneo vicio Contentorum ac corruptela originem duxerit, ita tamen regatur, ut Maculas expulso, quantum possibile, promoveatur, non verò ab illo Alvi Fluxu cohibeatur. Verùm, licet non sistant talis Alvus fluens, sedulo tamen insistentium & Sudoriferis, & Alexipharmacis, quo ita magis deprimere venientes sicut symptomatici, & subinde lethales; propterea cum Alexipharmacis miscenda simul interdum Adstringentia blanda, ut ita succellivè Fluxus in hoc casu potius suffraginetur, ac omne malum præcaveatur.

VI. Si ulla est Febri, in qua *visceraria* convenient, est imprimis Pectechialis, speciatim quando retrocesserint Macule: raro enim aut nunquam denud apparet solent, sed vel superveientibus nervosi generis Symptomatibus, nempe Delirius & Convulsioibus, *Ægri* intrent, vel succellivè per eandem Diaphoreticam saltem morbus solvitur. Ut ergo accipititali in casu *Ægri*um levemus: item si alias graviora nervosi generis Symptomata imminuant, ut ordinatè in Scaturum Febrium affolet fieri: consuecissimum est, maturè applicare *visceraria* in Pedibus ac Brachijs, prout plūs reusurgit urgent Symptomata: Vid. SANCTORIUS in *Arch. vltimorum errorum* p. 821. M. A. N. C. Ann. 2. *Obs.* 214. p. 315.

VII. Quoad Diætam: in equali Calore naturali conservandi sunt *Ægri*; Vinum imprimis moderato usu conducibile est bis *Ægri*: Sic enim HENRICUS ab HEER *Obs.* 5. refert, Mulierem in Febre Pectechiali pro desperata habitam, Vini usu restitutam. Confer. etiam BARTHOLINUS *Cens. 6. Obs.* 7. FIEBER de *Scorzar*,

p. 173. Potui ordinatio infillatur Tinctura Florum Aquilegiæ, quæ prout cæteris convenit ad expellendas Pectechias.

Quoad Remedia ista: nil singulare, quod non *supra* de Febribus Malignis in genere dictum fuerit, monendum occurrit. Saltem in Principio magis Sudoriferis, præsertim volatilibus, in Stata vero fixioribus, blandi Temperantibus & Alexipharmacis magis utendum. Hinc in Principio, Cortex Cervi Solare, Bezoardicum Joviale, Cinnamon Antimonii, vel nativa, adhibenda. Hinc:

℞. *Corn. Cerv. sicc. igne*
Antimonii diaph. ana. ℞i.
Sol. volat. Corn. Cerv. gr. xii.
M. f. Pulvis pro 2. dosibus.

D. S.
Pulvis Sudoriferus.

℞. *Antimonii diaphor.*
Cinnab. Antimonii ana ℞i.
Sol. vel. Viperæ.

Corn. Cerv. ana gr. iv.
Camp. gr. iii.
M. D. S. ut antè.

℞. *Pulv. Diaphor. Ludov. vel Corn. Cerv. sicc. igne*
Antimonii diaph. vel Bezoard. Solar. ana ℞i.
Sol. volat. Corn. Cerv. gr. x. v. vel vi.
M. S. ut antè.

℞. *Aqu. Cord. Hæc. Sac. ℞i.*
Mixt. simpl. ℞i.
Spir. Corn. Cerv. effus. ℞i.
Syrapi ex tere Citre ℞i.

M. D. S.
Potio Sudorifera pro una vice.

Item aliquoties in Principio & Incremento probatum expertus sum hanc Potiōnem:

℞. *Ag. Pl. Samb. vel Menthe ℞i. vel ℞i.*
Acet. occurr. vel simpl. vel distill. aut Pl. Samb. ℞i. ℞i. ad ℞i.
Theriac. seu Mithridat. ℞i. vel ℞i. ad ℞i.
Antimonii diaphor. ℞i. vel ℞i. ad ℞i.
Myrrh. gr. vi.

Syr. Cord. bened. vel Rubi Idæi, vel acetos.
Citræ ℞i. ad ℞i. vel ℞i.
M. pro 2. vel 3. dosibus cum sudore.

℞. *Aqu. Pl. Samb.*
Cord. nigr. ℞i.
Theriac. ℞i. ad ℞i.
Corn. Cerv. sicc. igne ℞i.
Simpl. Cephal.

Antimonii diaphor. ana ℞i.
Sol. volat. Corn. Cerv. gr. xii.
Syr. ex tere Citre ℞i.

M. f. Potio 3.
Mistura Sudorifera pro aliquot vicibus.

Detus coactilant.

℞. *Aqu. Menthe.*
Galig. an. ℞i.
Antim. diaph. ℞i.
Bezoard. min. ℞i.

Sol. volat. Corn. Cerv. gr. x. v.
Succin. gr. viii.
Camp. gr. iii.

Syr. Coriis. Aurant. ℞i.
M. S. ut antè.

℞. *Aqu. Scorzæ.*
Sord. ana ℞i.
Ag. Cord. Hæc. Sac. frig.

Cinnam. ana ℞i.
Simpl. Cephal. ℞i.
Bezoard. min. gr. v.
Sol. volat. Corn. Cerv. ℞i.

Succin. ℞i.
Camp. gr. ii.
Syr. Rubi Idæi ℞i.
M. S. ut *supra*.

℞. *Aqu. Menthe.*
Scorzar.
Mirrad. cum Caffæ. ana ℞i.

Spir. Camphor. ℥℥.
Antimoni diapher. gr. xxv.
Syr. Cephel. ℥i.
Sal. volat. Corv. Corv.
Succini an. gr. viii.
Laud. q. gr. i.
Syr. Card. Acorat. parum.

Aliquando sepius in una domo Petechialibus Febribus corripiebantur, in specie dum Ancillæ, his præscriptis præmissis remedia.

℥. Theriac. ℥i.
Antimoni diapher. ℥℥.
Salis Alkali. ℥i.

Cum f. q. *Syr. Acorat. Chir. f. Bolus pro s. doibus.*

Quarum unaquæque capiebatur in cochleari Vini, unde copiosius emanavit sapor. Una illarum adhuc putebatur Menies, quæ sine documento hunc Bolum accepit. Hoc præmissis postmodum creberrimo usu sequentes elixirum, die nocteque illud capiendo, ac sepius repetendo, ac tandem subinde expectando, convalescerunt.

℥. Conf. pulv. Citri ℥i. ad ℥℥.
℥℥℥. Diapher. Frac. ℥℥.
Antimoni diapher. ℥℥.

Cum f. q. *Succi Citri f. Elixirium*, addendo interdum camphoram.

Postmodum vero in & prope statum convenienter usurpanti potest Enoxia, supra de Febribus Malignis in genere, ex Seminibus expellendis præscripta: Item

℥. Aqua. fer. samb. ℥i.
Ceraf. nigr. unc. i.
Spir. Camphor. ℥i.
Corv. Corv. sine igne ℥i.
Bezaard. Min. ℥i.
Sal. volat. succini gr. ix.
Syr. Flor. Tunicæ unc. ℥. ad ℥vi.
M. D. S.

Mixtura Sudorifera.

Capiebatur pro 3. doibus, vel cochleatim sumenda.

Item

℥. Aqua. scabif.
Mentha ros. unc. ℥.
Colat. corv. Corv. ros. unc. i.
Antimoni diapher. gr. xv.
Syr. Card. broad. unc. ℥.

M. pro 3. doibus: S.

Mixtura sudorifera pro 3. doibus.

Item loco Julapii colluvii usurpantur, quæ supra de Febribus Malignis in genere cum Elixuario Dialcordis ordinantur.

Vel

℥. Decocti Rad. ferrug. cum corv. Corv. ℥i.
Succi Citri ros. ooc. i.
℥℥℥. Diaph. Frac. ℥i.
Antimoni diapher. ℥i.
Bezaard. Min. ℥℥.
Syr. Card. broad. unc. ℥.
M. D. S.

Mixtura Confortans, cochleatim sumenda.

Capitur pro lubitu.

Item cum plures simul egrotent, pro Remedio sepius capiendis

℥. Decocti Ligul. Sassafr. ℥i.
Succi Citri unc. i.
Antimoni diapher. ℥i.
Bezaard. Min. ℥℥.
Syr. El. Tunic. unc. ℥.
M. S.

Potio Confortans, circumagita.

Capitur sepius pro lubitu.

℥. Raf. Ligul. Sassafr. unc. ℥.

Rad. corv. dr. vi.

Coqu. in f. q. *Agu. simpl. vasis clausæ*: Colat. ℥i.

addo

Vini Rhenani unc. vi.
Colat. corv. Corv. unc. ii.
Syr. Rabi Mal. unc. ℥.

M. pro Potione.

D. S.

Potio Expellens.

In statu, dum summa urget virum præstatio, usurpanti possunt Potiones Analeptice, supra de Febribus Malignis in genere præscriptæ, vel sequens:

℥. Aqua. scabif. unc. ℥.
Card. bore. Sax. ℥vi.

Tom. II,

Chenop. ℥i.
Conf. Alchem. ℥i.
Bezaard. Seler. ℥i.
Syr. Rabi Mal. unc. ℥.
M. D. S.

Potio Confortans, cochleatim sumenda.

Capitur pro lubitu.

Juvenis 18. annorum, alius sanæ ac robustæ constitutionis, corripitur die Mercurii vesperi levi horrore, post quem incalcit medicoriter, mox infrequens mediocri, mane die Jovis caput intensè circa frontem dolet, sicut graviter, hæsit & lingua sicca, dolor gravitatis præcordia occupat, calor totius præternaturalis mediocri, lassitudo omnium artuum: capis soo auto Pilulas Cephalicas, sed à meridie præterea Medicum adit, qui ordinat pro sequenti mane ooc. ℥. Syrupi Emerici io vehiculo appropriato; & licet Pilulæ à meridie semel vomita, ter accessu evacuascent, jubet nihilominus die Veneris capere Vomitorium, quod septies supra copiosa mucosa, & cæcis infra evacuat; unde pro nocte sequentes

℥. Aqua. fer. unc. i.
Succi Sambuc. unc. ℥.
Theriac. ℥i.
Antimoni diapher. ℥i.

Missa sumebat pro 3. doibus.

Sequitur nos gravis, mane symptomata eadem, appetitus nullus, sensus clamoia, cephalalgia intensæ, fauces aridæ, lingua aspera & nonnulli nigricans, calor totidæ acris seu mordax, non tamen adeo letosus, cutis arida & squallida, lassitudo omnium artuum, vires prostratæ, pulsus cæter, frequens, debilis, serè inæqualis, horret Cerebrum; hinc præscriptis

℥. Corv. Corv. sine igne ℥℥.
Bezaard. Miner. ℥i.
Olei Camph. gutt. v.
Succini.
Citri ana gutt. i.

Miscebatur pro duobus doibus, mane & vesperi assumenda.

Nox infrequens erat inquietas cum infrequentis delirio: die Solis Symptomata eadem, robur faciei longioris, pulsus cæter, frequens, parvus, inæqualis. Ordinavi quod

℥. Ligu. Corv. Corv. succini. ℥i. ad u.
Pro 3. doibus.

A prima dosi oriebatur alius intensior, hæmorrhagia larga, quam rubor faciei præmonstraverat, petechiæ in manibus erumpentes, Symptomata cætera erant eadem. Potus erat cerevisia secundaria cum Vino.

Pro Faciibus, una cum iis, quæ Chirurgus usurpabat, præscriptis

℥. Macilæ. sem. cydon. cam. Aqua. fer. Ros. extr. ℥i.
Neri antimoniæ ℥i.
Rob. Dianæ. ℥℥.
Misc.

Subinde Fances hoc ipso illinebat, & blandè gargarisanda esopcebat.

A meridie alteram Spiritus dosi sumptis, copiosioribus hinc erumpentibus petechiis, Symptomata eadem continuabant.

Vesperi ordinabam:

℥. Aqua. Pl. Popul. errat. ℥i.
Samb. ℥i.
Zber. sine igne.
Bezaard. Miner.

Sal. volat. corv. Corv. ana gr. xv.

Syr. Diapher. ℥i.

Misc.

Assumebat ista nocte successivè.

Die Luox:

℥. Pulv. Bezaard. D. Misc. gr. xvi.
Sal. volat. corv. Corv. gr. viii.
Olei Possent. Heinißi gutt. vi.

Miscebantur: dabatur tres doies: quarum unam mane, à meridie, & circa medium noctem assumebat. Hac ipsa die Hæmorrhagia recurrebat, nox erat inquietas, deliria, & symptomata cætera eadem.

Die Martis:

℥. Ligu. Corv. Corv. ℥i. pro 3. doibus.

Vesperi verò ingruente nocte:

℥. Pulv. Bezaard. D. Misc. gr. xv.
Cinab. Antimoni ℥℥.
Sal. volat. Corv. Corv. gr. vi.
Misc.

Misc.

V u

Nox

Nos fuit pessima, summè delirata, inquietata, incipientibus manè Convulsivibus.

Die Mercurii, Marbi septima:

℞. Corn. Cervi sicc. ʒi.

Bezaard. min. ʒi.

Puls. Epilæ. animalial. gr. i.

Misc.

Capiebat mane: à meridie hora iii. capiebat gutt. ʒo. de Liqueore Cornu Cervi succinato: hac die Seculorum a. copiosè: de cætero Urina hædussemper cruda saniorum simillima. Appetente nocte

℞. Puls. Bezaard. gr. xii.

Cinnab. Animæ ʒi.

Sal. volat. Corn. Cervi gr. v.

Misc.

Poss. median noctem iterum sumpsit guttas ʒo. Liqueoris Cornu Cervi succinati: non erat tolerabilis ratione Delirii, sed Convulsiones ingravescabant.

Die Jovis Pulveres de Spiritus idem: vesperi ob nimias faciei & manuum Convulsiones graves Vesicatorium utrique Brachio prope Carpum in parte externa applicari jussi. Interdixit

℞. Aqua Pom. ʒii.

Spiritus Vini camph. dr. i. ad dr. ii.

Matr. Perlar. prop. ʒi.

Bezaard. Solat. ʒi.

Syr. Flor. Tenui. dr. ii.

Miscabantur pro a. dosibus.

Una ante, altera post median noctem usurpabat. Nox erat quietior cum somno, licet interdum Convulsiones manè longè miores, qui effectus Vesicatoris debebatur. (F)

Die Veneris propter Virium debilitatem ordinari:

℞. Aqua Pom. ʒii.

Spiritus Vini camphor. dr. ʒi.

Cornu Cervi sicc. ʒi.

Matr. Perlar. prop. ʒi.

Antimoth. Acipho. ana ʒi.

Conf. Alchem. dr. ʒi.

Misc. pro Potione.

Reiterabatur etiam vesperi pro nocte. Æger melius habebat, Convulsiones erant miores Vesicatoris largè fluentibus, nos tamen erat inquietior.

Die Saturni.

℞. Spiritus Cornu Cervi succin.

Tinctura cereali. cum Spiritu cornu Cervi an. dr. i.

Misc.

Bis hac die guttæ ʒo. capiebantur: vesperi Potio antecedens repetebatur: nos erat bona, Convulsiones & cætera Symptomata cessabant, Urina turbida reddebatur, & sedimento seponere: hinc die Solis Liqueor cornu Cervi succinatus à 40. ad ʒo. guttas per latera 24. horas continuabatur: quo porro idem continuato fit coarctatus.

Ubi Petechia cum Hemorrhagia, Dysenteria, aut Diarrhea compuncta, D. MICHAELIS usus est solutione Terræ solaris. Convenit quoque Terra sigillata. Diarrhea quidem ob metum graviorum Symptomatum non statim cessavit, sed Theriacalibus fomiti morbo obviatur quoad, sic sponte cessavit: v. g.

℞. Antimonii diaphor. ʒi.

Terra sigillat. ʒi.

Extract. Theriacal. ʒi.

Misc. pro Pulvere.

Div. in a. part. 5.

Pulvis Adstringens confortativus.

Capiantur cum vehiculo calido, expectandum huiusmodi Sordorem: Vel

℞. Aqua. Menthe ʒii.

Aceti destillat. ʒi.

Elæb. Diacord. Franc. dr. ʒi.

Syr. Cydon. ʒi.

Spiritus Nitri dulc. gut. xv.

Misc. pro Potione: 5.

Mixtura Adstringens sudorifica & confortans, coarctantem sumenda.

Eatero pro Hemorrhagia Narium silenda, optimè appenduntur, aut sub Axillis alligantur *Bastena*. Virgo adultæ Febre Petechiali graviter correpta, cum jam efflorescerent copiosè Petechia, gravi & pertinaci corripitur

Hæmorrhagia: pro qua silenda jussu capere duos Bulones viros, coque consulas & consulas sub Axillis utrumque aliger cum lincolo: quo facta, subito omnia Hæmorrhagia sedata fuit, & Virgo per continuatum Elethari ex conserva citri cum Theriaca usum convalescit. Sed brevi post, cum nimis stremit edisset, gravissimæ Anxietates præcordium: & *Ællus* interossibus recurrit: jubeo, ut vomeret cum Symplo Emetico, & distum eletharium continuaret: quo ita perfectè convalescit.

In adjuncta Dysenteria, aut alia Diarrhea Theriaca cum Vino generosè servide Stomacho & Hypochondriis sapienter applicari poterit.

Sæpiè in Febribus petechialibus Stomachi urgent Symptomata, ad quæ conveniens Remedium est, Latere leviter eodum ignare, & Aceto Vini optimo ac Aqua Mentha eundem extingueret, & hinc lineo involutum ad Dorsum, aut etiam ante è regione Ventriculi applicare: seu emacuerit, secunda vice ignitus, & solo Aceto Vini adpersus applicetur.

Commodè etiam scutum Stomachale poterit præscribi:

℞. Cerat. de Lad. Stomach.

Theriac. Androm. q. l.

Malaxata indicantur super alutem.

Vel

℞. Tacamah. part. ii.

Cerat. Stomach. q. l.

Liquefacta etiam subigantur largiter cura Theriacæ Andromachi q. l. & applicetur.

D. 5.

Emplastrum Stomachale.

Sunt, qui Epileptica *Fræni*, *Præcordii*, &c. applicare solent: sed male. Quia enim de facili refrigerantur, clausuræ pororum occasum ingerunt, & ita Petechiarum eruptionem impediunt, aut eas facilius retrocedere faciunt. Tutius Balsama oleosa usurpantur, v. g. Oleum Aranearum compotum *Mandari*, *Scorpionum*, &c.

℞. Olei Scorp. comp. Menthe dr. i.

destillat. Melle.

Ruta,

Citræ an. ʒi.

M. pro Linimento sterobusio Cordis & Pulsui applicando, vel idem cum Oleo Nuxii *maishan* expresso misc. in formam Balsami: 5.

Balsamum externum.

Veteres in usu habuerunt *Linum externum*, quando petechiales Maculæ, aut similes Exceptiones Cutaneæ, non sunt convenerint prodire. Instituerunt *Frissianus* seu *duvallianum externum cum Nitro*, quæ à multis Authoribus insigniter commendatur. Unguentum fit tale:

℞. Olei Amygd. amar. ʒi.

Vini Rhenæ dr. vi.

Aqua Cham. ʒi.

Nitri ʒi.

Bulliant ad consumptionem æquis, & f. Colatura.

D. 5.

Unguentum externum.

Linimentum hoc toti corpori affricetur, in specie Dorsum ad evaporandam materiam malignam è corpore, in Febribus Malignis & petechialibus, præsertim, quando non bene procedere vult Sudor: facta enim corporis inundatione, & propinatis hinc Sudoriferis, sufficienter admodum sudorem promovere solet.

Paulò aliter præscribitur hanc Inundationem BRUNNE-RUS in *conf. ar.* sequenti modo.

℞. Olei chamom.

Amygd. amar. ana ʒi.

Nitri pulveris. dr. iiii.

Aqua chamom. ʒi.

M. & coquantur.

Hinc inde videbitis apud Prædictos huius Linimenti ad evaporandas Petechias in Morbis Malignis vestigia, cui sublitui poterit Oleum Scorpionum simplex: Vel

℞. Olei chamom.

Ruta,

Scorp. ana ʒi.

Nitri dr. iiii.

Misc. f. Linimentum.

D. 5. ut supra.

C. A.

(F) Mirum fortasse videri poterit, quod Convulsiones Vesicatoris adhibitis miores sint redditæ: quoniam scimus hac Medicamentum ex iis componi, quæ summa quæ pellunt acritate, Convulsiones potius excitare quam sedare apta sunt. Hinc in Morbis ad irritantes pendentes, consilio ab illis abstinemus. Verum si materia acris Convulsiones parietis, quæ Vesicatorum summa educatur, poterit Vesicatoria Convulsione assilire prodire,

CAPUT IX.

De Febre Purpurata.

AD Maligna hujusmodi Febres pertinet etiam nostra *Febre Purpurata*, Germ. *der Purpelfieber*, qui alias *Morbus* & *Febre Miliaris* dicitur in M. A. N. C. Ann. 3. Obsv. 251. pag. 197. a Pustularum exulsiarum, Miliolum magnitudinis æquantium, efflorescentia; item *Morbili* igni quibundam vocatur: Vid. M. A. N. C. Ann. 6. Obsv. 42., quo loco etiam Obsv. 745. pag. 205. *Purpura Epidemica Miliaris* locutum fit mentio.

Febribus hæc est vel *Brigine*, seu *Sorborina*, vel *Maligna*, Febri Continuae Malignæ juncta: Quovis quidem adnotatur, Mares, & Fœminas, Infantes & Adultos, frequentius tamen apud nos Puerperas, quibus & malignior magis & infestior in specie existit, forsito Mensium retentionum occasione & Infantis recens nati, Etsi vel *Rubea* quæ forsitan illud Morbi genus est, quod *Rubellum* Germ. *Rubeln* dicunt; vel *Alba*, instar Hyæxidum splendescens, unde vocatur Germanis *der reine und weisse Prieist* Interdum etiam extra Puerperium Febribus Maligna Purpurata accidit. Propter symptomatum vehementiam, Morbi brevitate & periculum, commodè inter Febres Acutas refertur & utre Purpura Rubra in Plethorica & Scorbutica, necnon aliis Morbis cum multo Sodore, & quovis alio tempore sine omni Febre & Symptomate; excepto Pruritu molesto, frequentius observetur.

Incipit autem Febribus hæc sub specie Synochæ; ut plurimum cum Rigore, quem mox insequitur Incalescentia totius Corporis Anxietas Præcordiorum, Inquietudo summa, Oculorum Rubor, interdum cum Dolo Capitis; semper cum Agrypnia, & levissimo circa Caput, Pectus atque Dorum Sodore. Urina ut plurimum in principio foecorum est similis, aut parum admodum à statu naturali recedit: in Puerperis verò Lochia notabiliter factis immutatur, aut plane cessat. Temporis progressu & sub Morbi incremento ad sextum usque diem Ægri circa Præcordia, Scapulas, Cervicem, demum totum Corporis habitum, de Ardore cum hincinationibus, acutum puncturâ similibus, interdum pruriginosis, conqueri solent, Cuiusque simul asperior redditur cum aliquali Rubore. In statu verò Morbi omnia Symptomata cum Febre exacerbantur, Urina est crassa, & quidem vel tincta & pellucida manet, vel cum sedimento multo turbatur, & asperitas illa in Efflorescentias miliaris attollitur, nunc copiosiores, nunc pauciores, quæ levi accedente aura & levi denudatione in seculo evanescent, cum Anxietatibus, difficili Respiratione, summa Virium prostratione, frequentius cum Delirio, Convulsionibus epilepticis, & catarrho suffocativo. Solvitur tandem Morbus hic raro per Diarrhœam, interdum insensibiliter serè & per Mordorem, in Puerperis sæpè per Lochia, ubi Exanthemata hæc sensim lentissime evanescunt, & Cuticula cum Pruritu quodam in Squamas seu Fortiores abit.

CAUSÆ.

Originem debet hæc Febribus *Sali volatili aeri*, Massam Saguenam turbanti, quod tamen subactum, & Acido sui generis maligno saturatum, in forma Salis tertii Sero involuti infra Cuticulam sub Poris apponitur: hoc enim, ubi secretum & devium fuerit, acque ad loca intercutanea propallum, horum Ardor, Pruritus insignis, hinc Cuticular exoritur & deliquatio, &c. excitatur. Nasci videtur Purpura simul ex radice Scorbutica: nam Scorbutus, oti talem affectum Purpure benignum sine Febre interdum insert, ita si tales plura minus scorbutici Maligna cortripinatur Febre, tandem in Purpure efflorescentiam abeunt: Unde & Antiscorbutica quædam, & Remedia Volatilibus & Myrrhatibus, aliisque Alexipharmacis mista, præ cæteris conveniunt.

PROGNOSIS.

Subinde *acuta*, non raro *perpetua*, est Affectus, qui dum maximè videtur blandiri, etiam ex levissimo Horrore subitè jugulari: eisdem enim cum Febribus Malignis circumstantiis observat, ita tamen, ut Excretio hæc cuti-

Tom. II.

nea non sit critica, sed symptomatica, & pro Morbo seu Febre solvenda sola vix sufficiat, dum nunc sub Purpura comploso, nunc paretore, Ægri intereunt. In specie periculiosior est Purpura Alba, & quæ in Puerperis cum Lochiorum suppressione & Diarrhœa symptomatica contingit.

CURA.

In Cura Purpure ac Febrium Purpuratarum, præter generalia ista, quæ *suprà* de Febribus Malignis in genere dicta fuerunt, observandum in specie.

I. Quod, licet Alvus ad aliquot dies noctesque pertinaciter adstricta sit, non solum fortiter Laxantia, sed & Clysmata lenissima sine periculo summa, nec nisi blanda, atque non nisi necessitate urgente, iniicienda. Irritata enim Alvo Transpiratio cessat, Efflorescentiæ Cœcis evanescunt, & deinde Mors insequitur. Quod si Alvi fluxus symptomaticus & subinde lethalis superveniat, cum Alexipharmacis simul infundenda Adstringentia blanda, ut ita succedat fluxus in hoc casu periculosos inflammentur, & omnino malum præcaveatur.

II. Si Purpura sit *Alba*, causæ est tractanda, neque extra lectum, dum iterum fortè debet, promovenda est Ægra; si enim se extra lectum conserat, vel à levissima siletem aura frigida afflicta, retrocedit Purpura. Unde jubeo, ut Ægri continò contenti maneat, ut lectus iuxta 3. vel 4. dies noctesque iterum nequeat, cum si retrocesserit Purpura, ut plurimum moriatur. In Purpura verò Rubra, cum ea sit mitior, magis pollumus conovere.

In Principio ergò Morbi, conveniunt *Arseniciæ*, Serli ebullitionem compescit, imprimis Pulveris Bezardici; quibus Myrrha cum alio suis Antimonialibus addenda: in specie convenit Rob Sambuci cum Cornu Cervi sine igne. In Statu verò, ubi jam apparere incipit Purpura: convenit Emulio ita Seminum expallivorum, quam dedi *suprà* ubi de Febribus Malignis in genere: item Liquor Cornu Cervi succinat, Callosa, Tinctura Corallorum eum Spiritu Cordis Cervi, & Antiscorbutica, Essentia Myrrhat &c., quæ sunt egregia: v. g. in Principio Morbi:

℞. Corn. Cervi sine igne,
Antimonii diaph. an. gr. xv.
Sali Card. bened. ℥ss.
Myrrhæ gr. vi.

M. f. Pulvis.
Div. in 3. part. æqu. S.
Pulvis Expellens.
Vel

℞. Symp. Cephal. ℥ss.
Bezoard. min. ℥i.
M. D. S. ut antea,
Vel

℞. Aqu. Galæg.
Ror. Samb. an. ℥ss.
Pulv. Diaph. Lædov. ℥ii.
Antimonii diaph. seu Anth. præp. ℥ss.
Syr. Card. bened. ℥ss.
M. D. S.

Mistura Expellens, cochlearim succode,
Vel

℞. Aqu. Card. bened.
Fumar. an. ℥ss.
Cera. Cervi sine igne ℥ii.

Antim. diaph. ℥ss.
Cinnab. Antimonii gr. xv.
Syr. acerr. Citræ ℥vi.
M. S. ut antea,
Vel

℞. Aqu. Fumar.
Strabius. an. ℥ss.
℞. Caffæ. ℥i.

Univ. vers. præp.
Antibell. Pot. vel Antimonii diaph. an. dr. ss.
Sali vol. Corn. Cervi gr. xv.
Syr. acerr. dr. vi.

M. S. ut *suprà*

Item, quando Diarrhœa conjuncta, addatur Terra sigillata.

℞. Aqu. Card. bened.
Fl. Samb. an. ℥ss.
Spiritus Theriac. simpl. dr. iiii.
Corn. Cervi sine igne.
Antimonii diaph. an. ℥i.
Terra sigill. vel Boli Arm. præp. gr. iiii.

V u a

Syr.

Syr. Elix. Tonic. 3ii.

M. D. S.

Expellens & Adstringens Potio Confortativa.

Reflexio quoque super ad Scorbutum facienda est, unde in tali Purpura sequentem Mixturem prescribo:

℞. Aqua scabif.

Scordii an. 3℥.

Spiritus Cucki. 3℥.

Animonii diaph.

Mag. Corall. cum succo Citri à 3℥. ad 3℥.

Syr. Card. bened. 3℥.

M. D. S.

Potio Scorbutica Expellens.

Tempore excretionis:

℞. Mist. simpl. vel Tinctura Benzod. camphorat.

Vel Affer. Myrrha tartarif. dt. iiii.

Spiritus Cucklear. dt. i.

M. D. S.

Mixture Sidorifera 3℥. vel 6℥. gutt.

Liquor Corus Cervi succinatus egregius pariter est in hoc Affectu: ex gr.

℞. Lign. Corus Cervi succin. 3ii.

Spiritus Cucklear. 3℥.

M. D. S.

Mixture Expellens.

Dof. 30. ad 50. guttas.

CAPUT X.

De Variolis & Morbillis.

Variola & Morbilli singulare quod obtineat per Febres Malignas: nam ex se sunt saltem *symptomata febris Continua*, seu *synochi* sui generis, quae *benigna*, sunt, & quidem sepius; *Maligna*. Observant scilicet sunt absque ulla Malignitate; aut etiam quae adferunt sine igitur Effervescencia febrili in Infantibus; dum hi potissimum functiones rite exercent, per domum ac plebea decurrunt, &c.: quales Exemplis observat SCHENCKIUS lib. 6. *Observat. de Febribus Malign. & de Variolis*. Interdum quoque adeo mites sunt Variolae, ut licet cum Febre Ardente iunctae fuerint, paucos tamen interficiant, ut potius quasi sponte Naturae coalescant. In hoc puncto SYDHEMAM de Variolis benignis est prolissus, ut ostendat, Variolas & Morbillos esse Febres Benignas. Opinio equidem Vulgaris fert, omnes Homines necessario Variolis corripi, sed ita, ut quod illidem semel affectus fuerit, vix ralem deinde patiatur, ex qua praepocerta opinio Hypothesis Arabum, in specie AVICENNAE & RHASIS, nata est, scilicet Variolas nobis in Utero matris ingerari, ex relicto inquinamento Sanguinis Menstrui, à Fetu in Utero attrahi; quae Hypothesis multos haecum habuit Patronos: Sed Antecedens est falsum, Consequens irrationale. Nam quoad prius: multi Homines moriuntur, qui nunquam Variolis & Morbillis laboraverunt; sicut e contra sunt Exempli, utraque rara, qui scilicet aliquoties illidem affligi fuerunt; vid. BORELLUS Centur. 3. *Obser.* 10. de Muliere, quae septies Variolas passa fuit & tandem anno suae aetatis hunc vitae 218. his igitur Variolis tandem mortua fuit. Quid autem posterius sit contra rationem, patet ex eo, quod (1.) Fortis in Utero non Sanguine Menstruo, sed potius Nutrimeto lacteo vel chyloso sustentatur: deinde (2.) quod non omnes Mulieres sint adeo morbose, ut necessario exinde per Variolis fomitem contrahant Infantes. (3.) si Sanguine maternum corruptus esset causa certa Variolarum fieret, quod aut Lochis suppressis, aut etiam Menstruis, & sic necessario corruptis, lemper generarentur in Puerperis Variolae, Labilis ergo est haec Opinio: utque non sit negandum, natos esse Fetus Morbillis & Variolis affectos in Utero matris, quales observat exempla SCHENCKIUS lib. 6. *Observat.* & BARTHOLINUS Centur. 2. *Epist.* pag. 61. HILDANUS Centur. 4. *Observat.* 51. & 56. & FLATERUS Jr. Tom. 3. p. 230. de Muliere Gravida Variolis affecta, quae Fetum similiter affectum Variolis in lucem edidit. Haec tamen eorum est, plurimos Homines, in specie Infantes, ita corripit. Sed radicem obvenit revera in Sanguine fundamur, & siquid aliud, quam Sanguinis Depuratio & quasi Depuratio, mediante Fermentatione febrili, qua Sanguis se depurat à remanente lacteis Ma-

tris aut Nutricis vitiat, & plura minus ab Acido conglutina, Sanguinem inquinantibus: Unde talis inquinatio fermentando separata uni cum Sanguine tunc simul infuso, precipitatur per Fermentationis modum, & intra Cutim ac Cuticulam cum Sanguine hinc inde deposita, acrimonia sua parvas Inflammationes inferunt, & tandem suppurantur.

Observandum autem,

I. Quid non differat Variola & Morbilli, quam secundum magis & minus.

II. Quid peccat imprimis particula fermentativa, Lactis acore corrupta à qua Acrimonia acida.

III. Dolores lancinantes Dori, ubi nempe partes membranae & nervae locum habent, quae in principio vellicantur, Convulsiones partium nervosarum, & Paroxysmi epileptici, Urinae cruentae ex erosione Viscerum, aut etiam, quod saepe contingit, Ulcera, Pthibiles, & Spulcratio Pulmonum, Oflum Caries & Spulcratio ventosa, notante id HILDANO & alia, de Acido acri peccante, varias dante turbae haec, testantur, sicut Hepar & alia Viscera etiam interdum Pusillis corripuntur, etiam Variolis, unde Pthibiles. Conf. de Acido acri primario in Variolis peccante SYLVIIUS de Morb. Infant. cap. 9.

IV. Acidum illud ex Lactis inquinamento ortum, ut effervescit imprimis cum Sanguine, unde Febri Acuta continuus Ardenti similis oritur, donec precipietur, ut ambo abeat in Salium tertium; ita excitam simul Lympham inquinant singulariter, cujus ratione in principio Variolarum ut plurimum Tules sicce, una cum Faucium asperitate, & earum plura mola Raucedine adstet, & Oculi lachrymanes, &c. verant: de quo Lympham imprimis affectam esse, videb. in M. A. N. C. Ann. 4. p. 302. Acidum illud ita ex Sanguine secretum, ac in Pusillas congestum intercurrentes; Sanguinem in jaryia, quas acrimonia sua excitat, Inflammationis in Pus acido salium mutat per precipitationem Sulphuris Sanguinis ab Acido. Item illud Acro excoriat Cutim, Pustulam interit, Carcinem exedit, & inde ex filis ejus profundè erosio Cicatriculis efficit, donec tandem Cuticula erosio à dista Acrimonia Squamarum forma decidat. Confirmatur ex his, quae curant Variolas, nempe Callosore, Myrrha, Ala foetida, Sale Corus Cervi, &c. Acidum enim haec destruant, & Lac corruptum corrigunt. Hinc

V. In Variolis & morbillis, ut melius cursus & motus illarum observetur, observanda sunt duo Tempora nempe Tempus Effluviis seu Effervescenciae scilicet, aut Massae Sanguineae Depurationis; & Tempus Depurationis seu Exulsiōis. Tempus Effluviis febrilis est, dum Febria urget, & hoc Tempus absolvitur primo Quaternario. id est primis quatuor diebus quod raro extenditur ad septimum diem; Depurationis verò, dum Pusillae erumpunt, & successivè ad maturitatem pergunt, absolvitur sequenti Septenario, nempe à die tertio vel quarto ad undecimum, raro à septimo ad decimum quartum diem terminatur, ita ut circa diem decimum tertium Curatio absoluta sit. Nempe haec ut plurimum sunt ita, utot Suppuratio non fiat sine Aëlis recrudescencia nova, seu Febre secundaria ac Suppuratoria, cum Dolore atque Ardore per totum habitum mollescentis, Symptomatiq. aliis, pro diversitate Partium, quas Uliculula haec plura minus obident. Interim pro Circumstantiarum varietate subinde Variolae non praecise tertia aut quarta die, sed etiam septima vel octava, vel etiam vigesima die erumpentes observant. Hinc Variolae etiam desperatae poli diem decimum septimum demum suppuratae notantur in M. A. N. C. Ann. 3. pag. 360.

VI. Alter illud Acidum, nunc volatilis & aerios effluvis Malignitatem interdum adiungam habet, ita, ut dum Acro malignum Massae Sanguineae cohaerentem destruit, & Spiritus inquinat, tali occasione & Fermentum lacteum latitans praeternaturaliter simul excitetur, quod suo impetu fermentativo Variolas infert, sed saepe impeditur propter Spiritus nimis inquinatus, ut heueregenem à Massa Sanguinea turbata separari & erumpere nequeat subinde ex pullum: Et sic conjunguntur Febribus Malignis Variolae, quae sunt Variolae Malignae. Malignitas haec patet ex eo, quod interdum inter admodum lethales, & dum grassantur, commouit interitum Infantes; item, quod observatum fuit, Eripis Pestem praecedisse Variolas aut Variolas feratas Pestem, quae tunc tempora non fuerunt sine Malignitate. Cauti ergo sumus in Variolis diiudicatis, an Benignae, an Malignae sint? ut has invicem confusamus.

M.D.

Multiplis autem solum esse Variola & Morbilli, prout videre est in SENNERIO de Febribus, ubi de Variola: hinc & SCHENGHIUS lib. 4. Observat. præter Variolas & Morbillis tertium *Pustularem quasi Crystallinum* coferat. In Pueris etiam observantur Variolæ exilibiores, seu Tubercula parva, pellucida, pilis minis alba, Variolis æmula, sparsim tamen, & ferè sine Febre, aut tantum cum Ephemera erumpentia, quæ ut plurimum sine multa Sanie citissime exsiccantur & sanantur: Germ. vocant *Spizbocken*, *Windbocken*, *Schafskäutchen*, und *Strohbocken*. Parum, nisi mole majore, à veris differunt, & læta triduum ad summum excitantur; uxor eorum unam vel alteram aliquando suppurare, Cutim erigunt, & Cicatrices Inducere, Experientia testatur (G.) Affligunt nunc *foliaria*, nunc *scabiosa* *Exanthemata* procedunt, aut hæc post Variolas sequuntur: Vid. M. A. N. G. Ann. 3. Obs. 303. pag. 372.

Afficiuntur autem in *Parvulis & Morbillis* non solum *Partes externas*, sed & *internas* eodem copiosis infidere solent: vid. PARÆUS l. de Variolis cap. 3. item SCHENGHIUS alique: ac in specie *Pulmonum* non leve periculum ab his imminet, ut reddè observavit BARTHOLINUS Cur. 3. Epist. 38. ac KERKRINGIUS Epist. Obs. 62. refert Puerum, Pulmonibus Variolis repletis in hunc suffocatum. Unde qui Variola aut Morbillis interiret, ægrit, vel suffocatus interiret, vel ex Convulsionibus epilepticis moreretur, vel Fluxu dyenterico interiret.

C A U S A E.

Quod *Causam Originalem*: probabilissimum videtur, firmius & actius radicatum Principium quærendum esse, præsertim cum non videatur eorum Sententia probabilis, qui dicunt, quod oriatur ex *reptis* *Scin* *vel* *saltem jam Conceptum*, eum post Conceptumque Uterus firmissime claudatur, nec quicquam amplius Embryoni ab extra communicari queat. Ac promissum suspicor, *Fundamentum Variolarum & Morbillorum consistere in Lacte*, quod hæc Fœtus nunc in Utero, nunc cetera uterum in Ita, ut hæc vitio ferè ætate, aut vitio coagulati recrementum accidit, vitioque fuit quasi radix, ut per mutam Effervescenciam febrilem oriatur Variolæ & Morbilli. Occasionem in hæc defendendæ Sententiæ dedit analogia Achorem & Favorem, Germ. des *Ausbruchs*, & *Tineæ* Capitis, Germ. des *ausgeflogenen Kopf*, & ipsarum ex Lactis vitio ferè ætate, cum excretionis cutanea Variolarum: scilicet utraque noxiè primario Faciem affligunt, deinde & Caput & reliquum Corpus, quando nempe idem vitio Lactis nutritur, eoque vel in ipso Infantis Ventriculo inquinato, vel in Nutricis Corpore in Acidum vitiosum transmutato; ac hoc enim postmodum oriuntur Achores, Pustulæ (scilicet in Facie, imò rubicundæ, cumque pruritu coniunctæ, quæ consequenter abeunt in deformationem cutaneam, ac disparates ut plurimum relinquunt *Tineas* Capitis & Oculorum afflicti. Ut proinde tam Achores seu Favi, quam *Tineæ* ex Acido Lactis peccante originem ducant: ac ipsas quoque Variolas & Morbillos ab Acido Lactis, quod talem Effervescenciam febrilem excitat, dependere testantur Symptomata adjuncta. Summatim, arbitror, radicem, propter quam Infantes tam facillè Variolis sunt obnoxii, quærendam esse in inquinamento Lactis matris vel Nutricis, quod successivè congestum in Infantis Sanguine, ac aliquando per simile *Contagium* exeatitum & Effervescenciam in Massa Sanguine concitat, quæ consequenter le parificans inquinamento illa sub formæ Effervescenciarum deponit, quod prolatur per Symptomata sæpius allegata. Propter hanc in Sanguine fundatam originem, Consequens in specie mutuo inficitur, uti D. Doct. MICHAELIS plura retulit Exempla, quod Fratres duo longè distiti, quorum unus erat in Italia, alter in Germania, uno eodemque tempore Variolis laboravit, quorum nemo alterius novit conditionem seu morbum: adeo ut per longa etiam intervalva deprehendatur hæc inter Contagiosos conspirari. Sic fide Exemplum hic Lipsiæ

Gemellorum adultorum, Fratræ & Sororis: Frater cum degeret Wittebergæ studium gratia, Soror autem gemella eum hæc ex improviso incurrebat Variolas, ecce! Frater huius Germanus eodem tempore idem Wittebergæ, ut nunc nemo indiget locorum aliquid de Morbillis sciverit, etiam corripiebatur. Similiter novi tres Nobiles, quorum duo adulti ante paucos annos Gießæ studium gratia morabantur, tertius cum Sorore sua domi degebat. Sed cum hic tertius cum Sorore hic domi apud Matrem laboraret Variola, illi duo Gießæ (sunt illidem), & quidem eodem tempore correpti morabantur, utut tunc temporis nil aliud idem de Variolis innotuisset. Imò Gravidâ sana enititur Puerum Variolis correptum, eum antè Filio ex Variolis negotanti sedulo assistens, referente bene MORISONIO de Morbis Mulierum p. 66. Aliis non rarum est, Mulierem gravidâ Variolis correptâ, & Pæctum simuliter idem afflictum fuisse: Vid. BARTHOLINUS Cent. 3. Epist. pag. 623.

Sanguinem autem illud *fermentatum* in Sanguine doctilem nonnisi accedente *Causa Externa*, speciatim *tertia Aeris alterantur*, in actum ducitur, unde sæpiè epidemici casus sunt. Ad Causas Externas speciat etiam *Terror* ex contigèti epistemi morborum, & *Contagium*, ita quidem, ut ne Cadavera Variolorum ejusmodi effluvis actus delituit PANAROLLUS Pæc. 3. Obs. 12. perhibeat. Non tamen parandum, præsertim in Corpore sano tot & tantas lœsiones, quæ postmodum in ambitum Corporis copiosissime sæpiè protruduntur, sed *fermentum acidum, fermentum sive multiplicans*, ex naturalibus nutritivis Corporis Coceptis hæc generat: Unde quæ magis quis est casuisticus, seu quæ Singula alterabilis magis existit, id copiosius infundit afficitur: Unde nec Scabiosi ab inficem sunt immunes, uti observavit FEHR de Scabietate pag. 77. item HENRICUS ab HEER Observat. 6.

Insituitur dubitatur: an Veteribus Græcorum eadem etiam fuerit cognitæ? Nam quis, qui per Græcorum *Exanthemata* Variolas, per *Exanthemata* Morbillos intelligit. Vid. PARÆUS de Variolis cap. 3. Sed res præcisè determinari nequit, cum *Exanthemata*, & *Exanthemata* Græcorum generalis & universalis sit, quamvis in Cure Efflorescentiam deinceps: (H) Vid. CASTRO Qua ex quibus, lib. 3. cap. 14. 15. 16. pag. 189. 197. & 201. Sane, utut essent Variolæ aut Morbilli convenire videntur, differunt tamen hæc ipse pro *Exanthemata*, Nationem, aliarumque Rerum Nomenclaturam varietate diversimodè. Sic enim Morbilli in Italia & Hispania periculiosiores, quam Variolæ, quæ in Germania: Vid. THIERMAYER Consil. lib. 1. pag. 22. Sic Morbilli in Gallia sæpius cum Febre, Variolæ vero sine Febre esse observantur (I): cum eorum in Germania sæpius Febres acutas comitentur, eoque ferè graviore Variolæ. Sic Variolæ in Indis primis Hispanis intallisse natus SCHOOCKIUS de Form. pag. 458. & seq. item RIVERII Praxis, ubi de Variolis. In Islandia vigesimo quovis anno *Periodica* observantur Variolæ, teste BARTHOLINO Cent. 3. Epist. pag. 390. Frequentes Variolæ solent esse in Japonia: Vid. *Acta Societatis Regiæ Polonæ*, 1. pag. 225. Eadem Variolæ in *Æthiopiis* distinctæ sunt à Variolis Europæis: Vid. BARTHOLINI *Acta Med. Hist. Polonæ*, 3. p. 235. Unde & mirabilis eorum ab *Æthiopiis* Cura vid. in M. A. N. G. Ann. 8. Observat. 62. pag. 116. Sic Morbilli Ambrosii planè peculiare observat à SAAR in *Servitio militum* *Indis Orientalis* cap. 30. Nec minus curiosum est, quod D. MICHAELIS aliquando catavæ Malierem in unum Corporis medietate Variolis, in altera vero Morbillis, afflicam, quam Natura ita mirabiliter in duas quasi partes diverserat: Cura tamen fuit eadem. *Adultus graviter laborans*, & *difficillè ferre Variolas ac Morbillis, quam Pueri*, per Experimentum innotuit. Denique nempe Adultorum Cutis, & firmior quæ, teatuna, neque Depurationi materiam adeo apta est, & sub Suppuratione sensibilius longè dolere solet. Maligniores autem Variolæ frequenter *Vermineis* observantur fuerunt: Conf. M. A. N. G. Ann. 3. Observat. 10. pag. 44. ubi etiam Vermiculi post

(G) Quas vulgè *Nathas* seu *Spurias Variolas* appellamus, veris majores sunt, sed rarioræ & magis, *disperse*. *Rarior* Variolas *per* appellari possunt *adversarius*, nam minime cum illarum *separata* esse, *procedere* nituntur, & quoniam *variorum Variolarum erumpentia* pueri non absterunt, illas à propriis & tertis Variolarum *fermentis* non oriri, facile credimus.

(H) *Exanthemata* ab illis ex & *ad hoc* illas, quasi Efflorescentia. Exanthema ab illis ex & *ad hoc* impetu letor, servec, quod efflorescentia veluti quidem & sanguinis impetu tales Maculæ à cute protrahuntur.

(I) Nequaquam in Italia Morbilli tantæ Variolis periculiosiores. Vix enim Pueri Morbillis affligi, ni Maligna Febris copulatur, hæc interire solent. Novum quoque videtur quod subdit A. in Gallia Variolæ sine Febre observari, quoniam contrarium Scriptores Galli docent, & docet fides non puerorum, non etiam adultorum his ab hoc timore strages.

post Variolas cum Urina reieci allegantur: sicut & *Sadorem Vermiculatum* in Variolis videbimus in M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 3. pag. 2. item *Vermes* in Variolis observant R. HODIUS Cens. 3. Obs. 64. & BARTHOLINUS Cent. 3. Hist. 20.

DIAGNOSIS.

Variolarum imminetium Historia ita se habet: Prægresso *Horreri* plūs nōvis infensus insequitur *Astus* intensus, gravitas totius Corporis, Dorſi, præsertim *Lumborum Dolor* lumbicinis, & quasi pulsatio in Spina, cum qua subinde conjungitur insignis *Dolor Capitis gravitatus, Oculi tumidi & subrubentes, Dolor eorum renivus*, aut quasi involuntaria Lacrymatio, ex aciditate scilicet *Lymphæ* occulta Oculis afflicte: Quod si adit *Tussis sine fimo*, seu potius nimis tussivus conatus, cum *Tussis eeleri*, frequenti, vehementi, duro, plūs minis magno, vel parvo, prout mos Febris est, atque relinquitur Signis, res eo magis confirmantur. *Horroris* somnium impedita, aut plūs minis laesa, cum Voce interdu rauca, & Fauces asperitate, similiter adesse solet. *Urina* sanctorum non est dissimilis; Natura nempe ad ambitum Corporis Serenis imprimis propellente. Ubi ergo adiunt *Symptomata Febris Acute*, cum *Urina* prout aut nihil à statu naturali immutata, Variolas portendunt, uti HORSTIUS rectè observavit in Obs. pag. 146. præprimis in iuniori statu seu ætate. Incedendum tamen turbida est, quod magnam Concoctionem ebullitionem & agitationem significat: interdum alba cum sedimento furfuraceo apparere solet. *Egri* fuscini, & agrypi; *Terror*, *Insomnia* præva, *Deliria*, aut leviculi *Spasmi* *Infantis* antecedere solent eruptionem Variolarum. Interdum etiam in primo Morbi insultu *Vermes*, nunc verò saltem stans vomendi conatus, *Hæmorrhagia Nasalis* subinde admodum copiosa, occasione nempe Sanguinis nimium ebullientis & ferventi adesse solet, quæ in Principio Morbi levioris fere reddit, in statu verò Morbum longiorum, vel fuscini eventus innot, *Diarrhæa* subinde *Egros* corripit, interdum *Diabetes*, & *Mellus cruentus* *Egros* fatigant.

Hæc ipsa omnia eo magis confirmant, quando epidemicè gallantur Variolæ, quod bene etiam debet observare Medicus. Præ cæteris tamen tria præmaria *Signa Variolarum* sunt: Dolor in Dorſo & Lumbis, Oculorum involuntaria lachrymatio, & Dolor tenivus in Oculis.

Hæc & similia *Symptomata* *Egros* vexant plūs minis, donec tertia & quarta die *Macula rubra* apparens eipiant: quibus citò & copiosè præcedentibus, ferè mitigatis solent omnia prædicta *Symptomata*. Ipsæ Variolæ per se patent ex *Pustulis* & *Maculis*, nempe locis prorumpentibus: *Macula* illæ nunc simpliciter tales sunt, ita manent, ac sensim post aliquot dies evanescent, ac Morbilli appellantur: nunc successivè in *Pustulas rubras* elevantur, quæ albicunt pedetentim in centro, cum circulo ambieo purpureo, livido, &c. ibique in medio sui in *Parabeant*, hinc in *Craſſas* & *Synares*, tandem decidunt; atque hæc Variolæ dicuntur.

Macula tales potissimum se præmit in *Facie* et *Manibus* apparent, hinc & reliquis in partibus, quæ tumida omnino sunt, ac quasi Tumore inflammatorio & erematoso misto affliguntur, præsertim Caput. Sub suppuratione illa non rarum est, quod *Ulcera granula* variis locis reliquantur, ipsique *Ossa Caris* afficiant. In specie maiore aut non citò expulsi Variolæ, indeque per metastasim ad internam quandam partem delatæ, successivè mille mala, pro partium affectuum varietate, inferunt; adeo, ut non arbitretur, esse vel reperiri Morbum, qui tot mala post se quærit trahere, atque Variolæ & Morbilli non bene indicati: quorum Catalogum vid. in FEHR de *Synæres*, item SCHENCKIO in *Observat.* l. 6.

PROGNOSIS.

Signa Variolarum & Morbillorum *Prægnantia* quod attinet: Si sint Benignæ Variolæ, nihil refert.

Melior est Variolæ & Morbilli citò quam tardè, emittunt quam successivè erumpere: Materie enim obedientiam, & Naturæ robur ostendit.

Post erupras Variolas & Morbillos *Febris* & *Symptomata* remittere debent: si minis, res periculosa est; at enim insufficiens eruptionem, ac delictum varium allendit.

Porro in Variolis observatum est, quod ii: quorum pa-

rentes Morbo *Gallies* laborarunt, antequam eisdem genuerant, Variolis tandem eorumque gravitas fuerit afflicti, uti observat HORSTIUS in *obs.* pag. 308.

Macula purpurea, ut in Variolis Morbus præmonetur? observat SYDENHAM de *Morbis acutis* pag. 180. & de *Variol. Confusis*, pag. 12. LIPSIUS p. 9. HOCHSTEDTERUS Dec. 1. Caf. 9. & RIVIERIUS Prae. l. 17. Sect. 3. cap. 2.

Stillidium Sanguinis ex Naribus est ominosum, præsertim in principio: sed si in principio Variolarum Sanguis largius & Naribus effluerit, & sponte cessaverit, Variolæ & Morbilli pauciores erumpere solent, & ægerque facilius liberatur; si non, peius Signum est. Novi exemplum Familie cuiusdam, cujus individua grassantibus Variolis omnia patiebantur *Symptomata* ebullitionis; superveniente verò *Hæmorrhagia* ab eruptione, omnibus temporibus posthac liberabantur.

Variolæ meliores sunt *rubra*, & citò *albescunt* cum *circulo rubro*, magne, plures, molles & eminentes, acuminatæ, rotundæ, disjunctæ, & sine continuatæ propinquæ; quæque loca externa & ignobiliora occupant, faciliè maturantur, & decidunt: Nam in SCHENCKII *obs.* relictur, Variolas etiam omnia Viscera interna obediunt.

Porro Variolæ *acuminatæ* sunt *salutares*; dunt verò, *depressa* (ut in *Facie* & in Variolis *Confluentibus* sine nota contingat,) sunt *lethales*; & in specie *fœream* in medio monstrantes, & somnium fuscini sunt *nigrescentes*: si *rubra*, & tamen in medio habent foramina, pessimum est Signum.

Variolæ vel ipsæ *albescunt*, vel ad *livorem* declinant, aut saltem quæ habent *Circulum lividum* aut *violetum*, aut *nigrescentes*, & quæ sunt *dura*, & *terrena* similes, *depressa*, &c. admodum sunt periculosa, præsertim si in eorum medio macula nigrescentes apparent.

Si Variolis *Macula præcæciales* inspergantur, admodum periculosa est.

Variolæ cum *Prothibis* nigris lethales: Vid. M. A. N. C. Ann. 6. obs. 59.

Livide, eructule, & nigrescentes *Macula* post Variolas periculosa, imò ferè lethales sunt: Vid. M. A. N. C. Ann. 3. obs. 203.

Variolæ *duples*, aut *terribiles* erumpunt, & maturantur, admodum periculosa sunt.

Non terret debet Medicum, epileptica adesse, Convulsiones ante horam Exanthematum eruptionem; epulis enim his Pustulis subitò & sponte evanescunt, nec amplius redeunt: sed si continuatur *Symptomata*, in specie Motus convulsivi post eruptionem, aut redeant, admodum periculosa est, iuxta lethale, deficientem enim eruptionem hoc innuit. Nam semper post eruptionem alleviari *Egri*, ac ejus *Symptomata* remittere debent; in minis, periculosa est.

Si ante eruptionem fuerit Febris acuta, Intensa, & Variolæ erumpunt copiosiores; boon, si verò Febris intensa, & tamen parvè erumpunt, pessimum est, quia Viscera interna Variolis inquinantur observantibus SCHENCKIO & HORSTIO *Vid. in Obs.* Annotis: qui ipsæ Pulmones & omnia Viscera ferè interna post mortem Variolis repleta reperit. Habetur ergo proprius Variolarum excrementum, & Febris adiuncta.

Post eruptionem iam factam *Alvi fluxus*, aut *Hæmorrhagia* superveniens, malum est indicium: Aut enim retrocedere Pustulas faciunt; aut inquinamenti Humorum insignis ab illis Pustulis indolenti indicium sunt. Rarum igitur est, quod hunc cum ægroti levamine observant WILLISTUS in *Observat.* pag. 161.

Hæmorrhagia ergo *salutaria* si debet esse, contingat

1. In principio aut intermissione.

2. Si afflicti, aut emittenti copiosa.

3. Continua, una vel altera vice non interrupta: &

4. Per Analemmis fiat.

Urina sanguinea seu *Mellis cruentus* in Variolis & Morbillis Signum ferè est lethalissimum; uti etiam si Sanguis purus & sincerus supra & infra excreatur, nunquam evadunt morti, notantibus FORESTO lib. 6. *Obs.* 45. SCHENCKIO lib. 2. *Obs.* pag. 261. SYDENHAM de *Morbis acutis* pag. 17. & de *variolis morb. acutis* pag. 12. & 22. item RIVIERIUS Prae. lib. 17. Sect. 3. cap. 2. & Cent. 2. *Observationes* 72. SALMUTH Cent. 2. *Obs.* 70. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 26. Unde etiam HOCHSTEDTERUS Dec. 1. Caf. 7. 4. & 9. non tamen Urinas cruentas seu Sanguinem per Urinam, sed omnes omnino Sanguinis tam per superiora quam

quam per inferiora dejectiones, lethales afferit. Frequenter observari, quod imper fuerit lethale Signum. Rarum igitur est, Michonem cruentum salutare in Variolis observatum esse, cum sanguinis per Gingivae excretionem supplicet elicit. Vid. SCHENCKIUS lib. 6. *Observationum*.

Interim Hemorrhagia ex Naribus & Gingivis simul lethalis vid. in HILDANO *Cent. 6. Observ. 77*. Societatem eorum est, quando Variolae cum Dysenteria fuerint curatae à RIVERO *Cent. 1. Observ. 71*.

Res desperata, si Manuque curam aliusque Mador, sicis tamen Brachii, occupet; ossi forte tales madidas Manus naturaliter solent habere. *Eger*.

Si in Variolis & Morbillis adest *tafo & ruginis frontis*, cum anxietate & agitatione. Egrotum hac aequo illuc, intra paucos dies obducit; praeteritum si adjuvatur sit Dolor, qui innuit Inflammationem Interitum: Videtur RIVERO in *Observ. communis*, & HOCHSTEDT in *Observationum Anatomicarum pag. 23*.

Variolae salutaris utrimque die quarto erumpunt.

Si Variolae apparent, comitante iolummodo *lavi Febre*, ex pulsi aut Urina, aut etiam Calore externo vix notabili, tum vel materia expellenda pauca est, benigna, & Natura robore pollet; vel suspensa reest, praeteritum si magnus sit Dolor doli, & insulsa Virium oppressio advertatur, latitante Febre admodum Maligna, & quarto subside die lethali.

Quoad Tempus: curatae: pertinent hi Morbi ad Febres Acutas; nam utrimque intra decimam quartum diem totus curas absolvitur.

Qui ex Variolis pereunt, vel ex Angina moriuntur, vel suffocatione propter *Penam vel Pulmonum* opationem, vel *Alvi praesentis*, praeteritum Dysenteriae, vel denique confusionis intereunt. Hinc JOHANNES STEPHANUS *Commentarius in Avicennam*: Nil observationis dubit est, quod antea sit, vox in *patiens Variolis*: Ubi enim prompto religio agit respiratio, vox facili sequitur, mox rucit, admodum salutare signum est: Atque, ubi diffculter transierit spiratio, alterumque significat, nempe aut vires cessasse, aut certe in seipsa transivisse ad seipsum. Similiter quando Variolis impleti, vehementer sinit, insulsaque comitantur angustiae, promptique refrigerant bulla, de tumefactaque, & Morbilli Variolae glaucae livore pallent, tunc *Agri capite* progrediantur; hoc enim Caloris activi extinctionis argumentum est.

Maximè indicat sunt Oculi Variolae, in quibus Lipiditatem, Ophthalmiam, Suffusionem subside & Caecitatem inducunt. (K)

Tandem ha Variolae licet non statim jugulent Egros, interdum tamen, quia vel malè curatae, vel quia partem quandam nobiliorem graviter laeserint, diuturna & lethalia inducunt Mala, in internis praeteritum corporis partibus, maxime Eulcerationes eorum, speciatim pulmonum phlegmā, interdum Dysenteriam, Miliūm cruentum, item Hydropem: vid. LIPSIVS *pag. 21*. & FEHR de *Scararum pag. 39*. Interdum Ulcera Mala partium externarum, cariem Ossis, &c. Nec paralytici, Tremores, ac similes Artuum imbecillitates, post Variolas ac Morbillos non adeo infrequenter sunt: vid. LIPSIVS *l. a.* & BARTHOLOMÆI *Acta Med. Hafniens. vol. 1. Obs. 11*. Unde post curam attentè sumus, ne aliquid materiae morbificae remaneat.

C U R A.

Quoad Variolaram & Morbillorum Caranem: in hac 1. Fermentum acre acidum competendum.

2. Corrosum per Diaphoresin, Natura moderante viam, citandum.

3. Symptomata urgentia mitiganda.

Pro his scopis ritè obtinendis observetur.

1. Tempus Ebulitionis & Tempus Excretionis seu Exspulsionis probè discernendum esse, de quo supra, & hic enim Temporibus ritè distinctis magna pars curae innititur. Nam nec Ebulitio nimis excedenda, nec nimis suppressenda: confirmatur SYDENHAM *M. M. Febres, Caput, pag. 97*. Nec Exspulsi Variolarum & Morbillorum nimis provocanda, teste eodem in *Observ. de Morbis Acutis pag. 177 & 193*. item de *Variolis confusis pag. 22. 25. & 27*. Sed in principio, ubi Variolarum & Morbillorum elemta, i. e. pullulae & Maculae nondum apparent, haud procius ad Exspulsiōnem labandum, sed Naturae comitas ita expectandus. Quando ergo effervescit Massa Sanguinea, & Tempus Ebulitionis adest, *Absorbentia* debita & *Signis* est insidendum, quoniam tuncquidem primordium morbifici Fermenti, indeque ortum nimium Sanguinis Orgulium compelescere ac mitigare, sed etiam, quod corruptio sanguinis, à malignis Miasmatis periclitanda, obstruculum ponere possit, Quod si subseque puititum, aut praegressa quadam Evacuatione debilitatum fuerit, Alexipharmaca generosioribus Ebulitione depuratoria intendatur: vid. SYDENHAM de *Febribus Caput. p. 104*. Ubi verò jam erumpunt seu jam erumpere incipiunt Variolae & Morbilli, tunc Medicus convenientibus Alexipharmatis & Sudoriferis subsidere periciat, & in specie Emulsionem Sonium praestat, eorum proventus promoveatur, continuando eadem, donec bona fide Morbillis & Variolis exarefcat & decedant; *Symptomata vero* remedia: pro ea oia praeparat, imprimis Panchica, Oculia, & Naribus, ne laedantur. Magna tamen hic cautio opus est, ne, dum exiguis consilium, magnum Naturae opus turbemus: Est enim toto hoc tempore una & continuata est Crisi, quare nihil temerè tunc audendum est.

2. Il. Semper post sanatas Variolas & Morbillos Corpus purgandum est, Sanguineque purificandum (quod rite etiam in ipso Variolarum vigore fieri potest, cum Sanguinem purificanti putredini resistat) ne curam hanc inde habentes reliquiae acide salis aut Febres Intermitteutes, aut alia mala inferant: periculum enim malum post se odorem relinquere solent. pro Minera ergo Morbi mortificata, ne reviviscat, auferenda, post duas vel tres septimanas à primo Morbi insultu purgatur patiens scilicet: pro quo scopo *Mercurius dulcis* pra caeteris excellit. Sed an in principio purgandum? quaeritur. Equidem Variolis & Morbillis, qui talibus, nihil consentant purgationes, quatenus tamen Corpus cacochymicum est, & de prima vix fordibus obesse, ne superveniant crudo varia Symptomata Naturae motum turbent, blandissimum primas vias Abstergens, cauto tamen, & saltem in primo Variolarum principio, ubi minus arget Malignitas, ingens vero Sanguinis Effervescencia est conjuncta, propius, ne occasio detur periculo isti, quod ex Alvi Fluxu in Variolis imminet: adeoque Tamarindorum, Decoctionum, aut blandum Laxans Pustulatum, subside usurpandum condicet ad imitationem HORSTII *Observ. Annot. 27. & 28*. Mercurius dulcis parca doze propius, taneum appetitum contra Variolas remedium, qui aut impedit omnimodum eorum invasionem, aut facit ut facillimè & citè erumpant, parvisimèque proveniant: Vid. hac de re M. A. N. C. *Ann. 3. Observ. 9. & 56. pag. 13. & 56*. Ac proinde vel ante vel post Variolas purgandi iust *Agri* Mercurio dulci, qui pro stimulo addi potest gr. 1. Scammonii Sulphatis: nunc in forma Pulveris & cochleari lingeo, nunc cum Conferva Rosarum in forma Bolus, nunc in forma Pilularum cum Malis Pil. de Tribus. (L)

Sed in progressu Morbi, praecipuis in Variolis & Morbillis

(K) Imo curata nuncquā ab acutis Janis Caraculis Lacrymalis, primo involutariis illacrymarum, mox in Simom abente alaculo, Filium Lacrymalium Variolis supercenset haud raro observatum.

(L) Hiis nostris regionibus, in simplici Variolarum suspitione, ne dicam principis eruptionis, & diffinitionis, nedum de Purgentibus religiosis abstinentia: ne scilicet laxata Alvi, Diarrhoea supercremet, ex qua Variolarum eruptio impeditur, vel jam eruptum fiat retrorsum. Reverè tamen quā Variolarum & Morbillorum eruptionem feruida & magna Febre antea solent, hoc quoque argumentum à Purgentibus in principio abstinentia: in febribus enim Febribus, etiam juxta Hippocratis munus, Corpus purgare non expedit. Si vero Alvi satis adstricta sit, & maxime sacum corruptum ex praevio Vitiis ratione fuerit proveniat (ne in eadivisione pueri frequenter fitum est); Janis ritè Chyliferi miversi in ipse Febre principio adhibere, ut scilicet, educta qui in primis viis latebat excrementum salutare, Natura ad Variolarum verum Causam praeparandum expeditior reddatur. Praeterea nedum in principio, verum nec in ipsa declinatione Morbi, Mercurium dulcem, vel Scammonium propius audemus, ut faciendum suadet A., ne majorem irritationem irritatae Janis corporis furiosius his carboribus addamus; Cum ergo necessitas expellat, via ad Oleum Amygdalarum dulcium per vias exhibitum confugimus.

post Variolas cum Urina reiecti allegantur: sicut & *zosterem venereum* in Variola videtur in M. A. N. C. *Ann. 6. Obf. 1. pag. 8.* item *Varicella* in Variolis observatur R. HODIUS *Cent. 3. Obferv. 64.* & BARTHOLINUS *Cent. 5. Hist. 10.*

DIAGNOSIS.

Variolatum immixtum Historia ita se habet: Praegressa *Horror* plius minus tolerabilis loquatur *Astus* intensus, gravitas totius Corporis, Dorsum, praesertim *Lumborum* Dolor facinorosus, & quasi pullatio in Spina, cum quo subinde conjungitur insignis *Dolor Capitis* convulsivus, *Crassi* tumidi & lubrantes, Dolor eorum tenaxius, aut quasi involuntaria Lachrymatio, et aciciditate scilicet Lympharum oculis Oculis vellicante: Quod si addit *Tussis* facis simul, seu potius nimis raliendi conatus, cum *Tussis* celari, frequenter, vehementer, duro, plius minus magno, vel patvo, prout motus Febilis est, atque reliquis Signis, res eo magis confirmatur, *Raspiratio* nonnulli impedita, aut plius minus laesa, cum Voca interdum rauca, & Fauces asperitate, similiter addele solet, *Urina* tamen non est dissimilis; Natura nempe ad ambitum Corporis Serum imprimis propellente. Ubi ergo adfuit *Symptomata Febilis* Ardens, cum Urina permixta aut oihli & statu naturali immutata, Variolas portendunt, uti HORSTIUS recte observavit in *Obferv. pag. 346.* praecipuis in iuniori aetate sua. Interdum tamen turbida est, quod magnum Conventum ebullitionem & agitationem significat: interdum alba cum sedimento foris appareat solet. Aegri sunt inquieti & agrypi, *Terrere*, *Inanitia* prava, Deliria, aut leviscula *Epilepsia* Insulas accesserit solet eruptionem Variolarum. Interdum etiam in primo Morbi insultu *Vomitus*, nunc vero saltem inanis vomendi conatus, *Hæmorrhagia* Nasium subinde admodum copiosa, occasione nempe Sanguinis nimium ebullientis & ferociter addele solet, quæ in Principio Morbi levisior spem reddit, in Statu vero Morbum longiorum, vel sancti evocant insuit, *Diarrhoea* subinde Aegros corripit, interdum *Diabetes*, & *Mellus* cruentus Aegros fatigat.

Hæc ipsa omnia eo magis confirmant, quando epidemice grassantur Variolæ, quod bene etiam debet observare Medicus. Præ cæteris tamen *signa primaria* Signa Variolarum sunt: Dolor in Dorsis & Lumbis, Oculorum involuntaria lachrymatio, & Dolor tenaxius in Oculis.

Hæc & similia Symptomata Aegros verax plius minus, donec tota & quarta die *Macula rubra* appareat incipiant: quibus rito & copiose produntibus, ferè mitigari solet omnia prædicta Symptomata. Ipsæ Variolæ per te patent ex *Pustulis* & *Maculis*, nempe horum prorumpentibus: *Macula* illæ nunc simpliciter tales sunt, læa maneat, ac sensum post aliquot dies evanescunt, ne *Maculis* appellentur: quæ successivè in *Pustulas rubras* elevarunt, quæ albescunt prædentem in crasso, cum circulo ambiente purpureo, livido, &c. ibique in medio sui in *Parabolo*, hinc in *Croco* & *Squama*, tandem decidunt; atque hæc *variola* dicuntur.

Macula tales potissimum ac primitus in *Parie* et *Manibus* apparent, hinc & reliquis in partibus, quæ *tumida* contingunt sunt, ne quali Tumore inflammatorio & edematolo mista affliguntur, præsertim Caput. Sub suppuratione illa non rari est, quod *Ulcera* gravia variis in locis relinquunt, ipsaque *Ossa* Cario afficiuntur. In specie mala est non ita citè expulsi Variolæ, indeque per meatum ad internam quandam partem delatæ, successivè mille mala, pro partium affectum varietate, inferunt; adeo, ut non arbitretur, esse vel reperiiri Morbum, qui tot mala post se queat trahere, atque Variolæ & Morbilli non bene iudicari: quorum Catalogum vid. in FEHR de *Sæculari*, item SCHENCKIO in *Obferv. 1. 6.*

PROGNOSIS.

Signa Variolarum & Morbillorum Praegressiva quod attinet: Si sunt Benigne Variolæ, nihil refert.

Mellius est Variolis & Morbillis citè quam tardè, confertim quam successivè erumpere: Materiae enim obedientiam, & Naturæ robur ostendit.

Post eruptionem Variolæ & Morbilli *Febres* & *Symptomata* remittente debent: si minus, res periculosum est; aut enim insufficientem expulsiorem, aut deicdum virum ostendit.

Porò in Variolis observatum est, quod ii: quorum pu-

rentes *Merbo Gallico* laborant, aetatem eandem gravant, Variolis tandem corpore gravius fuerint afflicti, uti observat HORSTIUS in *Obferv. pag. 302.*

Macula purpurea, an in Variolis Mortis praenunciat? observat SYDENHAM de *Morbis acutis* pag. 180. & de *Varicell. Graecis* pag. 12. LIPSIUS p. 9. HOCHSTEDTERUS Dec. 1. Caf. 9. & RIVIERUS *Prax. 1. 17. Sect. 3. cap. 2.*

Gravissimum Sanguis ex Naribus est omnino, praesertim in principio: sed in principio Variolarum Sanguis largius è Naribus effluit, & sponte cessaverit, Variolæ & Morbilli pauciores erumpere solet, Aegreque facilius liberatur; si non, pejor Signum est Novi exemplum Familiae cumfiam, cujus individua graffiantibus Variolis omnia patiebatur Symptomata obolitionis; superveniente verò Hæmorrhagia ab eruptione, omnibus temporibus postea liberaforunt.

Variolæ meliores sunt *rubea*, & citè albescunt cum circulo rubro, magne, plures, molles & emittentes, acuminatae, rotundae, dispunctae, & sine coagulata propinque; quæque loca caetera & ignobiliora occupant, facili maturantur, & decidunt: Nam in SCHENCKIO *Obferv.* reiserit, Variolæ etiam omnia Viscera interna obolide.

Porò Variolæ acuminatae sunt salutaris; dura vero, depressa (ut in Facie & in Variolis Coniunctivis sine mora contingat,) sunt lethales; & in specie *ferasam* in modis monstrantes, & nonnulli sunt nigricantes: Si rubrae, & tamen in modum habet foramina, pessimum est Signum.

Variolæ vel ipsæ dissolutes, vel ad *interum* declinantes, aut saltem quæ habet *Circulum lividum* aut *violaceum*, aut nigricantem, & quæ sunt dura, & *terribilis* dissoluta, depressa, &c. admodum sunt periculosa, praesertim si in eorum modum maculae nigrescentes appareant.

Si Variolis *Maculae Potchiales* inspergantur, admodum periculosum est.

Variolæ cum *Pustulis* nigris lethales: Vid. M. A. N. C. *Ann. 6. Obf. 33.*

Livide, coruleæ, & nigrescentes *Maculae* post Variolas periculosa, imò ferè lethales sunt: Vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Obferv. 103.*

Variolæ duplæ, aut *cardis* erumpentes, & *maturantes*, admodum periculosa sunt.

Non terere debet Medicum, *epilepsia* addele, *Convulsiones* ante horum Exanthematum eruptionem; expulsi enim his *Pustulis* subito & sponte evanescunt, nec amplius redeunt: sed si continetur Symptomata, in specie Motus convulsivi post expulsiorem, aut redeant, admodum periculosum est, ipsius lethale & deficientem enim expulsiorem hoc innuit. Nam semper post eruptionem allevari Aegri, ac ejus Symptomata remittere debent; si minus, periculosum est.

Si aetate eruptionem fuerit Febriß acuta, letentia, & Variolæ erumpunt copiosiores; bonum, si vero Febriß intensa, & tamen patet erumpunt, pessimum est, quia Viscera interna Variolis inquinantur observantibus SCHENCKIO & HORSTIO *Filio in Obfervat. Anatomis* & qui ipsæ Pulmones & omnia Viscera ferè interna post mortem Variolis repleta reperit. Hæbatur ergo propositio Variolarum excretionum, & Febriß adfuit.

Post eruptionem iam factam *Alvi fluxus*, aut *Hæmorrhagia* superveniens, malum est indicium: Aut enim retrocedere *Pustulas* faciunt, aut inquinantur Humorum insignis ab ipsis *Pustulis* indoli indicium fuit. Rurum igitur est, quod hunc cum negati levamine observavit WILLISTUS de *Febribus* pag. 181.

Hæmorrhagia ergo salutaris debet esse, contingat

1. In principio aut incrementum.
2. Sit *fluens*, aut moderatè copiosa.
3. Continua, una vel altera vice non interrupta: &
4. Per *anastomosis* fiat.

Urina sanguinea seu *Mellus cruentus* in Variolis & Morbillis Signum ferè lethalißimum; uti etiam si Sanguis purus & sincerus supra & infra excretionem, unoquam evadunt morti, notantibus FORESTO *lib. 6. Obfervat. 45.* SCHENCKIO *lib. 2. Obfervat. pag. 261.* SYDENHAM de *Varicell. confusæ* pag. 12. & de *varicelliosis morbo* *acutum* pag. 182. & 112. item RIVIERUS *Prax. lib. 17. Sect. 3. cap. 2. & Centur. 2. Obfervat. 71.* SALMUTH *Cent. 4. Obfervat. 70.* M. A. N. C. *Ann. 3. Obf. 76.* Unde etiam HOCHSTEDTERUS Dec. 1. Caf. 7. 8. & 9. non tantum Urinas cruentas seu Sanguinem per Urinam, sed omnes omnino Sanguinis tam per superiora quam

quam per inferiora defectiones, lethales asserit. Frequenter observari, quod semper fuerit lethale Signum. Rarum igitur est, si Midionem cruentam iulaturam in Variolis observata esse, cum sanguinis per Gingivas excretio supplicia esset. Vid. SCHENKIIUS lib. 6. Observat. 100.

Interim Hemorrhagia ex Naribus & Gingivis simul lethalis videtur in HILDANO Cent. 6. Observ. 77. Sicuti etiam rarum est, quod Variolae cum Dysenteria fuerint curatae à RIVERO Cent. 1. Observ. 71.

Res desperata, si Manum cursum affluens Mader, sicca tamen Brachia, occupet; nisi fortis tales madidas Manus naturaliter solent habere Aeger.

Si in Variolis & Morbillis adeo infuso & rugoso Venter, cum anxietate & agitatione Aegrotum hac atque illic, intra paucos dies obeat, praesertim si adjuvatus sit Dolor, qui nunc Inflammationem Intestinalium: Videatur RIVERO in Observ. communibus, & HOCHSTEDTUS Observat. Anatomiarum pag. 23.

Variolae salubres utplurimum die quartae erumpunt.

Si Variolae appareant, comitante Colore externo vix notabili, tum vel materia expellenda pauca est, benigna, & Natura robore pollet; vel suspecta pauca est, praesertim si magnus sit Dolor dolor, & Infusio Virium oppressio advertatur, latitante Febre admodum Maligna, & quarto lubinde die lethali.

Quoad Tempus curatus: pertinent hi Morbi ad Febres Acutas; nam utplurimum sacra decimum quartum diem totus cursus absolvitur.

Qui ex Variolis pereunt, vel et Angina moriantur, vel suffocantur propter Faciem vel Pulmonum oppletione, vel Alvi pressura, praesertim Dysenteria, vel denique convulsivis intereant: Hinc JOHANNES STEPHANUS Cimonarius in Aegrotum: Nil observatione dignum est, quam anhelitus & non in partibus Variolae: Ubi enim prompti rutilique agitur respiratio, non facili sequitur, neque caecitas, admodum salubris signum est: Atque, ubi difficulter trahitur spiritus, altissimum significari; nempe aut vires succidisse, aut certo in septo transisse adeo plene. Similiter quando Variolae implent, vehementer fruant, intraque continenter augentur, promptique refrigerant bulla, deinde Variolae, & Morbilli Variolae glauco livore pallentem, tunc Aegri caput propinquat; hoc enim Celsus nativis excipit argumentum est.

Maxime infecta sunt Oculi Variolae, in quibus Lippitudinem, Ophechiam, Suffusionem subinde & Caecitatem inducunt. (K.)

Tandem haec Variolae licet non statim jugulent Aegrot, interdum tamen, quia vel male curatae, vel quia partem quandam nobiliorum gravibus laeserint, diuturna & lethalia inducunt Mala, in iocentis praesertim corporis partibus, maxime Exacerbationes earum, speciatim pulmonum phthisin, ipsarum Dysenteriam, Midium cruentum, item Hydropem: vid. LIPSIUS pag. 21. & FEHR de Senectute pag. 13. Interdum Ulcera Mala partium exterarum, Carum Oculi, &c. Nec paralyticis, Tremores, ac similes Artuum imbecillitates, post Variolas ac Morbillos non adeo infrequenter sunt: vid. LIPSIUS l. a. & BARTHOLOM. Alti Med. Naffius, vol. 1. Obs. 18. Unde post curam attenti sumus, ne aliquid materiae morbosae remaneat.

C U R A.

Quoad Variolarum & Morbillorum Curationem: in hac 2. Permutatione acris acidum temperandum.

a. Coreolum per Diaphoresin, Natura monstrante viam, citiendum.

(K) Imo curam immutandam & acritate jam Variola Lacrymali, primo involutivum illacrymansum, non in Si non abesse astringens, Fissilem Lacrymam Variolae supervenisse haud raro observamus.

(L) His modis regimini, in simplicibus Variolarum suspitione, ne dicam principis eruptionis, & Chyliferis, ne dum & Purgantibus religiosissime abstineamus: ne scilicet laxata Alvi, Diarrhaea superveniat, ex qua Variolarum eruptio impeditur, vel jam eruptam sui retrocessio. Revera tamen quoniam Variolarum & Morbillorum eruptionem feruida & magna Febris antea solent, hoc quoque argumentum a Purgantibus in principio abstinendum; in feruida enim Febrili, tunc juxta Hippocraticis munus, Corpus purgare non expedit. Si vero Alvi satis adstricta sit, & maximam fecum coarctatam ex praecursu Filia ratione fuerit preventa (ut in edictis praeteri frequenter est); jam erit Chyliferis mactare in ipso Febris principio adhibere, ut scilicet, educta que in primis viis latebat excrementorum sabura, Natura ad Variolarum verum Causam praerogationem expeditior reddatur. Praeterea nondum in principio, verum nec in ipsa declinatione Morbi, Mercurium dulcem, vel Scammoneum propinare audemus, ne facilius funder A, ne majorem irritationem irritati jam corpori furoribus his cathartici addamus, Cui ergo necessitas expellaverit, vi ad Oleum Amygdalarum delinim per vias exilium confingimus.

3. Symptomata argentia mitiganda.

Pro his scopis rite obtinendis observetur.

1. Tempus Ebullitionis & Tempus Exarationis seu Expulsionis probe discernendum esse, de quo supra; His enim Temporibus rite distinctis magna pars curae junctur. Nam nec Ebullitio nimis erebenda, nec nimis suppressenda: conferatur SYDENHAM M. M. Febres Contin. pag. 97. Nec Expulsio Variolarum & Morbillorum nimis provocanda, teste eodem in Observ. de Morbis Acutis pag. 177 & 193. item de Variolis confusum. pag. 24. 25. & 27. Sed in principio, ubi Variolarum & Morbillorum elementa, i. e. pusillae & Maculae nondum apparent, haud protinus ad Expellenda delinim, sed Naturae consentita expellendum. Quamvis ergo efferveat Massa Sanguinea, & Tempus Ebullitionis adeo, Abstergebat debitis & Figentibus est infundendum, quae non tantummodo primordium morbi Fermentum, inde ortum nimium Sanguinis Organi compellere ac mitigare, sed etiam, quae corruptionis sanguinis, & malignis Miasmatis pericula, obstatum ponere possunt, Quod si subiectionis titulum, aut progressu quodam Evacuatione debilitatum fuerit, Alexipharmacis generosis Ebullitio depuratoria intendatur: vid. SYDENHAM de Febribus Contin. p. 104. Ubi vero jam erumpunt jam erumpente incipunt Variolae & Morbilli, tunc Medicus conveniendi haec Alexipharmacis & Sudoriferis lubinde repetitis, & in specie Emulsionem Seminum praestata, eorum preventus promoveatur, continuando eadem, donec bona fide Morbilli & Variolae exaratione decedant, & Symptomata sua generis per se nata prosipiat, imprimis Pusibus, Oculis, & Naribus, ne indurant. Magna tamen hic cautio opus est, ne, dum sanguis consilium, magnum Natus opus turbemus: Etenim toto hoc tempore una & continuata est Crisis, quare nihil temere tunc audendum erit.

II. Semper post sanatas Variolas & Morbillos Corpus purgandum est, Sanguineque purificandum (quod tunc etiam in ipso Variolarum vigore fieri potest, cum Sanguinem purificantia putredine resiliunt) ne eorum hinc inde haerentes reliquiae acido-salivae aut Febres Intermitteutes, aut alia mala inferant: perquam enim malum post hoc odorem reliquiae solent. pro Minors ergo Morbi mortificata, ne reviviscat, auferenda, post duas vel tres septimanas à primo Morbi insultu purgare patiens fedelo: pro quo scopo Mercurius dulcis praecursus excellit. Sed in principio purgandum? quæritur. Equidem Variolis & Morbillis, quia talibus, aubi conferant purgationes; quatenus tamen Corpus cacochymicum est, & prima viae fordibus oblecta, ne supervenientia exinde varia Symptomata Naturae motum turbent, blandissimum primas vias Abstergens, cautè tamen, & saltem in primo Variolarum principio, ubi minus urget Malignitas, iogens vero Sanguinis Effervescencia est conjuncta, propiusque, ne occasio detur periculo isti, quod ex Alvi Fluxu in Variolis imminet: adeoque Tamarindorum, Decoctorum, aut blandum Laxans Palsiatum, subinde utendum concedit ad imitationem HORSTII Observat. Anatom. 27, vel Mercurius dulcis parca dosi propiusque, eorumque appropriatum contra Variolas remedium, qui aut impositi omnimodam earum invasionem, aut facit ut facillime & sub erumpant, pariterque protevant: Vid. hac de re M. A. N. C. ann. 3. Observ. 9. & 36. pag. 13. & 36. Ac proinde vel ante vel post Variolas purgandi sunt Aegri cum Mercurio dulci, cui pro stimulo addi potest gr. 5. Scammonei Sulphurati: sive in forma Pulveris & coactis liq. in forma Pilularum cum Mala Pul. de Tribus. (L.)

Sed in progressu Morbi, praeparatis in Variolis & Morbillis

billis Malignis, item ubi Pusillus plura minus eruperint, licet Alvi ad 6. vel 8. imo 10. vel 12. dies distrida fuerit, à quolibet tantillum Alvi stimulam, etiam levissimè Clymate aut Suppositorio, fluidos abstinendum, nec, nisi summa urgente necessitate, alterutrum eorum usurpandum: Vid. RIVIERII *Praxis* l. 17. pag. 187. & *Médecin*. LANGII *App. de Morbilibus* §. 97. & *Supp.* p. 139. Si irritatus Alvus, sit cum periculo Vitæ, licet jam omnia fuerint in salvo, quod etiam à D. MICHAELIS & LANGIO observatum fuit; utpote, quod antea erat expulsum, facile retrocedit, ac consequenter Anxietates lethales superveniunt. Nam subinde in Variolis in apparence jam Morbi declinatione supervenit Alvi Fluxus non absque periculo, quod etiam interdum Dysenteriam infert. Non ergo, nisi in Morbi principio, Mercurius dulcis adhibendus, aut si opus sit Clymate Alvi solvenda venit.

III. Pusillus jam apparentibus superveniens fortè *Alvi Fluxus*: hinc causè tractandus, & non adeo subito, nec simpliciter supprimendus est: idque præsertim, si Affectus non tam ex admodum Febre Maligna, quam interno Concentratum spontaneo vitio ac corruptæ originem duxerit: ita tamen regatur, ut Variolarum & Morbillorum expulsi-
o, quantum possibile, promoveatur, non verò ab illo Alvi fluxu cohibeatur. Verum licet non silatur talis Alvi fluxus, sedulo tamen insidendum erit Sudoriferis & Aleapharmacis, quò uti derivemus magis Naturæ motum ad exteriora, ac ita sponte cesset Naturæ ille. Contrà verò, cum tales Alvi fluxus alio tempore venientes sint Symptomatici, & subinde lethales, propterea cum Aleapharmacis expellentibus mikenda simul lacerum Adhærgentia blanda, ut ita succellat fluxus in hoc casu periculosus suffragietur, & omne malum præcavetur.

IV. In Variolis & Morbilibus *Regule mitemdas* hæc videntur in nostro Climate; all enim perit, sed Naturæ motum turbando maleum nocere valet. Interim tamen in principio in Adultis Plethorici aut habitioribus, ac Phrenitide superveniente, Vena supra hand adeo nocere solet, præsertim cum subinde insituta veniat in casu, quo de Variolis nondum est suspicio, sed in primo tali principio. Dum enim jam apparere incipiunt Pusilli, periculosissimum, modo non lethale, exitium Venam aperire hinc vitè imitandas GRASSIUS in M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 55, qui spærim jam tum etuipensibus Variolis Venæ sectionem cum levissime Agri administravit: Vid. RIVIERII *Praxis* l. 17. pag. 696. & SYDENHAM de *Febris* Sect. 4. pag. 101. de *Morbis acutis* pag. 127. 196. 199. & 207. Hoc tamen non obstat quin in aliis Ribularibus, aliis in calibus, subinde aut aut eorum post Pusillarum eruptionem Venæ salubriter secta fuerit; exemplo tamen apud nos non imitandum: Videatur BALLONII *Pharus Medicorum* p. 179. & 185. HORSTIUS in *Opusculis Medicis* in Obs. pag. 39. l. 1. Observationem, item FILIUS HORSTII in *Observationibus Anat.* pag. 23. & 24. & SEPTALIUS in *Animadversis* pag. 111. (M)

V. Opus in Variolis & Morbilibus perquam proficua sunt, debitis cum castelatis adhibita, quæ vid. in M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 68. pag. 115. cum per mitigandas argen-
tioribus Symptomatis, & promovenda excretionis cutanea, per silendo Alvi fluxu, & præcavenda Nerrosi generalia Symptomatis, multum conferat, in specie velipri exhibita. Adhuc ab eorum usu in Facie & Manuum intumescencia quam ingignit in hoc Morbo Natura habet, evacuatio rectius procedit, disicquæ Tumor enim ope ad debitu Naturæ terminum prohibetur, ut loquitur SYDENHAM Obs. pag. 303. Hinc parit in variolis per 5. dies ex abulsi Symp. papaveris innocue dormit: Vid. M. A. N. C. l. 1. a. pag. 154. Unde Infantibus gra-
vibus, vel alterum Theriacæ, Adultis Laudani opiatî conculam dosin, comode propinare possimus.

VI. Sanati cura peracta interrogandi sunt Agri postmodum: an sua vanti, diffidenter respiciunt, an aliorum? aut an in quibuldam partibus internis, vel certis locis, in pe-
lore, aut Abdomine, aut caviterum harum Visceribus, præsertim in pulmonibus, Symptomata quædam sentiant

adhuc? & runc maturè dentur parti affectu appropriata Remedia, ne Atriæ fermentatione reliquæ Variolarum in uno alio loco graves turbas excitent. Sæpius enim post Variolas non sufficienter capillus vel excretas facili Agri in Phthisin incident aut Pleuritidem, aut disturnam periculosissimamque Alvi fluxum.

VII. Externa in Variola ad tollendas Maculas & dec-
lendas Cicatrices fuit nulle, aut causissimè applicanda; ante maturationem enim nihil juvat, imò potius pellunt Agram, & tetra interdum inferunt Symptomata: Vid. FORESTUS lib. 6. Obs. 43. ubi refert, quod ex Variolis in Facie Butyro, in farsigade ad nigredinem frizo, illita, facta sit crusta admodum horrida, quæ totum caudicavit Faciem, ita ut Ager unum perderet Oculum, & nisi in tempore occurrisset, etiam alterum amississet: item BORELLUS c. 1. Obs. 64. observat Mortem ex Cataplasmate repellente Faciei admodum, ad tollendas notas Variolarum. Cauti ergo maxime sumus in talibus applicandis. Porius si volumus extrinsecus aliquid facere, Armille ex Succino Manibus & pedibus applicentur; ab his enim egregiè promovetur in dictis locis ignobilioribus Variolarum excretio, Vid. BECKERUS de *Cultrivæ Profundis* pag. 48. Cum autem blennium Variolæ hic efflor epidemiales, Virgunculae euidam in principio Morbi ante earundem eruptionem Brachialis ex succino parata Carpo imposta fuerint, & cinque & fistula Manu deciderent læpè, detrahe verò semper admoda manerent, Variolarum immanis copia ibidem loci prom-
pit, ita, ut non sine molestia ardorem illarum ferre coacta fuerit. Cum his conferatur et, quæ quoad succinum habet HELMONTIUS in *Tumore Testis* pag. 881.

VIII. In Variolis & Morbilibus *Regule mitemdas* cano-
das, quin potius in loco tepido seu moderatè calido Agri aservandi, & debitis stragulis custodiendi sunt. Ne tamen quid nimis in hoc positi? Possim in hoc errare, dum Agri in locis nimis calidis custodiuntur, atque copiosis stragulis taneumum suffocantur, ad quod admodum est nocivum. Ut hoc regimen sat ritè, tempore Ebullitionis observetur *Ætatis* in Agro febrili: qui si excedat, nullo modo per iniquitatem, aliisve modis est intendend-
us, econtra si sit debilis, aut saltem videatur minor, quam qui sufficit succedente & expellende materię Variolarum & Morbillorum, in mediocri calore sustentandi sunt Agri. Quæ regule in quibusvis Febrilibus, excretio, nec cunctis jussis, probe observandæ. Conf. FORESTUS lib. 6. Obs. 44. JOHANN. DANIEL HORSTIUS Obs. *Anatom.* p. 125. SYDENHAM *Praxis* in *syndem* *Methodo curandi Febris*, *intempus in observ. circa Morbos acutis*, & de *Variolis* *Conferant*, pag. 19. 20. &c.

IX. Dieta tenuis convenit imprimis his Agri, præ-
sertim Ebullitionis tempore, ne impediatur Naturæ motus. Lentum Decodum carumque eius à SENNER-
TO, RIVIERO, aliisque Prædictis in his affectibus laudatur: sed sine fundamento, cum Legumina ejusmodi flatulenta diutè tenuiori Variolarum non sine congruis; nec Decodum, Alvi laxando secretionem turbans. Vinum docet his Agri; Ebullitionem enim intendit, Cephalalgiam ac Deliria excitat, Hemorrhagiæque periculolas movet: (N) Vid. FORESTUS lib. 6. Obs. 46. & FEHR de *Scurra* *cap.* 37. & SYDENHAM l. 1. a. pag. 192. & 198. Gelatina cornu Cervi dissolvitur in Gerereia tenui cum Tinctura Aquilegæ, quæ præ pteris convenit ad expellendas Variolas; vel Nodulis ex femine Aquilegæ & Napi consulo infundatur Cerevisie renai, inhiilaturque desuper Liquor Corallorum pro Infantibus. De Potu in Variolis ordinariè observetur, cum Agri ut plurimum sint stitiales, quod pro Infantibus in specie semper infundendum sit pomum fætorice equini adhuc calidum, quod fœrdum quidem, sed verè egregium est Remedium: Nam per usum huius Infusi calidi promovetur sudor, & præservatur Collum, ne Variolæ inquant Fances, & concilietur Angina.

Quoad Remedia duobus scopis prioribus lætis facientia & eadem sunt vel Generalia, *absorbentia* & *indurantia* vel *Spesificum magis*, Variolis & Morbilibus imprimis convenien-
tia:

(M) Et res quæque à Venæsectione in omnibus Variolarum stadiis abstineantur. Verum si Variola postquam erup-
perint, quancumque cu causâ, sive interna sive externa, retrocedant, cum inflammationis interna & fixis, & præ-
sertim cum difficili respirazione; hoc casu præmissum remedium est Venæ sectare, Experientia demonstravit.

(N) Id quidem intelligendum est de largiore Vini potu: nam si Vinum, præsertim in ætatis Pueris, modica
quantitate exhibetur, sicut Variolarum eruptionem non promovetur; atque hoc est apud rusticos & pauperes famili-
ssimum atque efficacissimum in Variolis & Morbilibus medicamentum.

ta. *Afrasia*, & *Volatilis* final & Acce Acidum temperant, & per Diaphoretica acriam illud ejiciunt. Sed illa *Vicaria* magis temperant, *Volatilis* magis Sudorem & Urinam movent. *Alia* potius conducunt, ubi circa primas vias urgent Symptomata; *hæc*, ubi acris & volatilis peccaverit Acidum, adeoque graviora, præsertim Nervus generis Symptomata interat, ut Inquietudines, Convulsiones, &c. *Alia* magis tempore Ebullitionis; *hæc* Excretionis conducunt, dum difficilem aut tardam Eruptionem admodum promovere; *Alia* magis conveniunt, ubi primarum viarum urgent Symptomata; *hæc*, ubi Periculi, aut Pulmonum metumur à Variolis malis.

Remedia *Vicaria* sunt Unicornis fossilis, Antimonium diaphoreticum, Cinnabaris Antimonii & nativa, Corallia; item cornu Cervi cum & sine igne, Unicornis Verrum, quod tempore Ebullitionis in Variolis ante Eruptionem insignem efficaciam obtinet: item Semina Expulsi-
va ista, speciatim Variolis & Morbillis dicata: sic namque non tantummodo ex Semine Napi, Cardui benedicti, Nasturtii, & Aquilegæ sit Emulsi egregia ad curandas Variolas; sed etiam ipsa Semina pulverisata sufficiunt. Pertinet hæc *Pulsis contra Variolas Timidi*, cupit hæc est descriptio:

℞. Sem. Aquileg.

℞. Sem. Napi an. ʒij.

Card. ben.

Napi an. ʒij.

Rad. Scorz.

Distam. albi an. ʒij.

Terra sigillata.

Corn. Cerv. sine igne an. ʒij.

M. f. Pulsis.

Ex his Seminibus CRATO, triam Imperatorem Archier-
ura, facit Emulsionem, quam insigniter commendat in
Cura Variolarum. Et eorum est, quod in Variolis &
Morbillis magnam usum habeant hæc Emulsiones: Vid.
ZWELFERUS in Pharm. Reg. pag. 209. ubi egregium
habet Liquorem Alexipharmacum, ejus præscribendi
modum *suprà de febribus Malignis in genere* innot.

Volatilis autem sunt quælibet Salia volatilia, speciatim
Spiritus, & Sal volatile Cornu Cervi. Viperarum, Sanguis
humani, & in Infante Variola ob Epilepsiam
nunquam satis laudatus Lique Cornu Cervi succinatus.
His ipsis pro urgentibus Symptomatum ratione & opor-
tet, ut *suprà monitum*, quolibet Marbi tempore possunt
sociari.

Semper autem ante Variolarum Eruptionem cæteris
Remediis munusculi de Cinnabari Antimonii, vel simili
Antiepileptico addendum est, propter metum Convulsio-
num aut Epilepsiæ, quæ ante Variolarum Eruptionem
subinde imminet; sicuti in Pueris supervenientes Con-
vulsiones & Epilepsia Lique Cornu Cervi succinatus
optime sistit, impræparis si jam jam promovere Variolæ in-
cipiant.

Præter *suprà* autem in *Febribus Malignis* laudata Alexi-
pharmata observandum, ut in Variolarum & Morbillo-
rum Curatione Acida caute usurpentur: sicut contra *Spe-
cialis* magis remedia sunt Myrrha, Callorem, Tinctura
Tartari bene acris; item Stercora Animalium, Crocus,
Ficus, Milium; & inter Externa Succinum; ac specialissi-
me Myrrha, & post hæc Callorem, omnibus aliis Re-
mediis in Curatione Variolarum & aliorum Morborum
Malignorum præponenda: quippe Essentia horum cum
Spiritu Vini tartarizato præparatur, tam Præservationis
quam Curationis gratia in illud sunt proficue: sicuti illi
propria experientia observavi. Myrrha enim optimum est
præservativum, & curativum Variolarum, balsamica vi
alterationem harum à Fermento maligno inhibens, adeoque
ne capiosè alinis affligant, præservans. Unde ad
præcautionem Variolarum nonnullis optimo usum com-
mendat est Pulviscula Myrrha: Vid. VELSCHII *Me-
dicinæ. Censur.* 1. N. 29. *annota. ann. 4. M. A. N. G.* Sic
quoque D. L. A. N. G. I. U. S. habebat *Essentiam Saluris* ex
Myrrha cum Tinctura Tartari extractam, & *Essentiam
Acetum* ex Callorem & Aliis fortida cum Tinctura Tar-
tari seu Spiritu Vini tartarizato paratam, quæ in præser-
vandis & curandis his afflicto, uti & Passione hysteri-
ca & colica, plura præstavit; sicut & ipsa Essentiam hanc
tam præservare ab incursionem Variolarum, adeo ut nulla-
tenus illud contrarietur, quomodo etiam correptos minis
gravior laborare, experientia probavi. ZWELFERUS
etiam habet ex Callorem Essentiam contra Morbillos. De
Croc. refert LIPSIUS de *Variolis*, eum mixabilem esse
Tom. II.

in Expulsione Variolarum & Morbillorum, dolorem fe-
dando & venenositati resistendo. His accedunt Antimo-
nialia Diaphoretica, itemque Remedia ex cornu Cervi
parata, quæ tempore Ebullitionis in Variolis ante Eru-
ptionem insignem efficaciam obtinent: quibus pro Adul-
tis admisceantur Cinnabaris Antimonialia, ac pro Infantibus
Liquor cornu Cervi succinatus ob Epilepsiam. Ita-
que ante Eruptionem in principio Variolarum tales For-
mule præscribi possunt:

℞. Antimonii diaph. ʒi.

Myrrh. xl. gr. v.

M. f. Pulsis ʒ.

Pulsis Sanguinem purificans.

Detur aliquoties in vehiculo quocunque.

℞. Pulv. Diaph. Lend. ʒi.

Si Opista adiungenda, adde

Lend. opiat. gr. i.

Infanti

Thuris. gr. ii. vel plura.

M. ʒ. ut anteq.

Vel

℞. Corn. Cerv. sine igne

Antimonii diaph. an. gr. x.

Myrrh. ʒi.

M. pro ʒ. doibus:

D. ʒ. ut anteq.

Quando Variolis mos eruptivus Agri de Hære-
re aut Rigore conquiescat, optime conveniunt Salia fi-
xa: si enim Acrimonia salina vellicat Panniculum carneo-
sum, hoc signum Eruptionis est: c. g.

℞. Corn. Cerv. sine igne ʒi.

Unic. f. ʒi.

Salis Card. bened. gr. xv.

Myrrh. xl. gr. xii.

M. f. Pulsis pro ʒ. doibus:

D. ʒ.

Pulsis Expellens.

Porro in Progressu Variolarum, & tempore Excretio-
nis, *alia volatilia* usurpari possunt; hiac, ubi Variolarum
difficilis Eruptio imminet, tunc

℞. Ebor. sine igne ʒi.

Myrrh. xl.

Antimonii diaph. an. gr. vi.

Salis Card. ben. gr. vii.

M. D. ʒ. ut anteq.

Vel

℞. Corn. Cerv. sine igne ʒi.

(vel hujus & Cinnab. Antimonii an. ʒi.)

Castor. gr. iij.

Myrrh. gr. iij.

Sal. volat. Viperæ. gr. iv. vel v.

M. f. Pulsis ʒ. ut anteq.

Qui licet Linguam Narcotice offendant, tamen egregius
est in difficili Cura Variolarum.

℞. Corn. Cerv. sine igne

Antimonii diaph. an. gr. vii.

Sal. volat. Viperæ. gr. ii.

M. f. Pulsis.

D. ʒ. ut anteq.

Quem cum successu undecim Puero undecim annorum,

℞. Unic. f. ʒi.

Cornu Cerv. sine igne an. ʒi.

Sal. volat. corn. Cerv. ʒi.

M. pro ʒ. doibus: ʒ. ut anteq.

Vel

℞. Unicorn. veri prop. ʒi.

Cinnab. Antimonii gr. xii. vel xv.

Sal. volat. corn. Cerv. gr. vi.

M. pro ʒ. doibus:

D. ʒ. ut anteq.

Facit hæc Pulsis, quemadmodum laudat JOEL in Praxis:

℞. Corn. Cerv. sine igne gr. xv.

Becard. Solar. ʒi.

Sal. volat. corn. Cerv. gr. v.

Lend. opiat. gr. ʒ.

M. pro ʒ. doibus:

Pulsis Expellens.

Item in maxime Malignitate cum Fluxu Alvi, vel ubi
inquieti sunt Agri:

℞. Corn. Cerv. sine igne ʒi.

Becard. mica. ʒi.

Camph. gr. ii.

M. pro ʒ. doibus.

X x

D. ʒ.

D. S. ut antea.

Vel

℞. Corn. Cero. sine igne, vel Pulv. Diaph. Ind. ℥℥.

Baccard. min.

Specif. Cephal. gr. xv.

M. pro 3. doibus.

S. ut antea.

Vel

℞. Aqu. Scabif. ℥℥.

Essent. Myrrh. ℥i.

Corn. Cero. sine igne ℥i.

Baccard. min. ℥℥.

Laud. form. gr. ℥. vel gr. i.

℞. Card. bened. ℥℥.

M. D. S.

Potio Expellens, bene circumagitanda.

Vel

℞. Aqu. Scabif.

Rad. Scorr. an. ℥℥.

Corn. Cero. sine igne ℥i.

Antimonii diaphor. ℥℥.

Sal. volat. ℞. gr. xv.

℞. Flor. Calend. ℥i.

M. pro 3. doibus; S.

S. ut antea.

℞. Aqua Card. bened.

Fl. Samb. an. ℥i.

Pulv. Baccard. Semur. gr. xv.

Myrrh. ℥℥.

Cianab. Antimonii an. gr. vi.

Sal. volat. Corn. Cero.

℞. Card. bened. ℥℥.

M. D. S.

Potio Expellens, coctilem fumenda.

Vel

℞. Aqu. Menth.

Flor. Samb. an. ℥℥.

Gelat. Corn. Cero. ℥℥.

Terra filit. (in specie, ubi Alsi superius ad-

dit, qui non satus.)

Antimonii diaph. an. ℥i.

Myrrh. gr. v. vel vi.

℞. Card. bened. q. ℥.

M. D. S.

Potio Adstringens & Expellens.

Vel

℞. Aqu. Scab. ℥℥.

Spiritus Theriac. ℥℥.

Corn. Cero. sine igne ℥℥.

Baccard. min. ℥i.

Ceph. gr. i.

℞. Capiv. albi ℥℥.

M. pro 2. doibus; S.

Potio Expellens & Confortans.

In specie Emulsiones ex Seminibus Expulivis confic-
tæ, quas nota commendavi, & quas CRATO adeo
laudat, proderunt. Crætuus Emulsiō ad Pectichales Fe-
bres, Variolas & Morbillos est hæc;

℞. Sem. Card. bened. ℥℥.

Napi ℥i.

Chiri ℥℥.

Aqua Card. ben. ℥℥.

M. f. l. a. Emulsiō

cui addo

℞. acrif. Chiri q. ℥.

Egregia est hæc Emulsiō. Item...

℞. Sem. Aquileg. ℥℥.

Baccard. ℥℥.

Card. bened. ℥i.

Cum Aqua quodam spiritibus & Emulsiō.

D. S.

Emulsiō Expellens.

Vel secundum Methodum Modernorum præscribitur

hoc modo:

℞. Sem. Aquileg.

Napi an. ℥℥.

Aqua Amar. ℥℥.

F. Emulsiō addo

Corn. Cero sine igne

Antimonii diaph. an. ℥℥.

Educoretur cum Rosæ manas Christi per.

M. D. S.

Emulsiō Expellens Confortativa.

His, quando Agri sunt inquieti & jelligant, commo-
dè Semen Papaveris albi cum Essentia Calicorei addi. po-
tèst; illud enim Sudorem etiam simul producit, quem Pa-
paver nos cohibet. In tali ergo calui:

℞. Sem. Card. bened. ℥i.

Napi

Aquileg. an. ℥i.

Papav. albi ℥i. vel ℥℥.

Cum l. q. Aqua Card. bened. & Emulsiō.

cui addo

℞. Ess. Capiv. ℥i. sunt lactes.

Myrrh. ℥℥. sunt lactes.

Antimonii diaphor. ℥i.

Unic. scf. gr. xv.

Educoretur parum; f. Emulsiō Sudorifica.

D. S.

Emulsiō Sudorifica.

In specie Excretionem Variolarum & Morbillorum

promovet. Vel

℞. Sem. Napi

Aquileg. an. ℥i.

Papav. albi ℥i. vel ℥℥.

Cum l. q. Aqua. Fruct. & Scabif. f. Emulsiō

addo

Corn. Cero. sine igne

℞. sine igne

Pul. Marchion. an. ℥℥. ad gr. xv.

Res. min. gr. vi.

M. & edulcora cum Rosæ manas Christi per.

D. S.

Emulsiō Expellens.

Vel

℞. Sem. Aquileg. ℥℥.

Napi

Card. bened.

Papav. albi an. ℥i.

Cum Aqua. Flor. Aquileg.

Card. bened.

Napi an. q. ℥.

F. Emulsiō ad ℥i.

addo

Aqua. Cianab. cum Vitis ℥℥.

Corn. Cero. sine igne ℥i.

Res. min. ℥i.

Unic. scf. ℥i.

M. edulc. cum l. q. Sacchari.

D. S. ut antea.

Vel ad imitationem ZWELFERI cum Myrrha:

℞. Flavac. Cor. Chiri ℥℥.

Sem. Chiri ℥i.

Card. bened. ℥i.

Aquileg.

Contende in mortario cum l. q. Aqua. Rosarum in

Emulsiōem levis edulcorandam.

D. S.

Emulsiō Expellens & Confortans.

Chira Rosarum, & dam remittunt Symptomata, & copio-

se jam Pusillæ efflorescunt:

℞. Tinctura Antimonii tartariz.

℞. Ess. Myrrh. an. q. v.

D. S.

Essentia sanguinem purificans, guttatim capienda.

Detur his vel ter in die pro circumstantia Agri.

℞. Tinctura Tartari acerr.

℞. Ess. Myrrh. an. dr. ii.

M. S. ut antea.

Denur Adul o 3a. vel 6a. guttæ ter in die, Infanti-

sa. vel 3a.

℞. Tinctura Tartari acerr. dr. ii.

℞. Ess. Myrrh. cum Spirit. Sal. Ammon. per dr. i.

M. S. ut supra.

Dosis Adulto 4a. vel 5a. guttæ, Infanti 3. 4. & 5. au-
norum gutt. 1a. vel 2a. quater in die, pro ratione cir-
cumstantiarum.Imprimis ad expellendas Variolas nobile est Stevens e-
gnotum in Nodulo Potui ordinari infusum, expressum, &
ita propinatum: aut etiam in Cerevisia calida Succus ex-
pressus exhibitus scopis comibus in Cura Variolarum &
Morbillorum Genuifacit, & in specie ab Angina ac Pleuri-
tide, ac cognatis in Variolis periculosæ malis præservat.

Aliae

le, Theriaca Castoreis, Sympus Papaveris, gr. i. vel gr. iij. Laudani opiat, una cum Absorbentibus optime curant, His non sufficientibus, accedendum ad Liqueorem Cornu Cervi facinatum, qui præsertim Infantibus optimus est, & eisdem quietos reddit, in potu ordinario assumptus.

III. *Diarrhoea* in incremento, & stato superveniens plurimum funesta est, nisi in Infantibus succulencia, præsertim si in statu occasione vel Potus nimii vel frigidiusculi oriatur, & imprimis, si murationes Abdominis conjunctæ fuerint; & Excrementa ipsissima. Hæc Diarrhoea aut alius Alvi fluxus per Terram egillatam curatur, si nempe hujus Pulvis largiter Cerevisiæ injiciatur, & sub quolibet haustu præbeantur agitentur, & ita assumatur; sic brevi sedatur Diarrhoea, & Variolæ programrant: Item Elechuarium Diacordii *Præparati*, Coros Cervi utrum, Unicornis fossilis, Theriacalis, &c. conveniunt. Vid. SYDENHAM *de Morbis acutis* pag. 195. 203. & 205. nec non BONETUS *mercator. Campial.* pag. 612. §. 69.

Aliquando Pællæ decemni Variolis ingroisse afflicta, & in qua hæc luppuratione incipiente periculose evanescere, cum succedente Alvi fluxu, simulque Pedes ejus usque ad Genas cum dolore vivebant: hinc in adeo periculoso articulo constitit præscribere sequentes Pulveres;

℞. Antimonii diaph. 3℞.

Caster.

Myrrh. an. gr. viij.

Camp. gr. ii.

M. f. Pulvis pro 2. doibus.

Quo Pulvere cum aliquoties fuisset usa, & Alvus suppreffa, & Variolæ etiam expulsa fuerunt. Item

℞. Antimonii diaph.

Cor. Cerv. *sem. igne* an. gr. xv.

Caster.

Myrrh. an. gr. v.

M. f. Pulvis pro 2. doibus.

Puero 13. annorum tribus diebus gravi corporis æstu, vomitu continuo, & incipiente Diarrhoea afflido, in luppatione Variolarum, cum in vicinis locis observaretur, præscripsi:

℞. Extrac. Ther. gr. v.

Laud. opiat. *form.* gr. iij.

M. f. Pilula. no. xii. pro 2. doibus.

A primis dosi omnis vomitus, & angustia cessavit, Hinc

℞. Pul. Bezaard. *comp.*

Spiss. Ceph. an. ʒi.

M. pro 2. doibus.

Hinc copiosissime eruperunt Variolæ. Potui infundebatur Hærcus equinum, ejusque succus permisciebatur.

Puero aliquot annorum ex Variolis gravi difficultate respirations laboranti, & simul Diarrhoea correpto in statu morbi:

℞. Ag. Scabiol. ʒi.

Terra ʒiij. ʒ℞.

Syr. 2. sacce scabiol. ʒv.

Miscet. pro potione.

Capietatur pro lubitu.

Sim autem Diarrhoea, quod interdum fit, à Lombicis oriatur, lethalis observatur: Vid. RIVIERUS in *praxi* l. 27. pag. 302. quævis nec hoc forsitan perpetua veritatis esse, ex Prognosi colligi queat. In Morbillis interdum Alvi fluxus ad aliquot septimanas excurrit, non hæc Aëgrorum discrimine, pro quo compedienda dista Theriaca, & Absorbentia conveniunt. SYDENHAM quidem in hoc casu Venæsectionem commendat, quæ tamen vi locum habet, neque in incremento, neque in statu, propter rationes supra dictas, neque in declinatione, propter Sanguinem jam depauperatum.

IV. *Ygma*, *Deliria*, imprimis *Convulsiones epileptica*, quæ Infantem mox primo in Morbi principio aut incremento cum Abdominis duritie affligunt, optime curantur vel Pulvere Epileptico antimoniali, vel Liqueore Cornu Cervi succinato, Cinnabari Antimonii; & si necessarium videatur, in morbi principio Clysmata levia injiciantur; simul exteroe, si Dolor Abdominis tenivus aduerit, Lioamentum ex Olei destillati Succici ʒi. Spicæ gutt. v. recipiendum cum Corpore pro Balneo, regioni Umbilici, & scrobiculo Cordis inungatur, idque ali-

quoties; sic enim Epilepsia evanescere solet.

V. *Hæmorrhagia Narium* moderata aliquando lenenda, præstat ut plius fluat Sanguis quam minus. Videatur HORSTIUS *observ. anat.* pag. 95. Quid si non sufficeret procedat, potius promovenda venat, vellicando Nares, aut cum Seta porcina, aut per Radicem Crocodilii (P): (vid. LIPSIUS pag. 21.) aut crebris & fortius eisdem emungendo, aut alia modis Hæmorrhagiam Narium provocando, quod cum fecissem, Sanguis deinde fluxit, & Febris desit, & brevi sanata est, dicit FORESTUS lib. 6. *phlegmat.* 23. Quid si exaceris modum, optime Hæmorrhagiam Narium curant Bistones appensi, aut sub Asillialligati; vid. WILLISIUS *de febribus* pag. 266. Id quod & in aliis Malignis obicit. Alias cum in Variolis nimis Hæmorrhagiæ ex Ebullitionis Sanguinis nimio impetu ardeant, eisdem etiam *Opiata* cum *absorbentibus* seu precipitantibus dilutis compescunt; conf. WILLISIUS *Pharm.* Rat. p. 2. sect. 3. cap. 2. & 217. videndo tunc Valatilia.

VI. *Taffis*. Taffis secam subinde molestam, & pedoris affectus in principio optime siliunt Temperantia acrimosam Lymphæ, & Leucæntia, vulgo lacraffacta; in statu vero incidentia, & Expectorantia. Ita Sympus de Julebis, Violarum, Papaveris, Diacodium *Mentani*, Pulpa Passularum in Aquæ Scabiole, Tussilaginis, &c. Hæc vero Sympus Nicotianæ, de Erythimo cum Aquæ Menthe, Hyssopi, &c. In omni tempore remedia ex Scabiole præsertim, vel sola, vel cum Spiritu Salis Ammoniaci anilato, qui in Affectibus Pedoris optimus est, mista, spiciose præstant, & curant partes Respiratorias dicatas. Curavi superiore anno Adolescentem 18. vel 18. annorum, qui sub prima Morbi insula laborabat Catarrho Epidemico cum Pleuritide notha, per Missuram ex Spiritu salis Ammoniaci anilato, & Laudano opiato constantem, si quarto die erupero Variolæ. Vel

℞. Aqua. Hyssopi.

Tussilag. an. ʒi.

Symp. de Julebis.

Violæ.

Nicotianæ an. ʒv.

M. D. S.

Potio contra Tussim.

Variolantes si moriuntur, suffocati utplurimum intereunt, quare semper Respiratoria modum consideremus; quò celerius & minor, eo pejor; quò magis herant, eo pejus.

VII. *Mirum præparatio*. Si in statu ob Symptomatum syndæmon Vires incruet prostratæ, optime conquiri Tindura Coralliorum cum Spiritu cordis Cervi sæpius propinata, Item Vini Rhenani haustulus, vel Pans simaligineus, Vinn incidiuus, & ita propinatus, optime est Analepticum, speciatim, quando vires prostratae à nimio sudore, & ægri inde imbecilliores sunt.

VIII. Supervenit locorum *Stomachia*, quæ duplex; vel non possunt formare solem, quod fit vitio Laryngis, & Nervorum ejusdem; vel licet edent solem, tamen aquilam formare nequeunt, quod fit vitio Linguae, & ejusdem Nervorum. Primus casus reperitur in HILDANO *curat.* obs. 14. sed est rarus. Secundus casus curatur per insensu Volatilia Antiparalytica; imprimis Essentia Castorei Latius in parte prima circa fixum crebro affricatur: Vid. HORSTIUS *obs.* lib. 2. *observ.* 29.

Post Erupitionem Symptomata sunt;

I. *Retractiones*, quibus Deliria ac Convulsiones superveniunt, & vocatur communiter Raptus materiam excrendæ ad Caput; rellis autem diceretur Raptus materiam ad systema Nervosum. In hoc casu nil melius est, quam *Physicaria* Pedibus applicata: Vid. BARTHOLINI *Assa Med. Rhenicæ*. Vol. 2. pag. 200. Sicut alia, ubi in Variolis graviora erumpunt symptomata, nec rite eadem erumpunt, non absque fructu Velocitatem applicatur. Vid. FEHR *de Stomatitide* pag. 83. item BARTHOLINIUS l. 4. Vol. 3. pag. 73. Epilepsias, & Deliria ex earum retrogressionem oriunda præcaveant, interdum, & curant. Interdum optime convenit dicitur hoc remedium, quando particula Pagni rubri Anglici, Germ. *ruchschalisch*, in Cinerem seu crassamentum nigrum comburitur, & aliquoties in Vino Aëgro propinatur. Experimentum hoc ab Amico hodie digno habeo. Aliquando cum recessissent Morbilli, & varia excitaissent symptomata;

℞. An-

(P) Crocodilium vocant qui *Lim. AA.* vel *Carline* vel *Cardui Sphaeroccephali species quasdam*, in apud C. Bauhinum in Pinace.

U. Antimonii diaphan. Di.
Cinab. animosii. B.
Sal. vol. Corn. Cor. gr. iij.
Camp. gr. ii.
M. l. Pulvis pro s. doctus: 3.
Pulvis Expellens.

II. *Cicatrices* & *Foveae*, quae oriuntur ab erosione, ab Acido acri falio. Ergo temperandum illud, ut Pus mitescat, cum Lapillis Cancrorum, & Myrrha: quo facto, Fovearum & Cicatricum nullus metus. Unde

1. Mutantia & Temperantia conveniunt.
2. Nervi & Maculae tollentur.
3. Cicatrices & Foveae, si quae sunt, implentur.

Pro primo scopo, ut temperetur & mitigetur Pus, Oleum Amygdalarum dulcium, vel Oleum Nucum recens & sine igne expressum, cum penna calidè illitur, quando jam maturaverit, & in medio oculi quasi sibilantes apparuerint, hoc sibi pliculè fiat in din. Vel, cum Morbilli incipiunt se ostendere, & tumores crassius de Rubris Partibus, in qua liquoribus instinguntur Panaculis, quibus facies terenda est h. 7. vel 8. vitellus in dia, solummodo Morbilli faciant, & nulla Macula remaneat. Frullum item Lardi impositum, ac sibi pliculè renovatum, est egregium. Praestantior est Pinguedo Lardi incens super Flores Laici desillatis: Vid. CNOFFELIUS in M. A. N. C. Ann. 6. Append. pag. 193. utut SYDENHAM de Morbis acriis pag. 706. Pinguis ideo rejiciat, quod Furfures cumulet, ac Cicatrices potius augent, Pulvis ad Variolas MYNSICHTII vid. in armam. pag. 134. Decoctum Malvae sut Ficuum cum Gossypio aut Intoleto tepidè sibi pliculè applicandum commendat MERCURIALIS de Morbis Puerosum lib. 1. cap. 3. Unum ex optimis est Spiritus Vini aromaticum cum Salibus volatilibus leviter acutus, & subinde calidè Variolis applicatus (Q). Vid. SYLVIVS de Morbis Infantum cap. 9. Vel observetur elegans illa Methodus M. A. N. C. Ann. 4. pag. 30. ut sub Eruptione Variolarum Spiritus Vini myrrhatibus calidè per 2. dies repetitis vicibus illatur. Hinc Saccharum Saturni Aqua Rosarum mixtum, calidè penna Faciei applicetur: huius loco etiam Emplastrum de Spermate Ranasum cum Saccharo Saturni imponi potest: Vid. HOEFMANNI Clavis pag. 249. Sed caute talia fiant, ne Repulsioni Variolarum, superveniat Moris: qualia Exempla supra ex BORELLIO & FORESTO allegavi. Sunt, qui Aeu aurea vel argentea Pusculas ad mortificationem perducere sine dealbas perforat, ne materia purulenta Catem subcentem erodit: sed super hoc legi meretur Consilium MERCURIALIS l. 1. a. qui molestiam atque ac suppuracionem hanc operationem credit: potissimum cum nonnulli sub Sanie laudabilem Carnem succrescere ajunt.

Ne autem Facies toti variolis obideatur, Viennæ Doro seu Scapula imponunt Psyllaria: Vid. THERIAVERUS lib. 1. Confutatio pag. 106. Alii pro hoc Vaporem ex Decocto Herbarum Humilium cum Pedibus fuscipiant: vid. M. A. N. C. Ann. 6. Observat. 186. pag. 247. aut Laici elido Pedes immergunt, Variolas ad extremitates has detrahendo & rovellendo, auctore SYLVIO loco supra cit. §. 76. Facit hoc, quod refert FORESTUS lib. 6. Observat. 62. In Pruritis manuum & plantarum pedum, dum empuant, puscula, ponantur dista membra afflicta in aqua calida, & multum confricent: Pruritis & pustiones cessant, meliusque Morbilli evanescunt. Quæ Remedia quidem tuta sunt videtur: sed habetur super Pedum ratio, ne à copia Variolarum Dolores diuturni aliave graviora mala iidem concilientur: Conferatur HILDANUS Cent. 3. Observat. 99.

Secundo Naves tollens impellit Sperma Ranasum, hinc Aqua Florum Fabarum cum paucis Oleo Tartari per deliquium temperata; item Aqua omnium Florum, cui miscetur Cosmeticum Clavii cum pauca tutia, &c.

Vel

U. Aqu. Calcis vir. Bili.
Pulv. Sulph. citrini. B.
Coqu. invicem: Colatura adda
Aqu. Rosar. B.

M. D. S.

Aqua Mundificans.

Facit hoc etiam Cataplasma sequens.

U. Farin. Fabur.
Lupinor. an. Bii.

M. cum Rina Rovo ad consistientiam Cataplasmae, quo ipso vesperi tota inauguratur Facies.

D. S.

Epithema Mundificans.

Relinquatur ita per noctem, mane tunc cum Aqua Florum Fabarum abluatur, & videbitis egregium effectum.

Tertio *Cicatrices* denique, si nihilominus quædam superint, pro his mediante nutritione debet implendis interverti Axioma Affice plicia cum Oleo liqui Rhodi mixta & illita (vid. WEDELIUS de Medicam. Camp. pag. 186. & Pinguedo Anguillæ, Unguentum de Cetrulla camphoratum, Oleum Olearum, &c. An verò Cicatrices relictæ adeo facillè deleri possint; merito dubitatur.

III. *Frysillos*, rarum equidem hoc post Variolas apud nos est Symptoma; observatum tamen tepius à SYDENHAM. Hic igitur Variola male tractata, interdum asspicitur supervenient, ut sit tractandus, videb. in sicuti Axioma de Methodo medendi Febres pag. 103. Item in cap. Observat. pag. 174. & 201. Celsus Pyralismus promovetur per Cerevium tenentem, Decoctum Hordei, aut alium liquorem fermentescentem, nec ad Sudorem cagentem. Usi propter Salivæ viciditatem Suffocatio metuenda, conveniunt Gargarismata ex Cerevii secundaria, aut Decoctum Hordei cum Melle Rosarum.

Quoad IV. Indicationem; lesiones Partium adhuc habenda est ratio, quas inter frysip, ac periculosius affligi solent imprimis Oculi, & quidem duplici modo:

1. Quando Variolæ oculi bullam occupant, non tantum Tactitas, sed & interdum Albugo, Ulcera Oculorum, & Pannus relinquatur.
2. Palpebris obducit, quibus suppurantibus Oculis non possit aperiri.

Ad præservandos Oculos in Variolis commendatur Saphirus & Sinaragus, ut & Succinum, si nimirum circulus circa Oculos ducatur. Optimum est Collyrium ex Infuso Vitri Antimonii in Aqua Platanaginis, Rosarum, Cyani, & Calcitrippæ; vel dictis Aquis addatur parum Tutie, & omnibus Sacchari Saturni; nam & si hæc infillantur Oculis, præstentur à Variolis. (R)

Si jam incipiunt promovere vel in Oculo, vel eos affligunt, quod ex rubore & pruritu patet, fructum crudum Carota recentis, sive bovinae sive vitulina, si magis ordine & crassitie thaleri tepide applicetur, ut hoc ipsum falsam infestantem Oculos humiditatem absorbeat: huc, ubi ferè ad quadrate horæ affuerit, removeatur, novumque densè applicetur, & sic consequenter aliquandiu continuando, validè convenit in præservandis & curandis Oculis à Variolis.

Ante Mutur quædam sana Allium masticet, & balneum Otis Oculis inflet, mane ieiuno stomacho crebrius repetat; vel accipiat Crocus, infundatur Aquæ Foeniculi, & Infusum hoc (non tamen fit acre) instilletur:

Vel

U. Herb. Rary ros.

Ex qua coctura exprimitur Succus, filtratur, & cum Aqua quadam Ophthalmica mihi instilletur.

D. S.

Aqua Ophthalmica.

Succus Chrysosuli cum Aqua Foeniculi instillatur Variolæ Oculorum curat: Videtur SYLVIVS l. 1. a. §. 13. Item

U. Aqu. Plantan.

Salan.

Rosar. an. B.

In quibus ebulliant

Semi fumar. dr. i.

Pistac. dr. B.

Ex Colatura fiat Collyrium, siquæ Oculis instillandum, idque in principio, ut defendantur Oculi à Pusilla, in quo obtinendo tale me nunquam fessile, dicit REENALMUS in Obs.

Aliquando cum jamjam Humor ad partem appulerat, admiscui, detracta Aqua Solani & Semine Samach, Mucilaginis Seminum Althææ in Aqua Foeniculi extracta dr. B. Quibusdam minime in copia, pro ratione Morbi: Confer.

(Q) Sic fani à Spiritu Vini, cum ab omnibus spiritibus Medicamentis abstinentur; atque ad temperandum Pus arripuntur, vix Oleo Amygdalarum dulcium Variolas oblinunt.

(R) Ut Oculi à Variolis erant præservantur, solum: hic afflicti fasciis illis sapinifera obstruere, & non sine fructu. Hispani Palpebras antiquè Auri folio circumcingunt.

fer. HORSTIUS lib. 6. Observe. Append. pag. 301. Loco Scaminis Sumach Malicorium recipi potest: v. g.

℞. Cort. Granat. ℥iij.

Infund. in l. q. aqua Rosar. & Plantag.

Sent in Infuso in loco calido, postea filtretur, & adde

Margarit. prop. gr. ix.

Cori Orient. gr. iij.

M. S.

Mixtura ad Oculos.

Egregium quoque est hoc:

℞. Varioli de Cypro:

Dissolve tuncillam in

Aqua Rosar. q. l.

adde

Tutia quantum feruat Oculi sine dolore.

D. S.

Collyrium.

Infundatur guttatim Oculis, & præservat egregie à Variolis.

℞. Aqua. Rosar. ℥iij.

Tutia prop. ℥iij.

Camph. gr. v.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Missa aut infundatur, aut applicetur Oculo, ne Variolæ possint oculo nocere.

℞. Aqua. Plantag. ℥iij.

Rosar. an. ℥iij.

Camph. gr. v.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

Cori gr. iij.

post in Oculis per tres vel quatuor dies tempore matutino, quod quidem mordax, Oculum autem curabat. Item Oleum Infusum Multilorum: (salutem) cuius si una, vel dua gutta Oculis infundantur, infusum postea absterge, est egregium remedium. Pinguiculis Viperarum gutta una vel altera Oculis instillata, vel si minus recens aut rancida, Palpebris instillata illata, Oculorum vitia curat. Confectum quoque Eryngii post Variolas curatas FORESTIUS lib. 6. Observe. 35.

Nares descendentes sunt, ne intercipiatur Respiratio, nec fiant Ulcera & Oczena, quæ difficultat curantur. Optimus est odor Aceti Rosæ, vel Isolaris, vel Camphora impingenti, sic præservantur Nares à Variolis: Vcl

℞. Flor. Rosar. rubr. p. iij.

Camph. gr. viij.

F. Nodulus cerebrus Naribus admoveendus, vel solutis si vel Aceto rosaceo instillandus.

D. S.

Nodulus ad Nasum.

Quod si in Variolis Crusta subinde circa Nares concreverit, ita ut per eas spiritus trahi nequeat, Narium recens non salicium, vel cum Aqua Rosarum sapissimum locum, blandè iungendum est, quousque Crusta decidat.

Nares. Ubi in Variolis Auditus læsus fuerit, imprimis Veficatoria ponè Aures applicanda: hinc Essentia Cardui benedicti, aut Cafforei, cum Bombace cerebris Auri immittatur: Vel fiat Suffitus ex Cafforeo, Myrrha, Colocythide, Semine Fœniculi, & pauco Croco in Vino coctis, ac per tritorium Auribus immittatur.

Functæ imprimis sunt Variolæ Faciei, in quibus suffocatoria Pathemata, atque adeo angina quasi inducunt. Ad præservandas hæc Fauces ab Angina optimum est per collutione Oris & Faucium sterus equinum. Cerevisia secundariæ vel Potui ordinario Infusum, & sapissimum utatur: item Gargarisma ex succo Cancrorum Huviatilis, cum Aqua Sempervivi majoris, omitendo vel addendo Sal Prunellæ: sic Fauces & Lingua præservantur: item Gargarisma ex Aquis appropriatis cum Rob Nucum & Nitro dopurato vel antimoniato: a. g.

℞. Aqua. Prunell. ℥iij.

Rob Nucum.

Nuc. an. ℥iij.

Eryng. Granat.

de Succ. Scabio. an. ℥iij.

M. S.

Succus ad Fauces,

Vel

℞. Aqua. Prunell.

Scabio. an. ℥iij.

Moring. Sem. Cydon.

Fenugr. an. ℥iij.

M. S.

Gargarisma ad Fauces,

Convenit quoque Decodum vel Tinctura Florum Papaveris erratici cum Succo Cancrorum Huviatilis: Vid. SACHSII Gammarol.

Quod si nihilominus Fauces & Lingua obfideantur, idque cum magno Dolore & Calore, imitemur FORESTUM lib. 3. Observe. 17., qui iubet, ut continuè cum Lacte caprino, & Aqua Plantaginis simul misto, tepidè se gargazeant. Egeris aut si Gargarismo molestia sit, saltem aliquandiu in Ore decineantur, hinc exspuantur, quod miraculè instat prodesse ait, & Oris & Gutturis præstantissimum remedium, cum signa Exanthematumque producat. Item Gargarisma ex Decocto Herdei, Passule minoribus, & similibus temperatibus adhibetur, idque ad faciliorem maturationem: Pusillus vero se iam aperientes, huic Decocto Mel rosarum cum panisilla Aluminis admiscetur ad meliorem purificationem, ne Ulcera fœdida remaneant. Quod si nihilominus Fauces & Nates exulcerate fuerint:

℞. Herd. ven. vel Salv.

Herd. an. M℥. vel Mj.

Passul. min. M℥.

Coq. in l. q. aqua Plantag. ad ℥iij. vel ℥i.

Colaturæ adde

Mell. rosar. ℥i. ad ℥iij.

Alum. ℥i. ad ℥i.

M. S.

Gargarisma.

Quod si Lingua exulcerata fuerit, siquidem hæc non raro tota putrescit, eroditur, & exspuitur (vid. SCHENCKIUS lib. 1. Observe. BARTHOLINUS Crat. 2. Hist. 22. M. A. N. C. Ann. 1. Observe. 35. in Schol. p. 216. & RO-

Nebula postmodum in Oculis apparentes Pulvere Sacchari Candis in Oculis infusa curantur: Hoc enim Saccharum non solum præservat Oculum, sed & Nebulas detergit, si cum Aqua rosacea adhibetur. Sin his omnibus non obstantibus Variolæ tamen Oculum occupant, ita ut illis curatis vel Lippidino, vel Ophthalmia, vel Nebulae aut Suffusiones, vel Visus hebetudo, aut similes Visus obscuraciones, post Variolas superflue, profusa est Aqua Ophthalmica Rosacea, vel Aqua Ophthalmica ex Croco Metalorum: sed simul Nuchæ applicetur Veficatorium. His non sufficientibus, hoc clauso bina Veficatoria ponè Aures applicentur, quæ impedimenta removeat, ut melius Oculi curari possint per reliqua Remedia: c. g.

℞. Empl. Veficat. part. 1.

Cier. ana vel partem dimid.

M. D. S.

Emplastrum Veficatorium.

Hoc inductum super lineam Nuchæ applicetur.

Quo verò distillat seruetur apertum:

℞. Empl. de Sperem. Rosar. part. v. vel vi.

Veficat. part. 1.

M. D. S.

Emplastrum Aperientis.

Pertinet hæc, quod refert LIPSIUS de Variolis: In antiqua lege repertis hæc experimentum: Post quidem post Variolas per totum annum nihil videbat, Oculi ipsi quidem erant illi, sed perspicillat obduci. Summat tandem vultu radium Cratium, scilicet illum in perie minutat, equatque postea eandem in Vitis, & Aqua equaliter misto, & idem infundebat

ROLANDUS *Aphorismograph. anac.* ann. 3. M. A. N. C. pag. 448.) hæc est difficultas curatio. Contra talem tamen Linguæ Exulcerationem egregium est, & expertum Linimentum HORSTII, quod habet in *observ.* suis lib. 6. append. de Morbillis, & Variol. pag. 310, cujus descriptio est hæc:

℞. Pl. malv. arbor. ℥ss.

Ratanh. dr.ii.

Myrrh. el. dr.ii.

Alam. dr.℥.

Excipiuntur hæc omnia cum *℥.q. mellis desum. f. Elo.* Quarium molle.

Quo lapsus illorum partes vel locus exulceratus.

Si hoc non sufficit, accipe Mel rosatum, tantillo spiritus Salis acidulatum; sic serpe eluantur Ulcera Oris, quæ egregie mundificantur & consolidantur.

Quod si Variolæ Labia obducant, adeoque ingentem dolorem inducant, Mucilage seminis Cydoniorum eadem inungantur & curentur.

Quod si dysenteria vel corripit vel subsequatur Variolas; interne Eleuctatione Dialcordii *Paragolvi*, Cornu Cervi usum, Terra sigillata, Tormentilla, &c. conveniunt. Externe, si ferat Morbi conditio, Clyster ex Lacte cum radice Symphyti usurpari potest. Adhiberi etiam possunt remedia *2. observ.* quæ in 1. *observ.* 71. & *encl.* 2. *observat.* 2. legi possunt.

In *Altit. cruenta* remedia ex plantagine sunt optima. Sanguinem post Variolas per digitos pedum transudasse, videlicet in M. A. N. C. ann. 3. *observ.* 27. & Verruculis per Urinum excretis *ibid. observ.* 28. leni purgatione ablatis. Pollutionem nocturnam ann. 9. *obs.* 15.

Paralytes, nunc particulares nunc universales, non raro insequuntur Variolas: Vid. VELSCHIUS *Misemon.* num. 30. *encl.* 2. *anac.* ann. 4. & 5. M. A. N. C. quam curandi rationem videlicet in *sem. dicto anac. observat.* 9. pag. 13. Item quod *Legnolum* post Variolas amissum, vid. HIL-DANUS 2. 6. *observ.* 24. & M. A. N. C. ann. 2. *observ.* 307. Ulcera variolosarum partium subinde pessimi moris. *Tineas capitis*, &c. post se relinquunt Variolæ, adeo ut SALMUTH ann. 2. *observ.* 30. Ulcera Mammarum maligna admodum orta aetate ex paucis latentibus Variolis corruptis. Ulcera talia cautè, & non adeo vulgari modo tractanda sunt: Conf. F E H R. de *Stenocera* pag. 31. In gravioribus autem malis in subiecto robuilliore, & alio modo curari nequeat, per salivæ usum cura erit optima, cum non focus atque in Luce Venerea, in Variolis pachymata partium Nervolorum solvant esse communia, quibus Mercurius dulcis egregie proficit.

Gangrena non raro Variolas uno alterove loco insequitur: quæ pars quomodo tractanda? & ægra Corpore separanda sit? Exemplo Gangrenæ Genarum à Variolis ortæ docetur in M. A. N. C. ann. 4. & 5. *observ.* 60. p. 50. & ann. 2. *observ.* 2. pag. 2. Facit hæc curiosi observatio THIERMAIERI *encl.* 2. p. 206. *servum* nempe in Variolis spha-cularum per Mercurium precipitatum rubrum, cum Unguento rosato digestivo mixtam, separatam, & reserctam.

Denique *Arteriorum tumores*, & *Thera* post Variolas ut curanda sint? videb. in M. A. N. C. ann. 6. & 7. *observ.* 100. pag. 139.

Variolæ interdum curantur ut veræ, nisi quid blanda Diaphoretica inorperetur; sicut & Ægri post peractam functionem blandis laxativis evacuandi sunt.

C A P U T X I.

De Febre Scarlatina.

Febrix hæc Scarlatina à SYDENHAM *observ.* de morbis acutis lib. 3. cap. 2. ita dicit, quam INGRASSIAS de rumoribus à Neapolitanis *Rasani*, seu *Rasali* vocat, ad Morbillis vulgò refertur; sicut & cum Variolis noctis hoc commune habet, quod ferè in faciem tantum invadat, & quidem cum febre plura minus acuta; post duos vel tres dies notabile primo circa collum, scapulas, & pedus, hinc faciem atque totum corpus rubor quidam, cum aliquali, sed vix notabili, Invenietur, nunc hinc Macularum dispersarum, nunc expansi continui forma, Erysipelas similibus observatur; qui Tumor post duos vel tres dies sensim subsidet, & in Maculas saltem latiores abit, donec hæc circa diem septimum planè evanescent, & cuticula in Squamas secedat.

C A U S A.

Febrix hæc juxta SYDENHAM non tantum Æstatis, sed & quovis alio tempore fieri solet, cujus Causa peculiaris *Lympha exallitis* videtur, unde cum symptomatibus catarrhalibus, v. g. Tussi, & Aëris catarrhalis epidemica constitutione, frequentius oritur.

S I G N A.

Levem hæc SYDENHAM lib. 1. SENNERTUS verò *tract. de Variolis*, & *Morbillis* gravem, & sæpius lethalem pronunciat; sicuti etiam Experientia docet, eam gravibus ut plurimum, utut raro lethalius, conandum esse symptomatibus. Sub declinatione hoc singulare habet, quod Facies, & Crura expletissimum Tumorem oedematosis contrahant; imò crura simul obscure sitis repleant, qui Tumor interdum ad oculum, interdum diutius perleverat: interdum abdomine, & Hypochondria simili modo affliguntur, cum præcordiorum angustia, Tussi & respiratione difficili, Ægrique tandem, ut SENNERTUS annotavit, moriuntur.

C U R A.

Quoad Curam: Febrix hæc tractatur, ut febres purpuratæ, Variolæ, & Morbilli, blandis tamen Diaphoreticis, in fine Morbi *Lympha viscidior* blandè evacuetur, & simul primis viis, & massæ sanguineæ Dystricæ occurramus per Abstinencia, & Antiforbicæ.

C A P U T X I I.

De Peste, & Febribus Pestilentialibus.

Superest adhuc summus febrilium Malignarum gradus, *Pestis*, & *Febres Pestilenciales*. Pestis consideratio, & Theologica, & Medica esse potest. Theologi eandem flagellum DEI dicunt: Medici ejus naturam, quantum possibile est, & indagant, & per Medicamenta malignitati ejus succurrere satagunt. Est autem, & vocatur *Pestis*, quando in morbo *suprema adeo malignitas*: quæ, quoniam quilibet ferè Morbis conjungi, adeoque varia symptomata inferre potest, quibusdam non peculiarem Morbum constituere, sed tantum conditionem Morbi pestilentiæ designare creditur; unde Pestilentis Febrix dicitur Maligna vehementer, proinde se alii quoque Morbi Pestilentes vocantur, qui præterquam quod valde acuti sint, malignitate etiam sua admodum terribiles sunt. Coniungitur enim Pestis cum omnibus aliis Morbis particularibus quidem; populariter tamen grassantibus, quibus multi intericiuntur; unde etiam diverso tempore di verse pestes observantur sunt. Sic enim ab ÆGINETA prodita est *Calix Pestilentis*; *Pestis pneumonica* dicitur pestilentialis meminit FRACASSATUS; *Pestis pleuritica* est descripta à JOHANNES WIERO in *Observationibus*; sic *Angina Pestilentialis*, *Pneumonia Pestilentialis*, *Dysenteria Pestilentialis*, *Hepatitis pestilentialis*, &c. non sunt raræ; MERCURIALIS meminit CUSPIDIUM Pestis, quæ pedes, Tibias, & ossa ita infestabat, ut intra triduum peste correpti plerumque interirent; GEORGIO AGRICOLÆ nota fuit Pestis, quæ Homines velut suspensæ se dederit, omnibus membris tamen non mortibatur; sic ab eodem observata alia, quæ totum ferè corpus in putredinem verniculorum resolvebat: nec ignota fuit olim Pestis illa superioris seculi, & quod excurrit, *Sadaria Angliæ* nomine appellata. Sed, utur Febres Pestilenciales variis se afficiant aliis affectibus possint, pestis tamen *humanaria* propriè sic dicta peculiaritè Morbi genus constituere videtur, h. e. illa, in quibus nunc Bubones, nunc Parotides, nunc carbunculi, subinde etiam Petechiæ, erumpere solent. Omnes ergò hi affectus distincti, præter usum ordinariam, ut sic dicam, naturam sui constitutionis, summam habuerunt conjunctam Malignitatem. Unde si ve eos appellare velimus Morbos cum Malignitate summam conjunctos, si ve dicere velimus eos esse Pestes, tales Morbos imitantes, perinde est: cum in peste, & sit causa, quæ tales Morbos producere, & præterea singularem Malignitatem præsentantem vitæ periculum inferre potest: in

posteriori consistit Pestilentialitas; Unde morbus, cui hæc coniungitur, pestis postmodum vocatur.

De peste verò multi scripserunt, præ cæteris tamen meretur legi, quod Theoriam quidem KIRCHERUS *de fræstis Pestis*, & HELMONTIUS in *Tumulo pestis*, qui sunt optimi, quod scrutinium Theoreticum, & evolunt naturam pestis, quantum possibile. Quod Præxi verò ordinariam felicitè imitandum, aridet BARBETTE *de peste*, parvus quidem est libellus, sed elegans; item DIEMERBROECIUS *trakt. de peste*; quibus & societur SYLVIVS *de peste*: utpote qui præsentis pesti interfuerunt. BARBETTE interfuit duabus pestibus Amstelodami, & DIEMERBROECIUS etiam.

Pestis ergò nomine nihil aliud intelligitur, quam morbus maxime contagiosus, & epidemicus, qui ortum ducit ex Miasmate venenato, ab Aëre primùm suscepto, & ita per Contagium ulterius propagato, quod occurrere & latenter homines plures agrestem, eos in summum vitæ periculum coniecit, & ferè Balones, Carbunculos, nonnumquam, & petechias, comites locum trahit.

Miasma illud contagiosum fumme est subtile, admodum activum, & quaquaversum diffusum, virulentiam suam aserit, adeoque quasi multiplicabilis est: unde ob summam sui subtilitatem à quibusdam dicitur spiritus pestilentialis, ab aliis aura venenata, HELMONTIO vocatur gas fræstidum in Aëre, quo innit, & ejus subtilitatem, substantiam, & naturam. Gas vocant, levis materiam fugilissimam, spiritum incoercibilem, adeoque spiritui vitali facile sociallem: Fræstidum vocant, originem designare vult, quod ex Putredine, & Odore spirituali fræstido oritur. Cum hoc tanquam spiritus subtilis quasi incorporealis, adeoque nullo sensu, quomodo serpēt, proprie cognoscibilis, similis serē est cæco illi Odori, quo medianæ Canes heros suos agnoscunt. Illustrat verò hoc curiosum Observatum KORELLI *senior. tr. observat. 74*. de quodam Eremita, qui Miasma pestilentialia lætans solo Odore, uti relictus, cognoscere potuit, percepit Odorem fræstidum Calceorum usorum, similem. Summi contagiosum est Miasma, sed miris modis inficere ac se multiplicare potest, cum non tantum immediatum contactum corporalem, sed per intermedia quæcumque, per Vestes, per Nummos, per Literas hæc inde transmissa, &c. propagatum, & in alias regiones translatum fuerit, adeoque iuxta DIEMERBROECIUM *l. tr. cap. 7. annotat. v.* & annotata SENNERTO, pestis prius, & antiquæ Epidemicæ evadit, adeo furtim & clandestinè iterat, ut sensu internosci nequeat.

C A U S A E.

Natura huius Miasmatis pestilentialis contagiosi, cum hædendū à nemine cognita, ut exatè & scientiæ explicata sit, propterea etiam controversiam hæc in medio relictam (§). Illustrat negotium hoc, qui naturæ Afenitalis esse afferunt, imprimis KIRCHERUS *l. a.*, qui egregie ventilit hæc Contraverfiam, eam tamen fœu parredini animata applicat: Hinc imprimis legendus HELMONTIUS, SYLVIVS, & PAULI *de febribus malignis*, qui præcipuè de peste statuunt, quod ex Contagio filine volatilis substantiæ oriatur; unde cochiearia Acceti aliique Acida, quoties manè porrecta in peste Lugdunensi mirè profuisse, SYLVIVS expertus testatur. HELMONTIUS in eo præ cæteris est sollicitus: quomodo subinde animi affectus, Imaginatio, Terror ac pavore, ad pestis propagationem conferant, ut illi dem afficiant Corpora antea sana? Nam inter Causas, quæ corpus disponent ad pestis fomitem promptius suscipiendum, vix una est potentior Imaginatio, & hinc na-

tis animi affectibus, Terrore, Mente, Pavore, & similibus. Exemplis miranda animi affectuum prostrant hinc inde, in specie vid. DEUSINGIUS *differt. de peste*, item GABELCHOVERUS *cas. 5. observat. 67*, speciatim HOCHSTEDTERUS *decad. 7. cap. 21*. ubi curiosa exempla habet.

Post illos tamen animi affectus imprimis etiam Aer inquinatus multum in propaganda populariter peste confert; Sal enim ejus vitale nebetatum aut inquinatum à Veneno pestilentiali videtur, unde Aeris media Venenato tale peritens, quod cum semur instat Gas exsuscitatur ex fermentabilibus subiectis, aut Gas ex puteis profundis eruptum, mox partim spiritus Vitales afficit, partim etiam cruorem plūs minus inquinat; hinc illius ratione Virium omnimoda prostratur, & Vitæ periculum; bujus verò Balones, & carbunculi: Unde spiritus animales, & Vitales ab Animi pathematis, maxime à Terrore vel Metu ac Pavore, percussu & plūs minus suppressi, eo facilius Contagium suscipiunt.

Causa Remota, seu quæ Miasma illud venenosum possunt propagare, sunt variz ac diffinissimæ. Præ cæteris Terre motus considerandi sunt, utpote quos passim gravissimæ pestes infeceunt sunt, quorum causa non ineptè respici videtur in effluvia mineralia, arsenicalia, sulphurea, cruda, & immatura, & Mercutialia ex Cryptis exhalantia, ac similia quorum halitus toties jugularunt Metallii Folliores, quæ Aerem inquinando promptissimè pestem induxerunt: item cadaveria animalium sine lequatura læcentia, putredine Miasmata maligna evirantia ad pestem disponunt. Pertinet hæc Fæces, quæ sæpius loquuntur pestis; item Membrana fræstis in Bellis, quorum Cadaveria non sepulta, & putredine telosula ævem corrumperunt, & pestem inferunt. In specie Membrana conspiratio, & conformationis bæ observanda est, ratione cuius inter Contagiosos seu eos, qui habent Symbolum huius conventionis, cæteris paribus facilius & potentius propagatur; unde sæpiè integras Familias devallat pestis, uti alias homines cum his frequenter conversantes non attingat; sicuti, & quædam magis homines, quædam magis Bruta afficit. Vid. DIEMERBROECIUM *l. a. annotat. ubi annotavit Filios in Hollandiæ Civitatem, in qua tunc nulla pestis, transmissos, Patre ac Fratre pereuntibus, ac Matre scilicet decumbente, quamvis claudente, ibi pariter ex eodem Mincho decubuisse.*

Fundamentum consistere videtur in Archeo seu Spiritu Vitali infuso, cui cum Miasma pestilentialia inspiratum ardore se junxerit, extensio diffinissimæ, & determinatur, ut facile alium hinc symbolizantem, i. e. sibi similem Archeum inficere, & inquinare possit: Contingit enim, ut Pestis saltem determinata affligat Bruta, Bores, &c.; nam Bruta diversa diversa habent spiritus. Rarissimum est, quod pestis humana Bruta affligat: quod observandum sedulo quis in hoc ratio præservantem constituit.

Pures aliz Aëris alterationes undecunque natæ ad Pestes quoque plūs minus disponunt: hæc enim Morbi maligni populariter grassantes non acerbis attigunt, nunc deuo remittunt; pro Aëris scilicet alteratione varia: unde & tales Morbi maligni gravibus grassantes, imprimis Virales, Febres Petechiales, Dyentericæ epidemicæ, &c. interdum prodromi solent esse admodum frequentes iolecutoræ Pestis. De Præstis Pestem indacutibus non opus est, ut multa dicam, cum Exemplis passim præstant autrarches: Confer. GARMANNUS *de Miraculis Mortuorum. pag. 40*. & HERCULES SAXONIA *trakt. de Plica Poloni. c. 11*.

Quoad affligendi modum: Pestis, uti superius moniti, est admodum varia, non semper enim una Pestis, sed diversæ sunt: In genere nunc est cum Febre complicata, nunc, utut

(§) Novitatis speciem præferre videtur Aphorismi de Peste, qui habet Alardus Mauritius Eggerdes in App. ad Cent. III. & IV. Ephemer. Nat. Cur. At hic Auctor Pestem esse incarnationem hominis factam à Veneno contagioso, plurimum, quæ apprehendit existit. Venenum autem hoc statum à posterieri, & ab affectibus cognosci posse subdit. Alium illius semper unicum esse docet, naturam nempe materiam morbosam, quæ in corpore prius latet: quæ Venenum pestis parit Apoplexiam, si ad Apoplexiam corpus fuerit dispositum; Epilepsiam, si ad Epilepsiam; Pleuritidem, si ad Pleuritidem. Et hinc inferre quod si Corpus integre sanum fuerit, à Veneno pestis non corrumpitur, nisi subitaneum terrore, aut gravi merore homo afficiatur. Qui ergo à Peste præservatur, vel eam correpti mortem fugiunt, idcirco temporis robore, quam maxime auxilii accipere referre debent. Inferre etiam vultum esse diffinitionem Veneni pestis in Arsenicæ, Mercutiale, Antimoniale &c. scilicet quæ illam evirant, quæ ad Sal volatile acerrimum illud reducant: etenim Veneni huius vis diversissima exferitur pro diversa corporis affectu morbosæ dispositione, ut prius dictum. Nunc, soli Plurimi infusum esse hoc Venenum: unde credendum, quod Dominus Deus in saltem beneficiis partem illud produxerit, vel telius producat, quæcumque cum potius vellet. His & similibus passis, laudamus Auctorem Methodum, quem vocat infallibilem, subversis, Pestis per castidium depellende & extinguenda, eoque duabus & triginti Regalis comprehensæ, quæ apud ipsum videri est.

aut rarius, sine Febre affligit. Sunt epidem multi, qui existimant, Pestem non esse abique Febre: Verum contrariatur Experientia. Vid. DIEMERBROCIUS lib. 2. cap. 12. Auctor. 2. HODGES de Peste Londin. pag. 57. SORBAIT de Peste Venetiar. Caput. 12. & imprimis BARBETTE l. 1. a. q. 1. clam duas Pestibus interfuisset Amstelodami, refert, se multos observasse, quibus circa Februm sub Axillis aut propè Inguina Bubes erupterint, quod facie testatur, illos pelle corruptos & affectos fuisse: quos ipsos etiam Tumores abique Febre in Peste longè difficiliores esse curata, quam reliquos, observavit. Imò in genere Pests plures febres periculosas est illa, quae si cum Febre, Febris enim est motus Naturae irritatae. Quam ergo mox proferuntur Spirituum exercitus, ut foderati quasi intendant, & hinc primariam Naturae robur deficiat, abique Febre, periculosissime tamen decumbant Aegri. Saepe licet addit Febre, tamen est lenta, ut de interno Causa conpascatur.

Pro varietate ergo Pells etiam Symptomata, quae Aegros affligunt, sunt varia, & in quolibet Peste ferè variant. Frequenter levis Nervor corripit Peste infectio; hunc incipit Aegri seu Ardor intensus: Hic Alitus interdum est admodum insignis, cum Sici tamen parvi vel nulla consuecunt; e contra alius interdum est admodum levis, & ut vocant, clamosa, utut Ardor quod externa fit calidus. Uplurimum, siue parvos five magnos fit Ardor Corporis, Lingua percipitur arida seu siccata, Urina existente sanorum simillima: Interdum insinuat ad Somnum: facilius tamen Caput insigniter dolet, & tunc Oculi insigniter rubent, fulgidum sunt & ignei, atque taliter Aegri nullo modo Somnum capere possunt: Adhuc interdum acrius Cordis cum Pests parvo ac delitit, & primo stracha Pulsus magnus apparet, nihilominus tamen, ubi vehementius paulo applicatur digiti, mox suam parvitatem prae se. Vix imprimis in principio subit & cito profleruntur. Supervenit interdum alui fluxus; qui nullo ferè remedio fessit potest; quidam sapienter vomunt, quidam verò tantummodo ad Vomitus inclinant: Multi habent Tumores propè Axillas, propè Aures, & propè Inguina, aut in locis, ubi adhaerent Glandulae, aut majores, aut frequentiores; quibusdam erumpunt Pustulae rubrae seu albae; quibusdam acrius seu Carbunculi, maxime in Dignis, Naribus, Oculis, Labiis; quibusdam Pericula, & exque oigne, quae sunt omnium pessima, & frequentissime necant. Plura videantur in BARBETTE, SYLVIO, & DIEMERBROGIO.

DIAGNOSIS.

Signa, quae futuram Pestem insinuant, haec inter se maxime consideranda sunt Insecta, ubi scilicet varia ac multa infecta alia infecta, aut admodum copiosa, observamus in Aere. Nam ex his Insectis aut portendi, aut etiam insensu Pestem, multi existimant Auctores. Exempla sunt nota et KIRCHERO prae ceteris, praeter hunc ex RIVERO Observat. 10. Morborum infrequentia, item HILDANO Centur. 4. Observat. 33. Item observatum fuit insensu, vel Bubes crebriores, aut etiam Infecta inconspicua aut insolita, aut admodum frequentia, ita praedixisse Pestem, ut sapientia infecta fuerit: an ut Causa? an verò ut Signum? non dilputo. Haec & reliqua signa, praesens Pests imminente, à KIRCHERO l. 1. a. alligata, ex gr. quae dicuntur de Capra, de Pane mundo; de Aqua Vitrioli crustam contrahente, &c. omnia sunt vana, & saltem impliciter conjecurae superficiales; propterea non amplius attingo.

Signa vero praesens Pests etiam non aequè sunt facilia: Nam antequam Pests grassetur, via ejus Signum Pathognomicum haberi potest. Plurimum tamen in omnibus Pestibus generibus cum Signis quibusdam Februm Ardentium seu Continuum acutiorum ac periculosiorum concurrere solent Bubes, Carbunculi, & Maculae varietates, ubi etiam interdum Ulcera maligna.

Quid si vero jam in loco quodam familiariter grassari incipit Pests, non difficiat cognosci potest ex eo:

1. Quod multos invadat, ac plerique subito singlet, in specie cum Bubonibus & anthracibus. Vel
2. Quod Virus subteranea addit proflatio, & Symptomata Faciunt Vitalis insigniter laesa sine manifesta causa: Pulsus subinde in principio appareant magis ac celeriter sed mox fere parvi, longuissimi, frequentes, intermissiones, inaequales; in progressu conjungatur Febri, Calor extrinsecus appareat moderatus; oculi vero fit insigniter ardenti.

Tom. II.

Ipsam Aegrum Peste correptum insinuat Status sine manifesta causa, id quod Conagii suscepti indicium est, passionem in loci Bubonum, vel in Pustulis; item progressus Terror: item Capitis Dolor sine manifesta causa, vel simili Corporis praeternaturali alterato lubantia; Aegri interdum balitus fortidum exspirant, vel sudant, aut etiam totum Corpus male alet; vel etiam dicunt, in Cibo & Potu potidum esse Odorem, quàm faciundum; dicunt: Pests Aegri varii Colores habende ante Oculos verari videntur, qui vel Delirio, vel certe Epilepsiam insinuat; Tunicae enim Retinae convallant, qui ipsius motu continuatur ad reliquum systema. Ego observavi in aliis Febris Maligna, & Aegri non possunt discernere Colores, imminere Convulsiones. Observavi quendam Febre Maligna Periculi laborantem, qui dicebat: me indurum esse cerebralit velle; praedicabam de Epilepsia lethali, quae sublecuta est in meridie. Et denique fit grassante Peste Aegri sentiat in loci Bubonum, ver. gr. sub Axillis, circa Parotides, aut circa Inguina, Pusticulum seu pondoriam, plures vel pauciores, vel etiam unum, insar Aciculae cadentes, tunc solet esse insalubris Pells Signum, tum temporis, ubi alius eadem grassatur, & LINDANUS dicit, nunquam eum scissile, si nempè alia conspiciantur, qui tamen tribus Pestibus interfuit. Quandoigitur tale quid in Bubonibus fit, statim oportet erocare, quia Pustio illa est comatus Naturae, volentis hunc deponere Venenum, quae ipsa consumantur ulterius, si praecesserit Mctus vel Terror, & conjungatur Capitis dolor insignis, vel similibus praeternaturalis substantiae Corporis alteratio.

Chronologia Pestem insignem à Dilecto ad nostra usque tempora videbitis PIENS de Febris Par. 2. a. 319.

PROGNOSIS.

Quod signa Praesens & in Praesens cautus sit Medicus, utur minus possit in Peste errare, quam in Febris Maligna, ex eo, quodam seipsum Peste infecti moriuntur. Pells enim omnis acutissima, & periculosissima est: Interit sua est inter alias differentia. Quodam enim magis, quodam minus acuta est: est Pells, quae intra 24. horas, quodam intra 2. vel 3. aut 7. dies nodeque jugulat: intra quartum summum est periculum.

Sane si utilis Morbi, certe Pells incerta est Prognosis, ita ut JOHANNES MORELLUS de Febris. Pells. cap. 5. in haec verba erumpat: *Fit, ut in Pests non fallat casus, fallat ratio, fallant Hippocratici Aphorismi &c.* at ipse post, in his fallitur Hippocratici; quatenus non mutationes criticae, diutae criticae incidunt, nec acria & passiva laudabilia aliquid certi promittunt, sed passiva fallaciae sunt. Vid. DIEMERBROCIUS l. 1. a. cap. 13. §. 1. & Auctor. 1. SERNERTUS de Febris par. 419. HODGES de Peste Londin. pag. 162. & THOMSONIUS Experim. admir. pag. 20. Saltem observandum, quod Scabies tempore Pells sit salutaria; item Leu Venetae correpti, aut qui laborant Affectione Melancholica, moris solent affligi, vel affligi minus solent periclitari, vel plane non Peste affligi, nisi rectè hoc observat FORESTUS lib. 6. Observ. 24. In talibus enim peccat Acidum. Pestem tamen interit seise Lati Venerea associare afficit HODGES de Peste Londin.

Porro si, qui ob Pests horrendum Aetatem, vel post exortationem nimis vehementem, Peste corripiuntur, in Vite periculum adducunt, licet maxime sedulo curentur, uti observat GABELGHOVER Comment. 3. Curat. 72.

Tumores, Bubes, & Carbunculi, si cito & confestim erumpunt cum symptomatum levitate, salutarem promittunt eventum.

Bubonaria Pells quocunque in loco erumpat, est omnium micissima, & securissima, & rarior illa, quae cum Anthracibus conjungitur.

Pessime omnium ac lechalis dicuntur Pests Periculi, quae Periculi corpus inquinant, cujus maculae in signata facie abeunt, ac ferè semper symptomatum exitum: Vid. HODGES pag. 149. DIEMERBROCIUS lib. 1. cap. 15. Auctor. 33. & THOMSONIUS Experim. admir. pag. 21.

Pustula seu Vesiculae pestilentiales Pissum magis, aut Fabam minorem ad sumum arguant exurgunt cum dolore lancinante & exquisito, Humore intus terroso ut plurimum, citrino, imò livido; & ad supurationem incipit, modo plures, modo pauciores; aliae prodeunt sine ul-

lis serp. Symptomatis, aut cetere levioribus, omniumque multissimum fovens Pestem, vel quæ Venenum mox secedere patiatur, vel quæ crasso firmiore offundat; quibus Formellam totam scatenentem vidit HODGES pag. 220, quævis idem pag. 228. & BARBETTE pag. 33. eadem aliquando in Carbunculis degenerare annotaverit.

Stigmata. Germ. Die *Pyostekker*, id est, *Cicatrix fidei*, certissima Morbis signa obervantur, suntque nihil aliud, quam minutissima ac discretæ foveolæ, quarum radices intrinsecæ latiores quasi in pyramides assurgunt, & habitum mortificati; imò etiam non raro lineulis ac gravioribus symptomatis compareant, nihilominus epeccant, prout Exemplum ab HODGES pag. 244. & 245. allegata docent, nisi superficialis admodum, & quibus aliquod sensibilitatis remanet.

Pilæ diversæ coloris nunc solitarij apparent, nunc carbunculis adunati sunt; utrique tamen pessimi moris obervantur, imprimis, si sine febris incremento albescent.

Carbunculi, quævis indiguitatis Vitiis moris periculosi sunt, Bubonibus tamen utplurimum peiores obervantur; quatenus non tam Gangræna videtur in heri, quam in phagædæ degenerat.

Præterea sicut *Bubones* plures & boni coloris pauciores sunt magis salubres: ita *Carbunculi*, quod plures, eo res est periculosior.

Si per *Sudores* largiores materia discurrat, bonum signum est, verò frigidus si Sudor, aut etiam extrema frigiditas, in specie Nares, est malum.

Tumores dilataciones & imperfectæ erumpentes, seu, ut vocantur, ad interiora recedentes, summum Vitæ periculum portendunt.

Eminentissimos Bubonibus seu Elephantibus superveniens *sigillum*, malum est periculum.

Anthraxes qui erumpunt in Dignis, aut videantur tiores; propter Nervos tamen, ac multos concurrentes Tendines periculosiores sunt, quam in aliis partibus carnis.

Si super *Bubonem* erumpat *Anthrax* seu *carbunculus*, lethale est signum, præsertim in locis tendinosis.

Si *Bubones* & *Anthraxes* ante *Pestem* erumpant, minus est periculum, quam si post *Febrim* decess appareant.

Tumores aliquantisper *inflammati*, una cum *Ciculis* rubicundo inflammatione, cæteris partibus non sunt adeo insigniter periculosi; ubi vero eos circumdat *Circulus* plumbeus seu lividus, Gangræna pessima imminet, & sepe *Ægri* ante biduum intereunt.

Cantharides, vel *Vesicatoria* applicata super *Bubones*, si eascent amplam *Vesicam*, bonum est; si verò non eascent *Vesicæ*, audiverit pronuntiandum, *Ægrum* difficultè convalescentem. Infalibile hoc est in omnibus Morbis.

Si post applicatum *Vesicatorium* & apertum, vel etiam post *Cauterium* æquale, intra 24. vel etiam ad summum 24. horas *Anthraxis* augmentum seu eius progressus ad vicina non potest cohiberi, eger interit. Id quod etiam fit, quando post *Cauterium*, sive potentiale sive æquale, applicatum locus aridus & sicus permanet: sicut in moribundis Fontanellæ non effluunt.

Si *Elephas* excitata sit *candida*, infalibile signum Morbis est, sicut & quibus Fontanellæ in prima Morbi invasione eascent. Vid. DIEMERBROCIUS l. 1. a. §. 27. & l. 1. a. 108. 82. Sin vero applicato *Cauterio* erumpant *Pustulæ* vel *Vesiculæ*, quæ maturæ, eo melius, & si postmodum conveniunt & laudabilis materia in illis generatur, mger erit extra periculum.

Anthraxes Carbunculus cum *ulceribus*, communiter flavo vel rubro, est admodum periculosus, quod si verò *Vixes* albescent, curulecent, aut livescant, citra *Febris* decrementum, pauca spes salutis superest.

Si *Bubones* in Colla aut propè Aures indicant *dolores* *Gutturis*, & *Depletio* citra insignem internam inflammationem impediatur, tunc patienti vix ultra 24. vel 35. horas supervivet.

Febris insignis citra anxietatem Cordis minus periculosa est, quam Cordis anxietates citra insignem *Febrim*. Quod arida magis & sicca est *Lingua*, eo magis imminet periculum: Vid. BARBETTE de *Peste* pag. 5.

Mox insignis in principio *pestis* præsignat, crebra Animi deliquia, Cordis palpitaciones, & Præcordiorum anxietates compressivæ, lethalis utplurimum sunt Symptomata.

Delirium in *Peste* cum Oculis igneis & Lingua arida, squida, prævum est signum.

Pulsus la principio inæqualis valde & intermitens, semper serè lethalis est.

Sopores in principio ac statu semper lethales sunt: Vid. DODONEI Prax. lib. 1. cap. 11. DIEMERBROCIUS l. 1. a. Annot. 6. & HODGES pag. 162. Et rarissimum est, ut tunc cum *Surditate* Paroxisus salutaris præcedat.

Singulus, utpote qui utplurimum à Carbunculo Ventriculi ac Diaphragmatis videtur ortus, lethalis: Vid. DIEMERBROCIUS cap. 23. §. 5. & 6. cap. 25. Annot. 25.

Tumens peritina, seu qui per tempellum & legitimum Aleipharumorum usum ledari non potest, utpote qui similiter Carbunculum Ventriculo pro Causa agnoscat lethalis est.

Sopores *Alvi* raro sine omni salutis spe esse solent, e contra Diarrhæa, præsertim in principio, summum imminat periculum: vid. DIEMERBROCIUS lib. 1. cap. 25. Annot. 16. & 27. & HODGES pag. 137. imprimis, si Excrementa varia, nigra, viridia, & insigniter fetida percipiuntur.

Vitæ crassa, turbulenta, ac enormiter fortida, item pinguis, nigricans, aut hypostis lividam deponens, non sine periculo est: Vid. SENNERTUS pag. 419. DIEMERBROCIUS l. 1. a. §. 22. & 23. ac HODGES pag. 162.

Eructationes creberrimæ Morbi sunt prodromi, sicula ac RIVIERUS de *febris* *Pestilent.* inserit. Vid. DIEMERBROCIUS l. 1. a. Annot. 7.

Mors Arum ac *Lingua tremula* ac convulsiva, necnon *Vigilia*; item *Ranæ* & dolor *Gutturis* sine tumore, Aphthæ, similiter causa evidente, cessissimum Morbi imminentes signum obervantur: Vid. DIEMERBROCIUS l. 1. a. Annot. 20. Nec non *Anthrax* furor coarctior Vid. FRACASTORIUS de *morbis* *Contag.* lib. 2. & DIEMERBROCIUS l. 1. a. Annot. 22. Similiter, si sper omnia sibi foretæ dixerit, Vid. SENNERTUS de *febris* *Pest.* pag. 420.

Si propinquis *Sudores* ægri parum vel nihil sudant; si *Sudores* mox in principio Morbi sine euphoria prominent; si iusto fervidiores, aut frigidiores, aut sicciores cadaverosi sunt, facillimè interire possunt, aut *Sudores* aliquantum graveolentes, item salubres sunt: Vid. HODGES pag. 151.

Hamorrhagia semper ab omnibus Medicis tempora Pestis struatur periculosa, imprimis per *Vedum* & *Sputum*: Vid. DIEMERBROCIUS §. 24. & 25. & BARBETTE l. 1. a., utut hoc Narium *Hamorrhagiam* ac Menstruum fluxum, utplurimum etiam *Micum* eruentem, salubres annotavit.

Gravidis, *Puerperis*, vel *abortientibus*, si *Peste* corripiantur, multum periculum imminet, & periculum periculis. Sed, qui per Nares habent legitimè *Hamorrhagiam*, aut quibus supervenit Menstruum fluxus, si subinde convalescent; quibus verò supervenit *Micum* vel *Alvi* fluxus eruentis, subito intereunt.

Interdum fit, ut *Anthraxes* oriantur in Oculis, in Naribus, Stomacho & Intestinis, aliquæ citra spem vel minimum convalescent.

Anthraxes etiam oriantur in *Pescis* *invaria*, & tunc *Ægri* cum summo tocinibus intereunt.

Quidam tanquam certum hoc habent Experimentum prognosticum in *Peste*: scilicet præsentat *Las* *Mullieri*, lactantis masculum, in *Urina* *Pestis* infudit, unde, si cadat in fundum, ante sextum vel septimum diem *Ægri* interire, si verò non cadit, dicant, eundem supervivere, Sic fides potest Experimentum.

GURA PRÆSERVATIVA.

Quod *Cura* in *Peste*, duo sunt obice. scilicet:

1. Ut præservetur Corpus ab insultu.

2. Ut curæ jam *Pestis* infectus Homo.

Præservatio proprie dictum & optimum est *Paga*; eoque cauta, citra, longa, & tarda: *Paga* *in*, *Ranæ* *longæ*, *tanquam* *Ranæ*. Sed hæc *Præservatio* non semper est licita, interdum contra conscientiam & rationem, & sic prædicta propea incerta. Unde inter Medicos & Politicos disputari solet, an Domus infestæ occludende, ac Homines infestæ sequestrandi? Multi negant ex sequentibus rationibus:

1. Quod *Ægri* à societate liberet præscripti maxime conluerantur.

2. Sicut cum Infestis Ocul sanctibus exponantur: Et

3. Quod vicini areceant, à quibus tamen nihilominus

ais infecti conflant & solentem expectare possunt.

Verum, sicut pars corrupta amputari solet ac debet; ne pars sincera trahatur; ita non melior est preservatio, quam tempestiva Sanctorum ab infectis seclusio, cum alias infectionum malicia & fraudulencia vii cohereri possit.

Tempestive ergo, & maxime principio, Aedium infectionum separatio hac & exclusio prudenti cum regimine institueda erit; aliis, si Contagium hoc propter moras se iamdem latius explicuit, oculo haec respectu tanti periculi impar efficit remedium, nec Aediorum publicum sufficeret pro tanta segregata & oculo haec multitudine sustentanda. Simul tamen Contagium infectis, & inclusis, de Alimento, Medicamento, aliisque necessariis prospiciendum est, ne Fame potius quam Peste pereant; nec Sani cum Aegris secludendi, sed firmiores & Sani extra Urbem Aedibus, ab omni Contagio libere, ad certum tempus excipiantur, antequam ipsi in publicum prodire concedatur, temovendo interim pariter illos, eos, qui Contagio forsitan afficiuntur.

Præterea cum Pests afflicto in duobus consistat, nempe in causa agente, i. e. in Malignitate ubique grassante, secundo in subiecto passivo seu Corpore humano, Malignitatis infusus salubriter, propterea genuina preservatio consistit in duobus:

1. In causa malignæ aversione & vitiatione.

2. In subiecti patientis ad resistendum Malignitati roboratione, seu impetitione, ne Contagium malignum suscipiat, h. e. ut loquitur HELMONTIUS de Xanthico, h. e. Amuletis; quod debet tollere appropriationem, & adaptationem Murnalem, extra quam nulla fit Contagii susceptio, vel Spiritum nostrum vitalem roborant, ne per metum aut terrorem afficiatur, & in Contagio Murnalem dispositionem delect, hinc malfam sanguinem aberrat, & certo quasi Balsamo condunt, sic Symbolizatio Murnalis hoc ipso imminuit.

Scilicet non adeo promiscue in quovis grassatur Pests, quo certas Familias, certum Sexum, certam Aetatem, certos Homines, &c. saltem affligit graviter: Conf. NOYLE Supra, de aëris qualitate pag. 36. item VELTHUSIUS de Luce pag. 171.

Pru quibus Scopis notandum est: quod sepius facilius à Peste, uti etiam à Morbis malignis afficiatur, quod etiam in Metastasis observatur; item qui in Antimonio, vel Mercurio occupati sunt. Ideoque sepius non sumus; sed semper, antequam exeamus domo, fumamus aliquot buccellas Panis cum Butyro, & Ruta, & assumamus haustum Vini asphinctis bosum, vel alium medicatum, vel, quod melius est, præcipuum quendam haustum Vini Rhe-nani, aut alius generis Camphora imprægnati, i. e. fumatur Camphora quantitas Pili, eaque leviter accensa immitatur haustum Vini, ut superatando succedivè comburatur; sin extinguitur, domum accendatur, pergendo, donec tota consumpta sit; hoc enim modo Vinum redditur camphoratam, quod, antequam exeamus, hauriamus. Est enim Vinum Veneco pestifero coactum, adeoque singulari Pests preservativum, partim ratione acidi generosi, nostro Corpori amicum, partim quod animo-fos & minus paridos, & metuculosus reddat, adeoque graves Animi affectus, & curas ad Pestem disponentes pellat, si nempe ingurgitur ad aliquam Mentis bilatitatem: Vid. WILLIUS de febris, ubi de Peste. Semper autem addatur Camphora, quia hæc in Peste est optima. Vinum Hispanicum magnis encomiis extollit HODGES de Peste Londin. pag. 228. 233. 243. & DIEMERBRO-CIUS l. 2. cap. 6. Annot. 14. Potest etiam fieri Vinum medicatum infusione Vegetabilium Aromaticorum Alexi-pharmacorum, nunquam omitendo Myrrham, & Cam-phoram, & tale Vinum medicatum hauritur singulis mane, antequam exeamus. Sic Pests & Febris Maligna preservativum optimum est Salvia spinosa, quam-diu nimirum nobis in loco affecto, vel cum personis ac-rebus aliis suspensus, res est: Vid. M. A. N. C. ann. 9. & 10. Observe. 170.

Purgantia ad preservandam nil valent; sed si adhibenda, sunt rara, parca & cauta, ne superius Vires debilitentur, & massa sanguinea ab ipsis exinde vitetur. Ergo illa proprie sic dicta fugantur, & mistissima demus. Ubi opus est laxatione, præscribendus est Haustus BARBETIE trall. de Peste pag. 603., cuius hæc est Formula:

℞. Rhubarb. elect. ʒi.
Tom. II.

℞. Sem. feni. ʒi.
Crem. Tartari ʒi. vel l.
Rad. Torron. ʒi.
Sem. Anis. ʒi.

Infunde per noctem in Aqua, caud. bo. mane coqu. ad dissolut. Tartari.

Colaturæ ʒiij. adde

Syrup. de Clober. cum Rhak. ʒi.

Spiritus Salsæ parum.

Consist. alchem. ʒi.

M. f. Haustus.

Potes spiritus simpliciter tales, ut & Brandwein, ut & in specie Aquæ Viæ theriacales, Aquæ Theriacalis aromati-cata, Aquæ Apoplecticæ, & ipse Compositioes theria-cales solæ, ut Theriaca, vel Mithridaticum, non adeo sunt convenientes in Pests preservatioe, quia ad Phlogosin disponunt; Unde si talibus subiectis supervenerit Pests, ardentibus admodum corripuntur febribus, & in his per-tinacia admodum inducunt Deliria: Aut ergo parum sunt usapanda talia, aut intermissis Acidis temperanda, mone-nte SYLVIO.

Funiculi Corpori inusti sunt unum ex optimis præser-vativis, quos omnes Auctores, pariter & experientia, com-probant: Vid. præ cæteris PRIMEROSIUS lib. 4. de febris cap. 10. HILDANUS comar. 4. observat. 27. RIVERIUS in observat. communicat. HORSTIUS in observat. pag. 159. & 360. BARTHOLINUS in Affis Med. Hassien. Lindan. 4. pag. 153. alique. Confirmat hoc ipsum etiam PULSANIUS, qui optimo consilio dicit: Nil melius esse ad præservandam Pestem, quam funiculos: Avu-culat enim, dicit, viciis in Marocco Africa, ubi sæpe, spatio 3. septimannarum, 80000. hominum fuerant à Peste intercepti: Ipsi se præservant, & sancti Judas Medici, ut inuenerat funiculos, unde omnes illi, quibus excelsi fuerant funiculi, manserunt liberi ac immunes. Ipsi experia sum, pergit LINDANUS, funicularum infusum solum, & si, qui infusi ad infelles, aut lucum infellum accedunt, solum pascuntur, & quasi mortificationes in funiculis præsentant, quæ ipsi præsentant, solum esse Peste afflicto. Idque etiam con-firmit HODGES de Peste pag. 241. Unde rarum est, quod interdum fallit, sicut contrarium habet HOC-STEDTERIUS dec. 7. cap. 1. pag. 2. & cap. 31., qui observavit nonnullos, quibus Funiculi inusti, & tamen in Peste dormituri sunt: de quo vid. etiam HORATIUS AUGENIUS lib. 5. præservat. pestilent. cap. 35. FRIDE-RIGUS Pro de MEYE de Peste Briddana, & THOM-SONIUS in Epilogismo.

Preservatio ipsa in specie instituitur vel per medicatio-nem Aëris, vel per medicationem Corporis. Aërem medi-care solemus per Sulphur, ut nempe fracedo ista Aëris in-quinata corrigatur & tollatur, ubi fuascentia, ut Mo-schas, Zibethum, &c. minus conveniunt: Vid. DI-MERBROCIUS lib. 2. cap. 2. annot. 9. Quia potius Sulphure, Nitrofo, & omnia Acidia pro Aëre medican-do sunt aptissima, quæ illi putredini resistunt, unde etiam talia Miasmata exhalantia solent destituere. Sic Sulphur accensum insigniter Aërem corriget: si adjungatur Nitrum, est eo melius: hinc pulvis pyris, qui constat ex Nitro, & Sulphure, acceus est unum ex optimis Remediis pro corrigendo Aëre, in ædificium inflatus. Unde etiam opti-mo consilio commendatur crebrioris Tormentorum bellico-rum, Pulvere pyrio probe infarcitorum, & explosiones super Civitates, abique globulis. His tamen, nempe Sul-phuri, & Nitro, & aliis subiecta Sulphurea addi possunt, Succinum, Benzoe, Baccæ Juniperi, Thus, Pis, Myrrha, Camphora, &c. Galbanum, & similia Sulphurea. Pix, ut notum est, fuit secretum HIPPOCRATIS pro Aëre corrigendo: Confir. hie KIRCHERUS in Serenae de Peste p. 362. & HELMONTIUS in Tumul. Pests: c. 8.

℞. Antimonii pulvis. ʒiij.

Nitri ʒi.

M. f. Pulvis grossus, S.
Pulvis Fumigatorius ad infusum in domi-bus faciendum.

Vel

℞. Nitri ʒiij.

Sulphuris ʒi.

Nitrofo.

Succin. an. ʒi.

M. f. Pulvis grossus.

D. S. ut antea.

Vel

℞. Sulphuris ʒi.

Y y

oli.

Olibani ℥ss.

Myrrh. ℥ij.

M. & Pulvis grossus:

Cujus ℥. p. l.

Rac. Junip. part. ii.

Sarcini part. ii.

M. D. S. ut supra.

Præterea etiam Vitriolum, Alumen, Nitrum, Sulphur, & in specie horum spiritus superflui Lateribus ignitis, insigniter Aërem corrigunt: item Acutum tam simplex, quam rosaceum, & rutaceum, vel Acetum vitriolaceum *Angli Sala affunditur Lateri ignito*, ut tumis exinde exurgens corrigat Aërem, purificet Vestimenta, & Domus Pelle infestas: Vid. VALLESIUS de Epid. c. 19. Vel Aceto rutaceo addatur Vitrioli q. l. & hoc ipso dicto modo suffragatur: Vel viride si maceratur in Aceto, quo Lateribus candiculis manet, meridie & vespere affundit, Aer corrigitur: In quibus omnibus tamen Camphora subinde addenda venit. Trochisci efficaces, sed paulo suavioris, pro sumi possunt parari ita:

℥. Nitri ℥ij.

Sulphuris ℥ij.

Benzoes

Syracus limbi liquati an. q. l.

Ut fermentur Trochisci, sub igne carbonibus ardentibus insiliendi: S. Trochisci.

Fætores & Odores graviores sequi ingrati, semper Hircorum, quos GRULINGIUS de Pest. p. 24. commendat, Clescarum, Stercorum, Jumentorum, & Porcorum exhalationes seu frædo à CARDILUCIO de Pest. pag. 65. & append. cap. 3. magis aestimantur; Cornu quoque imprimis hircini, & Ungularum equinarum, sustinet, hincque Suffragamentum de Cornu hirci non *Myrrhifolius* moderate, & nonnulli sub porcorum seculo admittuntur, cum præter vim Miasmata peccidentia enervandi, spiritus animales simul figat & obtineat: Vid. DIEMERBROCIUS de Pest. l. 2. cap. 5. Non inepti sunt, qui Lar calefactum in conclavi suspeso reponi iubent; hinc enim feri, ut insectis omnis Lati, & ulimut, ita, ut cruda viridifcula Lati supernatare appareat: Vid. KIRCHERUS.

Medicatio Corporis in præservando fit per Remedia vel Externa, vel Interna. *Interna* sunt imprimis *acida*, & hinc *Sulphurea*: Unde SYLVIVS à possidere concludit; Cansam Pellis, & reliquorum Morborum Acutorum esse *Sali* res, quod obiter mones.

Acida velantia ab omnibus Auctoribus commendantur in præservando Corpore à Peste: unde præter Vinum acidum, commendantur inter fructus, aciduli imprimis, Citrus, Berberes, Ribes, & similes; item Cydonia, & Aurantia, eaque his parata varia. Reliqui vero præferunt acetum, in specie Aceta Theriacalia ea Simplicibus Alexipharmacis, præsertim Diaphoreticis, e. gr. Zedoaria, Radice Contrayervæ, Cinnamon, Zingibere, Radice Petasitis, Scorzoneræ, Serpentinæ, Floribus Calendulæ, Rnsarum, &c. insula, quæ, si cum, siue sine Theriaca parata fuerint, egregium sunt præservativum. De talibus mase cochlear unum vel alterum, jeuno stomacho vel post isculum assumatur, præservatiois gratia. Talia sunt Acetum Bezardicum KIRCHERI de Pest. pagin. 176. TIM. El in cal. 32. l. 3. pag. 393. & Aqua Prophylactica Belgarum, quam SYLVIVS, & BARBETTE in Pelle Amelotomensi felicissimè usurpant.

Sane acetum salum, in quo subota Camphora, vel Rob Juniperi, vel insula Myrrhæ, vel sola, vel *racis Juniperi*, Myrrhæ, Zedoaria, Cardus benedictus, & punci alii selectis adhibitis, insat mille aliorum Compositorum (sufficienti pro præservazione, quibus semper tempore usus f. q. Camphoræ vel spiritus Vini camphorati addenda est. Vel

℥. Acor. insula Theriacæ: huicque post filtrationem addatur camphora. Vel

℥. Racis Junip. vel heder. arbor. part. iv.

Myrrh. part. i.

Insund. in auro: hinc stentur, & imprægnetur cum camphora.

Hoc erit præservativum, & Alexipharmacum nobile, in multis compositis Theriacalibus præservandum.

Vel Theriaca q. v. assumatur in vehiculo Aceti, addita Myrrhæ & Camphora, pro præservazione.

Et sane Compositiones Theriacales nunquam usurpandæ sunt, nisi in vehiculo acido, aut Aceto. De virtute Aceti alexipharmacæ & præservativæ, præter SYLVIVM

prax. de Pest. vid. BARTHOLINUS innotat. a. hystor. anat. 13.

Post Acida sunt *sulphurea*, tam Mineralia quam Vegetabilia, balsamica vi Corpus defendencia. Hæc inter eminet sulphur commune, quod est *viscosum*, quo cavavit HIPPOCRATES Pellem: vid. HELMONTIUS: Sulphurique Flores legitime sublimati. Cum Pulvere Sulphuris si miscere qui Myrrham, & Camphoram velit, & sic Pulvis est convenientior in Peste: vid. in KIRCHERO Sulphur bezardicum egregium, præsertim in Peste: hinc Sulphur, & omnia ea quæ parata à HIPPOCRATE, HELMONTIO & KIRCHERO, & aliis omnibus laudantur in præservazione. Quibus etiam annumerandum venit succinum pulverisatum, vel solam, vel cum aliis in vehiculo acido mistis, & assumptum; singulare enim Pests est præservativum, interno & externo usu: nam quanta succini septem planetarum pulvis, nimirum utrique Temporibus, Carpi, Malleolæ, & sinistræ Mammarum affici, & eius Olei sit vis amuletica contra pestem, docet HELMONTIUS in Tract. magica Pulver. curat. §. 37. & in Tamele Pestis. Certè sulphur, Succinum, Myrrhæ, & Camphorata reliquis ferè præcellunt: Conf. SORBAIT de Pest. quest. 24. Nam Camphora omnibus Alexipharmacis la pelle palmam præcipit: de quo plura inferius: unde & Elixir proprietatis cum spiritu Sulphuris plus solito acidulatum egregiè convalescitur; vel fiant composita præservativa:

℥. Ser. Sulphuris ℥ij.

Myrrh. ℥. ℥ij.

Alum. ℥ij.

Croci ℥. vel ℥ij.

Camph. ℥. ad dr. ℥.

M. l. Pulvis; S.

Pulvis præservans.

De quo omni mine assumatur dr. ℥. in Aceto simplici, vel rutaceo, pro præservazione.

Ex hoc varia fieri possunt remedia. Cum addito saccharo q. l. l. *Salut. Præservativum*, cum succo, & Confecta pulpe Citri largitur f. *Electuarium Præservativum*, cujus dosis dr. i. vel quantum Culioli capis capis, vel quantitas Calancæ; cum addito Aceto quis tempore semper agitando potest fieri Acetum præservativum.

Tinctura Bezardica seu Mistrura simplex, ratione spiritus Vitrioli in debita dosi assumpta, etiam præservatiois loco usurpari potest. Hicce etiam Opium addendum venit; quod spiritus ligenda, & Animæ pathemata nonnulli coercent, inter præservantia non ultimam meretur locum; & hinc & Theriaca, Mithridaticum, Electuarium de Ovo, vel quod his præferatur in præservazione, Electuarium Diaphoretici fructuosi, & similes Opia divites Compositiones in vehiculo acido, in specie Aceto medicato, vel Aceto Vini simplici assumantur.

Parantur quoque Morfali præservativi: e. g.

℥. Confectio pulpe Citri ℥. vel ℥ij.

Theriac anodur. dr. ii. vel iii.

Terra figill.

Corn. cervi flos sine,

Antimonii diaphor. an. dr. ii.

Cum f. q. Sacchari in aqu. Rosat. sol. f. Morfali, irrorandi tempore usus cum aliquo guttis Olei deffill. Popule. Hingili.

D. S.

Morfali præservativi.

Vel

℥. Corn. cervi flos sine,

Terra figill. an. dr. ℥.

Benzoes. anis. dr. i.

Sach. Saturni ℥ij.

Flos Sulphuris dr. ii.

Elis. Diaphor. fructuosi dr. vi.

Camph. dr. ℥.

Cum f. q. Sacchari in aqu. Rosat. sol. f. Morfali, irrorandi cum Oleo Populi. Hingili.

D. S. ut autem.

Quæ etiam pertinent Electuaria, & Morfali præservativi supra, ubi de febribus malignis, præscripti.

Denique Saccharum Saturni à gr. iv. v. vel vi. vel viii. ad ℥. etiam singulare à Morbo Saturnino seu Peste, & febribus Malignis habetur præservativum, & Curativum, crebro usurpatum, quo aliquæ nulle personæ Angustie Vinelicorum in Peste præservare dicuntur. Si additur Camphora, magis tutum erit. Cautè tamen usurpanda, ne nimio ejus usu propter volatilitatem malum acceleremus. Pau-

Pauca hæc sufficiant ad Præservationem internæ.

Quod attinet *Zerzura Corporis medicamentum*; sit per Lintheum aut spongiam, Aceto vel simpliciter, vel theriacali, aut spiritui Vini camphorato imprægnatam, Naribus subinde admoventam, omnibus Pomambris, Balsamis, Oletis, Linimentis, reliquisque fœuulentibus præservendam; vel ad imitationem ZWELFFERI *Pharm. Arg. pag. 137.* fiat Pyxis tornasili perforata, cui indatur spongia, Aceto Benoardico madida, & admoveatur Naribus, quibus *Campora & Myrrha* addi possunt pro lubitu. In Ore massicetur Radix Ziogiberis vel Zedoarie, quæ præstetur reliquis in Præservatione à Peste, Aceto nonnulli impregnavit; item Metalla trāsstantia & effusacibus multum commendatur. RULANDUS *Tr. de Myrto Unguero* Experimentum scit in Peste Hungarica præservanda. Quo facit, quod SCHENCKIUS *in Ols. l. 6. p. 793.* ex FALLOPIO refert: Nebulones, qui intervienerint Peste correpta, non præstare Corpora sua, nisi Zingiberis & Zedoarie est, ea Ore massicando: Massicatur mane Zingiberem, postea exhibetur haustulum Vini generosi, & tota die habentur Zedoariam manducando. Commendantur præ ceteris etiam Radices Angelicæ, Heleniæ, Imperatoricæ, Cortices Citri in Aceto macerati, cujus aut Radicis alius maceratur semper frustulum in Ore detineatur, & subinde massicetur. Acetum camphoratum sæpe in Ore detineatur, & subinde massicetur continuò Myrrha & Massicæ: uti etiam Trachelidii Sublinguales cum Tragacantha in Aceto soluta, ex Myrrha & Camphora fieri possunt, qui in Ore continuò volvantur; vel Myrrha in Aceto soluta iucruetur cum Saccharo, & cum Mucilage Tragacanthi fiant Trochisci; vel Saccharum teratur cum Corticibus Citri vel Aurantium tenuissimè laceratis, sic ilud sub teitura imbibit Oleum:

Myrrh. ʒi.

addo

Camp. ʒi.

Cum Mucilage Tragac. f. Pilluli:
irrorandi cum

Ol. dissill. Sars. gutt. x.

Corr. Citri gutt. vii.

Angel.

Zedear. an. gutt. vi.

D. S.

Pilluli Præservativi.

Quod ipsum omnibus Elestuaris oleosis saccharatis præstetur, Radici Zedoarie, Corticibus Citri, ac quoque Costo aromatico vero, licet hæc alias indiguerit usum habeant, quod scilicet massicata debeant præservare ab infectione.

Quod si quis præterea Tempora, Carpos, & præter alia, Præcordia Oleo aut Balsamo illinire velit, sit Balsamum Apoplecticum paulo copiosius cum Camphora imprægnat; vel Oleum destillatum Baccarum Juniperi societur probè cum Camphora.

ʒi. Ol. dissill. Sars. Junip. ʒi.

Angel.

Corr. Citri,

Rosa,

Sarsini an. ʒi.

Camp. ʒi. ad gr. xxiv.

M. D. S.

Balsamus Præservans contra Pestem.

Et dicto modo usurpatur.

Sunt qui Appellus seu Amuletis, quæ Idiotisimo Paracelsico Xenocheia vocantur, multum tribuant, Impulsi Globulis ex Arsenico metallicum cum albumine Ovi & Gummi Tragacanthi confectis, & similibus. Sed cauti simus in his, ne periculosa adhibeantur; Arsenicalia enim cruda non tantum Elacharam in Gate, sed & internæ gravissima inducunt Symptomata. Præ ceteris egregius est *Magnet Arsenicalis Angeli Salis*, egregium Amuletum, in quo Arsenicum fixum & potenter correctum est. Faciendum ergo tale Amuletum:

ʒi. Magnet. arsenic. ʒi. vel ʒi. ad ʒiij.

Rosa, cum spiritui vini solut. & ad debitam consist. evaporat q. l.

F. Robule masculæ, quæ sindone rubra incluse circa regionem Cordis appendantur.

Item Mercurius vivus probè depuratus, & cum summa Saturni calcinatus, qui in Placentalis seu Trochiscos formatus ʒi. pondere in sacculo Amuleti inflat appendatur. Confer. HOFERUS *Herc. Med. pag. 104.* Vetus Jo-

vis hoc etiam præstet: vid. POTERIUS in *Pharmat.* Nota etiam est vis Bufonum, & quantum hi valeant in curanda & præservanda Peste; sive ad HELMONTII Methodum de *Tum. pag. 36.* fermentur Trochisci ex ipsi Bubonibus, pedibus posterioibus suspensis, eorumque Vermiculis repletis, cum Cera & Tragacantha, pro Amuleti appendendi. Cum H. E. L. M. O. N. T. I. O. conf. ZWELFFERIUS in *Pharm. Regiæ*, ubi hoc confirmat, quod ille habet. Alii ex Offibus Bufonum vel etiam Bufonibus integris, Ichthyocolla exceptis, ad Collum gellandum, Amuletum parant, Veneni attractivum & præservativum. Alii Bufones integros constatlos coquant in Aceto melleo & rutaceo, materiam cum Mucilage Tragacanthi redigunt in Trochiscos, qui Collo appendantur: vel impleant Bufones simpliciter tempore Junii & Julii per caput transfolios vel suspensas, & ita arefactas, pro amuleto Cordis regionis appendantur.

Ceterum notandum hic: rari Bufones Cantarellis vocantur, nisi illi fuerint vel grandiores vel seniores: interim verum est, quod HELMONTIUS refert. Si enim per Anatonem Bufonem examinamus; reperimus in stomacho, & imprimis in Iustorio Colo, revera tales Mulas seu Cantarellas, quales ipse describit, & hi in Ventrículo sunt integri, in colo verbò attriti, & ab his derivanda est vis diuretica in sale Bufonum: sive autem evomant Cantarellas, sive non, contus vel solitarie, vel cum cera & Tragacantha formati in Trochiscos, & ita de collo suspens, erunt amuletum optimum.

Verùm à quodam experto Medico mihi narratum fuit, quod Bufonum applicationem faciedam dissolutionem Pestis: Si fit Pests, quæ oritur ex Gas terrefco seu sylvestri, ex Terræ Mineræ exhalantibus, in tali Peste convenire amuleta ex Bufonibus, quoniam *Bubo* tanquam alimentum attrahat tale Gas sylvestre: ubi verò fit Pests ex *viscidis fœdum influxu*, aut ex perverso Aere citra Gas sylvestre aut terrefco, optimum Remedium esse in *arsenis*, utpote quæ vicia Aetis attrahat: In Peste ergo Terræ amuleta Bufonum, in Aere amuleta Arsenicum convenire.

Hæc de Præservatione Pestis pauca, sed sufficientia, Pergo ad

CURAM.

Ipsi Pestis *Cavensis* cardo in eo consistit, ut Miasma venenosum ab extra in Massam sanguinem & spirituum consortium receperit, potenter sudoriferæ foras excudatur. Methodum hanc modico suggerit ipsa Natura, quæ curatur Pestem deponit Venenum, & per hoc corruptam materiam, ob Veneni tamen atrociam simul corruptam, in Bubones & Carbunculos, necnon Maculas, idque quasi criticæ; & ita Pestem curat, quia Venenum extra Corpus eliminat. Totius ergo Curæ cardo consistit, in legittimo sudoriferorum usu & applicatione; adeoque si Peste atitit curandi, invocato Divino Numine, mox in principio ad sudorifera Aleispharmaca est confugiendum, quibus ob summam penetrantiam semper & ubique addenda est Camphora.

Ceterum in omni Cura Pestis legitime instituenda ubi ferventur *Cautela* sequentes.

I. *Aleispharmaca repetenda* esse singulis 2. horis, ita ut 24. horarum spatio *Æger* ad minimum bis vel ter fudet: Vid. BARRETTE *pag. 11.* ROLFINGIUS *Med. 45.* & SYDENHAM *de Morbis acutis pag. 153.* Neque enim putandum, quod ubi semel vel bis fuder *Æger*, periculum iam sit evitatum; nam vel minima Veneni particula inflat Fermenti mirandas & stupidas exerit vires. Totum ergo, quantum quantum est, eliminandum: nec metuenda nimia Virium profluvio, cum verè melius habeant, dum sudant *Ægri*. Et quamvis Bubo & Antrax egregie eruperint cum *Ægri* levanit, aut Prethich copiose effluerint; sudorifera tamen sedulo sunt continuanda, ut eò tutius Malignitas proflueret, ne fiat recidiva. Ceterum in sudore proliciundo testurum *Ægri* rare vendent. Virum infernorum vel validorum, Malignitatem vel majoris vel minoris, semper habenda est ratio, ne, dum Venenum eliminatur, Vires penitus desiccantur: nec nimis contragatur *Æger*, ne suffocetur: ad usum aliorum hanc modum prolicitus fuisse: pro constitutione scilicet *Ægri*, de in concedatur si Quies, donec horæ 2. circiter effluerint: quæ iterum propinquet sudoriferum, & per hoc sudore dentur Analeptica cum Acidis spiritibus missa, quæ & Malignitati resistunt, & sanguini nimis diluto debita

condensantur coactilae; nam Acida condensat Sanguinem. Si Bubo jamdum comparat, aut maturet, non ad adeo frequentes, nec adeo copiosos Sudores Ager urgetur, ne Materia maligna exterminata reisorbeat, Viriditate frustrâ dissipetur; cum illi, quibus Bubones sine notabili Symptomate prorumpunt, sine ulla quoque non raro Medici regimine recomalescant. In Carbunculis autem & reliquis metallisibus sudor potentius urgetur, utpote in quibus secretio minus perfecta videtur, hinc per sudoriferam magis juvetur; Sudorifera tandem, si Vomitu rejiciantur, toties eadem vel alia reassumantur, donec retineantur.

II. Observandum: *Ager sudans à Somno debet arcepi*, quia somnus impedit convenientem Venae maligni per sudorem expulsiorem. Quod si somno nimis infestetur Ager, subsidio Spongiae vel Linimenti Aceto Vini, vel Aceto rosaceo seu rutaceo-imbuto Narius admoveandum, aut Acetum ejusmodi camphoratum, ut & Castoreum cum Aceto & talium animodote arceus Somnus.

III. *Dum sudas Ager, Sudor verò nolit sufficienter prodire*, promovebitur hac encheirisi:

℞. Panis parvus q. furno colatus.

Detrahatur haec crusta inferior, excavetur circa medietatem aliquantulum, cavitas Theriaca in Spiritu Vin. camphorato dissoluta ℞ii. repletur, ac ita Panis servidus stomacho vel Umbilico imponatur.

Venenum enim à Pane, ut vocant, attrahitur; quod alii faciunt, si Ager Pelle correptus abhorreat à remedio Vid. PASCHALIUS & MORELLUS.

Vel ad imitationem KEGLERI:

℞. Panis feracissimus adhuc recens calidus, in cru-

stâ inferiori fixa firmiter magnitudine Imperialis, insudatur Spiritu Vin. camphorato, & ita dictus Panis imponatur Abdomini, ut foramen respondeat Umbilico.

Sic Ager incipit intente sudare, & per eam Malignitatis extradiagnosis procurabitur: Venenum verò Pani se insinuat, propterea desolendus est. Alia de Pane calido, quod si ex Aere attrahat Venenum, vid. KIRCHERUS *Tract. de Pest.*

IV. Quod si in Peste *Aegyptia*, vel etiam *Delirium* ex hac imminet, aut etiam si adit nimia *Insipientia*, & similia Symptomata sudorem impediunt in talibus casibus subinde necessarius videtur, ut Sudoriferis de Laudano opiato aliquid addatur, praeterit in principio, ut Symptomata assidua coercerentur, & simul post absterium sudorem blandus ac requisitus somnus sequatur. Quando Ager sufficienter fodaverit, abstergium est Lintecis sicis bene mundatis & calefactis, quae si prius sint probe suffusa cum Pulvere pyro, vel Sulphure, Succino, Thure, & Myrrha, eo magis proficua est abstergio, & convenientior. Abstergio sudore mutata et am Stragula, ne sudore egressa Malignitas denovo versus Corpus properet. DIEMERBROGIUS quidem *Tract. de Pest. c. a. §. 5. & 6.* BARBETTE pag. 18. hoc prohibent, praecipue Indusium permutationem. Verum per se non nocent, sed quatenus Frigida poros occcludendo insensibilem Transpirationem impediunt. Usde etiam SYDENHAM pag. 155. abstergiorem dissuadet, & Indusium sponte exsiccat permittere jubet, sine dubio, ut Ager Aerem frigidiorum, & Miasmata pestifera chalanat, evitet.

V. Postea, ut & Febres Pestilentialia, subinde conlun-
da esse solent cum Ardore intenso vel Febre Ardente. Hæc ergo si adit, & insignis Ebullitio totam Massam Sanguineam coarctet, in tali casu nimis commode Theriaca aut Mithridatum, & similia Theriacialia, quæ & ipsa fermentare solent, coacodi possunt, quæ nû cum Aceto vel Acidis temperentur, acrimonia aromatica Ferrem intendunt: vid. HILDANUS *Centur. 6. Observat. 29.* & SYDENHAM *de Morbis acutis pagin. 132.* Loca horum ergo postea *Formula Antivenerea & Salina Licivialis* & similia usurpentur, sicut & Eleasarum Diacordii *Fracturii* tutius tunc usurpentur: alias enim periculum est, ne, dum Venæ resistimus, Febrem nimis incendant, adeoque tandem Agerum incertum. Sin vero cum Peste vel Febre mitior aut omnino nulla adit, convenientia ista Theriacialia aromatica denovo usurpi possunt, ut sopita quasi Fermentaria denovo restituerent, & debita sanguini & Corpori Altitudo restituerent, hujusque medio Epistilo promoveatur.

VI. Acida in Peste non fecit ac in Malignis nunquam mittenda, quin eadem tempesta & Sudoriferis addenda, & in sudoris declinatione & post sudorem tempore Que-

re propinanda, cum hæc ipsa Ager post sudorem debiliorem recubant, & præterea, Experientia testis, simul Malignitati aliquemodo resistant. His ipsa tamen acida, ad Agerum compellendum propinquant, semper simul aliquid de sudoriferis permiscendum, ut Corpus, si non in perpetuo sudet, saltem in perpetua blanda conservetur, Diaphoret.

VII. Quibusdam in locis, Ager Peste affodis, non secus ac in Febribus Malignis, interdum subito cum saccula applicatur *Psalteria* ex Cantharidibus præparata; quæ Velicæ tali casu ad evacuationem Malignitatis præstuntur Fonticulis, cum hi potius in Præteritione, illa etiam curative magis conducant, & potentius eliciant ipsa Fonticulis. Conveniunt etiam, ubi Natura Bubonem aut Anthracem, imperfectè licet, extrudere molitur, ad promovendum Naturæ motum. Admoveri possunt partibus variis, Vertebrae Colli, versus Humerum & Carpum, Cruribus & Suris internis; quinimò & Bubonibus subinde applicantur cum fructu. Talia enim Velicatoria, ut cuiuscunque generis Calefacientia, Liqueores reddunt magis fixiles, Naturæ segnitie exstimulant, & usâ cum Seno-
sa colluvie & moris Humoris, per Ulcera Miasmata pestilentialia educunt; ut à partibus nobilissimis Revolutionem, & à vicinis Derivationem taceant. Sed ut celeriter operentur, acerrima sint hæc ipsa. Sequens Massa in ultima Pelle Londinensi fuit experta:

℞. Ole. naval. 3v.

Gallia. ʒi.

Cera ʒss.

Quibus simul liquasti, & ab igne semotis, adde

Pelle. Cantharid. præp. ʒi.

Ferri. scor.

Sem. Annon. an. ʒiij.

Euphorb. ʒi.

Cum Austissimis q. s. incorporentur, assidue agitando quoque cogatur in Emplastro massam.

Pars autem ab ardore prius fronda, quæ vis Emplastri se potentius elicit. *Notanda Ulcera aperta cum insinuantur*, Emplastro de Mellis, Pulvere Cantharidum respersum, locum iterum atque iterum succidendo. Insinuantibus dolorificis opportune succurrendum Folis Brasice, Ulceribus superimpolitis. Easilum tamen in Peste Morbificæ Malignis hujusmodi Epistolis semper de Magnete Artificiali aliquantulum addendum esse. Velicatoria hæc, si imposita Eitharam vel in loco sine, vel in Bubone ex-
citant, bonum erit signum; si non, pestilens. Ut autem multum proficiat hæc ipsa, non tamen indiscriminatione omnibus admittantur. Propterea, ubi in Pelle urget Urine ardor ejusque Iocunditatis, Spthister Velicæ Inflammatio vel Ulceratio, si Muller sit gravis, vel si inflent Menes, aut motus Naturæ ad vias Urinarias inclinet, abstinendum est à Cantharidibus, ne illis Miliis cruciatus, alias in Pelle lethalis, excutitur; nec applicanda in nimia Virium prostratione.

VIII. Satis est in Peste plene omittre *Transfusiorem*, quæ eadem Vires labefactare, quantum conservandam maxime est necessitas: cujus Exemplum videbitis apud VERZASCHAM *Observat. Med. pag. 57.* Præterea nullum Iodicum Venæsectionis adest, contra quod plus eruptionem impedit, eo plura incommoda Venæsectionem sequuntur: quæ omnia prohibent, eoque interdicunt, idque eo magis, ubi Pests cum Alvi flumine prorumpit, ut etiam, ubi Bubones vel Carbunculi, vel Eanthemata poeticalia se manifestant: Vid. HODGES *de Pest. pag. 157. & 161.* PIENS *de Pest. p. 179.* Unde cautè legendus, nec facile apud nos imitandum SEPTALIS in *Animadv.* pag. 122., dum quibuscumque casibus, apparentibus nû Bubonibus & Anthracibus, Venæsectionem inditit: ut taceam, Paradoxum videri Venæsectionis necessitatem, quam in Peste persuadere conatur SYDENHAM *Observat. pag. 39.*

IX. Observandum: In principio Morbi, ubi Materia maligna seu Miasma venenosum adhuc est in primis vis, vel sub primo Pestis insultu, quæ nocentur per Nauseam, Vomitus, vel conatum vomendi, tunc in principio primo commodissime adhibetur *Vomitoria*, appropriatis Alexipharmacis simul mixta: talia enim sub primo Pestis Contagio, dum Contagium per Aerem fuerit haustum, mirè conveniunt; & consentiant hac in parte Prædici in unum omnes, Vomitorium administratum levare Pestem. Certe *Purgatio nulli, Vomito pluribus salutaris*, dicit LINDANUS: & ubi jam mox in primis incipiunt appetere Bubones vel Anthracis, necessitas verò Vomitorum sua-

suadent, tunc, Ne naturæ contus per tales Tumores expellens Venenum impediatur, & tamen utrique scopo satis fiat, confusius est Rubori & Anthraci Maturativum, Attritu & diluam, Remedium applicare, dum propinquet Vomitorium, ut horum medio Venenum foras derive- tur, & Vomitorium præstet lumen officium. Aliis enim, si imminuat Tumores, subside Scirrhî inflat indurcit, ita ut ad aliquot menses postmodum durities illa remaneat. Vomitoria ergo in principio Pests conveniunt cum regimine. Purgant verò nullo tempore salutaris est, sed semper nociva in Peste, imò nec Clysmata semper præ- scribi tuto poterunt.

X. Si nimis adeo veset Aegros, ut Remedia retinere nequeant, mox sub primo insultu imitandus venit HUD- GES de Pests pag. 196. & SYDENHAM Olserv. pag. 352. Nempe tunc solo tegumentorum pondere & custodia (nisi quod lintaminis pars subside ad colligendos habitus vultu superinducatur) item applicato Pano calcido, a- liisque similibus modis, Sudor provocandus: nam, ut dicit SYDENHAM, Cum morbus mortifici radii cunctis ambi- bus corporis se extenderit, illos alvi præstium & vomiti- onis inflexu introitus repleti, ac in ventriculum & intestina de- cumbentes, præventus alvi sedantur, adeo, ut quantu- cumque stomachi subversio præstetur, assumpta deinceps medica- menta præbè retineantur, ac ad Sudores ex voto proliciendi cōducant.

Quoad Remedia pro sepe Sudorifero & Alexipharmaco ut- forpanda: observandum est universale Alexipharmacum pro quacunque Peste vix dari, nisi quis Camphoram & Su- perius hic substitueret velle, quo tamen non videtur suffi- cere. Depechesum enim fuit diversis temporibus, pro di- versitate nempe Constitutionis Pestilentis, diversa etiam Remedia peculieres obtinuisse vires. Quid si ergo Specialia in Peste tali ac Appropriata Remedia non sunt inventa, Generalibus istis in Febris Malignis utamur, & alio tempore probatis, utendum erit; quibus in Sym- ptomaticum cura subside Symptomati appropriata sunt ad- denda; hoc saltim observando, quod illorum generosiora præcipuis, eque in maiori doli, propinari debeant.

Substantia talium Remediorum utplurimum sunt Aquæ destillatæ, Aceto tam simplici, quam Rubi Idæi, sambu- cino, rutaceo, Florum Tonicæ, Scordii, aut Compositis theriacalibus imprægnatæ.

Præterea ergo, quæ de Febris Malignis recensentur, item quæ ad Præservandam supra laudantur, ex Regno Vegetabili supereminet supra laudata Camphora, quæ & cum ea parata Remedia, certè in Peste curanda ab omni- bus Prædictis extolluntur, sive in substantia assumatur, sive in Oleum redita propinetur. Unde nobile & expertissi- mum est in Peste Oleum Pestilentialia Nativis, Medici Ve- roensis in Italia, qui mira prædictum cum hoc in Peste Ve- roensis, ut & ipsi post mortem Venæ fistula fuerit cre- dita. Compositum est ex ass. Olei destillati Succini, Olei Corricum Citri, & Olei Camphoræ: quæ Olea invicem bene juncta constituunt hoc mirabile Remedium, idque pro Præservacione à guttis 5. ad 6., pro Curacione à gut- tis 6. 12. ad 15., pro circumstantiarum varietate, expo- nendo deluper Sudorem exhibetur. Equidem Oleum Camphoræ genium plurimum lateat; præparatio tamen facilis est, modo addatur certa quidam Terra mineralis. Hinc MINDERERUS de Peste inquit: Mox iudicio Cam- phora plar virium in Peste obtinet, quam vel pretiosa quavis medicamentum beaurdus: Vid. Anatom. Camphora D. MOEBII s. 19. pag. 50. Interim, ubi complicati sunt Morbi maligni cum Febre interiore, aut Symptomatici Capitis, Delirii, Agrypnii, &c. Oleola illa minus sunt tuta. Sunt, qui

℞. Camph. ʒi.

Alum. Ov. ʒvi.

Lento igne per retortam liqorem destillant in Oleo quod cum Spiritu Vini aliquandiu circulat & cōbu- bant pro Alexipharmaco Pestilentiali.

Imò vel solus Spiritus Vini camphoratus, seu in quo solu- ta fuit Camphora, aut Spiritus Theriacalis camphoratus, e- gregii sunt usus in curanda Peste: hinc etiam Mixture simplex & Tinctura Benzoidica ritè parata, propter ad- ditam Camphoram in Spiritu Theriacali solutam, non contemnenda venit. A nonnullis hæc duo Remedia, ab UNZERO de Peste descripta, insigniter extolluntur, quorum basis est Camphora: Primum est Patis, alterum

Electuarium. Perinis descriptio est hæc:

℞. Aqua Vitis seu Spiritus Theriac. ʒvi. ad ʒi.

Cruet ad quant. Ciceris.

Camphor. ʒb. (dosis excessiva)

Misc.

Detur totum infuso Adulto, Juniori dimidium, super- bibendo parum Aquæ Caudis benedicti, ac proluciatu- Sudor.

Electuarium, quod etiam à DEUSINGIO commenda- tur, sit hoc modo:

℞. Theriac. Androm. ʒii. ad ʒi.

Flor. Sulphuris ʒi.

Camph. gr. xv. (dosis excessiva)

Misc.

Detur totum lotio, expectando Sudorem; idque cre- bris reiteretur.

Facit hoc elegans Electuarium, quod ipsum R. D. MI- CHAELIS tam præservativè, quam curativè, in Febris Malignis & Pestilentialibus cum successu frequenter usur- pavit, cupis compositio est sequens:

℞. Spec. Alacit. ʒb.

Pato. Saxo. ʒb.

Theriac. q̄.

Mithridat.

Elect. Diacord. Frac. vel de Ovo an. ʒi.

Flor. Sulphuris ʒb. ad dr. vi.

Camphor. dr. iiii.

Olei Pistilli. Cralli dr. iʒ.

Succini.

Citri an. ʒi. ad ʒii.

Syr. de Sacco Scord. q. l.

M. D. S.

Singulare Electuarium contra Pestem.

Dosis ad Præservacionem est à ʒb., ad Curacionem dr. iʒ. vel dr. ii. Hoc ipso multi Milites à D. MICHAELIS conservati fuerunt.

Deinde Semen fex Barba nigra Hedera arboris, jam ab antiquissimis Auctoribus commendatæ, ab HELMONTIO etiam à multis aliis tanquam proficuum in Peste Remedii expertæ sunt, ad dr. i. in Aqua Cardui benedicti vel Vini, expectando Sudorem, & repetendo eisdem: Vid. KIRCHERUS in Serapione Pests, & PALMARIUS in Traict. de Morbis contagiosis pag. 453. Imprimis in Peste Hiberniæ Medicus quidam frequentissimo in usu habuit has Baccas, quibus istipia in die repetitis quæ plurimum liberavit. HODGES cum Ateri part. ii. & Vini part. i. propinat. Hæc Juniperi etiam in Peste sunt commendatissi- ma, unde & eorum Rob. seu Succus inspissatus ab Ita- lis, Baccis hic carentibus (T), Theriaca Germanorum opem jure vocari solet, quod, sicuti & ex sambuco eli- citum Rob. cum Aceto assumptum est nobile; tunc in Potionibus solet dissolvi, quam etiam in forma Electua- rii propinari. Unde quidam commendat sequens Electua- rium ROSENCREUZERI in Aftrologia Inferiorem ex hoc Rob. seu basi, paratum, tanquam in Peste Præservati- vum & Corativum remedium:

℞. Rob. Junip. ʒii.

Elect. Diacord. Frac. vel Elect. de Ovo.

Mithridat. an. ʒb.

Theriac. dr. iii. ʒb. vel ʒvi.

Flor. sulph. q̄. unc. iʒ. vel unc. iiii.

Myrrha dr. iiii.

Toril. aliff. dr. vj.

Camph. dr. ij.

Cruet dr. ʒ.

Succi citri unc. ʒ. vel q. ʒ.

promiscendo Electuario.

In Præservacione dr. ʒ. seu quantum caput Cistei cuf- pi; in Cura vero ʒiv. vel dr. iʒ. propinquantur in

Aqua card. bened.

Aerif. an. unc. i.

Theriacat. unc. ʒ.

invicem misturam. Hauriantur una vice.

Rob Juniperi dicto vix edit Rob Bastarnum sambuci re- dâ paratum & usurpatum. Hinc sic Theriaca seu Ele- ctuarium tam Corativum quam Præservativum LUDO- VICI, quod doli in Colleg. Pharmacop. in Lundeni à dr. i. ad ii. propinandum, ut & Electuarium Camphoratum Keglri. Alium similiter & suum accepit laudem, dum communiter Theriaca Rusticorum appellatur, cum certum

(T) Ne Neapolitani hanc baccis hic careamus. Utamque enim Apruniam, imò & Campaniam litu, Junipero abundatè, possidentem Urbis nostræ Baccarum quædam subministrat.

Salis Albus. 3℔.
(vel *Salis volat.* Corv. Cerv. gr. xii.)
Olei Pestilens. 3℔. guss. vi.
M. L. Pulvis, S. ut ant.

℥. Cinab. 3℔. an. gr. xv.
Succini prep. 3℔.
Sal. volat. Corv. Cerv. gr. v.

Succini
Camphor. an. gr. iii.
M. L. Pulvis.
D. S. ut suprad.

℥. Aqua Card. bened. 3℔.
Asti Vin. acri. 3℔.
Ellis. Diaphor. 3℔.
Camph. gr. vi.
Syrup. aceto. 3℔.

M. D. S.
Potio Sudorifica pro una dosi, bene circumaglanda,
Vel

℥. Aqua Card. bened. 3℔.
Ellis. Diaphor. 3℔. vel 3℔.
Salis Albus. vel *Card. bened.* gr. xv.
Camph. gr. viii.
Asti Vin. 3℔.
Syrup. de Cive. q. l.

M. D. S. ut ant.
Vel
℥. Aqua Card. bened. 3℔. vel 3℔.
Asti Theriacal. vel *Vin.* vel *Succ. Civi.* aut
Astrosa. 3℔. vel 3℔.

Ellis. Diaphor. 3℔. vel 3℔.
Camph. gr. v. ad 3℔.
Syr. aceto. 3℔. 3℔. 3℔. vel 3℔.

M. pro una vel 3. dosibus: S.
Potio Sudorifica, bene circumaglanda,
Fortietur hoc Potio BARBETTE pag. 23. qua in Peste
Invictissima Antilepidum simplicissimum usus fuit:

℥. Aqua Card. bened.
Prophylact. an. 3℔.
Ellis. Diaphor. 3℔. vel 3℔.
Salis Prunell. 3℔.
Albus. 3℔.
Syr. Barber. 3℔.
M. pro Haustu: S.
Potio Sudorifica.

Item hac Potio:
℥. Aqua Sumar. q. l.
Prophylact. nostras. 3℔.
Astrosa. 3℔.
Salis Scordii.
Rut. an. 3℔.
Julipi. reser. 3℔.

M. pro dosi,
D. S. ut ant.
Item
℥. Aqua Card. bened. vel *Ruta.* 3℔. vel 3℔.
Astrosa. 3℔. vel 3℔.

Liqu. Corv. Cerv. succin. 3℔. vel 3℔. ad 3℔.
Camph. gr. v.
Syr. de Scordii. vel *Ruta* 3℔.

M. pro Haustu: S. ut ant.
Vel
℥. Theriac. 3℔.
Salis Albus. 3℔.
M. in Haustu Vini acidulisi

D. S.
Electuarium Sudorificum pro una vice.

Vel
℥. Ellis. Diaphor. 3℔.
Astrosa. 3℔.
Cum Saccharo l. Bolus;

D. S. ut ant.
Conferatur BARBETTE de Peste pag. 16. Item Bolus
Alexiterius WILLISII in Pharm. p. 519. Item

℥. Theriac. 3℔.
Tom. II.

Rezeard. min. 3℔.

Camph. gr. vi.

Asti Rezeard. q. l.

M. l. Bolus pro oia vice, expectando Sudorem.
D. S. ut ant.

In genere morbo: in defectu Medicamentorum Anti-
monialium Sulphur commune, aut ejus Flores, commodè
posse substitui.

℥. Tinctura Rezeard. vel *Mixt. simp.* 3℔.

Spiritus Corv. Cerv. 3℔.

M. pro una dosi:

D. S.

Mistura Sudorifica pro una dosi:

Loco Tincturae Rezeardicae quibusdam secretis habetur
Spiritus Pestilentialis seu Antilepidum:

℥. Viridis Aeris boni calcinati. 3℔.

Irrora cum

Asti defillari. 3℔.

Destilla per retortam in arena ignis intensiore:

Jam

℥. Spiritus Tartari rectif. part. iii.

Viridis Aeris modè prep. part. i℔.

Mixta his addè singulis onciis Camphoræ 3℔. ponatur
vitro bene obrurato in digestionem, donec Cam-
phora volatur liquori.

Si cum aliqua particula Opil digeratur, & siteretur, dat
Ellis. Antilepidum egregium.

Pertinet hac etiam Elaxis Pestilentialis Essentia.

SYMPTOMATA PESTIS.

Ceterum frequentissima Symptomata Pestis sunt

(§. I.)

BUBO. (X)

Horum ergo Medela convenientissimè hic tractatur.
In Bubone curando tria prae ceteris attendenda sunt so-
lida: Nempe exordium, progressus, et curatio.

1. *Attrahere*, seu quæ Venenum efficiunt:
2. *Attractiva*, seu quæ Tumorem ad Suppurationem per-
ducunt: Et tandem

3. *Medicativa et Consolidativa*, quæ Ulcus uniant.
Ut enim tantum, qui *diffusus* Bubonem operam dare
voluit, minus tamen consilium habet erubescit, nisi simul
copiosius huius provocetur: quidem & Bubones sponte
recurrentes, Vexationis extrinsecus amotis, Sudorificis
verbis interius propinatis, erunt demum proliciendi. Equi-
dem fuit, qui fuscant etiam Bubones crudos *non Scalpello*
asse incidentes & apertendos, quod tamen minus commo-
dum videtur, quin potius aliquis saltem Materiam Co-
cto & Maturato expectanda, plus minus pericula, pro
circumstantiarum ratione: quidem scilicet apparent robo-
randa, non apertendi: quid si verò Bubo sit vel lividus,
vel niger, ita ut Gangrenam minoret, tunc nulla ex-
pectata Maturatione prociis etiam crudus Scalpello est ap-
ertendus.

En verò, quæ applicantur *pro attrahendo Peste*, & *ma-
turando* simul plus minus Tumore, sunt varis. Quidam
recipiunt Cepas sub cineribus coctas, aliquos contusas, &
cum *Sinapi albo* pulverisato mistas, aliquos Bubonibus,
ceu potens Attrahivum. Loco Sinapi etiam, ubi præfer-
tur. Dolor intensus urget, *Theriacis* & *Falga* fumi dicto
modo cum Cepis vel Succo Ceparum instat Attrahivum Re-
medii, per aliquot dies applicetur Bubonibus pro edolue-
ne Venæ, & Maturatione Albescentis FORESTUS lib. 6.
Obs. 19. refert, fuisse Experimentum cuiusdam Chirurgi.

℥. Copiam coram, immitte *Theriacum*, & applica.
Bubones certo tempore capri & exsiccati, in Vino soti
Aqua tepida macerari, usque dum probe mollescant, Bu-
boni calidè impositi Dolorem siliunt, & Ardori resistunt,
& potenter Malignitatem temperant; vel Pulvis Bu-
bonum cum Emplastro permiscetur, & ita applicetur Bu-
boni Pestilentiali. Faciunt hac omnia Emplastra cum &
ex Balone parata, quæ io principio, cum Bubo apparet
incipit, optimè conducunt. Tale Emplastrum expertum
vid. in HILDANI Com. 6. Obs. 30. Vel solos *Pulsis*
Defusis exsiccati cum Aqua Scorzæ, ac cum Aqua Rutæ
capra-

(X) Bubo præcipit est ingens: hinc ad Ingens Glandula, Bubones appellantur Ananici: quare harum Glandu-
larum Tumores Bubonum nomine vocantur Præcipiti: imò Tumores aliarum Corporis Glandularum, etiam ad Collem &
Axillas situm, Bubones quæque tumore dicuntur. Bubo autem hi vel sunt Benigni, vel Maligni: Maligni vel
Furiosi, vel Pestilentialis, de quibus A. noster hic.

caprarie in forma Cataplasmati imponitur, & insigniter conducit. Egregium Remedium est Stercus proprium adhibitum. Pertinet huc *Emplastrum Attrahens Magnetisam Canisla*, Bubonibus aut Tumoribus malignis in Pelle applicandum:

M. Succi apr. pulvis. 3℔.

Balsa. fœcæ & pulvis. 3℔.

Missa in Cucurbita tantum *Spiritus Vini* superfundatur, ut inspermentur digitum transversum, in leni Balnei calore sensim exhalet Spiritus ad consistentiam Magmatum, nec assulo semper novo Spiritu: tandem Magma residuum cum *Emplastro de Meliloto* in debita Consistentia redigatur & applicetur.

Quod vid. in *Methodo medendi Febres Epidemicas malignas*, pag. 60. 61. & 104. elegans est *Emplastrum*, & quod plus in recessu habet, quod scilicet nimium Hæmorrhagiam in Morbus malignis interdum evincit, sub alia applicatur, sicut; nam Bulo exsiccatus sub Aasilis gelatus quæcumque Hæmorrhagiam sinit. Methodus CNOEPELLII curandi Bubones est hæc: mox applicat Buboni *Emplastrum Attrahivum Magneticum*, & propinat Bezoardica, Sin loco euphorias speratæ, Vigiliæ, Deliria, Vomitus, &c. successerint, tunc eligit Centrum aliquod in extrado Abiectionis, & in illo Cotum specifico Ruporio, facta prius Elchæra, aperit. Ubi, inquit, scilicet observatio: hoc impetrari, quousqueque Ruporium Elchæra non infecta, toties Morbum sinne deseruatur: ubi verò prodixit Elchæram, Vigiliæ, Deliria, Aphonias, & similia Symptomata, subito cessant.

Cæterum reliquis ferè *Emplastris Magneticum Arsenicale Angelæ Salæ* præferitur, ex Magnete Arsenicali paratum, in quo Magnete Arsenicali plurima singularia habent Atcana abscondita. Legimus usum hujus *Emplastris* in eo consistit, ut, quod rapit, nodum per se applicetur. Dnm ergo erumpere incipit Bubo, applicandum *Hyssagium*, & promovenda eruptio: post septimam vel octavam horam facta Vesica seu Elchæra aut Pusilla est aperienda: Hinc admodum est *Emplastrum Magneticum* illud Arsenicale, quod omnibus pulsibus perfectæ Compositio est hæc:

M. Arsenici crudi,

Sulphuris fœcis:

Arsen. alb. an. 3℔.

Subtilissimè pulverisat fœcantur in phiala in arena, & subministratur ignis, donec bene invicem colliguescant, & colorem rubrum seu obscurum inducant (sic cum egregie corrigitur Arsenicum): vale refrigerato exime massam, quæ *Magnæ Arsenicalis* vocatur. Jam

M. Gum. Stracina.

Ammon.

Gulbani,

Magnæ. arsen. an. 3℔.

Terebinth. Laric.

Cera an. 3℔.

Olei destill. succin. 3℔.

Terra Viridi. dulc. 3℔.

Misceantur ita: Gummatæ dissolvantur in Aceto, & per pannum lineum traxita iterum inspissentur: deinde scorum colligata Cera & Terebinthina extræ ignem miscantur ad consistentiam debitam Unguenti: hinc superaddantur Gummatæ & Magnes Arsenicalis, cum Terra Viridi dulci, & Oleo succini, & sic paratum est *Emplastrum* ad extrahenda omni generis Venæa efficacissimum.

Vid. scripta *Chimica ANGELI SALÆ*, *Præcis Chymicæ*, HARTMANNI, & 10 specie BARBETTE in descriptione *Psylli*, ubi de Bubonibus.

Loco hujus *Emplastris* Magnetici Arsenicalis, B. D. MICHAELIS noster in Pelle pro curandis Bubonibus & Carcinomatibus ante annos 50. sequens *Emplastrum Magneticum* usurpavit: Nemo

M. Empl. Diachyl. cum Gum. 3iv.

Pulv. Pol. Uræ invers. seu Parid. 3℔.

Magnæ. Arsenic. 3℔.

Cum Oleo Scorpionum & Aran. Mindereri f. *Emplastrum*, quod, uti dicit, est efficacissimum in hoc casu. Hæc ipsa *Emplastris* Magnetica, Bubonibus admodum in Pueris, item in Cure tenuiore & textura rariore, optimè sufficiunt, & Malignitatem extrahunt, ut eadem sub forma Crustæ & Elchære, in qua residet Malignitas, super Bubonem hæreat: hæc apparente, auferatur vel sponte, vel blando Emolliente, ac si subsederit, Matorativis ac

Consolidantibus ei succurratur: si non, de novo adaptetur. De *Emplastro Magnetico Angelæ Salæ* refert BARBETTE, quod, si applicetur Cuti duriori ac ipsius, aut Buboni duriori, & profundius latenti, aut non satis prominenti, adeoque difficulter tractabili, nullam faciat Crustam, & ubiolumis tamen Malignitatem potenter extrahit, ita ut intra 4. vel quique dies Tumor disparat. Sed quoniam hoc non semper ita adeo cito, propterea tutius illi agnot, qui fusu HODGES & DIEMERBROCH prius Vesicatorium parti Bubonis inferiori, vel ipsi Buboni iuxta KEGLERUM & BARBETTE applicat, quod promovet & aditum faciat, ita, ut facta Elchæra & scilla, postmodum *Emplastrum Magneticum* ex melius queat operari, qualia Vesicatoria pro Bubonibus aperendis videb. in *Append. pag. 33. & HORTHII Observationibus* pagina 336. Convenit quoque sequens:

M. Form. accer. 3℔.

Cantharid. 3℔.

Sen. Sinepi.

Staphid. sagr.

Rad. Pyretri.

Emphor. an. 3℔.

Asteri foli. foris. q. f.

M. f. Pasta vesicatoria: 5.

Emplastrum Vesicatorium.

Vesicæ post 7. & vel 10. horas facta aperienda, eisque vel primis horis Folium Brasicæ rubræ aut Bete, Buxyri veteri aut Oleo Raparum insudum, postmodum *Emplastrum* & Cataplasma Attrahens aque Emollientis applicandum: 6. E.

M. Empl. Diachyl. cum Gum.

Canthar. an. 3℔.

Unguenti Basil. 3iv.

Sen. Sinepi. an. 3℔.

Missa sub forma *Emplastris* imponatur Vesicæ apertæ; hoc coim maturat promptè, & suppar Tumorem.

Longè autem melius est dictum *Emplastrum Magneticum*, super quod Cataplasma Emollientis applicandum, donec Malignitas sufficienter extrahatur, & Crusta remota fuerit.

In hæc Crusta, quam *Emplastrum* excitat, hæret imprimis Venenum, & ob id insigniter densa se ipsa est; unde etiam longè facilius remouetur prægressa necessaria scarificatione. Ungitur locus Unguento Balsamico cum Theriaca misto, quod super Crustam admoventur: eam hoc tam decidere facit. Quod si Crusta prima Tumor non sufficienter imminuitur apparet, deuo est applicandum *Emplastrum Magneticum*, & nova Crusta est elicienda, donec sufficienter disparerit Bubo. Quod si fiat, ut Bubo aut nimis altè prominat, aut resit super Tendine consistat, tunc Vesicatorium est nimis debile; Caeterum verò actuale est periculum propter Tendinem. In tali casu admodum est Ruporium seu Cauterium potestate, quod fit ex Calce vivæ 3℔. & Saponis Hispanici q. f. quæ missa dant *Emplastrum*, quod applicatum, forumolium credit.

Alii præmisso vel omisso Vesicatorio:

M. Herb. Parid. Mii. vel ii.

Rad. Lil. alb.

Alb. an. 3℔.

Fianum pingv. no. ii. vel iii.

Coqu. cum f. q. *Aqua* & *Olei Lil. alb.* ad consistent.

Cataplasmatum: Pulv. traxita adde

Theriac. Androm. 3℔.

Balsa. pulvis. 3℔.

Fulg. Sphæder. 3℔.

Sapon. Finet. 3℔. ad vi.

Olei Rosar. 3℔.

M. f. Cataplasma.

D. 5.

Cataplasma Extrahens.

Vel

M. Herb. Parid.

Fior. Chamom.

Malva.

Mellini an. M℔.

Rad. alb.

Lil. alb.

Sen. Ferner.

Lini an. 3℔.

Althægei 3℔.

Coqu. in f. q. *Aqua simpl.* ad putrilaginam ad consistentiam Cataplasmatum: cui adde.

Oli

Olei Balsam.

Scorpion. an. ʒiij.

M. D. S.

Epithema externè applicandum.

Vel

ʒf. Fel. Mitur. M. l.

Herb. Parid. M. l.

Rad. Angel. ʒi.

Rad. Angel. ʒi.

Coqu. in l. q. aquæ simpl. Pulver. trajectis addo

Cypr. sub ciner. coll. ʒiij.

Pulg. splend. ʒi.

Thuris. ʒiij.

M. l. Cataplasma:

D. ʒ. ut antè.

Herb. Paridis Folia vel sola, vel cum Fuligine in formam Cataplasmatum impastata, suppurare & maturare Bubones dicuntur: vid. SCHROEDERUS lib. 4. pag. 119. Item Decoction Herbarum Paridis. Alii Fermentum recipiunt, ex quo cum *Scrophularia*, additis & *Racis Herbarum Paridis*, Cataplasma faciunt, & ita imponunt ad maturandos Bubones & extrahendum Venenum. Item *Radix Symphytis majoris* sub prunis coctis, & cum Mithridatio ac Butyro in modum Cataplasmarum imposita, Bubonem coquit, maturat, & aperit. Aliis etiam Cataplasma ex Scabiosa contusa cum Fermento aeris & Saponis Veneto applicatum, Tumorem maturat: Vel fatis Emplastrum, seu Cataplasma ex Folio Samburi coctis, cum Pulvere Siuapi contuso subactis, quod applicatum maturat & promptè rumpit Abscessum seu Bubonem. Emplastrum Diachylon cum Gummi, cum æquali parte Theriacis Venetæ videb. in HORSTIO pag. 334. Observo. 376. Emplastrum de Bubonibus HILDANI, quod DIEMERBROGII lib. 3. cap. 13. §. 17. describit. Quibus, si dolor valde urget, Cataplasma, quale BARBETTE pag. 37. describit, substitui potest:

ʒf. Folior. Scard.

Rata,

Cicuta. an. M. i.

Flor. Chamem.

Anethi, an. p. i.

Summis. Absinth. p. ii.

Mica Panis simil. ag. ʒiij.

Coqu. ea Lactis Vaccini ad coassentem, Cataplasma.

addo

Cervi apt. ʒf.

Vinell. Ovi. No. ii.

Theriac. ʒiij.

M. l. Cataplasma.

Hæc Remedia similis morigeris Bubis aperientes videntur; quia periculum est, si perfecta Suppuratio expelletur, & sponte Tumor rumpatur, ne propter dolorem ac ardorem, subsidens atroci, Spiritus dilipiant, Vires prosterantur, ac Sanies pestilens retrorsum regurgitet; unde vel Scalpello aperendus est, vel Cantheria potentiali applicato extrahi Materie patefaciendus. Vitanda autem sunt Pustulæ, quando Bubones ad Suppurationem vergunt, & talem loco sequens Emplastrum ab HODGES expectum applicari potest:

ʒf. Empl. Oxymerc. ʒiij.

Galbani colat.

Gum. Canari. an. ʒi.

Vinis naval. ʒiij.

Liquatis simul cum Oleo Chamem. vel Lil. alb. f. Massa pro Emplastro, quod plus milies Chirurgica manus vicem supplevit.

Aperito tamen Bubonem artificialis auspiciator ipsi habent.

Aperio Bubonem, vel sponte vel Scalpello, usurpantur Mundificatione, & hinc Confolidatio. In Mundificatione maxime eminent Infusum ex Radice Aristolochia rotunda, Scordio, Myrrha, Aloe & Croco, cum Spiritu Siuapi tartarizato factum; vel Balsamum Peruvianum, Balsamum Sulphuris aëliatus, vel terebinthinatus mistus cum Unguento Basilico & Theriaca, & cum Lana carpa immittere in Ulcus apertum, imponendo desuper Emplastrum de Minio, Emplastrum Album coctum, Emplastrum Diapompholygon cum

Tom. II.

Oleo Nicotianæ, donec ita mundificetur, & successivè consolidetur Ulcus, observando, ne Confolidatio adeo citò promoveatur. Sed Ulcus, quamdiu possibile, apertum servetur, ut ita omnis Fomes & Gas pestiferum commodè eliciatur, ac removeatur: postmodum cum Emplastro Diaphlurii Rulandi consolidetur.

De cætero probè attendendum, ne Autem Buboni assistatur, teste HILDANO in suis Observ. Sic pariter nec Operta propter Dolorem, nec Saturata propter Ardorem, applicanda veniunt, ne Venenum Pestilentielle interiora repetere cogatur, vel talium abusu Spheacelis parè introductum. Quod si Bubones Obscuri aut rubelli fuerint, quomodo trahi debeant, vid. in HORSTIO Observo. pag. 330. & 331. Nec Mercurius Unguentis aut Emplastris contra Bubones addendus est, ut rectè monet BARBETTE. Exinde eum Mortem observavit SCHENCKIUS in suis Observ.

Quoad Curacionem Bubonum, imitari licet BARBETTE cavemus nobis saltem, non mox, ut ipsi, ad Infusoria properemus, cum hæc non addenda sint, nisi Bubo vel fuerit profundus, vel Cutis dura, vel Tumor durus. Interim post Vesicatoria, Theriaca in usum vocanda jubet HELMONTIUS.

Interim danda sunt Diaphoretica, imprimis Sulphura Antimonialia, ut in Cura Peste generali jam monui. Post Sudorem Julepi moderatè aciduli propinandi cum in finem, ut malignum fermentum acris ipsis corrigatur, & emendetur, simul tamen Corpus, quantum fieri potest, in Diaphorici blanda conservetur & retineatur.

§. II.

PAROTIDES. (Y)

Parotides eodem modo tractandæ sunt ac Bubones.

§. III.

CARBUNCULI, ET ANTHRACES. (Z)

Quoad Carbunculos, & Anthraces: cognoscuntur facillè, si cum colore purpureo & puniceo emergant, & circumscripta circulus rubicundus, quasi inflammations, qui melior; aut lividus & ater, qui deterior, se representat. Carbunculus talis facillè serpit, & Gangrænam inflat vicinas partes inficit, donec tandem pars mortificata excidat. Interdum saltem Pustula quondam plus minus alta apparet, Materiam quasi coctam continens, que aperta aut compuncta non tantummodo, sed etiam dura & sicca, ac profunda in partibus incumbentibus carnis radiata apparet. Interdum Pustula plures quasi Hydatides emergunt, sub quibus durities inflammatoria apparet. Bubonis & Carbunculi seu Anthracis differentia vid. in SENNERTO de Peste.

Carbunculus talis quicunque nihil aliud est, quam incipiens partis mortificatio. Unde in Cura

1. Mortificationis vicinas partes incipientis progressus inhibendus.

2. Substantia mortificata separanda.

3. Ulcus restitum mundificandum & consolidandum.

Notandum autem in genere: quod, dum in Carbunculo ardor summus est, adfringendum sit in Topicis ad Oleis & Pinguibus, quia quandoque Spheacelismi periculum inducunt, ac proinde Anthracibus non solum ac Bubonibus applicandus est Bulo exsiccatum, aut in Vino maceratum. Quodam expicatoris, utrum lethalis vel curabilis sit Carbunculus? Emplastrum ex molli Galbano imponit: Quod si tenaciter simè Anthraci adheret, licet nonnisi cum Cruâ avelli queat, salutis ipem esse afferunt; sin verò non adheret, incurabilem pterquam atque lethalem esse. Item Emplastrum ex Theriaca Andromachi imponi sudent Carbunculis: Quod si Theriaca citò arefcit & aduratur, ipsa verò Carbunculi constitutio nihil immutetur à Theriaca, lethale esse Signum portendunt. Verùm hoc in posteriori simus cauti (quoad Galbanum res est sine periculo); quoniam

Z. 3.

(Y) *Incipit* dicuntur Glandulæ prope Aures, atque hec Glandularum Tumores: ex vasa prope, & ʒi viti, Aures. Et Tumores = vasa in sem appellat seipsum Hippocrates.

(Z) *Anthracis* Carbo, & *anthracis* Carbunculus: hinc Ulcus, seu Exulceratio similis illi, que affa facti, dicitur à Chirurgis Anthrax vel Carbunculus. Et quare Anthrax ab Anthracis seu Carbunculo non differt, nisi quod Carbunculus seu parvus Carbo seu parvus Anthrax; autem apud Prælicos nomine Anthracis: non tam Carbunculus, sed male grandior, sed servat, & virulentia mobilior.

CEPHALALGIAE, VIGILIAE,
ET DELIRIA.

niam observatum fuit in Peste Mantuana, quae Anno 1529. superiori saeculo grassata fuit, quod Theriaca Carbunculo impetrata attulerit Mortem; Saltem vero; ubi Balaubus fuit applicata: uti refert RHODIUS in *Analysib.* pag. 129.

Pro prima igitur scopo Sapphis in cute ductus tandem circulus circa Carbunculum, donec locus non sit lividus. Praecavet enim non tantummodo, ut oleosis non ferpat Carbunculus, sed paulo post aperitur & excidit, & praeterea etiam vis Veneni tota exinguitur: uti hoc non tantum affirmat HARTMANNUS in *Praxi Chymica*, ubi de *Peste*, & HELMONTIUS *Tractatu de Magnet. Virtutum Curatio* ne, sed vid. etiam MARCUS MARCI in *Philos. Petr. Rescripta* Sect. 5. cap. de *Magnetis Supplici*. (Obiter nota, quod Sapphis sepius sub terra novae & fortiores accipiat vitres. (Hinc apud Carbunculi illinatur seu tingatur Butyre animonii quantitate Nummi: tunc, ubi Elchasa apparet, applicetur Ruptorium ex Oleo Lini & Chamomilla cum Croci HARTMANNI, ubi de *Peste* §. 15. vel loco talium Butyre animonii ettemitantes Anthracem artingantur, sive circumducatur circulus: hoc enim ob Acidum, concentratum non solum progressum ulterius Mortificationis inhibet, & in Gangraena partem mortuam a vita secermit, sed etiam totum Carbunculum excidere facit. Talibus factis, vel minori in malo sine his, applicandum est Emplastrum *Magnetis Arsenicis Angeli Sala*, utpote quo non datur melius, & fiet, ut ibi totus Carbunculus; vel ad suppurandum & aperiendum Carbunculum Emplastrum de *Faligine*, cujus descriptionem videb. in HORSTIO *observ.* pag. 349. & 356. Alii non inepte max. applicant *Cauterium actuale*, utpote in parte plus minus mortificata minus dolorum, quod tamen omnium efficacissimum à BARBETTE & HODGES praedicatur, ubi simul applicandam rationem HODGES p. 219. tradidit. Hoc facto, Elcharam Ruptoria, vel in Corpore tenenda, solum Emplastro *Magnetis Arsenicis*, succellere separant. *Piaingis*, & *Quesis*, antequam Elchaze secretionem molliatur Natura, maxime vitanda. His factis, ubi promptè exciderit Carbunculus, & solum si foramen, perigatur cum Emplastro *Magnetis Arsenicis*.

Ut suppuraretur eo melius Crusta, BENNETTUS, DIEMERBROCIUS, BARBETTE & HODGES *Cataplasma artemisiodae* sequit. *Emulsionis* deservit ut Alio, Scordo, Uva inerva, Alchaza, Farina Lentium, Ficus columbina, Sapon nigro, Melle, &c. si Dolor valde urgeat, Emplastrum de *Cynoglossa*, aut de Pomis Granatorum laudatur. Postmodum etiam Herbae Parisius Buxae vel Uvae ad maturandum Carbunculum, & ad mitigandum Dolorem laudantur. Sunt, qui postquam commendat Cataplasma *Barbette* super descriptum. Ubi substantia suppurae probe educta fuerit, Unguentum *Basilicum* cum Emplastro *Terebinthinae* & *Theriacis* utpote dum (vitanda Viscatoria;) Balsamo verò *Sulphuris terribilissimo*, aut *Assae*, item Oleo Tartari scitido. Ubi probe est modificandum & abstergendum, atque conveniente Emplastro consolidandum. Ad abolendum Consolidationem, ne remaneat Ulcus fordidum, insigniter laudatur Cataplasma ex Radice *Symphitidis* majoris, confusa intra duos lapides, & repetitum applicetur; hoc enim intra paucos dies Carbunculum consolidare & curare perhibet. De ulteriori Carbunculi curatione vid. DIEMERBROCIUS & BARBETTE.

§. IV.

AESTUS.

Est, quae Aethum in genere mirigant, sunt in specie Nitratu, v.g. pro usu Interius Nitrum arsenicatum in Puteo decoctum dissolutum, &c. ad ment. §. et etiam

24. Nitri artemisiodae §ii.

Antimon. diaph. §i.

M. pro s. doibus,

D. s.

Pulvis Refrigerans & Confortans.

Item arsenicum duplicatum, spiritus Niri dulcis, &c. conveniunt.

Externè dissolvatur Nitrum in succo Temperis majoris, & aceto rosaceo, quibus intingantur Linthea, & applicentur Pulvis, item Fronti & Temporibus. Sed observandum; non semper opus esse refricare Calorem, nisi ob modum nimis exacerbat; Deinde in Febrilibus cum excretionem cutanea consensu calor haud facile suffraginatus venit, & motus excretorios impeditur.

In Cephalalgia notandum: Episth. Dolorem Capitis Febrili Cauterium, imprimis Benignum, esse saltem per consensum *Roanachi*, vel primum viarum, saltem in principio. Cuius ratio exinde desinitur, quod *Somniferia* in principio Morbi dato, ut praecaveatur omnis ferè Praecordiorum Symptoma, in speciem Cephalalgia, quam intra etiam antea fuerit, renatat. Quin &, quod *Chysma* ingella in Febrilibus Cephalalgia solvitur eadem notabiliter levent. Sicut tamen & Febris, praeterit Maligna, quae genus Nervosum, adeoque & Caput primario affligit: hinc etiam corporis utrumque moderato, Caput, praeterit circa frontem, intem ardet, Agrypnia: adnot. plus minus, interdum plene non doluit. Febris haec sunt pessima nocte, quibus correpti rari evadunt; nempe spina magna Capiti & Nervis generi infusa est, unde illa Symptoma. Quoad *Vigilia*: haec peritantes in Febrilibus, vel Hypochondria ac Praecordia male affecta sequuntur; & tunc inquieti & plus minus lassabundi solent esse aegri: vel capitis seu Cerebri male habentis sunt pessimeque; & tunc intermoralefebrilis circa frontem, Oculi fulgidi, capitis plus minus perterritio; item subsane Dolor per essentiam adesse solet, aegri moros inquieti sunt. Haec ipsa symptoma diutius si aegri, & graviter affligant, Delirium post se trahant, cujus comites sunt convulsiones.

Dolor igitur Capitis si in principio est, adeoque non portendit Judicium vel Crisim, curandus venit. Sio vero Febris sit admodum intensa, adjuvare solertia signis, supervenit verò Capitis Dolor, cum ipsa prope Judicium venerit, nil oportet tentare, quia interdum talis Cephalalgia solet esse signum Decretorii. Vomitus vel Haemorrhagiae praesageant. Per ratio est quoad *Vigilia*, in quibus Critico tempore, vel praetentis, vel instantis, Anodyns aut plus minus Somniferia minus rursus applicari possunt. Interdum verò mala haec in genere corat Papaver, & quolibet ex eo parata Opia. Externè vero in febrilibus lo usu est Unguentum Alabastrinum, cum Oleo Papaveris expresso, Temporibus subinde illitum; item Emassio ex Nucis *Pisicis*, v.g. §iii. & sem. *Papav.* albi §i. cum aqua *Florum Sambuci*, aut *Viburni*, aut *Silvestris* parata, ac Fronti tepide applicata; nunc cum, nunc line Camphora; Camphorata enim semper non conveniunt.

Patitur & Cataplasma ex *Fellis Rato*, Radice *Raphani* & sale communi, cum Fermento succipit, & placent Pedum applicata, Denique Nitrum in aqua appropriata quavis dissolutum, cum linthea multiplicata Fronti ac Temporibus applicatum convenit. Observandum tamen hic: Dolorem in parte Capitis aeterniore a Febre orti; in parte vero posteriori a proprio Capitis afflu: Confer. PRIMEROSIUS de *Febrilibus* pag. 321. Deinde quoad Episthema Humida; haec minus conveniunt, quando nempe Corpus est in continuo Madore. Talia enim dum frigida applicatur, striditum pororum Capitis, adeoque & per consensum universae Cutis, Diaphoreticos impedimentum inferunt.

Haec ipsa verò & *Vigilia* medentur. Praeterea tamen & Medulla Crurum Vituli recens, Temporibus crebrius illita, vespertino tempore, somni beneficium adfert. Emulsionis ex seminis ab, frigidis moribus, Papaveris erratice &c. ut interno usu, temperando Sanguinis Aethum, & Arteriam ferrentis febrilis, Vigiliae solvitur compescunt, ita & Externè Episthema forma applicata non iustitiae sunt. Interdum

24. *Exten. Caput*, §ii.

Op. §6.

M. s.

Essentia Quietem inducent,

Vel

24. *Aqua Flor. Papav. errat.*, §iii.

Cera. Cera. sine igitur.

Antimon. diaph. an. §i.

Extr. op. gr. ii. vel ii. vel *Extr. op. gutt.* xlv.

Syr. Corall. §vi.

M. pro 1. vel 2. doibus;

D. s.

Potio ad Quietem.

BARBETTE de *Peste* scribit; Opia, licet Sudoriferum sit, illa Peste tempore se valde parum fuit usum, quod Somno primis duabus vel tribus diebus non adeo confertur. Quando verò Patientis 6. vel 7. diebus continuè insequendus nullum Somnum capere possunt, & Virium desc.

defectus inde sequitur, hac ratione, quod sequitur, prescriptum & aliquotum egregie contulit;

℞. Aqua prophylact. herb. 3℔.

Borrag. 3℔.

Cinnamon. 3℔.

Conf. de Hyacintho 3℔.

Sand. Perlat. 3℔.

Laud. op. 3℔.

Misc.

Exhibuit cochlearia singula horum quadrante, donec somnus redeat, hunc *Eger* somnum bene naturalem, & in somno ipso Dolorem sat tolerabilem, capiet. Idem tamen Author *hemorrhagiam Opitij* diffundit, nec impare Ventrículo *Egrigius* nimis delibulis dandum esse monet, quod plus nocuerit quam emolumenti in his ab eo sit expectandum. Econtrā neminem noculosum nimis esse jubet; ne ejus usum se ignorare prestat. Prius vero quam ad Laudanum opiatum deveniat, Capitis Dolorem sequenti more sedare sudeat *BARRETTE*: Hædæjan teretrem contusum Capiti, plantis Pedum, ut & vallis Manuum hoc vel simile adinvenire jubet:

℞. Fel. Ruta M. 1℔.

Perment. acris 3℔.

Pinol. calanch. 3℔.

Sali. camph. 3℔.

Acet. fœdant. q. l.

M. f. Cataplasma, plantis Pedum, & vallis Manuum applicandum.

℞. Seli. arca.

Terra figill. 3℔.

Cera alba an. 3℔.

Acet. Calendul. q. l.

Misc.

Usurpavit eodem modo.

§. VI.

SOMNUS NIMIUS.

Incedum profundius somnus ægros febricitantes quasi stupidos reddit, quo in casu vitandis *hericia*, *Mithridatum*, & *Electuarium Discordii*, ac similia, cum hæc ipsa Opium contingat; potius somno nimio resistit Acetum rutaceum, sambucinum, &c. Mixture simplex, Caloreum, & Castoreata: c. c.

℞. Ess. Card. bened.

Castor. an. 3℔.

M. s.

Essentia sudorifera q. ad. 30. gutt. in Aceto rutaceo, Vel

℞. Ligu. Corn. Cerv. facies 3℔.

Essent. card. bened.

Castor. an. 3℔.

M. s.

Mistura Sudorifera 30. guttæ in Vina Rhenano ter die.

Vel

℞. Ductil. corn. Cerv. cum rad. Scorc. 3℔.

Aqua prophylact. Sytu. 3℔.

Mixt. simpl. 3℔.

Essent. castor. 3℔.

Corn. Cerv. fœs ignis 3℔.

Antimon. diaphor.

Flor. sulphuris an. 3℔.

Benzard. Jovial. 3℔.

M. s.

Bernardica Potio Confortativa: singulis horis a. ad. 3. cochlearia.

Externæ *infusæ* Cervicæ, item Carpi aut Malleoli applicatæ, sunt optima. Conf. *HORSTIUS* in *Observat. pag. 38 p.*, in *præf. p. 16*. Naribus applicatur Acetum rutaceum, sambucinum, vel etiam succus Rucæ, Acetum mistum; item Caloreum Aceto intinctum, &c.

℞. Theri.

Ruc. Lauri.

Spir. nigr. an. 3℔.

Subiguntur probe cum Allumine Oreo. Imponatur Fronti q. l. & Somnolentiam arcebit.

D. s.

Externum Epichema.

NARIUM HÆMORRHAGIA.

Hæmorrhagia Narium variâ est, pro vicietate Febrim. Circa hæc notandum est: an *Hæmorrhagia sit critica*? an vero *symptomatica*? Critica incompensata suppressa quæ mala intulerit? & quomodo ipsa correctâ sit? videt apud *HEINRICUM* ab *HEER* in *observ. pag. 30*. *Hæmorrhagia* talis Febrim sistit, vel sanguinis fluxum prohibendo, vel locum apertum occludendo: illud prius, hoc posterius. Illud imprimis *Resolventia*, aut *Duriorantia*, aut internè *Refrigerantia* præstant. Quod si sedata fuerit *Hæmorrhagia*, places *Consilium SYDENHAM* in *methodo morandi febres pag. 61.*, laxationem Alvi esse institutendam, si nempe alia non impediant. Inter *Internæ* excellit *Laudanum opiatum* & omnia *Papaverina* etiam, & præsertim in *Malagis*, præmissis præmittendis: vid. *TIMÆUS* in *cal. pag. 387*. *HORSTIUS* *observ. lib. 1. observ. 27*. Hinc & *Aqua Papaveris* erratici cum *Syrupo de Portulacæ* & *Papavere* hinc & succi aciduli, *Cydonæum*, *Ribium*, *Syrupus Portulacæ*, aut *Plantaginis* ac denique *Terræ sigillatæ*, *Lapis Hammaritis*, *Corallæ*, *Benzardicum Martiale*, aut *Antimonium diaphoreticum Martiale*, &c. Inter *Externæ* autem imprimis coferat *Acetum*, si hoc ipso abluantur *Manus ac Pedes*: vel *Epithemata* ex *Aceto Collo* applicentur: vel *Græca cum Aceto* in *forma Cataplasmatia* Temporibus ac Fronti; aut ex *Argilla*, & *Bolo communi* cum *Aceto* fœdatis, in *forma Cataplasmatia* Fronti ac Nuchæ applicentur. *Bufo* vel *vivæ* sub alia applicatus, vel exsiccatu simili ratione sub *Axillis* detentus, vel *Pugna compressus*, ut probe incalcescat, potenter *Hæmorrhagias* sistit. Denique *Nitrum* ad dr. 1℔. in *Aqua frigida* dissolutum ac propinatim *Hæmorrhagias* sistit: Conf. *RIVERIUS* *cons. 1. observ. 42*. Quod facit *Julepus Primægi*, quo sæpe usus fuit ad compescendam *Hæmorrhagiam*, aliis irritis:

℞. Ag. Symphyt.

Plantag. an. 3. iv.

Syr. de Ros. sic.

Plantag.

Cydon. an. 3℔.

Acet. Vini albi dr. iij.

Nervi antimoniatum aut depravat. dr. i.

Spiritus Virgali gutt. x.

Misc.

BARRETTE *Obs. Nihil. 1.* in quadam *Pelle*, & insuper *hæmorrhagia*, dies 5. vel 6. laborante, ad sanguinem incitandum, & sic cohibendum, ordinavit sequens, de quo *Sapius* cochlearia duo haurire jussit:

℞. Aqua Rosar.

Plantag. an. 3℔.

Cinnamon. 3℔.

Sangu. Dracæ.

Corall. rub. præp. an. 3℔.

Consoll. de Hyacinth. dr. i.

Spiritus salis gutt. viij.

Syr. Berber. 3℔.

Misc.

Ex hujus usu *Hæmorrhagia* fuit sedata, *Sanitas* & *Mens* redierunt.

§. VIII.

S I T I S.

Sitis molestam perquam symptoma, sedatur convenientissimè per *Nivratæ*, & per *Acidula*, *Nivratæ* inter excellent *Nitrum antimoniatum* in quovis *Pocu* dissolutum: quo etiam facit *Serum Lactis* depravatum, imprimis succo *Citri* acidulat om. *Acidula* inter, tam *Vegetabilia* quam *Mineralia*, excellit *Julepus* ex *Aqua communi*, acidulata cum *Spiritu salis*, & *Syrupo Citri*, additur *Gelatina Cornu Cervi* sudorem simul movens: Vid. *RIVERIUS* *cons. 1. observ. 19. cons. 4. observ. 83*. *PIENS de febribus part. 2. cap. 19*. Ea *Vegetabilia* *Acidula* vulgè nocis, *Tamarindorum pulpæ* aut decoctum convenienti, ubi *Alvus* simul aperienda venit; item *Julepi* citrati blandè acidi, &c.

℞. Ductil. Citri cum Corn. Cerv. & rad. scorc. 3℔.

Syr. Ribium.

Berk. an. 3℔.

Sacci Citri q. l.

M. f. Julepus: 5.

Julepus Refrigerans Confortativus pro Siti.

Hinc

Halc & similibus Gelatina Coram Cervi addi potest.

§. IX.

CARDIALGIA ET VOMITUS.

Sal Abfinchii valde prodest in Vomitu, & Nausea febrium;
Confer. RIVERIUS *cons. 1. obs. 42.* Item Conserva Men-
tha, Extradum Tormentillæ, &c. sunt egregium.

Vel

℞. Conf. Menth. viridat.
Pulp. Citri aa. ʒiſſ.

Cons. citri candit.
Elect. Diacord. fræ. an. ʒi.

Conf. alcherm. ʒi.

Salis Abfinch. ʒi.

Cam. succ. Cydas. vel Citri f. Elecliarium.

D. S.

Elecliarium Stomachicum ad quantitatem Ca-
staneæ pro una dosi.

Præscribi potest in Nausea, salido Cibi, & Singultu.
Item

℞. Mixt. simpl. ʒi.
Spiritus Nitri dulc. Camph. ʒi.

M. S.

Spiritus Stomachalis.

De quo sæpius gotæ ʒo. ʒa. ad 40. in Vino sunt exhi-
bendæ.

Conferantur etiam Remedia BARBETTE usitata in
dysenter. *Reps. in Vomitu febrium Pleuritidalium*: Nempe

℞. Aqu. Menth.

Prop. ʒi.

Cons. ʒi.

Conf. de Nivacith. ʒi.

Salis Corall. ʒi.

Syr. Myrtin. ʒi.

M. f. Potio.

De qua omni dimidia hora cochlear recipere jubet pro
ordinario potu: ex cuius usu Vomitus plerumque sedat-
ur, si non ex Carbunculis Stomachi, & Intestinorum ori-
atur: simulque regio Ventriculi ter vel quater quotidie
Oleo sequenti inungatur:

℞. Olei Nucis. ext. ʒi.

Mas. destillat. ʒi.

Alfinch. ʒi.

Mile.

Inter hæc potus conceditur: sedato verò Vomitu mox
sudoriferum exhibetur. Egregium quoque est Emplastrum
de Caranna, aut quod BARBETTE in *prax. lib. 4. cap. 2.*
commendat: item ex Tacamahaca, & Balsamo Peruviano
cum Theriaca malaxata; vel Sacculi Stomachalis interposi-
tus ex Mentha crispâ, Abfinchio, Rosemarino, & Rosi
rubris; vel ex Fermento cum Bacis Juniperi, Caryophyl-
lus, Nuce moschata, Macæ, & Aceto rosato Cataplasmata
parum calidè applicanda.

Præsentanei ferè effectus est Epithema illud ex spiritu Vi-
ni rectificato, Aqua Apoplectica, Theriaca, & Camphora,
quod vid. in *Colleg. Formul. class. 3. §. 7.*

§. X.

DIARRHŒA, ET TORMINA ABDOMINIS.

Alvi fluxus, uti & Tormina abdominis, curat in specie E-
lecliarium Diacordii fræ. ʒi. ad ii. propinatum: v.g.

℞. Aqu. Plantag. ʒi.

Aust. Camph. ʒi.

Elect. Diacord. fræ. dr. i.

Extr. Torment. gr. xii.

Syr. Plantag. dr. ii.

M. pro 1. dosi: S.

Potio Adstringens pro una dosi.

Vel

℞. Aqu. Plantag. ʒi. vel iiii.

Cinnam. dr. iiii.

ʒiſſ. Diac. fræ. dr. ii.

Cons. Citri aa. ʒi.

Autim. diaph. gr. x.

Spiritus Salis dulc. dr. i.

Syr. Perisloe. dr. iiii.

M. D. S.

Adstringens Potio Confortativa.

Cochleatim capiantur pro libitu.

℞. Ment. ʒi.

Quint. Essentia Cinn. dr. i.

Essent. Opii dr. i.

M. D. S.

Essentia Adstringens.

Propinator in Vino dosi guttular. ʒo.

℞. Cons. Citri aa. ʒi.

Autim. diaph. gr. x.

Camph. gr. vi.

Mile pro Pulvere:

Div. io 2. part. æqu.

D. S.

Adstringens Pulvis sudoriferus.

Item Essentia Theriacalis ad gutt. ʒo. vel ʒi. Item Extra-
ctum Theriacale ad gr. iiii. vel ii. aliaque similia: anodynâ
autem & Quina sunt optima: quibus adduntur & abfinchio,
nempe Cornu Cervi ullaum, Bolus Armena, Terra sigillata,
Crystallus præparata, cum Confecta Rosarum antiquâ propi-
nata. Cydoniata denique quælibet sunt utilisissima.

§. XI.

SUDORES NIMIL.

Rariùs equidem sudores nimis vexant sub febrium motu,
quia moderati sunt expiati: interdum tamen post Febrem
Continuas, aut graviores, aut passò diuturniores, crebri
sudores nocturni agros vexare solent, Atrophiam minantes,
ex deficiente nutrimento chylos assimilatione, ob sanguinem
depauperatum nari. Hoc ipsos & humores temperantes, vel
absorbentia corallata, interdum mercuria, cum aromaticis
substantiis amaris, v.g. Abfinchio, curant: Confer etiam SY-
DENHAM in *obs. pag. 135.* De cætero Corpore adhuc pleno in
febris non elevari vi, quia facile transire fieri potest ad
caput, ut rectè monet BALLONIUS *Pæren. med. p. 15.*

§. XII.

URINÆ SUPPRESSIO.

Quoad *Urinariæ afflatus*: suppressio huius interdum super-
venit, quæ interdum Græcos pro sudores imminenti indicium
est, præsertim si prægresso sudore superveniat.
Conferatur HEINRICUS AB HEER *obs. p. 65.* Interdum
in statu sine Græcos indicio suppinitur, vel in Destructio-
bus, vel alio modo affectis. In talibus regio Pubis illinenda
venit sequenti Linimento:

℞. Unguent. de alb. ʒi.

Olei scorpion. simpl. dr. i.

M. D. S.

Unguentum Aperiens.

Applicetur crebrius.

Vesicatoria vitentur.

§. XIII.

SYNCOPE, CORDIS PALPITATIO, ET
ANXIETATES.

Ad *syncope*, *Palpitationem cordis*, & *anxietaatem*, à san-
guinis nimia ebullitione, aut symptomatis spasmoticis, aut
etiam sanguine coagulato oriundâ, præter externa, spiri-
tus animales torpidos excitantia, convenit aliquid Conco-
ctionis Alchermæ, qui ferè possunt, Castoreum & Cassi-
area, Spiritus Carniæticus de Tribus, Liquor Coram
Cervi succinatus, Spiritus salis Ammoniaci succinatus, &c.
Quando verò ex Ventriculi Cruditatibus originem trahant,
ante omnia conveniunt Absorbentia, vel sola, vel cum Vo-
latilibus sociata: e.g.

℞. aqua Theriac. ʒi.

Tinctura Benzard. dr. i.

Spiritus salis ammon. theriac. ʒi.

Puls. viperin. seu Benzard. anim. dr. i.

Syr. Cort. citri dr. i.

M. D. S.

Potio Confortans, coelestium capienda. Vel

℞. Corall. rub. pr. p. vel Extr. suc. ign. dr. i.

Cinnab. animat. dr. i.

Sal. volat. corn. cervi gr. xvi.

Succin. gr. viii.

Camph. gr. i.

M. pro Pulvere:

Div.

Div. in 3. part. inq. 3.

Pulvis Confortans.

Inter Externa pro Temporibus & Facie irrorandis :

℞. Aquæ Mirand. cum Caffeo. ℥i.

Carbone.

Spiritus Mellis. vel Ciri vel Refor.

Viridis Mris ana ℥ii.

M. D. S.

Aqua Externa ad illinendum.

Vel

℞. Herb. Scorpil.

Major.

Flor. Lavand.

Caffeo. ℥i.

℞. Nodus vel Sacculi pro Pulvis, Aere refectis, vel Aqua Mirand. cum Caffeo, vel Mixtura prescripta irrorandi.

§. XIV.

PRUNELLA.

Ad *Prunellam seu Unguam*, & incipientem, *Ovis nigra* diem, Gargarismis ex *Prunella*, *Salvia*, *Scordio*, cum *Rosâ rubra* mistis, &c. Aquam *Mordel* decoctis paratis, addito *Nitro*, *Sale Ammoniaco*, unâ cum *Syrupo Papaveris rhæadæ*, & *Diamoræ* confecti; &c.

℞. Herb. Scord.

Prunell. ana. M. i.

Uvæ.

℞. Scabif.

Malva arbor.

Refor. rub. ana. M. ℞.

Incis. dentur ad chartam: S.

Species mistæ ad Gargarisma.

Simul quoque externè Colla Sacculus integro Croco, Floribus Sambuci, & Spiritus Salis Ammoniaci irroratus, & interpassum ita locus calidè applicetur.

§. XV.

TREMOR MEMBRORUM ET TENSIONES.

Ad *Tremorem & Membra tremula* Vesicatoria super allegata Pulvis Manuum & supra Genus in parte interiore, imò contra nimias Anxietates Præcordiorum, etiam sub Axillis, & supra Umbilicum cautè applicari, Vesicæ inde ortæ maturè aperiri queant.

§. XVI.

MACULÆ.

Ad *Maculas* non raro diebus Criticis, quarto, septimo, vel nono, in Corpore hinc inde, præsertim Dorso, Brachiis, & Cruribus, cum morfu Pulicum, quandoque ut Vires longiores interitus, *Sudoris* supra nominata continentur: poterit quo Myrrha & Callosa excelsus cum Salibus volatilibus; hinc Electuarium sequens:

℞. Elæf. Diaph. Ros. ℥i.

Cor. Corv. sine igne

Salis Cord. bened. ana. ℥i.

Myrrh. elæf. ℥i.

Cum *℥. q. syr. Rubi idæi* Electuarium: Da S. Electuarium ad Venæum expellendum pro & vicibus Capiat in Vena calido.

Item Pulvis sequens:

℞. Cor. Corv. sine igne ℥ii.

Antimoni diaph.

Salis Cord. bened. ana. ℥i.

M. & Pulvis:

Div. in 6. part. aqua.

D. S.

Pulvis Venæum expellens.

Vel

℞. Pulv. Diaph. Ludov. ℥i.

Antimoni diaph. ℥i.

Camp. ℥i.

M. pro Pulvere:

Div. in 6. part. aqua.

D. S. ut antè.

Vel

℞. Cor. Corv. sine igne ℥ii.

Salis Cord. bened. ℥i.

Camp. gr. xv.

M. & Pulvis: S.

Pulvis Expellens.

Caveatur sedulo Frigus, & fricetur quotidie Corpus sacculo, Sale calido vel Sale Petreæ repleto, & præterea de Decocto sequenti sapè bibendum:

℞. Raf. Cor. Corv.

Rad. Serræ. an. ℥i.

Flav. Cor. Ciri ℥iii.

Sem. Anis.

Anis. an. ℥i.

Misc. & coact. coq. in *℥. q. Aquæ*:

Calatura edulcoretur insar Julepi.

D. S.

Potio Confortativa & Expellens:

Vel medianæ hæc *℥. Emulsi* ex Seminibus Expellentibus cum *Myrrhâ* ad imitandum *ZWELFERI* in *Phar.*

Reg. pag. 209.

Vel

℞. Flav. Cor. Ciri ℥ii.

Sem. Galg. res.

Aquile.

Card. bened. an. ℥i.

Myrrh. elæf. ℥i.

Cum Decocto jam prescripto *℥. Emulsi* adde

Cor. Corv. sine igne ℥ii.

Antimoni diaph. ℥i.

Edulcoretur parum:

D. S.

Expellens Emulsi Confortativa.

Sed etiam *Cucurbita* fere pulvis in Dorso, Brachiis & Cruribus calidè affigendæ, & sapè detrahendæ, vel distis Sacculis, Sale vel Nitro refectis, & Lixivio calido humectatis, Corpus calidè bene fricandum, ut eo melius Cutis aperiat, & Maculæ excrescant, nec retrocedant.

SECTIO XVI.

D E

SANGUINIS EX CORDE IN PARTES MOTU, ADEOQUE CORDIS, HINC ET ARTERRIARUM, PULSU LÆSO.

UT patet connexio cum prioribus, superius habuimus in genere de *Sanguificatione* facta, & inde natis *Febribus*, & sic, quando Sanguis non rectè fermentetur, & in Præcordiis ab Aere inspirato non rectè resolvitur, unde tunc simul fit vitiosus Chyli assimilatio: Quæ vitia Sanguificationis ex lesa particularum, Massam ejus componentium, Crassi orridi maxime, sive hæc Crasis vitietur vitio Chyli, sive vitio Massæ Sanguineæ, aut hæreditario aut adicipio. Verùm inter utroque intercedit alteratio ab Aere inspirato & expirato: hujus ergo vitia inferenda fuere,

Jam ergo in Præcordiis Sanguis ab Aere alteratus & perfectior factus, non ibidem hæret & subsistit, aliis præmissis immineret Mortis periculum; sed ulterius ex Corde movetur per Arterias in universum Corpus, & hinc per Venas undique revehitur ad Cor: qui *Mors* cum sit per Circulum, propterea dicitur *Circularis*: cujus Centrum est Cor; Peripheriam constituunt externæ Corporis partes; lineæ ex Centro ad Peripheriam constituunt Venæ & Arterie, hinc etiam ubique Arterii Venæ, & Venis Arterie respondere solent, excepto Cerebri Cortice & Hepate. Ratione modi consistit hic Mutus Sanguinis in Pul-

in *Pulsu*, dum ex *Corde* in *Arterias*, & hinc in *Venas*, impellitur. Duplici constat *Motu* hic *Pulsus Cordis Et Arteriarum*.

1. Est verus & proprius dictus *Motus*, qui est Contractio seu *Systole*.
2. Est impropius dictus *Motus*, qui est Dilatatio seu *Diastole*.

In illo agunt hæc partes? Dum se contrahunt, & ita continent *Sanguinem* ulterius propellant: in hoc verò reverà patiuntur, dum à turgescencia *Sanguinis* dilatantur ac distenduntur. Conf. de hac *Sanguinis Circulatione* WALÆUS in *Epistola de Chyli Et Sanguinis motu*, item CHARLETON in *Chymia animalis* Liber. 6. item HARVEUS de *Motu Sanguinis*; item CONRINGIUS de *Generations Et Motu Sanguinis* PAULUS SARPA, *Reliquis Venarum*, BARTHOLINUS in *Epist. C. 1. Epist. 26*. Vid. etiam HIGHMORUS *Diagn. Anatom. de Arterii Coræ*.

Certe à *Sanguine* ex *Auricularis* ad *ejus Ventriculos*, imprimis dextrum, illapso & turgescente, expanditur, quæ expansioe *Fibræ*, *Cordis Parenchyma* confluentes, extensio irritantur, h. e. nimio distensionis & lationis sensu afficiuntur, inde copiosè per *Nervos* irruunt *Spiritus animales*, qui has *Fibras* movet & contrahunt, quæ contrahione *Corus Cordis* ad *ejus Basim* movetur, motu quasi *Turbini* ventriculo, unde *Parenchyma* crassescens angustatur *Ventriculi*, & ita exinde *Sanguis* impetuoso in *Arterias* evibatur, donec expansioe illa facta *Spiritus* impetus cessat, unde *Cor* ex *Basidem* denovo subdit, & alientem *Sanguinem* ex *Auriculari* recipit. Est enim *Cor* reverà *Musculus*, & *Musculorum* in modum movetur, ut jam olim statuit HIPPOCRATES, & noviter confirmavit STENO in *Observ. Glauclidi Et Musculi*, item HIGHMORUS in *Diagn. Corp. Anatomia*, item LOWERUS *Tracl. de Corde*.

Pulsus iste continuatur in *Arteriis*, quæ etiam habent *Systolem* & *Diastolem*, *Cordi* tamen contrariè. *Cor* enim, dum inflat *Musculi* per secundum *Fibras* sua contrahit, cum impetu *Sanguinem* rarecentem exprimit in *Arterias*, quarum *Tunica crassa* & *nervosa* ab impellente illo *Sanguine* violenter dilatatur, simulque, qui in ea est, *Sanguis* ulterius pellitur. Ubi verò *Cor* denovo repletur & distenditur, dilatatur *Arteriarum Fibris* suis nervis circularibus denovo se contrahunt, & *Sanguinem* eo dilatantem in *Venas* propellant, donec novo *Sanguinis* impulsu denovo per universum *Corpus* dilatentur. Dependet ergò *Arteriarum* motus Dilatatorius à solo *Cordi* impulsu, & hinc facta *Sanguinis* eructio, id quod Moderatorem *Sanguinis Transfusu* ulterius confirmat, *Motus* verò *Contrahitionis* dependet ab ipsis *Arteriarum Fibris* nervis. Descriptionem *Anatomicam Arteriarum* videbitis in WILLISII *Pharmacopœia Rationali* pag. 178. Considerat etiam quoad *Arteriarum Notum* PLEMPIUS in *Fundamentis Med.* pag. 130. & 171.

Non possunt autem *Venæ*:

1. Quia *Sanguis* non tanto impetu irruit.
2. Quia *Tunicæ* molles, & facili cedunt.
3. Quia movetur à *Vasis* minoribus ad majores.
4. Quia *Sanguis* non est adeo tenuis, subtilis, & æquus, ut in *Arteriis*.

Vena Cava tamen circa *Infertionem* suam prope *Cor* utplurimum etiam pulsare solet, observante hoc W. A. LÆO in *Epist. Læ.* idque ob *Fibras nervosas*, quas obtinet.

Motus hic, qui vocatur, ut dixi, *Pulsus*, imprimis consideratur à *Medico* cum in finem, ut cognoscatur, qualis sit *Sanguinis Fermentatio* in *Corde*? sicut fœtus exploratur *Uterus à Medico*; ut cognoscatur *Sanguinis* status ex turgescencia illa resiliens, & pro *Fermentationis* varietate ininde varians.

In hoc *Pulsu* tria sunt consideranda;

1. *Sanguis*, qui movetur.
2. *Efficiens*, quod movet: Et
3. *Infermentatio seu Causa*, per quos movetur.

Pro ratione horum trium emergunt *Simples* & *Generales Pulsuum Differentiæ*: Et quidem

1. Ratione *Motus*, seu *Sanguinis* motus, *Pulsus* est vel *Magnus*, vel *Parvus*: *Magnus*, quando *Arteria Sanguine* turgescente distenditur; *Parvus*, quando minus eadem distenditur. Ad hunc *Pulsum* refertur etiam *Pulsus et Vacuus*.

2. Ratione *Partis moventis*, *Pulsus* est vel *Robustus* vel *Debilis*: A corde enim vehementer se contrahente, & *Sanguinem* ita vibrante, *Pulsus* fit

Validus vel *Robustus*, si contrà; Et *Parvus*.

3. Ratione *ejusdem Infermentis*, nempe *Arteriarum*, *Pulsus* est vel *Mollis*, vel *Durus*: *Mollis* ab *Arteriarum cedentibus*, *Durus* ab *endemarida*, & tãtini quasi renitente.

4. Ratione *Temporis* inter *plures Pulsationes* observabilis, est *Pulsus Frequens*, & *Rarus*: *Frequens* est, quando *Sanguis* celeriter movetur, & ebullit in *Corda*, sive totum *Cor* distendit: *Rarus* est ab immutata *Sanguinis* fermentatione ac rarefactione.

5. Ratione *Temporis* inter *plures Pulsationes* observabilis, *Pulsus* est vel *Celer*, vel *Tardior*: *Celer* à fortiori irritacoe; irritacoe enim *Cor* cum impetu ac violentia evibet *Sanguinem*, unde subito ac celeriter irritatur *Arteriarum*: Contrà minus irritato. *Corde* etiam, minus irritatur *Arteriarum*, & sic fit *Pulsus Tardior*.

De his vid. præter MOEBIUM, SYLVIIUS *Differ. Med. 3. de Sanguificatione Et Sanguinis motu*, item in *Praxi lib. 1. cap. 26*. Non enim alius est, qui magis præcipue, sive accurate negotio hoc tractavit. Ad ea his simplicibus *Pulsuum Differentiis* omnes reliquas, quæcumque *Pulsuum Differentiæ* compoſitæ, æquales & inæquales, dependent, & facilius cognoscuntur.

Locus, ubi præstatum *Pulsuum Medicus*, est (1.) *Carpus Manus*, (2.) est *inertium* inter *Pellendo* & *Indicem* in parte molli, (3.) *super Tempora*, quando v. g. in *Pregnantibus* *Corpus* non debet *desinere*, (4.) *locus* circa *Talio Pedum*, *besides* *Manubrio*.

Uti idemque *Sanguis* est, qui per *Arterias* & *Venas* circulator, *Accidentibus* tantummodo habet quidam *Differentiis*. (1.) *Arterialis* *Sanguis* est *serenus* *Venoso*, propter *Urinam*, *Lympham*, & *inertibilem Transpirationem*, quæ serum *Sanguinis* *Arteriarum* immittunt. (2.) Ex uberiori sero, & propter spiritus copiosos, *Arterialis* *Sanguis* longè est tenuior, subtilior & calidior *Venoso* vero est crassior & torpidior. (3.) *Arteriosus* est rubicundior & fluidior, *Venosus* est obscurior & nigrior, cuius causa est in *Aere* inspirato, qui in *Pulmonibus* aeratus *Sanguis* *Arterialis* fluidior apparet *Venoso*: Conf. LOWERUS in *Medicis*, Syntex. *Willisiana* pag. 50. & *Tracl. de Corde* pag. 174.

Finis Circulationis, seu continuatæ *Sanguinis* per *Pulmones* & *Cor* *Motus*, est in *Sanguine* novo vitali vigore in *Pulmonibus* & *Corde* imprægnatur, qui ateri longè prope *Corpus* motu erit infusus. *Consistit* autem hic ipse novus vigor in renovata *Sanguinis* Fermentatione, indeque nova *Caloris* exaltatione, & *Spiritus* vitalium regeneratione.

Uti *Sanguis* est, ut fit materia, unde *arteriarum* & *angustar* *notum* *Corpus*. Sed cum *Sanguis* liquor sit in se innoxius, qui *locus* *Corpus* nostrum nutrire non possit, propter diversitatem partium nutriendarum, consensum suum unde Angli *Sætem* quendam *aliquantulum* *videtur* *est Nervis* *aliquantulum* pro nutriendis *Partibus* *Spermatidis* commentum suum, v. g. GLISSONIUS in *Anat. Hispani* cap. 47. CHARLETON in *Chym. Anim. Exerc. de Sangu. nro* & *facto nervorum* *medicis*, & ENTIUS in *Apologia* pro *Circulatione Sanguinis* contra *Paracelsum*; sed hæc Opinione retractatur & sufficienter rejecit BARTHOLINUS *Spiegel. 1. v. 3.* Item STENO de *Glandulis* *Oris* §. 32. nec non DEUSINGIUS in *Exerc. de Sanguinis nro*, & commentum *Sætem* nutrire per *nervos* *infusus*. BARBATUS verò pater *Sanguinem* etiam *Sætem* partes nutrire ait in *Differ. de Sanguinis Et ejus Sætem*; cui BILSIUS *Remem* suum subicit, quæque *Nervosa* partes nutrire vel *altem* ad nutriendum disponere statuit.

Ut, quod probabilis videtur, differamus, consideramus venit *Sanguinis* status, quem ex *Chylo* infuso continuè relatiur novum est; non autem *Chylum*, *Sanguis* in *Vena Axillari* sinistra permixtum, unico per *Cor* transit in *Sanguinem* abire, sed sensim sensimque, suprà obfusum fuit. Probabile ergò videtur, *Sanguinem* (dum consideratur pro *Massa* illa, quæ per *Arterias* & *Venas* circulator) ad omnes *Corporis* partes distribui, ut eas per *Spiritus* vitalem vitali in vigore conservet, simul tamen etiam eas nutriet & augeat, sed pro diversitate partium diversimode: partes nempe *Spermatidas* dictas *partes* *Chylo* nondum in *Sanguinem* transfusitas; *partes* verò *Sanguineas* perfectas partes *Sanguineas*; cui Senecutus adscriptum videbitis BARTHOLINUM *Cent. 2. Epist. 65*. item *Cent. 3. Epist. 38*, SCHNEIDERUM de *Canceris* lib. 2. pag. 15. item lib. 3. p. 95. & BOYLEUM *Differ. de nro*

de *afu Lallus*. Quod spectat etiam *Gelation Serii lallus*, de qua **BARTHOLINUS** *Cent. 2. Epist. 33. Item B.A.R.B. A.T.U.S. de sanguine & sp. sere*. Facit etiam hoc coagulatio Serii à Spiritu Nitri in crassamentum quasi caseosum, quod nihil aliud, quam Chylus, sub Serii tegmine occultatus, tam pro nutrimento partium Nervarum & his cognatarum, quam pro aliis usibus per omniuniversum Corpus distribuitur. Imò quicquid contra Sanguinis asperitatem pro Succo Nervi benignitate in puncto nutritionis Angli tantopere urget, quamdiu levis materia potestiva huiusmodi subsistat, optimè Chyli, Sanguinis modum assimilati, disturno tamen cum eodem Circulo certo modo alterato, applicari potest. Quo ipsi non parum illustrat Experimentum, quo Anierum probe laginatum Sanguinem, ubi refrixerit, albidum Lactis superstante cooperiri constat; focus ac in idem non exceptus laginatus fieri observatur. *VID. BORRICHII Mercur. Aegy. & Sapient. pag. 262.*

Rationes, quæ hoc Nutrimentum duplex perferre videntur, præter Experimentum, quod Chyli in Sero copiosam præsentiam lausant, & supra allegata fuerunt, sunt.

I. Statum esse Sententia ex omnibus: Quibus existimus, ita etiam nutrimentum & augmen. Jam vero partes nutrimenti & augmendæ sunt duplices: Spermaticæ, & Sanguinæ; illæ ex rorido, Albumini Oream simili, Liquore in Ovo uterino immediatè generatur, quibus cœa flammibus postmodum per sanguinis adhesionem sanguinea Parenchymata agglutinantur: *VID. HARVEIUS de Generatione Animalium, item CLAUDIUS de la COUVÉE Traité de Nutritione Fetus in Utero Part. 2. cap. 6. & 8.* Duplex ergo Alimentum requiritur illi assimilandum, Chylosum nempe, pro Spermaticis seu Nervis; sanguis vero pro sanguineis.

II. Quod crassioribus sunt Homines & pinguioribus, item quod magis nutriuntur & saguentur, eo videtur Sanguinis quantitatis debitor, eoque Chyli in sanguinem transmutatio tardior, indeque Alimenti Chylosi major abundantia. Hinc Plegmatici, h. e. quorum sanguis chylosior existit, & sanguinei, h. e. quorum sanguis magis temperatus & dulcis est, uti utriusque sunt proceri, ita etiam crassius illi tamen magis, quam hi. Cholericus vero, h. e. quorum sanguis acrior & salior existit, Metabolici item, h. e. quorum sanguis macrior, & respectu acidior est, sunt macri & iscerum parvi: in illis enim levis & blanda est sanguinis Fermentatio in his vero eadem est citata. Unde ibi uberior Chyli abundantia propter tardam assimilationem; hic vero Nutrimenti Chylosi paucitas, eo citam esse in sanguinem conversionem. Ea eodem etiam fundamento totantes & juniores citius augentur, quam seniores; in recens natis pluribus locis Lacteus liquor reperiri solet.

III. In Pulveribus partium Nervarum debilis Aqua quædam limpida, sicciora dila, post caputimum illorum earefecit Membra; illa ergo Aqua videtur esse Nutrimentum proximum illarum partium, licet eo alterationem in Vulnere corruptum. Sic ita Offium Fradurum aduicatur Callus, similis Offium substantia, qui oritur ex Nutrimento Offis, in motu suo impedito, huc coæservato & coagulato; qui Callus tamen nullo modo sanguinis, aut partibus sanguineis similis existere solet.

IV. Impossibile est explicare, quomodo sanguis isto subducendus, ex Chylo candido generetur, possit deus in liquorem Lactisule huius albastrum pro nutriendis partibus spermaticis converti.

V. Per Diuretica, hinc per sudorifica, non secus ac per Exercitia crassi valde emaciatur. De Diureticis vid. **HELMONTIUS** *Traité de l'usage Humain* *lib. 4. & Tr. de diureticis*, §. 39. Item **SCHENKIIUS** *l. 1. Observ. de Diabete* p. 436. Item manifestatione humorum Tabaci per copiosam salivationem ingens Corporis crassities curata refertur à **BORELLO** *Cent. 2. Obs. 11.*, quod via alia ratione, quam per crebriorem Pysialium contingisse videtur; quo & **BORELLUS** *l. 2. a. inquit*, cum solis Laori, quod multas Aquas educat: Tartari ulus crebrior Corpora emaciat, eam Ulinam provocat: Ratio huius effectus alia dari nequit, quam quod separatum serum per Urinam, & cum eo pari Nutrimento Chylosi liquetida & resoluta evacuetur.

Vitatur Cordis Motus seu Pulsus, & hinc consequenter sanguinis Distributio, variis modis:

1. Quando eadem augetur, simulque depravatur in Palpitatione & Tremore Cordis.
2. Quando eadem plus minus immutatur aut deficit, sive in syncope, & in Urina proflusione, inquit *Tem. II.*

hos Pulsus aut est molles vel tardus, debilis & parvus.

3. Quando eadem est nimis frequens & celer, nempe in Febribus.

C A P U T I.

De Cordis Palpitatione, & huius cognato tremore.

Palpitatione Cordis est, quando Cor impetu admodum & vehementer substat & pulsat. Est enim revera Cordis Palpitatio Motus eisdem nimis inordinatus & convulsivus, cunctis de vrbeneas, quo foris Syssole se contrahit, utus nunc vehementior, nunc minor, nunc major, nunc minor, nunc vero medicis. Palpitatio hinc cordis seu Motus nimis in sufficiens iter Arteriarum pulsu cognoscitur potest: scilicet enim necesse est, regionis Sereæ circa latus sinistram, ubi cordis Pulsus optimus, admoveat Manum pro rite percipienda cordis Palpitatione, Pulsu ipso in Arteris subinde via aut leviter mutata, uti leviori in malo celerior aut frequentior solet observari. Non vero opus est semper, cum interdum fit adeo vrbeneas, ut solo auditu possit percipi, vel vili cognosci, adeo et proflente Exempla cordis Palpitationum, in quibus sonitus ad diffultam percipi poterit: qualia videbitis Exempla in **TULPIO**, qui convulsivum cordis Palpitationem in plura diffusa auditur; & **BARTHOLINO** *Hist. Anatom. 18. Cent. 2. 1.* sicut **EPIPHANIUS** *HERIAN. ANTON. 184. 79.* Culeitras superfluitas amovisse observavit: vel etiam Colæ distradit, & serè distradit fuerat: *VID. SCHENKIIUS* *lib. 2. Observ. HORSTIUS* *lib. 3. Obs. 17.* **HOECHSTEDTUS** *De Cordis Decid. 9. pag. 361.* **MAYOW** *de Motu Muscularum* *pag. 96.* Et **PISO** *de Caloris* *lib. 1. pag. 166.* notat Palpitationem cordis, in qua indumenta quasi flabellum mox inaequalem cordis Motum remolabatur, & Thorax & Sternum ab illo motu à se de naturali deiectione modiciter extuberant. Quo affertur patet, esse Convulsivum Musculi Cordis, lo tali Palpitatione.

Contrarium quodammodo Cordis Palpitationi est vitium, Tremor Cordis, Motus scilicet, cuius quodammodo deficient, vibrans & tremulus, ammittitur ac violenter cunctis coactionem iniquis, in qua Fib. & Muscularum cordis celeritè & quasi semicontracti Syssoles & Diastoles vices obduunt. Confunduntur communiter hic cordis Tremor & Palpitatio, & via reperitur quædam Prædicum, qui hæc non committit, cum tamen toto celo differant: Palpitatio enim est immoderata & vrbeneas cordis concussio, impetuosiissima Syssole ac Diastole molesta, in qua Cor violenter contrahitur & quatitur, & dicitur hic Motus rectè à **HIPPOCRATE**, a quo iam suo tempore cor habitum fuit pro Musculo, *Cordis Convulsio*: id quod uberius confirmat **LOWERUS** *Traité de Cordis* *pag. 132.* sicut modum, quo fit cordis Palpitatio, optime describit **MAYOW** *de Motu Muscularum* *pag. 95.* Tremor Cordis vero dicitur, cum minores sunt Pulsus & crebrior, & quasi tremuli, Pulsus longius & crebro similes. Oritur equidem a Musculi cordis irritatione. Verum in hoc est differentia, quod cor agitur palpitet, quando Vires adhuc sunt robustæ & coactiles; dum vero iam imbecilles ac proflatae, cor irritatum tremulo modo vibratur, adeo et Tremor Cordis pertinet suo modo ad Symptomata Virium imbecillium, & etiam quodammodo ad Lymphomas. In Palpitatione cordis Filtratum vehementia; in Tremore vero crebrites earum imprimis observantur, et rectissime hæc distinguit **WILLISIUS** *Medic. Nat. 2. 1. pag. 160.*

Illustrari potest per Experimentum Anatomicum, si nempe ex Canis viro cor extrahatur, quod aculea pusillum convellatur aliquoties; si vero ejus Pulsus penitus laqueetur, tunc, si demum attingatur, Tremorem exhibebit, & motum vibratorium. Quodsi ergo Palpitatio & Tremor similis lo Corpore vegeto adhuc excitari poterit?

P A R S A F F E C T A.

Pars Affecta in Palpitatione & Tremore primò est Cor, quippe cuius substantia muscularia perternaturali motu in Convulsionibus & Morbis convulsivis movetur.

Cor enim esse Musculum, & ex Musculis compositum, videtur in LOWERO l. c. & STENONE de Glandulis & Musc. item in *Thesaurum Muscularum Geometria*. Jam vero, cum omnis Motus convulsus in machina corporis nostri præsumptum sensationem nimiam, cuius occasione sequatur spirituum influentium impetus; proinde facile

putet, proximam *Causam Palpitationis* consistere in tali sensatione molesta aucta; uno nomine, in *irritatione*. Sicut vero sensationem nimiam limitat via cordis motus in spiritibus consistit: ita si cordis vis motiva sit nimis valida, oritur ex Palpitatione; si debilis, fit Tremor, aut cordis Motus vibratorius, inaequalis & varius. (A)

CAU-

(A) Cordis Palpitationem raro quidem mechanismo exponere solent; est Dominus Ruellius *Palentia* ad Rhodanum Medicus, cuius primam ideam à Dom. Chirac. se suscepisse fatetur. Primum & ratione & experientia mirum falsum esse putat receptissimam Medicorum hypotesin, Cor nempe, non sicut ex reliqui Corporis Musculis, ab influxu Spirituum animalium moveri. Quoties enim observatum, in Convulsionibus utriusque vel morbis omnibus convulsivis, nec esse exceptam Epilepsiam, quomodo Spiritus animales sint in sanis eaque perturbata agitantur, Cor tamen à repletionis, atque aequali suo motu non aberrare: quod quidem non accidit, si Cordis motus à Spirituum tunc temporis summi agitantur non pendere putet. Et contra in vehementibus Febribus, Cor citatissime movetur; hinc autem motum à Spiritibus summi agitari non pendere poterit ex eo, quia nullam Corporis partem simili ratione agitant observamus. Experientia item constat, quod si in Acute Nervi omnes, ad Cor pertingentes, sectione sub claviculari facta, animal huiusmodi moritur, sed perseverante Cordis motu (coloris tamen ob Febrem supereminens) ad diem & noctem vivere pergit.

Motum igitur naturalem Cordis laud Spirituum animalium influxui tribuit Dom. Ruellius, sed materia Nitro aeris cum Sanguinis massa commista, quae separata in exiguis Cordis glandulis, atque in ejus Fibris delata, commingitur cum pauca Sanguinis portione, ab Arteria Coronaria ibi effusa, atque epe fermentationis excitata communicat vim seile dilatandi, sui motum explosivum. Putat autem in statu naturali Cordis ipsam fieri, accedente epice ad basin, adeoque Cordis mole retundendi facta, & utriusque angustioribus redditus, Sanguinem propelli à dextro in Arteriam pulmonalem, & sinistre in Aortam.

Illi jussu advertit, Cordis Palpitationem non esse motum ejusdem Cordis tantum præter naturam adaugmentum; nam id in Praenotum est, in Palpitatione Cor ita sua mole elevatur, & antrosum versus Costas veluti salu propelli: ut & illius epinis sine exauditi, & Costae quoadque furcata congesta. Advertit alterius, Palpitationem non fieri, ut credimus est, in distensa Cordis, sed potius in systole: quod ex eo evidenter patet, quia Cordis Palpitatione effectus illius, & Arteriarum pulsus eodem tempore percipiuntur: unde siquis autem percipiam est, Arterias tunc pulsare cum dilatatur à Sanguine propulso, Sanguinem autem motum à Cordis se in systole coarctante propelli in Arterias.

Hinc inferi laudat Aulher, quod si Sanguis à Cordis propellitur, quatenus ex causa, cum impetu versus Cordis Ventriculos quæ collingentes resistit, hac resistenteria faciet, ut Cor vehementer versus Costas elevari, & in Palpitationem incidat: forte evenit id, quod effere aptum erit, si Sanguis versus Cor cum impetu resistit, causa erit illius Palpitationis. Præcipua autem & maxime familiaris huius Morbi causa erit Sanguis glutinosus & lentus: verum lentus & glutinosus Sanguinis visum huiusmodi hinc venit hic, qui sive & rariore portione abundat; sed potius cujus principia artius sibi invicem adherent illius impetu remittit ad fermentationem vel ex levi occasione concipiendam. Huiusmodi igitur Sanguis (qui solutus fore & formidius substantia dici poterit) à Cordis propellitur, quam non facile Pulmones solvere possit, nisi tu dilatatus Arterias; necessarii ex hac veluti contentione, magnam concepit efferectionem, atque adeo dilatatus in extremitatibus præsertim valorem, quam tenuiter, sibi ipsi viam præstat: quapropter Sanguinis columna quæ Arteriam pulmonalem occupat, resistit versus Cordis parietes, tunc sunt majores vehementia, quomodo major est Arteria unicarum vii elasticæ. Negotium autem hac ratione accidit evincitque situm Experimentum: si Canis Arteria pulmonalis vinculo obligetur, Palpitatione extempore fit: resistente nempe ob vinculum Sanguine versus Cor. Quod facit hic Arteria pulmonalis injunctum vinculum, facere apud potest Tuberculum, aut Scirrbus vel in eadem Arteria, vel in Aorta Johanne.

Expendit postmodum obiter aliorum sententias, ac mutat I. Excedentem Pericardii Aquam, quæm Lovet, atque Palpitationis causam esse crediderunt, potius aptam esse ad Pulsus debiliorem & mentem retardandam, præpedit tamen ad Pericardii hydropem liberam Cordis dilatationem. Imo tantum obest ut Aqua ille posse Cor ad saltu excitare, quin potius ad ejusdem impetum referendam aptior esse poterit. Potius ergo ex Cordis in Palpitatione violenta contrahione aqua parietale à Sanguine expressa, in Pericardii capsula retinetur, & Aqua copiam adaugment: itam Pericardii hydropem non tam si causa Palpitationis Cordis, quàm Morbi huius effluvi. II. A veritate aberrare & sui putat, qui ejusdem Cordis Palpitationem esse motum convulsivum causam ab irritatione, quam parere possit Aorta Tuberculum, Ulcera, Vermes Pericardii & similia. Nam si hoc verum esset, in Cordis Palpitatione Arteriarum Pulsus pro vehementia motu Cordis vehementius quaque esse deberent, si nullam esse impedimentum Sanguinis à Cordis in Arterias propulsioni: constat autem Pulsus in hiis, qui hoc Morbo affecti sunt fieri exigui esse & obsecro, III. Insuperabilem putat Polyposum in Cordis Ventrículo concretum, quomodo nullam Palpitationis Cordis causam esse crediderunt: siquidem ceter Sanguinis pro Ventrículo motu, Polyposus concretus hanc finit, constricterent quomodo facilius in Venis, in quibus Sanguinis motus satis tardus est. Credit ergo Polyposus in cadaveribus reportari, vel in mortis inflanti, vel etiam post, in Cordis Ventrículo concretus.

Denique propositam hypotesin confirmare conatur Ruellius argumentis à Symptomatum huius Morbi explanatione ductis. Pulsus 1. est debilis: nam quomodo exigua Sanguinis portio transiret à dextro Cordis Ventrículo in sinistram, nonnulli exiguam quæ hoc propellere poterit in Arterias, adeoque hac sequente minime turbulenter, minus elevabatur, & Pulsus adeo satis debilis: hinc facilius Corpus, ad Synopem maxime pressum reditur. 2. Respiratio difficilis traditur ex eo, quia Sanguinis minus promptus per Pulmones transiret, illorum vasa à tardioribus ad rationem Arteriarum comprimeretur. 3. Quomodo pauca Sanguinis quantitas ad Cerebrum feratur, pauca ex eo Spirituum portio secretur; hinc universi Corporis languor. 4. Corporis ejusdem lassitudo & anxietas oritur ex eo, quod Sanguis crassus fermentationem subire immixtus rariis, unde partium omnium per quas transit assuetio, & molesta atque ingratia sensatio. 5. Exponit denique A. quomodo Animi pathemata juxta possum hypotesin possint Cordis Palpitationem inducere: Sanguis enim vel ab impetu Spirituum vehementerem fermentationem subiret (si in Ira, Amore, & Lætitia) facile resistit à Pulmonibus versus Cor, vel à tardis Spirituum influxu trahitur reditur: (si in Melancholia & Timore) quam nequa facile per Pulmones transiret versus Cor; verum resistitur, & Palpitationem parit.

Hæc est Ruellii de Palpitatione Cordis hypotesis: si tamen minime displicent Dominus Gouinui Montis Limerii Medicus, aliam, quam hæc verosimiliorem existimas, in medium producat. Hæc Morbi causam quærit hic A. in ipsa Cordis penetrabili: air enim quod si Sanguis, qui singulis Cordis constitutibus debet ex ejus ventriculis extrahi, non totus, præsertim à dextro ventriculo, in Arteriam pulmonalem extrahatur, tunc ejus portio in dextro ventriculo remanens, quam impetum suscepit ut egredere, egressi autem non possit, vim suam in Cor ipsum, à quo acciperas, raret, atque adeo in Palpitationem motum illud adigit. Causam autem Cor Sanguis non totus à dextro Cordis ventriculo in Arteriam pulmonalem infusus, nam esse potius laetitia A., quod si fibrae Arteriae vel Venæ capillares, Pulmonum obstruata sint, ne insuperabilem resistenciam faciant crassiori saltem portioni Sanguinis, qui versus Pulmones à Cordis se contrahente impellitur. Oportet igitur, ut, quomodo vix minima Sanguinis quantitas per hac via obstruata transire possit, quæ remanet in eorumque vasorum latera vim faciens, illa ad se

CAUSÆ.

Causa convulsiva cordis in eius palpitatione, & Motu ejus convulsivè tremuli in ejus tremore, est omne id, quod quocunque ratione aut musculis Cordis, aut nervis ad eum derivatis, irritare & vellicare, adeoque ex impetu spirituum ad convulsionem stimulare potest.

Causæ tales irritantes investigandæ sunt vel in ipso Organo moto, nempe in Corde ipso, vel in Medis, i. e. in Nervis Cordis motui intercurrentibus. Ratione Cordis Causa irritans est respectu ejus Parenchymatis vel extra Cor in ejus ambitu, atque frequentior, vel intra Cor & Ventrículos ejus.

Inter causas extra Cor subinde observata fuit *Aqua Pericardii nimis abundans*, quæ Aqua nil aliud est, quàm Lympha eo per certa Vasa Lymphatica derivata, ex Glandulis Thoracis se eo effundens; scit enim MARCETTE observasse, Ductum se inferiore corpore ad Pericardium Lympham deducere: quæ Lympha abundans fit Hydrops Pericardii, cujus occasione pericardium dilatat, Cor irritatur, & Palpitatio molesta et duriterna Cordis oritur: Vid. AMATUS LUSITANUS *Centur. 3. Curat. 43.* item PISO *Tract. de rebus pag. 186.* qui etiam refert, quod in iis, quæ Palpitatione cordis laborant, post mortem inventum fuit Pericardium copioso Sero distentum quod GALENUS jam observavit *lib. 3. de Lasis affectis*, ubi dicit quod Aqua abundans in Involuculo Cordis fit causa palpitacionis Cordis, quæ fit aut ex gravissimis, consumas, & raro ferè curabilis, propterea, quod neque dissolvi neque diffusi possit. Quod enim attinet RIOLANI com-

Tom. II.

silium in *Anat. sua lib. 3. cap. 4.* ubi fuisse: tall in casu esse perforandum Æternum eo loco, ubi Capsula Pericardii ei adnascitur, & sic Aquam contineam extrahendam & magis Theoreticum, quàm Prædicum est. Sed dubium videtur quoad hanc Causam, annos accior Lympha postea impedit motum Cordis? imo Lympha hujus copia non tam causa, quam effectus palpitacionem Cordis iniquetur, fere Productionem morbosum sit? Vid. LOWE R. U. S. *Tract. de Cordis pag. 204.* ubi à Glandulis bafi Cordis adnatis tam derivat: quidem in Homine vivente paucior, quàm in mortuo, hujus reperitur quantitas, de quo vid. SCHNEIDERUS *lib. 2. de Casaribus pag. 93.* fuit in iis, qui Morte violenta, & impetis cum sanguinis profusione perierunt, viz guttula ejus. Econtrà in Medicis & Phthisicis, necnon suffocatis, major ejus quantitas reperitur.

Tubercula itidem & Excrecentia verrucosæ, Cordi vel Pericardio adnate, etiam in causa palpitacionis Cordis admodum vehementis. Exempla horum post mortem in difficultis repetuntur, videbitis in SCHENCKIO *lib. 2. observat.* de Sacerdote, circa cuius Cordis basin Excrecentia carnea reperta fuit; item in alio, de quo vid. BONETUS *Synops. chrestæ pag. 631.* nec non ZACUTUS LUSITANUS *lib. 3. Medic. Princip. Hist. cap. 8. Obs. 3.* ubi et Excrecentia carnea inter Arteriam Magnam palpitacionis Cordis insignis orta fuit. Sic ex *truncus Arteria magna prope Cor ejus palpitacionem cordis venæ observavit WILLISIUS in Pharm. Rat. pag. 184.* Ob Venæ Pulmonalis Cartilagineam adnatis & fere obstruam, palpitacionem Cordis vocat MAYOW. de Muscularum Motu pag. 97.

Aaa 2

Præ-

sepe dilatandum cogat, pro ratione quantitatis Sanguinis, quem Cor contrahit impellere pergit. Sed quoniam Arteria pulmonalis, oblique disposita, non potest recteque dilatari, ut quoties totum Sanguinem dextræ Cordis ventriculi exierit: nec Sanguis ob easdem obstruccionem in sua massa progressu pervenire aptus esset, pro mensura velocitatis, qua officio impelleret à Corde se contrahente, hinc necessariè sequitur in singulis Cordis contrahitionibus, non totum Sanguinem ad eam ventriculi contentum in Arteriam pulmonalem semper infunditur, propellitur: quare restat Sanguinis quantitas omnem impulsionem à contrahente Cordis impellens, hinc Cor iterum impellit, illudque versus Cœcæ subsistere facit. Quod de Arteria pulmonali dictum est, vicium quoque vult de Arteria dextra, si ob eam qualescunque vitium, impedimentum fiat magna evacuationis Ventriculi Cordis finituri.

Hinc ait Dominus Gounius facile capitari, quomodo Polypus, Abcessus, Tubercula, Vermes, Hydrops Pericardii, & similia circa Cordis orificia & vasa, atque circa Pulmones vicia organica, quibus impedimentum fieri putatur libere Sanguinis per Pulmones trajectioni, adeoque exatit ventriculorum Cordis evacuationi, Cordis Palpitationem sequenter inducitur. Sic quomodo Polypus alterutrum Cordis ventriculorum occupat, liberam Sanguinis exitum impedit, qui peracta contrahitione remanet, Palpitationem indicat. Sic Vermes subfusi Cordis nervos læsiones Spiritus animæ determinat, ut cum impetu in Cor ipsum & Pulmones influant, convulsivum in his contrahitionem pariant, adeoque impedimentum faciat Sanguini per eos trajectioni: quod, ut dictum, sufficit ad Palpitationem Cordis excitandam. Item dictum de ea videretur pneumoniam, & præsertim trunci Arteriae pulmonalis compressione, qua fieri potest ab Abcessu, vel Hydropse Pericardii: cum quomodo viciis succi præter naturam vel in Ventriculo vel in Involuculo collecti, fermentationem & variegationem concipiunt, postea Diaphragma, ipsique Pulmones comprimere & curvare, hinc valde rationem poterimus, cor quomodo veluti flammula & extemperantia in Hypochondriacis existunt, ob videretur infernorum casusum, Cordis Palpitationem.

Quomodo autem Gounius cum Ruellio censuit, à crasso Sanguine sepe rarefactione dilatari plus quam per est Arteriam pulmonalem, quæ adeo contrahit ostia ramorum capillarum, vel contrahit reliqua Pulmonum vasa, ut impedimentum fiat facili Sanguinis trajectioni, & occasio superadditur palpitacioni Cordis; Nihilominus haud facile credit, ex hac sola causa Morbum hunc, maxime si longo tempore perseveret, fieri posse, nisi simul concurrat Vaporem exilium Pulmonum obstruere, de quo prius dictum. Item horum Vaporum obstruere, longiorum Sanguinis in Pulmonibus moram necessariè parient, adeoque allicere Nitri aerei densius itum exponere, in causa est ut Sanguis fortius rarefasc. Verum cum est quod cum Sanguis secundum Naturam leges facili per Pulmones trajicitur, tunc minùs effervescit; contrà verò, si remoratur patitur, illico in majorem fermentationem abit.

Nec illud alterius Ruellio concedendum putat, quod Sanguis ob contrahitionem Arteriae pulmonalis resistit, versus dextram Cordis ventriculorum, Palpitationem excitet: Nam contrahitio Arteriae pulmonalis, non minùs quàm seminum Corporis Arteriarum, quomodo alternat fit cum Cordis contrahitione, hinc sequetur Cordis Palpitationem inuenta illius hypotesin fieri in Cordis distole se dilatante: quod est contra experientiam, atque ipsum Ruellii opinionem. Quod si contra vult verum afferre velis Ruellius, contrahitionem Arteriae pulmonalis, Sanguinem versus Cor repellentem, fieri eodem tempore, quo contrahitio Cordis completur; quæ spei esse poterit, ut vii Arteriae Sanguinem repellentis, superare possit vim Cordis, quod ei communicat determinationem motui oppositam, quomodo sciamus unum Cor vii Sanguinem repellentem omnium Vaporem corporis?

Sed interius laudem Gounius provocat ad Experimenta. Calaverum distillatione innotuit, Arteriam pulmonalem Anesthetizari facili per Palpitationem Cordis. Quomodo ergo Arteria hæc p. n. dilatata, nec ut clastica gaudet, nec contrahitionis capax, patitur usque Sanguinem versus Cor repellentem, irritat & resistit vehementiori fusi Cordis vi? Præsertim si vultis deponere Arteriam pulmonalem in ipso e Cordis exorta, vehementissima Cordis Palpitacione supervenire: quævis ergo à Ruellio Gounius, quæ ratione hæc Palpitacio oriri poterit in Sanguine resistente ex Arteria in Cor, si Arteria quomodo libera ob videretur non fit, minime poterit Sanguinem excipere, quem repellat? Potius igitur palpitabit Cor à Sanguine remanente in ejus ventriculo dextro, atque repercutiens saltu, illius parietes cum impetu feriente.

Denique Dominus Gounius, haud excludenda vult à censu Causarum occasionalium Palpitacionis Cordis, Hydropem Pericardii, Vermes, & Polypus, ut facit Ruellius. Et enim in Casaveribus vult deprehenditur, & quæmadmodum juxta Gounius hypotesin illarum reddi faciem potest ratio, quàm juxta hypotesin Ruellii; ita illius sententia magis favore videtur, quam hujus.

Ingenio sentis fons, quæ de Cordis palpitacione citati Auctores exaggravare: sed si quod sentio fieri fas est, regium hoc adhibe in ætrem latere vult videretur.

Præter Tubercula Vermis etiam, & quidem in specie di-
 versis Vermis Cordis, *de Drusianis* tam in Pericardio ipso,
 quam in Pericardio contenti, aut eidem adherentes, inter
 alia Symptomata periculosa habundat Palpitationes.
 Affectus raris habent Vermis Pericardii, & pauci, &
 ferè nulli, cogniti. Ego tamen puto, quod non sit carus
 talis Vermis, sed admodum frequens. Symptomata valiter,
 & ægotantibus, & Medicamenta contra eum videbitis in
 GABELCHOVERO *conr. 3. Corne. 1. Præ cæteris* Agri
 palpitatur palpitationem cordis subinde recurrentem sine
 manifesta causa, insignis rofones & vellicationes, pupu-
 las & dolores, præteritis rofones & vellicationes in inte-
 riore Pectoris loco, ubi frum est cor, ex improvise inter-
 dum lipothymia imminet, interdum etiam epileptice
 convulsiones supervenire observantur, Facies pallens, Agri
 inquieti sunt, Pulsum intermittens & inæquum est, &
 similia adiut Symptomata: Vid. FORESTUS *lib. 21. Obs.*
26. in Schol. PARÆUS lib. 1. Conr. 3. SCHENCKIUS lib.
2. Observ. 194. Medicamenta, quibus hoc Vermis Intermit-
 tens, sunt imprimis Mercurialis, & hinc succus Allii, Ra-
 phani rusticani, & Nallurti, aut quoque eorum Infusa:
 de quibus vid. *Praxis Chymica*. HARTMANNI, qui eam
 curat per sal Dulcissimum & Tanacetii; item per Mercurium
 vivum, hujus Infusum: necnon GABELCHOVERUS *l. 1.*
c. 1. ubi habet Exempla Vermis Pericardii per hæc Medica-
 menta curati. Curiosa est Historia, quam habet PETRUS
 à CASTRO, Medicus Veronensis, in suis *Manuscriptis*
Præfcriptis. Alibi, inquit, *emigrit, diuina merigritus in Can-*
salvia observata, sub epidemica confusione, in qua post
ingentem ægritudinem fragor, qui omnes convulsi cum frequen-
tissima & ferè continua cordis palpitatio moriebantur, dissolvi
quidam cadaveribus invenimus in singulis Vermem, magni-
tudine ferè minimam digitum æquantem, capsula cordis af-
fixum. Non valuerant, inquit, præstantissimum Alexipharmacum
Vermem occidere, nec Baccar Orientalis, nec Theriacum, nec
confusio Alchermis, nec Stomachica nec alia, denique nec Ali-
um, à quo tamen magis, quàm ab aliis causisangebatur, &
ex tali videbatur. Solus succus Scabiola mox Vermem occidit;
unde hæc experientia observata, Scabiola impingitur uti vulgus
lauguntur, tam in Infusis excoctis, quàm in Decoctis & Symp-
licis & ex ea fabricatis. Tandem nulla auxilio ægritudinis ap-
prehentur alique hoc specifico alexipharmacum, & cordis mirum
fuit, ab eo tempore nec ulum ægritudinem perisse. Itaque nec
cardiacis hæc afflicti curari potuit, sed succo Allii, Scabiola,
& eque Scabiola, in quo agitatur suis per aliquos horas Mer-
curius crassus: item Mercurius dulcis ad gr. ii. exhibitis cum
Bile ex Conferva Florum Scabiola magnopere profuit. Hæc
 CASTRO propria Experientia nobis reliquit. Vid.
 etiam hujus PETRI à CASTRO *Tract. de Vaso Neph-*
rit. Rom. pag. 137. & 138. ubi etiam Vermis ejusdem
 morboem facit.

Cataplasma externum contra Vermem Pericardii ex-
 periturum vid. LOWERO *Tract. de Cordis pag. 107. ex Folio Ci-*
neari, Tanacetii, & Alfini vulgaris. Aute Plai interitis, &
cum pauco Michridato mixto, regioni Cordis adhibetur.

Causa interna respectu Cordis palpitationem inferentis
 sunt variae. Rariores sunt ipsi Affectus cordis, ut *abscessus*
in corde, aut simile quid; sed potius omnia ea, quæ san-
guinis localem motum quacunque ratione per Cor impe-
dire valent, unde circa radices Valorum & cordis balin
adagellus, ad crebriores & validiores contractiones, adeo-
que palpitationem coactat, interne causæ rationem ob-
que: Cujus sanguinis in aëre suo ipsi minus indolenti
tinent: Cujus sanguinis in aëre suo ipsi minus indolenti
concor leve argumentum est, quod pulsus in carpo minus con-
cordis motui respondet, sed languida & diminuta subinde
percipiatur, quæ sanguine non sufficiente discendunt
Arterias. Hæc Inter Causas sunt tam ipsæ sanguis non ri-
et se habent, quàm etiam alia sanguinis ritè constituti mu-
tatione impedimento.

Sanguinem quod æstinet; ipse viscosus minus targebibi-
 lis & fermentescibilis, indeque ad signatissimum prout,
 ad palpitationem disponit. Ut enim à sanguine rare-
 facte naturaliter expulsum cor irritatur ad sui con-
 strictionem; ita ob præternaturali est fermentatio, etiam
 per consequens præternaturalis irritatio, ubi etiam præ-
 ternaturalis & violenta erit Contractio. Hinc in iis,
 qui sanguinis Menstrui potantur suppressionem, frequentes
 sunt palpitationes cordis, quæ ex levi motu tunc contra-
 hentur; non focus ac Cachectici confirmatis. Idem
 Spleneticis confirmatis, aliisque affectibus Chronicis non
 raro sunt; quod ex GLISSONIO *Tractata de cordis Pal-*
pitatione, & FORESTO lib. 17. Observ. 1. est notum.
 Præ cæteris tamen, Hypochondriaci, Hysterici, & Scor-

butici familiari est malum hoc, ita ut in palpitatione cor-
 dis semper suspicio fit de Affectu scorbutico: idque duplici
 modo; vel ob sanguinis intrinsecum configurationem; vel præ-
 per Nervos Cor moveores convulsus.

Rariores Sanguinis frequens est palpitatio cordis, *repleti*
ex causa: vel ob anormalem sanguinis in pectoris Tur-
gescensiam; vel ob acidum vitium tunc in sanguine per-
actis & cor vellicans, vel ob Grumulos sanguinis ac acido
condensatos in corde pellicis, qui inter cordis valvulas ha-
erentes illie denique impulsi palpitationem inferunt non ra-
ro. Dico tamen Grumulos: q. enim majores grumi, & po-
lyposæ concrecentiæ adflect, fynopes ac suffocationes
metas inflerat, cujus rei examens observatum est in M. A.
N. G. Ann. 2. Observ. 197. pag. 291. Nec mirum est, quod
 tales grumuli in Hypochondriaci palpitationem cordis in-
 ferant, cum & calculosæ concrectiones in corde existentes,
 item polypi cordis, idem subinde inferant malum: de quibus
 vid. HORSTIUS in *Obs. & HOEFERUS in Hist. Med.*
pag. 19. GREMBIS Arter. 1. c. 2. p. 81. Quo etiam Bile
 illa rectoria in Tophi nigri speciem redacta fuit, cujus
 FERNELIUS *5. Pathol. 1. 5. Observ. 19.* meminit. In
 scorbuticis autem communiter gravissima cordis palpitatio-
 ne afflicti hoc mirabile, quod ipsi quæti in lecto jacent,
 nihil mali sentiant; contra verò ex levissimo motu gravissi-
 mam incurunt palpitationes cordis. Lipothymia læpe su-
 pervenientibus, Imò, quando Hypochondriaci & Scorbutici
 obnoxii sunt Impulsu Nervorum, imprimis rami Inter-
 costalis & paris Vagi, fit exinde, ut in talibus confirma-
 tis, quando v. g. Ligni incumbunt, subinde contingat cor-
 dis palpitatio, propter tamen plenitum nervum latis lo-
 quimur tunc ipsi in corpore, qui ipsius Pleuræ Meleo-
 tico Nervorum communicatur, Nervum paræ Vagi affli-
 cit; quod uti ad quicquid Viscera interna, ita & copio-
 se ad plenem derivatur, à coris laetius movetur cor, &
 ita affectu hoc Nervo Cor palpitat. Patet hoc ferè ex eo,
 quod in talibus Hypochondriaci & Spleneticis ingruente cor-
 dis palpitatio percipiunt Murmora & Rugitus in Abdo-
 mine, ex spasio Mesenterii, & Intestinorum inordinata
 contractione & agitatione.

Quid de Flatibus? Communiter quidem putant: Flatus
 aut exhalationes ex Liene ad cor accedentes, ut Meta-
 stasin materiam in tali casu sobelle, à quibus Cordis pal-
 pitatio excitetur; quod tamen minus verisimile, aut rarissi-
 mum videtur: & potius, quod fuit, ut eam tamen continum
 cordis palpitationem inferre possent. Dubitat equidem
 nonnulli: *An dantur Flatibus in Vaso majusculis sanguinis, &*
per consequens Arterias? Verum ipsi possunt negari in Vaso
Flatus sub certis casibus, proinde namque Exemplum ho-
rum: sic SYLVIIUS in Belgio in quodam Cadavere in
Noiscomio reperit Flatus, vir diviti summa Abdominis
Cusp erumpentes: quin & Arteriam Aortam, præcipue
verò sinistram Cordis ventriculum ita distendentes, ut fi-
nisset ventriculus dextro longe capax appareret, pro-
pter distensionem a Flatibus, cum tamen alias fit minor.
 An autem his Flatus semper aut uprimòdum sint Causæ
 palpitationis cordis? vis eredo: sed semper dubito, cum
 illius eorum forma nativa cum impetu ad Cor delicti
 non possint.

Si Sanguis in suo motu locali nonnulli impedire, adeoque
 minus commodè per cordis ventriculos circuletur, etiam
 cordis palpitatioem dare potest. Hanc frequentissimam
 eam palpitatioem Cordis afflicti WILLISIIUS in
Pharm. Rat. P. 1. pag. 263. Sanguinis nempe in Cordis bi-
 gi remorat & aggelationem: Conf. M. A. N. G. *Ann. 2.*
Observ. 197. pag. 299. Id quod confirmat etiam FOR-
 ESTUS *l. 17. Obs. 1.* ubi Palpitatio cordis observata in
 quodam, qui somnum meridianum capiendū Tibias ha-
 bebat nimis confictas; laxatis vero Tibiis sine ulla Pal-
 pitatione prope debilius sanguinis motum dormiebat.
 SCHULZIUS in *Conf. 103. & 104.* de istem Tibiis con-
 fectis simile quid refert: in his enim propter impediment
 sanguinis motum non potuit non fieri Impedire circulus in
 Præcordiis, & hinc palpitatio Cordis. Quo etiam Exces-
 scencia crues in cordis bi *3vi. pendens, & alcerum cor-*
culum reperientibus, perinet: vid. SCHENCKIUS l. 2. Obs.
pag. 214: item Polyphagores in corde, *Tubercula in Cor-*
dis ventriculis: vid. BONETTI *Septicæsem pag. 639. &*
640. aut etiam Calculi seu Lapilli in corde reperi, de quibus
 supra. Sic SCHULZIUS in *Conf. 103.* refert inven-
 tum Lapillum quemdam nigricantem in eo, qui tali Mo-
 do suppius fuit correptus, qui HORSTIUS habet Esom-
 bula Calculorum in Corde reportorum, ex quibus vhe-
 mens ac diuturno oborta fuit palpitatio: & ex HOR-
 STIO

SITIO HOFFERUS *Hier. Med. pag. 19.* refert Palpitationem Cordis lethalem, ex tribus Lapidibus in Corde sepe.

Quoad Nervos affectos, & istos, qui ad Cor derivantur ejusque aut Viscerum viciniorum motui intervine, irriterentur, similem Cordis convulsivum motum inferunt, ubi, cumque etiam Causa occasionalis laesit. Unde praeterea, quod supra de Hypochondriaco Spasmodico dixi, euanthetiz, quod *Animi pathemata*, praetertim *Ira & Terror*, *Quod ferit* in non afflicti, & similia, quae Spiritus animales in motus perturbant, & irregulares faciunt, ac Nervos irritare aut concutere possunt, Cordis Palpitationem inferunt; imprimis Natus Hyperthrice, ubi cellante Paroxysmo Odore maxime quodam ex improvis afficiuntur, mos in Palpitationem eandem incidit, ex solo Odore: Id quod fit, affectu Nerro & Spiritibus Cor movere. Item Spiritus animales in motus inordinatos & convulsivos reddidi Palpitationem Cordis excitant, dum Palpitatione alios Affectus Spasmodicos lapsus comitari solet: & g. in Subjeto illo simul Epileptico, quod PLATERUS *Obs. 126.* adducit & a *Novis* justo quidem PLATERUS *Pr. T. 1. p. 486.* in specie ad hujusmodi Palpitationem ex Nervorum spasmodico affectu contractam pertinere hoc malum, dum in Hypochondriaco & Scorbutoque praetertim frequenter observatur, de quo supra dixi. Non putandum est, vel Flatus ex Hypochondriaco ad Cor deliri, aut Vapores ex Splene ad Cor ascendere, & ita Palpitationem inferre, utut Aegri dicant, se sentire praeternatalem alterationem, dolorem palpitantem, aut familiam pathemata, sub Hypochondriaco similitur in Lienis regione, unde concretur Cordis illud Symptoma: nempe similes illi hujusmodi Subjctis est spasmodico affectu, simpliciter ex affluente ex infima communicatione, quam Nervi Splenicis cum Cardiacis habent: de quo & alim hoc pertinet vid. *Anat. Nerv. WILLISII.* Sicut enim hujusmodi subiecti *Spasmodica Pathemata* aliarum partium per consensum Viscerum in Hypochondriaco non sunt rara, ita etiam Cordis supervenientia Palpitatione simpliciter per consensum Nervorum explicanda. Siquidem tales Hypochondriaci & Splenectici ante initium vel cum eo percipiunt mormura & rugitus in Abdomine, praetertim circa Epilurum Hypochondrium, & inter symptomata Splenis modo allegata, quae non praeterea oriuntur a Flantibus, spontaneis impetu has typhas eientibus, sed potius aut a parvis Flatus continuis, Spasmo vario affectus, adeoque Palpitationes hae sunt petividae, quae aliter in Affectu Scorbuto & hypochondriaco affligi genus vel in Sanguine, vel in Nervis suum habent fontem. Praeterea dum afficiuntur Paroxysmo tales, videtur Cor quasi confregi, aut ambabus manibus comprimi. Concurrat etiam interdum levis quodam ascendente Fumi ex Hypochondrio sinistro, quod Spasmi Membrarum istius loci indicium; (vel eorum) cecidit, ne taceam Vertigines subinde complicatas, anormales & perturbatum Spirituum animalium motum offendentes. Acido nempe vitioso Hypochondriacorum uterque commoto, & Nervis vel Stomachi, vel Lienis potissimum irritante, & hinc Spasmos eorum ex partium appropinquante concitante, facile & Nervi Cardiaci similiter per consensum affici, & ita ad Palpitationem Cordis adici poterunt: Ut etiam Nervuli Arteriae Cordi vicinas partes, Spasmo affecti, & ita Sanguine circulum turbantes, & mediana Valsum arteriae frictura impediunt, consequenter ex Sanguine circa Cordis basin congesto, huius Palpitationem tollere possunt. Sed de his omnibus animo optime & prolixis ag. orem vid. WILLISIIUM *Pharm. Rat. p. 166.* qui sane multum debemus, quod in Nervorum contrivae Affectuum theoria tantam lucem nobis concedit. Ex metallicis Fumis Palpitationes Convulsivas oriri observatur, quia ut plurimum sunt Arteriales.

Tremor Cordis, in quo Pulsus inequalis & languidus, interdum quasi vermicularis, percipitur, Causa, vel in Musculis Cordis, vel in Nervis investiganda, cum pariter convulsivis quid fiat. Quod ipsius Cordis Musculi attinet; equidem in his aliqual vicium seu praeternaturale con-

vis, per consensum in Spasmos cordis, leviores licet, Tremores in Cordis parti observantur. Pauci alii de hoc Cordis Tremore prolant apud Auctores & Scripsores Medicos, cum ordinario cum Palpitatione ejus confunditur, aut circa Pulsum vitia, vel Lipothymias, subinde Tremoribus supervenientes, tradari solent, &c. Abolvimus Theoriam Palpitationis Cordis; jam ad ea, quae Praesent spectant, pergemus.

DIAGNOSIS.

Signa Diagnostica ex observatione Differentiarum & aliorum symptomatum syndrone seu contingencia ferè colligenda sunt: Nou ex Pulsu in Carpi Manum, vel alius locis, ex quo parum certi, imprimis quoad Cauterum differentiam, imò plane nihil, cognosci potest, quin potius requiritur imprimis applicatio manus ad ipsum Cor. Facit hoc TIMAEUS in suis *Epistolis* *Epist. 23. pag. 140.* ubi observat Palpitationem Cordis mirabilem, insignem & validam, in qua oculus in Carpi Palmarum observari potest: ob id scilicet vel aegri relationi fidendum, vel ipsi Cordis regionis Manus admoveunda, pro percipiendo Cordis varia Palpitatione.

Quod attinet Signa Consonum: in his totius rei cardo vertitur pro meliori Prae.

Signa Aque Pericardii abundantia, Calculorum, Polypii, Valsorum pulmonarium Obstructionibus, &c. sunt pauca & admodum fallacia, interdem ferè nulla. Pulsus non est adeo magnus, nec adeo vehemens aut concitatus, cum Cor in impedita capsula liberè moveri nequit: afflicti est contumax & pertinax: conjuncta simul est fibrillata, referens Hecticae speciem; accedit & Tapes Corporis, & tandem quoque spirandi Difficultas. Signa Verum in Pericardio hujusmodi. Si vero Malum, quod frequenter huius est, oritur ex Afflicione Hypochondriaca, tunc non solet esse continuum, ante Paroxysmum verb vel cum his percipiuntur mormura subinde & rugitus Abdominis, in specie justa regionem sinistri Hypochondrii. Praeterea, cum tales paroxysmi afficiuntur, Cor quasi confregi, & cum ambabus manibus comprimi videtur, concutitur, simul & quidem nonnquam, Verrigines, aliaque Abdominis Caputisque mala, ex anomalo motu Spirituum animalium dependente. Scorbutoque etiam Malum hoc est admodum familiare, & ferè hoc habet peculiare, quod saepe ad levissimum Corporis Motum, & vel Brachium vel Manus nutummodo moventur, Paroxysmus palpitationis in vadit, & subinde pravus Lipothymias contumacia habet. Exemplum palpitationis cordis talis scorbuto & morandi vid. in HORSTII *Obs. Lat. Obs. 35. p. 180.* & 38. quod est sane rarissimum Exemplum.

Tremor Cordis verb, quod vitium ferè contrarium Palpitationi, utut confundatur committere, cognoscitur ex Pulsu inequali, debili ac languido: subinde etiam Vicium ingens prostratum & imbecillitas iuncta esse solet. Talem cordis Tremorem quoniam Auctores perverso vocant palpitationem Cordis, lethalem, eum ingeni inculcatur Pulsus, ex Terrore gravi ortum, vid. in KIVERII *C. 4. Obs. 215.*

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis: Palpitatione Cordis per se nun est Malum contemnendum; ut plurimum enim diffculter curatur.

Si Palpitatione Cordis superveniat Pulsus lenis remittens aut etiam nonnquam intermitens, cauti fore adlantes; imminet enim syncope.

Uterque qui in juvenili aut declinante aetate, sine sine ulla manifesta causa corripitur gravi Cordis palpitatione, raro ad sceudum pervenit, sed etiam moritur. Aphorismi est GALENI, & per Experientiam Praedictorum comprobatus.

Palpitatione Cordis ex malo hypochondriaco frequenter quidem est, ac sicpe recidiva, levior autem & curatu est facilius reliquis speciebus, praetertim per *anormalem* Cordis aut partium viciniorum accidentalem. Ea veru, quae ex scorbuto ferè gravius, & prope Lipothymias multas periculo, nec curatur, nisi Affectu ipso sublato.

Si palpitatione Cordis continua vitio Pericardii, aut Vermium, aut Arteriarum Cordis offusum, aut polypii ejus, aut calculorum, aut aliarum causarum quo cognitur contingat; incurabilis est, atque insular Hecticorum levis & successivè ad Mortem deducit Homines.

Si tandem malignitatis & Veneni suspicari adest in palpitatione Cordis, res est periculo plenissima, & rarius aegri evadit.

C. U.

Præter Tubercula Vermis etiam, & quidem in specie di-
ctus Vermis Cordis, de *Desfontain* tam in Pericardio ipso,
quàm in Pericardio contenti, aut eidem adherentes, inter
alia Symptomata periculosa subinde dant Palpitationes.
Affectus rarus habetur Vermis Pericardii, & paucis, &
ferè nullis, cognitus. Ego tamen puto, quid non sit rarus
talis Vermis, sed admodum frequens. Symptomata taliter,
Ægrotantium, & Medicamentis contra eum videbitis in
GABELCHOVERO *Cent. 3. Curat. 1.* Præ exterius Ægri
passivæ palpitationem cordis subinde recurrentem sine
manifesta causa, inignos rufones & vellicationes, puscu-
las & dolores, præsertim rufones & vellicationes in inter-
ioribus Pectoris loco, ubi situm est cor, ex improvise inter-
cedum lipothymia immittent, interdum etiam epilepticæ
convulsionis supervenire observantur; Facies pallor, Ægri
inquieti sunt, Pulsus intermittens & intercurrens est, &
similia adiunt Symptomata: Vid. FORESTUS *lib. 1. Obs. 36.* in *Sabel. PARÆUS lib. 1. Cent. 3.* SCHENCKIUS *lib. 1. Obs. 194.* Medicamenta, quibus hic Vermis intermit-
tit, sunt imprimis Mercurialis, & hinc fucus Allii, Ra-
phani rusticani, & Nasturtii, aut quoque eorum Infusa:
de quibus vid. *Francis Clynchius. HARTMANNI*, qui cum
curat per sal Dillamoni & Tanacetii; item per Mercurium
vivum, hujus Infusum; necnon GABELCHOVERUS *l. 1.*
ubi habet Exempla Vermis Pericardii per hæc Media-
menta peccati. Curiosè est Histeria, quam habet PETRUS
à CASTRO, Mercurio Vetroensis, in suis *Manuscriptis*
Præfatis: Alibi, inquit, contigit, diuina morbi genis in Can-
tabriæ observasse, sub epidemia constitutionis, in qua post
inter ægrotantium fluxum, qui omnes convulsi cum frequen-
tissima & ferè continua cordis palpitatione moriebantur, deficiente
quodvisdam cadaveribus invenimus in singulis Vermem, magni-
tudinis ferè minimum digitum æquantem, capsula cordis affixum.
Nec valuerunt, inquit, præstantissima Alexipharmaca
Vermem occidere, non Bistore Orientalis, nec Theriacæ, nec
essentia Alchermæ, nec Serræmæ aut alia, itaque nec Albi-
um, à quo tamen magis, quàm ab aliis emolliis angustior,
& sed videbatur. Solus fucus Scabiosa max Vermem occidit,
unde hæc experientia observata, Scabiosa infernam uti videntur
languentem, tam in Infusa scellata, quàm in Decoctis & Symp-
plicis & ex eis salicatis. Tandem nulla auxilia ægrotantibus
apprehendantur aliquæ hoc spiritus alexipharmaci, & perit mirum
fuit, ab his tempore non plura ægrotantium perisse. Itaque non
credendum hic affectus curari potest, sed fucus Allii, Scabiosa,
& opus Scabiosa, in quo agitur ut fuit per aliquos horum Mer-
curius crudit: item Mercurius dulcis ad gr. iij. exhibitus cum
Bile ex Conferva Florum Scabiosa magnopere profuit. Hæc
CASTRO propria Experientia nobis reliquit. Vid.
etiam hujus PETRI à CASTRO Tract. de *Physi. Nephri-
li. Rom. pag. 137. & 138.* ubi etiam Vermis ejusdem men-
tionem facit.

Cataplasma externum contra Vermem Pericardii exper-
tum vid. in LOWERO Tract. de Cordis pag. 107. ex *Volui Ci-
nora, Tanacetii, & Alchermæ vulgaris, Auto Podi incellu, &
cum pauca Michridatis mixta, regioni Cordis admodum.*

Causa Interna respectu Cordis palpitatioem inferentes
sunt variæ. Rationes sunt ipsæ *Affectus cordis, ut affectus*
in corde, aut simile quid; sed potius omnia ea, quæ san-
guinis localem motum quacunque ratione per Cor impe-
dire valent, unde circa radices Vascularum & cordis basin
aggestus, ad crebriores & validiores contrações, adeo-
que palpitatioem comedit, Internæ causæ rationem ob-
tinent: Causæ sanguinis in circulo suo plurius immodi
non levis argumentum est, quod pulsus in carpo minis cor-
dis motui respondeat, sed languidus & diminutus subinde
percipitur, quasi sanguine non sufficiente diffundente
Arterias. Has inter Causas sunt tam ipse sanguis non ri-
tè se habens, quàm etiam alia sanguinis ritè constituti mo-
tum impediens.

Sanguinem quod attinet; ipse vitiosus minus turgescibi-
lis & fermentescibilis, indeque ad flagrationem pronus,
ad palpitatioem disponit. Uti enim à sanguine rare-
fcente naturaliter expansioe con irritatur ad sui contra-
ctionem; ita ubi præternaturalis est fermentatio, etiam
per consequens præternaturalis irritatio, ubi etiam præ-
ternaturalis & violenta erit Contraçtio. Hinc in iis, qui
sanguinis Menstrui patiantur suppressionem, frequentes
sunt palpitatioes cordis, quæ ea levi modo tunc contra-
hant; non secus ac Cachectici confirmatis. Ictericis,
Spleneticis confirmatis, aliisque affectibus Chronicis non
rare sunt: quod ea GLISSONIO Tractatu de cordis Palpi-
tatione, & FORESTO *lib. 17. obs. 1.* est notum.
Præ cæteris tamen, Hypochondriaci, Hysterici, & Scor-

butici familiare est malum hoc, ita ut in palpitatioe cor-
dis semper suspicio sit de Affectu scorbutico: idque dupli-
ci modo; vel ob sanguinis intrinsecam constitutionem; vel pro-
pter Nervos Cor moventes convulsos.

Rationes sanguinis frequens est palpitatio cordis, etiam
ex causa: vel ob anomaliam sanguinis in præcordiis Tur-
gescentiam; vel ob anomaliam vitium tunc in sanguine pec-
cam & cor vellicans, vel ob Gramulis sanguinis ac acido
condensatis in corde relictis, qui inter cordis valvulas ha-
scentes illic denique impadi palpitatioem inferunt non ra-
rè. Dico tamen Gammolis: si enim majores grumi, & po-
lypotæ concretæ ascendent, syncopes ac suffocatioes
motus inflaret, cuius rei examen observatum est in M. A.
N. C. *Ann. 2. obs. 197. pag. 291.* Nec mirum est, quod
tales grumuli in Hypochondriaci palpitatioem cordis in-
ferant, cum & calculosæ concretiones in corde existentes,
item polypi cordis, idem subinde inferant malum: de quibus
vid. HÖRSTIUS in *Obs. & HÖFFERUS in Hæc. Med. pag. 89.* GREGORIUS *Arter. l. 1. c. 1. §. 1.* Quo etiam Bili
illa repleta in Tophi nigri species reducta fuit, quæ
FERNELIUS *Pathol. l. 3. Obs. 17.* meminit, lo-
scorbuticis autem communiter gravissima cordis palpitatio-
ne afflicta hæc mirabile, quod si ipsi quæti in lecto iaceant,
nihil moliantur, contra verò ea levissimo modo gravissi-
mus incurant palpitatioes cordis, Lipothymis læpè fa-
perverentibus. Imò, quando Hypochondriaci & Scorbutici
obnoxi sunt spasmis Nervorum, imprimis rami Inter-
costalis & parii Vagi, fit eandem, ut in talibus confirma-
tis, quod v. g. Lien incumbant, subinde contingat cordis
palpitatio, propter rami splenicum nervum latè in-
flectum tunc spasio correptum, qui spasmus Plexui Melen-
terico Nervorum communis, Nervum parii Vagi affi-
cit; quod uti ad quæcumque Vagina interna, ita & copio-
se ad splenem derivatur, à cuius furcillis movetur cor, &
ita affecto hoc Nervo Cor palpitatur. Patet hoc ferè ex eo,
quod in talibus Hypochondriaci & spleneticis ingruente con-
diti palpitatioem percipiuntur Murmura & Rugitus in Abdo-
mine, ex spasio Meleneteris, & Insipitum inordinata
contraçtione & agitatione.

Quid de Flatibus? Communiter quidem putant: Flatum
aut exhalationes ea Lienæ ad cor ascendentes, aut Mela-
stin materiam in tali casu subesse, à quibus Cordis palpi-
tatio excitetur; quod tamen minus verisimile, aut rarissi-
mum videtur: & potius, quod fuit, vi tamen continuam
cordis palpitatioem inferre possunt. Dubitant equidem
nullum. An duntaxat Flatum in Vagi majoribus sanguinibus
per consequens Arterias? Verum vi possunt negari in Valis
Flatibus sub certis casibus; prostant namque Exempla ho-
mum: sic SYLVIUS in Belgio in quodam Cadavere in
Noloemio reperit Flatum, vi divisa summa Abdominis
Corte erumpentes: quæ & Arteriarum Arteriam, præcipue
verò finitum Cordis ventriculorum ita diffidentes, ut si-
miller ventriculus deatrolongè capax apparuerit, propter
diffensionem a Flatibus, cum tamen alias fit minor.
An aotem hi Flatum semper aut uphismum sint Causæ
palpitatioes cordis? vi credo: sed semper dubito, cum
illæ eorum forma nativa cum impetu ad Cor descendi
non possint.

Si Sanguis in suo motu locali nonnulli impediatur, adeoque
minus commodè per cordis ventriculos circuletur, etiam
cordis palpitatioem dare potest. Hanc frequentissimam
causam palpitatiois Cordis asserit WILLISIUS in
Pharm. Rat. P. 1. pag. 163. Sanguinis nempe in Cordis ba-
si remoratur & aggestioem: Conf. M. A. N. C. *Ann. 2. Obs. 197. pag. 299.* lo quod confirmat etiam FORE-
STUS *l. 17. Obs. 1.* ubi Palpitatio cordis observata in
quodam, qui somnum meridianum capiendū Tibias ha-
bebat nimis contrictas; laxatis vero Tibiis sine ulla Palpi-
tatione propter delictum sanguinis motum dormiebat.
SCHULZIUS in *Conf. 103. & 104.* de iisdem Tibiis con-
strictis simile quid refert: in his enim propter impedimentum
sanguinis motum non potuit non fieri impedire circulus in
Præcordiis, & binc palpitatio Cordis. Quo etiam Ecce-
scæ cornea in cordis basi Syv. pectoris, & alterum con-
colum repræsentant, perinet: vid. SCHENCKIUS *l. 1. Obs. pag. 214.* item Pulpi graviores in corde, Taberula in Cor-
dis ventriculo: vid. BONETI *Supplementum pag. 639. &
640.* aut etiam Cuiuslibet Lapilli in corde reperi, de quibus
supra. Sic SCHULZIUS in *Conf. 103.* refert inven-
tum Lapillum quemdam nigricantem in eo, qui tali Mu-
bo sepius suis correptus; ferè HORSTIUS habet Exem-
pla Calculorum in Corde repperit, ex quibus vehe-
mens ac diuturna oborta fuit palpitatio: & ex HOR-
STIO

SITIO HOFFERUS *Herc. Med. pag. 89.* refert Palpitationem Cordis leibalem, ex tribus Lapsulis in Corde perceptis.

Quoad Nervos affectos, si isti, qui ad Cor derivantur, ejuque aut Viscerum viciniorum motui interviunt, irriterentur, similem Cordis convulsivum motum inferunt, ubique etiam Causa occasionalis latere. Unde præterea, quæ supra de Hypochondriaco Splenetico dixi, contingit, quod *Animi pathemata*, præsertim *Dra & Terror*, Quodæ Jures in non alluctis, & similia, quæ Spiritus animales in motus perturbatos & irregulares ciere, ac Nervos irritare atque concitare possunt, Cordis Palpitationem inferunt; imprints Mulieres Hysterice, ubi effluente Paroysmo Odore tantum quodam ex improviso afficiuntur, mox in Palpitationem eandem incidunt, ex solo Odore: Id quod fit, affecto Nervo & Spiritibus Cor moveotibus. Item Spiritus animales in motus inordinatos & convulsivos redacti Palpitationem Cordis excitant, dum Palpitatione alios Affectus Spasmodicos sæpius comitari solet: e. g. in Subjuncto illo simul Epileptico, quod PLATERUS *Opif. 336.* adducit & à *Præterea* eundem PLATERUS *Pr. 1. p. 146.* In specie ad huiusmodi Palpitationem ex Nervorum spasmodico affectu contrarium pertinet hoc malum, dum in Hypochondriaco & Scorbuto præsertim frequenter observatur, de quo supra dixi. Non putandum est, vel Flatus ex Hypochondriaco ad Cor deferri, aut Vapores ex Splene ad Cor ascendere, & ita Palpitationem inferre, ut ait Agri dicant, se sentire præcedentem alterationem, dolorem pilinguem, aut similia pathemata, sub Hypochondriaco sinistro in Lienis regione, unde conicitur Cordis istud Symptoma: nempe similitudine in huiusmodi Subiectis est ipsa modica affectio, simpliciter ex affinitate ac intima communicatione, quam Nervi Splenicum cum Cardiacis habent: de quo & alius hoc pertinet vid. *Anat. Nov. WILLISII*. Sic ut cum huiusmodi Subiectis ipsa modica Pathemata aliarum partium per consensum Viscerum in Hypochondriaco non innotata, ita etiam Cordis superveniens Palpitatio simpliciter per consensum Nervorum explicanda. Siquidem tales Hypochondriaci & Splenetici ante innotum vel cum eo percipiunt marmora & rugitus in Abdomine, præsertim circa sinistram Hypochondriam. Præter symptomata Splenis modo allegata, quæ non præterit oriuntur à Flatibus, spontaneo impetu hæc typhæ crebrius, sed potius aut à partibus Flatibus convulsivis. Spumo vixit affectus, adeoque Palpitationes hæc nunc periclitæ, non alter in Affectu Scorbuto & hypochondriaco nisi graves vel in Sanguine, vel in Nervis suum habent fontem. Præterea dum afficiuntur Paroysmo tales, videtur Cor quasi confringi, aut ambabus manibus comprimi. Concurrat etiam incedendum lesus quasi ascendens Fumi ex Hypochondrio sinistro, quod Spasmi Membraurum istius loci indicium; (vel comes) existit: ut taceam Vertigines subinde complicatas, anomaliam & perturbatum spirituum animalium motum ostendentes. Acido nempe vitio Hypochondriacorum uterque comotio, & Nervus vel Stomachus, vel Lienis potissimum irritante, & hinc Spasmi eorum ac partium appendiarum concitante, facile & Nervi Cardiaci similiter per consensum affici, & ita ad Palpitationem Cordis adigi poterunt: Uti etiam Nervuli Arterias Cordi vicinas moventes, Spasmo affecti, & ita Sanguinis circulum turbantes, & mediante Valvularum artium istarum impedimentes, consequenter ex Sanguine circa Cordis hanc congesta, huius Palpitationem inferre possunt. Sed hæc omnia sunt omnino optime & prolixis ægrem vid. WILLISIIUM *Pharm. Rat. p. 168.* cui sunt multum debeamus, quod in Nervorum corumque Affectuum theoria tantam lucem nobis accenderit. Ex metallicis Fumis Palpitationes Convulsivæ oriri observatur, quia ut plurimum sunt Arteriales.

Tremor Cordis, in quo Pulsus inequalis & languidus, interdum quasi vermicularis, percipitur, Causa, vel in *Malis Cordis*, vel in Nervis investiganda, eum pariter convulsivum quid sapiat. Quod ipsos Cordis *Malis* attinet: eundem in his aliquid visiosum seu præternaturale contineri videtur, quod Fibras motrices parenchymatis eorum continuo vellere, & hinc ad contrahendas irritare valet. Cùm vero necessarii Diapholo Cordis à Sanguine influente superveniat, hæc via sufficiens conceditur, quin ex causa subito contrahitio repetita superveniat, & ita continuus, sed interpositus, adeoque tremulos, sic fiet Motus. Quoad Nervos: Scorbatici etiam ac Hypochondriaci, ex his ipsis affectis, & ab aliorum Viscerum Nervis,

vis, per consensum in Spasmos cordis, leviores licet, Tremores in Corde pati observantur. Pauci alios de hoc Cordis Tremore prolant apud Autores & Scriptores Medicos, eum ordinario cum Palpitatione eius conivendatur, aut circa Pulsum vitis, vel Lipothymias, subinde Tremoribus supervenientes, tractari solet, &c.

Abolivimus Theoriam Palpitationis Cordis; jam ad ea, quæ Præfixi spectant, pergemus.

DIAGNOSIS.

Signa Diagnostica ex observatione Differentiarum & aliorum symptomatum sordine seu contingencia ferè colligenda sunt: Non ex Pulsu in Carpis Manuum, vel aliis locis, ea quo parum certi, imprimis quoad Causarum differentiam, imò planè nihil, cognosci potest; quin potius requiritur imprimis applicatio manus ad ipsum Cor. Facit hoc TIMÆUS in *scis Epistolis* *Epist. 23. pag. 540.* ubi observat Palpitationem Cordis mirabilem, insignem & validam, in quo oculus in Carpis Pulsu observari potest: ob id scilicet vel ægri relationi fidentem, vel ipsi Cordis regionis Manus admovenda, pro percipiendi Cordis varia Palpitatione.

Quod attinet *Signa Causarum*: in his totius rei cardo vertitur promelior Præfixi.

Signa Aquæ Pericardii abundantia, Calculorum, Polypli, Valvularum pulmonarium Ostruditionibus &c. sunt pauca & admodum fallacia, interdum ferè nulla. Pulsus non est adeo magnus, nec adeo vehementer aut concitatus, eum Cor in imposita capsula liberè moveri nequeat: affectus est contumax & pertinax; conijuncta simul est Febriçula, referent Hæcque ipsemet; accedunt & Tabes Corporis, & tandem quoque spirandi Difficultas. Signa Verum ut in Pericardio habuimus. Si verb Malum, quod frequentissimè fit, gratiar ex Affectu Hypochondriaco, tunc non solet esse continuum, ante Paroysmon verò vel cum his percipiuntur marmora subinde & rugitus Abdominis, in specie iuxta regionem sinistri Hypochondrii. Præterea, cum tales paroysmi afficiuntur, Cor quasi confringi, & cum ambabus manibus comprimi videtur & concutitur, simul & quidem nonnquam, Vertigines, aliæque Abdominis Captivæque malis, ea anomalo motu spirituum animalium dependenti, Scorbatici etiam Malum hoc est admodum familiare, & ferè hoc habet peculiare, quod sæpe ad levissimum Corporis Motum, si vel Brachium vel Manus nonnquam moventur, Paroysmi palpitantis insvadit, & subinde pravus Lipothymias comitatus habet. Exemplum palpitantis cordis talis febriç ut mirandum vid. in HORSTII *Opif. 147. Opif. 35. p. 180. & 389.* quod est sine rarissimum Exemplum.

Tremor Cordis verò, quod vitium ferè contrarium Palpitationi, utut conivendatur commanet, cognoscitur ex Pulsu inequali, debili ac languido: subinde etiam Valium ingens prostratus & imbecillitas iuxta esse solet. Tremor Cordis Tremorem quem Autores perversè vocant palpitacionem Cordis, leibalem, cum insigni inopulente Pulsu, ex Terrore gravi ortum, vid. in RIVERO *C. 4. Observ. 225.*

PROGNOSIS.

Quoad *prognosis*: Palpitatio Cordis per se non est Malum contemendum; neplurimum enim difficulter curatur.

Si Palpitatio Cordis super veniat Pulsus levis remittens aut etiam nonnquam intermittens, cauti sine adstantes; imminet enim syncope.

Uterque qui in juveni aut declinante ætate, sine sine nlla manifesta causa corripitur gravi Cordis palpitacione, raro ad incutendum pervenit, sed citius moriuntur. *Aphorismos GALENI*, & per Experimentum Prædicium comprobatus.

Palpitatio Cordis ex malo hypochondriaco frequentior quidem est, ac sæpius recidivas, levior autem & curatæ est facilius reliquis speciebus, præsertim per *duobus* Cordis aut partium vicinarum accidentalibus. Ea vero, quæ ex scorbuto ferè gravius, & prope Lipothymias iudicis periculiosior, nec curatur, nisi Affectu ipso sublatu.

Si palpitatio Cordis continua vitio Pericardii est, aut Vermium, aut Arteriarum Cordis escarum, aut polypli eius, aut calculorum, aut aliarum causarum non cognitarum contingat; incurabilis est, atque insat. Hæcque morum leotæ ac succellivè ad Mortem deducit Homines.

Si tandem malignitatis & Veneni suspicio adest in palpitacione Cordis, res est periculo plenissima, & rariis ægri evadit.

C U R A .

Quod ergo attinet *Curam*: in genere est ante omnia eo dirigenda, ut saltem *causa pascens*, seu id, quod Musculum irritat, antequam Nervum moventem vellicet, maceretur removeatur, quo ipso sponte cessabit dicta Convulsio. Nam irritationem ipsam siliere *Opiatus*, non equè nec semper tutum est; si enim cesset sensus Irritationis, periculum est, ne totaliter cesset cordis motus ac pulsus: itemque cum palpitatione Cordis laborantes solent insignem Virium immobilitatem comitem habere, cavemus nobis ab Opio, ne scilicet huius usu eis penitus proferamus, atque interdum, ubi graviter affligit parosyismus eius in Hypochondriaci, & scorbutici, Opium appropriatis additum ad coercendum impetum non sit inconveniens. Aspicienda ergo hic est Orig. Mali, & ubi est à scorbutico, vel Cachexia, vel malo hypochondriaco, vel affectu splenetico, aut hysterico, vel venenis, verime preleardi, &c. semper appropriatis his ipsa varianda est cura. Unde mox patet, ut supra dixi, palpitationem cordis ex Aque pericardii, excretiscentis, & conformatione lesa esse incurabilem; & solam eam, quæ à Cachexia, scorbutico, & malo hypochondriaco, similibusque affectibus provenit, venire sub praxim medicam.

Quod pñctum *Præcautionis* in palpitatione cordis, res est dubia: Nam capessimus prædictam cum cautela administrandam movent, ut vires proferamus, & non addit summa plethora, plane omitendum: Habeatur tamen ratio causarum antecedentium cum usu Venæsectionis. In graviore enim cordis palpitatione à subitaneo, & nimio terrore aut Timore, aut suspitione Grumorum sanguinis, aut à suppessione sanguinis alius solenniter fluentis, contraria, aut si es prædicta insignior corporis commotione supervenerit, aut in Janicibus sanguine fervido prædicta eveniat Palpitatio, aut alius circumstantie occurrant, in quibus suspicio addit sanguinis circa Cor egredi, vel impetuosis circa vasa moti; tunc subito necessitate coactus Medicus Venam aperire necesse habet, ut sanguinis flagrantiori ejus impetu motui, aut præsertim, aut imminenti, steretur aliquis meatus, ut depleta sanguine quanto facilius ejus circuitus fiat; nec tant insigniter aut copiose, item in uno loco subsidere queat. Eo magis hæc convenit, sive subitum sit plethoricum, sive revera tale sive apparens, alias minus tutam eam existimo. Prostant etiam exempla prædicta quædam palpitationis cordis per Venæsectionem in parosyismo levatis in HORSTIO lib. 3. observat. 16. item in FONTANI emulsi. & responsi pag. 66. Ad miraculum eam cessasse observavit HOECHSTEDTERUS in observat. Quin, & Mirandæ applicatæ posterio ribus Ani Venis, vel etiam applicatæ supra Cor, interdum sedatum parosyismum palpitationis Cordis. Exemplum habet ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Medic. princip. 188. 39. observat. 2. de palpitatione cordis per Herudines supra Cor adnotas curata. Imò, quod mihi magis adhuc videtur paradoxon, ZACUTUS LUSITANUS observat Palpitationem cordis validam, curatam per scarificationem Corachialis supra Cor adnotat, lib. 4. prax. admir. pag. 136. Proinde in puncto Venæsectionis Experimentis, & hinc Circumstantiarum varietas ubique probè est attendenda.

Cùm verò inter palpitationes Cordis curabiles frequentissima sit illa, quæ est effectibus hypochondriaci, scorbutici, & hinc nervosis partheniasticis convulsivis oritur, propterea semper in palpitatione cordis hic reflexus est facienda: & in talibus cordis palpitationibus, ratione peccantis Acidi, tam in primis viis quam in Massa sanguinis fermentationem turbantem, in Parosyismo trium remedium genera, Martialis, hinc Terrea (quo in specie pertinet Margaritæ, Corallia præparata, Magisterium Corallinum cum succo Cetri paratum, item Tinctura eorum, & omnia Corallia, Glonabarina jactandem Salis volatilis, utramque facient paginam in quacunque palpitatione). Equidem genuine Tincturæ Coralliorum rarissimum fuit: inter mille modos parandi optimus modus hic est, qui fit beneficio menthris Rore majali vel aive, Sale universalis ruregessibus. His finit *Analeptica*, & virium ac spirituum reforescencia juvenila sunt, de quibus vid. WILLISII Pharm. Rationalis; quæ inter tamen *Analeptica*, & spirituum confortatoria, quæ semper sunt volatilia, & penetrantia, observandum est, quod quoad Salia volatilia sulphurea licet fortiter oleria non æquè omnibus subjectis talia conveniat, sed interdum, uti in mulieribus

hystericis, ita in quibusdam hypochondriaci, & doctioribus Viris, qui ordinatio systema nervosum delicatum & sensile obtinent, hoc fortis addit parosyismum exasperare; quod pariter in aliis affectibus Convulsivis attendendum est. Talibus ergo loco Salium volatiliam oleosorum, & spirituum aromaticorum potius Salia volatilia mæta, ut spiritus Salis Ammoniaci, non Oleosa, sed temperata, & simpliciter penetrantia, sine eo, ut fortiter Nares afficiant, conducunt: verbi gratia Effluvia Ambre egregia est in Lipothymia, & cordis palpitationibus, quæ tamen malitiam Affectum Hystericum exasperabit, loco cuius simplex quoddam Sal volatile potius adhibendum erit: Cinnamonum, & omnia ex oparata egregia sunt in parosyismo palpitationis Cordis, non secus ac in Lipothymia, sicut & Oleum Cinnamonum destillatum omnibus in palpitatione Cordis præferendum monet, & mirè laudat LINDANUS. Nihilominus tamen ab ejus usu in quodam Viro palpitationem Cordis excitata fuisse refertur in M. A. N. C. ann. 1. observat. 134. pag. 244., quod dudum etiam notarat MÖBIUS in *Observat.* Quod si verò à Volatiliam sulphureorum, & fortiter Oleosorum ac Odoriferorum, ut à Martialis usu ex improviso inducitur, & exasperatur jam fuerit parosyismus; Acidula penetrantiora, ac speciatim spiritus Nitri dulcis, ligendo, & siliendo humores commotos optimè eum compescit: vid. *loc. jam alleg.* Cùm ergo Cordis palpitationis sit saltem symptoma aliis superveniente affectibus, pro horum varia differentia etiam huius symptomatis nonnihil varianda Cura; quod autem in specie attinet *Analeptica* in palpitatione Cordis, semper reliquis Remediis addenda sunt Melissa, Planta, si quæ alia, balsamica, ejusque essentia, & spiritus per fermentationem paratus, quæ insigniter reficit aut Lipothymia, aut Cordis palpitatione affectus: idque imprimis si hoc spiritus paratur essentia Ambre, de qua præmodum supra. Hujus Primum *Est*, ut vocat PARACELUSUS part. 2. mirè laudat FEBRURE in *Chymia* lib. 2. Vini habet aliqualem Corpori inducendi rejuvenescientiam, experientia fida in Anglia, ubi post primum Ros Melissæ propinquant Vetulae, ipsi capilli cani deciderunt, Menies autem naturaliter suppressi de novo fluxerunt, dentes & ungues regenerati, & rugæ seniles replent: Idem factum est apud Gallios, quibus propinquant hoc primum *Est*. Experimenta fecit, & mirè laudat in sua *Chymia* part. 2. qui describit ipsi processum, & experientia de primo Ente Melissæ. Obiter hæc quod rejuvenescientiam, item hæc ipsa Melissa etiam Vino irrorata, & externe regioni cordis vel sola, vel cum Folis Borræginis in fisco calido applicata, admodum conducere solent in ejus. Ex omnium hæc primum fecit HELIDÆUS PADUANUS felici successu: Conf. FORESTIUS lib. 27. observ. 1., qui LÆLIUM à FONTE in *conf. 43. lib. 2.* imitatus est, & in Thracis Valeribus sine languine concreto excitatis palpitationibus Cordis ingentes hoc modo curavit, scilicet Vena applicavit Melissam viridem, & Borræginem, Aquarum, & tantillo Aceti enfasci irrorata, quæ ipas cum calido cordis admovebat, subitò omnis palpitatio cessavit. Post Melissam fuit Caryophylli, & Citri, item Rosmarinus, quæ cordis palpitationibus laborantes egræge reficiunt. Imò fore omnia aromatica, & nervosa conveniunt, quæ inter est, item Radix Zedoarie in pulvere Hysterica: item Radix Enulae campans est insignis in hoc casu, uti & essentia Anethi atque Danci. Cruent etiam, & eius essentia, quæ dicitur Cordis lenitia, tam exarere, quam interne commendari solet. Interne ejus essentia leu Tinctura; externe, si fiat *Melissa ex croco*, & *camphora*, & in regione scrobiculi Cordis aspersurum, qui Nodulus est etiam singularis, quod obiter monere, in melacholia hypochondriaci. De Ambre, & Noche res nota est, quod insigniter reficitur Cor, ut dicunt, id est, quod spiritus vires, & animalis roborem: de qua tamen Ambra notandum est, quod habet vim inebriantem insular spiritus Vini, adeoque tandem nonnihil suspensivam: hinc nimis ejus usu pro juranda Memoria quædam, imprimis Senes, redditi sunt insipidi. In hac tamen Cordis palpitatione vis hæc Ambre inebriantia minime metuenda; nam qui palpitatione cordis laborant, difficillime inebriantur: res mira, interim tamen vera; unde eo tutius Ambre usus conceditur. Facit ergo hæc essentia Ambre, & croci cum spiritu Rosarum vel Melissæ parata, spiritus Rosarum ambratur, in quo per Fermentationem vis inebriantia Ambre insigniter corrigitur: Nam tanta vis est fermentationis, ut omnem suspensivam vim, etiam ex Opio, tol-

tollat. Parafat Spiritus Rosarum ambratus hoc modo : Quando Rosæ fermentantur, additur Ambra, ut od̄ melius diffolvatur : Hæc Spiritus Rosarum ambrato, unum alterumque gramum vel guttula Olei Cinnamomi addita insigniter conducit. De Cinnamomo, ejusque Oleo, vid. ZWELFERUS, & LINDANUS. De Tinctura Solis cum Olio Cinnamomi *Myriophyllo*, vel alia, res nota est. Quæ vultu communiter de Tinctura Solari, item hujus exillens in Aqua Rosarum BURRHUS de *Oculis ad Bartholinum* refert, Menstruo potius quam Auro in acceptis referenda eruat. Conducunt etiam Cortices Aurantiorum, item Citri; horum enim Sal volatile aromaticum in multis Affectibus, in specie in Palpitatione Cordis, multi est usus. Notum est, quod multi insigniter commendunt Aquas destillatas & alia medicamenta ex Corde, Pulmonibus, Hepate, & aliis Animalium partibus. quæ tamen non quidem judicio, sunt nullius pretil: si enim destillatur Aqua ex Corde, vel expirimitur Succus, vereor senē, ne potius Natura borreat talia Remedia, quam ut dem suavit afficiatur. Aqua verò Composita rite destillata, Spiritus etiam de Sal volatile Cordis Cervi, & imprimis Tinctura Coralliorum cum Spiritu Cordis Cervi parata, egregia est, in specie in Palpitatione Cordis hypochondriaca, & Palpitatione Cordis senilis. Do. D. MICHAELIS multi usus fuit: nempe Solutio Coralliorum cum Succo Citri facta ad mellaginem blandè inspillatur, & cum Spiritu Cordis Cervi extrahitur. Præterea Spiritus de Salia volatilia ex Animalium partibus parata magis estimantur, non quod hæc singulari quid obtineant præ Spiritu de Sale volatili Sanguinis, sed quod à Prædictis solent observari prærogativa; hinc Spiritus de Sal volatile Cordis Cervi in specie, item Sal volatile Vipereum, erunt egregia. In Baccis Juniperi, uti alia multa latitant, & intercedant est Juniperus Arbori Cedro ad vicem longam, de quo vid. TACKIUS in *Chryse*, ita ex his parata Tinctura seu Essentia cum Spiritu proprio, vel Malvaticum Juniperinum ROLFINCII in *son Glymya*, & familia ex Baccis Juniperi parata, multum laudantur à FONSECA l. 1. Cmf. 11. Quinta Essentia seu Elixir Vitæ *Marshall* notum est, imprimis Sale volatili Vipereum acutum: Nam ubi alia adhibeantur incassum Salia volatilia non fallunt, imprimis si cum Spiritu sulphureo combinentur in Corpus oleiforme. Camphora etiam non solum intercedit ad aliquot grana Remedia appropriatis permixta, sed etiam exterius, nuoc cum aunc sine Croco, in Sacculo appensa, sicuti in Melancholia Hypochondriaca egregia est, ita & in Cordis Palpitatione. Hinc Spiritus Theriacalis camphoratus, non minus quam Calosorum, utpote quod in omnibus Morbis Convulsivis est egregium, & à FERDINANDO N. 79. aliisque quamplurimis in palpitatione Cordis commendatur. Unde Essentia Callosi cum Camphora ad palpitationem Cordis insigniter, uti & Essentia Callosi cum Essentia Croci & Ambræ missa, in paulo largiori dosi usurpata conferunt: Nam Calosorum iam a GALENI tempore in quavis palpitatione Cordis in usu fuit, & confirmat ab EPIPHANIO FERDINANDO, ubi Calosorum omnibus aliis præter Remedia in Palpitatione Cordis: unde Calosorum, uti & Camphora & Crocus cum Spiritu Salia Ammoniaci vino vel cum Spiritu Carmuato soluta, & in Essentia formam redacta, per consuetum Hypochondriorum palpitationibus conviciunt, in quibus Corallia, Salia volatilia, & Martialis rite preparata, in Paragismo sunt optima. Insigniter etiam in Palpitatione Cordis hypochondriaca commendatur Symplos de *limarum Chalphy Mercati*, cujus descriptionem vid. in HORATIO l. 3. Obs. 6., & eredo. Alias Serum Ladis in palpitatione Cordis melancholica commendatur à RHODIO l. 1. Obs. 40. Succinum etiam hoc ficit, quod in palpitationibus Cordis non minus, quam Lipochymia & Syncope, Affectibusque Hystricis, magnam est vium, imprimis Sal ejus volatile, & cum hoc paratus Spiritus Corvi Cervi succinatus nobilissimus: imò Oleum destillatum Succini ad gutt. iii. iv. vel v. in Aqua Florum Nymphae seu Florum Aurantiorum, vel alia Aqua appropriata expertum fuit Remedium FONSECÆ Cmf. 54. Huc etiam Oleum Philiciale *Hemph* perinet, ex Oleo succini, citri, & camphora.

Ex hæc Formulæ sunt variae in Palpitatione cordis :

Aqua Melif.

Cinnam. cydon. an. ℥i.
Rosa. Ruff. Marshall. ℥vi.
Spiritus Theriac. camp. ℥℥.

Corall. rub. prop.

Spiritus Cord. Cerv. an. dr. l.

Syr. Flor. Tunic. ℥vi. ad ℥℥.

M. D. S.

Potio Confortans contra Palpitationem Cordis.

Aqua Melif. cum Vino.

Formul. an. ℥i.

Spiritus Theriac. camp. ℥℥.

Corall. rub. prop. ℥i.

Syr. Flor. Tunic. ℥vi.

M. D. S. ut ant.

Aqua Melif.

Cinnam. cydonias. an. ℥℥.

Spiritus Theriac. camp. ℥℥. ℥vi. ad ℥℥.

Cornu Cerv. cum Sale volat. ℥℥.

Corall. rub. prop. ℥i. ad ℥℥.

Lend. opiat. gr. ii. vel iii.

Syr. Flor. Tunic. ℥℥. ad ℥℥.

M. D. S. ut ant.

Capitulum cochlearum. Vel

Aqua Cinnamom. cydon.

Cordial. M. S. an. ℥℥.

℥℥. Samb. unc. ii.

Spiritus Cereus Cervi cum Sale volat. acuat. vel

Carmineat. de tribus (qui speciatim in Hypo-

chondriaci Palpitationem Cordis patientibus est egregius) ℥i. ad ℥℥.

Syr. Funic. unc. ℥.

M. S. ut ant.

Aqua Cinnam. cydonias. unc. i.

Cordial. M. S. unc. ℥. vel unc. i.

Ruff. uti Rob. Bacc. Junq. ℥℥. ℥℥.

Cervi unc. ℥.

Spiritus Theriacal. camp. ℥℥.

Olei destillat. Cinnam. vel Saccini pro mulieribus gutt. iv.

(Perinde est: Oleum tamen Cinnamomi Viris, succini Mulieribus convenit; non eam hæc semper possunt ferre Cinnamomum.)

Agitentur & miscantur.

D. S.

Potio contra Cordis Palpitationem.

Dosis cochlear. i. vel ii. pro re nata. Symplos fluidus

omittit

Aqua Melif. cum Vino unc. ii.

Cordus Cervi

Cordial. M. S. an. unc. i.

Tinctura corall. cum spiritus cereus Cervi dr. ii.

Salis volat. succin. ℥℥.

Syr. de Canella unc. i.

M. D. S. ut ant.

Tinctura corall. cum spiritus cord. Cerv. dr. ii.

Ruff. Amb. cum spiritus Melif. aut Ref. vel

Spir. rosar. ambrat. dr. i.

M. S.

Essentia Cordialis.

Dentur pro dosi gutt. xxx. ad xl. in haustulo Vini

vel Aquæ Cinnam. temperata, vel simili haustu approposito.

Vel Pulvis hic:

Tellur. canchar. prop. vel Corall. rub. prop.

Cinnab. nat.

Assim. Alaph. simpl. vel Martial. à gr. viii.

ad ℥℥.

Olei destillat. Caryoph. gutt. i.

M. ℥ Pulvis:

Cui etiam Salis volat. Cornu Cervi gr. iii. pro lubite

addi possunt:

D. S.

Pulvis contra Palpitationem Cordis.

A conformations ipsa si sit vicium, ferè intractabile malum erit, ac saltem per exactam Dietam, & miomum Animi & Corporis Motum, quantum possibile sustentandus tales Aegri.

Quod attinet Extrema, Aquam carbonicam, Spiritus, Balsama & Oles regionis Cordis illinenda; interdum aliquid præstant, sed parum: saltem Spiritus reficiendo graviora Symptomata inhibent; unde quilibet potest abundanter se sentiri illinenda parvi æstimo. Sin tamen vicium sit ex Hypochondriis cum rugitibus & borborcymis lene-

Rinarum, speciatim ex affectu splenis, aut ex Passione Hytherica eorum tunc in his casibus ad spasmus contrahendos ea Remedia, ex aliis in Hytherica Passione, ex Aia fastidia v. g. & ex Galbano usitata sunt: nempe Emplastrum Matricale de Galbano cum Oleo succini vel Oleo spicis malaxatum, vel Abdomini, vel splenis regionali, & in specie buie Emplastrum de Nicotiana, pro videret symptomatum commodè applicari possunt.

C A P U T II.

De Palpitatione Arteriarum Particulari.

Verùm præter Cordis Palpitationem subinde etiam particularis Arteriarum Palpitationis molestia sunt *Ægri*, ita ut modò in hac, modò in illa parte, cum impetu vehementer Arteriae pulsant. Splenica interdum, interdum Temporum Arteria pulsant: quo facit Exemplum BARTHOLINII *Cum. 1. Hist. 18. de Pulsu Arteriarum Carotidum*, ut etiam strepitus & sonitus pulsus audiri: sicut & alia Vasa pulsant particulariter.

C A U S A E.

Tres imprimis Causæ sunt particularis palis Pulsationis seu Palpitationis sensus:

1. *Inflammatio* eiusdem loci: exinde enim Arteriae tenduntur, & ex fibratum aliquali contrahitur, dilationi resistentur, unde semper Dolores palpatórios supervenit.
2. Est impedimentum quoddam in sanguinis Circulo, huius enim nonnihil in quadam parte sufflaminato transire, dilatare nimis Arteriae, manifestum Pulsationis sensum exhibent.
3. In specie *Hypochondriaci* ex dicta Causa Pulsationem Arteriarum percipiunt, nunc in toto Corpore, nunc & in regione Hypochondriorum aut Lumborum infra Costas mochas proximè, ubi nempe Arteria Coeliaca, & in specie inferior eius ramus splenicus situs est. In his Arteriis tunica per consensum splenis aut partium vicinarum ad spasmus fide Convulsivum motum disponitur, unde rigidiore propter fibras sensibiliter pulsant, cuius occasione sanguinis motus in particulari quadam Arteria impeditur, utut non penitus illatur: hinc enim est, quòd Paresyymum eundem Hypochondriacum, aut Melancholicum, aut Vomitur eruentem Splenicorum subinde Palpitationes tales in istis locis præcedere soleant. Præter hæc taliter affecti Sanguinem ipsiorem ac crassum, & ob id difficiliter mobilem habere solent: unde & Varices in Venis talium Ægrorum observavit BARTHOLINUS *Cum. 6. Obs. 14. de Pulsatione per universum Corpus cum Varicibus capillis*.

C U R A.

Verùm taliter affecti optimè per *Mariella* curantur, cum præcipuum ad Malum Hypochondriacum meliorare soleant, sicut priores duo modi imprimis per *Andersena*.

C A P U T III.

De Lipothymia, Syncope & Virium Prostratione.

Pulsus Cordis & hinc Arteriarum nimio sæpe oppositum est vitium Pulsus parvus, rarus, debilis, Myurus vel Vermicularis, idque frequenter in Imbecillitate ac Languore Virum plùs minus interio, hinc *Animi Deliquio*, de quibus optimè tractat SYLVIVS l. 1. *Prax. cap. 34.*

Languor hic aut Imbecillitas, Partium, Functionum, & Virium, non solum à Nativitate quibulum contingit, sed etiam variis ex Causis supervenit: Argue est vel luculentus, qui ipsi Morbis supervenit, vel eos antecedit, vel etiam post eos curatos subinde supervit: Non raro enim iam Virium Imbecillitates, quæ post Morbos diuturnos observantur accedere: Vel Languor Virium hic est substanticus, cum ex improviso penitus prostraria Viribus *Lipothymia* seu *Lipofthesia*, *Syncope* aut *Aphymia*, Ægrum corripuit. Cum hac Virium Imbecillitate semper coniunctus est Pulsus tardus & minor, item Pulsus debilis ac iussu languidior, tunc præterea, item plerumque rarior quandoque, imò lapsus per intervalla certa aut incerta intermittens, interdum secundum Arteriae ductum magis magisque deficiens, qui tunc vocatur Pulsus Myurus; qui ubi fit minor, dicitur Pulsus Vermicularis seu Vermicularis. Concurrit simul Sensuum tam Internorum quam Externorum corporis, & deficiens plùs minus Corporis Motus observari solet, quod in Languore succellente saltem Lassitudinis spontaneæ nominæ, Germanis *die marigkeits*, appellari solet: in qua Ægri conqueruntur de Vigore Corporis debito deficiente, sunt tardi admodum, membra ponderosiora videntur, & ad quaslibet actiones torpent. Vires enim fide Rubei Corporis propriè loquendo nihil aliud est, quam intensio Sanitatis gradus, quo Actiones vitales potenter suas exercere possunt.

Differunt saltem gradualiter, non essentialiter, Lipothymia, Syncope & Aphymia. In omni Animi Deliquio seu Lipothymia, (B) præter Pulsum minorem & debiliorem plùs minus, prout Lipothymia est magis minùve periculosa fide gravis, simul Sensus Interni & Externi omnies obfuscantur, & Motus animalis, tam voluntarius, quam etiam quodammodo naturalis, nonnihil deficit, adeò ut Respiratio etiam sub nonnihil obcura aut ferè nulla reddatur; quæ Symptomata tamen omnia denub evanescent, & Æger in antiquum statum revertitur, nempe sanum.

Quod Syncope, ita vocatur à *σύνκοπη*, concide, quòd Ægri concidunt, est gravior ac singularis Animi Deliquio species, & ab Apoplexia parum differt: in hac enim atrociora hæc adstant symptomata, subitò ac inopinatè ferè concidunt Ægri, Pulsus vis vel nullus observatur, Sensus externi & interni abolentur, Motus Corporis est nullus, uti etiam nullus ferè Respiratio, Interim adstant Anæsthesia Præcordiorum, Sudor frigidus & glutinosus per poros erumpit, partemque Corporis semper observatur, quamvis perpetuus sit in Syncope; vid. SYLVIVS l. 1. *Prax. c. 34. §. 65. Imò Urinæ & Alvi excrementa interdum sponte effluunt, ita ut mortales tales syncopizantes, quàm viris, existant similes*.

Syncopizantes Vitam agunt mediam resurgentes, non descendentes. Eiusmodi Vitam mediam abscondita, vivunt etiam Insecta omnia per hunc modum abscondita, Cochleæ, Ranæ, Hirudines, Insæ & HERBERSTEIN *Artem Medice, Comm. pag. 82.*, quod fide Homines syncope detenti, & quasi mortui: vid. KERGERUS de *Ferm. Selt. 1. cap. 6. pag. 35.* Quomodo vero Insecta ad Vitam iterum parveniant? vid. pag. 36. l. 1.

Observatæ etiam interdum fuerunt syncope in Morbis Malignis, quæ sine anxietate fuerunt, quando neglexerunt Vomitoria, impetius qui iam obnosci fuerunt.

Omnia hæc sunt adhuc graviora in Aphymia (D), ita ut cum Pulsu planè abito, & aliquando ad sensum cessante Ægri tales insens mortuorum iceant.

In omnibus his Affectibus tam Imbecillitate Virium quàm etiam Lipothymia speciebus, observetur, mutationem insignem, tam imminuentem quam præsentem, cognosci ex Pulsu & Respirazione, ita ut Pulsus plùs minus deficit in robore & magnitudine, nunc fit parvus, nunc debilis, nunc magnus, Interdumque, planè nullus; quæ cessante, cessant motus Thoracis & Respiratio. Cæterum *Sudor frigidus & glutinosus*, in omnibus Lipothymia speciebus plùs minus observabilis, non est ordinarius & infusus sudor ex sanguine per poros cutis evaporans; sed est nihil aliud, quàm ipsum Nutritivum partis incidens, & *spit*.

(B) *Ανωθυμία*, Animi defectus: dicitur deficitio, & *σύνκοπη* animus.

(C) *Quid nempe in his Animi rationalis facultates læbent sint, non quod reverè huius generis homines Insectis vide vident.*

(D) *Ασπύξια*, Pulsus privatio: ab *α* privativo, & *σπύξ* pulsus: *σπύξ*, salio, pulso.

de spermaticum, quod sub syncope resolutum ac dissolutum ac partibus subcutaneis sub forma glutinosi ac frigidissimi sudoris erumpere, & effluere solet. Unde & hic sudor singularis habet vires defuncti Verrucosae Excrecentiaeque, item inflammationes Haemorrhoidum: de quibus vid. HELMONTIUS.

GAUSÆ.

Ut Causae pulsus minoris ac rarioris, adeoque Virium Imbecillitatis scrupulos, sappono, Corporis nostri Vires vitales radicatas fundamentaliter esse in sanguine; exteriore vero suo formaliter per subtilissimam sanguinis substantiam, seu partem ejus summam ad vivam ac mobilem quam spiritus appellamus; qui in precordiis Aëris inspirati adimento volatilissimi, insular radiatæ, & luminosæ texture per totum corpus diffunduntur; nunc primum in sanguine per Vasa Arteriosa, qui vitalis dicitur; nunc securus, trunciendo per cerebrum, & nervos, qui animalis appellatur, unde partium solidarum firma structura & tonus dependet.

Veteres Robor corporis aut vires à Calido innato, & Cordis firmiori texture, dependere dicebant. Sed cum Calidum innatum, præter sanguinem, & huius Motum Inactum, nullum daret, adeoque huius respectu HOFMANNUS Vires corporis in Temperamento consistere non incepto dicitur; fons Virium primarius potius in ipsa vita seu huius principio, & Motu sanguinis intellendo querendus est, à quibus corporis temperatum, & utile calidum, hinc vires ejus oriuntur; ita quidem, si fermentatio sanguinis naturalis potenter fuerit, calor, & vires ipsi intenduntur, eadem vero suffumigata Tepor & imbecillitas simul obrepunt, Viriumque dissipatio, Motus prodromus sui principium est. Quod cordis configurationem firmiorem attinet: hoc nec ad Virium robur aliquid conferit, quia is eo, itaque in Officina, spiritus & vires corporis iuxta Veterum hypothesis non generantur, sed ipsum potius cor activitatem suam à spiritibus animalibus & sanguine recipit.

In sanguine ergo remota & fundamentaliter, in spiritibus primis, & quasi formaliter, & effusis debitas vires, tam successiva quam repentina, investiganda erit. In sanguine quidem, quatenus hic minus aptus est, ut debita fermentatione volatilifari, ac in debitos spiritus caeteri possit: id quod fit, vel quatenus sanguis adsumptus est exhaustus est, vel quatenus idem deficit in sua acrimonia salina fermentativa, i. e. dum in sanguine deficit acrimonia salina. In specie inertia salis volatilis urinosi, & oleosi, seu Alis, disponit sanguinem, quò minus aptus sit ad spirituscentiam suscipiendam; Econtra non raro vitiosus peccat Acidum; idque in subiecto subinde plus minus vitioso radicatum: quorum Causae Antecedentes ex primis viis à Chylis vitatis, & eius perfectione in duodeno à debili fermento Alis, nodi Cacochylia, & Cacochylia, de quibus *supra* sect. 3. p. adum est, intelligendam erunt.

Spiritus vero repentinam inferunt Virium prostrationem, vel Lipothymiam, quatenus vel deficiunt in cordis motione vel contritione, & regendo corporis Machine non sufficiunt, vel quatenus sunt minus mobiles, volatiles ac activi, sequæ quasi obtusi, & compressi, vel quatenus sunt nimis mobiles, adeoque facili diffusibiles, itaque texture totum luminis interrupta intereant operationes Vitales; adeoque omnis repentina Virium debilitas causa vel vitio spirituum vitalium in sanguine, vel vitio spirituum animalium in systemate Nervoso contingat. Unde in omni Virium imbecillitate pulsus notabiliter alteratur, in malignitudine quidem, & peracutis vitium sanguinis, & spiritus vitalis annuit; alteratur vero in robore majore vel minore, vitium spirituum animalium offendit.

Dependens tanquam quidam circulus hic spiritus eorumque functiones à se invicem, ita ut spiritibus vitalibus pessum emittibus eum radice, inde diffusi evanescent, & eclipsentur spiritus animales; sicuti e contra his spiritibus evanescentibus itidem cessat. Prius v. g. in suspensum manifestum est: si enim constringatur Arteriae Carotides, subit quoque cessat sanguinis motus: Posterior in Apoplexia foris ætatis, in quibus cessante radio spirituum animalium simul quoque vitales Operationes evanescent.

Succedens ergo Virium Langore ex sanguinis deficiente in precordiis turgescit, oritur, unde etiam huius respectu pulsus minoris, rarioris & tardiores; sicuti hic depen-

dentes spirituum animalium defectus, debiliores existunt: idque frequentissime ex præternaturali sanguinis glutinositate aut visciditate, unde partes ejusdem saline adivas obtusæ, minus concurrere inter se ac fermentare possunt; vid. SYLVIVS r. l. Quod si in hac sanguinis glutinositate, uti non raro fit, peccet simul præternaturalis Acidum, tam in sanguine, quam Lympha, nihil hoc evadit eò deterius, cum sic magis magisque inspissetur, ac tanquam coaguletur massa sanguinea, exindeque vitalis ejus fermentatio tantummodo omnino aboletur. Hinc est, quod post Morbos acutos curatos, si tantillum in Dieta peccarint Aëri, speciatim in alimentorum assumptione excedant, Langores adhuc superveniunt. Hinc post Morbos Chronicos non rite curatos, in quibus spiritibus exhausta Massa Sanguinea spiritus quasi ac crassa redditæ sunt, Virium Langores sæpius sunt diuturni, quò nondum restitutus sit completè sanguis motus vitalis. Hinc & Cachectici, Hypochondriaci, & Corbatici subinde sunt adeò Imbecilles ut vitata, & anomala sanguinis fermentatione, propter vitiosum, & rancidum acidum in massa sanguinea tunc abundans, & massam sanguinem inspissans. Unde, quando horum sanguinis visumque inspissatæ, minus expanditur ventriculi cordis, pulsusque fit sunt rariore, tardiores ac minores; quibus his positæ necessarii etiam deficiunt spiritus vitales, & animales, ex quorum defectu majore vel minore etiam reliquæ functiones, tam vitales quam animales, plus minus solent immolari. Quare in Virium imbecillitate sensus sunt hebetes, imò viae suffocantes aut Motui voluntario, vel Motui naturali, speciatim legitimo cordis motui, unde pulsus est tenuis, & simul tremulus ac languidus; aut ubi sufficiunt quodammodo spiritus motus cordis, ubi tamen à gravioribus objectis in motu distrahantur, vel perturbantur, vel gaudent, uti fit ab aperiis, & Narcoticis, tunc necessario sequitur talis virium prostratio, & langor.

Hinc de virium imbecillitate sanguinaria, additæ verò Langores seu Lipothymiam, aut Syncope, aut Alphyasie, radicatas sunt in spiritibus vitalibus, aut animalibus, tunc conjunctim, nunc separatim, ita ut in suo circulo non deficiant, plerèq; labefactentur quoque. In *viscosis* quidem, quando plures deficiunt, ob cellassem in precordiis quoque de causa Sanguinis Fermentationem vitalem. Hinc enim *Evacuatio* quævis nimis, per quæcumque loca, v. g. sanguinis, item Genituræ, & similium humorum abundantius effluunt, cum absumantur spiritus vitales, sequitur Lipothymia, & Syncope; five sanguis reddatur per Nares, five per Uterum, five hæmorrhoides, Venæsectionem, aut alio modo: item nimis aquarum hydropticarum evacuatio, & Pericardii sacculi ex Thorace emissio, nimis *Sudor*, &c. Syncope inducunt: uti etiam crebriores *perpirationes*, halitus urinis, aut disturnitur in his moris, ob dissipationem spirituum animalium quodammodo Syncope inferunt: mutatio item substantiæ ex *Aire* fervido in nimis frigidum, aut etiam ingurgitatio *Puris* in eo nimis frigidum post indugem corporis incalcemientem, nunc Lipothymias inducunt: Exempli habet SCHENCKIUS lib. 2. *observ. 259.* ex BENIVENIO *capit. 27.* ubi observat Animi Deliquium seu Lipothymiam ex frigidissimo Vino hausto sub lingua usam habet ardentissimo Sole: & talia Exempli Syncope correptorum ex nimio calore, & frigore non sunt rara.

De *venalis* res nota est, quod eodem, five extrinsecus applicata per Morbum se pondum Animalium venenatorum, five intrinsecus assumpta quæcumque, graves se periculosos dent Lipothymias.

Pertinent hac vitia ipsius Cordis, præsertim ejus Abcessus, & partium ejus vicinarum, qui subit rupti dant periculosas Synopas: sic præter TULPIUM lib. 2. *observat. cap. 16.* qui habet Lipothymiam ex abcessu in sinistrâ cordis auricula, SANCHEZ, Medicus Hippasus, in *observat. pag. 373.* refert notabilem observationem du Bibliopola longo tempore Lipothymiam sæpe correpto, quæ mortuo, maxime in corde Apoplema, medium ejus partem occupat, inventum fuit; *Alius* *Postea*, refert idem, in *his cordis apoplema dimidiæ ejus magnitudinis habuit, unde & hic ipse quoque subinde Syncope correptus fuit.* Sanguinis quoque habenda est ratio, qui aut nimis precesit post copiosas Excretiones, aut pure vitium, aut subit coagulatus, v. g. ex haustu frigide post æstus, aut alia quavis ratione inspissatus ac incrassatus, & ob id fermentationi ac spirituscentiæ debet interceptus, aut in debito circulo impeditus, v. g. in Syncope Cardiacâ, funellam & periculosam Lipothymiam, & Synopem comitem ducit; vid. *infra*

suo loco, ubi de Apoplexia, ubi agitur de Syncope Cardiacâ quid sit. Quod vero sanguine ipsifeciente & coagulato in corde subitò totum corpus corruat, sit, quod non tam sanguinis Circulus necessarius sit ad sustinendum totum corpus, sed imprimis, quod requiratur continuus radius spiritus vitalis ex corde cum sanguine in totum corpus; hinc sanguine in syncope ita in corde stagnante, & non fermentante, adeoque deficiente plâs minus ejus motu, tam locali quam intestino, intercipitur âpul necessarius spirituum animalium, & vitium commercium, hinc negatâs omnes facultates, & ægri mortuorum instar corruunt. A *Vermibus syncope* vocant ZACUTUS LUSTANUS lib. 2. *prax. ad intern. observ.* 4. BONETUS lib. 1. *med. sèpente. foll. 16. cap. 4.* SCHENCKIUS lib. 3. *observ.* 218. PANAROLLUS *Præf. 4. observ.* 29.

Spiritus vero animalis Liphymias inferunt, quando subito deficiunt ex coram staxia & confusione, ab objectis externis inducitur: unde omnes Causæ Remotæ ad syncope disponunt, afficiendo vel spiritus vitales, vel fermentationem sanguinis impediendo, vel spiritus animales in ipsâ fenestria ita quidem, ut in genere vel idem opprelli, & quasi concentrati in sua adritate impediantur, seu fit in syncope ab externis oria, v. g. in subitaneo Terræ, vel idem dissipati, & subito resoluti evanescant quasi, ac ita in operando deficiant, v. g. in nimio Gaudio. Pertinet ergo hæc, quod ab Odoribus fortibus, gravibus, ingratis & similibus, ægri in Liphymias & syncope incidunt: Sic refert AMATUS LUSTANUS *præf. 4. observ. curat. 36.* de Monacho, qui ab Odore, imò vel solo aspectu Rosæ in gravem Liphymiam incidit, Functus Exemplum est, quod habet HOFFERUS in *Herz. med. pag. 111.* de puerpera, quæ noviter pepererat, & ex Odore strophiali, in quo involutæ fuerant Rosæ, subito Liphymia lethali fuit correpta. Hinc est, quod Fœminæ Hystericæ ex Odore Zibethi, Mofchi, Cinnamomi, &c. cum Passione Hysterica seu Hypochondriaca simul in syncope currant. Nec flos Odor, sed sæpius etiam præsentia rei horridæ, insensit Liphymiam ac syncope.

Pertinet hæc *Idiosyncrasia* nativa, secundum quam quidam certa animalia horrent, eorumque præsentiam ferre nequeunt: sic qui non possunt perferre præsentiam Felis aut cancrorum (quale ego novi exemplum) aut Marium, aut canum, si, licet illi incilici, in loco quodam talia animalia abscondantur, subito tamen illis Defectiones animi cum fudore frigido, & anxietatibus ingruunt, ob intensius affectus spiritus animales.

De animi affectibus, vel fortioribus vel malignis subitaneis, in Terræ subitaneo, & gravi Tristitia, Nuncio Imperato, Incrudia nimia, &c. res nota est, utpote quæ immediate systema Nervosum ac spiritus animales afficiendo, & diluiguit perturbando, inferunt syncope, & Liphymias. Ita du Gaudii subitaneo, quod evanuerint quasi spiritus animales, syncope lethalem abortant, præter LIVIUM, LOTICHIIUS in *observ. medicis*, & MARCELLUS DONATUS in *hist. mirab.* habent: Ex Timore abortant syncope periculoſam, per Venæsectionem curant, refert FONTANUS in *conf. & resp. p. 63.* Imò sola fortior ac intensior rei causidam horrendæ Imaginatio, & Cogitatio quoddam synopticos reddidit: Exemplum, quod imprimis huc facit, habet HILDANUS *rest. 1. epist. 34.* ubi refert de suo servo Equo insidente, cui cum narrasset calamitatosas fruges bellicas, ex sola narratione in syncope incidisse. *Nimius corporis motus, ac extremæ defatigatio*, similiter interdum in Liphymias inducit ægros, ut etiam graviores dolores, in his præsertim, qui sunt rarioris texture, adeoque spiritus rariores & facilius dissipabiles habent.

Denique *Epilepsia* paroxysmus subinde superveniens syncope est syncope, uti etiam illis affectibus convulsivis gravioribus: sive convellantur saltem partes interne, quæ dicitur à Mulieribus *Epilepsia in corpore*; uti v. g. fit in passionibus hysterici, aut in doloribus Nephriticis subinde gravioribus: sive simul etiam externe partes afficiantur, quæ spirituum animalium perturbatissimum innotant motum, Plura de causis proximis & remotis languoris vitium & syncope videb. in SYLVII *præf. 6. 34.*

Imprimis ipsi considerandum meretur syncope, quæ ex causa interna oritur, & sponte quasi subinde ægros frequentissime invadere videtur, de qua vid. CORRÆUS in *definit. med. pag. 157.* Hæc ordinarij solet habere causam affectionem Orificij Ventriculi superioris, quo magis affecto, ab Objecto ipsi inimico, ex consensu ejus cum

universo systemate Nervoso, Liphymias, & syncope supervenire solent. Manifestum hoc est non solum in Mulieribus Hystericis, sed & in Viris, qui aliquid Hypochondriaci patiuntur, his enim leve occasione Liphymias superveniunt, sub quorum insulso ordinarij dicunt: *Malum frustum appropinquare cordi.* Hinc Vertigo tales corripit, & ita lub forma suavis sonni Liphymia corripuntur; exsufficati dicunt: *gavis bene ipsi fuisse.* Pathemata hæc originem habere locum simpliciter ex stomacho, & primis viis, imprimique ex sensibili Orificio stomachi specifice affecto per cujus sensum omnia reliqua superveniunt symptomata, & spiritus vitales deficiunt, ita ut frequentissime syncope à causa interna oriundæ ex Orificio hæc affecto contingere soleant, & tales ægri fit ordinarij mutationem circa Hypochondria præcedere observare solent.

Ex *Lethæ regularis* Liphymiam observavit HEINRICUS ab HEER *observ. 15.* Ex *ita sanguinis* syncope notat ZACUTUS LUSTANUS lib. 3. *med. præs. lib. 1.* AMATUS LUSTANUS *observ. 1. med. præs. 39.* *Acres fœvis*, præsertim ægruolus, Orificium didum gravissimè infestantes, præter Anxietates, crebras Liphymias, præsertim in subæctis tenerioris, & rariores texture inferunt.

Tales *syncope*, jacentes in lecto admodum debiles, dolores, mortificationes ac titillationes, aliaque pathemata, circa stomachi regionem percipiunt; item præter insupportabiles illius loci motiones lub molestias lub imminentes syncope sentiant Vertigines, caliginem Oculorum, & renerbicitatem, unde sic animo delinquant: paroxysmus tandem iterum evanescit, utri usque occasione recurrit, & ægri vel leviter saltem in lecto se moventes, aut extra lectum promoti, incidunt in eundem.

Un frequent est hæc *syncope Stomachica*, ita etiam nunc per essentiam ex Contentis stomachi, nunc per consensum affectis partibus, aut servis abdominis, stomachum simul plâs minus affectibus, accidere solet. Imò vis Liphymia quæcumque corripit, quin lub eadem imminente alterationem quandam notabilem, vis etiam usqueabilem, circa stomachi regionem percipiat, in quo stomachus vel musculo humore, vel aliis visiosis Succis, per Pylorum ad Orificium superius regurgitantibus, eidemque impati laborat: aque plâs in casu Liphymia optimè Vomitu carbitur, ita enim remota causâ malum hoc cessat; vel Abhorrentibus terreis, quibus tamen adiunguntur aromatica: vid. SYLVIIUS l. n.

His omnibus ita consideratis, facile est pbservare: Causas *syncope* proximæ esse aut spiritus vitales, subito deficiences ob cessantem sanguinis fermentationem ac circulum, aut spiritus animales subito in Motu naturali deficientes; unde quasi abrupti, vel ad alias staxias, & convulsiones acti, movendo seu contrahendo Cordi minus fervore possunt, adeoque spirituum caloroso abrupto syncope supervenit. Hinc Causæ modò d. *Remotæ* omnes vel sanguinem, vel spiritus vitales afficiunt, vel cæu objecta sensibilia spiritus animales in Motu suo alterant: Ita ut ipsi spiritus.

1. In Motu debito, speciatim Cordis, aut deficiant, dum opprelli, & quasi opacitati in sua adritate impediuntur, v. gr. in subitaneo Terræ; vel dissipati vel resoluti evanescant, ac in operando deficiant, & sic Cor quasi Paralyti laborat: Vcl

2. In Motu quasi exarbitrat, & ex Irritatione quoddam, & inde natâ spasmus undecunque concitatus, Cor in continua Sythole seu constitutione detineat, ita ut sic continuus quasi cordis spasmus, & Convulsio à spiritibus animalibus inducitur.

Sane in Morbis convulsivis, præsertim partium internarum, non raro hæc ipsa est, unde in tali casu ægri ad se redeuntes conqueuntur: *fuisse ipsi, ut si quis Cor ipse compressisset, vel pedibus calcasset.* Id quod innuit validum Musculi cordis contrahitionem. Sic sanguinem, & spiritus vitales afficiunt quælibet Evacuaciones, mutationes subitaneæ: Aëris, sanguinis quæcumque infusio aut in Crasi, aut in Motu locali alterationes. Vicio vero spirituum animalium in Motu deficiendum oritur syncope post Odores graves, & Obiectis ex Idiosyncrasia hostilibus; item quæ stomachi Orificium afficiunt, ex ejuis cum universo Nervorum systemate consensu facilius spirituum animalium in Motu abrupto fit. Dolores etiam spirituum animalium ratione syncope inferunt. Neque etiam hic negli.

negligendum, quod asserit PISO Traill. de *Colliculis serena* pag. 166. dicens: Quod *syncope* *functissima* & *momentanea* *causa* sit *motus* *Cardis* *repete* *abstinere* *ad* *interceptione* *sua* *abstinentie* *Morbi* *Cardis* *morbi*, *unde* *omnes* *diurnas* *iste* *afficiatur*, *aut* (verba sunt PISONIS) *ex* *subleiti* *aquali*, *quam* *aut* *vacantur* *lympham*, *ex* *Cerebro* *re* *deserente* *deficiente*, *spirituum* *motus* *intercipitur*. Declaraturus haec suam sententiam Observationes aliquae raras & curiosas subnectit, & dicit esse quendam Cardis Apoplexiam. Gaudium nimium spiritus dissipando, item Dolores diuturni, pariter ex dicto fonte syncopen inferunt. Et ex his spiritibus animalibus, aut deficientibus, aut perturbatissimis fit syncope; five causa externè hæreat circa Cor, aut in Corpore Cordis Musculo; five fit in Valvæ Unde nunc quod spiritus animales dicuntur luminosi, qui conestato Lamine omnes Corporis partes continub illustrant, & ita ad suas functiones aptas reddunt: Vid. BARTHOLOMÆUS de *Luce Animalium*, & HELMONTIUS. Hoc lumine intercepto fit syncope, & à *Paracelsus* vocatur syncope *Xelpho*, *Microsym*, quia nempe deficit lumen vitale, corpus irradians.

Certum est, semper observari in syncope vitium sanguinis circa præcordia, & spirituum in motu & Nervis: Vid. STENO de corde.

DIAGNOSIS.

Quod attinet *signa* syncopes & Debilitatis Virium à per se manifesta sunt sitis. Cause tantummodò probè distinguende. Melius autem has non possit quis percipere, nisi ex Adjunctum relatione.

PROGNOSIS.

Quod *Prognosis*: distinctio faciendi subitanei & successivi Virium Langoris, ac quidem in his, qui *sua causa manifesta* sunt languidi, ac decrementum Virium patitur; in morbis inclinant, in specie ad scorbutica mala.

Reconvalescentes, præsertim à morbis gravibus acutis, diu adhuc languidi, vel Recidivam, vel cachexiam, & tandem hydropem vel Febres Intermitentes, in specie certianam Intermitentem incurunt.

In Morbi cujusvisque *Principio* præter manifestas causas mox summa Virium proveniens Prostratio; Maligni Morbi signum est, adeoque Morbus talis Febris Maligna appellari solet.

Syncope & lipothymia quæcumque est *periculosa*, plura minis tamen, prout magis vel minis aut est durabilis, aut deficit cordis motus: item prout Cause antecedentes graves vel leviores fuerint. Unde quando Syncopæzantes post exhibitam spirituum aromatum aut aliarum rerum Volatiliam; item post irrorationem Faucium cum Li- quoribus spirituosos & fortiter odoratis & stimulantibus, aut Faciei cum Aqua frigida, non resuscitantur, nec post præmia etiam ad se redeunt, in talibus signum est gravissimæ, & ob id periculosissimæ syncopes.

Syncope ex affectu *stomachi* Orisio sinistro minis funesta est.

Si adfuit Anæsthesia Præcordiorum & Inquietudines, omnes sunt ex stimacho.

Syncope, quæ est ex *affusione sanguinis*, *Genitura*, aut aliorum humorum quoruncumque, minis periculosa est ea, quæ oritur à causa interna, & non raro addita.

Quæ magis affligit Massâ Sanguineam, eo periculosior est syncope: hic post *Purgationes*, *Venaesectio* nimias, ut & *Hæmorrhoides*, solet esse funesta.

Tandem *sudor frigidus* syncopizantibus superveniens, quod magis glutinosus & copiosior, eo gravior & periculosior syncope est.

CURA.

Quod *Cura*: In *Langore* Virium *successivo* seu paulatim omnia est convenient, quæ vitalem sanguinis Fermentationem *promovere*, Bilem plius nimis peccantem acere, & ita sanguinis glutinositatem attenuare, simulque vim stomachi digestivam suo modo resiliare valent, id quod uno nomine faciunt *Volatilia* & *Aromatica*, distinctio continuanda. Aromatica enim sunt stomachi amica, acutæ Bilem; & Sanguinem ad volatili naturam & spiritualescentiam promovent. Pertinet ergo hæc Spiritus vini & Vina generosa, imprimis Clara & Vina Hippocratica dicta, vel ex Vegetabilibus Aromatibus ordinantur talia Vinâ medicamentosa, quæ subinde hausta Vires ac sensus reparant, & similia alia

Tom. II.

Anæleptica recentia. Dabo Exemplum *Noduli* talis infundendi in Vium in Langore Virium pro idem restaurandis.

℞. Merb. rosifmar.

Merb. crisp. ana M. i.

Salsola.

Melissa ana M. ss.

Rad. aceri veri.

Evale.

Feniculi ana unc. i.

Sem. a. Calid. min. ana ℥i.

Cinnamon.

Calybar.

Caryoph.

Maiz ana ℥i.

Incisa & contusa includantur sacculo.

D. S.

Nodulus ad Vium medicamentosum.

Affundatur *Vium*, de quo tubide haorist *Eger* *Jejunus*, item omni passu, poculum anum. Quoniam Vium imbibit successivè vires simpliciter aromatics, & Vires ex Morbo vel etiam Senio prostratas resiliare: Nam Vium tanquam Lac senum Vires successivè resiliare vallet.

℞. Merb. ros. Meath. vel Meliss. M. iiii.

Rosifmar. M. i.

Rad. ros. aceri veri unc. ss.

Angelica ℥vi.

Galang. ℥iii.

Sem. anisi.

Feniculi ana unc. ss.

Passal. min. unc. iv.

Incisa & contusa includantur Nodulo, qui infundatur in aliquot mensuris *Vini Rhenani*:

D. S. ut supra.

Vcl

℞. Fel. rosifmar.

Mayran.

Salsola.

Calaminta ment.

Meath. crisp. ana M. ss.

Rad. Angel.

Galang.

Aceti veri.

Evul. camp.

Fenuli. ana ℥ss.

Sem. a. Calid. maj. ana dr. ii.

Cinnamon.

Cabob. ana dr. i.

Contis. & contis. includantur sacculo, ac affundatur *Vini* ℥q.

D. S. ut supra.

Vid. SYLVIVS l. 1. *Præc. cap. 34. pag. 613. & seq.* Quod si adit Malom scorbuticum vel hypochondriacum, Volatilia acris, ut *Cochlearia*, *Negastrium*, *Armoricaria*, *Piperitis*, &c. commodè possunt addi: ac ut melius operentur, singulo haustu certa dosis Spiritus eujusdam volatilis, v. g. *Spiritus Salis ammoniaci anisati* gustu aliquo infillari poterunt.

Item *Essentia* & *Eluxoria* *stomachica*, *Aqua Vita*, *Applicata*, *Epileptica*, &c. talia Volatilia alia, *Elizir Proprietatis* *sue acide*, & fixentia talia, locum inventionis, ter quotidie usurpando, mane, à meridie, & sub introitu lecti quiescens non inconsultum videtur, etiam sub ipso passu talibus uti.

Quod verò attinet *Syncope* & *Lipothymiam subitam*: in hujus paroxismo opera danda est, ut *Ægri* quasi revocentur in vitam, Extra Paroxysmum autem Recidiva præcauda.

In *Paroxysmo* ad revocandum *Ægrum* ordinariè generosiora paulò & spirituosiora Remedia, quod magis talia, eo meliora, quæ nempe penetrant, & volatili spirituositate spiritibus deficientibus facile applicabilia sunt, simulque sensum Organâ fortius vellendo, spiritus animales aliquantulum resiliant: ac si quidem penetrantia salina volatilia, Alcalina vel Acida, primum obtinent, habita tamen semper ratione Causarum præcedentium: Illa ab Spiritus quæ obroti concentrantur, & à debite expansione impediuntur, ut spiritus Sales Ammoniaci, Liqueor Cornu cervi fuscatus, &c. Hæc, ubi idem facile dissoluntur & exolvuntur; hinc ex. gr. in Lipothymia ex Purgatione oimia, in syncope ex Venesectione, ex Vomitu,

Bbb 2

Balneo, & ha nimio, Corporis motu, &c. contrahit, Acidit volatilia, ut haustus Vini Rhenani, & Acetum forte, Laborum convallium, Calendularum, &c. Ori infusa, aut Naribus adnecta, sunt admodum convenientia. Accedunt etiam his spiritus volatilia oleosa, & salia volatilia oleosa, quae tamen caute usurpentur, quia non omnia Subiecta promiscue talia ferre possunt. Non ergo indistinctim Aquam Carbonicam & Balsama omnibus externe admoveamus, sed his tantum Subiectis, quae hanc & similia non abhorrent. Sic novi Mulierem, quae non Rosam, Virum, qui non Basilicon ferre potuit: ac proinde hae Subiecta horum usui, magis prostrata, quam refocillata fuissent; sic alium novi Virum, qui post assumptam Anabram incidit in syncope; sicut in genere systema Nervosum sensibus habentia Subiecta non possunt suavolentia perferre: Tutiora his longe salina penetrantia, sive illa Urinola sive Acida fuerint, praescribuntur. Attendendum tamen est, an syncope oriatur a spirituum animalium dissipatione ob Obiectum fortius eos commovens, adeoque a radi luminis intercepcione? an vero a spirituum animalium & vitalium oppressione & quasi concentratione? Ad hoc in genere tres Classes Remediorum in Lipothymia Analeptica in Praei vulgo sunt.

I. *Spiritus Salubres seu Olei*: quo pertinent omnes Spiritus inflammabiles Aromatici per fermentationem parati, Olea Aromatica destillata, tam simplicia, quam Aque Apoplectica composita, plus minus suaviora olentia. Quoad hoc punctum tamen caute, ut iam dictum, nonnihil usurpentur; cum non solum Mulieres omnes talia spiritus oleosa, Famula inepte vulgo dicta, quod Caput replere putentur, commodè perferre nequeant, sed etiam Mares plures, praesertim Literati, aut Iucubrationibus dediti, propter rationem ac subtiliorem Spirituum texturam fortius Odoriferi, sive suavior sive male illa oleant, non commodè ferant; cum talia nimis Spiritus vel sanguinem afficiant, unde vel Cephalalgiam vel Capitis gravitationem quasi ebriolam inde contrahunt. Alias tam interne quam externe sensum Organum admodum conducunt.

II. *Spiritus Alcalini*, Spiritus volatiles aquae urinosa & omnia Salia volatilia, &c. praestantiora, quae magis Oleosa prius reddita fuerint.

III. *Acida, volatilia acida*, in specie Acetum, quae partim sensum Organum potenter afficiunt, partim spiritus dissolubiles, ne omnia calidiora, praevaleant.

In horum tamen omnium usui sedulo ratio *Conferum antecedentium* habenda est. Sic enim ubi syncope erit v. g. ex *venena*, appropriata Aleciapharmaca addenda erunt, in quo causa istidem convenit Vomitus, ubi Venenum in primis viis adhuc latuerit. Ubi est ex *Pedibus Hystrici* aut Utricina, appropriata Hystrica, v. g. Zedaria, Calloctata, omnia salia volatilia, spiritus cornu Cervi succinat, spiritus Mellifici, carminativi de tribus, salis Ammoniaci &c. Quonia Effluvia *Menthae*, praesertim cum Castoreo, si terro quæst *Eger*, cum Aqua appropriata, ex. gr. Artemisiae &c. propinquantur; aut etiam Oplaris ad idem Malum praevaleant, ubi etiam tunc Naribus admoveantur appropriata; utplurimum quidem Naribus in syncope Hystrica, Fœtida ex castoreo & Aliis foetida, saporis sulphurei, Penarum ascensuum, &c. Verum in hoc finis cauti propterea, quia non omnes Mulieres aequè perferre possunt Graveolentia; utplurimum quidem sed non semper, & quo suo loco, ubi de *Morbis mulierum*, sunt enim quædam, quae a Graveolentibus leduntur. Unde optimum est, in Hystrica Passione, ubi non scimus genus Mulieris, an Snavolentia? an vero Foetida perferat? spiritum Salis Ammoniaci volatiliem admovere Naribus; hic enim Snavolentia & Foetida serenitatem conducit: tempore habende Causae Antecedentis ratio, atque in syncope non Frigidiora & Calidiora Remedia Aiscularum more attendenda, sed ea, quae sunt plus minus resectiva, adhibenda.

Imò in Syncope vitio *Stomachi* & vitio *Orificii fastidi*, aut etiam *admodum* cito, Vomitus interdum tunc post provocari, & semper adesse Indicationes Excrementorum evacuandorum; cum & hanc motu spontaneo ortum condixisse observaverim: Sic FORESTUS lib. 17. cap. 7. refert syncope ex Utero ex defectu Menstrui afflicto simul stomacho, per Vomitus curatam: FAER *Curat*. 16. refert syncope desperatam, per Vomitus, cum Aquis Cinnamomi copiosa, curatam. Confert ergo Vomitus materre subiectus in syncope Stomachica, ac ubi fomes Mali circa primas vias hæret, praesertim ubi Nausea

& similia symptomata urgent. In casu, quo non tam reholuati quae oppressi aut inordinatè agitati spiritus videntur, excitat quoque tales Aegros vomendi coactus, ac quasi in vitam revocat; & licet Adhaerentibus terribilibus videatur, Medicus tamen hoc in casu si nec timendum nec tumidum exhibeat: non illud, ne mora inconsiderata Aegrum pessundet; non hoc, ne Aegrum spiritus evomere cogat. Ubi ergo signum certum est, vitium à stomacho, & Vires non attritas, sed validas adhuc esse, optimum erit, ut blandus & medicosus influatur Vomitus.

Hoc ipso Vomitionis actu, ne Animo deliquant, Odores penetrantes, imprimis Vini generosi, Naribus admoveant. Quod si Vomitus non aequè tunc videatur, Clyfma paulo acius inijcere non verabit; & propinquant Praecipitantia ita dicta, quae figendo Effervescentiam Humororum sibi: quibus tamen adiungatur *Aromaticis*. Hinc Corallia, Magisterium Corallorum cum succo Citri paratum, Lapis Bezoar in doli generali ad 35, Ebor præparatum cum vel sine igit, adde aliquot guttis Olei capillum destillati, vel Succini, vel Auri, vel Cinnamomi. His enim Syncope imminens praevaleat, donec opportune laboria vitiois ex optimis viis evacuari possit.

IV. Adduntur his Oplata medicosæ docti, in scopo nempe ultimo supra memorato, spirituum nempe aut dissolubiliorum, aut in impetus convulsivos proniorum, impetum silientia. Subinde enim fit, ut ex irrequiete nimis spirituum animalium motu, indeque ortis Delirius, aut Agrypnia, aut etiam Motibus convulsivis, iugens Virum imminuat Prostratio. In tali casu ex Opio ritè parata Remedia sunt divina auxilia, si appropriatis aliis Remediis miscantur.

Quæ ergo conveniunt in syncope, Resectiva & Analeptica dicta per ceteris forte primario Vinum generosum, Cinnamomum, Aqua & Oleum destillatum eius, ac omnia ex eo parata, in specie ejus Oleum (vid. HELMONTIUS de Petri, med. c.) Aque spirituosæ, v. g. Aquæ Apoplecticae quælibet, Spiritus Liliorum convulsivum per fermentationem paratus, spiritus Theriacalis, tam simplex quam compositus, Oleum destillatum Caryophyllorum, item Balsama Apoplectica & Cordialia, item Salia volatilia quæcumque, Spiritus cordis Cervi; Liquor cornu Cervi succinat, id est, spiritus cornu Cervi effluvia, & sal volatili succini debita proportione unitos, qui est elegantissimus: Nam succinum, Sal volatile & Oleum destillatum succini, aliquot gutturaliter vel granosum pondere exhibuit, admodum potenter roborat syncopeos, imprimis simul concurrentibus infatibilibus Epilepticis, aut insultibus Hystricis. Spiritus Rosarum per se est egregium resectivum. Quod si verò talis spiritus Rosarum ambratus, id est, si fermentetur Ambra cum Rosâ, fit exinde spiritus Rosarum ambratus potentissimus & elegantissimus; nam fermentatione Ambrae cum Rosâ ejus compages tecloditur, ut postmodum cum spiritu Rosarum sordidum raptæ per spiritum elegantissimum. Ambra enim, & omnia ex eadem parata Remedia, summum sunt restaurativum spirituum animalium; unde non tantummodo usurpantur in Venereis armat, sed præterea quoque senibus decrepitis moderato oia mirè conducit: unde Confectio Alchermes, quam ingredientur Ambra, potenter resectivè, imprimis si aliquot guttæ Olei destillati Cinnamomi addantur: item Effluvia Ambrae cum spiritu Rosarum, aut, quod melius, cum spiritu Mellificæ parata, ad guttas viij. vel x. in Aqua Mellificæ exhibita, cui tamen præterito spiritum Rosarum ambratum. Quod si his sal Viperarum aut succini probe depuratum addatur, vires relinquat Medicum & Aegrum. In specie RUDOLPHI II. Imperatoris constantissimum Medicamentum Cephalico-cardiacum, ipse ab ELISABETHA, Angliæ Regina, communicatum fuit ex Ambra, Moicho, & Zibetho, adidit spiritum Rosarum, Vitrum gillavit hermetice, quod elivio tempore in terra seduit.

Præterea quoque Citrus, Elisii Citri, vel spiritus Citri acutus sale volatili cornu Cervi, (quod semel pro semper noto) in Aqua appropriata exhibita similiter conveniunt: in specie Quinq. Effluvia dicta Vegetabilium Aromaticorum, Quinq. Effluvia Mellificæ, Angelicæ. Quibus, notæ sunt Eschebrechii Chymice parandi ex Vinum Oleum fere Quinq. Effluvia Vini, cujus mississimâ gutta Lingua admolet totum Corpus quasi fulmine penetrat, & est sal volatili subtilissimum Vini in oleiforme corpus concentratum, li habebat melius levamen in Syncope. Effluvia Cordialis D. Michaelis ex Vegetabilibus spiritualibus cum spiritu cordis Cervi est egre-

gia. Effentia Croci rectè PARACELSO dicta, summa Cordis læntia, insigniter landatur. Paratur hæc effentia croci per Aquam vitæ, Menie Martio ex Pampinis incisè destillatam, vel etiam cum Spiritu appropriato Medillæ, aut Rosarum parata, est efficacior. Hujus Effentia, si gr. i. vel alterum salis volatilis addatur, fit Medicina præclarissima. Tinctura seu Effentia Castorei, speciatim in syncope hysterica & hypochondriaca, convenit. Tinctura Coralliorum cum spiritu Cordis Cervi parata est elegans, imprimis post sanguinis, aut alius utris Socci excretionem, unde etiam puerperis post partum exhibetur pro reparandis viribus. Tinctura etiam Solares, ex gr. Tinctura solis cum Oleo Cinnamomi, tam MYNSICHTII in *Armanetario*, quam etiam D. GANZLANDI, egregia sunt. Verum vires potius Oleo Cinnamomi tribuendæ, quam Auro: ut ut enim per Salia insigniter dissolvatur Aurum, non tamen totalis est ejus reclusio, ut sulphur absconditum fiat manifestum; facilis enim est Aurum construere, quam destruere: Adde ut Menstrua quidem in his fere egregia, admixta tamen atomi Auri parùm operentur; qui verò potest parare veram Auri Tincturam, isti concedunt suum gaudium. Aliquoties facta sunt mentio Salium volatiliū, nec immerito: Hæc ipsa sunt magis appropriata, si sunt Oleosa, & summi Aromate impregnata, i. e. si artificiosis conjungantur cum Oleis Aromaticis destillatis, quod per se non potest fieri; beneficio tamen spiritus Vini, quod de utroque, nempe salis volatilis & Oleo, participat. Imprimis spiritus Salis Ammoniaci benè rectificatus, conjunctus cum Spiritu Vini rectificatissimo aromatico, & hoc oleosus insus, dat talem Mistruram, Sal volatile oleosum admodum elegans in Syncope, aut Virium subita prostratione. Fuit Medicus, qui frigidos, & Calore passivo jam quodammodo destitutos, haustulo Elitixis Vitæ Martialis, in quo grana aliquot Salis volatilis Viperarum dissoluta fuerint, se retracturum confidit; Vid. SACHSIUS in *Ampelographia* pag. 511.

In genere *Volatiles* horum Remediorum sunt Aqua Medillæ cum Vino, Aqua Pulegii, Cinnamomi simplicis vel cydoniata; Aqua Vitæ sive Quinta Effentia aut, ut alii vocant, Elitix Vitæ Martialis, item Aqua Cordialis Hære, Sæcenæ, Aqua Carboncelli, Aqua Cordis Cervi, Aqua Vitæ alba *Drosdenium*, quæ est optima, Aqua Cordialis calida *Myntschii*: In Mulieribus Aqua Hipundinum cum Castoreo, &c. quibus etiam Camphora, spiritus Theriacalis camphoratus, & similia, pro meliori stimulo commode addi possunt.

Quoad *Acida*: spirituosum ac generosum Vinum, Succus Citri, fuscus aut syrupus rubi Idæi, Conserva pulvæ Citri cum Elethuario Dialcordil, Acetum simplex vel Acetum Bergardicum, Florum Calendulae, Liliorum convallium, Florum Tunicæ, Sambuci, Caryophyllatum, Rutaceum, &c., in Aceto infusum Castoreum, &c. usurpantur. HOFFERUS externè commendat olfactum Panis recentis, cuius odorem omnibus Aquia perlati longè præfert BECHERUS. Regioni Cordis admovent HARTMANNUS Saeculus ex Melissa, irroscatos cum Spiritu Vini.

Quoad *Opata* denique: præter Laudanum opiatum *Holmeitii*, ex Opio cum succo Cydoniorum fermentando paratum: in parva dosi Theriaca, Mithridatium, Estrachum Theriacale, aut his cognatæ Compositiones, administrari possunt: v. gr.

Quint. Inf. cinnam. ʒi.

D. S.

Tinctura Cordialis ʒo. guttæ pro 1. dosi.

Vel

ʒi. Tinct. Corall. cum Spiritu, tora. Cerv. ʒii.

D. S.

Tinctura Cordialis pro 3. vicibus.

Vel

ʒi. Aqu. Medill. cum Vitis ʒi.

Appl. ʒvi.

Cinnam. cum Vitis ʒiii.

ʒi. Amb. vel confect. Alchem. ʒi.

M. D. S.

Potio Cordialis cochleatim capiendæ.

Vel

ʒi. Aqu. fragr.

Rubi Idæi ana ʒi.

Tinctura Sali ʒi.

Mentis parlar. prop. ʒi.

Confect. Alchem. ʒi.

M. S.

Mixtura Confortans pro aliquot vicibus.

Vel

ʒi. Aqu. Rubi Idæi ʒiv.

Tinct. Sali ʒiii. vel ʒi.

M. S.

Mixtura Cephalico-Cardiaca.

Vel

ʒi. Aqu. Medill. cum Vitis ʒiii.

Quint. ʒi. Mentis ʒi.

Confect. Alchem. ʒi.

Syr. ʒi. Tonicus ʒi.

M. S.

Potio Cordialis pro aliquot vicibus.

Vel

ʒi. Aqu. cordial. Hære. Sæc.

Cinnam. ʒi.

Medill. cum Vitis ana ʒi.

Spir. Theriac. simpl. ʒi.

Elitix. vel Sæc. Citri ʒi.

ʒi. Amb. ʒi.

Syr. de cort. Citri ʒi.

M. D. S. ut supra.

Vel

ʒi. Aqu. Rubi Idæi ʒi.

Cordial. Hære. Sæc. ʒi.

Spir. ʒi. convall. dr. ʒi.

Salis Ammoniaci dr. ʒi.

Syr. ʒi.

M. D. S. ut supra.

Vel

ʒi. Aqu. Medill. vel Rosar.

Fusc. ana ʒi.

Liqu. cit. cor. Cervi ʒi. dr. ʒi. ad ʒi.

Syr. ʒi. dr. ʒi.

M. D. S. ut supra.

Vel

ʒi. Aqu. Rubi Idæi ʒi.

Acet. Theriac. dr. ʒi. ad ʒi.

Spir. Citri dr. ʒi.

Syr. Rubi Idæi ʒi.

M. S. ut supra.

Vel

ʒi. Aqu. ʒi. Samb.

Borrag. ana ʒi.

Sæc. Citri rec. ʒi.

Spir. Rosar. dr. ʒi.

Syr. rubi Idæi ʒi.

M. D. S. ut supra.

Vel

ʒi. Aqu. ʒi. Borrag.

Engell.

Rubi Idæi ana ʒi.

Cinnam. dr. ʒi. vel unc. ʒi.

Sæc. Citri rec. dr. ʒi. vel unc. ʒi.

Conf. Alchem. dr. ʒi. vel loco hujus Tinct.

Corall. ʒi. vel dr. ʒi.

Corall. rubr. prop. vel Margarit. prop. dr. ʒi.

ad dr. ʒi.

Syrapi. cinnam. vel alius unc. ʒi.

M. D. S. ut supra.

Quoad *Extrava*, Naribus, Temporibus, pulvis, Labris, & Ierobisculo Cordis affricanda, sunt fere similia, vel Spirituosa, Aqua carboncelli, Liliorum convallium, Balsamus Apoplecticus, &c. Oleum Carboncelli, Cinnamomi, Cetri, &c. Præ cæteris utilis est Oleum Succini, Caryophyllorum & similia. Item admoventur Naribus spiritus Salis Ammoniaci, aut similes acrior, Acetum Vini, Acetum Florum Tunicæ, &c. similia, Succinum solum sub forma suffusæ, Naribus excipiendo, adhibetur à R. ULANDO, qui diei, se longa experientia in omni ætate & affectu reperisse Lipothymicos refocillatos ex accenso Carabe, aut ex Oleo Carabino Naribus illito, aut una alterave gutta cum Aqua appropriata Ori infusa: Vid. *Theaurus* pag. 177. de Muliere mortua sere & frigida, quam Oleum succini restituit. N. R. in *Succino multa lavas*.

In specie etiam in Syncope & Lipothymia ex *Evacuacionibus* quibuscumque, speciatim nimis purgationibus, quæ sunt frequentes, imprimis conveniunt *acida* quæcumque, in specie succus Cydoniorum, Theriaca in Aqua Cinnamomi uspurata, item Extrachum Theriacale in Aqua Cinnamomi, & Mixtura ex Aqua Menthae, Spiritus Theriacali

riscali simpliciter vel camphorato, & Confectione Alchor-
mes, aut Aqua Cinnamonii, in qua Theriaca & Confe-
ctio Alchermes fuit soluta, conveniunt: nam hæc sunt
preparata. Spiritus Vini rectificatus cum Ambra &
Moscho aromatizatus commendatur imprimis à F. A. B. R. O
in ejus *Pathologia*: sicut & hæc dicta opuscula erant in &
post nimium Vomitus contra Lipothymiam.

In syncope ex nimio *Sudore*, *Æstu*, *Labe*, *Exercita-
tione*, *Tracundia*, *Candide nimia*, aut Odoribus ingratis,
conducunt *Acida*, *Apotom*, succus Citri, Vinum, succi
Vegetabilium, aut Julepi Aciduli, Elixir Citri acidula-
tum.

℞. Conf. acetosell.

℞. Citri an. ʒi.

℞. Tunicæ ʒss.

℞. Rob. rubeum ʒvi.

℞. Conf. Alcherm. dr. iij.

℞. Syr. nitri. citri, vel rubi M. q. l.

M. D. S.

Saccharum Cordiale.

Imprimis contra alterationem ab ita, premisso, si o-
pus sit, Vomitorii, in specie si post Incuriam, Alimen-
torum facta sit assumpcio, convenit Mistura SYL-
VII *Prax. Lib. I. cap. 28. §. 22.*, item Mistura *suprà* c. 3,
Præleg. Artic. 2. Membr. 2. pro Acido temperando. In mo-
tu Febri Ardentis Malignæ ex nimia ita, hinc sorti Ma-
trunc, & potu, aliquando præscripsi.

℞. Rbor. fusc ignis gr. xv.

℞. Specif. Cephal. ʒss.

℞. Camph. gr. ii.

M. D. S.

Pulvis Cephalico-cardiacus.

Vesperi accipiebat.

In syncope *Febrim Malignam*, ex irrequieto nimis
spirituum animalium motu, indeque ortis Delirio, aut
Agrypnia, aut etiam Mutibus convulsivis, camphora in
gausa quantitate cum Laudam opiato conjuncta, & aliis
appropriatis addita, Spiritus animales nonnihil legit, & ad
erectum motum redigit; quo periciat & syncope ex Fumo
Cui narcotico, e. g. Opil, *Liquorem effervescensium*, *Carbu-
nem*, &c. orta; quo casu Acetum Calidum imprægnatum
perperis pollebit.

In Syncope ex *Terrore*, nimis *hemorrhagis*, *Tristitia* ni-
mia, &c. Cinnamonum, spiritus oleosus, spiritus Vini,
Aqua Vitæ, Aqua Carbanoli cum salibus volatilibus, ut
spiritus cornu Cervi &c. acuta, in specie Salia volatilia
oleosa, conducunt. Etiam graviores in syncope Venæ apo-
pæ, & aliqui sanguinis detractio liberum motum
huc conciliat, non inconsultum est: Nam non semper
synopsis nec sanguinis detractio: id quod confirmat
ZACUTUS LUSITANVS lib. 2. *Prax. Adubr. Observ.*
235., ex *Morbum semper supressum syncope gravis Venæ
Saphenæ scissio curata*: Conf. SYLVIVS lib. 3.
Prax. cap. 3. §. 22. & cap. 10. §. 69. Contra *Morbum*, *su-
bitumum Terrorem*, &c. confect. Mistura SYLVII *Prax.*
lib. 2. *cap. 28. §. 22.* Item

℞. Aqu. Fl. Samb.

℞. Cera. nigr. an. ʒi.

℞. Lil. convall. cum Vin. ʒi.

℞. Rbor. fusc ignis dr. ss.

℞. Sal. volat. corn. Cervi ʒss.

℞. Syr. Card. bened. dr. vi.

M. D. S.

Potio Cordialis per aliquot vicibus.

Quod si ex nimia Sanguinis excretionis, v. g. nimio Men-

strum fluxu, Syncope imminet, Opiata v. g. Acidis sociata
sunt optima, additis corallis preparata.

In Syncope cum *Epistaxis*, *Pessum hysterici*, &c. juncta,
conveniunt imprimis salia volatilia, ut jam dictum.

In syncope sit ex *Prostratione*, ut in *Hæmophobis*, &c.
Si syncope sit ex *Prostratione*, ut in *Hæmophobis*, &c.
Acida proderunt; impositus *Æger* supinus pavimento,
ac Sale communi affricetur ejus Labia & Lingua; vel
granula quedam Orit imponantur; & pro præcavendo
eadem ante Venæsectionem capiatur Ovum fœrale, vel
haustus Vini aromatici, vel Julepsam, & hinc in Dorso
cubantibus Venæ aperiat: Loco salis communis aut a-
liorum Remedium, fuscendo HILDANO, Urina hu-
mana vel bovina utiliter usurpatur; ita enim rostitui huc
in passu *Ægros* expertus fuit; vel Acetum applicetur
Naribus, & affricetur Lingue.

Illa & similia, Internis pariter & Externa. usurpari
possunt.

Ad Synopem *Senam*, imprimis ad Lipothymiam &
Virium Imbecillitatem ex defectu Spirituum Senibus
obviat, TIMÆUS habet egregium Millazum sub forma
Opiatæ.

℞. Rosal. Manus Christi perlat. (corpus) ʒiij.

Torturæ in mortario marmoreo, affunde

Olei Cinnamon. gr. xi.

Mastic gr. ii.

℞. Caryoph. gr. vi.

℞. Nock. mosch. gr. x.

℞. Essent. Amb. crocat. gr. xviii.

℞. Vell. aur. Weidenr. ʒi.

℞. Spir. rosar. gr. xi.

Mellif.

℞. Citri ana gr. xi.

℞. Conf. alcherm. ʒi.

M. ex aqua.

Dosis quantitas Avellane seu Juglandis.

Vel

℞. Ambra gr. vi. vel Mosch. gr. vii. vel viii.

℞. Solvo in

Olei dissilat. Cinnamon. gr. xi.

℞. Cardam. gr. viii. in. ad ʒss.

℞. Margar. præp. ʒss.

℞. Sacch. candi alij ʒi. ad ʒi.

M. f. Pulvis.

℞. Hoffmanni Clavis.

℞. Confer. Flor. Anthos.

Tunica,

℞. Salvia, an. uoc. ʒ.

℞. Conf. alcherm. ʒi.

℞. Amb. gr. ʒ. v.

℞. Mosch. gr. iii.

℞. Laud. opiat. gr. ii.

Com. Syr. Fl. Tunicæ f. Elechmarium.

Irroretur cum aliquot guttis Olei dissilat. cinnamon. &c.

D. S.

Elechmarium confortativum.

In Istudine Pedum

℞. Fel. Vitis.

℞. Salvia,

℞. Symp. an. Mil.

℞. Cap. papav. cum Sem. No viii.

℞. Incis.

D. S.

Species ad Balneum Pedum.

Decoqu. in Aqua simplic.

S E C T I O XVII DE NUTRITIONE LESA.

JAM ut pateat connexio cum superioribus, præsuppo-
no, quod sanguis in Præcordiis perfectus & turg-
escens, ex sinistro Cordis ventriculo transferatur tan-
dem per Arterias Aertæ ramos infusos in totum Corpus
ad singulas partes, quæ ipso tum illis nutriuntur, semper
sanguis in genere sic dicto, tum etiam ex eodem liquo-
re humanæ Oeconomiæ conservandæ aut utiles aut in-
utiles portiones separatur, utpote sunt Urina, Lympha,
Bilis, &c.

In genere ergo sanguis distribuitur ad partes, ut eis
nutriat, id est, ad particularum sensum ab ipsis succeden-
tium aut pereuntium separationem, ut & in luvante,
earundem ad majorem molem & magnitudinem excretio-
nem.

Operationes autem Machinæ corporis respiciuntur con-
servationem ejus vel in *Indivisione*, vel in *Spis*: Illæ vel
respiciunt *Æge* *visas* simpliciter, vel *Æge* *Animals*: unde
ad tria generalia Capita omnes Corporis Operationes, seu Fun-

etiam diffinitur usque ad Sanguinem; idque vel vixi-
visum lachrymum in Intestina quantum nobiscorum, verbi
 gratia in Passione Coeliaca, quam *sapra* habuimus; vel
 vixi *Pluri* a Vomore scitibus obstruere, ut *amurunt*
 SALMUTH *Centur. 1. obsv. 20.* & HOCHSTED-
 TERUS *Dec. 5. Obsv. 3. ab. 6. 28.* vel vixi *Glandu-*
larum Meicenterii obstruere, hinc insigniter tumescere
 & tandem scirrhoriam, & plus minus fluctuam
 (hæc enim se invicem ita inolepantur) Chylis transitum
 non concedentiam, unde necessarii Corpus emaciatur.
 Exemplum hujus non sunt pauci: Sic HILDANUS *Centur.*
1. Obsv. 5. evasit Puellam tabescentem Appetitu
 minime privato, idque ex Meicenterii vitio, Tumoribus
 scirrhoris & fluctibus multum repleto: & HORSTIUS
lib. 2. Obsv. 5. similiter Exemplum habet Atrophie ex
 Meicenterii vitio, Tumoribus scirrhoris & fluctibus mul-
 tum repleti: & HORSTIUS *lib. 2. Obsv. 5.* similiter
 Exemplum habet Atrophie ex Obstructione Glandularum
 Meicenterii. Facit hoc etiam, quod refert BONTIUS
de Med. Induram cap. 12., quod nempe Atrophie seu
 tabescentia Indis regionibus quoque familiaris & epidemi-
 ca sit quasi, idque ex vitio Meicenterii, nempe ejus Ab-
 scissibus corruptis: Nec Tabes adeo decantata in Anglia
 aliunde habet originem, quam ex Meicenterii Glandulis scirr-
 horis & fluctibus; id quod Anstome taliter affectorum
 confirmat, ut GARENZIER in *Tractatu de Tabo*
Anglica aliam suggerat originem. Infantulis imprimis &
 Junioribus satis frequens est Atrophie ex hac causa, nempe
 vitio Meicenterii: Vd. SYLVIVS *lib. 1. Præ. cap.*
24. §. 56. HORSTIUS *lib. 4. Obsv. 24.* HILDANUS
Centur. 1. Obsv. 70. & Centur. 2. Obsv. 4. SENNER-
 IUS *lib. 3. Præ. Part. 5. Sect. 2. cap. 3.* PANAROLLUS
Pentet. 5. Obsv. 10. & BARBETTE in *Præ. Part. 3.*
cap. 3. ubi de Intestinum Doloribus, item in *Anat. Præ.*
Part. 2. cap. 24. pag. 87., in qua refert, frequenter Infan-
 tes, raro Adultos, Atrophie colpiti cum Vultu tunc
 tumido & inflato, & Doloribus compressibilibus, vitio Meicen-
 terii, degenant Chylis transitum ad debitam distributionem:
 sicut etiam Maciem 1. Receptionis lumbis & Ductus
 thoracici angustia & compressione, testatur FERNE-
 LIUS *lib. 5. Pathol. cap. 12.* & BARTHOLINUS de
Lætitia thorac. cap. 14. Quo etiam pertinet Lumbi Chylum
 in Intestinis contrahentes, item quando cum vel sine
 Sanguine Chylis convulsatur aut consumitur, uti verbi
 gr. in Vulneribus ac Ulceribus manibus, Lactatione nimia
 & diuturna, nec non Mictione chylis, qualem DRA-
 WIDIVS *Tract. de Scirrhoris Sect. 9.* & TIMÆUS in
Gulielmo lib. 3. Cap. 4. annotant.

3. Deficit Nutritio, quando Chylis, licet Sanguini per-
 mixtus, & plus minus assimilatus, nimis tamen cum eo eva-
 cuatur. Quo pertinet nimis quæcumque Sanguinis effusio,
 sive fiat per Nares, sive fiat per Uterum, sive, quod sæpius
 fit, per Hamorrhoides, sive per nimias Venæsectiones:
 Nam tales Sanguinis evacuationes & excretiones multum
 depauperant de Rore nutritio, in quo non possit non sequi A-
 trophiam. Nec excludenda sunt Medicamenta Purgantia
 & Sudorifica fortiora, cum Massam Sanguinem nimis
 solvant, evacuent, & sic Corpus emacient. Facit hæc Mo-
 tus corporis nimis per Glandulas cutaneas sub forma sud-
 oris rurem nutritium etiam exhaustum: item ob eandem
 causam Efflus nimis, qui liquefaciendo succum nutri-
 tium, eundem successe depauperat: item fluxus alvi
 nimis copiosus hæc pertinet: Vd. BORELLUS *Cent. 2.*
Obsv. 64. ubi refert de Atrophie & Macie post sumptum
 Phlogicon, indeque orta Hyperæsthesi, Abortu, &c.
 item fluxus Febrium colliquativi: item Gonorrhoea Vi-
 rorum, tam vera quam notha: item Fluxus Urinisque albus
 Mulierum, aut copiosus aut diuturnus. Mulieres tandem
 ad Atrophiam ac Maciem disponent, uti exemplum habet
 GUARINUS *Cap. 105.* Ulcera cariosa & fistulosa in Ar-
 tribus, verbi gratia in Genu, Atrophiam inferunt, ab-
 scissione partium cuticularum: Vd. HORSTIUS *lib. 3. Obsv.*
20. Nima denique Venarum tabidos reddit Mares, quæ
 cum spiritibus mediante Genitura fuerim nutritium ex-
 haust: quale Exemplum habet ZACLIUS LUSITANUS
lib. 3. Præ. adm. Obsv. 100. qui etiam pertinet
 affectus novorum Maritum, qui vocatur *Tabes Dorialis*,
 vel alio modo *Hectica novorum Maritorum*, quando hi ipsi
 nempo ad rem Venærum nimis sunt intenti, tandem suc-
 cum seu rurem nutritium nimis exhaustando successe
 ad talem Doris Atrophiam deducunt. In Tabo tali Dor-
 sale, quæ frequenter inolepant Venærem, successe
 Macie Dorio extenuantur, processus spinales prominent,

& sensus verniculatioms cum aliqui titillatione subit
 per Dorium medium decurrente percipiunt. Exemplum non
 sunt raro, videbitis apud SOLENDANDRUM *Cent. 5.*
 item apud TULPIUM *lib. 3. Obsv. cap. 24.* item, ZACLI-
 UM LUSITANUM *lib. 1. Præ. adm. Obsv. 100.* sed
 in specie de hac *Lumbago* & *Tabo Dorali* vixi. SEN-
 NERIIUS *lib. 2. Præ. cap. 15.* ubi de *Tabo Dorali*, & hinc
 WILLISIIUS *Pharm. Rat. Part. 2. Sect. 1. cap. 2. pag. 21.* De
 hac Tabo Dorali ex Venærem abusu orta singulari est,
 quod habet LEMNIUS *Obsv. pag. 100.* quod hæc nempe
 Tabes Dorialis, licet semel curata, solet tamen subin-
 de per Periodos septemtrionum recurrere, & Maritus insig-
 niter affligere. Duplex HIPPOCRATI ejus species est:
 vel à Diffinitione in ignem, vel à Genitura, aut hinc am-
 pli Leguminis capimine & excretionis, unde & Gonorrhoeam
 quamvis serò inolepant.

Hæc sunt Atrophie ora ex defectu Nutritionis.

Altera Causa erat Atrophie orta ex vitio Nutrienti &
 Vitium Nutrienti Atrophiam inferens est, quando hoc
 vitium est, nimis temperatum, sed nimis asperum, aut
 acre, aut salum acidum & quasi muraticum, aut alio vi-
 tio peregrino inprimis; sine inceptum est, ut utriusque
 Corpus: id quod fit dupliciter.

1. Propter vitium Nutrienti in Stomacho & pri-
 mis vitiis Digestionem.

2. Propter vitium Nutrienti geniti, vel per se
 boni in massa sanguinea, tamen atque plura mi-
 nus viciata, Corruptionem.

Conspiciant hæc duæ Causæ non raro, ita, ut in Tabo
 confirmata per circulum quandam se mutuo intendant, &
 ita malum ex gravius reddant: verbi gr. Animi Affectus
 diuturni Corpus similiter emaciant, ut sunt Iracundia,
 Terror, & in specie Tristitia, Pocus frigidos post nimiam
 inalebescant, item post iram, &c. Nam hæc Pathemata
 partim sanguinem turbant, partim ex improviso obve-
 nientia & Digestionem primam alterant & viciant: sit
 eorum proflant Exemplum Hominum, his ex Causis Tabo
 correptorum. Stomachum quodattinet: in hoc, uti funda-
 mentum legitime Digestionis, ita & insipiente Causa Ta-
 bi & Atrophie hæret, quando scilicet alimenta sub Di-
 gestionem corruptionem, quæ non in Chylum subtilem
 nutritium, sed in viscosum salum-acrem ac muraticum, ac
 plus minus viscidum aut ferum immutantur: quod vi-
 tium sæpius est apud ipsa vitia Assumpse, verbi gratia in
 Picis, inolepant, aut insipiente vitio Lymphæ salivæ,
 stomachi Digestionem turbantibus, & fermentum ejus vi-
 tiosius, oboritur Tabes: aut denique accidit ea ipsius fer-
 mentum, vel etiam succorum in primis vitiis Tabæ successe
 contracta, & tandem via amplius emendabili; quatenus
 ea, quæ naturaliter fluida, illud consistere debent, im-
 pressis, Spiritus, Sanguis & Lympha, in eras sua viciata
 existunt. Quod frequentissime hæc Tabes, etiam Pthiisus,
 ex vitio stomachi male digerentis, fidelissime inolepant
 LINDANUS in *Comment. ad Præd. Chylis, Harmonia-*
li, qui dicit: quod illa Tabes, quæ vulgo à *Cataractis*
dicuntur, aut à *Diffinitionibus capitis* produci, sit simpliciter
 ab *aristotela* & *visciditate Sanguinis & Lymphæ nata*,
 propter errata Digestionis primæ in stomacho, vel etiam
 succorum in primis vitiis; quod vitium vocat eruditatem
 putridam, ad differantiam Cruditatis acidæ & acidulæ:
 vid. BARBETTE: quoniam nempe per hæc Alimenta
 corruptum, & in Chylum acidum salum seu murati-
 cum, similique viscidum, degenerant. Quis Pthiisus
 talis ut maturatus prænotatur, se eundem quod *Ægri*
 talis, frequentiter, etiam sine omni causa externa, aut sal-
 tem cum levisima, de summa Læitudine congeneratur,
 cum Appetitu maxime decreto, pusillimum Cæsum flac-
 cescent Mufcali, ad Tiffin subtilem saporem in Ore,
 & Murium non esse salinem: quæ *aristotela* à *Visciditate* *arist-*
otela, dicit LINDANUS. ab *aristotela* putrida, &
 ubi primam malè radicem esse: Hæc putrida melleum cum
 Chilo, & de fructu in Sanguinem, quem inquinant sua
 vitia, hinc hærent in Pulmonibus, quæ aerisima sua
 filana simulat ad cerebrum Tiffin: unde & in princi-
 pio, cum vellicetur à Saliva salia Larynx, Tiffinica te-
 ruitur, & ea coarsculi Pulmones seu in intumescunt, &
 Phlogist contrahunt, donec Vascularum aliquod erodit-
 & fiat Ulcerulum ralem sensimque erodens, ac pe-
 fecta tandem supervenit Pthiisus. Vixi ergo talis Stom-
 achi inguinaria Massa Sanguinea fit nimis salis, item Lym-
 pha similiter salis progreditur, unde tam prævi sapes
 percipiuntur illi Ore; pulmodum interrogati *Ægri*, an non

Supo

faporem aliumq. habeant? præter hæc acrimoniâ, salâm conq. solent de fap. cinereo, quod est signum iam incipientis corruptiôis esse Ulceris in Pulmonibus; deinde conq. ut de fap. Carnium & Piscium patridorum; tertiâ vel quarta post p. h. ora, vix Manus incensæ sent, percipit circ. præcordia cum gravitate sensu car. quidam, ac pulsus semper celer, & frequentior, est, Tussis exasperatur, & Respiratio fit difficilis, ac alia æque v. fida exsp.antur. Tales fit periculis, necessarii Tabem & phthisin pulmonalem contrahim. Hæc lps. derivantur vulg. à Destillatione Capitis, seu Catarrho; sed malè: prae- alme dependant ab acrimonia Sanguinis, & Lymphæ quasi emuraticæ; Pulmones & loca vicia afficiunt, fomes v. fidi Morbi revers. causit in stomacho, ejulque vitia Digestio; abolebit enim imminuta Chylificatione totum Corpus alimento defraudatur, ut exting. Tabes ac Marasmus mercedus fit necessarij. Nec deinde Exemplâ alios apud Prædicos talis n. Tabi vel phthisicos vicio hominis; vid. imprimis SOLENERANDER *Cent. 5. sect. 1. & Cent. 15. sect. 1.* ubi exemplum habet totius Corporis esp.iationis ex malè affecto Ventriculo; BARTHOLINUS *Cent. 5. Mif. 38.* item in POTERIO non pauca exempla reperietis Tabem & phthisicis ex affecto Ventriculo substantæ, *Cent. 2. cap. 61. & 93. Cent. 2. cap. 3. 70. 71. & 78. Cent. 1. cap. 85. & BARBETTE Praxis lib. 2. cap. 1. & alia loca, in quibus stomachus accular in phthisin, depravat alimenta, & in acrimoniâ salâm ac merulicam transfusum, Est fano in præxi quotidiana nulla Tabes aut phthisis, quàm hæc, frequentior & familiarior esse solet.*

tor et familiariter esse societ.

Item, etiam, occasione etiam necessaria vicatim distribuitur. Chylus, salis labellibus, fit Atrophica usq. Tibes, quando, sanguis quocunque modo a debita cras- sedicit, in fœcile fallus, aut acido-fallus-acris, et phlogismi- variarius redditur, aut alio quocunque vitio inquinatur, adeoque ineptus est, ut nutrit: & hinc populi Febres, tim continuis Ardentes, quam Intermitteutes malè curatas, inquinantur Lentæ & Hæcica, Tabem inferentes, partem ex acrimonia acida fallæ, partem junda visciditate liguinis & Lymphæ: Hinc febricitans fœpida laborans Tabæ & Atrophie, ex acrimonia fallæ febricitans: Nutri- mentum cõpõris inquinatum: Id quod etiam in Malo Hypochondriaco confirmato familiare est, usq. in ipsi Malo pro- grediente in Atrophiam incident, partem ex vitium di- proclitionem primam, partem preter vitium ipsius liguinis. Pariter & Menstruæ recentia, & Lochia suppressa, vel Atrophiam inducunt, aut improprietate sanatur: Atrophiam habundè Inducunt: (confer, etiam BARTHO- LI- NUS Cœm. 2. m. p. 15.) & que sine aliis cãmplexibus, Malum liguinæum diversè modo inquinatum, que Nutri- tionem impeditur valent.

Quoad *Cantharis vesicatoria*; Mucosae quippe Medicamentis acris immixtis, & interceptis uisceribus inferre late-
bras, v.g. Sella trivialis & volatilis, & Ammoniacum
vitae, & galli ascorionis flos Maffam funguicant nimis
soluunt, particulae solutae, praecipit terreas, per
Diaretem & Diaphoreticum exantur, flegus Corpus mate-
munt. Alpe si incofultu fuffuratur, ad regnum lentorem,
Mucosae intestinalis vifum acie hinc immutat, tan-
dem Tabera inferit, vid. PECHLINUS de *Furunculibus*.
Pertinet haec imprimis, quando talis crallio de viciis
duri, & in Lympa digredida & paribus impel-
penda deficiat, v.g. propter Febres diuturnas, Haemorrhias

gias uimor, aut sanguinis evacuationes. folioſiores ſuppreſſas, ex. gr. Herimoroidum, à quatuor flazis ſuppreſſis, non ſecus ab eorum fluxu nimio. Tabem crebro ſibi HIPPOCRATES *lib. 3. Aphor. 5.* uoluit. Imprimis Tabes oriri ſolet, quando Maſſae ſanguines ad Dyſterialm degenerat, *uiſi Paris euſuſam ſolida nobiliſſima*, propter ſui malam conſtitutionem in functione ſolida deficientis, aut etiam Abſceſſu aut Ulcere afficiat. Tali in caſu non ſolum ipſum Pu, ſed et Viſcus ulceratum, non amplius ſanguinis debet in functione circa ſanguinis conſervationem. Malum eo deterius reddit: quod etiam facit Pu. ex Ulcere cuiuſdam partis genitum, & cum Maſſa ſanguinea permixtum; quod ipſum Pu ſanguinem vitiat, putredine infecte, eumque ſalutem, acrio, & gtuſtioniſm reddit: uſe de talis ab Viceris cuiuſdam viſu quouis inflammare, ac ſpectum exacerbarione, Maſſaque linguaſca inſeſa, nq. Tabes in ſpecie pthiſis appellari ſolet.

ARTICULUS II

De Pbrbif

[illegible]

«Ceterum licet phthisis ea Ulcere variis sit, quoniam, verò, *Pulmo*, propterea omnibus partibus internis tam ex-
positus est, ut *Aspiris* Acoris, et, a quibus insigniter laedi
potest et solet, ipsi etiam tametsi *Intestinis*, *testiculis*, et
scilicet in *linguis* laedi possit, variis recrementis, et
equilibris scilicet aberrantibus exiliis: hinc etiam ea omnia
partes, frequentissimè Pulmo vitatur et excruciat, et
perit: ut, *Aspiris*, *Phthisis* dicuntur illi, *Aspiris* *Ulcus*,
et *Phthisis* laborans, sive *Ulcus*, sive *Induratio*, sive *Materna* quæ
fit in hoc uti, non *Ulcere* collata ferit: V. d. B. A. R.
THOLINIUS *Hepat. Aspiris*, 5.6, pag. 666. FERNELIUS
lib. 9. Pathol. cap. 11. SEVERINIUS *de Remediis alibi*, *lib. 2*,
cap. 16. TIMÆUS *de Glandulis lib. 6. Epist. 1*. WAR-
THONIUS *Anatom. cap. 21*. et WEPFERUS *de Affectioni-
bus*, cap. 114. Cum phthisis hæc temper sit simul quæque *Pulmo*
afflicta, la quacunque parte sit *Ulcus*; qualis *Hæctica*, de
inde *Tubercula*, contingunt etiam interdum *Ulcercibus* partium
externarum insignioribus. Si *Pulmo* suppuratus sit, fecerit
tunc fordidum *Ulcus*, quod magis magisque inquinandum
gignit: Tabem admodum exasperat, quæ etiam valent
in phthisi *Renali*, *Jecorali*, et c. Cum enim per *Vitæ*
continua circulator *Ganglia*, hinc facile in labem adducitur
potest, eandem *Vitæ*ribus, in specie *Pulmonibus*, affricare
potest: Cui etiam ex supposito *Mesenterio*, vel *Afflicto*
Mesenterio observata fuit *Phthisis* ab HORSTIO *lib. 1. Ob-
serv.*

Definite, ex

P. media.

Alimentis privis, in Pica.
Distributio Chyli impedita.
Chyli exhaustio.

Stomachum rale digerentem: Hoc pertinet omni Tabes, quæ
vulgo Cachexia adscribitur, de qua WILLISIUS Phlegm. Ac.
Part. 3. pag. 907. Clamat.

Sanguinem corruptum, Chylum inquinantem, in Dyscrasiam biliam, acrem, et muricantem degenerantem.

1. Es vitio Digestionis primæ.
2. Es Intermittentibus & Continuis male curatis, adeoque Hecticam inferentibus. &c.
3. Es Scorbuto Diathesi ac Hypochondriaci.
4. Es Purulenta cujdam Ulceris Sanguinem inquinantis, hinc Phlegmæ.

Phlebotia Palmanalis & *Femica Palmanum*, cum qua saepius confunditur, in eo faitem differunt, quod *Panica* sit *Ulcus Palmanum* vixitum sine *Alephio*; contra *Phlebotia Palmanum* est *Ulcus foridum*, ex *Alephio* nam aperte gignit. Nam in *Vomica Palmanum* sine eorum abiectione est pus purum, albidum, crassum, laudabile, leue & aequale, quod ipsum interueni sua membranis inclinum ciura excretoem in Pulmonibus haeret. Verum, ubi Pus tale non expurgatur, degenerat variè à propria natura in varias lodes ac finies acidio-viciadas, & tunc supervenit *Ulcus foridum*, quod confirmatur dat *Phlebotia*.

Probè autem hic observandum: quod inter *Phthisis*, uti frequenter et *Pulmonalis*, frequenter esse solet ejuſdem *Exacerbatio*. Ad præter hanc & aliam causam. Viscus Pulmonum vitiatum, Phthisin inducere valet; adeoque non solum exacerbationem Pulmonum, sed etiam quamvis eorum labem insigniorem, ob usum eorum ad sanguinis ejectionem & constitutionem vitalem summè necessariam, ad Phthisin disponere eorum est. Ut adeò rectè *Phlegm Pulmonalis* definiatur in genere *exacerbationis* totius corporis ad vitium Pulmonum nata, non solum exacerbatione, ut communiter ferri solet, conanda cum Febre lenta, difficili Respiratione & Tussis: Sic & Pulmonum corrugatio (de qua supra) Tabem potest inferre; non sicut ac si aliq̃d peregrini in Aperam Arteriam fuerit illapsum, et in Bronchiis hærescit, tunc eandem irritando ad Tussim continuam, succellere constitutionem & hinc fædationem Pulmonum ita lædere potest, ut Tabem demum cum Febre lenta inlar Phthisis superveniat; unde hæc *Phthisis* Austera appellatur, quod extra Pulmones exiit: Sic ex Nucleo Austera in Pulmonem illapso Tussim continuam cum Emaciatione totius & imminente phthisi videt, apud BARTHOLINUM *Comar. 3. Observ. 121. et Cræc. 3. Observ. 27. pag. 197.* Pariter ex Nucleo p̃mi in Aperam Arteriam illapso phthisi perniciem interalemi videt, in M. A. N. C. *Ann. 4. et 5. Observ. 34. pag. 26.* Plura exempla ad institutendam cautelam circa phthisin observanda videt in M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 31. pag. 56. et Ann. 3. Observ. 221. pag. 151.* SYLVII *Præf. 3. cap. 24. et HOECHSTEDTERO, item MARCO AURELIO SEVERINO Tr. de Phthisi. notis pag. 266.* Sic contra pulmones exacerati sine phthisi observati fuerunt: vid. KERKRINGIUS in *Epistol. Anst. not. 73.* Item M. A. N. C. *Ann. 3. obs. 94. pag. 223. et BARTHOLINUS c. 3. MUR. 16.*

Partes de affinis sunt palmones, five cum, five sine Ul-
cere.

Frequenter autem *causa Remota* huius Uleris phthi-
sici, (la specie phthiſis pulmonalis, sunt variae, nempe
vel *Interna*, vel *Externa*. Haec *Lymphæ* exſiſtit imia
ſanguinis, & exinde natiſcitur *Lymphæ* acrimonia ſaſſida
metuſtica, & exinde natiſcitur *phthiſis* pulmonalis, quæ à Ca-
tarrho ſeu diſſolutione vel deductione ex capite vulgo o-
riri dicuntur, à multo alio etiâ, niſi à ſanguine & *Lymphæ*,
& huius ſuccorum acrimonia varia, præſertim catarrhoſa-
li, quæ natiſcuntur à ſpiritu Arteriarum Tuſſim exa-
ſcitata ſua acrimonia ſua ſubſtantia pulmonem erodit. Sa-
piens autem hæc ſymptoma in Digelione Venerioli vitata
ſolventur, ponit.

Acromionia hæc præbent per Guttur: nam quæsciscun-
que laboramus Ulcere in Ore, toties maturo Ulcere dis-
rupto, percipimus saporem æmulantem Cafæ antiqui; &
hæc ipsa Materia purulenta demum producit symptomata
recitata in definitione.

Inter omnes vero Extremas Remotas fornicata plura non raro Ulcerationem pulmonum, & hinc phthisin induunt: verò, grat. Vulus Thoracem & pulmones penetrans, hinc in Ulcus degenerat: Cautius loqui Causa ab alto, indeque sanguis in quodam Thoracis loco grumulosus, pulmones opples, eundemque acrimonia sua facile erodunt, ut hinc visceri: Luxationes Vertebrae: Clavies fornicatæ, Angustia spuum ut plurimum, si non semper, & similes affectus, & de spum Pulvis pulmonum & phthisin perdifficiliam poti se trahunt.

Uterius phthisis pulmonalis alio Morbi non raro superuenit; sicut id videmus post pleuritidem & peripneumoniā suppuratā seu malē curatā, & Haemoptylia, quae saepius phthisin pulmōi se reliquant. Peripneumonia enim seu Inflammatio pulmonum, si non curetur, antequam sanguis

signans diffeſtatur, fit ex inflammatione ſuppuratione, & conſequenter in pulmonibus exulceratio. Quia verò omnis ſanguis per pulmones tranſire acceſſum habet, ſequitur, in exulcerata pulmonibus inibi totum maſſam ſanguineam uide cum ſucco nutritio chylo. Hinc dicto modo infecta maſſa ſanguinea taquam à fermento quopiam peregrino contrahit fermentationem præternaturalem, ad eam ipſi commiſſus nutritius ſuccus corpori nutriendo eodam incommoſus, quo factò necellum eſt, ut totum corpus tæſtat. Quia verò præterea omnis materia purulenta continet partes æſe, ſequitur, hæc acrimonia puris vellicare aſperæ Arterię Bronchia, ita ut his vellicata, irritentur ad Tuſſim. Cæterum quia pulmonum ſtrutura pure aut conſumpta aut oppleſta, fit inepta reſpiratori, inde accidit difficilis reſpiraciō. Variæ etiam & Morbæ non raro phthiſin in pulmonibus inferunt. Ulterius Acie incrementis, Vapores acidi & corrosivi Mineralium, Aquæ fortes, &c. huſui ab Operantibus Chymicis ſeu Metallicis, Vapor Calciæ vivæ, &c., non raro ad Tabem ac phthiſin diſponunt uſuæ & Aquæ fortis odor ac vitalitatis ab HELMONTIO dicitur, ut ſimplicis inſpirati Tabem & phthiſin pulmonalem inferat: uſu Glyſti & Calcem præparantes pierumque phthiſin moriuntur, ut rûdè obſervat LUſITANUS *Com. 4. Obſ. 41.* Pores Vini nimis acidi & tartari erubuit ad phthiſin diſponit: hæc enim teſte HOFFERO in *Herc. Med. pag. 112.* in Moraviæ & Auſtriæ Provinciis propter Viuæ acidæ tartareæ cerebrui hæc Phthiſis quædammodo *Endemiæ* exiſtit. Item Aceti nimius uſus corrumpitque Pulmonem inducit, cum Reſpiratione difficili & Dolore pectoris circa Alperam Arteriam. Faciunt hæc Aciditæ & omnia Vitrioliata quorum frequentior uſus eoſ qui debiliſſimos ſunt pulmoſum, ad phthiſin diſponit. Fumus Nicotianæ copioſius hauſtus ad phthiſin pulmonalem diſponit; Pyrus frigidiſſus pot localitatem corporis pariter eandem inferri vid. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Obſerv. 110.*

Diaprepes hibernicus Mull. cf. *phibius* palmaralis, quod, aeneis peris pro traduce femininam in aeternum transpallens. Hiberniam notatam narrat LINDANUS in *Harmonia*, de Cive Eochluice habitante, nomine Augeria Palla, cujus ortum patens ex Tab. & phibius fuit noctuus: post horum interitum prima filia incidit in phibium, quae enitida tabida mortua est, hinc filia secunda natu similitur tabeticulis moritur; post haec tertia natu experiri fatum. Propterea Augeria Palla peregrinas inter visitat regiones, ut tempus ellet in castris, ne id fatum experiretur, & peregrinatione coacta & Aetris munitior, mulierem auerit.

Contagiosa quæ admodum est exasperata pulmonum phthisica confirmata, & febricit phthisicis aschæta sanum, dum forentum Uterica contraximus, aut per Halitum quoque Corporis et precordii expiratum, aut per Sputum de sinu expulsum et propagatæ, & pulmonum aliam similitur infectæ, & ad alveolum vel Uterum disspati. Hinc Liberum cum Perostibus, Confortis & Conjugis cohabitantes, sibi invicem facili hoc malum communicant, potissimum si in his vel minime ad Lichidii dispositionis naturalis fuerit, aut Diutæ erroribus vascet. Exempla Contagii phthisici videlicet in RIVIERII Præf. lib. 17. cap. 17. Centar. 2. *Obfer.* 35. & 99. Et etiam Centar. 4. *Obfer.* 93. observat phthisicam propagatam per Contagium in Mulierem, quæ Mammis viri phthisica laudans præbatur: quæ Mulier lubide postmodum forem infecto quæque: Item BARTHOLOMÆO lib. 1. *cap.* 46. Item S. V. L. VIUS de Phthisi §. 70. NERNON SCHEUCHZERI in *Obfer.* pag. 256. cæ BAPTISTA MONTANO refert, ad contagia effe Phthisicorum spata, ut Medicus lubide olfaciens eadem prunis iniecit, et inde factus fit phthisicus: Idem cæ FRACASTORO lib. 2. de Morbis contag. cap. 9. refert, Phthisicorum veses ab aliis gellatas, post biemum etiam idem Contagium propagasse in alios. Ac non mirabile hoc videri potest, si verum est quod refert PANAROLLUS *Pænet.* 2. *Obfer.* 69. expulsum sputum et confirmato Uterice pulmonum ecretum ad virulentum & malignum esse, ut Mucos illud gulfantes infiar Arterias intermar: Interim tamen hoc Contagium non est ita adivum, cæ Febrium Malignatum.

Phthisis sequitur <i>Ulcus</i> : idque vel	Partis Externa, in Artubus insignis, partim Nutritum absumens; partim Sanguinem inquinans.	{	Frequentior Phthisicos species est ex <i>Pul-</i> <i>monibus</i> .
Casus. (Conf. WILLI- STIUS Ph. Rat. Part. 2. pag. 33.) vel	Partis interna, vel pulmonum, vel Ratum, vel Mesenterii, vel Hepatis.	{	Hinc Sanguinis Sputum.
Externa	Inspirata. Contagium. Assumpta varia. Vitiolacea.	{	Sanguinis & Lymphæ Acrimonia: vulgo à Desillatione citri dicitur, effluas Stomacho. Inflammatio pleuritica, & peripneumonia.
	Internas		
Varietas. Hæreditarium malum. Conformatio. Vid. WILLIUS Pharm. Rat. Part. 2. cap. 39.		{	

Hæc de Natura & Causis Tabis in genere, & phthisicos in specie. Pergo ad Signa.

DIAGNOSIS.

Signa Atrophis seu Tabis jam facta Diagnostica sunt facillima, & per se clara: sed terò & difficulter potest curari; facillimo verò difficulter cognoscibilis, & quæ facili curatur. In Tabis incipientibus Corpus semper æquum emaciatur ac tabesit, hincque Virum imbecillitas sensim se lentum supervenit, donec in confirmata succedat Tabes, prout faciem dictam *Atrophiam*, (cuius descriptio aliis per se est nota) Colit in Thorace protrudent? Cartilago Eniformis incurvata apparet, scapulae alarum ac Claviculae arcuum insular prominent, Dorsi Spina se exsert, Venter collapsus contriductusque apparet; Clunes pendulae sunt, vel omnia contumpe; Cura, Brachia, Pedes, Manuque cum Digitis arida spoliata, & circa Articulos protuberantiae actuali videntur; Ungues curvatores, Pili excidunt, Cutisque flaccida & corrupta existit; Venæ intermin prominent undique conspicue & livide, Corporisque universum tumens non transparens & pellucidum in quibusdam observatur: uti Hilaria hæc graphice SYLVIO lib. 1. *Prax. cap. 37. in specie 37.* exhibetur.

Præ cæteris dignoscende iust *Causis phthisicos seu Tabis*, & (1.) quæ in *spiritum animalium* vitio & *Allumini* delectu Tabem inferri per se facile patet, imprimis ex examine causarum antecedentium, & adiutorium Symptomatum syndrome: Et. grat. ex Tabes, quæ quodam Glandularum Mesenterii vitio, & consequenter ex denegata Chyli distributione accidit, Abdomen inflatum ac tumidum cum dolore in ejus profundo obtulo ac plura minus gravativo; itemque cum renitente bloc inde sparsa duritie, circa Umbilicum observabili, habere solet: Excreta, liquida, aut chylosa excremantur, & scilicet Corpus emaciatur: quæ omnia innuunt, vitio Chyli denegati oculi Atrophiam. Sed (2.) longe magis negotium est cognoscere Tabem ac subsequenter phthisin, ex vitio Nutritum, circa quam ad tres causas fontes imprimis attendendum erit:

1. An Tabes sit ex vitio *Digestionis Stomachi?*
2. An ex vitio *Sanguinis* ad Nutritionem inepti?
3. An ex corruptela ulcerosa emulsum partis internæ, in specie *Pulmonum?*

Equidem Causæ externæ, vel affectus varii procedentes, qui alterando sanguinem, vel vitando Chylum, ad eam Tabem disponunt, ut & symptomata concomitantia & similia, partim ab eorum signis specialibus, partim ægri relatione, aut ex ejus Vite genere patent.

Præ cæteris tamen inquirendum, an vitio Stomachi oriatur Tabes? Nam utur hæc Causa subinde se insequatur, ita ut vitium Stomachi, sanguinis & Lymphæ sequatur Acrimonia, & hæc tandem pulmonum Ulcus, interdum tamen etiam separatim existerit observantur.

Ex Stomachi esse & dependere Tabem innuit, si præcesserint Causæ ex rebus non-naturalibus, quæ ad Digestionem primæ labefactionem disposuit fuerint, v. gr. Cura nimis, fræcunda nimis, &c. item si in principio inflationis Stomachi, rufescentia Abdominis, angustia Præcordiorum. Ructus cineroti, quando scilicet ita depravatam

est Ventriculi Fermentum, ut ejusmodi Odorem spirantes res Ructus percipiantur, & alia symptomata Stomachi quoad appetitum aut quoad Digestionem præcefferint.

Alia, quæ immediatè sanguinem afficiunt, hujus lesionis coniecturam faciunt, v. gr. quando Ulcus in quodam loco sanatum comitatur phthisis pulmonalis: Sic ex Ulcere pedis sanato phthisin lethalem observavit THIERMEYER *Caus. lib. 2. pag. 15.* Nempe à Fermento Ulceris una cum sanis aeris per illud evacuari solita retentis, cum sanguine hinc inde circumscriptis, & in pulmonem dispositis. Malum atroxem cepit.

Facit hoc ipso *Helix* *Agrosum* plura minus ad phthisin & Atrophiam dispositum: nempe quotidiana constat experientia seu observatio, succulentos aut Obesos minime evadere phthisicos, bene autem Macilentos, à Natura plura minus attenuatos. Horum nempe sanguis minus temperatus, minus ductis, & minus oleosus calidus, adeoque minus nutrit: Econtrâ acrior, asperior, & salior esse solet, facilius incalescent, unde tales minus bene nutrii observantur.

Phthisis, quæ à *Visceris Interni* *Exulceratione*, vel alio vitio dependet, facillima, quæm ejus Causæ, cognosci potest, cum in horum vitia nulla occurrant signa pathognomonica, aut plures plurimum eorum Anomalia concurrant; adeoque Causa harum primaria & prima determinari non possit, imprimis si *Excreta* animalium non manifestent: ex. grat. quando phthisidem consequitur de Doloris, Tensionis, aliusque abdominis symptomatis, calligi quidem potest, quod aliquid abdominis Viscus afflicti sit, incertum tamen adhuc malet, an Intestina, an Mesenterium, an Pancreas &c. primario affecta sint? nec, licet pars affecta dignoscatur, de morbi formalitate mox constat, an nempe scyrrhus vel Hydrops, vel Ulcus, &c. subit? Næc *Excreta* morbum ejusmodi oculum semper manifestant, dum ex. grat. Pulmo, qui propter frequentem Cruoris aut puris reiectionem suppuratus putabatur, ioteger: s. Hepar verò maxime consumptus deprehensus fuit: vid. SCHNEIDERUS de *Catarrhis lib. 4. cap. 3. pag. 103.* Interim tamen, ut probabilis coniectura de phthiside ex hujus Causa nobis constet, pars affecta colligatur ex symptomatum ipsi adiutorum presentia, & Loco affecto seu dolente, utur nec symptomata ejusmodi semper generat, quæ nos ad partis affectum cognitionem ducant, imprimis cum de hujus & illius Visceris usu primario nihil coram adhibe nobis constat, duntaxat: An verò hoc vel illud Viscus exulceratum sit? *Amplius passim in Puris rufissimis*, qualis si non observetur, de scyrrho vel alio simili vitio, ex. grat. Hydropis, coniecturandum, utur nec omnium Viscerum Exulceratio, propter situm profundiorum & vicium excretorium defectum, puris reiectione se prodas. Frequentissima phthisis est pulmonalis, circa quam inquirendum, an à Causa externa, verb. grat. Inspirationis? an ab interna oriatur: & si ab hac, an affectus secundarius sit? Id est, si pleuritidem aut sputum sanguinis sequatur, affectus antecedentis ratio imprimis habenda est: Si verò est affectus primarius, tunc illa est phthisis pulmonalis, quæ ab Ulceratione ejus ac Desfluxu Catarrhali, ut vocant, oritur. *Hæc male sic dicitur phthisis Catarrhali* *radix seu virus est in Visceribus male digerente, progressus in Sanguine aut Lymphæ ejusdem acido-in-*

sis factis in Pulmonibus, uno alterove ejus Lobo, ejusque Vesiculis & Cellulis plius migis eros. Unde in Loco erosus Ulcus supervenit seu suboritur, cujus Fermentum Nutrienti prouti corruptum existit, unde Sordium, Saniel & Puris generatio, ac mediante Tussi succediva excretio, donec vel ab illis Sordibus suffocentur Aëri, vel erosus & absumptis maximam partem pulmonibus sanguis debita in crasi deficient, nunc mediante Diarrhœa colliquativa, nunc mediatis Tumoribus pedum oedematosis Mortem inferat.

Hinc, ut maturè præcognoscatur hujusmodi Phthisis ex vicio Stomachi oriunda, quippe que communissima est, & a Veteribus Catastrô à Capite deficienti falsè adscribitur, ejusmodi Mysterium, ne fiat confusio in lectione prædicorum, enarrare placet, & est talis. In tali Tabe nempe, Aëri ordinari, nunc cum præcedenti Erratè aliquis in vobis non-naturalis, vel Curæ nimia, vel fræcundia, ab ingurgitatione Potus, aut simili, vel etiam aliquis tali manifesti Erratè, de Virium labefactione enqueri incipiunt, cum Appetit plûs minus desitit, non saltem Carnes abhorrent; hinc tempore matutino, dum ex lecto se levanti, de Sapore in ore peregrino conquiritur, qui tamè primò solum esse extraordinariu, nec adeò sensibile, postmodum verò Saperem Salisum in ore percipitur, sub quo ipse magis magisque præternaturè appetitur, successivè Tristitiam Tunc agnoscit, quas subito levit Tussicula, sed arida & sicca, insuperat, idcirco negligitur, sentientesque fluctuantem phthiasis curam in Artibus: male magis progressæ, conquiritur de Sapore patris ciceris, aut de Sapore Carum & Pissum patridum, in tali casu semper Radix Mali in Stomacho quærenda; Tussis sicca, sed in qua remissa solum aut aqua respicitur, successivè si aspera, impetiosa nulla, aut saltem post lecti introitu, cum Sanguinis & Lymphæ impingementum ostendit, cui Tussis sicca desiccat, pûs minus Respiratio supervenit, aut cum Vesicula Leota, ipsi Aëri ferri insensibilis, solum ab omni passu, præter angustia & genitalibus sensum eras præcedit, levem quandam Calorem, specialiter in Manibus, extraordinariè percipiunt. Interim tamen, quocumque tempore sentitur Tussis, semper citius, frequenter, plûs minus parvus, pseruari solet: incipit exhorre candida tenuis, qua successivè dum in copia augetur. Præcedente male exasperatur Phthisis, dum non tantum calor post passum augmentatur amabiliter, sed aliquis Sudor necturæ copios supervenire solent, Tussis augetur in die, supervenit excretio copiosa Materie varis, primò viscida albida, hinc successivè viscida flavida, interdum viridis, hinc Materie livida, tertio superius exhiçitur, tandem genitum Pus, nunc cum, nunc sine viscidis Sanguinis aut excreti: quo in casu pars Exaceratio pusis conjungitur, impetiosa Pulmonis, supervenit: quæritur continuò Tussis hæc Tussis, præternaturè & magna, vesperi minùs, mox pars Materie corrupta excretur, hinc Phthisis, diffusibilis Respiratio, Corporisque instabilitas magis magisque insuperant, nunc cum Virium omnibus successiva labefactione.

Observandum autem hic phthisis, quòd Tussis phthisicorum non statim sit Pulmonalis, sed ferè in principio sit Stomachalis, cui tandem acrioris Lymphæ occasione per Glândulas Alperæ Arteris aut pulmonum excreta Tussis pulmonalis supervenit. Deinde attendendum eù, Tussis pulmonis Erosio aut Exaceratio observata fuit: non ita quavis phthisis aut Exaceratio Pulmonum Tussis adit, quæ interdum citra insigniorem Tussim insigni pulmonum Erosio aut Exaceratio observata fuit: vobis. KERKINGIUS in Spiritu. Observat. 72. tunc tantum est Tussis, quando Exaceratio Pulmonum facta à puraliora Materie acri Brachia solent irritari, licet Vomica Pulmonum sine Tussi existere queat, sicut Exemplis probat SCHNEIDERUS. Sic quoque relictum Pus frequenter quidem est ex pulmone, non tamen semper, etiam cum Tussi sit; quæ etiam Pus in Uteribus aliarum partium, pulmonibus salvis & illatis, per sputum expurgari potest. Exemplum aliquod habebis in SCHNEIDERO lib. 4. de Catarrhis pag. 103. de quodam pro phthisic habito, qui copiosius pus, & sanguinem tussiendo rejecit: aperto Corpore post Mortem pulmo omninò sanus, Hepar verò exaceratum & puru-

lentum repertum fuit. Nec mirum hoc esse debet: ut enim pus ipsum, y. gr. Pleuriticum suppuratorum, interdum per Alvum, interdum per Urinam rejicitur: & uti pus ex Ulcere Brachii per Urinam excretum observavit PARÆUS; ita simili ratione Hepatis, Renum, & aliarum partium suppurations etiam Excrementa purulenta mediante Sanguinis circulo in pulmonibus secerantur, ut mediante sputo ac Tussi ejici possint. Sic puris Sputum Menstruum sine phthisi videtur in M. A. N. Sc. Ann. 1. Observat. 54. pag. 113. item BARTHOLOINO Comar. 4. Hg. 17. Repellit Puris & Crasis sunt Signa Pathogenæ phthisis. Alias non mox præsentem Febre, difficili Respiratio, rejectione Materie copiosæ viscide, &c. pronuncians, Aërum esse phthisicum: Nam prædicta Mala sæpius etiam in depravata Chylis, aliisque afflictiis Ventriculis reperitur.

Si dubius sit Medicus, utrum Materie viscida, an vero pus excreatur; jubet patientem expirare in Aquam frigidam, quo facto, observat, an Materie fundum petat: an vero Aërum innatet? Prus si accidet, Patient exspuit Pus: si posterius, solum Materiam viscidam rejicit, nam visciditatem Materie pituitosæ magna inest portio, unde Aër huic portatit irritatus in causa est, ut Materie viscida fundum petat (F). Quomodo ex Urina cognoscendum, an pus rejicitur, vel Materie viscida, vel Genitura? i audivis in Collegio Vestri, ali de Urina.

Porro distinguenda est Tussis in phthisi incipiente. Sanius, Lucus delirius, Respiris, &c. scilicet hæc dicere de comæ: ac tunc demum limas de labe pulmonum certi, quando toti pulmonum lobi consilientur, aut etiam eorum frustula succedivè exiciuntur; sicut interdum fureali Venarum & Arteriarum cortici expeditori observatur. Sic namque furealem Venæ Arteriosæ Expectoratum observavit TULPIUS lib. 2. Cap. 12. de pulmo integrè ferè per pus rejectus observatus fuit à SALMUTH Comar. 1. Observat. 14. Omnis hic Tabidis, & phthisica commune est, ut copios Sudores nullarum patiantur, ita ut simul atque Oculos claudant Aëri, Sudores diffiant; sicuti in Mulo confirmato desuper Capillorum supervenit; sed tunc Viribus exhaustis cessante Tussi, aut deficiente ejus Expectoratioe Materie, Aëri suffocantur, aut superveniente Diarrhœa colliquativa, aut quam maxime prout pars phthisici, pedumve Tumore oedematoso, Aëri iugulantur. Quòd si ex Visceris cuiusdam præcedente Inflammatione vel Abscessu, aut etiam pleuritici suppuratæ, aut sputo sanguinis supervenit phthisis, in talibus minùs Stomachus est incutandus, qui tunc potius indolens apparet, sed ad primarium Morbum est respiciendus. Quæ pars Pulmonum afficitur: an dextra? an sinistra? præter fœnem Dolorem omnibilibi obscuro, congeritur ex decubitu Aëri: siquidem Aëger non potest decubere in latere sano, sed in latere affecto, alius immet suffocatio; cùm contra si in latere sano decubat, talis ipsi non accidit (G), uti redè observat SALMUTH Com. 1. Observat. 14. Urine est flammea; & præcipitatur in Sabulum rubicundum, & Materiam pinguem Urine instantem.

Pro meliore didicim intellectione Observ. 1. Omnia Atrophis & frequentior omis species phthisis, vel sunt affectus primarius, vel secundarius, vel comitatus, qui alium sequitur partis affectum; Unde phthisi pleuritidem, sputum cruentum, Atrophiam, Febres Chronicas, Scorbutum, &c. inequitur. Illa semper radicem habet in Stomacho, & hinc dependente Sanguinis Dystrasia, sæpius Ichoriæ.

Observ. II. Atrophis & phthisis primaria, qua Sanguinem sequitur vitium, fundamentum etiam habet in Stomachi Digestione prima, vel quatenus inde Sanguinis Dystrasia datur oratio, vel quatenus Sanguinis alterati occasione & Stomachi Digestio prima læditur, indeque Malum confirmatur. Multum hoc faciant Animi Pathemata, Coræ, Terror, Tabem prædictam sine Ulcere cuiusdam partis inferentia; quatenus enim hæc Sanguinem afficere possunt, & Digestionem primam turbare, eatenus ad phthisin disponunt.

(F) Saltem hic sputum rejectum materiam cum Aqua Muri, vel ac purioram salis, commiscere: quòd si Vasis illa fundum petat, puriorum esse judicamus, contra, si supervenit: non ex alia sine ratione, nisi quòd gratius Pus salis Aqua rejectum superet, quem viscida quæcumque materia, que purulenta non sit, superare nequit.

(G) Cùm enim in latere sano decubuit Aëger, tunc pars Pulmonis afflicta, multo gravior & durior molestia, seu pondere partem sanam comprimit, in ea vim facit, non sine gravi anxietate, ac sicut materiam extempore quærit: contra, si hic in latere agram ducimus; superimminit enim pars Pulmonis sana non nullam in subitum morbosum facere partem, quare Aëger quietius degit.

Observ. III. Apprimè notandum, quòd Pulmonum vitio frequens etiam Tabes oriri solet, non solum exulcerationem, sed etiam Nutritionis defectu contabescendum: item si aliquid peregrini in Asperam Arteriam ipsam sit, quòd irripando ad Tussim continuam, succedere Tabem Noctam inferre solet, quae tandem remotione illius rei cessat, cujus *Exempla supra allegavi.*

Plura qui de Tabi & Phthisi natura desiderat, adeat in specie WILLISII *Pharm. Rat. Part. 2. Sect. 1. cap. 5. & 6.* item SYLVII *lib. 4. Prae. & Tract. de Phthisi*, deinde BENEDICTUM in *Thesoro Tabidarum*.

PROGNOSIS.

Quòd *Prognosis*: notum est, Tabem omnem ac phthisin esse Malum chronicum, & difficillimum curatu; imò confirmata, quia sipe insigni Viscerum & Humorum Dystrasia, & laesione fieri aequi, saepe nullius est Curationis, nisi sublimiora negotia accedant.

Imprimis tres illi gradus, *Phthisis* nempe *Imminuta*, *incipiens*, & *Confirmata*, quas WILLISII insinuat s. l. pag. 106., probè observandi sunt.

Primus enim facili, secundus difficilior, tertius plane non curatur. Et quidem in gradu secundo Vulnerariorum & laudabili Dieta ita interdum curati, ut ulterior progressus interdum per plures annos retardari possit. Sed necesse est, cautissime & rigorose Aegri observent omnia, alias impossibile est, ipsi succurrere.

Quòd melior & sanior est Stomachi constitutio, eò uberius Sanitatis spes superat; unde Tabes incipiens à Ventriculi Dyspepsia, Vermibus, &c. aliquid salutis promittit.

Tabes à Ciacricis intestinali, Scirrhis ac Ulceribus Viscerum, Scorbuto, Fluore albo, Gleetorrhoea, Hydrope, & Menium suppressione, nisi promoveatur, difficulter aut nunquam curatur; Conf. HIPPOCRATES s. l. *Prædix. 13.*

Qui ex pulmonum Ulcere vult evadere, eum sex HIPPOCRATIS signa habere debet, quae videb. in SENNERTO *lib. 2. Pr. 2.2. de Phthisi p. 107.*, cuique prolixius explicat SYLVIIUS; omnia cum alijs, *Tract. de Phthisi §. 57. & sequens. (H)*

Diarrhoea sponte superveniens phthisi, aut Tumor pedum oedematosis, aut denique deficiens Tussis, Mortem in propinquum denunciant. Tandem, inquit GALENUS, *Phthisis* gravatur, quando cessat, & Spata Pulmonum expurgata possunt: alii vero Spata lotas manent, obstruuntur viae & suffocantur.

Si spatium phthisicorum vel per se, vel Carbonibus injectum graviter aëre, & Capilli desiliunt periculum est Signum.

Phthisis denique, quae à Tuberculis & iodurata pulmonum compage, nunquam curatur.

CURAE.

Quod atinet Curam Atrophiae, Tabi & phthisi: haec consistit in eo, ut

1. *Causa*, quae vel Alimentum exhaurit, vel primarius Morbus, qui Massam sanguineam inficit, removeatur. Haec causae remotio variat eundem per eorum varietatem supra recensita. Sed in Tabi, quae frequentius Curae subicitur, vel Stomachus restituitur, vel Acrimonia ac Lympha acido-salis temperanda, vel denique Visceris laesio aut Exulceratio plis minus periculosa à specie pulmonis, sananda, aliave ejus Corruptela corrigenda.

2. *Symptomata* graviora interdum, praesertim in phthisi, mitiganda, qualia sunt, Tussis ferina, praesertim nocturna, Excretio difficilis, inde Respiratio difficilis, item Febris lenta, Sudor

nocturnus, vel Diarrhoea.

3. *Corpus* autem: id quod Dieta laudabili praestat, quam Stomachus appetit & facile digerit in specie Lactis, quae & Chylum subtilem & subpinguem & probè divitem suggerit, simulque Sanguinem temperatum & quasi chylum reddit.

Pro Cura hac rite instituenda.

Observ. I. Quòd Vomitoria in omni Tabi ac Atrophia, item in phthisi tunc primario incipiente, quam confirmata, idque secundario, sint optima, in specie, ubi *Mela* est ex vitio Stomachi, & inde nata Acrimonia Massae Sanguineae salso-muraticae: uti rectè hoc inculcat LINDANUS, quòd scilicet Vomitoria sint maxime necessaria, & se curasse saepe Tabidos per Vomitoria etiam repetita: Et quisquis, inquit, feliciter vult curare Tabem, quando iam non adeo vehementem, ubi Tussis, nec tamen Ulcus, & quamvis incipiat quodammodo, & excretum sit aliquid spumae sanguinolentae (1) aut purulenti, tamen statim accedat ad Vomitoria: in quo ipse eleganter consentit HARTMANNUS in *Praxi Chymica. cap. 99. & cap. 185.* Hoc ipso enim radix Malis evellitur, & quidem non tam in principio curae, quam & in Ulcere pulmonum confirmato, ubi urget difficilis Respiratio, aut est difficilis Materie maturae, ut per se fluidae, excretio, si Virescunt consent, tunc similiter optime conveniunt Vomitoria, propter quam causam & BARTHOLETTUS *Tract. de difficili Respir.* & etiam SYLVIIUS in *Praxi*, insigniter commendat Vomitoria in Ulceribus pulmonum etiam in Empyemate: Et sanè, uno Vomitu plura emittitur & pectoris cavo, quam decem diebus Tussis, Interim in tali causa, ubi phthisis est confirmata, habetur spatio spumae sanguinis immixtione, quo praesente cantu sumus in Vomitoriis uti: contra si non adit, tunc illa propinquum, cum & semper ipse in tali causa curam à Vomitoriis propinquo incipiam: & certum est, quòd Vomitoria potentes ac copiosae evacuent fomites sanandi ex pulmonibus, propter quam causam in Empyemate etiam commodè Vomitoria usurpari possunt. Curavi aliquando Aetiam desperatè phthisicam ex Ulcere pulmonum, cui inter alia Remedia dum valida praescripsi Vomitoria, non tamen una vice, & vix credibile est, quam variae & copiosae sordei cum praesentissimo levamine rejectae fuerint, quae promptissime faciliabant Curam.

Observ. II. Post Vomitoria, quantum possibile, cavendum est à *Purgantibus* quibuscunque: nam etiam licet purgant phthisicos & Tabidos maxime & copiosae evacuae solet cum insigni Virium noxa, ut ipse observavi; ita ut quòd aliis in statu naturali nil effectus praestaret, in phthisicis cum summa noxa per totum Morbi cursum inestimabili assumpsum fuerit, & tales Aegri post purgationem semper pejus habeant, ac vesperei crebris tussunt. Penitus ergo non sunt purgandi, nec *Praxi* est operanda, nisi quodam sanguinis evacuatione suppressa in causa sit, ubi Venae sectio conceditur, sed post Vomitus reliqua Cura consistit in mitiganda Acrimonia salina. Et quidem, quam noxia sit purgatio, uti & Venae sectio in phthisi, videbimus apud ROSELLUM *Cent. 4. Observ. 15.* & PROSPERO MARTIANO in *Hipp. Sect. 4. Aph. 1.* Sane ergo, si aliquid tentandum, primè viæ, & quidem lenissimis purgantibus, in principio abstergendum sunt; vid. haec in parte BARTHOLINIUS *Cent. 10. Obs. 13.* HIPPOCRATES *lib. 2. de Morbis* *Tract. 46. §. 57. & Tract. 47. §. 13.* cui copio Rhubarbarum optime iulervit. Vulgo etiam solent inter *Fortissimos* phthisicis, sedulo à Casarho, quem ex capite in Asperam Arteriam deplevere existimant: sed nil prostant, modò non nocent.

Observ. III. *Dulcia, Saccharata, & Mellita* crebrius sub forma Symplicum Linctuum usurpata plis nocent Tabidi ac phthisici, quam profutur; fermentativa enim vel saccharata & purgativa, adeoque Stomacho, aut à Visceris cuidam erosio, speciatim Pulmonibus, insigniter sunt.

(H) *Haec sunt verba Hippocratis 2. prorrh.* Oportet enim eum, qui probè liberandus est facile Sputum per tussim rejicere, & id esse album & aequale, & ejusdem coloris, & ab inflammatione situm, (sic enim verbi Mercurialis interpretatur). Quod verò à capite desiliit ad nates converti: febrem autem non invadere, ut ne à cœnis prohibetur, neque fiat. Venit autem egerat quotidie, & id quod egerit fit durum, copia pro ratione ciborum ingestorum. Hominem verò quamminime tenuem esse oportet. Pectus autem laudare convenit quadratum, & hirsutum, & os ipsius (cartilago petrii, *verum enim habet Hippocrates, atque intelligendus est de Cartilagine Xiphoide*) parvum sit & robustè carnosum. Quicunque enim haec omnia habuerit maxime superstes erit; qui vero nihil horum habet, interitū proximus. *Haec Hippocrates.*

(I) *Si spatium eruentum apparuerit, periculum est ne Vomitus excutiat, Vena vix consolidata iterum aperitur, & nova Haemorrhia procedat, non sine gravi Aegri periculo: Quod & A. infra tunc facturus.*

sunt hostilia, Digestionem primam turbant, ac imprimis qualvis Corporis Succos vicidiores, ac ad vitatate incertius reddere solent: unde etiam Symplicum asurorum Dulcium nonnulli modis usui in Phthisicis & Tabidis tolerandis, nisi in quantum ad lubricandam Pancreas intercedunt, sed caute, pro scopo Expectorationis usurpanda sunt. Quantum nocet Mel & Saccharum, videt GARENZIER Tract. de Tab. Anglia, & HELMONTIUS Tract. de Diffus. andrea. §. 30, pag. 371. Etenim, ubi loquitur: *etale omnia melle & saccharo laeviora, et remediis in se aliis fac debiliorem proprietatem retinere, quod omnino morborum unica modis & apud in danti sunt. Saccharum enim & illorum formosior acida stomachi aversat, adeoque digestiones facit difficiliorem. Saccharum a- pum lignis calidius vix & argilla figulina clarioratur.*

Observ. IV. in Phthisi scorbutica, quae facili supervenit Scorbuticis, & quacunque occasione ad Tussim dispo- nantur, & Lymphæ Scorbuticorum admodum acri ex- siccant, præ cæteris optima erunt castilleja, quibus Spi- ritus Cochlearum, vel Balsamum Sulphuris anisatus, vel Assensia Vulneraria, vel Spiritus Salis Ammoniaci, & similia insillari possunt: imprimis Lac caprinum, Herbis Antiscorbuticis & Vulnerariis prius contritis. Capra præ ætatis ad talem Phthisin scorbuticam coartat; item Petiones Vulnerarias, quibus Spiritus Cochlearum per- mickendus.

Observ. V. Tabes Phthisicæ perfecta ac confirmata maxime potest curari; Vita interea diutissime potest conservari per hæc tria

1. Per legitimum usum Lactis,
2. Per usum Pulveris arcani.
3. Per antacidum Aeris.

In specie ergo, quod attinet *Diatam Lacteam* pro tu- endis Phthisicis & Tabidis: & certe legitimum Lactis & quorsumlibet Lactationis usus in omni casu multum vult, imprimis quando Malum dependet ab Acrimonia Sanguinis & Lymphæ falsa muricaria, quippe ad quam Lactis usus nobilissimus est, ubi cætera ritè præmissa fuerint, & Dyscrasiam Contentorum maximam partem cor- rodat: quoties partem proderit, quæ Atrophia est & gollivæ aut corruptæ cuiusdam Visceris, aut quando est à vitio Stomachi, sic hæc impedimenta prius removean- tur, & Venterque Digestio ipsa minis restituantur, alius enim, vitæ fædè potest, cum Lac etiam intertempus in Vegeticulo, eripere quod incitè alterabili sit à Aeris vel Je iussio contactu, ac facillimè evanescat in odore, ut sic dicam, infusatur: adhuc facillimè coagulat, quod Lac coagulatum postmodum plura nocet, quam prodest: Conf. HILDANUS *Crus. 1. Observat. 91. & de schistis de Melior cap. 12. & 14.* In Atrophia ergo illa imprimis Lac convenit, quæ est à nimia Acrimonia Humorum, quoniam causa eorum caliditate vel quasi acredine Massæ Sanguineæ, ubi opus est, ut humedetur & temperetur, in hoc casu multum prodest. Nam, quantum hoc autiat, videri potest in Infantibus, qui solo Lacte patenter au- xiliantur. Sub eius usu semper aliquid Sacchari, vel Con- servæ Rosarum addatur, nec tam facile coagulari possit à viâ supra, ubi de saccharo. Porro in gravitate Mælo, qui Lactis quantitas debet ter in diebus sumere, mane scilicet, à meridie, & vespere, & vitæ alium Cibum gustare, aut Passulam, aut Cibum facili digestibilem: idque per ali- quot septimanas, donec denovo Corporis iterum probetur: & sumpto Lacte, moderato exercitio Corporis succosivo promovendum est, ut melius illud dissolvatur, non cum Jonga in Stomacho indiget digestionem, cum potius Lac sit Chylus antea bene præparatus. Modum ejus utendi legiti- mum videli. in *Collig. subdub. Part. 2.* In illa etiam Ta- be, quæ ex Exaltatione pulmonali oritur, Lac itidem præcipuum confert, à sum adhiberi parte serosa, notricæ Corporis, & temperata parte butyrea. Convenit præ cate- nis Lac Muliebri, quæ ipso autius se restituit videlicet aut præfectum FORESTIUS in *Observat. & PLATERUS*

Tom. 3. pag. 498. & RIVIERUS in *Observat. Comm.* idque si fieri potest, ex Mamma Nutricis tantum ab Agro extrahitur, ne ab Aeris strado alterari possit, & exinde in perullaginem verminosam abeat: sicut & Butyrum ex Lacte muliebri confectum cum summo Arcanum in Phthisi habetur à BORELLO *Cont. 3. Observat. 12.* Post Lac Muliebri est Balsamum & Caprillum, in specie in Atrophia Scorbutica, præsertim si Capra prius appropriata Vegetabilibus, Vulnerariis imprimis & Antiscorbuticis, nutrita fuerit; item Lac Equinum cum paucis Saccharo, quod laudatur ab HARTMANNO in Atrophia à Phil-

tro. Sane in Scorbutica Phthisi optima sunt Lacticia, quibus insillari possunt Spiritus Cochlearum, aut Salis Ammoniaci, aliæ similia. Veteribus in usu fuit Lac *Asinum*; optime Ulcus detergens, quia serenum, de quo suo loco dixi in *Collig. Schraderiana Part. 1. Sall. 3.*

Intra Lacticia conveniunt etiam Ova foribilia pro scopo Nutritionis, eque cum Vino generoso assumpta, quia insigniter nutriunt & reficiunt; qualis haustus, additis aliquot graminis Ambræ, imprimis in Tabè Dorsali, ac in Imbecillitate nimia à Venere contracta, est optimior Remedium: aliis Vinum non usurpant. Pertinetque hoc etiam omnia reliqua Chylum temperatum & dulcem subministrantia, ut sunt Radix Glycyrrhizæ & Helenii (generalia hæc sunt in omni Tabè ac Phthisi) & omnia ex iis parata: item Lactuca, Betonica, ac Tussilago, Semina Oleosa temperata, ut Amygdalum dulces, Nuciei Pinei & Pistacei, Semina quatuor Frigida majora & mi- nora, vel ex, aut cum his variè præparata Emulsionem: item Semina Nymphaeæ ac Foenugræci: Chocolata: item Mucilaginosæ, & reliquæ Farinacæ, Milium, Hordeum, Triticum, &c. Hæc enim omnia temperat oleositate sua quancunque viscosam Acrimoniam Sanguinis, Lymphæ, & reliquorum Succorum Corporis, & contriunt: unde & Cerevisia, primariò Triticea & Hordeæ, sunt nutritivæ. Palliæ & Palliata imprimis existunt; laudabiles hæc enim sunt, & cæc Mustum concentratum continet Sal & Sulphur coæque & temperatum: unde similiter omnium optimè quancvis omnium Humorum asperita- tem & Acrimoniam salinam temperant, indeque Massæ Sanguineæ Crasso talem largiuntur; quæ aptior redditur Nutritioni uberiori; & huius respectu vulgò calidæ de humidæ dicuntur, quia & Veteribus Hepar corroborare. Unde quancunque modò adhibere conveniunt, verb. grat. Rob Palliarum, Decoctum Palliarum cum Radice He- lenii, item cum Radice Cicchori & similibus, in Maras- mo seu Contabescencia Corporis optimè conveniunt. Sic refert LINDANUS, se curasse quendam Domestici Atrophia laborantem solo Decocto ex Radice He- lenii, cum Passilla & Glycyrrhizæ, adjecta decima parte Vini Hispanici: Nam & hoc nutrit egregiè. Conf. *Obser- vat. RIVIERI.* Hinc JOEL in *Praxi* dicit, quod Passilum cum Amygdalis pinguefaciat, & RIVIERUS in *cont. a. Observat. 43.* habet Exempla pinguefcentium per usum Palliarum. In Officina probat Electuarium Refum- ptivum, quod cum Rob de Passillis misceri, & ita assumi potest. Pertinet & hoc suo modo Carnes Olearum: item Cancrosum fluviatili & simulum: ut & cum Cancris fluviatilibus Butyrum non salum nullum, dat Butyrum *Antiphlogisticum*, multi usus & commendationis in Tabè. LINDANUS sane refert, Hædum ex Ulcere Pulmonum copioso Olearum esse curatum. Aquæ ac Sanguinis Animalium, item ex Carne Testudinum & Cochlearum, maxime laudantur, quæ tamen ego minimi facio.

Quod in specie attinet *transfusionem remissionem*, Lactis usui præmittendum; convenit ratios Stomachi imprimis Vomitus. Hinc in Tabè adhuc incipiente appropriata Stomachica, imprimis blanda *Sulcatia*, conducunt, quæ eæ experta commendat BARBETTE in *sua Praxi* p. 107, & credo, intelligere illam Tabem ex Stomacho: quæ ipsa tamen vel moderata doli blandiora etiam huius curli Morbi; ad ita Stomacho propiciam, haud adeo inconcinna sunt. Talia blanda Subacida sunt verb. grat. Liqueur Ter- re soliatæ Tartari, seu Salis essentialis resolutum, Tar- tarius tartariatus, spiritus Aperitivus *Renet*, spiritus Salis dulcis, Tinctura Vitrioli Martis *Zweifleri*, Nitrum antimoniacum, Arcanum duplicatum, Sal Ammoniacum, Tartarus vitrioleus *Tachenianus*, Elixir Proprietatis cum & sine acido, Lapilli caecorum cum Aceto destillato juxta BARBETTE, & similia:

Æ. Aqua scabell.

Card. bend. an. Bil.

Prophyl. 36.

Land. optat. gr. l.

Syrup. Papav. errat. q. l.

M. l. Mixture, cohibetanti singulis horis capienda.

D. &

Resolvens Mixture Stomachalis.

Quo etiam videtur facere *Pulvis Cameridii*, Archiatri Brulvicensis, ad phthisin singularis:

Æ. Sali ammoniaci pari.

Nitri pari an. 36.

Med.

Rad. Liquirit.

Irris Florent. an. ʒi.

M. f. Pulvis:

De quo omni mane & vespere capiatur, quantum cuspis
cubelli capiat.

Aliquoties observavi in Phthisi ex stomacho incipiente
cum Tussi, Macie, Virium labefacta, Anorexia, Siti
nimia, post Vomitorii usum egerit liquorum Terræ
foliæ Tartari seu arcanum Tartari doli gutt. 40. vel ʒo.
his quotidie assurgatur; In Tabo vero quancunque cohi-
mata, in specie ea, quæ jam in Ulcus pulmonum tran-
sit, tanquam Diaboli fugienda sunt acida, imprimis Vi-
trioliata, cum hæc phthisis sit admodum inimica, quæ
hæc aggredimur pulmones, quibus debilitatis Phthisis
confirmata redditur: Vid. LANGIUS *differt. de acidulis*
§. 12. *Tab. seu de sup.* Sane ipse novi quoddam ad phthisin in-
clinantes, qui vel propter scorbutum, vel malum hypo-
chondriacum viderantur acidulas, & in ipso earum po-
tu, aut brevi post certè phthisin confirmatam, vel hydra-
pem contraxerunt.

Ratione sanguinis ac Lymphæ, hujus Acrimonie falsæ
temperatæ præ cæteris conducunt Remedia ex sulphu-
re, Succium, Myrrha, Antimonium diaphoreticum, An-
thelidicum Pteridi, Papaver, Papaverina, & Opia: item
Tragacantha, Amygdala, Helenium, Liquiritia, Hæma-
onica, Tulligala, Pululur, Sperma Ceti, & ea his & simi-
libus parati compositi varii pulveres Pectorales dicti, et
iam pulvis Hali contra Phthisin, & species, ex. grat.
Species Diu-Irris, Dia-Tragacantha, Conservæ Ro-
marum, & Chocolata: quibus adjuvantur decocta talia ex
Ligno, quæ alia in Lue Venerea usurpantur, aut, uti
vocant, contra Catarrhos desillantes laudantur, in specie
ex Ligno Salsifras, ac Radice Chiræ, hinc ex Ligno
Guaiaci. Nam ex his Ligois parata decocta resinsam
sulphuream subtiliorem una colligantur obtinent, inde-
quæ temperatæ acuti, resolvantur inde hæcutes inderet,
imprimis in proctibus phthisos seu tabis, speciatim ubi
jam Dyscrasia sanguinis præcessit longius, aut pulmo-
nem aliunde Viscum iam erosa, & exulcerata sint, conse-
runt; quibus optimè Helenium, Glycyrrhiza, & omnia
ea his parata locantur, & crebrius, quæ abique odore,
talia Lignorum remedia usurpantur: quia, & fumaris
his ipsa mista, & sepius usitata dicunt confectæ. Adeo-
que conveniunt hæc in Phthisi, quæ vulgo à Catarrho seu
desillationibus originem ducere asseritur, & adhibetur
commodissimè præmissis Vomita. Prescribendi modum &
usum videb. in LOTICHI *observ. pag. 1.*

Ratione visceris doli imprimis Vulnerarii simplicia, in
specie Veronica, Scabiosa, Hedera terrestris, Chærefo-
litum, &c. conferunt: item Balsamica, Sulphura quancun-
que, in specie Antimonialis, Fermentum Ulcerum cor-
ruptivum, sanguinem inquinans, emendantis, substantiam
puris ejusque proventum corrigentia, & alius consi-
deranda: item, Balsamus sulphuris, Peruvianus, Terebin-
thina, &c.

In specie hæc ut illustrentur, pro tali scopio præmissis
præmittendis universalibus, primis vias imprimis respi-
ratorias, conveniunt v. gr. Pulveres pectorales: e. gr. pul-
vis pectoralis D. Michaelis.

ʒi. Pauci. seu potius rad. Ari ʒi.

Rad. Iris Florent. ʒi. vel ʒii.

Myrris seu Res. Benzoi ʒi.

Flor. sulphuris ʒi.

Ancis. Priar. ʒi.

Sach. ʒi. ut qu. pl. pro sapore:

M. f. Pulvis.

Qui mane & in specie vespere ante coram, & sob in-
teritum in lectum, assumptus doli ʒi. ʒi. ad ʒi. egregius
est, acrimoniæ sanguinis seu Lymphæ temperat, Tullum
modum quodammodo cohibet. Ratione tamen Fæcu-
lis Ari potius pulverem Radicis Ari præparatum vel po-
tius crude usurpatur: idque imprimis quando simul Mu-
cillaginem viscidam, aut plus nimis purulentam, ex pectore re-
silienda sit. Vel loco hujus usurpatur Pulvis Ladani ad
phthisin seu Atrophiam, vel acrimoniæ sanguinis, admo-
dum corroboratus:

ʒi. Sem. papav. alb. ʒi.

Portulac.

Melin. an. ʒi. ʒi.

Cydon.

Cucumer.

Bombac.

Pom. seu ruscidi an. ʒi.

Gumm. Arab.

Tragacanth.

Ampli an. ʒi.

Ceran Cerui.

Ebor. seu ignea ʒi.

Succ. Myrris (est Succus ex planta Radicis

Cilli fruticosa: vid. SCHROEDERUS

pharm. l. a. p. 156.)

Sol. Arn. an. ʒi.

M. f. Pulvis.

Sumatur ter in die à dr. ad dr. cum Decocto Radicis
Chium, quæ admirabilis est in curandis phthisicis, si rectè
adhibeatur: sed non debent alio potu, quam hoc Decoc-
to, uti si nisi cum Phthisici semetipsos acide adstringant
Dietam, non curantur, etiam optimas habeant Medi-
cinas. Mane & vespere simul ioculantur siccitate ex succi-
no & thure naribus hauriendos.

Item

ʒi. Nuc. Pin. ʒi.

Sem. papav. alb. ʒi.

Gum. l. q. Aqua scabios. & Tragac. f. Emulso:

adde

Ebor. seu ignea ʒi.

Lapill. Cancer. præp.

Matr. perlar. præp. an. ʒi.

Edulcor. cum Rosal. Mannæ Christi perlas.

D. S.

Emulso ad potum quotidianum.

Præ cæteris se observat Mineralia: quæ inter Sulphur
tam commune, utpote quod alias Balsamum est pulmo-
nem, & ipsam appellari solet, quam sulphura Antimo-
nialis fixa, Flores Sulphuris, & remedia ejusdem gene-
ris sulphurea, sunt optima in Atrophia & Tabo, ea acri-
monia sanguinis enata, quam, uti etiam Lympham, opti-
mè temperat pinguedo illa mineralis Sulphuris: sciti
uhs etiam in omnibus pulmonum vitiis ac pectoris affec-
tibus insigniter conducit. In sulphure enim observanda
insolentia sunt:

1. Est pars ejus pinguis & oleosa,

2. Est pars vis Acidæ.

Ab Oleosa habet vim inflammabilem; per Acidam ob-
tinet spiritum acidum, qui in præparatione Olei Sulphu-
ris per campanam colligitur. Pars hæc acidâ potius no-
cet quam prodest. Verum separare hæc duo, hoc nupus hic
labor est: Nihilominus tamen, qui artificiosè sciunt utili-
mare Flores sulphuris, acquirunt Balsamum pingue abs-
que acido, sed in pauca quantitate. Cum ergo tam diffi-
cile sit acquirere partem oleosam, & pinguis ea Sulphure,
propterea exaltatur eadem in Balsam Sulphuris, me-
diante solutione per Olea desillata, quæ ipsa tanquam
Saliu volatili concentrata, coacta sunt Acidis: utpote
hæc ratione magis obtunditur ejusdem Acrimoniosâ acidâ,
econtrâ promovetur magis ejusdem viâ temperantia, & acce-
corrigit: nam Tinctura sulphuris, Extractum sulphu-
ris solidum, præparatis Balsamum sulphuris crystallum
quod habet BOYLE in *Philos. experiment. part. 2. sect. 1.*
pag. 166. item quod *pag. 316.* describitur: item Balsamum
sulphuris vulgaris, tam insignis est commedicationis, tam
in phthisi pulmonali incipiente, quam in quancunque Tabo
alia, ea acrimonia imprimis sanguinis, & de hinc cor-
ruptione, & exulceratione Visceris ejusdem interni, v. g.
pulmonum aut ulnarum quancunque partium. Præter-
tim puris acrimoniæ non tantum corrigat, sed & es-
sum ejus proventum optimè coarctet, detergat atque
consolidat. Olea, cum quibus præparatur hoc Balsamum
sulphuris; ordinariè sunt Oleum desillatum Terebinthi-
næ balsamicum, aut Oleum Anisi, seu singularissimum
Pectorale, aut Oleum Juniperi Remibus exulceratis ap-
propriatum, aut Oleum Succi. Usurpantur hæc Balsa-
ma sulphuris à gutt. vii. & x. ad xii. in Liquore appro-
priato, vel decocto Chium aut Salsifras, aut etiam inde-
cocto quodam Vulnerario, vel liquorum, aut ex his mi-
sto decocto pectorali, ubi ea pulmonum labe in specie o-
ratur Atrophia. Mileri etiam possunt hæc Balsama cum
sympo de Liquiritia, & similibus, quæ egregiè tempe-
rante nonnulli ejus acorem. Verum cum ignea vis sit in
hoc Balsamo, ob id in iis, quibus manifestus, & gravior
est Hæctica, & nimia sudatio, cautè aut planè non usun-
dantur: cum observatum fuerit, quoddam ex nimio Bal-
sami sulphuris usu Hæcticam lethalem contraxisse, uti au-
divimus *suprà in febris Hæctica* Nam: quem in finem præ-
pararetur cum Oleo expresso quodam, & cum tantillo Olei
desillati Anisi acuetur: Hinc

℞. Bals. sulph. cum Oleo Amygd. dulc. per. ℥i.

D. S.

Temperans Balsamum pectorale.

Caplaque guttur 40. mane & vespere in iuculo avenaceo vel cerevisia calida.

Etiā cum tali Balsamo sulphuris optimo cum confuso pingentiori medicamento *fururina* (in specie Saccharum Saturni) quæ, & ipsa effrenatum Balsami Sulphuris ardorem refringant. Nam in ipso Saturno singularare quid latet contra febrem Helicam, & internas Vicerum emulcerationes, & corruptelas; hinc vel saccharum saturni, vel Crystalli Minera Saturni congenerantur cum Balsamo sulphuris, & ita aptius ac convenientius usurpari possunt. In specie autem species Dia-Saturni *Antiphelici* à quædamplurimis contra Tabem singulariter laudari solent à hinc & Tinctura Antiphelica D. *Nitroaculi* dicta, ex Sacchari Saturni part. i. & Vitrioli Martis part. ii. invicem misctis, cum spiritui Vini rectificato parata, hoc in passu usitata est; in specie ubi adfectu corruptio Viscerum, Ulcus pulmonum aut Renum, aut similes cuiusdam partis, sanæ multat est laudis, & efficacis, doxi dñ. gutt. unæ & vespere, virtuosque sua adstrictoria robora simul, & firmitudinem pulmonibus conciliat. Post hanc Tinctura Lapidis Hæmatitis à 15. guttis, & Tinctura sulphuris Vitrioli (cujus descriptionem dabo infra, quando de hæmorrhægiis tractabimus) si & ipsa præterpropter à guttis xv. az. az. ad xxx. subinde usurpetur, egregium erit remedium Antipheliticum. Denique Phlegma Vitrioli roridum, quod nihil participat de spiritu acido corrosivo, quem supra reliqui, cohabitatum, & digestum cum proprio Capite mortuo aliquoties, Experimentum est singularare ad phthisis & corruptiones Viscerum internorum, uti hoc refert MARCUS MARCI in *Philos. vet. Rific. pag. 350. §. 1.* fuit Experimentum HELMONTII junioris in quadam Comissa.

Cæterum loco sulphuris communis legitima Remedia sulphurea antimonialis præferenda sunt; unde etiam Antimonium Diaphoreticum à quibusdam insigniter contra Phthisin laudatur, imprimis si quotidie cum Conserva Rosarum mane, & vespere usurpetur. Nam & hoc ipsum ad partium emulcerationes, item ad Venticos pulmonum, ad corrigendum, & prohibendum pus, laudabiliter administrari solet. Quod si ergo Antimonium Diaphoreticum solum est tam egregium, multo magis conveniet, si combinetur cum sulphure Jovis, in legitima præparatione Antiphelici *Pætur*, quod à gr. xii. ad ℥i. cum conservâ Rosarum usurpari potest, cujus continuo usu aliquot phthisicos & hædicos feliciter curavit POTERIUS, uti videtur in ejusdem *com. p. curat. 20.* In specie pulveres pectorales diodi, quorum basis usuplurimum sunt Flores sulphuris, ac pro communi sulphure etiam ejus Balsamum, cum Lapidis Cancrorum, Antimonio Diaphoretico, Antihelico *Pætur*, & omibus ex Antimonio cum Jove, & Marte fixato compositis, præsertim in phthisi confirmata, sunt egregii: v. gr.

*℞. Spec. Dia-Droo,
Lapill. cancr. præp. ℥i.
Antihel. Pætur ℥b.
Cruci ℥b.*

M. l. pulvis:

Div. in 6. part. æqu. 8.
Temperans Pulvis Pectoralis.

Vel

*℞. Lapill. cancr. præp. ℥b.
Flor. sulphuris ℥i.
Olei dissill. Terrebis. gutt. viii.
Aust. gutt. iv.*

coactari ℥b.

M. l. Pulvis:

D. S. ut ant.

Item sequens Pulvis ad acrimoniam massæ sanguineæ temperandam, utut videatur simplex:

*℞. Lapill. cancr. præp.
Rad. Ari. crud. vel præp. an. ℥i.
Droo Flor.
Sem. papav. alb. an. ℥b.
Mastic ℥i.*

M. l. pulvis:

D. S. ut supra.

Assumatur quotidie in decocto Hedere terrestris, & Chæresolii.

*℞. Rad. Droo Florent. ℥b.
Lapill. cancr. præp. ℥b.*

Antib. Pætur ℥b.

Cruci ℥b.

M. l. Pulvis pro aliquot doibus.

D. S. ut supra.

Vel cum Sacch. Sant. Rosule: 8.

Rosule Pectorales.

Vel Sant. Rosule:

℞. Spec. Dia-Droo ℥i.

Sac. Armen. ℥i.

Sac. Liguiri. Rific. ℥b.

Sacch. ℥i. vel iv. in aqua papav. errat.

Joint. F. Rosule.

D. S.

Rosule contra Tussim.

In phthisi contra Tussim siccam nocturnam, Pauciam expectorantem, conceptum eorum phlogosin, &c. conducunt.

Item pertinent huc suo modo Rosule *Concocti* contra phthisin; item pulveres *Concocti* ex sulphure & aliis parati quorum usum videb. in *concoctis* in M. A. N. C. ann. 6. append. pag. 11. Compositiones sunt sequentes:

℞. Spec. Dia-Droo:

Tragac. fr. an. ℥i.

Antimon. diaphor. fri. ℥i.

Flor. sulphur. ℥b.

Sacch. alb. in Aqua Tussing. q. s. dissil.

Olei dissill. Aust. gutt. xii.

F. Tabule ad Scutulum mundum.

Dosis 6. j. & 2.

Vel

℞. Antimon. fri. diaph. ℥b.

Flor. sulphur. ℥b.

Spec. Dia-Droo:

Dia Tragac. frig.

Sacchari alb. præp. an. ℥i.

Extract. Helen. ℥b.

Bals. sulph. an. ℥b.

Sacch. in Aqua Rosule. q. s. dissil. ℥i.

F. l. a. Rosule.

Plura videb. l. a.

Nec sequentes *Concocti Rosule* inelegantes sunt:

℞. Flor. sulphuris res sublimat. ℥i.

Antimon. diaphor. ℥i.

Mastic.

Quæchi alb. an. ℥i.

Cruci Orias. ℥i.

Spec. Diarrag. frigid. ℥b.

Sacch. alb. ℥i.

F. Rosule, & error. cum

Olei dissill. Aust. gutt. vii.

Fiant magnitudine solidi vel similes monete. Pro una dosi No. viii. tumantur, mane, & a. horis ante prandium, ut & cubitum ientur; superbiat decocti alijus pectoralis vel lignorum bonum haustum.

Exhiberi etiam possunt sub forma Pulveris,

Item

℞. Spec. Dia-Droo:

Rad. Ari. præp. ann. ℥i.

Extract. ℥i.

Cruci gr. vii.

Flor. sulphur. ℥i.

Cum q. l. Sacch. & Rosule *Concocti*.

Vel

℞. Rad. Droo Flor. dr. ℥b.

Flor. sulphur.

Antihel. Pætur and. i.

Bonac dr. b.

Cum l. q. Sacchari in Aqua scabio. solut. F. Rosule:

D. S.

Rosule Pectorales.

Vel exhibentur sub forma pulveris his quotidie, mane & ante prandium, vel in decocto Hedere terrestris, vel in decocto lignorum, Radix Chiam vel Balsamum, jubendo, ut & Eger cubitum ientur affinat haustum ejusmodi decocti Pectoralis.

℞. Rad. Liguiri. dr. ii.

Ari dr. b.

Droo Flor.

Symph. maj. an. dr. i.

Gum. Ammoniaci in Aqua sol.

Bon. an. ℥i.

Cum l. q. Sacchari in Aqua scabio. sol. F. Rosule.

D. S.

Temperans Rosule Pectorales.

Vel

Vel

*M. Balsam. Salp. anisat.**Terebinth. ana ʒi.**Exsiccantur l. q. Conf. Scabiosa, & cum Sacch. in Aqua**Fumicoll. sol. f. Rotule vel Morsuli:*

D. ʒ.

Rotule Pectorales.

Hilce Sanguinis & Lymphæ Acrimoniam corrigentibus pro scopo temperandi Tussim, præsertim diuturnam sistendi, & hinc copiosum nimis Puris proventum coercendi, etiam Papaverina & Opia fuerunt annoverata, quæ sunt optima ad temperandam Acrimoniam saltem muciatam. Hinc Veteres *Pilule de Cyngilia* usurparunt, quæ tamen admodum sunt crude, & cum Pilulis de Sytyace coincidunt: Maderal vero Pilulas de Sytyace adhibent, quas videt. in SCHROEDERI *Pharm. lib. 2. pag. 352.* item SYLVII *Pilule de Sytyace l. 1. c. 1. Pr. cap. 20. §. 36.* qui Ambram omittit; uti etiam ex ejusmodi ingredientibus Rotulas habet. Succinæ sunt Compositiones, & non contemnendæ in Tussi nocturna sicca, & quando ex inclementiori Aere tempore hyberno Tussis excitatur, tunc in principio affectus propinquantur, & erunt elegantes. Propinquantur etiam in sicca Tussi Gravidis; temperant enim Lympham fistulam. Conveniunt quoque Opia optimè in principio Tabis & Atrophie, ubi nempe præmissus fuerit Vomitus, uti etiam in ejus progressu mirabiliter valent sedare Tussim nocturnam, uti & Sudores nocturnos collatiunt. Largas Opis, legitime per fermentationem parati, dotes per alia Aëria duo sine nocumens ferre possunt Phtisicis: vid. M. A. N. C. *Ann. 4. c. 2. Observ. 107. pag. 291.* ejusque usû imprimis diu conservari. Sic aliquando phtisicis dedi sequentia:

*M. Conferv. Rofar.**Mader. terr. ana ʒi.**Flor. Sulphuris,**Aniseth. Petrosi,**Lap. Camer. Bursatell. prop. aa. ʒi.**Ros. ferrea. ʒii.**Laud. opiat. ʒi. vii.**Cum Syr. Diacod. Monachi, vel Syr. Dia-**salphuris Willis.**f. Electuarium ʒ.**Electuarium Pectorale.*

Vel

*M. Conferv. Mader. terrestr. vel Confolid. maj. vel**Verna, vel Agrimon. vel Chersil. vel**Sard. vel Scabios. vel Coffa (K), vel**Flor. Hyssico, vel summe. ʒii. ʒi.**Lapill. Camer. prop.**Aniseth. Petrosi ana ʒi.**Succin. prop. ʒii.**Bezoar ʒi.**Cum Syr. Mader. terrestr. ut etiam Sulphuris Willis, f.**Electuarium:**Cui Laud. opiat. aliquot grana addi possunt.*

D. S. ut autè.

De priori Electuario Aëger intra octiduum semper assumpsit, capiendos bibosum ante cenam bonam dosin, cuius usû semper habent melius Aëgi, Tussis remittit, melius dormio, mane facilius mugique coëla expiunt. Sanè hæc Opia quotidie, item Essentia Opis liquida, successively ultra tres menses continuata, citra ullam sensibilem noxam, ceterè irritatiosis sensum sùendo, Tussim, item Humorism acutum in parte lesa decubitu, & hinc ulteriorem corruptelam & ulcerosum progressum sic inhibent. Hoc etiam commodi habent Opia in phtisicis, ut vesperitino usû Sudores nocturnos poterint cohibere. Confer hæc ea, quæ supra circa Tussim de Tussi sicca nocturna Catarrahali *Sed. l. 1. Cap. 3. Art. 3.* monita fuere.

Obervandum tamen est, quod in statu, quando difficilior est Anhelitus, aut etiam eo in casu, quo multa Materia viciata expectoranda est, uti etiam eo in casu, ubi Purulenta rejicienda venit per Os, quod in hoc passu causis usurpentur Opia, aut penitus intermitantur, ne impediatur, Materie rejiciendæ motus, & ita difficilior Respiratione, aut Suffocationis inducatur metus.

Tandem ad hæc ipsi Remedia *Alterantia*, *Craffa Sanguinis & Lymphæ corrigentia*, in incipiente præsertim phtis Pulmonali, pertinet: Decolla Lignorum, nempe Radix Chinæ, Ligni Sassafras, &c. quæ egregiè hæc faciunt, quia alias in Morbis Chronicis Lymphæ vitio,

Tom. II.

& inde natis Malis seu affectibus Catarrahibus in usu sunt, quibus et magis felici successu utimur, si Morbo ulterius procedente, similia Vegetabilia Vulneraria, Fermentum Ulcerationis inchoata corrigentia, simul addantur. Nam semper, quando prædicti dicunt, esse phtisim seu Tabem Pulmonalem à Desfinitionibus Capitis Catarrahibus, subirelligitur vitium Pulmonum, ex Acrimoniam Lymphæ & Sanguinis primariò dependens. Hæc ergo in calibus dicit, quod Decodum Lignorum & Radicum convalescat.

Præ ceteris hæc Radix Chinæ eminet. De horum Decodorum usu vid. GARANZIER *Tract. de Tab. Anglica*, ALPHONSUS FERREUS *lib. 2. de Ligas. Sanit.* qui etiam hujusmodi Decodis phtisicis tantummodo desperatos deusd sanitati fuisse restitutos refert. Confer etiam RIVERIUS in *Praxi lib. 2. cap. 7. item Cretz. 1. Observat. 35. & 39. & Observat. à Fenis Commun. 27. item Cretz. 2. Observat. 61. & 71.*

Modum propinandum hujusmodi Lignorum Decolla optimè docet ARCEUS *Tract. de Vitis. Capitis & Febrium*, non secus ac ERASTUS in *Consil. Scholæ No. 11. dicit: so phtisicis novantibus plantis desperatis & incipientibus plurimum curasse, per hæc Decolla se, exhibitis, præmissis Universalibus, per dies vel tres menses, prius purgare Corpore, si Aëgri sint Cacochymici, in decolla aliquando macturæ pulv. Santalinum, pedem Lemni, sap. Pyreleum. Quinquasolium & Pimpinellam, &c. quæ simul subinde usurpantur. Expellencia sunt una Humida, una Sicca, ex Spiritibus Diacubis simplicibus, Floribus Sulphuris, Saccharo Candy &c. His consentit HILL-DANUS, qui Tabidus propinat decodum Chinæ cum Radice Buglossæ, Prunellæ, Confolidæ majoris, &c.*

Præ ceteris tamen, præter radicem Chinæ, & Lignum Sassafras eminet propter vim aromaticam, & quod in affectibus à Lymphæ vitiois ortis specialiter convenit. Sed si citè sibi volunt conficere tales Aëgi phtisici, alio potu non debent uti, quam ejusmodi decolla. Huc facit etiam Decollum elegans ex Sassafras & Vulneraria POTERII C. 2. Cur. 99. Quibus tamen lignis & aliis unum Santalorum, speciatim cultri & citrini, quidam substituant: quorum decolla eodem modo atque Decolla Guajaci parata & removere pulmonum erofionem, & eandem talem tollere afferit FONSECA *lib. 1. Conf. 58.* & conveniunt tam in Tabæ ex Acrimoniam Sanguinis & Lymphæ simplicis, quam quæ jam cum ulcere pulmonum conjuncta est. Præterituratur ejusmodi decolla, ut dicit, semper cum Vulnerariis, item cum Helenio: modus est sequens, v. g. ex radice Chinæ & ligno Sassafras, quæ ceteris: præfero:

*M. Ros. ligni Sassafr. brad. oder. ʒii.**Rad. Chin. in talcol. incid. ʒi.*

Mactera in l. q. Aquæ in Balneo Mariæ per diem noctemque, & ebulliant ad consumptionem tertie partis.

*Colaturæ aduc calenti infund.**Paffal. min. contrainf. ʒii, vel iii.*

adde

*Syr. Flor. Papav. erras. vel Papav. simpl. vel de**Jasch. q. l. pro grato sapore.*

D. S.

Potio contra Phtisicu.

De hoc calidè semper mane, à meridie & circa vespertim cubitum iturus capiat haustum. Optimam est in phtisicis non admodum confirmata.

*M. Rad. Chin. in talcol. incid. ʒii.**Flor. Papav. erras.**Bacon.**Scabios. an. M. ʒ.**Paffal. min. contrainf.**min. an. ʒi.**Cum l. q. Aquæ comm. coq. Colaturæ edulcoretur,*

addendo

Syrup. Papav. rhoad. parum.

D. S.

Potio Pectoralis pro aliquot vicibus.

Vel

*M. Ros. ligni Sassafr. ʒii.**Flor. Papav. erras.**Bacon. an. pug. ii.*

Macerentur per hibernum in Aqu. feat., hinc bulliant: Colaturæ edulcoretur cum

Syr. Papav. erras.

Ddd

D. S.

(K) *Herba Coffa Camer. an Hieracium Alpinum, latifolium hirsute incanum, flore magno C. B. ?*

D. S.

Singularis Potio Catarrhalis.

Aliquando in Tussi pulmonalis phthisin minitante cum succello præscripti:

℞. Ligni Sassafr. ℞i.

Maceret in

Aqua comm. Mens. ij.

adde

Herb. Hedera terrestris.

Scabios.

Palmar. maculif. an. M. ii.

Sem. Anis.

Feniculi an. ℞℞.

Rad. Liquirit. ℞iij.

Pafful. min. coagulaf. ℞i.

Coqui. ad tertias.

Colatura D. S.

Potio Pectoralis contra Tussim pro aliquot vicibus, Edulcorationis gratia sint Syrupi Confolide majoris, Agrimonie, Charentillii, Scordii, Nicotianæ, Liquiritiæ, Enulæ, &c.

Item euidam perfectè phthisico præscripti:

℞. Lign. Guaiac. ℞iij.

Cort. epulæ.

Rad. Chin. infus. an. ℞i.

Rad. Enul.

Borac. an. ℞i.

Bacc. Junip. ℞iij.

Herb. Veron. M. ii.

Heder. terrestris. M. l.

Incisâ macerentur in ℞. xii. Aqua simpl. per 24. horas: Coqui. ad dimid. addenda in fine coctionis

Sem. Anis.

Fenic. an. ℞℞.

Rad. Liquirit. ℞i.

Colatura detur.

Capiebat anni maœ bonum haustum in lecto, expectando aliqualem Sudorem, addendo simul gutt. aii. Bals. Sulpuris terrestris, unicuique hausti: vespertino verò tempore Remedia cum Opia usurpabantur, sed minus, cum Hoëtica Ager affligebatur. Vel

℞. Raf. Lign. Santali ℞iij.

Cort. epulæ. ℞i.

Infund. per 24. horas in f. q. Aqua simpl. maœ coqui. in Cucurbita cum Alembico munita: Colaturæ Eli.

adde

Herb. Veron. M. ii.

Dysal.

Raioguesal.

Santal. an. M. i.

Paff. min. ℞℞.

Coqui. leniter: Colaturæ addatur

Aqua. superius destillata

D. S.

Sanant Potio Pectoralis.

Melius fit, si cum Ligno Guaiaco Santalum decoquantur, vel etiam loco illius Lignum Sassafras sumatur; egrogis enim altera Lympham nimis acidam scorbaticam.

Simile Decodum vid. supra, ubi de Tussi.

℞. Raf. Lign. Santali ℞iij.

Santal. ℞℞.

Macer. per 24. horas in f. q. aquae: mane coqui. ad consump. mediocritatis, in fine addendo

Pafful. min. coagulaf. ℞i.

De Colatura clarificata ter in die bibatur bonus haustus absque Sudore. Huc pertinet etiam Decoda bina Lignorum, cum his Vulnerariis in Idem Formularum Class. 4. §. 17. Scilicet pro Lymphæ vitii corrigendis, ad ejusdem nimiam effusionem Pulmones nimis irritantem, inhibenda non inepta sunt hæc Ligna, præsertim cum Vulnerariis usurpata, idque præsertim in phthisi, non tam confirmata, quam adhuc incretente.

Parant quidam Essentias Pectorales ex his Vegetabilibus, quod pertinet Eliæ Pectorale D. Michælis, Essentia Helenii, quibus addenda Essentia Croci; qui vocatur à plurimis Anima Pulmonum. Sperma Ceti à ℞℞. ad ℞℞. in Ovo forbili, omni mane assumptum, admodum convenit in temperanda Acrimonia Mæsse Sanguineæ, & curanda Phthisi.

Cætera huc facientia, nempe Species Dia-Ireos, Dia-Tragacanthi, Pulvis Haly contra Phthisin. cu ubi vi nota, in medio relinquo. Pertinet hæc Elecluarium illud expertum Antiphthisicum, quod M. A. N. C. Ann. 6.

Observat. 95. pag. 134. habent. Pertinet & hoc denique Conserva, seu, ut alii vocant, Saccharum rosatum inveteratum, Germ. der Rosen Zucker, à pluribus adeo decantatum: ac sanè Alkali nonnulli typicum in Floribus Rosarum rubrarum est egregium, pinguibus scopis, ad Acrimoniam præsertim succorum corrigendam, & Viscerum totum conservandum, interserviens. Præ cateris convenit ea, quæ exstat in Dispen. Londinensi, & quæ in Tab. ac phthisi incipiente egregie convenit. Sed Saccharum junctum non itaque omnibus proficuum, & huius ratione nociva quibundam observata fuit Conserva: vid. SYLVIVS ubi de phthisi §. 187. Alias à pluribus expertum, idque sæpius feliciter, est Remedium, de cuius efficacia vid. FORESTIUS l. 6. Obs. 57. VALERIOLA l. 5. Obs. 5. & SYLVATICUS Cent. 2. Conf. 40. Uti est, ut Conserva acriquissima vel creberris pro, inhiat utinquitur, vel vespertino præsertim tempore ad ℞℞. cum ℞℞. Terræ sigillatæ vel Lapidis Hæmatis hora i. ante cenam usurpetur. Peculiare quod etiam in Bolo Armena laet, unde nec inconvenienter hæc permixturæ possunt cum Floribus Sulphuris, Terra sigillatâ, Antimonio diaphoretico, Radice Ireos Florentinæ aliisque similibus Pectoralibus, & cum Conserva Rosarum Elecluarium parari possunt. Nalureum Indicum cum Conserva Rosarum assumptum admodum commendatur, & dicitur fuisse Remedium Doct. MOEBII Joenis. In usu quoque sunt Conserva Vegetabilium Vulnerariorum, v. g. Hedera terrestris, quæ potenter expectorant: item Herbae Colæ. Decodum Pulegii à quibusdam tanquam expertum contra phthisin commendatur, cui additur simul Sacus Hedera terrestris, & Infusum Nalburii Indii. In specie Pulveris Fungorum Salicis in Pleurilium Mole Maji collecturum ℞℞. cum hac Conserva creberris usurpata, tanquam expertum Arcanum à quibusdam singulariter laudatur. Nempe Spongia illæ vidualis in Salice superius interdu adnascentes exsiccatæ in Sole, pulveriscentur, & ita cum Conserva Majoranæ vel Veronica hæc forma Tlecluarii contra phthisin insperantur: vid. VELSCHIUS Millesim. C. 2. Obs. 60.

Quæ infusionem partis, præsertim ulnaræ, respiciunt, sunt ea, quæ Fermentum acium partis plus minus alacritate corrupevit corrigere, & ita patis ulceriosis provenitum inhibere valent, adeoque Detergentis & Manducantia appellantur. Hinc usurpentur ea, quæ Natura opus in consolidando loco laeso adjuvant, quantum possibile. Hæc inter excellenti Vulneraria distat, quorum Alkali pluribus usibus in phthisi curanda interservit, si præmissis præmittendis usurpentur, in specie si Ventriculi, ac primarum viarum, & his in locis principalioris Assumptorum alterationi, babeatur ratio. Hinc Decodum Bugulæ seu Confolide modice admodum commendat POTTIUS in Pharmacop. Spægrica ad Ulcera Pulmonum curanda. Decodum verò Symphyti & Præclæ cum China & Guaiaco laudat LINDANUS, assuendo in quolibet haustu dosin Antimonii diaphoretici, Florum Sulphuris, Anthellici Ferri, &c. De Ulmarie vi traumatica, rursusque Aquæ destillatæ in phthisi usu, vid. VELSCHIUS Millesim. C. 2. Obs. 60. annot. Ann. 4. M. A. N. C. Rorem Solis, ac ejus guttulas non pauci specificè commendant, cum hæc plantula rore limpidissimo repleta sit, etiam sub ardentissimo Sole ardore; unde etiam cum humedare & Rorem nutritivum reinvicere purant. Hinc & Scabios, Hypericum, Helenium, Sanicula, Confolida major & minor, Prunella, Veronica, Hedera terrestris, Piosella, Charentillium, Plantago, Vinca peruviana, Equisetum, Flores Rosarum, & similia, tam in Decodis, quam inde paratis Pulveribus, aut cum Saccharo & Melle Elecluaris, in usu sunt. In specie, ubi Acrimonia Pulmones erodere incipit, quatuor hæc Vulneraria, ut Scabios, Veronica, Hedera terrestris, quæ elegantissima & essentissima Plantula, & Charentillium, vel solitariè vel cum Decodis Lignorum usurpata & creberris haustu parum possunt den conservare, paritè & reitueræ phthisico. Tria enim vel quatuor simplicita plus præstant, quam centum: quibus in Scorbaticis, apud nos familiaribus, sub hæc Decodionis infundenda sunt Plantæ Antiscorbaticæ, quæ sunt Nalburium, Plantago aquatica, Trifolium asparicum, & similia. In specie si laeso pulmonum facta sit à Causâ externa, sola Decoda Vulneraria sufficient, si scilicet omni haustu aliquid addatur Ballami Sulphuri, vel Spermatæ Ceti ℞℞. Exempli gratia sequenti Decodo Charentis quidam Striereri gravi phthisi laborans per multos annos se sustentavit.

℞. Herb.

℞. Herb. Alchimill.

Pulmonar. macul.
Saxis.
Cent. min.
Veron.
Auris. Mur.
Pinc. pervinc.

Flor. Hepar. ana M℔.

Coqu. in Cerevisia bene defecata.

De colatura bibit mane jejuno, item ante prandium, & ante cenam cubitum iturus.

Vel

℞. Herb. Veron.

Alchimill.
Heder. terrestris. ana M℔.
Scabios.
Charesfol. ana M℔. vel M℔.

Coqu. in f. q. Cerevis. defecata:

D. S.

Potin Pectoralis.

De qua decocto Eger omni mane bonum haustum capiat, cuius haustus addatur semper vel *Ellicir propriet.* tam *sumplex*, vel *antiscorbut.* gutt. 30. vel 40., vel gutt. viii. de *Balsamo sulphuris*, vel *serm. Cusi* ℥i. ad ℥℔.

Vel

℞. ℞. gum. ammon. ℥i℔.

Tinctura sulphuris ℥i.

M. D. S.

Essentia Pectoralis.

Continuandæ sunt hæc dolæ aliquandiu, donec exaetò immutetur Dyscrasia lymphæ.

Vel in phtisi pulmonali nondum inveterata:

℞. Herb. Heder. terrestris,

Veron.

Pulmonar. macul.

Roris Solis,

Pyrola.

Alchimilla ana M℔.

Rad. beleu ℥i℔.

Vincetex.

Ires. noctur. ana ℥℔.

Flor. Scabios. M℔.

Farfar. M℔.

Craci integri ℥i.

Sem. Hortic.

Anis.

Feniculi ana ℥i℔.

Paff. min. ℥i℔.

Jupub. ℥vi.

Ficuum plaga. No. vi.

Concil. & contus. dentur ad chartam:

D. S.

Species ad potionem pectoralem.

Vel

℞. Herb. heder. terrestris,

Charesfol.

Veron. ana M℔.

Rad. Enula ℥i℔.

Ires. Flarent. ℥i.

Sem. Anis. ℥i℔.

Fenic. ℥i℔.

Ficuum No. iv.

Paff. min. ℥℔.

Rad. Liquirit. ℥vi.

M. D. S. ut antea.

Potest ex his fieri *Infusum*, vel *decctum*, ex decocto cum *saccharo syrupus*, aut cum Melle *hydromel pectorale*, & similia alia.

℞. Herb. scabios. M℔.

Heder. terrestris M℔.

Rad. Enul. ℥i℔.

Ires. Flarent. ℥vi.

Sem. Anis.

Fenic. ana ℥i℔.

Coqu. in f. q. Agas simpl. Celatura Biss. edulcor. cum syrupo aliquo, e. g., Dia-Sulphuris Willisii, Heder. terrestris, de Symphyte, qui admodum commendantur, aut ubi opus est Expectoratinoe, cum syr. Vernica, Nicotiana, &c. q. s. pro gratia saporis.

D. S.

Potin Pectoralis.

Apud nos pluribus in frequenti usu est sequens Farrago, quæ feliciter pluribus cessit, magis tamen ad phtisim pulmonalem inclinantibus, quam pericò phtisicis: liquorem

Tom. II.

ob alcali herbarum Vulnerariorum, aliorumque ingredientium vis alterativa in corrigendis corporis contentis, & confirmandis viceribus non contemnendi usus est:

℞. Herb. Pulmonar.

Veron.

Fol. Sen. sine stip. ana M℔.

Herb. Salu. ros.

Hepat. nob.

Hysopi ana M℔.

Flor. Hepar. nob.

Rad. Polyod.

Tarment.

Liquirit. ana M℔.

Sem. Anis.

Fenic. ana M℔.

Isicif. & contus. coqu. in f. q. Agas simpl. additis cochlearibus duobus Mellis:

De colat. ℔. vi. vel viii. mane, & vesperi bonus haustus assumitur.

Vel

℞. Herb. Pulmon.

Hepar.

Scard.

Cent. min.

Fragar.

Hysopi,

Salvia,

Tussilag.

Euphras.

Prunell. ana M℔.

Flor. cent. min.

Rad. Liquirit.

Polyod. ana ℥℔.

Jupub.

Sabios. ana No. xv.

Pafful. maj.

min.

Ficuum ana ℥i℔.

Fol. Sen. sine stip.

Sem. Anis.

Fenic. ana ℥i℔.

Isicif. & contus. coqu. in Agas simpl. iv. vel v. in vase clauso:

D. S.

Potin Pectoralis.

De qua fumatur calidè haustus mane, & vesperi duabus horis ante cibum.

Faciunt hæc pulveres *Antiphtisicis*, imprimis pulvis *Antiphtisicus D. Erbenii*.

℞. Vis. Pyrr.

Salu. ana ℥i.

Pulmon. macul. vel Consolid. med.

Veron.

Flor. Tussilag. ana uoc. ℔.

Rad. Enul. ℥i.

Sacch. cand. albiss. unc. i.

M. f. Pulvis. Dosis ℥i.

Pertinent hæc *Electuaria* quorundam, imprimis tamen excretioni infervientia, ex pulvere scordii, Salvia, radice Helenii, &c. cum melle ad electuarium consistentiam redactis. Sed cum his vulnerariis modo recensitis in specie simul usurpanda sunt Balsamica, quantum hecica plùs minùs iuncta eorum usum ferre possent, adeoque minus confirmatis, seu in cura magis incipientibus, i. e. in preservatione phtisicos conducunt; qualia sunt Aloë, Myrrha, Balsamus sulphuris cerebiniatus, & similia item Antimoisum dia-phreticum, vel Antielectricum *Pæteri*, &c. e. g.

℞. Herb. Salu.

Scordii ana M. l.

Pulverificatis adde

Myrrh.

Antimonii diaph. ana ℥i℔.

Cum f. q. Mellis: vel pulv. pafful. ros. f. Electuarium spissum, irrorandum cum Balsamo sulphuris vel phtisicinato, vel antiseo.

D. S.

Electuarium Pectorale.

Vel Balsami peruviani gutta l. aut plures cum Saccharo aut Floribus sulphuris in pilulas redactæ, aut etiam guttatim ad gutt. viii. vel x. mane in iusculo, vel vehiculo calido, aut Vitellu Ovi ferbilibi dissolutum balsamum, & quotidie usurpatum, multum laudatur in phtisi, & Ta-be, & ad quævis partium lésiones, & exulcerationes: Vid. M. A. N. C. *ana. 3. observ. 77.* Huc pertinet Balsamus Peru-

D d d

xvianus

vianus Domini D. DOLÆI in *Encyclopædia Medica de phthisi* deiericus: Hinc & RIVERIUS multum commendat has Pilulas contra phthisin cum Balsamo Peruviano ita:

℞. *Mell. pilul. Rosi* ℞i.

Animum diaph.
Cum. *guajaci* ana ℞℞.

Cum. *Lq. Balsami Peruviani* f. *Massa*.

Dosis ℞i. Capiatur per mensem integrum.
De *Terebinthina* res nota est, quatenus vi balsamica in quibusvis partium internarum Exulcerationibus valeat, qua derergit & purificat; unde etiam *Balsamum Occidentale* ita nostris vocatur. Optimè datur in Ovo forbilli jejuno stomacho, & dr. ℞. ad summum dr. iij. vel sola, vel addito modico Florum sulphuris, ut sit conveniens in Ulcere continuo ad aliquodiu; item permisceri solet eadem cum Melle violato, recipiendo,

Terebinth. ℞℞.

Mell. violat. ℞iij.

M. cum paucis pistello Ovi

De qua capiat *Æger* omni mane quantitate Castane in Juculo cathido.

Alii *Terebinthina* ℞℞. cum *Melle rosato* & *Syrupo Hedæ*, *terrefris* vel *Nicotiana* miscetur, & in forma Boli subinde assumendam suadet.

Sed nimis ingratus hic ejus est usus; omnino optimè in Vitello Ovi dissoluto capi potest; Vid. VELSCHIUS *Attemin. l. 2.*

His perdis demum ad *Lac* accedendum, vid. LOTI-CHII *observ. p. 239. & 253.* RODERICUS *de Fungis l. 2. & MARCELLUS DONATUS Hist. Med. Mirac. lib. 3. cap. 10.*

Quidam in phthisi *Salia volatilia* commendat, in specie Sal volatile, & Spiritum sanguinis humani rectificatum, quem in Phthisi hereditaria, & desperata mira præstulisse BOYLE testatur; sicut *Mém. le FÉVRE* in *son Chymia pag. 1.* commendat Sal volatile Cornu Cervi quique spiritum supra Balsamum Sulphuris digesta, & tincta. Alii spiritum Formicarum, alii Mercurium Microcosmicum, uti vocant, id est, spiritum, & Sal volatile Urinae, contra phthisin commendat; imprimis si moderatè Acido in tertium Ammoniacale mutetur, & ad guttas vi. vel viij. propinquetur. Sed verum ut fatear, in Tabæ confirmata, & exulceratis Visceribus nullo modo convenit, nisi altem in ea, quæ ex defectu distributionis Chyli, ac post Morbos Chronicos; verum in inveterata hæc non succedant, nec tamen novissima præstant Remedia.

Quoad *Symptomata* in phthisi mitiganda: *Tussim* quod attinet, præsertim *serenam*, hæc mitigant optimè suprà laudata Opia, quæ ipsa etiam *sudores nocturnos* colliquativos satis molestos cohibere solent, Abhorrentibus appropriata iuncta: hinc aliquando phthisicis perfecto seu confirmato præscripti sequentes Pilulas, quas etiam *differ. 2. de Opia variæ diaph. c. 3. §. 8.* atque in *Idea præscrib. formul. coss. 2. §. 3.* interui:

℞. *Antibell. Poteris* gr. xv. ad ℞i.

Sacch. sacchari ℞℞.

Extract. Croci gr. iv. v. vel vi.

Laud. opiat. gr. ii. vel iij.

Cum f. *g. Balsam. Peruviani* f. *de Capaite*.

F. Pilulæ pro duobus dosibus:

Quarum unaquæque vesperi duabus horis ante coenam sumebatur: sub usu earum *Æger* semper biliorum reddebatur, sudore nocturno, & Tussi illa posse cessante: N. *R. post inde non amplius sedans.*

Item

℞. *Arcan. dupl. ℞iij.*

Lapill. cancer prop.

Antibell. Poteris ana ℞℞.

Laud. opiat. gr. iv. vel v. M.

Div. in 4. partes, singulis diebus duabus horis ante coenam capiendas.

Tussim catarrhalem siccam, & à tenuitate aut acrimonia humorum in specie vesperinam aut nocturnam plura minus siccam, mitigant *Lenientia*, aut si à Materia tenaci, & firmius impaeta fuerit, *Expectorantia*. Quæ Lenientia illa, communiter incrassantia dicta, sint? *Infrà ubi de pleuritide*, audietis; quibus &ungi possunt papaverina, & Opia, v. g. Pulve de Syrrace, ac Cynoglossa, utpote qualium usû impilati satis diu conservari possunt phthisici, earumque etiam dosin satis largam sine damno ferunt: vel M. A. N. C. *Ann. 2. & 3. observ. 207.* ita tamen, ut cum expectorantibus alternet,

Vel pro usu vesperino.

℞. *Succin. prop.* ℞℞.

Myrrh. cost.

Sal. volat. succin. ana gr. v.

Laud. opiat. gr. i. vel ii.

Cum *off. myrrh.* vel *Olio dissillat. succin.* f. *Pilulæ.*

D. 5.

Pilulæ Vesperinæ contra Tussim.

Vel

℞. *Essent. Opi* ferment. ℞i.

M. D. 5.

Essentia Vesperina.

De qua 11. guttæ sumantur in aqua scabiff.

Vel

℞. *Extr. sulphuris pulvoris* gr. xii.

Myrrh. gr. v.

Extract. Croci gr. iij.

Laud. opiat. gr. i.

Cum *Essent. Myrrh.* f. Pilulæ vesperi capiendæ, S.

Pilulæ Vesperinæ pro 1. dosi.

Vel

℞. *Aqu. ferpill.* ℞i.

Laud. opiat. gr. ii. vel iij.

Syr. Peron. ℞i.

M. f. Potiuncula.

D. 5.

Potio Vesperina pro una vice.

Vel

℞. *Aqua scabiff.* ℞i.

Syrup. scabiff. vel *Peron.* vel *ref. sal. ℞i.*

Dissol. montani unc. iij.

M. 5.

Succus Vesperinus pro aliquot vicibus.

Vel

℞. *Rad. tres Virens.*

Fior. sulphuris ana ℞i.

Animum diaphor. ℞℞.

Laud. opiat. gr. iij.

Olei dissillat. succin. gutt. xij.

M. f. Pulvis pro aliquot dosibus.

D. 5.

Pulvis Vesperinus pro aliquot dosibus.

Vel

℞. *Lapill. cancer.* prop.

Fior. sulphuris ana ℞℞.

Laud. opiat. gr. iij.

Olei dissillat. succin. gutt. i.

M. f. Pulvis. 5.

Pulvis Vesperinus pro una dosi.

Vel

℞. *Syrup. Cost.* ℞i.

Fior. Benz. ℞℞.

Olei dissillat. succin. gutt. iij.

M. f. Pulvis pro 1. dosi.

D. 5.

Pulvis Vesperinus.

Theriacalem autem fugiant patientes: nam utrum Opium in Theriaca fermentetur, attamen, quia Medicamenta acris copiosa ex feminibus, & Aromaticis habet admixta, causat sudores nocturnos.

D. MICHAELIS sequentes formulas commendavit:

℞. *Pulv. anodyn.* gr. xij.

Antibell. Poteris ℞℞.

M. D. 5.

Pulvis Vesperinus pro 1. dosi.

Vel

℞. *Conserv. Betæ.* dr. ℞.

Pulv. Amad. ℞℞.

Cum *Syr. de Betæ.* q. f. f. Bolus.

D. 5.

Bolus Vesperinus pro 1. dosi.

Vel

℞. *Aqu. ferpill.* dr. ii.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. Betæ. dr. ℞.

M. f. Potiuncula.

D. 5.

Potio Vesperina pro 1. dosi.

Vel

℞. *Aqu. pulm.* *Vital. unci.*

Syr. Dissol. Montan. unc. iij.

de Betæ. dr. i.

M. 5.

Succus Vespertinus pro aliquot vicibus.
Quoad symptomata in *Serena*, eisdem Nicotiana, & quævis ex ea parata, sunt optima. HEURNIUS in *Præsi* solo *Syrupo* ex succo ritè parato quosdam Tabidos phthificos restitutos fuisse memorat: produxit. Certe ad Ulcus pulmonum abstergendum, & sordes acres plùs minus vicidas pectori inherentes eliminandas, optima sunt ex Tabaco Remedia, quæ præter vim expectorandi, Vulturariam quoque possident. Nam proxima via pulmonibus curandis est per asperam Arteriam; hinc tot ferè proflant Eletharia Antiphthifica, quot Ramuli arteriales & venales, qui tamen sunt iniquiores. Formulæ sunt tales:

- ℞. Herb. *Borragi*,
Malva an. M. i.
Rad. *Liquirit. cas.* ℥i.
Aib.
Cichor. an. ℥℔.
Coq. in l. q. aqua. Colar. Filtr. addo
Lich. de *Parfar.*
Syr. de *Nicotian.* an. ℥i. vel ℔i.
M. S.
Potio Antiphthifica, coctilem capienda,
Vel
℞. *Conf. ro. Brdr. tartr.*
Scabif. an. ℥℔.
Rad. *Cichor. cond.* ℥vi.
Piscar. rec. ℥℔.
Elex. *fus. ign.* ℥i.
Antibell. *Poterii*
Flor. *Salphoris* an. ℥℔. vel ℥i.
Cum l. q. *Syr. Nicot.* f. Eletharium;
D. S.

Eletharium, de quo ad magnitudinem Castaneæ fimen-
dum. Plura videb. infra cap. 8. §. 18. ubi de Pleuritide &
Pneumonia.

Pariter si *Spasmod. miltum* ac *fortidum* fuerit, Mel & Myr-
tha ferèatum promoventibus semper addenda erunt.

Si *adjuñda Febri*, curatur per Abstergentia, imprimis
Terrea. Sic ex Muretilibus est Antisepticum *Poterii*, An-
timonium diaphoreticum, Crythallus præparata & Abster-
gentia nota: c. g.

- ℞. Radic. *Altheæ*,
Cichor. an. ℥i.
Flor. *Melo.*
Scabif. an. M. i.
Tamarisc. ℥℔.
Salsol. No. viii.
Coq. in l. q. aqua. Aerd.
Colaturæ a le
Lapill. *Caecor. præp.* ℥℔.
Aerimoni. diaphor. ℥i.
Syr. *Viclar. solut.*
Flor. *Papav. erras.* an. ℥℔.
M. D. S.
Refrigerans potio Pulmonalis.
Vel
℞. Lapill. *Caner. præp.*
Antibell. *Poterii* an. ℥℔.
M. i. Pulvis;
Div. in 3. part. aqu. S.

Pulvis Refrigerans pro 3. vicibus.

Diarrhea Colliquaria, si quæ supervenerit, utut ferè ma-
li sit omnis, Abstergentibus, Terra sigillata, cornu Cervi
ulbo & similibus inhibetur, vicando tunc, quantum possibi-
le est, Melitta, faciliè alias Alim. moventia. De *saffi-*
bus, Odoramentis & similibus nil attinet dicere, Constat
suprà laudatus BONETUS.

Quoad *Distam*, ut ritè formetur, imprimis Ventrien-
li, eisdem virtutis Digestivæ, & hinc distaminis Appetitus
habenda est ratio. Hinc Alimenta probè nutritiva, co-
piosum Alkali, quodvis Acre temperans, fuggerentia, &
quæ sacrum minus alterabiles, sed potius glutinosum ro-
ridum, nec faciliè exhalabilem suggerunt; hinc Cancrì,
Olivæ, &c. subinde utiles phthificis observatæ fuerunt,
ut suprà dixi. Præ cæteris Lac, & quilibet Lacticia,
ubi extera ritè præmiata fuerint, & Dyscrasia Contento-
rum maximam partem correctâ, coavenientissima sunt, de
quo pariter jam suprà dixi.

Præterea ad *Distam*, Passulorum earumque Rob er-
rebius usus, & Ova forbilla, sunt optima: à potu quoque
copiosiore, quantum fieri potest, Agri abstinent, ac Se-
rum copiosius generetur: vid. WILLISII *Pharm. Rat.*

Part. 2. *secl.* 1. cap. 6. pag. 105. Ex Vinis verb. dulciora fo-
figant, v. g. Malvaticum & Alacanthinum: vid. SYL-
VIUS de *Phthisi* §. 222. Ipse potus ordinaris phthifico-
rum Helicorum commodissime conditus sit Fumo Sulphu-
ris, ad imitationem HELMONTII, qui Potus sulphu-
rati ad curam phthificos sunt singulares: Imò & fumus sul-
phuris cum aliis per os attractus singulare est experimen-
tum cupulam Medici Hyberni, qui aliquot desperatos
phthificos curavit, uti refert BOYLE in *Physic. experiment.*
pag. 277.

Ratione arie saluberrimas videtur phthificus siccus & se-
renus, nisi paulè emaciati & exsiccati fuerint: vid. SEN-
NERTII *Præsi* l. 2. Part. 2. cap. 12. pag. 225. & MAYER-
NE de *Aridura* pag. 24. Aut si etasus, Exhalationibus
tamen sulphureis relectus, fuerit; quamvis non omnibus
acque phthici idem Aer proportionatus observetur: Vid.
WILLISII *L. a.* pag. 85. 86. &c.

Sunt, qui etiam *Transplantationis* medicuram satagunt
Atrophias. Modus vid. in HARTMANNI *Præsi*
Chymici, ubi de *Atrophia*: Nempe Ovum in Urina Agri
coquunt, post nonnihil apertum in acervo Fornicarum
sepelitur; sic Atrophia laborantes curantur. Quod & non
tantùm D. MICHAELIS aliquoties cum successu exper-
tus fuit; sed præterea quoque Medicus veteranus in Ang-
lia Atrophia correptus se ipsum curavit hoc modo, uti
refert BOYLE in *Infusa Philosph. Experiment.* Item cum Un-
guento Armario: vid. SCHMUCKIUS in *Corar. Magnat.*
pag. 59. item PARACELSUS de *Rebus materialibus*. PLY-
NIUS l. 2. c. 22. dicit: Si quis tussilem in parva Rana,
arboris scandentis, ex cuspide, *Idemque dimittat*, ad Tragi-
litarum. Simile est, quod de Equi Saliva SEXTUS MAR-
CELLUS scribit: Si Equi salivam phthifici libenter; aut
qui male tussunt, sicut efficiuntur. Equus autem moritur:
Vid. CASPAR à REYES in *Comp. Elph. Quæst.* 53. pag.
666. Sed talia transeat.

Hæc sunt, quæ dicta fuerunt, de Atrophia Universali
totius Corporis. Superest adhuc

A R T I C U L U S III.

De Aridura Partium.

A Trophia seu Tabes particularis cupulam partis seu
Membrì determinat, quæ alias *Aridura Partium*,
Ger. das *Gliederkrankheit* dicitur, ea est nam internarum,
nunc externarum. Internarum partium Aridura, uti co-
gnita est impossibilis, ita sub Curam nunquam casâ, nisi
insupio ferè sit Pulmonum ariditas: de quibus SYL-
VIUS in *Præsi* cap. 20.

C A U S Æ.

Externarum verb. partium Aridura seu Atrophia parti-
cularis externa dupliem Causam agnoscit: nempe quod de-
fectus sit sub Nutritione, vel in ipso Nutritione, quod de-
ficit in parte; vel in errore ipsius Partis nutriende, quæ nec
recipit, nec agglutinat Nutrimentum. Rarius observatur
in quadam parte à Causa interna, sed ut plurimum præce-
dentes quandam occasionem ea sequetur externam. *Dif-*
fusia Nutritionum, quando nempe tam sanguis propriè di-
stus, quam Chylus, non affluit in partem nutriendam de-
terminatam, propter quoddam impedimentum, propter
Vasorum, Arteriarum in specie ad eam tendentis læsionem
& compressionem, ex Dilatione, Luxatione, Fractura,
Tumore duro, Vinculis & similibus impedimentis. Ra-
rissimè tamen ex hoc principio oriuntur Atrophie parti-
culares, vel Ariduræ; Motus enim Massæ fluminae per
Arterias est vehementis, ejusque insignis per-tenues poru-
los quosvis & angustias penetratio, ut in Vasis capillari-
bus manifestum est.

Potius ergo fit Aridura vitio ipsius Partis distituta;
nempe vitium subest vel partis non recipiens, vel non
retinens, vel non assimilans, vel non agglutinans
Nutrimentum: Id quod frequenter fit, si pot. nimis au-
gustantur, & Fibræ exarescunt, ita ut Pars fiat inep-
ta, neque Alimētum, licet conveniens, aut recipere,
aut retinere, aut commodè illud agglutinare. Debilitas
hæc depedet à spirituum vitio, Animalis nempe lassus,
& hinc Inertia, qui ceu Agens se habet in Nutritione,
& Alimenti appositione. Debilitatur autem Spiritus In-
stus in manifesta partis & Membrì cum Vulnere ac Ul-
cere læsione; quando v. g. in Vulncribus Vasa ad ex-
tra-

tendens rumpuntur, Nutrimentum partis copiosius effluit, aut per Ulcera id copiose in Pus mutatur, & ita cura sicco nutritio Infusus Infusus Infusus affluunt, à quo spiritus Infusi conservatio & vigor dependet, pars aperiit, ac difficulter postmodum reficitur potest. Ubi hoc venit praeterit in Articulis profundis Vulneribus, & hinc aliam partem nervorum similibus laesionibus, quibus copiosior Synovia fluxus supervenire solet; ita enim interceptis Nutrimetum, & sub forma Poris vel Synoviae excluditur. Nam Synovia nihil est aliud, quam liquor chylosus nutritivus, in parte nutrienda occasione Vulneris, plus minus ad Ulcus tendentis, degenerans in liquorem laniolium & aquosum, sub quo degenerante acorem occultum contrahit, et exinde Vulnera ista partium non solum insigniter concumacia, ac simul periculosa fiunt, sed simul partes istae laesae, dum desituntur convenienti Nutrimetum, necessarii avertunt. Unde fibrae exsiccatae & contractae poros partis augulant, eoque magis connivere seu quasi subdure faciant; ipso vero spiritu Infuso plus minus laesificato, Nutrimetum convenientius assimilatio imparetur. Unde sanatio licet Vulnera seu Ulcera, nihilominus tamen pars difficile & tardissime deinde nutriripotest, quin potius saepius pertinax & contumax Ariditas sequitur. Quia & cum debilitata dicto modo pars minus rebus sit, atque alia ipsi respondent, (id quod *Boerhaave* vocat HELMONTIUS) propterea facilius ac sensibilius ferè exterminum Objectionum imperfectiones recipit, unde tales Aegri, resistent licet, tamen quavis Aeris mutationes in loco aene laeso modo periculose. Deinde alterum vitium latet in spiritu Animalis, qui per Nervos ad partes distribuitur Agentis vicem sustinet, ita ut mediante hoc Nutrimetum agglutinetur & assimilatio peragatur; unde & in hoc puncto spiritum Animalium ratio habenda est. Si enim debilitantur in aliis partium nervorum laesionibus, sine aperta licet continui solutione, his tamen debitis motus spiritus Infusi plus minus inhiberi potest; hic Paralytes Apoplexiam sequentes, convulsiones Articuli, & hinc compressiones & dislocationes Nervorum ac Tendinum, item horum ipsorum dislocationes, post Luxationes & Fracturas Ossium, &c. Vid. HILDANUS *op. cit.* 90. & de *liber. et Medicor.* c. 24. A quibus ipsis, externis licet, & apparenter parvi momenti laesionibus, propter spiritus Animalis Infusi impedimentum plus minus radiolum influxum pars in motu successively debilitatur, cum sensu quodam Suporis ac Fornicationis successively flaccidior, & plus minus tibia quasi redditur, postmodumque Atrophia particulari accipitur; uti & Circumflexiones in locis Articulis, scilicet ad eas disponunt, quotenus per has partes nervosae & tendinosae non recte content, adeoque spiritus Animalis interceptur; unde à Gangliis Atrophiae particulares observatae fuerunt, vid. PLATERI *Praxis* Tom. 3. pag. 208 & 211. WURZII *Chirurgia* part. 2. Obferv. 79. Quo faciant casus ab alto. Consequenterque partium, imprimis circa Articuli, & quae sunt aliae causae successively inferentes ariditatem partium, ita, ut raro vel nulla sit Atrophia particulari à causa interna. Pertinet hae denique de fluxu Casarialis, quando videlicet sine ulla causa manifesta, scilicet ab Lymphae Casarialis decubitu in quandam partem, cuiusque Articulationem, & inde Fibram ac Tendinam paralyticam plus minus resolutionem, cum sensu dolens obtulo, praeterit vel pertinet ad postmodum tempore ingravescente, pars successively ad Atrophiam particularem disponitur. Qua ratione non rarum est, in Arthritide Vaga scabietica, aut etiam in aliis Arthritidis speciebus, Partem, quae saepius aut gravius affligitur, debilitari successively, flaccescere plus minus ac tabescere.

DIAGNOSIS.

Signa huius ariditatis particularis per se patent: Causae, cum semper aut uperlimum sint externae; ex relatione Aegri explicandae.

PROGNOSIS.

Omnes hae Ariditae difficles sunt curatae, idque est magis, quo magis confirmatae ac inveteratae. Prae ceteris tamen optime de hoc negotio scripsit FELIX WURZIUS in *Medicina Vulneraria Germanica* (imprimis, *Tract. de Symptomate Vulnerum* cap. 19. & 23. p. 380. Post hunc vid. AGRICOLA in *Chirurgia* parva pag. 31.

CURA.

Quod Caram: haec eo sit directa, ut promoveat spiritum Animalium, & hinc simul Massae Sanguineae ad partem laesam influxum, quo reparetur sufficiens Nutritio, Sanguis quidem, & mediante eo Nutrimetum advehem agglutinetur. In specie habenda est ratio causae Occasionalis, quae introducat Atrophiam: scilicet attendendum est, an cum solutione continui, & effluxu spiritus nutritivi insoluta fuerit Ariditas? an vero à sola laesione, sine Continui solutione, five hae ubi externa, aut Paralytica passio sola fuerit, five ab interno Lymphae acidae decubitu? Nam si prius obtinet, si v. g. successively ex Vulnere subsecuta sit Atrophia particularis, Remedia magis Temperata, Pinguia, adeoque, uti vocant, moderate Caliditatis, sed probe Humedantia, & Humore roscido oleoso partem perfundenda, adhibenda hic sunt: Sin posterius vero, Acriora, & partem laesam Irritantia, ut vocant communiter, caliditatis & facultatem Astrictivam stimulantia, hic conducunt, ut ita sensibilius afficiendo sensum Tactus, spiritumque uberior radii, humorumque copiosior affluxum, ita in parte conservetur, & insidua convenientia Pororum cum blanda frisione restituatur; unde in Atrophia post Vulnerationes Artuum Membra in sanguinem Bovis modo madati immittitur. Posterius vero si fuerit, si nempe sine vulnere contigerit, cum internis seu sudoriferis externis Diluentibus & Resolventibus conveniunt. Ceterum Catholicum ad qualemque particularem ariditatem remedium Arcanum Aluminis, quod specialiter commendat FELIX WURZIUS in *Chirurgia citata* loco, uti etiam AGRICOLA in sua parva *Chirurgia*, qui duo praeter reliquis omnibus Thematibus hoc tractantur. WURZIUS describit huius arcani preparationem clare quidem, interim selectis in Aluminis habendas, quod non vulgare illud Rupem, sed Plumum sumendum. Aliis vocatur Germanice *Das Federstein*, uti vocat WURZIUS aliquo in loco, quod ipsam Amianti species est. Hoc Plumum, minime pungens accipitur, juxta illius descriptionem, & cum aqua Salis suis fundatur fortis igne in Crucibulo, usque refrigerata condensetur in Lapidem, cui assundatur postmodum Aqua fontana, à qua resolvitur Sal, Alumen vero ad fundum subsistit. Hoc Arcanum feliciter omnes Ariditates possunt curari, si nempe laesio debita docti misceatur suo Linimento, vel Unguento, & cum pinguetudine humana, aut alia Appropriata, vel Oleo laurino, vel Oleo specie subigatur in forma Linimenti, vel debilitatur Oleum ex Pinguedine humana vel urina, quod fit, quando mista cum Ciceribus Vitae destillatur. Adhuc huius univ. iv. AGRICOLA docente, univ. Olei Phosphoratum, & misceatur hae cum Arcani illius Aluminis Salis, illoque fricetur Membra aerecentia.

In specie autem, si ab effluxu Nutrimeti aut Synoviae post Vulnera insigniora seu Ariditae, convenientior fortis partium cum Decoctis emollientibus, Malvae, Althaeae, Seminibus Linij, Capitis & Pedum Vervicis, aut ex Animalium partibus, v. g. ex Capite, Pedibus, Pulmone & Hepato Oris & Agni, &c. donec ab Odibus abscedant Caro & omnia, quae asserent, quae separata ulterius in Aqua ipsa coquantur, & cum hoc Decocto Membra lavetur & foventur. Postmodum fiat Litus ex pinguetudine hominis, Vulpis, Catheris, Equi, Casti Sylvestris, Ursi, Canis, Lupi & Taxi, &c. Vel in specie fiat Unguentum ex

Pinguetudine Ardae,

Rosae, ana ℥i.

Pessell. ℥i. vel ℥iij.

& facta Lita calido applicetur Emplastrum ex Cera & pinguetudine porcina: Conf. FELIX WURZIUS.

Item convenit succus Lambericorum cum Oleo Amygdalarum dulcium mistus, si Membra eodem fricetur.

Quod si vero ex Paralyte, Contractura, &c. sequatur ariditas, Remedia externe Irritantia & Vellicantia convenient, quae nempè partem laesam variè vellicando, spiritum Sanguinisque, & consequenter Nutrimetum affluxum promoveant. Hinc ordinario laudantur frisiones cum Urticis recentibus, quod euphorion succedit, si nempe Ariditas est citra laesionem manifestam à Vulnere factam, sed ex compressione tantum Membrum, cuius ipse Exempli hae ratione curatores Pedum Ariditae laborantium novit. Post Frisiones Partium decolorum vixit institutas, Arcanum Aluminis Wurzii cum Linimento & Pinguetudine appropriatis subactum asperetur, ut jam dictum.

Modus

Modus autem Frictionis est hic; scilicet Membrum arensens probè fricandum est, incipiendo à summo, & imò rependo, donec illud, labore hoc diu continuato, incalcescat, rubescat, & consequenter Vasa turgida appareant. Quando autem Membrum ita calefactum rubicundum apparet illinatur illud Linimento dicto, pannisque calidis probè postmodum custodiatur, hoc repetatur semel, bis vel ter in die, pro necessitate circumstantiarum, donec desinat Ariditas. Quod si vetò debet Arcanum hoc Aluminis, Linimentum ex Alumine plumbo, pulvere Sabine, Oleo laurino, Juniperino, & similibus distilis, prout à WITTIGIO sequenti modo describitur, ut utpote: c. 8.

℞. Ping. Taxi. ℞i.

Olei Laurin. ℞iv.

Bacc. Junip. ℞i.

Spica ℞i.

Ping. Partis. ℞iv.

His omnibus ad ignem probè calefactis adde

Sem. Urt. ℞i.

Puls. Sabini. ℞i.

Alum. Plumb. ℞i.

Hæc mista pro Unguento applicari possunt in Aridura partium, citra defectum synoviae.

Quibuscumque tanquam secretum commendatur hæc Aqua cum Vino destillata ex semine Urticæ, radicibus Armo-raciz, & similibus, prout describitur ab AGRICOLA I. s. item à SCHNUCKIO Theaur. Med. Secret. 30. seq. modo:

℞. Sem. Urtic. Rom. ℞i.

Rad. Armo-rac. rec. cont. ℞iv. ad ℞℞.

Ariet. ℞iv.

Piperis longi ℞i.

Hæc omnia cum Vino albo digesta in Balneo Mariæ per 24. dies nocteque, agitando quotidie Maltam, destillentur.

Aqua spiritusosa acris prodigiosa inservit huic negotio, si eadem Membra cum panno calido probè fricata sapidis illinantur, præsertim in casu, ubi Ariduræ Membri sensus Formicationis aut suporis una adsit.

Et hæc quidem conveniunt, si affluxus Nutrimenti impeditur.

Præter quæ Remedia, si non confirmata Aridura, etiam sufficiunt pro fricatione Medicamentis ordinaria, nempe ex Lumbicis terrestribus paratus Spiritus ex Latis aut Succis eorum cum Oleo Amygdalarum dulcium subtilis: Quæ ipsa etiam locum habent, si ex defluxu Cæcæbali dâteris Aridura superveniat. In quo casu præter sudores Interiõs concitatus, optimi sunt Spiritus Formicarum & Lumbicorum terrestrum cum paucis Spiritu Vioi addito Alkali fixo, per retortam destillati & rectificati; vel Aquæ Articulares cum paucis Spiritu Salis ammoniaci cum Calce viva, aut cum Oleo saponis imprægnatæ, ita applicentur aut usurentur, imprimis Liqueor Lumbicorum terrestrum per deliquium in elibato paratus, prout describitur à MÖLLENEROCCIO de Variis pag. 270. cum usu applicari potest. Item conveniunt Oleum Lumbicorum terrestrum, Oleum Nardium & colinum, & omnia Olea nervina cumposita, cum Oeis destillatis Juniperi, Lauri, Cereæ, Saponis, angustis nervinis; e. g. Agrippæ, Nervino angustanorum, &c. juncta. Linimenta vero his semper præmittantur Balnea, aut somenta, donec Membrum probè incaluerit, hinc, idem ad isocalentiam novam dorsum versus fricetur, & Emplastrum denique appropriatum, v. g. Emplastrum de Galbano croceatum, oxycroceum, vel aliud Nervinum quoddam applicetur, quotidie repetendū, donec Æger in Membro vel ruborem, vel formicationis sensum percipiat; postea enim ad Aquas vel Spiritus articulares, similesque penetrantes, accedendum. Pro scopo hoc conveniunt etiam Frictiones cum pannis apertioribus, & Cucurbitulæ vasis majoribus admoveandæ, imprimis illæ Sudoreæ, quales, post HILDANUM C. 1. Observat. 10., TULPIUS lib. 3. Observat. 49. commendat. (L.)

Hæc de Ariduræ & Atrophis Universalibus & Particularibus, & ita etiam de Nutritione deficienti.

C A P U T II.

De Nutritione aucta.

Quod nullum attinet Nutritionem: sit hæc vel universalis in Corpore secundum Carnem Musculosam, & huic annexam pinguedinem, in Corpulentia dicta nimia & Obesitate, vel particulatim, secundum Partem nonnullam & Viscerum Parenchymata, quæ ratione observatæ fuerunt nimiz & stupendæ magnitudines Hepatis, Lienis, Renum & siminum partium: de magnis Lienibus jam suo tempore locutus est HIPPOCRATES. De hac particulatim Auditione quendam Viscerum sufficienter actum fuit in Physiologia.

ARTICULUS UNICUS.

De Corpulentia Nimia.

Quod vetò attinet universi Corporis Augmentum in Corpulentia nimia, ea est, quando habitus Corporis Musculoso insigniter augmentatur, sicuti quando pinguedo copiosè, & in specie partes subcutaneas, intarcat & intermit, dicitur Obesitas nimia. Quo pertinet Habitibus corporis vocatus succi-plenus, i. e. talis Status, si totum corpus copioso succo nutritivo abundanter irrigatum, adeoque Habitibus mollis, humidus, tumefactus, & ita uno nomine succi-plenus, delictus, & ad tactum suavis percipitur. Alio nomine vocatur Corpus quadratum, dum nempe omnes partes in omnes dimensiones ita abundanter nutriuntur, ut etiamde conveniunt robur acque firma consistentia Corporis conciliatur: Metaphora delumpta ex Mathesi, in qua Corpora quadrata pro firmissimis habentur. Item facit huic Vetetum Habitibus Athleticus dictus, cujus apud Veteres, in specie aphas, HIPPOCRATIS sect. 1., subinde injicitur mentio: quando nempe Carnes Musculosæ nimis augentur, & ita postmodum tale robur conciliatur illidem, quale veteres Athletæ habuerunt, qui invicem congregentis exercitia athletica suscipiebant. Huic Habitui Athletico, & Succi-pleno sunt quasi affines corpulentiz nimiz; ut adeo Corpulentia nimia sit, quando Corporis totius, tam Ventris quam Artuum, peripheria in tantum conveniunt Nutrimento est aucta, ut actiones, imprimis Motus, sique vel Thoracis respiratorios, unde Corpulentus sunt anbelatores; vel & Motus Artuum apprehensivos, siue totius corporis progressivos, aut impediuntur, aut insigniter viciuntur. Cum enim sit Motus per Fibras musculorum; hæc autem, dum omnia intercepta musculorum spatiosa succo nutritio in tantum tam repleta & infacta, ut nullo modo in seipsum cedere possit Musculus, hinc Fibre nimis distendæ, & per consequens membrum ipsi annexum, non possunt contrahi, aut abbreviari: Alias non raro prostant Exemplum corpulentiorum ad Obesorem suffocatorum, de quibus vid. SCHENCKIUS lib. 2. Obs. speciatim SENNERTUS Pr. l. 5. Part. 1. Cap. 4. p. 21. Mulierem tætere 36. annos natam 450. lb. item Virum 1600.00. pendentes; & præterea p. 23. Nobilem post Febrem malignam adeo obeso rediitum, ut vix loco suo se movere poterit: sic etiam TIMÆUS in suis Casibus l. 6. Caf. 1. 2. & 3. pag. 262. sequ. notat Mortem repetitam ex plenioris corporis Habitu. Stupenda superius Obesitatis nimiz Exempla, cum inter alia referat PANAROLLUS Part. 4. Obs. 31. de Muliere adeo obesa, ut pinguedo ad Genas usque laberetur, 30. circiter & amplius librarum: sic stupendum abundantis pinguedinis Exemplum in Abdomine Puellæ recenset BARTHOLINUS Casus. 2. Epist. 81. plura qui caput videat MARCELLI DONATI Historiam Med. lib. 1. cap. 2. PLATERUM lib. 3. Obs. pag. 584. TULPIUM lib. 3. Obs. cap. 55. uti etiam Aetiam Philop. Cont. 2. lib. 93.

GAU.

(L.) Ad membrum Ariduræ emendandæ, nullum apud nostrates familiarius, atque efficacius remedium, quam effluens membrum Balneo ex Aquæ Theriacalis Gurgulis, vel Subveni homini, sapus per plures dies fevere.

C A U S A.

Causa Proxima corpulentiae & Obesitatis nimiae in Sangui- ne, & coque laudabili, copioso, pingui, temperato, & quod parce admodum absorbetur, seu per Habitum Corporis non dispergitur, sed in partes distribuitur ibique quodammodo affigitur, consistit. Hinc enim est, quod omnia ea, quae sanguinem temperant, pinguem ac nimis acrem reddunt, atque nimis absorbunt, ea disponunt ad corpulentiam. Ac sicuti in sanguine temperato ac dulci, minimus salinis, nimis aucta est Fermentatio: ita fit, ut Chylus non adeo subito assimilatur, neque ex Massa sanguinea multum adeo dispergitur; quin portio sanguinis emergat magis nutritiva, adeoque magis lacteus, ut copioso chylo eurgidus copiose nutrit partes. Nam uti & lacte primi constat, & ut Infantes ex lacte primum ac praeteritum acquirunt augmentum; ita simili ratione ac Lacte vel chylo etiam fit corpulentia nimia; Nam quod nutriamur Lacte, praesuppono cognitum ex Physiologia. Ceterum in Chylo largius permisso, non secus ac in Lacte, copiosae sunt partes butyrosae ac pingues, quae beneficio feri hinc inde distribuitur, imprimis circa Membranas, beneficio subtilis casum seu blandi ac temperati Partium Acidis; quo uti omnia pinguis & oleosa sunt insigniter impraegnata, ita hoc ipsum occurrunt Alkali fixa & volatilia in omnibus Partibus obvia, & in omni partitura Nutrimeto etiam praesente, tunc-jon- sim fit mutuo coagulans, unde copiosa pinguedo, Homi- nes insatiablem.

Causa corpulentiae Remota, quae sanguinem dulcem & lacteum reddunt, & sicque ad corpulentiam & obeso- ritatem disponunt, sunt variae: nempe praeter Res Non-naturales, ut corporis Motus deficientes, aut Exercitium ad- modum moderatum, Vita curis analis vacua, Somnus mediciorum aut procrastior, aliae concurrunt materialiter, aliae efficienter. Tanquam Causas materiales se habent Assumpta, quatenus ea sunt naturae temperatae, i. e. mediis saporis inter acidum & urinosum; ita enim suggerunt copiosum Chylum pinguem, & plane nutritivum. Hinc Passula, tam majores quam minores, dicuntur pingue- facere etiam Tabidos, quod temperant quodcumque acre, & chylum similiter temperatum sanguini communicant; de quibus vid. RIVERIUS & JOEL. Faciunt haec Olea, Lactiscula, & lacti similia temperata, qualia sunt Amygdalae dulces, semina quatuor Frigida majora & minora, Pinae, Pistaciae. Haec enim blanda sui oleositate uti temperant Massam, sanguinem, ita copiosum subministrant Chylum, ratione cuius etiam Venereis stimulant, & sic polimodum Nutrimetum co- piosius & temperatius exhibent. Unde etiam Cerevisiae Triticum uberius nutrit, quam Cerevisiae Hordeaceae: illae enim Nutritivae temperatae copiosum suggerunt Chy- lum; haec vero hordeaceae sunt asberius, & praeterea Lapulo diuretico conditae; unde quatenus omnibus Uri- nam movent, & ipse corpus minus nutriunt. Nam sine in Obesitate nimia, aut concilianda aut curanda, Potus imprimis maxime habenda est ratio: potus enim est vehi- culum Nutrimeti, ut lacte apollo chylus dilutus transferatur ad partes eas, ut nutriat.

Ceterum, quod a talibus nutritio dependeat, monstrat ista Gelatina in sero sanguinis corpulentiorum superna- tans. Notum liquorem esse, quod Gelatina in sanguine venesectione emissa apparet sit chylus nondum san- guine assimilatus, sed copioso sero dilutus, ratione cuius BARBATUS statuit, in sero sanguinis esse imprimis Nu- trimentum patrum spermaticarum. Jam vero in san- guine corpulentiorum emissio Gelatina ista semper copio- se & uberius conspicitur. Probatur, si ab hoc sangui- ne decantato sero, inhiileur spiritus nitri, ita enim serum instar calci liquidioris ab acido coagulabitur; Unde in pinguis & Obesit. remedium infallibile est Ab- stinentia a nimis Potu, ut recte hoc confirmat P. A. N. A. ROLLUS Praet. 4. Cap. 18. quod nulla res majori celeritate Pinguedinem imminuit, quam subtrahere Humidi. Unde etiam Lactis usus impiegitur, quoniam est tem- peratum, & in seipso nutritivum. Panis etiam habenda est ratio, quatenus in eo, quoad Digestionem primam, multum redest: hic enim non tantum per se admodum nutri- tur, sed etiam in cremorem liquefcent, propter acidum fermentativum in panificum susceptum, & beneficio salivae in Masticatione resuscitatum, instar fermenti appo- siti aliorum Alimentorum Digestionem, ut magis nutri- tiva evadant, insigniter faciliat; unde etiam panis recte

Theriaca Alimentorum audit: vid. HELMONTIUS 29. Vetus Ratio. Hinc est, quod refert CATTIUS in Ob- servationibus, Observantibus Barili manens, Observat. 12. & 13. ibi quidem quantum panis dosi aucta ad corpo- ris Habitum laudabiliorem disponat, hic vero, quod quidam, diminuto panis ante nimis copiose assumpti usu, in loco ejus substituta tantummodo Carne, insigniter tenuis redditis sit. Unde etiam Gendura excreto ma- cicat Homines, quatenus subtrahitur succus chylosus nu- tritivus; e contra Castrii panis pinguis, quoniam materia lemnalis blanda, dulcis & oleosa, retinetur in corpore, quod & temperat massae sanguineae acrimoniis, & ita eandem disponit ad uberiores nutritionem, ratione ejus assimilandi partibus.

Tanquam causa efficiens ad corpulentiam nimiam se habent Digestionem, quam hic concurrunt, si liquorem videmus alimenta non tam constitutivae ad nutritionem facere, quam chylicationem. Ergo non nutrimentum, ut sic, valet nos nutrire, nisi accedat chylicatio in ven- triculo: & separatio in Duodeno. Ac proinde, sicut in digestionem primam fundamentum sanitatis consistit, ita & nutritionis universalis corporis, adeoque alimentorum vulgaris optime nutritionis, modo fiat laudabilis chylosis. Ipsa vero chylosis fit a fermento ventriculi acido vo- latili, quo mediante alimenta liquefunt & disponuntur, ut facile possint enagulari via nutritionis partium solida- rum, sicut ii, qui habent fermentum Stomachi acre, raro solent pinguescere ob defectum Acidi volatilis, partim io prima, partim in secunda Digestione. Redd igitur HEL- MONTIUS exclamat: Digestionem primam esse funda- mentum omnium reliquarum Digestionum. Hae enim, prout diversimode praeparat chylum, etiam idem diversimode disponitur pro nutritione corporis, aut uberiori, aut par- tiori. Unde est, quod in digestionem prima & rudimenta Obesitatis, & prima principia atrophie, consistant.

D I A G N O S I S.

Signis Diagnostici non est opus, quia per se patet.

P R O G N O S I S.

Ratione prognostici observandos HIPPOCRATIS Aphorism. 44. Sect. 3. Corpulenti breviores, Macilentis lon- gioris Vitae sunt: Pinguedo enim extraordinaria Junio- ribus subiectis non saltem periculosa existit, illeque non ra- ro Mortem conciliat; siue quatenus hac ratione sangui- nis motus, in quo Vita consistit, ob Valorem angustiam & compressionem impeditur, & simul spiritibus materia detrahatur; siue quatenus Partes folidae iusto crassiores & Pinguedine copiosiore infarctae, sensationes atque Mo- tus naturales minus commodè praestant. Sterilitatem quoque inducit siue Materiam commodam Geniturae de- trahendo: vid. HIPPOCRATES Aphor. 46. S. 3. siue Meatus spermaticos comprimendo, prout ex TIM. & O. Van Guldenius lib. 6. Cap. 1. & BETTO de Oris & Na- tura Sang. cap. 2. Sect. 5. videre licet.

De cetero propter Corpulentiam Medici suavitatem ta- rù implorat; imò difficulter eadem sanatur.

C U R A.

Quoad Curam Corpulentiae nimiae seu Obesitatis: nita- mur

1. Ut impediatur copiosis Alimenti laudabilis pro- ventus; quod ipsum fieri potest per Iaculam & moderatam Dietaem.
2. Ut nutrimentum jam genitum ante sui assimilatio- nem materiam removeatur; quod facit Diuresis & Sudorifica primaria, hinc Purgantia & Emmetici- ca: quemadmodum ZACUTUS LUSITA- NUS lib. 3. Praet. Admir. Observat. 18. prodigio- sam Obesitatem Scarificatione ac Hirudinum su- cu, ac BARTHOLINUS Altor. Naisling. Praet. Observat. 74. per salivationem, curatam testatur. Unde Rusticus ob continos labores, adeoque si- dores, raro pingues ac obesos videmus: scui qui ex Vita sedentaria laboriosam subied ineunt, suc- cessivè emaciantur.
3. Ut Nutrimentum partim assimilatum plura mi- nus resolvatur ac liqueat; & ut resolutum, & so- ro allucine imbibitum, evacuetur: serum enim, uti primo est vehiculum Alimentorum, ita post-

modum vehiculum est Excrenendum.

Quoad Indicacionem primam; Corpulentia, & Obesi remaneat sibi a Cibis & potibus largius assumptis, & omnibus illis, quæ ad maiorem Corporis molem causam alias præbere possunt: Cuius sit parca, ac summa brevior. Econtra prænot Cibis solidiores, & pauciores, probè saluti necnon Olera; ratione Salis nitroli Alvim, & Urinam moventia. Probè autem observandum, ne mox in principio, ut interceptivè nitus, Corpori nimium, sed singulis saltem diebus aliquid, subtrahatur; eam Vires alitis debilitentur.

Dubium equidem oriri potest, an nempe possibile sit, ut Corpulentia jam facta Nutritum semel assumptum donec resolvatur, & perat eliminetur, adeoque Augmentatilis evadat? Sed respondendo affirmando. Videmus enim, quod Febrium ardor Corpora antea crassa, & obesa solcat insigniter emaciare; item quod febricitans confirmatus Corpus succi-plenum breviter reddat emaciatum, unde Atrophia Scorbutica. Ad hæc Vicerum ulcera, dum Hebstica inferunt, ita Massam Sanguinem infundendo Phibeticos, & macros reddunt, ut cum feri corninus per Diabetelem, & Salvatorem, itaque per nimis Purgaciones, ac in specie Lymphæ copiosis ac Urinæ fluxus insignior emaciant, hæc hoc confirmat HELMONTIUS Traict. Jan. Decem. Viri. §. 59. & Traict. Letum. Hum. Negl. §. 44. ubi refert Exempla insigniter Obesorum per Potiones Diureticas subitè emaciorum. Talia Exempla habet etiam SCHENCKIUS in lib. 3. obs. pag. 158. ubi de Diabete. Ibi enim refert, multos, Diabete affictos per copiosum Urinæ profusum subitè fuisse excrenatos. Nec minus efficacia est copiosa Salivæ excretio; neque enim est, quod Lue Venerea laborantes sint curati per Inundationes Mercurialis Gallia frequentes, ubi continuam ac copiosam excrentiam Salivam quod exinde admodum accretumur: Conf. BORELLUS G. 2. obs. 11. ubi refert, quendam per crebriorem Mallicacionem Foliorum Nitentium excrentum fuisse redditum: hæc enim cum sit sine Mallicacionum, & uberium Salivam proleat, hæc Gelatinæ nutritiva necessariè final expellitur: Id quod etiam cum Politi Laxi indicat BORELLUS, quod multas Aquas educant, si eorum mallicentur, Salivam elicendo Corpus emaciant. Hæc & familia persudent, quod Corpora pinguedinosa post resolutionem jam assimilata Nutrimenti, à Laxis aquo Partes ambiente imbibit, & sub forma Urinæ aut Salivæ copiosæ, & uberem evacuati emaciantur. Convenit ergo Mercurius dulcis cum Extraculo Catholico aut Panchymago Culli, Pilulis Aloeticis aut aliis lenioribus Purgantibus commixtus, quotidie præmissis præmittendis propinando, donec Salvatio largius subseqatur: qualem Methodum videbis in BARTHOLINI Alia Hæmorrh. Tom. 1. obs. 74. Quo etiam pertinet Nicotiana Fumus, mane ac vespere haustus.

De cætero inter Remedia Emaciantia in specie eminet Aetrum, & omnia ex eo, Vini filio degeneri, parata; Imprimis Aetrum Scilicetum ceu certissimam Experimentum hæc in parte allegat à CATTIERO cu. loci; qui ex STRADA refert Exemplum Viri militaris admodum obesi, qui loco Vini Aetrio continuè utens in Potu ita rursus catenatus fuit, ut 87. lib. pondere decreverit. Id quod confirmat STEPHANUS in Oper. Medic. Traict. Cosmetice, ubi Obesitatem tollendam nihil molius esse, quam Aetrum Scilicetum jeuno stomacho haustum. Hinc Aetrum Rutaceum, aut etiam Potus ordinarius ex Aqua Chalybeata Aetrio temperata, item Aetrum Scilicetum, in quo Abundantem effi maceratum, & omnia Aloica sepius usurpata, profunt. Hæc enim faciunt, ut Alimenta ingesta adeoquod dissolvantur, & liqueant in ferociorem, & asperiorum minisque nutritivum Chylum, qui porro tam sub Digestione in Stomacho, quam extra eam in Duedeno attrito Felis, abie in Sal certum plus minus volatile aere, ac fit insignis Absorptum, tam sordidum nocivum quam etiam Nutrimenti laudabilioris, & Diuretici: unde Nutritum chylum excrenatum, & resolutum tunc sub Urinæ forma solet emitti, adeoque habitus corpulentior successivè immittitur. Sic quoque Aetrum supra Nitrum ac Sal aliosque cohobatur, uti acrimia, & magis diureticum fit ita Corpus, magis ad Emaciationem disponit, si assumatur.

Possit Aloica hæc etiam spectant Purgantia; hæc enim semper aliqua de Viribus deprædando Corpus acidum redditur: Hinc etiam CELSUS inquit: Crebris Purgantibus Tom. II.

nilius adnoscere, est Corpus non nutritum. Nam Purgantia etiam Nutritum Succum purillagine afficiunt, & sub forma Stercorum exhauiunt. Verum cum Purgantia fortiora ceu venenata non semper totò in usum vocari possint, propterea Aloetica Absorbentia mihi conducunt imprimis. Hinc FERNELIUS Conf. 12. ad Obesitatem exhibet Pilulas ex Rhabarbaro, Aloe, & Agarico paratas, quibus aliquandiu continuatè Corpulentia adempta est. Præ cæteris hoc in casu pollet Aloe ob amarorem, & hinc ob vim acidum absorbendi; unde etiam GRUELINGIUS Pilulas Aloeticas & Francofurtenses Obesia commendavit. Eliair proprietatis sepius sumptum, Corpus nonnulli emaciat, uti etiam omnia Amaricantia, Myrrha, v. gr. Pinis de Tribus per Pelliculales, Massa Pilularis Hietæ cum Agarico, vel de Aloe cum Agarico, congrua sunt Remedia: ac præstè committitur, & restè dicunt, Eliair proprietatis effuscare Corpus; que effuscatio tamen consistit in colligefactione Succorum nutritivorum. Hæc pertinet alla Amaricantia, v. gr. Centaurium minus, Nallurium, Meratha, Abinthium, & ejus Efficta, Efficta Myrrha, Gentiana, & familia: quæ omnia vulgè effuscare dicuntur, cum tamen revera Corporis Nutritum attenuent, & dissolvant, ac Sero liquant, quod interdum excreatur sub forma Urinæ, interdum Sudoris.

Uterque Diuretica quæcumque fortiora per copiosum Urinæ fluxum solent extenuare, copiosius usurpata, que inrer eminet Radia Alparagi, Radia Penciloli, Petroselin, item Alliata ac Caprea omnia, Syrupi dicti de duabus, item de quinquæ Radicibus, qui Diuretici sunt; Decoctum Cicerum roborant, item Cappares, Olivæ, Amygdalæ amaræ, & familia Condimenta diuretica. Ad hæc in specie pertinent Tartarus, Remedium Vini ipso nobiliss, cuius volatilisaciditas potenter absorbet, ac vi attentivata, simul interdum blandè Urinam movet, & omnia ea ex parata: Hinc enim FORESTUS lib. 31. obs. 13. talem habet Pulverem,

℞. Tartari emulsi ℞.

Clen. ℞iij.

Zingib. ℞i.

Sacch. ad pondus omisioni.

M. f. Pulvis.

Pulverem hunc, dieit, crebris assumptum Aurisabrum extenuat.

Sic etiam EPIPHANIUS FERDINANDUS Conf. 82. specifice commendat Tartarum in Pulverem redatum contra nimiam Pinguetudinem. Alii commendat Pulverem compositum ex ana Tartari, & Cymarum seu Julemum Coryli, qui crebris ante passum, & hinc sub introito lecti assumatur, idque ad magis 6 ℞. vel 3℞. irroretur cum Aetrio destillato, idque continuè, donec Corpus egregiè emacietur.

NB. Quæ dico de Tartaro simplici, etiam intelligenda de Sale volatili, & oobiliioribus præparatis, quod præsuppono.

Pertinet hoc etiam Tartarus vitriolatus, qui & hys ad emaciandum aptus: Sic quoque Nitrum Obesitatem impedire vi sua diuretica observatum fuit, ac in specie Nitrum crudum copiosius usurparum. Nitrum vitriolatum seu Arcuum duplicatum Myrsinè, specifice etiam contra Obesitatem commendatur. Imò per Aquas, Nitrum, Alumen, & Martem continentes, pinguetudinem nimiam in quodam solutum TIMÆUS à Galienicis l. 9. Cap. 3. testatur. D. LANGIUS ex singulari habuit Arcuum Species Diapolliecon Galaei ex Nitro, & Cumino, quod sepius usurpatum per Urinam corpus emaciat. Pertinet hæc Tartarus vitriolatus Barbolati ex Sale Tartari, & Spiritu Niri invicem milis paratus, egregium hæc appropriatum contra nimiam Corpulentiam: item hæc pertinet Gummi Juiperivum seu Soodaracha Arabum (Græcorum Sandaracha est Arsenicum): hinc etiam elegantes sunt Pilule contra obesitatem nimiam Myrsinè, quæ basio Gummi dicti agnoscunt, & multum valent: Dosis ℞. est, singulis mane jeuno stomacho.

Vel

℞. Massæ Pilular. de Sandar. ℞i.

Sal. volat. Viperar. ℞i.

Cum Eliair. Prop. f. Pinis iussu Fii mla.

D. 5.

Pilule contra Obesitatem.

Dosis est 3℞.

℞. Sandarac. ℞i.

Myrrh. rati.

Eco

Raf.

Ref. Lign. sancti,
Extrait. Aloë arab.
Alco. am. Di.
Spirt. Vitis. coag. 35.
M. f. Pulv.

Dois 35.

D. O. S. W. A. D. est Auditor, qui primus composuit has Pulas contra Obesitatem, a quo habuit has MYNSICHTIUS.

Semen Fraizui ad uoc. i. manē in haustu Vini propinquum insigniter commendatur ad evacuandam Utinam, ratione eius, & hydropico curat, & emaciatur Cassios, Secretum D. E. R. B. N. I. est Semen Efula pulverificatum, & omni mac. quantum cultelli cuspid capitis, usurpatum, & concinnatum: hoc colm dicitur experium remedium. Nec omissa Terrebithina ratione virtutis diuretica: refert FORSTIUS c. 4. de Viro valde crasso, qui insigniter extenuatus per Pulas est. Terrebithina cum Saccharo paratas, altamendo eorum quapiscularum 5. & 7. pet a. bonas aoto prandium.

Denique per Sudorem etiam corpus emaciatur, five per ioretia clentur, five externe per Exercitia. Atque hinc omnia Decoda Lignorum, in specie Guaiaci, & Ligni sandi, exsiccare dicuntur, quatenus sudorem copiosius provocant. In specie autem sudotifera cum, & ex Salibus Alkalibus parata, qualia sunt Salia Vegetabilium tam ha quam volatilia, imprimis Sal Abūthū, Cardui benedicti, item Salia Theriacalia, quae corpus insigniter macrum reddere dicuntur, expellendo sudorem, egregia sunt. Alius Salia Viperarum, item alia Remedia Viperina, sunt commendata, quae & ipsa corpus extenuare, & pinguedinem resolvare dicunt. Item Salivatio Mercurialis mirabiliter corpus emaciatur, ita ut illud Sceleti formam repraesentet; Mercurius enim acrimonia sua nutrimentum corporis dissolvit.

Tandem ex Fonte Chirurgiae hoc spectant crebriores Venae-fectioes, & plures iussu Fonticuli: Venae-fectio enim cum sanguine simil nutrimentum exhaerit, unde substatu nutrimento emaciatur: Ea Fonticuli resut fuso forma parit nutrimentum partem resolutam evacuat, Massa sanguinea depravat, & ita necessario emaciatur.

Externē à MYNSICHTIO commendatur Decoctum Nucum Cupressi compositum, quod sine dubio ratione virtutis absteriliora: effluxum Alimentis uberiorē reprimat.

De Exarantationibus adhuc notetur: hasin Obesitas pareiores esse debere, quam in Carnosis fide Muscularis, ne corpus mandum torpidum magis coarctetur.

Quidam scilicet Artificiali emaciatur jubent, de qua ioh. tegrum Tractatum IOHANN-DANIEL MAJOR conscripsit: sicut & hoc ipsa sepe Natura nobis monstrat.

Hae de Corpulentia nimia (M): Pergo ad Vitium Nutritionis depravate, quando nempe partes vitio ac depravate nutruntur.

C A P U T III.

De Nutritione depravata.

ARTICULUS I.

De Cachexia in Genere.

Qualitate ergo pecuni Corporis Nutritionis in genere vocari solet Cachexia, si ob vitium nutrimenti pervenit nutrimentum partes. Haec enim quidem a pueris descripta per tumidum totius Corporis molliorem, & via quasi ad hydropem seu ejus initium credita fuit: Alii generaliori concepta opus est, cum sine Corporis iotumescencia Cachexia quoque contingere possit, ut mox dicetur. Est affectus iste, in quo naivus, & floridus Cutis Color, ac imprimis Facies nitet, perit, mutaturque in varium, in pallidum, lividum, luteum, viridescens, in tenet rubicundum, &c., in diversis Corporis Partibus

Exanthemata, & Pustulae emergunt, ac quoque Partium Consistentia durior juxta ac superius cum Squamarum decedentia interdum in molliorem mutatur; nonnunquam Sapor fetidus exhalat, Cutis unctiosa observatur dum Pruritu notabili, Piorum contugnot desinunt, Dolores diverfi partes diversas infestant, ita tamen, ut Corpus nonnunquam simul intumescat. Cachexia talis est revera fructus Cachochymiz; haec verò est pedissequa Cachochymiz (N). Nempe depolet omnis Cachexia ab effusione vitio, & depravati Nutrimenti, i. e. Humoris viscidu, loco Nutrimenti hinc inde distribuit in Habitum Corporis ac Partes molles; Unde dum Nutrimentum non rito assimilatur, ob debitas proprietates deficientes emergit Cachexia, adeoque prout variant Nutrimenti vitia, variant etiam Cachexia. Hinc Humor iste, qui ita Habitui Corporis affunditur, si est albus, dicitur Cachexia in specie; si flavus, dicitur Atheria; si viscidissimus seu luridus aut lividus, aut alio tetro colore tinctus, ut plurimum Atheria niger audit.

Est itaque Cachexia, five malus Habitus, terminus facis generalis, species diversae habens seu complexiones: in genere quaecunque Corporis, ac partium substatu nutrimentum mutationem a statu naturali in deteriorē inuit, ex vitia quasi nutritione dependentem. Unde tam variis Cachexiarum sunt species. Nam praeter dictas etiam Cachexia Scorbucica, & Cachexia Hypochondrica, item Scabies, Elephantiasis, &c. in Mulieribus est Uteri vel Menstrui vitio Febris Alba dicitur. In specie tamen ubi obtinuit, ut vitium illud tantum Cachexia appellatur, quando Coepit a nativo Colore in pallidum, & lividum, plus minus viridem, & sanguinem substatu, & laccidum degeneret, & a Sanguificationis defectu in specie dependet. Ut verbo me explicem: si specie biliositas dat Atheriam, ita Putriditas dat Cachexiam in specie ita dictam, utat omnes hoc sub generali Cachexiae nomine legitimo jure comprehendamus, ejusque talis est Historia.

Egri successivè palleant ac Colorem plus minus lividum contrahunt, postmodum Facies nonnihil intumescit, & tandem quoque Habitus Corporis; hoc dicitur: Pinguis sit quidem, sed non est pinguedo naturalis. Praeterea Curis mutatum Colorem juxta simul loti esse in plerisque Dyspnoea, quae praeterit magis urgetur, quociens Corpus, imprimis adoescent in aetum, tantulum, & leviter moveatur, quod ad motum Corporis concitiorum augetur, quin tunc saepius Cordis Palpitatio, Arteriarumque circa Jugula Tempore inconflua Pulsatio, observatur: Accedit quoque uiverti Corporis, praeterea Crurum, lassando spontanea, & tenso, mentis torpor: urget non raro compressivus, & anxiosus Praecordiorum Dolor, qui post Alimenta assumpta intercedit: Appetitus in principio coarctat, in progressu vero profluitur, ac non raro rales. Egri sciunt: Adest saepe etiam Febris Lenta, Aegri vix sensibiles, & quidem modo Continua, modo Intermitte, Quotidiana ferè periodicà: Pulsus sunt inaequales, parvi, frequentes, & debiles, Urinae saepius etiam sunt crudae, aquae seu pallidae, tenues, & saepe minus tinctae: raro, nisi in progressu Morbi, ptoeant crassae, & turbidae cum copioso Sedimento albo. Observata tamen fuit Cachexia cum Urinis laetis, uti hoc habet SYLVATICUS c. 1. c. 29. Tandem Malo ulterius procedente Corporis Habitus fit turgidus, tumidus, crassus, & pallidus, fovearum post impressionem digiti effleat, adeoque tunc vocatur Leucophlegmatia; si vero evadat turgidus cum quodam splendore & livore, quasi Aquae essent collectae, vocatur Anasarca, seu Aqua Interius, tam universalis, quam livide particularis Crurum, & est hydropis species. Antequam Leucophlegmatia vel Anasarca erumpat, fit, ut Pedes saltem intumescant, ulteriusque, Morbo incrementum capiente, & Abdomen intumescit, & sic in perisellum Aetatis Abdominis, seu Hydropem in specie distinctum, degenerat. Valgò Tumorem hoc Pedum edematofum, & Leucophlegmatiam per Morbum Intemperiei humide explicant: sed non sunt Morbus, sed saltem Producta morbofa Cachexiae. Nullis ac nulli Aetati perit Cachexia, sicut Feminas quoque Vitam sedentariam frequentius, & ob superfluentiam Menstruationis vitia quatuordecim ac pejus afficiat: Quin & saepius comitem ha-

(M) In gram de Corpulentia nimia Dissertationem habes Tomo I-col-1399.

(N) Kach' est malus, Ather habitus, Xanthos pro humore fumiis, & Xanthos pro succo in Ventriculo genito. Hinc patet significatio Cachexiae, Cachochymiz, & Cachochyliz.

bet Affectum scorbuticum aut hypochondriacum, In principio Morbi Ciberum Digestiones impediunt, mædente Appetitu; tandem etiam Anorexia accedit, Corpore summè imbecille redditur. Alvus læpius est obstruenda. Plura hæc facientia vident. In specie in SYLVIO lib. 4. Præf. & Tract. de Cachexia.

P A R S A F F E C T A.

Parti Affecta seu Subjuncta Inafectio est Habitus Corporis, seu Partes ejus solidæ molliores, in specie Carnosæ, in ejus ambitu extrinsecus sitæ, quæ primario afficiuntur. *Subjunctio vero Radialis seu Pars Affecta à Causa*, est Massa Sanguinea Cachochymica facta. Ut dictis Cachexia in specie sic dicitur Causa facili patet.

C A U S A.

Causa nempe Proxima Cachexia est nimia Cachochymia vel Cruditas Massæ Sanguineæ; indeque dependens deficiens ac immutata ejus Fermentatio, unde Chylus & ipse plus minus viciosis non rite assimilatur, sed tota Massa eodem crudo repleta, cruda & viciose fermentans manet, particulae ejus salinæ obstruunt, Morbus magis magisque confirmatur, unde tali erudo Sanguine, vel, ut vocant, Pituitoso per partes circulato, hæc Chylus & Sanguine non rite alterati nec volatilissimi infarciuntur potius, quam debita appositione aut aliqua assimilatione nutriuntur, itant rectè proin dicat FORESTUS, Corpus ita inflatum non aliter se habere, ac Pastum non rite fermentatam, in qua digiti impressi vestigium bzeant.

Causa Remota est multiplex: Observandum enim Cachexiam nunc esse *Afflictam Primariam*, & qui per se incipit; non *Secundariam*, aliocum insequitur Morbos, v. g. qui quavis Sanguinis nimis effusione, aut ejusmodi consuetas suppressas insequitur: in specie Mensium suppressio, uti & nimis eorum fluxus, cachecticas reddunt Mulieres: sic Gonorrhæas diuturnas, aut Fluores albos, item Febres Chronicas ordinariè insequitur: Mola aut Fæcus mortuus retentus etiam Cachexiam infertur: Videtur FORESTUS lib. 9. Observ. 26. in *schol. HORTIIUS* lib. 3. Observ. 21. Urinæ suppressio, Hepatu ac Lienis aliorumque viscerum vitia, uti sunt Atoniæ, Obstructiones & Tumores facili seirrhescunt, Renum Ulcera, &c. Cachexiam infertur.

Causa Remota Cachexia Primaria est deficiens Chylus, dum nempe Alimenta in stomacho nec rite fermentando volatilantur, nec in subletem aut saliam volatiliem abeunt Liqueorem, sed in Pituitam viscidam ac acidam degenerant, adeoque vitiosum in primis viis Acidum quoddam fixum, nec volatile, primum fundamentum Cachexiam ponit, quod foret ulterius semper simul conjuncta Billa inertia, seu deficiens ejus acrimonia salina volatilis, quæ nec corrigit, nec perficit debet Chylum in Duodeno non rite Fæces separat. Ac in Cachexia quidem semper peccat Cruditas Acidæ, (propterea quoque Martialis dicitur Anticachectica) quæ Alimenta non transmutantur in Chylum volatiliem, sed viscidum: Unde ex vitio Digestionis primæ ortæ Cruditas Acidæ ad Massam Sanguineam delata Fermentationem ejus inhibet, Hæmatum turbat, & succedente Cachexiam inducit. Massæ sanguineæ enim particulae salinæ fermentativæ succo isto crudo atque ineoquo obstruunt, debitam Chylli alterationem & sanguinis assimilationem rite perficere nequeunt; quin hæc eandem crudam, plus minus viscidam, & quasi occultæ acidis remanet; unde de facili flagrans sanguis in Præcordiis, dum levi Corporis motu celeritatem movetur ad Pulmones & Cor, *Dyspnoea & Anxietas* infert; Quin & Massæ sanguineæ debita Fermentatione viciata & immutata, immiscetur quoque in Feminis mensibus sanguinis *Fermentatio*. Unde Cachexia incipienti, multo magis confirmata, supervenit etiam Mensium suppressio, quæ ipsa Massa postmodum & gravior & contumacius reddit; etenim Menses suppressi Cachexiam infertur, sed vitio cachectico suppimentur. Porro si sanguis crudo Chylis ingenuatus circularur ad Partes, tunc Nutritum illud erudum appositum & congelatum, necessariè *Leucophlegmatia*, summum Cachexiæ gradum, post se relinquit, unde depravatur Nutritio, adeoque Habitus Corporis tumidus insigniter inflatur, & exiende ob Fibrum musculorum & nervorum laxatum tonum flaccidus fit: Quid si ex retento quavisque occasione Sero aut Lympha (Cachectici enim non, aut difficillimè su-

Tom. II.

tant, & parum quoque mingant) serosior quoque simul fuerit Sanguis, necessario oritur vitium, quod dicitur *Anasarca*, seu Habitus Corporis copiosè Aqua suffusus; quæ ex erit major, si tali succo crudo aut obstruuntur Glandulæ partium musculosarum, aut etiam Vasa Lymphatica, ita ut Lympha aut saltem serosior, non rite ex partibus per vasa lymphatica revehi queant, sed debirus earum motus inhibetur; unde sub Cute Aquositates congelatæ necessariè Habitu tumidum inferunt, & vulgo pro tertia Hydrops specie, nempe totius Corporis hydrops, habetur. Hinc BORELLUS *Cenot.* 3. Observ. 66. observat corpus cachecticum erythrali instar translucent. Sive ergo copiosum serum in Massa Sanguinea peccet, sive motus impediens Lymphæ in causa sit, utroque modo generari potest Anasarca. Quod si Humorum istorum serosiorum plus minus Chylorumque vitiosiorum ex proprio impetu decubitus sit magis ad inferiora, unde crura, Scrotum, ac tandem Abdomen intumescant, erit ordinarius sic dictus *hydrops*.

Confunduntur equidem subinde *Leucophlegmatia* & *Anasarca*, sed malè; differunt enim varia modis, & non nisi subiecto, nempe Habitu corporis inter se conveniant Nam in *Leucophlegmatia* est Habitus corporis Pituitosus (i. e. crudus chylosus); Anasarca verò est ab ichoroso & crudo sero, in Habitu corporis deposito, concurrente serosum plus minus vasorum Lymphaticorum ruptione. Distingueri autem facile est *Leucophlegmatiam* ab Anasarca: in *Leucophlegmatia* nempe minus est splendor ac nitiditas, quam est in Anasarca, sed Habitus corporis pallidus; in hac verò corpus plus julto splendet ac nitet: Deinde vestigia foveæ digitis impressis in *Leucophlegmatia* diu durant, tandem successivè pereunt, quæ in Anasarca facili & brevissimo tempore disparent. Interim sæpius evenit, ut *Leucophlegmatiam* sequatur Anasarca, si nempe impediatur Sero & Lympha transcolatio.

Vulgo statuitur, cachexiam & similes Affectus orti ex *Hepate*, nempe Intemperie ejus Frigida: quæ Sententia cum superfluitate sit hypothetici illi, quod *Hepar* sanguificet mediante suo Calore innato & speciali, sponte corrui: Quin potius WILLIUS in *Pharmac. rationali* Part. 2. pag. 174 & seq. Materiam esse Humorem serosum, Efficiens verò sanguinem esse, asserit.

Causa remotissima seu Occasionalis seu Preterartificialis, ad cachexiam, leucophlegmatiam & Anasarcam disponens, sunt imprimis Errata quædam in sex rebus Non-naturalibus: quæ pertinent Vita delictiosa & sine motu peracta; sicut contra sub motu Corporis Homines male hiæce minime solcant infestari: quin curari potius, notante PANAROLLO *Præf.* 2. Observ. 30. Item Ira, Mæror, Tristitia, & Corpæ procreant, aut diutius continuantur non raro inferunt cachexiam, quia non rectè volatilantur, tardè & intumescent Viscera. Hæc pertinent Errata in Vitâ: sic enim imtemperatè viventes subinde cachectici evadunt. Somnus nimius, & Labor deficiens promptè ad Cachexiam disponit: & quæ sunt alia Causæ Externæ. Quod facit imprimis Observatio PANAROLLI a. l. de Muliere Cachectica, multis obstruendis Parenchymatibus, magis Exercitio quam alio quocunque Remedio curata; Unde vi oppositorum Exercitium & Motus deficiens disponunt ad cachexiam. Dum PANAROLLOUS inquit, fuisse obstruendiones Parenchymatam, loquitur ex Hypothetico, quod Cachexia oriatur ex Obstruendione Viscerum: de quibus alibi dixi, quod hæc sint imaginariæ, ut si adfuit, superveniant, & potius sint Effectus, quam Causæ.

Quod *Cachexiam Secundariam* nascitur hæc talibus Occasionibus, quæ sanguinem immediatè afficere, vel, idque frequentius, mediante læsione Digestionis primæ nemine alterare possunt. Sic ea, quæ spiritus nimis exhauriunt aut dissipant, & hinc Fermentationem stomachi laedunt, ut Hæmorrhagiæ nimis, Gonorrhææ, &c. vel Fermentum digestivum alterando, ut Menses suppressi, & Febres Chronicæ & malè curatæ, mediè Sanguinem alterant. In specie tamen post nimiam Sanguinis effusione progrediuntur solet cachexia, & hæc quidem frequentissima est Causa, attestantibus omnibus Auctoribus, Cachexiæ, & Hydropsis Alciat; vid. FORESTUS lib. 2. Observ. 25. Nam depauperat Massa Sanguinea & spoliatur principia salinis, unde cruda manet, ut exinde minus fermentari, aut Chylus assimilari possit. Notum enim est, Mulieres seri Cachecticas esse suppressione Mensium. Queritur autem: an Mensium suppressio

Ecc 2 60

fit sequatur, ex inducat Cachexiam? Respondeo: deficiendum Menstruum ut plurimum præsupponere Cachexiam. Dico tamen, ut plurimum; non semper; Nam & fluctuant Menstrua, ex Terrore verò subito suppressa, Cachexiam insunt, quod nempe Sanguis incitatus inquit Malum Sanguineum, & turbet ejus Fermentationem, adeoque Sanguis effertur redditur, utut Cachexiam superveniens Menstruum suppressio extiteret: Hinc Martialis tam in Cachexia, quam in Menstrui defectu, utramque facit paginam. Immediatè afficit Sanguinem Lues Venerea, tempore Cachexiam comitem adficiens, uti hoc refert SENNERTUS lib. 3. Prax. pag. 104. cap. de Cachexia. Urina suppressa, Viscera, Abdominis præsertim, affecta, Sanguificationis alias perfectissimæ intervicia, Fetus mortuus diu in Utero retentus, aut Secundinæ recentæ, vel & Mola distans gestata, Cachexiam non raro inferre solent. Sic Cachexiam post Fetus mortuum observat HORSTIUS Tom. 2. lib. 1. Observ. 20. & item ex Mola Cachexiam observat FORESTUS lib. 19. Obs. 26. Sanguinem enim inquinando debitam quoque ejus spiritualitatem impediunt.

DIAGNOSIS.

Signa Cachexia in specie sic distat ex supra dictis signis patet.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis: Cachexia, uti notum, ordinariè Malum est admodum Chronicum, & tardè Curatio: Imò, quò magis inveterata, & firmius radicata, eò difficilius curatur, & nisi ei maturè occurratur, sepius in Anasarcam, Leucophlegmatiam, & Hydropem Ascitico degenerat.

Sin occurrat Scirrhus Visceris cujusdam, Hepatis aut Lienis confirmatus, vix Cachexia curabitur; sicut & illa, quæ sequitur Morbum Acutum & Febrem Ardentem, aut Intermittemtem Chronicam, nisi à Medico, vel celeberrimo Poto ab Aëro tractata, difficilis est admodum, imò nullius Curatio: Item si Cachexia superveniat Mulieribus, quibus jam ordine Naturæ Menses deficiunt, is difficulter, aut admodum lentè curabitur, eoque gravius reliquis laborare solent.

CURA.

In Cura Cachexia eo attenditur:

1. Ut corrigatur Stomachus, ac ejus Digestio prima, & Cruditas Acida emouetur: quod ipsum post Vomitoria imprimis præstant Martialis.
 2. Ut corrigatur Cruditas, & inde certa Dyscrasia Massa Sanguinea, una cum inserta ac deficiente acrimonia Bili.
- Unde in Cachexia Primaria
1. Acidum vitulosum primarum viarum remouendum per Absorbentia, in specie Martialis, Partes Animalium duras, Terres, Alcalia, tum fixa tum volatilia.
 2. Acidum incidendum & attenuandum per Gummatà, Salia tam fixa, quam alcalia, item per simplicia Stomachica aromatica, ac salina volatilia.
 3. Bili inertia accenda Aromaticis seu Resinosis volatilibus orosina, præsertim Amaris, quæ aliis Hepatica dicuntur.
 4. Cruditates primarum viarum & Sanguinis plùs minus correctæ evacuantur Vomita & scellæ ex primis viis; ex Massa Sanguinea verò per Sudorem & Urinam.

In Secundaria verò Cachexia Morbus primarius curandus, aut lesiones ab illa inducæ res reliquæ eliminandæ, semper Digestionis primæ negotium, quatenus possibile, observanda. Hoc Scopus ut felicitè obtineamus in Cachexia curanda, rectè observandum monet LINDANUS, quòd Cachectici, quòd lenius tractentur, tamen citius curentur: bine fortioribus Purgantibus, ab initio statim adhibitis, nos nil efficere, nisi fuit Vomitoria; sed ut Malum sensum crevit, ita successe saltem Digestionem, aliæque leniora Remedia propinanda esse, quæ crassa & viscidus Humores incident & attenuant, Acorem vitulosum corrigunt ac temperant, atque ita successe Evacuatiōni aptiores reddunt, Unde imprimis in usu sunt Noduli ex

Aperientibus, ut vocant, i. e. Resolventibus & Incidentibus, blandis Purgantibus mistis, compositi: quibus habende Martialis Remedia sunt interponenda. Et cum Cachexia sit initium Hydropicæ, comode Methodus & Medicamenta, quæ in principio Hydropis conveniunt, etiam in Cachexia adhiberi possunt & contra ea, quæ in Cachexia usurpantur, validiora tamen & magis Diuretica, in Leucophlegmatia & Anasarca quoque proficiunt. Item illa Medicamenta huc pertinent, quæ supra Sect. 13. in Morbum Chronicum Cura recensita sunt, et in seq. de Hæm, Scirrhis, Scellæ, Lue Venerea, &c. occurrunt. Illud saltem adhuc observandum: ut in Medicamentorum Appropriationis usū aliquandiu perleveremus, nisi primis radicatum magis Malum est, i. e. tandiu illis inhærendum, quamdiu ab ipso bene, aut ad modicum non pejora, se habeat Ager, ac Medicamentum absque oculis singolari hic admittat; quamprimum verò hujus fastidium insuperat, aut prodellè desinat, gratum atque optimum licet Medicamentum, statim de alia, aut alia certè illius Formula Medico cogitandum: vid. SYLVIIUS Praxi App. Traß. 5. Ito specie tamen conveniens regimen Diets secundum sex Res Non-naturales observandum, & præsertim Motus suadendus: isquod confirmat PANAROLUS supra c. 1. de Muliere admodum Cachectica, Exercitio plùs quam alia Auxilio sanata.

Principium autem Curæ a Vomitu, incedendum repetendo, faciendum est, & præter Aurina propinata, Conferva Gratioræ ad 3i. vel 3ii. egregiè Vomitus movet, & specificè in Anasarca commendatur; vel si coquat in Vino ad dr. ii. Gratiola, egregium etiam & blandum est Vomitorium, si præprietur Decodum. Aote tamen Vomitoria consultum est, ut Digestiva saltem præmittantur, Cruditates solventia, & ad motum disponentia; nunc Cremor Tartari, nunc Liqueor Terræ solutæ Tartari vid. ROLFICIUS, 2. W. I. F. E. R. U. S. nunc Cremor tartarissimus, & cum Sale Tartari fixo vel alio conquisito, quod vocant Digestivum Tartari universale, Tinctura Tartari simplex, quam etiam Tinctura Tartari acrimoniatia, Arcanum duplicatum, Tartarus, vitriolatus, Sal Centaurii morosus, Absinthii, Sal Ammoniacum, Sal Digestivum, Hypochondriacum, dosi à ʒi. ad dr. ʒ. bis in die, mane, & meridie aliquæ diebus totum usum Vomitorii assumentur: quibus pro Acido absorbendo Terræ adijungi possunt, e. g. Corallia, Lapides Cancrorum, Matherperlarum, Martialis, Bezoardicum Martiale, Terra sagillata rubescens, Antimonium diaphoreticum Martiale, Antihedidicum Perrii ex part. iv. Reguli Antimonii & part. v. Jovis, cum triplo Nitri detentis, Bezoardicum Joviale, & similia fixa Jovialis. Hinc

ʒi. Salis digest. Hypochondr. dr. i. ad ʒiv.

Div. io a. part. æqu. 5.

Pulvis Digestivus.

Vel huius loco:

ʒi. Tartari vitriolati Tachen. ʒii.

Salis Alsteth. ʒi.

M. div. in 2. part. æqu. 5. ut autè

Vel

ʒi. Salis Ammoniaci ʒii.

Div. in 2. part. æqu. 5. ut autè.

Vel

ʒi. Arcan. dupl. Myrs. gr. xv.

Salis Alsteth. gr. vii.

M. S.

Pulvis Digestivus pro 2. dosi.

Vel

ʒi. Lapill. Cancr. præp.

Salis digest. hypoch. an. dr. ʒ.

M. div. io a. part. æqu. 5.

Sal Digestivum.

ʒi. Crem. Tartari dr. i.

Lapill. Cancr. præp. dr. i.

M. i. Pulvis. S.

Pulvis Digestivus.

Quodvis diebus mane in vehiculo calido assumendus.

ʒi. Tartari vitriolati Tachen. ʒii.

Salis Alsteth.

Lapill. Cancr. præp. an. ʒi.

Olæ distillat. Terribith. gutt. vi.

Misc. i. Pulvis:

Div. in 3. part. æqu. 5. ut autè.

Vel

ʒi. Co.

24. *Carall. rub. prepar.*

Latil. cancr. prepar.

Arcan. dupl. an. gr. xv.

Mile. pro pulvere.

Div. in 2. part. aqua.

D. S. ut supra.

Vel

24. *Marr. Ferlar. prepar. 3i.*

Tartari vitriol.

Salis Ammoniaci depur. an. 3℔.

M. f. Pulvis.

D. S. ut supra.

C. S. ut supra.

Dosis quantum cuspide culpe capi potest, vesperi u.

supranda:

Mant. verò

24. *Tinct. Tartari compof. 3℔.*

D. S.

Tinctura Apocientis.

Dof. 40. gutt.

24. *Tinctura Tartari acris, vel ex Tartaro & Ni-*

tro calcinati; vel ex Storacis Reg. Antimon.

3℔.

Spiritus Salis Ammoniaci 3i. ad 3℔.

M. S.

Apocientis Tinctura.

Dosis 40. vel 50. gutt. bis vel ter in die

in vehiculo calido:

Quibus præmissis una vel altera vice, propinetur vomitorium. Aut si hoc minus conveniat, inflicatur Purgatio per Alivum, inter quæ est Radix Ebulæ legitime præparata, vel ejus Extractum, quo sæpius & frequentius usus fuit RULANDUS in Curat. Abstinendum tamen à fortioribus & frequentioribus, cum magis nocent, quàm prosunt: vid. HOFFMANNI M. M. l. 1. c. 7. & l. 2. cap. 6. pilulæ ex Extractis pachymagogis cum Mercurio dulci sunt admodum utiles: v. g.

24. *Extr. Pachym. Crell. gr. xii. ad xv.*

Mercurii dulc. rini par. gr. xii. vel xv. ad 3i.

Extr. troch. alb. gr. i. vel i℔ ad gr. ii. & iii.

Cum Siftent. distillat. f. Pilulæ.

D. S.

Pilulæ Laxativæ pro 1. dosi.

Vel

24. *Maff. Pilulæ de tribus Rex, vel de Ammo-*

nian Querc. gr. xv.

Mercurii dulc. 3℔. ad gr. xv.

Extr. troch. alb. gr. i℔.

F. Pilul. min.

D. S. ut supra.

Vel

24. *Extr. Panth. Crell. gr. xv. vel Maff. Pilul.*

de Ammonian Querc. 3℔.

Mart. cum Succo Pom. gr. vi. vel vii. ad 3℔.

Troch. Albund.

Scamm. sulphurat. an. gr. i. ad gr. i℔.

Cum Ess. Martis f. Pilulæ.

D. S.

Pilulæ Laxativæ.

Vel

24. *Mercurii dulc. gr. xv.*

Scamm. sulphur. gr. iv.

M. f. Pulvis.

Pulvis laxativus pro 1. dosi.

Detur in vehiculo calido

Vel cum Extr. Martis, utpote quod in Ca-

chexia egregium, f. Pilulæ: f.

Pilulæ Laxativæ pro 1. dosi.

Vel

24. *Puls. Jalopp. gr. xv.*

Crell. Martis speris. gr. vii.

Extr. Troch. Alb. gr. i.

M. f. Pulvis.

Pulvis Laxativus pro 1. dosi.

Aut etiam Pocio Laxativa cum Gummi Ammoniaco usurpetur, aut Infusum Rhabarbari, quod in sequ. de Hæ-

mo occurrit. RIVERIUS in purganda Anasæra utitur Succo Icteo recenti per residuum depurato ad 3℔. cum 3℔. Manne invicem permittit, ad Serositates abundantiores evacuandas.

His præmissis sit accessus ad Martialis: Hinc tot Pul-

veres & Medicamenta Anticachædica, ut vocant, præ-

stant, qui basin Martem agnoscunt. Martialis hæc diver-

sifimodè præparantur: Interim, quo suspiciat præpara-

tio eò melior, & quò minus ab Acidis saturatur Mars, eò efficacior erit: unde Pulvis Cachædicus Quercetani melius est præci, quoniam illius primarius Ingrediens est Crocus Martis Saccharinus, cujus tamen nullus est usus: Ratio, quia saturatus Mars Acido Sulphuris, instar scoriarum tantum in corpore jacet sine effectu. In specie tamen Martialis, prout nunc acida magis nunc acia peccant, disponuntur: In Subjectis enim non delicatis locum invenit sufficiens Limatura Martis, minutissimè trita & pulverisata, præprimis ubi Acidum fortius peccat. Parili ratione pulvis Cachædicus Hartmanni usurpari potest, & in specie de pulveribus Anticachædici vid. HARTMANNUS in Praxi Chym. p. 204. & 206. E. g.

24. *Limat. martis part. i.*

Cinnam. pulv. part. ii.

Sach. ad pondus omnium.

f. pulvis.

Qui dosi 3i. frequenter usurpetur.

Vel

24. *Antimon. diaph. Martial.*

Salis Alstet. an. 3℔.

Olei destillat. Ligni Cassia. gutt. i.

M. pro dosi S.

pulvis Apocientis.

Ubi verò Acidum non adeo excessivum, ac Stomachus sensibilis, in his casibus Martialis præparanda sunt, aut imprimis Vina Martialis conveniunt, obtinendo conditionem Ventriculi plus minus robusti, & qui facilius aut difficilius talia ferre possit: v. g.

24. *Limatur. Martis 3℔.*

Affundantur Vini mensuræ tot, quot illius uncie sunt, sicut invicem per 40. dies noctelque, postmodum de hoc uncias aliquot hauriat Eger, cui si addantur Aromata, majorem efficaciam acquirat.

Quo facit claretur martiale Myofchit, item Vinum Malvaticum Martiale HARTMANNI, quod habet in Praxi Chymiatr. p. 204. Loco vini Malvatici commodius assumitur Rhenanum, quod est acris, & potestius rodit Martem; necnon Extractum Martis cum succo Pomorum Boridorsiflororum, vel Musto vel Decocto Tamarindorum paratum, uti etiam Extractum Martis Myofchit (Tinctura enim Martialis sunt lauguide) deque tali Extracto, quantum cuspis cultri capiat, vel ad quantatem Castaneæ, in Vini Martialis propinatur. Huc speciat Tinctura Vitrioli Martis Zeroversi & Ludovici, Antimonium diaphoreticum Martiale, loco Spiritus Vini communis sumitur spiritus Baccarum Juniperi, vel Menthae, Cochlearis, &c. Bezoardicum martiale, quod etiam in Anasæra, & incipiente Hydrope est egregium, Pertinet hæc etiam Tartarus Martialis ex assuione solutionis Tartari super Limaturam Martis: sic enim sunt cry-

stalli Tartari Martiales:

24. *Solut. Mart. cum Succo Pom. 3℔.*

(vel in Storbura par. iii. cum p. i. Spirit. Cuckl.)

D. S.

Essentia Apocientis.

Dosis 40. ad 50. gutt. cum leni moen.

Vel in Subjecto paulo robustioris stomachi usurpetur Acidula naturales & artificiales: Vid. PLATERUS Olferv. l. 3. pag. 608. Prax. T. 3. pag. 114.

Vel

24. *Liqu. Martis Solar. 3℔. vel iii.*

D. S.

Essentia Acidularum.

De quo primo die gutt. vi. capiantur, secundo vii. tertio xii. ascendendo ad 15. 30. vel 30. guttulas, ad modum Acidularum in Murbis Chronicis:

24. *Salis Martis compof. 3℔.*

D. S.

Sal Apocientis.

Dosis omni mane, quantum cuspis cultri capiat.

24. *Aqua Pomar.*

Græss. an. 3℔.

Mag. seu Extr. Martis Myofch. vel cum Succo Pom.

3℔. ad 3℔.

M. D. S.

Pocio Apocientis cochlearium capiend.

Capiat quotidie bis cochl. i. vel ii.

24. *Pulp. Passul. per satat. troch. 3℔.*

Extr. Mart. cum Succo Pom. 3℔.

Rhab. elect. 3℔. ad 3℔.

Cum 1. q. Syr. Rosat. sal. vel Pomor. f. Electuarium.

D. S.

Ele-

Electuarium Aperiens.

Capiatur quotidie mane dosi magnitudine Castaneæ.
Martialia hæc aliquandiu continuantur, observando tamen interim:

1. Quod post usum horum instituentibus sit aliquis *Mensus*.
2. Quod sub usu horum *Alvas* semper *aperta* servanda sit.

Quare consultum est omni septimana, ad minimum semel, blanda Laxativa interponere, ut ita, quod cicuratum est, ab illis evacuetur: e. g. vespertino tempore usurpentur *Pilule suprà de chylofatione laesa* allegatæ, vel dosi *Pilularum ususum*, v. g. *Glaucanarum*, aut *P. F. (O)* de Ammoniac & Tartaræ *Quercetani*, aut quales describit *Sylvius in Prax. cap. 7. §. 52. pag. 69. &c.* & ita interpolatis vicibus cum illis *Martialibus* adhibeantur, vel *Pilule in Differt. de usu & abusu Purgantium. cap. 3. §. 30.*

℞. Gulaea, cum Amy. sol. 3℔.
Extoll. Troch. Albond.
Diagrid. gr. iiii.

F. Pilule pro 3. dosibus.

Martialibus his ad aliquot septimanas continuatis, fiat progressus ad *algerantia volatilia*, plura minus *aromatizata*, quæ vulgo vocantur *Hepatica*, i. e. quæ sunt *saporis amaricantis* & acris plura minus, & omnia imprægnata sunt sale volatili urinoso, nunc magis nunc minus temperato, blandè Laxantibus mixta, ut ita acuetur Bili, alteretur sanguinis Dyserasia, resolvantur Cruditates acide, & succi vigoris sensum & per epiciam simul evacuetur, Atmatica illa in genere sunt omnia simplicia amara & acris, Hepatica alias à Veneribus dicta. Ut enim Acida stomacho sunt amica; ita Amara Hepati grata, quatenus incidunt, & Bilem corrigunt. Inter Acia illa, sale volatili plura cingida, eminent *Cichorium*, *Radix nempe ejus*, *Radix Ari*, *Helentii*, *Centaurium minus*, *Carduus benedictus*, & maxime *Abinthium* & *Agrimonia*, cujus Decoctum insigniter laudat *POTERIUS*; *Rosmarinus*, *hyssopus*, *salvia*, *Mentha*, & similia; item omnia *aniseptica*, ut, *Radix Armoracis*, *Nasturtium*, *cochlearia*, &c. locum inveniunt in curanda cachexia & Anasuria, quæ laudantur à *BACONE de VERULAMIO in lib. Vita & Moris*; *Flores Geniste*, *Bellida*, *Centaurii minoris*, hepaticæ nobilis à quibus potè *aromata* conia, quatenus sunt stomachica, & imprægnata sale volatili oleoso, præ ceteris tamen *Cinnamomum*, *Galanga*, *Zedoaria*, *Caryophylli*, *Zingiber*, &c. adduntur. Ex his confici possunt Noduli Vini infundendi, nunc folis, nunc Laxantibus mixtis, nunc ante, nunc post *Martialia*; v. g.

℞. Herb. Alfinth.
Menth. an. M. l.
Rad. Enul. 3℔.
Genian. 3℔.
Rhab. el. 3vi.
Pol. Sen. sine sup. 3i.
Rad. Helleb. nigr. ana. 3vi.
Cort. X/al. sup. (sic enim præscribuntur) 3iij.
Salis Tartari unc. 5.

Includantur Nodulo, qui indatur Vini Mensuris aliquot.

De infuso bibat Ager omni mane haustum, & si placent, à meridie.

Vel

℞. Herb. Fumar.
Alfinth.
Rosimar. an. M. j.
Rad. Enul.
Fenicul. an. 3vi.
Pol. Sen. sine sup. unc. i.
Rad. Helleb. nigr. crud. 3vi.
Rhab. el. dr. iiii.
Sem. a. solid. maj. an. 3℔.
Bacc. Junip. 3℔.
Cort. Aurant.
Citr. an. 3iij.
Galang.
Zingib. an. 3i.
Sal. Tartari (quod acule Mensuris pro extrahendis Purgantibus) 3iij.
Incis. & confus.
D. 5.

Nodulus Laxativus in Vinum,
Vel

℞. Herb. alfinth. res. M. ii.
Menth. res. M. ii.
Rosimar.
Salvia an. M. 5.
Rad. Armorac. res. 3℔.
Dro. nasturt. res. 3℔.
Cort. X/al. sup. 3vi.
Cinnam.
Galang.
Zedoar. an. 3iij.
Sal. Tartari.
Incis. & confus. includantur Nodulo pro Vini Mensuris aliquot.
D. 5. ut suprà.
Vel

℞. Herb. Nasturt. res.
Cochl. res.
Card. bened.
Alfinth. an. M. j.
Pol. Sen. sine sup.
Rad. Enul.
Armor. res. an. 3i.
Helleb. nigr. ana. 3vi.
Cort. X/al. sup. 3iij.
Bacc. Junip. contus. 3i.
Passul. min. 3vi.
Sal. Tartari 3iij. vel 3iij.
Incis. & includ. Nodulo.
D. 5.
Nodulus in Vinum,
Vel

℞. Herb. Menth.
Alfinth.
Cam. Centaur. min. an. M. j.
Rad. Enul. 3℔.
Pol. Sen. sine sup. 3x.
Helleb. nigr. crud. 3i.
Pol. Galang. 3i.
Zedoar. 3iij.
Sem. Anis. 3℔.
Sal. Tartari 3vi.
Incis. & confus. includ. nodulo.
D. 5.

Nodulus in Vinum; quo exhausto alia Mensura Vini denub superinfundatur.
Convenit in Cachexia scorbutica jam ad Hydropem inclinantem.

Vel

℞. Herb. alfinth. Mii.
Cochlear. res.
Nasturt. res. an. M. j.
Rad. Armorac. res. 3℔.
Enul. 3vi.
Cort. X/al. sup. 3iij.
Passul. min. 3i.
Bacc. Juniper. res. 3i.
Salis Tartari 3iij.
Incis. & confus. includ. nodulo.
D. 5. ut suprà.
Vel

℞. Herb. rosimar.
Salvia ana M. 5.
Alfinth.
Fler. Centaur. min. ana M. l.
Guaifa vel Lapul. p. liij.
Rhabarb. el. 3℔.
Cinnam.
Galang.
Zingib. ana 3iij.
Limar. Meris res. 3℔.
Includantur Nodulo, Vini infundendo,
pro scopo alterativo.
D. 5. ut suprà.

Nam *Rhabarbarum* non tam propter usum laxandi, quam alterandi, acidum corrigendi, Bilem in naturali statu conservandi, Urinam movendi, & Atoniam Hepatis corrigendi, adhibetur; unde etiamnum *Anima hepatis* quibusdam dicitur. Sanè præmissis prætendens in Virginitibus, in specie Cachectici, egregium usum observavi tam

tam Rob Juniperi folius, quod *Theriac Germanorum* dicitur, subinde usurpati, quam ex Rob Juniperi cum Rhabbaro Pulverisato facit Elechtharii.

℞. Rob Juniper. ℥iij.

Solu. Rhabbar. ℥i. ℥iij.

Cinnam. ℥i. ℥i.

M. f. Elechtharium: 3.

Elechtharium Aperiens.

De quo omni mane capiat bonum haustum.

Huc etiam pertinent Cerevisiæ & Vina Anticachectica, quorum formulas videb. in *Colleg. Pharmac. Schraderiana* P. 2., *Ludoviciana*, & *Idea Formalarum*, & *TIMÆO von Guldenklein* in *2pfl. 3p. 48f.*

Pertinet hic *Elisir Anticachecticum* D. Reinefi. Compositum est Magistralis, quam nemine facile imitabitur; nam tria Ingredientia interdum plura præstant: propter materiam tamen Medicam hic apponere lubet:

℞. Rad. Armaræ. ℥iv.

Helleb. nig. ℥ij.

Gentiana.

Ari ana ℥iij.

Quinquæ Aperiant. ana ℥vj.

Trout Flor.

Alari.

Epithymi.

Enuli.

Corr. Rad. Cappar.

Sem. Carthame. ana ℥i.

Anacet.

Enuli ana ℥ss.

Merb. Card. bened. M. iij.

Cochlear.

Nuxtom. aquat.

Flor. Sambuci.

Fol. Alari ana M. ii.

Salv.

Betom.

Myop.

Rosmarin.

Chamaedr.

Chamaep.

Alfimb.

Menth.

Cyst. mis. ana M. l.

Galang.

Cinnam.

Maceis.

Caryoph. ana ℥ss.

Santal. alb.

Gran. Paradis. ana ℥iij.

Papiri sibi.

Croci ana ℥iij.

Rob Juniperi ℥iij.

Vini Rheum. ℥viij.

Macerentur in Balneo Mariæ per osiduum, tum exprime & destilla ad siccitatem, cavendo Empyreuma, Aqua destillata reassumens Fæces, & Tinctura eliciatur: post calcinentur Fæces, & cum Aqua pluviali destillata extrahatur Sal, quod purificatum Tincturæ admiscendum.

In Officiis præstant Species Dia-Curcumæ, & Dia-Galangæ: Hinc RONDELETIUS ceru expertissimum Remedium in omni Cachexia habet has Pilulas:

℞. Spec. Dia-Curc. (est egregium in his Affectibus Curcumæ) ℥iv.

Rhab. ℥i. ℥iij.

Spec. Diarhod. Abbas.

Dia-Galang. ana ℥i.

Cum l. q. Syr. de Alfimb. l. i. a. Pilulæ, ex ℥i. No. 30.

Dof. 30. vel 24.

Tandem *Pessula* misce conveniunt in Cachexiis quibusvis, & loco Rob Juniperi usurpari possunt, quæ vocantur optimum Hepaticum, id est, quæ egregie conveniunt in temperanda Sanguinis Dystrasia, quia Sanguinem laudabilem ac temperatum reddunt, Bilem optimè in suam naturam conservant, & Sanguinis motum fermentativum nonnihil restitunt. Sunt enim quasi Mustum concentratum. JOEL & RIVIERIUS pinguedinendi vim eis adscribunt. SOLENANDER *Conf. 21. 2pfl. 3.* sequens Elechtharium parat:

℞. Pessul. Coriand. ℥iij.

Rhabbar. ℥i. (hoc enim solum est insens in-

ter Purgantia) 38.

Sach. ℥iv.

Quæ mihi invicem & servat. Usurpatur interdum auct passum doct. cochl. i.

Incredibile est, inquit SOLENANDER, quantum emolumenti afferant ad sanitatem conservandam, dum alvum laxant, gastriculam & primas vias evacuant, & spiritus convolvunt, i. e. Sanguinis Crasim emendant. Loco hujus potest præscribi Elechtharium Angeni, aut etiam Elechtharium ex Pessulis HORSTII in Observat. pag. 301., aut quod in Colleg. Pharmacop. P. 2. Aut præscribi potest Elechtharium Molle sequens:

℞. Pessul. Pessul. Coriand. ℥iij.

Rhabbar. ℥i.

Crem. Tartari ana ℥iij.

Sal Tartari ℥iij.

Cinnam. auct. ℥i.

Cum l. q. Syr. de Pessulis f. Elechtharium Molle,

D. 3.

Elechtharium Aperiens.

De quo alternatim usurpari potest.

Si quis velit addere Extractum Martis, Remedium faciet eo magis conveniens, variando subinde dosin pro circumstantiarum ratione. FINCKIUS in *Tract. Chymico* Decodum parat cum Tartaro vitrinatum.

Sed, quando in Cachexia Bilis secunda, & Sanguinis motus fermentativus omnimodis retinendus est, Aromaticis ralisamara resinosa, & Rob hi aromatici, optimè conveniunt: Nempe hæc omnia effectum Caliditatis possunt se relinquunt, jam verb Intemperies Frigida in Cachexiis solet adesse, Decoda Lignorum alibi commendantur.

In hæc adhibentur omnia *Salis volatilis*, plûs minus oleosa, *Spiritus urinae* volatiles, tam simplices quàm compositi, *Spiritus Tartari* volatilis, *Spiritus Carminativus*, *Liquor Cornu Cervi* fuscatus, *Lamburcorum urinae* fuscus, *Urine*, *Salis Ammoniaci simplex & oleosus*, *Tinctura Nephritica Ammelungii*, &c. Quibus pro circumstantiarum ratione nunc *Pessulæ*, nunc *Antiscorbatica*, nunc *Emmenagoga* permiscenda, *Elisir Proprietatis sine acido*, imprimis illud rubicundum, quod paratur cum *Spiritu Urinae*, vel *Salis Ammoniaci*, hic enim insigniter convenit: *Elisir Præcipitani*, *Cachecticum Polychrestum*, vel *solutarium*, vel cum *Essentia Abinthii*, *Agrimoniae*, *Rosmarini*, *Juniperi*, *Tinctura Tartari* composita, &c. Dope ex alio reconvalescat Ager: Hinc

℞. Tinctura Tartari compos. aut Elisir Anticachecti, aut Elisir. Propr. sine acido ℥i.

Essent. Abinthii.

Cyst. mis. ana ℥iij.

M. D. S.

Essentia Aperiens.

Dosis 40. vel 50. gutt. his vel ter in die, mane in vehiculo calido, hora quinta pomeridiana, in Cerevisiis, & sub introitu lecti.

Vel *℞. talia maturant tempore, à meridie verb recipiatur Spiritus Salis Ammoniaci*, vel bujus loco *Spiritus Carminativus de Tribus*, vel *Tinctura Nephritica*, vel *Liquor Cornu Cervi fuscatus*: de quibus à meridie & sub introitu lecti capiantur gutt. 40.

℞. Spiritus Carminativus de Tribus ℥iij.

Salis Ammoniaci ℥iij.

M. D. S.

Spiritus Reinsvens.

Dosis 50. gutt.

Vel horum loco:

℞. Tinctura Nephritica ℥ss.

Liqu. Corn. Cerv. fuscus, ℥iij.

M. D. S.

Tinctura Reinsvens & Aperiens.

pro dosi sunt 50. gutt.

℞. Tinctura Nephritica Ammel. ℥ss.

Spiritus. Lambur. per part. vel Urina per part. ℥iij.

M. S.

Tinctura Urinam pellens.

Vel

℞. Tinctura Nephritica ℥iij.

Tartari ℥i.

M. D. S. ut antè.

Dosis 40. vel 50. gutt.

℞. Aqua Alfimbria.

Pessul. an. ℥iij.

Malvat. Juniper. ℥vi.

Tinctura Nephritica ℥ss.

Spir. Lumb. terrestr. ʒi℥.

Syr. Cinnamon. ʒvi.

M. D. S.

Potio Nephritica, cochleatim capienda.

Vel

ʒ℥. Arsen. dupl. Myrs. ʒi.

Salis Genst. ʒ℥.

M. D. S.

Sol Singulare pro 2. vel 3. doibus.

Tandem Balsamum Sulphuris retinebatur vel juniperinum commodè aliquandiu continuandum venit. Item cum Aromaticis istis interdum usurpatis capiatur sub interitu lecti *Ellix Mencha, Cochlearia, &c.* parva dos, aut bujus loco *Spiritus Baccarum Juniperi, Mencha, Salvia, &c.* & horum medio promovetur digestio prima, acuat Bilis, & restituitur densu Sanguis.

Pro meliore illustratione ditorum, observanda venit Ancilla cachectica, alias succiplea & formosa, quæ jam ab aliquo mensibus Scabi laborans deformis reddebatur, ab alia Ancilla per contagium contracta. Scabies erat humida, pustule lætæ, ingentes, copiosum serum, perierim in cruribus, fundentes, Crura simul insigni Tumore edematoso ad Genia usque turgabant, manibus etiam tumidioribus existentibus. Conspicebatur simul de sapore dulci nauseoso, insigni siti continua, Cereviam soculariam bibebat, quia primaria non sapiebat, beas appetebat, probeque comedeat, intendum dulcis & calidus halitus ex Abdomine ascendens videbatur, dicebat, *ascendens ipse inflat furis calidi*; in Abdomine subinde varias agitationes percipiebat, quod eandem nunc parum tumeat, nunc denovo lubidebat, Facies erat pallida & tumida, Urina parva mitebat, quolibet mane Vomitus jejuno stomacho patiebatur, Menis inordinatè fluctans, nunc intra 14. dies redibat, nunc ultra Mensium tempus deficiebat, & bene dormiebat. In hac Cura ad vitium Bilis respiciendum erat, & cum ante accessum meum jam purgata esset, ante omnia operam dedi Acidum corrigere, viscidum resolvere, & Bilem acuem: hinc Americanicis tribus his scapis facilius credidi, unde beneficio Abinthii maximam partem emi restitui: Primum dedi Li- quorem Martis Solaris ad gutt. 40. quotidie, donec ʒ℥. absumpsisset; omni mane docti uterando, quo Ægra melius habuit, Urina copiosius fluebat, & sapor dulcis evascebat. Externò Uleculis scabiens imponere fuit Folia Lapathi acuti, recentis confusa, ita illa minus plorabant Seri; nec Tumores increbescant, sed Pustule ad sanietatem properabant. Dein fusi parandum decoctum ex Radice Lapathi, Frondibus Cynobati, & Herba Abinthii, ana cum Aqua simpliciter, quod omni mane calide bibit, & expectavit Sudorem, ubi etiam Urina fluxit: imò, ut penetrantius esset; quotidie Spiritum Abinthii utrosque per potestatem paratum ad gutt. xxi. id dicto decocto dedi.

Hic aliquot septimanis continuatis melius habuit, sed mundum rediit: unde dedi Vomitorium, ex quo miram salutem cum euphoria reiecit, postea dictum decoctum continuavit. Cuius vero illud nausearet, iussu ex Abinthio cum Spiritu. Vini parare Elentiam, de qua mane & vespere cochli. l. assumpsit, simulque insillavit Spiritus Salis Ammoniaci gutt. xxi. & ad aliquot septimanas continuavit; Abinthium etiam cum Pane butyrato assumpsit, & sic convaleuit.

Si ex Officina curari debuisset, Digestiva præmissem Martialis, v. g. Solutionem Martis cum Succo Pomorum, vel Tincturam Vitrioli Martis Zosteri, vel Pulverem Cachecticum Hartmanni; Post Vomitorium dedissem, vel Purgans Mercuriale; tertio volatilia Aromatica amata propter inertiam Bilis, ut Vinum Abinthites, Vinum isefum Herbarum Americanicum, vel Hepaticarum, item Elentiam Myrrhe, Lignorum, Spiritum Carminativum, quotidie à ʒ℥. ad ʒi℥. aliquandiu continuando. Cum his propter Scabiem procuralem Sudorem.

ARTICULUS II.

De Leucoplegmia, & Anasarca.

Hæc ipsa similiter conveniunt in Cura Leucoplegmia & Anasarca, in quibus tamen subinde ad validiora, & in specie in purganda Anasarca ad Succum Iridis nostratis accedendum est, itemque ad Mercurium dulcem, qui in his expurgandis est optimus, si scilicet Pulvis de Ammoniaco Quercetui, aut Extracto Catholico immiscetur.

Notatu digna est observatio RHODII Centur. 3. Obf. 9. de Fœmina Leucoplegmatica ab insuadente Mercurio rivi reconvalcente.

DIAGNOSIS.

Anasarca signa specialiora quod concernit: in hoc totum Corpus molem præternaturalem acquirit, maxime Pedes, qui primo intumescere incipiunt; simul totius Habitus color pallidus, Carnes molles ac flaccide existunt, laborem minimum magna capicit Lassitudo, Pulsus est parvus. Urine tenues & aqueæ ut plurimum, secus ac in reliquis speciebus Hydropsis, quatenus in hoc non tanta Serit quantitas extravasatur, imò ad poros Partium hoc depositum, aliquantum adhat, utat tardius, circulator.

PROGNOSIS.

Anasarca autem, si Pectoris atque Abdominis Hydropi comparetur, minus periculosa est; quia Causa hujus Continentis à Vasis Sanguineis & Lymphaticis, commodius absorberi, ac à Sanguine affluente facilius digerit ac dissolvit, vel etiam per Ecretoria eliminari potest, nisi Phlebis aut Tympanites superveniat, imò multo exterior est Particularis, & que Crura tantum occupat, modò Ascites ipsi non combinetur, quam Universalis.

Aliis vero plus spei est, si Anasarca Ascitem, quam si Ascites Anasarcam, superinducat.

CURA.

Præter Purgantia superius allegata, Sudorifica & Diuretica specialiter laudantur pro Habitu totius Corporis promptè evacuando, & simul emendando. Sudorifica inter vulgaria eminet Decoctum Lignorum Sudoriferorum, Radices Chinæ, Ligni Sassafras & Guajaci: de quo conf. WILLIUS Phurm. Rat. Part. 2. pag. 386. & 375. Sic LINDANUS refert, se curasse Anasarcam in Muliere Decodo Ligni Guajaci, una cum interposito Condito seu Electuario Stomachico, & secundum factam fuisse: Decoctum Granorum Juniperi vi diuretica est egregium. Decoctum Radicis Vineticoalis in Vino paratum singulare Remedium Diureticum simul & Diaphoreticum in Anasarca esse, & mira præstare afferunt, non secus ac Decoctum Helenii. Novi Exemplum insignis Anasarce mediante *Diosco Prælim Cynobati cum arillis entæ*. Aliis in usu est, ut accipiant Lignum Sassafras, cui addant Lignum Juniperi, vel Baccas ejus, ut ita fiat Remedium & Diureticum & Sudorificum: de quo vid. RIVERIUS Cent. 4. Obferv. 3. pag. 49., qui Rusticum post Febrem quartanam confirmata Anasarca laborantem, beneficio Vini Juniperi per Diuresin curavit: Sicut etiam Spiritum Baccarum Juniperi admodum commendat JOEL in sua Praxi. (P)

Pro scopo Diuretico Litivum ex Cinciribus Abstrahit & Genizæ cum Vino albo vel Aqua appropriata, paratum, est egregium: Nam certè Vinum Abinthites, aut Vinum Emulatum, seu Infusiones Radicis Helenii, optime,

(P) Haud facile fore est in Praxi Anasarcam vel Leucoplegmatiam Sudorificis Medicamentis curare; plegmaticas enim & crassas humores minimè potest per Cutis poros, adhuc vi morbi angustiores redditos, & siccis, imò crasse illas particulas à Sudorifero removere in meum acta, quoniam non possunt ob crassiam per poros extrahi, tunc in Corpus universum faciunt, non sine notabili virium egritudine dispendio. Quod quidem verum est non solum de Diaphoreticis intermiscitis assumtis; sed etiam de Hypocistis, aliisque similibus infrascriptis, quoniam spe Sudor in Leucoplegmatis, atque Anasarca procurari solet, & in calore hujus Articuli moras. Sane igitur est loco Sudoriferorum, Diuretica præferenda, & præsertim quæ salina adeoque inciderent fore: horum enim auxilio attenuari licet viscidæ humores, facili negotio poterant per Urinam feceritula extra Corpus propelli.

me conveniunt pro Potu in Cachexia & Anasarca. Adde nempe Amara post Martialis utramque in his Affectionibus faciente paginam. Alia, ut Essentia Lignorum, Lignis salisfrax, tambuci, vel Essentia Rob Lumboci, Tinctura Coralliorum salisfrax, Malvatum Juniperium, Elisair Febrile Myrsinisi, spiritus Theriacalis camphoratus, spiritus Tartari volutius, nota sunt. Semem Hyperici ad ʒi. in Vino haustum potens est Diureticum. Species Diacureumae cum Decodo Cicerum rubrorum laudantur imprimis, ubi addit simul vatium Menisium sap-
piflorum. Ceterum hanc ipsa quoque conveniunt in Cachexia Virginum curanda, & in specie Martialis.

Si verò Cachexia sit ex defectu Menisium, imitemur FORESTUM lib. 19. Observ. 34, qui Anasarcam ab *affluente Menisium* præmilis Universalibus per ea, quæ Urinas ducunt, & simul Menies ciecit, curavit, ut est Asarum ejusque Decodum, quod mirè profecit, præterim si Cinnamon aliquid adjungamus, fortiter coquamus, & quæ herbam Sabine, Racas Juniperi, Radicem Rubiæ Tincturam addamus, e. g. potest esse talia.

ʒi. Rad. Atri ʒi.

Rub. Tinctur. ʒi. ad ʒi.

Herk. Sabine, M. l.

Rac. Junip. rec. ʒi. ad ʒi.

Coqu. in l. aqua simpl. sub faciem addendo

Cinnamon. acat. ʒi.

Cardam. ʒi.

Colatura educatur per lubitum.

D. S.

Potio Aperiens pro aliquot vicibus.

Insuper ipse Virum postmodum Leucopneumia & Anasarca laborantem, cum ipse Medicamenta in parva dosi respueret, præscribendo sequens Decodum per Urinam operans, unâ cum aliis prædictis observavi, restitui:

ʒi. Rad. res. Bryon. ʒi.

Atri ʒi.

Est. Tart. ʒi.

Infund. in l. q. aqua simpl.

Stent in loco tepido per noctem: mane adde

Rad. Fuscis. ʒi. ad ʒi.

Cinabar. afflati. M. l.

Flor. Bellid. M. ʒi.

Rac. Junip. ʒi. ad ʒi.

Scm. Fuscis.

Aust. an. ʒi.

Incis. & contus. infund. & coquantur simul: Colatu-

ram ʒav. ad ʒi. vel ʒi. adde

Spir. Ess. Ammoniaci.

Tinctura Nephros. an. ʒi. ad ʒi.

Syr. de Myrr. unc. li. vel unc. iii.

M. S. an. auct.

De hoc assumptis æger quondam ter, mane, meridie, & sub interitu lecti, bonum haustum, ita uberiori Urinæ profusio factus est sanus.

Pertinet huc Pulvis Menisii ab hoc expertus ad Virginum pallidos Colores, seu ad Cachexiam Virginum cum Menibus suppressis, quem cum milles expertum commendat in observ. apud res. observ. 6.

ʒi. Rubea ʒi.

Sabin.

Masse d. an. ʒi.

Cres ʒi.

Lamb. ʒav. ʒav. vel loco hujus Boraci ʒav. d. i.

Melle.

Fel. Lauri an. dr. ʒi.

Spec. Arom. refat. ʒi.

Limas. Chalyb. dr. iij.

Rad. Eaula dr. l.

Sacch. duplum omnium.

M. l. Pulvis.

Dosis dr. i. in Vino albo.

Tom. II.

Lumbicorum Decodum vel Spiritus eorundem per fermentationem seu putrefactionem paratos est expertum Diureticum in Anasarca, imprimis si sit complicata cum scorbuto, in qua scorbutus lumbici sunt admodum egrogii.

Externæ, ut *Teftraria*, *Echavaria*, *Acum pusillus*, &c. pro Anasarca cura videb. in WILLISII Pharm. Ration. Part. 2. pag. 266. sequ. præterea in Anasarca conveniunt Folis bardane viridis, si levis contusa applicentur plantis pedum & juncturis: Nam mirum est, quantum Fuliginem extrahant ea toto corpore, cum sensibili Aegrorum levamine, etiam admodum copiose per poros pedum & sanarum efficiunt. Oleum scorpionis unctum per Diuresin Anasarca laborantem sanasse, vid. WILLISIIUS l. a. cap. 5.

In principio ac declinatione Balnea, tam humida quam vaporosa, conveniunt: Illius generis efficaciora sunt thermæ Naturales ac Artificialis, Sulphure ac sale imprægnatæ: Huius verò Vapor Aquæ Mineralis, in tale decoquenda, prope Fornos salinarum excipiendus. Speculant huc laconica, vel sicca cum spiritu Vioi accenso instituta, quæ non tantum poros relaxant, sed elasticitate quoque Humorum excitando visciditatem horum corrigunt, hinc duplici modo ad sudorem disponent. Sed Balnea hæc via, nisi in principio ac declinatione locum habent, cum in statu adhibita asthma, appetitiam, &c. inducere possunt, quatenus corpore omni calefacto ferum ea Habitu ad Vasa, binque ad præcordia & Cor reuertitur, cogunt. Quidam corpus Anasarca laborans immergendum sudent in Arenam calidam, ut eo promptius absumantur humiditates, quod etiam FERDINANDUS Hist. 30. pag. 94. tanquam suum Experimentum refert.

ARTICULUS III

De Hydropse Universalis

Cachexiam modò explicatam frequenter sequitur Hydrops, non locus ac reliquis ejus species, ut Cachexiam Emericam, Nephroedemiam, Scorbuticam & Febrilem, tandem insequi solet. Hydrops nomine intelligit Aquam sine Membrana forisam extrinsecus atque præternaturaliter collectam, quam necessario Tumor & distensio Partis, cum ejus tamen mollesce, & non raro fluctuatione, comitantur. A partibus, quas immediatè magis occupat, variis appellationibus, l. e. Hydropthalmus, Ascites, &c. sortitur, hydrops enim vox convenienter Latine Aquæ diturus redditur. Jam verò hydrops vel totum corpus tumefacit, & dat hydropem universalem; vel determinatum corporis Partem, unde Hydrops Particularis. Ille est vel simpliciter talis, & dicitur Anasarca & Leucopneumia, vel secundum quid talis, & est illa Ascitis species, quæ successivè post crura tumefacta totum Abdomen & Thoracem occupat. Hic pro partium varietate, quas affligit, varius est: unde specialis sortitur nomina: sic quando Aqua colligitur in capite, dicitur Hydropthalmus: quando in Pectore, Hydrops Pectoralis: si in Pericardio præternaturaliter abundet Lympha, ea hydrops Pericardi: si in solo Abdomine, dicitur hydrops Ascites, ab Utere, quia inflat Uteri Abdomen repletum & tumefactum est (Q); in Utero est hydrops uteri: in Testibus est hydrops Testis: In Partibus externis, non altero membro, Tumor Testis aut Aquis generali nomine appellatur: Imò in Omenti bursa cniopie Aquæ inclusæ in insignem Tumorem Abdomen attollunt, quæ Exemplum videb. in HORSTII Observ. Irem in Peritonæi duplicata conclusæ Aquæ Hydropis Abdominis speciem præbent; vid. MEEKREUS Observ. Chirurgic. (R)

FFF

Es

(Q) Ascitis enim est Uter.

(R) De hac Hydrops specie, in qua Aqua occupant duplicatam Peritonæi, seu spatium vi fallum inter utranque Peritonæi Membranam, obliquum habet descriptionem D. m. Lierre, occasione subdit Mulieris, ex morbo post quartum annum solutata, conceptam. Hæc autem modo id accidere posse putat citans Author: si scilicet potueris, qualem ex Glandulis ovaricis in duplicatura Peritonæi effusis, aquæ adeo resori: ea effusio ac inter se resoritur, separant a se invicem superficiem membranarum in statu naturali sese coniungunt: ex qua separatione & distensione membranarum, alia Glandula in eadem duplicatura sua mensuram dilatare ac ratione, ne illarum pars filtratam dicat superficiem unius membrane adharere, vas vero excreviorum, quod secretum liquoris juxta naturam ordinem extra Peritonæi duplicaturam transmittere debet, veluti in cæcum inter utramque membranam retinere hinc: quare liquor aqueus in istam Glandulam secretus, quom non possit foras exire, nunquam in eadem retinere

Ex his patet, hydropem non esse propriè alium Morbum, quàm ubi est Aqua. Hinc *Tympanitis* improprie est hydrops, cum Flatuum tantummodo, non verò Aquarum in Abdomine collectio sit: Unde saltem propter similitudinem Tympanitis cum Ascite ad hydropses refertur. (S) Eodem modo curatur, ac de *distentione stomachi supra dictam*, in specie spiritus Nitri dulcis, & spiritus Carminativus de Trilias, qui insisteret convenire solent.

Saltem *Drugsis Hydrops in Universalem & Particularem* notanda venit. *Universalis* est, qui vitio totius Corporis oritur, & a Pedibus incipiendo tandem Abdomen succellit occupat. Frequentissima Hydropis species est ista, quando Pedes, Scrotum & Abdomen insigniter intumescunt & turgescunt: quæ nec propriè *Anasarca* est: cum saltem Partes inferiores occupet, ut ait WILLISIO *Anasarca Particularis* minus tamen appellat, dicitur; Neque tamen est Ascitis propriè dictus, quia præter particularem Abdominis Tumorē, & universa Crura subinde immensum tument. Reverà igitur frequentissimus hic Hydrops est quasi *Anasarca* Partium inferiorum, cum origine, fieri modo, ac medicamentis ratione inter se convenient: accidentialiter verò differat: de quo infra. *Particularis* est, qui vitio determinatæ Partis fit, & primo Abdomen, dehinc Scrotum, tandem Pedes occupat, de quo Particulari infra plurius.

Hydrops Universalis utplurimum Cachexia confirmatam insequitur, ita tamen, ut ouc sit *Gonorrhœa*, ubi simpliciter serum peccat: nunc *Morbus*, ubi simul cum sero Materias plûs minus viscidæ est, adeoque Ascitem cum Anasarca constituit.

C A U S Æ.

Causa Hydrops non est Hepat frigidum ob Hæmatostes defectum, quæ Veterum fuit sententia, cum à Modernis Hepat defectum fit ad Imperium sanguificationis, ipsæque publice dicitur Eserique. Deinde adveniat huius sententia omnes, qui per experientiam Anatomicam observant, capillimè Hepat lesioni in Hydropis, in specie Ascitici, fuisse repertum: de quo vid. præter HELMONTIUM *Tract. de Hydropis* §. 20. SÉNERTUS lib. 2. *Præfixi*, ubi de Ascite, qui jam suo tempore præteritum hoc recitat. Unde in principio hujus seculi S. YACIVUS LANCEANUS, *Medicus Romanus*, peculiariter edidit Libellum, cuius Titulus: *hydropem non semper à Jecore fieri*; excusum Romæ Anno. 1803. Licet negari ce-

queat, Bilis defectum simul concurrere, Non nego equidem, Hepatis & Lienis scirrhus fuisse subinde letosiores in Hydropis demeritos, sed hoc habet commune cum aliis Visceribus. Viscerum enim quorumvis varia & multiplex observata in Hydropis constituit præternaturalis ita ut hæcuna aut certi de Parte solida, primario in Hydropis affectu, colligi queat. Imò fieri potest, ut sine vitio alicujus Visceris Hydrops nascatur, quando ab Errore externo, aut Potu frigido confectum ingello, Aqua in Abdomine colligitur: atque adeo non solus Hepatis, sed & aliorum Viscerum culpa, imò interdum Visceribus penitus illis, Hydropem generari constat. Ut tamen obscuram esse generationem & fieri rationem Hydropsis, si ex Hepate orti supponatur.

Propius ergo ad *Causas Remotas Universales* accedamus. Est ergo Hydrops non secus ac supra memorata Cachexia, nunc *Morbus Primarius*, qui per se vitio Rerum Naturalium aut Non-naturalium succedere solitur, nunc *Secundarius*, qui ex vitio quodam morbo præternaturaliter præcedente originem ducit. Nempe oritur hydrops frequentissimè

I. *Ex Febribus Intermittentibus Chronicis*, quibusvis *maie crassitas*, speciatim ex Quartana dignetur: præteritum quando Aegri in Paroxysmo omnis bibunt, sequentes hydrops oritur. Aides, ut frequentissimus disturnatur, & male traditur Quartanarum, pedilicet fit hydrops, per quæ prævidua diebus intermissionis Amara ex Vegetabilibus Febrifugis, præteritum Abdomine, sedulo stirpanda sunt, per conservanda Bilis & sanguinis crassi, debiteque Viscerum tono; vid. M. A. N. C. *Ass.* 3. *Obser.* 322.

II. *Ex Affirmate* (præteritum *Orithiana*) non solum humoreto, sed etiam Convulsio, cui, si diutius duret, ordinariò hic hydrops supervenit, cum ex talis Pectoris Pathematibus hydrops observatur; siquidem aliquando Empyema, Plethia & sanguinis ipsam hydropem hunc insensum observatum fuit.

III. *Ex Renem* vitio frequentissimus est hydrops. Vix credo, ad pollic. Alices Universalis supervenire hoc Renem præternaturalis defectu, quin ex talis hic affectu hydropem, licet Particularem, orti præter ex, quæ HELMONTIUS *Tract. de Hydropis* §. 26. & 30. habet, PLATERUS confirmat in *Orithianæ*, ubi ex Renibus erulicatur Hydropem ortum allegat. Hinc Renem, ex æquozum artificem omnis hydropsis, asserit HELMONTIUS l. a., vel ex eo imprimi, quod totus

by-

retillo spatio congeri debet: quæ copiosius autem hic congeritur ad magis membrana à se invicem abscissæ, & amplius locis concedunt aqua liquori indur periphæri: atque hoc patet sensim Hydrops in duplicatam Peritoniam suam habens incrementum fundit.

Addit idem Author ad Præteritum prævidua signa: quibus hic Hydrops species deprehendit utrumque passu. Postquam autem fuit. 1. Si Ventris tumor lenis satis inasperit, & mox post multum anni incrementum senserit. 2. Si Abdomen proprium ferat signum, etiam multum corporis sit. 3. Si Tumor circumscriptus particulari, à Ventris circumscriptis diversis gaudiat. 4. Si aliquis hinc sit, in quo nec reperiatur nec fluctuantis sensus percipitur. 5. Si extrema infima Hydropis vel peritum, vel ferat & parum intumescat. 6. Si post Paracæsem, longum spaciolum per fistulam immittitur, non possit in auræ & Peritonis capacitate intruderi. 7. Si eadem fistula iniquitatem ab intus: alioque visceribus formata non deprehendatur. 8. Si post Paracæsem parum Aqua in Abdomine remaneat. 9. Si edula Aqua in ære lapine jacente, hanc per fistulam suam in ventrem injecit, à ventre non excipitur, sed statim per fistulam eromat. 10. Denum si corpus Hydropis afflicti longo tempore veluti sanum se gesserit, nulla alia molestia afflicti, quàm quæ à pondere & mole ventris ortum habet.

Rapide demum Hydrops species Carcinæ in hoc consistit ex Litter. a primo Paracæsi infusum in parte infima Tumoris, ut & collecta jam aqua, & quæ successu colligitur, prompti effluere possit. Punctulo tumore sine allegata intus, ut illud confectum aperitur continetur, quousque Membranarum diversarum coatum probe scissa sit. Et autem ut consequatur Injections per Punctulum quousque infundatur, ex Decoctis Pulveribus & Aligmentis, ad faciem & crustamentum ad aqua rediti edulcentem: quod si fortasse Ulcera in cavitate suborta sint, Decoctis addenda Myrrha, Aloe, Aristolochia &c. Petiula denique falcis compressa Petri suspensenda, ut, Jaceat quousque Majusculum Abdominis allione, quæ ex Merbo divisa exat Peritonem membrana, sensim sibi invicem adhæbuerunt. Quia stimula adhuc Glanula longis fortis carne laxa: aut, hanc aiglatinam impingit, tunc oportunitate ventrem ex sede incidere, ut passu Tumor parafallus Chirurgi manibus, & medicamentis appropriatis trahatur.

(S) Non autem re hic animadvertendum ripat, quod accurate notat Dem. Du-Verney Junior: *sapi saltem discipi etiam Classibus Præteritis in dignificationis hic Hydrops species, Affert nempe à Tympanitis: viz enim aquam se viscidæ aut Ascitem, qui tempore Tympanitis fieri habet, Ventris natura tunc, & locis separanter accuratissimè observatoribus imponi, qui infusum mentis opinem non repudiant, nisi cum facta panitione. Aqua non Aer effuit. Signa autem peristima, quibus Aquam in ventre contineri non Aerem convecturum deprehendimus, dum sunt, ventris scilicet pondus, pondus equalis Aeris: molis longe superant, atque fluctuat. Tamen autem hoc verum esse quotidiana experientia demonstrat: negare tamen non possumus, quodquod Aerem cum Aqua in Hydropis commiseri: quod hic iudicium æquum potest. I. Si ventrem aurque manu tantum, ex præteritum sede hic Aqua terminat, hic levitatis sensum percipimus, veluti cum viciat hinc teritur tangimus, quæ non tantum Aqua teropit, sed reliquam Aer complet. II. Si motus Aegri sit, hinc qui levis deprehendatur, gravis eradit, & eundem, qui gravitatem præseferat levi eradit. III. Si infusum Paracæsi Aqua salientis fluxu: Aeris bullis interruptum, sed ut fura parata vix vix ex quo fistulam fistulam hinc cogatur.*

hydrops per urines fluxum solvatur, l. c. §. 1. Totum enim fundamētum, propter quod supervenit Cachexia hydrops, consistit partem in renibus; partem in defectu virium viscerum, vires non amplius regere valentium. Semper renem in hydropoe finis fuit affectus, ita ut hydrops frequenter vitium fecum vehat. Sane ea renibus obstruētia, & debilitant, aut ab illis ulcerata, crebrior hydropoe observatur; sicut patet nephritica pæthemata, & renis exulcerati frequenter hunc affectum inferunt. Notorium enim est, quod in omni hydropoe, tam imminente quam incipiente, urina pauca, parva, nec respondens potui assumpto, excreatur: quod observet tanquam prognosticum potiores, qui, neque mingentes neque sudantes multum, certi sint, se evasuros hydropicos. Ut adeo concludendum sit, in hydropoe fermentum renem alterans secundum naturam serum sanguinis, vel decedere, vel impediri: & optimam eorum esse, quæ sit per Diuretica, & Lotium provocata. Confirmatur hoc ea co quod Serum, licet materialiter idem sit cum urina, si in abdomine coærcuatur extravasetur, neque saporem, neque odorem, neque colorem, neque alius urinae proprietates obicitur: quod ipsum innuit renem officium decedere, vel planè cessare in hydropoe, nec eos transmittere serum. Mithra quoque sanguinis diuturnum hydropem infert, teste SCHENCKIO in *observ.*

IV. Ea vitia *Mesenterii capsulam nobilioris*, aut usus necessarij in abdomine, Hepate, Lienē, Mesenterij glandulis affectis, utero, &c. frequens hydrops observatur. RONDELETIUS in *praxi l. 1. cap. 35. de Scirrbo hepatis* inquit, se ex frequent corpore diffinitione observasse omnes hydropicos vel Scirrbo, vel glandulas mesenterij induratas, habere, aut pauciores similiter constitutum. Item ex ulcere mesenterij observatur fuit hydrops, quod confirmat RONDELETIUS l. c. *cap. 36.* Sic ex ulcere mesenterij quicunque hydropem observat TULPIUS *lib. 2. observ. 32.* uri etiam HOECHSTEDTERUS *des. 6. conf. 6.* Sic Lienem malè affectum, in specie scirrholo factum, hydropis necessario insequitur: par est ratio de hepate scirrholo hydropem inferente; & ex Vulnere hepatis, Sclopeto lollido, suppurato, hydropem natum, videb. in M. A. N. C. *ann. 6. & 7. observat. 106. pag. 145.*

V. *Ex illis, & aliis quibuscumque Chachexis speciebus confirmatis*, tandem nascitur hydropoe in specie locustorum hydropis sui generis iniqui solet, de quo vid. optimè differētem EUGALENUM *rr. de febribus.*

VI. *Affectus à sanguine, vel præternaturaliter extraxi vel retrahi*, frequenter admodum oritur: Sic suppuratæ hæmorrhoides Aquæ interitus metum inieciunt: sic propter mensuræ consueta suppuratæ hydrops non raro supervenit; e. gr. post quatuor hæmorrhagias, aut nimium, aut crebrius repetentem, semper Cachexia; & hydropis metus imminet; sic post vomitum sanguinis, post inmodicum sanguinis spumam, hydropem insecutum, &c. observatum fuit: vid. RIVIERIUS in *observo. Communicatio.*

VII. Imò ex aliis nimis excretionibus, præsertim per Alvim tam Artificialibus (sc. enim Lencoplegmatiam, & Ascitem à variis Cathartica malè adhibitis, crebrioribus aut fortioribus, notat POTERIUS *enst. 2. cap. 29.*) & Non-naturalibus, quam præternaturalibus: sic ex alvi profusio diuturna observat FERDINANDUS hydropem, *Aph. 98.* Item hydropem gravem succedentem pytalim diuturno, & pertinaci observat THONERUS in *observo.* Idem de Dyenteria, ac similibus excretionibus observatum, nec non de Veneris abusu.

VIII. Crebrior, & copiosior, aut intempestiva *peruræ præsertim frigida*, post nimium æstum, aut corporis exercitum, aut æstus febrem, *ingurgitatio*, subitaneum interdum hydropem Ascentem infert: quæ quum exemplum, præter PISONEM *scit. de rebus feris*, etiam refert SENNERTUS l. 3. *cap. de Afficis pag. 711.* Sic intemperantia ebriolæ ad hydropem disponit: Ea haustu copioso frigida post nimium æstus hydropi post Tertianam genitus in M. A. N. C. *ann. 6. obs. 35. p. 52.* potus noxurnus in specie ad hydropem disponit: vid. BARTHOLINI *Alia med. Hæsticæ Plac. 1. pag. 160. & 161.* In potasyfimo febrium, qui copiosius potant, præsertim frigida, facillimè hydropem incurrit. Item ex copioso frigida potu in Ætate hepatis Scirrbus, & hydrops vid. in PONSECA *lib. 4. conf. 39.* Item RIVIERO *enst. 2. observ. 65.* Alius frigidam quotidie anre prandium bibens hydropis factus, auctore PANAROLLO *præ. 3. observ. 42.* Idem confirmat HENRICUS ab HEER *observat. annotat.*

Tom. II.

quendam ex affixis Ebriolitate altero, & hydropoe laborare: Acidula in dispoſitis hydropem accelerare potest, vid. in M. A. N. C. *observo. 1. to. ann. 3.* Quod facit spiritus Vini nimis abusus, (T) & similium potuum Aromaticorum aut generosiorum ingurgitatio nimis, Collapsationem vitium inducendo; & Lymphæ Acrimoniam augendo. Spectat hæc etiam fructuum pleurotorum similes, ut & Lactucæ, Endivie, &c.

Juxta hæc Causas magis particulares observandum: *semphitis Urinæ excretionis*, & *semphitis Transpirationis defectum*, ut plurimum, si non semper, adesse in hydropicis.

Urinum quod attinet: sanè hæc non uniusmodi excrenitur in hydropicis, quando ut plurimum crassa, intescentia, & perquam lixivialis, pauca tamen excrenitur, quæ in aliis econtrâ, aut rarius pallida, tenuis, cruda & pauca, prodire solet. Sane in omnibus patior & longè minor copia, quam assumptorum potulentorum sit ratio, excrenitur, quæ in aliis econtrâ, utut raris. Et sæpe primam occasionem suggerunt hydropi *renes*; Imò frequenter ex solis renibus affectis, itaque Lotium non emittentibus hydropis supervenit. Hinc etiam est, quod optima, & turissima hydropicos facit in urinae provocatio consistat, qua denud copiosius fluente subito evadunt. Hinc est, quod id serum, quod aliis sub forma urinae emittendum erat, in abdomine vero coærcuatur & exhaustum Arte, nullas tamen proprietates urinae, nec odore, nec sapore, nec colore exhibet, cessante nempe renum functione. SCHENCKIUS in *eise Altenburgensi decollato*, & publice diffundit renalem Adipem maxima ea parte aqueam, defluere vidit, itaque hydropis initia Visceribus, & Testibus induta observavit; & BARTHOLINUS omentum in hydropicis compunctis vidit.

Quoad *insensibilem Transpirationem*, hujus penuria colligitur ex eo, quod licet multum Seri colligant hydropici, nihilominus tamen difficulter sudant: itaque & circa madorem illorum corpus est, nec in Balneo facile sudare maderunt; quod ipsum cum aliis Cachecticis commune habent, quod omnes difficultat ad sudorem cogi possunt. Hinc si sudor hydropicis supervenerit, adeo, ut *Æger* alleviari se sentiat, bonum. Fortius observandum hæc meretur, quod SMETIUS *medic. lib. 2. aserit*, illos præcipue difficultat iudare, quibus scur & Lien Ætate Morboe insuerit, vel obstruētia magna aut seibro obduerit.

Præmissis bisce, *symptematæ* necesse erit considerare, quæ præsentia sibi hydropem vel præsentem vel plura miads imminuent, designant. Incipiunt sæpe pedes in inferioribus locis circa talas intumescere, Tumore quidem Edematolo plura miads serioso, impressi Digiti vestigia aliquando retinente; qui nodus quidem imminuitur, ita ut matutino tempore multo ciliore videatur; Interdum augetur, adeoque vespertino tempore major longe apparet. Idem Tumor paulatim ascendens erasit ad Ventrem, quem successe occupat; ut plurimum in Scroto sibi parat viam, & tunc final, quandoque intumescit Testes, præputium & collis, qui quandoque penitus occulatur, quandoque quadruplo major & transclusus sit. Dum *Æger* de latere in latus convertitur, murmur & fluctuationem Aquæ quasi sentit, quinimo mox corpore Aquæ ita movetur, ut impetus ejus conspicui possit, ut habet CÆLUSUS. Intumescit autem abdomen plerumque sensim & via animadvertentibus *Ægris*, & interdum quasi subito & brevi temporis intervallo. Præterea nunc animum tantum latus Tumor occupat, tunc utramque, ita ut Venter quandoque in duas partes divius dividatur, nunc vero aliquoties diffenditur Venter ab hypocondriis ad pubem usque; erecto autem corpore sensus ponderis prominentis in regione inguinum percipitur. Plerumque quidem Venter etiam post Mortem tumidus manet, raro vero deumescit; quod tamen observavit BALTHASARUS l. 2. *Aph. 2ph. pag. 170.* in duabus mulieribus, quarum atraque cum Hydropica foret, postquam extinctæ essent, ita resedit Venter, ac si naupium insumisset. Dum sic inferiores corporis partes accrescunt, superiores decrescunt & emaciantur, præcipue Jugulum, Cervix & pectus, quibusdam tamen, & Facies, præsertim matutino tempore à Somno, intumescunt, interdum & ad extremum Manus inflantur, colore in facie ut plurimum suppallo plius

Fff 2

monis

(T) Spiritus Vini abusus Hydropem parit ex Listero, quod Ferriendum laudat, & veluti aderat, testante eodem scribente.

minis ac livido. Multa puritas admodum molesta venatur quidam enim scilicet sicca laborant. Abfcessus quoque & maculae in cruribus quibundam empuunt saepius tamen leviales. Plerumque fabris comitari solet hydropicos, atque concussa lenta, circa vesperam manifestior. Pulvis est parvus, crebrior, subdurus, cum quadam tensione. Si vis imprimis Aegros misere verat, quot indulgentes cruciat, & qui plerumque, plerumque scilicet aqua simul etiam cibum salidum adesse infigne: quod si, quod ratissimum tamen est, sitiant parum, e contra commode plura minis appetant, melius omnino signum putandum est. Hinc magnam angustiam circa praecordia sentiunt, & spirandi difficultatem, maxime cum loca alta scendant vel decumbant, etiam unum ex praecipuis, de quo conquantur Aegri, quae etiam nundum apparente tumore incipit, hydropicemque praesigat, coque emergente incrementum sumat, adeo, ut saepius a media nocte Orthopnoicorum more erecti spiritum ducere cogantur: Hinc Dydropicorum nocturnam praenanciam Hydropis Akitis esse alteri PLATERUS in observat. & tum plerumque etiam Tussis facit, vis inanis ad tussendum irritatio, etque mali omnis, accedere solet. Conf. M. A. N. C. ann. 4. observ. 27. Alvus nunc clausa est, nunc quibundam, etque non alicubi, subit liberior esse inest. Quandoque & epilepsia acciti supervenit, & grave periculum plerumque minatur: interdum eadem in apoplexiam lethalem convertitur. Refert enim BAILLON IUS lib. 1. Epidem. pag. 27. Plicatorem quendam hydropem laborantem Epilepticum scilicet, saepius convulsus, Abfcessu circa Testiculos, & femora libera liberatum fuisse ab hydropice, & Epilepsia.

Observandum autem, ne Obesi nimis habeantur interdum pro hydropicis, de quo vid. HOECHSTEDT ERUS de med. 10. pagin. 418. Prode quoque observandum est, non confundantur hydropicæ, & gravidæ. Distinguntur autem invicem.

1. Exultare facit, & bono habitu.
2. Ex Tumoris specie. In gravidis Tumor Abdominis ad praecordia sursum vergit, etque inaequalis: In Hydropicis autem inferior part Abdominis intumescit, Mamme detumescunt, & Tumor undique aequalis, & quasi clemensior, ut nil dicam de motu totius.
3. Certum signum est fluctuationis, nempe ad tactum sentiant fluctuationem in hydropice.
4. Hydropsis, & rigor scilicet significat gestationem: sed ubi hydrops est, perit oculorum nitos, sunt lividi, &c.
5. Urina in gravidis non fuit ita constituta, ut supra de hydropice dictum.
6. Hydrops valde membrum gravat, in gestatione non item.
7. Quod se vertant hydropici, eo labitur Aqua; id quod non fit in gestatione.
8. Aetia in hydropice iuncta est, in gestatione non.
9. Denique sub hydropice mensis saepe fluunt, in gestatione non, &c.

Porro Aqua ista scilicet non semper aetia generis observantur: Plerumque Aqua est pallida, & citra, & urinam ferè refert, vocant Geem, Aquam halem. Interdum lotes, interdum viridis, interdum flava in nigrum vergens, interdum loturæ caruium similes, observate fuerunt Aquæ. Exempla allegata videb. in SENNERTO lib. 1. par. ubi de Aetia pagin. 217. Eadem exemptas, & leni igne tralatas, in gelatinam albam abiecit observavit BOYLE in Philosoph. Experim. p. 82. ut & WILLISUS Pharm. Rat. p. 2. p. 156. In gelatinam viridem abiecit observavit SIMON in hydrol. p. 370. (V.)

Aetia quoque est humor ille, falsus serè, ad acido-salutem, qui ahi Aqua permixtus spumam instar Saponis excitat. Ita refert GABELCHOVERUS Cæm quendam Augustinum hydropicum alterius consilio Dolio (submersus aqua reperto) insidentem, Aquæ falsæ se immerisse quotidie, & post 15. Lotionis diem ruptum esse umbilicum, & Aquam omnem, quæ in Ventre continebatur, effusam in Aquam Balnei, hanc verò inde spu-

mosum totam redditam fuisse, ut speciem Aquæ multo Sapo agitate referret. Unde etiam Acrimonia illius ratione subinde Internæ erodit, & emulcerat. Sacra, & subinde plerumque in externis partibus, praesertim Genibus, excitat, diffcultat curabiles: Unde & quod per Alvum excernitur, non sine moria lucellinorum, praesertim Recti, erone. Speciatim Acrimoniae ejusmodi partem illam Aquam esse collectam, non immerito suspicatur WILLISUS Pharm. Rational. par. 2. pag. 164. Et confirmatur aliter ex eo, quod sudor hydropici acidus Lac coagulans observatus fuerit: vid. BARTHOLOMÆI Alla med. Historiæ, volum. 4. pag. 175. & quod intero pariter, quàm in specie externæ Dilautionis Tumori dicata, ad aliam naturam accedat, verè gr. Aqua Calcis vivæ, Limaces ac Cochleæ, Liliæ hlerorum animalium &c.

Sane & acrimonia haec, praesertim occultè acida, das explicanda venit phænomena ab Androsibus nimis animadversa. I. Quod intus in illa crura, Scroti, & abdominis sit quidem & contentio liquore, sed tamen fortis illa Tensio, & iuncta quasi infatio non ab eo, quod talis, simpliciter proficisci videatur, sed arbitror potius vim fermentativam habere hunc ipsum liquorem, sive ipse in se fermentet, sive cum contentis cæteris liquoribus, speciatim nutritio fusco ad partes illas distributo, motum Turgescentiae, praesumum fermentationis, concipiat.

II. Dum acre ibid contentum aqua falsam undique a partibus membranis, v. gr. Quatè, Peritonæo, &c. concluditur, vis fieri poterit, quàm ad eodem vellicentior & irritatior plura minus fibra illarum partium, quæ occasione illar heret, & quasi hinc afflicte oblique plura minus incipiunt, quo ipso oculis poros, & angustias quævis cæteros meatus contingit, adeo ut non tantum insensibilis transpiratio, & sensibilibus transudatio è magis impediatur, sed & renis hoc modo fibræ, & membranas renales, etiam ulterior urine excretio è magis sistatur. Ad spasmoticam hac affectionem declarandum faciunt, quæ habet HELMONTIUS pagin. 411. 412. 413. Alias sane non video, quare tam parum transpirat nec sudat hydropici, aut saltem guttaturum forma non copiosius aliquid transmittant per Cutim, nisi hæc prius la pulsula crata fuerit, aut alio modo fibræ lales transtus Aquæ potest. Adhuc angustia illa praedictum in hydropicis, & impedimenta illa respiratoria, quæ non solum circa pectus, sed ferè maximam partem circa hypocondria sentiunt, quasi Cingulo ibidem confringuntur, non à soli videntur esse Repletione Abdominis, ex eo, quod gravidæ Femellæ gestantes, atut Venæ maxime tumido, de simili non coquantur pathemæ, quia omnia, & cæteri cedentia in eadem ibidem deprehenduntur, cum hydropici tendi circa illa loca, & confringi ita soleant, ut ne digitus quidem infra cingula nothas possit adigi.

His ita præmissis, ad causam proximam Collectionis nempe, & extravasationis illarum humorum est dilabendum, in alicute nempe, quæ ad Anasarcam proximè accedit, sive in Anasarca sic dicta particulari WILLISII, in qua podes, Scrotum, & abdomen ad pectus usque, & Diaphragma intumescunt, & ab Aetia propriè sic dicta, hinc particulari abdominis hydropice, multum differt (quæ differentia in historiis, & observationum monumentis probè attendatur.) Praesuppono autem hic: Humorem istum esse maximam partem ferum; & quidem vel naturale, tam alimentitium quam excrementitium; vel præternaturale. Naturale enim pro contentum ferè nullum ratione aunc Chylorum, nunc putissimum, nunc cruentum, nunc alio modo affectum, v. gr. in ichtero, & scorbuto, deprehenditur. (X.)

Serum laudabile omnium frequentissime peccat, & post hoc præternaturale; quatenus utrumque (in alicute particulari) vel per disrupta Vasa lymphatica, & laesa excretoria, vel sanguinis per venas, ac fieri per Vasa lymphatica motu retrogrado impedito, per substantiam partium idem excludat.

Vasorum lymphaticarum ad Lasterum Reptura peccat, lationes externas dependet vel à Lymphæ Acrimonia ero-

(V) Laudatur Du-Verney immensa infinita Experimenta, per variorum Corporum cum Aquis Hydropicis Peractis, etiam, commixtionem. Non in omnibus autem eadem mutationes observata sunt: signum scilicet Aquas in Hydropicorum Ventre collatas, non semper, nec in omnibus eisdem naturæ esse, sed pro corporum, & causarum diversitate diversas.

(X) Notatu digna est Observatio Dom. Vernage, Medici Parisiensis, qui refert à Ventre Puella hydropica, facta puellione, non Aquam, sed materiam lacteam effluisse: hoc ad eam rem revocata sollicitudinem quendam præfer-

erodunt: aut Gravidie dissidentem ac rumpunt, vel ab illis quo Vasis distis circumstant aut adiacent, verb. gr. Glandularum Mesenterii Intestumque praeternaturalem, aquae hanc Ulceribus: (vid. TULPIUS lib. 2. Observ. 72.) & in Femina quadam ante triennium in Femore per puncturam vulnerato supposito, quo consolidato Ulcere, totius pedis Tumorem Oedematosum patiebatur, scissam à Cicatrice, notabile aliquod Vas Lymphaticum in compimento, ut à flagante Lympha illud disruptum fuerit: quo etiam spectat casus in Abdomen, aut ex Motu Corporis nimio Alities, qualis PLATERUS Praet. Tem. 3. pag. 342. & BARTHOLINUS Cas. 2. Observ. 74. meminerunt.

Seri autem Translocationem per partium substantiam naturam facit.

1. Ejus Abundantia; hinc ex suppressa urina, potu copiosiore Hydropem fieri, & potus abstinentia sanari, testatur experientia.
2. Seri Fluiditas & Aequalitas nimia, qualem Mercurii vivi Inquiescentia produci posse BONETUS Anat. Praet. lib. 3. Sect. 10. cap. 18. perhibet.
3. Ejus Mavis retrogradas impeditur: vid. LOWERUS de Cord. pag. 118.

Huc spectat Viscerum substantia lacerata & erosa.

Generatur haec in Corpore ad Hydropem disposito ob deficientem insensibilem Transpirationem, & immixtam Urinae excretionem. Generatur autem primitus) adeoque hujus Hydropis causa proxima erit) ex insigni & notabili vitio in Hæmatoidi contingente, ac plus minus deficientie, ratione cujus assumpta in Chylum mutata cum puncto Vehiculo seroso assimilari debet maximam partem nequeunt, quia hic ipse suffocatur in sanguine, continuato hujus circulo, alteratur magis magisque attenuatus & re-

solutus, tandem certis in locis decumbit, & extra Vasa cum Vehiculo seroso subsistens Tumorem ralem interquod pluribus explicatum vides in WILLISII Pharm. Rat. Part. 2. Sect. 2. cap. 3. Hinc hæmorrhagias nimias Hydropem frequentius excipit. Errorem quoque externum, v. g. infectum partium Refrigerium, huc Morbo occasione præbere, docet SCHENCKIUS Observ. lib. 1. p. 434. Seri autem & sanguinis crasis vitiatæ ab errore externo, primam Digestionem ladentem, quod docet, præter appetitus prostrationem præcedentem, Frigidæ potus immode-rata, præcipuis autem ex Felte exanthemato Corpore assumptis, item spiritus Vini calidi, totum Ventriculi destruent. Unde Remota Causa omnes erant eadem, quo Cachexia, cum, ut supra monuit, hæc frequentissime in universalis, nunc particularem, cum affectu sanam, dederent. Unde dum per se incipit hinc Hydrops, sero vitium lætæ in primis vis Digestionis sublele solet. Viam autem alios Morbos insequitur, pro horum læsione, corporis ejusque partium soliditatem, & sanguinis alterationem multiplici, etiam multipliciter ad Hydropem disponunt: de quibus remanentibus Causis superius pluribus actum. Unde pro causis hanc remotaus diversitate subinde tanta diversitas humorum in toto Corpore Hydropicorum nata fuit.

Extravasata verò idem Serum multiforme, non ex vitio Vasorum Lactearum, & Lymphaticorum, nisi saltem per accidenti & secundariis; sed revera ex Vasis Arterialis in Hydropoe Universalis ocri, omnino probabilissimum est. Nempe pro hujus notitia ipsis sic supponendo erunt:

1. Sanguinis texturam & mixtionem in Hydropicis ita esse alteratam, ut minus exacte cum coacervata uberius Collavie serola plus minus chylosa misci-

ferbat: Lactis valde similis erat, sed levior, & minimè ab acidis, sed à Sale Tartari concretescat. A quibusdam pro Chilo extravasate habita: maxime quoniam Puella in hoc malum ex ingenuis ponderis elatione incurrebat, qua distensa furtiva potuit Vas quoddam lacerum. Verum Chylus Sale Tartari nua coagulatur: nec fas est eridere, maximum liquoris illius copiam, qua singulis quindenis diebus infinita operatione educatur, Chylum esse potuisse; superabat enim ille ferè ipsum cibum assessorum quantitatem. Alii crediderunt liquorem hunc lactem potius fuisse familiarem Hydropicis Aquam, sed potius Chylus extravasatus infestum: ita ut illud singulare in hoc Hydropis specie fuerit, quod complicata simul fuerit Vasa alienius lactis ruptura. Quoniam autem Vasa hæc lactea Chylus simul & Lympha communia sunt, ut cum Chylus non transjicitur, Lympha ejus loco per eadem fluit; hinc facile fieri potest, ut Vasis lactis disrupsi maxima Lympha copiam Chyli permixta in Ventris cavitate infuset, ac Hydropis lacteus constituat. Liquor autem hic in Ventris cavitate retentus facit negotia poterit salubris aringis, quibus Viscera sanent, imbihi, & saltem hinc saporem præferre, aliisque qualitates adipisci, quæ in liquore ex hydropico Puella Ventre talis deprehendit Dom. Verrage.

Dom. item Mery modum excogitavit, quo aliquot Vasorum lactearum rupturæ, liquor ejus nature, quem descripsimus, poterat in Ventrem ejusdem; si scilicet percellatur per membranas Ventriculi & Intestinum: ex tantum potius, quod aliquid peculiariter, & præter naturam fuerit vel in Liquore, vel in textura Membranarum. Liquor ex eo hanc impossibile esse potius, quod expertus pluries fuit, Aquam, quo Ventriculum vel Intestina repleverat, per illorum poros effluxisse: quod Aer non accidit, corpori adhuc tenuiori quàm ipsa Aqua. Sic lacteus Chylus Uteri Gravidarum & Puerperarum substantiam facit trahit. Præterquam quod Cathartica & Diuretica Medicamenta Aquas in Ventre Hydropicorum crementum sapienter cogit, ut per alvum vel urina educatur: quod fieri non potest, nisi illis per Intestinum, vel aliorum viscerum Membras percellatis.

Addit autem Dom. Hombergius ex ratione Aquam faciliorem sibi transire parare per Membranarum poros, quàm ipse tenuior Aer, quod Aqua diluit materiam glutinosam, qua Membranarum filamenta sibi ipsi adhaere facit, atque filamenta eadem lenius & flexibilia reddit, ut scilicet poros amplius redditis, ipsa premittent inveniat viam: quod quidem ab Aere minimè expellendum. Id confirmat experimentum: si Vesica Aere repleatur, Aer ex illa non exiit: verum si addito lapilli pondere Vesica eadem in Aquam mergatur, tunc Aer per poros Vesicæ prodibit, Aqua nempe illi resistens.

Litem hanc Cadaveris Puella post annum demortua defuncta animæ sunt potuisse: sed id nimis præcipue saltem: saltem Regie Scientiarum Academiæ nil certi de hac dissensione innotuit: fama nunciam delatam, Vas aliquod lacteam disruptum invenit.

Sed mirum digna est Observatio Hydropis item Lactis in aliæ Puella septenni, ex casu in Caput salis: casus Ætiologiam se imaginatur illi Dom. Lierre. Ex foris Capitis illa tunica Cerebri parvis defideratur, ut per arterias redditis tubulis sanguis agri transire Sereni illi deberet: quod sui falsidum membranas vellicat, accendit quoque Sanguinem easdem distendit, molles Capitis dolores excitat. Præterea ex turbata Cerebri textura Spiritus animales basi sicut per corporis functionibus generantur: hinc torpor universalis, & digestionem omnium labor. Chylus præinde crassior redditur, quem hanc facile scilla Vasorum lactearum subire potest, potius tali Inguinalis cuspem sequenti est, ac proinde cum facibus ex alio disturbata Carica passum occasionem dedit. Quare nil mirum si Corpus universum abito alimentum erantem extrema macie correptum fuerit. Consuetudo igitur nimis Mesenterii pinguedine, qua ejusdem membranas interjacet, ac Vasa lactea involvit, sensim crassus Chylus in vasis his remanens, illa easque intumescente fecit, ut tandem disrupsi fuerit, Chylusque primus in membranis duplicatarum, mox, his quoque divulsis & laceratis, in Ventris cavitate effusus fuerit, ac Lacteus Hydrops formatus. Post hæc Carica passu defusa, faciliorem transiit inveniunt Chylus per lactea Vasa in Ventrem haurire, quoniam ut cogitur in Intestini remanere. Chylus hic Paracelsi celebrata maxima quantitate eductus fuit. Mesenterii Glandulas profusa lapidescentes ex Chylis in gyssum materiam coacervantes, Duodenum Thoracicum seri observatum ob Chylis per ipsum dragatum infusum, ostendit Autem cadaveris quindenis diebus post Paracelsi infusum.

miscibilis sit, adeoque serositates istas facilius separari, & hinc inde extra se quasi diffundere permittit; cum aliis serum & sanguine facilius separabile existat, ut in sanguine Vena secunda emissio manifestum evadit.

2. *Convenit Corporis Humori, in specie sanguine & serum, naturaliter non moveri proprio impetu, quia aliis omnis Motus fieret ad inferiora, nullus verb ad superiora; sed more mechanico à Cordis impetu per Vasa pelli, adeoque se purè passivè habere, ac superius & inferius acquirere; simul verb ac Via illa vitalis seu animalis movens in Corde plus minus debilitatur, proprio impetu gravitatis ac ponderis eisdem ferri, adeoque deorsum ruere.*

3. *Firmo stare talo Experimenta ipsa LOWERY de Cordis cap. 2. pag. 123. 124. 125. seq., quod ligata Venæ Cavae propagine Capis infra Coe, brevi post tanquam Aficte artificiali laborare, ut animalis abdomen aqua repletur; & ligatis jugularibus Tumor aquosus Hydrocephali supervenit: ntrumque saltem ex impedito sanguinis ex Arteria in Venas circulo; sicut & eadem allegat WILLISTON in Pharm. Rat. Volum. 2. pag. 199.*

Adeoque ex impedito plus minus sanguinis Arterio in Venas transitu separationem & extravasationem ferri facillime contingere. Quia ratione etiam videtur oriri *Hydropes subiacere* à causa externa hinc progressio interno vitio, verb. gr. dum Hydroper Aficte artificiali laborare, ut animalis abdomen aqua repletur, & ligatis jugularibus Tumor aquosus Hydrocephali supervenit: ntrumque saltem ex impedito sanguinis ex Arteria in Venas circulo; sicut & eadem allegat WILLISTON in Pharm. Rat. Volum. 2. pag. 199.

Addeoque ex impedito plus minus sanguinis Arterio in Venas transitu separationem & extravasationem ferri facillime contingere. Quia ratione etiam videtur oriri *Hydropes subiacere* à causa externa hinc progressio interno vitio, verb. gr. dum Hydroper Aficte artificiali laborare, ut animalis abdomen aqua repletur, & ligatis jugularibus Tumor aquosus Hydrocephali supervenit: ntrumque saltem ex impedito sanguinis ex Arteria in Venas circulo; sicut & eadem allegat WILLISTON in Pharm. Rat. Volum. 2. pag. 199.

Hinc ratio reddi potest, unde fiat, quid Morbis Chronicis Agri convalescentes Tumores pedum patiuntur, qui tamen iterum evanescent? Item, quare infecti tumores pedum incurant? Item quare ratione subinde post Dyspnoeam & Asthma superveniunt Tumores Pedum Edematosi? qui Heuaticis & Phlebotomicis infestis, eisdem ad Mortem deducunt. Vivit hic Aurifaber, qui ex Quartana contumaci per an-

num malè tractata, Anasarca partium inferiorum tam incipiente Aficte laborat, ex qua ipsa suo quoque tempore morietur: Hic quoties quavis ex causa, in specie ita quida vel Erythelate, vel Pleuritide mota, quod sapidius evenit, corripitur, (idque semper cum Motu febrili, gravissimo Rigore, intensissimo aliquot dierum Aestu, & hinc sudore uberrimo superveniente accidit,) toties mox primo huius Affectus die omnis Tumor hydropticus evanescit, pedibus flaccidis & extenuatis apparentibus; dum verb febrilis impetus post aliquot dies remittit, pedetentim etiam decumbentibus adhuc Crurum & feret Tumor redit. Nempe febrili sub impetu cum alteratione sanguinis in specie rapidior ejus circulus & validior impulsus, quo retruduntur in Vasa evacuatæ serositates, considerandus venit.

Idem extravasandi modus obtinet in *Anasarca Univerfali*, hac saltem cum differentia, quod in Anasarca Virium Contents Corporis moventium robur adhuc validum sit, quod æquatur sursum deorsum eadem qualiterque constituta movet; in *Anasarca* autem *Particulari* partium inferiorum cum Aficte complicata debilius, adeoque regenda iisdem Corporis Contentis minus sufficiens, hæc ex parte fit motu spontaneo ferri permittit, quæ ob id deorsum magis tuat, cum aliis unde æqualiter distribuita forent. Sed dum sub Translocatione illa ex capillaribus Arteriis in Venas, ac pororum & mesurum angustiam, per quos trajecio fieri solet, difficilius suo modo, adeoque tardior fit sanguinis motus; hinc Serum facile à reliquis sanguinis Massa recedere, partium vicinarum poros subire, & ita undique plus minus fluando, Anasarcam Universalem inferre potest. Foras & Chyle seu pituitoso isto ferri contento quædam Venarum capillares, ut & Vasa Lymphatica obstrui ut angustari plus minus poterunt: qua occasione & difficilius sanguinis circulus, & facilius copiosior ferri secessus fieri potest.

Summatim *Hydrops fit ex Cachexia*, quando hæc ex defectu Chylificæ, tamque vitio Fermenti Ventericuli, quam periculis à Bile tendæ, iuducitur; unde alterius Tumoris ingravescens Vires debiliunt, quibus debilitatis sunt partes regendis humoribus: Adeoque hi, quo remotione circulus à Corde est, eo procliviores pondere suis inferiora petunt.

Atque hæc quoad *Theoriam hydropis ordinariam* sufficiunt. Nam observatur quoque præterea *Hydrops* magis *extravasariorum*, à *Colligatione nati*, dem non tam conservari, quam ex Contents aliis Humoribus per Coagulationem generari ferum hydropticum observatur. Docet Experientia in Febris Acuti & Heuatici, ut aliis Excretionibus Colligativæ fuit familiars, ita etiam his subied Aqua Abdomen intumescere, ita et præter Chylum & Sanguinem ipsa etiam pinguedo colligata in serum abire videtur, ut hoc ipsum in Diabeticis quoque fieri solet. Hinc in Hydrope subinde observatur, A quam ferri evacuatam Arte per Paracentesim, hodie equaliter demum Abdomen replevisse, de quo vid. H. E. L. MONTIUS Traill. *Quæstiones* §. 14. Sed in hoc Hydrope Colligationis primaria ratio est habenda, opposito ejus affectus cum productum saltem est illa hydropica intumescencia. (Y)

DIAGNOSIS.

Ratione *Diagnos* in paucis saltem partibus hydrops ad eò manifestus est, ut in tempore appareat: Delicibiliter, equidem vulgò Hydrops per Tumorem sed ille

1. Interdum tales partes occupat, quæ non facillè distendi possunt, v. g. Cranium, Thoracem, & quæ, utut distendantur, Tumorem tamen nobis palpare, aut oculis cernere non concedunt, verb. gr. Pulmones, Uterus, &c. Nec

3. Pat-

(Y) Inter rariore Hydropis species consideranda illa est, in qua Aqua non tam in Peritonæi cavitate & Viscerum intervalla continetur, quam Cylis quædam seu Viscera membranis clauditur: tisque raris refert in Mulieribus Observaciones Dom. du-Verney Jun. Huius generis Hydropis Cylis dici potest, atque his signis illam deprehendi possi mox cit. A. Si scilicet Aqua congesta sit in Ventre nulla per biennium perseveraverit aliqva notabili agri incommoda. Si Morbus initium habuit facili & universi corporis color parum vel nihil à statu naturali degeneraverit, nec pedes & crura, nisi in ultimis Morbi temporibus intumuerint. Si Venter tamen semper retineat figuram, in quoque ferri corpus collectur. Si denique infusa Paracentesi, Aquæ omni ducta, Venter non omnino detumescat, sed aliquod circumscripta mole in illo innata videatur. His indicis Aquam multam ferventem nequaquam Viscerum intervalla occupare, sed in Viscæ peculiari contineri cernituris deprehendimus.

2. Partes sensibiles magis obvias & extensas, Abdomen v. g. Hydrops non semper attollit, nisi ingravescens deinceps Male. Tumor quidam est adest cum aliis signis, praecipuum Hydropis augurium suadet: aliens vero non statim eam negat. Nihilominus Hydrops in genere diagnosticatur, si in subscitis, in quibus nulla de Renum aut Vesicae vitia est suspicio, Urina paucis admodum, i. e. potius minus Affinis non proportionata, simulque saturata cinis reddatur, ideo quod parum admodum feri ad Organa haec ablegatur.

3. Si Sanguinis Excretiones naturales diutius suppimentur;

4. Si Haemorrhagiae praeternaturales moderatè contingant; Ac

5. Tumor alicuius Visceris observetur: vid. PISO de Morbis sereis *lib. 4. cap. 3.*

Sed Praesentem magis manifestant.

1. Tumor pedum Edematosis, ubi Morbus aut difficiat, aut diuturnior, vel error in Dieta praesentis, licet modò evanescat: cuius rationem vid. in SYLVIO *Tract. de Hydropse §. 31.*

2. Si Color Faciei haecenus vividus absque causa evidente in pallidum & luridum mutetur.

3. Si Dyspnoea Aegrum simul, aut sine aliorum Morborum signis, utae sine Tumore, adhuc angat: quae omnia à Lymphae visciditate, ejusque circulatione turbata oriuntur: &c.

4. Si Sitis Intensè superveniat, à feri extravasatione praeternaturali ortum ducens.

PROGNOSIS.

Prognosis nostri Hydropis egregie tradit HIPPOCRATES *lib. 2. Praedictum*, quem locum CELSIUS *lib. 3. cap. 5. ita vertit*: *aque inter extem minimè terribilis est, quae ante antecedente morbo capis: dein qua longa morbo supervenit. Uniusque si firma viscerum fuerit, si spiritus facili, si nullus dolor, si sine calore corpus est, si aliorumque in extremis partibus macrum est, si venter molli, si nullusque, nulla sitis, si lingua non per firmam quidem ardeat, si ubi capitis est, si venter medicamentis movetur, si per se succedit mollior & figurata, si non extenuatur, si arida ex vi potationis, & non potius aliquibus medicamentis movetur, corpus sine lassitudine est, & morbum facili solvitur; si videri in qua haec omnia sunt, in ea tunc status est: in qua plura ex his sunt, in bona spe est.*

In specie tota Prognosis ratio consistit scilicet in accurata consideratione Causae Remota & constitutione Viscerum Abdominis, horumque collatione, imprimis Renum: ubi enim est oberior Urtio fluxus, ibi spes Curationis superest.

Omnia Hydrops periculosus facis est, ejus contumacia Naturae vires, omnemque Artis industria cludere videtur, quam tamen Curationis difficultatem moderatè atque invidit.

1. Tempus Duratioris, quatenus hoc longius non solum Causae perstinet. Vixitumque defectum, sed Viscerum quoque indurationes atque coarctatas, quarum Causa non raro Hydrops existit, testatur: cum minus inveteratis haec conditiones probabiliter detrectet, adeoque plus spei concedat.

2. Causae diversae vi, utpote quae, quò magis mobilis atque sanabilis, eo plus sperare, quò potentior & firmior, desperare jubet. Hinc qui à solidam Partium Conformatione laesa, v. g. Obstructione, Induratione seu Scirrhus Viscerum ejusdem insignioris, aut Hepatis, aut Lienis, &c. diffculter admodum ac ferè nunquam curatur, aut curatur licet, facili renascitur: qui Recidivam ordinis lethalis est: quod obsecratur in Paracentesi iudicio influenda: eorum minus periculosus est, qui à Fluidorum tantum dispositione praeternaturali, ver. gr. ferè copia, aut crassitie, deperdet. Nihilominus, qui à Crasi sanguinis noxaliter depravata ac diffculter emendabili, ver. gr. scorbutica, dependet Hydrops, pro periculo maxime habendus est, qui à Vasis Lymphaticis majoribus aut pleribus ruptis evenit, diffcultior videtur Curationis, cum Vasa haec lacerata non adeò facili coalescere queant.

3. Qui à Transfusione seu Diapedesi aucta, modò huius Causa solubilis sit, v. g. ob Menfes suppreffas, diffcultè curatur.

Qui supervenit Morbis Chronicis & Aetate gravescens, saevius curatur: qui autem Junioribus, Febrilibus

Acutis laborantibus, obvenit, non adeò est periculosus, nec curata diffcultis, sed per reliquis facilius curari potest.

Aliis ea Febrè, praecipuis Acuta, mali omeis est: vid. HIPPOCRATES *Prognosis. Text. 2. §. 1.*, quod vel singularem sanguinis Dyscrasiam, vel Viscerum labem, vel utrumque denotat. Quibus accedit, quòd Vires gravi ejusmodi Morbo à priore straxit impares valde sunt, quarum insensu quomolibet alium Morbum excipiens Hydrops utplurimum lethalis est: vid. HIPPOCRATES *lib. 4. de Morbis Text. 34. §. 7.* Quòd si vero Febris à potu frigido affatim haustu superveniat, interdum solvitur. Hydropem magis minime periculosum reddunt symptomata conjuncta supervenientia, horumque conditiones. Quippe HIPPOCRATES *lib. 6. Aphorism. 14. de Judicat. Text. 11. §. 20. & 25. Constat. Praenot. lib. 3. §. 25. 28. & 326.* Hydrops equidem solutionem contingit ait, si Aqua ad Ventrem confluerit, seu per Alvim evacuetur: in principio verò, citra Cruditatem tamen, juxta *Constat. Praenot. 585.* allegata, hoc fieri debere asserit, fluxus Alvi progressu Morbi Hydropicis contingentes maxime lethales observantur: ita quidem, ut juxta eundem HIPPOCRATEM *lib. 4. de Morbis Text. 34. §. 20.* sentientes & loquentes illi moriantur.

Hydrops ex perverso Purgantium abusu, admodum periculosus est.

Urina paucis, rubicunda & crassa, malum admodum signum est: vid. HIPPOCRATES *Constat. lib. 3. §. 284. & WILLISIIUS Pharm. Ration. lib. 1. cap. 3.* Urina enim, quò minus redditur, eo deterior est Hydrops: ut proinde monet CELSIUS, tunc asilugere spem ejus, quando plus per Urinam exoneretur, quam potu fuerit assumptum.

Hydropis Taxis vexant, malum & desperatum signum est, juxta HIPPOCRATEM *lib. 6. Aphorism. 35. & lib. 7. Aphorism. 47. & M. A. N. C. annot. 4. & 5. Observat. 142. pagin. 163.* nisi scilicet haec à Catarrho, sed ab Actinomia Maltis sanguineae, quam haec ex defectu feri contrahere, superius dictum, aut à feri copia contingat.

Hydrops cum Talem Colligantia conjunctus, cum copiosa Materie viscidit rejectione per Alperam Arteriam, non semper habet comitem Phthisin, uti & hoc aliquando oblietaturum.

Abfcessus ac Ulcera non facili in Hydropis sanant, excepti propter supervenientem sphacelum lethalis evident, juxta HIPPOCRATES *lib. 6. Aphor. 8. & lib. 7. Epidem. Text. 13. §. 7. & 8.* Item Macula rubra ac livida in cruribus erumpentes Gangraenam minantur, Mortemque praeforibus esse innuntiat.

Ulceris, quando in Hydropse, ex Cachexia aliisque Morbis diuturnis similibus orio, apparent Duplicatione nigra, quae non sunt à Medicamentis Martialibus assumptis, lethale & desperatum malum est.

Hydropis Convulsionis periculose sunt, annotat eodem HIPPOCRATE *lib. 3. Constat. Praenot. 267.*

Tandem Residuum Hydropicis interdum lethalis à HIPPOCRATE *lib. 3. Constat. Praenot. 282.* pronuntiatur: vid. SCHENCKIUS *Observ. pag. 436. & SENERTIUS Pr. lib. 3. pag. 753.*

CURA.

Quoad Caram: in hac

1. Numerum Colluvies seu Aque, nunc simplicia, nunc cum Chylis crudis, seu Pituita commissa, remanenda.

2. Remanendum scilicet fistulanda.

Hoc principale, illud minus principale. Quoniam verò collecta Colluvies impedit potuerem intentionem, propter quantum possibile & quam citissime removenda, metuen dum enim, ne hujus retentione Viscera condantur, indurentur, aut quocunque modo lacerantur, adeoque horum corruptiones Hydropem non tam pariat, quam sequantur. Poterit hoc fieri duplici ratione, imò combinari utraque, scilicet per Potus Absumptionem, quam Evacuationem.

Potus abstinentia, quantum Hydropem moderate curat, testatur DODONAEUS *Observat. pagin. 116. & 117. PANAROLLUS Praenot. 4. Observat. 38. HILDANUS Constat. 4. Observat. 41. HOLLERIUS de Morbis internis cap. 39. RIVERRIUS Praenot. lib. 1. cap. 6. in Observationibus commun. pagin. 323. & WILLISIIUS Pharm. Ration.*

vis. Pars. 2. Tell. 2. cap. 5. pag. 297. (Z) Quibus minimè reingaritur, quod SCHENCKIUS Observat. pag. 437. PANAROLLUS Prae. 2. Observat. 22. & DODONÆUS l. 2. docuerunt, quodam nimis Pura ab Hydrope liberatis fuisse. Per accideri quidem & non sine Vite periculo hoc scilicet, quatenus per rupturam Umbilici Diarrhæam, & hæmorrhoidum fluxum, ab uberiori Aquæ haustu excitatur, præter omnem expectationem causâ hydropi conjunctâ eliminata fuit.

Sed manifestius hoc præstant Evacuaciones, siue pharmacia siue chymica adhibendæ: Prioris generis sunt evacuatio sensibilibus per Alveum, & hæc per Urinam, vel, quod rarius est, insensibilibus per sudorem. Unde enim via præfata est, nisi in Anasarca hydrope autem Alveo plus nocet quam prodest, quia scilicet intendit, ut Vires exhauriat. Ergo opera datur, ut primario per Alveum, hinc per Urinam sit Evacuatio.

Posterior Indicatio obducitur in genere, Mollis sanguineæ crassi, & inde vitiatum Hæmatosis emendando, & resistendo, Stomachum roborando, Digestionem primam corrigendo & promovendo; aliis enim radicibus curare hydropticum impossibile est. Imò quantum Bilis currenda hoc in casu habeat in recessu, vel hoc solum testatur, quod solo Abinthio hydrops quandoque fuerit curatus. In specie pro Antecedentium casuum varietate, quam secutus est hydrops, & relictis nixa, & aliquis ratio & varietas subside observanda, ut & hisipis maturæ occurratur, nisi enim Fomes eliminetur, hydrops non poterit curari. In hoc proinde potius consideretur: an hydrops illerum, an morbus chronicus secutus sit? Si hoc, aut ea abusu fortiorum medicamentorum purgantium obiectus sit hydrops, ut & his ipis maturæ occurratur, optima erunt Martialis adhibita. Adeoque omnia ea, quæ supra de Cachexia monita fuerunt, hic repetenda.

Pro his scopis rite obtinendis Casus sequentes in curando hydropem sunt observanda.

I. Purgantia, quæ Aquam evacuant, in hoc hydrope quicquid bene conveniant, cum Experientia confer, eadem Urinam seu copiosam Aquam ex Abdominis cavo eliminant. Interim tamen notandum, quod ut Purgatio crebra in omnibus Morbis non est necessaria, ita & hic est admodum nociva, accuratioribus id testantibus Practicis. Non dum Purgantia evacuant ferocitates; simul utiles succos plus minus colligunt, Vires ac Viscera debilitant, ac ita plus nocent quam prosunt, quatenus Serum Sanguinis ut causa Mali Anecdens per illa eaugitatur aqua fuscum, in Loca affecta, unde non scilicet remaneat est, aberius adigitur, quæque causa continens evadit, hancque agget vid. SYLVIVS de Hydr. §. 154. RIVIERUS Prae. l. 2. cap. 6. POTERIUS Centur. 3. Observ. 14. & WILLIUS l. 2. cap. 3. & 5. Hinc rectè dicit LINDANUS: Qui vult, vult curari hydroperem, rari debet purgare, dari tamen tuos debet ea, quæ arte & vehementer purgant sed rari, ut dicit; Intermedia vero, tempore appropriata & aperientibus, ac melle sanguinea vitia & cruditatibus prout se reliquorum humorum, corrigentibus & in naturalem crassam reducentibus, debet sufficere. Confer, hic ea, quæ habet BRUNO in notis ad Jessu's Indicia de sanguine à Vena fusa emissi pagin. 147. qui JESSENIUS fuit Medicus Bremensis. Observandum etiam, ut Purgantia exhibendum operationem suam rite adjuvant: quod si fias, bonum; sin minus; malum: dum colligando solum contenta Corporis, aut non evacuando, Malum augeat. In principio tamen, & si nimis debilis sit æger, ideoque non par sit validiori Purganti, Læsa saltem primas vias abstergeat, & per Epericam blandè evacuatiua conveniat, ut ita melius disponatur primæ viæ ad sublevaras fortiores purgationes. Ulterius commodissime indicantur Purgantibus Læsa deterfenda, epelente enim Læsa & ipsum Malum decretere, decretescente verò eadem etiam Malum decretere, Experientia testatur (A) unde quo tempore habemus adjuvantem Naturam, quando scilicet Læsa per aliquot dies decretere incipit, purgatio instituta, ideoque imprimis ante Novilunium, & quædam eo magis, quando Læsa exsistit, ut vocant, in Signo Aqueo. Verùm hæc purgatio tunc tantummodo

convenit, quando in cavo Abdominis finit Aquæ; si enim hæc ipsa aut in Omæti bursa conclusa, aut in peritonæi duplicatura, aut in Veficulis Mesentericis inclusa fuerit, omnis omnino purgatio foret esse frustranea.

II. Observetur, Pomeria in hydrope raris in usum vocari, nisi forte in principio, dum adhuc cæcæta confirmata, in hydrope autem confirmato rarius conducitur, licet certum sit, quod interdum fructuosius observatur fuerit eorundem usus Membris enim CULCUS in suis scriptis METRODORI Philopoli, qui fuit discipulus EPICURI, qui hydropticum cum plurimum haberet, sed minus vomeretur, succellere sic convalescebat, cuius exemplo, inquit CELSUS, Medici Vomitus probant, & laudant in iis, qui facile, & sine molestia vomunt. Facit hæc, quod relict FORESTUS Observat. 22. lib. 19. in scilicet, ubi quidam hydropticus pro desperato habitu ascendit Naviculam, & petit Mare, hinc provocat largi Vomitu navigationibus primum confecto, & post Vomitus Exercitio creberrimo itens, sic fuit curatus. Interdum ergo, ubi adhuc vomendi inclinatio, ut etiam nbi gravior Dyspnæa urget ægrum, commodè infusa potest Vomitus: hæc enim subito liberat respirare solent. Sed necesse est, ut larga dos propinquet Vomitoria, cum in hydropticis, præsertim confirmatis, Vomitoria Vomitus procreare soleant exhibita Remedia. Sic enim Mercurii vis gr. ii. vel iii., quæ alias abundè sufficit pro Vomitorio, hydropticum non movebunt, idque aut Ventriculi Atoniam, aut ob Remediis ad contentis refoctibus acido-salis alterationem, & quasi Fixationem.

III. Observetur, Diuræta in hydropis cura omnium esse optima. Hæc nempe revera sunt hydragoga seu Aquas evacuantia, dum Naturæ sit mos & conseruato per vias Urinarias superfluum serum naturaliter expurgare: ut præmissis necessariis Universalibus, his imprimis insistendum. Dico præmissis Universalibus: Hoc enim omnes præcipiunt prædicti, ut Diurætica non prius exhibeantur, quam Universalia Attenuantia, Aperientia & Laxantia faciant præmissa, alias non tunc ad Diurætica acceditur; Intempestivo enim eorundem abusu impeditur Urinæ fluxus poris, quæ ut hic promoveatur & adjuvetur, quippe comia specifica Anti-hydroptica vi dactrica insignia sunt. Aliis multis satisfaciunt scopis, præsertim quæ sunt ex numero volatilibus, ver, gr. quæ ut Urina, Lumbriæ, Rufusculi, &c. perunt, quia salina virtute incidunt, peneant, & vias absterunt, Viscera aperient, & scierhos induratos resolvunt: &c.

IV. Observetur, Opium ac simile Narcotica, quæ talia ac per se, hydropticis exhibita ut plurimum esse necrotica & lethalia: uti eorum notam per Experientiam confirmat MELLENBROGGIUS de Arthritis vaga cap. 14. pag. 254 & 255. Id quod verum arbitror, cum Opium in Morbis chronicis, ac propemodum ad extrema deductis, ut fit in hydrope, quando Vigiliæ accedunt, minus prosint, quàm in Acutis, quin Vires ulterius debiliant, & Viscerum tonum ulterius labefactent, & læsent. Imò post chronicos aut Acutos Morbos, dum languent adhuc ægri, & quædam adhuc symptomata supersint, si illis Opio succurrere velimus, periculum est, ne hydropticis exinde fiant, quod heri observatum. Saltem per accedens vi fua, ut vocant, anodyna spirituum impetum nonnihil refocinando, & Fibrarum Nervorumque Reculum irritatum spasmus demulcendo, sicque per Meatus aptiores redditos indorum & Urinarum fluxum promovendo, prodesse observata fuerunt. Confer. BARTHOLINUS cent. 3. Epistol. 46. & 49. pag. 192. & 201., ubi referuntur hydropes: in quibus potius uisum Laudari opiatu copiosæ Aquæ per Alveum & Urinas evacuatæ fuerint, idque scilicet cum successu. Sed hæc Exampla, ut eadem admiratur BARTHOLINUS scribens, & LANGELOTTUS respondens, ita ea minus adhaerent imitando: quæ scdula cura & nonnisi summa circumspectio, administranda vultum, cum effectus hic fit rarissimus & accidentarius: Vid. BIFRILINUS cent. 2. aduers. 5. pag. 16. Quo pertinet mirabilis Observatio WILLIUSI Pharm. Rational. P. 1. pag. 302.

Ausilia igitur, quæ priori scopo conveniunt, sunt Evacuaciones.

(Z) Notandum tamen quandoque nimis puris abstinendum hydropticis maxime esse, cum scilicet quod tunc facit non tam est fersa & maxime fluens Aqua, quam potius crassa Plethora, vel itraque Pituita: hoc enim casu omni de negare Pura, materia hæc majorem lenacitatem acquirit, ad quæcumque evacuationem impar redditur, cum maxime ægri incommoda.

(A) Nec Experientia id testatur, nec Ratio fundet: ut manifestum est iis, quæ Astrategici præiudicis nunci jam sunt.

vel per *Fermentationem*. Infusum ergo Bryoniam cum sale Tartari paratum, vel Decoctum, ad evacuandas Aqueas commendati solet. Ad hanc Bryonia haec in Hydrops curando tanquam evacuans & alterans singulariter convenit: In specie in Hydrops Uteri quidem quid obliquo videtur. Dosis ʒi. in infuso, vel syrupo ad ʒʒ.

Calceatilis denique & ipsa, ubi crassiores & viscidiores sunt Aqueae, commodissime usurpatur. Alias *Spiritus Vitis aures Rulandi*, seu *Essentia Trochiscorum Albandi*, est ordinarius purgans hydropicorum: sic loco istius Trochisci ipsi Albandi decoquendi sunt in Vino, scilicet ad ʒi. bulliant in ʒi. Vini, & sic fit Decoctum utilissimum ad purgandos hydropicos, ubi non solum Aqua, sed & humor crassior, qui in Abdomine continetur. Espejumentum est RULANDI, qui desperatam hydropicam dum facta mortuo hoc modo curavit: nempe propinato hoc Decocto per superiora & inferiora Aqueae rejecte, & factus espulsum est.

Hic ex Regno Minerali imprimis adnumeratur Luna, & quae excellit Pulvis Lunares, nempe *Cryalli* ex Luna purissima cum spiritu Nitri vel aqua Forti parati, sapore amarissimi, sed mirabiliter Aqueas Hydropicorum evacuantes. Dico ex purissima Luna; 6 enim tantum, quod facile & sepe fit. Veneris fuerit permixtum, Vomitus movet. Accuratissimum huius preparandi rationem cum omnibus encheiribus optime describit BOYLE Tr. de utrisq. Philof. Exer. Anglicae conscripserit *Observ. 97. & WILLISTUS l. c. de Seli. 2. cap. 3.* Cryallorum vultum gr. i. vel ii. ad ʒi. cum mica panis in Pulvis redactam Aqueam copiosam, sive uli tamen Symptomate, evacuare solet; adeo ut his ipsa aliquot hydropici curati fuerint. Alias & Mercurialis decantata sunt in Aqua hydropica; unde imprimis Mercurius dulcis ex Simulo appropriato acutus convenit, imprimis in Hydrops Scorbuto. Huc pertinet Mercurius Vitis, quem sine Vomitu io hydrops operari plures testantur, & BULTON Medici. Mag. pag. 77. cum Oleo Salis circularum, tanquam specificum in hydrops purgans, commendat; unde Mercurius dulcis milius cum Mercurio Vitis perquam conveniens laxativum est. Huius Remedii & Mixturae proportionem docet HARTMANNUS in *Praxi Chymiatrica* pag. 25 *Edic. Cardhuani* in 4. Squidem sub bene facta ista miscella, salis Mercurii dulcis habent Mercurium Vitis, ut vim vomitoriam amittat, & evadat Remedium maximam partem per micturiam purgans; Nempe

ʒi. Mercurii dulcis. gr. xv.

Vitæ gr. xii.

Hæc trita invicem Catharticum dat non ignobile. Prescribitur tunc temporis imprimis cum Conserva Rosarum Perficorum sub forma Boli v. g.

ʒi. Conservæ Flor. Persicæ, vel Granul. ʒi.

Mercurii Vitis cum Mercurio dulci. mʒ. gr. xii. ad xv. (sic enim sunt præter propter grana li. vel iii. Mercurii Vitis correcti)

Extraculi. Elater. vel Trach. Albandi. gr. ii. vel iii.

Cum ʒi. q. Symplic. Flor. Persicæ, vel de Spina Cerv. f.

Bolis pro doli i.

Nam Mercurialis fixa & Chymiatricis, In specie ab HELMONTIO, multum commendatur: (dico Fixam.) Denique sequenda Inguam humorum Vini iniusta, fortiter etiam purgans. HARTMANNUS præcipit, ut impeatantur umbilico hydropicorum pro ista purgandi: Quod ad respondere Experimentis? nescio.

Cæterum his Purgantibus semper Interponenda sunt *hemachia* & *Magma Sanguinarum* refrigerantia, quæ vulgo vi appetendi prædicta dicuntur, & teri sunt omnia amara, acia, & quodammodo salina, quæ de Sanguinis Crasso costringunt, Ostrudiones & infarctus relaxant, & imprimis Urinam stimulant; inter quæ eminet *Albuthium*, quod quacumque ratione, vel io Cerevisia, vel io Decocto, vel lob. Extraculo seu Essentia usurpatum nobile est, nec usquam umittendum.

Diureticorum autem, Hydropi appropriatorum; quamvis loquens farrago apud Scriptores observetur, non sine ratione tamen a Prædictis haud levis momenti eorum alia præ aliis selegitur sic laudatur, ver. gr. Linaria, Petroleum. Daucus, Genista, Radix Rulici, Rardanz, Lignum Salsas, Balsamum de Copayhe, Terebinthina, Semen Sciscles, Dauci, Herba Chirezoli, Radix Petroselinii, Eryngii, Ononidis, Liquiritiæ, Graminis, Herba Pastetarie. Inter alia excellenti in specie post Albuthium ex Alaro, Helento, & Gentiana petra Remedia. Marubium, in specie, ubi ad iderum utus fit Hydrops, lauda-

tur à FORESTO lib. 29. *Observ. 20. in Schol.* Iderum enim radiciorum curat. Item Chelidonium majus equique Radia Specificum dicitur HELMONTIUM in Hydrops. Quicquid sit, credo, quod Chelidonium majus singulariter conveniat in Hydrops, sive Succina caprulis, sive Visum Insulium usurpetur. Hicce præ cæteris addatur *Radix Vinetresci*, quæ vel per sudorem, vel per Urinam operando, à multis tanquam specificum ad Hydrops Remedium laudatur, si sic ejusdem Decoctum cum Vino crebrius & sepius usurpetur; hoc enim ipsum, & per Urinam & per Sudores, eleganter curat Hydrops. Alii parat Essentiam vel Extraculum ejus, & hoc ipsum cum succellu propinat. Hydropicis: hinc est Destillatum Paracelsi commendatissimum ad Hydrops, cuius descriptio habetur in HARTMANNO cap. 207., line tamen Spiritus Vitrioli, ut vult HARTMANNUS, assilendum venit.

Compositio est sequens:

ʒi. Tartari rubri ʒi.

Rad. Mirandis. seu rhæticæ. ʒʒ.

Calceatilis. ʒi.iii.

Vin. ardens. q. l. pro incorporatione, seu mixtura.

Destillatur per Alembicum, & probe redificetur.

Hoc omoi die his vel ter dosi ʒʒ. ad ʒi. in Vehiculo quodam appropriato vel Vio Malvatico hauriatur. Pellet Urinam, tanque sordidam reddere facit. Continuantur est ejusdem usus per aliquot dies; nam primum nihil, succellive tamen egregie operatur, & cum certum remedium solet commendari, & credo, quod imprimis, ubi vitium est ex Mesenterii Glandulis stransis, conveniat Vinetrescium, cum in hoc singulari lateat vis contra stransas.

Huc pertinet & Radix Aseri veri, Caryophyllata, Coccinea, item Radix cinerum & similes, ac imprimis capitula Alliarum, quæ ob sal acre miranda in Cura hydropis cum cægestissimum Diureticum sit Alium. Præter eam exemplum BARTHOLINI *Cent. 2. Rss. 74.* Hydropici per Decoctum Allii io Lacte curati; Facit hoc, quod reperi FORESTUS lib. 29. *Obs. 37.* ubi refert hydrops, alia io vacuum adhiberi ea constantia comestione Allii, multum aequoat per Urinam reddendo, imperato fuisse curatum, sicut & Mulierem Hydropicam deplorata assumptione Succu viridis Allii expressi cum Jure Vervicis vel Galli, provocato largiore Urinæ suae restitutum observatum esse: Hinc optime lesula Diuretica ingreditur, Radia Allii io Vino insola, quæ optime convenit in Hydrops. Porro Cæteris Capapur & Tamarisii, item Cæteris citri aut Aurantiorum aliis convenienter adducitur. Exupariam admodum commendatur à LINDANO ad Coram hydropis: usurpatur semper tempore intermissionis à purgantibus: item Anserina, Flores Syani, & Flores calcitropis: quorum Tinctura solet laudari AGRICOLÆ ad Curam hydropis.

Hicce præ cæteris addenda sunt Juniperus, tam Lignum, quim specialiter ejusdem Baccæ aromaticæ, & omnia Juniperina, quæ multum conducunt contra Hydrops. Uode Baccæ conducunt io Vio, vel Rob Baccarum Juniperi, quod simul egregium Alterativum existit, Essentia & Spiritus Baccarum Juniperi; hinc Malvaticum Juniperinum ex Spiritu Baccarum & Rob Juniperi, mistum cum Tinctura Nephthica, io hydrops egregie profect: v. g.

ʒi. Malvæ Juniper. ʒi.

Tinctura Nephthæ, aut hujus loco Spiritus

Carm. de Trib. ʒi.

M. D. S.

Malvaticum Diureticum.

Pro ʒi. cochli. ʒ. vel ii. pro lobitu.

Sane Decoctum Ligni Juniperi longè magis appropriatum Sudorificum existimo, præsertim io Analara, quam Decoctum Ligni Guaiaci & Sassafras: Uode & Decoctum Baccarum Juniperi in Vio genitolo Experimentum est RULANDI, quod ipso per sudorem & Urinam hydropem curavit: Conf. M. A. N. C. Ann. 9. *Obs. 18.*, ubi M. Absinthii cum M. Baccarum Juniperi in ʒi. Cerevisiæ vel Vini decocta, addito Rha-Pontici poazillo, mirè commendat VOLCAMERUS, & ut probatissimum catolici Remedium, ʒi. Viscera adhuc salva sicut. Uterius ad Diuretica pertinet herba Kali dila, quæ quidem olim saltem in Ægypto procrevit, nunc vero apud oos reperitur, saporis admodum salis iostar Maris, cum

24. *Bulfin.*

...autem in umbra, post abscinde Capita, & exime
testicula, quod reliquum, redige in Pulverem subtili-
ssimum.

De hoc vel solo, vel cum Pulvere Hepatis proprii misto, datur gr. x. ad xv. usque ad 3℥; mirabiliter Aquas Hydrioporum educit per Urinam, idque cum summo levamento. Possit dari Pulvis hic, vel a. vicibus, donec proveniat Urinae fluxus, ita tamen, ut 3. vel 4. dies post assumptiones semper interponatur, ne nimia fiat Urinae effusio; alias nimia debilitaretur Aeger. Autem autem Bafones vi pollent, non est adeo obscurum. Vis siquidem illa diuretica dependet ab alimentis, & in specie quia idem Caneharellis (sunt Mulice instar cantharidum aut Scabiorum, quas avide videtur devarant, in stomacho, & colo eorum reperitur) vescitur. Hi cantharelli turgent Sale volatili diuretico, a quibus hoc, tanquam Hydriopiferos Remedium, Bafones accipiunt, unde & putrefacti spiritus & Sal volatile nitrosum suggerant, simile ei, quod est in Lumbis: potentissimum est Diureticum; sicut pulvis Bufonium calcinatorum est Arenam Diaphoreticam. Alias Bafones vii contra Lumborum regionem applicati per copiosum Urinae profusum Hydriopem solvere dicuntur. Differentia haec inter Acalia haec Diuretica fixa & Volentia probe observanda, nec promiscue usurpanda. Conf. WEDELIIUS in Pharm. pag. 150. & WILLISIIUS in Pharm. Rat. p. 3. pag. 316. & 367. Ulterius Lapis Fulminaris cum aqua quadam appropriata in Alcohol tribus, erat specificum ad Hydriopem & Icturam B. D. MICHAELIS, quod ipse habebat a TILEMANNO & D. HARTMANNO, qui his ipsis crebro usi fuerunt.

24. *Lapide Fulminaris dicto modo prep. p. iii.*
Exuviae, Serpent. sponte decidunt, pulverizat.

Miscebat haec, & ita à 3℥. ad 5℥. familiariter pro Hydriope & Ictero curando exhibebat.

Nam observatum fuit, notante HELMONTIO, easius serpentum, instar cinguli remum regionem seu lumbis alligatis, Diuresin excitalle.

Denique pertinent quoque hac Opercula Testarum Cavillearum, quae ob singularem vim urinalem, qua turgent, viis parata, seu probatum contra Hydriopem Remedium laudantur. Unde bene deparatur & simpliciter pulverisatorum mane & vespere larga dosis in haustu Vini vel Liqueore conveniente propinetur; pellunt enim per Urinam: Vel, quod melius, alii cum Spiritu Salis resolvunt haec Opercula pulverisata, ita fit Solutio urinosa, quae coagulat: quo facto ponitur in locum frigidum, ut ita per deliquium fluat, eodem modo atque Tinctura vel Liqueur Nephriticae Buatur, & sic Liqueur Nephriticum egregium Diureticum Antihydriopicum acquiritur: vid. M. A. N. C. Ann. 9. observat. 79. Liqueur iste per deliquium paratus ad gutt. xx. xlv. & xlv. in quocunque Vehiculo, si fieri potest, calido, aut & Decocto Radicum Fernelii vel Petrofolii ad curandos Hydriopicos est insignis. Loco Spiritus Salis in Vino acido vel Aceto solvantur, & idem erit. Huc facere videtur Rumeii Diureticum ex Spiritu Salis cum Sale volatili Succini coagulato.

Circa Diureticorum usum adhuc notetur:

1. Ut corroborantibus ac moderate adstringentibus, e. g. Martialis etc., ita semper temperetur, aut saltem cum his frequentius commutetur; non quod talibus, ut Veteres docuerunt, hepatis tonus confortandus sit, sed ut impediatur, ne sanguinis crasis sua teutura fusione nimia penitus dissolvatur.

2. Ne, antequam primariam viarum evacuationes praecellat, & portio quaedam Serii intra vasa & subilantiam partium haerentis educta, nec antequam humores viscidii attenuati, & acriter contemperi fuerint, exhibentur, ne illorum mole aut visciditate urinae vias obstruant & infarcentur, acrimonia vero eandem erodantur.

Iuxta haec Diuresis interdum etiam procedendum est ad Diaphoretica & Sudorifica (interdum non semper); testatur enim experientia, quodam largo sudore fuisse curatos, praemissis nempe promittendis, in specie Diureticis, & quidem convenientius magis in Hydriope ad Anasarcam accedente, quam in Ascia; vid. SYLVIIUS: imò intempestive caliditate nullum levamen, sed loci huius magnam sepe noxam Aegrotanti adferunt. Horum enim potestas ultra tertiam corporis regionem non extenditur, sed causam saltem

antecedentem in secunda & tertia movens sub hoc tamen periculo, ut Diaphoretica massam languentem fundendo, ac serum praecipitando, hoc aquae ad interiora & cavitates, ac per habitus externi poros, deponant: Ut taceamus, aquas in illis fluctuantes ab horum usu magis exsuarare, spiritumque ac humorum motum variis modis turbare. Hinc experientia manifestum est, sudores ejusmodi subiectis semper in deterius cedere, quatenus febres, dolores Capitis, Vertigines, Lipothymias, aliaque Cerebri & Cordis symptomata movent, Abdomine verb. grat. iuterim non collabescere, sed magis magisque intumescente: vid. PLATERUS Prax. Tom. 3. pag. 286. Atque hoc non Paradoxum videri poterit illis, qui ex Topicorum Calidorum, v. g. Sacculorum & sotorum, saltem applicatione angustias maiores, Animi deliquia, similiaque symptomata extempore Aegris oboriri observant, mox rursus exspirantia localibus illis remotis, ut experientia quotidiana docet.

Non nego quidem experientiam illam, quam nonnulli de curatis per sudorifica Hydriopici allegant, v. g. BARTHOLOLINI in *Alia Medica*, Tom. 1. observat. 85.: nec illorum, qui sudoribus sponte obortis & quasi critica Hydriopem non raro solum intertulerunt, verb. grat. HOLLERII *Schlagaphus de Morb. Inter. cap. 39.* & BARTHOLOLINUS Cap. 3. *ibid.* 33. Diversae tamen in allegatis Observationibus resiliunt circumstantiae, quae dubitant aniam insignem subministrant. Scilicet

1. Concedi debet, in Anasarca & Hydriope cavitationem tali, ubi feri extravasati non adeo multum est, sed major eius portio intra glandularum ac Viscerum substantiam, & Vasa adhuc flagrant, sudorifica maxime prodesse; sed per sudoris excretionem, Vasa in habitu exsiccantur, eorum, quod interiora insinuat, ad illa commodè devolvit valet, paucis illis, qui fortis in cavitate fluctuat, vel per Naturam, vel per Medicamenta, dissipabili: quale quid in Hydriope illo Vesicario, quem in alicuius interdum SCHENCKIIUS ex CORDAEO, & communicatione EICHOLZII, ac SALTURIUS *Crit. 1. Obs. 31.* testatur, & de BARTHOLOLINIO *Crit. 3. Obs. 21.* & *Crit. 4. Obs. 31.* suspicari licet, pariter interdum contingere posse inobabile fit, quatenus Vesiculae hae cum flavore intrinseco vel immediato, vel mediato per parenchymatibus, communicant, eorumque Contenta huc manifestis continuis exsiliunt.

2. Longè alia ratio videtur sudoris illius, qui Hydriopici quibundam Criticus accidit, & qui Arte excitatur: In illo liquidum blandum lenius fit res in sanguine cessat, ut Aequali augmentum nullum veniat metuetendum; in hoc vero nonnulli impetu & exsuaratione aliqua secedere ac prodire iubetur aliis.

Tandem ac 3. quod ab Authoribus nominatis allegatur sudor acutus solvens, extraordinarium porum dilatationem supponit, dum *Schlagaphus* HOLLERII inquit: Per desiliantem quā Aquam alligant Hydriopem solvitur fuisse; & BARTHOLOLINUS Aquam per Poros Cutis in immensum dilatata patulos hiliat perhibet.

Ea sudoriferis atque Diureticis, quorum farrago amplissima deprehenditur, eligantur, quae incidenti atque resolvendi vi maxime polleat: quales sunt in specie dicta *Janserina* supra laudata, Decoctum Lignorum, Decoctum Milii, aliorumque Vegetabilium Aromaticorum, cum salinis praeteritum volatilibus, Sale volatili Urinae, vel Sale volatili Viperae, & sub forma lipida magis propinantis; modo sudore violenta prophila Aeger ad languorem non debilitetur, sed sit lenis, ac repetitis vicibus creatur; cum nihil ab assumpta sudoriferis periculi Aegris imminet, quamvis nullus sudor promoveat. Sed parit vicibus exhibita humores viscidos solvant, poros obstruendos releant, sicque ad sudorem securum omnia blande disponunt. Occasionem primam, ut alia, citius suggerit. Refert nempe LANGIUS *supra citatus*, ut & LIPSIUS *de Hydriope*, de Rustico Hydriope laborante, Clibanum pistorium adhuc calidum ingrediente, & mediantu largo sudore ita curato.

Foritan & Salivaria Mercurialis interdum cum frodo institui poterit, quem commendat SYLVIIUS *de Hydriope* §. 155., in Anasarca scilicet & reliquarum Hydriopem specierum initio adoranda, praemissis cum salivario interdum spontaneis aut cum euphoria in ejusmodi Casibus contingat potissimum in Belgio inferiore; ita tamen cum talibus circumstantiis adorneat, quales ex *Celsi* *Indicationum* & SYLVIIUS supponimus. Conf. GREN-
BUSII

ESLIUS Tr. Arbor integra. & riuus hominis lib. 2. cap. 1. §. 6. Aliqui, inquit, in Curacione hydropsis sumunt Mercurialis praeparationes: ad hoc:

℞. Magist. Tarrari virgatus, dr.℥.

℞al. Bryon. dr. i.

Salis Card. bened.

℞al. And.℥.

Mag. Corall. ℥i.

M. pro 1. partibus;

Pestis peragant sequens Salum:

℞. Mercur. dulc. gr. xv.

Gum. gummifera. gr. v.

℞al. rofar. dr.℥.

Cum Syr. rofar. q. s. f. bals.

Dysia pestis tribus granis argenti, sigillatim Salivato oris superueniat.

Hæc sunt parua satisfacticia indicationis primæ.

Externarum usum ipsa docuit Natura, quæ nunc per spontaneam in Umbilico Abdominis tumidi apertione, nunc per Vesicas in Cruribus excitatas, nunc foramine in Pollicis Pedis apertio, successivè collam collavem evacuantem hydropicos curavit. Quando ergo dictis modis Urina, & Aqua hydropicorum evacuari nequeunt, subinde usuvent, ut per varios modos Chirurgus expertos extrahatur Aqua & Modis variis.

Quoad Umbilici apertione, non pauca prostant Exempla ita restitutorum, qualia Exempla videbitis in SCHENCKIO, item AMATO LUSITANO C. 3. Cap. 37. Unde fit tumidus prominens Umbilicus, tutissimum est, ut in medio indicatur Pusillus: ibi enim est locus optimus, ut applicetur Umbilico Apertoria, ut promoveatur Apertura; sic enim jucundè & citra incommodum solet evacuari Materia. Ad huc imitationem instituta fuit primitus Paracentesis, h. e. Abdominis artificialis apertio (B), quæ in maiori copia, & celerius Aquas hydropicorum evacuat & hujus vicaria exsternunt: quarum potior illis, quæ habentem Corporis extenuum insunt; prior Aqueulicis tantum curandis inservit; quamvis à MICHAËLIO per hanc toti Abdomini applicatam Aflectio quoque curatas HORSTIUS Cent. Problem. deced. 37. quæst. 8. §. 6. perhibeat. Instituit nunc Veterum Methodo, pertundendo Abdomen per Lancetam, imponendo hinc Cannulam; nunc, idque melius, Recentiorum Methodo per Acum argenteum perforatum. Nec refert, ut per scarificationem Chirurgorum, sive Acu saltem communi, quem WILLISIUS cap. 5. commendat, ut Sello argenteo adnectatur, modo præceptis ac siminis Aqueum profluvium præceatur: sic enim, si illuvies hydrotica non satis exauritur, certè in hydropse etiam deplorato Vita Aegrorum aliquandiu prorogatur. Locus convenientissimus hic Umbilicus rursus, hinc à latere umbilici alioque digitorum transversiorum latitudine, notando simul Membranam Peritonæi in hydropse valde crassescere, vid-

BARBETTE Chirurg. & Anatom. pract. item observationes; Cætro Anatomica LYSERI anæc. pag. 183; & HORNIUS Microtechn. pag. 99. Emittere autem vena Aqua succellivè: nam ex subitanea ejusdem extrahente Mors subinde sequitur: vid. TIMÆUS vna Goldenklein in responsis pag. 31. Uncum verò vi. vii. vel x. pro virum Aegroti ratione evacuentur. Conferatur TULPIUS l. 3. observ. 31. item lib. observ. 42. HILANDUS anæc. 1. observ. 47. cent. 2. observ. 51. PANAROLUS Pract. 2. observ. 17. & in genere quavis Chirurgi. Operatio hæc in se est cutissima, & quæ alia Remediis internis, præsertim alterantibus rite adhibendis, optime inservit, modo in tempore adhibeatur.

Verum ut præsentissimum non raro sit Remedium; quia tamen intempestivè atque incautè adhibita sæpius quoque aut Agram interimit, aut certè non curat, hinc multis Medicis ejus usui maxime suspectus est: summa igitur cautio hoc Remedium genus tam fœderi quam administrari debet, ne profuturum hoc nobile Remedium. Nam in duobus imprimis salis Casibus.

1. Quando sa nimis tardè adhibetur; sic enim fit, ut nimis profunde radicato Mælo, & prius corruptis aut labefactis plūs nimis à colluvie Visceribus internis, ob præterlapsum occasionem Mælo non cedat. Et sanè magis in Afcie, seu hydropse Abdominis particulari, quam Universalis, & Anasaræ locum habet. Non omni tempore bene Operatio prodest, sed in principio atque incremento Morbi duntaxat, cum progressu temporis seroem extravasatum acrimoniæ contrahat, ac interanea hæcena sana corrupta, vireque simul deficiant. Ideoque hæcenas recentis Remediis, haud brevi proficiuntibus, ad Paracentesim fœlicitandum.

2. Quando cum Hydropse ipsa coarctatus sit Stomachus, vel aliud vitium singulare Visceris cuiusdam nobilioris, tunc evacuatæ quidem Aqua; restant tamen scaturigines palliatum saltem est Remedium; sic enim Hydrops semel curatus recrudescit iterum. Paracentesis igitur tunc potius administranda, quando suspicio est Viscera adhuc esse valida; Vasa saltem Lymphatica minora, non magna, lacerata; Motus Hæmorum facili restitui possit; & à causa evidenti sola, v. g. Potu immoderato, Hydrops emergit; quando Mælus non est adeo inveteratus à tandem quando Hydrops particularis est.

His probe observatis, immoxa plandè, & salutaris evadet hæc Operatio: vid. SYLVIIUS præc. lib. 1. cap. 17. de Hydr. §. 118. & 119. ac de aff. Epidem. Londin. §. 53.

Præterea juxta Abdomen, & Stomaci tumidi, ad Naturæ imitationem, interdum fit Agertio, vel Ferro, vel Caustico, atque sic optime Spongia admoda succellivè eva-

(B) Περαιστικός & τεραιστικός δεσπότης, pango. Est punctiō vel incisio variis, quæ Hydropici Aqua eximitur. Ita vocatur etiam curantissima in Saffione, quæ fit per punctiōnem acutajella. Paracentesim quoque appellant Prædicti Thoracici in Empyricis incisioem inter costas factam ad Paris centum adhibentem.

Quoad Hydropicorum Paracentesim illud hic abutantur duximus: quid quævis Antiquioribus Prædictis religio fuerit Hydropicorum Aquas punctiōne omnes simul & confertim educere; nihilominus novelli inter Recentiores hæc Methodum Aquas per vicia & intervalla educendi per vana, & superflua labantur, atque audacter Hydropicorum ventrem ita incidunt punctiōne penitus rotundando quæ credidit. Verrum citius Doen. Du-Verney mutat, quod quovis ex integro hæc Aquarum educio Aegri quæmaxime sublevis tunc temporis valdeatur; attemperandūque in summam viriam incidenti imbecillitati, & nonnupam murem obest: tunc quæ simul cum Aquis maxima Spirituum copia educitur: tum quæ Sanguinis partes bollicæ & spirituales per vicia Viscerum Lymphaticorum in Ventrem evacuatas committunt: tum denique quæ hanc ad apertissimam reparatur Spiritus dissipati, ob summam Viscerum areniam. Aegri igitur accuratis consulunt, qui non viciat vicia, sed potius iterat illorum Ventrem Paracentesi exauriant: quod non solum de Hydropicorum, sed & de Empyricorum scilicet, Paritypæ à Pellore vel magnis Abfcessibus educioem, ducunt velum.

Paracentesi insituta, Aquique eductis, varia solutis vel moris Aegrotantium suberantur argumenta, quæ vel ex Aquarum eductione condunt, vel ex Aegri statu colliguntur. Hydropicorum Aqua plerumque colore gaudet ad Cæci majori carmine vergens, maculosa sunt, saliscula & vitram elentes: immixtum omnino aqua sunt, lactea, flava, rufa, vel sanguinea colore tincta: quæ prioris generis sunt, minus præternaturales reputantur, & minus periculi; quæ vero magis ab his recedunt majoris periculum minantur, minores Curacioni spæ elucet. Aqua educta si parvam vel nihil sedimenti in vase relinquit, necum lotri minime emittit, adeque murem. Vester enim statim à Paracentesi intumescit semper malum pertinet. Mælo Aquarum adeo Viscerum purissimum denatur: hinc febris, nausia, inquietudo, & mæritas, quæ si in Aegrotantibus post punctiōnem observentur, semper mali sunt omnia, & nonnupam Thoracis intumescunt acriam. Si cruenta Aqua sit, Viscerum Sanguinem reputatur significat. Si coloratior observetur præsertim cruenta, vel rubro casta saturata, Bile summa dyscrasia insiduit. Epiploï ramenta cum Aquis permixta novissi ex sequestratione educuntur: Urine rubra, parca & lateralis sedimenti conferta, post Paracentesim observata murem potentiam. Vix curatur Hydrops, quærem morbus ab Uterio oritur traxit, vel Utericorum contum habuerit. Alii fluxus Paracentesim inequent alique Aegri brevitatem, Ventris colligantem & succam murem præstipiscat. Denum si post Aquarum eductionem rigore & febres superveniant, Viscerum sequestrationes expellat.

cruentæ Aqua: Quæ ipsa tamen aperta, si per Naturam ipsam fiat, est optima; si per Chirurgiam, nec materiam admissit, non semper est æque tuta; quia interdum scroto hinc gangrenosum scilicet decidit, citra tamen periculum ægri. Probè igitur hic observandum, ne, quod facile evenit, in loca aperturæ Gangrenam concipiat. Labefactur nempe partium membranarum continentium totas, & spiritus intus vigor à contenta colluvie, quæ magis per loca aperturæ jugiter destillans facili mortificationem inferre potest. Hæc ipsa igitur sedulo præcavenda, defendenda pariter circa locum apertum, non communibus satura: ac similibus remediis, defensio dicitur, ad inflammationem aliis ultatis, sed additis in specie balsamitis, resinosi, amari, ad Gangrenam curam aliis utilis: hinc Emplastrum de minis Paracelsi adæptatur Emplastrum Dis Sulphuris Rutandi seu præservativum Gangrenam inhibens. Interim tamen, si gangrena scroti invalens sit, non penitus decidat, Aquis fucellivæ evacuat, postmodum Carne quadam Testes involvens, & inflat pilum eorum coarctans, scroti defectus sponte naturæ refarcitur: vid. TIMÆUS *von Guldensack in cas. pag. 269.* Id quod pariter & in Luto Veneræ post scroti sphaculum observari observari. Propter periculum hocce hydropticis raro perficitur scroto.

Post scroto & erura subinde scarrificari solent, ob hanc rationem, quia excitatum suis effluviis Aquarum, & ægros navis sanos: Nempe circa loca carnosæ, & circa luras influentem scarificationem lancem, ita ut incisiones à se invicem aliquantisper distent, defensa supra & infra admovento. Promptè enim levi scilicet incisione copiosum serum transiit: Linteolo molli circa friditionem abstergendum, vel apposita sponsa excipiendo, ac præterea loca vicina propter facilem gangrenæ metum defendenda, nempe torvendo subinde spiritu Vini simplici, aut theriacali, aut erocato, & impoñenda desuper Emplastrum Balsamica defensio. Quin, & ne Vulnoscicula gangrenam concipiant, spiritu Vini camphorato subinde eluenda sunt.

Præterea Vesicæ spontaneæ subinde in erubibus se aperiant, quibus dilapsis multa Aqua evacuat, unde istud Pulvis Brasiliæ esse applicandum, utpote quod multum feri extrahit. Observatum fuit, quod plantago aquatica convulsæ, & pedibus nimis tumefactis applicata, Vesiculas copiosas fatis excutiat, quæ postmodum a partibus multum Aqua solidare cum insigni ægri levamine. Ad hanc imitationem quidam Hystricus locis erarum carnosæ applicat, nempe vel prope Scras, vel in parte carnosæ intumens, & humilis: His enim apertis copia colluvies eveniat, & loca ista carnosæ minis facili gangrenam concipiunt, quam nervosa. Aquam autem inter Cutem falem, non intra caritatem collectam, collux abducent: serum ad erura ruit, educunt, ut, præter RIVIERIUM observat, à JACOZO commun. 21., WILLISIUS testatur, modo sub tali contenta applicentur, ne, quia magnam fæcè post se illuviem ex tota vicinia trahunt, spirituales enervent, ac calorem partium extinguunt, sphacellum inducant, prout inter alios SEPTALIUS *an. med. uel. medic. lib. 6. p. 56.* HILDANUS *cent. 1. observ. 49.* & SYDENHAM *de Hydrope*, animadvertunt: qua de causa non tantum artuum extremitatibus, quàm femoribus, & humeris, ac in hydrocephalo, externè ponit aures ne in sucha admoveatur. Quod si sponte fiat, apicium est.

Cæterum, quoniam confertum nimis per Vesicationem sit evacuatio, & majus de gangrenæ imminet periculum, potius Ecthemata seu Cauteria, vel actualia vel parietalia, circa loca carnosæ applicant, quæ Vesicatorum ideo interponenda, quod in principio lentè magis operentur, & ratione Ecthemæ contra gangrenam partes firmas moriantur: vid. WILLISIUS l. c. A. His ipsi enim successe per parvum foramen cum minori gangrenæ metu sit evacuatio. Quibus tamen pariter serum latum intercutaneum, minime quod in cavitatibus fluctuat, educitur, nisi forsitan paracenteses vicem in Ventre gerant, aut ex cavitatibus serum ad habitum, v. g. pedes, ruit. Verum non semper imitari possumus, nam in hydrope inveterato, & in quæ pedes diu tumidi, ac partes eorundem apparat, in quibus casibus periculosisimè hic cauteria applicat, quia frequentissimè insequi solet gangrenæ, quæ repit, ulterius, nec eidem resisti potest.

Ideo non instituentur sunt nisi in corpore robusto, & juvenibus, licet & hic cautela opus sit. Modum applicandi cauteria uni cum defensione crurum à gangrenæ, optimè refert WILLISIUS *Pharm. Ration. p. 2.* Nempe locus aromaticis partem confortat debilem, cujus robur per balsamicam viam *dist. Bengardina* conservatur, sicque gangrenæ metus optimè præcavetur. Quin, & postura cum acribus non evacuanda Aquas optimè institui possunt: vid. WILLISIUS l. c. Nihil tamen relictum, five per scarificationem Chirurgurum, five Acutalem communi, quam WILLISIUS commendat, putrescentes instillatur, modo Aquarum profusius, præcepti ac nimis præcavetur. Hic faccedit denique præceptum simulatum ungum *abscissi*, in specie in digitis pedum, quomodo tutissimus est hæc enim occasione successe quasi Aqua transudans, & destillans Hydropticis desecit, id quæ sine periculo, potius cum emolumento: videtur SCHENCKIUS *in observat.* & SENNERTUS *l. p. prax. p. 2. sect. 1. cap. 7.* Remediis Chirurgicis quoque accedentibus *Ligatura espartiva*, quales non latem in tumore pedum eodemmodo interdum magne efficacie observantur, sed RIVIERUS quoque à FOMIO commun. observat, & in Hydrocephalo quoque secus nati Infantis, sine ulla alia remedia effectum singularem præstare perhibet, sine dubio quatenus in partibus compressis influxus feri ulterior inhibetur, ut reliquum ejus vel à Venis ac Lymphaticis Vasis refluatur, vel per Emuloriorum solennia eliminetur.

His modis prima indicatio satisfaci solet. (C)

Hæc interim dum sunt, & postquam facta, antecedentis etiam causæ habenda esse rationem.

Quædam secundam viam indicant: in usum sunt observantia in genere sic dicta, varianda subinde pro casuum remotarum differentis. Quæ tamen ordinariæ ferè locum habent, sunt imprimis *marialis*, & *amara*, aliis *barica*, & *apertoria*, *calcfactiva* dicta, humorum visciditatem corrigentia, incidentia atque corrigentia: quæ inter excellit *abstinthium*, adeo ut existimem, postquam hydrope curandi viam finem esse in *Marte*, & *abstinthio*. Iusta hæc sunt & *Verula*, *Ceræ*, *Cantharis*, *Emulopodis*, *Cortex Præconi*, *Menstricium*, *Chelidonium majus*, *Rhabdium*, *Marrubium*, *Rubia tinctorum*, *Allium*, *Sidera tenuifolia*, *Bellis minoris*, *Rosæ fructus*, & *Sambuci*, *Tartarus cretus*, *Lapis Cereæ* seu *Vulcanicus*: quæ omnia ed nobiliora sunt effectum, quo ipsorum usu, sed adducunt ratione, copiosior urinas fluxus supervenit. Hinc quolibet *marialis apertoria*, pulveris, & extralla *aristocollis* præsertim cum *sartaro* præparata, aut sociata, Tartari maritales, croci maris apertivi, essentia maris liquide, & similia, sunt convenientissima, istem temporibus cum aliis alterantibus usurpanda, quibus à purgantibus vacamus. *Marialis* magni ad omnes in his casibus æstimantur, quatenus non latem acrimoniam humorum temperant, led quidem quatenus in fermentationes novas citant, prout WILLISIUS *de Morbis convulsivis cap. 11.* & *Pharm. Ration. part. 2. sect. 2. cap. 3. duce*: sic *Vinum maritale hydropticum Causitii* videb. in M. A. N. C. ann. 6. append. pag. 107. ubi simul inter hydropis cura, tam per interna, quàm per externa reperitur. Quo referenda quoque Cura Hydropis, quæ recedente in BARTHOLINI *alio Hæmorrh. valum. 5. observat. 119.* *abstinthium* mobilissimum est simplex in Hydrope quoqueque uo; *Cerevisia*, *Vinum*, *Essentia*, *Extraktum Abstinthii*, &c. singulariter hydropticum conducunt. Solus abstinthii uli plures hydropticis curati observati fuerunt à vid. M. A. N. C. ann. 3. observat. 121. & ann. 9. & 10. observat. 11. RHODIUS *cent. 3. observat. 11.* & FEHRIUS *de abstinthio pag. 116.* Unde quidam coagulant spiritum Salis cum Sale Abstinthii, & hoc tanquam Sal salinum tertium eum expertum ad Hydropem commendant, eum poterat aperiat. BORELLUS *art. 3. observat. 55.* Decollum Veronicæ laudat. *Menstricium* à pluribus decantatum specificum est, cujus decortum pro sudorem, & urinae specificè hydropticæ desecit: vid. M. A. N. C. ann. 1. observat. 57. *Rhabdarium* alteram quoque specificam ad hydropem, ita ut existimem, Electrium scilicet ex *Rob Juniperi* cum *Rhabdare* multum præstari posse in hydrope: c. 6.

24. *Rob Juniperi* f. f.

Extrakt. Martis cum succo pom. unc. 5. vel de vl. Palo.

(C) Rarum est quod refert sapientissimus Dom. Du-Verney, de Hydrope etiam autem ferè 30. *Ajiste* & *Anagora* præbere, ceteris remediis inefficacibus additis, *Puccinæ*, & *Sativæ* integræ rursus.

Pulv. Rhubarb. stell. ʒij. vel ʒiij.
Cum Aqua Cinnamon.

P. Electuarium.

Confermat RIVIERIUS in Obsorvat. commun. dum refert, post Vomitus Sanguinis ortum Aicrem, per Infusionem Rhubarbari pro potu ordinario curatum.

Chelidonium majus, item Marrubium specifica sunt ad hydropem, praesertim si Icterus insequatur. Alium quoque vi alterativa & diuretica hydropicis multum confert, de quo supra, ubi de Diarriae.

De Hedera terrestris aliquot novi Esempla: est hic Vir, maxime ad Anasarcam proclivis, & cuius Crura jam aliquoties insigniter tumefacta copiosum serum per aperta Ulcuscula emiserat; hic per Decoctum Hedera terrestris & Absinthii in Cerevisia secundaria quotidie aliquoties calide bibitum haeculis paucis praeparat; vixit; Equidem semper copiosum Urinae fluxum procuravit; licet simul quoque Absinthii familiaris ipsi erat usus. Quoad Hedera verò terrestris, notabile est sequens Exemplum: Mulier quaedam desperatè hydropse laborans, & à Medicis relicta, ubi fuerit Radix Itra in Vinum Malvasiae hausti, & interea & externo usu herba Hedera terrestris coaculavit: nempe Anciliculis suis intra Hedera terrestris locis tumensibus impoluit, unde notabiliter Tumorem remittere observavit, qui ipsa animata & ipsam herbam in aqua vel Cerevisia decoctam calide & copiose hausit, & tali hujus usu, cum fuso Itra interdum repetito, convalescit. FERDINANDUS Eschmanni Aristocrati singulariter commendat. Rab Juniperi & Sambuci vi alterativa Bili & sanguinis, diaphoretica, ac diuretica multum valent in Hydropicis, adeoque per corpore Electuorum aut aliarum Formularum commodè interservire possunt. Ex Tartaro stinctura Tartari acris, vel sola, vel in Scorbutico cum spiritus Cochleariae mista, Terra soluta Tartari, Tinctura Martis tartarata Ludovici, Tinctura Viridi Martis Zuecheri, Spiritus Tartari proliè refrigerant, ac similia, Sal Tartari, &c. polychrestia sunt, & tanquam digestiva purgantibus praemittenda optime conveniunt. Quoad Carumiam praeparatum, vid. supra, ubi de Diarriae. Praeterea hujus salis erit, quod MARCELLUS DONATUS lib. 4. cap. 21. refert: quendam hydropicum aëdum Labore sine ulla aliis Remediis fuisse curatum. Illud de Digestivis ac Incidentibus adhuc notetur, quod SYLVIVS sepius inculcat, ut, dum Illa assumuntur, in lecto se contineant, & ad blandum Sudorem Corpus disponat Ager; sic enim facillius praestant, quae praestare debent: quatenus hac ratione illorum motus ad partem affectam, quod ex operatio in humorem peccantem, notabiliter promovetur.

Ea his vitiis fieri possunt formulae contra hydropem. In principii imprimis Nodus cum Sale Tartari convenit: verb. grat.

ʒj. Rad. Vinetorum. ʒij. ad ʒij.

Herb. Chelidon. maj.

Marrub.

Albust. an. M. l.

Curis.

Aurant. an. ʒvi.

Sem. Fraxini.

Camelis.

Anis.

Feniculi an. ʒij. vel ʒiij.

Rac. Junip. contus. ʒij.

Galeog.

Coryphill.

Gingiv. an. ʒi.

Sal. Tartari ʒvi. (vel Sal. Tart. Albust. Ge-
nii. an. ʒi. ad ʒij.)

Incis. & contus. infund. in Vino, pro repetitis pro lubitu haustibus.

Idem facillè potest fieri Purgans, addendo Radicem Rhubarbari, Helictotem nigri, Elixir non praeparatè, &c.

Vir quidam hydropicis insequenti Nodulo fuit curatus, quem mirè per Urinam evacuarè dicebat.

ʒj. Rad. Cichor. ʒij.

Gram. ʒij.

Gentian.

Helleb.

Curis. Rad. Cappar. an. ʒi.

Ligni Sassafr. ʒij.

Cam. Albust. vng.

Past.

Sol. Card. bend.

Samm. Centaur. min. an. p. j.

Flav. Cort. Ciri ʒij.

Et Incisus f. Nodulus.

Cui affundatur dimidia Mensura Vini Malvasiae, seu alius Hippocri, licet in loco tepido per diem & noctem: hinc bibatur mane haustulus unus, hora, una ante usum Juleculi. Continuenter autem tales Potiones necesse est aliquandiu.

Omni septimana simul bis Chylus Emulsi & Carminans applicatum fuit, & simul Saccharis ac Aromaticis & Carminantibus in Aqua vel Vino coctis Abdomini & scroto impositus fuit.

Item

ʒj. Melos. Juniper. ʒij. ad ʒij.

Spiris. Apert. Pesti ʒij.

M. D. S.

Effusio Apertis.

Dosis à guttis 40. ad ʒo.

Item

ʒj. Spiris. Carminat. de Tribus ʒij.

Salis Ammoniaci simpl. ʒij.

M. D. S.

Spiritus Apertis.

Dosis ʒij. aliquoties in die, in Vehiculo conveniente.

Item

ʒj. Salis Fimi columb. vel Sarmat. ʒij.

Pulv. Balsm. ʒij. vel ʒij.

Misc. pro Pulvere:

Div. in 2. part. aequales:

D. S.

Singularis Pulvis contra Hydropem.

Hæc tantum pro Formula; Usus & Experientia plura docebit.

Item fiat Sinum Chylæum ad imitationem HARTMANNI, ubi de Catarrhis, in quo coquitur Absinthium, Rubia tinctorum, Carduus benedictus &c., quod commodè pro potu ordinario ultrapro potest.

Seri Arimionum, quam causam interdum erosiones Vasorum esse superioris dixi, corrigunt diversè diversitè Acrimoniam resistunt, præsertim tamen lentare notabilè denotata, v. gr. Tragacanthum, Malliche, Radia Cynoglossæ, & Oenoglossæ, ut Semen Violarum, & Hymicyni, ac Nuculorum Emulsionem, item Terra & Telha, v. gr. Lapilli Cancrorum, Mater Perlarum, & Balsamica seu Viscularia. Quamvis negandum non sit, ejusmodi Acrimoniam rariis in principio subesse, sed cum sero demum evacuatè contrahi, aliis in Hydropicis frequentiores Viscerum erosiones forent. Quid si verè Vasorum & Viscerum Obstructiones atque indurationes circulationem feri turbent, hinc hydropi occasione præbeant, harum modèz incumbendum per illa, quæ Diuretica, Diaphoretica & Attenuantia superioris diai; quamvis parum admodum spei in posteriore calu subesse ex prognosi consistit.

Tandem etiam Fibrarum cutanearum laxitatis & imbecillitatis Cura habenda est, qualem & per eam Hydropem frigus indolis videtur, apud BARTHOLINUM Comm. 6. lib. 17. adeoque sepiè copiosioris feri affluxus causa existit. Scopo haic satisfaciunt Nervina spirituosæ, Balnearum, Pediluviorum, Potuum, & Lituum forma applicata: e. g. in Cruribus edematosis optime applicatur Spiritus Vini, Spiritus vel Aqua Articularis, Balsamum Anglicum, Aqua Vitis Saronica, &c. item Emplastrum de Alcalibus TACHENII in Merbor. Principio. Adhærentia, quæ RIVIERIUS offerunt. comment. 9. pag. 369. MARCELLUS DONATUS lib. 4. cap. 21. aliique commendant, meritò rejiciunt, cum ea pororum occlusionem, & hinc transpirationem insensibilis impedit, plura mala oriri, imò ipse Hydrops regenerari possit.

Denique si erisio atque rugositas Vasorum similisque Organorum salis, Consolidantia seu Viscularia propinquent, quatenus Agrimoniam, Chazetolium, Venonicam, Verbenam, Vincetoxicum, &c. Hydropicis multum prodesse, Experientia comprobat.

Et hæc est Cura Hydropis ordinaria.

De extraordinariis ejus Curis, quando per continuam Sitim, vel per etiam Halicis sunt anni potu, quale Exemplum in Paralysomen. habet SENNERTUS pag. 149. item quando Ager hydropicus sepiè in Furnis piliorum, ita ut Caput saltem prominent, nihil amplius morbo.

Potèd in Hydropse duo Symptomata maxime urgent, nempe difficultas Respiratio & clausa Sitis.

Quæd

Quand *Respirationis diffilium*: super sub puncto Anafic-
cor curandæ diu convecit Vomitus. Interim utitur
quoque est Sperma Cerei à ʒi. ad ʒi. in Vehiculo fervido
vel Vino Malvatico usurpatum, quod ipsum remedium ef-
ficax deprehendit.

Quod verò situm clamorū *argenteum*, quæ est unum è
præmissis symptomatis hydropicis, cum nimia potus in-
urgitatio doceat, opera detur, ut fallatur, & palliative
solvatur; quod fit per Mallicen, ʒi. semper grana huius
in ore reocantur, & sedulo mallicentur; sic enim blaudus
sapor ex his prolephas sitim compescit. Quod magis enim
abstemii sunt à potu hydropici, eo facillius curantur. Si-
quidem plura profuant Vemph. Hydrioporum sola potus
abstinentia curatur: vid. HILDANUS Cras. 4. Ob-
servat. 43., ubi refert, hydropicum, qui potus abstinentia
per 4. septimanas curatus est. Quod si verò necesse sit, ut
bibat *Agger*, imitemur RULANDUM, qui meliore in-
ventione

ʒi. *Acet. Junip. contraf.* M. ii. vel iii.
Decoq. io *heri Laſt. Evi.*

Et ita hoc Decodum propinat pro potu ad sistendam hy-
dropicorum sitim, quod elegans est ob vim diureticam la-
tentem: cui addit parum de *Succo Granatorum*.

Nitram optimè purificatum contineb in ore reteorum, ut
liqueat, proficuum est hydropicis; aut etiam Potui eorum-
dem cuique additum sitim temperat. Urinam eliet, & op-
timè lideus confert. Sic quoque radia Liquiritiæ masti-
cata cum Passulis & similibus in ore detineatur, aut assuma-
tur, temperando aere salum, sitim excitat, hanc miti-
gat. Vinum seu *Succo Granatorum*, aut Jolepum cum succo
Granatorum temperat, non immerito ab HARTMAN-
NO commendatur: vel *Spiritus salis dulcis* parva in dosi sub-
inde propiciatus ad sitim egregius est, simulque diorectus;
item Spiritus Salis coagulatus *Rhamneli*. Acetum aqua Cha-
lybeata dilutum, abluendo es usurpatum, etiam sitim fal-
lit. Subinde etiam tinctura florum Bellidis potui additur
ad mitigandam ferociam sitis.

Hæc fuerunt interna.
Præter hæc interea etiam *Chymata* multis sibus hydra-
pici interveniunt, præsertim cum Pediculi ac Capitis or-
gent symptomata, ut serum è Vasis atque sobstantia In-
testinorum ac Meioterili, sine totius Massæ Sanguineæ
exagitatione prolicentes, ita ut illa depleta serum extra-
vasatum aliquantulum imbibatur. Enematum ejusmodi In-
gredientia sunt Hydræga cum Aromatica mixta, verb-
grat. Herba Gratiolæ, Soldanelle, Betæ, Flores Gemi-
læ, Sambuci, Chamomillæ, Centauri minoris, Radix
Ieros posstratis, Etyonia, Cortices interiores Sambuci,
Fragulæ, Semen Carthami, Cuminol, Carvi, &c. quæ ma-
joris efficacis erunt, si in Urina decoquantur: v. gr. pro
Clystere stimulant

ʒi. *Decoq. Fl. Chamom. ʒi.*
Urin. hum. ʒiii.
II. *Levulin. ʒi.*
Ol. *distill. Terreb. ʒi.*
M. pro Clysmate: ʒ.
Clyster Abducens.

Et acrioribus

ʒi. *Cortic. interior. Fragulæ,*
Sambuci an. M. l.
herb. Absinthii M. ii.
Rad. Bryon. ʒi.
Decoq. usuprat. rec. ʒvi.
Succo. Junip.
Lauri an. ʒiii. vel ʒi.
sem. Cuminol vel Carvi,
Fuculan an. ʒi.
Coqu. in ʒ. q. Urina Puer. vel ʒi. Laſt.
ʒi. *Colatura ʒvi. i. vel ʒii.*
In qua dissolve
Eleasar. Nitra cum Agar.
De Nat. Lauri an. ʒi.
Mull. Ovor. No. i. vel ii.
M. ʒ. Clysm. pro 2. doibus.
Clysm. Abducens pro 2. doibus.
Vel

ʒi. *Cortic. interior. Fragulæ,*
Sambuci an. M. l.
Rad. Bryon. ʒi.
Decoq. usuprat. rec. ʒi.
Succo. Lauri,
Juniper. an. ʒiii.
Coqu. io ʒ. q. *Aqua comm.* addendo parum Urina Pueri

ʒi. *Critic. ʒi.*
adde
Mellis parum.
M. ʒ. Clysm. ʒ.
Clyster Abducens.

Maria Maleici cum Passulis loco Clysteris injici potest *Chy-
mata autem ex Urina humana*, in specie Pueri, perquam sunt
egregia, idque in specie, ubi Flatus simul adlocunt, quos
dissipellit Urina. Nam *rari sola aqua in hydrop potat*, sed
ferè simul ex origine illa simul Flatus generantur, caspe-
raotes Malum; in quo casu saluari cum succosil applicandus
Clysmata cum & ex Urina Pueri, in qua modicum fermenti
ac seminum Carminativorum coctum cum Melle; vid.
VALERIOLA L. 1. Obſ. 2. M. A. N. C. Ann. 2. Obſ. 219. in
Schol. p. 310. & SENNETUS L. 3. Prax. Gæp. de hydrop
quorum ad imitationem

ʒi. *sem. Ajil vel Anif.*
Fenic. an. ʒiii.
Fermentum comm. ʒi.
Coqu. in ʒ. q. Urina Pueri:
ʒi. *Colatura addo*
Mell. distemp. ʒi.
Ol. distillat. Terreb. ʒi.
M. pro Clysmate: ʒ.
Clyster Flatus dissipellens & Abducens.
Vel
ʒi. *sem. Feniculi vel Anif.*
Fermentum comm. an. ʒi.
Coqu. in aqua communi:
ʒi. *Colatura ʒi. addo*
Urina Pueri ʒi.
in quibus solve
Mellis distemp. ʒi.
M. pro Clysmate:
D. ʒ. ut antè.
Vel
ʒi. *Decoq. Carminat. ʒi.*
Urina hum. ʒii.
Fermentum ʒi.
Salis commun. ʒi.
Mellis refusi unc. l.
M. pro Clysmate:
D. ʒ. ut suprà.

Non immerito *Terebinthina* hic commendatur, cum Cly-
steres ex mera Urina Pueri, in qua aliquid Terebinthinæ,
& Nitri dissolutum fuerit, admodum laudentur a WILLI-
SIO L. 4. pag. 318. & 319., utpote qualis Clyster non tam-
en Intestina ad deponendum serum vellicaret, sed hujus
etiam aliquam portioem virtute sua dioretica ad Re-
nes moveret: v. gr.

ʒi. *Urina human. ʒi.*
Terebinth. Pura cum Vitell. Ovi solut. unc. i.
ad unc. iſſ.
Nitri depur. unc. iſſ.
M. ʒ. Enema, quoties applicandum.
D. ʒ. ut suprà.

Præter hæc *Externa* quoque Abdomini Affectionum, ut
& scroto tumefacto, vel labii Vulvæ nimis tumebus,
& pedibus ipsi inflatis & tumida, varia applicanda sunt,
ut nempe successivè resolvatur Tumor illorum oedema-
tosus, & ipse Liqueor contentus attenuatus partem indivi-
sibiliter, partim sensibilibiter discuti queat, nunc per Fo-
menta, nunc Cataplasmata, nunc sacculos interpersatis
in Vino vel Lixivio. In leviori Malo *Herba Chelidoniæ ma-
joris*, aut etiam *Geranii Robertiani*, contusa, & plantis pe-
dum applicatur. Singulari quæ obinet Radix Barda-
næ, vel Folia recentia contra plantis Pedum alligata,
convenerunt; singulari eorum experimento potenter resol-
vere, & multas ferocitates elicere dicuntur. *Perroſillium*
rems contusum & scroto applicatum etiam condocere ob-
servatum. *Externa* hæc scroto, Abdomini & pedibus ap-
plicanda, in genere sunt in dupli differencia, nempe
vel *Aromatica attenuantia* & *disscutientia*, vel *Salina altera*
dissolvantia. Aromatica discutientia sunt Folia & Flores
Sambuci, Folia Ebuli, Folia & Semen Chamomillæ,
Folia Lauri, Mentha, Origanum, Abanthium, Radia &
succo Cucumeris affinis, Radix Bryonici, Alari, Buccæ
Lauri, & Jonipetæ, Semina Milii, Carminativa calida
minora, & similia: in specie Chelidonium majus, quod
ipsum in Tomoribus Pedum oedematosi, superveniens
Morbis chronicis aut acutis, ac etiam ex errore Dia-

120, aut dyscrasia bilis soboris, plantis pedum applicatum endem solet relinere & insigniter missero. Nam *furfuracea*, & insubribus decodis parati Sacculi, una cum Pulvere Cornu, Venti applicati, admodum commendantur à STOECKERO in *Praxi*. Omnium optima sunt *stercora Animalium* pro externa Emplastratione, quae ratione salis nictali miram vim obtinent dissolvendi insensibiliter hydropicorum colluvium, in specie Stercus Caprillum, hinc Columbinum & Bubulum. Stercus humanum quidem alias praefertur: sed applicatum nimis ferit nares. Sanè Stercus Caprillum confusum prius, vel Columbinum, bulliat cum Aqua simplicis vel Calce vivae, præbe subactum instar Cataplasmati: liquidum applicetur: item Stercus Bubulum subactum cum Pulvere Gumini cum succosum applicatur: fortius est Stercus Caprillum cum Urina humana subactum, & Cataplasmaticum instar Abdomini infratum, aut pedibus aut scroto applicatum mitificet tumorem durescit: aut quoque Stercus Vaccinum aut Equinum cum Farina Hordei mihum, cui addatur Acetum distillatum, invicem subacta sub forma Cataplasmatici praefertur ibi convenit, ubi *Dysenteria*, quam dixerunt, imminet. Inter salia convenit faculus ex Cinadibus ac sic tollis paratus, vid. SYLVIVS de *Hydrog.* 23. Cum Urinis Puerozum facta ex Vegetabilibus Cataplasmata insigniter commendantur. Prae reliquis eminet illud euphoris, nempe *Aqua Calce viva* seu Aqua benedicta Chirurgorum singulariter in tumoribus scroto dissolvendis, vel solitaria, vel imprægnata Spiritu Vini, spongia vel lino applicata crebrius, & quidem calide scroto vel tori Abdomini inferuntur. Ac sanè multum laetetur haec Aqua sub Salla duplici, quae habet in recessu. In specie si imminet pedibus oedematosis *Gangraena*, quod ipsum ex Maculis constat, haec Aqua erit convenientissima, tam quod dissolvat Tumores, tam quod à Gangraena praevia. Cum Aqua hac ergo reliqua iam dicta in Cataplasmaticis formam coepta, & ita imponi possunt: e.g. ex Urina Pueri:

24. Fel Sambuci,

Fl. Sambuci vel Chamom. an. M. l. vel ii.
Ster. Caprill. confus. Bi. vel Biß. ad Biß.
Sem. a. calid. mal. an. 3ß.
Rad. Bryon. rec. 3ß. ad 3ß.

Coqui in 6 q. Aqua vel Urina Pueroz. ad consisten.
Cataplasmaticis: S.

Cataplasma Dissolvens.

Applicetur Abdomini vel scroto.

Cataplasma expertum ex Radice Cucumeris asini cum Pulvere Gumini commendatur & describit RIVIERUS c. 5. *Observat.* 70. & *Prax.* lib. 11. cap. 6. Speciat haec Cataplasma ex tamentis Coriariae recentis ex Calce viva paratorum, quod RIVIERUS de *Morbis Insuperantibus* Obs. 33. commendat: item Cataplasma ex herore borleo, sulphore, semine Gumini & Urina, aut ex Raphano contrait: vel quod RIVIERUS *Prax.* lib. 11. cap. 6. describit, cuiusque efficaciam *Creat.* 1. *Observat.* 70. & *Creat.* 5. *Observat.* 70. confirmat.

25. Stercor. bovis, fusc. Bi.

Sulphuris viv. Sem. Cornu pulvis. an. 3ß.
Urina Pueroz. q. l.

M. f. Cataplasma: S. ut supra.

Prae ceteris singulari quid obtinent contra Tumores scroto & pedum asinibus recentibus, cum suis Tellis coactae, & Venti Hydropicorum ac scroto tumenti ad modum cataplasmatici applicatae: quae si sicca fuerint, alias rursus imponenda. Singulariter conveniunt tam in Abdominis quam Tellium tumore: quod Remedium ceteri secretum & efficacissimum à CASTRO, THONERO, & aliis Aethoribus estimatum hoc in casu: nempe parant Cataplasma ex *Cochleo cum Teste coactae*, adpersio Pulvere *Stercoris caprilli* & *Seminis Carvi* aut

26. Flor. Chamom. simpl. vel Ros. M. ii.

Farin. Fabar. 3vi. ad 3ß.
Coch. cum Teste coact. 3iv. vel 3ß.
Stere. caprill. 3ii. vel 3ii.
Pulver. Sem. Cumini vel Carvi 3i.

Componatur in

Aqua simplicis.

Actri an. part. aequal.

(vel Aqua par. iv. & Actri par. i. vel etiam in sola Aqua)

Pro Cataplasmate:

D. S. ut supra.

Et applicentur in excessivo tumore pedum, vel scroto tumente.

27. Coch. cum suis Teste coact. Bi.

Pulv. Sem. Carvi 3ii.

Stere. caprill. 3ii.

M. pro Cataplasmate: S.

Cataplasma Dificiens.

Quod tepide imponendum est in resolvendis tumoribus scroto, in hydropse tam universalis quam particulari. Et sanè huiusmodi *Cochleis*, vel *Limacibus* cum Tellis coactis & applicatis Abdomini, seu secretum singulari commendat PETRUS à CASTRO, quo ipse etiam usus fuit in cura hydrocephali.

Item

28. Racc. Juniperi part. iv.

Lauri part. ii.

Pulverifata, & melle excepta inferantur Abdomini quo carum fuit hydropicus, qui ex animo spiritus Vini abusu hydropem contraxerat: cuius loco Cataplasma ex Tellis *Racc. & Albuginis* una cum Melle subactis, Abdomini applicari potest.

Quibus molesta forent haec Cataplasmata, illi asperpent inunctiones per Olea Aromatica, quae simul etiam urinam movent; prout exemplum à WILLISIO l. a. c. 3. de inunctione Olei Scorpionum Anasar laborantis, & per Diuresin sanati, testatur: qualia sunt v.g. Linimenta ex Oleo Laurini, Sambuci, Aethi, Scorpionum simpliciter & compositis, in specie Bufonum, Oleo distillato Juniperi, Carvi, Rosmarini, & similibus: cum quibus Unguentum Agrippae, vel de Arthanica, vel Martiatum, vel Emplastrum de Baccis Lauri, Hydropicum Angustanum, & Calce viva cum Vegetabilium acrim Extrahit macilaginosis: hinc v.g. Unguentum de Calce viva Angustanum, & Unguentum, quod RIVIERUS *Creat.* 1. Obs. 97. describit, conveniunt;

29. Ol. de Cassia.

Tamarisc. an. 3ii.

Succ. Rhol.

Cucum. agrost. an. 3ß.

Bulliant ad succorum consumptionem.

Colaturum addit

Sem. Aga. casti,

Purif.

Mellis pulvis. subtilissimi an. 3ß.

Ol. Nucis 3ß.

Cera q. l.

M. f. Linimentum.

Quo illinatur totus Venter calide in introitu lecti. Alia etiam locum invenit unctionio partium tumens cum spiritus Vini, vel simplici, vel juniperino, addendo parum de Oleo Carvi.

Alii Olea Bufonum, Scorpionum, Juniperi, Laurinum una, similiter Abdomini illinunt.

Vel

30. Unguent. de Arthanica 3i.

Agrippae

Diathes an. 3ß.

Ol. Scorpion. f. 3ii.

Chamom.

Aneth. an. 3ß.

M. f. Unguentum:

Crebè tepide Abdomini illinendum: S.

Unguentum Dificiens.

Vel

31. Unguent. de arthanica 3i.

Agrippae 3ß.

Ol. Scorpion. f. 3ß.

Dophilat. Bufon. 3ii.

M. invicem & illinatur Abdomini.

D. S. ut antè.

Vel

32. Unguent. de arthanica 3i.

Agrippae

Diathes an. 3ß.

Ol. Scorpion.

Chamom. vel aneth.

Amigd. dale. an. 3ß.

Succ. Raphani 3ii.

M. f. Unguentum crebrius Abdomini illinendum.

D. S. ut supra.

Balnea à quibusdam commendantur: sed via alia in Aethica, locum habent.

H h h

Quid

Quod si *Gangraena* aut *Ulcers Pedum* vel *Seroti* in Hydro-
piciis adfint, Topica pro his seletia vid. in M. A. N. C. Ana.
6. & 7. Attend. sur. 220.

De *Caris Magnificis* ad *Hydropem* affectis, nempe dum Vesica fuilla urina /Egri impletur in fumo suspendenda; vel dum sanguis ingri putamini Ovi inchoatur, &c. nil at-
rinet dicere. Item, dum rarsa Unguium manuum ac pe-
dum cum findone rubra Cancro vivo in dorso alligantur, &
ita in aquam fluorem proiciuntur.

Haze de Anafarca, Cachetia, & Hydaspes.

Pergo ad alia vicia Nutritionis latus; & quidem ad effectus Cachecticos multa alia pathomata pertinent, adeo, ut etiam sub Cachexia *Mertii*, seu *Cachexia Mertii* comprehendatur, corpus vel flavescit, vel nigrescit, vel viridescit, vel plumbeo sit colore.

Sie ergö

ARTICULUS IV.

De Nigro Flato, Nigro, & Albo.

Icterus seu Morbus Aquosus, sicut Corporis Catensis, Partibus solibus flavedinem inducens, Urinum obscuro rubedine tingens, ut plurimum cum Cardialgia, dolori hypochondriorum, præprensio dextri, Torminibus Ventris, Alvi segnitie, interdum Diarrhoea biliosa ac lassitudine membrorum, item Lithopythia composita, est multiplex, eique tot sunt species, quot colores in corpore efflorescentes observantur: nempe datur Icterus Niger, Plumbeus, Floridus, qualem PETRUS FABER Cir. 28. et 31. recenset. Licet autem varii fiant quod colorum, in ratione tamen omnes conveniant, & sunt uno indidemquebuti, ac saltem gradualis causæ morbois differentia à se invicem distinguuntur. Quando Ægri colore flavo, in corporis peripheria efflorescente, trochi observantur, vocatur *Icterus Flavus*: quod si flavedo illa tunc ad viriditatem, tunc ad cæruleitatem, tunc obscurorem flavorem inclinet, *Icterus Niger* vocari solet.

Quod *Hydrops* affectus huius: Idcirco praefens quidem
est facillime manifestat, immunes vero disculcat à pri-
ori cognoscitur. Alias omnes *Uteri*, praeterim *primarii*,
de *Dolore compressio Praecordiorum & Stomachi*, interdum
vis tolerabilis, mihi conqueruntur: vid. M. A. N. G.
Ann. & S. Obs. 99. 101. item *Ann. & S. p. 304.* quae
praecordiorum inextinguibiles angustiae Idcirco ferè conitari so-
let, licet eor plane sit immensa: hinc saepe venit falsissimè
se causas *Alimentorum* à subinde *Cephalicis* admodum
rationali. Verrugines de *Scotomiae* conunguntur, ita ut
Ergo *Syncope* & *Lipophymia* imminet. Adeli praeterea
Lufitudo rotatur: Corporis & omnium *Membrorum*, quibus
Dolores gravitati in regione *lumbari*, subinde difficiet
admodum relatiopnes anxietatis ista Praecordiorum
unguntur, ita ut spiritus defectu vis verbum praeferre
conatur: Urine impeditur Idcirco flavum manifestat, cum
quid Latens appareat, fed potius, ut vocè *ZACUTUS*
LUSITANUS, *Spina*, i. e. *graffi* *rufta*, *ruftant* *ru-*
fo, *olofa*, *erofa*, *opra*, *magis* *magis* *rufticanda*. *Germani*,
vanckel und garft nicht gelte, qui huiusmodi caudum immer-
sumo flavillino colore, tanquam si Croco tintum e-
ret, impraegnantur extrahitur, quod illa urine quatenus-
que, colore quamvis inextinguibile, non fluctat, & vis
in ullo alio Moxbo contingit, unde terti finis de Idcirco:
quod si fobederit, Sedimentum quasi argillaceum fepo-
nunt: interdum ex viridi nigrescentes obtevantur Urine.
Hicè fuccedere Habitus Corporis mutatur, & primario
in Oculorum alio foleat vel flavedo vel nigredo apparere,
cujus rei ratio nulla est, quam quod album Oculi sit re-
te mirabile, ex variis minutissimis Arteriolis intertea-
tum, sit patet hoc in Ophthalmia, ubi ha ipse magis fons
conspicue; per quae Vafa diftributum contentum flavum,
illud fenfibilibus magis tingit, cum mihi fit coloratum.
Jam ergo cum tura recemenda in Milla Sanguine con-
tineantur, fit ut fuccellive vitiatius color emergat, donec
magis magisque Corpus tingatur, quae tindura adeo in-
tenfa observata fuit, ut luteumina fudor praeumpens
colore flave infecerit. Saepè upurium, idque in confir-
matum, non in omnibus, americanis etiam varis in Ore
percipitur, upurium est nonnulli amarus ex Lympha
corrupta, cui reit fempè *Sitis elemofa*, juncitur, unde
& Corvium horret Aegri, alium appetentes potum.
Imò Idcirco cum Febre conando alvum nunc est fluida

esse Diarrhœa quasi biliosa est juncta; sicut talem etiam observavit Puter. Fœces tindas sacramento; nunc contraria pertinetur clausa, & quæ nullis Purgantibus relaxari potest, excrementis præduobus albicantibus, & id observavit ipse in Muliere per octiduum Alvum non deponente, tandem Fœces albas & caducentes monstrare: idque contingere solet, quando Duo Felles in Intestinum hiantes undecunque sunt obstruisti, & sic quasi Fluxus Calcule affligit. *Fœbris interdum juncta est, interdum penitus absque, interdum ad ante Alvum, cuiusmodi Alvus supervenit; nunc Criticæ, prægressis fluxibus.* Cœdiosis debet Criticis obviens, nunc symptomaticis sine cœdiosis signis prorumpens, per se tamen Alvus sine febris infusus solet emergere. Nunc cum Alvus sine advenit Fibriula levis, orta est Fermentationis Sanguinis anda, quæ precipitatur Maffis Sanguineæ. In quibusdam, non in omibus, Dolor in Hypochondriis dæmo obuius in profundo percipitur, Sabiende facile cunctor, subinde autem est nimis contumax, non semel curatur, facillimè recidivans, quo in casu signis Calculi ad Vesicæ felleas observari hærent, qui ipsi iun modo sunt i. fleri crebris recidivans, aliudquæ nullam habemus f. esse Calculum.

Icterus nunc est Morbus Primarius, nunc est Morbus
Secundarius. Hinc, quando vel Febrix supervenit, idque
tam Continua, quam Intermittebilibus Chronicis, ferè se-
crisius, post prægressa coctionis in Urina signa de iudi-
catorio superveniens, live fit Sympomaticus, vel quando
abscessus Venosus alampis, & impingit a morbo Ani-
malium venenatorum, Icterus oritur. Exempla nonnulla
curiosa refert MARCELLUS DONATUS in *218.*
Méd. Minéral. l. 3. c. 6. 9. & post morbum Arteriarum In-
flammatum Icterus flavum observavit JOEL in *Præxi* ad
de *Neurisy* p. 226. & iuxta Viperæ morbi laboris ordinario
ferè Icterus jam Veteres auctoritatur; sicut ZACUTUS
LUSITANUS l. 5. *Méd. Princ.* lib. 39. refert: Nec tan-
tum Viperæ, sed & Canis rabidi, morbi ortus fuit Ictus
contumacissimus: Icterus lethalem à manifestatione
semelitis Staphylytis notat LOSSIUS in *Obs.* l. 3. *Obs.*
38. p. 239. Vel denique Affectus convulsus Ictusoriam,
præsertim teneigam, sequitur, & sic à Partu laboris in-
fante observatur superveniens Icterus. Passioni Hystericæ
quoque supposita in Muliere quadam superveire vidi: Colicis
Tortuosis subinde Icterus supervevit. Quo pertinet,
quod refert BARTHOLINUS *Cent.* 5. *passim*,
62. Icterus provocatur per Medicamentum sudorificum
in Calicæ alampis: sic Icterus vulnerato Capite su-
perveniente dicit & notat HOECHSTEDTERUS *Diss.*
pag. 168. Necnon fœtus Vulneribus Capitis gravioribus ter-
tu de aut-eo-que quadam Vomitus biliosus supervenire so-
let; ita & confusus Ictus ratione etiam Icterus, acce-
ptis secundarius.

C A U S A.

Quoad *Fluvium Primarium*: *Causa remota* sunt variae. Non ultimum locum obtinet *Triginta*, quae nunc incipit, nunc foret iterum, tellus **HELMONTIO** *Tract. Insularum Dissert. §. 26.* Sic iterum eurasiam a tribu Nili receduntem reuertit **BARTHOLOMÆUS** *Atlas Med. Hist. Pers. Vol. 3. pag. 52.* *Præcausa* etiam non raro iterum provocat. Nempe **RIVERTUS** *Cons. 2. observat. 9.* iterum mirandum in *Gravida* ex Ira refert, in qua facies Alvi erant biliosæ, et in lecto assignat, extra illud incensum patiebatur flavedinem. *Obstructiones* Ductus Cholechodici subinde in *Melicis* observate fuerunt. Ante aliquot annos hæc vitæ quidam, qui perniciatissima Alvi obstruètiōne, cum Colicâ intermissâ affligebatur, cui iterum a Febri Continua superveiebant, huius lethales: Abbitu diffinitione facta adverterunt, Felsis Vesiculam grandem et confertissimam, infumumque Pyrum vicidua putrida penitus obstruèti, adeo ut post abscessum hujus Ductus Boliarii ne putra quidem Nili profunderet, quia Nili ibi contenta crassissima atque tenacissima erat. Ac sanè in pluribus *Idiæ* vel *Ris* vicidua, Amuræ similis, vel *Calculi* plures vel pauciores, majores vel minores, in *Cystâ* fuerant inventi: vid. **BARTHOLOMÆUS** *Atlas Med. Hist. Pers. 3. pag. 59.* et **PANAROLLUS** *Pers. 1. observ. 27. et observat. 22.* **DEODATIS** in *Palæst. pag. 250.* refert iterum lethalem cum puriginosa Læitudine, et vigis hinc inde erumpentibus Tuberculis: in Cadaveræ tres *Lapilli* in *Vesicâ* felicia recepti fuerunt: Pariter ac **TIMÆUS** cum *Guldenius* in

Cal. Ictericam post Arthriticam diuturnam, supereminente Hydrops icteralem, ex calculo magno in Venucla selecta notat. Ac tunc ad Ictericum prout Calculosi, ut Observationes prædictorum testantur. vid. le RHYNE de H. Med. p. 222. & M. A. N. C. Ann. 1. Offert. 189. p. 164. Calculi enim huius modo sunt arago Icteri crebrius recidivantes. Aliis vulgo Ictericum Ictericum dependere ex folliculo Felleo obstruendo, quod iorandum quidem verum est, sed non semper: quia etiam sepius & frequentius in Calculis, in fundo folliculi Fellei hærentibus, is procreatur. Nec tamen hoc univiale est, quia sepius in Ictericis folliculum Felleum aut Ductus biliaris apertos esse, non solum docet debita tinctorum Excrementorum excretio, sed etiam sepius in Ictero demoustratis dissectis Ductus fellei aperti forant, teste HELMONTIO l. 2. sicuti in febricitantibus Ictero nulla Hepatis aut Ductuum biliarium obstruendum suspicio adeile potest: ita ut Mæus Cylliscus satis per se sit putatus, & per eundem Bilis ingressus & egressus ab his non impediatur. Ex his ipsi Icteri aliud quod Hepatis Obstructionem, aut Pori Choleodochi intarctionem, insulse censibile facit patet. (D)

Potest ex Ulcerebus quibuscumque intertatis Crurum occlusis Ictericum Flavum natum observavit AMATUS LUSITANUS Centur. 3. Cent. 13, ubi certe aliud quid necesse fuisse, quam solus defectus excretionis Bilis? Item ex Menibus inflantibus, sed non prodeuntibus, id pathema notat BARTHOLINUS Cent. 5. Hæm. 62. sicuti HENRICUS ab HEER Off. 6. Monalem Ictericam ex Cachecticam ex Menium suppressione observavit. Vid. WILLISII Pharm. Rat. p. 2. Sect. 2. cap. 1. p. 240. Vultus Sclopeti Ventrucium penetrans Ictericum produxit; vid. BARTHOLINUS Cent. 6. Hæm. 35. Item a Scorbuto sine Felleorum Valsorum angustia Ictericum observavit LOSSIUS lib. 3. Off. 33. Denique & Hepar induratum & inflammatum, aut Scirrho obduco, crebro Icteri solet inlequi.

Disiudat alias Ictericus in Flavum (qui Viridescens intertetur) & in Nigrum, quem communiter vitio Lientis fieri contendunt, & ab Humore Melancholico derivant: sed hoc tandem ex Veterum præconcepia Opinione & Hypothesi de quatuor Humoribus in Massa Sanguinea contentis. Nam dicuntur: sicut Sanguis Corpori dar floridum colorem & suaviter rubescendum, Putra verò habuit cachecticum; ita necessarii Bilis vitia Ictericum Flavum, & Humore Melancholicus ille edus variatus Ictericum Nigrum inducit: hinc ut præsuppositum saltem præter alias, quæ dedit turbas, tanquam antecedens saltem & alia consequentia falsi produxit. Nam quia Bilis in folliculo Felleo ex Hepate cum Excrementum colligitur, & folliculo hoc obstruendo, aut Ductibus Felleis infardis, saltem Ictericus Flavi fieri voluerunt, quoniam nempe, ut dixi, Bilem tanquam Excrementum per Hepar tractolandum non rite per Vasa Choleodocha expargari crederentur. Et quia Lico sibi flatusus buia Humoris Melancholici, ob id necessariu in Lente saltem Icteri Nigri fontem quæverunt, quod nempe hic ipse non sufficienter separat ac expurgat Scorius, hic dictas Melancholicas, quia potius hæ ipse in Massa Sanguinea congestæ ab eius Facilitate Expulsiæ, tanquam a matura fusione ad Habitum Corporis deponantur & detrudantur. Hæc satem Hypothesis refellitur partim Modernorum Theoria, partim Experimenta: ac ex supra annotatis manifestum est, Ictericum, in specie Flavum, sæpius oriri citra impediment Bilis motum ad Intestina, aut citra insufficientem secretionem ex Hepate, quod non tantomodo multo sibi Icteri Flavi, in quibus tamen Alvus aperta, & Fæces flavo ordinario colore tinctæ conspiciuntur, sicut etiam RIVERIUS Cent. 2. Off. p. observavit, sed etiam post Febres, Menes suppressos, & Ferarum motus natu Ictericus Flavus sine Obstructione tali observatur. Nec à copia & abundantia Bilis propter defectum excretionis oriri potest Ictericus; loqueretur enim, eandem debere curari per Medicamenta Bilem præcipitantia & Tom. II.

corrigentia, ut Acidis: contrarium tamen testatur Praxis, cum potius Salina solatia acris & insigniter Amara in Cura Icteri primatum obtineant: quæ potius Bilem augmentant, & acritiem reddunt, quam quod immutuant aut corrigant.

Tandem posito, Bilem expargere ex folliculo Felleo in Massam Sanguineam, quæ unquam persuaderet, tam Corpus potio colore adeo flavo, cum ex in centro suo elegatissimum albidissimum habet ruborem, cum eius alcum sit rubicundissimum, quo ipso similiter tingit Chylus, licet intensius, in Intestinis, ut exaltetur promptus in Sanguinem? Potius ergo Bilis Sanguini permixta ratione latis copiosi ejus rubem tincturam exaltat, quam quod flavidine conspurcet: item tales Icteri, in quibus Fæces alvine colore ordinariu à Bile tinctæ, sunt ut plurimum (non semper) ii, qui supervenientes ordinario Febribus; qui Icterus supervenientes Febribus est frequentissimus, & sepius in declinatione Morbi: quin in Continuis citra imaginariam Hepatis & folliculi Fellei noxam non raro supererit Icterus, five symptomaticus, five criticus, in quibus nulla lites Hepatis conspicietur, & Alvi Excrementa lute flavæ.

Nigrum Ictericum juxta attinet: hunc non oriri ex obstruendo Lientis, patet inter alia ex eo, quod Icterus Flavus deatior tenet in Ictericum Nigrum degeneret; unde & Nigrum essentialiter non differt à Flavio, assertu WILLISII de Urinis p. 335. & Humores biliosus aut Bilis analogos Ictericum Nigrum producere probabile fit, quatenus ic. ab Acido præternaturali interdum in primis rig effuso, frequentius in Massa Sanguinea abundante, illorum flavo in virorem, modo pallidiorum, modo obduciorum, nigredinis æmulum, maturat, & mediante hoc color partium naturalis tincturæ. Bilius quidem Humores materiam quæ primam hinc prodromo morbo sopeditare collat ex eo, quod PLATERUS l. 3. Off. 575. observat Ictericum Nigrum, in quo Excrementa Alvi minus naturaliter tincta, sed omnino alba apparuerunt, in quo tamen Hepatis potius ac Valsorum Choleodochorum, quam Lientis rictum subesse videtur, hinc Pr. Tom. 3. pag. 96. eandem à Bile intra Venuclam ac coacturata deducit. Unde probabile fit, Ictericum Nigrum quandoque vitio Hepatis generari, modo si bilisæ molecule a Sanguine intra Hepar non seceantur: five hoc fiat ipsius Hepatis rictu, aut Valsorum angustia; five in Ictero Nigro Laborans Hepar aliquando Scirrhosum VESALIUS l. 3. c. 15. & M. A. N. C. Ann. 1. Off. 37. testantur: five rictu Lientis, materiam Bilis ad secessum non citè disponens, utpote à calas aberrationibus similiter interdum Ictericum Nigrum consingere afferunt FORESTUS l. 19. c. 20. & ex Off. FABRICII à AQUAPENDENTE, & BONETO Sepulchr. p. 1007. : hunc vitio Ventruculi Laticem ejusmodi fulcum producentem, vid. WALÆUS Præx. 2. 1. : nam rictu Bilis crassioris & fusce magis, intra Vasa Biliaria congestæ, vid. PLATERUS Off. p. 612. Acidus autem Humores ejusmodi colorem æruginosum atque porraceum Bil inducere, multa Modernorum Experimenta confirmant. Accedit, quod, fatente eodem PLATERO, nec in Liente, nec in alia Corporis parte, æruginosusmodi Latex Melancholico Veterum æquiparandum obreteret: Item quod THONERUS Off. l. 3. p. 154. in Ictero Nigro laborante Oris amarorem biliosum testetur: Sic quoque rectè notat LINDANUS, le in Fritia multos carasse, ob Latu usum copiosum & Calid. Scirrhos ac similes Tumores duros Lientis habentes, in quibus tamen nunquam vel minimum Icteri Nigri observatæ reliquum. Et certum est, in Hollandia tales Scirrhos & Tumores sunt frequentissimi, non tamen Ictericus observatur Nigri, adeoque ut Lien fit infons, quod SYLVIVS quoniam confirmat, dum testatur, quod multos dilascasse etiam Ictericos, in quibus Lien fuerit acutus & tamen hoc Vires semper sanum & vegetum Ictericis. Interim tam quod Bilem & Valsi Fellea, & inde oriundum Ictericum, non adeo omnia sunt plura, Suprà notatum fuit, Ictericum sæpius observa-

Hhh 2 ri,

(D) Probabilis valè est sententia Cl. Lucæ Tozzi Præceptoris mei æternis clementi, decemsi circa Bilis humoris vitium, Duellumque Cholei icterum obstruendum, Ictericum fieri ex Lymphæ & Sero Sanguinis exaltis, atque flavum colorem adeo, & milturam salis ætate præditi, seu succi acidi cum Lymphæ seu etiam sale imbure, seu si ferri modo, ac expersiter Lixivium ex cineribus plantarum in aqua elixis paratum flavescere, ac in crocum colorem virgere, si acidum, bulla mensura superfundatur: quia, subdit, & Lixivium ipsum sinuato & acri cinere aspersum, phlegma deest & floribus, non leviter rubescere sicut, & rufum colorem inducere. Et sicut id confirmari ex eo poterit, quod Morbus Regius Cachexiam, h. e. humum ferri & acidis phlegma abundantiam, nephriticum infestatur.

at, dum Lapides Folliculorum Felleum replent: Verum non semper lequitor Icterus hoc Lapides. Memini enim ante plures annos dissectam hanc fuisse Mulierem capite multatam, quæ in Folliculo Felleo copiosum Lapidem majorem & minores collegerat, sine tamen Icteri vestigio, nec quomam illam pilla erat: Et eodem tempore dissecimus Corpus masculinum, in quo principium erat Anasarcæ; erat enim fultum-dum, & aperta ejus Cuticula cum cultello copiosum serum effluebat, in cujus Folliculo Felleo non gutta Bilis inveniebatur, in quo tamen nullum Icteri vestigium, qui maxime debuisse adesse, si vera esset communis Hypothesis. Sic Canibus Felleum Felleum posse exsiccari sine vitæ aut sanitatis incommodo, notum est: sicut per litteras superius mihi communicatum fuit ab Amico, in Universitate Batavo-Logdunensi quodam Medico Candidatum ante 3. menses Cani totum excelsu folliculorum felleum, & Abdomen denud confectum, qui ipse adhuc vivens omnes operationes perficit sine omni incommodo. Egregium Experimentum, quod adhuc potest duci occasione meditando ulterius de usu folliculi Fellei. Sed mones, quod Porus Choleochus & reliqui fuerint adhuc salvi & integri. *Quæ supposita, nihilominus cum Veteribus cruciari debet Recentiores, ita ut his Dissipis æquidem Hæmores in Ictero Nigro concedamus, non tamen, nisi ab acido, quod Veteres Melancholicum vocabant, immutatus & precipitatus, adeoque & liquis sui modo ad Icterus Nigrum producendum Interdum concurrere statuentes: Conler, FERNELIUS lib. 19. Observat. 20. & 23.*

Et ad hoc potest:

1. Quid licet Icteri sint diversæ Species & Colorum varietates, in radice tamen, Causa & Modo fendi, omnes conveiunt. Omnes enim *aut sunt Morbi, aut aquosum Causam, aut sanguinem etiam obtinent Methodum medendi, uti reus inquit FABER in Pathol. pag. 364. Paragraph. 6. Quod confirmat SCHENCKIUS lib. 3. Observat. pag. 423., qui notat Icterus ex Obstructione Menium, in quo successit quatuor colores fuerunt observati. Adeoque Icterus Flavus & Niger non differunt specie, sicut nec Icterus Viridis, quæ cum gravissimis Symptomatibus notavit PETRUS JOHANNES FABER in Carot. 71., nec colores plumbei, alique plures viri, cum ex una fonte omnis oritur, ac in genere omnes Icteri species ex Crasi sanguinis inligniter vitata, seu ex Scælis splendoris crudioribus primarum vitarum sanguini commixtis, postmodum Cutim tingentibus, dependunt.*
2. Immediatè nempe sequitur vitiatum Maffam Sanguineam, camquo à speculatis Alimentorum non citè digestorum imparum redditum, præpter confusum heterogeneum, nec citè permiscibilem, donec imbibita illa Recrementa partim per Urinam excreantur; unde hæc sunt variæ coloratæ, crassæ & turbidæ, hinc depositum sedimento densum apparent; partim verò, & quidem maxima ex parte, per vasa capillaria quasi filtrata vel transcolata hinc inde, in specie ad superficiem partium solidarum externarum deponuntur, quæ pro coloris sui varietate nunc flavæ, nunc viridæ, nunc lividæ, nunc nigredine, tingunt. Vehiculum eorum est Serum. Hoc autem non solum in Ictericis post Venam scdam flavissimum conspicitur, sed pæterea quoque ex excitatis Velicis intensè croceus Liquor efficitur. Quid si illa Massa sanguinea tandem ad solum puritatis statum redeat, sanas efflorescit: si vero hæc ipsa tandem omnino in sua Crasi depravetur, Mors necessarii lequitor. In statu quasi neutro inter Ictericum, nunc ad convalescentiam, nunc ad decedentiam prout.
3. Quid dicit Imperitias necessariò Maffam sanguineam afflictemus nonnullis ex primis viis deducendæ sint. Licet
4. In extraordinario Ictero, qui sequitur Animium venenatorum morium, Massa sanguinea à sermone putrefactivum inquinata tandem efflorescat in Icterus.
5. Quid Icterus ordinariò originem ducat ex primis viis, & vel ex corruptione Chyli in Ven-

triculo in tale liquamen sidosum flavum: vel ex Chyli corruptione, sicut in Duodeno à perveria miscela succorum Bilis & Pancreatici vario modo corruptorum, non ritè Chylum perfectum & elaboratum, sed potius insigniter vitiatum.

Ergo ea, quæ hæc præstant, sunt partim Symptomata in Ictero observabilia, quales sunt anasarcæ, angulæ Præcordiorum & Lipothymia, partim Excreta per Alvim plus minus vitata. Unde colligitur, tres quasi affectiones, quibus mediandis existit Icterus:

1. Ex corruptione Chyli in Stomacho in liquamen sidosum.
2. Eisdem alteratio in Duodeno à succo Felleo & Pancreatico; Et
3. Fermentum putrefactivum, seu Venenum, Maffam Sanguinem inquinans.

Hic ita præmissis ad Causam Proximam propinqua accedamus, quæ est Serum antirium flavissimum præternaturaliter imbutum, adeoque corruptum: cujus corruptionis triplicem Causam concipere licet, aliam nempe in Ventriculo, aliam in Vasis Biliaris, & aliam in Massa sanguinea.

Ut ergo jam propius ad scopum accedamus, notum est, secretionem Fæcum alvinarum in Ictericis fieri per concursum Bilis & Succi Pancreatici, qui duo Succi per modum præcipitationis separant à nutritio Chymo Alvi Excrementa, & simul certo modo alterant Chylum ad futuram promptiorem sanguificationem: vid. TACKIUS de Chrysemya. Si ergo ritè fiat Chyli digestio in Stomacho, & ejus præcipitatio in Duodeno, & consequenter perfecta Hæmatosis, rubicundum florido sanguine conspersum Corpus viget, dum utilis Chymus suggeritur Maffæ sanguineæ, per quem eadem in continuo flore conservatur; cætera tamen partibus simul ac verò hæc ipsa secretio vitatur, necessest Chylus corrumpitur, qui Massa Sanguinem permiscetur, & inquinatur variis recementis: quæ ipse particulas excrementitias variis fallibus impægnatè mixtas erant unibiles cum toto liquore, unde necessitas sanguinis militat ejusque crassa vitatur, & in varias ac inlignes diversas eadem deprehendit pro varietate lase separationis Fæcum à Chylo, & hinc notorum variorum Excrementorum lingulæ permiscitur.

Jam verò uti liquor Bilis seu liquor balsamicus naturaliter in Ictericis tingit Chylum (noti invisiibiliter propter acidum Pancreatis) sulphure suo rubicundum, ut promptius sanguificari possit, & juxta hanc tincturam sanguinis simul Chylum balsamicum suo sulphure tingit & præstatur, quod minus corruptionis, verminationis & putredinis subit: & tertio cum succo Pancreatico eadem conjunctum Chylum utilem separat ab Excrementis alvinis: ita necesse erit, ut his duobus succis vitatis, in specie Bile insigniter depravata Excrementa heterogenea & copiosa in Massa sanguinea colligantur, & dom à bile depravata vitiosè sunt tincta, exinde etiam Massa sanguinea variis, nigræ, vel ex nigra viridescens vel flavescens colorem acquirat, idque pro varietate concretioneum, præcipitationum, ac separationum: quæ sero imbibitur hinc ad extremam partium solidarum superficiem deponuntur. Cæterum à posteriori incipiam, separatio hæc recementorum fit nunc cum nunc hoc fœt Effluencia febrili, & hinc Icterus nunc per se Morbum constituit, nunc à Febre dependet; sive ea jam ab extra sanguini infundantur, sive vitæ digestiois primæ inde communicentur. Utroque autem modo mediante Sero in extremam superficiem partium solidarum deponuntur, tam externarum quam internarum; cuius rei Hæmatem videbitis in ZACUTO LUSITANO Nigro. 3. Præ. Adm. Obs. 56. qui in Ictericis mortuo non eorum solum Corporis Habitum, sed etiam interiora Viscera sua deprehendit: sicut similiter HILDANUS Fortem ab Ictericis Matre edum quoque Ictericum vidit. Quod autem impuritates illæ magis ad Cutem deponantur, ratio est, quia ibidem sunt Glandulæ Milites minime copiosæ, quæ imbibentes Serum, simul cum eo excrementa imbibunt.

Quoad Colorem in Ictero varietatem, ut res fiat magis clara, duo tenenda sunt.

1. Quando in genere omnis Color dependet ex textura particularum in superficie concreti minutissimarum, quæ Lumen immixtum succellere refrigerantes consequenter varietatem Colorem repræ-

representant: de qua hypothesis vid. WILLI-
SIUS de Ferment. cap. 21. ubi de Coloribus per
varia mixta excitatis; BOYLE Tractatus de Co-
loribus, GRIMALDI Tract. de Oculis, ubi ap-
petitissimum Experimentum demonstratur, quod nunc
per varias Precipitationes, per Salia, nuoci-
da nuoc urinosa, factus insigniter ac in momen-
to Colores possint mutari, &c. Liqueurum illor-
um, in quibus sunt variae Precipitationes,
Unde

2. Sicut ratione connexionis & testatur particu-
larum per varias Precipitationes & Separationes
Immutatur perfectio Lucis: ita pro ut Recre-
mentum istud diversam habent naturam & tes-
taturam, extensa etiam diversum Colorem repre-
sentant.

Ubi magis præponderet vitium Olei Urinosi Bilis, ibi
magis Color Flavus confpicitur; ubi verò magis Acidum
peccat concentrans Bilem, Color ad Lividum, Viridi-
tatem, & ad Plumbeum quasi, declinat. Item ita se ha-
bere, confirmant Experimenta cum sanguine emisso in-
fusa, dum enim hunc variis Liqueoribus infunduntur, emer-
git nunc color Viridis, Nigri, aut intensi Rubicundus:
qualia Experimenta videbimus in BARTHOLINO Cap. 3.
Eph. 97. pag. 422. ubi Sanguini calido ex Cane vivo emil-
lo variis Liqueoribus fusi sunt immixti, pro liquorum salino-
rum varietate & ipse Sanguis variis Colores, varias consi-
stentias, & similes proprietates acquirit.

In genere omnes liquores Salini Urinosi eidem Colo-
rem incrementum tribuunt, ver. gr. spiritus Salis Am-
moniaci, & Oleum Tartari per deliquium, magis tamen
hoc seu Alkali fixum, quam ille seu Alkali volatile: Om-
nes e contra liquores Acidus obscurum, tæneum, fæcu-
lentum, & similem ipsi contribuant: Pellusiam Omnium,
qui factus per solutionem Aluminis, cui sanguis calidus
fuit mixtus; ex tali enim Nigri, & fæculentus, ac luridus
apparuit.

Jam ergò ubi Massa Sanguinea in corpore vivo tam
variis foris incrementis & sibus, ex vitiosis in In-
testinis separatione, est purgata, necessarii facta illa sepa-
ratione & præcipitatione Excrementorum varii & novi
colores, quos antea non habebat, exinde emergunt; ea-
dem ratione atque Art imitatrix Naturæ ex diversis præci-
pitatione diversis coloribus liquores tingere & pingere
sunt, dum antea permixta inconfusa, jam præcipitata &
aliquantisper separata reddit conspicuis, adeoque ex diver-
sa Luminis refractione colorata.

1. His præmissis, in specie tres occasiones illas ad Ict-
erum disponentes evolvement: quarum Prima latet in Sto-
macho, nempe in bugis corruptione, aut si Assumpta in
liquorem flavum amaricam degenerent. Ventericulum
int idem solum Cruditates Felli æmulas loco Chyli lau-
dabilis producere inde constat, quod non tantum ejusmodi
Biliosa sub dyscrasia Ventriculi Vomitu aliquando reji-
ciantur, sed sæpe non à commissis Diætae erroribus Ict-
erum eum Appetitu prorsus & Præcordium angustia
obstruant; ver. gr. 2. Potu frigido; item à deglutito Ni-
cotinæ fumo; vid. BORELLUS Cap. 4. Obs. 21. &
à Saturei devoratione; vid. FERNELIUS de Cur. Luis
Renæ cap. 7. & quædam huc HORSTII Obs. 16.
l. 4. Recidivæ in Icterum & Febrem ab immo-
dico Panmorum, & Caffæarum usu: item hujus loci videtur
Icterus, quem RIVIERUS Cap. 2. Observ. 9. præ-
ter rationem Hepati accessit contribuit, ita ut Fe-
bris omnibus per manifestas sequi ac ignotas vias ex Fol-
liculo suo ad Ventericulum decessu COITER Observat.
Anatom. Chirurg. pag. 252. suspicetur, & maximam par-
tem in hoc productum videtur. Jam verò in omnibus
Ictericis, paucissimis casibus exceptis, observatur urgere
primario Symptomata Ventriculi circa digestionem, &
Ægri circa illud negotium ordinari vitium quoddam
sentiant; imò, si Juvencis consideramus, post Vomitoria
præmissa, Martialis, & hinc Amara, totam adsolvunt
paginam: adeoque in omni Ictere Acidum aulterum in
primis viis adhuc peccare observatur. Saltem dubium est,
an hujus occasione secundum HELMONTII hypothe-
sin ex vitio Digestionis primæ, indeque natis scoris ni-
dorosis plis nimis flavescens, plus nimis amarican-
tibus, in Massa Sanguinea distribuit & in peripheriam
Corporis diffusis, Icterus oritur? an verò præstatum vi-
tium Fermentum, acidum aulterum, Bilem inquinan-
do, & hinc eundem secretionem debitam in Hepate im-
pediendâ, Icterum inferre? Sanè quod ex Digestione prima

visis, & inde Cruditate nidorosa, generentur loco Chy-
li amara Recrementa, aut dulcia, flava, & sic porro, do-
cent Vomitus flavescens maculati post erupulum: qui
non dependent à Bile, cum hæc nonnisi in vehementiori
Vomitu reddatur; sed sunt revera ex Stomacho, tunc
nempe per Pylorum non rectè fuerunt transmissi, sed re-
sentes, adeoque corrupta. Confirmant quoque Excreta
copiosa flava ab Infantibus reddita, quæ ipsa nil aliud
sunt, quam Lac in Stomacho & hinc in Intestinis cor-
ruptum; quæ similiter non sunt derivanda à Bile, quia non
sunt amara, sed quia à Castellis appetuntur, ideo potius
dulcis sunt. Adhæc Fructus horæi, Cucumeres, &c. Pin-
guis, Pisces, &c. in Stomacho nidore corrupti similes for-
des suggerunt, unde Chylus ejusmodi in Stomacho cor-
ruptus, nec ritè in Duodeno perfectus, sed vitiosè à Bile
& succo Pancreatico alteratus, adeoque ad Massam San-
guineam adductus, necessariò eam corruptum, & variis
precipitationibus & separationibus demum istos colores
& tincturas acquirit, & sic Icterus conficitur. Quid igitur
obstat, quò minus occasione talis Fermenti aulteri,
dolores Stomachi aut Præcordium inferrent, vitietur
digestio prima, & inde genitæ fordes nidorose in Cor-
pus distributæ, Icterum inferant? Et sic est intelligenda
illa allegati HELMONTII Sententia, ubi Icterus ex
hac causa natum graphicè delineat: in hoc falgini ipse
hallucinator, quod omnem Icterum hoc modo gigni
statuat, quod tamen veritati minimè respondet. Existimo
sanè, omnem Icterum, qui superveit scribis, non Bilis aut
folliculi Felli vitio, sed Diæta, & digestionis primæ vi-
tiaz occasione supervenire, non fecus ac illum, qui post
Venæsectionis absumm crebris mæci obliatur.

II. Juxta hunc tamen Icterum, eamque frequentissi-
mum, etiam secundò oritur Icterus à vario modo cor-
rupti Succi, Felli & Pancreatici, Chylum non perfecti-
tibus, nec tingentibus, nec debite à Fœribus strinis in In-
testinis fermentantibus, unde denique Massa sanguinea tota
vitiosa redditur. Visorum enim Biliorumum obstruc-
tione, compressione, aut quavis oburatione, Bilem na-
turalem; (eum modò dictum Icterus ex vitio Bilis Viteli-
line præternaturaliter in Stomacho genitæ oriæ, ex jam
dictis patet) istam nempe, quæ in Hepate secretenda, &
per Vasa Choleodocha excrendenda venit, ad Massam San-
guineam reurgitur, quotidiana doret Expectorata. Hæc
vel vitiosa, vel in debita distributione impedita, Icterum
inferit: Illa, causæ frequentior, gravitatem dat Icteri;
Hæc, rarior, leviorer inducit.

Bilem vitiatam quod attinet, occurrit ejus inertia, seu
deficiens acrimonia Bilis felina. Inert verò redditur vel
à modo dicto vitioso Acidum exortu primarium viarum,
quod imprimis Bilis ad vitiatam infringere, vitiare, testa-
ram ejus immutare, ac plus nimis inspissare valet, cum,
ut super, monuit, in graviore ac perniciatiori Ictero
spissior ac tenacior Bilis subinde inventa fuerit. Acidum
hoc vitiat Bilis, aut dum in Hepate est generanda aut
secretenda, aut eandem in folliculo Felli jam secreta-
tam non solum inficit, hebetabit, incassabit, & simul
ejus Sal volatile oleum in Calculos degenerando coa-
gulabit; sed etiam Oleum ejusdem variabile, istudque in-
eum reddit per tinctura Chylo legitime communican-
da: quibus occasionibus nec debite excreti poterit; quin
facile ex mutata consistentia Duodeni Choleodocha ob-
struere, & ita transgredi sibi ipsi intercedere poterit.
Hinc in quibus copiosi Calculi in folliculo Felli reperti
fuerunt, imprimis Ictero obnotati deprehendi sunt; ut de
vid. PANAROLLUS Cap. 3. Obs. 22. Et hoc à ne-
mine negari poterit, nam se eodem inertie innotat. Vel
quoque quando Bilis est nimis ferosa vel aquosa, ac nimis
pinguis, & in specie nimis alba, ita ut Oleositas fixa
obstant ejus Sal volatile acre balsamicum, primæ Di-
gestionis correctivum. Ac hinc, est quid ex abusu Spiritus
Vini Icterus obortum observavit SYLVIVS, deuti
ex abusu Pinguum simili Ego notavi. His ergò mediis
Bile labefacta, sit ut eadem non sufficiat perficiendo
Chylo, eundem à Fœcibus separando, & tingendo pro fia-
turus sanguificatione: unde Chylus non ritè separatus vi-
tio Bilis, nec ritè ab eadem tinctus, necessariò inquinabit
Massam Sanguineam, ejusque consistentiam inducet
crasin vitiatam. Deficit quoque Bilis, quando vel plene
non generatur, vel non decessit ad Intestina. Hoc de-
stant Obstruções in ductu Choleodocha repetitæ, scilicet
& Excrementa tunc temporis sibi, glutinosa, chylosa &
vitiosa, defecum Bilis, non delata ad Intestinum, suffi-
cienter confirmant; quia imò in talibus sapit Lumbri-
850

generantur, propter defectum condituræ balsmicæ Bilis; unde & in tali Ictero Dolores Colicæ percipiuntur ob Acidum tunc temporis abundans, ubi vulgò quidem dicunt, esse *Colicam Biliosam*; sed mali: potius enim est ex Acido non temperato à Bile: Et Anatome detexit, fuisse in talibus omnem transitum in Intestinis præclusum.

Causa vero, ob quam obstruitur Felleus, est, quando Bilis debita acrimonia caret; quòd si enim eadem tam debitam habeat, quævisque Obstructiones removet, ac ferè impossibile est, supervenire Ductus Choleodochi Obstructionem, quamvis ipsa naturaliter consistat est. Unde denique ex sola distributione Bilis Iasa, & inde genita cum sanguine commissione, oritur Icterus, quando Calculi meatui obstruunt, aut quando aliunde quavis ex causa Ductus Hepatici communes obstruuntur; vel quando occasione partium vicinarum, e. g. Intestinoorum renuunt ac speciatim Duodeni, Convulsionum, Vasa Biliaria in consensum trahentium, ac eorum Morum peristalticum inventientium, in specie oritur Ductus Fellei constrictio, & condensatione, Icterus oritur; cuius Exemplum in Partu laborioso, Passione Hysterica, &c. supra annotata fuerunt. Nempe non rarum est, in Ictero Alvi Excrementa hodie pallida, eras denud flavædine tincta coactip, & ita subinde evacuari, non quòd non obstruatur, nec denud tectetur Ductus, sed quòd occasione Spasmi intestinalis nunc constrictur idem, nunc denud aperitur, idque diversimodè pro occasione varietate. Sic HOECHSTEDTERUS Dec. I. Obs. 3. MARCELLUS DONATUS Hist. Mir. Lib. 1. 2. Vulneri Capitis, BARTHOLINUS Centur. 6. Hist. 35. Vulneri Ventriculi Scleroti globulo infuso, & Cent. 3. Hist. 64. & RHODIUS C. 3. Obs. 19. ac FORSETIUS Id. 19. Cap. 17. Colicæ ac Ictericæ Passioni Icterus supervenisse testantur, & à Vomitu nimio mihi observari, necnon à Partu difficili contingit. Atque hoc quidem Vasa Biliaria arata, tam radicalia quam distributa, præstat, quòd Bilem secretam aut non admittant, aut non emittant; atque verbè ratione ad Massam sanguineam illam remane faciant, hinc Intestinoorum Contractis sincuram naturalem subtrahant;

Et dido igitur Acidum Fermentum visio primarum viarum, & Bile, vel ex nidore præternaturali genita, vel Bile Hepatis naturalis, exque aut vitata, aut saltem male distributa, omnis Ictericorum varietas in Colore, ac differentia in Symptomatis deducenda: nempe, prout ab Acido præsto in testera diversimodè mutatur Bilis, quævisque etiam ipsa Colorum varietas emerget, cum prævalente potentia Bile, vel quantitate vel qualitative, sequatur *Ikterus Flavus*; prævalente vero Acido hoc, nunc simpliciter Acidus, nunc aliunde sua viriolaceo primarum viarum (live ex Stomacho secundum HELMONTIUM, live ex Pancreate secundum SYLVIVM, derivare velimus) *Ikterus nunc Viridis*, nunc *Purpureus*, nunc *Niger* oritur; quatenus nempe vel Oleum Bile concentrat, vel quatenus non tantum vitiosa Effervescencia in Ictericis Scybalarum à Chymo separatione naturalem depravat, sed præterea quoque Chylum non ritè à Bile periclitum depravatione & precipitatione in varium, obcurum ac tertium Colorem tingit & transmutat; unde non plumbei, nunc virides Colores emergunt. In horum ergo duorum Succorum vitis investigandæ sunt omnes Ictericæ Causæ. Declarant hoc Experimenta Anatomica, quibus diversis Acidis Bilis succo admixta diversum eidem Colorem impingunt; unde deduci potest: quòd magis Ikterus ad Viriditatem tendit, et magis Acidum periclitum; cum alijs notum sit, ab infiltratis Acidis Bilem naturalem ad obscuriorem Colorem, in specie Viridem, disponi. Sane observari aliquando in Urina Ictericæ, eni præ rictum Salis inillaveam, Sedimentum vitide extingit precipitatum fuisse. Certè dum illas insignes Ictericorum Cardialgie consideramus, Bilis in Folliculo notabilem alterationem, per Acidum austerum explicabilem, ut & juvenia, Martialis, Acidum corrigentia, quatenus scilicet hæc, primaria tanquam alias Remedia contra Icterus, Acidum vitiosa imbuunt & destrunt; Amara, aut Volatilia, Bilis dykrasiam emendantia (acripe omnia Amara Hepaticam sunt, ficut Acidum Stomacho) facile ad Acidum tanquam primarium agens destitutum possunt: ut addè *Ikteris Bile*, & *Impuritas ejus Obstruat distributionem*: Acidum vero aliud, concurrat ad Ictericum genitum; & quidem prævalente Bile vitia vel quantitativè vel qualitative, sequitur *Ikterus Flavus prævalente vero Acido, aut vitioso Imoq. Pancreatico*, imptimis *Ikterus Niger*, chil-

que species oriri videntur; ac proinde pro Inertia Bilis corroboranda Salis volatilia acria, pro infringendo verò Acido conducant Martialis.

Curavi his diebus Mulierem, quæ subinde tantum Intolerabili Cardialgia affligebatur, quam ordinariè sequenti die totius Corporis Icterus infestabat; brevis denovo uno altero die evanescens, sed redeunte quavis occasione ista Cardialgia, semper superveniente Icterus in Paroxysmo Cardialgie; Alvus liberè aliquoties fluxbat, utut postmodum clausa esset, Pulsus rarus, tardus, mollis, magnitudinem moderatus, debilis, prostratus Virium summa, Siccitas clamorosa. Diligenter à me interrogata, an maiorem perierit in Ore? semper negabat: sed sedula attentione observavit semper, quociens Paroxysmus Cardialgie instaret, fensere se sporem aerem acidulum ex ventriculo eructatum; Hoc sine quociens fensiebat, toties die aut nocte sequenti Paroxysmus Cardialgie, & hinc Icterus, superveniebat. Curavi tam *Pulvere Cardiacos Hartmanni*, & hinc *Aetheralem, Alcalinæ, & Animalium* partibus duris. Existimo, Acidum Ictus austerum irritasse Ventriculum ac vicinas partes oeruas, quarum ipsæ tam miserabiles Cardialgie cum respiratione difficili, & totius dorsi dolore, excitare fuerunt sub quo spasmo & Vasa Choleodochi cum folliculo Fellico diversimodè nunc constricta, nunc relaxata fuerunt; unde huius occasione Alvi libertas in Paroxysmo, cum alijs fatis facioris esset Alvi natura; illius vero occasione Bile impedita distributio, cum sanguine permixta, in Habitu Corporis secretio, hinc vagus ille Icterus. Hæcenus d'ida confirmat Tristitia & Ikterus, item *Ikterus*, ad Ikterum, ut supra didum, dispositio: Nempe Tristitia & Mærore omnes Humores incassari, Acidum fsum augeri, & ita affectus naturæ Bile contrarij, induci solent. Iracundia omnes Humores remittit ac mobiliores, ac Acido volatili acriores, reddere solet.

III. Ad tertium Ordinem, Sanguinem empe, contri- buunt Ikterum vel assumpta, vel in illa à costu vrenaturum Axiomaticum, verb. grat. Viperarum; vel etiam *Fermentum periclitum*, verb. grat. Uleum occulorum, cum alijs Symptomatis Ikterum inducentia: quæ quid. post CALENUM de Luc. Hist. 1. 3. c. 7. p. 3. MARCELLIUS DONATUS Hist. Mir. Lib. 1. cap. 3. & BARTHOLINUS C. 3. Hist. 35. annotantur. Hæc enim suo Fermento putrefactivo subinde immutatur & corruptum Massam Sanguineam, & præternaturalem ac singularem Fermentatorem ac Precipitationem inducunt; unde ex mixta ejusdem particularum figura diversimodè tincta, à Massa Sanguinea separata, & hinc Sero imbibita, ad extimas partes delata, in Glandulis Cutis miliaribus deponantur, & ibidem alienum colorem, inferant. Hoc peritotè *Febris*, tam symptomatica quam critica in Ikterum degenerantes; item Ikterus à Semine Staphyliginis magnitudine, obervante LOSSIO L. 2. art. 2. Scorbuto sine Fellicolorum Viarum angustia, de quo vid. idem LOSSIO Id. 3. observat. 35. ac denique à Mercurij suppressione, vid. HENRICUS ab HEER Obs. 6. BARTHOLINUS C. 3. Hist. 62. item WILLISIVS Pharmat. Rational. P. 2. Sect. 3. cap. 1. pag. 240.

Et hi innot tunc fides, qui inquiesando massam sanguineam Ikterum faciunt.

Impregnata ista Massa Sanguinea loco Chyli vitiosis Recrementis, hoc ipso naturalis ejus Fermentatio necessario turbatur: Unde antea in Præcordiis, dolor Præcordiorum compressivus, Lipothymie, Virium dejectiones, & similia Symptomata in Principio Ikteri, fæ æqueum erumpit Ikterus, fuit frequentissima, donec ita Excrementa à Fermentatione Sanguinis naturali, aut Effervescencia ejusdem fibrili separata, & Sero involuta (precipitata vocant Chymici) dom cum Massa Sanguinea circulari motu rapiuntur per Patres solidas, in horum porulis tanquam filtris & coloratilis hæreant, ibique loco Succi nutritivi subsistant; ac successivè densius aggrinatas partes solidas colore adæ peregrino inciant vario, prout varias Excrementa varia Precipitatione in Massa Sanguinea varias acquirit colorationes, simul quoque Excrementa ista precipitata & separata, à Sero imbibita, per Urinas otterantur. Unde in Principio Morbi Urina fuit clara, aut saltem simul opaco, ingruentem scilicet Sanguinis Fermentatione, & excrementarum particularum separatione. Tandem verò, ubi precipitata & separata fuerunt Excrementa, Urina saturata, & copioso Sedimento onusta, elaxa evadit ac naturalis, aper-

spento ligno, fermentando separari & segregari in Massa sanguinea escrementa, quae aut per Urinam excreantur, aut in habitu Corporis designantur.

Hinc Tragedia auditur tandem, docepit facci hi corbici, & cetera Massa sanguinea, hanc ad naturalem crassam rediit, & quicquid in habitu Corporis, nunc per sudorem, nunc per insensibilem Transpirationem dissipatur.

Modus ergo, quo fit Icterus, est hic: lo Massa sanguinea coagula escrementa varia insilire Faciem in Manus fermentant separantur, & separata ac precipitata acquirunt tam distinctos ac tetros colores, & dum sepi innotata hinc inde haerent in partibus solidis, aut cum urina excreantur, necessitate tam varium illud partibus infundunt colorem.

Quae omnia ut intelligantur, exactam praesupponunt notionem precipitationis, quae observatur in confectione atramenti: qui etiam peritior tota doctrina Colorum, prout satis accurate à BOYLE fuit tradita, alias non possunt intelligi.

PARS AFFECTA.

Pars affecta ratione declarationis sunt tam partes extimae solidae, ac imprimis Corporis habitus, quam etiam interna Thoracis & Abdominis Viscera: se enim ZACUTUS LUSITANUS lib. 3. Prae. adm. observat. 136. & 136. refert Icterus mortuum, qui omnia interna Viscera, imprimis Hepat & Intestina, colore flavo totaliter infecta habuit. Rarum autem est, quod Ossa etiam flavescant fuerint, reperta. Pars vero affecta à causa proxima est massa sanguinea heterogenea recrementis impregnata; sicut horum humores & fomes sunt primae viæ.

DIAGNOSIS.

Quoad signa Diagnostica: Icterus praefens faciliè in genere cognoscitur ex habitu & Urinae colore, qui imprimis in Oculorum albo se manifestat; sicut Urinae lateum vel charta albicans si intingatur, hæcque colore croceo inficiuntur, quoniam Urinam Ictericam non semper lateum tingit RIVIERUS Cent. 1. observ. 9. annotat: aut si Urina incoctis spumam flavam ostendat, & sedimeutum ochreum post horas aliquae dimittat. Causarum vero signa dignoscenda majoria difficultate sunt. Ventrículum nihilominus affectum esse patet, si mala Digestio, & Ventrículum immediate gravans non præcesserit, qualem v. g. ex HORSTIO supra allegavi, si Cardialgia addit: si abscessibus Bilis præternaturaliter effervescentis indicis Ructus, Vomitus, ac Fluxus Alvi odorosi ac biliosi observentur, aut Faeces colore naturali tinctæ sint.

Sanguinem verò huiusque texturam in Ictero laesam monstrat:

1. Causa evidens, si v. g. à mortu Animalis venenatis is contigerit; si Febres, Menstruum suppressio, similesque circumstantiae, quales superius allegatae, præcesserint, aut adint.
 2. Ventrículus mediocriter, aut bene constitutus; Ac
 3. Vasorum Biliariorum angustia, Biliisque turgescunt extra ordinem pullæ adfuit nocte, ac Internorum Contenta naturaliter tincta sint.
- Vasorum denique Biliariorum, & Hepatis angustias, aliaque vitia, monstrant*
1. Dolor citra hypochondrium dextrum molestus, nunc cum tenesmo ac pondere, nunc cum lacinatibus obscuris.
 2. Faeces Alvi semper albicantes, aut cineritii coloris, hincque difficillimè & nullo labore solvi potest Alvas; Ac
 3. Convulsiones Viscerum Abdominalis antecedentes, aut adhuc præcipientes.
 4. Bilis viscidioris signa.
 5. Calculorum per Alvum interpolata excretio antecedens.

An Icterus superveniens fit Criticus? an Symptomaticus? signa coditionis Urinae monstrant. Si enim signa coditionis in Urina apparent, Icterus est Criticus; si citra Coditionis signa pericula superveniat, est Icterus symptomaticus.

Urinae in principio sunt tenues, nonnulli laetem; in progressu sunt turbidae, obscuræ & crassæ; in statu copiosa deponunt sedimenta, & colore naturali flavo plius mi-

nus tinctæ apparent. Ex quando urina fit crassa, turbida ac nigra, tunc signum est isolationis Muri, cum viscidior Naturæ: Sic namque hoc facit Exemplum SCHENCKII lib. 3. observat. de post. Mictum cruentum, seu Sanguinis a terrimi excretionem, subito curato Ictem: Magis huc facit Exemplum HOFERI in Hist. Med. pag. 121. de Ictero Nigro, in quo ex usu Lapidis Bezoar Urina nigra & infar Atramentis fuit excreta.

PROGNOSIS.

Prognosis omnis hiltur Causarum antecedentium consideratione. Est Morbus, si quis alius, contumax, si illegitimè traditur. Per se periculum quidem, non tamen lethalem, involvit, nisi ratione Causarum, aut supervenientium intendam symptomatum.

Hinc Icterus, qui sequitur vitium quoddam Visceris cuticulæ, Hepatis ac Lienis, confirmatur, Scierim, &c. sed chronicus, immedicabilis & lethalis esse solet, & nunc immediatè, nunc mediatè, quippe cum ordinariè hydrops lethalis superveniat, Aegrum jugulat.

Icterus quo magis Flavus exit, eo facilius est curato; quò verò magis Niger, difficilior; eòdem hinc causam complicatam magis aut certè alteratam, scilicet humorem acidum, quæm satis pertinacem, fovet.

Icterus Flavus, qui est ventriculi eruditatis facillimè, & sæpe uno Vomitorio, aut purgante curatur.

In specie Niger Icterus Quartanis superveniens solet esse contumaciore sicut FORESTUS l. 19. Observat. 24. observat, Quartanæ per 12. annos duranti Icterus Nigrum contumacem & durissimum supervenisse. Interim Aphorismus HIPPOCRATIS 61. Aph. 4. non semper est verus: vid. HORSTIUS libro 1. Observat. 20. ubi Icterus salutaris quædam die continens febre obvenit; & BARTHOLINUS Centur. 3. Aph. 4. observat Icterus in Quartana salutarem, ante diem septimum supervenientem.

Icterus à Veneno externo productus periculo non vacat, ob symptomata maligna ipsi communicata.

Icterus à Fermento sanguinis intrinseco viz, nisi dyscrasia illa ablata, tollitur, v. g. Scorbuto, Menstrui suppressione, &c.

Ex Ictero flavo securissimus est, qui in febre est Criticus; symptomaticus verò, qui citius, quam coditionis signa apparent, malus observatur, & non raro periculum infert: vid. HIPPOCRATES Epidem. lib. 1. Text. 120. & superius de Febr. in generi pag. 425. & 406.

Post hunc facillior est curatio & securior, qui ex impedito Bili per Mentum Felleum motu, huiusque Obstructione oritur, modò non nimis pertinax fuerit Obstructio.

Icterus ab angustia Vasorum Felleorum, & fælorem & pertinaciorem Causam hujus angustia fovet, ver. grat. Calculum, Calculum, &c. semper difficilioris curationis observatur, quàm qui mobilis magis, v. g. obstruentem humorem, agnoscit.

Icterus à Scorbuto viz, nisi hoc curato, sanatur; qui verò ex corruptela humorum, est incurabilis.

Calculi in Felleo Felleo, & inde natus Icterus difficillimè, rarè ac nunquam, curantur; eòdem non profert remedia, Calculos atherantia, ut spiritus Nitri dulcis aliquid præbet: aut curati lieet, crebris recidunt, & mortem inferunt.

Nec qui à Menstrui obstructione, nisi hac sublata, sanatur.

Pariter Icterus, qui à Lienis vitio, non semper eandem habet Prognosis: nam qui ab eius Scierio oritur, incurabilis est; qui verò à leviori Lienis affectu, curari potest.

At intulit supervenientium, & concomitantium symptomatum, Ictero sepius succedit hydrops lethalis: non altem, quòd ille Hepati vel Lieni icterum inducat; sed quatenus Chylus hie laud sufficienter coctus, hincque viscidior, Vasorum Lacteorum & Lymphaticorum Obstructiones, hinc Rupturas parat: & raris factis est avis Icterus cum hydropi curatus, qualem PLATERUS observat. pag. 558. annotavit.

CURATIO.

In Ictero cura ante omnia in genere prædis causæ removez sunt; hinc Fermentum acidum auferendum.

1. Fermentum Acidum astrum corrigendum, & si ex causis

40. in *scabulo*, ubi curavit Mulierem diuturna Ictero laborantem, quae aliis omnibus irritis solum usum Symplicis Mar-
"alibit curata fuit: quod & omnes Praedicti confirmant.

Huc spectat *Centaurium minus*, quod Icteri huiusmodi quocunque modo fungitur, ob amaritatem ad Icterum egregium est: Eius Decodum euphorisum est RULANDI in Cura Icteri; idem fuit, qui dicitur, quod centaurium minus re-
cens anemolum in calceps Intestini, ut nudis pedibus inter ambulandum ita teratur, erret Icterus; heri enim Plantam omnino flavam, ob id quotidie esse repetendam. Item *Taraxacum*, item *Flores Chamomilla*, *Herba Agrimonia*, *Abrutum*, *Asterias*, cupis lucus vel Decodum hauriatur, appropriata sunt Icteri Remediorum: vid. RIVERIUS, FONSECA, & PETRÆUS in *Differt. harmonica*. Huc pertinet *Fennaria*, cuius solum Succo RIVERIUS C. 3. observat. 73. Icterus & Vomitus biliosum curatum refert: *Salvia*, de qua vid. PLATERUS *Prax. T. 3. pag. 141.* & *respirans*, vid. FONSECA l. a. Hæc simplicia omnia, quibus & *Cuscutaria* addi potest, operantur, corrigendo Bilis viscositatem, & sal volatile ejus accendo. De *Succo Capitellum Venis* vid. VELSCHTUS *millum*. C. 13. obs. 13. Facit hoc *Frangaria*, quæ etiam est Remedium expertum RULANDI, Decodum nempe ejus aliquandiu continuatum, aut præ potu ordinario propinatum, quod ipsum sufficiens est in Cura Icteri Infantum: Nam quod etiam *Infantes sunt Icteri*, observat PANAROLLUS *Prax. a. observ. 44.*, ubi refert de Infante ex Utero materno Ictero. Magis adhuc convenit, si *Frangaria* simul decoquatur cum *Paffula*, & ita Decodum bauriatur, telle RULANDI in *Thesauro pag. 163.* item FONSECA l. 2. *Conf. 34.*, qui dicit, famile Secretum curandam Religiosi, qui Ictericos curavit Decodum Herbarum & Radicis fragrarum quotidie haurio; vid. etiam BARTHOLINI *Alia mod. hauriunt*. volum. 1. *observ. 220.* v. g.

Herb. fragrar. cum vino M. li. vel iii.
Pafful. min. 3ii. vel iv.

Hæc coqu. in l. q. Aqua fere pro potu ordinario.

Fie potus gratus tempore usurpandus, quem etiam HARTMANNUS commendat in *Praxi Chymiatrica*, Ictericis enim, utat Intense sitientes, malè ferunt Cerevisiæ potum, partim propter amarorem, partim quod coeret Ventriculum, cum bene digeratur, sed in macum degenerat. Hinc sitientibus maximè Ictericis, convenientissimus potus erit vel modo dictum Decodum, vel si *Frangaria* amarior molestius sit, solum Decodum *Paffularum*. *Paffula* sanè malum in recessu habent, unde non possunt non laudare. *Electuarium DIGMÆI* p. 2. Experimentis, ad quemvis Icterum, paratum ea pallulis minoribus & Rhabbarbo.

Conveniunt etiam *radix 5. Apocynus*, *Cichorii*, *Rubig. tinctorum*, *Urticæ*, Lignum *assusiss*. Radix *Hirundinarum* seu *Vincetoxie*, quæque *Silencia*, appropriata est Antiictericum, & à SIMONE PAULI *De. Botan. pag. 127.* extollitur, præsertim in progressu & declinatione Morbi, si Vinum decoctionis emulsum hauriatur, tam per sudorem quam per Urinam egregiè operant, & ticturam remouent. Ex his *radix Urticæ maris* & 3ii. Cruci GESNERUS cum vino albo extrahit *Tincturam*, quam tanquam celebre antiictericum per 3. dies dosi 3iit altissimum commendat. Ulterius *Flores Hyperici* & *Caulecula* hoc in casu etiam sufficiens, in specie Cruci *Flores* experimentum sunt ad Icterum, in specie Cruci *Flores* commendat STOCKERUS in *Praxi*, si scilicet Flores cum Herba perforatur, i. e. Hyperici, coquantur in Vino, vel Aqua, & detur continuò bonus haustus mane: prætereaque Herba & Flores ponantur in calceps: Remedium enim dicit esse expertum. De *Floribus Gualtheri* res idem certa est; id quod confirmat Observatio BORELLI *Cent. 4. observ. 31.*, ubi Icterus à fumo Tabaci abortus curatus per *Confermam Florum Gualtheri* & *Calendula*. Nec *Ambrosium*, nptimum Hepaticum, hic negligendum est, cujus virtutem in Ictero cum aliis eacheiis symptomatibus annotavit SOLENNANDER *Med. 5. Conf. 25.* Icteri diuturni Curatorem per Decodum Mulci pulmonarii quædam videb. in M. A. N. C. *Annot. p. observ. 390.* Pertinet hæc *Dorsum* spositum *Camerarii* ad Icterum, quod describit FEHR de *Aphor. pag. 19.*

Herb. Cam. Aphor.
Flor. rufar.

Prax. sylv. an. par. viii.
Cruci part. 6.

Decoque in *Vino diuretico*, & exprime per usum. Alias *Semen Aquilegia* nobile est specificum expulsum Tom. II.

in Ictero, quod promovendo expellendove Excrementa Ictericæ massam sanguineam purgat, effique TIMÆI euphorisum, unde est basis pulveris Timæi ad Icterum experti, cujus descriptio est hæc:

Herb. Aquileg. 3vi.
Cruci Cruci. 3i.
Tartar. vitriol. 3i. vel 3ss.
M. f. Pulvis.

Div. in 7. part. æqu.

Sumantur ex vino Rhenano calido 7. diebus continuè; omni mane doxin propinanda. Testari possum, quod aliquando Sartorem Ictero FlavO contumaciter laborantem, aliis irritis, præmissio Vomitorio, hoc Pulvere restituerim: iusta cujus usum imprimis *Spiritus Carminativus de Triker* præ aliis proficuum erat.

Vel convenienter potest fieri Emulsi ex hoc Semine: est.

Herb. Sem. Aquileg. 3ss. ad 3vi.
Cum l. q. Aqua. Flor. Aquileg. & Chelidon. maj.
f. Emulsi:

adde

Herb. flos igne, vel Rofar. Icteric pulv. 3i. ad 3ss.
F. Mixture contra Icterum.

Educoratur parum & usurpetur pro lubitu.

D. 5.

Emulsi sanguinem purificant.

Bene confert hæc Emulsi, frequentius enim usurpata blando sudore expellit Icterum, & tincturam opem delect: inter alia perperam, mox à partu Fortis mortui Ictericæ, cum succo de *Herb. ceræ*, seu appropriatum Abstergeat, ut & *Corallia*, à multis ad Icterum commendantur.

Iusta hæc Emulsionem pariter quoque experta est Emulsi *Crucifera* seu *Semina Frigidæ maris*, &c. quam videb. in M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. Observ. 40. pag. 43.* & 40. SYLVIVS laudat *Semen Camarii* in Lacte ad eripendam coctum in Ictero: vel hæc ex hoc Emulsi cum Aqua appropriata;

Vel

Herb. Sem. Card. bened.

Magis.

Aquilegia an. p. æqu.

Cum Aqua quodam appropriata f. Emulsi.

D. 5. ut antè.

Hic accendenda venit Radix *Cereus*, restitutum sanguinis seu hepaticum, & Antiictericum specificum bonum; siue solitaria, siue cum mercurialis in forma sicca, e. g. *Antidotum diaphoreticum martialis*, conjuncta propinetur: verb. gr.

Herb. Linat. trad. Martis, vel Pulv. sacchar. Martialis.
Vel Antidotum diaph. Martialis.

Rad. Cereus, an. 3ss. ad gr. xv.

M. f. pulvis pro dosi: 5.

Pulvis Antidicticus.

Vel

Rad. Cereus.

Antidotum diaph. vel Baccar. minor. an. gr. xv.
Sal. vol. Cereus Cervi, vel Siperar, vel Sacchari.
gr. vi.

M. f. pulvis.

D. 5. ut antè.

Vel

Herb. Antidotum diaph. Martialis, Lod.

Rad. Cereus, an. 3ss. ad 3ss.

Sal. volat. Cereus Cervi 3ss.

M. pro 2. dosibus.

D. 5. ut suprà.

In specie, si à Calculis in Folliculo Fellico fuerit Icterus, Radicem hanc oia Experimentum commendat HOFMANNUS in *Clavis Theropædica* p. 365. de quibus Calculis exturbandis etiam vide. Remedia ordinaria in M. A. N. C. *Annot. 4. & 5. Observ. 99. p. 109.*

Hæc ipsa specifica ex Regno quidem Vegetabili optimè sunt juncta in *Electuario contra Icterus* D. MICHAELIS, cujus ingredientia sunt hæc:

Herb. Neri, Marrub.

Expator.

Abrus.

Auror. an. M. l.

Rad. Chelid. maj. 3ss.

Tarax.

Frangar.

Gramin.

Rhabarb. Mo. an. unc. lii.

Corcum. (egregium remedium) unc. ſ.

Flor. Hyperici.

Calend.

Cichor.

Hepar. nobil.

Gaulth. an. p. lii.

Ex his cum Spiritu Chelidon. maj. ſ. Efflicis.

Nec omittenda sunt ex Animalibus, quæ Sale volatili, & Lumbis diuretica esse sudorifero, constant: Hinc *Asteli*, & *Lumbis terrestris*, seu eorumdem blandi in Balneo Martiano exsiccatum Pulvis ad ʒi. sæpius propinquetur: vid. THONER, & LOTICHIUS; Nam hic Pulvis Bilem insigniter acuit: aut more Antiquorum subigendi cum fero Lactis vel Cerevisia: vid. MAROLDUS Pr. p. 171. vel infundendi, vel coquendi cum Vegetabilibus Aperientibus sic dictis, aut Specificis, vel Menfes moventibus &c. aut per putrefactionem vel fermentationem spiritum Urinæ ex his paratus ad ʒb. subinde exhibetur, propter Sal volatile nitrosum adsurgens, incidens, & saporem licti speciem corrigens, Urinamque crens, ab omnibus Prædictis laudatur. Quibus via credit Spiritus Tartari probe rectificatus urinosus, Spiritus Carminativus de uris, Spiritus Urine humanæ, ad modum ZWELFERI in Mant. Herm. traditum paratus, Liqueur Cornu Cervi succinatæ ad guttas xxx. distillatæ Tartari acerrimæ gutt. xix, aut loco Spiritus Urinæ Spiritus Salis Ammoniaci efficacior erit: hinc Panperculi Urinæ Fœm ab lictro in curare solet: vel quod in multis probatum euphorisum, ut testidum:

ʒi. Succ. Albus, vel Chelidon. & Morrah. q. v. Misc. cum uinea Aëri.

De quo bibat bonum haustum, contineat se in lecto & fudet, sudorque sæpius abstergetur: hoc enim aliquoties scripto subinde restituitur.

Certe præmissis præmittendis (i. e. Panis & Martialis) post Specifica, Salia volatilia sunt optima licti Remedia. Unde propter humilitatem volatilem salinam utroque ammoniacalem testatur, Stercora quorundam Animalium tanquam ad licti Coram tam PARACELSUS, quam alii Prædicti, commendant, qualia sunt sterces caprini, gallinaceum, columbium, equinum, in specie liquæ viridescens *Antelorum* juniorum, imprimis Chelidonis & Antierina nutrosum, ad ʒi. Nam propter ammoniacalem vim, & Acriam, seu Specificam in hoc Morbo, quæ veli solet, illud Stercus Specificum Antiericum sicut BARTHOLETI (vid. FONSECA l. 1. a. & C. RULINGIUS Prax. lib. 3. pag. 387.) recipiunt Stercora acrium & Lumbrosos terrestris: aut Pulverem licticum, quem LOTICHIUS lib. 4. cap. 2. observat. & 3. describit quibus WILLISII Stercoris ovillum lubrificat: item Stercoris Canis ossa rodentis, item sterces alium Pullorum exsiccatum & pulverisatum: Abundant enim omnia stercorea sunt volatili de natura ammoniacali, quod ipsum egregie vitia Bile & facit Pancreatici simul coarctat & emendat. Quod facit Trægas *Barbarica* QUERCETANI in Pharm. pag. 451. ea Ios Animalium Reticoribus parata: vid. FINCHUS Chym. pag. 145. Hæc omnia à ʒb. ad ʒi. propinquantur, & ad lictum laudantur: sicut & quidam commendant succo steroris Capra expressum cum Lacte esse egregium in lictro Remedium. *Judicium* tres, vel quatuor vivi deglutiti commendantur à quampurissimis, & Experimento comprobavit ZACUTUS LUSTITANUS lib. ult. Med. Princip. cap. 3. Hic enumerandi veniunt *Lapides* in Felibus Animalium reperti, præsertim Lapis ille in Felis Bovis repertus euphorisum non est contemnendum, utpote cum sit nihil aliud, quam Bili naturalis coagulata ab acido, cujus Pulvis à ʒb. ad ʒi. ind. ad ʒi. mirè ad licti Curam laudatur: extra quem & Lapis ex Felis Porci egregius est: Conf. M. A. N. G. Ann. 3. observat. 183. pag. 499. Loco quorum etiam capi solet Lapis Bæsar, live Orientalis, live Occidentalis, ex cuius ulsa Urinas nigra infusar Atramenti redditas fuisse, observatum fuit in lictro Nigro: vid. HOFFRUS in Her. Med. pag. 140. *supra allegata*: vel *Calculus humanus*, tam per Urinam quam per ludorem, lictum pellens est. Item spectat hic Lapis *Ceraneus* præparatus à ʒi. ad dr. ſ. qui est specificum ad lictum D. Michaelis, qui ipso aliquoties curavit, qui quotannis hoc Morbo afflictabatur: in gubus defectu Lapis

in Folliculo Fellis Tauri repertus commodè sublimi potest: sic ipse cuidam quantitas lictro laboranti exhibere solco lapidem Ceraneum præparatum. TILMANUS & AGRICOLA ea Lapide Cerano Pulverem contra lictum præparant. HARTMANNUS & D. MICHAELIS cum Exuvii Serpentem, aut Viperauram sponte depositis miscuerunt, & dossi ʒi. propinquant: vid. *supra*, ubi de hydro Arrie. 3. Ex quibus variæ fieri possunt Formule: ver. grat.

ʒi. Rad. Rhei. tincti.

Chelidon. maj. an. unc. i.

Herb. Marrub.

Succini. Albus, an. M. i.

Sal. Tartari ʒii.

Includ. Nodulus Vini infundendo.

D. S.

Nodulus Sanguinem mundificans.

Vel

ʒi. Extr. Chelidon. maj. gum. ʒi.

Lap. Bæsar. Occidens.

Animæ diaph. Martial. Lind. an. gr. xv.

M. ſ. Bolus. S.

Bolus Sanguinem mundificans.

Dilatur in haustu Vini, capiat.

RIERLING sequentem commendat Pulverem:

Bæsar. minor.

Jovial. ana ʒb.

Matris perlar. præp. gr. v.

Bæ. Orient. gr. vi.

M. S.

Pulvis Velpetris pro una dosi.

Item

ʒi. Aqu. Tarax. ʒi.

Extr. Chelidon. maj. ʒb.

Sal. velut. Corn. Cerv. gr. ix.

Tyr. Cord. brand. ʒi.

M. S.

Pozin Sanguinem mundificans pro una dosi.

Vel

ʒi. Cord. Martis aperit. unc. ſ.

Extr. Rhabarb.

Rad. Corcum.

Jumar.

Albus.

Cont. min. ana dr. ſ.

Oli. dissilat. Mayrana gutt. vi.

F. Pilulum No. 197. (E)

D. S.

Pilulæ sudoriferæ. (F)

Dosis viii. ad xii. mane & vespere.

Præ Targiferentia biliosa mitiganda opus loci concedi potest: Potui ordinario infundendus Spiritus Salis dulcis, & Spiritus Nitri dulcis, item Spiritus Salis Ammoniaci acidus vid. GRIMMIUS Compendio Medico Chymic. lib. 3. cap. 1. observ. 26. & 27.

Ceterum in finem interdu, non autem semper, blanda Lavantia adhiberi convenit pro evacuatione primarium viam, inter quæ huc scopo inferentia hædus enarratis aut subjugenda, aut interdu etiam permittenda, semper sit moderata & blanda. Præ cæteris commendantur *Stress Transylvanica*, qui blandissime & appropriatè laxant per Alvim, & infunduntur in potum ordinarium cum Nodulo, qui crebris bibatur: vel Manipulis *Fleam Acria* infundendus in Vinum, maceretur per diem & noctem in loco calido, quod Vinum ita hauriatur: Dicitur KAUFFINGERI Experimentum, laxat blande, & ad crassum Sanguinem coarctat: vid. *Collegium in Schræderum Prax. 1. 3. 3. Classi*, 1. Convent hic etiam *Infusum Foliorum Senæ cum Sale Tartari* in Aqua Specifica; Nam sal Tartari hic convolvit duplici ex locis:

1. Quoniam absorbet Acidum, & præcipitat materiam heterogeneam.

2. Quia adjuvat extralationem mucilaginis purgantis ex Senæ, & simulat quocumque, ne adherendo pellicia Intestinarum Hypercathartica inferat: semel enim pro semper mones, non debere propinqui Infusum Senæ, nisi adjecto stimulo Salis Tartari.

Extratum autem Foliorum Senæ nil valet. In specie ludem meretur *Rhabarbarum* & *Rhabarbaria*, quod ap-

(E) Cur non 200.?

(F) Potius, Pilulæ Aperientes, signandum foret.

propriatum est, ut ut vulgò Bilem evacuet. Ast hoc non solum præstat, sed potius partim alterat, partim evacuat; ideo vim speciem Antididitricam habere dicitur, nec sine causa à PARACELSO commendatur. Nempe Rhabarbarum siculum pulverizatum optimè in sublentia usurpatur à ʒi. ad ʒi. propinquetur in Jure vel Vino calido mane jejunio stomacho, & per nonnullos concessus insigniter sudabit (G), & à meridie Alvim laxam habebit:

Vel

ʒi. Rhabarb. ʒi.

Tartari viridis. vel Arsen. dupl. gr. xii.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis Laxativus.

Usurpetur dido modo. Et si sub pulvis hic Rhabarbari in his calibus præferendus est extradiis, utpote quæ nullius sunt pretii: Unde Infusum Rhabarbari cum Nistrubio est egregium remedium ad Curam Icteri: Quo pertinet Essentia Alexipharmaca laxativa Glauberi & Rhabarbaro, vel Elixir Catharticum polyphrenum laxativum cum Essentia Abinthii:

Vel

ʒi. Fussal. min. aut sarrum d. Pulp. Bili.

Rhabarb. ʒi.

Tartari viridis. Tach. ʒi.

Cum f. q. Syr. de Cichor. cum Rhabarb. f. Elecluarium.

D. S.

Aperiens Elecluarium sanguinem mundificans.

Vel infunditur Rhabarbarum in Aqua Specifica cum Folis Senæ, addito Sale Tartari:

Vel

ʒi. Fol. Senæ. f. q. ʒi. ʒi.

Rhabarb. ʒi.

Rad. Carum. ʒi.

Sal. Tartari ʒi.

Infund. in Aqu. Fumar. per noctem i

Colaturæ adde

Syrup. de Cichor. cum Rhabarb. ʒi.

M. D. S.

Patio Laxativa Sanguinem mundificans.

Vel

ʒi. Sarrum. Crataur. min. p. ii.

Rhabarb. ʒi.

Sal. Tartari ʒi.

Infund. in f. q. v. abinthii, sicut in loco calido per noctem.

Colaturæ adde

Syr. de Cichor. cum Rhabarb. ʒi.

M. S.

Vinum Abinthites Purgans pro una dosi.

Vel

ʒi. Rhabarb. ʒi. ʒi. vel iii.

Sal. Tartari ʒi. (vel Crem. Tartari ʒi. ad ʒi.)

Infus. in Aqu. simpl. vel Appret. ʒi.

Sicut in loco calido;

(cum Cremore Tartari verò ebulliat ad Tartari dissolutionem.)

Colaturæ adde

Syr. de Cichor. cum Rhabarb. ʒi.

M. D. S.

Patio Laxativa Sanguinem mundificans.

Sed Rhabarbarum sub forma Pulveris vel Infusi in his calibus præferendum est extradiis.

In Hæc nigre autem Infusum Hellebri nigri in Sero Lactis confert, aut Pulvis ex Extracte Hellebri nigri cum Extracto Martis concinnatur; quibus, quantum possibile fuerit, Gummi Ammoniacum locum datur, quod opem aperitivam, & mucis viscidis insolvum. præcipitata Mercurialis pro purgandis Ictericis ad Curam Icteri à quibodam commendatur: sic Mercurius præcipitatus rubescens cum Tartaro ad aliquot grana commendatur à FINCKIO: Mercurius præcipitatus luteus ad gr. v. vel viii. commendatur à SCHNEIDERO in Pharmacopoeia: sed transseat, cum tutiora proferant. Pertinet hæc Decoctum LINDANI, quo quævis Icterus curat, præsertim, quod probè notandum, præmissio Vomitorio; ut plurimum enim in

Tom. II.

principio Cratialis Vomitorium propinandum venit. Decoctum est tale:

ʒi. Rad. Cich. aut Tartar. ʒi.

Chelid. maj. ʒi. ad ʒi.

Herb. Radix. aut Cichor. M. l. vel ii.

Fragar. M. f.

Marrub. M. f.

Tartari alk. ʒi. ad ʒi.

Fol. Senæ. ʒi.

Coqu. in f. q. Aquæ, aut Aquæ & Vinæ ana q. f. in vase clauso: Decodi ʒi. ʒi.

Detur prouti: addendo, si præstantius desideretur, singulo haustu spiritus Tartari colli. ʒi. ad dr. ʒi. sumantur 3. diebus, & omni mane duo haustu, interposita hora, continuando, donec Malum sit curatum.

In hujus usu attendendum, ne sint feces ultra tres vel duos in die: si contingat liberius purgari prima die, aliis sumatur tantum minus. Tali Decodo Amstelredami curavi Mercatorem ex Ictero Nigro: Tribus septimanis nihilum quidem profici; Urinæ manebant crudæ, & splendide; post dies paucos, apparente coctionis figo, aberat splendor, & turbide erant urinæ: Prædixi ergo illi solutionem Morbi. Continuari igitur Medicamentum, & non mutare opus est.

Contenti quoque Apocrypha SYLVII cap. 46. §. 68. pag. 452. & Patii liquens BARBETTE, quam habet in Exerit. Præficio.

ʒi. Rad. Rabis thali. ʒi.

Urtica.

Curcum.

Chelid. maj. an. unc. ʒi.

Fol. Marrub.

Cuscut. an. M. l.

Fler. Genst. p. ii.

Sem. Cannab. unc. ʒi.

Aquilag.

Petraslin. an. dr. iii.

Coque in

Vial. albi tenuior.

Aqua pura an. q. f.

Colaturæ ʒi. adde

Syr. de Cichor. cum Rhabarb.

spina cervic. an. unc. ii.

spiritus Salis Ammoniaci vel Camphor. de

Tribus dr. iii. Mille.

Vel

ʒi. Herb. Marrub.

Cuscut. an. M. l.

Fler. Genst.

Acacia.

Calend. vel Cartham. an. M. l.

Rad. Stercor.

Filicis.

Cichor. an. unc. l.

Crem. Tartari unc. ʒi.

Coqu. in f. q. Aquæ.

Colaturæ adhuc ferventi infunde per noctem.

ʒi. Senæ. f. q. ʒi. dr. vi. vel Rhabarb. unc. ʒi. ad dr. vi.

Colatura ad ʒi. D. S.

Patio Sanguinem purificans.

Quoad Hæram Nigram, saltem notetur: ut in præfrendis Remediis semper Acidum absorbendi simul habeatur ratio, sive hoc fiat illa eligendo, quæ utrique Humori simul dicata, v. g. per Terra, urthola & Martialis; sive hæc alius & sedesmodi committendo; sive modò hæc, modò illa diversis vicibus propinando.

Hæc fuerunt Internæ, de quibus adhuc in genere monito: in medicamentis Antididitricis esse insistentium ad tempus, quia est Morbus chronicus, & continuus, & quidem quando Urina minus tenuis, & splendida, tandem illis insistentium, donec figo Coctionis appareant, & ant hanc crasse, & turbide, & cum sedimento repleta; his enim apparentibus solutio imminet, & spes salutis est in propinquo. (H)

Hic Internis interdum Externæ quoque Remedia ac-

lii 2

cc.

(G) Sudabit, si frangulis convegetur, non quid Rhabarbarum assumserit.

(H) Specificis omnibus Antididitricis patiens/sani præcipit Aquæ ex albo albi dilla, ac inter arcana à Cl. nostro Thoma Cornelio habita, præmissum à Luca Tozzi 4. apb. 62. publici juris facta. Parare ex albuine Ovi, quousque in spumam abierit, convegetur, & cum Aquâ Graminis, vel fœtis, permixta, adjici Saccharo candido ad saporem. Na & Nivum fixum maximo æquoreo commoda addimus. Hæc Aquæ niva perfrigerata ad ʒi. mane (& quandoque etiam vespere) jejunio stomacho ad multa dies exhibita, etiam depravatum Icterus, toti/siclicetque dilla.

cedunt, quæ in Icteri Cura subinde plantis pedum applicari solent, quæ sunt *Centaurium minus*, item *Radii Chelidonii majoris*, & *Hypericæ*, de quibus supra dictum. Sic pro delenda penitus tinctura seu colore citrino, qui alias sponte evanescere solet diu hædum adhibitis, conveniunt *Præfixæ* seu *Balaui*. Sic mittantur Colore petregino infecti, sani licet sint *Ægri*, in Balneum Aquæ petreginæ, ut ita relaxentur Cutis pori, fricetur corpus cum Sacculis, repletis farina *Hordæi*, & *saburam*, quibus Aquam calidam immeritis fricandum Corpus; ita enim vitiosus color quicunque, interdum pertinax, deponitur ac evanescit, vel fiat Balneum ex Relolventibus, v.g. *Scabiola*, *Sapularia*, *Chelidonia*, *Chamæmilla*, *Parietaria*, *Origano*; de quo vulgo dicitur, quod colore citrino item quod illic evocet: ut Aquæ Balnei inde tiogatur; *Beta*, *Anetho*, *Marrubio*, *Astracano*, *Radicis Lepatib.*, *Sigillæ Salemonis*, ex *Lupinis*, *Nitro*, *Sulphure*, *Calce viva*, & similibus, quibus Corpus abluatur; v. g. uturperet Balneum ad Cutem detergendam *Myrsicinis*,

Vel

℞. Herb. *Sapular.*

Pariter. an. M. ii. vel lii.

Rad. *Bryon. Bb.*Rad. *Sigilli Salem. 3iv.*Pulv. *Piper. Noduli inclaf. Bb.*

Iocifia D. S.

Species ad Balneum

Balnei hujus decoctionis aliquoties *Æger* iofideat, novam semper Aquam recipiendo: tunc Pulverum pulvis Nodulo laiori inclusus sit.

De *Tinea Fiste*, Umbilico vel dextro hypochondrio imponenda, aut plantis pedum supponenda, quæ exinde flavescere dicitur, & æger sanari ac de potu è poculo cerreo flavo, rem in dubio, ceu incertam, relinquat.

Pertinet hoc Externa ad Icterum quemcumque Mulierum Gravidarum convocientia, quibus propter metum Abortus non semper tutum est propinare Interna, aut imbecillioribus: in talibus quovis Ictero correptis expertum est *Cataplasma fæculis*, quod habet:

℞. Fel. *Marrub. virid.*Rad. *Chelidoni. maj.*℞. *Ystiquereia*, an. M. ii.

Hæc cum Aceto vel Vino subacta plaetia pedum applicantur: vid. RONDELETIUS.

Aut si tutum videatur, potest ex his fieri iofasum iō Vino, & propinari Interne pro sudoris prolezione. **FORSTUS** l. 19. *obfer.* 21. Gravidæ Ictero laboranti, eum jam inflaret partus temer, sequens Claretum cum successu propinavit:

℞. Herb. *Marrub.*

Puleg.

Artemif.

Capill. *Veneris*

Verben. an. p. i.

Rad. *Calam. arom. 3ib.*

Cruet. ʒi.

Cinnam. ʒb.

Sacch. q. l.

Cum Vino f. Claretum, quod proficet, & cum 5. vel 6. diebus assumptis, sed fuscit peperit, & simul tunc ab illa liberata fuit. (1)

Pertinet hoc etiam Cura Magnæticæ, uti in aliis Morbis Chronicis, ita & in specie in Ictero proficere. V. g. Urinam *Ægri* misceat cum Farina *Hordæi*, exin formant placentas, quas in Aquam picibus proleione, aut Cani vel Feli devorandas præbent; sic Icterus evanescit. Inquit hoc **HELMONTIUS** pag. 595. & in Anglia in duabus personis à se expectum refert hoc **Dr. BOYLE** in *Philosoph. Experimentis*. Dicitur, si *Æger* quotidie urticas vivas permingat, exinde crescere Urinam, ægrum vero succedere curat; vid. **KESLERUS** *Præf.* tom. 5. pag. 16. Vel infundat *Ægri* Urina supra acetum Formicarium: vid. **M. A. N. C.** ann. 3. *obfer.* 89. pag. 146. Sic Urina Ictericæ supra Stercoris equinum, dum calet, excreta cura Icterum, annotant **PLATERO** & **GRUELINGIO**: vid. **WILLISII** *Pharm. Rat. Part. 3.* pag. 149. Vel permiscatur Urina cum Ci-

neribus Fraxini, & in Globulos redacta, quod fornacem excipiet: **Conf. WILLISII** l. vi. Vel, quod fuit expertum à CASTRO.

℞. Ovum *Gallina*, suo luteo, & albumine per medicore foramen orbatum, & in iola Tella remanet integra, quæ impletur Urina *peristili*, & fella serobilia in hypocausto, finatur ibi, donec lento calore evascescat Urina; pari gradu, & calcetur Urina, & tollitur Ictericis.

Potest fieri etiam citius in digestionem Cinerum. Si vero per incuriam contingat aduri Tellam, Ictericis abie in Nigram Ictericam immiscibilicem.

Vel Sanguine ex Mediana *Ægrotantis* extracto, & Ovi gallinæ Telle artificiosè incluso, & ita Oro 3. dies Gallinæ pro fusu supposito, postmodum cum Casae quadam misce, & Cani, vel sui famelicæ exposto, ut comedatur, Icterus & Morbos ex vitioso sanguine oriundos transplantando avertere satagunt: vid. **BURGGRAVIUS** in *Hydroth.* Item ex Urina *Ægri*, & Lactis, & addito Pane similigineo, fiat Jusculum, propinquet Cani; qui si non moritur, nec Homo moritur, sed convalescit.

ARTICULUS I.

De Lue Venerea.

Lue Venerea ita dicta, quod ex concubitu & usu cum subiecto impuro frequentissimè, & facillimè contrahatur; & est nihil aliud, quam *Contagiosa virus* *Corticis Cachexia*, tam insignis, & eroditibus Artum, & locorum quorundam Nervorum Doloribus, pluribusque Symptomatis *spæta*, à corruptis, malignis, & quasi virulentis Humoribus dependens; ita quidem, ut prius semper Memborum afficiatur, per cuius contagiam Vitæ illud corpori primo & immediate afficiatur.

Innotuit hic morbus Europæ non nisi ante duos circiter secula, & quidem circa Annum Christi 1493. Dubium ergo mox oritur: an Veteribus cognitus fuisse Morbus, an non? Prina qui defendunt, non pauci sunt, quos inter est **LINDANUS**, exactus Veterum scriptorum, qui *super Hyppocratem* asserit, quod **GULELMUS de PALAZETO**, qui floruit Anno 1479. accuratè de hoc Morbo scripsit; item **BERNHARDUS GORDONIUS**, qui floruit Anno 1505. & in *Lillo* suo Medicina de hoc scripsit; item **VALESCUS de TARANTA** Anno 1417; imò quod & alii Antiquiores citari possunt perhibent, qui de hoc Affectu scripserunt, & de eo agunt, cum de Morbis pudendi scribunt. Alii e contra Veteribus incognitum volent, asserentes eundem in India Occidentali Endemium existisse, illi quæ milites Hispanos ex illis locis redeuntes Anno 1494. reportasse, & hinc in Italia ab illis disseminatam, & in specie in Caltris Gallorum in Obsidione Neapolitana à Scotis Urbe exclusis longè latius propagatam fuisse, undè ab Italis Morbus *Gallicus*, à Gallis Morbus *Neapolitanus*, ab aliis *Syphilis*, quod nomen apud Veteres venit (K), ab aliis appellata fuit. Sed his hæc de hinc capienda: vid. **SENNERTUS** l. 6. *præf. part. a. t. 1. p. 188.* **MANARDUS** *Ep. 12.* p. 99. item **MONARDUS de simplici. Med. hystor. pag. 312. **HELMONTIUS** de *p. f.*, **FRACASTORIUS** *tract. peregrina Luce venæ*, &c. qui nunc diverfa de eodem Origine tradunt.**

Exactam eius Historiam contrare ferè difficile est; nunquid inquit **LINDANUS**: si *Præterea est*, *Lue Venerea est*, & *trada*, non esse morbum, qui tam diffusus sit cognito, quam *Lue Venerea*; nullus enim morbus est, cuius pallio regi non possit, adeo ut ex multis hoc morbo laborantibus vix duos sint, qui eodem modo afficiuntur.

Symptomata enim, quibus Morbus hic se manifestat, non semper eadem sunt: quibus tamen insinoscere solet, aut primaria aut frequentiora, hæc deprehenduntur:

1. Effluvia Humoris spermatici virulenti ex Pene in Maribus, ex Geostilibus in Mulieribus, quem *Gonorrhæam Virulentam* seu *Veneræam* appellant, con-

(1) Externis remediis accendi debet, quæ Ictericæ ad Icterum depellendum utuntur. Suerum Cucumeris syphilitis non minus idoneum, vel Cucumeris in ipsum solum morbum applicat: ex his enim maximum fluxu liquoris capiam thicatur, atque Icterus sanatur. Verum in delicatis morbus fuit Remedium hoc excoctivum: quæ altera sua acritate extirpat.

(K) Syphilis stitit insignis elegantissimum Poema Cl. Hieronymi Fracastorii, de Morbo Gallico compositum.

gressum, cum persona plūs minūs suspecta paulo post, interdum tertia vel quarta die, interdum paulo tardius, insequens. Cū verò Sanies, quæ proficit, acris sit, & in consillis Præputii, ubi Glandi conceditur, subinde retineatur, acrimonia sua irritante Inflammationem Præputii, & Tumorem ingulgentem excitat, ita ut Glans Phymosi quasi affecta detegi non possit; dum interius Sanies illa acrior facta Glandem potentius ardeat: nunc verò Præputium Tumorem quasi flagulentem contrahit, ita ut in immensum intumescat, & quasi transpareat, & Glandem inferius stringat. Quod si impetive suppressum, aut non rite corrigatur hic fluxus, universum Corpus Lues ipsa brevi post perficere iniquabit.

2. *Bubones in Inguinibus* saltem exorti, vel post Venæ ulum, vel etiam aliquo tempore post, duri, dolentes, præsertim noctu; qui si evanescent, aut saltem incisione aperti ad Suppurationem & Mundificationem producuntur, res in meliori erit stata: interdum non suppurantur, sed potius indurantur.
3. *Leptitudo inguinis alarica*, & Torpor gravis quælibet membra occupat, quasi subtilis corrosiva essent.
4. *Pustulae variae multiformes & scabre*, in Corporis partibus se offerunt: in Pene quidem pustulae parvæ præsertim in Glande apparent, item circa Coronam, quæ paulatim rumpuntur, & in Ulcera alba degenerant, quæ successivè sunt profunda & callosa, Glandis substantiam successivè exedentia & absumptia. Si ea Congressu impuro malum sit, ferè in pene primitus, idque ut plurimum cum Gonorrhoea, apparent Ulcera. Alias quoque pustulae hinc inde in Corpore, præsertim tamen in fronte, Facie, Faucibus, & Naribus, hinc Cate Capitis pilosæ, erumpunt, nunc plūs nunc minūs protuberantes; item circa Pulvem & Coxas, interdum densæ Labia Vulvæ obdunt, suntque squamosæ, scabiosæ, inæquales, coloris rari intensè rubri, ut plurimum lividi, aut ex livido flavescerent. Nunc aride sunt & esulcæ, & Squamas saltem suggerunt, aliquando Sanies quædam acris exinde emanat, ipsius pusillus hinc latius serpentes, & se dilatantes.
5. Procedente malo Pustulae hæc tandem abeunt in *Ulcera*, quæ etiam sine illis non raro accidunt, *furida & maligna*, nec Pus, sed Saniem acrem, vicina loca exedentem, suggerentia, nunc materiam tenacem, lividam, viscidam, &c. simul exadentia. Loca occupant imprimis Glanulosa, penem & pudenda mulieris, Nares, Labia, Fauces, Palatum & Papillas. Sanè Exulceratio spontanea & discurra, nec facili curabilis, aut curata licet, subitò tamen denub recidivans, in Palato & Faucibus sine alia causa cognita eveniens & perdurans, nunquam ex primariis (si alia tamen simul respondent) ex hujus Luis indicis subministrat.
6. *Ulcera hæc ossa frequentè* quoque adoriuntur & cariosa eadem reddunt, in specie Ossis Palati, Narium, & propter perpetuum pituitæ virulentæ affluam, ac illorum spongiositatem, & Crani maxime, quin & partes interne in Venerea Lue Ulceribus obesse observatæ fuerunt.
7. *Dolores adfines arrectissimi*, & hi etiam primarium quoddam symptomata Luis constituent, Dolor nempe nunc Artuum simul, nunc simul etiam Capitis, & quidem non Articulorum, sed solum Artuum mediorum, nempe mediorum Humerorum, mediarum Tibiarum, Frontis, Temporum, item sterni dolores. Hi sunt saltem nocturni, qui circa vesperam hora nona vel decima, aut etiam citius, incipiunt exacerbari, & inter tertiam & quartam matutinem solent discedere, toraque die toti nulli aut tolerabiles esse: Sunt *Obscuri, fixissimi*, subsidue etiam simul *lancinantes*. Rarum est, quod subsidue etiam circa Articulos observentur; idem, sicuti etiam raro Lumbos & Os Sacrum occupat. Observavi tamen in Fœmina morbo hoc Inguinali, per su-

dorem copiosum, quem frequenter detulerat, infesta, quæ graves dolores nocturnos in dorso & Lumbis, & circa Os Sacrum, patiebatur aliquandiu, antequam ipsa Lues perficere se manifestaret.

8. In diſtis locis, medietatibus nempe Ossium, item in Capite, Fronte, &c. observantur quoque *Tubercula* & *Tumores*, diſti *Gomata*, *Nodi*, *Tophi*, &c. plani, minūs elati, ad medi Os & ulterius magnitudinem excreſcentes, secundum Ossis solum ferè formati, insigniter nocturno tempore ut plurimum dolentes, raro indolentes: Hos ipsos sub Periodicis priores plures asserunt, unde si diuturniores sunt, non raro ad illam ardeant, & cariosa evadunt.
9. *Calor in velis Manuum & plantis Pedum insignis*, harumque *Ringendi*, *Fistulae* & *Excoriationes*, sine manifesta causa.
10. *Verruca*, tam depressæ, quàm elatæ; Item *Ficuli* & *Condylomata* & *Crista* in partibus pudendis mulieribus, & utriusque sexus Ano succrescent.
11. In morbo inveterato *Pili desinunt*, tam in Capite & Barba, quàm superciliis præsertim, cum Pusillis, Ulceribus, aut scabie fœdita junctis, sine alio Morbo præcedano.
12. *Maculae rubefcentes, flavescerent, aut livescerent*, nonnunquam satis late, præsertim in Pudentis, Pectore ac Dorso, item in Abdomine, subsidue comparent, quas pressis albicam vestigium, mox ad pristinum colorem rediens, exhibere PLATERUS Prax. Tom. 3. pag. 178. statuit. vid. SYLVIVS Hb. 4. Prax. Tract. 3. §. 18.
13. Supervenit *Inflammatio Testium*; *Rantido*, atque *Urethrae laxitas & erosio*.
14. *Tinnitus Aurium*.
15. Inveterato denique malo pro majore vel minore partium solidarum affectione, fluidarumque alteratione, Sardi, Ceci, Tabidi, Scabiæ &c. sunt infesta.

Omnia hæc prolusè explicita videbitis in SENNERTO l. 6. Prax. Part. 4. SYLVIVS Hb. 4. Prax. Tract. 3. & BOTALLIO Tr. de Lue Venerea: qui tres insulas aliorum omnium sufficiunt.

Atque hæc quidem symptomata non cuius contingunt, nec omnibus hujus Luis gradibus, nec etiam, utut frequentiora, solitaria observantur; sed alia insuper hic complicantur, imò non cuncta eandem vim diagnosticam habent. Quatenus verb. gr. non omnis, sed Virulenta saltem Gonorrhoea Luis Venereæ suspicionem movet; Pilorum decidentia sine alia signa & per se pariter nihil tale arguit, Bubones Venerei ab illis, qui extra hanc Luem geniti, haud differunt, sicut contra commune sententiam PLATERUS l. a. pag. 177. & SYLVIVS l. a. §. 124. per Experimentum testantur; ac Condylomata non tam Luem Veneream, quàm præproferunt & frequentioris Venerei usum, familiarem illis, qui hoc morbo laborant, sequuntur: binque hujus Luis signa propria haud existunt. Ita, ut Symptomata hujus Morbi prima manant Gonorrhoea Virulenta, Pustula, Ulcera, Ossium Caries, Tophi, & Dolores enormes, nullique Anodynæ cedentes: quibus PLATERUS pag. 174. Maculas cutaneas quoque addit, quatenus ex his solis, si de nulla alia eorum causa, præter Coitum impurum, conſlet, Luem Veneream incipientem concludit.

C A U S A E.

Afficiendi modus hujus Luis simpliciter est per Contagium, ique frequentissimus per Congressum Venereum; non quidem frequentior, sed vel unicus levior actus sufficit, sicut hujus respectu rarissime aliis modis afficere solet. Pertinet hæc etiam Hereditarius Characteris, quo Liberi à Parentibus infici solent: Sic FORESTUS Hb. 32. Observat. 2. refert Luem Veneream, quæ Maricus affecit Vanrem, hæc insinuat in Utero, hic Nutricem, hæc tres Liberos proprios: simile videri in AMATO LUSTANO Centur. 4. Cur. 49. Item SCHENCKIUS in Observat. refert Mulierem, quæ Fortem reddidit Gallicis Ulceribus facientem, cū Coniuga hoc morbo afficeretur, illa sana. Reliqui ergo modi præter Congressum, quibus Contagium Venereum se propagat, sunt varii. Omnes autem Fomitum materiale minūs spirituosum pro

pro fundamento agnoscunt, ut sunt v. g. *Lectus Communis*: sic enim HORSTIUS lib. 7. *Observ.* 3. refert Lnem Venerem à communi Lecto contractam, cum Condylomatibus & Ulceribus Pudenti. Sed hoc ita absolute minus probabile videtur, nisi Lectus vel copiosis Sudoribus, vel Sanie Ulcerum, ab inquinata fuerit infectus, *Eudores* certe multum valet. Exemplum novum Ancillæ pudicæ, cuiusdam Venereæ ad sopientes Artuum dolores Balneo Formicarum subinde attenti, & hinc sudores abhergentis, quæ horum Contactu & Halituum inspiratione infecta fuit. Sic postificationem in Balneo publico, Instrumendo non bene abstergo, Luem Gallicam contractam novit idem HORSTIUS lib. 7. *Observ.* 8. Par serè ratio, quando CORNARIUS *Observat.* cap. 25. notat Morbum Gallicum ex Cæcubindarum impositione, quæ infectæ erant, contractum. Sic *Hypocaustum* huc pertinet. HILDANUS refert *Cent.* 5. *Observ.* 99. de Muliere sana, aliquando in Hypocausto, in quo Ager Lue Venereæ laborans per Litus Mercuriales sanati fuerunt, adeoque Vapore Mercuriali infecto degens, quæ gravissimum morbum Venereum, hinc contraxit. Pertinent huc *Pygmæus*, de quibus idem HILDANUS *Cent.* 1. *Cent.* 200. refert, Luem Veneream ex Vesle Hominis hac infecti fidum. *Communia Penula* etiam huc accipiuntur, ut quando BOTALLUS de *Lue Venerea* pag. 472. Hilarium Infecti ex communi Poculo cum Venere refert. Nempe tuas per Pocula Malum communicari arbitror, quando à Sanie Ulcerum in Palato aut Fauces vel Potus vel Poculum inficiantur, quod tunc contagiosum Malum fit. Per *solam Obscuram* Luem Veneream à Viro infecto Puellæ communicari refert FORESTUS *Observ.* 2. *Schol.* lib. 31. Sed tamen, modo Oculum tale non fit malitiae pallium, vi ætatis medio Contagium communicabitur, nisi Ulcera Faucium & Oris insignita adjuverint, & hinc vel saliva, vel Lingue intrusione, malum multiplicetur. Per *Opthalmicum* in distans contagiosum Morbum Gallicum refert ZAGUTUS LUSITANUS *Prax. Adm.* lib. 7. *Observ.* 125. de quo tamen reverè dubito, an ita fieri possit. Notabile est, quod duo admodum Seminariorum Morbi Gallicæ latere queant, cum teste SCHORERO in *Observ.* post. 2. vel 3. annorum pulviscere queat. Par ratio est, quando AMATUS LUSTITANUS *Cent.* 1. *Cent.* 49. & 50. refert, Viros Lue Gallicæ coreptos sanatos, post 7. item 25. annos, Pueros eadem infectos ex sanis Mulieribus succipientes.

Allicuntur autem *Partes inter solidas* primariò *Locus Glandulosi*, hinc *Testes*, non nisi mediatis istis affectis, & *Partes Sanguines*. Ac fane potentius Locus Glandulosi se Virulentia Venereæ infinuare, & hinc eorumdem Ulcerationes. Correlationes & Tumores malignos penitus, & contumaces, aut, nisi radicatis curentur, facillimè recidivantes, efflicere solet.

Quoad *Contenta liquida*: inquit primariò *Chylusum Corporis Rorem*, & hinc derivatos Succos, eorumque Vehiculum, nempe *Serum purius* ac *Lympham*: Hinc Genituram in Gonorrhæa; Oiliom Nutrivmentum in Tophis, & Carie Glandularum quarumvis; Lympham in Bubonibus, & Esculcerationibus Faucium & Narium, Pustulis Cutaneis; Membranarum Rorem in Doloribus nocturnis otitocis, &c. ordinariò infecti: In quibus omnibus Acrimonia acida singulariter corrosiva, cum Nutrivmenti roridi chylis in viscidiorum & glutinosorum consistentiam alteratione, deprehenditur. Inquinantur autem imprimis contenta ista, & horum medio partes solidæ, à Contagio ratione *Acidi speciei* fermentativo, & Contentorum sui multiplicatione immutativo, ratione verò subiecti cum parvo fco exito villicio & glutinolo, nunc Halitus, nunc faniis forma, Vehiculo communicato: parili serè ratione ac scabiei exitu admodum Fermentum nobis communicari, & tamen totum Corporis Habitum inquinare solet.

Ex quibus *Causa Effluens Materiali Proxima* huius morbi vel ipsoe patet: nempe conficitur huc in *Acido sui generis* peccante (cujus tamen natura specifica à priori non adeo exactè determinabilis est) Fermenti instar lentè se

multiplicante, & contenta Corporis predestinam destruentem, functioneque Corporis, primò Naturales, indolente: quæ ipsa latius explicari vid. in SYLVIO lib. 4. Tr. 3. de *Lue Venerea* §. 29. & 63. (L)

D I A G N O S I S.

Ratione *Diagnosæ*; quamvis Morbum hunc adultiorum cognoscere facillimum sit, quumvis tamen adhuc latet, & sub cineribus saltem gliscit, eius Diagnos difficultior est; præ primis cum tunc PETERIO, non raro sub larva Scorbuti & Arthritidis latet, sed etiam ipsi Ageri honoris acque dignitatis tue gratia rem cum Infectis se habuisse constanter negent, & à consorcio humano exclusionem metuant. Cautus ergo sit Medicus in judicio, ne infentem accuset, neque rem absolvat, nec se ipsum proficiat.

Quid si verò talo quid se perpetrare facerent, simulque de uno vel altero Lue Venereæ appropriato symptomate conquantur, de morbi specie alterius dubitandum non est. Intem in priore, & abrogationis casu, in Mari vel Uxoribus, si in Conjugio vivat Ager, conditionem & mores inquirendam, utpote ex quibus non leves interdum de Infectiōe coniectura hauriantur: aut porro investigandum, an cum morbi talis Infectio in eodem Lecto dormiverit? cum eodem ex uno Vase liberit? Infentem impurum laudant? &c. Aliis est ex nostro horum aliquid certa de morbo hoc determinari valeat, Ageri status præfens potius attendatur, qui quidem vasat per Tempus diversitate, aliisque observatur in Morbi Principio, Alios in Augmento, alius in statu seu morbo inveterato.

Quid si igitur ex *Congressu impuri* Malum hoc propalatum, paulo post eundem aut circa penem & Vulvam Affectus quidam exteodinatarius seu Inflammatio exoritur, aut Ardor Urinæ, quem intra biduum aut triduum Gonorrhæa excipit, observatur: Inflammationem dictam mox sequuntur Pustulæ, hinc Escoriatio atque Evulsiō: partium dictarum cancerola; imò si Inflammatio vehemens, vel neglecta fuerit, huc in Gangrenam degenerat, crystallis Vesiculis se manifestantem. Interdum nulla succedit Gonorrhæa, sed Virus per Cæcem potius ad Inguina non fertur, & Bubones excitat, qui pro diveris malignitatis gradu aut facili curantur, aut temporis tractu in Ulcera Phagedæna degenerant: aut tempore principi callosa quogue Scroto atque Perineo contingunt Ulcera. Quibus dicta Phenomena non comparentibus interdum Ulcus cancerosum atque callosum exile intra Preputium & Glandem, aut in orificio Urethre, conspicitur, cui Ulceri interdum Callositas sine Ulcere substituitur. De cætero quamvis nulla de Causa nefanda suspicio sit, modo Bubones atque Gonorrhæa complacentur, infallibile Lue Venereæ signum hoc existunt; ita quidem, ut uno cessante; alterum invalens: quibuldam intumescunt Telles: in Sexu verò sequiore fluor albus valde dolorosus, quique partes externas erodit, affligit. Sio verò *absque Congressu hic Morbus* contrahitur, semper, ut superius dictum, magis accipit pars, quam Virus seu Miasma Venereum immediatè tangit: verb. gr. si ex Lactatione Infantis import, circa Papillas & Mammæ Pustulæ, Escoriations, Inflammationes, Ulcera depascientia & callosa; si ex Vestimentis, & Conenbatione, in Cute Pustulæ atque Efflorescentiæ varii generis excitantur.

Sub incremento autem Mali, quacunque occasione contracti, quoniam ipsa Massa Sanguinea tunc Virulentia hac contaminatur, hinc Nutritio totius depravatur, unde & sanguinem *crassum seu spurium* apparere, Prædici restant. Bubones etiam in illis, quibus sine Coita tale quid contingit, protuberant, habitus totius Maculis & Pustulis desquatur, in Impetiginem acque scabiem necesse est ut crullus abeuntibus: quæ tamen Pustulæ atque Ulcera frequentiora sunt modo his illis membris, verb. gr. Faciei & Capiti, & quidem non raro sub emittente notabilis, Brachia, Pedibus, Pubi, Pudendis, Uvula, Tonsillis, & Musculis Laryngis, una cum Partibus carnosiss.

(L) Fermentum Gallicum (quod imperferabilis sunt natura esse utro faciemur) non tam ad corrosivitas Casifica, quam ad Acida reducendum esse ait Boerellus. Casifica enim valde acida non agunt, nisi vi salium fixiorum est cineribus elictorum, ex quibus componitur: hæc autem salia fixiora in corporibus Animalium non inveniuntur, atverit citatus Auctor. Præterit Casifica nequaquam vim faciens in ossa, & cum Ulcera excitant, basid callosa lobis reddunt. Hæc quævis observentur in Lue Gallica affectis, fasius est credere, inter Acida potius commutandum esse illius Venenæ præterit quam Acidi maximum sit in Animalibus præterit.

carneola reliquis circumstantibus Deglutitioni dicitur, quæ sunt eroræ, inde deglutitio est difficilissima: quare res deglutientes ad Oropharyngum translatæ rursus per Nares protrahuntur. Capilli decidunt: in volis ac pedum plantis Rheumatis & Fissuræ, circa pedicem & pudenda Verrucæ nomine Condylomatibus propoliuntur, ac gravissimi Dolores Capitis atque Artuum observantur, frequentes Serpiginosæ acris eructationes in Fasciis, maximopere in Palato, quod interdum cum Nariibus penitus eroditur, ita ut in Os assumpta per Nares mos effluant. Præterea adest rotius Corporis Lassitudo, Respirationis difficultas, & fœda Oræna, Urinis supernatans crassa livida, plûs minus emulsa.

Uti tandem inveterata magis Lue Venerea, Ulcera putantur Nares, hæmorrhagie tubuli cartilaginei, item Polyposi: pariter Tumores in pedore atque Artibus congenerantur, in Ulcera cancrosis, callosi ac sinuosi degenerant: Dolores otitici, præsertim nocturni, & Parotidis hæi magis sunt, adstant dolores continui in Oculis Nali & Oculorum, Tophi & Nodi in Partibus emergunt: Ossa corrumuntur, imprimis Crani, Palati, &c. Refert FERNELIUS, quod in Lue Gallia Ossa valida sunt fragilibus, ut levi est causa confringantur insarili-gui aridi: Ratio est Acidum, quod ita corrodit Os, ut non frangibile. Caro dicitur Ossium insensibile, & ex illo ruberit ad instar partium frigoris laesuram. Superneunt Sorditas, Cæcitas, Febris Hæctica, Diarrhæa, Tabes, &c., ut aliorum minus frequentium Phænomenorum ac symptomatum taceam: v. g. Epilepsia à sanie, ex cariofo Cranio, ad Cerebri Membranas depulsa, qualem VIDUS VIDIUS l. 2. Curat. Memb. cap. 18; Verminum super eisdem Meninges decumbentium, quales FORRESTUS lib. 12. Oculor. 23. in Schol. i. ipsius Cerebri tandem per Os rotæ: sicut SCHENCKIUS Observat. lib. 6. pag. 311; Cæcitas, Sorditas atque Loquelæ perditæ, quam PLATERUS lib. 1. Observat. pag. 119. allegat.

Interim illud hoc in loco monendum, quod à WISEMANNO de Lue Venerea capite 1. observatum, allegat hæc Symptomata sæpius quorundam Phantasia ita supple, ut postquam Coitum nefarium perpetraverunt, mox sibi persuadent, se Lue Venerea, à qua tamen immunes, laborare, i. e. ridiculè satis sibi imaginantur, omnes dolores atque Symptomata, de quibus unquam legunt aut audiverint se afficere, ita, quidem, ut si Medici ejusmodi Agnorum quæstus non auscultent, hoc Agre ferant, atque ab his recedentes ad Impollos abeant, aliquod sanitarum cum Nummis perdidissent.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis, Lue Venerea lentæ & diuturnæ Morbus est, qui tardè procedit, & difficulter admodum curatur, & quidem tam ratione ipsius Virulentæ ac Malignitatis, quam Agnorum Morocitatis, præsertim si inveteratus & confirmatus Morbus fuerit, ac præter Genitalia plures partes glandulosas & ipsa Ossa inquinaverit: ita quidem ut quavis ejus Symptomata interdum cessent, ut videatur omne Malum eradictum, quin tamen recurrant, impedire, adeoque Virulentiam plenariè extingueret, ut plurimum magni laboris videtur.

Nihilominus Morbum perniciorem aut leviorē reddit Virulentia vehementia atque imbecillitas.

Facilior quoque in uno quam in altero curatur: nam cuius contenta Corporis magis temperata sunt, minus acris; & quorum Corpus magis permeabilis, ac periparibilis est, facilius curatur, quam qui contrà habent.

Curat facilius observatur recens, quam inveteratus Morbus, utpote, qui tardè & difficulter curatur: unde PANAROLLUS Præf. 3. lib. 3. testatur, huius Curam ante festum mensem non adnotant, nullas efficacie esse.

Quod si semel sanati iterum Lue inficiantur, aut malum redeat, ut nunquam, aut non sine insigni difficultate corari, præter EPIPHANUM FERDINANDUM Moderatè perhibent: quasi satis quod gaudent, quibus hereditario jure malum hoc contingit.

Si inciat Lue Venerea in Corpus calidum & secum, in illud ferociter virulentum potentius agit, & difficilior longè curatur; & contra corpora humidiora facilius. Unde in Corpore robusto & sano illa facilius curatur, quam in tali, qui alii Morbi Chronicis laborat, & vitiis humoribus jam tum scatur, v. g. Scorbuto.

Item Corpora quod magis sunt transpirabilia, eo felicius succedit Cura, præsertim per sudationem; econtrà quorum Corpus minus perspirat, melius per Alivum aut salivationem curantur.

Qui Coram Mercuriale sine successu passi, illi difficulter sanantur, & qui post salivationem denud inficiuntur, nunquam forsan, utpote quorum Corporibus Mercurii usus familiaris nimis redditus, hi verò diuturnitate Morbi & Evacuacionibus multis jam tum emaciati fuerunt.

Adjuncta Symptomata etiam malum vel facilius vel difficiliora curatu reddunt.

Quod si autem Viscera se male habeant, ac Ager Hosticus existeret, omnia desperata sunt.

Gummata pariter, denique Tumores, quod magis inveterata sunt, & quod magis jam Ossa Carie affecerint, eo difficilior malum curatu erit; adeo ut, etiam si caries apparent Morbus, si tamen Caries in quodam ossis remanet, licet occulta, nihilominus tamen recidivat Morbus: videatur HILDANUS Cent. 2. §. 10. v. 95.

Balanes retrocedentes ordinariè sequitur Lue ipsa: quod verò facilius suppuratur & melius, eo præstior erit curandi ratio.

Ossa Nali interiora erosa, aut etiam si Ossa interiora Capitis sint inquinata, malum incurabile est: cum Cerebro & eius Membranis facile communicetur.

Afflicti Cariebus hi in Lue Venerea superneunt, mali sunt, cum facilius potius Partis afflicte erodantur secum ducunt.

Quod si lethale sit malum, tandem Febri quasi hostis inveterat Agri, aut tabes Corporis sequitur, aut exilis partibus Respirationis dicitur, inefficaci intereunt.

Devisit Lue & carie tota ossa sua, si Sanguis Venefusione emittit sit floridus, & eleganter consilientur, cum paucis vel nullo fero superantate, quod aliis ferè maculis lividis, aut colore quasi caeruleo in superficie conspici solet, prout nempe malam plûs minus inveteratam fuerit.

CURA GENERALIS.

Quibus suppositis Cura est vel Universalis, ipsius mali, id est, quæ in Massæ Sanguinis purificatione consistit, & Indicatione Præservatorie satisfactæ, vel Partialis, seu quæ multiplicitas ejus Symptomata in specie debetur, & Indicationem Curatorum respicit.

In Cura Universalis Atidum illud virulentum specifi sapienter corrigendum & extinguendum: visidum ejus Substantiam dissolvendum & attenuandum; atqueque verò extra Corpus evacuantum.

Obtinemus hæc scopos duobus modis: vel per Sudationem mediantibus Decodis Lignorum, vel per Salivationem mediante Mercurio: Qualis horum magis conveniat? tam ratio Morbi minus vel magis inveterati, quam Corporis naturalis constitutio magis vel minus rara, & contentis vel acrioribus vel temperatis prædita, docebit: Nam Luem confirmatam sine Salivatione Mercuriali radicitus evellere per quam difficile est, cum Mercurius illius Penetraginem si Alivum percutiat, sicut cecidit in Corpore Biliofo & Melancholico Salivatione periculosa est, cum Mala gravissima subinde inducat; Sanguinei verò, & omnium optimè Phlegmatici, Salivatione curabiles sunt, utre cum majore mollesia, citius tamen & cum minore recrudescencie metu. Hinc pro corporis constitutione, & ratione Climatum & Vitæ, facilius longè salivam Galli, citiusque curantur, quam nos Germani. Nostrum in Climate præstat ut plurimum utrumque modum conjungere: Decodia nempe Sudorificis liquare Contenta, & permeabile ac transpirabile undique Corpus reddere, hinc per Mercurium Salivationem instituere, qua facta, demum per Decodia illa Sudorificia repetita, quicquid per Mercurium relictum fuerit expellere, sordes hinc inde adhuc residuas abstergere, & Contenta corporis in debitam ac naturalem Crasam restituere: verè grat. præmissis Digestivo ex Tartaro vitriolato, Lapidibus Cancrorum & Sale Viperarum, & hinc utrisque Pillulis Purgantibus Mercurialibus una alterave vice, pariter Decodum aut Ligas, de quo Ager quotidie bis bibat modum bonum calidè, expectando mane blandum madorem. Non nimis sudent, ne tenuiori difficulte fero relinquatur visciditates crude, difficulter per Mercurium molles: sed sufficit, si liqueant saltem Contenta Corporis per Decodia, cujus signum est mador blandus: altera vice bibatur vesperi sub

Introl-

intus leſi ſine madoris provocacione. Quibus præmiſſis pro odium inſinuantur inuociones Mercuriales in exter-
na, vel horum loco Mercuriale remedium inſerè propina-
tur, hauſtione deſuper ſuſculum calidum. Quod ſi ab huius
uſu primis diebus ſequatur Vomitus, ſemper Cereuiſia ſe-
cundaria Os eluatur, ne aliquid Mercuriale in faucibus hæ-
rendo Ulcera Ori pertinetia & periculosa inſerant. Contin-
nuatur remedium, nam ſuccellè ceſſant Vomitus, deinde
ſuperueniat ſalutatio. Perſecta ſufficiente ſalutacione, cum
Ager nonnulli vires recuperavit, maturè repetendæ po-
tiones ſudoriferæ Lignorum, præmiſſa ſi opus fuerit, ad-
huc Purgatio, aut ipſi Decodò eadem Hellobori vel Pal-
pi Calocynthia quali incoquantur, ut ita cum ſudoribus
Alvus ſimul aperta ſit. Continuatis hæc per 8. 10. vel 12.
dies cura ſerò abſoluta erit; ſed hæc in malo inuetera-
to, Minus inueteratum potius ſimpliciter Decodò *Sudariferæ*
curetur, quod, utut ſit paulo diuturnius, non tamen id-
eò periculolum eſt, æque cura, quæ fit per Mercurium,
in ipſe apud nos, qui ſubinde ſcorbutico ſumus affecti,
in quibus periculosa eſt ſalutatio, quibus quoque modo
depuratus Mercurius noxiuſ eſt. De cætero ſunt et
Recentioribus, qui quævia ſalutatio notabilis intendat-
ur, ſaluantium nihilominus uſu humores ad purgationem
& diaphoreticæ ſeſicionem diſponunt.

Quod ergo attinet in *ſpecie curæ per ſudationem*: ſudorife-
ra interdum mox primum locum inter euacuantes gerant,
ſæpius tamen nonnulli purgantibus præmiſſis, adhiben-
tur, & quidem talia præcipua, quæ ſpecificè huic virulen-
tiæ reſiſtant, ſimulque viciditatem atque aciditatem humo-
rum corrigant, ſcilicet primum obſident inter remedia ſu-
dorifica nitroſa, in ſubſequentem frigidioribus *Guaja-*
cum, emi libenter jungo *Lignum ſanſiſium*: in calidis verò
Sarſaparilla eſt optima, quinimo utplurimum utrumque ſo-
ciatur, augendo autem hoc nunc illud pro circumſtantiarum
ratione. Optime *Guajacum*, item *Sarſaparillam* propinandi,
& horum medio curandi Laem Veneremur, modum docet
ARCEUS lib. 4. de *Prax. cap. p. 158. & 164.* de quo dicit
LINDANUS *quid eodem modoſſimè curaverit, & Patet ejus*
etiam deſcriptiſſimæ reſcripturæ. Sed notandum, quod dixi, in
frigidis Guajacum, in calidis Sarſaparilla: alibi nihil efficitur: ſi
arceus obſervatiſſimæ, quæ illa habet, *metamorphoſis, illa Curatio*
unquam viſa fuit: Hæcenus LINDANUS. His etiam ad-
numerantur *radix China, Smilacis aſpera, Perſæſidis, Sapa-*
riæ & Radix Bardana, de qua vid. RIVERIUS obſeruat,
commun. pag. 342. Cortex Guajaci, Ligni Sarſapæ, Quercus,
Bucci, Cupreſſi, & Leonici. Imò FALLOPIUS ſolo *Ligno*
perſæſidis curatos teſtatur. Herba *Perſæſidis* juſta PA-
RACELSUM, ſecundum alios *perſæſida, ſapanaria, ac Na-*
perum ſapanaria, de quibus vid. BORELLUS *Cent. 2. obſer-*
uat. 96. SIMON PAULI Deſcrip. Manu. p. 163. & RIVE-
RIUS Cent. 4. obſeruat. 59.

Ex quibus omnibus, utut varia in Officinis proſene
preparata, diverſæ etiam queant conſecrari Formule pro
curatione Luis per ſudorem: frequentiora tamen & com-
modiora hæcenus obſervantur *Decodò*, & quidem tam
primaria ſeu potentiora pro ſudore movendo, quam *ſe-*
cundaria ſeu dilatoria, alterandis Humoribus iolervien-
tia, & pro potu ordinario & toto Corationis tractu ſu-
mendia: quorum hæc utplurimum æa remanentia priorum
parantur. Sicut autem iidem Medicamentis alterari ſi-
mulque evacuari poſſunt Humores peccantes; ita in prin-
cipio ſine ſudoris excitacione quoque propinanda ſunt eo-
rum Decodò, *quatenus ad ſudorem nunquam egredietur eſt*
Ager niſi poſſumant humores diſſolvi, & ad eam præparati
ſuerint: Quod ſi negligitur, non raro contingit, ut ſu-
doreſeru allumpru Ager ſub ſtragulis fruſtra, ad lipothymiam
utque, angatur.

Quare ſi ad ſudoris excitacionem tranſeundum ſit,

1. Ea Diæta præcedenda aliſque ſignis Humorum
condicio eruat.
2. Pro horum diverſitate ſudoriferæ, modo hæc, mo-
dò illa, ſeleantur.

3. Nec tamen valdè urgeatur, ſed Ager mediocriter
ſaltem tegatur, & obſervare jubetur, an ad ſu-
dorem ſenſim inclinet? tunc enim aut ſuſculo, aut
ergumentorum pluriim impoſitione, idem pro-
moveatur: Sin levis, 4 ſudoriferarum ultiorie
uſu humorem præparatio prius expediet: vid.
SYLVIVS 27. de *Lac ſtreper. p. 221. & 222.*

Decodò ſi ſudoriferis non incommode additur An-
timonium erudum, quod BORELLUS *Cent. 2. obſ. 96.*
& RIVERIUS *Cent. 4. obſeruat. 22.* commendat (M); item
ſpecifica parti affectu, ac ſymptomata maxime urgentibus
appropriata.

Preterea liquor horum utplurimum equidem Aquam
conſtituit: in Subſpectu nihilominus, quorum Ventriculi
vis digeſtiva vacillat, Vini dimidium, plus aut minus
ſub coctionis finem adſciendum, aut hoc ſtatim, & in
principio aſfundatur, diutiſ ſaltem cum eo ingredientia
ſolidiora inſundantur, aut in Cucurbita Alembico clauſa
coquantur, Liqueorem proſectum Decodò addendo. Pro
Corporibus emaciatis in Lacte quidam cocturam inſtituant:
Verum Lignorum ejuſmodi ſubſtantia extrahendis ineptum
eſt Menſtruum, cujus loco tamen ſerum Lactis magis ſp-
um erit.

Formule ejuſmodi Decodorum ex ZWELFERO, *Me-
phreſis form. Cl. 4. §. 15. & Collegio ſchradanum 2. a. ubi
de Decodò*, patent v. g.

26. *Reſar. Ligni ſanſiſii* 3iii. ad 3vi.

Cort. epulæ 3ß. ad 3ii.

Rad. Sarſapæ. 3i. vel 3ii. ad 3ii.

China, vel *Reſ. Ligni Sarſapæ.* 3i.

Mercurii viſc. per aleali depurand. & in potu
lyſand. (N)

Antimonii groſſi coarſi. & in potu *lyſar. an.*

3ß. ad 3vi.

Infundantur in

Aqu. comm. M. vi. ad xii.

Macerentur per 24. vel 48. horas in Balneo Mariæ,
hinc coqu. ad remanentium tertiam partem.

Colatura D. S.

Potio ſudoriferæ languinem mundificans.

Doli 3i. ad 3ß.

Jam

26. *Remanentium Decodò huius:*

Infundantur deinde in

Aqu. commun. M. 12.

Macer. per 12. horas: decoqu. ad conſumptionem tertiam
partis, in fine addendo

Puſul. m. conſuſ. 3ß.

ſem. Coriandri cont. 3vi. vel 3ß.

Rad. Liquiritæ.

Polypod. an. 3vi.

Cinnamon. 3ii.

Colatura D. pro Bochetto: S.

Potio Ordinaria.

Vel

26. *Reſar. Ligni ſanſiſii.* 3vi.

Cortic. Ligni Guajac.

Rad. Bard. in aleali diſſol. an. 3iii.

China

Ligni Sarſapæ. an. unc. i.

Mercurii viſc. in pot. ly.

Antimonii erudi in pot. ly. an. 3i.

Macerentur in Balneo Mariæ in

Aqu. comm. Menſ. xii.

Ebulliant ad tertiam.

Colatura D. S. ut ſuprà.

De qua capiantur unc. v. velvi. calidè pro doſi.

26. *Remanentium Decodò prioris:*

Addè

Reſar. Ligni Sarſapæ. unc. i.

Rad. Liquiritæ. 3vi.

ſem. Coriandri. unc. iß.

Paſſ.

(M) Ad hæc Aquæ Antimoniales referenda eſt Aquæ Antivenerea noſtratiſſima diſſa, quam ſanè efficaciffimam experimur
pro Luæ Gallica proſiganda. Ejus deſcriptio hæc eſt: 26. *Sarſæ parill. minutim incifæ, & Rad. Chinæ dulc. in ta-*
bulas redactæ an. 3ii. Ligni Guajaci lim. 3ß. Raſ. C. C. & Ebor. an. 3ß. Ligni viſci querni 3i. Santali rub.
3iiß. Antimonii erudi 3i. Pumiſis 3iii. hæc ſino contrahuntur & lineo ſacculo inclauduntur, deinde ſimul cum aliis in-
funduntur in 3vi. Aquæ Lemis per 24. horas. Deinde bulliant leni igne ad tertiam (vel, ſi fortius eſſe velis, mediocriter) con-
ſumptionem. Adde Cinnamon. acuti 3ii. Cola & pro potu ordinaria ſerva.

(N) *Potus ſanè, ne Mercurius ex iniectione aliſiquid Decodò commanice, quod aſſuteraq. noxiuſ eſſe poſſit. Argentum*
enim vivum adeo volatilis eſt, & ejus particula adeo ad nuntum & metamorphoſin parata, ut ignis alime facile poſſit mo-
ve, & forſitæ mixta corpori, mutatio ipſi accidere.

*Ref. min. Bili ad Bil. sub
affundatur*

Aqua commun. Mens. vi.

*Decoqu. ad consumpt. tertie partis: coletur
per Manicam Hipp. fiat Bocheum.*

D. S. ut supra.

Item cum Appropriatis:

*℞. Raf. Ligni Guaiaci, cum cort. Fir.
Sassafr.*

Rad. Sarsapar. an. Bili.

China Bili.

Antimoni crud. in per. lig. Bili.

Infund. per noctem in

Aqua. comm. Mens. xii.

*Mand coqu. ad tertie partis consumptionem, sed si
aem addendo*

Herb. Saponar. cum ruto M. li.

℞. Sassafr.

Peru. an. M. li.

Rad. Liquirit. Bili.

Ref. min. Bili.

Sem. Funic. Bili.

China. Bili.

Colatura detur pro usu:

D. S. ut supra:

Aut

℞. Raf. Ligni Sarsapar. Bili.

Liquirit.

Ros.

Sassafr. an. Bili.

Rad. Paeon. Bili.

Sarsapar. Bili.

Macerentur per noctem in

Aqua. commun. Mens. ix.

*Coqu. mane ad tertie partis consumptionem, sub
finem addendo*

Vini Rhenni Mens. iii.

Herb. Rorif.

Peru. an. M. li.

Cort. Aurar. res. Bili.

Sem. Coriandr. Bili.

Colatura addo

℞. Raf. Ligni. Bili.

Syr. Rad. Enal. Bili.

M. S.

Potio Sudorifera Sanguinem mundificans.

Vel

℞. Remanentiam Decocti prior. & posterior.

addo

Passul. min. censul. Bili.

Sem. Coriandr. Bili.

Coqu. cum

Aqua simpl. Mens. vi.

ad tertie partis consumptionem: circa finem addendo

China. Bili.

Colatura D. pro Potu ordinario: S.

Potio ad Mensam.

*Assumuntur Remedia hæc (cum nempe his solis Cu-
ratio per Sudorem intenditur absque Salivationis adju-
mento) mane aliquæ dies nocteque tantum, donec in
Cura principio Corpus adfuerit paulatim Remedio: quo
facto etiam vapores a. vel 3. horis ante Cœnam haustus:
repetitur, & semper pro virum, & constitutionis plûs
minus succellente: Æger ratione Sudor plûs minus largus
exspectat. Ut verb. subditi fiat Sudor, non statim ab
assumpto Sudorifero Arte promoveatur, sed post horam
intercedente, si fieri potest, Somno. Sudor per horum
plûs minus protrahatur in principio, postea verb. etiam
ulterâ ascendat.*

*Sudandi modi sunt varii: optimus autem pro eradicen-
do Morbo modus est, ut Strophas, seu Alutaris ingrediatur,
quibus Æger insidetur potest, intendendo & remittendo
Bathni calorem pro necessitate ratione: præter vel Si-
cum cum Spiritu Vini accenso in succellentioribus aut
paulo habitioribus, vel Humidum cum evaporatione Aquæ
calide Scoris metallicis candelastris, vel dilicibus Ignitis
supersuffus, idque ferè in calidioribus, & hecioribus na-
turis. Quod si Æger his fodare nequeat, saltem mano
assumpto Decocto lilo sudorem expectet, à meridie verb.
Decoctum bibat absque Sudoris superuentu, ut saltem al-
terando hoc ipsum potest, Corpusque disponat, quò
insequente mane eo melius provocari possit Sudor. Ubi
Sudor aliquandiu protraxit in Æstuario, & Æger haud*

Tom. II.

*amplius bene ferre queat, Letho calido immittatur, ibi-
que Sudor ulterius sponte fluere permittatur: hinc Sudor
propè abstergendus, & Aer frigidus, quantum possit,
vitandus: mutanda autem sæpius Lintheamina illa alia,
que imprægnata Sudore, ex Linivio acmi probè eluenda,
& Aer libero exponenda, ante quam denud addibentur,
eò isdem denud inflectionem contrahat Corpus: quod
confirmat HILDANUS Crus. 3. Observ. 93. Concoctio-
andæ autem sudationes hæc, aut simplices aut duplices,
ramdli, donec morbi malignitas vicia, Venenæque
correctum & exclusum fuerit: id quod omnium Sympto-
matum, potissimum Gonorrhææ & Coordiomatam, re-
motio ostendit, ultra quam tamen aliquandiu adhuc fu-
dacio continuanda venit: quo quælibet vestigia, aut vi-
rulentæ fælem odores in Corpore forsas hinc inde hæren-
tes, omnimodè & sine Recidivæ metu discissi fuerint:
adeoque subsido à 4. ad 6. septimanis Cura hæc conti-
nuanda plûs minus pro Morbi vehementia, & sudorem
emanantium copia.*

*Quid fructum sentiat, Sudorifera superius enarrata si-
mul per Urinam operari, Ægerque difficilis fudet, ac
Urinam crassam cum sedimento multo & laudabili excre-
tat, nullam sibi hinc difficultatem fingat Medicus: quæ
pleræque sudorifera Diuresin simul excitare palam sit:
Imò in hoc casu intermixtis potentioribus Diureticis ad
Urinarias vias Virulentia Venerea urgeatur, viscidiores
Pituitæ, utpote cum Lotio commodius excutienda, in-
volata, donec successu temporis ad habitum denud Humo-
res vergere constet: vid. SYLVIVS L. A. §. 230. & 234.*

Quæd Urinæ Sudoriferarum:

1. Hæc per biduum ad minimum bis de die propin-
gatur sine sudore.
2. Sudorifera semper calida, aut cum calidis Vehicu-
lis, assumantur, ut Vetriculo gratiori magisque
adiva existant, Imò in immoente sudore Jusculum
calidum exhiberi potest.
3. Eorum Dosis moderetur pro Mali gravitate & sub-
jecti robore & rectora diversis, v. g. 10 Pueris Bili.
vix transeat, in adultis Bili. attingat.
4. Nec sudor mox valde urgeatur, sed Æger modici-
ter tantum tegatur, utque dum ad sudorem inclinet,
& tunc vel Jusculo calido, vel Stragulis impositis, vel
Laconico, adiuvetur.
5. Quælibet ad summam septimo die, quo cura per
sudorem administratur, Purgans ipsi interponatur hæc
ratione, utque ad Curæ terminum.

*Vires si moderant, potius secus, v. g. in principio ex
Carnibus magis assatis quam coctis, in progressu parior
insistantur Vidus, aut si à meridie carnis utatur, vapo-
res passulis aut similibus loco Cœnæ sit contentus. Potus
sit Decoctum secundarium.*

*Quæd Curam Salvatorem: ut in usu saltem est Mercu-
rius, nunc virus eternè cum Unguentis illius, non
preparatus pro usu externo. Casu primus, ut plurima
alia Medicamenta, inventa sunt à Chirurgis, quæ nunc
ex Instituto administrantur in Curatione Lue Venereæ,
aliquæ chronicis morbis. Ex Arabum semper monuen-
tis indicere Veteres: ad Ulcera commensura maligna,
ad Gangrenam declinantia, commendatum fuisse Mercu-
rium: adhibere ergo illum cum Emplastris & Unguen-
tis in Ulceribus Gallicis, hinc ex accidente & casu co-
piosa subserata est salivatio, & per hanc tamen Ulcera,
quam ipsius primarii morbi, Curatio: vid. JOHAN-
NES CARPUS Salutar. Medicee Remissionis, qui primò
hac Lue Venereæ curandi Methodo multa millia san-
ctorum lucratus fuit. Mercurius datus quidem raris pro
usu salivatorio usurpatur, sed potius pro usu Laxativo,
utque continuatur diutius aut etiam crebris subtilioribus,
secus hinc redditus, etiam salivationem satis fortem
interat. Et quidem non addo inveteratum Malum solo
Mercurio dulci per Purgationem sæpius repetitam, in-
terpositis subinde Lignorum Decoctis, curari potest, mo-
do ferè, quem docet HARTHANNUS Praesi ubi
de Lue Venerea §. 5.; sicut RHODIVS C. 3. Observ. 84.
Loem Veneream per Mercurium dulcem tantum sine
Decocto Lignorum curatam refert. Notandum tamen,
utque ab hujus ipsi Dolores remittat, Ulceraque coale-
scent, mox tamen recurrunt, & nova excitantur, modò
salivatio immittatur, aut cesset. Qui verb. Mercurio dulci
pro scopo salivatorio uti voluit, imitari possunt modum,
qui docetur in HORSTIO L. 7. Observ. 12.*

Vel

℞. Mercurii doli. Bili. ad Bili.

Kkk

Conf.

Conf. Refar. vel Vitar. vel Conf. Alchem. 58.

M. D. S.

Saccharum sanguinis mundificans, & purgans.

Singulis 3. diebus continuis exhibetur bora matorina, huius prius aut post aliquos cochlearibus Cerevinae cadide.

Frequentissime autem interne usurpatur Arcanum Corallinum, seu mercurius precipitatus rubens, si Mercurius cum Nitro preparatus, sive fiat precipitatus, adeoque in via humida cum spiritu Nitri, & quem Mercurium Corallatum vocat SCHROEDERUS in Pharmac. ubi de Mercurio no. 6.

Vel

36. Spiritum Nitri, & Nitro, & Alumine paratum:
 & in hoc solve Mercurium vivum bene purificatum, & abstrahendo spiritum, denub precipitatum relinquatur, qui spiritus Vini probe edulcorandus.

De hoc 4. ad 6. grana dantur una vice, repetitis tamen doctibus, doceat prout propter 31. pondere assumptus fuit, plus minus tamen, ac probe succedet Salivatio.

Melior est hæc præparatio, quam precipitatus cum spiritu aut Oleo Vitrioli paratus, cum Oleum Vitrioli haud adeo separabile existat, metallicum magis cum sit proficiat.

Sive fiat idem Arcanum Corallinum sublimando, adeoque in via secca, cum Nitro, & Vitriolo addito, & præter CROLLIUM describitur in SCHROEDERI Pharm. ubi de sublimatis Mercurii no. 8.

Propinquantur hæc Arcana Corallina cum Conserva Rosarum, aut pauco Mercurio, pilulari forma deglutienda, Mercurius dulcis vero, si pro Salivationis magis quam Purgationis scopo propinquetur, cum Vitæ Ovorum exhibetur; quia sit facilis longæ Salivationem movet.

Quod si pro usu externo Mercurius vivus addatur Unguentis, sumi solet ferè Mercurii vivi quadruplum aut triplum, aut dimidium, plus minus præparare, & viribus Aegri; item pro ratione Morbi addatur Pinguetibus, & Oleis convenientibus, ac invicem in Unguenti formam rediguntur. Pinguetibus inter primatum obtinet Azungia porcina, loco cuius propter maiorem vim anodynam etiam Pinguedo humana recipi potest, quibus tertio vel quarta pars Terbinthinae additur. His, seu primariis Unguentorum Mercurialium ingredientibus, pro circumstantiarum ratione aut Medici intentione Oleum destillatum Salvie, Terebinthinae, Guajaci, Rosimarini, Ligui Rhodii, item spiritus Vini additur; item à quibusdam Unguentum Martiatum; qualia in convenientibus addantur, in frigidis præsentim naturis, & quando viscidius Venæ fomes est, & qui loco vis moveri aut dissolvi potest. Sufficiens autem pro integra curatione Mercurii unc. iv. vel v. Nam minus, quam unc. ad ix. & magis quam vii. ad vii. 3ias via licet aliter: pro circumstantiarum tamen ratione, & celeritate vel tardiore, & proficiore. Si pauciore Salivatione superveniente, dosi limitari potest. Assumantur autem de Unguento pro singulo Litunc. ii. ad iiii., prout plus vel minus impregnatum fuerit. Formulam talis Litus non inconcinne videb. in SENNER-TO 14. pag. 305.

37. Mercurii vivi part. 3v.

Adip. suilli non soluti 3i.

Extingatur cum Adipe suilla Mercurius, & exactè miscetur in mortario lapideo: Jam addo

Medull. Crur. Bovis 3ß.

Terbinth. 3iii.

Olei destillat. Terbinth. unc. i.

M. l. Unguentum

Vel

38. Mercurii vivi 3v.

Pungad. suilli non soluti 3i.

In mortario lapideo, pessillo ligneo contundatur pinguedo, elique sensim miscetur Mercurius, donec plane sit absorptus; addo

Maslick pulveris. unc. i.

Et. Salvia.

Rosimar. an. 3ii.

Pulp. Pom. dulc. rest. & à cortice ac nucleis mund. No. ii.

M. per dimidiam horam in mortario ducendo.

D. S.

Unguentum Resolvens, & Purgans.

Vel componatur Unguentum ad imitationem HILDANI cent. 3. observat. 95. Huiusmodi Unguento immo-

gantur plantæ pedum ac volæ Manuum, in Molo scilicet recente, hinc quoque Tali, Carpi, Genium, Cubitorum, & humeri flexurae, interdum etiam regiones Inguinum (Germ. das Gelenke): quod si gravior aut pertinacius Malum sit, aut Salivatio non rite succedat, etiam integra hæc Membra, Lumbi, & tandem tota Spina Dorii, ab Offe Sacro ad Cervicem ascendendo, inungenda. Tuius tamen procedunt, qui Artuum flexuras, Inguina & alias sufficenter fricant, Abdomen, Pectus, & Caput non inungenda, aut rarissime, propter gravia & periculosa nervi generis, quæ ordinarij superveniunt, Symptomata: saltem ZAGUTUS LUSTANUS lib. 2. præf. adm. obsor. 138. Inunctionem Capitis commendat, quando nempe hoc à Causa morbi magis gravetur, & omnia frustra tentata fuerint. Exemplumque refert feliciter inundi Capitis. Post quartam vel quintam Inunctionem ferè sequitur Salivatio. Inunctio pro Virium ratione nunc fit his, mane & vespere, tribus primis diebus assumpto prius Iusculo aut Ovo forbili; si Salivatio verò non procedat, addere etiam diem quartum licebit: quod si procedat, unica Inunctio die quarta sufficit. Quod si Salivatio legitime, & liberaliter procedat, Inunctionem remittere oportet; si non verò sufficiens, sed aut plane non, aut potius Sputum moveri videamus, post diem unum intermissum iterum una vel altera Inunctione excietur: Interdum Inunctio saltem matutina sufficiens est. Insistatur autem hæc in loco calido, aut prope Fornacem: quavis Inunctione peracta Membra lineis obvolvantur, & Ager sub lecto, assumpto Iusculo calido post biborium, recubat prope lectus absque sudore, levi saltem Madore, ut ita Mercurius ferè bene insinuetur: quæst; promovebunt enim sic multum Salivatio. Et quidem si plura inungatur loca, sufficit saltem unica Inunctio quotidie: Quod si verò sole Plantæ, aut secundum alios saltem Tali, & Genus inungantur, his quotidie tribus vel quatuor diebus Inunctio continuanda venit.

Inunctionibus huiusmodi ferè Salivationem excitant, aut in principio subinde etiam Diarrhoeas terminatas inducunt, imò interdum magis per Alrum, quam per Os morantur: qualis Diarrhoea non statim aut violentè sistenda, cum ferè perinde sit, an per Glándulas Salivales, an verò per Glándulas Pancreatis, & Intestina Mercurius evacuando operationem exeat.

Salivatio ipsa nunc in principio, nunc in progressu, promoveri potest per Trochiscos Sublinguales, aut Pillulas Majores, factas ex Gummi Tragacanthæ in Aqua Rosarum soluto q. l. cum Mercurio dulc. 3i.

39. Maslick 3i.

Mercurii dulc. 3ß.

Gumm. Ammoniaci cum oleo sal. & inf. q. l.

F. Trochisci.

De quibus unum manifest per horæ quadrantem, & ultra. Propter Dentium tamen Infectionem Mallicostia ex Mercurio in praxi scilicet & tutiore magis exalant.

Alii alias compositiones Unguentorum habent pro cuspis lubris.

Suffragium Cimarinarum pro Salivatione evitanda mentionem haud facim, cum eisdem supra Symptomata secuta fuerint, ut ferè in defunctuendo abierint. Interne aliis hoc modo penetrat, & efficaciter satis operatur Mercurius, cuius rei exemplum curiosum refertur: nempe præbuerat Pharmacopoeus quidam Viro robusto, & juveni pulverem Hydragryi preparati rubicundum, quo æternis ex ordine vespere destri Teliculis Sarcoma super orum suffragandum censuit. Corpore toto modo, lodice saltem tecto: post secundi pulveris fumum haustum Saliva fluere cepit, sed pauca: largissima vero tertium excepit, ut aliquæ Pelvis masculina una die impleverit, satisque copiose illa manarit. Uxor, quæ Martium lodicibus contexerat, vel per semestrem spatium nullam Scîm sensit, tamen liquoris aquei copiam continuè in Ore habuit. Lodices, quamvis spatium biennii quater quicquid quæ Sapone fuerint elotæ, & in Sole siccatæ, nihilominus quies lectæ fuerant infractæ, Salivam utrique Coniungi denub moverunt, ut eas prius abicere coacti fuerint.

Potioris ergo usus sunt Inunctiones Mercuriales ultra dies tres via continuandæ, semel aut bis in die, prout plus vel minus Unguenti, aut plures vel pauciores Arteri ita tractantur, quarta præterpropter Salivatio expedanda, quæ immovente cessandum. Præmittatur autem Evacuatio Ventriculi aut primarum viarum, vel per Vomitus

tus vel per feculum, ne Eucementorum collavies maligna angustias Pericardiorum, Suffocationes, aliaque Symptomata excitet vid. HILDANUS c. 5. Obs. 91. & RIVIERUS c. 1. Obs. 77. Inveniens Inflammationis Indiciam, si Alvus supprimatur, Labia incipient tumere, Gingivae vel Tonguae, aliaque in Maxillis Glandulae, intumescere ac dolere, Odor gravis & foetidus ex Ore expirare incipit, quod tertio, quinto, vel sexto ad summum die contingit. Quoties vero ois tale intra triduum eveniat, Inflammationis usum decessu peregrinum, donec praedicta signa, eorumque monstrata erant saluatoria, superveniat. Hinc mirandum potius MASSA, quam imitandum, qui h. a. cap. 20. quendam jamdum frustra iuvandum per 37. dierum Inflammationem (interpolatis quamvis vicibus) demum à Lue Venerea liberavit: quorsum etiam PARÆUS spectat, quando de Lue Venerea cap. 12. die uno aut altero interjecto decies, quinquies & septies perfrictis convalescit periculis, nisi quantum quidem intervalla interjecta conceleat, legiorem minusque violentam reddiderit salivationem. Audiendum potius ZACUTUS LUSITANUS Pr. Adm. T. 2. Obs. 135, dum, si per aliquot dies nocturne continuata Inflammation, non salivationem, sed Anxietates tantum, Lipothymias, &c. moveat; ab hac desistendum, & cum sudoriferis peragendum esse monet: quae tamon symptomata neminem deterreat, modo salivatio sequatur, aut cum aliis, quae huius immensae quavis indices & prodromi sunt, combinetur. Continuanda salivatio pro morbi & Constitutionis Aegri ratione 20. dies ordinari sufficiunt, interdum & ad quatuor septimanas continuare licet: in specie eo usque procedat salivatio, donec pot salivam fluidiorem & tenuiorem, qualis primis diebus fluere solet, ultimo viscida, foetida & glutinosa perquam materia exeat, quae Muci spissioris formae fœdum vasu petat Glottidis infuset, aut parietibus ejus adhaerens haereat, vix enim ois Colluvies ex sedimento crassius.

Sub-Salivationis cursum attendere oportet ad emulsionem. Oris, propterea ut praecavatur, convenit Gargarismis ex lacte tepido, Raparum Decocto aut eorum succo: si vero periculis Emulsionem fiant, fiat Gargarismus ex Decocto Guaiaci, Plantaginis, &c. cum puco Alumini & Nello rostrato: quo ipso etiam subinde Emulsionem cum Precipito tangatur. Si vero de Alumine metas sit, ne sufflaminetur salivatio; ejus loco fal commune addatur, quod potius Fluxum promovebit.

Itaque Temperantibus & Mordacitibus etiam Hamorrhagiam Oris praecaveri potest, fit enim interdum, ut salivatio, si ipsius nimis existeret, ex acrimonia succorum & impetuore eorum metu, ingens Hamorrhagia Oris exierit.

Nisi inter salivandum Ager utatur parco & moderato: quod plus comedit Ager dum salivare, eo tardius curatur; cum non tam Rur nutritivis solidam partem Acido Venereo ioculis sub salivae forma tunc prodcat, quam potius Alimenta assumpta & in Chylum digesta excernantur: unde, si paulo copiosius procedat salivatio, propter Oris Exulcerationem, Dentium fluxorem & vacillationem, Gingivarum & Linguae erosionem, Pericardiorum aetia mollescit, & Nauseam, parum comedere querat Ager: Optima alimenta hic sunt Juicula ex Pane bis cocto parata, Potus fit Decoctum Lignorum non adeo forte, aut folitatum, quod melius, aut saltem eodem probè ceteris diluatur. A Vino penitus est abstinendum; nam salivatio eo facile fititur (O): Nil aequè hostile est salivantibus, quam Frigus & Aetium: illud in Aere ambiente & potu: hoc in alimtis. Utramque mox salivationem immittit, angustias praecordiorum inferre, & Artuum musculorumque partium varia pathemata molesta inducere solet. (P)

Accidit interdum contumacia Alvi obstructio: nam si praeter parum bis coctum in sulculis, aut Ovum forbile, nihil assumitur, Corporeque prius bene evacuato esset, & copiosa salivatio scquitur, facile praesumere licet, Alvim iri coarctatum: In hoc autem causa Alvi intacta relinquatur.

Quod si magis affatus & cum impetu precipitari ad Os materiam videmus, periculum subesse aut Fav-

Tom. II.

orem atque Gingivarum Inflammationem nimis, aut totallè Erosionem, aut suffocationem, iahbenda est salivatio, & Mediascento aliquo ad inferiora per feculum iter ducenda, quae Euceme iniectione evacuanda, & Os Gargarismate doctè duque sepius abluendum, item Velicatoria blanda aut similia Epispastica, variis in locis applicanda: in specie omne hoc apudum complet Opus interne exhibitionis. Aetiam nam singulari amicitia Mercurio ex Corpore evacuat, & ita salivationem fitit. Applicatur affricando eadem, vel in Ore detinentur, detentum absceit ex attrito Mercurio, inieitur igit, depuratur, & iterum in Os immittitur. Hac methodo quondam usum in nimia salivatione ROLFINGUS, applicavit & affricuit externè; in ore detinendo Nummos similiter aureos, quibus se infusoavit Mercurius; eaque ratione salivatio subata, adhuc partitis simul vicibus Laudano opato.

Quod si crebris licet salis Inflammationibus, tamen non sequatur salivatio, sed ex Mercurio, partes internas affricat, legantur plura terra aut grava Symptomata: cum reperitur certum quendam horum Causas, quae Mercurium salivatorum aut elidunt, aut non suscipiunt: In tali casu, dubie alio pleno, aut Sudoribus repetitis Visulencia per Mercurium inuocant insudata, correcta usuali cum Mercurio ejusdem ad imitationem ZACUTILUSITANI lib. 2. Prae. Adm. Obs. 135, cum interdum salivationem cessantem ex Hamoreum impetudine quodam promovet, id quod notabil Observatione docet SCHREKEDERUS pag. 219: aut per Vomitorium ex Mercurio Vitis in largiore dosi symptomata praecordiorum temovenda: interna Inuochomibus repetitis coarctandis, ut salivationis defectus compenietur Frigiditatem crebritate, donec insensibili Transpiratione Virus potenterius exsiccetur, ad imitationem notata significationis Calus HORSTII lib. 12. Obs. 14. Quo etiam facit singularis RIVIERI Observatio de horrendis symptomatibus sub incipiente Psyllismo ex Inflammationibus Mercurialibus natis, aliis Ictitis; Vomitorio evasit, C. 2. Obs. 77.

Observandum autem probè, quare non faciat salivatio, ac unde illa symptomata supervenerint? an Conventorum visulorum immobilitate, & circa Praecordia stagnatione? (nam per Mercurialium salivationem ex peripetria & artibus ad centrum moventur Comenta maligna: sicuti exorta per sudores ex centro ad peripheriam eadem distribuantur): an verò ex Vitiis Aegri debilitate salivatio non procedat. Necesse enim est, ut Aegri salivandi habent adhuc Vires utcuque firmas, nam salivando ordinario debilitantur. Quod si nimis reddant debiles, cessare, aut saltem admodum imminui solet Fluxus, Spirituum debilitate non ita commotus ex circulatione Hamoribus; unde receduntibus Viribus subinde repetere aliquo modo, sed imminuit: solet Fluxus. Aegri tales incipi, sed in quibus ex Vitiis debilitate nimis cito cessat salivatio, fin pot laaxam Alvim & aliquot dierum moram aequè debiles persistant, fit hoc Os Mercurio intus adhuc desinente, hinc progressus fit ad Sudorificia, succedunt tamen. Nam talium usu redeunt Vires; Aegri saltem mox melius exinde habere observantur. Commotum est, quom Venereis talibus, quibus pot salivationem peractam, sed non sufficientem, ob Vitiis imbecillitatem, absolutam, propinquare sudores; ab huius usu cum omnia Symptomata Venerea aet apparuerint quiesca, debet Dolores Artuum redire silent, Acido viscido à Mercurio soluto, & cum fluidis Corporis deinde unito, fit non excreto, Sudoriferorum vi ad extremos Artus horumque calida nerva secreto, quae nonnulli repetitis Sudoribus, applicando simul levem Litem Mercurialem, vel imponendo simul Emplastrum de Ratis cum Mercurio, usque repetitis, curari possunt, nisi recedat Vires deinde salivationem insititue velimas. Probè tamen hoc in casu attendere oportet, an Vires deficiant? quia si resolute seu exhaustae; nam do his haecem dida intelligenda: an verò sit oppellat ex malignitate per Mercurium commota? nam do his intelligendi sunt Casus isti ex MORSTIO, RIVIERIO, &c. allegati.

Quod si Symptomata quaedam ex salivatione à Mercurio Malignitate Nervis iocimicima, aut non suffici-

Kkk 2

(O) Imo potius Nisi hic in omnium Mercurialium usu Aqua omniis Aegritudinis interdicenda, & Vinosa, illibet parva patum, potendum exhiberem.

(P) Id ea ratione accidit docet Boerellus: Mercurius in Gallia amalgamatus cum Acido Venereis pellitur, & sublimatur à calore Sanguinis: quod si à frigido quipiam continetur, evadit in sublimatum cursum, atque agit in tunicis Pulsum lymphaticum, eaque cerrata, una universis corporis aeternum perturbat.

ciente ejus capillone, telilla fuerint, prout Remedia Solaria, tam interne quam externe adhibita, conveniunt in specie Decodum Guaiaci, de quo vid. THERMAYERUS l. 2. Cap. pag. 149. sicut de Remediis Solaribus, tam interne adhibitis, quam externe Litus forma applicatis, pro corrigenda Mercurii malignitate, conf. in specie ZACUTUS LUSITANUS in l. 2. Prax. Adm. Obs. serv. 119. item RIVIERUS Cont. 2. lib. 91. & Obs. 13. summus. 2. JACOTIO, ubi Cephalalgia diuturna, post curatum per Mercurii Litem Lucem Veneream refluxus, ex Mercurii malignitate nata, per Nummen aureum in Ore detentum fuit curata; Asem enim Mercurium allicit, & ita e Corpore secum rapit. Commendatur etiam ab HOECHSTEDTERO Dier. 3. pag. 323. Decodum Helenii & Feniculi, expectando Sudorem.

Mercurius Scorbuti est hostilis & inimicus, illis praesertim, qui ex Scorbuto Gingivarum & Oris Ulcerationibus sunt obnoxii. Dubius propterea fuit, an, quibus copiosa quasi Salia scorbutica Urinas impregnant, utt quoad cetera parum de Scorbuto perceperint, tunc salivatio possit institui, metuendo Dentium, Fancium & Gingivarum pathemata; sed talibus non nocuisse observavi: Imo Facies Ancillar, Luis Venereae contagium inquinatum, cum talibus Urinis, adpulo Foramine, ex Luc prope Uvulam emulcente, salivando melius habuit, & admotione Unguenti Aegyptiaci cum Melle rosato curatum fuit Ulcus.

Quod si Gravidia Luc Venerea infecta fuerit, etiam haec ipsa, modo alia respondeant, praesertim Vires, Salivationes tractari potest: cum sic simul & Fetus sanctus, qui aliis similiter infectus prodiret Exemplis videb. in HILDANO C. 5. Cur. 97. & 98. item VIARDEL in Observationibus de Partu pag. 93. item MORISON de Morbis Mulierum, item SANCHEZ in Observation. pag. 377., ubi refert Mulierem Luc Venerea laborantem, infimilis transfectionibus Mercurialibus usum & curatum, paulo post Puerum sanum peperisse. Conf. ROTALLUS de Luc Venerea. Sicut etiam infantes per Mercurium, tam foris illitum quam intus propinatum, nunc solum purgando, nunc salivando, a Luc hae liberari possunt. Quod usum Iulianissimus, & hanc secutam Salivationem, vid. BORELLUS de Luc Venerea pag. 346. Quod usum Mercurii internum, vid. HORSTIUS lib. 7. Obs. 11., qui refert Puellum sex menses toto Corpore, & impium circa Podicem, a Luc Venerea pulsionem, per repetitum usum Mercurii dulcis ad lib. & Oleo destillato Lignorum curatum: sic FABER Lucem Veneream in Infansulo unius anni per repetitum Mercurii dulcis Solaris exhibitionem curavit Cur. 39. item RIVIERUS C. 1. Obs. 95. & C. 2. Obs. 96. Lucem Veneream in Puero per Mercurium dulcem & decodum Lignorum curavit. Suspexit tamen in Pulsionibus Litem merito habet BALLONIUS: vid. BONETI Phasar. pag. 650.

Ceterum aequum vel iodatoria ista, vel haec Salivatoria Cura instituitur, prius fruantur Uvulae Luc Venerea infectorum, an adhuc robusta? an simul infecta? Nam si haec jam fuerint suppurata, perperam instituitur, cum Mors magis acceleretur. Probat etiam examinanda sunt Offa Carli junjam infecta; si enim haec Offa secundi paris maxillae inferioris, vel Offa inferiorem Oculi Canthum constituenta, item Offa Crani, cariola fuerint, a salivatione est abstinendum, aut Aegroti prius iudicandum, & in animum inducendum, utrum Oculum amittere, an verò Luc Venerea alterius infectus esse mallet? Dicit enim Offibus Oculorum cariola & separata, Oculum utrimque amittere. Si Offa Crani sine cariola, salivatione simplici negotium non succedit, sed Pericranii apertura necessaria est, quò Partes cariolae aliterque felleae separate eximi possunt: id quod non cruciatibus summis peragi non potest. Ulterior Offa Palati, Septum Narium, imò ipsa etiam Nasi Offa, multoties pereunt; haec enim jamjam atrofa in jussuris fit: non facili concrescunt, nec Ulcus sanatur, priusquam omnes particulae atrofae separatæ & semota fuerint. Hinc nonnumquam post salivationem & Carationem Vix cum Loquela & Facies emittit, dehonefatur: quorum omnium Aegrotantes prius bene sunt monendi.

Hic itaque praemissa, prius Corpus vid. preparandum erit, & prius vix manducandae, tam per superiorem, & circumstantiam permittitur, quàm per inferiorem, quia alia vel Medicamentorum potentiam eludunt congeha ibidem cordis, vel commotis ab istis gravia Praecordiorum & Abdominis Symptomata, in specie Anxietas,

insurgent; quod in specie fit à Mercurio, si Universalis ista aliquoties non fuerint praemissa.

Beneficentia, quam quidam praemittunt Chirurghi, postea est frustranea; bene autem digestiva & Preparativa, à e. Succorum Corpora vitalem Dyficilissimam corrigentia, ex Tartaro vitriolato, Terra foliata Tartari, Sale Absinthii, Lapidibus Cancerum, Sale volatili Viperae, Elisir Proprietatis sine acido, Tinctura Antimonii tartarifata, Tinctura Tartari compota, Tinctura Coralliorum suffragata, Essentia Fumaris, &c. per circumstantiarum rationem praemitti, & hinc Purgatio una alterave institui potest; aut certe Purgantibus talia digestiva admiscenda, praecipue si per Epuracem evacuat animus sit, nunquam negligendo specificis.

Quod si peracta sit Salivatio, praemissa per Alivum purgatione blanda, procedatur adhuc eo ordine, quem docet HARTMANNUS §. 38. V. g.

℞. Ligni Guaiacii lib.

Tr. 1/2 lib. vii.

Infunde in

Aqua sum. Bulli.

Maceretur non tam 14. quàm potius 48. horas, ut

valet LINDANUS: Coq. ad medietatem.

D. S.

Potio Sudorifica Sanguinem purificans.

Magnam vim affunde demum

Aqua simpl. Bulli. ad xv. vel xvi.

& aliquantum coque, circa finem addende

Rad. Liquirit. lib.

Paeul. min. cont. lib.

Facile Colaturae adhuc repide adde

Cinnamon. anat. lib.

F. Bocheum & S.

Potio Ordinaria.

Priori decodo utatur ad lib. vel v. pro Sudore magis elicendo; posteriori verò pro Pitu ordinario; quo nimirum, si particulae malignae in Massa Sanguinis nova concrescunt, ex mora eliminantur.

Probat etiam est notandum, quod peracta salivatio omnis Amida, non cum Lechulis Aegrotantium, fit innotandus, ne misaluta prius inflat novi Verminis natiq. Massam Sanguinem fubeant.

Pro scopo purgandi Mercurialis primarius desiderat, utpote quibus ritè purgantibus nullum praesentiam in hoc Macho Remedium existit vid. HORSTIUS l. 2. Obs. 5. V. g. Mercurius dulcis, qui reliquis facile pulmam praeripit, annotante SYLVIO de Luc Venerea §. 257. Arcuum Corallinum, de quo pariter vid. SYLVIVS l. 2. §. 283. Mercurius cum Venere praecipitatus, item Mercurius Praecipitatus albus, quem RIVIERUS Obs. Commun. pag. 321. 337. & 346. commendat. Hic non immerito addenda Cycotymus, de qua vid. SYLVIVS §. 253. V. g.

℞. Extr. Cathol. vel Panach. Crall.

Malt. Pilul. Cork. min. an. gr. xii.

Mercurii doli. gr. xv. ad lib.

Extr. Trach. Alb. vel Mag. Jalapp. §. i.

vel ii. vel iii.

Olei destillat. Lign. Guai. vel Zeredin. gutt. ii.

Cum l. q. Mism. Lignorum, vel Ligni Santali.

F. Pilulæ.

D. S.

Pilulae Sanguinem mundificantes pro una dosi.

℞. Extr. Cathol. Crall. vel Malt. nigri,

Mercurii doli. an. gr. xv.

Scamm. sulphurati,

Extr. Trach. Alb. an. gr. ii.

Cum Mism. Fumar. F. Pilulae.

D. S. ut ant.

℞. Extr. Cathol. Androm.

Panach. Crall. an. lib.

Mercurii doli. gr. xii. ad gr. xv.

Extr. Trach. Alb. an. gr. i. vel ii.

Olei destillat. Guaiac. gutt. ii.

Cum Mism. Ligni Santali F. Pilulae,

D. S. ut supra.

℞. Malt. Pilul. de Fumar. lib.

Mercurii doli. lib.

Mag. Jalapp. gr. v.

Olei destillat. Zeredin. gutt. ii.

Cum *Æsc. Lignorum* F. Pilulæ.

D. S. ut suprà.
Vel

Æ. *Æsc. Panchym. Cretæ*, vel *Catbol.*

Mercurii dulc. an. gr. xv.

Stæam. sulphuræ. gr. vi.

Cum *Æsc. Lignorum* F. Pilulæ.

S. ut suprà.

Æ. *Maf. Pilulæ. Catb. min. Di.*

Mag. Jalapp. gr. v.

Turb. minor. gr. iv.

Olei deßilæ. Goad. gutt. i. vel ii.

Cum *Æsc. Ligni* F. Pilulæ.

D. S. ut suprà.

Æ. *Maf. Pilulæ. Catb. min.*

Di-Colony. an. gr. viii.

Turb. minor. gr. ii.

Turb. Trach. Alband. gr. i.

Cum *Æsc. Fumar. F. Pilulæ.*

Vel

Æ. *Æsc. Panchym. Cr. Di.*

Mercurii dulc. an. gr. xv.

Mag. Gummi Gout. gr. iv.

Jalapp. gr. ii.

Cum *Æsc. Fumar. F. Pilulæ.*

D. S. ut suprà.

Æ. *Mercurii dulc.* gr. xv.

Mag. Jalapp. gr. iv.

Turb. Di.

Pulvis sanguinem purificans pro una dosi.

Æ. *Mercurii dulc.* Di.

Stæam. sulphuræ. Di.

M. f. Pulvis.

D. S. ut antè.

Æ. *Sp. Di-Colony. cum Rhubarb.* Di.

Stæam. sulphuræ. gr. xi.

Turb. Alband. gr. i.

M. f. Pulvis.

D. S. ut antè.

Æ. *Confer. Fumar. Zi.*

Pulv. Catbol. purg. Di.

Mercurii dulc. gr. xii.

Cum *Conf. Fum. F. Bolus.*

D. S.

Bolus Purgans pro una dosi.

Æ. *Pulp. Paffal.* Zi. vel Zi.

Mercurii dulc. gr. xii. ad xv.

Stæam. sulphuræ. gr. lii. ad v.

M. S.

Electuarium Purgans pro una vico.

Æ. *Conf. Fumar. Zi.*

Mag. Jalapp.

Stæam. sulphuræ. an. gr. vi.

Turb. minor. gr. iv.

M. f. Bolus.

D. S. ut antè.

Observandum autem quod Purgatio talis, quod ubi Lues Venerea adhuc est in fori, & Genitalia saltem occupet, ut in Gonorrhæis, Bubonibus, &c. quid tunc vel unica talis præmissa Purgatio sufficiat: (vid. PLATERUS Pr. Tom. 3. pag. 450.) ne Virus commotum ad loca interiora, occasione irritationis in primis viis factæ, commoveatur; & in specie Buboni sub Purgatione tali Emplastrum, ut vocant, Attrahens, seu ex Gummibus acris vel focans admoveendum. Quod si Lues sit inveterata, & in Extremis præcipue partibus hæreat, non tamen Purgationibus fortioribus aut repetitis Materia peccans intro revocanda, sed una alterave tantum præmissa ad ipsam Curam accedendum. Potest ergo in Lue non dum adeo confirmata, & cujus inquinamenta adhuc maximam partem Fluida Corporis occupant, Purgatio repetita; & fortior, addito Mercurio indicenda. Sub ipsa Salivatione, nisi sit nimia, & Purgatione penitus abstinendum, nec sub sudationis cursu eadem adeo convenit;

bonæ autem finita Salivatione, & Sudatione una altera vice institui potest, si necessarium videatur; sicut ante Salivationem Vomitus profusus est, à quo Salivatio sequitur facilis. Interdum tamen, si Symptomata, & Indicationes promiscuæ fuerint, quilibet quarta vel quinta die sub Sudatione Purgatio institui, aut ipso Decocto sudatorio Purgans quoddam, præsertim Colocynthidis, incoqui potest, ut ubique, quorsum Natura vergit, succurramus. Si vel à Morbo ipso, vel à Purgantium frequentiore usu excutitur Dolor, his unum vel alterum granum Laudani opiatum admiscere convenit. Si Purgationes per Mercurialia institutas, & frequentius repetitas Salivatio sequatur, à Cathart. ulteriore desistendum, hæcque vel permittenda, si sufficiens fuerit, vel juvanda, quod tamen primis quatuor diebus, utut Salivatio compareat, non attendendum.

Quoad *Phimosis*: horum assumptionem indicant

1. Ventriculi cruditates, atque fordes eliminandæ.

2. Excrementorum collicives malignæ à Salivatione magis aut simul ad Ventriculum commota, atque in hoc Molesta, aut Anxietates excitantes; qualem casum RIVERIUS Cast. 1. off. 77. refert.

Præter dicta hæcenus Remedia commode etiam alia asurgunt: ut quando sudoriferis decoctis vel Salin. volatilibus, & spiritibus urinois, vel Essentia Lignorum, vel sulphur Auratum diaphoreticum secundum HORSTIUM, vel spiritus Theriacalis camphoratus, vel Mixtura simplex, vel ipsa Theriaca, vel perspersio à sudoribus vacuo propinquant, aut etiam ante, & post Salivationem exhibentur: quo etiam Cimabarina Remedia, Viperina, Antimonium diaphoreticum, Ceraffa Antimonii, Extractum Ligni Sandi cum Sale volatili mistum, Rob. Jussipii aut Sambuci, Oles deßillata Lignorum, & similia Polychrestia, & ex his composita pertinent, v. gr. Electuarium Mafæ, quod Pulvis subtilissimus Ligni Guajaci, & Sympus de Fumaria ingreditur:

Aut

Æ. *Rasar. Ligni guajaci, live naturalis, live*

aristæ. Zi. vel Zi.

Sulphur. Antimonii diaph. Di.

Sal. vol. Cura. Cura. vel Viperæ. gr. xii.

M. pro 1. dosibus: S.

Pulvis sudoriferus sanguinem mundificans.

Vel

Æ. *Corræ. antimonii.* vel *Antimonii diaph.* Zi.

Cimab. Antimonii Zi.

Sal. volat. Cura. Cura. vel Viperæ. gr. xv.

M. f. Pulvis.

Div. in 3. part. æqu.

D. S. ut antè.

Vel

Æ. *Mix. simpl.* Zi.

Spiritus Ligni guajaci,

Sassæ. an. Zi.

M. D. S.

Mixtura sudorifera.

Dosis eo. ad 60. guttas.

Aut

Æ. *Æ. Lignorum.* Zi.

Viperæ. Zi.

M. S. ut antè.

Hicce modis hæcenus recensitis Methodica, & ordinaria cura peragitur.

Quod si vel Malum sit levius, & spes sit, idem facile curari posse, vel Eger tam stricte Cura se subijcere nolite, sequentia aliquoties plura minus proficua observata fuerunt.

Æ. *Cor. Lign. Sandii* Zi.

Rad. Sanæparrill. Riv.

Fal. Iron. fine. Zi. Zi. ad Zi.

Rad. Liquirit.

Mellib. nig. an. Zi.

Pulp. Calceolæ. Zi.

Incil. & contul. infunde in

Vini,

Corræ. an. Menf. iii. vel iv.

Coqu. in Laguna flumina, vel in Cucurbita probè clausa

in Balneo Mariæ per 4. s. vel 6. horas:

Colature adde

Melibræ. dr. ii. vel lii.

D. S.

Potio Alterativa Apertina.

De

De quo bibat *Ager* bis in die 3. vel 4. *ſi*as, mane & vespere aliquot horas ante cenam, viscida mucaginosa cum euphorbia evacuat.

Cum hoc decocto Purgante *Ager* omni tertia, vel quater die usurpet hoc sudoriferum:

*℞. Rad. Sarsaparill. ʒvi.
Ligni Sassa ʒvi.
Cort. Ligni Sassa ʒvi.
Ligni Sassa ʒvi.
Rad. China,
Liquirit. an. ʒij.*

Som. Anisi ʒi.
Infundantur & coquantur in
Aqua communis. Meul. x.

ad remaneant Meul. vi.

Colatura detur pro Potu sudorifero, interpolatim, ut novius, cum illo Laxativo usurpanda:

M. S.

Potio sudorifera sanguinem purgans.

Ex utriusque decocti remanentia etiam decoctum secundarium fieri potest, quod usurpetur una cum illo.

In decocto sudorifero, si placeat, cubitet haustus pro excitando sudore simul permisceri possit:

*℞. Quina ʒss. ʒss.
Stiracis Theriac. ʒi.
Clysti Antimoni ʒss.
Spiritus Ligni guajaci ʒij.*

Misceantur pro doli: S.

Mixtura sanguinem purificans.

LUIS VENEREÆ SYMPTOMATA.

Perlegendum iam ad *Curam Particularum Symptomatum.*

§. I.

Gonorrhœa gallica.

Aliis Virulenta dicta, item Maligna & esse saltem illa, quæ ex Coitu impuro cum Femina Lue Gallica infecta contrahitur, & quidem in tali, ubi Malum illud Ulcera in Vagina Uteri excita vitæ talescum Femina aptæ sunt, ut per Coitum virulentum Gonorrhœam Mâli possint communicare. Ab alia causa nascuntur. Effluit in hoc ipso cum acerbio dolore circa penis radicem, ubi sunt proflata glandulæ, primo feminales aquosius Liquor, & prolati nempe, qui hinc successu flavescit, tum citiuscit, & magis accrescit, tandem viridescit aut cerulea, imò lubide Potulenta permittitur, non raro graviter licet. Dolor talis est, ut nunquam Urina sine acris dolore mlti liquor supervenit tunc Tumor præputii & Glandis; Nam liquor hic vellicando præputium primo peritum infert; dum reliquias ponit inter præputium, illud purulentum reddi; tandem Tumor infert, ut difficulter possit detrahi & Glande, unde in conjunctione Utriusque sunt. Talis Gonorrhœa accidit, ut visitant Galliam, & Italiam: interdum adeo acris est, ut nunc proflata glandulæ, nunc Meatum urinarum corrodant, & exulceret, ex quibus Ulcusculis succre-

scit postmodum Caro præternaturaliter inflat, cuiusdam Veruæ, quæ casalem Urethram tandem obstruendo Urinæ excretionem impedit, & vulgo *Gonorrhœa Mætu urinarum* vel penis appellatur. Affligit hæc Gonorrhœa constitudo, imprimis secundum indolem Luis Venereæ: velpertino aut nocturno tempore cruciat, adeo ut eodem tempore acerbissimi dolores crucientur, ique & horribiores, & forsitan lætædant, & erigat Membra. Sin Malum ulterius procedat, superveniunt crudelis Ardore nocturno Lumborum, & quæ sint similia symptomata Gonorrhœæ Virulentæ.

G A U S S E.

Causa hæc Gonorrhœa est simplex Celibitium fermentativum Venereum per Coitum ex Muliere infecta, & quæ Utriusque Gallia plus minus in *Vagina Uteri* habet, haustus. Malum cum proflatu est hæc ipsa Gonorrhœa Gallica: adeo ut referat BALLONIUS l. i. Cap. 9. de quodam Viro, qui ex Coitu impuro Gonorrhœam Virulentam contraxit, unde postmodum non tantum propriam Urethram inquinavit, sed cum eadem Filium quoque generavit, mox à primo ortu eodem Mâlo affligit.

P A R S A F F E C T A.

Rapitum hujus Gonorrhœæ sunt eadem proflata glandulæ (rarò enim ulterius exiit, ut etiam ipsos Testes arripiat; id quod confirmat experientia Anatomica: vid. RO-NETUS. Anat. pr. l. 3. sed. 3. affligit. SPIGELIUS de Anatomia Corp. Fabr. l. 1. cap. 47. BARTHOLINIUS Anat. Reform. lib. 1. cap. 23. & lib. 2. Hæst. Anatom. 36, ubi aliquot memorantur ex Gonorrhœâ huiusmodi, in quibus proflata glandulæ: fuerint reperiuntur, unde & dicuntur: Unde etiam tali Gonorrhœa infecti Urinam emissuri acerbissimum Dolorem in eademe penis, ubi illæ proflata sint sunt, imprimis percipere solent (Q) id quod egoon nunc tumescit, nunc exoritur vel exulceratur proflata glandulose esse solet. Nam dum in Coitu intentus incaluit portes genitales, tunc Utriusque Gallia Vagine utrinque exhalant, & transiunt: hinc & proflata aria, quæ post excretionem Semen virile se infundunt in Urethram, penis, ibique se affigunt, & per meatus ex modo excreta Genitura adhuc patulos inproflata glandulose se infundunt, & Fermentatione corruptiva impugnant ibidem Lympham seu liquorem elaborandum, & fecerendum, eumque in Acrimoniam acidam corrodunt malignam, qualis in Lue Gallica prædominatur, corrompant. Unde postmodum exinde talis succus acris acidus corruptivus proflatur non tantum in similia Ulcera corrodit hæc proflata, sed etiam Meatum urinarum, & præputium exoritur, unde Sæpius testatur, & ulcerose aut ichorosis continuis proflatur, atque quidem dolorosa, & tam dira, & atrocis ac dolorifica symptomata oriuntur, qui Fluxus Gonorrhœæ Virulentæ seu Gallicæ nomine venire solet, Fluxus Lædemonius vocatur aliter. Promotum ulterius, & à lita serpens Contagium, itat per Vasa deferentia Testes iugrediat, horum Tumorem, & dolorificam Inflammationem infert. (R)

DIA-

(Q) Dolorem penis percipiunt in ea Glandis parte, cui Præputium allegatur: id tamen si penis ex causa fibrarum illas ex partibus intertribus constituitur.

(R) Gonorrhœa virulentæ sedem triplicem in mariis esse advertit Dom. Littre, quod cicatrices & alia in eademe viribus reperta, satis manifeste ostendere nitur: triplex nempe Glandularum genus, quarum Vasa excretria in Urethram hauri, ad liquorem tuissimum excretionem: Vesiculae nempe Seminales, Proflata, & Glandula Coepperti. Ad hæc enim viri Gallicæ & muliere male affligit eodem tempore prorsus, si peritingerit, easdem corrodit, rursus, succutitur in istis foribus corruptis, qui Sæpius forma per Urethram proflant. Gonorrhœa virulentam constituit. Hinc Gonorrhœa vel dicitur Simplex, si unum ex his tribus specibus Glandularum occupat; vel Complicata, si plures, hinc nempe, vel omnes. Quamvis Vasa excretria Proflatarum, & Vesicularum Seminalium, satis proxima & sensu simul in Urethram hauri; hinc viri ad Glandularum species adherent, facili negotio in aliam transire poterit: quoniam Generis & Simplicis in Complicata satis prom- te exat. At quoniam Vasa excretria Glandularum Coepperti non hauri in Urethram nisi distantia duntaxat duntaxat ab hauri excretionem versus Glandem; hinc haud facili fieri poterit, ut malum prius Glandula inproflata, Glandula Coepperti simul quoque afficiat. Et quoniam Sæpius & Vesicularum Seminalium, & Proflatarum proflata rursus in istis foribus beat affligit distant Glandularum Coepperti, ut facili nui credere possit hæc d præterflant Sæpius omnino affectibus viri; ut quoniam hauri Glandularum affligit ea rursus in Urethra meam sua sunt, ut liquorem excretionem versus Glandem rursus dirigat: quæ rursus diffilic est, ut Sæpius eadem motu determinatione per Urethram fluens, iter recipiat, & ad Glandula Coepperti per- veniat, easque virulentia afficiat.

Hinc promum est conjicere, hanc frequentem esse eam Gonorrhœam Complicatam, in qua rursus post affligit Vesicularum Seminales, & proflata, Glandula Coepperti in consensum trahatur. Imò valde rara est ea simplicis Gonorrhœæ species, in qua sola Coepperti Glandula affligit sint. Tamen enim hæc Glandula ob majorem viciniam prorsus videretur ad viam Gallicam suscipiendam; atamen notas laudat Littre hanc Glandula distans, prius quam

DIAGNOSIS.

Diagnos. hujus Gonorrhoeae ex primò dicta Historia est clara.

PROGNOSIS.

Quod Prognosis: observandum, quòd Gonorrhoea haec in princip. leve malum sit; quo citius ipsi occurrat, eo facilius curatur.

In Senibus ut plurimum ad mortem terminatur.

Nisi leve illi occurrat, in progressu escoriatur Glan- dulas & quandoque absumit.

Interdum non ritè curata, sed saepe oppressa, ulterius serpit, & Testes ingulnat, in quibus Tumores, & subinde Bubones insert.

Tandem in perfectam Luem Veneream terminari solet. Fermento maligno successivè partes vicinas, & cum sanguine universum Corpus tandem inscensit, & ita perfectum Gallicum Morbum inferente. Et hic est modus communissimus, quo Lues Venerea contrahitur.

Optimè notandum est, frequentius supervenire Bubones Glandularum in Jugularibus, quod malum est; si enim hoc fiat, certum est, universum Corpus correptum esse: malum etiam signum est, si ipsoe iterum dilapseat.

CURA.

Quod attinet Curam: in hac Fermentum illud Gallicum virulentum appropriatis, partim Mercurialibus, partim Acidum corrigentibus, debet curari, & qua data pota, speciatim per ludoes & vias Urinarias, ea Corpore & Massa Sanguinea evacuat, Remediis aliis addendo Semen Violarum, Lapides Cancrurum, Radices & Ligna superius nominata, utpote, prout vim specificam atque Sudoriferam, Diureticam pariter habentia. Hae Partes iuxta Balsamici abstergantur & coalescent.

Alia autem Inflammati Cura, si Fluxus hic principium Morbi exstiterit, nec ab ipsa adhuc infecta sit Massa Sanguinea, alia, si eadem simul contaminata, & Lues Venerea Universalis magis jam tam janda fuerit. Quippe in priori casu ante omnia pro Ulcere Prostatitum & Vesicularum seminalium mundificando, Humor acris contemperetur & corrigatur per Emollientes in Gonorrhoea alias consetas, propriis ex Semine Cannabis paratis; Ad Septic, Succinum, Terrebithinam, hujus Oleum, & Balsamum Indicum. Si vero reliquis Lue Venereae Symptomata Gonorrhoea superveniat, aut hujus Virulentum Massa Sanguinea jam tum notabiliter inquinata fuerit, Universalis Cura opus erit.

Quòd si cur lubeat se praeservare ab hac Gonorrhoea, quem nempe Venus verat, interim tamen non certus esse poterit, an cum infecta coeat? si Praeventiois loco mox ante aut post Coitum assumat Spiritus seu Olei Terrebithinae guttas vii. viii. vel in haustu Vini generosi, hujus enim Sal volatile oleosum metatum Urinarum abstergit, ac corrigat Coitum virulentum fortitan haustum. (S)

Quòd si verò quis jam affectus sit hoc Malo, & laboret Gonorrhoea, autè omnia purissima Corpus per Universalis Purgantia, Mercurialibus locata; v. g. fiant Pilulae ex Extracto Hellebori nigri, aut ex Extracto Catholico Andersoni, aut Panchymago Cralli, cum ana Mercurii dulcis, huius pen stimulo adjuvantur aliquot grana Extracti Trochiscorum Albandi; Colocythidis enim efficacia mirè commendata est ab HELMONTIO in Cura Lue Venereae, praestata ubihs Lignorum.

24. Extr. Panch. Crall. vel Helleb. nigri, vel Mass. Pilul. Cathol. Ludov. gr. xii. ad xv.

Mercurii dulc. gr. xv.

Extrakt. Troch. Alband. gr. i. vel ii. ad iii.

Olei deffillat. Terrebith. vel Guajac. gutt. ii.

Cum Effent. Guajac. F. Pilulæ in S.

Pilulæ Sanguinem mundificantes.

Vel

24. Extrakt. Panch. Crall. vel Helleb. nigri,

Mercurii dulc. an. gr. xv.

Stamm. Sulphur. gr. ii.

Extrakt. Troch. Alband. gr. iß.

Cum Effent. Ligni Saffras. F. Pilulæ.

D. S. ut antè.

Convenit loco Mercurii dulcis, *Mercurias Praecipitatus viridis* Venereus cum Calce vivâ paratus, qui hic est specificus, ejus descriptio vid. in SCHROEDERI Pharm. ubi de Mercurio: Alii utuntur hujus Mercurii Praecipitati viridis primitus quidem videtur augere malum, sed bonum est signum; si enim contemperatur, tandem id eciliat: e. g.

24. Extrakt. Panchym. Crall. vel Cathol. gr. xv.

Mercurii praecipitati virid. gr. v. vel vi.

Extrakt. Troch. Alband. gr. ii.

Cum Effent. Ligni. F. Pilulæ.

S. ut antè.

Aut Pilulæ de Terrebithina, vel Terrebithinae codice miscetur Mercurius dulcis. e. g.

24. Terrebith. op. 34.

Mercurii dulc.

Offi. Sopia prop. an. 36.

Cum Oleo deffillat. Succi pro 3. doibus.

F. Pilulæ iterandum.

D. S.

Pilulæ Sanguinem mundificantes pro 3. doibus. Non tantum laesit, sed & Gonorrhoeam respiciunt. Vel fiant Bolus ex Terrebithina Cyprina cum Khabbaro ac Mercuriali remedio, vel dalei, vel alio. In Subiectis fortioribus.

24. Turbith. minor. Cralli gr. vi. vel viii.

Cum Lq. Conserv. Rofar. vel alio approp. f. Bolus.

D. S.

Bolus Sanguinem purificans.

Vid. SYDENHAM in Epist. Med. 2. de Lue Venerea p. 76. Nam licet Mercurialis talia in principio videatur augere malum, istum ramen audacter insistendum; cum non detur appropriatum magis Remedium contra Virulentiam Gallicam, quam Mercurialis.

Evacuatis ita Corpore cum Mercurio dulci, five semel, five repetitis vicibus, pro ceteris conveniunt Balsamica appropriata, dicta loca albugeritica: Inter quae eminet Terrebithina, Oleum deffillatum Terrebithinae, in specie Balsamum sulphuris terrebithinae aut guttas xii. vel xv. ad xa. bis quotidie assumptum, aut juniperinum. Continetur aliquandiu. His ipsis commodè subyngeatur Aqua Scuritana contra Coitum virulentum, quam lex censis expertum esse gloriatur. Videatur etiam SCULTETUS in Armen. Chirurg. Observ. 79., qui ipse etiam addit hujus Aque experientiam. Loco hujus Aque Balsamum Sarum terrebithinae, ex Saccharo saturum & Oleo Terrebithinae blando igne paratus, vid. in ZWELFFERO in Mantissa Mercur. ubi de Saturo, egregie conducit, ubi ardet nimis elica Renes & Genitalia juvantur, vel solus, vel mistus cum Oleo Juniperi, addita Campora; non absumendo Semen, ut vulgè putatur, sed absorbendo Acidum vitiosum in hac Gonorrhoea.

in Urinam hinc, ad pulvis crassitiam, inter cellular, ex quibus Urinæ parietis formati sunt, perfrangere: quare fit, ut, quam citius potest, cellula illa vasis inflata undique comprimatur exigui: illos Glandularum dulus, hinc facile fieri possit, ut Virus Gallicum summa violenia nonum, Glandularum Coitum penetrata febat, eoque mact officiat.

Gonorrhoea Simplex, cujus sedes est in Glandulis Coitum, huius dignificatur Signi. Delorem percipit Ager circa medium Perine, ubi nunc illarum Glandularum dulus in Urinam hinc: atque item circa Anum, ubi Glandula effa sua sunt, dicitur, ubi quique hanc exiguum tumorem natus Chiturgus, ex inflammatione scilicet ex tamdallione Glandularum scilicet, Saneis fluitis quatuor satis exigua est, pro exigua tempore Glandularum affluente mole, atque tiam obsecratur. Omnis nuncini mola est hac Gonorrhoea species, tam ob materia summi porritatem, tam quia satis brevis via est, qua Saneis ex Glandularum dulus ad Glanum perducitur.

Curata ergo inter omnes alias species facillima est Gonorrhoea Glandularum Coitum: praesertim quoniam pars affecta, vix sub Cure latens, passu facile ab externis Medicamentis actione reficitur. Quare pro illius Curatio Fatus, Cataplasmat, & Balsami ex paraceticis & emollientibus praecipuo Littre.

(S) Sicut quoque caca Pteritis affa miseri percipit, ut se & Gallica Lue praeservens, post impuram coitum, injellione enjue fanguine deffertentis liquoris, ex syringe scilla, Urinam perhinc, ut veneno qui citius fieri possit latente eliminato, nullus sit profectus exacerationis loca.

ihona peccans: qua ratione etiam *Camphora* conducit, non quod calstret per Nares, ut putant, sed tanquam Sal volatile oleosum detergit & corrigit Acidum Venereum.

℞. Olei Terebinth. ℥iij.

Camph. ℥i.

Sacch. Saturni ℥ss.

M. D. S.

Balsamum Sanguinem mundificans.

Item Tinctura Antiphtisica ardorem Reum post Gonorrhoeam optimè compescit:

℞. Off. sup. prop. ℥i.

Sacch. Saturni ℥ss.

M. f. Pulvis pro tribus dosibus.

D. S.

Pulvis Refrigerans & Sanguinem modificant.

Justa hanc convenit Extrahum Tormentillæ cum Saccharo, & Oleo destillato Terebinthinae in formam Pilularum redactum: v. g.

℞. Extrah. Tormentill. ℥i.

Sacch. Saturni ℥ss.

Camph. ℥i.

Cum f. q. Olei destillat. Tereb.

F. Pilule

D. S.

Pilule Adstringentes & Sanguinem purificantes.

Pilule singulare quæ habent.

Item conveniunt Pilule de Terebinthina contra Gonorrhoeam ZWELFFERI in Pharm. Reg. p. 70.

Hicce addatur Infusum *Cantharidum* in Vino, quod expertum est Remedium cupisimum Medici Belgæ; quatenus Cantharides acerrimo sale volatili abundat (T). Parandis modum vid. in *Collegio Pharm.* in Schrad. P. 2. S. 3. p. 111. BARTHOLINUS Cent. 5. Observ. 51. Decocta Lignorum, Essentias aut Extrahæ Lignorum, etiam per se nota,

& ad Luem Veneream & eius prodromum Gonorrhoeam, commendatissima siccæ pedæ præterea. Tinctura Cassii cum Spiritu Lignorum parata est egregia, sed crebrius usurpanda. Resina Ligni Guaiaci expertissimum est Remedium ad hanc Gonorrhoeam: item

Essentia ac Extrahum *Guaiaci* cum Tinctura Tartari vel Spiritu Vini tartarizato paratum, in Aqua Plantaginis lubandæ propinacum summum etiam specificum est in hoc casu: nam in Resina hæc perfecta consistit Cura Gonorrhoeæ Malignæ. Aliâ etiam Balsamum de Petro ad aliquot guttas assumptum, vel, quæ omnia est præstantissimum & longe excellentior Balsamo Peruviano, Balsamus de Capivi, præter usum externum Chirurgicum: ex fida Belgarum experientia Specificum est Remedium in Gonorrhoea Virulenta, uti etiam Stranguria, à guttis ℥i. ad v. vi. vel viii. in Vitello Ovi dissolutum, vel cum Saccharo in forma Pulveris assumptum, & fuit Experimentum LINDANI: aut ejusdem cum Spiritu Vini tartarizato parata Essentia in quavis Gonorrhoea est proficua. Antimonium Diaphoreticum, Bezoardicum Minerales & Martiales, & similia laudantur. Item Succum Limonium cum Spiritu Terebinthinae & Camphora ex FABRO jam proposui: uti hujus Experimentum videre est in SCULTETO Observ. 79. Arman. Chirurg. cit. loc. Singulare quædam Medici Experimentum est Aqua Mercurialis vel *Mercurialis*: qui recipit *Mercurium vivum*, coquit in Aqua simpli per aliquot horas, decantat Aquam & remanent Mercurium in eodem plumbæ ponde, quo fuerat ante ebullitionem; hinc Aquam istam propinquantidum mane & vespere bonum haustum, & est egregium Remedium, quo successivè sedatur Gonorrhoea Virulenta.

In BARTHOLINO refertur Cura Gonorrhoeæ Virulente per Pulverem Sympatheticum; id quod eatenas veram est, quatenus ex processit Exulceratio Prostratarum, ut contracta Vasa Sanguis quoque effluat: Unde talis Sanguis purulentus quoque effluens Pulvere Sympathetico facta noto acceptus in distans curavit Gonorrhoeam.

Quod si fiat, ut sæpius etiam fit, Exulceratio in Pro-

statu glanduloso, indeque Dolor & Ulcus in Mente Urinario, tunc conducunt Iniectiones per Siphonem in Penem, quæ sunt ex Succo Plantaginis cum Melle rosato, quæ diluantur cum Aquâ appropriatâ: Vel inieciuntur Lique ex Stercore Gallina, quem HARTHMANNUS pag. 164. in Vesicæ Ulcere commendat: Aut parentur Iniectiones ex Aqua Calcis vivæ, in qua ebulliant summities Hyperici, Flores Meliloti & Verbasci, Aloe, Melle, Mercurio dulci, & similibus; sicut mihi in usu sunt Iniectiones omnium optimæ:

℞. Aqua Calc. vivæ ℥iij. (vel hujus ℥i.

& Plantag. ℥i.)

Aloe hep. ℥ss. vel Essent. Aloe ℥iij.

Mellis rosat. ℥ss. vel ℥vi.

M. pro Iniectione in Penem cum Syringa aliquoties lo die Injicienda; S.

Iniectione Purificans.

Vel

℞. Aqua Calc. vivæ ℥iij. vel iv.

Aloe,

Myrrhæ an. ℥ss.

Mellis ℥vi.

M. f. Iniectione in Penem cum Siphone.

D. S. ut antè

In malo graviori etiam Iniectionibus talibus per se nata ana Mercurii dulcis respectu Aloe addi potest vid. Idea Formularum Class. 4. §. 17. Vel Decoctum *Menturii dulcis* edulcoratum cum Melle, quod pro tali Iniectione in usu esse solet: vid. SCULTETUS in Arman. Chirurg. Observ. 79. Vel mixtura ejus Part. 1. Observ. 65. ex Succo Plantaginis, Melle rosato, Aloe, &c.

℞. Aqua Calc. vivæ ℥iij.

Mercurii dulc. ℥ss.

Sacch. Saturni ℥ss.

M. S.

Aqua Purificans.

Vel

℞. Decoct. Plantag. cum Aqua Calc. vivæ par. ℥iij.

Aqua Aloe. ℥iij. ad ℥ss.

Mercurii dulc. ℥ss.

Mellis rosat. ℥vi.

M. S.

Mixtura ad Iniectionem.

Aut si altius processerit malum, Iniectiones Aloeticæ cum modico Mercurio sublimato, aut etiam, ubi ferocius fuerit malum, cum Mercurio sublimato, erunt infundendæ. (V.)

Quod si intra Glandem & Præputium Uleuscula sint, carantur sequenti Linimento:

℞. Unguenti Diapomph. ℥iij. ad ℥ss.

Mercurii dulc. gr. xv. ad ℥i.

Aloe rosat. vel Nigar. gr. xv.

Mell. rosat. q. s.

M. f. Linimentum pro Uleusculis in Glande; Item intra Glandem ex Præputio illinendis;

D. S.

Unguentum Mundificans.

Vel si Ulcus fuerit *Cancerosum*, Iniectionibus jam dictis loco Mellis rosati addatur Unguenti *Aegyptiaci* q. s. pro diverso Virulentiam gradu: si vero Cancer extra meum Urinarium conspicitur, ut commodius applicare liceat medicamentum, solutione Mercurii sublimati in Aqua appropriata facta contingatur, aut Lincola eadem imbuta probeque expresse superimponantur.

Quod si Vixera Præputii adfuit cum aliquali ejus Tumore,

℞. Unguenti Diapomph. ℥iij.

Olei Tartari per deliq. ℥ss. ad ℥ss.

Miscetur & dilinatur; S.

Unguentum Sanans.

Rinos Studiosos Gonorrhoea Virulenta cum dolorosissima mictione, Ichore purulento profusente, ex parvis Uleusculis in Glande laborantes, curavi præmissis Pilulis Mercurialibus Purgantibus, cum f. q. Olei destillati Terebinthinae paratis: jussu quotidie bis 12. ad 15. guttas

(T) a Cantharidum usque penitus abhorremus: illarum Infuso vel inusu assensum, vel per Iniectionem assensum, sapè Mili trahunt, & Urethra Exulcerationis: factas vidimus, non sine Aegrum periculo.

(V) Petere Gonorrhoea virulentam, guttulum septemvenero Sanici perinoster manus, nostra hujus Aqua Iniectione, se vi semper sanavimus. ℞ Rad. Symphyti maj. & Aristoloch. rot. ana ℥i. Sem. Viticis p. j. Bull. in suff. quant. Aquæ sint. Deinde adde Vini albi ℥ss. Myrrhæ et Si Ispion parum bull. deinde cula, atque adde Sal. Saturni, & Lapid. Medicament. Collui ana ℥ss. M.

tas Balsami Sulphuris terebinthinati capere; nam huius vis abstergetur & corrigatur Fermentum malignum, & cum Urina evacuetur, ac impeditur simul, quo minus ceteras Corporis partes possit inficere. Item loco Balsami Sulphuris terebinthinati alio in casu consummatori Balsamus de Capabe ad gatas v. bis in die usurpatus profuit. Interdum missa præscripti ita:

M. Bals. Sulphuris terebinth. Zii.

De Capabe ℥i.

Mile.

Dosis gutt. xii. vel xv. bis in die.

Alios studiosos et Cauti impuro Gonorrhoea affectus, hae supprella supervenit Testiculi dexteri Tumor admodum dolens, quo evanescente, cum exercitio, & speciatim equitatione, indolueret, recruduit Tumor cum gravi dolore contumens, iurum ad Lumbos ascendens, & Testis affectus alterius magnitudinem bis aequabat. Ordinata Purgatione Mercuriali, pro Tumore distantiae sequens præscripti Cataplasma:

M. Far. Salar. ℥ii.

Sem. Camis. pulv. ℥i.

Coqu. in f. q. *Succo* ad consistens. Cataplasmatibus; addenda simul

Lithargyr. pulv. ℥i.

Mile.

Hoc calidè subinde Posca irrigando applicuit Scroto tumore & rubenti in latere affecto, quo contionato primo Dolore mitigatus, & hinc Tumor nonnihil immixtus fuit.

Interdum usurpavit Balsamum Sulphuris terebinthinatum ad gatas xii. bis in die.

Exterius postmodum

M. Bals. Sulphuris Ros. ad extra ℥iii.

Olei dissil. Camis. ℥i.

Unguenti Dialdi. ℥i.

Mile.

Quo aliquoties in die partem affectam illinebat, & maximam partem evanuerunt symptomata.

Sed cum relictus tumore durities Testis adhuc pertinaciter resisteret, ordinavi sequens Emplastrum:

M. Gummi Ammoniaci in Acetis.

Empl. de Giera an. q. l.

Malva cum q. l. *Olei dissil. Tartari*, vel *Lign. Guaiaci*. Induc super *Alutam*, applica loco affecto, omni biduo vel triduo novum applicando.

Et sic huius beneficio, quicquid supervenit, penitus discuriebat. Mox in principio applicentem, sed metu inflammationis ausim. Dubius eram, an etiam Emplastrum de Rosis cum Mercurio istis Tumoribus commodè applicari posset, quod alias in Tumoribus & Bubonibus incipientibus optimum est, malaxatum cum oleo destillato Succini; sed metuebam vani gentalem a Mercurio labefactum iri.

Quod si Præputium insigniter Tumore sed inflammatione cum Phimo afficeretur, convenit Phlegma Vatrioli insipidum sere cum linteis multiplicatis applicare; vel Aqua Calcis vivæ cum Saccharum Saturni quovis modo applicari potest. Quod si insignis Dolor ardens adit, Camphora in Oleo Amygdalarum dulcium soluta egregia est.

Quod si Tumor Præputii stantius plus minus serosus adit cum

M. Aqu. Calc. viv. ℥i.

in qua ebulliant

Flos. Chamemill.

Samburi an. Ml.

Fol. Myrsin. M℥.

Sem. Anis.

Fenic. an. ℥i.

Bass. Lauri ℥i. ad ℥v.

Coletur, cum qua fermentetur Pars affecta: 3.

Fomentum refovens.

Quod si suspicio sit, longius progressum fuisse, & iam Malignam Sanguinem nonnulli contraxisse inquinamenti, insinuat Cura aliqua Sudorifera per Decocta Lignorum, omni matutino tempore ad aliquot uncias assumenda, impedendo sudorem, idque ad aliquot dies noctes continuando: quorum loco etiam in leviori malo Effusio lignorum, tindura Coralliorum cum spiritu Lignorum, &c. aliquandiu usurpari possunt.

Vel

M. Herb. Agrimon.

Tumor. an. Ml.

Raf. Lign. sanct.

Tent. II.

Saffor.

Rad. Sarsapar. an. ℥v.

Sem. Coriandr. ℥i.

Incis. & consus. infund. in *Aqua simpl.* per diem & noctem: mano coqu. ad tertiam, circa finem addendo

Herb. Cochlear. Ml.

Safful. min. contus. ℥i.

Colatur *℥iii.* addatur

Syr. Scelleryrh. Ferri. q. l.

M. D. 6.

Potio Sanguinem purificans.

Vel

M. Aqua Card. bened.

Tumor. an. ℥i.

Ext. Ligni Guaiaci ℥i.

Thuris. ℥i.

Camph. gr. vi.

Syr. Scelleryrh. Ferri. ℥v.

M. D. 3.

Mistura Sanguinem mundificans, coctilem fumens.

Præter dictam Gonorrhoeam Virorum Malignam seu Virulentam est adhuc

§. II.

FLUOR MULIEBRIS GALLICUS.

A Contagio maligno Gallico oritur, & Emigrationem cumdam partis internæ, aut in Vagina, aut in Orificio Uteri, aut Prostatibus glandulis; quæ etiam Eulcerationem ipsorum Testium Muliebrium infert: Nam Testium Muliebrium substantiam in tali Gonorrhoea eulceratam PANAROLLUS in suis *Observat. Putei. s. observ.* 14. in Muliere, quæ ex Gonorrhoea Gallica cum gravibus Doloribus mortua fuerat, observavit. Talia *Ulcera* plerumque aciem *Sanium* plus minus purulentam ac lividam, cum insigni dolore ac molestia. Hæc ipsa Gonorrhoea magna minus confundenda est cum hac Gonorrhoea seu fluore albo, de qua *infra lib. 4. sect. 4. cap. 4.* dicitur.

DIAGNOSIS.

Patet hic Affectus ex *Ægre* relatione, cui insuper in graviore Maligno juncturæ sedes Faciei Color, Urina turbida, Ciborum fastidium, Lassitudo, Dyspnoea, Tumor Oculorum & Pedum, Dolor Lumborum, Tabes, Vaginae uterinae prolapsus, Lymphomizis, & si Morbus exerceat acrior & putrilaginosus exilat, Gentalia eraduntur & eulcerantur: vid. *GRÆFIUS de Organ. Mulier. cap. 9. & BLASIUS lib. 5. Observat. Med. 3. & 5.* Tandem Febribus plus minus lenta accedit: vid. *HIPPOCRATES lib. 5. Aphor. 36.*

PROGNOSIS.

Fluori albo Gallico si Convulsio & animi deliquium accedat, malum est.

CURA.

Gonorrhoea Mulierum Gallica originem & modum fendi eundem habet cum Gonorrhoea Maligna Virorum; cum eundem Græna eademque ratio, & quoad Causas, & quoad Curam: nempe dependet simpliciter a Coitu cum Mare Lue Venerea correpto, unde etiam eadem ratione atque Gonorrhoea Virorum Gallica, aut ipse Morbus Venereus, curanda venit: nempe interne per remedia Mercurialia, Pilulas Mercuriales, per Decocta & Effusia Lignorum, per Balsamica terebinthinata, Oleum Succini, cum Ossis Sepiæ, & Antimonio Diaphoretico, &c. *Interdum* verbò curati nequit, nisi per modum curandi Luem Veneream, tam per *Sudorifera*, quam per *Sanguinem* Mercurialium.

Externè conducunt *Infusum* ac Lignum cum Aqua Calcis vivæ paratæ, addita Aloe, Melle, Mercurio dulci; item Decoctum Mercurii dulci cum Melle edulcoratum; vid. *SCULTETUS Armen. Chirorg. Par. 4. Observ. 65.* & liquor ex decore Gallinæ, quem HARTMANNUS *Præpar. 464.* commendat; item Unguenta Mercurialia et superioribus nota, Turundis illata, intruduntur in Vaginam uterinam, aut mundificatur Ulcus jam factum.

§. III.

BUBONES.

Bubones sunt Glandularum Axillarum & Inguinalium Tumores,

LII

meret, ex Lympha intra dictas Glandulas flagante nati; quatenus nempe Vasa Cubitalia & Glandulae has transcutit, & in his ex sanguine Serum segregatur; quod fucio eradi viscido turgidum, & à fermento Venereo maligno corruptum, receptioni in Vasa Lymphatica plenè ineptum redditur, unde flagnando Tumorem producit: idque landabili Naturæ conatu; nam sic præservatur reliquum Corpus à Lue Venerea, ut non amplius lo exeat. Fermentum hoc & Contagium, cuius in contaclu Lues Venerea contrahitur, in materia purulenta consistit, quatenus nempe Aura ejus fortia vel ipsum Pus alii in eodem lecto decumbenti communicatur. Ipsum tamen Pus è Bubone extrahit eandem malignitatem non habet, ac ipsa Aura aut sudor illic prolecutus, eum per illam concodionem aut suppurationem Miasmæ Venereæ malignum omnis subducit sit. Unde de his dicit CARDILUCIUS in *Officio Sanitatis*, pag. 856, *Apparet verò erubescit in Sauguias, aliquando rari vel nonquam nisi gravissima Lue Venerea obnoxio, occurrente scilicet elegantibus corporis ingem inguinalium, nunquam ad inguina protrudunt.*

Hinc quia bubonibus sponte sua evanescentibus Lymphæ & sanguinis refluendum vitio tota Massa Sanguinea, & hinc totum Corpus inquinatur, maturæ eorum Suppurationi & hinc Apertioni per elicienda Virulentia opera danda: Conf. M. A. N. C. Ann. 2. Obsev. 78. Propter hæc, incautionem medicorum more, purgationibus vehementioribus aut repetitis, nec Venæsectione, nec sudoriferis insistentibus, & Lympha hæc maligna intra Corpus trahenda; quod hoc modo facillimè fieri, & Arthritidi Vagæ scorbuticæ ac Pthili occasione dare potest: utat si Bubovenericus sua sponte, & ita merus subsit, ne universum Corpus hinc inquinetur, sudoriferis fortioribus hinc necessariis fiat, quorum opus aliquando reddisse Bubonem jam penitus extinctum observavi. Applicanda ergo sunt Emplastura ex Gummatibus & Aromaticis nonnihil acriora, & simul irritantia, seu, ut vulgè vocant, arrabentia, nisi Canceri, vel aliud symptoma subsit, pro horum supputatione juvanda: v. g. imponatur Emplastrum de Ranis viscosum cum Mercurio, malaxatum cum Oleo destillato ligni Guajaci.

Vel

℞. Empl. Dia-alyd. magis, seu cum Gum. Zifi.
Malaxetur cum Oleo Tartari fer. (quod CARDILUCIUS l. c. tanquam diffusissimum præstantissimum commendat) aut Ligni Guajaci, aut Phosphor.

D. S.

Emplastrum Emollientis,

Vel

℞. Pic. Burgund. Zifi.
Sap. emmua.
℞. Hyphr. an. Zi.
Gum. Ann.

Sagap. cum Aceto solut. an. 3℔.

Rad. Pyrethr.
Sem. Erucæ an. 3℔i.
Cera q. l.

M. f. Emplastrum, malax. cum Oleo Tartari fer.

Quibus etiam magnes Arsenicalis addi potest, de qua vid. SALA in *Anat. Vir. Tract. 2. pag. 385. & 386.* necnon RABETTE Tr. de *Pestis* pag. 247. Item Emplastrum descriptum à SENNERTO, ubi de Lue Venerea, pag. 214. vel Emplastrum magneticum Angeli Sala secundum descriptionem HOFMANNI. His ipsi, modo protuberant magis incipiat Bubo, nonnihil emollire sufficit; non opus enim est perfectum, quæ raro, ut nunquam fit, expectare supputationem, sed tunc aperitur maturæ Apertione larga, & tractetur ad modum reliquorum Bubonum.

Quod si verò simul Canceri alique Symptomata concurrant, à Suppurantibus abstinendum, Purgantibus potius materia peccans evacuanda erit.

Si in Bubonibus his simplicibus non procedat alteratio suppuratoria dictis Remediis, aut Pus bene coctum profundè nimis lateat; aperiat Lancela profundius incruscatus, aut applicetur *Cauterium potentiale*, ne ad interiora pergere queat Venenum, Factum inde Foramen diu apertum teneatur, ut saltem Fonticuli instar esse queat. Sane ZACUTUS LUSITANUS l. 2. *Prax. Admir. Obsev.* 131. Fonticulis in Inguine sponte apertis quendam à sivo Morbo Gallico immunem evasisse asserit.

Aperto Tumore vel sponte vel scalpello, suppuratio & mundificatio instiganda Balsamo Hyperici, misto cum

Oleo destillato ligni Guajaci, vel Tartari, vel Unguento Aureo, cui additum sit parum de Mercurio præcipitato, vel Arcano Corallino, superimponatur Emplastrum Dia-chylon, malaxatum cum Oleo Tartari rectificato, extensis, vel applicetur Emplastrum magneticum, quod Ulcus apertum coire non patitur, donec satis emundatum fuerit. Conf. RABETTE in *Chirurgia*, DIEMERBROCC. in *Tract. de Pestis*, & NICOLAUS de BLEGNY Tract. de *Lue Venerea Gallicæ confusæ*. CARDILUCIUS l. c. Bubonem Acceto maderisum & Buboni impolitum, quo intumescente alium applicandum, aut Emplastrum de Cicuta, cum Oleo Phosphoratum vel Saponis malaxata; commendat; tandem scalpello aperendum, & Sanem cum Pure & Crore exprimenda, postea Emplastrum Opotechod applicandum, quod nunquam coalescere sinat Ulcus, priusquam omnia fundamentaliter sanata fuerint. Quod si nihilominus suppuratio aut mundificatio tardè se diffuset, aut placè non, quod sæpius accidit, succedat, eadem Emplastura continuanda; quin & Cucurbitæ applicandæ, ut viscidissimum hoc serum, in Glandulis hinc quæ congestum, sensim sensimque tandem resolvatur. Interne usurpantur primo liquorum decocta, postea purgantia, in fine Sal & Spiritus Viperarum, quæ Curam Bubonum abfolvunt. Quibus etiam irritis infectionis universi Sanguinis periculum subest, adeoque Cura generalis instituenda venit.

§. IV.

PUSTULÆ ET TUBERCULA.

Pustula & Tubercula, præter Lues Venereæ Caram Universalem, fovantur & abluantur infundè decocto lignorum, & Oleo Tartari illinantur: sed cum hæc raro sufficiant, optimus est Mercurius Præcipitatus & Dulcis, simpliciter cum Butyro non salto missus & illitus, loco tunc etiam Unguentum de Nicotiana, Diapompholygon, item de Hellebore, vel aliud appropriatum capiat, aut Unguentum Pomatum, subactum cum poco Arcano Corallino, præliano, vel Oleo Vitrioli, Sulphuris, Butyro Antimonii, seu liquore Mercurii saccharato tangantur Pustulæ & Tubercula quotidie, donec corosio decidat; in quem finem etiam mixtura composita ex Aluminis roche & Mercurii sublimati ana 3℔. in Aqua Plantaginis, aut Rosarum, ut alius appropriat: Si solutus, quam cum lincolis admodum descriptis SENNERTI Tract. de *Lue Venerea* pag. 216. adhiberi potest. Melius est sequenti modo:

℞. Aqua Plantæ. 3℔i.

Mercurii sublimati 3℔i.

Alum. 3℔.

Diffoluta invicem

D. S.

Aqua Purificans,

Liquore hoc cum penna intinda tangantur Verruæ; sic emarcitæ potentem decidunt. SYLVIVS Tract. de *Lue Venerea* §. 349. laudat Spiritus & Salia, Capri Tindura imprægnata, quo Pustulas sedas & planè malignas, reliquis frustra tentatis, præter speciem suffulsi testatur. Hæc ipsi quoque in Pustulis Penis, Ani, Faciei, &c. profusa sunt. Spectat hæc quoque Lac Virginis, cuius singulis unctis Mercurii Sublimati 3℔. addendus; item liquor HARTMANNI, ac Oleum Viridis Scris in Tr. Chym. pag. 322, & 331. descripta.

In specie in Pustulis Faciei:

℞. Spem. Rosar. 3℔i.

Mercurii sublimati 3℔i.

Digeratur in Vitro bene clauso, & ita cautè hoc ipsa tangantur Pustulæ.

D. S.

Mixtura Mandifcans.

Nec inconcinna est, mixtura FORESTI lib. 31. Obsev. 6.

℞. Althæa Ovi no. l.

Agita, donec spumescat; addo

Mercurii sublimati

Camph. ana gr. iv.

M. f. Unguentum;

quo illinantur Pustulæ.

§. V.

CONDYLOMATA.

Ad Condylomata Ani Mercurius Sublimatus in Aqua Plantaginis aut Perlicariæ solutus cum poco Aluminis con-

convenit. Imò si Condylomata fuerint maiora, quæ non nisi longo temporis tractu per quinque Caulicula tolli queant, Ligaturis potius si radices angustiores habeant, aut Ferro locute extirpentur: postquam verò Hemorrhagia sopita, reliquæ Mercurio sublimato adsumantur, & Ulcera Mercurio sublimato, aut Arcano Coralino detergantur ac mundificentur.

§. VI.

VERRUCE.

Verrux Gallica si in extremitate Oleo Vitrioli tangantur, excruciantur & decidunt: loco eorum etiam Aqua fortis, aut solutio Mercurii in Aqua fortis facta, s. q. Aqua simpl. diluta, adhiberi potest: item pulvis Sabina: imperius eas abluunt: vid. WEDELII de medic. fatali. pag. 62.

§. VII.

ULCERA.

Quod Ulcera quæcumque partium, in horum cura semper prima ad Cacoethiam seu malignitatem Veneream respiciendum, qua non extinda perfectè, nec mundificata, nec consolidari possunt, aut consolidata licet, semper recrudescunt: imò a reliquo occulto eorum, non perfectè mandatorum, sed præmaturè consolidatorum fermento, Lues curata licet, denuò in universum corpus propagari potest: id quod notabili Exemplo docet HILDANUS cum occultis Ollis Carie Venereæ rem. 5. hylur. 95. Pro qua malignitate expugnanda primatum obtinet mercurius, tam sublimatus quàm precipitatus, & hic vel corrosivus, vel in specie Dulcis, qui semper mundificantibus addi debet. Abluenda igitur sunt Ulcera decoctis Lignorum, hinc applicandum Unguentum ex Melle, & Vistello Ovi cum Mercurio sublimato HARTMANNI in præc. Chym. §. 28. vel Unguentum de Cerevisia malaxetur cum Oleo Nicotianæ, & impregnata cum Mercurio Dulci: utriusque vel Unguenta cum Mercurio sublimato, quæ describit SENNERTUS l. a. pag. 217. Itali cum bono successu in quibusvis Venereis Ulceribus utuntur hac Unguento:

℞. Olei commun. ℥iv.

Cerasi. ℔i.

Minii cribrati. ℔ss.

Coq. lento igne ad Unguenti majoris consistentiam: post adde

Mercurii sublimati op. vel mercurii precipitati
(sive Turbith. minor. ℔ss.)

Cera alba ℔i.

Misceat pro Unguento.

Vel Unguentum Basilicum cum sufficienti quantitate Mercurii Dulcis misceatur, & applicetur, quod Ulcera Venereæ maligna etiam quasi cancerosa curabit. Vid. DIGBY Receipt. P. 2. p. 12. Unguentum Ægyptiacum interdum subdole applicari potest, sed vitentur loca Offibus nudata: hæc enim nigrore illud lascere asserit HARTMANNUS l. a. §. 28. Huc pertinet Aqua Divina Terrellii:

℞. Aqua Plantag. ℥vi.

Mercurii sublimati gr. xlii.

Misc.

Quod si mundificata fuerint hæc Ulcera, h. e. ubi Pus laudabile suggerat, & Labia nudiq. rubra & naturaliter tincla, & pro natura partis ulceratæ constituta fuerint, Sarcoticis incandens, & conglutinanda sunt: pro quo scopio vel Emplastrum HARTMANNI l. a. §. 29. 30. & 31. vel Emplastrum de Liebiggyrio, aut Emplastrum Norimbergense Zwölfferi, cum dimidio Emplastri Disulphuris Rulandi misceat & applicari possunt.

In specie Ulcera penis si fuerint Extrema, abduantur cum Decocto Scabiolæ, Marrebilli, Saponaræ, Ligni Guaiaci, Plantaginis, &c. in quibus aliquantum Sacchari Saturni, & Mercurii Dulcis potest dissolvi: aut Decocti Calcis vivæ ℔i. cum dr. i. Mercurii Dulcis exhibetur externe. Si sordida fuerint, Unguentum Ægyptiacum, aut Unguentum ex Mercurio sublimato SENNERTI l. a. pag. 212, aut Linimentum ex pulvere Sabina, Croco Metallorum, & Butyro recenti HORSTII l. a. obfero. 54. pag. 257. adhiberi possunt. Pro Consolidatione vero decoctum Lignorum cum Saccharo Saturni cum linteis applicatum convenit. Si verò sint Ulcera Interna intra glandem quidem, & præputium tumefactum, & conflatum,

Tom. II.

Iniectione ex iisdem fiat, & hinc cum filamentis carptis, Unguento abluendo imbutis, cum sileo loco affecto auxilium applicandum.

Si Ulcera sint in ipsi membris, aut Glans molliorem substantiam occupant, aut Meatum Urinarium affligunt, utroque in loco difficilis perquam sunt consolidatio: sed in specie ex posteriore periculum est, ne necesse sit Caruncula, quæ Meatum oppleat. Iniectiones cum prædictis similes hant, aut Candela cerea, Unguento supra citato illinenda, Meatus immittenda est. Si enim postmodum ex Meatu extrahatur Candela, faciliè Lues, ubi sit in Membris Exulcerata, ex parvis in Candela vestigio, observari poterit.

Quod si in utero, nempe in vagina ipsius Ulcera talia, injiciuntur Decocta Lignorum, aut Aqua Calcis vivæ cum Plantis Vulnerariis ebullita, & iniecta, in quibus parum Aluminis solutum sit; hinc cum Digo aut pello immitantur Unguenta aut Emplastra appropriata, linteis indecta, & ita relinquuntur: v. g. præter illa, quæ supra in genere allegata fuerunt.

℞. Unguenti albi camphor. ℔ss.

Mercur. dulc. ℔i.

M. D. S.

Unguentum Purificans.

Oris Ulcera præ aliis curatu difficilia sunt, quia ex continuo Salivæ affluxu copiosasordes generant, & loca Glanulosa afficiunt, in quibus etiam ordinario Ulcera sunt graviora. Curantur per Gargarisationem ex decocto Salsaparillæ, Corticis Guaiaci, Foliorum Plantaginis, Scabiolæ, Rolarum rubrum, Veneticæ, &c. cum Melle rosato, & pauco Aluminis: v. g.

℞. Herb. Plantag.

Scabiolæ. an. M. i.

Flor. Rosar. rub. p. li.

Rad. Salsap. ℔i.

Ligni Guaiaci,

Costalis rubri ana ℥vi.

Sem. Simach. ℔ss.

Coqu. in l. q. Aqua Herdai

Colaturæ ℔ss. adde

Syr. de Ros. ficis,

Dia-mor. ana ℔ss. vel ℔ii.

M. D. S.

Gargarisma Purificans.

Hoc decoctum, si Ulcus pond. palatum, aut in superiori ejus parte existat, per Nares injiciatur; ita tamen, ut Æger pro Tussi, & Vomitu vitando Os Aqua repletum teneat.

Impetis, si Ulcera sordidiora, convenit illis Viride æris; unde v. g. Unguentum Ægyptiacum cum Melle rosato applicatum confert; vel hoc HORSTII l. a. obf. 4.

℞. Mell. rosat. ℔ii.

Rob. Damor.

Nor. an. ℔i.

Unguent. Ægypt. ℔iii.

Misceantur.

Vel Aquæ Virides sic dictæ, quales e. g. describit HARTMANNUS l. a. cap. 52. §. 2. & 5. cum penicilla subdole applicatæ conferunt: item Mel rosatum cum spiritu Vitrioli acidulatum applicari potest: videtur RIVIERIUS eor. 1. obfero. 95. Aut solutione Mercurii sublimati, & Aluminis aut solutione illa Solari, quam SENNERTUS commendat, contingantur:

Aut

℞. Salis Ammoniaci

Spiritus Vitrioli an. ℔ss.

Aqua Regiæ ℔ss.

Misceantur.

Quo ipso Ulcus Venereum ingens in Palato juxta Uvulam concidit, successuè curatum fuit.

Quidam Butyrum Antimonii cum Gossypio Ulceri applicant. Cavendum tamen, ne Canaliculorum horum aliquid deglutatur.

Narium ulcera per similia curantur, sub forma pulverum aut Iniectionum; quæ tamen, quia Mucum exsiccat, aut simul Crassam mæsam habent, in principis Effluentibus sunt tradenda: e. g.

℞. Herb. mund. M. i.

Rad. Alk. ℥vi. vel ℔i.

Liquirit. ℔ss.

Sem. Cydon. ℔ii.

Coqu. in l. q. Aqua simpl.

LII 2

Cola-

Colaturæ Hi. adde

Olei Amygd. ʒiʒ.

M. pro Iniectione.

D. S.

Iniectio Emollientis.

Hinc Crusta remota iniciatur sequens:

*ʒi. Rad. Sarsap. ʒiʒ.*Infund. per noctem in *Aqua Plantag.* vel *Aqua Ferrar.*

mane coquatur; in fine Coctionis adde

*Herb. Agrimon.**Sulvia.**Plantag. ana Mi.**Fior. Refar. rubr.**Balaust. ana p. ii.*

Colaturæ Hi. adde

Alum. crud. ʒiʒ.

M. S.

Aqua Mondificans injicienda.

Aut

*ʒi. Succ. Baton.**Scroph. maj.**Pimpinell.**Plantag. ana ʒiʒ.**Mell. refat. unc. iv.*

Coga. ad consist. Linimenti. cui adde

Aqua Calcis vias part. iv.

Misc. & injiciatur.

Omnia hæc Ulcera hæcenus enarrata sponte confanescunt, sicuti alia quælibet symptomata Venerea sub Litu Mercuriali per salivationem: Nec metuenda hæc ipsa io Oris Ulceribus; nam & huius ope ex ipsa citius sanantur: *Cons. ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Prax. Admin. Obseru. 78.*

§. VIII.

FISSURÆ MANUUM ac PEDUM.

Fissura seu Rhagades Mannuum ac Pedum abluuntur Decocto Calcis vivæ, cum Mercurio Doli impregnato, præprimis si simul aliquod Ligni Guaiaci, ejusque Corticis, Radicis Chanæ, Sarsaparillæ, Herbar Scabiorum, &c. decoquantur. Si *Callositas* aliqua simul sobit, Emollientia, v. gr. Radia Altheæ, Malvæ, Cucumeris agrestis, &c. addantur. Post quorum usum applicetur illud Unguentum Emulatum cum Mercurii subtilissimi paucis; vel Butyrum, pinguedo porcina, asserina, gallinacea, &c. cum oleo Tartari per deliq. aut Arcano Corallino, aut cremore Calcis vivæ, &c. prodest: vel denique Unguentum Diapompholygos cum paucis Mercurii præcipitati, item Unguentum reosativum WEDELII: vid. *tract. de Comp. medicam. pag. 187.*

Vel

*ʒi. Unguent. Emulat. unc. iʒ.**Mercurii doli. ʒi.**Olei Tartari per deliq. ʒiʒ.*

M. D. S.

Unguentum Purificans.

§. IX.

CARIES OSSIIUM.

Caries Ossium difficillima est curata, cujus ratio ex SYLVIO de *Lac Venerea* §. 366. petatur, sine cuius tamen remotione impossibile est vel curare Locum, vel consolidare Ulcera sine Recidivæ continuo supervenit. In Cura huius, quidquid Ossis cariosum ac corruptum fuerit, maturè removenendum, nisi vicium quoque partem successivè infici velimus: Ergo Ossis carioso audato applicandum Oleum destillatum Ligni Guaiaci cum Oleo destillato Caryophyllorum, vel inspurgatum Tutia præparata, Pulvis Cerussæ, Lithargyrii, Radicis Iros Florentinæ, Pulvis Eosphoril, &c. quibus potenteriora observantur Salia Fissa, & Volantia, item Aqua Divina *Fernelii*: sed omnium optimum est vel Ferramento debito radere Cariem Ossis, si levior fuerit, eamque ita removere; vel si profundior fuerit, Ferramento ignito aut hinc inde perforare, aut totum Os cariosum probè urere, & hinc spiritum Vini largiter irrorare, ut ita promoveatur separatio mortui seu cariosi à vivo. Quid si hoc modo fieri nequeat, Malum seu immedicabile existimandum, & quod Ægrum vel ad Mortem usque comitatur.

Quia vetò, inter reliqua, *Palati Ossa* frequenter Carie

eroduntur, necessarium erit, aut locum lamina Argentea, vel ex Auro confecta, tegere, aut Ulcus Palati quadam, quæ in Laminas redigi; ac parti affectæ recenser applicari debet, consolidare: v. g.

*ʒi. Maffich. unc. i.**Olibani.**Sunderach.**Sangu. Dracen.**Myrrh. el.**Res. Ligni Guai.**Succini;**Rad. Iros Florent.**Cerna Corsi ʒiʒi præp. ana ʒi.*

Ex subtilissimè pulverisatâ, cum *l. q. mucilag. Tragacanthæ* in Mortario calido l. Pasta in Lamellis redigenda, & ad formam Ukeris extendenda.

Huic, si Caries nondum planè cariosa, Appropriata admisceri possunt: v. g.

*ʒi. Pasty jam præp. unc. i.**Pulv. Rad. Aristol. ret. ʒi.**Gentianæ rubræ,**Euphorb. ana ʒiʒ.**Caryoph. ʒi.*

Cum paucis *Terebinthina* misce, pro uso jam dicto.

Si vero Ulcus planè non occludere licet, Lamina,

ex Luna vel Sole confecta, & spongiosa instruita, illud obturetur.

§. X.

DOLORES.

Dolorum Cura primaria consistit in ipsius Lasis remotione universalis: Interim pro his in specie internè Sarsaparillæ Decoctum laudari solet; Papaverinis vespertino tempore ante dolorum recrudescentiam non omittis. Externè optima sunt primò quidem Fomenta, ex Ligno Guaiaci, Juniperi & huius Raccis, Radice Sarsaparillæ, Folii Polegii, Salviæ, Rosimarini cum persicaria; hinc Inunctiones cum Oleo Scorpionum, Viperarum, præsertim Lumbriorum, & Ranarum viridum cum pinguedine humana: hinc Theriaca, vel sola, vel cum addito Oleo gossacino, prodest ad *dolores Tithianæ*, ulcata AMATO LUSITANO C. 5. Curat. 78. Aut recipiatur spiritus Vini, seu spiritus Lumbriorum, in quo aliquod *Cresci* & *Opii* dissolutum, & cum lotieis applicetur.

Item

*ʒi. Pinguet. hæn. unc. ii.**Olei Scorpion. unc. i.**Petræ albi.**Spice ana ʒiʒ. vel ʒi.**destillat. Ligni Guaiaci. ʒi.**Rosimar.**Salo. ana ʒiʒ.**Opii cum Vitis sol. ʒi.*

M. D. S.

Unguentum Leoienis.

Sed rarum est, quid his Remediis cedat, Dolor, nisi Cura Universalis perfectâ jam præcesserit, & saltem velleja quædam læsiones à Malignitate Venerea relidâ adhuc eodem foveat in partibus, quæ his & similibus removeri possunt. Non enim novum est, quod perfectè curata Loe, & omnibus ferè remotis symptomatibus, nihilominus tamen quædam adhuc eorum supersint, pro quibus tamen removenis non statim nova Cura repetenda: Consulat. RIVIERIUS *obseru. 16. commentarum à POMARET.* Speciatim ergo Unguenta & Emplastra Mercurialia appropriata pro his Doloribus sunt Remedia: hinc Cecotum de Rami tiganis cum Mercurio coarvenit, imprimis ad Cephalalgiam; item Nervinum cum illo tiganis mistum: e. g.

*ʒi. Empli. de Rami cum quadruplo mercurii unc. iʒ.**Olei expref. Nuc. melle.**Opii cum dest. sol. ana unc. ʒi.**Succi Nicot. infus.**Cinnab. vulg. ana unc. i.**Cenci ʒvi.*

Cum *l. q. Terebinthina* misce, in Emplastrum.

D. S.

Emplastrum Leniens.

Vel

*ʒi. Emplastr. de Rami cum mercurio unc. i.**Polychof. Lader. ʒiʒ.*

Malax, cum *l. q. Olei destillat. ligni sancti.*

D. S.

D. S.
Emplastrum Resolvens.
Vel

℞. Unguent. Aur. Officin. ʒiij.
Extracti, vel Sacri infusq. Nicotian. ʒi.
Mercurii sublimati ʒiij.
℥. Mastura.

Applicetur Parti dolenti.

Quod si Dolor evanuerit, sed aliquis Tumor superfit, recipiatur Butyrum Indisum, liquificat cum Vino, & blando ebulliat ad Vini absorptionem; in hoc madescant Linthea, & imponentur, discutiant brevi tumorem.

Emplastro huic, si in Capite usurpandum sit, addendum venit Balsamum Peruvianum.

§. XI.

GUMMATA SEU TOPHI.

Gummata & Tophi, qui sunt Tumores duri, tactui resistentes, in Ossium medio enati, & iis immediate incurrentes, dupliciter observantur gradus: vel *Recentiores* sunt, Ossia superficiei afflictae, adeoque tractabiliores; vel *Inveterati*, adeoque magis coagulati, & parti, cui insident, incamerati: sicutque vel *Indolenti*, vel subinde misere *Dolenti*, qui Dolor secundum Membranam, Periostronem nempe, ductum subinde longius diffunditur, ac totam partem occupat, nodum imprimis molestissimum ferè intolerabilis ossis corpus, ac si *malles ossa contendantur*; unde tandem partes molles subiacentes & Ossia subiecta eroduntur & cariosa redduntur.

Ex Acido maligno Venereo originem ducunt, quod aggrreditur partes Nervas, in specie Ossis, in quibus se firmius implantat, eorum Alimentum corrumpit, quod corruptum acre inquinatur, succosive in medio Ossium coarctatur, & porro coagulando in ista Gummata induratur (X), donec Acidum vitiosa lassa erodendo Ulcera perficitur excitet.

Recentes, aut saltem minus inveterati si fuerint, adeoque nondum Ossis & Partes molles infecerint, profusius *Indurata* ex Lignis, aliquae Livi Venereae appropriatae; in graviore *Salivae Mercurialis*, quibus etiam semper *Viperina* & *Antimonialis* hinc Remedia sunt intermiscenda.

Præter interna, Gummatis & Emollientibus & Resolventibus potentioribus, speciatim tamen Mercurialibus additis, curandi veniunt: Emplastrum Diachylon simplex, item cum Gummatibus, & Emplastrum Diaphoreticum *Myrsicibus*, in specie Oleo distillato Ligni Guajaci malaxatum; quod Oleum Cariem conservat & curat; quibus tamen semper Mercurius cum Terbinthina subacta misuitur, tanquam specificeum Alexipharmacum: item sepius allegatum Emplastrum *Stygis* de Ravis cum Mercuri duplicata, triplicata, vel quadruplicata hujus dosi, ex PLATERII *Observationibus* pag. 732., cum Oleo Guajaci malaxatum; vel Emplastrum SENNERTII de *Lue Venerea* pag. 215. aut poterit Mercurius præcipitatus cum Axungia saltem porcina & Cera in Cerotum redigi: quibus addere convenit Gummata Aromatica Emollientia & Resolventia communiter dicta. Quidam etiam Cerotum summe probatum ad Tophos Venereos dissolvendos commendant:

℞. Gummi. Ammoniaci cum Axungia distillat. acerr. sol.

℥i.

Pulv. Rad. Bryon.

Alth. ana ʒiij.

Tarpeti min. ʒij.

Cera alba ʒij.

Butyri rec. q. ℥.

Fiat Cerotum.

Interdum in summa dolorum vehementia Theriaca admisceri potest.

Alii sequenti feliciter utuntur:

℞. Emplastro. Diachylon cum Gummi.
Olei Olivæ. ana ʒiv.
Cera nova ʒi.
Piperis nigri ʒij.
Salic commun. ʒij.
Cantharid. ʒi.
Sem. Sinapi ʒi.
Mell. inf. ʒij.

Pulverisanda pulverulentur, hinc liquescita *Cera* cum Emplastro Diachylon in Oleo, & ubi medium refraxerint, reliqua exactè incorporantur.

Ufus tempore tumori applicetur Sindon subtilissimas, supra quem Cerotum applicetur, bene ligetur quorum quotidie bis mutetur Sindon, qui semper erit humidus, & ita paucio tempore extrahetur Tumor sine Cutis vel Carnis læsione.

Adhiberi etiam potest Unguentum HARTMANNI ex *Ungu. Aur. Officin.* part. iij. cum *Mercurii Sublimati* part. i. in *Praxi Chymiatrica* §. 21. & WIESEMANNI de *Lue Venerea* pag. 20., utpote quod per aliquot dies nocturne Lintheo inductum, ac Parti afflicta, quam prius Vino rubro lavare decet, applicatum, Tophos tollit. Quod si autem Tumores ac Dolores ab usu hujus Medicaminis cessaverint, Pars afflicta Butyro non fuso, & in Vino rubro loto aliquandiu fovetur pro reliquis absumendis: vel fiat Emplastrum cum Mercurio vivo & Opio, ad imitationem BARBETTE *Anat. Pract.* P. 1. cap. 3. vel miscendum est Oleum Terbinthinæ cum Oleo distillato Guajaci, cui addendum est Opii q. ℥. pro doloribus nonnihil leniendis, usque cum Mercurio vivo, & insar Linimentis illinendum Gummatis dolorosis. Opime enim convenit in Tumoribus Sanguineis Opium, Dolorem sistit, & simul resolvit. Vel recipiatur Emplastrum de *Hyssopo Ladensis*: miscetur cum Mercurio, Pinguedine Iubæ. Item Emplastrum, quod Patavii in usu est, cujus descriptionem videb. in *Callegio Pharmaceut.* in *Ladurici Pharmacop.* Lamina quoque Saturni cum Mercurio illata applicetur, si scilicet adhuc sunt in principio; vel etiam Mercurius à Saturni fumo coagulatus extendatur in Beadum, & ita applicetur; qualis Mercurius Saturninus præter Tophos etiam ad Ulcera Cancrofa aliaque similia adhiberi potest.

℞. Saturni ʒi.

Dissolve in cratere, & liquescitum ab igne remove, & subito *Palum ferreum* in medium Saturnum immitte, donec incipiat contereferre Saturnus: Hinc in Ferri velligium immitte.

Mercurii vivi ʒi.

Unde congelatare videbis: Congelatum celtello separe, & ex Oleo communi ad ignem coque, donec Oleum conflaxerit, idque ter repete, & Mercurius reddetur malleo flexus: Duc in Laminas, Plage: vel Topho imponendas.

Ad ʒi. Mercurii requiritur ʒi. Olei.

Foras quoque hic non invale erit Emplastrum Saturnium *Clofai*, quod describit SCHROEDERUS in *Pharm. lib. 2. cap. 53. ubi de Emplastro* no. 12. pag. 198., & Emplastrum ad Tophos & Gummata Venerea *Clofai* no. 19. pag. 201., in quo, loco Cinnabaris, Mercurius vivus admiscendus.

Si his non cedant *Excoles*, hæc *Vesicenteria* admoto tractari, & illud aliquoties repeti poterit, ad imitationem RIVERII *Centur. 4. Observat. 22. & 29.* Sed in casu posteriore, si inveterati magis sint Tophi isti, & viscidiores ex coagulo concentrati, adeoque ipsa Ossia profundius, plus minus tamen, infecerint, necesse est, aperiatum Tumor, tum per *Gaustra* potentialia, tum *Adnalia* immissicorditer premendo ignem, ut loquitur ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. *Prax. Admir. observ. 130.* Aperti quovis modo diu aperti servandi sunt, ut Ichori maligno & exitus fiat, & Os subjequum pateat, quo hinc in tempore mederi queamus: Conf. BOTALLUS de *Lue Venerea* cap. 15. item FALLOPIUS de *Lue Venerea* pag. 95. Sed summa habenda est tatio Musculorum atque Tendinum in Cruribus, ne hi lardantur. Quod si vero huiusmodi tractari nequeant, sed, præmissa licet Cera Universali, etiam Salivatoria, obstinatè persistant, præsertim dolorosis, *Pariculis* in regione ista superiori excitandi sunt; his enim liberè fluentibus hoc habetur commodi: quod dolor mitior nonnihil fiat, & ipsi Nodi sensim tractabiliores fiant, ita ut post aliquod tempus vel Emplastro Diachylon simplici plus minus cedant & evanescant.

Interdum, præter Generalem Curam, Radix Sarsaparillæ in specie laudatur, cuiusque decoctum pro absumendis huiusmodi Tophis.

§. XII.

(X) Acidum Gallicum certis Ossium partibus aliquis ratione inferens, efficit, ut succo illorum nutritis noduli efficiantur, Excoles, seu Ossium Tumores, & Gummata pariat.

§. XII.

A T R O P H I A.

Talis & Atrophica Livi Venereis superveniens præter Universalem Curam, aut si hæc locum minus habeat, levatur imprimis decocto Radicis Chinæ cum Paffulis, vel decocto Sarsaparillæ à SEPTALIO incuriosioribus Medicis adeo laudato, & quod etiam laudatur à SENNERTO lib. 6. *prof. ab de Lue Venerea* pag. 218.

§. XIII.

SCABIES, SERPIGINES, LICHENES.

Scabies, Serpignes & Lichenes Gallici remouentur cum Aungia porcina, cum Oleo Tartari per deliqui. in Unguentum consilientiam redacta. Quod si debilius fuerit, Oleum Vitrioli addatur.

Vel

℞. Aquæ Persicæ. aut Plantag. ℞iſſ.

in quibus solve

Mercurii sublimati ℞iij. ad ℞j.

D. S.

Aqua Mundificans.

Hoc ipso liquore subinde blandè cum pluma illioantur dicta mala. Valet etiam ad *Morillas*; item *Candyemata* in locis *scissimis*.

§. XIV.

AURIUM TINNITUS.

Aurium Tinnitum Symptoma pertinacissimum est; ejus tamen Remedia observanda sequentia:

℞. Ligni Sassafr.

Flor. Lavand. ana ℞j.

Cort. Lign. Sancti.

Castor. ana ℞j.

Caryophyll. ℞ij.

Spiritus Vini, vel Tinctura Tartari ℞iij.

vel ℞iij.

Digere per dies aliquot; & Essentia filtrata tepidè cum Bombace indatur:

D. S.

Essentia ad Aures.

Eundem in finem SEPTALIIUS commendat Urinam Alini, in qua per noctem aliquid Ligni Guajaci, Callosi, & Menthalli infundat.

§. XV.

CEPHALALGIA.

Doler tandem Capitis istdem mitipari solet, quæ superius de doloribus Artuum dicta; potissimum tamen laudatur Emplastrum de Rano cum Mercurio *Vigenis*; aut quod PLATERUS observat pag. 723. describit, potissimum si aliquid Calorei & Opii ipsi addatur, vel laudanum opiatum simul cum aliis appropriatis laterne propinetur. Hinc in casibus pertinacioribus Trepanationem adhibere convenit, ut Exemplo comprobat AMATIUS LUSITANUS c. 1. *Curat. 4.* & FORESTUS lib. 32. observ. 23. in *Schol.* si scilicet Virulentiam Veneream maximam partem extindit esse ea aliorum Symptomatum cessatio consistit.

Hæc igitur de Lue Venerea, ejusque Symptomatum curandis sufficiunt.

Cæterum jam super dictum, quod detur etiam *Cachexia Scorbatica* & *Hypochondriaca*, unde non inconvenientem esse dixi, ut huic Cachexiarum Tractationi etiam Affectus horum complicatissimos annexamus, & infimal Symptomatum eorum Curationem abolvamus.

A R T I C U L U S V I.

De Malo Hypochondriaco, & ejus summo gradu scorbuto.

Malo Hypochondriacum utut fit Cachexia communissima in nostris Regionibus propter multorum, diversiorum, ac diversimodè complicatorum Symptomatum syndromem, proprio tamen nomine caret, adeoque Mali Hypochondriaci nomine innuitur Affectus, ratione

multorum Symptomatum diversimodè complicatus, ex Cruditate Acidæ plüs minus vicida in primis viis natus, cuius superior & quasi eminentior gradus vocari solet *Scorbutus*. Quoniam vero Symptomata frequentissima, quibus hoc malum vexare solet Aegros, in specie partim circa Regionem Hypochondriorum utramque & in Regione Hypochondriaca imprimis percipiuntur, partim quod Causa in Hypochondriis videtur flabulari, propterea in specie isto nomine appellatur: ab aliis *Malum Placulentum*, sicut Chymici Causam moribicam nonnihil respicientibus simul Tartarus *Hypochondriorum* vocari solet. Germanis utplurimum *Licni* *gravenen* dicitur, interdu etiam *Opisthi Pibaren*, utut fæpiusdem Licni immoxius deprehenditur; Valorum verò Melaricorum Obstructio Causa saltem palliativa fit, Perfectior gradus, ut dixi, & consequm Affectus Hypochondriaci, *Scorbuti* nomine venit, appellatione originariæ Germanica inferioris Saxonie; quæ tamen in Forum Medicum translata, & ita retenta fuit, & ob id in primis hæc vox Scorbuti est recepta, quæ adhuc multo admodum Auctores inter se digladiantur, an *Modus* *hæc* *etiam* *Veteribus* *fuerit* *cognitus*? Ratio dubitandi est, quod videatur novus Morbus, sicut & Malum Hypochondriacum. Nihilominus tamen multi eum ab HIPPOCRATE lib. 4. ad Affect. intern. sub nomine *Licni* *magis* *exacte* *descriptum* *esse* *asserunt*; Alii *Stomachum* & *Scorbuto* *PLINII* *eum* *existimant*, qui Affectus PLINII ætate in Exercitu Imperatoris Germanie plurimum grassatus fuerit. Sed his hæc est admodum lazana, tam parum refert, an Veteribus fuerit cognitus Scorbutus, an tunc? Arbitror tamen, eundem omnino fuisse admodum cognitum, utut non adeo clarè, quin locis Septentrionalibus quasi proprius videatur, nec adeo atrocibus flapsus fuerit Symptomaticus. Nam sic crescentibus delictis crescit pæne; sic etiam crescentibus Læsarum & Diæte erroribus, quid mirum, atrociori furore etiam nos aggredi? Morbos, Veteribus non adeo graves, ita ut nec eorum Descriptions tanquam nonnihil meliores exatè cum nostris conveniant? HIPPOCRATES Clima sublimis habuit, propterea Scorbutum non tam exatè cognovit.

P A R S A F F E C T A.

Malum ergò Hypochondriacum, & ejus non degenerat filius Scorbutus, eam ex varis ista Symptomatum complicatione, ut dixi supra, adeoque mirabilis & variabilis sit Affectus, ita ut tantummodo omnes actiones diversimodè pro subjectionum varietate ledantur, propterea factum est, ut res diversæ Sententiæ & litigationis de *Lue* & *Causa* in malo Hypochondriaco primariis affecto, seu de radicali fove ipsius Morbi, caute fuerint. Hinc alii nullam determinatam Partem in malo Hypochondriaco affect, sed *Vicium* *esse*, existimant; quod tamen non est: alii *Vasa* *Mesenterica* obstructa primarium esse *Focum*; alii Intemperiem ficcam & calidam *Stomachi*; alii *Intemperiem* *Intestinalium* *calidam* & *ficcam*; alii *Lienem* *vitiatum*, & omnes aut Intemperiem aut Obstructionem esse *sidum* *Hypochondriaci* *Mali*; & hinc dependentes Scorbuti, asserunt. Præ cæteris Plantas mirè indulgent, si qui *Spasium* *istud* *vexant* *inter* *Stomachum* & *Diaphragma*, *Hepar* & *Splenem*, *Pituita* *reterunt* *pro* *Sede* *primaria* *Mali* *Hypochondriaci*, aut saltem pro udo, ubi tot flabularum Flarulentia, existimant. Hoc inter fuit imprimis HENRICUS LEVINUS FISCHERUS, qui edidit peculiarem *Tractatum* *de* *Lue* & *Fæo* *Mali* *Hypochondriaci*; Nam pernotus Aphorismi HIPPOCRATIS 54. S. 3. *Rærit* *Foream* *leu* *Cavitatem* *istam* *Stomachi* *hæc* *Diaphragma* *inter* *Stomachum* & *inter* *Lienem* *esse* *Focum*, quæ Cavitas multis adimplatur sobole *Fœditatibus*, live prominent ab Hepate live à Liene, live ab alio Abdominis Viscere: Unde etiam in isto loco imprimis Symptomata à Flatuulentis orta, item Rugitus & Murmura ac similia solent percipi. Hinc etiam ea eisdem Hypothesi assentem veram Mali Hypochondriaci Curam in Duæretorum legitimo usu consilire ait. Verum consideratis vel obiter variis Mali Hypochondriaci Symptomatibus, spem sua hæc Opinio vacillare & correre videtur. Quomodo enim tam pertinaciter istæ fordes in eodem Cavo hærent, totum Corpus afficere, & diversimodè excruciare valent? vid. etiam SENNERTO lib. 3. *Prax. de Malo Hypoch.* pag. 518. & 520., qui etiam hæc inclinat. Sed miror in re adeo clara tam varios esse Auctores! Ratio, quod

tam

tam in varias Sententias delapsi sint, videtur, quod non observent Differentiam inter Præteritum et præteritum variis Causis radicalibus, & Præteritum variis Symptomatum: Nam qui unquam Malum Hypochondriacum, vel incipiens vel confirmatum, examinaverit, ejusdem ætæ Symptomatum consideraverit; aut qui aliquando Curatiōnem ejusdem Hypochondriaci præfuerit, eandem morbi causam palpasse poterit. Radicem morbi veram, & tantum herere semper in Stomacho, & quidem in vitio ejusdem Fermenti, non rite lesit digerentis Alimenta; Unde, ex lætæ Digestione, & inde nata cruditate Acido-pinitolæ, & Chylus, & Milla Sanguinea, & Lympha, & speciatim Bilia, & consequenter reliqui etiam corporis Machinam regentes humores, cum spiritibus vitiantur plus minus & depravatur, & sic demum totum illud, quod malum hypochondriacum vocamus, oritur. Quam ipsam de Foco hujus Mali Sententiam primario defendit acriter GALENUS lib. 3. de loc. aff. cap. 7. ex DIOCLE, HOECHSTEDTERUS in loc. citato de 3. observatiōnem in specie observat. t. & 1. & SYLVIVS lib. 1. præf. Append. Tractat. 7. id quod etiam HIGHMORUS in Tractat. de Malo Hypochondriaco, & Passione Hyperica similiter statuit, quod etiam primario afficitur Stomachus, ut ut aliis principis suam Opinione superfluit. Ut etiam LINDANUS super Hartmannum, qui differens verbi dicit: Primario percat Ventriculi Cruditas acida, & quæ originem suam habet ex Malo Hypochondriaco, & hanc præservens Melancholia Hypochondriaca, quæ passiones animum arduat, quia præterit prior tali Stomachi Cruditate. Id quod similiter de Scorbuto verum est, qui tamen præter Radicem ipsam primario suam notam in Sanguine & speciatim in Lympha vitiatæ explicat. Rancescit nempe quæ Acidum in corpore, ut in Vitis, unde læpè Vermiculi in Maculis scorbuticis, uti vult LANGIUS & HA-UPTMANNUS, reperiuntur.

Sed hæc ut pateant clarius, saltem consideremus Symptomata, quorum nunc plurius, nunc pauciorum Symptomata malum hoc constituit. Symptomata hæc ut varient, & sunt infinita sint, & quibus cum Signis ejusdem præsentis digoscitur, sunt sequentia. In omnibus Hypochondriaci primario male se habet Stomachus, Aphasia subinde laborat, ut frequentius in Morbi progressu, non semper, avide tales Ægri appetant, & comedant, interdum nimia & Cania quæ Appetitui laborat. Tales aliquot horis post comestione subinde Dolores Stomachi compressivos, gravissimos, convulsivos percipiunt. Hypochondriaci ergo & nimio Acidu laborantes semper inflante & adhuc urgente Appetitu Prædium debent finire: Germani dicunt: *Wenns ein heftiges Sessen ket, saltem aufhören etc. Appetitus Acidu*, quæ tamen assumpta insigniter eos ledunt: Stomachi, tam vacui quam repleti, frequentes Inflationes adiunt: tam post jejunio, quam præfictum ab omni Pultu frequenter eructare solent: Rallus, qui erumpunt, dum sunt jejunii, sunt acidi; dum verò saturati, nunc sunt acidi, qui meliores, nunc infidi, qui deteriores: Hinc Abdomen sæpè post assumpta Alimenta inflatur, & ab his Flatibus præter vagam Incommensuram Abdominis, Murrura, Borborygmi, & variæ agitationes frequentissimè sentiuntur in eodem, & in omnibus his copiosissimæ nec inquam deficientes Flatus adell proventus, quorum aliteris in specie Hypochondria, præfictum similitur, affligit, ibi enim facile compressione manus Substanciam lentos & Fluctuantes crebris recurrentes, & Murrurantes percipiuntur, ex Flatibus in Colo, ibidem locorum partim angustato, partim incurvato conclusi; ubi ex hoc colli simi dolorificæ Lancina-tiones, Diffusiones & Pusillones admodum molestæ, Lien equidem vulgo, sed falsè ascripserit, persèpè sentiuntur, quibusdam & Fluctuantes in Cavo Abdominis, in Meicenterio & similibus locis se conjungunt. Accedit er plurimum Alvi peritum Osiffractio, ita ut inter centum Hypochondriacos vix duobus aut tribus Alviu quotidie respondeat; quin intra quatrundum, aut triduum, aut biduum demum, aut stimulo quodam irritata Alvi, aut sponte, interdum suam officium facit, in quo ipsi tandem dura, pauci, & quoque interruptæ, globulæ formæ, nigra subindo, & non abique insigni cantu, interdum etiam non abquo dolore, eacernantur. Ex quidem Hypochondriaci in hoc Malo fortissimè Furgantibus parum aut nihil evacuatæ solent, cum contra blandiora Laxantia, Emollientia, Purgantia, Præparata, & similia tales solent satis copiosè, respèctivè tamen, evacuatæ; si verò fortius purgentur, semper lædantur. Si forsitan ta-

libus Ægri vomitas contingat, qui non sunt rari, vel sponte vel Arte, rejiciantur ut plurimum aut Aquosa, aut simplicioribus plus minus vicidua Pituitosa, sed semper plus minus Acida; ita ut etiam Dentibus subinde Stuporem inferant, & Vasa orichalcea in Æruginem corrodant, nisi interdum sub fortiori conatu aliquid de Bile ex Folliculo Felleo hoc admiscat, ut Excreta porracea, & æruginosa compareant, & aliqualem Amorem gustui repræsentent. Interdum etiam Cardialgia, & Ventriculi adijunt Dolores quidam, qui frequentissimè ad regionem Spinæ Dorii usque se extendunt juxta sinum Gule, ubi nempe est officium Stomachi sinistrum, & ignavis subinde pro Nephriticis Doloribus imponitur: Ita sæpius hi ipsi Coli ingelos se exerant, idque pertinaciter subinde, ut etiam vix nisi post ingestorum Vomitus remittant; Interdum enim conqueuntur, premi circa præcordia; Malum scilicet hoc semper esse ex Stomacho. Observari quidam Ægros in hoc Affectu de Dolo compressivo la loco Colli anteriori conqueunt, qui reversè ex Stomacho ratione Gule, & hujus Spasmo, & Constrictione circa Laryngem, originem duxit: Phlegma, & Mucositas Hypochondriorum, hinc Robor Malarum, & Faciei, item Calores vagi, modo remittentes modo accedentes, & primariis nempe Signis præfictum dimidia à pultu hora, vel etiam dum adhuc affident Menstrua, sunt frequentes; hinc Mala insigniter rubent, quales Rubor interdum etiam ex unico Vini haustu, similis minus congruo Assump-tu, supervenit; quod est Signum ex primis viis originem esse Mali Hypochondriaci, Dolores Abdominis la-tentes tam Contentivè sentit, seu Colici, & hinc vix frequentissimè, sique sæpius acerbissimè, in quibus interdum Abdomen contrahi, & Umbilicus interiora versus velut revelli solet; ut plurimum quidem sunt Convulsivi, & oriuntur à Spasmi Intestinalium; præter hos subinde etiam Hæmæ & Celæ convulsivæ Dolores patiuntur, interdum Dolores terebrantes, nunc in sinistro, nunc, quod rarius, in dextro latere, qui sunt sæpius à Pituita, ut vocant, vitrea, vel à Mucos acidu viciduo in cellula Coli sub Hypochondrio sinistro, ubi lacervatur, & dextro, ubi etiam angulum facit; unde hi Dolores subinde nunc Humorem, nunc Dolores Hæmæ convulsivæ, pro consensum faciunt. Anxietates Mentisque perturbaciones circa manifestam causam; Palpitationes Cordis graves, frequentes, & subinde per Paroxysmos, Hypochondriacos affligunt: Non secus ac difficiles Respiraciones imprimis à pultu, quarum subinde observatur differentia triplex.

1. Cum respiciunt Plethoram, & est Asthma stomachale humidum, quod nunc observatur in Hypochondriacis, nunc etiam in Scorbuticis, ab omni rursus, dum conqueuntur de difficili Anhelitu, ubi vitium est in Stomacho à Digestione vitiatu; quando autem Ægri tales matutino tempore patiuntur Halitum nonnihil difficilem, ita tamen ut simul expant copiosa Viscida, mucosa, tenacia, sit hoc ex vitio Digestionis primæ, & remanentis erudis à Cœna vespertina: & frequentissimè quidem.

2. Tenfione Hypochondriacæ, quæ imprimis difficulter respirant, partim propter impeditum Diaphragmatis deorsum versus motum, partim propter tensionem in regione hypochondriorum, qua Thoracis debita circa Collas Notas impedit dilatatio: Hinc quando velint respirare, impedimentum, & Dolorem insignem gravativum, & tensionem percipiunt in Abdomine, & circa hypochondria, quæ ipsi quasi Circulo Abdomen circa hypochondria circūdu videtur: idque imprimis nodurno tempore, quando supini iacentes dormiunt, & hinc ita evigilant, est quæ à spasm membranarum in dictis locis. Interrogati enim, ubi sit hoc impedimentum, quod Respirationem impedit, dicunt, se costas; monstrantes regionem Diaphragmatis.

3. Cum Respiratione depravata decumbunt ex Asthma Sicco convulsivo, quod vitio Diaphragmatis aut Muculorum Thoracis convulsivo subinde evenit. Talem enim difficultatem Respirationis imprimis infert Diaphragmatis impedita contractio, & dorsum versus explicatio: Nam sic per consequent etiam Thoracis dilatatio impeditur. Talia Asthma convulsiva, patiuntur hypochondriaci confirmati, imprimis it, qui patiuntur Symptomata Maliciorum Hypericis commonia, sed raro hoc fit.

Potè in confirmatis Hypochondriacis interdum Tumores Pylorici Abdominis, imprimis Lienis duri, & scirrhosi,

vbi, non sunt rari, qui confirmato huic Malo imprimis superveniunt, sicuti etiam hepatis infarctus, ejusque peritineas Scirrhi, & Tumores interdum superveniunt: suntque tamen revera potius prodiūm morborum, utut falsò à quibusdā pro causa, & Radice Morbi habeantur. Nam & malum hypochondriacum, & scorbutus infante omnino Liene aliisque hypochondriorum Visceribus, observata fuerunt, teste HORSTIO lib. q. observ. a. pag. 442., quicquid etiam in contrarium dicit VELTHUSIUS tract. de Liene. Percipiunt præterea tales Ægri non raro malefæ Passiones in hypochondriis, uti etiam in regione Dorsi, imprimis circa Lumbos, & regionem Lumborum superiorem, & regione Psoceatis, (gegen psoer) ubi sunt dispersi Rami Arterię Cœliacę, quo etiam tales pulsationes percipiuntur interdum etiam in aliis Corporis partibus, ubi aliis nullus naturaliter sentitur pulsus, & terz duritiam Arterię ex stridura Fibrarum convulsivæ infestatur. Malo oterius procedente Vertigines graves frequentissime superveniunt: omnes ferè hypochondriaci præsertim ipsæ stomachica sunt vertigines, quod signum raro fallit: uti infra lib. 3. cap. 3. sect. 3. patet; qui ipse Vertigines saltem assumptis, v.g. Panis buccella, brevi post domo cessant.

Cephalalgia subinde affligunt in specie tensiva, & hinc Capitis Obmolestatione, imprimis à passu, & tandem ingenui corporis & Memoria lapsus, uti audiens lib. 2. sect. 3. cap. 4. art. 1. ubi de memoria, ut Hypochondriaci confirmati interdum necesse habeant, valedicere studii; tandem interdum Memoria planè desicere incipit. A passu silent effe quasi Rari, & facillè terrestrum hypochondriaci subinde Anxietates frequentes, præsertim Cordis Palpitationes, Træstia & Morores circa mæsticam causam, atque que tandem ipsa Mæsticam, à Foco Hypochondriaci specialiter dicta, superveniunt, quam Infamia varia, & turbulenta, & terrifica sunt præcedunt, uti etiam comitantur: videat. TIMEUS in Guidenker lib. 16. lib. 1. pag. 34., uti generosus Nobilis ultra biennium Mente anxius, tristis & metuculosus sine causa fuit, Cordis percipit angustias, sæpè Mortem infat putavit, ac perinde Lacrymans dum opem petit, Capitis Dolore, Vertigine, Aurium Tinnitu & Vigilis afflictus fuit, &c.

Passus sunt variis & interdum admodum inæquales, subinde intermittere videntur, & io paroxysmo Mali confirmati ferè omni momento mutantur. Nam ubi confirmatum fuerit hoc Malum Hypochondriacum utut Symptoma stomachi, & Hypochondriorum, seu potius totelliporum, nunquam omnino remittant, tamen subinde per Paroxysmos affligunt, & suas Exacerbationes habent, rariis certas, frequentes vagas, ac ipsi Palpitationes, & Anxietates Cordis, & Capitis, & Senium Symptomata, item Dyspnoea, atrociter interdum affligunt: qui etiam interdum Viri in graviore paroxysmo ex patinore Pathemata, quæ evenire solent Mulieribus Hysterici: adeo ut revera Passio Hysterica Mulierum sit certo quadam species Mali Hypochondriaci; & ipsi Ægri dicunt, se percipere ascendere Fumos ex Abdomine ad Cot & Caput, (de quibus infra lib. 2. cap. 2. sect. 3. ubi de Epilepsia,) item ex Liene subinde ascendentes, & postmodum ita tales Paroxysmos inferentes, quo ipso Vulgi Hypothefis de Fumorum ex dictis locis ascensu non parum confirmant.

Urina Hypochondriacorum est varia: extra paroxysmum ferè sanorum est similis, dum paroxysmus gravior arget, interdum effluit cruda, & tenuis, interdum etiam turbida, pallida, plus minus aqua, & crassa: Sedimentum habet subinde Farine Laterum analogum, speciatim ubi jam malum in foribus degenerat: interdum Crassa salina eidem Urine supernatant, aut Corporula salina lateribus Vas adherescunt, sed ad fundum præcipitantur: interdum corpus puriforme, moto Vase in Liquorem lacteum distillens, observatur, qualem describit DRAWIZIUS de scorbut. pag. 176. & TIMEUS in Guidenker lib. 3. Cap. Med. 48. PLATERIUS lib. 3. observ. pag. 784., interdum in talibus deprehenditur, post nimias nempe Vigiliis, iotensè tincta. Quid si Urine antea clare, & tenues ut Medicamentorum fuerit crassæ, & turbide, & subingrantes, cum copioso sedimento, bonum signum est recte operationis Medicamentorum.

Ex Symptomatibus his multiformes Ægorum querele emergunt. Omnia tamen hæc, quorum complicatio Malum Hypochondriacum constituit, raro in uno subiecto omnia existunt; quædam eorum in hoc, quædam in alio subiecto se manifestant. Sufficiat nihilominus pro

Malo hoc determinando, si stomachi non ritè digerentis adnot signa, cum Torminibus, & Flatibus Abdominis, Alvo adstricta, & hinc Capitis perturbantibus, quibus tanquam primariis, si alia quadam ex recentia accedunt, eo facilius Malum determinatur, huiusque præsentia certior redditur. Exempla, quæ pro Idea huiusmodi ægrotum sufficiunt, vid. in HORSTIO lib. 4. observat. 27. & sepp. item HOECHSTEDTERO Deacid. supra citat.

CAUSA.

Causa Proxima horum Malorum complicatorum est stomachi Cruditas acida seu Acidum Ventriculi viscosum, plus minus austerum, io subiecto plus minus viscidio ex stomachi vitiosa Digestione ortam, à quo pro varietate subiectorum omnia reliqua symptomata facillimè deduci possunt, modo ea, quæ alio tempore, & alia occasione de similibus Affectionibus dicta fuerunt, ruminentur; adeoque subiectum seu Pars affecta in malo Hypochondriaco (a causa quidem) seu Radicationis est Ventriculi, ejusque vitiosa Digestio prima; à Morbo verò, seu locutione, sunt Sanguis & Bili: sed non excludendi sunt spiritus infusi, præsertim in Malo confirmato, & luveruto, & quod ad Scorbuti naturam quasi accedit, unde etiam hæreditariis exsist.

His namque Prædictum morbum superveniunt ipsarum Partium Corporis Constitutionem seu soliditatem multipliciter Alterationes: & quidem quod hæ partes solidas, magis affecta sunt in Malo Hypochondriaco Viscera Abdominis, quorum consensu subinde, & alia afficiuntur: unde Palpitationes Cordis, Cephalalgie, Vertigines, Mæsticæ Hypochondriacæ, & scilicet præ Digestionis primæ in Ventriculo est universale in totum Corpus, adeoque tam in Theoria quam praxi Morborum maximam semper sui postulat considerationem, ut non minus à praxi legitima semper quoque ad eam respiciendum est: liquidem, ut sæpius jam dictum, omnes Succorum in Corpore Fermentationes sunt saltem continuationes Fermentationis in Ventriculo inchoate. Huius ergo adio, nempe Digestio Iasa, vitio Sacci ejusdem fermentati visum acida nec ritè volatiliter, ratione quævis aviditappet quam concupiscit, est primaria causa totius Mali Hypochondriaci.

Ex Crudo acido io primis vitis depravatæ sanguinis Crassi, hinc deficit & vitatur quæ spiritiniferus seu Pneumatis; hinc hebetet Bili, aciesit Serum, & Lympha, irritatur Genæ Nervorum, & partes solide in Abdomine, malè nutritur universum corpus.

Ex his quasi quæque Pandis, nempe

1. Cruditate Acida in primis vitis,
2. Sanguinis Crassi depravatæ,
3. Bili aciesitæ,
4. Lympha Aciditatis & Acrimonia, &
5. Bili inerte,

omnes Linæ deducendæ sunt, quæ depingunt malum hypochondriacum, cujus Centrum fit stomachus.

Causa ergo Efficiens Mali Hypochondriaci est vitium Acidi spiritus fermentativi, vitiosæ acidi, nec debetè volatiliter ac spirituosè, ratione quævis avidit appetit quam digerit Ventriculus: quo ipso Fermento Alumpia quidem promptè plus minus dissolvitur, sed eadem dissoluta minus fermentantur ac volatiliter; unde io Passum acidum, aut acido austerum plus minus viscidum, flatulentum degenerate, quæ alias in Chylum salitum volatiliter transformari debuerunt: unde copiosissimi Flatas præternaturali fermentativa turgescentia erumpunt, (vid. supra cap. 2. sect. 5. ubi de Infestatione stomachi,) hinc Rellus acidi & stomachi Infestationes, & ex materia viscidæ acidi ejusdem graves Dolores, aut Vomitus materie viscidæ insigniter acida; delapsa tandem hæc Massa cruda ex stomacho, & occurrent Bili in Intestis, vitiosè effervescent, unde copia Flatuum. Nam, ut alibi ostensum, Flatus sunt ab Acido, vitiosè in materia viscidæ effervescent. Et speciatim, si paulo volatilior ac spirituosior fuerit Bili, Incalcescent, seu fluitantæ Phlogosæ est Hypochondrio dextro subito in totum Corpus se dispergunt, (ad imitationem quasi Olei Vitrioli, vel spiritus Nitri, Vini spiritui redificato commixti), quod valde quidem, sed falsò, Hepati calido adscribitur. Unde etiam tuit imaginaria illa Ventriculi frigida, & Hepatidis calida in Affectu Hypochondriaco quibusdam acutis Anxietatibus, cum tamen potius præfens Flatuum proven-

tus continuus, & hinc multiplex Intestiniurum nata Irritatio, continua Murrura, & nunquam intermittentes Borborygmi Abdominis semper ex materia acida viciosa oriuntur (Y). Cum vero Fæces tales secretæ sint plus minus viciosa in Cellulis Intestiniurum, Coli imprimis, hæc perniciosa hærent, quorum acore præternaturali perniciosis Dolores, Lacerationes & Terebationes, Pituitæ vitæe vulgo ascriptæ, generantur: Hinc est, quod subinde conqueratur Agri, qui sentire nunquam infardus in Abdomine, & monstrando locum illius infardus, situm Coli fusi stomacho crasse delineant, (ubi scilicet Colos cum Ventriculo, finitiorum versus porrigitur). *Quando Membranas manifeste dixerit, valde premis, enata sunt plena cum Stomachis laborant materia: sed cum sub Stomacho premittantur, ac si lapide quodam graventur, Celos est affligunt.* Hinc ipsa Materia viciosa, simulque occidua acida, aulera in Cellulis Coli contenta & quasi condensata Alvim contumacem & difficilime solutionis reddit.

Hypochondriacum secretæ sunt pæca & indurata, quia coagulatur ab Acido plus minus asiduo. sicut enim Bilis, tanquam Alcali volatilis, fluidas reddit; Fæces, ita Acidum eadem coagulat, quare, qui firmiores redduntur in Cellulis, diutius retinentur & sequenti Alvi infarctum. Hinc quando Ventriculus & vicine Partes membraceæ, que Chylis nutrir solent, Acido aulera succo irritantur, tunc Spasmi contrahuntur, Fibreque eorum stringuntur, sicut Tenionis, & tunc infardus sentis circa Hypochondria, pricritum sub Inspiratione, percipi solet. Quin & aliquorum Vicerum Nervi ac Membræ nunc in radice, nunc in suo progressu, præsertim Mesenteris, eodem Sapore male asidue, præsertim & convulsivo potius patiuntur, per confusum alias Cordis partes ascientes, hinc variis Hypochondriacum & Abdominis Dolores, Illaci, Lacerationes, & Tenivi Agri inducuntur; sicut & Palpitatio Cordis non raro in Hypochondriacis non tam loquimur transvasati, quam Nervorum noventium vitio, ut plurimum nacti videtur. Et Tenionis Capitis circa Tempora sunt nihil aliud, quam ipsam membranam in dictis locis ab Acido præternaturali irritatam.

Crudior talis Chylus per Intestina transcolatus, & Maffa sanguinea infiltratus, & huius Cratio, Acore suo vitioso & præternaturali in subiecto nonnulli viciosa hærent impingendo, ipsam Massam Sanguineam plus minus crassam & spissam & difficulter fermentescibilem, minisque spirituales reddit; Unde Anasæ, Cædæ Palpitatio & similia Cordis Pathemata derivantur à grumoso Sanguine plus minus coagulato, circa Auriculam in Ventriculo Cordis hærente; unde Sanguis & spissus & crassus observari solet: Conf. SYLVIVS Praef. lib. 1. cap. 35. sin verb sub colatura sanguinis per Vicerum, in specie per Hepat & Lienem, & tali crudiori Chylis Sanguini infuso nonnulli in eorum porulis hærent, irritatis Fibris illorum contractura meatuum, hinc subascentis Materie firmior retrahit, tandem à vitioso suo Acido coagulatio, sicut Tumor & Infarctus Vicerum supervenit, & ita his denique Scirrhi potentem efficiuntur. Minus dum spirituales sanguis iam depravatus, etiam spiritus minus volatiles, minisque subiles, nec fatis lucidos, minisque naturaliter temperatos, sed asperiores & ut sic dicam, ad acetum saporem declinantes, producit, qui facile in Motus anomalos, asurditatis & exorbitantes prouincunt: adeoque Stomacho ascesso, Vitiis, item Cephalalgia, &c. inferunt, donec ex dictis, Tristitia, Moror, Apathia, Cogitationes sue, & tandem Melancholia symptomata superveniant.

Causa Proxima ergo est Acidum excessivum, minus spirituosum, quod pro ratione Aciditatis inferit omnia illa symptomata.

Disponunt ad hoc malum ex Causa Remota præter ea, que supra de Aphædia dicta sunt, speciatim tres.

1. Errata in Vita.
 2. Deficient Motus Corporis; & tandem
 3. Vita genus Stadii & Carui nimis occupatum.
- Quæ omnia disponunt Aegros ad cruditates in primis viis.

Quoad Dista Errata: hæc vitiosum pedetentim chylum suppediant. Nam Alimenta aut nimis Acidia, aut Fumo indurata, aut Sale condita, aut difficulter digestibilia,

& sale volatili destituta, &c. multum hic conferunt: Sale condita, insublerunt non parum de spiritibus salis; Fumo indurata de spiritu acido Fuliginis multum continent, Facit hoc Fumus facile asidus non rari deicatus, vel qui ad acetum inclinatur, ipsum non adeo diureticus, vel in Acetum vergens, ad Malum Hypochondriacum disponit.

Metas, qui alias inflat stimuli & chyloso & Hæmatoso adjuvat (nempe Motus naturalis) & dissolutiones succorum promouet, dum deficit, hæc omnino impedit, ad cruditatem colligendam non parum confert, & Excrementorum separationem, tam per Urinam, quam in specie per Sordes, minus promouet.

Cura denique & India, nodurna præsternit, spiritus animales absorbunt, & Vires ita exhauriunt, indeque Digestionem primam deficiunt, & Massam sanguineam minus spirituosam minusque volatilem reddunt, unde inquinatus ita sanguis, & consequenter etiam Lympha ipsa tam Glandularum conglobatarum, quam etiam conglomatarum, v. g. Pancreatis, ascribi & acidior redditur, succellive spissata stomachi, Abdominis & Intestiniurum, & tandem hoc Malum inferit. Hinc Lacerationes nactura flammæ post coeam notoriæ ad Malum Hypochondriacum disponit.

II. Inquinatus itaque sanguis, ipsique Lympha, & consequenter reliqua corporis contenta, ipsique adeo affligi spiritus, tandem corpora habitum locumque ita immutant, ut etiam malum nascatur, Sordes appletur: qui tamen haud adeo frequens, quam vulgo haberi solet, ut optimè monet SYDENHAM in Observat. de Morb. acut. pag. 411, quin Morbis vel minus cognitis, vel nodum sufficienter confirmatis, pallium esse solet. De cætero reddi quidam dicunt, quod Malum Hypochondriacum exaltatur, & quasi malignius redditum, constituit scorbutum, ut præterea & alias causas Antecedentes appropinquat, hanc multi in specie PETRÆUS in Differt. Normant. non ineptè inter species Calcularum refertur, dum scilicet vitio sanguis aut Atrophia, aut cacotrophia, depravata nempe Nutritio, tandem necessariè sequitur: quin tandem exaltatur, & succellive quasi volatilis nonnulli illud viasum Acidum hypochondriacum in Massâ Sanguinea & Lympha indeque penetrativa & fermentativa liquum, tandem Maligna tormentativa & contagiosa de se spargit. Adeo ut scorbutus confirmatus per Oculum, per Halitum, item per portula communia, aliisque media, uno nomine per Contagium hic multiplicet, itaque contagioso Fomite præ cæteris efficacissima esse saliva in scorbuticis adeoquæ inquinata: quia contagia, aut eum Aere inspirata aut cum Saliva hausa, & hinc chyloso & Hæmatoso, tandem inquinant, ac ita se subinde multiplicant, quo etiam scorbuti Fomes, ubi confirmatus egerit radices; seminali medio à parentibus in Liberos transducitur.

Est igitur hic petaliaris Humorum Dyscrasia, seu calcaria, symptomata adeo varia excians ut si aliquod horum infrequens euidem obveniat, quod ad certum aliquod Morbi genus referri nequit, statim Scorbuticum pronuncietur. Hincque Descriptio angustioris comprehendi vi potest, ut in frequentissimum nostris etiam Regionibus hoc Malum existit.

Symptomata scorbutica præter ea, que modo de Malo hypochondriaco fuerunt explicata, ex eo imprimis oriuntur, quod (1) Fermentum scorbuticum imprimis Glandulas quascunque asidit, harumque Lympham inquinare & infectare solet; quodque (2) illud ipsum, prout contradiungitur à Malo hypochondriaco, in specie Nervis imingitur infestum & hostile esse solet; unde etiam scorbuticos tam varia Nervosi generis Pathemata solent affligere, & quidem graviora & frequentiora, quam Hypochondriacum.

Res ut patet, quod iniquet Glandulas, & Aciditas ejus sit infesta Nervis, specialiori Scorbuti symptomata consideranda sunt; Nempe præcipitur Lassitudo totius Corporis spontanea, & ad Motum nunc major nunc minor impotens, sensus Gravitas in Cruribus, ut & aliorum Membrorum Debilitas, & Dolor oculis; Patiens inclinatur ad Somnolentiam, nisi adde Febre scorbutica; appetitus ut plurimum est aulius, aut plane defensus, confusus cum Nausea, semper facit asidit Glegiam Lacerationes (nam omnia Mali hypochondriaci Sym-

M m m promota

promata sunt etiam in Scorbuto) una cum vaga seu varia causandum nunc *Excessus* & *Intemperantia*, nunc *Excessus* & *Exaltatione*, item cum inloquente *Dentium* *vassilatione* ac *erofione*, atque *Ora* *fetore*, & *fricat* *Gingivae* nunc *sanguinem* *stillant*, cumque intensè salum, nunc *Liquorem* quoddam *serum* in talibus *salivae* frequentes admodum est *saliva*, interdum, imprimis matutino tempore, manifestè *arida* deprehendi solet, ut io Juvene Scorbuto observari. Præterea frequentes sunt in Scorbuto *Phlegmas* vel *fadens* etiam nocturni, in quibus *fadens* spargit *fuscum* Odorem, imprimis in habitu Corporis, in Cruribus, in Brachiis, Malo procedente varice erumpunt *maculae*, nunc majores, magisintense interdum Thuleri (uti ipse vidit) nunc minores, Pulicem moribus similes, quales videntur in purpura, Germ. *das Friesel*, interdum Manus superant; imò læpè totos in Artus, præprimis Tibias, ita diffusioque, ut quasi una sit macula livida, cum Elephantiasis aut Spacheli meti: vid. EUGALENUS *de Scorbuto*, pag. 7. Diversi sunt coloris, nunc rubicundus, nunc flavescens, nunc atropurpureus, lividus, &c. Cum quibus alternant frequentes *Exanthemata* in Artubus, quæ varia, modo lævia, protuberantia, aspera & squamula. Scorbutoque subinde patiuntur Corporis *Pruritum*, sed dum incipiunt se leviter scarpere, locus intumescendo totus insiguitur rubet, sed brevi tempore evanescit; in alio loco iterum pruritum & talem intumescerentiam inferit, deinde tamen cessat: Rarum est, quod *Tumores* sint constantes, & si sunt constantes, ut plurimum occupant Glandulas Artuum, quæ forma *spherophalarum* solent tumescere. Sæpè pruritus hic, si scalpatur, dat *Unguicula* *graviore*, & in varia Ulcera generantia, quæ plorant serum adeo acre, ut quandoque calcamenta Ægri fuerint exinde erosa; & quidem talia Ulcera sunt difficilest sanabilia, quia facile degenerant in *Gangrenam*.

Urina *scorbuto* admodum sunt variæ, intensè subinde tinctæ & flammæ, absque Febre tamen & Ictero, & rutilant insar spiritus Nitri, et si nulla Febria adint indicia, cum sedimento copioso & crasso: subinde lacerata, ita tamen, ut exterius inspectis Matule fundus subercent ferè carneum quod representet. *Urina* *hæc* *flammæ* est nihil aliud, quam Lacra orinaris urinis salibus contentis saturata, insar accerrimi Lisivii. Interdum tales Urine flammæ subinde immutatur, & sunt naturaliter *vir* talis sedimento tinctæ, sed ita, ut *copiosa* *Arenula* *rufa* facile fissibiles, quæ sunt Salia crystallisata à Valis laceribus, incurrent Matule fundum & latera, & hæc Arenule sunt nunc ex crystallinis signis scorbuto. Præterea interdum flammæ tunc Urine *Crassa* quasi pinguis seu quædam *Plaganda* insar Pellicula supernatat, quæ Pellicula ad latus adiposita solet esse admodum variegata, & *Parvula* *Caudam*, nec eleganter coloratam fridem representat. Est autem nil aliud, quam Salia coagulata, & signum Scorbuto infallibile. Sic in Chymis si aliquid evaporetur utique ad Pelliculam, ea apparet variegata, ut plurimum autem in Urinali reperiatur; Urina effusa, Color quidam cæruleus, qui vix, ac ne vix quidem, prima vice abstergi possit. Et si forsitan contingat tenuem, limpidam & planè aqueam nonnunquam exorari Urinam, hoc fit, vel a Recrementis aqueis hæctans in Corpore congestis & retentis, nunc vero cum impetu excretis, propter particularem salinarum deficientem aut nullam secretionem: unde etiam hæc Urine sæpè malorum symptomatum prodromi existunt.

Respirationis insignes *læsiones* valdeopore Scorbuto nesciunt, eaque non Humores, sed ferè Convulsivæ, cum gravissimis Anxietatibus & Pedoris angustis iunctæ. In specie *Dolorum* variorum torturæ crudelis est Scorbuto Crurum & Sursum, nunc vagis, nunc fixis, præ cæcigia Ventriculi, Dorso, Lumborum, Pedoris atque Abdominis; in Abdominis Dolores Scorbuto sunt omniâ crudelissimi, & subinde in Dorso & regione Lumbari incipiunt (tuncque Nephritidem Notham constatuunt) & cum gravissimo Contortione sensu hinc inde in Abdomine oberrant: & ita anteriora versus, ad regionem Umbilicalem & distas partes convellendo, contereuntur, ut Nephritice interdum doloribus simillimi sint; absque lierè omni Calculo & ideo patenti Ægri, *se laborare Nephritide*, sed malè: *Præterea* *Nephritice* *Marka* *vocanda* *est*, quæ *interdum* *Umbilicum* *lunivaria* *varius* *retrahit*. Verum quidem est, quod abdomen intumescat, & si intumescat, etiam indurecat, non à Flatibus, sed à Spasmo, & Tensuæ Membraarum, Dolores hi nunc solitariè

affligunt, nunc in variis Corporis partibus *Tubercula* *vagia* non raro erumpunt, quæ subito jacerunt, aut subito etiam deinde disparant; nunc copiosa parva *Tubercula*, *rufura*, plus minus *parvissima*, hinc inde protuberant, quæ deo de facili evanescunt. Et io quocunque Ægro tam vagis & varia observantur symptomata, Scorbuto lætè; unde etiam Scorbutoicorum Febres Erraticæ existere subinde solent: Certissime Scorbuto subest, ubi malè *hæc*, modo illud *Symptoma* *supervenerit*. Præter dictos Dolores, qui constanter Nephritidem Notham, *scilicet* *Dolores* nunc *Fixi* præsertim nocturni, nunc *Vagi* & *vagabundi*, *arrit* *excruciant*, dum acerbo dolore nunc Crura, nunc Brachia, nunc alia pars mutatis vicibus affligitur; nulla tamen aut leviter sensibiles in parte indicia alterationis, quod symptoma in specie *Arthritis* *Toga* *Scorbuto* *leu* *varia*, Germ. *die raissende Gicht*, appellari solet. Dolores hi Artuum sunt vel leviores vel graviores: subinde *sensus* *Formicationis* *vel* *Fermicationis* in extremitatibus Artuum percipitur, simili lierè sensui illi, quando dicunt; *Sensu* *se* *motum* *in* *artibus*, *ut* *si* *Fermica* *in* *illis* *circumconspiciuntur* *vel* *membra* *ipsi* *Torpore* *præmi*; & est species talis depravati; unde affectum hunc quidam vocant *Morbum* *Scorbutoicæ*, *scilicet* *Membra* *stupida* *plius* *minus* *huic* *paralytica*, aut saltem dolosia, idque imprimis post Colicæ seu post Tormini & Dolores Abdominis, quibus *Paræsi* *superve* *re* *solet*, ut quia Motus præter sensu integro aut saltem doloroso, interdum Motus adest, & sensus deficit, ut si quid in Manu teneant, illud non sentiant. Interdum in tali Paralyti *contracta* *Membra* *sunt* *rigida*, *contracta*, & tamen non immobilia. Loco paralytico contrà frequentes admodum *Convulsiones*, *Motusque* *Convulsivi* Scorbutoicos insiguitur vixant, quæ internas occupant Regionis, seu externæ agitent Artus. Sæpè insipillimè Epilepsia & similiter Convulsivi Morbi, quæ & Hyberica pulsio ex fomite Scorbutoico origine suam, aut saltem malitiam obtinent, & morbosam virtutem. Præter vagos supra dictos Dolores Scorbuto etiam interdum inferit *febr*, tam io Artubus lacerantes & lincantes, præsertim *antranas*, quam *Cephalas* immanes, atque habituales contumaces; ita Vagos quæ Periodicas, quæ sunt frequentissimæ & urgentissimæ Scorbutoicorum symptoma, item *Obstaculis* *lierè* *intolerabiles*. Interdum stomachum perniciatè affligunt, unde *Pruritum* *admodum* *consumens* *oriuntur*, *omniâ* *Antisorbutoicis* *curandi*: Interdum occupant *Extremitates* *artuum*, qui sunt gravissimi; hi interdum sicut, omnia vero affligunt, & hic magnam habent convenientiam cum Dolori in Lue Venerea occurrente; unde etiam quidam dicunt, nullum affectum magis esse affinem Lue Venereæ præter Scorbuto. Præter dicta, *Crura* *subinde* *intumescunt* *constat* *tumore*, *hæc* *quidem* *edematosa*, sed dum plus minus rubescendo, nunc cum, nunc sine doloribus nocturnis; interdum *scelerantur*, ita, ut Elephantiasis Arabum representent. Quin etiam *Glandulas* *dorsi*, Gallicos Nodos æmulant, tam in locis glandulosis, quæ etiam in locis Musculosis, præsertim cruribus, protuberant Dolores expertes, dum quiescent Ægri, dum verò ambulat, nunc dum Crura pendentia habent, iudiciozè dolore solent.

Interdum quoque *Crura* *desolentur* plus minus dolorificas talis à quibusdam Dysfericis, ab aliis hæmorrhoidibus apertis tributas, inducunt; aut si non sponte sua accedunt, facillimè saltem Purgantibus acrioribus provocantur. Nam Ægri tales, quando emittunt Cruentæ, non sicut Dysenterici; sit enim lue Tormentibus; non sunt hæmorrhoides; & quia post hæmorrhodiam producit: sed est hæmorrhagia *lactiflora*, unde interdum lue purgationes scorbutoicæ Diarrhoeam Gruentam, interdum atrociam symptomatam dysentericam inferunt, præsertim si Pillularum forma propinantur Purgantia. Signa tamen, quibus huiusmodi Cruentæ Dejectiones scorbutoicorum discernantur à dysentericæ & fluxu hæmorrhoidali, descripta videbunt in HISTO lib. 7. Observat. 37. pag. 193. & 394, ubi egregia est Obliervatio.

Nec solum per Alvum, sed etiam pernalla Laca, pertinet *Hæmorrhagias*, e. g. *Narium*, *Spem* *Cruentum*, &c. inducit Scorbuto, Sanguis interdum cæruleus vel subviridis apparet: interdum inferit *Erysipela* io Artubus tantissimè tractanda; nam facillimè gangræscunt, aut saltem in Ulcera admodum acerbos degenerant; sicut *Gangrenam* *artuum*, præsertim circa pedum digitos, sponte sua exque Causa interna oriondam, inferit semper letalem: qua de re vid. imprimis SENNERIUS lib. 3. Prax. P. 2. cap. 19. circa finem.

Tandem à malo confirmato frequenter *Atrophia* plurimum *Corpus* tabefcit, aut superveniente *Plasmi* emaciatur. *Catarrhi* quoque & *catarrhici* afflicti, usque frequentissime circa caput, colum, lauces & regiones glandulis magnis obitas, item *vascularibus* & *vascularibus* non ita facile curabilibus obnoxii sunt *Scorbuto*.

Pulsus est admodum varius, inaequalis, subinde parvus & debilis, interdum fortior, ac subinde plene intermittens; cum avari deliquit frequentioribus: adeo, ut qui *Scorbuto* naturam ignavit, facili à tali pulsu terroretur, utat fit mox *Scorbuto*, ut interdum pulsus totos vegeto adhuc corpore solcat indicere.

Præterea subinde observantur *fadasi* copiosi, imprimis *nasarii* admodum *cellulosi*, quibus nonnumquam accedit *nasæ* & *alvi fluxus*: de quibus & aliis minus frequentibus symptomatibus vid. WILLISIUS de *febr.* cap. 3.

Quoad *causam proximam*: Symptomata hæc multiplex opacitatem plus minus convulsi & similia *Scorbuto*, ex acido specifico sapore aut odore fermentato *Scorbuto*, spiritus & hinc contenta Corporis inquinante, peculiariter Nervis & Fibris morticinis infesto, interdum plus minus falsedini juncto, deduci optime possunt; conjugenda utroque utrumque, tam acidi speciei activitatem, quam ex fibrarum seniliam ex mortuorum irritatione Affectum plus minus spasmoticum. *Præterea* enim in *Scorbuto* acidum patet:

1. Ex *consequentiis*, quia Remedia Martialis & Volatilia conveniunt.

2. Ex *antecedentibus* symptomatibus, exulceratione, & similibus variis glandularum tumoribus.

Nempe Acidum illud Massam Sanguineam & hinc etiam Lympham inquinans, Bilem vero pessundans, Hemorrhagias, deficientem Nutritionem, partium exulcerationem, & viciatam fermentationem, pulsus diversimodè inæquales, &c. infert, dum Lympha acris & corrosiva, in variis locis nervosis multiplices torturas dolores, Contortum variis Motus, eorumque non singulationem, unde Tumores, nunc Excretiones &c. excitat. Oris exulcerationes, Gingivarum ac Dentium plus minus corrosiones, *stomatitis* didas, contumaces Catarrhos acrim passionem, vagos partium dolores & lincinationes, &c. infert. In Mesenterii glandulis conservata, & vitio acore suo Membras & Nervos irritans, illud in spasmos convellendo, atrocissimos Abdominis cruciatibus infert: item motus convulsivos, Pathemata Hysterica, Epileptica, etiam Paræses, Paralytes, & similia Symptomata. Hinc quoque largior copia Lympha talis acris, & etiam frequentiores sunt convulsiones in Corpore. Ut eadem nonnullis de salivæ & oris falsedine valde conquiri. Quando vero in tali Lympha Acrimonia est vis destruenti partes animales duras, uno verbo, ossa, accidit, ut Ossis partibus multa erret mala: sic ver. grat. Dentibus summè est exiligo, quippe quos sensum atque sensum resolvit, atque destruit horum cariem vicinam, nempe Gingivas, unde Vulgus partem affectam credit solas Gingivas. Item Artuum juncturas inimica est hæc Lympha quare in illis collecta producit Arthritidem, Tom. II.

dum nimirum Membras, Ossâ cingentes, acrimonia sua pungit. Item in quibusdam *Scorbuto* serum adeo corrosivum fuisse observatum, ut ex Nervi eorum pressus Lioteamina iuncta eroderet; alia serum inter dendum per Os stilans in Gena in verum sal coagulatum fuit. Quæ affert de Lympha nimis acris, ea tribuit WILLISIUS *juce* sua *Nervis* acris, qui proinde facile potest corrigi, & in locutionis Authoris hujus observandum. Quo supposito, sal non tam fixum esse Alcalicum, quale nonnulli fortissima calcinatione fit, nempe acidum, utpote quod fierem fiderationes ac coagulationes morales introducere, eam sanguis *Scorbuto* fluidior julo observetur: sed *Acidum* salum potius existere patet: ita tamen, ut in talis hoc ale modò utrosque, modò acidum, prævaleat, quamvis illius portio notabilis humorum malis temper naturalis & connata, hoc verbò toto genere ipsi præternaturali observetur. Atque ad eodem acidum, à compari Alkali in salum plus minus commutato, turgida & imprægnata Urina interossâ rutilat abque crassa & sedimento salino; quia & interdum coloris distentionis conspicitur, quando talia hæc crystallata sub arenularum forma in fundo subinde subsident, aut in superficie in cremorem seu crustam illam salnam concreverunt. Illud quidem ab acido partem minime potente, sale arisio magis saturato, ita ut ratione hujus saturationis obiores Sulphureas sanguinis particulas commodius imbiberet, hincque Urinam rubicundiorum & laxiorem magis reddere possit; cum eondit, quò plus acidi, minime alcali volatilis, acidior feri *Scorbuto* portio illi resistit Urinæ in ac super-naret, quod urinosi eius uberis atque lotimilis junctum, buxus vim agredi in Sulphuream portionem sufflamini, hinc Tincturam minus rubicundam Urinæ concedat.

Macula denique, quæ hinc inde Corpus tingunt, è primariis lignis sunt partibus Sanguinis corruptæ & quasi gangrenate, ut sic dicam, quæ à reliqua massa separatæ per sanguinis circulum hinc inde delignantur sub Cutem, donec ita successivè intensibiliter exhalant; unde earum erupcio bonum est signum, depurantis scilicet massæ sanguineæ. Cætera Symptomata ex supra & alias didis facile explicari poterunt. In specie tamen consulendi adhuc veniunt Auctores, qui ex professo de *Scorbuto* scripserunt, verb. grat. SENNERTUS tam in *Praxi*, quàm peculiari de *Scorbuto* Tract., SALOMON ALBERTUS HORSTIUS in *Observ.* & Tract. de *Scorbuto*, WILLISIUS in *Speciebus Patholog.* Cerebri, ubi de Morbis Convulsivis & *Scorbuto*, DRAWIZ de *Scorbuto*, & recentissime M O L L E N B R O C. de *Arthrit.* vag. *Scorb.* Proceus interim etiam est *Scorbuto*, dum ordinariè pathemata ex aliis Morbis quibuscunque sese afficiant, eorumque similes graviores aut deteriores aut certe contumaces ipsos reddunt, adeo ne tales Morbi præter hoc, quò circa Symptomata multum variant, via citra Recidivæ metum finit curabiles, nisi simul Appropriatis *Scorbuto* infringantur. Imprimis febres periculosos thipæ Symptomatibus ex societate *Scorbuto* nascuntur, sicut Intermittentes ex *Scorbuto* ferè Erraticæ sunt. (Z)

M m m a Si

(Z) Accuratissimum, si quis alius, *Scorbuto* Symptomatum Historiam, ex innumeratis *Scorbuto*, in *Notificatio* S. Ludovici Parisi jacentem, Observationibus eruat, illarumque *Ætiologiam*, tradidit Cl. Poupertius, anno 1699. *Morbosque* suis *sevis* gravitate aliquid commune habere ait cum *Peste Atremensium*, de qua Lucretius lib. 6.

Miselli *Ætiologiam* Symptomatum quidem vexabantur, quæ sunt aliis *Scorbuto* familiaria: nempe *feverem*, *crurum*, *abdominis* & *ventriculi* *dolorum*: *membra* *multo* *dissimulantur*, *illius* *sentia*: *capite* *dolent*, *convulsantur*, *ac* *tam* *multis* *præteritis* *gignunt* *argenti*, *in* *pari* *illis* *angustis* *evolverent*: *Sanguis* *inde* *effusus* *aqueus* *erat*, *salus*, *corrosus*, *cum* *minimo* *ferendo* *oris* *fetore*: *sic* *laudant* Lucretius.

Spiritus ore foras tetrum volebat odorem

Rancida quoque potest projecta cadavera ritu.

Præterea macula dura & livida femora & crura deferebant: frequentes hæmorrhagia à nervis & intestinis infestabantur dentem incidere: *Ægri* ex labiis præ summa debilitate genibus, vacillabant.

Præter hæc Symptomata omnibus *Scorbuto* communia, quodam peculiari *Scorbuto* Parisiensis consilabant: præcipuè autem Ossium crepitus, cujus causam esse erratissimè ait Poupertius, quid scilicet Ossium epiphyse ab ipsi Ossium separata, cum istis colliderentur & crepitum edere: quod cadaverem seivem se manifestissimè dictum esse fatur. Imò in his, quibus respiratio exigua in pectoris Ossium sensus emendaret, Sterni cartilagines à parte ossa Costarum profusè drossa reportata sunt, ac quærum in Respiratione attrita levius crepitus fallat. Qui hoc Symptomata afflicti, interibant omnes: unus mortem evasit, cujus Cella (ut visum fuit) cartilagines adhaerens; Jam enim hæc amplius crepitum cum respiraret, audire.

Maxime cadaverem pars Ossis scissura exhibebat nigra, & cario ossa: imò Ossium ipsum Ligamenta cariosa erant, & hæc; adeoque Ossium nimis à se invicem foveis, vacillabant incedere volentes: *Ægri*. Loco enim dactis & oleis Lympha, quæ Ossis, illarumque articulari madefere debent, ac & castium succo viridis aqua forma reportum, illa corrudent, & cariem Ossium inducunt, & elasticum Ligamentorum vim labefactant.

Quidem

Si consideramus *Romanae causae* ad Scorbutum dispositas, eas sunt variae; imprimis Res Nonnaturales, inter quas

1. *Locorum ratio ac Regiones*, quarum quaedam Terra *Aquarum & Alimentorum* causa magis per alia ad hoc malum disposita sunt. Aeris praeterea summo per hic habenda est ratio, cum ab eodem cras- tas sanguinis quam spirituum multum dependet. Ratione huius omni Hypochondriaci saltem *spontaneales*, & Mariae Ralthei imprimis acco- lam, tandem evadunt Scorbutici, ita et Morbus Endemicus in inferiori Suesonia, Belgio, & Anglia, veliquorumque locorum maritimarum, sit Scorbutus; cum e contra *Orientalis & Meridionalis*, Gallia, & imprimis Hispania, parum aut nihil nominetur de scorbuto licent. Hoc autem inquinamentum Aeris est Aura marina no- stras salis admixtum, & cum nostro Aer Aquila- ris per se loca paludosa & lacustria, Effluvia ista puriora locum affert. Hinc ex Aere hoc a nobis inspirato illud acidum in nobis exacerbat, Maligna sanguines, saliva, & consequenter fermen- tum stomachi vitiantur, & tandem scorbuticam corruptionem inducunt; unde locis quibudam scorbutus magis familiaris & Endemicus redditur: vid. RONSÉUS *Epist. ad Nadrivianum Junium*, & HORTSIUS *de scorbuto*. Sic ratione ta- lis Aeris & mali Vitius omnes *Navigantes*, quod citius in libero Oceano errant, ordinariè con- sistunt Scorbuto, dum Aer marinus Effluvis salis suis ex Mari elevatis inquinatus, respi- rando attrahitur, & per alia Belgæ & Angli- hinc Scorbutici, dum navigant. Conf. WILLI- SIUS *de scorbuto*, cap. 2. Quin & qui jam con- sistunt cum Maligno Hypochondriaco, si pere- grinantur in loca puro Aere praedita, solent sponte ab illis male purgari. Ille ergo Aer no- stras Effluvis salinis acidis est praeditus, & se- cundum HARTMANNUM Sulphure tem- perato delictus est, hinc malum Hypochondria- cum exasperat, illud aeris reddit, & sic in Scor- butum degenerare facit; atque vel hoc quidem ratione causae, ventilationis sanguinis, huiusque Effluviurum heterogeneum secretioni minus con- gruæ, vel salia atque sulphura aequalia corpori inspirando.
2. In specie *villosa ratio* ad scorbutum maximè dispo- nit, cum malarum locorum in se salubrium io- calis scorbutus enormiter affligat, contra mari- timis quibudam locis plane incognitus sit; quatenus hi Vitii salubres vitium ab Aere contra- dum sensim emendant; illi vero vel solo Vitii incooveniente levissimum Aeris infusum juvant. Qualem praepriis suggerunt Cibi omnium aci- di viciidi, Sale conditi, ac sumo indurati, Caro porcina, Pilces maritimi, lacustres, & tes- tacei, item Cerevisiae nitidum viciidæ & non ritè fermentatæ, Aque corruptæ, Vinum & Vini spiritus copiosius hausta.
3. *Ozium* Excrementorum eandem secretionem atque excretionem sufflammas: Hinc Fomi- nae, aut studii vacantes Scorbuto magis obno- xii observantur, quam Viri, Rulicæ atque Ope- rarii.
4. *Contagium* ablentibus reliquis causis scorbutum pro- ducens, ita quidem, ut annotante DRAWIZIO *de scorb. pag. 100.* Conversatio cum scorbuticis

frequenter causa videatur, quare apud nos ma- lum hoc adeo commune sit & quidem per salu- rem, adeoque per communia pocula, item per sudores, alios inficere solent.

5. *Difficilis Hereditas.*

6. *Vicium primæ & secundæ Digestionis Dyscrasia:* Quibus
7. Accedunt alii Morbi Chronici, Febres diuturnæ, imprimis Quartanae, & omnium maxime Ma- lum Hypochondriacum, quod, ut supra didicim, inveteratum & magis confirmatum, aut degenerat in scorbutum, aut eumdem certè hunc sibi associat.

Quibus praemissis vel ipso patet, *malum sanguinis & spirituum in se esse subitum scorbuto*; hos quidem in se, illam radicatos; adeo ut macro circulo malum magis magisque confirmet. In specie spirituum infusum a sua crasi de- generes in aerem speciemque Diathesis delictum: deinde iterum ac Lympha specialiter hoc ipso fapore imprægnata depercienduntur, sanguine quo testuram salino, vasculis- culum nonnulli obtundente eundem; quod manifestum in illis hominibus percipitur, propter quas causas affectus Scor- butici partes inter solidas, præcipud in partibus Nerviis, seaserunt, & hinc in glandulosis locis: Unde Atrophia, spalmi, convulsiones, Paralyse, Apople, dolores variæ ac multiplices, spique adeo arthritici; item dolores vagi & fixi, Ulcera Oris, Catarrhala pathemata, &c. frequenter adelle solent.

Causa ergo *proxima* erit *Super seu Odo* (voet quis ut li- bet, modo minimum fermentationis in huiusmodi morbis, licet Chronicis, ubique consideretur, quod io *Conragio* & *Hereditaria* multiplicatione manifestum est) *Species acida*, spiritus infusus & malum sanguinem imprimis in- quinans: Specificum faporem voco, ut pote à priori à ne- mine dignè explicatum; de acido verb natura esse, sym- ptomata confirmant. Dum vero spiritus inquirat, fermentum digestivum Ventriculi, ejusque protopepticum acidum simon, idque ferè primario, alterabit; unde primo Digestio- nis est errato continuatus morbus semel incubato progres- sus vel sponte sua patefuit.

Diathesis scorbuto in eum, qui est ex sanguinis acidi- tate sulphurea, qui à sale fixo, & à quibudam *substantiis calidis* dicitur; & qui ab acido, & hinc *frigidas* salutaris, quam habet CHARLETON *Treat. de scorbuto* aut doplex ista sanguinis Diathesis Scorbutica, vel Sulphurea - salina seu calida, vel Salino-sulphurea seu frigida, quam habet WILLIS, non videtur essentialis, sed ex eo saltem nata, quod pro varietate Constitutionis nativæ & ægrorum seu Craeos sanguinis, partium solidarum, ac seminalis diversitate, Fermentum seu Odo scorbuticus symptomata plùs minus diversa inferat: Eum in finem tamen dis- ferentia tales saltem observandæ sunt, ut Remediis mor- selestos eo concipiam fieri & Methodos medendi exactior insiliui queat, quæquos in priori Remedia magis tempe- rata & Venæ Sectio, neutiquam Acroria & Volatilia oleola conveniant; io postérieure vero Remedia magis activa & Sale volatili oleola abundante, item Martialis, quæ Acidum uberius temperant ac delinuat, commen- dari solent.

Hic itaque prælibatis pergo ad *Signa*.

DIAGNOSIS.

Signa tam Mali Hypochondriaci, quàm Scorbuti, ex- superius recentitis Symptomatibus per se sunt clara & mani- fecta. Magis tamen specialiter, ubi Stomachi non ri- tè digerentis adiunt pathemata, cum lymphomatia circa

Ab

Quidem agri ex pelloris aspergione repenti mortui sunt: in his autem nullus deprehensus est morbus humor, nec in Thorace, nec in Pulmonibus: Pericardium tamen penitus Pulmonibus adhaerens, Pulmones Pleura & Diaphragmate am- organa omnia pelloris acio commissa & confusa invicem erant, ut intricatam molem, in qua vix partes asserneris, con- stituerent.

Macula scorbutici familiares, non sunt, nisi effusi sub cute sanguinis congestiones: Sanguis autem suum ruborem con- servat, rubus: Maculae effusi, si ex coagulatione liqueat, vel nigrum acquirit colorem, lividas, vel nigras: Maculae parvis quod si alius cum sanguine commistus sit humor, pro illius varietate, variis Macularum emergit color. In scorbutici Pa- ritypsibus quondam femora & crura, veluti ignis rubore integrè perfundebantur, ut videtur, quæmadmodum ait Lucreti- tius,

Et simul ulceribus quasi innitit omne rubere

Corpus

effusi nempe sub hepatis partem cute sanguine; imò utrumque & carnes ipsæ Musculorum coagulato sanguine infarciebantur; atque hinc Membrorum rigiditas & ad motum incipiente. Erant quoque Erysipelatosa famæ aspre ad altissimum vicia, utrumque necata; hanc nempe Pericardium acerrime ferimento.

Abdomen, cum Turbinationibus, & Flatibus Intestini, Alvi obftructione, & hinc corporis perennatione, alii- que symptomata, nullum dubium est, adesse tum malum hypochondriacum. Nam hæc signa primaria sunt mali hypochondriaci, quæ sæpe semper adesse solent in hac affectu, & his ipsis etiam vel sponte se manifestare. Quod si his tanquam primariis alia etiam supra enumerata superveniant symptomata, Diagnosi malum hypochondriaci eo est certius.

Signa scorbuti autem Diagnostica sunt vel Externa quædam, vel Interna, symptomata nempe corpori inheren- tia, alia sunt patientis scorbuti, convertitur cum Ico- rthia intus, Commotio in Locis maritimis ac pa- ludo, febres disturie, vel alii morbi chronici, ac an- ticothoracici cum levanis, ac si quis abique alterius morbi certis indicibus sepius valendinarum agat. Hæc vero seu Internis materis ponderis sunt, & jam sunt reco- gnita, quamvis eorum alia frequentior, alia rariora obser- ventur; rarissime autem cuicunque in uno subiecto con- current, Scorbuto enim, non inveniuntur, si, quæ difficultas cognoscitur: interim tamen cum scorbuto fit præter, & in quibusdam morbis afficit, semper peiora symptomata atque in morbo simplici.

Ut igitur cognoscatur latens scorbuto, considerat Medicus urinam, quæ vel est nimia flammæ, vel etiam cum areu- lulis illis rufis impregnata, vel & cauda pavonis est in- flata.

Præter urinam attendat Medicus symptomata doloris; si pariter dolores pariter ultra naturam talis morbi, si in alio morbo superveniat dolor Lancinans in Lumbis, alii adit Nephritis, signum est adesse scorbuto, in quibus si nervi generis pathemata superveniant, de scor- buti præsentia vis amplius dubitandum erit. Confirmatur, si Ager conpercat de doloribus Gingivarum, & Dentium, si hinc inde Maculae excreverint, quæ quò majores sunt, imprimis in cruribus, eò magis malum manifestum est.

Præter maculas præter scorbuto interdum solet infer- re, præterflam quæque purpuram, quæ certum signum est scorbuti intentia.

Potèrò immo Stomacho, frequens est pyrosis.

Signa scorbuti primaria, & quibus tantummodo infallibiliter cognoscitur potèr scorbuto, recentet sequentia LINDANUS: nempe (1) Arteriarum & stillularum in gingivis cum subse- quente Crustatione, adeo ut si parum fricetur, cruententur, ubi sanguis aquosus, & salsus effluens fore, qui potèr sit spidatus. (2) Sinu concavo Osulem apparet color purpureus, qui est quasi semi leucis, inquit LINDANUS. Et hoc unum signum si adest, satis arguit tunc adesse scorbuto: cui si accedat Crustatio Gingivarum, res est fere infal- libilis. (3) Maculae infor morbuscularum pullem, præfer- tim in semoribus, & inferioribus Tibiarum parvis, subinde apparent. (4) Signum admodum singulare, quæ multum con- ducunt ad cognoscendum scorbuto est vasculis Græcum, seu ut vo- cabant robur corpus fulcitur parat, ut Ager quasi sit lapsus. (5) Adest interitus, & insignis fætor Oris, usque præsertim ve- niis. (6) Sentiantur crebro Phlegma, & excretionem per os. Hæc quo signa primaria recentet LINDANUS pro cognitione scorbuti. Hæc ego (7) Ar- teriarum rubras & facile friabiles, si nempe hæc ipsis fundo & la- teribus matule adhære videantur.

Hæc quoad Diagnosim sequitur.

PROGNOSIS.

Hi duo affectus recentet adhuc, & Nervis generi aliis- que partibus solidioribus nondum impetiti, idoneis medi- camentis, & accuratiori victus ratione possunt facili- curari.

Malum hypochondriacum hæpius solus motus corporis cu- rat, rite institutus.

Verum quæ magis loqueretur fuerit malum, & nisi simul exadæ, & cuncta observentur Diata, hinc hæmorrhoe- gerit radices, in specie in negotio Digestionis primæ Economiam systematis Nervis turbaverit, Gingivæ ac dentes erodit, Viscera notabiliter contaminant, macu- læ, & Exanthemata progerit, impossibile est, Agerum perfectè curari, sed palliatum tantum aliud occurrit, præcipua cum maxima medicorum opera argentibus Symptomata tollendis, neglecta causâ continetur, non raro impenduntur. Accedit, & hoc, quod ejusmodi chronici affectus continuatur etiam remediis pollent ulom, ne deus semel mitiga- recedat.

perfectè eradicantur: in qui ipso tamen maxime inobe- dientes sunt Ageri remedium tardium percipientes; sub- ito enim, nisi paulò melius se sentiant, ab ipsis uplarla- mùm desistunt.

Scorbuto enim est Lerna malorum arpe morbozum; haud enim facile reperit morbus, qui non possit originem trahere ex scorbuto.

In primis autem producit obftructiones vacias ob vis- citatem sanguinis, omnis generis Convulsiones, verb, grat. Colicas, hystericas, Hypochondriacas; Artuum om- nis generis dolores, verb. grat. Odonalgiam, Dolores Arthriticos, Cephalalgiam, Lippitudines, &c. Adeoque vel singulis annis vel longiore aut breviori Intervallo scorbuto excitat: tumultus, nunc hæc nunc aliis stipatis symptomatibus, læpæque plures annos prostrahit, do- nec tandem aut postpetuo Languore Ager contabescat, aut hydrofici aut Phthici evadant, aut Spachro hinc vel illius membris conripiantur. Scorbuto enim inestera- tus interdum in Cachexiam Universalem, interdum et- iam in hydroper, terminatur; læpidissimè verb in Acto- phiam, & Tabem transit, lentæque morte hominem ju- gat.

Periculosa contigit scorbuto Dypsente, utpote ex qua Ager non raro pereat, non quidem in se, sed si non fiat cum commodis solvatur remediis: vid. BARRETTE præf. pag. 125. Maxime ubi vacu dignum est prognosticum SENNER- TI, quod habet lib. 3. præf. cap. de Scorbuto pag. 404. Refra- gantia, spiritus difficultas, & hystericæ angustia periculosa malum est, & quomodo si medius, & aditus sum officium non fa- ciant, sed Ager Syncope præter extollentiam incedat; si vero fortiter Natura Morbum ducit tolerare q. fit, phlegma in hydroper Ager incedat, præcipue si, qui parantibus feriat- bus subinde utitur.

Quibus alius periculis, morbus hæc gravior evadit.

Potèr hæmorrhoidum, & mentium fluxus aut nullis quædam lenientis hæmorrhagiæ periodis, uti hæc mala in- signiter leniunt, ita eorum suppessio aut naturalis emat- tio non parum illa aggravat; vid. præf. ubi de hæmorrhoi- dibus pag. 213.

Pulsus in hypochondriaci est variiformis, quandoque in- termittit: in scorbuto vero, imprimis in scorbuto ut sit, est admodum varius, subinde parvus, languidus, & in- qualis est, ut Ager omni momens, quando pulsus, vi- deatur expiraturus; sed longè minus periculosus est, quam in aliis morbis esse solet, etiam non alia symptomata adiut; non terreat Medicus. Pulsus deficientis subinde deprendit, quando propter Acidum sanguinis ad grumescitiam plus minus disponitur, ut hinc inde grami sanguinis col- ligantur, qui motum Arteriarum impediunt; malum si- gnum est.

Urina in malo hypochondriaco hæpius tenuis, & clara, si vel sponte vel ab ulu medicamentorum effluat evadit, mellor est, cum illa crassos humores in corpore delictori ar- gnat. Nigræ quoque urines sine febre post ulum Remedio- rum Antiscorbutorum hæpius hunc morbum solvunt; indi- cant enim excrementorum præcipitationem ex massa san- guinea.

De cætero hypochondriaci non raro hydrofici, & hæctici, interdum melancholici & maniaci, evadunt.

Macule scorbutoz, quæ sæpe in Febribus Petechialibus, quò magis rubent, & quò sunt grandiores, sunt, est melio- res, & sine periculo: tamen quò magis ad creruleum, & li- vidum atque atrum colorem tendunt, non secus ac Febrium Malignarum Petechiæ, eò sunt peiores; qui Ageri rariss- evadunt, & in aperta si abeat ulcera, difficiliter sanantur: semper tamen bonum signum est, cæteris paribus, Maculæ rubræ.

In omni scorbuto levas nocturni sudores symptomata, nisi sint inimiùm frequentes, apprimè verò sudores cum ef- florescentia maculari.

Potèr observanda etiam est mira, & cæcitas symptom- tum scorbutoz inter se Metamorphosis: Nam Dolores vagi transiunt in peritineam Cephalalgiam; nunc in Pa- reth, nunc Colicam Convulsivam: Colica subinde muta- tur in Paralyfin, & Parëfin; & contra: Item Convulsi- nes scorbutoz subinde etiam in Paralyfin nonnunquam ter- minantur, aut etiam in Cataphro: Nunc transiunt in Tumorem modò evanescentem, modò deniqz emergentem; nunc transiunt in Allama Convulsivum, subinde, & Epi- lepticum.

Quandæ scorbutoz atrocissima Dolores Artuum la- borat, subinde Leithrag correpti in alium statum muta- tur.

Diffici-

Difficillioris curationis observatur scorbutus calidus diffusus, quam frigidus, cum in illo particula salino-sulphurea sanguinis maxime intimis junctis videantur, in hoc vero hanc magis ipsi adherescant.

Scorbutus morbus diuturnioribus superveniens, aut Valedudinarius est quatenus causa irradens, agrius curatur, utpote in quibus, & sanguis, & Viscera jam tum vitata sunt.

Cuius etiam ferè generis est scorbutus mala Visus ratione, & imprimis potius generosioris frequentius usu contrarius: cum eorum, qui per Contagium, aut in salubritatem, aut Viam fœderatam excutatur, minorem curandi difficultatem foveat.

Sic difficulter compescitur scorbutus hereditarius, aut qui Laete materno aut neritico fuerit infusus.

Quod fœvis est scorbutus, eo difficilius curatur, si vagus melius curatur.

Præ cæteris *glogivaram habenda est ratio*, quoniam Cruentationi, & excretioni internum gangræna supervenit, interdum etiam Livor, & putredo palatum occupat, & corruptum: vid. SENNERTUS: id quod quibidam asiam dedit, ut putaret esse Litem Veneram, cum tamen tantum fuerit scorbutus: Aliis certum est, nullum morbum magis cognatum esse Liti Veneræ, quam scorbutum, cum etiam dolores in scorbutis æquè noxios tempore magis affligant, sicut fit in Liti Veneræ.

Humores per superiora atque inferiora rejecta parum levaminis scorbuticæ creat, sed hi potius doloribus, & craciaticis Ventris diuturnioribus consuevit: vid. EUGALENUS de feb. p. 7. & 8. Imprimis scorbutus cum Diarrhoea est periculosissimus.

Hoc tamen circa prognosin scorbuti adhuc notetur, illam causæ esse applicandam cum florum pro desperatis habiti reconvalescant, Econtrâ et si symptomata mitiora videantur, si abdominis viscera indurata, pulmones corrupti incipiunt, via successus laudabilis promitti poterit. vid. WILLISIUS de scor. cap. 6.

Sed de his, & similibus ad scorbutum, & malum hypochondriacum attentionibus vid. Auchores suprà citati, in specie REUSNERUS de scor. MOLLENBROCCII, qui quidem scripsit de Paris, seu Arthritide Vaga Scorbutica, sed tamen etiam multa habet, quæ ad scorbuti naturam declarandam optime faciunt, tam quoad Theoriam, quam quoad praxin; & HORSTIUS in Tractatu parvo, sed accurato, de scorbutis.

CURA GENERALIS.

Quod attinet curam mali hypochondriaci, & scorbuti: in hac ad mali scaturiginem, nempe fluxum, præsertim est respiciendum. Propterea

1. Acidum viciatum peccans, & viciosis eruditates, tam primarum viarum, quam in massa sanguinea, & succis corpora, corriguntur: idque vel cum generalibus Acidum temperantibus, vel specificis, in specie Antiscurboticis, Acidum scorbuticum emendantibus.
2. Corruptum Acidum peccans, & ita in scrofali matorem transfusum, emendandum, imprimis per vomitum, urinam, & sudores.
3. Stomachi semper exacta habenda est ratio, ejusque fermentativus Liqueur Volatilibus temperandus, & volatilissimus, & Digestio naturalis, quantum possibile, promovenda, & in naturalem suam restituenda.
4. Laesiones sanguinis Crasse in scorbutu corruptæ, seu Cacochymia, emendanda & quali renovanda: unde in scorbutu imprimis habenda est ratio specificis Saponis scorbutici. Ac
5. Si quæ subint evacuationum solennem suppressio, tollatur.

Corrigenda Acidum sunt vel generalia, nempe metallicæ Alborientia, Martialis, Saturnina, Terrea, & quæ salum fixorum alcalium sunt natura, omne Acidum destruentium: item Vegetabilia acris, & aromatica, animalium partes duræ, Marina, & ex omnibus hæc parata multa Remedia Artificialia: Vel sunt specificis, ut Salia volatilia acris, & oleosa Antiscorbutica Vegetabilibus, tam nativæ, quam Arte facta, & Animalis Regno ab Appropriatis desumpta, nempe Lumbicis, &c. Crasæ massæ sanguineæ sensum alterantia, & ita nec per sudorem, nec per urinam heterogenea excludentia. Hæc vulgo Hepatica, item Splenetica, & Stomachica appel-

lari solent: quibus commodè elegantiores Tincturæ Antimoniales aut Salares succedant. In quibus scopis simul observanda semper symptomata varia, ut additis convenientibus Remediis, & horum sterocia mitigetur. Cuius ex superioribus consistit, Causam Scorbuti proximam in dupli Salis præternaturali consistere, utraque etiam sui emendationem postulat; & quidem tam in primis viis, si in culpa fuerit, quam in massa sanguinea. Ratione primarum viarum, quæ in his vel occasione Asthmæ, vel Dyscrasie propriæ, Cruditates, tanquam scorbuti prima rudimenta, cumulantur, illorum seledum per Diarrhoea, hujus emendationem Pharmaceutica docet, scilicet Alimenta euclyma atque eupæ simpliciora, & facultate incidendi atque resolvendi pollentia, assamum, crassa, viscida, Salis condita, Fumo indurata, Legumina verò, Fructus immaturi, Piceas superius inter Causas relati, & Alimentorum farraginem, evitentur: Saccharum, & Saccharata ratione Salis acris, & corrosivi à plurimis in tantum vituperantur, ut ea Reoscorbuticis sint, qui eorum abusu Scorbuti hujus feculi adeo frequent, huiusque augmento mirum contribuere autumant: vid. HORSTIUS lib. 7. observ. 56. MOLLENBROCCII de Paris cap. 2. & WILLISIUS de scorbutis pag. 323. Potius ut Viscum generosum, & Ventruculo gratum, Consuetis probe delicata, item Lac, Salsicellum scorbuti quidem eluens atque temperans, Ventriculo tamen Cruditatibus repleto non adeo facile exhibendum: Cui etiam subtilius potest ferum Lactis primas vias magis laxans, ac per urinam evacuas, adeoque Antileis. Fritia ac Batavia, hujus quotidianus usus commodum à scorbutu verumcula efficit præservativum. Quibus præter Aquam nihil potest: consuetum, aut hæc cum Vino temperant, seliguntque finitiam pelucidam minime limotam, aut chalybeant bibant, cui tamen Acidula meritis præferuntur: vid. HORSTIUS lib. 7. p. 310.

Alli per Chylificationem depravata, Remedia Pharmaceutica corrigenda, pro meliori Curæ directione observanda:

I. Vena scellione quancunque in his Affectionibus per se nullus esse usus, neque in mala hypochondriaci, neque in scorbuti: utut sit, qui in adjuvno splenis afflicta Salutate scellione mirè laudem in manu infusa: & ceram est, quod multi insignes prædici, aliquot observationibus indidit, hujus Salutate scellione in manibus commendat: sed tamen re ipsa constat, quod hæc ipsa Vena præ alia Venâ nullam habet prerogativam in Brachio, unde hujus scellio ridicula est, de qua vid. in specie MARCUS AURELIUS SEVERINUS in Cognitione Phrenophræsiæ. Unde mirari subit, quomodo secutus sit subinde tam prosperæ curationes post hujus scellione; nam per se nunquam hoc fidum fuit. Interim tamen, utut per se non conveniant; tamen interdum indirectè, & saltem per accidens, v. gr. in Dolore Crurum Scorbutico suo incipiente, Venæscellio Brachii interdum egregiè consistit: sic etiam in Cephalalgia Cruraria incipiente, aut impio recurrente, & similibus in principio Venæscellio in Brachio confert, per accidens autem: non focus ac etiam Fœnalis per se nihil conferunt, à posteriori tamen in affectibus scorbuticis catarrhalibus crebrius affligentibus, per accidens sunt profici, Cruribus iussu.

II. Diaretica imprimis, & hinc fudifera blanda, sunt optima, & naturalissima mali hypochondriaci, & scorbuti Evacuantiæ: Certum est, si in malo hypochondriaco largiter fluit urina, maximum esse levamen: Sine autem in principio blandina, nec ex primis viis ad Vasa rapit sabarrum modicam. Inter Diaretica conducunt præsertim Remedia Salina, de Alcalium profusis, non Terrea, nec Acida, sed Alcia vel fixa vel volatilia, Nitrois est Iosetis, speciatim Arcanum duplicatum Myl. perquam egregium est, spiritus Tartari volatilis, spiritus Lumbicorum terrestrum, &c. Sal Selpitum Fabrum, Tinctura Tartari si ritè parata, vel Sale Tartari, vel ex Scoris Antimonii, vel sola, vel cum dimidio spiritus Salis Ammoniaci mista.

V. & 26. Arcan. dupl. Myl. 3i.

Sol. Cantuar. min.

Gaiffan. 3ss.

M. pro tribus vel a. dosibus.

D. S.

Pulvis Diureticus.

Vel

26. Lepill. Casser. prop. 3i.

Erra

Terra fol. Tartari ꝑß.

M. D. S. ut ant.

Vel

Ꝛ. Tinctura Tartari (sed proban fortis sit) Ꝛiil.

Spir. Sal. Ammoniac. Ꝛi.

M. D. S.

Tinctura Diuretica.

Dosis 30. guttulæ.

Ꝛ. Tinctur. Nephrit. Salic. Ꝛi.

Decur pro duobus doſibus :

S. ut ant.

Vel

Ꝛ. Tinct. Nephrit. Salic. Ꝛiil.

Spir. Carminat. de Tribul Ꝛi.

M. D. S. ut ſuprà.

Vel

Ꝛ. Spiritus Tartari volat. Ꝛi.

Cochlear. Ꝛß.

Sal. volat. Succini gr. vi.

M. pro duabus doſ. S.

Mistura Diuretica pro duabus doſibus.

Sudorifera diſi debere eſſe blandiora, cum ſubinde Scorbu-
tici pluſ debito ſudoribus diſſolunt: ſunt valgaria & ſtitata
cum Antiſcorbutica mixta. DRAWIZIUS de Scorbuto pag.
739. commendat ſpiritum ſequentem :

Ꝛ. Spir. Tart. opt. Ꝛi.

Cochlear. Ꝛi.

Miſſia irroretur.

Variis ad rubedinem mediocri igne ex-

ſic. Ꝛiil.

Diger. in Balneo Mariæ per aliquot dies, dein per Re-
tortam deſtillat Spiritus, in ſine igne fortiffimo,
donec ſpiritus Viſcioli tranſeat. Coius Miſturæ Ꝛß.
vel Ꝛi pro Doſi ſudorifera ſufficiat, & conducere al-
ſerit.

Conuenient optimè, quando in Scorbuto partes Nervæ
externe graviter affliguntur, obſervando tamen conſtitutio-
nem Agri habitus pluſ miſca rariotia, item magis vel mi-
nus ſudoribus colligatiua affectuorum, pro horum enim
conſideratione vel copioſiora ſunt rariotia: vel fortiora aut
blandiora, uſurpanda ſunt ſudorifera: v. g.

Ꝛ. Beccard. Martial. gr. xv. ad Ꝛi.

Sal. Card. ben. Ꝛß.

M. D. S.

Pulvis Scorbaticus Sudoriferus.

Vel

Ꝛ. Animæ diaphor. gr. xv. ad Ꝛi.

Cinnab. Anon. gr. xii.

Ol. deſtillat. Cochlear. gutt. l.

M. f. Pulvis.

D. S. ut ant.

Vel

Ꝛ. Corn. Cero. ſine igne.

Cinnab. Animæ an. Ꝛß.

Sal. volat. Viperæ. gr. vi.

Mag. Cochlear. gr. v.

M. D. S. ut ſuprà.

Uſurpetur in ſequenti Vehiculo:

Ꝛ. Aq. Fumar.

Flor. Samb. an. Ꝛß.

Spir. Cochlear. Ꝛi.

Syr. Card. ben. Ꝛß.

M. D. S.

Aqua ad Pulverem.

Vel

Ꝛ. Conſerv. Cochlear. Ꝛi.

Beccard. Martial. Ꝛi.

Salis Abſinth. Ꝛß.

M. f. Bolus: S.

Bolus Scorbaticus pro una doſi.

Vel

Ꝛ. Spir. Faliq. Ꝛß.

Cochlear. Ꝛi.

M. D. S.

Mistura Scorbatica pro una vice.

Ꝛ. Tinctura Beccard.

Spir. Cochlearis an. Ꝛiil.

M. D. S.

Spiritus Scorbaticus 30. guttæ pro una doſi.

Vel

Ꝛ. Aq. Fumar. Ꝛi.

Ꝛ. Liq. compoſ. cum diſſolventiis. an-

trat. Ꝛi.

Animæ diaphor. Martial. gr. xv.

Syr. de Fumar. Ꝛiil.

M. S.

Potio Scorbatica pro una doſi.

Vel

Ꝛ. Aq. Fumar.

Carmin. Dornæ. an. Ꝛi.

Spir. Cochlear.

Eſſent. Pini an. Ꝛi.

Tinctur. Animæ tartariſ. (vel Spir. Vipe-
rar.) Ꝛß.

Syr. Card. ben. Ꝛß.

M. D. S.

Potio Sudorifera veſperi ſumenda.

Poteſt etiam loco Aquæ Fumaris adhiberi aqua Scordii,
Cardui benedicti, &c.

Ꝛ. Aq. Antiſcorbut. Dornæ. Ꝛiil.

Mixt. ſimpl. Ꝛiil.

Spir. ſal. Ammoniaci ſaſſaſe. Ꝛß.

Rob Janiper. Ꝛi.

Syrup. Fumar. Ꝛiil. vel Ꝛiil.

M. pro duabus doſ. S.

Potio Sudorifera pro duabus doſibus.

III. Bâis curandi Mali Hypochondriaci eſt Fumetur,
proximis Digeliſis, & ſi Alvus conſtipata, Enemate
appropriato provocanda, eaque interdum poſt uſum
repetenda, quæ, ut & primario Vomitus, ſuberram pri-
marum viarum exterminat, & ſtrum fundamentum
parat pro proſpera futura Curatione: vid. HARTMAN-
NUS in Præſ. Chymiat. v. 184. §. 1. Sine Vomitu enim
præmiſſo reliqua Remedia parum vel nihil operantur.
Unde dicunt, optimum eſſe, ſi Hypochondriaci Literati
omni ſpatio meſtruo ad ſtrictum litæu & vomant. Si
Ventriculus Cruditatibus reſertus eſt, Nauseam & vo-
mendū conatum parit, Vomitus optimus eſt, imprimis
abſente Doloꝛe Abdominis. Obſervandum tamen (1) ut
Ventriculi habeatur ratio, iſque debilis fortioribus Vomi-
toris nos omis evocetur. (2) Ut præſcribantur in ma-
iori doſi, cum interdum dupla, imò tripla requiratur, &
quidem potius in forma ſicca, quàm liquida. In Scorbuto,
quæ tali, raro convenit Vomitus, niſi forſas prime vim
ſaltem muſtificandæ: nam periculum eſt, ne Vomitione
cum vi acrioris Scorbaticorum ſucci commoti varia & de-
inde periculofa ſymptomata primarum viarum intant, cum
ipſi Scorbatici ſubinde à Vomitionibus enormibus aut ſal-
tem inanis, uſus præſcribitis vomendi conatibus, miſere
veſentur.

IV. Purgantia fortiora & propriè dicta quæſunt, ſem-
per & maximè nocent, aut ſaltem non præſunt Hypo-
chondriaci, & deteriorè reddunt Scorbutum, im-
primis ſi adeſt Doloꝛ Stomachi, quin & Intelleſtorum atque
Abdominis gravia inferunt Symptomata, diſponuntque
ad Dyſenterias, ad Termina, & Diarrheas, &c. Con-
ſer. SENNERTUS lib. 3. Præſ. ad de Scorbuto pag.
601. TIMÆUS Epistol. pag. 233. MOELLENBROG-
CIUS de Paris pag. 90. Speciatim ſi dolores in Scorbuto
urgeant, vel Abdominis vel Artuum, ſedulo caveantur
à Purgantibus propriè dictis, quia augent Malum. Ad
hec in Hypochondriaci Purgantia ſubinde parum aut
nihil operantur propter Termina, ſemper lædunt, ſal-
tem Paries, aut Contraſturt hinc excitantur; Laxatio
eocoſa optimè proſunt, & interdum cum euphoria
largiter evacuant. In Mulieribus Hypochondriaci vel
Hyllericæ ex levi uſu Purgantium faciliè Dyſenteria ſequi-
tur.

V. In Malo Hypochondriaco ſemper ſedulo habenda
eſt ratio Magiſtræ viſcæ aut Pituitæ viſcæ, cœ ſimi-
liaris ſomitis iſporis Hypochondriaci, à quo ſerè diſturt-
nitas ipſius Mali ac Symptomatum in prima viſ per-
tinetia dependet. Sinus ergo ſemper in ejus Cura ſollici-
ti, Viſcidum pituituſum ut incidatur & attenuetur, hinc
blandè & ſucceſſivè potius quam conſertim per primas
vias evacuetur. In quem ſinem Gummatæ, & ex his pa-
ratæ potiones ac Pilulæ acutendæ cum Extraſto Trochi-
corum Alhandal, repetitis vicibus allumendæ, ſunt opti-
mæ, quarum Formulæ infra ſuo loco: id quod pariter in
quibusvis ſerè Morbis Chemicis ac Cachecticis obſervan-
dum.

VI. Inter præcipua Curationis in his duobus Affec-
tibus, & imprimis in Malo Hypochondriaco hoc obſer-
vandū eſt, ne Alvus ſemper ſervetur aperta; niſi enim
fluida eſt, ſolent inſigniter exaſperari Symptomata,
Capitis perturbations, & Symptomata Melancholica:
ſi in

li in Scorbuto non est aperta, Dolores Artuum & Abdominis exasperantur. Ideo Eger subinde habere debet aliquot Medicamenta familiaria, quibus crebro utatur, modo hoc, modo ille. Ne scilicet unus superveniat saluberrimus, aut ne Natura una assilendo sine alteratione id accipiat.

VII. Notabile est, quod monet HARTMANNUS Prax. Chymiatr. cap. 128. §. 9. ubi dicit: Nota sunt subinde de his remedia, ut ab exhibitione *Aperientium* & *similium*, solum jam visum Obstructionibus, ita alias proutur, ut quasi *Dysenteria* subijungi videatur, tunc providendum erit *Cathartica* appropriata, in specie *Ellicii Proprietarii*, *Tincturae Corallorum*, & *similibus* visum emam conservantibus.

VIII. Alterantia, vulgo *Aperientia* dicta, non semper fortia aut flectora, v. gr. *absorbentia* vel *marialia*, aequè confutunt; sed interdum leniora & quasi humectantia, praefertiora observantur. Hoc facit, quod dicit W. EDELHUS Tr. de Medic. Facult. pag. 50. *Quodvis salis, constantem Hypochondriacis, cum fortioribus & sicioribus aperientibus frugere & diu fuisse vexari, optimi haec ab humectantibus huiusmodi, unde & Galestra Medicamentum cum Chymicis hic commode misentur, & in Infuso commode dantur; in Dietsis etiam hoc eandem rationem. Item ut summam hanc repetamus: Aqua & Liquida magis diluunt & temperant, Terra magis absorbent, salia magis per Urinam pellunt, alia magis incident, acria magis attenuant & resolvunt, dulcia magis absterunt, amara simul magis roborant. Pertinet huc quoque notabilis cautela TACHENII de usu Marialium: In his, in quibus visum tamis & infesta sunt ad ferendum naturam degenerant, minus profusa, Vid. Clav. Med. Hippoc. pag. 121. & 192.*

IX. Comperitum est, quod in Malo Hypochondriaco etiam Medicamentorum antiscorbutorum aliorumque volatiliu optimus sit usus, Imò vix sine alterantibus scorbuticis curari possit, quibus vix sine remediis non cedit. Quod si Malum aliis prodeum sit, Antiscorbuticis vel sola conveniunt, non solum in Scorbuto propriè sic dicto, sed etiam in Malo Hypochondriaco paulo molestius. Per ceteros spiritus Carminativus in Hypochondriorum affectibus mirabilis existit.

X. Quod spirituum antiscorbutorum magnus sit usus, utut propriè sic dicta Antiscorbuticis omnia de Sale volatili acuti participant; Nunc enim sunt *Acriora*, nunc *Temperata*, nunc *Aromaticis saluberrima*. Obiervanda ergo est *Constitutio Aegri*; quidam enim non possunt ferre Volatilia acria, ut Spiritum Cochleariae. Ob id attendant Medici ad Constitutionem Aegri, semper delectum quendam inter Remedia Antiscorbutica habendo, eaqueque observent, quae & quia imprimis uni alteri vel subiecto magis sit familiaria: Nam Antiscorbutica Acria & Volatilia subinde magnam Scorbuticis inferunt noxam nisi subijungantur; sive in Biliofis subiectis; sive etiam in subiectis, in quibus Alkali nonnihil volatilius & acris peccat. In talibus enim Effervescentias aeres, & phlogosae, Symptomata multiplicia & vaga non raro excitare solent. Quo in casu Antiscorbutica acria non conveniunt, sed Vix praemitterenda, aut Temperatis aliis vulgo resistenteribus appellatis, v. g. Cichorio, Endiviu, Acetofo, Acetofo, item Acidis Blandis, succo Citri, Ribium, aut Berberum, Spiritu Salia dulci & similibus temperanda & emendanda. Quo etiam serum Lactis pertinet, cum optimum Antiscorbutorum nimis acrium correctivum.

Solium Antiscorbutorum quod spectat, vid. HELVETIUS Tr. de Aer. pag. 50, in Scorbuto cum Maculiseruleis discoloribusque *Cochlearium* cum Maculis vero rubris *Acerolum* cum tumoribus Artuum quasi hydrocephalicis *Putnamia* cum Atrophis *Stecobaryum* imprimis commendat. Par ratio est in Hypochondriacis, quippe ubi phlogosae adsunt, non adhibenda Oleosa aromatica, quibus potius exacerbantur, sed potius Volatilia macra, seu Salia volatilia macra, seu Salia volatilia non oleosa, ut et si spiritus salis ammoniaci, Carminativi de Tribus, &c. Adde quoque in subiectis, ubi Alkali volatilia acra, & hinc dependentes Phlogosae adsunt, prius Vix Marialia acidum absorbentia propinanda sunt, vel Volatiliu acrium loco substituantur.

XI. Autem nocet tam Hypochondriaci quam Scorbutici; succi tamen Vegetabilium acidi non nocent, nisi in quantum Fermentationes praeter naturam excitare queant. Nempe magna est differentia inter aciditatem succorum

fructuum, v. g. Pomorum aut Pyrorum, ab Aceto ea istia succis per Fermentationem parato. Quo etiam faciunt succus Citri, Aurantiorum, &c. Hypochondriaci ac Scorbutici non adeo hostiles, qui licet acuti, tamen in talem, quae spiritibus solubilibus est, aciditatem terminantur, adcoque minis nociva existunt.

XII. Quod huiusmodi Antiscorbuticis appropriata, seu Volatilia acria, non sunt asperanda nisi in principio Cuae, sed consultum est Fixa, primarium visum Acidum temperantia & absorbentia, Marialia scilicet, vel Salia alicui praemittere horum usus, aut etiam eadem ipsa subinde interponere, ut citius illis succi peccantes minas exasperari per Volatilia, minimeque effervescere queant: (notabilia est cautela.) Hic praemissis tandem appropriata Volatilia subijungi possunt. Quae ipsa quoque si effervescentias aut Phlogosae excitare observentur, Lacte vel Sero Lactis aut additis acidulis succis, ut sapienti monui temperanda.

XIII. Lac & omnia Lactisima in Scorbuto, praemissis Universalibus, & viscosum acidum corrigentibus, quamdiu Stomachus adhuc digerendo aliquid valet, sunt optima. Singulare enim quid obinet Lac in corrigenda Crasi Sanguinis a Scorbuto vitata, omne viscosum acidum temperat, dissediment acrem emendat, partes solidas imprimis Nervae nutritio Rore humectat, unde in Scorbuto, qui nimis fudat, & ad Tabem inclinant, praemissis Universalibus, Lactisima nobilissima sunt Remedia, & Atrophiae ac phlogosae metum tollent, imprimis si legitimo modo cum Antiscorbuticis appropriatis misceantur. In specie commode propinatur in Lacte spiritus Salia Ammoniaci missum cum ana spiritus Cochleariae, de quo capiat omni mane & vespere semper bonus haustus. In Hypochondriaci autem cum saculis coaguletur, Cruditates & Obstructiones mctuenda sunt. Appropriatum verò vis magis erit Serum, utpote potentiori virtute absterrens pulens, praemissis si ipsi Vegetabilia appropriata, Hepatica & Splenetica dicta, insudantur aut incoquantur, vel hoc cum illorum succis & Lilientis temperetur ac Ventriculus alid ferat.

XIV. In Cura Scorbuti movent Praesides, ut & Mercurialis quilibetque omnia affluantia, aut saltem caute eadem usurpetur; quia minus est, ne Mercurius, ad Salivationem disponens, pessima ac periculissima Symptomata Faucium & Oris incutiat: item Dolores nodulos in Artibus solent exasperare Mercurialis, & etiam graves Phlogosae, Affectus, & angustias excitare in tali corpore. Interdum ubi Humores acidi sunt in corpore, Mercurius praecipitatur, ut cum Aqua Fori fieri solet. Antimonialis ideoque Scorbuticis tantum optima. In Malo verò Hypochondriaco Mercurius dulcis commode admodum usurpari potest, miscendo cum ceteris laxantibus, quia somitem Materiae viscidæ optimè incidit & abstergit.

Hic ics praemissis, pergo ad Materiam Medicam. Quod attinet ergo Rem Medicum in cura mali hypochondriaci & scorbuti profusum: imprimis *Digestiva dicta & Preparantia*, Sordes viscidas atque acres primarium visum incidentia & detergentia, simulque vi Diuretica materiam ad liberem Urinae excretionem disponantia, praemittenda sunt & subinde tependa; alia enim levioribus Evacuantiis Cruditates hae non cedunt, potentioribus verò cum magnis torminibus eiciuntur.

Talia sunt ex Vegetabilibus illa *Aromaticis mistura*, quae digestiva, Incidentia & Aperientia conveniunt dicuntur, v. g. Herba Scolopendrii, Ceterach, Centaurii minoris, Hyssopi, Marrubii, Rosmarini, Radia Gentianae, Polydii, Cichorii, Chinae, Petroselinii, Liguiritiae, Lignum Sassafras, Myrrha &c., illorumque Salia fixa per incinerationem parata.

Ex Mineralibus conveniunt *Terrae, Marinae & Metallicae* quae tamen non tam in viscidum, quam in Acidum videntur operari, unde etiam *Absorbentia* vocantur: v. g. Creta, Mars & huius Vitriolum, aliisque Marialia & Antimonialia. Ea Marinis Socinum preparatum, Corallia preparata, Margaritae preparatae, & Lapides possunt hae adhereri varii generis Medicamenta usalia, Crytallus preparata, &c. Saltem notetur hic, non esse addidendum Lapillos, participantes de Marte: nam hi Lapides constant ex multis partibus Terrestribus, & partibus Marialibus, v. g. Lapis Haematites, Magnes, &c. & hinc absorbent quidem Acidum, interim tamen ob copiam terrae terrestris alia addunt. Jam verò notum est, Acidum excrementum Ventriculi in Scorbuto &

& Malo Hypochondriaco coagulare Excrementa, ut inde frequens sit Malum Hypochondriacis & Scorbaticis Alvi Obstructio: & revera, non alio modo accidit Obstructio Alvi, quam quateus Acidum excessivum, concurrens cum partibus excrementitiis terrestribus, degenerat in corpus hyssicum.

Ex Animalibus conveniunt Lapilli Cancrorum, Lapilli Petrarum, Carpinum, Calothorum, illorumque Volatilis.

Ex Compositis vero magis Tartarus vitriolatus, Tartarus nitratus, Sal Digestivum hypochondriacum, i. e. Caput mortuum spiritus Salis Ammoniaci, Terra Foliatæ Tartari, Tartarus tartariatus, Liqueur Terræ Foliatæ Tartari, seu Sal Essentiale ZWELFFERI, quod vid. in *Appl. contra Tach.* p. 73., & hoc ipsum est, quod commendat inter Pulverem suum Purgantem MOLLÉN-BROCK *Traité de Paris sub tit. Tartarus pulvisci modo preparatus.* Ante ZWELFFERUM, hoc LOCATELLI descripsit. Ex Sale Tartari collat, Aceti acidulo ad saturationem usque imprægnato: ita imprægnatum sal solvitur in spiritu Vini, solutio abstrahitur, donec remaneat corpus laminatum sibi lovem superjaceos, hinc Terræ Foliatæ nomen accedit: Hoc Sal nihil aliud est, quam Tartarus regeneratus: Nam si hoc Sal essentiale per Rectorem distillatur, Phlegma & Oleum acquiritur, quæ nihil differunt à productis Tartari communis, adeoque Sal hoc est Tartarus quidam regeneratus. Sal hoc facile liquefit, qui liquor polychrelli usus est in Malo Hypochondriaco & Affectionibus Scorbaticis. Porro conveniunt Extractum Martis, Tinctura Vitrioli Martis Zwenfieri & Lederici, Liquor Terræ Mart. Solaris, Sal Martis compositum, Tinctura Tartari acris, Antimonii ex Scoris Reguli Antimonii, Tinctura Antimonii sicca, pulveres Martiales, Crocos Martis aperivus, Limatura crudè pulverisat, Tartarus Calybeatos, Antisepticum Poterii, Antimonium Diaphoreticum ex Regulo Antimonii, Bezoaricum Martiale, Mineralæ: ex Sulphure Flores ejus, Elixir Proprietatis sine acido, & cum dicto Sale Essentiale paratum, & similia. Præ ceteris omnibus *Arcanum duplicatum Mynsichtii*, quod lo ipse definiturum est scorbato à MYNSICHTIO, SCHROEDERO, & LANGELOTTO. Hæc scilicet ad usum vel duas septimanas præmittatur, & Capiantur quotidie bis, bona dosi, v. g. *Salis Digestivi hypochondriaci* quotidie bis ʒi. ad ʒss., *Liquoris Terræ Foliatæ Tartari* gutt. 30. 40. vel 50. mane jejuno stomacho in Vehiculo calido, à meridie lo frigido. Aliæ quidem Acida quoque in viciditate primarum viarum corrigenda magni usus sunt, quia tamen Acor quidam utplurimum in Malo Hypochondriaco combinatur, cautos nos esse debet in talium propinatione. Igitur non Imitandus SENNERTUS C. 3. *Epist.* 30. & 35., ubi Spiritum Vitrioli Martis & Elixir Proprietatis ratione spiritus Sulphuris commendat. Salia dicta Essentia, de quibus vid. *Chymie ROLFINCII*, etiam non perperam adhibentur: nam ut revera iuxta ZWELFFERUM in *Applend.* saltem sunt Tartari, attamen non sunt contemnendi. Porro ex Tartaro Recentiores pollicentur, nonnulli, v. g. LAGELOTTUS, *Sal volatile amaricans*, quod etiam estimatur magnarum virium, verissimum est, Spiritum Tartari urinolum, de quo vid. *Supplementum* 2. RECHERI, sua mereri laudem. Ex Urina, excreta in loco publico, v. g. in Causpion, elaboratur per blandam calcinationem & elixiviationem Sal multarum virium, id quod Dreidæ nonnullis commendatur, tanquam insignie Antiarthriticum, seu Antipodagrium.

Formulas Digestivorum varias hinc facientes videbitis *supra in Prælegem. Art. 3. Capis.* 3., item *Sect. 3. ubi de Cura Morborum Chronicorum, & in Cura Cachexie Artic. 1. Cap. 3. Sulfuris hujus, item in Colleg. Dissolut. Artic. 2. Membra. 3. Cap. 2. Sect. 1.*

Vel pro corrigendo Acido Hypochondriaco,

ʒi. *Aqu. Cichor.*

Fumar. ana ʒiʒ.

Salis Mart. cum *Succo Pom.* ʒiil.

Syr. de 5. Rad. ʒi.

M. F. Mixture.

D. S.

Mixtura Corrigen.

Capiantur mane & vespere duo vel tria cochlearia.

ʒi. *Aqu. Fœnicul.* cum *Fumar.*

Ment. an. ʒiʒ.

Sal. Martis cum *Succo Pom.* ʒiʒ.

Tom. II.

Mag. Corall. cum *Succo Civi* ʒiʒ. ad ʒi.
Syr. Cret. Aurum. vel *Fenic.* ʒiʒ. ad ʒi.
M. S. ut antea.

Vel

ʒi. *Tinctur. Aurum tartari.* ʒi.

D. S.

Tinctura Resolvens: 40. gutt. pro una dosi.

Vel

ʒi. *Tinct. Tart. acerr.* ʒiʒ.

S. ut antea.

Dosis 40. gutt.

Vel

ʒi. *Tinct. Tart. acerr.*

ex *Serulis Reg. Antimonii* ana ʒiʒ.

Spir. Sal. Ammoniaci ʒi.

M. S. ut supra.

Dos. 40. gutt.

Vel

ʒi. *Arcan. Tart.* ʒi.

D. S.

Essentia Digestiva: 40. guttæ pro una dosi.

Vel

ʒi. *Elis. Propr. Antisept.* ʒiʒ.

D. S.

Elixir Aperiens: 40. gutt.

Vel

ʒi. *Tinct. Martis aperiv.* ʒi.

Spir. Cochlear. ʒi.

Sal. Ammoniaci ʒiʒ.

M. D. S.

Tinctura Aperiens: 50. gutt.

Vel

ʒi. *Limat. Mart. crud. pulverisat.*

Tartari Chalybeat. ana ʒi.

Viniduli dr. ʒi.

Mag. Corall. cum *Succo Civi* dr. ʒi.

M. f. Pulvis pro 3. dosibus.

D. S.

Pulvis Digerens manet in Jusculo,

Vel

ʒi. *Sal. Mart.* cum *Succo Pom.* dr. vi.

Spir. Cochlear. dr. ʒi. ad dr. ʒi.

M. S.

Essentia Aperiens 50. ad 40. guttæ

Vel

ʒi. *Tinct. Vitrioli Mart.* Zwenf.

Syr. Fumar. compes. an. dr. ʒi.

M. S. ut antea.

Vel

ʒi. *Arcan. dupl. dr.*

Or. Cauter. prepar. ʒi.

M. f. Pulv.

Div. in 4. part. æquales.

D. S.

Pulvis Aperiens.

Vel

ʒi. *Arcan. dupl. dr.*

Corall. rub. prepar.

Antisept. *Pot.* an. dr. ʒi.

M. f. Pulv.

Div. in 4. part. æqual.

D. S.

Pulvis Digestivus manet in Jusculo acido,

Vel

ʒi. *Limat. Mart. pulverisat. dr. ʒi.*

Ol. deßill. Salisfr. gutt. ii.

M. f. Pulv. S.

Pulvis Digestivus.

Vel

ʒi. *Pulv. Cochlear. Martial.* ʒiʒ.

Terra tartari. ʒi.

Div. in 4. part. æqual.

D. S. ut antea.

Vel

ʒi. *Corall. rub. prepar.*

Elix. sine Igne an. dr. ʒi.

Viniduli Mart. ad alb. calc.

M. f. Pulv.

Div. in 2. part. æqu.

D. S. ut antea.

Vel

ʒi. *Cret. Mart. aperiv.* dr. ʒi.

Arcan. dupl. ʒi.

Naa

Sal.

*Sal. Albusch. Bñ.**M. f. Pulvis pro 3. dof.**D. S. ut antea.**Vel**3. Crm. Mart. 3b.**Coral. rub. prop.**Salis Summ. gr. v. vel vi.**M. f. Pulvis pro 3. dof.**D. S. ut antea.**Vel**3. Crm. Mart. apria.**Cyball. Tartari.**Solis. Rad. Ari an. 3b.**Mag. Cascar. 3b.**M. S.**Pulvis Digestivus pro 3. dofibus, mane in Juleulo**calido.**His subiunguntur, & intermiscetur Evacuantes blanda.*

Premiis his digestivis usurpentur *Ventosia* primas vias potenter emungentia, eoque reistanda: inter quæ eminent *Infusa Antimonialia*, vel *Tartarus Emeticus Myrs.* qui in *Malo Hypochondriaco* optimè conducit, à gr. iv. vel mistus cum *Antiscorbucis*, vel ubi viscidum incidendum, cum *Salinis*, v. g. *Sale Ammoniacico* depurato, &c. His sumi semper appropriata *Scorbucica* vel *Antihypochondriaca* miscantur: v. g. si fiat *Infusio Croci Metallorum* in *Vino*, tunc filtrata: addendus *Spiritus Cochlearis*, aut alius compositus, aut simplex *Antiscorbucicus*, ut magis approprietur *Vomitivum*: v. g.

*R. Agn. Antiscorb. Darnar. 3b.**Spir. Cochlear. 3b.**Tart. Emet. Myrs. gr. iiii. vel iv.**Extr. Mart. 3b.**M. S.**Potio Emetica pro una dof.*

Quomodò sunt *Infusa* talia, ex superioribus notum est. Post hæc vel loco horum usurpentur blandè *Evacuata* per *Alvum*, & quidem in *Scorbuto sic dicto* calidiorè, in frigidiore verò per paulò potentiora: utraque tamen non sepius reiteranda, cum frequentiora *Malum* exasperent; vid. *EUGALENIUS de Scorb. pag. 233. 243. & 248.* & *SALOMON ALBERTUS de Scorb. §. 252.* Inter hæc conveniunt *Pilule* non tam præcité evacuantes, quàm scilicet *Laxantes*, primam vias Adhergements, alia *Unala* dicunt, usurpari solent. Quod *Pilulas Purgantes*, *Mala*, *Pilul. de Gummi Ammonico Querc.*, *Mala*, *Pilul. Tartarac.*, *Querc. & Rosæ*, item *Pilula de Fumaria*, & *Apéritores Tiliaceæ cum Mercurio dulci*, &c. usurpantur; item *Extradum Catharticum* cum *Gummi Ammoniacico*, *Bdelio*, *Galbano* & *Opilibus* in *Pilulis* redactum, & cum *Trochiscis Alhandal acutissimis* quales *Formulas SYLVIVS Tr. lib. 2. Cap. 2. §. 30. Cap. 7. §. 32. Cap. 14. §. 30. Cap. 30. §. 134. & Cap. 34. §. 102. Cap. 35. §. 16.* describit, & commodè *Hypochondriaci* propinari possunt. Gummi enim *Ammoniacum* laxat & promptè adherget quicunque fordes in primis visceribus stantes. Facit hoc *Mala*, *Pilul. Antiscorbucicæ* *Timal*, quarum hæc est compositio:

*3. Mala. Pilul. Melanag. Querc. 3b.**Extr. Fel. Senn. 3b.**Rosa. Jalap. 3b. gr. vi.**Tart. vitriolus. gr. xiii.**Sal. vitat. Senn. 3b.**Sem. Nafura.**Cochlear.**Sicapi. ad. 3b.*

M. & cum Agn. Antiscorbucica F. Mass. Pil.
Quarum dofis est à 3b. ad 3b. Vid. *MOELLENBROCK.*

Salem hic notet: subinde *Pilulis* talibus esse adiungenda medicamenta aut *Martialis*, aut *Antimonialia*, aut *Mercurialis*, ne *Alvum* post purgationem reliquum adfricem. Præ ceteris *Pilula* usuales sunt communiter quidem *Aloetica*, ex *Extrado Aloes gummoso*: qua ratione *Pilula Rosacea Francofurtensis* & *Glassia*, singulis à vel 14. diebus vespri semel usurpata *Hypochondriaci* sanè perquam proficue sunt: Item *Pilula Aloetica* ad imitationem *LUDOVICI in Pharmacop.* Item à Tr. de *Pilulis Sale Tartari*: *Francofurtenses* præprimis cum *Tartaro vitriolato*, similis salino stimulo addito, acuatæ. Ipsa alia *Aloes* in *Hypochondriaci* aut *Scorbucis* plius nocet, quam prodest, propter virtutem adfricivam, quam altero die post se reliquant ordinatè

rationes partis resinæ, utut primo die latent: Iis enim *Resina Purgantium* & *Extradia* resinosa minds commode propinantur, nisi forsan habitioribus & succulentioribus. Propterea si *Aloes* volumus usurpare, usurpemus substantiam gummosam, quæ potest separari, recteque aut extrahendo *Aqua simplicis*, *Menstruo aquæ*, quæ substantiam gummosam potest redigi in formam *Pilularum*, & tales *Pilula* dofis granorum ii. vel iiii. blandè laxant *Alvum*, & in tali casu *Hypochondriaci* confirmatis omnibus tribus vel quatuor septimanis in usu sunt, egregia cum euphoria. Omnes hæc vel per se usurpari, vel cum aliis Appropriatis specificari, & cum tantillo *Resinæ Scammonii* aut *Jalapæ*, vel *Extrado Trochiscorum Alhandal* acuari possunt; quarum *Formulæ* variz ex *Idea Form. Cl. 2. §. 1. & 2. Colleg. Pharmacop.* in *Schand. P. 2. Cl. 2. Difere. de Precipitant. Usa & Abusu c. 9. §. 10. supra de Cylindricis lasa 3b. §. 2. cap. 1. & de Cura Morborum Chemicorum 3b. 13. petende. Et sanè ad huiusmodi *Pilulis* Usualibus primas saltem vias adhergements longè plus comodi sentit *Hypochondriaci*, quàm à fortioribus etiam propiatis purgantibus.*

*Vel**3. Mala. Pilul. de Ammon. Querc. gr. xv.**Gumm. Ammon. Aceto sol. 3b.**Scamm. sulphurat. gr. ii.**Trach. Alhand. gr. i.**Cum 3. Extr. Mart. f. Pilulæ.**D. S.**Pilula Laxative pro una dof.**Vel**3. Mala. Pilul. Cathol. gr. xii.**Gumm. Ammon. Aceto sol. 3b. ad gr. xii.**M. f. Pil.**D. S. ut antea.**Vel**3. Mala. Pil. de Hier. cum Agn. gr. xii. vel xv.**Gumm. Ammon. Aceto sol. 3b.**Scamm. sulphurat. gr. ii.**Extr. Trach. Alhand. gr. i. vel ii.**Cum 3. Extr. Mart. vel Albusch. f. pil.**D. S. ut supra.**Vel**3. Mala. Pilul. de Ammon. Querc. gr. xv. ad 3b.**Extr. Martis cum Succi Fem. 3b.**Scamm. sulphurat.**Extr. Trach. Alhand. ana gr. i.**Cum 3. Extr. Mart. cum Succi Fem. f. Pilulæ.**D. S. ut supra.**Vel**3. Extr. Mellicor. agr. gr. xv.**Gumm. Ammon. Aceto sol. 3b.**Scamm. refat.**Extr. Trach. Alhand. ana gr. ii.**Cum 3. Extr. Mart. f. Pilulæ.**S. ut supra.**Vel**3. Mala. Pilul. Tartarac. Querc. vel Senn. de**Ammon. 3b. ana 3b.**Rosa Jalap. 3b.**Diapryd. gr. vi.**Ol. dissolut. Cort. Aur.**Macle ana gutt. iv.**M. f. Pilulæ. S.**Pilula pro aliquot vicibus.**Vel**3. Aloes gummos.**Gumm. Ammon. Aceto sol. ana 3b.**Arcan. duplicat. 3b.**Extr. Trach. Alh. 3b.**Cum Tinn. Mart. cum Extr. Fem. F. Pil.**D. S. ut antea.**Dofis xxi.**Vel**3. Mala. Pil. de Ammon. Querc. 3b.**Mercur. dole. gr. xv.**Extrad. Trach. Alhand. gr. i.**Ol. dissolut. Amyg. gutt. ii.**M. f. Pil. S.**Pilula pro una dof.**Vel**3. Mala. Pilul. de Ammon. Querc. gr. xv.**Tartari vitriolus. gr. vi.**Scamm. sulphurat. gr. i.**Cum*

Cum Ol. *deffil.* anif. F. pilulæ.
D. S. urantel.

Vel
℞. *Mass. pil. de ammon.* ℞. xv.
Extr. Caffor. gr. vi.
Trech. Alband. gr. ii.

Cum ℞. *caffor.* f. pilulæ.
D. S. urantel.

Conuenient in malo hypochondriaco flatulento,
Vel

℞. *Galkan. Aceto sol.* ℞. ℞.
Extr. caffor. ℞. ad gr. xii.
Trech. alb. gr. ix.

Diagryd. gr. vi.
Cum Ol. *deffil. carui.* f. pilul. pro tribus doſibus.
D. S.

Pilulæ laxatiuæ reſoluentes pro 3. doſibus.
Vel

℞. *Mass. pilul. de triſas ruſſ.* gr. xii.
Mercur. dulc. ℞. ℞.
Extr. trech. Alb. gr. ii.

Cum ℞. *Eſſent. mar.* faet *Pilula.*
D. S.
Pilulæ purgantes.

Vel
℞. *Mass. pilul. de ammon.* gr. xii.
Mercur. dulc. ℞. ℞.
Extrall. hellek. nigr. gr. v.
Trech. Alb. gr. i.

Cum ℞. *mar. cum ſucco pame.* f. pilulæ.
D. S. ut antel.

Vel
℞. *Gummi. ammon.* in *aceto ſol.* aut *mass. pilul.* de
Ammon. gr. xv. ad ℞i.
Mercur. dulc. ℞. ℞.
Reſin ſcamon. gr. iiii.

Cum ℞. *coſt. aut Elia. præp.* f. pil.
D. S. ut antel.

Vel
℞. *Mass. pil. tartarear.* vel de *Fumar.* gr. xii.
Mercur. dulc. ℞. ℞.
Maſſick. gr. ii.
Extrall. Trech. Alband. gr. i.

Cum ℞. *ſumac.* vel *Elia. præp.* anif. *carui.* f.
l. a. pil. n. 19.

D. S.
Pilulæ purgantes mane ſumendæ.

Vel
℞. *Mass. pil. de Ammon. quere.* ℞i.
Mercur. dul. gr. xv.
Extr. trech. alband. gr. ii.
Ol. *deffil. carui* gutt. ii.

Cum ℞. *ſumac.* gummi *ammon.* f. pilulæ.
D. S. ut antel.

Vel
℞. *Extr. cathol.* vel *panch.* Crall. ℞i.
Galk. cum aceto ſol. ℞i.
Mercur. dulc. ℞. ℞.

Extr. trech. Alb. gr. xii.
M. f. pilul. pro 5. vel 6. doſibus: S.
pilulæ aperientes pro aliquot vicibus.

Vel
℞. *Galk.* vel *gummi ammon.* cum *aceto ſol.* ℞i.
Viridil Martis gr. xv.
Stammon. præp. breu del. gr. xii.
Mag. jalapp. gr. vi.
M. l. pil. min.

D. S. ut ſuprà.
Dentur 12. ulque 15. pro doſi.

Vel
℞. *Mass. pilul. de triſ.* ruſſ. vel Cum. *ammoniaci* in
aceto ſol.
Extr. Hellek. nigr. ana ℞. ℞.
Viridil mart. ad alkæ. calc. gr. v.
Stammon. præp.

Extr. trech. Alband. an. gr. i.
Cum ℞. Cum. *ammoniaci* vel *Fumar. compoſ.*
f. pilulæ.

D. S.
Pilulæ aperientes pro una doſi.

Vel
℞. *Mass. pilul. de ammon.* *Quere.* vel *Gummi. Amm.*
cum *aceto ſol.* deſur. ℞i.
Tom. II.

Viridil Mart. ad alk. calc. gr. v.

Trech. Alb. gr. ii.

Stammon. præp. gr. i.

Ol. *deffil. Fœnic.* gutt. ii.

Cum ℞. *gummi ammon.* l. pilulæ quotis menſe capien-
da.

D. S. ut antel.

Vel
℞. *Extr. pauchym.* Crall. gr. xii.
Mercurii dulc. ℞. ℞.
Stammon. ruſſ. gr. iiii.

Cum ℞. *ſumac.* gum. *ammon.* f. pilulæ.
D. S. ut antel.

Vel
℞. *Mass. pilul. de ammon.* vel *Tartarear.* ℞. gr. xv.
Mag. jalapp. gr. ii.

Extrall. Trech. Alb. gr. i.
Cum *Tiſſol.* *terr.* f. Pilulæ.

D. S. ut ſuprà.

Item *Evacuatio appropriata miſſa Alterantibus* ſunt o-
ptima, ut blandè & ſucceſſivè per continuam uſum
evacuentur & alterentur Viſcoſitates acide, quod faciunt
imprimis *Molali Vino* inſuſi, qui ut in omnibus morbis
chronicis, ita in ſpecie in malo hypochondriaco, & hinc
ſcorbuto, ſunt optimi. Et quidem *Ingrédientia* Laxati-
va ſunt imprimis omnia ſennata, ram Inſuſum *Herbæ*
quàm *Pulveres ſennari compoſiti*, quorum tot ſunt *Deſ-*
criptiones, quot capita. Poſt ſennata ſunt *Helleborata*
ex *helleboro nigro deſumpta Remedia* ſive *Extractionum*
ejuſ, ſive *Eſſentia Radicis hellebori nigri*, quæ extra
ſcopum laxativum commodè aliis alterantibus in his
Malis addenda venit: ſive alia ex eodem *Remedia*. De-
nique his ſtimuli loco aliquid de *Colocynthide* ejuſque *Ex-*
tracto poſſeſt addi, quod non eſt inconveniens *Remedium*
quod ſi fortior jam ſtimulus hi addendus ſit, *Radix E-*
ſulæ præparata recipiatur. *Exempla nodulorum* in malo
hypochondriaco, ſcorbuto, & ſimilibus morbis chronicis,
videb. *ſuprà ſcſ.* 12. & in *cachexia Cura* 1. Cap. 3. *hujus*
Solſtatio: Vel præſcribatur nodulus antiſcorbuticus ex re-
centibus ingredièntibus talis:

℞. *Herb. rec. cathlear.*

Negler.

Extrimar. ana M. l.

Rad. armorac. rec. (Germ. Meer, rettick.) ℞. ℞.

Pol. ſen. ſim. ſip. ℞i.

Rhabarb. elict. ℞. ℞.

Helleb. nigr. crud. ℞i.

Barr. juap. ℞vi.

Cinnam.

Galang. an. ℞. ℞.

Sal. Tart. dr. iiii.

Incisæ & contuſæ includantur nodulo: S.

Nodulus Aperiens.

Inſundatur *Vino ſimplici* vel *Abſinthio*,
Vel

℞. *Herb. abſinth.*

Extrimar.

Centaur. min. an. M. l.

Fler. Anth.

Cenſif. ana M. ℞.

Pol. ſen. ſim. ſip. ℞vi.

Rhabarb. nigr. ℞. ℞.

Helleb. nigr. ℞i.

Sam. Eraca contr. ℞i.

Cinnam. ℞i.

Caryoph. ℞i.

Sal. tart. ℞i.

Incisæ & contuſæ includantur nodulo.

D. S. ut antel.

Vel
℞. *Herb. abſinth.*

Agriem.

Centaur. min. an. M. l.

Fler. anth.

Cenſif. an. p. ℞i.

Rad. Enal. rec.

Polypod.

Armorac. rec. an. ℞vi.

Cora. Fraxini.

Tamarif. an. ℞. ℞.

Pol. ſen. ſim. ſip. ℞vi. ad ℞i.

Helleb. nigr. crud.

Rhabarb. elict.

N u u 2 Agor.

Agar. alioq. ana ʒʒ.

Zedear.

Zingib.

Cinnamon. ana ʒi. ad ʒʒ.

Paffai. mia. (hæc enim tanquam blandissime temperate, his nodulis adduntur) ʒʒ.

Sal. Tart. (est quasi stimulus mentis ad resolvenda ista simplicia) ʒiii. ad ʒʒ.

(aut loco huius *Crem. Tart.* ʒvi. sed

Sal. Tart. est melius)

Incis. & contus.

D. S.

Species ad nodulum Laxativum in Vino.

Includantur *Nodula*, infundantur in *Vino*, quod omni mane & vespere capiatur, ut relaxetur *Alvus*, Vel

ʒ. *Cem. albus.*

Samm. cent. mia.

Herb. rec. coctil. ana M. ʒ. ad M. l.

Rad. armarac. rec. ʒi.

Gustas. ʒʒ.

Tarax. ʒi.

Fel. seu. sine ʒp. ʒvi ad ʒi.

Rad. bellid. nigr. crad. ʒʒ.

ʒi. non ʒp.

Sem. anis. ana ʒʒ.

Fenile. ʒii.

Cinnamon.

Caryoph.

Zingib. an. ʒi.

Sal. tart. ʒiii.

Incis. & contus. includ. Nodula:

D. S.

Nodulus Laxativus in Vino,

Vel

ʒ. *Herb. purficar. rec. M. l.*

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

Incis. & contus. includantur Nodula.

D. S. ut antè.

Vel

ʒ. *Herb. rec. Fumar. M. l.*

Cochlear.

Baccabang. ana M. ʒ.

Rad. Polypod. quæc.

Cert. Aarac. ana ʒiii.

Fel. seu. sine ʒp.

Rhabarb. q. ana ʒʒ.

Helleb. nigr. crad. ʒvi.

Galang. ʒii.

Sem. anis.

Fenile. ana ʒʒ.

Sal. tartari dr. ii.

Incis. & contus. includ. nodulo.

D. S. ut suprà.

Vel

ʒ. *Herb. rec. Fumar. M. l.*

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

ʒi.

Incis. & contus. l. Nodulus.

D. S. ut suprà.

Facit hoc etiam Infusum seu similis Nodulus contra Malum Hypochondriacum CNOEFFELIO alias usitatus, qui fit ex sequentibus:

ʒ. *Herb. ʒi.*

Centaur. mia. M. l.

Rad. bellid. nigr. (nam hæc fuit ipsius Ar-

canum purgatorium singulare, ubique ab ipso commendatum) ʒi.

Polypod. ʒʒ.

Cert. Frazini.

Tartari alioq. ana unc. ʒ.

Zamat. Martis dr. iii.

Incis. & contus. confpergantur

Spiritu salis dulc. gutt. ix.

Includantur nodulo, qui infundantur in

Vini canth. iss.

& more usitato adhibeatur.

Hæc in subiectis scicioribus commodè paffularum miorum ʒʒ. addi potest. *Rhabarbaram* ipsum ad *Caram Mali hypochondriaci* tanquam optimum, præsertim paulo succulentioribus, à quibusdam laudatur, alterando simul & evacuando: vid. RHODIUS *Centar. 2. Observ. 100.* qui ad obstruccionem inveteratam commendat Decoctum vel Infusum rhabarbati, Spectat huc etiam Sympus de spina cervina, seu domesticis, item Sympus florum *A-caciz & de carthamo*, qui sunt blandi & maxime conducunt: aut cremos *Tartari* cum tantillo *Radici lalap-pæ acutus*; c. p.

ʒ. *Crem. tartari, vel tartari viridat.*

Polv. Jalapp. ana gr. xv.

Olei deffil. Mac. gutt. ii.

M. l. pulvis.

Pulvis laxativus.

Vel

ʒ. *Tartari viridat. vel Atram. dragl. gr. xvi. vel ʒi.*

Samm. sulphurat. gr. ii.

Trech. alband. gr. ii.

M. l. pulvis.

S. ut antè.

Vel

ʒ. *Polv. Diapena. mont. gr. xvi.*

Crem. tartari ʒʒ.

Samm. sulphurat. gr. iv. vel v.

M. l. pulvis.

D. S. ut suprà.

Vel

ʒ. *Craei Martis sperul. ʒi.*

Samm. sulphurat.

Sal. tartari ana gr. v.

M. l. pulvis.

D. S. ut suprà.

Vel

ʒ. *Fel. seu. sine ʒp. ʒiii.*

Rad. bellid. nigr. crad. dr. i.

Zingib.

Sal. Tartariana ʒi.

Infund. in l. q. Aqua calid. per noctem;

Colaturæ mane addatur.

Aqua cinnamon. dr. ʒʒ.

Extrait. trech. Alb. gr. l.

M. D. S.

Potio Laxativa pro una dosi.

Vel

ʒ. *Fel. seu. sine ʒp. dr. ii. vel iii.*

Rad. Polypod. dr. iii. vel unc. ʒ.

Fibr. Helleb. nigr. ʒii. ad dr. i.

Zingib. ʒʒ.

Sal. tartari ʒi. ad dr. ʒ.

Infusd. per noctem in Aqua simpl. vel fumar. vel Sora

Lallie: mane coquantur leniter: Colaturæ unc. iii. adde

Spiritus cochlear ʒi.

Syrup. fumar. vel Refat. solut. vel de Fem. dr. ii.

ad ʒʒ.

M. pro dosi.

D. S. ut suprà.

Vel

ʒ. *Herb. pici reuili. M. ʒ.*

Tamarind. unc. ʒʒ.

Rad. bellid. nigr. dr. iii.

Coq. in l. q. Cerevis. secund. in vase clauso & igne

lenissimo;

Colaturæ unc. v. adde

Aqua anisicorbi dract. unc. ii.

Cryball. tartari dr. ʒ.

Succ. coctil. rec. expr. unc. l.

Syrup. scalyrb. Furef. unc. ii.

D. S.

Potio purgans pro 3. vicibus: capiatur mane per

3. dies consecutivos.

Ve-

Verum ut Alvus obstruatur aut saltem contumacior quotidie laxa iervertat, etiam *Remedia quidam Domestica* sedulo in usus vocanda sunt; quae inter primatum obtinent *Passula*, quae admodum conveniunt in Malo Hypochondriaco, Scorbuto etiam, & nihil nocent; cum alia *Dulcia*, ut *Saccharata* & *meliosa* Hypochondriacis & Scorbaticis propter facilitatem aeternam & propter contentum ea effervescentia concitata turbationem, terra interant Symptomata, & Afflictus recrudescere faciant. *Passula* autem, quatenus sunt temperata, potius quamcumque Acrimoniam in Corpore temperant, emolliunt & nutriunt, & blanda ac naturali Fermentatione (sunt enim inflar Modis concentrati) vitium Sanguinis Fermentationis restituunt & renovant, conducunt imprimis Viris, Mulieribus non semper. *Poma* etiam *Berberis*, *Prunae* aliaque *Dulcia*, seu *Cruda* bene matura comella, seu coram Succo ulparum, Medicamentum sunt Laxativum, & admodum temperatum in Malo Hypochondriaco. Hinc Succo depurato commode alia Remedia Alterantia & Laxativa infundit, & ita propinari possunt, qui Poma admodum conducit in Malo Hypochondriaco. Quo etiam facit *Pilulae Domesticae* seu *Uinales* jam dictae, omnibus L. vel 14. diebus semel capiendae; item *Terebinthina* mane deluta, ad quantitatem Nacis parvae, quam HORSTIUS L. observ. 28. singulariter commendat.

Conveniunt ergo hic *Passulae Laxativae*, item *Pruna Laxativa*, quae in Officinis solent prostrare; quorum vis Laxativa est imprimis à Senna, Passularum nempe vel Prunorum in Senna coctio vel maceratio: Item Decoctum Passularum Laxativum cum & sine Tamarindis; nam & ipsi Tamarindi utilissimi sunt Hypochondriacis ac magis Scorbaticis, illis praesertim, in quibus Philogofes & Aëliationes vagae subinde obervantur. Formulas duobus infra L. 2. *sest. 3. Membr. 2. articulo 3. Capitis 4. ubi de Melancholia*, & in *Colleg. Pharmacop.* in *Ludovic Tit. 1.*

Vel
2℥. *Passul. min. anaquass. 3℥i.*
Probè coquasq. coq. in l. q. *Aqua simpl.*
Colat. adhuc ferventi infunde

Fol. Sen. sicc. 3℥i. dr. iii.
Fol. Alar. P. ii. ad iii.
Crem. Tartari dr. i.

Stent aliquandiu in loco calido, postmodum coletur & affervetur prosum.

D. S.

Potio Laxativa.

Capiant Hypochondriaci haustulum Vitri unius (Germ. *ein Weis glases voll*) & intersit etiam pro Vehiculo reliquorum Remediorum, blandè servat Alvam apertam, item

2℥. *Passul. min. anaquass. 3℥i.*
Coq. in l. q. *Aqua simpl.*
Colaturae ferventis huj. infundo
Fol. Sen. sicc. 3℥i.
Rad. Helleb. nigr. non prepar.
Cort. Aurat. ana dr. ii.
Galang.
Zingib. ana dr. i.
Crem. Tartari dr. ii.

Stent in loco tepido per noctem vase clauso.

Colaturae addè

Spiritus Cerebelli unc. ℥.

M. S. ut supra.

Vel fiat Electuarium hoc modo:

2℥. *Passul. min. unc. ii.* vel iii.
Arcan. dupl. Myrs. dr. i.
Sul. Amm. depur. (ratione Stomachi.)
Syr. Dia-trion pipere. ana dr. ℥. vel 3℥i.
Syr. de Pom. Reg. Sul. q. l.

M. f. Elect. pro aliquot (9. vel 12.) dosibus usurpandum, quod sufficiens Alvam apertam servat.

Si verb Alvam nimis contumax sit, aliquot granis *Terebinthinae Albandi*, vel *herum Extracsi* facillè potest acui. Melius autem est in forma liquida propinare. Pertinet huc Sympus de Spina Cervina Domesticus, item Viam Infusonis Florum *Acaciae*, qui pro hoc scopo sunt perquam proficui & blandissimè Alvam servant apertam; vid. *Collegium Pharm.* in *Ludovic.* Ut taceam *Cremorem Tartari* à 3℥i. ad dr. ℥. cum aliquot granis Jalapae acutum, in Juicula servido assumptum, egregium.

Praeterea dicta, *Clysteris* quoque in Malo Hypochondriaco & Scorbuto magnae sunt efficaciae pro Albo aperta laxanda,

praesertim in paroxismo, quando Aëliatio Corporis, Philogofes &c. urgent, in Abdominis Afflictibus mimentibus, palpitatio Cordis, Anxietate Melancholica, Dolore Abdominis Scorbatico, & quidem saltem Emollientes & blandè Abstergentes sufficiunt, vel, quod melius est, ex Urina pueri, qui conveniunt in Malo Hypochondriaco cum copiosis Flatibus mendo: Si contumacius sit Malum, conveniunt Clysmata cum Lixivio diluta, additis aliquot uncis Mellis depurati. Talia Clysmata mirè conveniunt Intestina abstergendo, in specie si crassiori Mucro sunt obdeta, vid. *supra* *sest. 11. ubi de Colica*. In Doloribus Abdominis conveniunt Clysmata ex Sero *Lactis*, aut ex *lacte*, vel simpliciter, cui parum *Sacchari* sit additum, vel cui incoquantur plantae quaedam *Carmenatives*.

Modus praescribendi notus est ex MORELLO. In specie si urgeant Dolores Nephritici notui, conveniunt Clysmata ex *Lacte cum Terebinthina*, quillo *videt. supra, sest. 9. cap. 3. artic. 2. ubi de Dysenteria*; faciant Urinam bene oleentem inflar Violatam, & multum commodi afferunt. Quis etiam Clysteres nocturni, seu qui vespere injiciuntur sub introitu lecti, & per totam noctem retinentur, admodum commendantur io *sest. HORSTII*, & *sest. ex Lade* praeparantur, io Scorbuto summe proficui: Imò sunt, qui alternis diebus illorum iniectionem commendant, v. gr. RIVERIUS L. 12. *pr. cap. 3. ex. gr.*

2℥. *Lact. bubul.* unc. i.

Elect. Lentiv. unc. i.

de *Bact. Laur.* unc. ℥.

Vitell. Ovi i.

M. f. Clysmata sub introitu lecti injiciendum: S.

Clyster Leniens.

Vel

2℥. *Flor. Sambae.* M. ii.

Flor. Hyssop. M. i.

Coq. in l. q. *Lactis bubul.* vel *caprill.*

Colat. unc. x. addè

Vitell. Ovi. ii.

M. f. Clysmata io Doloribus Scorbaticis.

D. S. ut antè.

Vel

2℥. *Herb. Chamemill.* cum *Flor. M. iv.*

Rad. gentian.

Bact. Juniper.

Laxativa unc. ℥.

Sul. Tartari vel *Cocci.* clav. 3℥i.

Coq. io l. q. *Aqua*:

Colaturae unc. viii. addè

Elect. Lentiv. unc. i.

Ol. Colicaryth. 3℥i.

M. f. Enema.

D. S. ut supra.

Vel

2℥. *Spec. Carmine.*

Flor. Chamemill. ana M. i.

Rad. Levist. 3℥i.

Bact. Juniper. unc. i.

Coq. io l. q. *Urina Parvi*:

Colat. unc. viii. addè

Elect. Hier. cum Agar. unc. i.

Mell. aschebat. dr. vi.

Misc. pro Enemate:

D. S. ut supra.

Vel

2℥. *Lact. bubul.* 3℥i.

Terebinth. cum Vitell. Ovi. 3℥i.

Mell. rosat. 3℥i.

M. pro Clysmate:

D. S. ut supra.

Praemissis his Universalibus, aut primis viis ritè mundificatis, fiat accessus ad *maritima*, *salia fixa*, aliaque similia, Acidum peccans in primis viis emendanda; quibus vel subiungantur vel simul cum his subministrantur *ultrapuritia*, acria quidem, amara, aromatica, quodammodo Diuretica in Malo Hypochondriaco; nempe conveniunt hic in genere omnia vulgò dicta *aperientia* & *Maritima Amara*, & hoc *Stomachica aromatica*, & virtute in specie diuretica insignita. Vel horum loco *Volatilia Spirituosa*, spiritus ac *Salia Volantia* usurpantur, pro varietate nempe Constitutionis Subiectorum. Nam ista phlegmaticis, sanguineis, Frigidis, &c. & in quibus bilis Stimulo indiget, conveniunt; haec verb arinosa volatilia Cholericis, Janiatis, Melancholicis, & his, qui crebrius Aëliationes

nes

nes patiuntur; magis consensum martialia: Hæc insect emineat nunc Mars crudus, nunc præparata varia plius minus cruda, prout plius minus acidum infringendum venit. Hinc in usu sunt omnes Croci martis aperitivi, qui quo sunt simpliciores & Acido minus concentrato parati eo sunt meliores. Croci Martis cum salibus, item Limatura Martis subtilissime trita Facit hoc etiam Tertia martis præparata, quæ inferri fœdus reperitur, laudata insigniter à ZACUTO. Huc faciunt omnes Pulveres cathedrici, quantum basis solet esse Mars, adjectis tamen etiam aliis; Pulvis cathedricus *Narmanni* simplex cum Cinnamon, Viriolium martis ad pulveris consensum calcinatum, Liqueur martis solaris, sal martis compositum: c. 8.

℞. Conf. Fumar. ʒiʒ.

Conf. Alchem. ʒiʒ.

Martis crudi pulveris ʒiʒ.

Mag. corall. cum succo citr. ʒi.

Cum ʒ. q. syr. pom. vel Flor. papav. croc. vel aliis appropriati

F. Eleutharium.

D. 5.

Eleutharium aperiens pro aliquot vicibus.

Vel

℞. Pulv. passul. min. ʒi.

Lim. martis pulveris ʒi.

Oil. distillat. cinnam. gutt. ʒi.

M. pro dosi. 8.

Eleutharium aperiens pro una vice.

Vel

℞. Confusio fumar. ʒiʒ.

Cochlear. ʒiʒ.

Viriolium martis ʒiʒ. vel Extr. martis cum Succo

Pom. ʒiʒ.

Corall. rub. præpar.

Elor. sine igne.

Lap. cancr. præpar. ana ʒi. ad ʒiʒ.

Cum ʒ. q. syr. pom. i. Eleutharium.

D. 5.

Eleutharium aperiens pro aliquot vicibus.

De quo capiatur omni mane dosi a. cassanærum maturitudo, subingendo vesperi Eliax, vel Essentiam quandam appropriatam.

℞. Tinctura martis tartarizata ʒiʒ.

Spiritus cochlear. essent. ʒi.

M. D. 5.

Aperient tinctura chalybeata.

Dosis 40. ad ʒo. gutt. bis in die.

Vel in mullisioribus:

℞. Lign. Martis solaris ʒiʒ.

D. 5.

Aperient Essentia chalybeata.

De qua primo die capiat gutt. vi. secundo viii. tertio xii. ascendendo sic ad xv. & xxv. usque ad modum Acidularum Naturalium in morbis chronicis.

Ratione martis ipse Acidale naturalis, quæ originem ducunt ex Vena Martialis, insuta ab Acido sulphureo, in his Morbis, præmissis præmittendis, sunt aded egregie, in quibus præponderat Acidum forte: de qua virtute & efficacia vid. HELMONT. PARAD. & TACHENIUS in *Hyp. Chym. SYLVATICUS* c. 1. conf. 63. & c. 3. conf. 76. ac RIVIERIUS *Pr. L. 12. cap. 5.* Usus videbitur in L. ANGIO de *Utu Therm. Carol. & Acidularum Igrænarum*. Loca quarum liquor martis solaris, tanquam Acidulæ concentratæ, commodè substitui possent. Aliis autem Acidulis artificialibus vulgo dictis quales clystus Autimonii, &c. nihil tribuo, si quidem aded certum est, quàm quod certissimum, acidulas naturales, uti præmonitum est operari respectu partium sibi junctarum Martialium, quæ desunt dictis acidulis artificialibus. In refringendis autem Astibus febribus, etiam malignis, laudes suas his altero decernam, præmissis clysto antimonii. Ex talibus Acidulis elaborant tincturam suam Horum bellidus nosse D. HORNBIUS. Quorum stomachus est nimis sensilis, his loca Acidularum naturalium sufficit Tinctura Vitrioli martis *Zoroff.* Solutio martis cum succo pomorum horisferum ut. Extrañum Martis cum succo Tamarindorum vel succo Pom. borsd. extrañum. Hoc Extrañum succo Pom. borsd. extrahitur cum spiritu cochlearis antisepticum compositum in essentiam seu tincturam martialem, & est egregia Tinctura antihypochondriaca: vid. DRAWIZIUS. Vel Solutio martis cum succo Pomorum mûceda cum spiritu cochlearis. Dosis 40. vel ʒo. gutt. bis vel

ter in die. Martialia hæc aliquandiu continentur, & post eorum usum blandus instituitur moeus, alvusque servetur aperta.

Hæc quoque facit Antimonium diaphoreticum Martiale, Bezoardicum minerale, martiale, & in genere quivis pulveres, Eleutharia, Essentia, ac Tinctura martiales Anticathedricæ, &c. Et denique laudatur lapis bezoar tanquam expertum in malo hypochondriaco, ex eo, quoniam quodcumque acidum promptè absorbet.

Obervandum autem, ne semper Martialis propinentur in febrilibus subiectis, utpote in quibus blandiora & liquida non raro majorum virium observantur. In specie vetò ubi Vicerum Infarctus ad scirrhum inclinat, subinde Martialia non conveniunt, sed Mâlem potius intendunt, vid. *Diff. de Præparandis usq. & abusu* c. 3. §. 18. & TACHENIUS *Clen. Mûpser. pag. 181. & 192.* In usu Medicamentorum martialium, in specie Acidularum etiam stomachi habenda est ratio, unde externò Emplastrum de laudato *Crotavio*, item Emplastrum de Tacamahaca, malaxatum cum Oleo chamomilla, in forma scuti stomachalis applicatur: Item Corium cervinum cum Oleo destillato chamomilla & mentha illitum commodè adhibetur. Vel

℞. Oil. express. aceti ʒiʒ.

destillat. bacc. junip. ʒiʒ.

Cumbe ʒiʒ.

Mastic ʒiʒ.

M. D. 3.

Balsamum stomachale.

Alterantia hypochondriaca, quæ Veteres consueverunt usurpare præmissis martialibus, imprimis sunt Vegetabilia amara plius minus aromatica, Hepatica & spleenica dista, it. stomachica, ver. g. herba absinthii (optimum in hypochondriaci succulentis.) Agrimonia, centaureum minus, Rad. Armoricæ, Aronis, filicis, poly-podii, helenii, &c. Præ cæteris Fumaria, centaureum minus, Barbae juniperi & omnia ex his parata, ut Infusa, Decocta, quæ tamen in defectu ventris abierunt, & Vina medicata. Magni etiam à nonnullis estimantur *Cappares*, de quibus audientes est SENNERIUS *Prax. lib. 3. par. 1. Sect. 1. cap. 7.*, qui diffidit non saltem coctionis, sed ratione Aceti quoque, quoniam continuenter conduntur, eas suspensas pronunciat, idoque cum Passularum corinthiacarum tertia parte, saccharo, & tan-sillo tantum aceti eas præparare jubet. Insigniter autem ex his Vegetabilibus quodcumque fixa lixivialia per calcinationem parata in malo hypochondriaco conveniunt, quia sunt simul diuretica, ut Sal absinthii, Cichotii, centaurei minoris, sal stomachale *Hypochrysi*; item istud compositum, quod remanet in destillatione spiritus salis Ammoniaci, hoc enim sal est egregium Diureticum, & vulgò vocatur sal digellivum hypochondriacum; & similia, &c. Faciunt hæc etiam Vegetabilia Essentia; nempe fumarie simplex & composita, & omnia ex Fumaria composita Remedia, quæ egregia in Malo hypochondriaco: Essentia splenis Bovis, Essentia absinthii ad imitationem DRAWIZII parata, aliæque similia: item Essentia aperitiva D. Michaelis, cuius propter materiam medicam cogitationem hæc est compositio:

℞. Herb. Agrimonia.

Eclogandra.

Cuscuta ana M. iij.

Melissa.

Citrach.

Cichor.

Tarax.

Marrub.

Capill. Peneiri ana M. iij.

Rad. Rhubarb. menach.

Filicis.

Cichor.

Tarax.

Gramin. ana ʒiʒ.

Curcum. ʒiʒ.

Flor. Cichor.

Bellid. min.

Tamaric.

Hepac. nob.

Croci. ana p. iij.

Cort. capar.

Tamaricis.

Fraxini ana ʒiʒ.

Stm

sem. Albarag.

Frus. ana ʒʒ.

Anis.

Fenical. ana ʒij.

Gum. Lucca ʒi.

M. & fiat cum spiritus Vini simpl. vel appropriato Eff. sentia Aperitiva.

Elixir proprium commune, vel paratum sine Acido, vel paratum cum spiritu Salis Ammoniaci viscoso, vel mistum cum spiritu Salis Ammoniaci, aut etiam cum spiritu Cochlearie, vel solum sufficere dicit LINDANUS in Malo Hypochondriaco, iter. in scorbuto in subleis paulo habitioribus: Sic etiam Elixir stomachale D. Michaelis mistum cum dimidia parte spiritus Cochlearie, mirè conducat Hypochondriaci. Quin etiam omnia Remedia Tartarea Salina, aliasque Volatilia uberius penetrantia, nunc per sudorem, nunc per Urinam evacuantia, præ cæteris sunt egregia. Hæc inter eminet Sal volatile, & spiritus Tartari, utque ræ paratus, & volatilis: item Tartarus Viriolarum, Tartarus Chalybeatus: Item supra laudatum Arcanum duplicatum *Myrsinæ*, quod usu diuretico omnibus palmam præcipit in Malo Hypochondriaco, & Scorbuto, præsertim Scorbuticis, quando crebriores Philogotes Aegros laniat: In talibus casibus est nobilissimum: unde etiam in Febribus Intermitteatibus, & scorbuto Remedium est sine pari. Tinctura Tartari acris ad 40. gutt., mista cum spiritu Salis Ammoniaci, item Tinctura Tartari antimoniatia, quæ & ipsa est egregia. Mistura simplex, quæ pari modo conveniens est Remedium in Malo Hypochondriaco, non minus quam in Scorbuto. Pertinet hæc imprimis spiritus Carminativus de Tribus, ex Tartaro, Nitro, & spiritu Vini, qui vel solus vel mistus cum ana spiritus Salis Ammoniaci potens est Remedium ad Malum Hypochondriacum. Dosis fuit gutt. xx, xxx, ad xl, utque; melius non habebitis Remedium in Paroxysmo Mali Hypochondriaci, quod nunquam me deteruit, & Hypochondriacos mirabiliter levat. Nam spiritus Salis Ammoniaci per se egregius est ad Curam Mali Hypochondriaci, itque non tam simplex, sed & fecerosus oleosus, si mixtura Caleis vivæ & Salis Ammoniaci addatur spiritus Vini infusione Aromatum imprægnatus, & hinc totti igne per Rectortam destillatur, prodit hic spiritus vini aromaticus reterens, qui est optimus dosi gutt. xxx. vel xl. in Malo Hypochondriaco. Quo etiam pertinet Tinctura Nephritica Ammelan- gi, & fæccosa alia, a gutt. xx. xxx. ad xl. Ut hæc reser- vata eo magis reddantur Diuretica, consilium est, ut imitemur ZWELFFERUM, qui miscet spiritum Salis Ammoniaci cum ana Liquori Tertæ soliatæ Tartari, sic est forte Diureticum, & tanquam quoddam secretum à quibusdam habetur in Cura Mali Hypochondriaci: Aut etiam hæc ipse spiritus Salis Ammoniaci miscetur cum spi- ritibus Anticorbaticis, cum spiritu Cochlearie: aut cum spiritu Anticorbatico compo- sitis, & singulariter confert in Cura Mali Hypochondriaci. Ex dictis Formulæ sunt varis.

ʒi. Eff. Albusch. vel albusch. tartarif. ʒij.

Spiritus Cochlear. ʒi.

M. D. S.

Essentia Aperient.

Dosis 40. gutt. bis in die.

ʒi. Eff. Gum. Ammon. ʒʒ.

Spiritus Sal. ammon. salaf. ʒij.

M. S. ut antè.

Dosis 30. gutt.

ʒi. Elix. prop. sine acido, vel Tinct. tart. comp. vel

Eff. albusch. ʒij.

Spiritus Sal. ammon. ʒʒ.

M. S.

Elixir Aperient.

Dosis 40. gutt. ter in die.

ʒi. Elix. prop. sine acid. ʒʒ.

Spiritus Sal. ammon. tartarif. vel alius oleif. ʒij.

Cochlear. ʒij.

M. S. ut supra.

Vel

ʒi. Tinctura Viridi maris Zouaiff.

Eff. Fumar. comp. ʒʒ.

M. D. S.

Essentia Aperient.

Dentur 30. vel 60. gutt. bis in die.

ʒi. Elix. Cochlear. alterat. ʒij.

Spiritus Cochlear. ʒij.

M. D. S.

Elixir Aperient.

Vel

ʒi. Elix. prop. sine acido ʒʒ.

Eff. Fumar. comp. ʒij.

Spiritus Cochlear. effat. ʒi.

M. D. S. ut supra.

Dentur 30. vel 60. guttulis.

ʒi. Elix. Cochlear. alterat. ʒij.

Spiritus Cochlear. ʒij.

M. D. S. ut supra.

Vel

ʒi. Spiritus Carminat.

Salis ammoniaci,

Cochlear. ana ʒi.

M. D. pro 4. doibus: S.

Spiritus Aperient.

Vel

ʒi. Arcan. Tartari ʒij.

Spiritus Sal. ammon. ʒi. ʒʒ. ad ʒij.

M. D. S.

Mistura Aperient.

Dosis 30. 40. ad 50. guttulis.

ʒi. Aqua Fumar.

Flor. acac. an. ʒij.

Eff. aperit. comp. ʒʒ.

Spiritus Cochlear. ʒi.

Syr. de ʒ. Rad. vel Fævic. vel alias parum.

D. S.

Mistura Aperient: caplatur cochleatim.

Vel

ʒi. Aqua Fumar. ʒij.

Rorag.

Bagi. an. ʒi.

Spiritus Carm. de Trib. ʒij.

Cornell. rubr. prop. dr. i.

Syr. Papav. err. ʒʒ.

M. S. ut antè.

Caplatur cochleatim in paroxysmo hypochondriaci.

Ratione Salium horum, & ipsam Nitram depuratum (non fixum) aut siccum, non iocogrum est Remedium in Cura Mali Hypochondriaci, præsertim ubi Flatus urgent, aut Philogotes crebriores affligunt. Et hinc etiam species *Dialysatus Galieni* ex Nitro, & Cimini Semine in Malo Hypochondriaco cum Cruditate stomachi non contemnendum est Remedium, imò valdè commendabile, cuius usû desperatos Hypochondriacos ad extremam ferè Maciem deductos aliquando feliciter curavi, inquit BARTHOLETUS de Dyspnea l. 5. cap. 4. p. 437. Compositionem vid. in ZWELFFER O pag. 179. Et certum est, quod quidam etiam famulos Medicus D. JAHN afferit; quod nulla sit Compositio in tota Pharmacopœia vitata, quæ magis conveniat in malo Hypochondriaco, & Ventriculi Affectionibus, quam illud, utpote quæ amplissimi hypochon- driaci restituti sunt: ubi non proliat, potè ex tempore describi ita:

ʒi. Nitri depur.

Spec. Diacumia. ana dr. ʒ.

Olei destill. Camia. gutt. iij.

M. f. Pulvis.

Div. in 3. part. æquales.

D. S.

Pulvis Resolvens & Aperient.

Vel

ʒi. Spec. Diacumia. dr. i.

Nitri depur. ʒi.

Olei destill. Camia. gutt. iij.

M. f. Pulvis.

Div. in 3. part. æqual. D. S. ut antè.

His ac similibus accedente Mena ferè curari solet malum hypochondriacum.

Ab Enteritis nonnulli incrassationem, & condensationem humorum aut partium laxitatem metuant, v. g. SANGTORIUS meth l. 2. cap. 3. & SOLENERANDER sect. 1. com. 10. Alii urgente dolore Hypochondriaco, Anodyna, & Dilatentia temperativa haud omittenda, v. g. Unguentum Agrippæ, aut Martiazum cum Oleo de Capparibus vel Chamomillæ, Unguentum, & Emplastrum de Cicuta, Nicotiana, Carminativum Syroli.

Sed præter dicta in Malo Hypochondriaco, & scorbuto, tam incipiente quam coarctato, adhuc alia sunt in usu, nempe specifica Alterantia Anticorbatica, quæ illis præmissis Meritis scripturatum emendat, & tollere possunt.

sunt. Hæc imprimis post *Marietia* usurpanda, sunt in *dupli differentiâ*, nempe vel sunt talia, quæ

1. Respiciunt saltem *Dyscrasiam sanguinis*, & inde oriuntur succorum ab Acido scorbutico factum, & sunt Volatilia plus minus Acrida; vel
2. Respiciunt novam *Sytematis Nervosi*, & partibus continentibus simul Hilarum, & sunt temperata Balsamica seu Oleosa sulphurea, nempe ex Pino, Junipero, & horum Succedaneis ex Lignis, & Corticibus.

Pro utroque Scopo convenit Lac, & qualibet Lactis *antiscurbutica*.

Antiscurbutica ergo *specifica* Volatilia sunt ferè seque. *Cochlearia*, Nallurtia quæcumque, imprimis aquaticum, *Chelidonium majus*, & minus, *Flammula Jovis*, quam mirè laudat HILDANUS, Sedum vermiculare, de cujus egregiis in scorbutum viribus vid. M. A. N. C. ann. 6. & 7. 85. 11. *Barbarea*, *Perficaria acris*, *Piperitis*, cujus Aqua ex Cucurbita destillata mirabilem obtinet acrimonium; *Nommu-laria*, *Radix Raphani rusticani*, *Armoracis*, *Ari*, *Chelido-nii majoris*, *Semina Sinapi*, Nallurtii, *Erucae*, *Cochlea-rie*, *Aquilegie*. Hæc ferè sunt *primaria Activa Volatilia scorbutica*, inter quæ tamen excellit *Cochlearia*, hinc *Flam-mula Jovis*, & tandem *Trifolium aquaticum*, seu *Pibirium*, de quo vid. in specie SIMON PAULI in *Quæd. Botan. it. Atla med. Nafsu*. vol. 3. p. 123. Conf. etiam M. A. N. C. ann. 4. & 5. *obferv.* 113. p. 133. Ac hæc Trifolium hoc in Tamoribus pedum scorbuticis, & ubi metus est hydroperis scorbutici, multum Trifolium tribuit PAULI, cui res Artificii experto in Regione, ubi scorbutus est Endemius, merito credendum. Quibus ipsis acrioribus Volatilibus, quæ non semper omnibus subiectis, in specie Junioribus aut Acido volatili prædictis, conveniunt: pro mutua temperatura commodè vel Acetosa, & Acetolella, *Beccabunga*, *Chelidonium minus*, vel *Citrum*, vel succus *Citri*, *Aurantiorum*, & *Acetofel-ic* addi possunt, juxta observationem Norvegicam in *Atla Nafsu*. BARTHOLOMIJ volum. 2. Mala coim Citria, it. Mala Aurantia acida, mirè conducunt in præservando, & curando scorbuto, imprimis Navigantium.

Pæpivera quod attinet: sunt in specie committentes, & Cortices abietis seu *Pinari*, imò tota *abies alba* quæ propter egregiam virtutem vocatur *arbor antiscurbutica*, in specie sunt Coni sesu stibilibi teriores in usu, loco quo-rum substitui possunt *Ligna*, & aliis nota Remedia ex Lignis parata, speciatim ex Ligno Juniperi, *Sassafras*, *Goaiaco*, & *Radice Chine*, *Saricæparillæ*, *Cortice Win-teriani*: nam hæc singulares habet virtutes antiscurbuticas, Item *Scordium*, *Albithium*, *Ceterach*, *Chamaedrys*, *Chamaepitys*, *Fumaria*, *Betonica*, *Theo*, *Radix Helle-ni*, *Geotiana*, 5. *Aperiemens*, *Chelidoniimaj.*, *Scorzon-e-ræ*, *Taratraci*, *Angelice*, *Petasitidis*, *Levistic*, *Zedo-rie*, *Galangæ*, &c. Cortices Frasinii, *Tamaricis*, *Auran-tiorum*, & *Citri*, &c. sunt admodum convenientes in scorbutum: Sunt similiter conveientes Fructus Chamæ-mori Norvegici, de quibus præ aliis vid. SENNER-TUS *tratt. de scorbuto*, quorum Eleusiarium ex Norvegia Daniæ magna quantitate fertur. Item Cactæ, de quo vid. WILLISIIUS *de scorbutis*. 166. Porro Flores Genifæ, *Aquilegie*, *Hyperici*, *Sambuci*, & *Croci* huc pertinent; item *Semina Anisi*, *Aquilegie*, *Feniculi*, &c. Bacca Juniperi, sunt admodum egregie: nam multa latent in Juniperi pro his visibus. Ac denique ex Regno Animalis Lumbrici, *Serpens Asietum* mense Maio collectum, & ad d. i. in Vino haustum; si enim nitrolo sulphureo Rilem mirè corrigat. Ulos horum Antiscurbuticorum est nunc crudorum, nunc præparatorum. Cruda imprimis usurpantur in Infuso: Nam plurima Decoctionem non ferunt citra virium injuriam, propter Sal volatile, nisi levissimam ebullitionem, & quidem in Vase probè clauso, oñe dupli-ci; Vel Antiscurbutica cum talibus inter cospensum sunt miscenda, qui illorum particulis volatilibus ligandis ac retinendis apta, v. gr. *Folia Cochlearie* aut *Nallurtii* cum *Acetofella*, quorum Decodum cum Lacto capillio SENNERTUS se JOEL. adeo commendat: Quod tamen ab Antiscurbutica polterioris generis, seu minus prop-riè dicta, baud extendendum, utpote quorum Deco-da potentis satis virtutis observantur. Singularem colim habent restauram, videntur abundare sale volatili, simul tamen acido in recessu salis penetranti, quod demon-strant Rustici acidi, *Menthrum Jovianis* est vel Vinum, vel Lac, sicut serum Lactis: Quibus cum hoc fœdus utendum; nempe quibus Vinum fuerit acris, aut qui Vinum ob acorem ferre nequeant, & in quibus sal acris & magis effertum dominatur, & Phlogogen excitat, item

tempore *Æstiva*, item in calidis, & Biliofis Corporibus, commodè vel serum Lactis vel ipsum etiam Lac præfer-ent in subiectis macilentis magis, & ad Atrophiam plus minus declinantis, & in ipso infuso, & aliquandâ continuari possunt. Hinc enim rancidos acore corrigitur, & nova fermentatio sanguinei reconciliari potest; ex gr. si ab usu sacci Nallurtii aquatici cum Sero Lactis Macule prærumpan, dicitur bonum signum esse, quia iterum fer-mentationis habetur signum. Econtra propinquantur in Vino in subiectis contrariis, tempore Hyemali, in constitutionibus frigidis, & magis fuculceis. Modum propinandi, & administrandi hujusmodi Remedia cruda pro Cura Scorbuti, o timè docet HORSTIUS *l. 4. obferv.* 40. item *l. 7. ubi de scor-butis*, item TIMÆUS *in Guidensken in Xpist. 1. 1. 3. p. 435.* Res ut patet, c. gr.

24. *Herb. recet. Cochlear. Mijl.*

Fumar.

Nallurt. ana M. l.

Rad. Armorac. 3i. vel 3iij.

Enal. rec. 3i.

Pafsal. min. (pro temperatura) dr. vi.

Incisa, & contusa includantur Nodulo, quibus Infusatur vel Vinum, vel serum Lactis depuratum, vel Lac ipsum.

D. 3.

Singulare Vinum, five Lac antiscurbuticum.

De hoc Infuso *Ægri* omni mane jeini, & ante pran-dium vel à meridie, bibant bonum haustum cum levi ex-pressionè; ita tamen ut primo minorem dosin accipiant, successivè tandem augendo, & sic continuando aliquan-din.

Vel

24. *Herb. recet. Cochlear. Mijl.*

Rad. rec. armorac.

Enalia.

Bacc. Junip. ana 3i.

Pafsal. min. 3i.

Incis. & contus. infund. Vino.

D. 8. ut sopori.

Quod si metuatur aciditas, Hypochondriaci, & scorbu-ticis nociva, semper singulo hausti addantur, vel post an-nuamque hæc haustum, *Lapilli Camer. preparati*, & ad 3i. aut quantum Culetris cuspis capiti, hi enim amac Vini aci-dum absorbent, & in salum diureticum absterunt egre-giè ita transmutantur; quia ratione etiam Arcanam dupli-catam *Myrsinici* est optimum Antiscurbuticum, quia & Diureticum.

24. *Herb. Cochlear. rec.*

Nallurt. aquat. rec. ana M. l.

Rad. Enal. 3i.

Acrid. nallurt. 3i.

Rad. Lign. 3i. nallurt.

Lim. Martis ana 3i.

Cort. aurant.

Citri.

Galang. ana 3i.

Incisa & contusa includantur Nodulo:

D. 3.

Nodulus entors scorbutum Vino imponeodus.

Item

24. *Summit. Pini.*

Flos. genif. ana Mijl.

Copo. in l. q. aqua.

Colature Bili. infund. per dies:

Fol. Cochlear. rec. M. l.

Maos colectur.

D. 3. ut ante.

Vel

24. *Summ. albifish.*

Herb. rec. Cochlear. ana M. l.

Nallurt. aquat.

Chelidon.

Flos. Trac. purp. ana M. l.

Rad. armorac. rec. 3iij.

Lign. 3i. nallurt. 3i. vel 3i.

Cort. Winterian. 3i. vel 3i.

F. Nodulus pro Vini Meolli. vel 3iij.

D. 3. ut supra.

Vel

24. *Rad. armorac. rec. 3i.*

Summit. Fenic. word.

Herb. rec. Cochlear. M. l. ad M. l.

Fumar. Mijl.

Alfisch.

Albisth.
Charefol. ana M. ſ.
Pom. citri incif. no. i. vel ii.
Paſul. min. confuſ. ſiſ.
 Incif. & contuſ. Includ. Nodulo. D. S.
 Nodulus ad Vinum Antifcorbuticum.
 Nodulis his, ſi delideretur purgantes, addi poſſunt
Fel. ſenn. ſus ſpſi. ſi.
Rad. bellis. nigr. crud. ſyl.
Rhabarb. el. ſiſi.
ſal. tartari ſiſi.
 additis Aromaticis. S.

Nodulus ad Vinum Laxativum Antifcorbuticum.
 Vel

Herb. perſur.
Nafurt. aquat. ana Miſſ.
Acetoſell. Miſſ.
Salv. Miſſ.
Raf. Ligni ſaſſafr. ſi.

Coq. in l. q. *Seri Laſſ.* Vaſe clauſo:
 Colatura D. S.
 Potio Antifcorbutica.

Vel

Decoſt. Tamarind. cum ſero Laſſ. par. &
adde. ſerv. ſiſi.
 Cui infunde
Herb. naſurt. aquat.
Recebuſag. ana M. i. vel M. iſſ.
 ſcent in vaſe claſo in loco tepido per noctem:
 Colaturæ adde

Syr. Ryzant.
ſcolotyrb. Fer. ana ſiſi.
 M. D. S. ut ante.
 Vel

Fel. rec. cochl.
Nafurt. ana M. ſ.
Rad. rec. armar. onc. ſiſ.
Paſul. min. unc. ii.
Limas. maris unc. ſiſ.
 Cancif. includ. nodulus D. S.
 Nodulus ad Vinum antifcorbuticum.

Capitur quotidie ter hauſus, mane poſt aſſumptum
 luſculum, à meridie, & à cena. Vel ſimplicia dicta A-
 cidia antifcorbutica conſtituuntur & conſtantur, aſſan-
 duntur ſerum Lactis vel Vinum, exprimitur fuccus, qui
 blando calore depurandus, colandus, & pro uſu quotidia-
 no in Vitris parvis ſolphoratis (die non dorant) aſſer-
 vandus, & quando necesse eſt, aliquando Unciæ aliquæ
 in ſero Laſſis vel Vino propinentur.

ſuc. cochlear. rec. expreſſ. unc. i.
Vini Rhenan. onc. ii.
Spiritus cochlear. ſiſi.
Ranal. manus Chriſti perlat. ſiſi.
 M. S.

Potio ſtomachalis antifcorbutica, alterno die
 capienda.

Commode autem Naſurtium aquaticum, vel Cochlearia
 cum *acetoſella* conſule ana vel dimidio ſociatur, & cum
 Lacte caprino, ſi Febriſ addit, vel cum ſero Lactis, ſi
 febris, phlogiſtis & Aſtutia vaga addit, propinatur, &
 aliquando continuatur; vid. SENNERTUS l. p. *Præ-
 ſcrip. de ſcorbuto* p. 616. item BARTHOLOINI *altæ med.*
Naſu. Vni ad imitationem HORSTII:

ſuc. cochlear.
Naſurt.
Fumar. vel ſipſis. ana unc. iſſ.
Cichorii.
Acetoſell. ana onc. ſiſ. ad unc. ii.
Seri Laſſ. depur. in ſpecie caprif. ſiſi.

Seponantur nonnihil, ut depurcentur per reſidentiam,
 hic coletur & fervetur pro uſu.

D. S.

Serum Antifcorbuticum.

Datis pro uſu vice ſint unc. iv. vel v.

Capiantur mane ſunt cum, nunc abſque ſudore: poſteſt
 etiam repeti hauſtus à meridie: poſteſt etiam cuilibet
 hauſtu inſillari *ſſ. Martis cum ſucco Fumarum.*

ſſ. ſeri laſſ. ſiſi.

ſuc. Citri rec. unc. ii. ad onc. ſiſ.

Ebulliant cum *albu.* ovi, clarif. & pauco *ſeck.* edule.
 D. S. ut in præ.

Vel, quod melius, loco *Succi Citri* recipiantur *Succi Pom.*
ſorſſſſ. unc. iv. ad vi. impetris ubi obſtruſta Alvus adeſt.
 Tom. II.

Vel

ſſ. Herb. ſammal. ſeris.

Fumar.

Nafurt. ana M. ſ.

Infund. per noct. in vitro claſo: mane exprimitur
 & coletur. D. S.

Serum præparatum contra ſcorbutum.

Doſ. unc. iſſ. ad onc. iv. ſemel vel bis in die.

Continuatur potus talis præmiſſis præmittendis ſubin-
 de per aliquot ſeptimanas, nunc, præſertim maturiore
 tempore, cum blando ſudore, nunc, præſertim à meri-
 die, abſque ſudore.

ſſ. Fel. rec. cochlear. M. i.

Incif. & contuſ. aſſund. per diem & noctem in
Aqua ſorb. Dornier. unc. ii.

Vini Rhenan. unc. i.

Mane exprim. adde

ſſ. Martis liquis. dr. i.

Spiritus cochlear. dr. ſi.

Maſtick. ſi.

Edule, cum l. q. *Ros. man. Chriſti perlat.*

M. D. S.

Singularis potio purgans, de qua capitur cochlear ſin-
 gulum mane.

Plura videbitis in *Colleg. pharm.* in *Schroederum* p. 2. &
 HORSTIUS p. 384. 392. & 442. Tales *Succi* puri etiam
 poſſunt aſſandi Limatura Martis recenti, ſicut aliquan-
 diu; ſic dicti ſucci redditi Martiales ſimili modo usur-
 pari poſſunt. Vel loco talium ex Marte parietur *Extradum*,
 quando ſuccus Martialis impuſatur, & rurs extrahatur
Tinctura Martis ſcorbutica: vid. HORSTIUS, SENNER-
 TUS, & EUGALENUS.

Huc pertinet *Decoſtum Herba Thee* pro Cura ſcorbuti,
 à Modernis, principè Belgis, admodum commendatum &
 cui tamen quidam præſerunt *Decoſtum Granum Coffe* in
 Anglia admodum uſitatum: item ſyrupus ſcolotyrbicus
Ferſſi, ſyrupus Eſſentiæ. Cochleariæ, & Fumariz, Sy-
 rupus ſcolotyrbicus *Myſiſſſiſi*. Verùm ſyrupi ob rationes
 ſuprà dictas nihil valent, oſiſ forſan ad imitationem ZW-
 ELFFERI parati ſint, quem modum in *Animadu.* in *phar.*
Auſtan. ad *Syrupum ſcolotyrbicum Ferſſi* exponit. Ut ra-
 ceam, quævis Dulcis ſcorbuticus eſſe inſiſſa, ut ſuperſidia
 de ſaccharatis & Mellitis monium ſiſt. Dicti Succi ta-
 men delicatis, vel qui proni ad Efferveſcentias, miſcia
 convenient. In ſorma Pulveris D. MICHAELIS multum
 laudat contra ſcorbutum ſequentem:

ſſ. Aloe.
Myrrha.
Luccia. præp. ana ſiſi.
Croci ſi.
Sem. cochlear.
Nafurt.
Sinapi ana ſiſi. dr. i. ad ſiſi.
 M. l. pulvis Dolis dr. i.
 Vel

ſſ. Pulv. cochleſt. martial. ſiſi.
Rad. arcerud.
Arcan. dupl. Myſſ. ana dr. i.
Olei diſſillat. cochlear. vel *Ligni ſaſſafr.* gutt.
 vii.

M. f. pulvis: S.

Pulvis ſingularis pro aliquot vicibus, capiantur duo
 Cuſtelli cuſpides pro doſi.

Ex hæcenis dictis ſimplicibus varia ſunt *Præparata*,
Aque diſſillata, tam ſimplices quàm compoſitæ, *Spiritus*,
Eſſentia, &c. *Spiritus* parantur vel per ſimplicem *Cochlea-
 reum*, & ab iſtis ſimplicibus, aut per *Fermentationem*
 ſpirorum ſimplicium (*ex ſpſis, abſq. viſ. vng.*) vel ſimul
 per utrumque modum, & ſemper ſpiritus fermentando pu-
 ratus aſſundatur ſpeciebus recentibus, & ita ab iſdem
 cohobetur: obſervando, quod Antifcorbuticum ſpiritus
 volatiles in reſidificatione attendendi ſint, ut mox pri-
 ma vice ſpiritus à Phlegmate ſcorbutico blando igne pro-
 vocetur, à qua incinens commiſtum phlegma via ſepara-
 bile aliàs exiſtit, & quæ ſæpius reſidificatur, eò magis
 ferè enervatur. Hæc namque ratione elaboratur ſpi-
 ritus odoratus & ſapore plantam referens. Mediante hoc ſpi-
 ritu præparantur etiam *Eſſentia* ex Folis recentibus: vid.
 SIMON PAULI *Quadr.* *ſum.* ſpiritus iſſi aſſundun-
 tur Extradis variis, unde Eſſentia compoſet, verb. gr.
 Eſſ. Martis Antifcorbutica, Tinctura Corallorum An-
 tifcorbutica, &c. Mari cum ſucco Fumorum extrahitur,
 cui inſipſato ad Extradis formam reſoluto ſpiritus co-
 chle-

chleariz. Anticorbaticus affunditur, sic fit egregia Essentia Martis Anticorbatica. Spiritus Cochleariz omnibus potus est, cum quo interdum commodè Spiritus Lumbri-
corum teretissimum permiscetur. Ad Fermentata hæc per-
tinet etiam *Cervisia Meditata* per Fermentationem,
qualis est v. p. *Cervisia Anticorbatica* TIMEI p. 428.
in *Exp.* cuius Ingredientia sunt hæc:

℞. Herk. Cochlear. rei. M. li.

Fumar. Mli.

Cort. Franc. ℥vi.

Racc. Jamp. ℥i.

Crem. Albic. Miß.

Rad. Cichor. ℥i.

Trulla ℥i.

Cort. mtr. Abiet. M. i.

Incid. & conquisita deantur Sacculo lineo, seu ex
Lineo parato, immitte Sacculum in dimidium do-
lolum Cervisie recenter paratæ, & nondum fer-
mentatæ, sed potius fimal fermentatæ permiscitur:
de quo tempore vernali, etiam autumnali, per men-
sem & ultra bibitur; sic enim optime conducit ad Cu-
ram Scorbuti.

Aliam Formulam dedi *suprà* *℞. 17. Cap. 3. Artic. 1.*
ubi de Cochlea. & in Idea Formul. Claf. 4. §. 7. Inula est
quibuldam Spiritus Anticorbaticus R. D. MICHAELIS
compositus ex his Simplicibus commixtis per Colobatio-
nem; nempe

℞. Herk. Cochlear.

Nasturt.

Piprit.

Raphan. rub.

Rad. Aren. ana q. v.

Omnibus his recentibus leviter contus & concis
affundatur Spiritus Raccarum Sambuci vel Juniperi
per fermentationem paratus, ad eminentiam aliquot digi-
torum; digerantur per aliquot dies in Vase clauso, &
hinc destillando in Balneo Mariæ, cobobando eun-
dem Spiritum crebris à novis Speciebus, ut eò magis
acutetur sale Simplicium scorbutorum volatili,
& rectificando Spiritus huiusmodi: si aciores sint
ac penetrantiores, & calorem angant, temperantur
optime cum addito paucio Spiritus Aperitivi *Purari*,
vel Spiritus salis dulcis, egregie quodque in scorbuto,
& à BARNETTE in *sa. Praxi* laudat.

Spiritus tamen talibus, tam Simplicibus quam Com-
positis, convenienter Essentia seu Extractis Anticorbaticis,
item ex Extracto Martis, parari possunt, sicut & Essentia
Strobilorum Pini Anticorbatica, & Elisir Proprietatis
Anticorbaticum, aciendo tamen Spiritum Anticor-
baticum cum Spiritu Aperitivo *Purari*. Nam reverà In-
gredientia Elisir Proprietatis in Scorbuto sunt optima,
balsamica vi resistent Contentorum corruptioni, & multa
Symptomata Partium solidarum præcavent, ac in specie
humidioribus aut ferofioribus Subicis conducunt.
Item ex Antimonio cum Salibus per incinerationem paratis
paratur Tinctura quondam egregia in depuranda
Massa sanguinea. Præstat tamen juxta MOELLEN-
BROCCIIUM parare hanc cum Spiritu quodam
Anticorbatico, cum quo etiam Tinctura Coralliorum An-
ticorbatica commodè parari potest. Tinctura hæc con-
venit, quando Corpus est tinctum Maculis, Pusculis &
similibus Affectibus, ubi opus est Expulsionem; in tali casu
est mixtæ efficacis. Essentia Abiesii, Essentia Cochlea-
riz, similesque Essentia Scorbaticis conveniunt, sed pa-
randi modus est observandus: Nempe istarum Anticor-
baticarum Succus per rectificationem faciem optime depura-
tus ad Extracti consistentiam est inspissandus. Succus hi
inspissati vel Extracta, v. gr. Abiesii, Helendi, Gentia-
næ, summatim Abietis, Rob Sambuci &c. cum Spiritu
Cochleariz, Raphani rusticani, vel cum alio Anticor-
batico, simpliciter aut composito, in Tincturas & Es-
santias simplices ac compositas admodum efficaces, in qui-
bus integra Crassa anticorbatica est recondita, redigi
possunt. Huiusmodi verò Spiritus & Essentia cum fructu
inspessantur dco grt. ad 30. vel à ℥i. ad ℥i. in Vehi-
culo convenienti, vel aliis Medicamentis admiscuntur.

Per Fermentationem dubitant multi, ad ex Scorbuti-
cis debeat parari Spiritus? quia sub Fermentationis
negotio maxima pars Salis volatilis solet evanescere, quod
cellatur Odor, qui tunc erhalat. Cerrum est, pati ali-
quam jacturam, non tamen omnem; qui per Fermenta-
tionem caute parati Spiritus Anticorbatici adhuc sunt
satis penetrantes, Ut ergo omnibus satis fiat, procedu-

dum est ita: Paretur Spiritus per Fermentationem ex An-
ticorbaticis quibuldam; hunc affunde Speciebus recentibus
& aliquoties cobobatur, & tandem rectificetur. Cæ-
terum in his ipsis Anticorbaticis Moderni, imprimis
Belgæ, commendant Flammulam Jovis, uti vocant, vel
Clematidem surgentem cretam, ex eaque parata Remedia:
hæc sporis est acerrimi, nihilominus tamen cu-
singulare & expertum remedium, & sufficiens laudatur
à LINDANO, qui

Recipe Flammulam vel Rannuelum arem, q. l. quam
cum Rube rubre contunde in Mortario ligneo, in fundit ad
tempus, digerit, & postmodum blando igne destillat Spi-
ritum, quem allevat tanquam egregium Remedium ad
Curam Scorbuti.

Potest etiam destillari cum aliis Anticorbaticis, & ita
habetur *Phlogia Spirituum Anticorbaticum* pro Vehicu-
lo aliorum Remedium.

Hic adduntur Oila destillata ex didis Remediis pe-
netratissima, in specie ex Cochlearia, quando jam in-
cipit referari ejus crasis in Semine, tuoc Oleum ex destil-
latione per vesicam prodit penetratissimum, & in lar-
giori copia, quam alias sine Semine; quod cum Saccha-
ro in formam *Electuarii anticorbatici* redactum, est
egregium. Modum talis *Electuarii* dedi in *Colleg. phar.*
in *Schneiderum* p. 1. DRAWIZIUS vocat Magisterium
Cochleariz, ZWELFFERUS verò Essentiam Siccam.
Hicce Volatilibus Nativis non incommode adduntur
Remedia Volatilia magis artificialia, spiritus nempe Uri-
noli & salis volatilis ex Animalibus supra laudata, v. g.
spiritus & sal volatile salis Ammoniaci, Tartari, &c.
cum spiritu anticorbatico composito mixti, vel cum
spiritu Cochleariz saltem sociati, &c. Congruum est,
ut paretur spiritus salis Ammoniaci compositus, ita ut mix-
tura pro ejus præparatione inspissatur spiritus Cochlea-
riz, vel spiritus anticorbaticus quidam compositus. Interim
spiritus & sal volatile Lumbicorum terrestrum per
Putrefactionem huius Volatilibus amancrandum venit,
tam propter vim diureticam, quam quod Affectibus scor-
baticis dolorosis, conveniat; imprimis egregius est in
symptomatis tenens & Motus scorbutorum corri-
gendis. Quidam etiam Elisir Proprietatis cum spiritu sa-
lis Ammoniaci, Essentiam Myrrha cum Tinctura Tarcari,
vel cum spiritu salis Ammoniaci vinoloso cum Calce
viva parato, &c. ad scorbutum commendant. De Spi-
ritu salis Ammoniaci vide BARNETTE in *sa. Praxi*,
qui dicit, quod solus sufficit pro scorbuto; ubi elegans
Observatio Paralytici scorbicæ: ingentis, solo Decodo
Radici Armoraciz in Iero Lactis curacæ: Coquitur ℥i. in
sa. Lact. & Colaturæ propius ℥i. Huc etiam pertinet
Tinctura Nephriticæ Ammelugii, & Essentia contra An-
thraxidem vagam D. Michaelis, quæ extrahitur cum spi-
ritu Lumbicorum, corona Cervi, & Anticorbatico
composito: Sic quidam succum Citri inspissatum cum
spiritu Cochleariz extrahunt pro Essentia anticorba-
tica temperata.

Ex didis etiam subinde mixtura varia præferuntur in
Cura scorbuti, quando Decoda aut Infusa sunt naufo-
sa. *Formale* pro usu extemporeo contra symptomata
urgenta sunt v. gr.

℞. Aqua anticorb. Dornæ. vel Minf. ℥iv.

Solut. mart. cum. succo Pom. ℥i.

Spiritus Cochlear. ℥ii.

Syr. de Fumar. vel Solut. Fer. ℥i.

M. D. S.

Mixtura Anticorbatica cochleariz capienda.

Vel.

℞. Aqua Cochlear.

Fumar. ana unc. iß.

Spiritus Cochlear. ℥i.

Sol. Amm. simpl. vel Solut. Fer. ℥i.

ad ℥i.

Syr. Scabiorb. Fer. ℥i. ad ℥i.

M. D. S.

Mixtura Anticorbatica Sanguinem mundificant.

Vel.

℞. Aqua Flor. samb.

Auricorb. Dornæ. ana ℥i. vel unc. ii.

Spiritus Cochlear. ℥i.

Lumb. terrestr. per patr. ℥i.

Aren. dupli. Myrs. ℥i.

Syr. Scabiorb. fer. vel Fumar. ℥i. ad unc. i.

M. S. ut antè.

Item sub forma Essentiarum:

℞. Extr.

℞. Elix. prop. Antiforb. ℥i.
Spiritus aperiti. Ros. ℥ii.
 M. D. S.
 Elixir Antiforbeticum.

℞. Elix. prop. antiforb. ℥ii.
℞. Pini.
Cisti cum spiritus Cochlear. par. an. ℥i.
 M. D. S.

Mistura Antiforbetica: 30. ad 30. guttas.

Pro dosi his vel ter id die.

℞. Elix. Sumar. comp. ℥℥.
Pini ℥ii.
Spiritus Cochlear. vel antiforb. comp. ℥i.
 M. D. S.

Essentia Antiforbetica: 30. guttas pro dosi.

℞. Elix. prop. fusa Acido. vel Tinctura Tartari
comp. ℥℥.
Spiritus Carminat. de tribus. vel Tinctura
Saphiri. Ammel. distill.

Spir. Cochlear. dr. ii.
 M. D. S. ut autē.

℞. Tinctura Tartari comp. ℥℥.
Spiritus Antiforb. dr. ii.
 M. S. ut suprā.

Dosis 30. gutt. bis in die.

℞. ℞. Myrrh. tartari. ℥℥.
Spiritus Sal. Amm. sulf. vel Cochlear. dr. ii.
 M. S. ut suprā.

℞. Spir. Carmin. de Tribus dr. ii.
℞. Antiforb. ferri.
Cust. min. dr. ii.
 M. S. ut suprā.

℞. Solon. Martis cum sacra Ros. vel Antiforb.
℞. Sumar. ana dr. iii.
 M. D. S. ut suprā.

℞. Tinctura Viridii Martis Zuvolf. vel sol. Martis
cum sacra Ros. dr. ii.
Spiritus Cochlear. dr. i. vel dr. ii.
 M. S. ut suprā.

℞. Spiritus Carminat. de Tribus. vel Tinctura
Saphiri. Ammelogi.
Elix. Amm.
Cochlear. ana dr. ii.
 M. D. S.

Spiritus Antiforbeticus.

Dosis 40. vel 30. gutt. mane & sub introitu lecti.

℞. ℞. Cochlear. vel alius Antiforb. comp. ℥℥.
Sumar. dr. ii.
 M. S.
 Essentia Antiforbetica.

℞. ℞. aperit. comp.
Tinctura Aurimoli ex Scorb. ana dr. ii.
Spir. Cochlear. dr. ii.
 M. D. S.

Essentia Sanguinem mundificans.

Pro dosi dentur 40. vel 30. guttas id die.

Quod attinet *Antiforbeticum Rofus balsamica*, non tantummodo Acidum acie Icorbicum temperata, sed etiam magis syllemati Nervulo induratum, & inde a totis variis dolores emendanda: eminet hic imprimis Lignum Sassafras, Radix Chinae, cujus Decoctum ad imitationem TIMÆI non Galdenhus videt. *℞. i. s. r.* Præ cæteris omnibus Abies alba, Picea & Pinaster, in specie Strobili Pinasteri Menfe Martio collecti; (cuius enim tactu sunt pingues & resinosi, vid. SIMON PAULI in *Quadr. Bot.*) item Surculi seu Germia vel Strobili etiam adhuc resinosi usurpantur, vel crudi vel præparati. Crudi recipiuntur vel recentes vel eniccati, & iidem verb. grat. ad eorum ℞. vel ℞. infunditur Cerevisia vel Covenri Menf. i. s. co. aperta leniter Vase, & ebulliant ad tertie partis consumptionem plus minus in hoc dum omnia fervent, infund. *Paffel. minacort.* q. l. pro dulcoratione ubi restiterit calcetur. De Colatura anni mane imprimis haustus bonus calidè capiat, ac sudor blandus expelletur, repetatur in die semel vel bis, mirabile! quon-

Toom, II.

tum doloribus vagis, Pareli, Contraurum, ac similibus afflictiis Scorbeticis, Partes nervæ, & Membra externa magis affligentibus, præmissis præterea conveniat, & præsertim in decocto, minis in essentia. Aut

℞. Summar. Pinaster. ℞i.
Rad. Chin. in talcol. infus. ℞i.
 Affunde his

Aqua. Cerevis. ana ℞i.

Coqu. blando igne ad medietatem. D. S.

Potio Sanguinem mundificans.

Colatura bibitur quotidie his mane calidè, blandum expectando Sudorem item vesperi sub introitu lecti. Residuum denud coqui potest paulo diutius, & dicto modo continuari. Egregiè proluit in Arthritide vaga, Pareli, Doloribus Partium Icorbeticis: Vid. MOLLENBROCC. *ubi de Puris*. Interdum quoque Baccæ Juniperi recentes, Rafara Ligni Sassafras, aliaque similibus decoctis addi possunt.

Extradum Granorum Juniperi resolutum cum spiritus Cochlearis est egregia Medicina in Cura Scorbati. Locorum etiam Cortex Abietis miumt rases simili modo, diutius tamen coqui & usurpari potest. Huiusmodi decocta spirant odorem terebinthinatum, unde forsitan nec Terebinthina usus est incongruus in scorbato. Summitas Abietis concise, & vel in Aqua, vel in Cerevisia, vel etiam simili vehiculo decoctæ & usurpatæ, in dolorosis afflictiis egregiè conducunt.

℞. Cymar. abiet.

Bacc. Juniper. ros. ana q. v.

Contulus adde

Rad. China infus. minium alterutris dimidium.

Affunde *Aquam* vel *Cerevis.* coqu. ad tertie partis consumptionem.

D. S. ut suprā.

Colatura debito modo usurperetur.

Qui gratiam saporis desiderant, sub finem decoctionis, dum omnia fervent, optimè *Paffel. minacort* conquisatæ pro lubitu addere possunt: Vid. *Collig. formalar.* Neque mihi est dubium, quin alia arbores plures simile quid præstare valeant.

Quod attinet *preparata*: est Aqua Cymarum abietis, spiritus & Elix. Strobili. Pini vel abietis, quæ mirabilia sunt in diâis symptomatibus scorbeticis:

℞. Nemp. Strob. Pini, illicque consuls copiosum *Aquam* affunde, institutus fermentatio, addendo parum de *sa-*
cibus Cerevisia, destilletur, & prodit spiritus admodum suavis & qui pro usu asservetur. Hinc recipiuntur simili-
ter Pini seu abietis Strobili trulli, quos coquantur tandem in *q. q. aqua simpl.* donec eorum sapor & omnis eorum vis in *Aquam* impregnent; Decoctam fortiter expressum infusum ad consuetudinem Rosb, quod vel cum *spiri-*
tu proprio, vel cum *spiritu Cochlearis*, vel cum *spiritu*
compofit. antiforbeticis extraclum, dat *Essentiam Pini* potentissimam in Icorbato, in specie in Paralyticis & etiam Catarrhis Icorbeticis afflictiis: dosis gutt. 30. 40. vel 50. vel solitaria vel cum alius mixta, e. gr.

℞. Essent. Cochlear. vel ferri. comp. ℥℥.

Pini dr. ii.

M. D. S.

Essentia Sanguinem mundificans.

Dosis 40. vel 30. guttas.

Verum in hisce *remediis de Pino* observandum est: primo quod eadem non conveniant omnibus, quia nonnulli appetitum ledunt; secundo quod Junioribus & Caliditibus subiectis præpter nimiam volatilitatem non nimis diu propinandum sint, aliis afflictiis Externis variis, Varos, Pustulas in Facie, Erysipecta & Febres Ardentes inferre solent. Locis horum possunt substitui *Liquorum deorilla & essentia*, una cum *specificis antiforbeticis* permixta, expectando sudorem; Imprimis quoad Pathemata Catarrhalia Icorbeticis affligunt, sunt optima temperata, additis simul specificis Antiforbeticis.

Ex *Lumbriis* pasata remedia quæcumque mirè conveniunt in Cura scorbati. Unde eorum spiritus, & cum eo parata essentia contra Arthritidem Vagam (de qua cras) magnè est laudis in Cura Scorbati. De *Martialibus*, Tinctura Viridii Martis Zuvolf. & similibus, quæ sunt Antiforbetica, item de *Saturinis* nihil dico: Nam ex supra dictis satis clarum est, quod etiam conveniant in Scorbato. Item de Tinctura Martis cum Essentia Pini, vel spiritus Cochlearis. Quæritur pertinet Essentia Martis *Dravouit*, & exinde parata Tinctura elegans Antiforbetica cum succa Putiorum, vel Acetosæ, vel Cochlearis, vel Nallurtii; vid. *trall. de scorb. p. 334*.

Dum disti *Lac* & omnia *Lacticia* esse optima in Cura

Ooo 2

Scori

chlearie Antiscorbaticus affunditur, sic fit egregia Essentia Martis Antiscorbatica. Spiritus Cochlearie omnibus notus est, cum quo interdum commodè Spiritus Lumbicorum terrestrum permiscetur. Ad Fermentata hæc pertinet etiam *Cerevisia Medicata* per Fermentationem, qualis est v. g. *Cerevisia Antiscorbatica* TIMÆI p. 413.

in *Eph.* cujus Ingredientia sunt hæc:

℞. Herb. Cochlear. rec. M. ii.

Fumar. Ml.

Cert. Frax. ℥i.

Bact. Junip. ℥i.

Com. Aliphth. Miß.

Rad. Cichor. ℥i.

Enale ℥i.

Cert. inter. Alut. M. l.

Incidit & conquisita indantur Sacculo linteo, seu ex Lintheo parato, immittit Sacculum in dimidium do-
liolum Cerevisie recenter paratæ, & nondum fermentatæ, sed potius simul fermentare permittantur: de quo tempore vernali, etiam autumnali, per men-
sem & ultra bibitur; sic enim optime conducit ad Cu-
ram Scorbuti.

Aliam Formulam dedi *suprà* *Sect. 17. Cap. 3. Artic. 1.* ubi de *Cachex.* & in *Idea Formel. Class. 4. §. 7.* Involuit quibundam Spiritus Antiscorbaticum R. D. MICHAELIS compositus ex his Simplicibus commissis per Cohobatio-
nem; necne

℞. Herb. Cochlear.

Naphth.

Piprit.

Raphan. rad.

Rad. Arsen. ana q. v.

Omnibus his recentibus leviter conusis & concisis affundatur Spiritus Baccarum Sambuci vel Juniperi per
fermentationem paratus, ad eminentiam aliquot digi-
torum; digerantur per aliquot dies in Vase clauso, & hinc destillando in Balneo Mariæ, cohobando eundem
Spiritem crebrius à novis Speciebus, ut eo magis acutius fide Simplicium scorbaticorum volatili-
& redificando Spiritum huiusmodi: si aciores sint ac penetrantiores, & calorem angant, temperantur
optime cum addito paucio Spiritu Aperitivi Perati, vel Spiritu salis dulci, egregie quoque in scorbuto,
& à BARBETTE in *sua Praxi* laudat.

Spiritus tamen talibus, tam Simplicibus quam Com-
positis, conveniunt *Essentia ex Extrahis Antiscorbaticis*, item ex Extrahis Martis, parari possunt, sicut & Essentia
Strobilorum Pini Antiscorbatica, & Elisir Proprietatis Antiscorbaticum, acuto tamen Spiritum Antiscor-
baticum cum Spiritu Aperitivo Perati. Nam reverà In-
gredientia Elisir Proprietatis in Scorbuto sunt optima, balsamica vi resistenti Contestorum corruptioni, & multa
Symptomata Partium solidarum præcavent, ac in specie humidioribus aut ferocioribus Subiectis conducunt.
Item ex Antimonio cum Salibus per incinerationem paratis paratur Tinctura quædam egregia in depuranda
Massa Sanguinea. Præstat tamen juxta MOELLER-
BROCCIIUM parare hanc cum Spiritu quodam An-
tiscorbatico, cum quo etiam Tinctura Coralliorum An-
tiscorbatica commodè parari potest. Tinctura hæc con-
venit, quando Corpus est tinctum Maculis, Pustulis &
similibus Affectionibus, ubi opus est Expulsione; in tali casu
est miræ efficacis. Essentia Abinthii, Essentia Cochlearie,
similesque Essentiae Scorbaticæ conveniunt, sed pa-
randi modus est observandus: Nempe illorum Antiscor-
baticorum Succus per residuum sacrum optime depuratus
ad Extracti consistentiam est inspissandus. Succus hi
inspissati vel Extracta, v. gr. Abinthii, Helenii, Gentianæ,
summitatum Abietis, Rob Sambuci &c. cum Spiritu
Cochlearie, Raphani rusticiani, vel cum alio Antiscor-
batico, simplici aut composito, in Tincturas & Es-
sentialia simplices ac compositas admodum efficaces, in quibus
integra Crasis antiscorbatica est recondita, redigi
possunt. Huiusmodi verò Spiritus & Essentia cum fructu
usurpantur dosi gutt. 30. 30. vel à ℥i. ad ℥i. in Vehi-
culo convenienti, vel aliis Medicamentis admiscuntur.

De Fermentatione dubitant multi, an ex Scorbaticis
debeat parari Spiritus? quia hoc Fermentationis
negotio maxima pars Salis volatilis solet evanescere, quod
emittitur Odor, qui tunc exhalat. Certeum est, potius ali-
quam partem, non tamen omnem, qui per Fermenta-
tionem caute parati Spiritus Antiscorbatici adhuc sunt
sibi penetrantes. Ut ergo omnibus satis fiat, proceden-

dam est ita: Paretur Spiritus per Fermentationem ex An-
tiscorbaticis quibundam, hunc affunde Speciebus recentibus
& aliquoties cohobetur, & tandem reficetur. Ceterum
in his ipsis Antiscorbaticis Moderni, imprimis Belgæ,
commendant Flammulam Jovis, uti vocant, vel
Clematidem surgentem crescentem, ex eaque parata Remedia:
hæc saporis est acerrimi, nihilominus tamen est
singulare & experientum remedium, & sufficiens laudatur
à LINDANO, qui

Recipit Flammulam vel *Ranunculus acris*, q. l. quem
cum *Vino rubro* contundit in Mortario ligneo, in fundit ad
tempus, digerit, & postmodum blando igne destillat Spi-
ritum, quem asservat tanquam egregium Remedium ad
Curam Scorbuti.

Potest etiam destillari cum aliis Antiscorbaticis, & ita
habetur *Phlegma Spirituosum Antiscorbaticum* pro Vehicu-
lo aliorum Remedium.

Hicce addatur *Olea destillata* ex dictis Remediis pe-
netrantissima, in specie ex Cochlearia, quando jam in-
cepit relevari ejus crasis in Semine, tunc Oleum ex destilla-
tione per velicum prodest penetrantissimum, & in largi-
copla, quam alias sine Semine, quod cum Saccharo
in formam *Eleasacchari antiscorbatici* redactum, est
egregium. Modum talis Eleasacchari dedi in *Calce phar.*
in *Schrodorum P. 2.* DRAWIZIUS vocat Magisterium
Cochlearie, ZWELFERUS verò Essentiam Siccam.
Hicce Volatilibus Nativis non incommode adduntur
Remedia *Volatilia magis artificialia*, Spiritus nempe Uri-
nosus & salu volatilis ex Animalibus supra laudata, v. g.
Spiritus & sal volatile salis Ammoniaci, Tartari, &c.
cum Spiritu antiscorbatico composito misli, vel cum
spiritu Cochlearie saltem sociati, &c. Congruum est,
ut paretur *Spiritus salis Ammoniaci compositus*, ita ut talis
tunc pro ejus præparatione insinuetur *Spiritus Cochlearie*,
vel *Spiritus antiscorbaticus* quidam compositus. Interim
Spiritus & sal volatile Lumbicorum terrestrum per
Putrefactionem huius Volatilibus annuerandum venit,
tam propter vim diureticam, quam quod Afflicti scor-
baticis dolorosis, conveniat; imprimis egregius est in
symptomatibus sensus & Motus scorbaticorum corri-
gendis. Quidam etiam *Elisir Proprietatis* cum Spiritu salis
Ammoniaci, *Essentia Myrrha* cum Tinctura Tartari,
vel cum Spiritu salis Ammoniaci vinoque cum Calce
viva parato, &c. ad scorbuto commendat. De Spiritu
salis Ammoniaci vide BARBETTE in *sua Praxi*,
qui dicit, quod salus salicis pro scorbuto; ubi elegans
Observatio Paralyticis scorbaticis ingentis, solo Decocto
Radici Armoracæ in lero Lactis curatæ: Coquit ℥iij. in
fero Lact. & Colaturæ propinat ℥ss. Huc etiam pertinet
Tinctura Nephritica *Ammoniaci*, & Essentia contra Ar-
thritidem vagam D. Michaelis, quæ extrahitur cum Spiritu
Lumbicorum, cornu Cervi, & Antiscorbatico
composito: Sic quidem succum Citri inspissatum cum
spiritu Cochlearie extrahunt per Essentia antiscorba-
tica temperata.

Ex dictis etiam subinde *mixture variæ* præscribuntur in
Curâ scorbati, quando Decocta aut Infusa sunt nauclia-
la. Formula pro uia extemporaneo contra symptomata
urgensia sunt v. gr.

℞. Aqua antiscorb. Doræ. vel Minf. ℥iv.

Solut. mart. cum succo Pom. ℥ss.

Spiritus Cochlear. ℥iij.

Syr. de Fumar. vel fiolet. Fer. ℥i.

M. D. S.

Mixtura Antiscorbatica cohibentem capienda.
Vel.

℞. Aqua Cochlear.

Fumar. ana unc. lb.

Spiritus Cochlear. ℥iij.

Sal. Amm. simpl. vel Salsaf. ℥iij.

ad ℥iij.

Syr. Stoeleph. Fer. ℥vi. ad ℥iij.

M. D. S.

Mixtura Antiscorbatica Sanguinem modificans.
Vel.

℞. Aqua Flor. samb.

Antiscorb. Doræ. ana ℥iij. vel unc. lb.

Spiritus Cochlear. ℥iij.

Lamb. verror. per part. ℥i.

Arenæ. dupli. Myrr. ℥ss.

Syr. Stoeleph. fer. vel fumar. ℥vi. ad unc. i.

M. S. ut ante.

Item sub forma *Essentiarum*:

℞. xlv.

℞. Elia. prop. Antiforb. ʒi.

Spiritus apertiv. Pom. ʒii.

M. D. S.

Elisir Antiforbaticum.

Vel

℞. Elia. prop. Antiforb. ʒii.

℞. Pini.

Citri cum spiritu Cucklear. par. an. ʒi.

M. D. S.

Mistura Antiforbatica: an. ad ʒo. guttas.

Pro dosi bis vel ter in die.

℞. ℞. Fumar. comp. ʒss.

Pini ʒii.

Spiritus Cucklear. vel Antiforb. comp. ʒi.

M. D. S.

Essentia Antiforbatica: ʒo. guttas pro dosi.

Vel

℞. Elia. prop. sua Acido, vel Tinctura Tartari

comp. ʒss.

Spiritus Carminat. de tribus, vel Tinctura

Nephri. Amm. dr.ii.

Spir. Cucklear. dr.ii.

M. D. S. ut antē.

Vel

℞. Tinctura Tartari comp. ʒss.

Spiritus Antiforb. dr.ii.

M. S. ut suprà.

Dosis ʒo. guttas. bis in die.

Vel

℞. ℞. Myrrh. tartari, ʒss.

Spiritus Sal. Amm. fass. fr. vel Cucklear. dr.ii.

M. S. ut suprà.

Vel

℞. Spir. Carminat. de Tribus dr.iii.

℞. abf. f. f. f.

Cent. min. dr.ii.

M. S. ut suprà.

Vel

℞. Salut. Martis cum succo Pom. vel Antiforb.

℞. Fumar. ana dr.iii.

M. D. S. ut suprà.

Vel

℞. Tinctura Viridi Martis Zwoelf. vel sol. Martis

cum succo Pom. dr.iii.

Spiritus Cucklear. dr.ii. vel dr.ʒss.

M. S. ut suprà.

Vel

℞. Spiritus Carminat. de Tribus, vel Tinctura Ab-

sp. Amm. dr.ii.

Sol. Amm.

Cucklear. ana dr.iii.

M. D. S.

Spiritus Antiforbaticus.

Dosis avel ʒo. guttas. mane & meridie, & sub introitu lecti.

℞. ℞. Cucklear. vel alius Antiforb. comp. ʒss.

Fumar. dr.ii.

M. S.

Essentia Antiforbatica.

Vel

℞. ℞. apertiv. comp.

Tinctura Anisimii ex Scorb. an. dr.iii.

Spir. Cucklear. dr.ii.

M. D. S.

Essentia Sanguinem mundificans.

Pro dosi dentur ʒo. vel ʒo. guttas in die.

Quod attinet Antiforbatica Rufina balsamica, non tantummodo Acidum acris scorbaticum temperantia, sed etiam noxam Syphiliticam Nervinam inducunt, & inde natos varios dolores emendanda: eminet hic imprimis Lignum Sassafras, Radix Chinae, cujus Decoctum ad imitationem TIMÆI vni Goldschmidt videtur. f. s. c. c. Prae caeteris similibus Abies alba, Picea & Pinaster, in specie Strobili Pini Menfe Martio collecti; (f. tunc enim tactu sunt pingues & resinosi, vid. SIMON PAULI in Quadr. Bonon.) item Sarculi seu Germia vel Strobili etiam adhuc resinosi usurpantur, vel crudi vel preparati. Crudi recipiuntur vel recentes vel essiccati, & iidem verb. grad. ad eorum ʒss. vel ʒii. infunditur Cerevisia vel Cerevisia Menf. ʒss. coq. aperte leniter Vase, & ebulliant ad tertiam partem rursusumptionem plus minus in fine dum omnia fervent, infund. Sassafras minatur, q. l. pro edulcoratione: ubi restiterit coletur. De Colatura omni mane imprimis haustus bonus calide capiat, ac sudor blandus expelletur, repetatur in die semel vel bis, mirabile! quan-

Tom. II.

tum dularibus vagis, Pareti, Contrastrum, ac similibus afflicto Scorbaticis, Partes nervas, & Membra externa magis affligentibus, praemis praemittendis convaleat, & praesertim in decocto, minus in effluvia. Aut

℞. Summit. Pinastri ʒii.

Rad. China. in saltem. inf. ʒi.

Affunde his

Aqu. Cerevis. ana ʒii.

Coqu. blandu igne ad medietatem. D. S.

Potio Sanguinem mundificans.

Colatura bibitur quotidie his mane calide, blandum expectando Sudorem; item vesperi sub introitu lecti. Residuum de mo coqui potest paulo diutius, & di lo modo continuari. Egregie proluit in Arthritide vaga, Pareti, Dolores Parium scorbaticis: Vid. MOLLENBROCC. ubi de Paris. Interdum quoque Baccæ Juniperi recentes, Rasiura Ligni sassafras, aliisque similibus decoctis addi possunt.

Extracum Graecum Juniperi resolutum cum spiritu Cucklearum est egregia Medicina in Cura Scorbati. Loco horum etiam Cortes Abietis minuit rasis simili modo, diutius tamen coqui & usurpari potest. Huiusmodi decocta firant odorem terebuthinatum, unde forsitan nec Terebuthina usus est incongruus in scorbato. Summitates Abietis concisae, & vel in Aqua, vel in Cerevisia, vel etiam simili vehiculo decoctae & usurpatae, in dularibus affectibus egregie conducunt.

Vel

℞. Cymar. abiet.

Racc. Juniper. ret. ana q. v.

Contusis adde

Rad. China. inf. minutim alterutrum dimidium.

Affunde Aquam vel Cerevisia, coq. ad tertiam partem consumptionem.

D. S. ut suprà.

Colatura debitu modo usurpetur.

Qui gratiam saporis desiderant, addenda praeparant pro lubitu addere possunt: Vid. Colleg. formular.

Neque mihi est dubium, quin aliae arbores plures simile quid praestare valeant.

Quod attinet praeparata: est Aqua Cymarum abietis, spiritus & Ess. Strobili Pini vel abietis, quae mirabilia sunt in diutis symptomatibus scorbaticis:

℞. Nemp. f. s. c. c. Pini, sique confusis copiosam aquam affunde, infunditur fermentum, addenda praeparat de facibus Cerevisia, destilleat, & prodit spiritus admodum suavis qui pro usu asservetur. Hinc recipiuntur similiter Pini seu abietis Strobili tenelli, sique coquantur tandem in f. q. aqua simpl. donec eorum sapor & omnis eorum vis Aquam impregnent; Decoctum fortiter expressum infusetur ad coctionem Rob. quod vel cum spiritu propria, vel cum spiritu Cucklearia, vel cum spiritu comp. Antiforbaticis extracum, dat Essentia Pini potentissimam in scorbato, in specie in Paralyticis & etiam Catarrhosis scorbaticis affectibus: dosi gutt. ʒo. an. vel ʒo. vel solitaria vel cum alius mella; & c.

℞. Essent. Cucklear. vel scorb. comp. ʒss.

Pini dr.ii.

M. D. S.

Essentia Sanguinem mundificans.

Dosis ʒo. vel ʒo. guttas.

Verum in hisce remediis de Pino observandum est: primo quod eadem non conveniant omnibus, quia nonnulli appetitum laedunt; secundo quod Junioribus & Calidioribus lubellus propter oleosam volatilitatem non nimis diu praeparanda sint, aliis affectus Esternos varios, Varos, Pustulas in Facie, Erysipelata & Febris Ardens inferre solent. Loco horum possunt substitui Ligumum decolla & essentia, una cum speciebus Antiforbaticis permixta, expectando sudorem; Imprimis quando Pathemata Catarrhalia scorbaticis affligunt, sunt optima temperata, additis simul speciebus Antiforbaticis.

Ex Lumbis parata remedia quaecumque mirè convalescent in Cura scorbati. Unde eorum spiritus, & cum eo parata essentia contra Arthritidem Vagant (de qua cras) magis etiam in Cura Scorbati. De Martiabus, Tinctura Viridi Martis Zwoelf. & similibus, quae sunt Antiforbatica, item de Sassafras nihil dico: Nam ex suprà dictis satis clarum est, quod etiam conveniant in Scorbato. Item de Tinctura Martis cum Essentia Pini, vel spiritu Cucklearia. Quocirca pertinet Essentia Martis Dravotini, & exinde parata Tinctura elegans Antiforbatica cum succo Pomorum, vel Acetosa, vel Cucklearia, vel Nallurtia; vid. praef. de scorb. p. 134.

Dum dixi Lac & omnia Lactinia esse optima in scor-

Qua 2

scor

scorbuti, unde cum dictis vel post hunc, in specie post Universalis et primas vias Purgantis & Martialis, usurpentur Lacticia, in specie vero Lac caprillum eiusque serum pro Remedio Antiscorbutico Vehiculo modo supra insinuat; qua ratione etiam FORESTUS l. 20. obsert. 2. usi Lactis dulcis, cum Cochlearia & Beccabunga decocti, multos, qui non debilitant, scorbuto curavit. Serum usurpatur in scorbuto Feblicatibus, vel qui Borborygmis in Hypochondriis sunt obnoxii, ut & Phlogosis vagis, ut supra iam dictum. In reliquis vero melius est, si usurpetur Diata Lactea; etque vel stricta ista contra Arthritidem usitata; vel laxa; in qua nempe cum Lactis vehiculo Remedia Antiscorbutica propinantur, ut quando v. g. quotidie semel omni mane, interdum & bis, vespere, stomacho vacuo, ante cenam larga dosis Lactis calide haustur, (Cern. via Nessel well.) cum tantillo Sacchari, vel singulis haustibus spiritus salis ammoniaci & Cochlearii ana mischorum gutt. 20. 30. 40. ad 50. usque inbillantur; continuatur aliquandiu, succedere ascendendo, & tunc etiam descendendo, modo Ventriculus aequè ferre queat: multum in recessa habet Lactis usus ad Curam scorbuto: Malicentioribus vero & ubi lapsor scorbuto acris existit, convenit Diata Lactea. Novi Mulierem Paralyti scorbotoica cum Arthritide Vaga dimidio fere anno laborantem, huic curam, v. g.

℞. Lactis caprilli. Men. ℞. (i. id est, ana Nessel) & ipsi adde *Rerb. Roman. rec. incif.* ℞. ad M. i.

Hæc ipsa bulliant invicem aliquandiu tecto Vase, trajiciantur postmodum per Linteum, & vel pro simpliciter vel duobus doibus Lac ista paratum ita haustur, addendo parum Sacchari; quod fere obesse videtur, ne tam promptè coaguletur, simulque singulo haustu infunditur gutt. xli. xv. vel xx. spiritus Cochlearii, & ita quotidie mane usurpetur, quilibet quarta die blandum Infusum Laxativum interponendo.

Lac ista paratum scorbutois est admodum proficuum, in specie ubi laborat genus Nervorum & adfunt Dolores Arthritici, & imprimis, quando malum insidat: quin & succi simplicium Antiscorbuticorum expressi & depurati Vehiculo lacteo optime usurpantur. Vel

℞. Rad. China minoris. incif. ℞iij.
Bulliant in
Soci Lactis caprilli. ℞iij.
Colaturæ fer ventis infundat
qther. rec. Cochlear.
Sumar.
diaphan.
Trifol. aquos. ana M. l.
Rad. rec. Armerie. ℞iv.
Enol. ℞iij.
Sem. Erui crassif. ℞yl.

Reent in digestionem Vase clauso per noctem: mane detur Colatura. ℞.

Lac Antiscorbuticum.

Eligitur ex omni Lacte imprimis Caprillum & ejus serum, quod est optimum & convenientissimum, speciatim si Capra appropriatis Antiscorbuticis fuerit nutrita. Est hoc Vehiculum Lactis imprimis tempore Verno & Aulivo convenit; tempore vero Autumno frequentius cum Vinu propinantur alia Remedia, sive sub forma Infusi, sive Decocti, sive alia sub ratione. Sub Diata Lactea cavendum est ab omni Vitis & Arido, potu haustique Lactis insinuat aliquoties Ambulatio, ut propulset Urina. Novi juvenculos ex scorbuto epulæ ferocis acrimonia fluctantes, ab usu Lactis Bubali aliquandiu mane haustu fecundus redditos esse. Novi que Floræ albo, ex radice Scorbuto non laborant, Liqueamine affluente acris erodente partes varias, præmissis Martialibus ea usi Lactis commodius habuisse.

Hæc fere cardinalia ordinario in saut obsequenda in scorbuto Cera. (A)

SCORBUTI SYMPTOMATA.

Loenti sumus heri de Praxi scorbuto & Mali Hypochon-

driaci; sed præ cæteris in scorbuto urgent symptomata, eaque multiplicia, que adhuc paucis consideranda restant, & quibus mitigandis etiam prospiciet Medicus, respiciendo scorbuto uno oculo, altero verò ad symptomata afflicta. Et illa congeries symptomatum, que adeo longè le per scorbuto dilundit, etiam Hypochondriacis insitit. Hæc symptomata, ut sit varia, in genere tamen hoc habent commune, ut le eorum modis semper habeatur respectus ad Adidum spiritum ut optum primario potest, & secundario huiusmodi Remediis semper simul addenda Appropriata symptomati & Parti affecte: conveniuntia: v. g. quando adfuit Diata scorbutoica, tunc primario usurpentur ista, que vim Acti scorbutois infringunt, & addantur simul, que Diartheam sistere valeant; hinc que stomachum roborant, & Intestinarum tonum restaurant. Hoc certum est, nisi semper ad scorbuto respiciatur, & appropriata Antiscorbutica Morbo addantur, quod vel symptomata non cessent, vel eadem deteriora fiant, vel diversimodè in alia symptomata mutantur: Quia ratione Colicæ male curatæ superveniunt Paralytes, hinc Convulsiones.

Symptomata talia inter, ut urdine progrediant primo loco maxime conspicua sunt.

§. I.

DENTIIUM & GINGIVARUM PATHEMATA.

Nempe stipitia mala veniunt scorbutois circa Gingivas & Dentes

1. Gingivorum Laxitas & Mollities, hinc Dentium in suis Alveolis laxis vacillans, quon interdum Digiti validi possunt extrahi.
 2. Earum inflammationis, Cruentatio & Exaltatio, cum qua sæpè & Dentium Caries complicatur.
 3. Gingivarum Gangraena & Putredinis fœpess.
- Omalum horum Pathematum Origo est salvia, tale acris scorbutoico impregnata & inquinata. Gingivarum texturam fibrosam laxam, delructam, & Dentes rodens, unde Gingivarum Mollities; hinc ex tale acris Exaridit, tandemque Putredinis cario.

Pro his Gingivarum Affectionibus curandis conveniunt:

- (1.) Cellasium Ore.
- (2.) Timiara Gingivis affricandæ.
- (3.) Pulveres; Vel
- (4.) Liximæta cum Antiscorbuticis jencia.

I. Quod Cellasium Orii in his, siquid aliud, eminet salvia, que est specificum appropriatum, Rosmarinus, Flores Ligultri, Aquilegie, Hyssopus, Quercus cum specificis Antiscorbuticis, ut Cochlearia, Nasturtio, Vermiculi, Nicotiana & similibus decocta, & Collutiones instat in Ore usurpata. His simul Adstringentia, Radix Bistortæ, Aristolochie, Tormentillæ, Ireos Florentine, Balsamiorum, Rosæ, & similia addi possunt: Item Malva arborescens rubra. Nam Pulsio Florum Malos arborescentes habet est secretum HORSTII in his Gingivarum Affectionibus, & quidem cum Alamine permixtum. Sicuti etiam Lacca, Myrrha, Alumen, Item Phlegma Aluminis, spiritus salis, &c. utramque faciat paginam in Gingivarum scorbutois Affectionibus; item succus Cochlearii vel aliorum Antiscorbuticorum; item succus Salviæ & Cochlearii, que duo reliquis palmam præripiunt, pro Collutione & Absterfione Gingivarum imprimis sunt commendata. Deconquatur Salvia & Cochlearia, Item Nasturtium, vel in Aqua, aut, quod melius est, in Lacte aut ejus fero, aut in Vino; si Vinum est acris, interdum etiam ipsius loco Conventum sumatur, & Decocto dilis seu Gargarismis paragarifetur Oris, & præstentur & abluantur Gingivæ, Item Decoctum Florum Ligultri, & summatum Pini in Aqua, addito pauco Alamine in Dentium morbis præ cæteris est in usu: Imò si exulceratur Gingivæ, hoc Decoctum Pini eadem consolidat: Item Decoctum in multata in Pini & Nasturtii in Vitis abluendi Gingivis mirabiliter prodest dicitur, Gargarismatis forma subinde usurpatur: Item Decoctum vel Florum Ligultri in Aqua, addito pauco Aluminis, tuncque eptertum Gargarisma commendatur à MINDERERO in

(A) Dom. Lemery F. præter peculiarem Cochleariæ distillationem (cujus Spiritum non solum ad scorbuto, sed & ad Linis Morbus, ad Melancholiam, Scrophas & Verru commendas), Melancholum tradidit distillandi Nasturtium aquarum cum suis partibus Antiscorbuticis. Mikes exaltit in Cucurbita Nasturtium recens ex aqua sua ad ℞iij. cum Bii. Succ. ejusdem plantæ rectis expressi: addit Cinerum Alvernensium tantundem, & Salis Ammoniaci in aqua rectis reddidit ℞℞. per osimipsum Cucurbita capite, & quolibet hora obdormis, sicut ut digeratur per biduum, postmodum Balneo Maris distillat. Elicit ℞℞℞℞℞℞. Liquoris spiritum salis, volatilis penetrantis & nature alcaline, adeoquæ Scorbutois egredi, non solum variam subtilitatem volatilis Nasturtii, sed ob Sal Ammoniacum. Cineres Alvernensium parantur ex munda Plombæ, que nascitur in ejus Provinciis montibus, quæmaximè Sali expressis; turgere ergo Sale alcali, ad separationem acidi volatilis Salis Ammoniaci ab ejus parte fixa, aptissimo.

Medicina Militaris p. 374. Item Gargarismus de Tormentilla
Myrs. & Decodium ad Gingivas roborandas POTER II
Pharm. p. 12., vel Inquent Densitatem Antiscurbaticum:

℞. Herb. Salu. q. s. Mijs. vel iii.
Nasturt. vel Cichlear. M. i. vel horum ana. M. ss.
Flor. Malv. horrenf. M. i. ad ii.
Rad. Polypod. ℞. vel ℞i.
F. Decodium in ℞i. ad ii. aqua font.

Colaturæ addo
Mellis rosæ. ℞. ss.
Alum. nři. ℞i.
Miris depur. ℞i.
Terra Siliat.
Lact. Ferrent. ana. ℞i.

M. pro Dentilavio seu Gargarismo Oris.

D. S.
Gargarisma Antiscurbaticum.
Item

℞. Herb. Salu.
Cochlear. ana. M. iij.
Coqu. in l. q. Seri Lallist
Colat. ℞i. addo
Succ. Cichlear. ℞i.
Syr. Flor. Aquileg. ℞i.
M. f. Gargarisma.
D. S. ut supra.

Retineatur aliquandiu in Ore, ut suam operationem melius exerceat.

℞. Herb. Salu.
Satureja
Rorismarin.
Nasturt. ana. M. i.
Rad. Iress Flor. ℞i.
Polyp. ℞i.

Coqu. in l. q. Seri Lallist in finem addendo Herb. Cichlear.
M. i. Cola & edulcora cum Melle rosaceo, pro Gargarismo in Gingivarum Intumescencia.

D. S. ut supra.

℞. Herb. Aquileg. cum Flor.
Sammir. Rubi Idæ ana. M. ss.
Herb. Cichlear. M. ii.
Rad. Bistort. ℞i.
Cort. Oranac. ℞i.

Coq. in l. q. Ap. Ferrarior.
Colatur. ℞i. vel ii. addo
Syr. de Rasse sic. ℞i.
Alum. crud. ℞i.

M. pro Gargarismo in Gingivarum Cruentatione.

D. S. ut supra.

℞. Herb. Cent. min.
Sard.
Plantag.
Labin. ana. M. i.
Flor. Rosar. M. ss.
Rad. Arith. rot. ℞i.
Myrsich. ℞i.

Coqu. in l. q. Vini asperit:
Colaturæ ℞i. addo
Unguent. Egypt. ℞i.
Alum. crud. ℞i.

M. pro Gargarismo in Gingivarum Putredine.

D. S. ut supra.

Præ cæteris optimum est Sal Mirabilis Glauberi in l. q. Aquæ Rocabunge solutum. Quædamdam placeo pro Gingivis icorbuticis hæc Miltura:

℞. Aqua Plantag.
Præcoll.
Rosar. ana. ℞i.
Tiohar. Rosar.
Spiritus Cichlear. ana. ℞i.
Saliu.
Vinelli ana. ℞i.
M. D. S. ut supra.

Quæ Miltura fricetur Gingivæ

℞. Aqua Salvia.
Plantag.
Rorismar. ana. ℞i.
Spiritus Cichlear. ℞i.
Syr. Flor. Aquileg. ℞i.
Syr. Saliu. doli. q. l. pro subtili score.

M. D. S.
Dentilivium.

Plures Formulas vid. in *Id. Form. Class.* 3. §. 2.

Vel etiam sunt Gargarifmata, extempore ex Aquâ Cochleariæ, Nasturtii, Rocabunge, Sedi minoris, addendo insidem Rob. Du-Meri, Syrcupum Florum Aquilegiæ, Syrcupum Nicotianæ cum Melle tosiæ, aut etiam cum Melle rusticato, aut similibus.

II. Post Collutionem Oris Tinctura Dentibus sunt adfricandæ, quas inter eminet præ cæteris Tinctura Laccæ Myrs. ritè parata, singularissima in Scorbuto Dentium aut Gingivarum afflicto, in Laxitate, Mollitie, Exulceratione, & Gingivarum Gangræna: In his illa tinctura mirabilia facit, & infallibile est medicamentum probè Gingivis cum Linteo applicata, vel sola, vel mixta cum dimidio tincturæ Horum Aquilegiæ: c. gr.

℞. Tinctura Laccæ Myrs. ℞i.
Flor. Aquileg.
Spiritus Cochlear. ana. ℞i.
M. D. S.

Tinctura Dentium.

Potest tamen meliorari: si Laccæ addatur Myrrha, aut si loco Phlegmatis Aluminis Phlegma Vatrioli, in quo aliquid Animonis solutum, pro illa consocienda adhibeatur: vel bujus desectu ex tempore potest præscribi (quando non potest haberi) Miltura, quæ est similis Tincturæ Laccæ. Nempe

℞. Loph. Medicament. Croll. q. l. vel ℞i.
Aqua Sedi minor.
Cochlear. ana. q. f.

Post solutionem leni & blanda digestionē filtretur:

Colaturæ infunde
Gumm. Laccæ ℞i. ad ℞i.
Myrrha ℞i.
Alum. nři ℞i. ad ℞i.
Flor. Aquileg. p. iij.

Stent in digestionē, donec tingantur, tunc filtrentur. Et hæc præscriptio idem valet atque tinctura Laccæ, quæ imbuitur Lintheo & affricetur Gingivis & Dentibus icorbuto correptis. Vidi aliquoties adhibitum.

Facit etiam hoc sequens singulare in Scorbuto Oris: nempe Aqua calida affunditur Calci viæ & coquitur, post massæ subdentium filtretur Lixivium, & abstrahatur ad remanentiam Salis, quod parum est.

℞. Hujus Salis, seu Crem. Calcis viæ ℞i.
Gumm. Laccæ, ℞i. ad ℞i.
Vatrioli de Cypro gr. vi.
Aqua Rorismar.

Salvia, ana. ℞i.
Mista invicem solve calore leni, & hoc ipso ablue Scorbuto Oris & Dentes Scorbuto.

D. S.

Tinctura pro Dentibus Scorbuto.

III. Post tincturas sunt Pulveres pro Dentibus, qui sunt varii: Hos tamen non ingrediantur Lapides vel Tamarac, Gingivas enim lædunt. Præ cæteris elegans est Pulvis pro Dentibus & Gingivis Scorbuto BARTHOLOMI Cens. 6. huj. 54. cujus descriptio hæc est:

℞. Pol. Aquileg.
Cort. Rad. Cappar.
Sem. Cichlear. ana. ℞i.
Rad. Iress.
Alum. nři ana. dr. iij.
Maxilli. Lavii pss.
Coral. alb.

Cornu Cervi nři. ana. dr. iij.

Pulverulentur subtilissimè & irrorentur parum cum Oleo Caryophyllorum destillato. Imbuatur hic Pulvis ulterius Spiritu Cochlear., ut ita melius approprietur, adoretur caute, & affricetur sæpius Dentibus.

Vel excipi potest Unguentum Aquilegiæ, vel saltem Mella.

℞. Pulv. Rad. Bistort. dr. iij.
Rosar. rubr.
Balast. ana. dr. i.

Hæc misceantur & irrorentur aliquot guttis Olei destillati Caryoph.

M. pro Pulvere Dentifricio, & ita usurpetur.

D. S.
Pulvis Dentifricia.
Vel

℞. Saliu. nři.
Cimex, Nicotian. ana. dr. i.

Vel.

Pol. Aquileg.
Salvia.
Mor. Malch. ana ℥i.
M. f. Pulvis pro Gingivarum Intumescencia.
D. S. ut antè.
Vel

℥. Long. Drac.
Alum. nři ana ℥i.
Sum. Myrrh.
Pol. Salu.
Raf. Iros Flor. ana dr. i.
M. f. Pulvis; adde
Olui Safflor. Cochlearia. gutt. vi.
M. f. Pulvis pro Gingivarum Gracatatione.
D. S. ut antè.
Vel

℥. Rad. Bistort.
Tormentill.
Cort. Gramat. ana dr. i.
Hamanit.
Thuris.
Alum. nři.
Sal. Ammoniac ana dr. i.
M. f. Pulvis in Gingivarum Putredine.
D. S. ut antè.

IV. Denique *Limenta* conveniunt imprimis in graviore Gingivarum Exulceratione & Fectore Ichorotico. Conveniunt etiam in Ulceribus Oris & Faucium Scorbuticis; ex. gr. sit inflar omnium sequenti:

℥. Alum. crud. dr. i.
Pol. Salu. dr. i.
Rad. Iros Flor. dr. i.
Myrrh. dr. i.

Omnia probe pulverisati accipe cum ℥. q. Mellis, & f. Linimentum dentibus subinde affricandum.

D. S.
Linimentum pro Dentibus.
Vel

℥. Pol. Rosmar.
Salvia.
Flor. Aquileg.
Mor. Malch. ana dr. i.
Myrrh. dr. i.
Mallich. elsi. ana dr. i.
Alum. crud. dr. i.

Cum Mell. nři. vel Ungu. de Aquileg.
P. Linimentum in Gingivarum Intumescencia.
D. S. ut supra.

Alutinosi Limenta enim convenientissimè adhibeantur cum aliis Remediis in Gingivarum Scorbuticis afflictiis. BORELLUS *Com. 2. Obf. 65.* recipit Alum. parum in Oleo Sulphuris ℥i. Conferv. Rosar. ℥vi. deterio dentium tartaro, quo Scalpelli lignei admovet, & intra 14. dies, si hæc sèpè fiant, Dentes firmari, dealbari, & Carnem Gingivarum producti scribit.

Item
℥. Unguent. de Aquileg. ℥i.
Flor. Rosar. rub.
Rad. Iros Flor. ana dr. i.
Alum. nři. ℥i.
Myrrh. dr. i.

M. in Gingivarum Raccrescencia.
D. S. ut supra.
Vel

℥. Punic. nři ℥i.
Coral. rub. prepar. dr. i.
Quam. Laca dr. i.
Myrrh. cum Aloe sol. ℥i.
Caryophyll.
Melle ana ℥i.

Cum Sr. Cochlear. f. Linimentum.
D. S. ut supra.

Aliud videb. in *Id. Form. Cl. 5. §. 4.* Vel aliis irrita Mel rosatum aliquot guttis Spiritus Salis ad aliqualem acrimoniam imprægnatum, dat Linimentum egregium ad consummatam Gingivarum exulcerationem, exstirpationem & Gracatationem Scorbuticam, & ad sumum Corruptionis gradum. Conveniunt etiam in Ulceribus Oris & Faucium Scorbuticis. Dico cum aliquot guttis Spiritus Salis: Nam quidam etiam miscent cum Spiritu Vitrioli; Spiritus verò Vitrioli reddet Dentes nigros. Ratio hæc est: In omni Spiritu Vitrioli semper est Liquamen metallicum, quod in ignis coctura Spiritus secum rapit per retortam. Probo, quod Spiritus

vitrioli licet clarissimus, si ad temperatorem, & obsecutus & turbidus, quia se ipsum præcipitat Metallum. Quod si jam dentibus affricetur Spiritus Vitrioli, vel alius Corporis puritibus, pars metallica præcipitatur ab effluviis salinis volatilibus, & ita præcipitata pars metallica Nigredinem post se relinquit. Ergo commodus Spiritus Salis usurpatur. Ad hoc Gingivarum affectus appropriata est Conferva sanum Aquilegæ. Nam Conferva hæc irrigata cum Spiritu Cochleariæ, tanquam quoddam Linimentum Gingivis illinitur, bene fricando, commendatur contra hoc malum. Elegans denique Linimentum in Scorbuto Dentium videbitis in SENERTO l. 3. *Prax. ubi de Scorbuto* ubi p. 633. Compositio ejus est hæc:

℥. Polv. Pol. Aquileg.
Mentha crisp.
Salu.
Mor. Malch.
Myrrh. ana dr. i.
Alum. nři ℥i.
Mellis virgine. ℥i. i. vel q. ℥.
M. f. Linimentum.
D. S. ut supra.

Si Ulcera Maligna aut etiam Gangræna occupent Gingivas aut Fauces, sique minus videatur sufficere Tinctura Lacce, tunc in pessimo statu *Aqua Viridis HARTM. Pr. Chym. 1. 53. §. 4. & 5.* vel PLATERI applicari possunt, quæ in exulcerationibus Scorbuticis Oris sunt nobilissimæ. Salis harum est Viride, & cum Aceto, Admittit quoque Colicodiar, Ceruffa, Alumen, & vid. SCHROEDERUS *Pharm. 1. 2.* Præ cæteris PLATERUS in *Praxi* Aquas famulos reddit. Item conveniunt Aquæ Mercuriales (ex Mercurio dulci) caute tamen usurpandæ. Aut etiam, ubi magis urget Malum, accedendum est ad Unguentum Ægyptiacum Melle dilutum, & locis exulceratis cum penicillo admotum; vel Unguentum de Aquilegia cum Succo Salviae & paucis Spiritus Salis mistum illinitur. Denique *Curationes Malignæ sympatheticæ* potest fieri Curatio Scorboti Dentium: Si Planta *Sensitiva* effodiat illius Radice, Planta hæc & Radix laventur, & cum radice fricentur Dentes & Gingivæ ut Sanguinem emittant: Radicem ita Sanguine adpersam iterum in terram infundunt, observant ut probe crescat: quantum enim planex crescit, in tantum decrevit malum Scorbuticum in Gingivis.

§. II.

DENTIUM DOLOR SCORBUTICUS.

Juxta Vacillationem Dentium & Gingivarum, affectus frequent in Scorbuto est *Dolor Dentium Scorbuticus*, ilque contumacissimus Gingivas exulcerans, & etiam subito Dentes erodens. Conveniunt in tali Scorboto Dentium dolore Radix Bistortæ & Filicis, Folia & Flores Salviae, Folia & Flores Rosmarini, Folia Rutæ, Plantaginis & Hyssopini in Aqua vel Vино decocta, vel addatur parum Aceti, addenda simul Colaturæ adhuc calidæ Succum Cochleariæ vel Beccabongæ, & ita per collutionem Oris usurpetur. Sedum minus, seu vezmiculare admodum prodest, quod quidam colligere volunt, ex signatura Dentis & Gingivarum in Folio: imprimis Succus Sedi vermicularis expressus egregium est Remedium in stomace, & in dolore Dentium Scorbutico. Decodum Foliorum Pini cum Spiritu Cochleariæ acutum pro Gargarismatibus etiam egregie confert. Quod si dolor simul malas torquet, tempora & reliquis vicinis partibus afficiat, commode dicitur locis illinitur Spiritus Cochleariæ succulentus se phlegmaticus cum Spiritu Lauræborum terrefactum ana.

§. III.

ORIS ET FAUCIUM ULCERA SCORBUTICA.

Non rarè etiam Oris altera, non minus, quam in *Lux Veneris*, infestant Fauces Palatum perneque vicinas. Contra hæc præter Linimenta jam dicta, ad Unguentum Ægyptiacum, cum Melle vel Lacte vel Vini Spiritu dilutum, & locis exulceratis cum Penicillo admotum, accedendum. Singulare & egregium hic est Gargarisma RULANDI, qui

℥. Aqua camom.
Hydromel ana ℥i.
Hic addit
Alumina. ℥i. ad ℥i.

Ebullire permittit, & hoc decocto mane à meridie post primum vel vespere collatur Oris, & ita sanantur Ulcera Oris.

Vel

Vel
 24. *Aqua Naftræ aquat.*
Plantag. ana ʒi.
Succian. ʒi.
Spiritus kalis ʒi.
Ung. Myrr. ʒi.
Mell. refin. vel rosæ ʒi.
Syr. Flor. Aquilg. ʒi. M. D. S.
 Maturata Os mundificans.

Summitates Pini his adpſcrunt quoque proficiunt, quia hæc virtute balsamica instar Terrebſtantæ ad hæc Ulcera sananda multum conferunt. Nec Aqua Viridis Plasteri negligenda, quæ abique periculo usurpatur.

§. IV.

MACULÆ CUTANÆ SCORBUTICÆ.

Dixi, quod in superficie Artum et Partium externarum Maculæ scorbuticæ subinde erumpunt coloris varii, & quod earum eruptio sit profusus ex eo, quia sint semper bonum signum malæ Causæ foras erumpentis. Opera ergo danda est ut conserventur in superficie corporis, & promoveantur, expellendo eas per cochleariarum & fumarium. Quia autem Lympham acidiorum tamquam causam agnoscunt, ad has Maculas expellendas internè conveniunt omnia, quæ Acidum absorbendo ac edulcorando sanguinem purificant. Præmissa igitur purgatione leni Mercuriali præcitantur Antiscorbuticæ, Sale volatili acriori turgida, ut Massa sanguinea porificetur ac floridior reddatur, quæ inter est Essentia Fumaris simplex, & imprimis composita, Essentia Helenii, Perficatur cum spiritu cochleariarum permixta, Tinctura Florum Aquilgæ capellens hic etiam convenit, non minus quàm Emulsiõ feminis Aquilgæ: Tinctura Corallorum Antiscorbutica reliquis præferretur, egregie enim promovet excretionem, valdeque conducit, quæ etiam in purpura puerarum, de Malignitate Scorbuti plâs minus participante egregie confert. Curavi aliquando Puerperam purpura Scorbutica afflicta. Signa erant, quod purpura rubicunda se habebat, & erumpentibus pustulis copiosissimæ Aquosæ. Hanc, inquam, curavi Tinctura Corallorum Antiscorbutica, quæ expulsi pustulas & purpuram copiosam Adeoque & hoc erit egregia. Alias nota est differentia Macularum Scorbuticarum. In Maculâ rubra, internis remediis addendus venit succus Acetosi, ipsa Acetosa, Acetofilla, & succus citri: In carolinæ & Lividæ cochleariæ, & ea hæc parata Medicamenta, optimè conveniunt; item Tinctura corallorum Antiscorbutica, quæ dictas maculas potenter expellit. Hisce interponantur diaphoretica terrea, Acidum temperantia & absorbentia, cornu Cervi singiæ, Corallia rubra præparata, cinababris Antimonii Antimonium diaphoreticum, simplex & martiale, Benzædicum joviale; Antihedicum Peterii, Myrrha, Flores sulphuris, &c. &c.

24. *Cornu Cervi singiæ ʒi.*
Corall. rub. præp. ʒi.
Antimonii Diaphor.
Flor. Sulphuris.
Cinab. Antimonii, ana ʒi.
Myrrh. el. ʒi.

M. f. pulvis: s.
 Pulvis Expellens per aliquot vicibus.

De hoc quotidie bis vel ter à ʒi. ad ʒi.

Quod si expulsi sint Maculæ, sponte evanescunt, si vero pertinaces resistant, nec evanescere velint, utut oihil mali in recessibus habeant, quibusdam tamen curis nitore studendibus sunt molestæ, & etiam interdum majores ad excoriationem disponant partes, subinde necesse est ut removeantur, quod fit optimè per Linimentum, patatum cum pulvere lini cum Aceto in Linimenti liquidi formam redacto: hoc enim in Balneo vel lecto post sudorem illius Maculæ subito disparant, quod etiam conducit in Maculâ Hepaticâ. Quod si acris fuerit ad modum TIMÆI vna Galenicæ convenit linimentum sequens.

24. *Pulv. sem. Sinapi salsitiff. ʒi. ad ʒi.*
Olvi Amygd. amar. ros. ʒi. ad ʒi.
Succi Citri ros. q. l.

M. f. linimentum, contra maculas scorbuticas (etiam vulgo dictas Maculas hepaticas) egregium, quo post sudorem Maculæ fricantur vel quater de die, evanescunt. Plura Externa sequuntur Artic. 7. ubi de afflictiõ Catævis. Vid. hic HORSTIUS in Osforo. p. 401. TIMÆUS vna Galenicæ in Epyf. p. 229. DEUCKERS Comment. in Præcip.

Rashette, ubi Medicamenta nonnulla Externa extant. His quoque associari potest infallibile hoc: c. g.

24. *Rad. Irid. Flor.*

Helleb. albi ana q. l.

Pulverisati misce cum Melle Virginis vel Oleo Amygdal.

amar. in Unguentum.

R. D. D. MICHAELIS arcanissimum Remedium in usu erat sequens:

24. *Flor. sulphuris p. ii.*

Camph. p. i.

Avena ad pondus omnium.

Sublimabat, & cum Aqua Scrophularis inungebat.

§. V.

PRURITUS CUM PURPURA.

Non rarum est, quod scorbutici in ambitu Corporis patiantur Pruritus rodentem cum eruptione quali Purpura in loco calido, quæ in frigido denso disparat, idem heret inter cutem & carnem, mordetque instar Utricarum. Pro Excretionem intercutaneam promovendo nihil melius est Decodum summatum Pini, expellendo Sudorem, qui multum expellit. Externè Canis linctura Masoum ac Pedum laudatur in M.A.N. C. Ann. 4. & 5. Ol. ʒi. quæ ad Maculas cutaneas confert.

§. VI.

CRURUM DOLORES SCORBUTICI.

Præ ceteris notum est, quod Dolores frequentissimè, iisque variis, affligat sit Scorbutus, qui Dolores nunc sunt sui, nunc vagi. Dolores fixi sæpius in Abdomen, sæpius etiam Crura infillant. Ad Dolores crurum, qui magis incitantur tempore vespertino & nocturno, sudoriferæ appropriata sunt optima, præmissa subinde in principio Venæsectione Brachii & Pedis oppositi, aut etiam Cruris magis, si nempe maturè instituitur, averrendo quasi aut derivando contentum motum; potius tamen in Brachio, quod bene notandum; sicuti etiam omnia ea conveniunt, quæ postmodum circa Arthriticum vagam explicabuntur. Speciatim præ ceteris internè conducunt Spiritus Tartari volatilis seu Carminativus, Spiritus Theriacalis camphoratus, &c. cum spiritu cochleariarum, aut Naftræ, spiritum Baccharum Ebuli aut sambucis aut spiritum Antiscorbuticæ mistus. Essentia Salsarum mista cum spiritu Cochleariarum aut Antiscorbutico quocumque ad dr. affluatur, addendo subinde Essentiam Opii, aut grana aliquot Laudani opiat, ad compescendam Doleis ferociam: c. g.

24. *Essent. Ligni sassafr. vel succini sassafr. ʒi.*

Spiritus Antiscor. ʒi.

24. *Opii terræ ʒi. ad ʒi.*

M. D. S.

Essentia Antiscorbutica.

Convenit item Decodum Ligni Salsarum aut summatum Pini cum radice Chinæ: c. g.

24. *Rad. ligni sassafr. unc. iij.*

Cori. Lign. sancti anici.

Rad. china elat.

Sassafr. ana unc. ʒ.

Stent in infusione cum Aqua simpl. ʒiij.

Mane coqu. Vase clauso, fco alembico munito.

Colaturæ ferventi infunde.

Herb. ferod. M. iij.

Rad. Liquirit. unc. i.

Polypod. ʒvi.

Stent per diem & noctem, mane coletur, Colaturæ addatur Liqueur per alembicum proleclus. D. S.

Potus antiscorbuticus.

Externè conveniunt Fomenta, tam humida quàm siccâ. Humida parentur ex Decodo Althææ, Abrotani, Fumariæ, Beccabungæ, pulegiæ, Hyssopi, Cochleariarum, Salyiæ, Sabini, Naftræ, Floribus Chamomilæ, Sambuci, & Baccis Juniperi: v. g.

24. *Herb. salsicæ.*

Flor. chamomil.

Samb. ana M. ʒ. ad M. l.

Herb. Naftræ. aquat. M. ʒ. ad ʒi.

Coqu. in l. q. Lactis vel feri Lactis, vel Aqua romm. pro

Foro calido cum lineis multiplicatissimis applicando. D. S.

Fomentum Lenitæ.

Aut etiam coqu. in forma Cataplasmati & ita applicetur.

D. S.

Cataplasma Lenitum.

Item

Item Flores Sarsuræ, quibus adduntur aliquot Folia hyssopini, in l. 5. eod. commendatur admodum ad scorbuticum et cratum dolorem.

Aur. Cataplasma ad imitationem D. MICHAELIS:

℞. Rob. Junip. unc. l.

Succ. iussij. Flor. Chamem.

Sambus.

℞. Rosæ. apoc. an. unc. 5.

Coqu. in l. q. Lactis coagul.

F. l. a. Cataplasma.

D. S. ut antè.

Sed quoniam non equè omnia Subjecta ejusmodi Focus humidos ferunt, Focos siccos fieri potest, v. g. facculus qui calefactus imponatur.

℞. Melli M. lil.

Salis commun. M. l.

℞. Rosæ. tritic. M. lil.

Sambus. albiflor.

℞. Flor. Chamem. ana M. l.

Includuntur Sacculo, quo dolor Brachii gravissimus refertur curatus, in M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Obf. pag. 133. Milii quantitas ad ℞. & ℞. augeri potest, uti etiam quantitas salis ad unc. vi.

Horum loco Spiritus possunt commode illiatri calide; quæ ratione Spiritus Baccharum Juniperi euphoras TIMÆI vno Galenicis extero illitus etiam est elegans contra hoc Dolores: vid. opus Epist. p. 368. Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva, vel, qui omnium optimus, Spiritus lumbicorum terrestrium, (sunt appropriati) cum duplo, triplo vel quadruplo Aquæ Articularis ad extrâ mistus, & ita crebrius illitus, est optimus, cavendo, ne acris sine Ingrederentia. Galbanetum Paracelsi cum Spiritu Tartari mistum & circumulat, hinc leniter asfridum, extero Dolores earum suas sedat. Facit hoc Pediluvium Myns, contra dolores eorum, Imprimis singulare quod obinet Lixivium Coriariorum, cum dimidio Urinæ humanæ mistum, in forma Humoræ vaporosi: (Balsamum vaporosum: cura operantur, ne vapor abeat) Est singularis efficacæ. vid. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Obferv. 22. p. Tandem Vinacea & Infusa Vinacea calidiora, ut probe calefactis Membrum dolorum, singulare quid obtinent in corrigendis Dolorebus Artuum: quando scilicet fermentatio spontanea probe incaluit: (si non sponte incaluit, aspergatur calx viva) pars ossis immergitur probe fudat, qua absterge. Ager in lectum casidum se conferat, donec sponte cesset Sudor, & de opus est, alterius fudet, & de mistic h. dolores cessant: mirabile levamen est. Utens horum loco Balsamum ex formice, eorumque Culule, itidem hic est egregium. Denique aliis irritis Theriacum Aquæ, aut Balnea ex Luto Theriacum, aut Theriac Artificialis ex Sulphure & Calce viva parant, per lotionem dolentium membrorum sunt covalentissimæ: Sed probè notandum, præmissa præmittendis, Vociferatio In aut prope locum magis dolentem applicata subinde multum conferre in hujusmodi doloribus & consumaciis torturis.

§. VII.

COLICA SCORBUTICA ET NEPHRITIS NOTHA.

Inter alia symptomata scorbutica eminet quoque Venæ dolor, colica & Abdo Pæsi, qui sunt Affectiones acerbissimi interdu adeo atroces, ut duos exinde ruptam peritonæi passos EUGALENIUS pag. 86. perhibet. Variè affligit Aegros, ut plurimum congeruntur, circa Vertebra Dorsæ per Pati Dolores Lancinantes & Lacerantes, unde totum Abdomen cruciatur, & spasmodici convulsionibus ad totum usque, ubi imprimis melenenterio annectitur, se manifestant: subinde Umbilicus ad interiora versus retrahitur, & Aegri jacenti incurvati, interdum totum abdomen tumet, & licet Venæ expirant Flatum, tamen levamen non sentiunt.

Facit hoc Nephritis Notha, in qua omnia serè Nephritidis adfunt symptomata, etiam Urinæ Ardor atque pressio, cum Dolore Lumborum circa Renes in regione hypochondriaca ac Perinæ exquisitissimè, nullo licet præfente Calculo. Frequenter enim discipiuntur Aegri, atque ad Medici, ut putant, se laborare Nephritide, sed malè; Et ut Urinæ suppressum, non tamen statim adfuit Calculus. Complicati quidem interdum sunt Dolores Nephritici & Abdominis, interdum scorsim affligunt. Conqueruntur de angustis Cordis: ito subinde eadem Symptomata, que Mulieres hystericas & utat cessant Dolores Nephritici &

Abdominis tempore tamen extra paroxysma concurunt de Dolorebus lancinantibus & lacerantibus circa Regionem Lumborum, donec variè Causæ exteroæ evigilantes Paroictem inferant.

Dolor hic simpliciter oritur ex Spasmo seu Motibus convulsivis Intestinelorum, Melenenterii, & Partium nervosarum annectarum, ab acro scorbutico sale vellicatum; in quibus imprimis Regio Lumbaris mirè lacerari & affligi solet, quarum fundamentum hæret in Plexu Melenenterico nervo & ibi confitis Glandulis, que Plexibus nervis Melenenterii vicinæ sunt, ubi varios Dolores inferunt, & simili carla abdomen occupant.

De hac Nephritis Notha nemo melius, quàm DRAWIZIUS scripsit: notabilis est locus.

Quoad Causam horum Dolorem, in paroxysma dum duratione observantur sunt.

1. Intestina leviter aspergenda blandis injectis & assumptis.
2. Convulsio impetu & Spasmi in intestinis & Membranis Abdominis, tam generalibus quàm specialibus Antispasmodicis, imprimis volatilibus oleis, & opiatis & temperatis compendiendi sunt, interius & exterius.

Extra paroxysmum servati cura primario attendenda: & in specie post Marialis Remedia, & ex Fine sunt optima idque cessare paroxysmo, aut extra tem.

Quoad primam partem: quovis Morbi statu à purgantibus fortioribus planè abstinendum & cavendum, quia maxime nocent, Symptomata spasmodica exasperant, & Dolores exacerbant, ac non raro hinc Faciem per os rejectio contingit.

Cum verò Alvos subinde pertinaciter se clausi, usurpentur scilicet blandè Abstergeria Intestina, inter que emittent passiva & omnia passiva, Serum Lactis, imprimis caprini, aut Lac caprinum cum saccharo & Spiritu Salis Ammoniaci mistum, ad demulcendum Acrimoniam Salis scorbutici, illas convulsiones spasmodicas in abdomine exsistentis Oleum Amygdalarum dulcium recet, aut Olivæ, in quo Rosæ pallidæ fuerit intulæ, ad unc. vi. vel iii. vel solum, vel in Jusculo gallinæco, Jure Pisum, Decocto Rati-cum Althææ aut pericritæ haustum, aut Sperma Ceti cum in ita assumunt, egregie temperant Acrimoniam Salium, blandè alvum leniunt, & intestina relaxant. Quoad passiva in alvo nimis obstruata, vid. TIMÆUS à Gendebus in Epist. pag. 136.

Vel

℞. Tamarind. unc. l.

Coqu. in l. q. Seri Lactis ad mens. l.

Si verò dolores hic adhuc in principio fuerint, leviter tantum affligant, & alvos nondum confipat, statim purgantibus materia viscosa edoci debet, illam primo attemptando per absorbentia & temperantia ut. Oleum Amygdalarum, Sperma Ceti, Lappas Cancrurum, Soluto Martis cum Succo Pomorum, &c. singulis verò est Emchrisis, quam RIVERIUS Prax. l. 2. c. 1. commendat, scilicet ut Purgantibus Opus committatur, quibus modicantibus primo fœnus inducitur, hincque Alvo soluta paroxysmus sedatur.

Quoad alterantia: variant hæc pro diversitate Acrimonie peccantis, que modò absorbentia minime acia, modò sulphurea, oleosa aromatica, ac assuantes magis fuerint. Si cum humores rodentes, ac assuantes magis fuerint, conveniunt Alterantia Absorbentia Terres & marina, v. g. Lappas Cancrurum, Mastix Peruviana, Maxille Lucii Piscis Corallia rubra, margaritæ, martialia, Unicorni sine igne, Elbur sine igne, &c. item serum lactis tepidum aut in quo Radix chinæ cum aëre Borraginis, & part. ii. forum Tunicæ decoctum, cujus aium pro obtundendo sale acido singulare frequenter observavi. Vid. DRAWIZIUS l. 2. pag. 224. Aut loco hujus Emulsionis seminum 4. frigidorum majorem cum semine paveris albi & Ebore sine igne: Aut his substituentum saccharum lactu-ni, & ex hoc parata Tinctura Antiphosphica, que omnes rodentes & assuantes humores singulariter temperant observatis tamen illis circumstantiis, quas DRAWIZIUS l. 2. pag. 126. indigitat. Sin tartarus areniformis simul in Urinæ comparcat, frustraneæ est Lemnientum finis, nisi per Diuretica moderatissima & absorbentia ille prius tollatur scilicet per Terebinthinam Syri, de Althææ Fille, Emulsionem seminum 4. majorem & Paverum albi, Violarum, ac Lappas Cancrurum &c. Præterea ad convulsivos impetus sedandos conveniunt falia volatilia oleosa cum Opiatis mixta, quarum formulas videbis supra sect. 22. de colica. In specie Remedia ex Callore, coctiore, & corticibus Auratiorem, aliisque Carminantibus sunt optima, nempe

pe Syrupas, Aqua, &c. Corticum aurantium. Præ cæteris vero Elix. Cort. Aurant. nulla cum Elix. Galloræi & Spiritu cochlearis est elegans. Spiritus ialis Ammoniaci mis-
tus cum Spiritu cochlearis, item cum Spiritu Anisi, & bene circularis acutus, etiam convenit. Spiritus Nitri cum Spiritu Cochlearis unicus & dulcificatus dat spiritum Nitri dulcem cochleariatum conera Dolores Ventris scorbuticos: Imo si datus duret Paros ydus, Martialis sunt usurpanda. Denique spiritus carminativus de Trilobis cum spiritu cochlearis mislus, etiam cum Vehiculo antiscorbutico appropriato assuescit, est nobilissimus in abdominis Doloribus. Loco spiritus carminativi potest etiam sumi spiritus Tartari volatilis mislus cum spiritu cochlearis vel cum spiritu Lumbicorum terrestrium, qui in sero Lactis assumi sunt optimi; Spiritus enim Lumbicorum terrestrium, & cum hoc parata Essentia contra arthritidem vagam, sunt egregia in Doloribus Ventris, abdominis, aliisque scorbuticis. Item Elixir Proprietatis antiscorbuticum non incommodè usurpatur. Quibus subinde præmissis præmittendis, Laudanum Opium, Laudanum Hyssericum, aut Essentia Opii, consilio addi possunt: v. g.

℞. Aqu. Carminat. Dorur.
Antiscorbut. ana ℥i.

Spir. Cochlear.

Carmin. de Trilobis ana ℥i.

℞. Op. ℥i.

Syr. Cort. Aurant. ℥vi. ad ℥i.

M. D. S.

Mixtura antiscorbutica contra Dolores abdominis. Præ cæteris essentia clysterum cum cataplasmatibus, Fomentis, ac Linimentis antipainificis magno emolumento sunt; unde clysteres Lactei, tam simplices quam terebinthinati, sunt perquam probati. Fomenta ex Lacte cum anodynis & scorbuticis, cum anodynis v. g. Floribus Chamomillæ, Sambuci, summitatibus asfethidis, Anethi, Althææ, Mercuriali, Parietaria, Radicibus Helenii, Baccis Lauri, Folis Hyocyami, &c. sunt egregia. Hæc enim & similia misla pro Clysteribus Lacteis coquantur, & vel Ventræ applicantur, vel Decodum sub forma Clysteris addito Oleo Violarum, Rosatum, cum Vitellâ Ovorum incipitur. Vel sunt Clysmata ex Lacte, vel solo vel medicato, cum Appropositis quibusdam addito Saccharo, imprimis Lac, in quo dissoluta Terebinthina cum Vitello Ovi est egregiam in Abdominis Doloribus, idque impicimus, si diu retineatur. Vel sunt Clysmata ex Lactis, quibus additur castorei dr. ℥. vel ℥i. ad dr. i. cum Symplicibus Papav. albi ℥i. ad ℥. ii. vel cum Regum Nucis ad ℥i. ℥. et enim sit Clysmata appropriata, & admodum dolores leniens: Aut incipiantur clysmata carminativa anodyna & Terebinthinata supra scilicet. 11. ubi de calida, item infra scilicet. 30. cap. 2. Membre. 2. ubi de Nephritis, Doloribus præscripserat: Vel

℞. Herb. & Flor. Chamomill. M. ii.

Althæa M. i.

Sal. Tart. vel Cim. elev. ℥i.

Coqu. in l. q. Lactis.

Colaturæ uoc. viâ. addè.

Mell. Styracis, vel resas. unc. i.

M. pro Enemate:

D. S.

Clyster Leniens.

Vel

℞. Herb. Alib.

Aneth.

Mercurial. ana M. i.

Cib. cavellat. ℥i.

Coqu. in l. q. Lactis.

Colaturæ addè.

Ol. Violar.

Lilior. alb. ana unc. ℥.

Mell. Oxi. No. i.

M. & Clysmata.

D. S. ut supra.

Vel

℞. Summit. Asfeth. Mj.

Herb. Cochlear.

Hyocyam.

Flor. Chamomill.

Sambuc. ana Mj.

Rad. Angelic. unc. i.

Bacc. Laur.

Juviper. ana ℥vi.

Coqu. in l. q. feri Lactis:

Colaturæ unc. viii. addè.

Tom. II.

Ol. Lilior. alb.

Cochlear. ana unc. ℥.

Mell. Oxi. No. i.

Elix. de Bacc. Lauri unc. i.

M. pro Enemate.

D. S. ut supra.

Vel

℞. Lact. bubul. vel Decocti Flor. Chamom. cum Lactis

& Sale Tart. noc. viii. ix. ad x.

Terebinth. cum Vitello Ovi ℥ii. vel unc. ℥.

Theriac. Androm. (propter Opium) ℥i. vel ℥ii.

Sacch. ℥ii. vel ℥iii.

Mell. resas. unc. i.

M. & Enema.

Vel Infusivum.

Sin Clysteres nil præstent aut plane retineantur, ab ulceri-
corum usu desistendum, & Fomentationibus aut
Balneis negotium tractandum, Folia Hyocyami his adden-
do: vid. DRAWIZIUS pag. 319. Per retirata quippe at-
que retenta Enemata Intestina magis inflantur, hincque Dol-
or augetur. Quod si verò ipsam Intestina ab us-
u clysterum aliquotum remittant, illis insidendum, & Purgan-
tibus potentioribus lidem accendi sunt. Jungatur alterius
Oleum Lumbicorum terrestrium, Oleum Cochlearis,
Oleum Chamomillæ, &c. que ipsa Olea etiam externe in
Dolore Hypochondriorum circumscripto (sub castis serva-
ribus) optimè conveniunt & conducunt; quibus in Nephri-
tide Notha Oleum Scorpionum, Unguentum de Liquiritia,
Althææ, &c. addendum. Reliquis præsertim, Galbanum
Paracelsi seu Oleum destillatum ex Galbano & Terebinthi-
na externe Regioni Umbilicali largitur calidè illitum est ef-
ficacissimum, imponento desuper Laterem calciatum & vel
Emplastrum de Galbano usitatum seu Matricale, malaxatum
cum Oleo destillato Sacconi, Phillosophorum, Oleo Tartari,
Castorei, Chamomillæ, vel cum Balsamo Peruviano, est
optimum. Nam eadem Externa, que in Passione Hysseri-
ca usurpantur possunt, conveniunt etiam in Doloribus huius
Abdominis; imprimis in huiusmodi Doloribus, ubi cum Ne-
phritide Notha seu Doloribus Dorli Lumbicis, circa Os
Sacrum conjunctis & quasi liliadicis, optimum est Empla-
strum Diapylasuræ Petrii, quod aliis præmissis præmitten-
dis internis nobis est Remedium ad liliadem: vid. infra. l. 2.
scilicet. 3. cap. 3. artic. 3. ubi de Paracelsi: Valde conducit in casu
bus scorbuticis et Observatione propria, Lumbis applica-
tum, sed Glacis instillaretur. Compositio est talis: v. g.

℞. Pic. norval. ℥i.

Flor. sulphuris.

Terebinth. ana ℥i.

Succini.

Myrrha. ana dr. i.

Liquefacta miscetur pro Cerato, in forma quadrata
applicando Loco dolenti, gestetur aliquandiu, & in di-
ctis Affectionibus est egregium; elevat interdum Pustulas,
sed nihil nocet.

DRAWIZIUS ejusmodi Emplastra plane rejicit. Non-
nulli tamen eo modo sudent, ut modo applicentur, modo
iterum removeantur. Ubi deficiunt talia, Fotus humidus &
Cataplasmata adhibeantur, qualia parantur ex Baccis Jun-
peri, Floribus Sambuci, Nasturii, Hyocyami & similibus, qua-
lia vid. supra scilicet. 11. ubi de calida: v. g.

℞. Flor. chamomill.

Sambuc. ana Mj.

Sal. Hyocyam. M. ii.

Rad. Helen. unc. ii.

Bacc. Lauri unc. i.

Incisa & contusa D. S.

Species ad Fotum.

Coquantur in Lacte, & dictis modis usurpentur.
Præ cæteris tamen convenit Fotus toti abdomini infer-
endus ex Folis Hyocyami in Lacte coctis, de quo vid.
DRAWIZIUS Tr. de foveis p. 315. aliis irritis. Infusus
in Decocto Emollientium & carminantium fuit, commen-
datus à TIMÆO non Galenicis in Eph. pag. 336. Lacti in-
coquendi, imprimis Cancris fluxivatis, tam pro usu Fotus,
quam pro usu Ingestionis.

Extra paracelsum radicalia Contra Scorbuti postmodum est
attendenda, ubi præter Martialis & antiscorbutica, imprimis
Remedia ex Fimo conferunt. Decodum strebilorum Pini aut
Baccarum Juniperi, sudore aliquoties repetito, cum Em-
plastro de Pice sola sufficiunt pro curandis his abdominis
Doloribus, ne recidant. Horum defectu Lancia cum
scorbuticis usurpanda sunt, præmissis Martialis extra Pa-
rosydanum: Nam Dolores solent præcavere, aut imminu-
ere.

P p p

tes sistere. De Nephritide Notha vid. DRAWIZIUS de scorbutis, M. A. N. C. ann. 3. Observ. 46. p. 73. ubi spiritus falsi Ammoniaci & Lumbrocorum terrestris, item Essentia Nephritica & Ligno Nephritico, cum spiritus falsi Ammoniaci & Fragorum extrada, commendantur, propinanda in Aqua Petroleini, in qua Crystallus candefacta extincta.

Vetula 82. auctorum laboribus gravi Dolore Abdominis scorbutico revera Convolso, una cum vagis Artuum Lanicinationibus: huc pro leniendo Paroxylimo prescripsi;

℞. Aqua. Lil. convall.

Pist. Tili.

Mentha ana ʒi.

Mag. Corall. cum succ. Citri ʒi.

Spiritu. Soli. Ammoniaci ʒi.

Cochlear. ʒi.

Laud. opiat. form. gr. v.

Syr. Cort. Aur. di. vi.

M. f. Potio aliquot vicibus haurienda: cui sociatum

Clystima blandè emollientis & laxans.

Vespertì verò ordinalem;

℞. Mag. Corall. cum succ. Citri. ʒi.

Coffea. gr. iv.

Laud. opiat. form. gr. ii.

Cum *℞. Caffea. f. Pilulæ*, quæ egregiè contulerunt.

Sedato Paroxylimo pro evacuanda Vetula prescripsi;

℞. Cinna. annam. in aceto solut. depur. ʒi.

Mercur. dulc. gr. vi.

Extr. Trich. alband.

Laud. ferment. ana gr. i.

M. f. Pil. quæ iidem egregiè contulerunt.

§. VIII.

ARTHRITIS VAGA SCORBUTICA.

Iuxta Dolores hos etiam familiare est scorbuti symptoma. Dolores nempe vagi Arthritici, seu *arthritici Vagi*, qui imprimis sunt molles scorbutici. In locis ubi scorbutus est familiaris, sic solet appellari: Ubi verò rarus est, ibi apud Prædoctos subinde (sub nomine *Dolorum artuum & Rheumatismis* seu *Dyscrasie artuum*, qui ordinariè sunt scorbutici), veniunt: Veteres dicunt Rheumatismum *Artem in Oleribus, Cistis*. Revera ergo cum Arthritis vera conveniat, accidentibus saltem variis. Differre scilicet hæc Arthritis Vaga ab Arthritis Vulgari, propriè sic dicta, seu Podagris Nam utrum non raro etiam scorbutici Podagris, seu Arthritidi Vulgari, loci officio, ita utrum Arthritici, seu Podagris Antiscorbutica Remedia non sint incongrua, & cum successu applicentur; nihilominus tamen Arthritis Vaga scorbutica magis propria est: Deinde & in hoc differunt, quod *Arthritis Vera* fit constantis, seu in parte, quam semel occupavit, successuè sua temporè absolvet; *Arthritis Vero Vaga*, quatenus scorbutica, inconstans est; & ex iam scdem non habet, & simul Multifocalia partes atrocius infestare solet, modo in hanc modo in illam partem irrevera, jam in Pedes, jam in Brachia, in specie si forsitan per externa Flegida admoda repellantur, ex improvise evanescit, modo recedit: Interdum talminè inllat Articulum locaque vicina occupat, interdum citò disparat. Curiosum est, quod fricationes Panis calidi Dolores non remittant, sed mox in alio loco se manifestent. In Arthritide Vera successuè oriri solent *Nodi seu Tophi*, Germ. *Knoten und Knollen*, difficulter curabiles; in Vaga verò non, & ut etiam Tumores interdum observentur (nam fuerunt observati inllat Ovi Gallinæ); nihilominus tamen facilius discutiuntur & disparant, cum tumores tales non sint propter Materiam contentam, sed propter Contractiones ipsomodicas, nunc constantes sunt, nunc inconstantes, modo evanescunt, modo denovo compungunt. Dolores hi nunc sunt simpliciter *Lanantes*, nunc *Profundi*, *Opniti*, subinde nocturno tempore per modum Febri-culæ plus minus lætè affligentes, ut ut sint maxime *Piani* & quandoque *Vagi*. Terminatur Arthritis Vaga nunc per *sedes & Urinam*, nunc cum exipit Excretio cutanea inllat *Purpura*, & tota superfices Corporis fit aspera; loca ejus interdum *Extravasata puræ*, item *Pustula* superveniunt, quæ subinde exsiccant. Notabile est, quod si Arthritidem Vagam excipiat talis Purpura, quod ægri tantum *Zvarium* percipiant, ut etiam fricando Cuticulam detrahant; Talis Purpura est cum *Rubore* Corporis totius inllat Eryipelatis. Non rarus est, imprimis in nostro Climate, quod *Arthritis Vaga* fit complicata cum scorbutis, nade Dolores, & symptomata graviora esse solent. Arthritis Vaga hæc, præter Dolores in articula, simul solet affligere, in specie dum recrudescit Paroxylimo, cum gravissimis anxietatibus præcedit-

rum, quod fit in principio Paroxylimo: Adest scilicet clamor, sudores, totius Membri movendi Imbecillitas, Delires lancinantes, magis pungentes.

Fundamentum hujus Pathematis est falsi scorbuticus vitiatus Fibra nervæ motrices, Carnem, & imprimis Periosum, minus tamen affligens Partes tendinosas in articulis, Nunc autem his error insinuat MOELLENBROCCII, falsi hoc scorbuticum afferentis aliquod volatile, exinde quod tubitò & Parte in aliam transmigret: Nam reverè symptomata hæc non oriuntur a sale, & Parte in longè distans volitante, cum conflit, falsi omnia in Corpore esse volitantes, & moveri secundum motum Humorum ordinatum; sed ex consensu Nervorum, qui omne id est attribuentur, quod HELMONTIUS per Murbos Pustulativos explicat, quando v. g. affecto Ventriculo Cerebrum & aliz Partes afficiuntur.

Pro Cura ergo observandum, ut in paroxylimo

1. Impetus spirituum & Numerum, occasione falsi scorbutici excitatus, refrascatur.

2. Rhariditas appropriata, nunc Urinosis, nunc Oleosis amaricantibus, succutendum, vel per Urinam, vel per sudorem, illud evacuando.

3. Paroxylimo declinante Remediis ex *pina saderis* radici Morbi succutendum; &

4. Extra paroxylimum præter Dietam convenientem, Lactissimè præparat in Mali Recidita prævacanda.

I. Quod primum, *passim faciunt, qui in Principio Paroxylimi usqueque volatilis*; frustanea enim sunt; potius ergo in principio & Incremento *Vine fellis*, nunc *Revivifica* respectu partis affectæ, nunc aëriora, subinde cum fructu singulari instituitur, & Egri conditiolati non raram cum tanto excessu, ut facit SYDENHAM in *Observ. pag. 409*, nec in Latere aut Membris affectis, sed in opposito, nec circumstantia hæc neglecta illud eveniat Malum, quod HORSTIUS I. I. *Observ. 16*, in Matrona quadam observavit. præsertim convenit, quando suspicio est sanguinis vel supprelli, vel evacuati, & in specie quando Menses supprelli sunt. Loco Vene scilicet Cucurbitulae scilicet optime sunt; sicut etiam Pustulas in genere in principio hujus Mali egregiè convenit. Hinc præmissis *Clystima*, præsertim, & Anxiates præcordiorum urgent, quæpianda sunt Fixæ & Imperium falsi scorbutici peccantis refrascant, qualia sunt *Alcalia*, *Martia* & *Tellurica*. Eximiet hic *arcumum duplicem*, *Alcalicæ*, cum quo simul usurpetur antiscorbuticus *Diaphoreticum simplex* & *Martiale*, vel *Cinnabaris antiscorbutici* item *Lapilli Cancrorum*, *Maxille Lacis Pulvis*, *Ossa humani sine igne*, *Dens Equis marini*, &c. cum Opatis: interdum Bezardicum Minerale, Solare, &c. item aurum fulminans. Interdum addantur *Salia Fissa alcalia*, quæ mox spontaneo sudore, nunc per Urinam levant Agros, ita ut & symptomata remittant, & Dolores postmodum remittant. V. g. in motu materiam nimis excessivè & plus minus perturbato, cujus indicia sunt Febres interior, pulsus inordinatus, præcordiorum symptomata graviora, &c., præscribat *Diaphoreticum Opiatum*.

℞. Arcan. dupl. Myrr. ʒi. vel gr. xv. ad ʒi.

Antimon. Diaphor. ʒi.

Laud. opiat. gr. i.

M. f. Pulvis.

Dentur 2. doses & S.

Pulvis arthriticus antiscorbuticus.

Vel

℞. Arcan. dupl. ʒi.

Antimon. Diaphor. Martial.

Cinnab. antimon. ana ʒi.

Laud. Myrr. gr. vi.

M. pro duabus dosibus,

D. S. ut antea.

Vel

℞. Antimon. Diaphor. Martial. ʒi.

Cinnab. antimon. ʒi.

Laud. opiat. gr. ii.

M. pro duabus dos.

D. S. ut supr.

Vel

℞. Cinnab. antimon. ʒi.

Auri Diaph. Poter. gr. xii.

Laud. opiat. gr. ii.

M. pro duabus dosibus.

D. S. ut supr.

Vel

℞. Antimon. Diaph. Myrr. vel Martial. vel Arc. merr.

Cinnab. antimon.

Arcan.

Arcan. dupli. ana gr. xv.
M. pro dosi expectando sudorem,
D. S. ut supra,
Vel

24. *Lapid. Caner. præp. ℥i.*
Cinab. nativ. ℥℥.
Laud. Optat. gr. ii.
M. I. Pulvis.
D. S. ut supra,
Vel

24. *Aqu. Fumar.*
Fler. Samb. ana ℥℥.
Spir. Sal. Ammoniaci ℥i.
Arcan. dupli. ℥℥.
Antimonii diaph. ℥i.
Cinab. Antimonii ℥℥.
Syr. Scitayri. ℥vi.
M. D. S.

Potio Antiscorbatica pro aliquot dosibus.

Gubinde & blando *Laxativo* primæ viæ abstergendæ volumus. In motu Naturæ deficientē potiùs *Aromatico diaphoretico* Opacis plùs minus sociata, ut Essentia Liguorum, Theriacalis, Theriaca cum Oliboolla, &c.

II. Postmodum fiat accessus ad *Warilia*, eaque *Generalia*, cum *Storacis* mixta, imprimis tamen fiat accessus ad *Appropriata Volatilia*, quæ inter *Lumbrici* antecessant & *Lumbrici* enim terrestres una cum aliis, sunt Specificum optimum, quod par sibi non habet remedium in hac Arthritide Vagâ. Nam si *Lumbrici* vivus applicetur loco doleat, in quo est Arthritis Vagâ, hic ipse statim exilit, mirè circumgratue, & tandem moritur, idque cum doloque levamine, qua contestione & expiratione Arthritis Vagâ Scorbatica manifestatur; unde hæc impositio novorum *Lumbricorum* tandiu continuanda, donec *Lumbrici* non amplius, aut saltem non tam citò, moriantur, sic dolores egregiè sistantur: videatur *WIERUS* in *Oshero*, item *HORSTIUS*, *FORESTUS*, *TIMÆUS* in *Goldenkle*, *MOELLENEROGG* de *Vario* & alii, qui hoc unanimitè consensu affirmant, episcopi Phænomeni rationem *WILLIUS* de *Sorb.* c. 6. exposuit. Omnia ergo remedia ex *Lumbricis* parata, externè pariter & internè, erunt optima. Internè usurpantur crudi, vel depurati & pulverificati: Sic Decoctum *Lumbricorum* terrestrum cum plantis appropriatis Antiscorbaticis in *Vino* laudatur à *LOTICHO*: Vel, quod melius est, *Lumbrici* terrestres contusi infundantur *Vino* vel *Lacti* aut ejus *Sero*, quod infusum colatum hauritur quotidie bis aut ter pro vario *Ægrorum* statu, & est remedium singulare & egregium contra Arthritidem Vagâ. In *Vino* propinquantur, dum *Æger* Vinum ferre potest, & si abest Febri, vel verò adest Febrius vel Phlogosis, in *Lacte*. Pulvis *Acellarum* est probatus: Pulvis *Scorabacarum* unguolurum similiter commendatur contra Arthritidem Vagâ. Sed quia talia Decocta & Infusa quandoque *Ægri* horrent, priùs præparantur *Lumbrici*. *Lumbrici* enim terrestres putrefacti resolventur in Liqueorem, qui destillatus & rectificatus dat spiritum penetrantissimum egregium, & qui mira facit in Arthritide Vagâ, dosi ad *℥℥.* in *Sero Lactis*, vel ipso *Lacte*. Cum hoc & ana spiritus corno Cervi Sale volatili acuat fit *Essentia contra Arthritidem Vagâ* D. *Michaeli*, si nempe affundantur isti spiritus speciebus Arthriticis appropriatis, & Nerviosis exsiccatiss, digerantur & sistentur; & ita dant *Essentiam* egregiam contra Arthritidem Vagâ, quam nunc solum ad *℥i.* nunc cum *Essentia Pini* optimè exhibuit: sed aliqualiter continuanda, expectando sudorem. Convenietiam *Liquor pistorius Lumbricorum*, in *Vase Mællæ* Patis incito paratus, qui datur ad *℥℥.* Quibus Carminatives de Tribulis aliisque *Tarsaria* volatilia addenda sunt: Vel

24. *Liquor. Terra. fl. Tartari.*
Spir. Sal. Ammoniac. vel Lumbr. terrestr. an. ℥i.
M. D. S.
Essentia Arthritica Antiscorbatica.
Dosis aut. vel 30. gutt.
Aut

24. *Aqu. Serpill.*
Cenar. Alit. vel Pini Serch.
Aqu. Cucklear. ana ℥i.
℞. Cataract. ℥i.
Spir. Lumbr. terrestr. pro part. ℥i.
Sal. volat. Cornu. Cere. ℥i.
Sacchari ℥℥.
Lapill. Caner. præp. ℥℥.
Laud. Optat. gr. lii.

Tom. II.

Syr. Rad. Nelen. ℥i.
M. D. S.

Potio in Arthritide Vagâ.

Capiatur cochlearim, expectando sudorem.

Facit hæc Mixtura *TIMÆI* in *Goldenkle* contra Arthritidem Vagâ Scorbaticam, quæ non est incoagulâ. Compositio verò est hæc:

24. *Rad. Vinetæ.*
Rexia.
Arthel. rotund.
Zedear.
Caryophyllat.
Pennis. ana ℥i.
Lumini. Salvia.
Betonica.
Serpill.
Abrantani.
Ruta.
Chamad.
Champ. ana ℥i.
Fler. Ascher ℥℥.
Spir. Dis. Mællæ dale.
Di. Ambar.
Laur. Galen. an. ℥i.
Sem. Citri ℥vi.
Theriac. Androm. ℥℥.
Fusci. Ari. ℥vi.

Pulverificatis affunde *Vini spiritum* vel *Vinum Malvaticum* tantum, ut emineant 4. digiti, bene clauso Vase, bene in Digestione per aliquod tempus: Postea abstrahæ spiritum ad consistentiam Mellis; Residue spiritus *Vini* modo abstrahi. *℞i.* adde

Spir. Cucklear. ℥i.
Nosfer. aquat. ℥i.
Rubi. Mæi ℥℥.
℞. Lumbr. terrestr. ℥i.

Digerantur per tres dies nocteque, sistentur & ferventur pro usu.

Dosis hujus Mixture seu Elixiris est à *℥℥.* ad *℥i.* Videbitis hanc etiam in *MOELLENEROGGIO*, qui ex *TIMÆO* in *Goldenkle* excerptis.

III. Hisce etiam declinante Paroxysmo usurpatis conveniunt postmodum remedia, quæ malum ex ipso Artubus, quantum possibile, eradicant, & talia sunt ex *Pino* cum Antiscorbaticis mixta, Essentia *Pini* mixta cum Essentia *Lumbricorum* terrestrum, aut cum Essentia contra Arthritidem Vagâ, sit egregium remedium: c. g.

24. *℞. aqua. Arthr. Vag. Myn.*
Pini ana ℥i.
M. D. S.

Essentia contra Arthritidem Vagâ.

Loco horum tamen non inconsultò *Bacca Juniperi*, aut ex iis parata remedia propinentur, imprimis ex recentibus; nam & harum vis balsamica in Arthritide Vagâ est egregia; unde Rob *Baccarum Juniperi* expectando sudorem, aut Decoctum *Baccarum Juniperi* & *Radix Heleni* laudatur à *MOELLENEROGGIO* Tr. de Arthrit. Vagâ. In specie Decoctum *Centaurei minoris* & *Abinthii* in *Sero Lactis* est admodum proficuum: (conf. *M. A. N. C. Ana. 8. Oshero. 84. p. 120.*) præsertim cum Antiscorbaticis mixtam, expectando sudorem, est elegans. *Abinthium* impetis & omnia ex *Abinthio* remedia, à *GALENO* laudantur in Arthritide Vagâ: item succus corticis *Citri* & corticis *Abrantiorum*. Præterea *Cardus benedictus*, *Chamædrys*, *Chamazypis* & *Sabina*, *radix Armoracæ*, *Aristolochie rotundæ*, *Caryophyllatæ*, *Veronica*, & *radix Amarædulcis* cum Antiscorbaticis mixta, convenientia dant remedia. Necessè est subinde, ut etiam præscribantur *Noduli Vini* infundendi ex Antiscorbaticis. *Aqua Analithina* composita (descriptionem videbitis in *SCHROEDERI Pharmaz. ubi de Aquis*) est magnæ commendationis contra Arthritidem Vagâ. Denique Mixtura simplex cum spiritus Cochlearis permixta, spiritus Salis Ammoniaci cum spiritus Antiscorbatico, spiritus Carminatives & similia sunt egregia. Decoctum *Scrobilorum Pini* Curam fieri abolvit; sicut etiam Decoctum *Radiciæ Chinæ* & *Sassafras* indigenter conducit: Vel

24. *Cymar. refect. Pinastr. vel Alit. ℥i.*
Rad. China in sal. incis. ℥℥.
(vel in subjectis ferocioribus & humidioribus *Rad. Sassafras* *℥i.* ad *℥℥.*)
Bacc. Juniperi ℥i.
Incil. & contus.

Ppp 2

Coqu.

Coqu. in l. q. aqu. communis.

Colaturæ Biv. vel vi. S.

Potio in Arthritide Vagæ.

De hoc Decocto capiatur Siv. mane in lecto expectando sudorem, & vesperi sub introitu lecti citra sudorem. Pro sepe iugato corrigendo *Passiflora minoris coagulata* addi possunt.

IV. Febris si non urget, *Lac. asprinum*, in quo Cochlearia & Naphthum bullierit, repetitio usui est optimum: vid. TIMÆI *Van Guldencleij* p. 165. Nempe ut aliis in quibusvis Morbis, ita in specie in Scorbutico, ejusque Arthritide Vagæ bene observandus Materie Morus. Quid si enim facile ludent *Egeri*, & *Corporum* eorum non mudeat; Diaphoreticis volatilibus, vel Oleosis, vel Amaricantibus infundendum: sin minus, Temperantibus potius, Lacti nempe ejusque sero; infundendum: quibus nunc Lumbicalia, nunc Antiscorbutica, socianda veniunt. Quoad *Diatem Lalleum* extra Paroxysmum: hæc equidem admodum proficua est, sed necesse est, ut semper eadum Regimen Rerum Non-naturalium observetur, ac in acutum Morbum *Eger* dilabatur: Conf. M. A. N. C. *Apud. ad. d. n. i. p. 35. & d. n. a. Observez*, 258. pag. 184. seq.

Quod attinet externa contra Arthritidem Vagam: in more quibusdam est, ut applicent partibus Dolore vago correptis *linimenta Oleosa* ex Oleo Lumbicorum terrestrum, Chamomillæ, Ranzarum, Buissonis, Pinguetis anserina, Anatis, item et sero biricino &c. sed male: Scorbutus enim & Affectus doloris scorbutici (quod etiam valet in Paralyti & Contractura scorbutica) non ferunt talia, quæ poros obstruunt, sed potius quæ conservant insensibilem Transpirationem salivam. Omnis ergo his Pinguibus usurpantur *Pene-trantia & Volatilia*. Convenit ergo *Fanus siccas* seu Halitus aut *Succus* ex Decocto Lumbicorum terrestrum & Formicarum calidè toto Membro exceptus, fortiter Membra exteriora versus fricando: v. g. si in Brachio ad Manum versus fortiter fude Membrum, sub quo sudore mirè silietur Dolor, in specie si Lintheis calidis abstergerat sudor. Radix Raphani comminuta & cum Lacte codâ instat *Caraplastum* utiliter apponitur loco dolenti, non focus ac radix Bryonia, quæ & ipsa contrafe recentia non sine successu applicantur. Vel sunt Fotus vel Cataplasma ex floribus Chamomillæ cum radice Symphyti majoris, & cum radice Bryonia, decoquantur ad extrâ (de quibus infra L. 2. s. 281. 3. C. 3. *Arise. p. 281. de Paralyti*) vel Spiritus Buccarum Juniperi, mista cum Calce viva destillata vel solitaria post blandum sudorem, blanda manu tepidè illinantur: Spiritus Lumbicorum terrestrum potestefactorum, item Spiritus Formicarum cum Calce viva destillatarum, affusa Aqua, vel Spiritu Vini, aut patrefactura, item Spiritus Vini lumbicorum, tam simplicia, quam composita, seu ab Herbis Arthriticis abstrahenda, omnia sunt convenientia. Aut Li-quor in Clibano paratus, qui maxime lenis Dolores Arthriticis Vagæ, si *Arder & Auer* in parte dolente, & quasi *Erysipelas*, excitetur in dictis Spiritibus solvatur Camphora, quæ ardoris sensum solet siliere. Vel fiat Mixtura, v. g.

℞. Spiritus Formicar. cum Calc. viv. vel per patref.

Lumbic. terrestr.

Uring phlegmat. (ne quid nimis) ana ℥i.

Bacc. Junip. camphorat. vel Cerat. nigr.

camp. ℥ss.

M. S.

Spiritus Externus contra Dolores Scorbuticos.

Qui tepidè exteriore loco dolenti imingatur.
Non inconveniens est compositio DRA WIZII exteriore usurpanda contra Arthritidem Vagam:

℞. Flor. Lil. convall. M. ii.

Rorimar.

Castor.

Sem. Cochlear. ana ℥i.

Rruca ℥ss.

Hæc omnia Infundit in Spiritu Vini optimè rectificati ℥i.iii. digerendo per triduum; hinc expimit fortiter, & addit

Spiris. Lumbic. terrestr. ℥i.ii.

Camph. ℥ss.

M. exadè pro externa illitione.

Balsamus etiam Antipodagricus *Rassadi* factus ex Sapone Veneto in Spiritu Vini soluto, addita panca Camphora acuatæ cum Spiritu Lumbicorum terrestr. commodè etiam interdum applicari potest; ad cujus imitationem parata est Timidura Balsamica DECKERS in *Comm. ad Prax. Biv.*

betæ p. 150., quæ videtur non inconcinna contra Affectus quoscunque doloros scorbuticos. Tandem Cataplasmata ex floribus Chamomillæ, Verbasci, Folis Hyocyami, Lumbicis terrestribus & Farina Hordei in Lacte coctis exteriore applicata, vagos Dolores siliunt. Hicce addendum Cataplasma sordidum quidem, sed optimum, nempe *Stercus urinorum recens* subadum cum lumbicis terrestribus conculis, & instat Cataplasmatum appositum locis dolentibus, repetitum, commendatur, & mirè Dolorem siliit. Cavet tamen applicentur ejusmodi Cataplasmata; nam utrot calida poros recludant, tamen si frigescant, & quia humida sunt, admodum stringunt poros. Semper ergo calida applicentur.

Vel

℞. Emplast. Diaphor. Myof. ℥i.

Tucamahob. ℥ss.

Blando igne liquata, malax. cum Ol. Tarsi. sat. Inducatur super lintheum, & applicetur articula.

Quæ omnia tamen, quia sine *Evacuantibus Univerfalibus* Insufficiunt, ita, ut ratione *Cathartica* ostetur, per leniora eam esse inchoandam, ac si dolores exin non sidentur, sed potius exacerberentur, ab eadem planè desistendum. Dentur igitur Lavativa blanda, nempe Pulvis Francourtenæ & Clasilianæ singulis mensibus, quæ specificari possunt aut cum Extraclo Hellebori nigri, aut si succi sint vicidiores, cum Gummi Ammoniac: vid. LUDOVICI *de Sale Tarsi*, volatili:

Vel

℞. Tartari vitrolari gr. xii. ad xv.

Stannum. sulphur. gr. ii.

Trach. Almond. gr. i.

M. f. Pulvis.

Pulvis Lavativus.

In contumaciori Alvi obstructione, & quando symptomata Præcordiorum urgent, applicetur Clyma:

℞. Decoll. Carminat. cum Urina can. par. ℥i.

add.

℞ell. de Bacc. Lauri, vel de Hiera cum Agar. ℥i.

Olvi destillat. Chamomill. ℥ss.

Urell. Ovi no. i.

M. f. Emema. S.

Clyster Aperient.

Mulier quædam floridæ ætatis de Lassitudine omnium Artuum nonnihil laniante conquecebat, quam aliquæ ab hinc diebus tumor Cruris dexteri insequeratur circa tum, item circa Genu, dolens & insigniter lacerans, color tamen partibus vicinis, motum crurum inhiens: calor totius præternaturalis simul aderat, moderatus tamen &, ut vocant, vaporosus, una cum ardore corporis continuo, pulque magno, celeri, frequenti, molli quâ ardore: orine erant crasse, turbide, cum sedimento lateritio inque: ita diu anxietas superveniebat, Tormina & Tumulat Abdominis, Respiratoria difficultates: eadem vespera ad æterum Cras simili modo similibus in locis cruciati incipiebat; Nox eras iniqua, mane pessime habebat, in Brachio sinistro vagè loci variis in locis torqueri incipiebat, Manus tumida admodum erat, Digni lantari immobiles sine ulla sensibili alteratione. Ægra anxia erat, animo subinde deficiebat, Caput admodum dolebat, ipsa sudore calido nudebat, nullo modo se movere valebat, quæ quolibet, tantillo licet moto, dolores exasperabantur: Appetitus erat nullus, Alvus clausa, & stis intensa. Ego ad eandem vocatus, cum esset eufarsa, succulenta, galsia, Temperamento sanguineo-ferro, Venæsectionem in Brachio institui, cui alias adducta erat, idque cum levamine: quæ præmissa propter Symptomata Præcordiorum, præscripti Clyma Emollient cum Sale Tartari cum levamine. Sequenti die iterum ordinabam:

℞. Arcan. dupl. Myof.

Antimonii diaphor. ana ℥i.

Laud. fermeat. gr. ii.

M. pro duabus doibus: hinc sudor copiosus erumpit. Antea saltem Crura dolore & tumore affecta erant, jam etiam Brachia dolere & tumere incipere. Continuas Pulverem in Decocto Strobilorum Pini cum Passulis parato. Post vero insignes Passiones Hybericæ superveniebant; hinc Clyma ordinavi:

℞. Spec. Decoll. Carminat. M. iiii.

Salis Tartari ℥i.

Coqu. in aqu. comm.

Colaturæ ℥i. add.

℞ell. de Bacc. Lauri ℥i.

Ol. destillat. Succini cum Urellis Ovi ℥i. ℥i.

Misc. pro Clymate.

Interdum omni iborio accepti gutt. 30. Liq. Corn. Cet. succina.

cinari: quorum usu Passio Hysterica evanuit. Hinc Pulveres modo laudatos usurpare jussit; sed ne Nauseam excitaret, Decoctum Scrobilorum Pini omisi, & saltem in potu ordinario, cui Spiritus Cochleariz infillatus, usurpare jussit. Item mutavi hos Pulveres, v. g.

℞. Antimonii diaphor.

Artem. duplicat. ana ℥i.

Cinnab. Antimonii gr. xv.

Milla capiebatur pro s. dolibus, expectando sudorem.

Pro anxietate praecedentium & Lipothymia usurpavit spiritum Carminativum ad ℥ss. mistum cum ℥ss. spiritus Cochleariz, gutt. xxx. bis, vel ter indie, & statim levamen circa praecordia percipit.

Externis locis tumebantibus imponebat Lumbricos vivos, donec moricantur, cum levamine sensibili. In hoc Maribus usurpavit crebros spiritum Salis Ammoniaci & sic convaleuit. Superiori anno hoc ipsum Malum recurrit, hinc post Venae sectionem, praemia blanda Laxatione, spiritus Salis Ammoniaci ad gutt. 40. usurpabat, quia aberat Febris. Externis jussit usurpare spiritum Salis Ammoniaci cum Calce viva paratum, mistum cum Aqua Articulari; sed nihil conducebat, potius malum augebat: Unde

℞. Tasmachae pulverizat. ℥ss.

Empl. Diaph. Aegypt. ℥i.

F. Emplastrum, quod cum ℥ss.

Ol. de Illino Tartari malaxatum inducitur super fissuram, applicatur articularis circa genu, manus, &c. quod dolorem leniebat.

Extra Parasymplicum Indicationes hae observantur:

1. Acidum in primis vili haerens evacuetur, &

2. Massa sanguinea inquinata corrigatur.

Pro Indicatione prima ex Fonte Pharmacutoico, praemissio prius aliquandiu Lapidulum Cancrosum usu, vel Sale Tartari effluenscit, omni vespere guttatim fumendo, Vomitus insituitur.

℞. Aqu. Menth. ℥ss.

Cinnam. ℥ss.

Syr. Emet. ℥ss. ad ℥ss.

M. D. S.

Potio Vomitoria pro una dosi.

Ad secundum Indicationem itidem ex Fonte Pharmacutoico tam Diaphoretica quam Diuretica proficua sunt: e. g.

℞. Antimonii diaphor. ℥ss.

Sal. volut. Sulfur. ℥ss.

Elasac. Cochlear. gr. vi.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Sudoriferus.

℞. Aqu. Pomar. ℥ss.

Cinnamom.

Atti fumbos. ana ℥ss.

Thuris ℥ss.

Salis alijatri. ℥ss.

Syr. Scabietyri. Fern. ℥ss.

M. D. S.

Potio Sudorifera pro una vice.

Ex Fonte Dietetico, vicus viciandus, pro temperanda sanguinis acrimonia proficua Ladacina cum succis Antiscorbuticis expressis, anni mane jejunio stomacho & vespere bilorio ante pulsum hausticanda.

§. IX.

CEPHALALGIA SCORBUTICA.

Porro praeter dolores Artuum vagos sibi in scorbuticis caput dolere solet. Pro Cephalalgia Scorbutica sudoriferorum vi est maxima, in specie laudatur sal volatile Succini, Spiritus Vitrioli volatilis Cephalicus cum spiritu Liliorum convallium paratus, & cum spiritu Tartari & Cochleariz mixtus: Item Giombaris Antimonii, Succinum Catarrhale, Ambra; quibus interdum in contumaciori malo addenda Opiata. Conveniunt etiam Pilulae Londones, quas HARTMANNUS Praef. p. 41. describit:

℞. Eliz. Propri. Antiscorb.

℥ss. Alijatri.

Lig. Fern. Cern. succin. ana ℥ss.

Post haec Ladis usus proficua est in dolore capitis Scorbutoico, in alio vero otiosus.

Externis Zedoaria & Baccae Juniperi cum Aqua vel Decocto Verbenae, Florum Sambuci ac Betonicae admoveeri poterunt.

PARALYSIS SCORBUTICA.

Scorbuticis etiam subinde evadunt Membra stupida plus minus paralitica, quae Paralysis Scorbutica, ita potius Paralysis non adeo confellum, ut alias in Paraplegia fieri solet, sed potius scotum invadat, & pereunne succellit motu, scotus ut plurimum superficialis est, cui interdum conjunctus est sensus formationis cujusdam, ac si Formica intrinsecus currens, qui tenus laepidis praecedat Paralysis Scorbutoica, subinde etiam eam comitatur; interdum sensus est lancinans, & est quasi dolor compositus ex Lancinante & Ollecepo: in Paralysis hac, aliquando affligente, membra nonnquam rigida & quasi contracta sunt. Haec Paralysis Scorbutoica est grave malum, quod difficulter curatur, imprimis si inveterata sit, in specie formationis scotus, quo praesente vigil sit Medicus, ut possit praecavere Paralysis.

In cura talis Paralysis conveniens est, ut praemissis praemittendis, in specie Vomitorii, nisi metus doloris Abdominis subat, cum incipiamus. Si enim Aeger per se inclinet in dolores Abdominis Scorbutoicos, à Vomitorii caveamus; dolores enim ab his exacerbantur: si vero Abdomen est sanum, tunc possunt propinari Vomitoria, imminente vel praesente Paralysis Scorbutoica. Purgantia quoque frequentiora ac vehementiora, utpote materiam peccantem ad genus Nervosum magis movetia, afflicti in Paralytici haud ferant, sed mitiora saltem concedunt, praeparis ubi paratis & dolores Abdominis adiunt; & quidem à Clysteribus Emollientibus ac Purgantibus lenioribus simulbutque, de quibus superius ubi de Ceteris Scorbutoica erat sermo, inchnandum. Praemissio pariter in his symptomatibus parca admodum, imò nulla sit, nisi plethora exelliva aliud foadat. Praemissio ergo evacuantiis, vel omnis, praemissio etiam reliquis remediis Antiscorbuticis, nempe Antiscorbuticis, in leviori malo Lae vel ejus Serum, appropriatis Antiscorbuticis medicatum, confert: In graviore vero malo parca, vel una cum Ladis Pinus, Juniperi cum Aromacis Nervosis, cum Roemarinio conveniunt. Imprimis Pinus seu Abies alba, & ex hac parata remedia, sunt appropriata ad Paralysis Scorbutoicam, per sudores evanescit & curantia. Hinc Effluvia Pini crebrius usurpanda, quae misceri potest cum ana Effluvia Catarrhalis, & propinari à gutt. 40. vel 50. bis vel ter in die: Item Decocta ex Pino, nempe ex strobilis seu summitatibus, quae sanè semper intelligendae, & hinc Decoctum ligni Juniperi, & omnia Juniperina, Effluvia Juniperi, spiritum Baccharum Juniperi & similia commendare soleo; loco quorum etiam Decocta reliqua Lignorum, imprimis Sassafras & radix Chinæ, cum fructu usurpantur; quo & Antiscorbuticis cum Ladis propinata sunt egregia: qua ratione Paralysis Scorbutoica contracta, per radicis Aromacis Decoctum in Sero Ladis, curavit BAR. BETTE in Praef. Quibus si accedat spiritus Carminativus, item spiritus Tartari volatilis, vel simplex vel compositus, cum spiritu Cochleariz vel spiritu Antiscorbutoico eruat magis appropriata. Nam ad Paralysis Scorbutoicam imprimis valent Tartarus volutis interne usurpanda, imprimis quando scorbutica Recrementa Nervis atque Membris jam tum impata sunt, quae tollantur, si singulis quaterne diebus sudor per dictam Mistram aliunde Diaphoreticum moveatur. Speciat hoc Decoctum Abinthii ab EUGALENO p. 199. laudatum, aut burs Effluvia, Roemarii & Gasterii mixta est convenientissima: Item Eletharium EUGALENI, quod eodem loco describitur.

Heri dicit ex BARBETTE, quod curaverit Paralysis Scorbutoicam consumtam per Radicis Aromacis Decoctum in Sero Ladis & spiritus basium; hinc Nervus, v. g. spiritus Liliorum convallium, spiritus Lilis Ammoniaci simplex, faciozior, serpillatus, lavendulatus, Effluvia Liliorum, Succini, simplex & Sassafrata, Ambra, ac Oleum & sal volatile Succini aliaque juxta EUGALENUM potentiora Antiscorbutoicis mixta propinentur. Justa quoque ulterius Specificum Cephalicum, Aurum fulminans mistum cum Cinnabari Antimonii, aut Aurum Diaphoreticum Poterii, & Offa Microcosmi, in Rob Juniperi vel alio Vehiculo antiscorbutoico pro scopo sudorifero, repetito tamen usu, sunt insigniter proficua.

Inter ea, quae externis conveniunt ad Paralysis Scorbutoicam, ferè sunt ea, quae externè circa Arteridum Vagam fuerunt laudata; praesertim Radices Symphyti majoris & Bryoniae contusae, coctae & impositae, sunt proficuae, praesertim si Tumor durus partis resolutae addit. Item pro externae fricatione Membrorum paralyticorum Spiritus Baccharum

rum Juniperi, Lumbicorum terrestrum, Essentia Collo-
rei, &c. sunt optima. Quando ita fricatae sunt partes, asper-
gitur commodè spiritus Tartari: hac enim asperitas infusit
se sensim & Paralyfin solvit. Juata hæc imprimis Rianæ &
Infusum ex illi parati, imprimis in Paralyfi crurum Scorbuti-
ca sunt nobilissima; nempe Vinaceis collectis & sibi invicem
impositis, donec incipient incallescere, immergatur
Æger usque ad regionem iliacam. Huiusmodi Vinacearum
Balnea sicut aliquoties repetita sudorem largum partibus in-
ferunt, & Paralyfin Scorbuticam solvunt. Si non sufficien-
ter incaluerint, aspergatur Galla viva, Balsamum Galla-
ni terebinthinatum; seu Galbanum Paracelsi, de quo vid.
SENNERTUS, SCHROEDERUS, & HARTMAN-
NUS, etiam in Paralyfi Scorbutica præ reliquis est nobile,
quod illinentem est tepidè à radice Membri ad posteriora
versis: Vel

℞. Ligu. Lumb. terr. ʒi.
Ol. Cichlear. (vid. M.D.) ʒss.
dehilar. salvia,
Rorismar. an. gutt. ix.
M. D. S.

Oleum Externum ad Unctionem.

Quod si Tumor, ut diali, cum rigore Membri addit, convenit
Cataplasma SENNERTII lib. 3. Prax. de Scorbutica pag. 639.

℞. Pulv. Flor. chamom.
Cem. Aliphath. an. ʒiij.
Rad. Bryonia,
Camphid. maj. an. ʒss.
Farin. Fabar. ʒi.
Medulla Panis albi. ex Laitte de B. l.

F. Cataplasma applicandum Tumori.
D. S.

Cataplasma Externum.

Quibus admodum commendatur focus siccus seu balneus ex
pinguedine asneria, si scilicet pinguedine super carbones
bene calefacta aliquoties inde suffumigetur quousque foveatur
Membra; est enim penetrans, & in Paralyfi Scorbutica
spadæ Westphalæ usitatum remedium. Aliis in usum est illi-
nito Membra paralytica Oleo Lumbicorum terre-
strum, & Cochlearie, addendo aliquos guttas Olei de stilla-
ti Salviae, Majoranæ, Serpilli, Rorismarini, Balsami Pe-
gulariani, & Succini, vel Olei Linii destillati. Alii usurpant
pinguedinem Taxi, Vulpis, Gallinae, Ciconiæ, Castoris,
Serpentis; Emplastrum Oxyroceum aut Nervinum rō-
næ item quod DRAWIZIUS de Scorbutica p. 176. describit:
quæ tamen obtinendo poros mihi conveniunt in Scorbuti-
cis; Porum enim quantum possibile aperti feruntur; vid. Pra-
xis de Paralyfi HARTMANNUS alii irritis a d Theriacis
ablegat. Verum potentiores non conveniunt, sed moderatè
saltem, v. g. Embusci & Euphrasie; neque servidæ nimis
adhibeantur ob eandem rationem.

§. XI.

CONVULSIONES SCORBUTICÆ.

Subinde etiam convelluntur & tandem contrahuntur Mem-
bra & universum Corpus, ac rigida evadunt, dum corru-
gantur Fibrae Muscularum & Tendinosa à Sale scorbutico,
quæ Convulsionem comitantur ferè Paralyfin Scorbuticam;
tam mixtae sunt interdum & suspendi, ut Ægri ab Adstan-
tibus ignaris pro Obessis à Demone habeantur; qualia vid.
Exempla in Paraly. Cervicis WILLISII, qui in his Morbis
Convulsivis non est inolegans.

Currantur optimè huiusmodi Contraduræ & Convulsiones
Scorbuticæ per Vomitoria, quæ magnarum virium observan-
tur; quorum loco etiam purgantium usus repetitus conve-
nit; v. g. Electuarium Marpergenium, ab HORSTIO
Cent. Præf. Decad. 1. in Quæst. 7. descriptum. Accedunt his
Anticorbutici anticonvulsivi, seu genus Nervosum & Ce-
rebrum confortantes mista, in Lade imprimis usurpanda:
Sic enim Epilepsia talis Hypochondriaci cum Lade, in quo
Sapo sive dissolutus fuit, curata observatur. Observatio
prostat in M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 85. BARRETTE Prax.
Cura hæc nihil ferè peculiare habet à supradictis remediis
contra Arteridum Vagum & Paralyfin Scorbuticam. Læ-
præ reliquis hic in usu est, cui adduntur remedia ex Caphu-
ris: Item Cinabaris Antimonii, Speciebus Cephalicis,
cum Sale volatili Succini & Camphora, in Vehiculo Decodi
Hellemi cum Racis Juniperi commodè propinquantur: v. g.
contra Epilepsiam Scorbuticam propinavi aliquando cum
succeda hunc Pulverem:

℞. Cinab. Antimonii gr. xv.

Sal. vol. Sacchari ʒss.

Laud. apiat. gr. i.

M. f. Pulvis S.

Pulvis Anticorbuticus.

Cuius Vehiculum erat Aqua Anticorbutica Dernacalli, cum
spiritu Lumbicorum terrestrum & Cochlearie probe in-
pregnata: Vel

℞. Aqu. Anticorbut. Dernac.
Epilept. Langui an. ʒiij.
Spir. Cochlear. ʒi.
Cern. Cerv. ʒss.
Arcan. duplicat. Myof. ʒiij.
Cinab. Antimon. ʒi.
Syrup. Cochlear. essent. ʒi.
M. S.

Potio Anticorbutica pro aliquot vicibus.

Miatarum hæc in Epilepsia Scorbutica aliquando egregio
cum succeda præcipiti. Item convenit mixtura ex spiritu
Tartari probe rectificato & volatilitate, vel Camminio,
cum spiritu Cochlearie & spiritu Theriacali camphorato,
Castoreo assulis & invicem in Essentiam redactis; vel spiritus
salis Ammoniaci cum spiritu Cochlearie; aut spiritus
salis Ammoniaci cum Calce viva & spiritu Cochlearie de-
stillatus assunditur Castoreo pro Essentia, contra Contradur-
as Scorbuticas egregia: Item Essentia Pini cum spiritu
Crani humani mista, addito spiritu Cochlearie etiam con-
venit in contraduræ & convulsionibus Scorbuticis: Essentia
Ligni Salsifras mista cum Essentia Fumariæ aut Pini,
addito spiritu Cochlearie aut Nasturtii aquaric commenda-
tur etiam contra contraduræ & convulsionem. In gene-
re usurpantur, quæ ad convulsionem adhibentur, mista cum
Scorbuticis, & interdum cum Opus. Quibus ad eandem
non operantibus, Diaphoretica substituantur, & inter hæc
Decoda Liguorum ac Radicis Chinee, item Fœniculi. Sed
Vermiculare quid obstat contra rigiditatem & contra-
duram Membrorum Scorbuticam, vid. M. A. N. C. Ann.
6. & Obs. 23. p. 30. interius usurpatur.

Externè usurpantur aquæ articulares ad catr. mistæ cum
Essentia Calorei, cum aqua Hirundinum cum Caloreo,
item aqua Apoplectica cum Caloreo: Item spiritus Vinæ
infusione Cephalicorum, Liliorum convallium, Primulae
Veris, Lavendulae, Salviae & similium, una cum Castoreo
imprægnatus, externè affricatur: Item remedia Lumbica-
lia & alia superius iam allegata. Sunt qui recipiunt Cal-
cem vivam, eique assundunt Oleum Linii, destillantque
Oleum penetrantissimum, quod ad contraduræ Scorbuti-
cæ & Paralyfin Scorbuticam commendat; Oleum enim
Linii per se destillatum fere adeo penetrans, ut forsan nullum
Oleum ei par sit. Aliæ Oleum Cochlearie, Oleum Lum-
bicum terrestrum, Oleum rutaceum cum Oleo Laurino,
Angelicæ & Cumini, etiam externè commodè usurpantur,
ac Unctio fide VALERIOLE, quam l. 5. Obs. 9. descri-
bit. Balnea etiam in contraduræ Scorbuticis, item in do-
loribus Scorbuticis, imprimis Abdominis, inter cetera. Ta-
le Balneum contra contraduræ scorbuticæ est hoc:

℞. Morb. Gentian. cum Rad. ʒss.
Graz. Junc. cum Radic.
Herb. Rata mont. an. ʒiij.
Agrimoni. M. i.

Hæc omnia in Nodulo collecta coquantur pro Balneo.
Hoc Balneum tepidum quotidie per 6. horas repetatur, id-
que tandem, donec æq. horæ balneando fuerint coquantur:
Sic enim contraduræ & Convulsiones Scorbuticæ cessare
dicunt. Observetur tamen, quod renovandæ sint species,
& non debeat mingi in Balneo.

§. XII.

DYSPNŒA & ASTHMA SCORBUTICUM.

Respiratio difficilis & infirma Asthmatici in Scorbutico affli-
gentes sepe extra methodum generalis appropriata urgent,
quæ quidem modo incidentia plus minus aromatica, modo
spasmodica, prout nimirum huius symptomatis causa variat
e. g. Crocum, cuius Extractum RARITHOLINUS Ant. Hæf-
nienf. P. 1. cap. 91. commendat, spiritum Cornu Cervi, Fa-
ligiis, Liqorem Cornu Cervi succinatum, Caloreata,
spiritum & Flores Salis Ammoniaci, Benzoes, Radicem A-
risolobocis rotundæ cum Decocis Anticorbuticis: vid. SI-
MON PAULI Quadr. Botan. pag. 22. c. 6.

℞. Aqu. Flor. Rorip. ʒv.
Anticorbut. Dernac. ʒiij.
Spir. Cochlear. ʒiij.

Alimant.

Affimat.

Rf. Zula.
Crocii an. ʒi.
Syr. Rad. Eual. ʒiſs.
M. S.

Succus ad Respirationem pro aliquot vicibus : Dosis
 a cochlearia.

In Affimate verò merè conuulsivo vitio scorbuti WILLIS de Scorb. p. 330. & 331. Laudano opiato nullum præstantius Remedium suspicatur, cui Laudanum Hyſtericum aliis Appropriatis iunctum, subſtitui poteſt. Accedunt hiſ clyſteres acriter cum diaphoreticis ac Diureticis, e. g. Atellis, Lumbriſis ; vid. ſuprà ſeſt. 1. c. ap. 2. Artic. 1. ubi de Affimate conuulſivo : & ſi à ſanguine circa Præcordia ſtagnante hic Affectus oriatur, Venæ ſectio inſtituatur.

§. XIII.

VOMITUS SCORBUTICI.

Præterea affligit etiam ſcorbuticus Vomitus contraximus, ſignis periculis Nauſea cum continuo vomendi conatu & Cardialgia, ex irritatione ſtomachi ad Acrimonia ſalis ſcorbutici. Quo in caſu, præter Vomitoria blanda, quibus Purgantia per inferiorem, blanda tamen, interdum ſubſtitui poſſunt, conducunt imprimis Acrimoniam ſalis ſcorbutici temperantia & præcipitantia; quæ ſæpe emiſet Lac, Laſilli Cancrorum, Ebor, corallia præparata, cornu Cervi oſſum, & ſimilia. Ulteriùs Tinctura Tartari, Eliſir proprietatis ſine acido, ſpiritus ſalis ammoniaci, Arcanum duplicatum Myſtiſſimi, Flores ſalis ammoniaci & ſimilia, interius cum Aquis antiſcorbuticis aſſumant, imò cum Opiatis interdum miſcenda, laudantur, item ſpiritus Nutri ſalis, aut præſcribitur ſequens Mixtura.

Rf. Agn. menth. ʒi.
Cinnamon. ʒi.
Spirit. cochlear. ʒiſs.
Nutri dulc. ʒi.
Syr. cydonior. ʒiſs.
M. D. S.

Potio ſtomachalis antiſcorbutica.
 Conducit in Vomitu ſcorbutico.

§. XIV.

DIARRHŒA SCORBUTICA.

Quòd ſi addit Diarrhœa, ſcilicet & Dyſenteria ſcorbutica Adſtrigentia non ſtatim adhibenda ; utpote quæ Lipothymias & maximas Præcordiorum angustias eſſent : ſed loco horum potiùs Medicamenta quælibet ex Abſinthio, Roſis & Matricæ imprimis conducunt ; Ut v. g. Eſſentia Abſinthii cum Eſſentia Lignorum & ſpiritu cochleariæ, item ſpiritus cochleariæ miſtus cum ſpiritu Martis, decoctum Lignorum aut Ligni Guaiaci cum Antiſcorbuticis & Abſinthio parata : Cum quo ſimul propinquet ſpiritus maſtick, qui provocando ſudorem Diarrhœam etiam ſopit ; item Liquor martis ſolaris, aut loco huius à WILLISIO commendatur Aciduli.

Quibus præmitti & ſingulis oſculis reiterari debet Evacuatio cum Rhabarbaro, additis Aromaticis ſtomachicis. In Dyſenteria quòmodo ſecis diuturna atque enormi WILLISII Piliſe ex Rhabarbaro & Vulnerariis ſingularis eſſiciæ commodevix ; In quo caſu clyſteres ex Vulnerariis parati magnum quoque levamen præbent.

§. XV.

HÆMORRHAGIÆ SCORBUTICÆ.

Hæmorrhagia ſcorbuticis frequenter & per diverſa Corporis loca contingentes, ſiſt immoſicæ, non adſtrigentium & ſanguinem temperantium & incalſtantium ulum poſſunt : Quod optimè præſtat Martialis, & quidem illa, quæ magis ſalina & Terrea, nimis ſulphurea ſunt v. g. incinctorium Diaphoreticum martiale, Vitriolum Martis, Liquor Martis ſolaris, & Tinctura Amphiſphica D. Miſtelle, &c.

§. XVI.

ATROPHIA SCORBUTICA.

Atrophia ſcorbutica, ſicut modò chylum depravatam, modò Maſſam ſanguineam nimia acrimonia & corruptam, modò ſpiritum animalium deſectum aut crudiorem viciſſim, pro cauſa agnoſcit & ita Remedia huic ſymptomati appropriata variant. Quippe ſi præmatum viarum culpa alimen-

ta non ritè digerantur, Digeliſia, Vomitoria blanda, ſtomachica Aromatica &c. conveniunt. Aut ſi chylum laudabilem, vel propter Vaſa lachry obſtrudta, vel propter Meſenterii & lumbarium glandularum Tumores ſcrophuloſos, non ritè diſtribuitur, ita ut fluxus coeliacus ſuperveniat, reſolventibus præprimis volatilibus, ac acidulis opus eſt. Quando vero Marasmus & ſanguinis craſis contingit, Lac & Lacticia, ſimiliaque, quæ copioſum chylum ſuggerunt, ſunt exhibenda. Imò totum negotium in alimentorum ſucculentiorum & eupetorum uſu conſiſtere videtur, quæ antiſcorbuticis temperanda, v. g. ſi Lac caprillum cum naſſurto aut cochlearia modo ſupra deſcripto decoquatur, aut ſpiritus cochleariæ illi miſtilur; item Carnis vitulinæ, lincum & Offitaurum ſimilia cum ſero lactis & antiſcorbuticis præparantur. In genere eadem & io Atrophia ſcorbutica omni, à quocunque Cauſa præmatum viarum dependeat, Dieta Laſſa vulgò commendatur ; ſed malè, cum ſtomachus malè conſtitutus exinde lædatur, magis debilitetur, & Lac corrumpatur, ſpiritus vero animalium, horum anomalias corrigendis nimis conducit. Dieta ergo laſſa in uſum non vocanda, niſi ſtomachus à fordibus & cruditatibus liberatus, & Digeliſio ejus laudabilis ſit. Io ſine paſſus Ager ſemper cochleare unum Paſſilorum probè conſuturam comedat, ſuperbibendo bonum ſtantum Cerevitiæ.

Rf. Eliſir. propriè. ſine acido ʒiſs.

Spirit. Sal. Ammoniac. ſimp. ʒiſs.

M. D. S.

Eliſir Antiſcorbuticorum.

De hoc omni ſane duntaxat 40. ad 50. guttulas in vehiculo tepido : à meridie vero biſorio ante Cenam propinquet Tinctura Amphiſphica, ex ſaccharo ſaturni & Vitriolo Martis paratæ, 40. guttulis ; continuando ad tempus aliquod. Quòd ſi verò ſpiritum animalium craſis vitata Nutritio in ſcorbuticis lædatur, ſi per Nervia volatilia, tam exteros quàm interna, ſuccurrantur.

§. XVII.

FERRES SCORBUTICÆ.

Quotieſſimæ accidunt, ut Maſſa ſanguinea ſcorbutica amittat viſciditatem ſuam, degeneretque per omnes partes in Liquorem acrem corroſivum, toties adeſt in corpore Febris ſcorbutica ; quo ſenſu omnino accedit maſſæ ſanguineæ Fermentatio nimia, dum ſcilicet partes contrariæ improprietate impetioſæ in ſe invicem agunt. Hæc Febris in noſtris provinciis proſectò eſt frequentiffima, adeo ut biac nonnulli ſibi perſuadeant, Hæmicam febrem penitus eſſe amiſſam in pathologia moderna, in cuiusque locum ſurrogatam eſſe febrem ſcorbuticam.

Signa Diagnoſtica huius febris ſunt omnia ea, quæ per ſe ſcorbutum ſignificant ; palmarum interius notetur Signum quòd in Febre hæc adeo oſtendit circa appetitum vitia : v. g. adeſt nimius, euphuſimorum autem cum Vomitu, aut depravatæ, ita ut ad omnis generis falſi appetitus ſeratur item in febre hæc uſuplurimum adnot Obſtuciones Alvi contumaces, in habitu corporis videntur Maculæ livide, denique ſudor odorem ſpargit ſubacidum, repetiturque in lecto maſſe copioſum rubrum ſabulum, prætereaque adeſt totius corporis Macies.

Signa Prognoſtica ſunt. Omnis febris ſcorbutica eſt tandem periculofa, imprimis autem ea, quæ comitatur Eructationes. Hæc namque uſuplurimum degenerant in Gangrenam, & ſubſequentem Iſchemiam.

Febris ſcorbuticæ curantur aut alia, in quibus cuiſque generis Antiſcorbuticis reliquis Medicamentis ſemper commiſcenda, obſervata tamen ſanguinis & reliquorum ſuccorum vitalium craſis, id eſt, ut reſpectu huius nunc actiora nunc temperatiora adhibeantur. Scorbuto autem ut tali, præprimis ingraveſcente, propria eſt Febris Erratica cum ſudoribus nocturnis ; in quo caſu præter Viſum aut Cenam ſaltem parcerent, præmiſſis Univerſalibus martialia ac ſalia ſina atque volatilia, quæ Cruditates chyli corrigunt, cum Antiſcorbuticis mixta notabilem uſum præſtant, utpote ſine quibus omnis labor erit fruſtraneus ; v. g. conducunt flores & ſpiritus ſalis ammoniaci ſimples, aut diſſaſſatus, cochleariatus, &c. Arcanum duplicatum eſt unum ex optimis eorum remediis, cum Abſorbentibus imprimis ſociatum, quarum Formularem jam ſuprà ſeſt. 1. c. ap. 2. de Febris intermitteſcentibus mentio facta.

Vel

Rf. Eliſir. propriè. antiſcor.

Rf. abſorb. tartari/ar. an. ʒiſs.

M. D. S.

Eli-

Elixir Febrile Antiscorbuticum,

Dosis 30, ad 40. guttas.

Vel

℥. Spir. sal. ammoniac. simpl. ʒiij.
cochlear. ʒi.

M. S.

Spiritus febrilis Antiscorbuticus.

Vel

℥. Spir. carminat. de tritico ʒiij.
Sal. ammoniac. cochleariat. fusc. cald. vin.
par. ʒiij.

M. S. ut suprà.

Vel

℥. Arcan. duplicat. ʒß.

Corall. rub. præp.

Specif. stomach. Fucus ana ʒß.

M. f. pulvis.

Div. in 5. part. æqu. S.

Pulvis febrilis Antiscorbuticus.

℥. Flor. sal. ammoniac. gr. xv. ad ʒi.

Antimonii diaph. martial. ʒß.

M. f. pulvis.

Dentur 4. doses.

D. S. ut ante.

Vel

℥. Sal. Centaur. min.

Arcan. dupl.

Corall. rub. præp. ana ʒß.

Sal. vol. facies gr. v.

M. f. pulvis.

cui addi potest

Laud. opiat. gr. i. vel ii.

D. S. ut suprà.

Vel

℥. Flor. sal. ammon. gr. xv.

Lapill. cancr. præp. ʒß.

Ol. defill. caryoph. gutt. ii.

M. f. pulvis.

S. ut antè.

Vel

℥. Aqua. Antiscorb. Dornac. ʒi.

Spirus sal. ammoniac. ʒi.

Laud. opiat. gr. ii.

M. D. S.

Potio febrilis Antiscorbutica pro una vice.

Vel

℥. Aqua. centaur. min.

Antiscorb. Dornac. ana ʒi.

Spirus cochlear.

Sal. ammoniac. ana ʒi.

Arcan. dupl.

Mag. Corall. cum succ. citr. ana ʒß.

Syr. sculeyrb. Fer. ʒvi. ad ʒi.

M. pro aliquot dosibus: S.

Potio febrilis Antiscorbutica.

Vel

℥. Aqua. centaur. min.

Card. ben.

Antiscorb. Dornac. ana ʒi.

Mint. simpl. ʒiij.

Syr. sculeyrb. Fer. ʒvi.

M. f. potio pro aliquot dosibus.

D. S. ut antè.

Vel

℥. Aqua. Mench.

Antiscorb. dornac. ana ʒiij.

Spirus. Cochl. ʒi.

Arcan. dupl. Myrs. ʒß.

Syr. sculeyrb. ʒß.

M. D. S.

Potio febrilis Antiscorbutica pro una dosi.

Vel

℥. Aqua. card. bened.

Cust. min. ana ʒiij.

Aret. ʒvi.

Mint. simpl. ʒiij.

Spirus. cochlear. ʒi.

Lapill. cancr. præp. ʒiij.

Antimonii diaphor. ʒß.

Syr. sculeyrb. fer. ʒvi.

M. D. S.

Potio febrilis Antiscorbutica pro aliquot dosibus.

Urgente Siti convenit Julcpus in *Ides formular. Cl. 1. §. 4.*
Item TIMÆI in 279, 279.

Vel

℥. Ser. Lact. cum succo Citri acidul. ʒß.

Drosc. Tamarind. ʒß.

Tinct. flor. Bellid. ʒvi.

Syr. an. toto citro ʒiij.

Spirus. sterili philoph. q. f.

M. D. S.

Julepus Febrilis Antiscorbuticus contra sitim.
Serum enim Lactis per succum Citri acidularum valde prode-
st; nec inutilis est, premixtis Abstercentibus blandisque
Laxantibus. Putus Lactis extra paroxysmum febrim scorbu-
ticarum, si aliquantulum Spiritus Salis Ammoniaci adda-
tur & homachus cujusque Digestio beatè se habeat, vix enim
dici potest, quantum in hoc Affectu praestet.

§. XVIII.

HYDROPS SCORBUTICUS.

Hydrops Scorbuticus, si diuturnior & habitusilis, scorbu-
tus autem gravius fuerit, curari vix potest: Qui vero non
invecerratus & à causâ saltem evidente, v. g. quando à ve-
hementiore purgatione Malla sanguinea scorbutica nimis
exagitata fuerit, interdum curatur, Vitanda autem sunt
Purgantia fortiora atque frequentiora, Humores scorbuti-
cos, ut nim inuui, agitantia, & ad hydropem dispo-
nentia, & usurpentur blandiura primas vias tantùm evacua-
ntia, e. g. Mercurius dulcis cum limbo appropriato acua-
tus, aut clysteres acriter, hinc Resolventia cum Diure-
ticis blandis & Antiscorbuticis mixta, ut pote quibus so-
lis sine multis Evacuacionibus hanc hydropis speciem cura-
tam EUGALENUS pag. 244. perhibet. Conducunt ergo
Millepedes Vino infusi, spiritus salis ammoniaci simplex
& compositus, cochleariatus, juniperatus, Elixir Junipe-
rinum, Tinctura Tartari cum spiritu Cochlearie, item
infunduntur Millepedes conquisiti cum Tinctura Tartari
& Extractio filtratur.

§. XIX.

ERYSIPELAS SCORBUTICUM.

Fie subinde ut scorbuticos invadant Erysipelata, levissi-
maque occasione quæ recidivaut: eaque admodum periculo-
sa, quia faciliè in Gangrenas aut in Ulcera maligna can-
thra abeunt. Conveniunt ergo interiores sordifera ex Am-
monio Diaphoretico, Beroardico Minerali aut Joviali, cum
Terra sigillata & Cornu Cervi, atque cum spiritu Florum
Sambuci in misturam Antiscorbuticam usurpanda, & om-
nia Remedia ex sambuco appropriata mista. Sic Essentia
Rob sambuci cum spiritu cochlearie mista, quæ Essentia
hæ, quando spiritus Sambuci super rob affunditur; Item
Essentia rob sambuci cum Essentia Perlicaræ aut Essen-
tia fumarie usurpata, item decoctum florum Sambuci in
Lacte bibitum.Externa pulveres, in specie MYNSICHTII, ad Ery-
sipelata conveniunt; item Epithema ad Erysipelas WELP-
FERI in Pharm. pag. 91. quod polychrestum est ad Exal-
cerationes humidas in metu Gangrenæ; e. g.

℥. Litharg. ʒß.

Flor. Samb. M.li.

Olibani,

Myrrha,

Mastic, ana ʒß.

Aqua. calc. vin. ʒiij.

Aret. defill. ʒiij.

Coqu. simul, utque dum Lithargyr. fuerit solutum,

in fine addendu Camph. ʒß.

Colatura D. pro usu: S.

Epithema discutienti.

Osservare tamen in horum applicatione cautela in *Dif. de*
Præparacionum usu & abusu c. 3. §. 2. allegata. In solo etiam
vino coqui possunt.

§. XX.

SITIS.

Sitis, quæ subinde graviter affligit scorbuticos, præ-
sertim matutino tempore, optime decocto Radicis Chinæ,
aut Liguisticæ ad imitationem TIMÆI in *Goldenleide*
h. 3. 279. 29. p. 277. cedat.

§. XXI.

ULCERA SCORBUTICA.

Ulceræ verò Scorbuticarum live per se, live post Erysi-
pelas effluorescent, periculosæ sunt: quod si verò hat ut partes
ulcer-

ulceratæ non sentiunt, nec dolent, periculum est, ne imminet *Gangraena*. Contra hæc Ulcera ergo convenit optime Aqua Cæcis vivæ pro eluendis his ipsis, & applicetur de super Unguentum Nicotianæ cum Saccharo Saturni; item Unguentum Diaphoreticum cum succo infusillæ *Becabunga* mistum, & malaxatum cum oleo Nicotianæ. **HORSTIUS** commendat Unguentum de Aplo, Ulcus herum mundificatum, cujus hæc est compositio:

℞. Succi Apii,

Medullæ Sapphyll.

Cochlear. ana ʒss.

Chelidon. maj. ʒiil. ad ʒi.

Mell. rosæ, q. s.

Coqu. ad justam consistentiā, adde *Thurs*, *Aloe*, *Myrrha* ac similibus q. s. pro consistentiā Unguenti.

Hoc etiam Decoctum in Læ Venerea est Unguentum Ulcerum ablatione est egregium Remedium. Quin & Decoctum Calcis vivæ pro eadem intentione commodè ulitur.

Quod si Ulcera sint pejora, ibi succedaneum sunt Decoctum Sedi minoris, cui additur aliquantulum de spiritu Vitrioli (aliquot gutt.) sic enim partes exulceratæ mundificabuntur.

Cum verò non semper Scorbutici ferte possint Unguenta aut Emplastra, præsertim pingua, tunc partes exulceratæ Pulveribus inspersis curandæ sunt. Nempe Pulvis ex Saccharo Saturni, Lactē Lunæ, Olibano, Myrrha, Croco Martis præparato, & similibus. Interdum somitem horum Ulcerum subtrahunt Effluvia Lignorum, Effluvia Fumæ, Traumatica, item Tinctura Coralliorum Antiseptica & similia, Sanguinem mundificantia.

§. XXII.

TUMORES.

Tumores duri, qui Crura subinde affligunt, resolvantur per Cataplasma ex Radice Consolidæ maj., quæ hic est specifica: Cui etiam addi possunt Radix Bryoniae, Abinthii, Chelidoni majoris, Farina Fabarum & Lupinorum, ex quibus in Lactē coctis fiat Cataplasma imponendum v. g.

℞. Pter. Symphyti maj. ʒi.

Rad. Symphyti maj. ʒi.

Dryas. ʒi.

Medullæ Pan. albi No. i.

Coqu. in l. q. Lactis ad consist. Cataplasmatiss.

Vel etiam Cataplasma ex *Becabunga* & Geranio Robertiano locum habet: vid. **WEDLIUS** de Compos. Medicis, pag. 63.

℞. Empl. diaph. Myrs. ʒi.

Succi infusill. Rad. Symph.

Becabunga. an. ʒi.

Malax. cum Oleo dissillis. Chomem. f. Emplastrum.

D. S.

Emplastrum Discutiens.

Quod si Dolor addit, *Tacamahaca* dimidium ad Emplastrum Diaphoreticum addi potest.

Abolvimus jam Nutritionem lesam totius Corporis, vitio alimenti nutriticæ: Restant *Vicia Curanea*, in quibus pariter alimentum nutritum in vitio Acido subcutaneo depravatur, ut ex præternaturali sua accedunt, in specie acido-salsa, Pruritus, Pustulas & Maculas excitet: Unde & Medicamenta Cosmetica, Cutaneis Morbis dicata, talia esse solent, quæ acidum illud aut absorbendo aut præcipitando corrigere valent, v. g. Sperma Ranaarum, sal & oleum Tartari per deliq. Sulphur, Saturnina, &c.

ARTICULUS VII.

De Affectibus Cutaneis.

MEMBRUM I.

De Scabie.

Affectionem Cutaneam, in specie *Scabiei*, origo est simpliciter à vitio Nutritionis depravata partium ipsarum subcutanearum. Causa præcise est Fermentum acidum in glandulis intercutaneis hærens, nunc simpliciter tale, nunc acidum acre, seu acido salum; hinc enim pruritus, Squamule, & Pustulæ rubræ, interdum pus & ſines: videtur **BECKIUS** in *Medicina de Princ. Rerum Natur. & Tum. II.*

WILLIS Pharm. Rat. P. 2. pag. 476. Adeoque formalitas Scabiei consistit in Nutritione depravata, quatenus illam suppuratum Corporis Contrahentia, interdum Pedum Tumores, comitantur. Vicarius autem Nutritio partium subcutanearum privata ab acido præternaturali Fermentum digestum impediunt, & alimentum partis protum corruptum. Acidum illud præternaturale fermentativum oritur vel ex *Transpiratione infensibili* nonnulli impedit, indeque retentis Effluviis acido-salis, aliisque similibus, idque subinde ex immoderata *Ægri*, aut quando e. g. Pueri, Servi, Ancillæ, Pharmacopœorum aut Aromatariorum aliorumque famali, Corpora sua nunc frigori intensissimo exponunt, nunc à frigore recedentes Fornacis calori vehementiori se obijciunt, unde à febribus sine & capitis repetitis mutationibus non raro Scabies nascitur: vel ex ipso vitio Nutrimenti aliti, Sanguinis nempe & Chyli, salioris aut acris, Fermenta præternaturalia sub Cuta hinc inde generantur, unde oritur Fermentatio: vel denique frequenter ex *Contagio fermentativo*, e. g. Chirothecæ scabiosis extrinsecus hausto, spiritum insitum Cuti alterant, quod fermentando se multiplicans partium Intercutanearum nutrimentum ledit, & in sanum seu leichorem acido-salum convertit; simili modo ac crassa Lactea Infantum subinde florefcit ex vitio Lactis Nutriticæ.

Ex his patet, non semper in Scabie totam Massam Sanguineam affectam esse, sed frequentius nutrimentum intercutaneum seu serum nutritum in habitu Corporis: unde, quicquid Prædici de Viscorum imtemperie & sanguinis puritate in omni scabie docent, locum non semper habet; cum à solo sæpe scabiosis contactu vel bujus vestimentorum usui, &c. Scabiem contrahamus, ubi præter Cutem aliæ partes simul non afficiuntur, quæ tamen si tota massa sanguinea semper inquinata esset, Viscera interna etiam inquinaretur: accedit & hoc, quod scabies sæpe per sola Medicamenta externa curetur. Causæ negati non possunt, etiam interdum ex mala Dieta & ulcus internis, v. g. Scorbuto, Læ Venerea, &c. Scabiem excitant, aut contagium, quo serum nutritum in habitu Corporis semel affectum, totam massam sanguineam successivè inficere potest, unde Phthisis, Cachexia, & alia similia mala excitantur. Dividitur vulgò *Scabies in Humidam & Siccam*; quæ tamen differentia non est essentialis, sed tantum accidentaria, cum pro diversitate Corporum plius minus serosiorum & siccorum Pustulæ scabiosæ nunc benivoliores, nunc sicciores, & magis crustulosæ, sint: Illæ enim à nutrimento partium subcutanearum magis serulo & magis temperato, adeoque facile corruptibili; Hæc verò à nutrimento minus seroso, sed magis balsamico aut sale volatili oleoso magis imprægnato, oriuntur.

DIAGNOSIS.

Signa Diagnostica per se patent: Scabies humida & sicca facile quoque à se invicem dignosci possunt, dum illa apparet sub forma Ulcusculorum cutaneorum; hæc verò solum saniem exsiccatam & in crustam representat.

PROGNOSIS.

Prognosis quod attinet: Scabies propter Deformitatem & pruritus magis molestem malam, quam periculofum, cum hac affecti pluribus Morbis sepe immunes sint, v. g. à Variole, Epilepsia, &c. imo ipsa Pelle, notante **FORESTO** l. 6. Obs. 24. in *Schola*.

Scabies recens facile curatur; leveiterata verò Medicis multum facessit negotii; interdum in Impetiginem ac Lepram degenerare, & Viscera interna inquinare solet.

In senibus contumax magis est, quim in juvenibus, quibus sæpe infansibilis: vid. **FONSECA** Trw. 2. Conf. 11.

Scabies humida melius curatur, quim sicca; imo vix curari debet: vid. **GABELCHOVERUS** c. 6. Obs. 75. Malè curata multorum Morborum Chronicorum, Insanctorum & Inflammatorum causa existit; unde frequens post malam curationem phthisis.

CURA.

Curantur Cutanea Vicia tam per *purgantia*, quam *sudorifica*. Externè verò conveniunt, quæ vi absorbendi aut destruedi acidum possunt. Conveniunt ergo interner purgantia Helleboria, Extrahum Hellebori nigri & Panchymagogum *Croci*, Pulveres Purgantes cum tantillo Antimoniæ Diaphoretici ad imitationem *Comitæ de WARWICK*, quibus semper Mercurius dulcis addendus erit; *Q99* adeo-

adobque optime Pilule Mercuriales conveniunt, item Calomelanos Targui, i. e. Mercurius dulcis cum Scamonia sulphurato, it. Mercurius Vitis per inferiora purgans, de qua vid. HARTMANNUS in *Pract. Chym. cap. 4. §. 1.* In robustioribus Turbibus Mineralis, Mercurius Precipitatus viridis: E. g.

℞. Mass. Pilul. de Ann. Sydere, vel *Extr. Hellebori nigri*, vel *Punclicym. Crisill. gr. xv.*

Merc. dulc. gr. xii. ad xv.

Extr. Troch. Alband. gr. i. ad ii. (vel loco huius Scam. sulphurat. gr. i.)

Cam. ℞. Liqueur. vel Tinct. Tartar. antim. vel *Fumaris*, f. Pilulæ;

D. S.

Pilulæ Sanguinem purificantes.

Vel

℞. Mass. Pilul. de Tribus Rufi gr. xv.

Merc. dulc. ℞.

Scammon. sulphurat. gr. v.

Cum ℞. Liqueur. f. Pilulæ.

D. S. ut antè.

Vel

℞. Conf. Fumar. vel Scabios. ℞.

Merc. dulc. gr. xv. ad ℞.

Scammon. sulphurat. gr. i.

M. f. Bolus.

D. S.

Bolus Laxativus Sanguinem mundificans,

Vel

℞. Turbith. Miner. gr. v. vel vi.

Cum Theriac. f. Bolus in robustioribus.

D. S.

Electuarium pro ana dosi,

Vel

℞. Merc. dulc. ℞.

scam. prop. gr. iv. ad v.

M. f. Pulvis S.

Pulvis Purgans.

Vel

℞. Merc. dulc. gr. ix. vel xii.

Scammon. sulphurat. gr. i.

Sacchar. gr. v.

M. f. Pulvis pro puero 7. & 9. annorum,

D. S. ut antè.

Vel fiat Nodusus prius purificando Sanguine in genere, simul & Alterativis & Laxativis, quibus Plantæ amaricantes, siccæ & sanguinem purificantes addenda erunt, v. g. Radix Enulæ, Polyposi, Fœniculi, Hellebori nigri, Rhubarbari, Armaroræ, &c. Fumaris, Carduus benedictus, Veronica, Scordium, Abinthium, Flores Acazie, Bellidis, &c.

℞. Herb. rec. Afinsch.

Cochlear.

Fumar. an. M. l.

Flor. Bellid.

Cichor.

Cera. min. an. p. li.

Pol. Scam. fœc. ℞.

Rad. rec. Armaror.

Fœnic.

Kauls an. ℞i.

Helleb. nigri erad. ℞.

Rhabarb. el. ℞iij.

Colang.

Zedair.

Cinnamon. an. ℞.

Paff. min. ℞.

Sem. Anisi.

Fœnic.

Nasturt. ana ℞iij.

Sal. Tartar. ℞iij.

Incis. & contris. inclus. Nodulo: S.

Nodulus Sanguinem mundificans.

Vel

℞. Herb. Fumar.

Scabios.

Veron. an. M. l.

Pol. Scam. fœc. ℞.

Rad. Rhabarb. Menarb. an. ℞.

Kauls.

Bryon.

Polypos.

Helleb. nigri erad. vel Rhabarb. el. an. ℞.

Paff. min. cont. ℞.

Cinnamon. acor. vel Cora. Winteran. ℞iij.

Sem. Fœnic. ℞i.

Sal. Tartar. ℞iij. vel ℞iij.

Incis. & contris. includantur Nodulo:

D. S. ut antè.

Affundantur Menstruæ ii. *Vin. Rhen.*, de quo post sufficientem digestionem omni mane aut alterna diebus, capitur Cyathus novus, plus minus, prout operabitur à meridie, vel diebus intercalariis mane & vespere uniscentur Pulveres *Absorbentes & Temperantes*, vel *Essentia Purificans*, de quibus infra.

℞. Herb. Fumar. M. li.

Scabios. M. l.

Pol. Scam. fœc. ℞.

Rad. Lapathic. an. ℞.

Zed.

Polypos.

Helleb. nigri erad. an. ℞.

Crem. Tartari ℞.

Sal. Tartari ℞.

Coqu. in C. q. Aqua fontan. in Vase leniter clauso: Co-

latura ℞iij. add.

Syr. Violar. solut. ℞.

Fumar. compof. ℞.

M. D. S.

Potio Sanguinem purificans.

Vel tempore Vernali:

℞. Flor. Acet. rec. M. l.

Ter. Laß. habul. vel caprill. Menst. S.

Coq. leniter in Vase clauso.

De Colatura bibatur mane dimidia pars, per dies 7. ad 14. continuando, & singulo mane ex Floribus recentibus coquendo.

De usu Seri Lacis in Scabie vid. AMATUS LUSTANUS *Cent. 2. Cor. 74.*, & Lacis capilli PLATERUS *pag. 542. & 543. l. 2. Observ.*

Inter Sudorificæ, convenient Ligna, Cortices etiam, in specie Ligni sancti, eorum nempe Decocta, Essentia & spiritus, uti etiam partes Animalium dure philosophice calcinatæ, e. g. Cornu Cervi sine igne, Ebus sine igne &c. Salia fixa & Salia volatilia quæcunque, in specie verò Sal volatile Viperarum, & omnia ex Viperis parata Remedia quibus ex Regno Minerali additur Sulphur Antimoni, Cinnabaris Antimoni, Antimonium Diaphoreticum, aliaque fixa Antimonialia; nunc sociata cum aliis, nunc per se cum Rob Baccarum Samboci; item Tinctura Antimonialia; vid. M. A. N. C. *Ann. 6. Obs. 317.*

In contumacioribus Malis preleritum Viperis, aliaque que Sanguinem purificant, conducunt; & aliis irritis salivatio Mercurialis instituerenda; sicuti in pessimo rerum statu, adeoque in ipsa Leprosi, tandem ad Arsenicum fixum confugendum erit.

Quædam sudorificorum Formulas:

℞. Aqua Fumar. ℞.

Antimoni diaphor. ℞.

Sal. volat. Viperar. gr. vi.

Syr. de succo Scabios. ℞i.

M. pro Haustuulo Sudorifico: S.

Potio Sudorifica pro 1. dosi.

Vel

℞. Aqua Flor. Samb. ℞.

Spir. Thieriac. camp. ℞.

Antimoni diaph. gr. xv.

Sal. volat. Viper. ℞.

Syr. Cort. Aurant. ℞.

M. S. ut antè.

Vel

℞. Aqua Flor. Samb. ℞.

Pol. Viper. ℞. ad ℞iij.

Sal. vol. Viper. gr. vi.

Syr. Fumar. ℞.

M. S. ut antè.

Vel

℞. Antimoni diaph.

Sal. Asphat. an. ℞.

volat. Cora. Corv. gr. v. vel vi.

M. pro Pulvere sudorifico: S.

Pulvis Sudorificus pro 1. dosi.

Vel

℞. Cora. Corv. fœc. ignis ℞.

Antimoni diaph. ℞.

Sal. vol. Viper. gr. vi.

Laud. ferment. gr. i.

M. S.
Pulvis fadoriferus expellens.
Vel

℞. Antimoni diaph.
Cera. Cero. fusc igne 2℔. ℞.
Myrrh. gr. iij.
Sal. volatilis. Piper. gr. iv.
M. S. ut antē.
Vel

℞. Antimoni diaph.
Cera. Cero. fusc igne 2℔. ℞.
Myrrh. gr. iv.
Salis alijust. gr. vi.
M. S. ut antē.
Vel

℞. Cera. Cero. fusc igne.
Ser. Sulphuris an. dr. ℔.
Salis Card. ben. gr. xij.
M. S.
Pulvis sanguinem mundificans.
Vel

℞. Extr. Bals. Sulphuris p. iij.
Antimoni diaph. p. i.
Cera. Cero. fusc igne p. ℔.
M. f. Pulvis.
D. S. ut antē.

De quo omni mane, quantum culpis Cultrici caput sumatur; vespere vero duabus horis ante Coenam Elixir Proprietatis, sine acido, vel Elixir Cachecticum.

℞. Salis Antimoni diaph. dr. iij.
Pulvis. jam prescript. ℥ij.
M. pro 4. doibus:
S. ut antē.
Vel

℞. Rob. samb. vel Theriac. dr. i.
Pulvis. Serpax. calcin. vel non calcin. ℥ij.
Sal. Ammon. ℔.
Cum l. q. Syr. Cort. Aur. f. Bolus.
D. S.
Bolus sanguinem purgans pro 1. dofi.

℞. Camph. Fumar. dr. i.
Pulvis. Myrr. ℥ij. ad ℥ij.
Cum Syr. Rosar. fol. i. Bolus.
D. S.
Bolus sanguinem mundificans.

℞. Tinct. Antimon. ex ser. par. (propter alcali commendatur) unc. ℔.
D. S.

Tinctura sanguinem purificans.
Dentur pro dofi 10. 30. ad 40. gutt. bis vel ter in die.

℞. Ess. Viperæ. unc. ℔.
D. S.
Essentia sanguinem mundificans.

Dentur an. 30. ad 40. gutt.
℞. Tinct. Corall. cum sp. Liqueur. vel Saffr. ℥. vi.
D. S.

Tinctura Corallarum sanguinem purificans.
Dosis an. vel 30. gutt. bis in die, mane jeuno stomacho in Vehiculo calido.

℞. Ol. de Sillis. Terabint. dr. iij.
D. S.
Oleum sanguinem mundificans.

Dni. gutt. vi. mane.
Vel sumatur Bals. Sulphuris resinosus. gutt. viij. ad xv.

℞. Bals. Sulphuris terabint. dr. iij.
fuscinat. dr. i.
M. D. S.

Balsamum sanguinem purificans.
Dosis x. ad xv. guttulis mane.

Externæ convenienti Remedia ex Saturas, Mercurio, sulphure, sale Tartari, Calce viva, saccharum saturni, Cera, Minium, Colicetum Clavii ex Bismutho paratum, seu Magisterium Marcesite, (vid. SCHROEDERUS in Pharmaz. & BEGUINUS in Typogr. Chymico.) Lapis calaminaris, species Ratunum, Decoctum Colicetum MYNSICHTII, in Armacum. Chym. pag. 377. Mercurius dulcis, Mercurius Præcipitatus cum Spiritu Nitri, seu ut vocatur ab HARTMANNO, Arcanum Co-

rallinum, Liqueur Mercurii saccharatus MYNSICHTII l. n. p. 443; Essentia Benzoes, Oleum Nicotianæ, Unguentum de Liquiritia, de Nicotiana, Unguentum Album camphoratum, de Lithargyrio, Unguentum Emulatum, Unguentum Diasturni Zvolfferi emulatum, Unguentum ex Tutia, Diapompholygos, Emplastrum de Ranis cum Mercurio &c., quæ miscebat Acidum temperat, abstergens, & mitigant.

In usu tamen Sulphuris & Mercurii, necesse Unguentorum Saturniorum observandum, ut pori Corporis probe aperti maneant, ne Fermentum externum illius repugnum totam Massam Sanguineam inficiat, pro quo scopo Sulphuri semper Sal Tartari vel aliud Alcali adjuvandum: E.g. sit sequens Unguentum ab Scabie mihi perquisitum famillare:

℞. Unga. Ranas. vel Diapomphol. vel Alb. vel de
Liquirit.
Camphor. dr. vi. ad unc. i.

(vel Unga. Rana. & Alb. camph. an. part. æqu.)

℞. Sulphuris dr. iij. vel dr. iij.
Sal. Tartari dr. i. vel ℥ij. (vel Ol. Tartar. post
deliq. dr. iij.)

Cum l. q. Ol. Hyperic. vel Nicot. f. Linimentum.

D. S.
Unguentum Mundificans.

Adde huic pro lubitu & gratia odoris possunt,

Bals. Peruv. ℔.
Ol. Ligni Rhod. gutt. vi.

Hoc ipso illinantur saltem junctura Brachiorum & Pedum, v. g. articulatim Tali, Genium, & Carpi, & interstitia Digitorum, vespere sub introitu lecti, & Corpus bene teclum conservetur: mane Manus possunt abluvi Urina propria calida, relicto in Pedibus Linimento, reitertur hoc ipsum tandiu donec Malum evanescat. Postmodum alii evanescit Scabies, ut Velligia rubra deleantur, abluantur mane & vespere cum Aqua Calcis viræ.

℞. Unga. de Liquirit. vel
Dia-Saturum Zvolff. dr. vi.
Ol. Laurin. ℥ij.
Pulvis. Bacc. Laet.

Fler. Sulphuris vel Sulphuris comm. pulvis. an. ℥ij.
Sal. tartar. ℥ij.

Cum l. q. Ol. Hyperic. f. Linimentum.
D. S. ut supra.

Ubi contumacius fuerit Malum, ad Mercurialia fiat accessus.

℞. Unga. Nicotian. vel Pomat. unc. ℔. ad dr. vi.
Fler. Sulphuris dr. iij.
Mercurii dulc. dr. i.

Cum Ol. Nicotian. vel Jasmini f. Linimentum.
D. S. ut supra.

℞. Unga. Alb. camph. vel Ranas. vel Diapomph. ℥ij.
ad ℥ij.
Mercur. dulc. ℥ij. vel iij.

(vel arcan. corall. ℔. ad ℥ij.)
cum Ol. ad. f. Linimentum circa articulos Manuum ac pedum inungendum.
D. S. ut supra.

Hæc ipse præter scabiem etiam in Pruritu Partium; in Scerpigine, Germ. in den scrofulosis; item in Lichenibus & similibus Cutaneis Corporis Affectionibus, commodissime usurpari possunt. Augetur vel immineatur sal Tartari quandoque propter nimiam acredinem, Item,

℞. Unguent. Rosar. ℥ij.
Mercur. præcip. ℥ij.
M. pro linimento.

S. ut supra.

Quod etiam externè in gravibus Malis usurpari potest

℞. Ol. tartari post deliqu. ℥ij.
Amigd. dulc. q. i.
M. pro linimento externo.

D. S. ut supra.

Facit etiam hæc Decoctum Calcis viræ polychrestum in Cutaneis Affectionibus per Partium affectionum abluitione.

℞. Aqua. calcis viræ ℥ij.
Sulphuris comm. pulvis. ℥ij.
Ebulliant invicem aliquandiu.

Colaturæ addo

Aqua. Rosar. ℥ij.
M. D. S.

Aqua mundificans.

Hæc Aqua eluuntur Membra scabiosa, item Genium & Cubiti articulationes: permittantur sponte siccat, & eva-

Q99

neſcit Scabies & Maculae atque Puſtulae ab hac reſiſt; & convenit hac Locio etiam, ſi *partes Scabie afflictae Tumore Oedematofa tumantur*. Praeterit Aqua ſublequens eſt egregiae virtutis; ſcilicet.

℞. Decoll. Calcei viſci ℞i. ad ℞iſſ.
Mercuri dale. dr. i. vel dr. ii. ad dr. iii.
Spiritus Theriac. camphor. unc. i.

M. pro Locione Partium caternarum in Scabie ſetina, quam ſola ſapetita Lotio curat.

D. S. ut ſuprà.

Odores gratia *Aqua Salorum*, interdum etiam *Sacchari Saſurati* dr. iſſ. vel dr. ii. addi poſſunt: loco capis etiam

℞. Melle. viſci parvi, qu. v. c. g. unc. iv.

Ebulliant in *Div. Aqua ſimpl.* aliquandiu:

Colaturae ℞i. vel iſſ. S. ut ſuprà.

quae ſola partes abluendo, praeterit Manus, Scabie evaneſcit.

Qui vero potentius voluit, addunt *Mercur. dale. dr. i. vel dr. ii. ad ℞iſſ.* & ita calide utantur.

Secretum in omni Scabie eſt Aqua deſtillata Hercoſis humani, hactenus locus, expertiſſimum eſt: Item *laurentis Manus Lixivia Carſiarum calida*; ſcilicet cum ſuccellu vidi uſurpatam in Scabie ſetina Puella, interuſu adhibendo ſimileſſent. Viperarum. Denique Ungu. Anarum, elegans in Alopecia leproſa, quod videb. in M. A. N. C. ann. 6. Append. p. 179. non inolegens erit.

Sunt qui in Remediis Externis contra Scabiem, Item in aliis ſimilibus pro uſu Cosmetico, externe non raro adhibent *Mercurium ſublimatum*, ſed peſſimo cum conſilio: nam praeter alia mala, & incuſtus adhibitus Dolorem inflammatorium, Puſtulas, & Veficas ingentes, acrimonia ſua corrosiva, acida excipit: vid. M. A. N. C. ann. 8. ob. 77. in quo caſu optimus eſt Fotus Lactis tepidi; ceſſantibus poſtmodum Doloribus, convenientiſſimum eſt adhibere Aquam ſoſietis vivam. Aliquando Studioſum ex Liquore Mercurio impregnato contra Scabiem ex aſſuſione ejus Dolorem & Tumorem Brachii & Manus à Cubito ad Digtos uſque incurrit cum crudeliſſimo Dolo: unde praſcripſi:

℞. Aqua Calcei viſci ℞i.
Spiritus Vin. ℞i.
Ceraſſ. ℞iſſ.

M. D. S.

Cataplaſma Leniens.

Applicabat calide & optime conſuit.

Io Caſibus pertinacioribus etiam *Ciguſtam Adverſariale* comendandum, de quo vid. BARTHOLINUS C. 3. Miſſ. 29. cui FONSECA L. 2. Conf. 18. *Saffum Cinnabarum* addit, probè tamen prius purgato contra frigus praemunito vel ſub ſodore detento Corpore: effectus enim ex Mercurialium abuſu ſatis deploratos Experimenta teſtantur, quos etiam ab aliis Externis Intemperatè applicatis conſtigie Medicorum Obſervationes cum quotidiana Experimenta teſtantur: Exemplum ab Unguento ex Arſenico videbitis in AMATO LUSITANO C. 2. Cor. 33. & ab Unguento ex Lichargio in ZACUTO LUSITANO l. 1. Praeſcri. (B)

Necroſum quoque, quod ſa Scabie Critica nulla Remedia Externa applicanda, ſed ſolummodo Remediis Internis Diaphoreticis inſiſtendum eſſe. In Scabie autem ſocſan reſtopaſſa, & inde natia gravibus Symptomatibus, optime conveniunt Viperina, Eſſentia Viperarum, Sal ejus ad ℞i, cum unc. i. Syr. Fumarum.

Tandem etiam in uſu ſunt *Salera* pro delenda Scabie, quae etiam in Scabie Critica concedi poſſunt, ex Chamomilla, Malva, Meliloto, Hyperico, Nicotiana, Scabioſa, Fumaria, Perſicaria, Lapatho acuto, Enula, Saponaria, Patricaria & ſimilibus appropriatis: c. g.

℞. Herb. Lapathi ac. M. iv.

Nicoſ.

Scabioſ. an. M. ii.

Rad. Lapathi ac. ℞iſſ.

Enula unc. ii.

Bryon. unc. i.

Sulphuris erad. unc. vi.

Calcei viſci ℞iſſ.

Infuſa & conſuſa

D. S.

Species ad Balneum.

Coqa. in l. q. Aquae moderato igne pro Balneo. Prius ſudet Aeger cum cornu Cervi igne igne in Rob Sambuci, vel cum Eſſentia Lignorum, dein inſident huic, Corpus fricando & à ſordibus repurgando; poſt cum Linimento appropriato illinendo. Item:

℞. Herb. Fumar.

Nicotian.

Perſicaria.

Scabioſ. an. M. ii.

Rad. Enula.

Lap. acuti an. unc. ii.

Bryon. unc. i.

Sulph. Sulphuris ℞iſſ.

Nitri.

Calcei viſci an. ℞iſſ.

Conſuſa & conſuſa S. ut ſuprà.

Coqa. in Aqua dulc. cum ana Libelli acuta, moderato igne bene agitando, F. Balneum.

Vid. HORSTIUS pag. 335. & 337:

Item

℞. Herb. Lapathi ac. M. iv.

Perſicaria.

Saponar. an. M. ii.

Rad. Lapathi ℞iſſ.

Bryon. ℞iſſ.

Sulphuris viſci ℞iſſ.

Calcei viſci an. ℞iſſ.

M. D. S.

Species ad Balneum.

Coquantur in Aqua ſimpl. addendo parum Lixivi.

MEMBRUM II.

De Pruritu.

Pruritus eſt Scabiei Symptoma individuum, & futurae Signum certifiſſimum.

CAUSAE.

Cauſa Pruritum excitans eſt Serum acido-ſaliſum, cuius Acrimonia à Cauſa Scabiei in hoc diſſert, quod illa tumor & ſubſeſſor ſit, atque per minima magis inter Cuticulam & Cutem ſe inſinuat. Oritur tamen etiam interdum à Cauſa Externa, ab Urlicarum & Formicarum contactu; Calicem & Pedicularum, necnon Saurorum morſu, Item à Ligatura Arſiſſore in Fracturis & Luxationibus.

DIAGNOSIS.

Diagnos opus non habet, cum Malum hoc Somnum & alia negotia maxime impedit.

PROGNOSIS.

In Prognos nihil peculiare occurrit, niſi quod Pruritus diutius venati Scabie tandem aſſiciantur.

In Decrepitis incurabilis eſt: vid. VALESCUS de TARRANTA in Chirurg.

CURA.

In Cura ſi Malum ſit à Cauſa Interna, & quidem totum Corpus aſſiliat, conveniunt Acrimoniam Temperantia. Aut omnia vero purgare Corpus Mercurio dulci: c. g.

℞. Conf. Roſar. ℞i.

Morcor. dale. gr. xv.

Ref. Jalapp. gr. vi.

Scamm. Sulphuris gr. i. vel ii.

Cam Syr. Fumar. i. Bolus: S.

Bolus Sargolium mundificans.

Non minus etiam conducunt Noduli Purgantes, & omnia Purgantia jam Membris praecid. in Scabie laudata.

Purgato ſe corpore in Plethoricis V. S. iſſitral poteſt: poſt ſudo-

(B) Si verum ſateri velimus, nulla praeterit adverſus Scabiem, imò & acrius affectus cutaneos, amantur, quam Sulphur: quod ni ob terrorem edreſſu reſiſtans delicatuli acriores, efficaciffimum ad ſubſtitutiſſimas quoque Scabies proſigandas experientur. Sulphure ſunt, Oleo tantum ad Unguenti formam dicto, ad Gallicas quoque Scabies ſuperandas, in Noſocomio Incurabiliſſimum ad ſuſcitandum uſurpat. Quae rariſſime Theriacali Aqua de Piſciatelli diſſa à radice mentis, quae ſolſcitara vocamus, qua parte lacum Agnetum ſpſhet, erumpens, quippe qua Sulphure imprimi ſcatur, conſiſtunt ad Scabies inveteratas proſigendum.

fudorifera temperata etiam acrimoniam falfam abforbentia, in *scabie pariter jam laudata* imprimis ex antimonio diaphoretico martiali, coram Cervi linc igne, cinnabari ancinonit, &c. prefcribenda. Ubi verò pars tantum una vel altera puritatem molleatur, una cum fudoriferis jam dictis conveniunt omnia. *Externa in scabie laudata.* Vel fiat *Linimentum Rosaleiti.*

℞. Rad. Lepae. ac.

Selen. ana. ℞i.

Decoqu. in *Aeto* ad mollietiem.

per focumcum trajectione addo

ol. Tr. ℞i.

sal. comm. ℞i.

Myrrha ℞i.

Lithargy. ℞i.

Cera parum

P. l. a. linimentum.

In malo pertinaciori dicitur aliquid mercurii dulcis addi potest; imprimis si malum oriatur à gonorrhoea, in quo causa simul decoctum colocynthidis applicari solet.

Si à Ligaturis diuturnioribus aut stridioribus, pars tantum laevetur cum Aqua tepida si à Formicis vel Urticis preter seclionem cum gleba terrae recentis, convenit Lac tepidum, decoctum malvae, Aqua spermatis Ranarum, vel Unguentum diaporphorum, de tertia, &c. quibus saccharum Saturni addendum.

Post scabiem & pruritum sequitur lepra.

MEMBRUM III.

De Lepa.

Lepa olim abominabile Affectum fuisse, tam ex SACRA SCRIPTURA quam alius Autoribus constat. Nostro autem saeculo cum scorbuto & Lues Venerea ubique ferè se infundunt, Lepa ipsi rarissima, cum vel sub nomine Lusi Veueræ, vel ipsius scorbuto lateat. Imprimis communis cum *scabie confirmata*, utpote quem, malum contagiosum, ab Acido quodammodo corrupto & corrodente ortum, ex *Artic. 6.* & inde ortis lymphaticis patet. Alias etiam plures dicitur, & *Elephantiasis Graecorum.* Ab *Elephantiasis Arabum* in hoc differt, quod haec particularis tantum, & feces vino liberaliter indulgentes plerumque invadens, Affectus quidam sit, pedum nempe tumor rubicundus, lividus seu nigricans, cum ulceribus varicosis à quibus serum acre limpidum effluit; intermedium etiam solae Cruisae furfuraceae totos pedes occupat: Illa verò universalis. Vocatur *Elephantiasis*, quia haec ipsa affectus tumida Cutis, rugosa & alpera, Elephantum iussit, apparet. Alias etiam vocatur *Saeyrasmus*; vel quia Nares, & Labia tumida, Aures tabidae, Genae rubentes, & in fronte excrefcentes quidam iussit cornuum hinc late proberant, quali facie latry pinguntur, vel quod leprosi in principio Morbi maxime libidinosi dicantur. Item *Leontiasis* dicitur vel quod leprosi Vultum terribilem & frontem rugulam Leonum iussit acquirant, vel quod eorum avelitus & excrementa Leonem bulique excrementa oleant. Nihil est aliud, quam sumus & contumacissimus scabiei scorbaticus gradus, unde scabies & lepra ab AEGINETA conjunctim tractantur, in lepra tamen longe major & habitualis succi nutritii corruptio est, quam in scabie, adeo ut, quando in hac cutis iussit furfuris separatur & decidit, haec in lepra squamarum piscium iussit decidat, quatenus in hac non tantum cutis, sed etiam subjacentes partes carnosae exulcerantur: unde & scabies serica & inveterata in lepra degenerare solet.

CAUSAE.

Causa Lepae cum scabie causa communis est, longe tamen gravior: scilicet nempe feri muratica & corrosiva, in specie acido-salis. Veteres bilem strum, singulari malignitate praeditam acculant; ratione cuius quidam lepram cancrum universalem non inepte dicunt, quatenus eadem fere causis cum cancro particulari concipi potest, nempe salio acidum quoddam corrosivum, & partibus solidis maxime insensum: unde Acidum Abforbentia Lepam mitigant, Acidorum contra abulis eam fovet & auget.

DIAGNOSIS.

Circa Lepae Diagnosis Medicus sit cautus & prudens, ne

Signo uoi ac soli credat, sed iudicium dirigat ad signa plura, tam propria, quam communia; adeoque secundum illa quidem iudicat, secundum haec verò maximam partem. Colliguntur autem signa haec vel ab antecedentibus, vel Coniunctis. Quoad *Antecedentia*: Medicus imprimis investiget ex Aegri parentibus, consanguineis & agnatis, an horum aliquis Lepa, vel Cachexia congeneri enormiore laboravit: com Contagium hoc interdum ad tertiam & quartam usque generationem propagari solet: deinde attendatur Vitae genus, an Aeger, aut parentum, aut consanguineorum quidam cum Leprosi degerit? quo Vitu & quali Dieta utatur? an quartana, Mania, aliusque similibus morbis olim laboravit? an Haemorrhoides, mensis vel alia soleanis quidam evacuationi, ipsi aliandi suppreffa fuerit, aut adhuc suppreffatur? Ex quibus Coniuncturae artificiales surmari possunt Aegrum ad lepram esse dispositum, adeo ut, licet jam nondum leprosus, lepra tamen metuenta sit.

Quod signa *concomitantia* attinet; haec sunt vel Interna, vel Externa. Interna sunt in principio Rudus crebriores & molles, cruditas acida vel acidiora, alvus obstruata: quibus progressu temporis superveniunt Orit & Fautum siccatas, sitis iotensa, sudor graveolens & foetidus, Urina subjugalis, cui si iuxta LEVINUM LEMNIUM calx futurae iociciatur, haec fundum ejus non petat, sed superneat; sunt libidinosi: sanguinis venae sectione eductus solet esse foetidus, crassus, viscosus & undulosus, adullus, nigrescens aut lividus, saeculentus, & pingui quasi Cruisae obductus, qui dignis aut manu agitatae Aeneae iussit stridet & tactu asper apparet: per passum vero colatus arceolat Granula & nodos quasi poli se relinquit; à granis aliquae salis superiuscatis mox dissolvitur, ab Aqua verò non adeo facillè diluitur, sed potius cum hac iussit Gelatinæ congelatur; vid. MARCELLUS DONATUS *Myth. Mirab. l. 1. c. 4.* pulsus pauciora frequent est & debilis, Respiratio difficilis, & foetida, ut in phthisi, Dyspnoea & Asthma: Vox clangula & rauca, & interdum Aegri per nates quasi videntur loqui. Accedit his in malo confirmata Ignitio & lassitudo totius corporis, facili infirmitas, adullus Tactus, remanens tamen motu; vid. PARAEUS *l. 19. cap. 7.* ut Aegri interdum pruritum furmicum repetunt ad iussit percipiant, somnus est gravis cum infamiosis turbulentiis & Incubo, ac si cor eorum claudatur ac comprimatur; imò tandem pullanimitas quidam supervenire solet.

Inter signa Externa apparet cutis, nunc ad colorem lividum & nigrum vergens, nunc flavescens & ex rubro nigricans; vid. VALERIOLE *l. 6. Ewaer. 3.* acti exposita mox corrugatur, exasperatur & iussitgicet, itea apparet undulosa, ut aqua ipsi iussit vix hæreat; sensum craileicæ, rugosa & asperius redditur; furfuris ovae purpureae nunc albogae, ac si calce incrustatae esset, imprimis in Facie ad iussit viderit, multiforme nodositatis, tuberculis mobilibus & indolentibus, potissimum pone Aures circa frontem, Mentum & Artus, desolatur, & morphæa, Impetigine & scabie sicca, pertinaci, aliusque passulis afficitur; vid. HILDANUS *Expt. ac.* Unde etiam coniectus (& continus exinde ortæ Vigiliæ) pruritus, ac si acubus pungantur, aut Urtica percussit essent, aut Vermibus roderentur, Leprosos maxime urget: & dum partes cutaneas Unguibus scalant, paucissima saltem aut nulla materia, neque serosa, neque purulenta, promanat, partisque cutaneae e-rasie mox exsiccantur, nec crulla quidam obducuntur. Cum his simul observantur capillorum defluxum, & superciliorum, Pilifque veris interdum parvi, lanuginis iussit, succedunt, frons etiam rugosa & tuberosa, Aures tenae, eorumque pinnae tumida; vid. HILDANUS *l. 1.* supercilia iussit elevata & callosa, & pilis aut defluunt, aut si evellantur, aliquid Cutis & carnis in radice hæret; oculi iussit GUIDONEM de CAULIACO fene rotundi, rubicundi, scintillantes & lacrymantes, qui Venas tumidas & intra angulos Tubercula grandinosa, aut iuxta HILDANUM *l. 1.* a iussit iussit pilicula acquirunt, Narium extrema dilantur, superior pars contrahitur & corrodatur, in medio cartilagineo corrofo apparet, una cum ocanie, Fattore, Polypo, Respiracione per Nares interceptione, & copiosa sernutatione, necnon palati quæ Uvulae erosione. Labia cum facie pallent, crassa, dura, nigricantia, livida, & sissa comparent: si ore & faucibus bine inde observantur Tubercula flavescencia & sublivida; lingua ruget, nigrescit & induratur, cum Venae inflantur & varicose evadunt cum tuberculis grandinosis & durioribus, albis, viridibus, vel lividis, & sciti etiam Gingivæ præter modum pul-

gallent, tumet & rubet, asperæ & coriole apparent: saliva maxime est viscida & quasi biliosa: Mammæ sunt duræ & tumet cum Venis varicosis: Artus non solum marcescunt, sed etiam in pedum plantis & digitorum interstitiis, necnon in manibus prope cubitum, alibiq; artuum locis fissuræ & Ulcera callosa, prætomida, & ad levissimum contactum cruenta, ut plurimum tamen indolentia, deprehenduntur. Maouum musculi, maxime pollicis & indicis, condempti sunt ipique manuum ac pedum digitis frigidi & dormiantem, & quasi quandam sensus privationem patiuntur: Articuli horum sunt nodosi & distorti, Ungues vix lividi, nigri incurvi & fissi.

PROGNOSIS.

Lepra leviterata incurabilis est: de Incipiente verb; à mala dicta aut contagio orta, per Dietam acutiorē, & Remediū generosiorum diuturniorē usum aliqua spes adhuc affulget; secuti lepræ incipientis sanata Exempla videtis apud ARETÆUM l. 4. de sign. & caus. morb. cap. 12. GALENUM Aeg. c. 12. & HORSTIUM 7, cap. 18. & 21. uter fortan ratio fiat. Conf. LAURENTIUS de Lepra 18. & PALMARIUS de Lepra 1. 4.

Sanguis in lepra foetidus & nigrescens: item serpigio & Imperigo in manuum ac pedum digitis, cum pilis parvis ascendentibus, malum signum fuit.

CURA.

In Cura sanguis purificetur, tam per Evacuantes, quàm Saderivas, & alterantia ferbentia.

Quoad Purgantia: propinquant primò mitiora, hinc potentiora & generosiora, qualia supra de lue Veorea & calie fuerunt propōita.

Purgantibus succedunt Saderiva, quæ inter primum locum tenent Viperæ, quas commendat ARETÆUM l. 4. & GALENUM l. 1. de simpl. med. Facult. cap. 1. quarum quidem virtutem in dubium vocat ERASTUS 4. Diſſ. contra Paracels. ZACUTUS LUSITANUS l. 1. de Med. Princ. Hist. 5. & PALMARIUS de Elephant. cap. 9. Commendantur autem Theriaca benedicta viperina, pulvis, essentia & sal volatile viperarum, sal volatile cornu Cervi, spiritus falis Ammoniaci, sal volatile & Quinta essentia sanguinis humani, Tinctura Antimonii coarallorum, antimonium diaphoreticum martiale, sulphur antimonii autatum. Ubi Remedia aliis usitata & vulgaria non valent, tandem ad Artericum haum confugendum est, quod moderante Ductore RHEFELD leprosum quandam restituit, præmilis Digeſivis & Lavativis per Alvum à nempe dedit sequens:

℞. Murr. perlar. calc. ℥iij.
Sals. Sumar. ℥iij.

M. l. pulvis.

Divid. in 4. part. æqual. S.

Pulvis incidet.

Vel

℞. Mercurij vici gr. iv.
cum Theriaca fecit Bolum. S.

Saccharum purgans.

Quibus præmissis ad arsenicum fecit accessum.

℞. Recrement. Urar. q. v.

Redigatur calcinando in Cineres, à quibus more solito à l. Lixivium, ad dimidium potest incoquendum:

℞. Huius lixiv. menſ. iv.

℞. Arsenic. albiss. ℥iij.

Coqu. in Olla per horam unam aut alteram, semper lignea spatula movendo, donec ferè sit consumum Lixivium; sic fiet massa spongiosa, tunc novum affundatur Lixivium, & Coctio repetatur; si mox Arsenicum, erit solutum, quod solutio decantetur in aliud Vas purum, in quo pro præcipitatione addatur sequens:

℞. Ceraſ. R. ii.

Acet. distill. q. s. ad solutionem, quæ filtretur, Hac solutione tantum præcipitur, quantum possibile, edulcoratur, & esalccetur.

Exhibat doles 8. per tot dies, incipiendo à gr. iij. singula aurore gr. i. augendo, & ad ℥ss. assumendo. Potest lo mi in Theriaca in paſco Bolli, vel cum antimonio Diaphoretico, & paſco facchari in Jusculu vel cerevisia calida bono semper sequente fuisse. Post balnea & scarificationes simul à liquoribus adhibitis quædam deciderunt, & ita Ager sanitati fuit restitutus.

Alterantia denique sunt vel Interna vel Externa. Inter

Interna eminent ea, quæ Membra 1. de Scabie dixi, & omnia Abhorrentia, uti sunt Corallia, Conchylia, Lapilli canerorum, Antimonium diaphoreticum simplicia & compositum, aliq;e huiusmodi pulveres: quibus & plantarum Epaticæ & spleneticæ adungi possunt, e. g. Fumaria, Eupatorio, Chelidonium, de quo vid. HAFENREFFERUS de Affectionibus Cutis p. 128. scorzonera seu Vipera, quæ ZACUTO LUSITANO lodatur à Tinctura Tartari simplicia & antimoniat. De carne Asini pulli comesta vid. BARTHOLINIUS Cens. 6. Hist. 31. utut Carnis bujæ etiam AMATUS LUSITANUS C. 2. Cur. 34. inter causas lepræ externas referat: Mulvi caput combustum laudatur in SENNERTO Pr. cap. 5. p. 177. sanguis leporis, & cinis leporis; item Fel & sanguis Accipitris vid. HAFENREFFERUS l. 4. p. 130.

Externæ prolute balnea in scabie commendata, aut juxta RULANDUM cap. 4. p. 471. ex Plantagine, Pilis, & Folis Quercus; & quod WECCKERUS in Aetideis specialis l. 2. pag. 604. describit à inguentum ex succo Lapathi majoris Hæmæfferri, Unguentum medicamentosum Myrsinæ & Oleum sulphuris Rulandi, de quo l. 4. Quidam Theriaca commendant, quibus ramen contradiat HAFENREFFERUS l. 4. p. 127. & ZACUTUS LUSITANUS loco allegato.

MEMBRUM IV.

De Elephantiasi Arabum.

Elephantiasis Arabum ejusque causæ, item quomodo à Elephantiasis Græcorum seu lepra differat? Membra antea d. 3. dixi. Effectus ut plurimum est criticus; ideo in cura cavendum ab externis repellentibus, non sicut acrimoniae effluente intempèstivè cohibito, & Transpiratione insensibili impedita, per metastasin eius, Althmata, catarrhus suffocativos, peripneumonia, hydrops pectoris, lethargus, similiaque mala, quæ alias à scabie retrorsum aut ulceribus Crurum intempèstivè oculis oriri soleat, excidentur.

CURA.

In Cura, seri acrimonia temperetur ejusque colluvies per purgantia evacuetur, pro quo scopo coſert Mercurius dulcis; Jalappa, & omnia supra Membra 5. in scabie laudata.

Item

℞. Herb. fumar.

Secunda.

Nemular. rec. 20. M. l.

℞. Her. hyper. M. l.

Rad. anal.

Caryophyllat. an. ℥vi.

Cor. ligni guajaci ℥i.

Sem. Anis.

Fruct. 20. ℥iij.

Incisa & contusa includantur nodulo. D. 8.

Nodus sanguineum mundificans.

Affundatur Vin. Rheum. Med. ii. de quo mane & à meridie bonus haustus capiat.

Quid si nodulus hic lassare debeat, solia fenæ, Helioleboris niger, & colocynthis addi possunt.

Externæ conveniunt abstergentia saturnia, martialia, & Veorea; unde applicari potest Emplastrum griseum seu de lapide calaminato, vel emplastrum de spermatæ Saturnorum campoboratum enſissu in Append. M. A. N. C. Anni 6. & 7. Tit. 25. p. 186. omniaque in Diſſert. de Uſu & abusu Præcipitant. cap. 3. §. 2. allegata; item Emplastrum de alcalibus TACHENII in morb. princ. p. 119. vel ad hunc imitationem concinnatum Emplastrum Mirabile Mercurii sequens;

℞. Ol. Olivæ. ℥iij.

calefacto adde

Sap. venet. ℥ss.

Ceraſia alba pulverisat.

Mund. erib. an. ℥i.

Coquantur lento igne in Emplastro consistantiam, circa finem addendo

Camphe. ℥i.

Convenit quoque emplastrum saturninum polyæthredum, quod videbitis in Collig. Formular. item emplastrum Nigrum Helmontii.

Pedes autem simul fasciis involvantur, incipiendo à Talis usque ad Genua.

Quod

Quod si inflammatio erysipelacea iuxta, quod non raro accidit, a dictis Empiistris abstinentium, donec inflammatio hæc debitis remediis, de quibus suo loco, discussa fuerit.

MEMBRUM V.

De Serpigne & Lichene.

Affetus hi maximè sibi sunt cognati, & gradu tantum differant. (C) De Lichene enim, Germ. *Schwinden, Flecken, Zitternadeln*, cutis est aspera cum pustulis hinc inde erodentibus, erulis furfuraceis, & cum summo pruritu ad partes vicinas serpentibus; in *Serpigne* verò, vulgè Ger. dicta in *Vermis*, seu *Vermis dormientes*, Alperitasti & Pustulis cutis dolor & ardor conjuncti sunt, unde etiam GELSO hunc *Sacer* vocatur, & serpendo pariter se extendit, hinc etiam vulgè scabies serpens dicitur. Pustulæ hæc, si summæ tantum cutis erodant, *Herpes* ferri seu *Herpes exanthematicus*, item *induratus* vocatur. PONTIUS quidem de *Med. Indur.* obs. 16. *Serpignem* cum Lichene confundit, dum *Serpignem* per pruritus definit. Verum licet in Lichene nulla symptomata graviora conjuncta sint, certum tamen est, quod in *Serpigne* major acrimonia, adeoque major sanguinis & feri diuturnitas peccet.

CAUSA.

Causa *Serpignis* & *Lichenis* est eadem ac de scabie dixi, *ferum nempe acido salum* circa glandulas subcutaneas effusum; utur hujus Acrimonia ab ea, quæ in scabie peccat specificè differat, adeoque per varia cutis textura nunc scabies, nunc *Serpigo* & *Lichen* oritur.

PROGNOSIS.

Serpigo & *Lichen* sunt sine periculo.

Lichen faciliè curatur; difficilior autem *Serpigo*.

Imò si totum corpus ab hæc defecerat, lethalis esse solet; dum simili quoque ratione interiore & exteriora erodantur.

CURA.

In *Serpigne* & *Lichene* *Massa sanguinea purificanda* & *alteranda*; unde etiam eadem methodo per purgationem, in specie pilulas mercuriales, & *sudorifica* instituenda, ac supra *Membrum 1.* in scabie dictum fuit: quibus etiam, in casibus desperatis *salivæ* adjuvenda; quo etiam *Fomiculi* pertinent.

Quoad *Alterationem* præter supradicta in scabie, in *Serpigne* conducunt saturatio, in specie saccharum saturni, Balsamum saturni, tindura antipithica *D. Michaelis*. Quoad *Saturatio*, sunt hæc vel blandiora vel magis potentiora. Inter blanda laudantur in *Serpigne* & *Lichene* aqua spermatæ tanarum, florum omnium, calcis viræ vel solitaria, vel cum saccharo Saturni mista; oleum ovorum, nicotianæ, cereæ, radix Lapathi acuti cum aceto in formam linimenti subdita; Linimenta ex oleo tartari per deliquium, Cetrulla, & camphora. vel linimentum Butyri formæ BORELLI Cap. 4. observat. &c. ex oleo tartari per deliquium cum oleo Lillorum alborum, Amygdalarum dulcium & aliquot granis camphoræ. Vel subigatur fortius lialivum cum oleo Baccarum sambuci expresso, donec lactescat & applicetur; Lixivia enim acidum in glandulis subcutaneis stagnans destruat & invertunt. Unguentum album camphoratum, nicotianæ, & SCULTETO *Armeniacum*, *Chirurg.* observ. 39. laudatum: Unguentum nobile *Myrsinæ*, Diapompholygos, de mercurio dulci, saccharum saturni, tutia. Vel

Unguentum alium vel resat. *31.*

Mercurii dale.

Olei tartari, d. an. *3ii.*

Cera vel sapo, *3i.*

M. D. S.

Unguentum Purgans.

Alias quoque sùpo Venetus cum Spiritu Vini redificato

subadus instat laetis, ac cum lineis inde madefactis applicatus lichenem tollit, quibus & amalgama saturni admisceri possent, ad quod imprimis pertinet mumia saturni cum unguento digestivo, & POTERIO P. 3. obs. 65. & 80. commendata, & in *Pharmac. Sæpt.* approb. delicta; item emplastrum ex saturni saccharo, de ranis cum Mercurio, & omnia externa *sup. Membrum 1.* in scabie laudata. Inter potentiora sunt arcasum corallinum, Mercurius sublimatus albus, Turpetum minerale, Aqua divina Mercurii, liquor Mercurii saccharinus, & liquor Mercurii acetosus *Myrsinæ*, huius unguentum medicamentosum, unguentum secretum *Riverii* ex unguenti Rosæ, *3i.* & Mercurii sublimati *3i.* Vel

U. Aquacalcis vici 3i.

Mercurii sublimati 3i.

M. D. S.

Aqua purgans.

Cui etiam *31.* val. gr. xv. Camphora addi possunt.

Istius epithematis applicetur.

Vel applicetur epithema in *Colleg. form.* laudata.

In *Dalero* *Serpignis* exorniore leniendo convenit *Mistura RIVERII* ex *pol. pomor. parid.* No. vi. cum *3ii.* *Olei Rosarum*, & pauco *Lactis malibris*; vid. *Observ.* pag. 279. &c.

Notandum adhuc, quod impetigo seu lichen in foveis necnon Vino indulgentibus, eritque quasi efflorescat & integros Artus, maximè pedes occupet, quo in casu ratio- nem Easternorum eadem cautela observanda, quam heri in *Membrum 4.* de Elephantiasis urabam audivissim. Prodest in hoc casu epithema se focus ille elegans contra erysipelata in *Colleg. Form.* ex lithargyrio, myrrha & olivano cum Vino & Aceto laudatus. Alias cortex mediceus sambuci recens contusus & calidè applicatus, egregiè etiam convenit,

MEMBRUM VI.

De Phlyctenis.

Phlyctena seu *Phlyctenides*, Germ. *die hitzige Blattern*, sunt Vesiculæ parvæ pruriginosæ, & ferventes, sero lim- pida repletæ, quæ intra digitos & circa carpos oriri so- lent. (D)

CAUSA.

Causa *proxima* est serum plûs minis acre sub glandulas miliares seu subcutaneas.

Remota est Frigus, post ignis aut Balnei calorem subito admissum, ac quando aliquis ex loco æstuoso, aut post vehementiora corporis exercitia cum sudore, acri frigidi- ri se exponit.

PROGNOSIS.

Pustulæ hæc, uti celerrimè generantur, ita citò & intra biduum ad summum evanescent; Interdum tamen in scabiem & *Serpignem* degenerant, imprimis quando nimia feri acrimonia peccat; vel Phlyctenæ ex inepta extero- rum applicatione retropulsæ fuerint.

CURA.

In *Cura* conveniunt *Purgantia* & *sudorifica*. Quoad pur- gantia:

U. Crem. tartari 31. vel gr. xii.

Nitri antimoniæ.

Antimonii diaphor. an. gr. vi.

Stamm. sulphurati. gr. iv. vel v.

Olei distillat. fenic. gutt. ii.

M. f. pulvis 3.

Pulvis sanguinem purgans.

Vel

U. Salis abstr. vel *Nitri antimoniæ.*

Antimonii diaphor. an. gr. xii.

Pulv. talapp. 31.

Stamm. sulphurati. gr. iii.

M. f. Pulvis.

S. ut antè.

Vel in forma Pilularum.

U. Extr.

(C) *Ανχία*, Lichen est summa cutis asperitas cum leni pruritu: dicitur Impetigo vulgè, & Mentagra Plinio. *Ανχία* furfuræ dicitur, & *Ιχθυα*, quod cuti tenaciter adhaeret: vel parvis dicitur *Ανχία*, lambo, quod morbus hic superficialiter cutim lambat. Quam *Serpignem* vocat A. & Herpes, *Ιχθυα* Gregorium, ab *Ιχθυ*, ictu, ictu. Hujus due species vulgè, *Ανχία* seu miliaris, & *Ιχθυα* seu exodens, ut infra Author.

(D) *Φλυκταινὰ* dicitur, fletu, ebullit, quod Pustulæ sint fervide & calore mistæ.

℞. Extr. Cakel. vel Fust. Sym. Crell.

Mercurii dulc. aa. ℥. xv.

Scamm. sulphureos. gr. iij.

Cum ℞. Fumar. f. Pil. D. S.

Pilule Sanguinem purgantes.

Inter sudorifera conveniunt, quæ Serî acrimoniâ simul temperant, v. g. Cornu Cervi usum, & sine igit præparatum, Pulvis Diaphoreticus Linderi, Antimoniolum Diaphoreticum simplex & Martiale, Baccardum Minerale, Cinnabaris Antimonii &c. cum Rob Sambaci, Theriaci, &c.

℞. Aqua Fumar. vel Strak. ℥iij.

Antimonii diaphor. ℥i. ad ℥i.

Baccard. Mineral. ℥i.

Syr. ex rosa Ciris vel Rubi. ℥iij.

M. D. S.

Mistura Sanguinem purgas pro aliquot vicibus.

Capiatur pro duabus vel tribus doibus, vel cochleatim pro

scopo temperandi.

Exterius conducunt in principio Macilagoesa temperantia, v. g. Mucil. Sem. Cydoniorum, Pyluli, Foenugræci, Lini, &c. cum Aqua Sperm. Ranarum extractis; progressu vero temporis Aqua Calcis vivæ, Ung. de Lithargyrio, Dia-pompholygos, Album camphoratum, Linimentum Saturninum Zosteriferi, vel per se, vel mixta cum Amalgama te Saturoi: Vel

℞. Olei Jafmæ. vel Amygd. dulc.

dulc. Saturni. (ex infus. Misti vel Litharg.

cum adesto parat.) aa. part. æqual. vel q. l.

Milla agitentur probè in consistentiam Linimenti.

D. S.

Unguentum Refrigerans.

Vel

℞. Crem. Lactis.

Arcis Saturni aa. part. æqu.

Misc. probè pro Linimento.

D. S. ut antè.

MEMBRUM VII.

De Sudaminibus.

Sudamina Græcis *ἰδρωμα*, à Phlegmâ, uti & Epinythidibus, Terminis, & Effluviis, parum differunt, minora sunt, & Milli grana similia. Germanis, vocantur *Schweißblutchen.* (E)

CAUSA.

Causa proxima est serum plus minus acere.

Causa remota est sudor copiosus impeditus, aut Intemperatè suppressus, qui ratione acrimoniâ plus minus intensè Cutim exacerbat, & cum pruritu exasperat.

CURA.

Internis conveniunt, post leviore purgatione, Medicamenta diaphoretica, imprimis Cervina & Antimoniata, qualia sunt cornu Cervi sine & cum igne, Antimoniolum diaphoreticum, Pulvis diaphoreticus Linderi, &c. mane cum Rob Sambaci, aliquoties repetendo.

Exterius aliis commendatur Indufum mandatorum & calidorum frequenter mutatio, hinc pars cum Lactè aut Aqua Calcis vivæ abluta, addendo gr. usum vel alterum Camphoræ; convenit etiam Unguentum de Lithargyrio.

MEMBRUM VIII.

De Sironibus.

Sirones, Germanis *Reitfiesen oder Sauren*, sunt Pusculæ in volis Manuum, atque pedum plantis ætivo tempore

(E) *Fiunt*, Sudamina, ab *ἰδρωμα*, *sudor*: sunt enim Pusculæ ab sudore (præsertim genitalium partium ex Hippocrate) *externa*. Epinyctides à *νύκτα*, *nox*: Pusculæ piffine, multu præsertim contempores & maxime cruciantes. Plinio Epinyctides dicuntur Pusculæ livens & multibus impetant. Terminthi dicuntur parvi tumores seu tubercula, in cruribus præsertim & ubi sunt subactantia, supra qua Pusculæ nigra quandoque emittunt. Effluvia dicuntur barba vocantur appellatur parvè thus arbor, quod scilicet tubercula hac Terribentis fructum emittunt. Effluvia dicuntur barba vocantur appellatur parvè thus arbor, quod scilicet tubercula hac Terribentis fructum emittunt. Pusculæ bullarum vel squamarum instar, extantem carnem bobentes, quæ Squamulæ pedicularis appellas Paracelsus, easque metastississimè semitissimas esse ait, ex mineralium semine basitibus ortas. Hinc videtur quando inter se differant Sudamina, Phlyctæne, Epinyctides, Terminthi, & Effluvia.

(F) *Vide eandem Observationem tom. 1. col. 1484.*

(A) *Vari Græci dicuntur torbo fortissimè ab ἄρδω Ros, quod circa gratia flores erumpere solent.*

emergentes, & cum infigni pruritu molestantes, in quibus subest Simum Formicæ, hoc nomine gaudientem, genus latet; de quibus & horum effigie, Microscopii ope observatis videbitis in *Obs. mea Alibi Brud. Anni 1682. inserta.* (F)

CURA.

Quod *Curam* ante omnia Sirones totus lateores Acri effodiendi sunt; hinc locus Vini, in quo Abfinthium, Colocythis, Myrrha, Allium, Porrum, Nasturtium, & similia Vermes necantia, incocta, item Halicium Muria, abluatur; tandemque applicentur Linimenta Mercatoria hactenus præscripta, imprimis Unguentum ex succo Lapathi acuti, Scabiosæ, Abiachi, Tanacetii, & Mercurio vivo paratum, quod describit SENNERTUS *de l. 3. p. 118.* vel aliud Unguentum ex Aloe, Sulphure & Oleo Nicotianæ paratum, qui similiter aliquid Mercurii vivi vel dulcis admisceri possit.

Internis præter purgationem Mercurialem & sudorifera, propinetur Elixiria Mithæ tartarizata, Tinctura Antimonii tartarizata, Elixir Proprietatis cum & sine acido, spiritus Cornu Cervi, salis Ammoniaci simplex & oleosus, &c.

MEMBRUM IX.

De Variis.

Vari, Germ. *die Tumor*, sunt tumores duri & parvi, ex rubedine in fumantes tandem albicentes, qui stipulimè in Facie & Collo oriri solent, & aperti pus crassum & tenax fundunt, magnitudine grana Cannabii ut plurimum æquant, si non superant, & tam Adolefcentis quàm Virgines ad Venerem aptos præ cæteris molestant, unde frequentius nos tam à sero excrementitio, quàm alimentitio, & fermento seu spiritu generali præter naturam inquinato, dependere videntur. (G)

PROGNOSIS.

Per se sunt sine periculo, adeoque *Curam* eorum CELSUS inceptis admodum.

Nihilominus, ubi Rubor intensus conjunctus erit, difficilis satis est Contractio, & licet pusculæ remaneant, Rabedo tamen permanet; cui si inflammatio & saucio conjungantur, Lepre imminens signum est.

CURA.

In Cura ad serum nutritionis iniquitatem respiciendum, ejusque Acrimonia temperanda est. Talia inter, præter haec in *Scabie* & reliquis Cutis Affectionibus dicta, conveniunt:

℞. Pulv. Poffal. min. ℥i.

Lapilli. Camer. præp. vel Ebor. flos ignis ℥iij.

ad ℥iij.

C. l. q. Syr. Cichor. l. Eleftharium.

D. S.

Eleftharium Sanguinem mundificans.

Vel

℞. Conserv. Fumar. ℥iij.

Ebor. flos ignis

Lap. Camer. præp.

Univers. flos. ℥i.

C. l. q. Syr. Cichor. cum Rhubarb. l. Eleftharium:

D. S. ut antè.

Pro Potu ordinario commendatur Serum Lactis.

Inter *externa*, & quidam in principio, sufficienter distantiâ, hinc Emollimenta, & tandem Erodentia. Imprimis commendantur à Prædictis Aquæ Lil. alborum, Flor. Fabarum, Rosarum, Sigilli Salomonis, Sperm. Ranarum, Flor. omnium, Oleum Tartari camph. destillatum, Pari-

na

Pars afflta est Cutis & Cuticula: & quidem certa illius in Facie ac Manibus textura.

CAUSÆ.

Causa Proxima est vel Interna, vel Externa, vel utraque simul. Causa Interna est Serum nutritium in Valvularum, lymphaticarum interstitiis, intra Cuticulam, & Cutem pariter, calori Solis expositum, flagrans: Inter Causas Externas notissima est Solis ardor, dictum Serum in partibus cutaneis, imprimis Faciei ac Manuum poris, in Gelatinam quasi coagulans & entiscans; unde Aërio tempore suboriuntur, Hyerno vero iterum evanescent. Quod verb certa quidam Cutis textura, immo certa forsan Seris nutritii textura, concurrat, probare videntur, quod illi quoque, qui Radiis solaribus non adeo exponuntur, & imprimis Capillis, raris præditi, Lentiginibus utriusque efficiuntur.

PROGNOSIS.

Bestigium Cuti pertinacissimè adhaerens, nec facile curatur, imprimis in iis, quibus jam per aliquod tempus efflorescere consueverunt.

CURA.

Præcaveri solent lotiones Faciei ac Manuum cum Albumine Ovorum coagulato, & Aqua Rosarum, vivendo simul tempore Verno Radios solares: scuti etiam Lentiginum Cura per sola Externa insiditur, & quidem majori cum successu, si à causa externa quàm interna, origines ducant. Nihilominus tamen præstat etiam Laxativa blanda, Serum tartareum, exhibere, ex Flor. Acaciarum, Fol. Sennæ, & Tartareis, & hinc sudorem provocare, post quem Lentiginis primo Vere prodeuntes facie Lineæ albae tolluntur: Prodest etiam Elixir proprietatis sine acido.

Externa inter conveniunt Aqua Florum Pabularum, Florum omnium, Rad. Sigilli Salomonis, Scrophulariarum, Leucolei bulbosi, & Saryri maculosi, Aërium destillatum, succus Citri affrictus, Decoctum Colmeticum, & Unguentum tam Nobile Myrsicini, Pulvis Rad. Iros Flor. & Bryoniae, Mercurius dulcis, Mag. Saturni cum Oleo Tartari præcipit, Colmeticum clarum, & Cerussa, Antimonialis, Camphora, Lac Virginis, tam SCHROEDERI, ZWELFFERI in Append. Pharm. Aug. p. 299. & WILLISII Pharm. Rat. p. 2, pag. 471. descriptum, tam supra membrum 9. in Cura Varicorum communicatum, Oleum Ovorum, Ligni Heracini, Guaiaci, Berulæ, Cerae, Saponis, Oleum Tartari per deliquium, Arcanum Tartari, & ex Corroisvis liquor Mercurii saccharatus Myrsicini, E. D. MICHAELIS commendat sequens Linimentum:

℞. Oili.

Cerass.

Myrrh.

Sulphuris vulcan. ʒiʒ.

Camph. ʒi.

Cum L. q. Ping. gallinæ. f. Linimentum.

Plura qui desiderat, vident JOHANNEM-BAPTISTAM PORTAM in Mag. Natural.

Talia autem Externa semper insurgunt tempore nostro, matutino verb Aqua fontana rursus abluantur. Utriusque verb Cutis post tales inunctiones vadit semiquamola vel furfuracea, quæ particulæ demum commodissime per Asurgens humane inunctionem separantur.

MEMBRUM XI.

De Ephemelidibus.

Ephemelides sunt Maculae Cutaneæ fuscæ, & interdum asperæ, Mulieribus communes, quæ possimum frons, interdum Genæ, immo Collum, & Manus quoque decurpant, in longum & latum, & sæpe ad Palmæ magnitudinem se expandunt: Gravidæ in specie afficiunt, in quibus etiam per reliqua Ingravitationis Signa dignoscuntur. (1)

R. r.

PARS

MEMBRUM X.

De Lentiginibus.

Lentiginæ, Germ. Sommer-Spreßen, sunt Maculae obscuræ flavæcentes, magnitudine Lentis, & utriusque totam Faciem, Collum, Pectus, ac Manus defordantes. (H)

Tom. II.

(H) Lentigo Graeci ὄψις lentis, lenticula, leguminis generis: à similitudine dicuntur macula, candidarum præsertim mulierum faciem, pectus, & manus defordantes.

(1) Ephemelides quæsi dicuntur Maculae Salutaræ, ab ὄψις Sol: dicuntur asperiores in facie possidens ex Solis ardore progremitæ; quævis autem quævisque ex Inflammatione, vel aliâ quacunque causa oriantur uterque macula ista, semper tamen ab similitudine Ephemelides appellantur.

Pars affecta sunt Partes Cutaneae in diſſis partibus.

C A U S A E.

Cauſa proxima eſt ſeri acrimonia, quæ tam in Gravidis, quàm interdum Virginitus, & Mulieribus non Gravidis Menſium ſuppreſſionum occasione, necnon Menſtruationis tempore non raro obſervari ſolet, unde Serum non parum alteratur.

Cauſa Remota ſunt variæ: Ex rebus Non-naturalibus maxime ſicci Cræſi Maſſæ ſanguineæ acrior. Ad res Non-naturales pertinet Aromata ſimiliterque Acræ oleoſa, & alimenta fermenticibilia, & colorandi vim habentia (K), v. g. Rad. Carotæ, Betæ rubræ, &c. Cereviſia & muſtum recens, Fraſcus horæi, & ſimilia menſtruationis tempore aſſumpta.

P R O G N O S I S.

Mulieribus, quæ in Menſtruatione vivunt, nec diſſos aut ulios Diæte urrores commiſerunt, Conceptionis ſignum exiſtunt, & in his etiam rariffimè curantur: imò ſi evaneſcant, mox redeunt, & plerumque uſque ad & poſt partum durant: in aliis Mulieribus, & Virginitatibus facilius cedunt, Menſibus ſcilicet ritè aut fluentibus, aut penitus ceſſantibus.

C U R A.

Pro Cura Ephelidum Rumedis Internis non opus eſt. Inter Externa prodeſt Fraſcio partium affectarum Pomò diſſo ſubacido, vel Pomò Citrio diſſo. Alias laudatur Linimentum ex Pulvere Bacarum Lauri decoratissimum cum Melle, quo Facies in Balneo laungur; item Emulſio ſemina Cannabis, ſuccas radicia Bugleſia, ſulphur vivum, & Flores ſulphuris.

M E M B R U M XII.

De Maculis Hepaticis.

Macula hepatica ita dicuntur, vel quòd hepatis colorem repræſentent, vel quòd vicio hepatis obſtrudti, nec ritè ſanguificantis, oriſi vulgò credantur; ſuntque Maculæ obſcurè ſavi coloris; nunc majores ad palmæ ſæpe latitudinem, nunc minores, quæ interdum evaneſcant, mox deinde emergunt, cum Cutis aliqua uſperſetur, & ſquamiſ occupant imprimis Collum, Peſtus, atque Dorſum, interdum Manus, cum ſingulari pruritu.

C A U S A.

Cauſa harum nil aliud eſt, quàm ſerum nutritivum, acidum, plùs minus viſcidum, in Valvularum lymphaticarum interſtitiis, occasione rigoris aut Aeris externi poſt Exerciſia vehementiora admiſſi, in gelatinam quaſi coagularum; unde à Lentiginibus viſi aliter quàm gradu differunt. Taxat quidem PLATERUS SENNERTUM, quòd hic Cauſam harum Internam, & Curam unam eandemque cum Lentiginibus ſtatuat: Sed ſine ratione cùm Maculæ ſe diſſe hepaticæ eundem cum Lentiginibus colorem habeant, ſilique, quibus Lentiginis familiares ſunt, pariter aſſiciant. Unde patet, quòd ſentendum de illis, qui ſanguinem ſicculeſcentum, & melanbolicum, quantum macularum hepaticarum cauſam, accuſant, quatenus etiam hæc ſubſecta illa, quorum Maſſa ſanguinea Sale volatili oleoſo ſeu bilioſo conſtat, aſſiciunt.

C U R A.

In Cura harum conveniunt abſorbentia blanda, & ſanguinem purificantia: unde præmiſſa pleniori Purgatione Mercuriali præſcribantur Vegetabilia amara Anticoſcorbuticiſſima in forma Nodulorum, vel Eſſentiarum, quorum formulæ hæc tenent diſſis patent.

Externa ſunt vel Blandiora, vel Fortiora, ſeu Rubeficientia. Blandiora ſunt Coſmetica hæcenus recensita, v. g. Radices Bryonia, Oxyſpathi, Symphyti majoris, Sigilli

Salomonis, Lac Virginis, Oleum Tartari per deliquium cum Oleo Amygdalarum dulcium in formam Linimenti redactum, cui etiam Olea ſarveroleſcentia, v. g. Oleum Jſalmi, Ligni Rhodii, &c. ad aliquot guttas addi poſſunt: Conveniunt etiam Linimenta ex Oleo Tartari per deliquium, Cereſſa & Camphora: quibus omnibus Meſcuris dulcis addendus.

Inter Fortiora eminent Sem. Sinapi viride cum Aqua appropriata in formam pulvis redactum, quæ in Balneo poſt ſudorem cutis fricetur, donec ſervor & punſio quædam percipiatur, hincque Cuticula mortificetur.

Ad Maculas ergò hepaticas optimam eſt.

24. Sem. Crucæ ſeu Sinapi q. ſ.

Contunde in Mortario, addendo Acetum, ut fiat inſtar paſte, addde

Salis com. ʒi.

Alum. Ovi. m. ſ.

M. ʒ. S.

Cataplaſma Abſorbens, & Mundificans.

Et hoc ipſo in Balneo Cutis maculata probè fricetur, relinquatur aliquandò, & abluatur poſtmodum cum Aqua communi. Fiat hoc aliquoties, uſque ſaltem ſingulis Anni quadris: vid. etiam TIMÆUS à Goldſtedt in epſt. lib. 6. epſt. 26. p. 229.

Ad Vires etiam uſurari poſſet.

Pulvis quoque ſemina Sinapi, cum ſapoſe, & ſucca Lappathi ſæpi miſceri, & ſimili modo adhiberi poſſet.

M E M B R U M XIII.

De gutta roſacea.

Gutta roſacea, à ſigura ſacies capræ, vulgò Germ. des. Kaffer Handel, eſt Rubor Faciei tuberoſus, puſtuloſus, Guttis interdum ſanguineis ſimilis, qui Naſum ſæpè & Genas inæqualiter, & valdè tingit, & potaturibus latè frequens eſt.

C A U S A E.

Cauſa eſt utriuſque Acidum volatile vinofum per glutinulæ Cutaneas ſecretum, & Cutim erodens; unde patet, quòd non ſemper tota Maſſa ſanguinea hæc dyſcræſia laboret; niſi aridum volatile præter ſaruram exiſtat, ſed ſerum tantum nutritivum ſub faciei Cutæ corruptum, cum eaſmodi homines quoad reliqua utriuſque maxime ſani ſint.

P R O G N O S I S.

Malum curatu eſt difficile, præſertim ſi facies ſimul puſtuloſa & exulcerata fuerit; & tunc utriuſque ad Mortem uſque comitari ſolet.

C U R A.

Internæ præmiſſio Nodulo purgante, & ſanguinem purificante, & in Plethorici Veneficione, conveniunt abſorbentia Terra, & Marina, e. g. Os Sepiæ, Lapilli Cæceorum, Antimonium Diaphoreticum Martiale, Tiſtion Coralliorum ſaſſifraga, Tiſtura Antimoni tartariſata, &c. diutius continuando.

Externæ Gutta Roſacea optimè curant ſeurrina, quæ Acidum illud promptè abſorbent, & vulgò propterea reſrigerare dicuntur: præterea Saccharum Saturnianum Cereſſa cum Aqua appropriata miſta, addendo parum Camphoræ, optimè hic conveniunt: vel et Saturno cum Aceto deſtillato ſoluto, & Oleo Roſaceo, ſit miſtura egregia in tali Gutta Roſacea; item Linimentum, ea Saccharo Saturni cum ſucco Sempervivi & Plantaginis paratum, crebriùs illitum, in ſpecie ſempermiſis in graviſſi Malo ſanguigniſ faciei per vires applicandis (vid. TIMÆUS lib. 6. Cap. 20. p. 225.) vel Scarificationibus Auricularum ab HARTMANNO commendatis. Porro cu expertum admodum ſequens laudatur Unguentum:

24. Piper.

Singulor. an. ʒi.

Sulphuris vivi ʒ6.

Ung. Penar. q. ſ.

M. pro

(K) Nevi Virginiæ, quæ quædam nimium æſtatis tempore Melanogenis in cibus intereunt, quarum ea tempore ſuavis maculæ, Melanogenarum colorem referantur, per univerſum corpus commaculatæ v.

M. pro Linimento; S.

Unguentum Singulare.

Vel Saccharum Saturni crebris in Cella in Liqueorem resoluatur Cutim albam valde reddit, si antea rubra pustulosa fuerit. Hic & alius irritis tandem ad Mercurialis accedendum erit. Quo etiam pertinet Ol. Tartari per deliquium loco humido salutum; & c.

℥. Aqua Flor. Fabar.

Sigill. Salem.

Sperm. Ranar. ana ℥ij.

Ol. Tartari per deliq. ℥℥.

Camp. cum Spiritu Vini solut. ℥℥.

M. D. S.

Aqua Mundificans singularis.

Occasione Affectionum Cutaneorum Cosmetica quaedam polycresita ad Cutim in faciei & aliis baculis dictis Cutaneis affectibus candidam, glabram & nitidam reddendam communicabo: Sit igitur

M E M B R U M XIV.

De Cutis Nigredine.

Nigredo Cutis, in specie faciei & manuum, ab Igne aut Solis ardore contracta, tollitur cum Aceto destillato, cui etiam simul ante destillationem flores Fabarum, Liliorum alborum, Jasmini, Ceraſi, radix sigilli Salomonis, Scrophulariæ infundi possunt. Melius & magis euphoribon est succus Citri, vel Caro ejus fuculentata, quæ affricando omnem Cutis Nigredinem tollit. Huc etiam Camphora & Spiritus Vini Camphoratus pertinet: vel de Essentia Benzoe rubicundata inbillitur Aquæ comomani, vel Aquæ Rosarum quantum velis, & sit liquor albicans lacteus, quo mane & vespere abluatur facies & manus, permittendo ut sponte succedant. Quidam cum Emulsionem, et Nucleis Persicorum & Amygdalis amaris, cum Aqua Spermatis Ranarum, florum omnium, florum Fabarum, &c. parata, Cutem non faciem lavant. Glabram & nitidam Cutim imprimis reddit Magisterium Mercatorum, vel eum Unguento Rosato vel Pomato, aut Pulveris forma applicatum; unde v. g. sequens laudatur Pulvis:

℥. Amygd. amar. exc.

Nocl. Persic. exc.

Sem. Papav. albi,

Rad. Iros Flor.

Sigill. Salem. ana ℥ij.

M. f. l. a. Pulvis: adde

Amyli,

Far. Fabar.

Mag. Mercat. an. ℥j.

M. D. S.

Pulvis Mundificans.

Haic, qui ferre possunt odorem, addi possunt

Molchi,

Zikeri an. gr. iv.

Vel

℥. Sapon. Vinct. rasi & exsic. ℥℥.

Nocl. Persic.

Sem. Papav. albi ana ℥ij.

M. f. l. a. Pulvis:

cui adde

Amyli puriff. ℥ij.

Farin. Fabar. vel Lupinor.

Pulv. Rad. Iros Vini. ana ℥ij.

Prode missis adde pro Inbata

Molchi opt.

Zikeri an. gr. viii.

D. S. ut supra.

Ufus est, ut tempore vespertino hoc introtram laſſi ℥ij. vel ℥ij. horum Pulverum cum sequentibus Aquis ad Pulvis firmam humedetur, & Facies, Collum & Manus, aut loca pustulosa, leniter eodem illinantur; altero mane cum Linteo, prælatâ Aquâ humedato, densâ abluatur, & ita aliquandiu moderatè continuetur.

Aqua in hunc usum fit:

℥. Aqua Rad. Scrophular. ℥ij.

Flor. Fabar.

Rosar. an. ℥℥.

Tom. II.

Rad. Lil. albor.

Sigill. Salem. an. ℥ij.

M. D. S.

Aqua Purgans ad Pulverem.

Mistura hæc cum paulillo Olei Tartari per deliquium acui poterit.

Item:

℥. Facul. Rad. Bryon.

Ari,

Sacch. Saturni

Mercurii dulc. an. ℥℥.

M. per Pulverem; S.

Pulvis Purgans.

De hoc parum cum prælatâ Aquâ humedetur, & dicto modo procedatur.

Delicatioribus his non contenti, ad ipsum Oleum Tali provocant, quod tamen graminum vis habetur, & quæ sub Olei Tali nomine venditur, nil aliud fuit, quam subtilissima Tali Calx in Alkali quodam fixo obvelata, ad quod plerumque Borax, vel Sal Tartari expetitur: vid. Pharmacopœia, Collig. in Schröderum pag. 110. Non inutiliter ergo loco hujus Oleum Tartari per deliquium, eum Aquis dictis dilutam, adhiberi potest.

Interdum Saponem odorati Cosmetici expetuntur à Virginitibus delicatis, quorum compositiones videbunt Schrödero, l. a. p. 180. Vel

℥. Sapon. Vinct. rasi & exsic. ℥℥.

Amygdal. amar. exc.

Nocl. Persic. exc. ana ℥ij.

M. f. l. a. Pulvis:

adde

Pulv. Rad. Iros Flor.

Arom. an. ℥j.

Sal. Tartari ℥℥.

Cum f. q. Effect. Benzoe cum Spiritu Rosar. parato

f. l. a. Massa saponiformis;

addendo

Ambra griff.

Molchi opt. ana cum Spir. Rosar. sol. ℥℥.

Zikeri gr. v.

Olei Ligni Rhodii gutt. xv. ad xx.

Formetur Globuli saponiformes, leviter exsiccandi.

Tandem sit adhuc locus multis utilis dicamus:

℥. Mercurii sublimari ℥ij.

bulliat in

Aqua commun. ℥℥.

quousque sentiantur aliqua acrimonia in lingua, hinc adde

Ceraſi. ℥ij.

Bulliant parum: Mistura clarificetur cum Albumine

Ovi, coletur, & usui servetur.

Sub usu agitur crebris.

M E M B R U M XV.

De Porriginis.

Porrigo Capitis affectus satis sedus est, Scorbeticis, Lue Venereæ affectis, & Leprosæ familiari. (L)

C A U S A.

Causa est Acidum plus minus salsum, à Sero tamen viscido & corrupto temperatum; quod in partibus Capitis Inercentancis flagrans Poros Cutis obstruit, coagulat, & sic insensibilem transpirationem impedit: unde propter aciditatem cum Sero viscido combinationem non Ulcuscula humida, uti alias ab Acido acriori in Sero prædominante fieri solet, sed Crustæ densiores, & densè subinde compactæ, & successivè lamellatim sibi invicem superstruunt, & successivè exsiccatæ Forfurum instat decidunt.

C U R A.

Interdum conveniunt Purgationes Mercuriales, Noduli laxantes & Sanguinem purificantes, similiaque remedia, quæ scabiem & serpiginem curant.

Interdum usurpantur Lotiones Capitis, singulis septimanis instillandæ. c. g.

R r r 2

℥. Herb.

(L) Pityriasis vocatur Græci, quam Latini Porriginem appellant: utriusque à vitio, sursum: ex quo hoc Morbi affecti symptomata veluti sursum: à capite vel quocunque loco affligo scalpulis erellat. Porriginem labem esse Porci familiarem ostendit illud juvenalis: — grex totus in agris Unius Scabie cadit & Porrigine Porci.

℥℥. Herb. Absinth.

Beenic.

Malva

Chelidon. major.

Saponar. 20. M. l.

Rad. Alib.

Lapathi acuti.

Bardan. an. ℥i.

℥℥. Riser. ℥i℥.

Bacc. Lauri.

Cateuyark. an. ℥℥.

Iocia & consula coq. in C. Lixivi.

Colatura D. S.

Lixivium Caput mundificans.

Fada infusio per 24. horas, bulliant ad humiditatis consumptionem, hinc fiat expellio fortis.

D. S.

Unguentum ad Capillos.

Hoc ipso Luna crescente illiuntur Caput, quod sub decremento Lunæ ultimo blandè abluunt, hinc Vino rubro aut alio austeriusculis irroratur, & hinc ulterius Linimentum continuatur.

Ad Canitium tollendum & Gra ebrelandum convenit Luna in Aqua Forti soluta, & Aqua simplici probe diluta & temperata; qua Capilli frequenter pedicentur. Quidam Pedine plumbeo Canos frequenter fricare jubent, donec migrediem canticantur. LANGIUS Lixivium Betulae, & BORELLUS Cantar. a. Olivar. 2. sequens laudat:

℥℥. Cinar. Clavell. ℥i.

Aqua pura ℥i.

Bulliant ebullitione una tantum in Vase aëreo: in decoctione ab igne remota extingue

Calcei vivi ℥i.

Qua extingita adde

Saturat. aëri.

Lithargyr. aur. an. ℥i.

Bulliant omnia simul bis vel ter.

ARTICULUS VIII.

De Capillorum Vitiis.

AD Capillorum vitia referuntur Calvities, Capillorum Deformium, Alopecia, Capillorum Tinea, & Plica Polonica. Calvities est, quando Capilli in summo Capite decidunt. Capillorum deformium dicitur, quando hi undique circum decidunt. Alopecia, quando Cutis nuda hinc inde conspicitur. Tinea Capillorum dicitur, quando hi frustulatim decidunt. Plica Polonica vetè est, quando Capilli in Cirrhos contorqueantur, ut nullo ierè modo explicari possint.

MEMBRUM I.

De Calvitie.

Calvitie in pluribus malum hæreditarium est, quæ in juventute incipiens nullo modo curatur, nisi Capillis factis pallietur. Alias ad Calvitie præcavendam MYN-SICHTIUS in Arament. Chym. Tincturam suam præparatam commendat.

Externè præscribuntur Cucuphæ Aromaticæ, imprimis ꝑ Calvitie à Nutrimeto vitioio oriatæ.

MEMBRUM II.

De Capillorum Destruo.

Capillorum destruo frequenter Morbis acutis supervenit, ubi convenit decoctum Rosmarini in Vino, vel Unguentum Sacroili, quo Capilli laxi simul regenerantur.

℥℥. Fol. Abies. maris.

Capill. venetis an. M. l.

Favi Mellis.

Laudani an. ℥i.

Myrtillar. ℥i.

Sem. Fœnogr.

Lini ana ℥i℥.

Ol. Amygd. dulc.

Vini gener. an. ℥i℥.

MEMBRUM V.

De Plica Polonica.

DE Plica Polonica, Affectu apud nos rarissimo, videtur SENNERTUS in Praxi l. 5. p. 3. Sæll. 8. a. 9. seg. DAVIDSONIUS in Commentar. super Perri Serenali Dani Medici Medicinæ Paracelsi pag. 451. & HERCULES SAXONIA.

Hæc de Vitiis Nutritionis læsæ.

S E C T I O XVIII.

DE SANGUINIS EX PARTIBUS REFLUXU VITIATO, ET EXINDE ORTA INFLAMMATIONE, TAM IN GENERE, QUAM IN SPECIE.

IN superiori sectione dictum, quid Sanguis ex Cordis distributus, in totum Corpus & omnes ejus partes de-

rivetur, ut in his partim Nutritioni inserviat, partim in quibusdam certam Fluidi separationem potiar ad

(M) Alopecia quasi Vulsus Morbus; est enim *ἀλωεῖς* Vulsus. Capillorum vel Pilorum significat destruo, quæ *σπῆ* Vulsus efficitur. Distinguis autem hic Auster (ut & alii quoque faciem ex Galeno) Alopecia à Calvitie & Capillorum destruo, quid nempè Calvitie, *περὶ αὐτὴν*, sive ex senio vel causa naturali; Capillorum destruo ex morbo acuto prægresso *σπῆ* accidit non conferimus; & Alopecia ex causa aliqua radices Capillorum vel Pilorum in *σπῆ* aliquo vitio corrupte oritur: quare à Celso Arca appellatur: quid *ἄλ* Morbus hic per longam spaciem *σπῆ* arguit similitudinem, Ophiastis à Grecis dicitur, ab *ὄφι* serpent.

Œconomia Animalis integritatem maximè necessariam. Jam vero sanguis non perpetuo ibi hæret, sed uti per arterias influit, ita per partes eribitur, naturaliter derivatur ex arteriis in Venas, per Venas deorsum refluit ad Cor: qui motus vocatur Circularis, propterea quoniam inflat Circuli ad id terminat punctum, à quo inchoavit. Jam vero, si arteriæ plus devehunt, quam Venæ revertere possunt, lædatur etiam distributio seu motus Circularis per partes & Vasa, unde plus minus vitatur; idque vel

(1.) Quando sanguis in parte quadam hæret, stagnat, & in via sua subsistit.

(2.) Quando extra partem effunditur in singularem Corporis quandam cavitatem.

(3.) Quando sanguis planè extra corpus effunditur.

Sanguis ergo in suo motu impeditur, & in quandam partem locis depositus, stagnat & hæret in Vasis Capillariibus venosis, & partium spæciali; vel in minori quâ, ita ut succellere intensibiliter evanesceat & discuti possit, id quod fit in *Congestionibus*, & inde natis *ſeſſionibus*, v. gr. Calu ab alto; vel hæret & congegitur in majori quanto sanguis, unde uberius collectus sanguis motu excandescit, ac molestem calorem in parte quadam sensili producit, donec sensum corruptus in pus vel sanem abeat: Unde prior mutatio vocatur *Inflammatio* seu *phlogia*; posterior vero *ſeſſus* seu *ſeſſio*. Quando vero sanguis in corporis Cavitate quadam, Humoribus naturaliter vacuum effusus, v. g. in pectus, vel cavum Abdominis, ac ibidem collectus in pus mutatur, vocatur tunc *ſeſſio*. Quod si sanguis planè extra corpus effundatur, generaliter *Fluxus sanguinis* seu *hæmorrhagia* vocatur; quod nomen licet in specie tribus locis in Naribus erumpit, in genere tamen cuique sanguinis extra corpus Fluxui attribui debet, & etiam solet.

CAPUT I

De Sanguinis in parte quadam stagnatione.

ARTICULUS I

De Inflammatione in genere.

Refluxus igitur sanguinis quicunque impeditur succellere inflammationem constituit; quia enim arteriarum Motus & per has sanguinis influxus est validus & impetuosus, ac propter canales Arteriarum quintoplo era flores ipsa Venis, refluus sit interruptus, & omnino perpetuus; necessarius sit, ut dum perpetuo influit, non tamen debet possit reflueret, ut exinde in parte hæret, hinc coarctetur, & coarctatus dicitur *tumor*, qui vocatur *Inflammationes*.

CAUSÆ.

Causa Materialis proxima omnis Inflammationis est sanguis collectus & stagnans in parte quadam, ob impedimentum sive ex Arteriis in Venas refluam, ita, ut plus influit per Arterias, quam reflueret valeat per Venas. Stagnatio hoc in loco est nomine Metaphoricæ, desumptum ab Aquis, quæ plus ad partem fluunt, quam reflueret possunt; nihil aliud est, quod si sanguis influit non refluit, sed coarctatur: Nempe si qualibet pulsatione dr. sanguinis per Arteriam influit, sed dr. per Venas solum refluit, remanet dr. qui stagnat, & dum continuat pulsibus semper maior maiore sanguinis hæret copia, sic necessaria oritur Inflammatio. Quod si vero in parte inflammata nihil omnino reflueret, adeoque reciproci spiritus Influxus sit motus, à quo sustinetur latus, necessaria supervenit tandem *Gangrena*, dum sanguis spiritus Vitalis Influxu privatus corrumpitur & putrescit, indeque pars, suppressis spiritus Influxu emoritur.

Jam vero cum sanguis, qui dat Inflammationem, sit materia rubra spirituosâ & calida, ergo enervat partes, & pars necessaria exinde rubor: quia vero plus influit sanguinis, quam refluit, dum ita stagnat & in parte hæret, necessarius pars *influxus*, & cum à Tumore discendatur partes fibrosæ, & hinc necessariis excitabitur *dolor*, & con-

sequenter *Inflammatio*. Hæc ergo quatuor modi dista Pathemata seu symptomata in omni Inflammatione observabilia sunt: sunt enim signa *Inflammationis Pathognomonica* & CELSO enarrata, nempe calor seu ardor, *Rubor*, *Tumor*, & *dolor*.

Cæterum dolor, qui adest, triplex in omni Inflammatione succellere observatur:

- (1.) *Tensivus*,
- (2.) *Pulsativus*,
- (3.) *Punctivus*.

Tensivus propter partes fibrosas & membranas, à sanguine congesto, & stagnante distentas & convulsas: *Pulsativus* vel pulsativus, quia sanguis influitus repercutiuntur patitur, à cuius influxione, & repercutiuntur impetu fit pulsationis sensus, & quidem à Fibrosarum, Membranas arteriarum, per quas sanguinis motus debitus nonnihil impeditur, constitutum Spasmo aut convulsiva Tensione, hinc ad Diastolen resistit, unde evenit ut pulsationes senties percipiatur. *Punctivus*, qualis adest in omni Inflammatione, ubi Membrana pars afficitur; & licet hæc ipsa nihil patiatur, tamen supervenit tandem Dolor punctivus; dum suppuratur Inflammatio, & in abscessum degenerat, superveniens, ac scribis salinis acidi salis particulis, partes nervas acicularum inflat pungentibus.

Hæc omnia manifesta sunt in parte externa visibili: Dolor pulsativus vero in parte interna, adeoque invisibili, item interdum Gravativus Ardor, & denique partis ordinaria Functio læsa, & Inflammationem committitur. Hinc observetur, quod quæ omnis Inflammatio est in parte quadam determinata tanquam in subiecto, semper hiis modo allegatis 4. Symptomatis, omni Inflammationi communibus, subinde simul prodeunt aut accedunt peculiaria quædam symptomata, ex partis specialis Inflammatione, non Morbi ratione, nata. Sic enim v. g. Inflammationi faucium in Angina simul deglutitio læsa & difficilis; in Meningide difficultas respiratio, ratione partis afflicte supervenient. Et hæc symptomata propria supervenient Inflammationibus, non quæ talibus, sed quatenus Inflammatio hæc vel illam partem affligit, adeoque huius partis Inflammatio speciale sibi symptoma adiunctum habet. Modo dicta quatuor symptomata in Inflammatione partis externæ sunt sensibilia, in interna verò non; unde cum sensu ardens, Dolores, &c. alia simul signa, v. g. Febres ardens, conjungenda sunt: Sic in Inflammatione podii res clara est, & quatuor illa symptomata percipi possunt si vero per aliquam internam partem afflicta, tunc alia concurrentia signa conferenda sunt: Sic in Viceribus inflammationis semper ponderis gravitatis sensus seu *Gravativus*, obtusus Dolor, præter dicta simul accedit. Ponam exemplum; Quando congeritur de Dolo Gravativo in Hypochondrio dextro nisi cum insigni Ardore istius regionis: pars ad tactum tumet, insigniter calet, & ad reitanciam quandam intumescit, interius Dolor Pulsativus profundus, admodum molestus percipitur, Tussicula adest inanis, difficultas omnib. respiratio, Febria Continua acuta, &c. Hæc signa conjunctim arguunt adesse Inflammationem Hepatis. Ergo hæc supervenientia posteriora signa innotuit partem, quam Inflammatio illa obidet.

Causæ efficiens, quare sanguis stagnet, seu Inflammationem, est vel *Externa* seu *Remota*, vel *Interna* seu *proxima*. *Causa Externa seu Remota* sunt varæ, quæ Visu angustando occasionem præbent, ut Impediatur Sanguinis motus: qualia sunt quæcunque, quæ vel partes & Vasa arde comprimunt, vel eadem angustant, vel quæ adstringunt, v. g. fortiores Ligaturæ, & Vincula iniecta, Lutationes, Fracturæ, Vulnera, Ulcera, Contusiones graviores, v. g. Testem ea Ratione violenta, aut alie quæcunque res extraneæ violentæ: Sic Spinæ post Offa fracta, aut post Cranium contusum altius eminentes semper Inflammationes inferunt. Item repentina ac adstringentia nunc inferunt, quæ evanescunt Inflammationes. Interdum sola Transpiratio à Frigore intercepta Inflammationem excitat. Sæpius Fibrarum nervorum, & tendinorum dolorificæ crispationes, & contracturæ, & hinc nata Vascularum capillarum arde constrictiones, Inflammationem inferunt; hoc enim est, quod quilibetque ferè Doloribus, in specie Fibrarum nervorum lationibus, frequenter supervenient Inflammationes, silique Tumores. Hæc siquidem irritat spasmum convelluntur, quibus convulsis dura redditur pars, unde pori non transmittunt sanguinem, sed pars tumet, & inflammatur: e.g. Dolori dentium ab acido, radicem dentis nervam morificante & vellicante, supervenit totius mali, & Capiti ipsius afflicti inflam-

mato-

matius, de qua vid. *infra* l. x. *sect. a. cap. 3. art. 3. ubi de Oden-
rat.* quia Fibra nervosa, & musculi vicine ex Dolo-
re per consensum afflicte se crispant, & levi quasi Spasmo se
contrahunt, quae crispatura Venae capillares coarctatae libe-
ram sanguini transitum denegant, unde postmodum Tumor,
& Inflammatio supervenit: Hinc & in Arthritide ex simili
causa Tumor inflammatorius, ut plurimum erysipelaceus,
supervenit; item in punctura Vespae, aut intrusione Spi-
nae. Talis Tumor non est causa afflicta, sed potius effectus,
sive productum eius & consequens doloris, & dependet ex
erigitione fibrarum partium. Unde ridicula est ea cura,
quae ad Tumorem, tanquam afflicta, dirigitur. Qui enim
tales Tumores simpliciter curant, ad posterius curam dili-
gant; eorum modo Causa dolorifica remaneat, ipsique
Dolor dilatur, omnis Tumor & praecaveatur, & incipiens
mox densatur curatur.

Causa Interna sunt in sanguine ipso influente, nempe
sanguinis motus circularis aequalis ineptitudo per quavis
Vasa capillaria; vel est in parte recipiente partem, nempe
quodcumque illud, cuius occasione Vix & partes angustant
ineptae fiant, ut sanguinem debite non transmittant.

Sanguis ad motum circulares impetus est duplici modo:

1. Quando nimis est viscidus, & crassus, ob Seri defectum
cuiusque nimiam abluptionem, quod tamen raritas
venit; aut propter Chyli crudioris ac glutinosioris
sua pituitae viscidam congelationem.

2. Quando idem sanguis nonnihil erugmentatus, aut quasi
semicoagulatus in quodam loco liquet & coarctatur,
hinc ita sublevis & Inflammationem ita infert.

Dispositio haec ad Grumescientiam sanguinis aptatur
Acido quodam viscido occulto, & nimis excessu sanguini
permixto: quippe per experientiam cognovimus, hoc potest
coagulare sanguinem: ita quidem, ut qui plus peccet Acidum,
eo magis sanguis ad Grumescientiam disponatur; sive
Lympham nimis acidam, sive res quaedam externa, sive aliud
quod, ipsi acorem imprimat. Quod confirmatur non tantum
per experientiam, dum sanguis in Liqore acidum immor-
tatur, sed etiam ex insitione Liquoris acidi in Venam
Canis. Hinc enim omnes Inflammationes erysipelaceae ex
Grumescencia aliqua sanguinis, facta ab Acido occulto,
inductae tales Coagulationes, originem ducunt: Hinc ver-
gr. a substantia frigida, post nimium Corporis motum ac
incalcescentiam, partibus internis subito coagulato,
subito quod spissatur, & condensatur sanguis calidus, nimis
attenuatus ac resolutus, unde Internae Inflammationes,
in specie pleuritidis, & Angios: hinc expositio Cor-
poris calidissimi Aeri frigidiore, immersio ipsius in Aquam
frigidam, sanguinem ad hanc Coagulationem, & hinc ad
eandem mala disponere solet; aut potius frigida post nimis
exercitia, in nimio Aëre ac Corporis calore, copio-
sius ingessit, saepius dicit pleuritides aut Peripneumonias
ex sanguine in praecordis condensato & nonnihil coagu-
lato, circa pulmones ac pleuram subinde subsidente, ac
Inflammationem excitante: vid. SYLVIVS de Inflammat.
Sed rarior ex recentis causis est Inflammatio: Nam vel
Universalis in toto Corpore, aut una quodam parte, aut
pluribus partibus simul, heret sanguinis ex causis illis fla-
guinis; aut danda foret ratio, quare praecipue in hac, non
vero in alia parte heret talis flagitium, adeoque sic ad par-
tem inflammatam simul respiciendum erit.

Hae duae, *spissitudo scilicet sanguinis*, & ejus *Grumescen-
cia* aliquis, ferè sunt *Causae Universales* Inflammationum
Spontanearum, seu ab interna Causa ex sanguinis vitio
euntium: Ubi observandum est, Internas Inflammationes
omnes, v.g. Pulmonum, Ventriculi, &c. esse acutas,
imò interdum peracutas, (nam Pylori Inflammatio vix ad
quartum diem ducit,) cum omnes sint de genere Erysipela-
tum.

Probatum sanguinis Grumescencia, hinc quavis inflam-
matio, & quavis cetera symptomata aut supervenientes
afflicti, ab ejusdem Accensione, ex eo

- (1.) Quod in Pleuritide, seu Inflammatione, sponta-
nea de causa crassa, frequentissima, sanguis Venae
seda extravasata dum sinit, semigrumulosus appa-
reat; de quo vid. *infra*. Id quod non tantum
HELMONT. *trall. Pleura Furcata*, item WIL-
LIAMUS de febribus l. 11. testatur, sed praeterea
Exempla suggerit GABELCHOVERUS *cap. 4.*
Cur. 70. & 79. ubi affirmat, se in sanguine Pleu-
riticorum sedit Venae educto Grumos, Germ.
gantz. Klemmungsfeib, ut loquitur, vidisse, ex ali-
quali sanguinis Coagulatione, & Grumescencia.

- (2.) Sanguinem crassificare, & congrumescere probatur

ex Cera, quod nempe Inflammationes quolibet inter-
nae, remotis Causis externis, eas plus minus
invenientes, omnium optime interne per talia cura-
rentur, quae sanguinem grumulosum dissolvant,
attenuent, & fluidum reddere possunt, quia Acidum
vitium absorbere, & corrigere, & vi dia-
phoretica sanguinem mobilem reddere, atque per
sudorem vel urinam ejicere valent. Hinc enia
omnia Salia volatilia, & in genere ea Remedia,
quae in easa ab alto ad sanguinis Grumos extra-
vatos dissolvendos commendantur, v.g. Lapilli
Cancrorum, Dosa Apri, Flores Bellidis, PAPA-
veris rhodaeos, Sperma Ceti internae & externae,
& similia.

- (3.) Externas Inflammationes quavis, in specie Erysipela-
ceae, per talia Externa, Inflammationes dis-
cutientes, & resolutiva, tollantur; quales sunt
quae Acidum corrigant, illudque absorbant, vel
grat. per applicatam Ceram, Farinam triticam,
Fibram, Pulverem Florem Sambuci, Chamomile,
Camphoram, Myrrham, spiritum Vini,
Aquam Calce vivae, Decoctum sulphuris, Lac
Virginis, Ceruam, Minium, Sperma Rana-
rum & similia applicata; & haec omnia inflam-
mationes a causa interna, nempe sanguine con-
grumato, ortas tollunt.

Altera Causa Interna, nempe vitium partis recipientis,
sanguinem non debite transmittentis, praeter Spasmodum Fi-
brarum, & inde Vainum angustationem, de qua *infra* di-
ctum, observandum est, quod subinde Aptitudinem quendam
certa in quibusdam partibus solit talis, ut ex levi quacun-
que occasione inflammationem: Videmus enim, quod semel
in parte quodam facta Inflammatio a Causa interna, sub-
inde in eadem parte recurrere solet. Primum quod attinet.
Dispositio ista seu Aptitudo prompta ad Inflammationem
in parte, consistit imprimis in nimia partes nervae
adeoque irascibilis, Dolori &c. hinc enim partes nervae
facilissimum quam sanguinem inflammantur. Quasi facilissimum
Cerae, & sic porro. *Secundum posterius*, Quodam quotannis la-
borant Pleuritide, alii Erysipellate Suræ, & ita ut facile
curat malum in eadem parte: Angina, & Inflammationes
Tonsillarum semel factae, si non levi curentur, facile vel
talia externa talium causa seu occasione, recurrunt in ead-
em parte: Ubi vulgè dicunt Aures, remanere in parte
semel inflammata certam Dispositionem, secundum quam
Inflammationem semel affligens denovo remouet. Quoritur
in quoniam haec Dispositio consistat? HELMONTIVS quidem
rectè allegat, *Isidori Ebor. Insigne partium*, idque per idem
in Aethere deiphas ea reponit. Sed non satisfacit scrupulo; si-
quidem hic triplex revera lubet Ratio, cur pars saepius
in eandem afflicta mediat: nempe

1. Debilitas Strictus infiri.

2. Aeterna partium semel inflammata.

3. Relicta Spina seu fermentum acidum occultum post In-
flammationem, quod facile vel interius occasibus, vel
gr. lre exandescit, vel exteriori Ductu erroribus, com-
moveri, sanguinem afflicte, & ad flagitationem disponere
deum potest.

1. Debilitatem spiritus infiri & Atoniam quod attinet: cer-
tum est, quod pars semel inflammata, sive discussa, sive
idque imprimis, suppurata fuerit Inflammatio, necessarii
debilitetur, ac plus minus enervetur spiritus laetus, ob
denegatum liberum cum Insulo commercium, simul quoque
partem eroduntur Fibrae, partem dilenduntur, ac alio mo-
do dolentur. 2. Fibrae autem haec semel relaxatae, disten-
ae ac laceratae, non amplius in debitum tonum corvet, ut
hinc pori partis transformantur, & pars debilis manet, ut
vel levi data in Massa sanguinea occasione facile postmo-
dum sanguis in suo motu legitimo impediri potest, unde
eius eadem partem sanguis haeret, & extravasatur. 3.
Quod autem attinet fermentum post Inflammationem reli-
ctum; certum est, si in parte curata tantillum odoris fer-
mentativi remaneat, imprimis si abiectionis suppuratae, seu
Inflammationis suppuratae non probe, & exacte mundificetur,
etiam post consolidatam Ulcus Inflammatio recurrit; tum
enim odor fermentalis acidus residuus manet, qui partem
partes sensiles irritando, si excitatus fuerit, Fibram cri-
spationem efficit, partem quoque odore, & enoagie sa-
nguinem praeterfluentem simul disponit ad faciliorem sui
coagulationem, adeoque subsistentiam, & Inflammationem:
ita enim in Uteribus; si idem nonnihil fermenti puru-
lenti remaneat, videmus eadem recurrere. Ex quibus
patet, Causam Inflammationis esse partem in parte ipsa.

Atten-

Attendendum etiam, *an sub Inflammationibus concurrat simul aliqualis Plethora*, sive revera talis, sive ex Confectudine? Nam tali sub occasione copiosior Sanguis stagnare, & Inflammationem insigniter promovere solet. Hinc ii, qui afflicti sunt annuis Phlebotomiis aut scarificationibus sapienter repetendis, simul atque si hanc intermittunt facili in Inflammationes crebrius recurrere incidunt, ipsi tametsi ferè præcaveant odioribus, & adiectis suis Sanguinis diminutionibus. Novi hic Mulierem non ignobilis, quæ nisi singulis mensibus aut post biensem saltem spatium utatur scarificationibus, ordinariis Tonsillarum, & Fancium Inflammationibus est subiecta. Concurrit nempe hic Plethora fovecundum quid, seu à consuetudine contraria, in qua Sanguis suo naturali puncto defleat, in motu suo impeditur, & sic Inflammationem inducit.

Et hæc sunt *Erysipelas* & *Pleuritides* recurrentes in eadem loco.

Observandum autem hic est ulterius, *Internas Inflammationes* quascunque, v.g. Pulmonum, Ventriculi, &c. omnes esse *Acutas*, interdum *Præcursas* cum Febre ardente continua, interdum typum Tertianæ observante, conjunctas, & sunt omnes de Erysipelatum genere; nam v.g. Pylori Inflammatio vis ad quartum diem durat.

Sanguis ergo extravasatus plus minus, ac in parte stagnans, non ibidem quietus hæret, sed dom ejus spiritus volatilis evanescit, coagulatur & Acorem contrahit, qui Acot cum Sale volatili oleoso adjuncto effervescentiam concipit, sub qua Sanguis immixtus incalcet, turgescit, ac in Pus corrumpitur, quod *Suppurare* dicunt: Ratio hujus est, quia Sanguis præternaturaliter extravasatus, suis partibus volatilibus balsamicis destitutus mox corrumpitur, accelerare incipit (Acorem enim præter naturam vitiosus corruptionis individuis comes semper est) & in Grumum abit: Quæ visiofi acitudo in Sanguine extravasato oborta, uti ipsius & coagulati primitus Sanguinem, ita postmodum cum Sale volatili oleoso in Sanguine abundante, & succellivè magisque emergente, Massam Sanguineam fermentando, imò interdum acriter effervescente, colorem inteseum & tumoris succellivum augmentum efficit, sub quo fermentativo motu succellivè Sanguis corrumpitur, ita ut tandem Salia effervescentia motu concursu ex Sanguine alterato & corrupto aliam lubilantiam, tertium salium, nempe Pus, quod est crassum, moderatè salium, grumulosum & album, constituant: Nam omne Pus est *salum*, in quo laudabile & naturale, quia natum ex concursu acidii vitiosi, & Urinæ, ex quibus semper & necessarib subaleat; Est *album*, quia ab Acido præcipitatur Sulphur Sanguinis, sub effervescentia motu ab Alcali solum, exinde enim emergit Color lacteus. Illustrabo v.g. si Sulphur aut Pinguedo quæcumque solvatur ab Alcali fixa vel volatili, emergit solutio rubra; huic autem si infundatur acidum, dat Præcipitatum lacteum. Jam similiter se habet Massa Sanguinea: si solvens plus minus dominatur, Alcali, emergit rubedo, quæ præcipitata per acidum, colorem album exhibet, & ita effervescentia cessat, quæ cessante, in Sal tertium, scilicet salium, mutata sunt ambo, & tunc perfecta est suppuratio, quæ evacuata, cavitæ remanet in parte, vocata *Apertura seu Abscessus*. Conf. hic SYLVIVS l. i. *Prax. ubi de Inflamm.* item BECKIUS *de experim. circa Rat. natur. Princ. p. 46. Crassum est Pus*, quatenus ipse Sanguis, ex quo ortum est, plus mixta fuit crassus.

Ardor, qui in Inflammatione perquam sensibilis, est ex Acidi volatilis motu concitatus; adeoque pro hujus plus minus acritoris cum Alcali, etiam plus minus acritoris, plus minus lacta effervescentia majori, cætera symptomatica, *Ardor*, *Rufus*, *Pneusis* &c. plus minus intensi quoque solent. Idem Acot vitiosus, sive Sanguinem purum coagulando ad Inflammationem disponit, sive Inflammationem ex alia causa oborta superveniat, effervescente in tota Massa Sanguinea cum eia Sale volatili, causa est adjunctæ *Febris Continua ardensis Symptomata*, quæ in omni Inflammatione Interna adest; & est *tam acuta*, ut in Inflammationibus partium ioternarum à Causa interna enatis, v.g. in Pleuritide, Hepatitide, &c. *quàm lenta*, superveniens nempe Inflammationibus partium quæquodam exterarum à Causa externa subortis, v.g. in Inflammatione Mammæ ex Lactis grumuli, &c.

Dividuas vulgò Inflammationes in *Legitimas* & *Illegitimas*, *Illas*, quando Sanguis bene constitutus Inflammationes excitat; *Has* vero lue Illegitimas in *Biliose*, *Pituitas*, *Melancholicas*, &c. dissepunt, non propter tales Humores Sanguini permixtos, sed propter variam Sanguinis Cræm, ac inde natam temperiem, de qua in *Physiol. de Temperam. cap. 22*

Signa Inflammationum suprad sunt recensita: nempe

1. *Tumor* remittens ad tactum.

2. *Ardor*.

3. *Calor* seu *Ardor* Exgrum, ac attredantem manum afficiens.

4. *Dolor* urens, tensivus, pulsativus, panchorius, & etiam gravativus, dum pars à Sanguine dilectantur, & gravando distendit partes, quibus est annexa: & quibus denique semper accedit *Febris*, sive Symptomatica sive Comitata, plus minus acuta, concursa cum Inflammationibus à Causa interna excitatis.

Quæ per se patent hæc signa in parte visibili, in invisibili verb parte dolor pulsativus, Ardor, Febris, & denique partis ordinariæ functio plus minus læta Inflammationem innunt: quibus in specie accedunt signa unicuique parti læsæ seu Inflammatæ propria & specialia, quæ semper aliter se habent in Fancibus, aliter in Pleura, aliter in Pulmonibus, aliter in Ventriculo Inflammatis.

Signa Particularium Inflammationum inferius suo loco habebimus.

P R O G N O S I S.

Inflammatio vel sua sponte recurrit, vel non recurrit: *quid*, quando Sanguis nondum periclitè extravasatus aut congruatus fuit, quin relaxatis Fibris aut apertis Poris idem stagnare incipiens, denovo per Venas regurgitat, sive purus fuerit, sive sordibus heterogeneis, in quandam partem depositis, & ita Inflammationem occasionaliter interrentibus permittit; id quod probè notandum est in tumoribus partium Criticis semper cum Inflammatione junctis: *dum non recurrit* Inflammatio, omnis in genere, vel discutitur, vel suppuratur, vel scitificatur, vel gurgulietur.

Unde Inflammationis *Prognosis* duo involvit. *Eventum* ipsum, & *Morbis Tempora*. *Eventus* obiter vult bonus & malus: *Bonus* scilicet, si Inflammatio sui materia peccans vel insensibiliter discutatur & planè dissolvatur (id quod fit imprimis ab operante & prædominante Alcali, dissolvante Sanguinem grumulosum) & ita, vel in alia vasa remeet, vel insensibiliter transpiret; & est optimus & brevifiniendi modus, & Inflammationis exilioris non adeo profundæ & quæ à causa externa magis dependet frequens est: *hinc* est ille, quando Sanguis ille extravasatus non relictus suppuratur, & abit in abscessum, id quod fit ex aliquali motu fermentativo Acidii & Alcali; quæ ambo coeunt in Salium tertium: *Malus*; & quidem Toti aliisve Membra si evanescat quidem, & insensibiliter resolvatur Inflammatio, cum aliorum tamen symptomatum accessu atque incremento; *Parti vero æstiva*, si in Gangrænam aut scitrum abeat. Nam ab Acido nimis insipiente, abundante & prædominante Sanguis in tumorem penitus induratur, ac in Scitrum abit, quod malum est, propter tumorem contumacissimum & curato difficilem; nisi enim Scitricæ cautè & leniter traidentur, Humores tales Effervescentiam concipiunt, & facili in Cancrum evulceratum degenerant, cum Cancer oculcus & Scitrus dolens in paucis differat, Inflammatio vero ista, quæ ex omni modo Sanguinis, & Spirituum in parte motu impedito, & ita ejus mortificatione ac destructione in Gangrænam abit, omnium periculosissima & pessima est, dum Acido vitali spirituiolo destrudo, Sanguis & pars in Putredinem dilabuntur.

Aliis *Eventus boni & mali Signa* quoque petuntur

1. A *Subiecto*, cujus intuitu Inflammatio in Juvenibus, & bonæ constitutionis Hominiibus, in parte externa & carnosa, minus periculosa ac io levioribus ac Carceclis, in Viceribus & Membra nervæ, existit.

2. A *Atqueindio*, cujus ratione major & amplius Inflammatio plus periclit, quàm minor, involvit.

3. A *Tempore & Loe*, quocum inquit graviores, quæ Anni tempore fervidiore & in regione calidiore, quàm quæ in Aere & locis temperatis aut frigidioribus emergunt.

Tempora Inflammationum quod spectat: *Principium* ejus dicitur, ubi Tumor, Dolor, acque Extensio adhuc exilior, quæ symptomata si augentur, *Argumentum* Morbi dicitur; quæmodum *status*, si cuncta fuerint vehementissima; & *declinatio*, si symptomata remittant, sive cum Materie insensibilis disculione, sive supuratione hoc fiat. Quæ tempora modo longiora modo breviora sunt, adeo ut nomenclatur Inflammationes citiæ, ac tardius terminentur, tam pro di-

diversitate materię, quàm partis affectus. Nam quę à Sanguine viciore, atque crassiore dependet Inflammatio, tardior; quę à tenuiore & fervidore, citior; pariter, quę in partibus carnosiss, facillius, quę intensionis, difficilior curatur, & lento magis motu progreditur.

C U R A.

Possit hinc fundamentis facilis esse accessus ad Curam, pro qua in omni Inflammatione. In genere observandum est, ut Sanguinis flagrantior calidior & motus naturalis & circulator restituantur in integrum; id quod fit, vel impedimenta quęvis externa, Sanguinis motum interius inibentia, removenda, vel interea Sanguinis Gruescentiam crassiorē & Aciditatem corrigenda, five eadem sensu præcavenda, five eodem jam facta resolvatur.

Ad hoc quod has

I. Sanguinis tenuitas & fluiditas conservanda, & circulus ejus concitator reddendus pro sudorifica, præsertim alcaline naturę, tam fixa quàm volatilia: illa acidum, Sanguinem plus minus coagulans, absorbentia: hæc eodem potestate dissolvencia & attenuantia, expectato sudore, optimè conducunt.

II. Fermentum vitiosum acidum in parte affecta corrigendum, aut quodvis aliud Heterogeneum removendum, id quod tam interna quàm externa præstat.

Interna sunt Abscessus fixi, aut penetrans Volatilia cum sudore administrata, adeoque sudorifica Inflammationibus quibuscumque conducunt. Jam verò patet, quod in Inflammatione ab acido interno orta, tam præservativa quàm curativa nil melius coferat, quàm ea remedia, quę Sanguinem viscidum & tumorem attenuare ac resolvare, acritatem corrigere, & ita eundem mobiliorē & fluidiorē demum facere, naturalemque motum ipsi restituere possunt. Hinc sudorifica, & omnia alia ad casum ab alto commendata, optima erunt in curacionibus omnium Inflammationum, tam Internarum quàm Externarum, in specie Erysipelacearum. Præ cæteris autem ea sudorifica conducunt, quę Sanguinem grumulosum speciatim resolvare valent, sub omni enim sudore acidum immittitur, Sanguis tenuior ac fluidior redditur, & sic in naturalem circulum rapidius magis concitatur; unde in omni sudore pulvis est frequentior ac robustior, & percipitur, ut vocant, undatus: Hinc facile patet, quod hæc sudorifica præ cæteris convenient.

Hæc inter autem sudorifica, Salta volatilia imprimis palmam obtinent, utpote cùm omnia hæc egregiam potentiam habeant coagulata & conglutinata omnia in Corpore humano dissolvendi, eademque ad debitam fluiditatem deducendi, simulque sudorem movendi. Hinc est, quod exhibitio volatilibus aut similibus parvo, simplicis Pleuritidis absque ulla Venæsectione in Inflammationibus minoribus, & subiectis non adeo Pectoricis citò, tutò & secunde curare fuerint. Id quod similiter de omnibus aliis Inflammationibus intelligendum; horum nempe medio Sanguis discutitur partim, partim in naturales alveos deducitur. Ubi hoc, nempe intensibilis discussio, obtineri nequit per sola sudorifica, sed Inflammatio persistit, tunc ad secundum Scopum accedendum, nempe Externis Discutientibus seu Aromaticis carminantibus, Sale volatili temperato confusibus, applicatis dissipandi est Inflammatio. Quod si verò nec hæc sufficiant, tertius Scopus in auxilium vocandus, & Suppurantibus & Maturantibus Sanguinis extravasati ac coagulati in Pus transmutatio maturè promovenda, & denique factus abscessus aperiendo, mundificando & consolidando. Interim cum binis hi Scopii ad Chirurgiam spectent, ideo eos infra tractabimus.

Inter remedia ergo interna, ad Inflammationes in genere præfusa, nullo modo convenient Peripartica, nisi (cui jurati sumus semper, ubi nempe neque morbus, neque symptoma urget, omissa illa præmittere velimus) interdum primas vias propter justam simplici Febrim simpliciter blandè evacuat velimus. Alvo tamen in cursu morbi adstricta Clysters loquantur ex Sero Lactis cum Sili vel Sili.

Melli: Vel

℞ Floris Chamemeli, M. ii.

Coqui, in l. q. Sili Lactis;

Calamuræ Sili, vel ix. adde

Dutyr, res. cum Vitelli Ovi sol. Sili.

Melli Sili.

M. f. Enema: S.

Clyster Abluens.

Quin potius sudorifica Alcalia blanda, quæ Sanguinem congruatim resolvunt, ejusque circulum restitunt, hæc faciunt. Unde omnia illa, quę alia in specie ad Pleuritidem, seu frequentissimam Internam Inflammationis speciem, commendantur, & infra declarabuntur, similiter in omni Inflammatione in genere convenient; ob id in specie utilia diu Salia volatilia, quę inter sunt spiritus Tartari, spiritus Salis Ammoniaci, Urinę, & Sal volatile Cornu Cervi, Sanguinis humani, Offium humanorum, & similia. Item hæc pertinent alia tali Alkali occulto impręgnata Concreta, Acidum potenter absorbentia, v. g. Animalium partes durę, ut Lapilli Cancrorum, Mandibule Lucii Pręcis, Dens Apri, Cornu Cervi sine igo præparatum, Ebur sine igne, Unicornis, Lapides Carphonem &c. quibus adde Sulphur, & Sulphurea Mineralia, & Metallica fixata, præsertim Antimonialia, quę Acidum quodcumque in corpore destruant & sudorifica sunt, quę inter primatum obtinent v. g. Antimonium Diaphoreticum, item Bezoardicum Minerale, tam simplex quàm compositum, & similia: Quin & modò distilla addenda Theriaca, Spiritus Theriacalis, tam simplex quàm camphoratus, liquor Cornu Cervi succinatus, in specie ratione Camphorę mixtura simplex & tinctura Bezoardica à Sili ad Sili. In principio Inflammationis propinanda, præsertim si oriatur illa ex substantia Corporis frigore quocumque post alium ejus Effluvi, tales enim Inflammationes citò, tutò, & potenter dissipat. Faciunt quoque hæc omnes Pulveres Bezoardici valde diti, SENNERTI & quicunque alii, utpote quorum Ingredientia non tantum acidum absorbendo & temperando, sed & sudorem excitando, suo modo Inflammationes litem solent.

His omnibus simul adduntur sperma Ceti, ac Cancrorum Lapilli cum Aceto assumpti, & omnia Vegetabilia Volutararia, Alkali plus minus occulto temperato prædita, Sanguinem congruatim resolventia, v. g. ea, quę ex Chærefilio, Bellide minore, flore sambuci, Mentha, Scabiosa, Papaveris rhœoadis (quorum tinctura in Jalepis) sunt remedia: oti etiam remedia ex sambuco, quia hic est egregius in Erysipelle; superius enim monui, omnes Inflammationes Internas semper esse de natura Erysipelatous, adeoque horum sambuci spiritus, Baccarum sambuci essentia & rob, necnon ea variis plantis Antispasmodicis ac similibus acris petita remedia, quia licet ex Nallurti speciebus, Cochlearia, ex Erythimo & similibus parata conducunt. Præ cæteris spiritus Nitri dulcis, in specie cum spiritu horum sambuci per fermentationem paratus, ad Sili in Aqua Chærefili cum Syr. Papaveris rhœoadis propinatus, ac appropriatum remedium sudoriferum in Inflammationibus quibuscumque Internis, præsertim quando Febris Ardens acuta simul ardeat, imprimis in Angina & Pleuritide similibusque, admodum est commendatum remedium, imprimis tamen in Angina; quin & omnia Nitrata, ratione febris commode conveniunt, in specie tam Nitrum depuratum, quàm Nitrum Azotum, tum, à præparatione & edulcoratione Antimonii Diaphoretici, Antibedici Pessii restitutum, in Potu ordinario dissolutum, idque plus minus copiose, prout necessarium fuerit. Exempli gratia pocas formulas subministrabo, quibus Interne quęcumque Inflammationes quancumque Partium facile sili & tolli possunt: v. g.

℞ Aqua Scabii, vel Fumar.

℞ Flor. Samb. ana Sili.

Spiritus Theriacalis, Samb. vel camph. Sili.

Dens. Apri præp. Sili vel Sili.

Sal. vel. Cornu Cervi gr. av. ad Sili.

Syr. Scabii, vel Nitrat. Sili, vel Sili.

M. pro duabus vel tribus doibus: S.

Mixtura dissolvens pro aliquot vicibus.

Uteretur pro scopo sudorifero in principio Inflammationis, habita ratione Venesectionis.

Quibus etiam pro circumstantiarum ratione Opus adhi possunt. Aut hujus loco

℞ Vinicern. vari præp. vel sili.

Maxill. Len. pili.

Cornu Cervi sine igo an. Sili.

Sal. vel. Cornu Cervi gr. av.

Laud. Opus. gr. ii. vel iii.

M. pro duabus vel tribus do. in haustu Vini capiedis, expectando sudorem. S.

Pulvis Dissolvens.

Vel hoc loco, ac in Incrementis Inflammationis, ubi Ardor & Calor urget.

℞. Ana.

℞. Ag. Flor. Sambuc.

Cherisil.

Papav. errat. an. ℞i.

Aceti Sambuc. ℞i.℞.℞.

Marill. Luc. p℞. ℞i.

Lapill. Cancr. prop. ℞i. ad 3℞.

Syr. Papav. errat. ℞i.

M. pro duabus vel tribus dieb. expectando sudorem: S. Mixture refrigerans & dissolvens pro aliquot vicibus.

Vel

℞. Aqua Flor. Sambuc.

Card. bened. ana ℞i.℞.

Aceti Sambuc. ℞i.

Marill. Luc. p℞. ℞i.

Lap. Cancr. prop. 3℞.

Syr. Papav. rhoad. vel Rubi Idai ℞i.

M. pro duabus diebus: S.

Mixture refrigerans & dissolvens pro duabus vicibus. Notandum: consensu his mixturis additur Acetum; licet enim illud cum Lapillis Cancrorum effervescat, non tamen penitus saturatur, sed hoc ipso Lixivii naturam assumit, & in sapore urinosum mutat, ut dicit HELMONTIUS, ac potentius vicia Acida absorbere, Sanguinemque grumulosum mediante sudore dissolvere valent, uti SYLVIVS testatur, se habere ex HELMONTIO; id quod probatur, si enim Acetum Marinis affunditur, hæc longè melius operatur, quàm si solitaria affunderetur.

Vel

℞. Lap. Cancr. prop. ℞i.

Ror. fœs. ℞i.℞.

Land. Opist. gr. ℞i.

M. f. Pulvis pro duabus diebus in hanstu *Viel Rhœnani* affundendus, vel in parvo cochleari *Aval.* expectando sudorem: S.

Pulvis Dissolvens.

In Progressu vel statu morbi, & imptimis quando nimis urget iuxta Febris acuta.

℞. Aqua Flor. Samb.

Card. bened. ana ℞i.℞. ad 3℞.

Antimoni Diaphor. ℞i.

Syr. Card. bened. aut Papav. errat. vel Acetif. Ciri ℞i.

Spiritus Neri Mal. q. s. p. grato sapore.

M. f. Potio, S.

Potio Confortativa refrigerans.

Captatur subinde coctionem, vel pro duabus diebus, observando, ut quantum possibile, Corpus in modore conservetur, & Inflammationes pro sudore curat, & iuxta Febris optime resistit.

Sudoris defectu Opiera non negligenda sunt, que figendo spirituum impetum, & hinc Fibram nervorum solvendo stricturn, multum promoveant sudorem.

Loco Potionum istarum, in Inflammationem incrementum laudatur, commodè etiam Mixture Theriacalis ex Theriaca & Aceto, *supra Scil.* 15. ab *de Febribus Malignis*, infusa, usurpata potest. Hæc Formula jurgantur blæ istæ Mixture, quæ habet SYLVIVS in *son Præsi* l. 1. c. 40. §. 21. in Inflammationibus, quæ certè sunt egregie, & quibus sæpius Pleuritides, Peripneumonias, & similes affectus & præservavit & curavit.

℞. Aqua Petrosell.

Hyssop.

Fenicul. ana ℞i.

Theriacal. simpl. 3℞.

Spiritus Rai. Ammoniaci 3℞. (pro ut fortis vel debilis)

Land. Opist. gr. iv. (ratione Febris & inquietudinis)

Syr. Papav. errat. ℞i.

Misc.

Hæc ipsa mistura subinde coctionem brevi tempore est haurienda, & Ager benè contegendus, expectando blandum sudorem.

Mixturam alteram videb. l. a. §. 43. quæ Sanguinem congruam resolvit, & resolutum partim dissipat, partim in naturalem crassam reducit:

℞. Aqua Hyssopi.

Fenicul. ana ℞i.

Aceti dissillari ℞i.

Spiritus Vini rectif. vel Theriacal. vel coajule

Aromatizati 3℞.

Lap. Cancr. prop. 3℞.

Spiram. Ciri,

Tom. II.

Momia ana ℞i.

Land. Opist. gr. iv.

Syr. de quinq. Radic. ℞i. ad 3℞.

Misc. pro potione.

Hujus Mixture assumat sæpius Ager Cochlear unum vel alterum; cujus ope non tantum impeditur Sanguinis effusi concretio, sed partes ipsius effusæ incidentur, attenuanturque paulatim; tenuiores autem usque cum sudore aut insensibili transpiratione discutientur: quæ sola in tempore usurpata periculosa Inflammationis curas gloriatur SYLVIVS.

Et tales Mixture ex fixis cum Acidis sunt ipsi in frequentissimo & satis felici usu: quin temperatis eisdem partibus acrioribus dolor leniatur, tandemque in totum tollitur, ipsæque adeo solvuntur ac dissolvuntur obstruções: quasi sola in principio atque diligenter usurpata curatæ sunt non semel incipientes Pleuritides ac Peripneumonias, aliarumque partium Inflammationes satis graves, atque anxietibus doloribus acutis molestant.

Et hæcusa dicta pro quolibet sufficient Inflammationibus.

Sunt etiam non raro Emulsiones, internè contra Inflammationes sub Morbi statu multum proficue, ex seminis Cardui bened. & Maris cum Aqua Papaveris erratici paratæ, quibus adhuc adduntur appropriata, Anemionum Diaphoreticum, Sperma Ceti, & similia *supra dicta*; quæ etiam ad Inflammationes, speciatim partium pectoris, sunt admodum proficue. Quod si Inflammationes sint Erysipelatæ, imprimis adhibendum simul Rob Sambaci, quibusvis formulis additum; aut pro Vehiculo Pulverem usurpandum, cum appropriatissimo Erysipelatis Remedium; præsertim quando motus Naturæ excretorius deficit, nec debite Erysipelas efflorescere potest, tunc loco Simili usurpandum Rob optimum est. Plura de Erysipelatibus tradam in Chirurgia Medica.

Potè pro dictis Scopi observandum, saltem ferè esse in omni Inflammatione ingruente aut profectæ Vna Telluris institueri, & restè quidem: easque subinde aliquoties repetere, idque secundum Revulsionem, Aversionem & Diversivm leges & fundamenta abseque explicata. Nempe ubi cæteras respondent circumstantiis, ut etiam morbi Inflammationis partium plus minus Venesectionem urgent, administranda Venesectione Juxtilatæ, seu, ut vocant, pro scopo revulsionis & derivativæ; (de Venesectione Revulsoria & Derivativa *supra* in *Prælog. Cap. 3. Artic. 1.* videtur etiam HIGMORUS *Disquis. Anæm. Corp. Hum. p. 130.*) quod reverè suum locum adhuc obtinet, debitis ac selectis in locis instituta, ubique tamen nimio jure secundum alias naturas abusu, in casu quando nimis urget Inflammatio, & morbus admodum acutus videtur, in tali casu mox in principio, vel ante, vel post sudorem poscitur, convenit Sanguinem mittere per Venesectionem, ut imminuat nonnulli Sanguinis quantum, facilius in loco stagnationis seu Inflammationis per vicinos ramos distribui, & ita incrementum nimium Inflammationis præcaveri possit; ita quidem, ut pro scopo revulsionis secetur in regione respectu cordis opposita, in principio scilicet Inflammationis; pro scopo verò aversionis secetur Vena in regione respectu Inflammationis eadem, sed loco paulò remotiore, in incremento nempe; pro scopo verò derivatorio secetur Vena in loco Inflammationis proximo, isto nempe, per quem ordinari Sanguis stagnans reflueret deberet, in statu nempe, ut non semper Venesectione necessaria sit, nisi in insigni Plethora, aut illi, qui Cæcæstasiam se emancipant, ut illi tempore inanes insistant Venesectiones. Alias ingruente Inflammatione repetiti sudores per remedia appropriata, Sanguinem congruam resolutis, & discutientis, subinde quibusvis Sanguinis detractionibus præferendi sunt.

In principio Inflammationum, tam Internarum quàm Externarum, sudent applicare remedia repellentia, quibus volunt Sanguinem stagnantem denudè repellere, vel urgere, ad retrocedat, id est, volunt Sanguinem movere à termino ad quem ad terminum à quo. Repellentia autem sic dicta, partim impossibilia, partim sæpè nociva esse, ex hæcenus dicta patet: Nam stante Sanguinis circulo, impossibile est Sanguinem, qui per Arteriam insiuit, per eandem ex loco stagnationis repellere: Nociva autem sunt, quia Repellentia quæcumque, ordinariè ex Refrigerantibus aut Acidis, aut adstringentibus, & similibus composita, expellimè Inflammationes reddunt deteriores, aut ad Scribent vel etiam ad Gangrænam disponere solent: Id quod imprimis in Erysipelatibus notum est, in quibus curandis cautiore sunt Mulierculæ, quàm Chirurgi, qui omnia Humida prohibent, quous

sum

rum timor sanè est inanis, cum spiritus Vini, Spermâ Rarum, & similia turo applicentur Erysipelati. Verùm, quoniam experientia eas docuit, quod Hamida, quæ Chirurghi applicant, sæpius deteriora reddunt Erysipelata, & omnes Inflammationes, quia semper habent adstringentia, quæ Sanguinem antea flagrantem magis coagulant magisque congruunt, & Erysipelata in Ulcera deteriora transmutant, quæ sunt frequentissima in Gallia propter talem Chirurgorum inertiam; quare cautiore Mulieres omnia prohibere Aquosa, cetera Repellentia, quæ five sint Sicca five Humida, semper tamen ea Adstringentibus, ut floribus Balsamorum, Corticibus Capparis & similibus, sunt composita. Certè natura Morbi contrarius vult: nam ubi flagrat Sanguis, ibi Partis Tumor, ubi Partis Tumor, ibi angustia vasorum Sanguinis, ubi maior angustia, ibi eadem non per Repellentia aut similia est augenda, quin potius per *Detraherentia aromatica*, quantum fieri potest, eadem minuenda, ut materia concreta possit promoveri & removeri. His autem frustraneis, *Sapparaia* & *Emollimenta* externè applicanda sunt Inflammationibus. Maximoque ergo fugienda sunt omnia Repellentia & similia, quæ vulgo, utut perperam, Inflammationibus applicantur. *Insuperatitia* quod attinet, seu sic vulgo dicta *Desfusio*, subinde sunt tolerabilia: sunt autem talia, quæ Fermentum acidum ante progressum, absorbendo istud aut corrigendo, emendare possunt. Sed de his alibi.

Externæ sunt ea, quæ

1. Acidum absorbent, ut Saturnina, & Alcalina.
2. Sanguinem vi aromatica alcalina dissolvunt, & ita Inflammationem discutunt.
3. Quæ temperamento mutuum salium effervescentiam concutunt, supurationem adjuvant. Quod factum
4. Abfcessus aperiendus, Ulcus mundandum, hinc consulendum.

Mundificatio fit exalta, ne tantillum Fermenti in Ulcere corruptivum residuum recidivas inferre possit. Sed de his Externalis *sus lito in Chirurgia Medica*.

ARTICULUS II.

De Inflammatione Fascium, & in specie de Angina.

Quod specialis iam attinet Inflammationes, occupant hæc vel Partes Internas, vel Externas; omnes enim Corporis Partes, Obliis exceptis, Inflammati possunt, quippe hæc parum Sanguinis advehit. Internas ordinè pertractabimus, externas Chirurges relinquendo. Inter internas aut Inflammationes se offerunt primò, quando partes Fascium internæ, sæpe etiam cum externis, nempe Pharynx cum summitate Gulæ; Larynx cum Alveola Arteris; Fauces necnon Tonsillæ in Istmo Fascium sitæ; Uvula; interdum denique Musculi Fascium & Gulæ; Musculi Laryngis motui dicati, & similes partes vicinæ inflammantur. Inflammatio Musculorum Colli, in specie Laryngis & Gulæ, ordinariò nomine *Angina* appellari solet, quæ ita dicitur ab *angere* à Græco *ἄγω*, *frangere suffocare*. Ab Angina autem excipitur *Tonsillarum Inflammatio*, quæ ferè Nequa exsistit, ac aliis speciali nomine caret. Angina Barbaris aliis *Spinianina*, Germanicè *das Hals zehobren* appellatur. Male, *Prænella*, Germ. *das Branne*, quibuldam dicitur, cum Lingue saltem ardor, & symptoma sit, & simul quodammodo Fascium, in Febris ardentibus familiaris, de qua superius loco addidimus. De Fascium tamen omnibus ac Partium hæc pertinet Inflammationibus, cum habeant communem medendi rationem, conjunctim agere placeat.

Quod Anginam ergò, Fauces afficiuntur in hac ipsa, i. e. ea pars Colli imprimis, quam constituit Pharynx seu Gulæ musculosa expansio, & Larynx seu caput Alveolæ Arteriarum. Est enim utriusque utraque pars, tam Pharynx quam Larynx, adeoque utriusque partis Musculi, tam interni quam externi, utut nunc una pars magis, altera minus inflammantur; tamen pro maiori acrobia theoretica Angina à GALENO & TRALLIANO in quatuor species seu

Differentias, utut saltem speculativas, non autem Practicas, curiose nimis, ut GALENUS loquitur, verborum acceptione dividitur, nempe

1. In *Synanche*, quando Interni Fascium seu Pharynx totius inflammantur.
2. In *Parafynanche*, quando Externi Fascium seu Pharynx Musculi afflicti sunt.
3. In *Cynanche* N., in qua Internæ Laryngis partes sunt inflammatae; &
4. In *Paracynanche*, quando Exteriores Laryngis & Gutturis Musculi sunt inflammati.

De quibus vid. SENNERTUS I. 2. Pr. 1. c. 1. cap. 24. pag. 95. ubi de Angina.

Circa quæ observandum est in Cynanche sæpius simul Pulmones plus minus esse affectos, & non solum Internos Laryngis Musculos, unde etiam tunc temporis tant insignes respirandi difficultates solent adesse, quales in Peripneumonia interdum contingunt, adeo ut Aegri Canam more ore hiant respirantes: vid. DECKERS in *Barbette Prax.* p. 47.

Formaliter Angina consistit in Inflammatione, quæ ubi aliud, quam Sanguinis motus retrogradus ea partibus impeditus, sui signatio est, unde Inaccescentia Laryngis atque Pharyngis, *Respirationis atque Deglutitionis* notabiliter sedans, nullo aliis in Pulmonibus ac Thorace easilente vitio.

C A U S Æ.

Causa Externa crebriores, quæ in specie Anginam inducunt, præter eas *Generales*, quæ communes sunt reliquis Inflammationibus, sunt Res inepte deglutitæ, quæ in Fauces hærent; & vel nimia moleas angustando, & ita valde comprimendo; vel pungendo, vel acrimonia nimiope eas irritando, ad Fibrum contrahuntur, & ad successivas Inflammationes, hinc Anginam, disponunt. Sic à *Spina Pisces* in faucibus hærent, item *ex partibus Viti devoratis* & faucibus infixis, Inflammationes, & tandem abfcessus faucium & Gulæ notatur SCHENCKIUS alique practici: Ex *Pnu* Aquæ fortis aut similibus Liquorum corrosivorum, inflammatis non raro fauces & Gulæ esse, res per se est nota. Imprimis *despirare*, ut Aer externus, immèdo contrahit hæc loca irritantia, & lædenta, multum coarctant. Ex simili, sed singulari, Inspiratorum vicio, *Spasmodica* occurrunt hæc mala, ut plurimum *Maligna*, cum non saltem Miasmæ morbosum Inspiratum in sui transitu Fauces lædat, & acrimonia occulta tanquam tot infixis spiculis eas irritet, sed fortas etiam Sanguinem certo modo alterando, hunc ad facilem sui flagrationem, quæ & Inflammationem, & seorsum malignam fermentationem disposat; hoc modo enim observatæ fuerunt Anginæ Epidemicæ Malignæ.

Ac in specie ad *Tonsillarum Inflammationem* & *Tumorem* disposuit *Lympha nimis viscida, glutinosa & spissa*, eas inficiens ac tumidas reddens, ac naturalem Sanguinis motum ac transitum per & circa glandulas impediens, unde succedunt earum tumor. Quia & *Lympha* per glandulas Oris & vicinarum partium excreta *nimis salsa, acris vel acida*, ut in afflictiis contingit Casarthalibus, encorando aut rolando didas partes, nunc graviores nunc leviores Inflammationem Tonsillarum interit. Imprimis in hac Tonsillarum Inflammatione Materia viscida, crassa ac mucosa Linguae, & Fauces inersat, ac subinde tenacis pelliculis insar eis adhæret, ac nihil aliud est, quam Lympha Tonsillarum ac glandularum vicinarum vitiatæ ac impura redditæ, & glutinosa, à Nutritio didarum partium chyloso, hoc earum læsionem non rite assimilato, ita alterata: Porro Tonsillæ habent foramen amplum in summitate sui, seu Tonsillarum tunica crassa *Periantha* aperto gaudent, quod hiat in Fauces, & Lympham salivalem omnih glutinosam in Fauces & Gulam emulget pro facilliori deglutitione. Quando ergo Tonsillæ hæc sunt tumide & inflammata, foramina hæc insigniter sunt expansa, & hiant, magisque inde conspicua sunt; unde ad imperitis Chirurghis interdum pro Ulceribus Tonsillarum in earum Inflammatione habentur, observante hoc iam olim SCHENCKIO in I. 2. Observ. ubi de Tonsillis.

Præterea inter *Causas Externas* ad Tonsillarum Inflammationes, item ad Fascium Inflammationes seu Anginas disponentes, sunt in specie *subiacens Frigus inspiratum*, aut

Pocus

(N) Cynanche, *ἡν ὅτι sic dicta videtur, à νῦν vultis*, Canis, quid est Angina specie detrita, lingua & sunt radice mureturæ, & nulla difficultate respirant, coganur acri aperti semper ore respirare, & Catum in marem linguam exterrere. Sic Teyze Hyanche dicitur à Plinio ea Angina speciei, quæ suis corripit solent, ab E. Sals. Quoniam Sui dicitur quoque Græcis οὖν; hinc fortè etymon dicit Synanche, & Parafynanche, de quibus hic Auctor.

Potius nimis frigidus post nimiam ac intensam Corporis incalcescentiam; his enim laesae fauces, & Gula, atque sanguis in illis spissior laesae, stagnans, Inflammationem merent.

Præter has causas externas dantur internas, quæ spississimè ad Anginam disponunt, uti sunt confusæ sanguinis evacuationes suppressæ, imprimis Menstrui ac hæmorrhoidum suppressæ, idque speciatim in talibus subiectis, quæ antea jam Angina laboraverunt, & ad Anginam disposita sunt quando tempore jam illæ partes, quæ fauces formant, quavis occasione præterita debilitate sunt, & ita robur inæqualiter patiuntur, facile erisidit sanguine stagnante deorsum inflammari possunt: Unde etiam mulieres, quando non ritè sunt Menstrui, aut aliæ ordinariæ evacuationes intermittunt, subinde Pleuritidi, item Anginæ vix obnoxie; hinc quoque in tali calæ præstervationis gratia Venæsectiones indicandæ sunt, sicuti curatiois gratia Venæsectiones in pedibus imprimis, non verb Brachii: Et novi ipse mulierem, quæ nisi singulo mense scarificationes inflaret, Anginam incurrit.

Pertinet hæc Morbi alius in Anginam transitus: quia ratione Dyenterici præcurata, aut interemptivè suppressa, præterit Dyenteria Epidemica, ut crebro Pleuritidem, ita etiam Anginam infert, qualis exempla non tantum recenset LA MONIER de Fluxu dyenterici, cap. 5. sed & HILDANUS tract. de dyenteria observat.

Observatur interdum etiam Angina Epidemica, ut dictum, conjugetur ut plurimum cum febre contiosa ardente, eoque in specie maligna, in quibus sanguis ita disponitur, ut facile stagnando det Inflammationes: Nam cum Miasmæ morborum insipiendo imprimis attrahatur, hoc in transitu de assigendo faucibus, & Laryngis portibus, has ita afficit, ut imprimis ista in locis Inflammatio illa seu Angina oritur, in quibus ista, quam tradit BARTHOLOMÆUS de Angina epidemica, cuius quoque exempla habet WIERUS in sua observat. (O) Et singulare itidem exemplum Anginæ admodum Malignæ Contagiosæ Epidemicæ videtur in PANAROLLO Præsent. 5. observ. in Puerto, ubi parum mordendo digitos Obstrictis mor in parte commota Carunculus excitatur, & obstrictis simul Angina correpta fuerit.

Præter dicta Invenitis Mercurialis pro cura luis Venereæ inceptè insinuat, Inflammationem Tonsillarum & Faucium subinde infert, eamque satis periculosa si tempore nimis copiosa sit salivatio, sanguis circa dicta loca stagnat, ab acrimonia caustica Mercurii Fauces vellicante, Liquore lymphatico corrosivo eadem rodente, subinde graves faucium Inflammationes, interdum suffocationes excitantur, quæ exemplum observat SCHENCKIUS l. 6. obs. Conf. TACHENIUS Hipp. Chym. cap. 25. p. 225. & SYLVIVS de Læe Thurore. Sane Luis Venereæ virus acre, ut speciatim Lympham Glandularum Conglomeratarum inficit, ita & hujus ratione suspensim Excoriationes ac Inflammationes faucium, subinde perquam contumaces, infert.

Vulgò etiam Anginæ ex Luxatione & compressione Vertebrarum Colli fit mentio: verum cum nota est structura Vertebrarum Colli, videtur, quòd hæc sententia sit nata ex falsa hypothefi, idque ob malè intellectum aphor. 35. sect. 4. HIPPOCRATIS: Si d. Febre detente separatis Collum in torquantur, ut vis deglutiri queat, nullo tamen tumore locus vel foris appareat, lethale est. Hinc enim aphorismum ordinariò interpretantur de Angina ex Luxatione Vertebrarum Colli, anamque buic sententia dedit GALENUS, quasi Luxatio Vertebrarum in eodem loco intelligitur: Sed structura, & articulo Vertebrarum Colli evincit, eas difficultat admodum Luxationem pati, atque tunc Paralyfin potius universalem, quam Anginam, excitare. Nam in dicto aphorismo nil aliud intelligitur, quam Convulsio Colli, emprothotonæ ac Epilthotonæ similis; Utrique enim in casu suffocationis periculum imminet, cum si superveniat Angina, seu Tumor inflammatorius Colli, lethale est. Quid non possit fieri talis Angina ex Luxatione Vertebrarum Colli & Cervicis facile patet, cum impossibile sit, ut luxentur. Nam si luxentur, necesse est, ut summa vi id fieret, quo factò necessarò Spinalis Medulla contingeretur, unde abolitio fieri, & motus, Mortisque appropinquatio, & potius afflicti Apoplexiam similis quam Anginam sequeretur. Sane enim Vertebrarum Cervicis procerus ita invicem inarticulati, ut citra fracturam luxari nequeant; & si luxentur, præsentaneam potius Mortem, quam Anginam inferent.

Tom. II.

Aliis dividi etiam solet Inflammatio Tonsillarum, & faucium in Exallam seu Geminam, & non Exallam seu Nephram. Illa autem, quæ rarior est, Tonsillarum Inflammatio, quando infert saltem sanguis stagnans in dictis locis Inflammationem infert, adeoque est, ut vulgò dicitur, vel sanguinea, vel albuginea, Acutum Malum est, de quo hædum dicta ferè intelligenda sunt. Hæc est, quando Angina chylosa, seu, uti vocatur, Lymphæ glutinosa permixta, stagnando Inflammationes infert, & vocatur Inflammatio Nephra seu Pirinosa; est tantum Tumefactio sanola illarum partium plus minus odematosa, & excitatur ferè occasione Lymphæ vitiosæ, Glandulas didarum partium malè afficientes, loca vicina rodentes, plus minus excoriantes, & ita junctam Phlegmonem inducentes. Quæ ipsa vitiosa Lymphæ, prout plus minus circa dicta loca stagnat, etiam plus minus easdem tumidas reddit, & circulationem sanguinis plus minus impediendo aliqualem Inflammationem, aut eius dispositionem junctam, habet. Et talis Nephra Angina frequentius occurrit cum Tonsillarum Inflammatione, quarum Tumor crebrius occasione vitiosæ Lymphæ supervenit. Nunc Febri expens est hæc Nephra, nunc Lentam saltem junctam habet. Et de ejusmodi Angina videtur hæc alia dicta, eoque satis periculosa videt. M. A. N. C. ann. 6. obs. 132. p. 28. Pertinere hæc videtur rari Angina quasi Membranacea species, quæ vid. in SENNETO præf. l. 3. p. 1. cap. 24. & M. A. N. C. ann. 2. observ. 14. p. 37.

DIAGNOSIS.

Quoad diagnosi, præter signa Generalia omnium Inflammationum, nempe Calorem, Dolorem, Tumorem, & intermedium visibilem Ruborem Faucium, quæ faciliè possunt conspici, si Os aperiat (nisi in Cyanæte, ubi vix Tumor ullus apparet), in specie Inflammationis Nephrae & Tonsillarum adeò difficult Colli motus non abque Dolore; item difficultas quædam respiciendi adeò præter vias angustas; idque imprimis ubi Larynx est afflicti, difficultas etiam adeò Deglutitio, imprimis ubi Pharynx, minus vero ubi Larynx est inflammatus. Et denique Dolor ardens præcipitur in faucibus, præcipuis, si Angina contumax malum observetur, aut casuram quædam externam præcelleret.

In facta verò jam Angina signa sunt (1.) Respiratio plus minus abolita, & nunquam summa difficultat reiterata, ita ut etiam, in quibus graviss afficitur Larynx, his etiam suffocationis mortua subinde adit, sine Pulmonum, & Thoracis affectibus.

(2.) Deglutitio etiam vocaliter est impedita, ita ut etiam Liquor in ore detentus vi Gulam intrare possit, ut si assiduè debeat, propter summam tamen faucium angustiam & Laryngis irritationem, deorsum sursum per Nares regurgitet; quam speciem adeò dicit in Hydrophobia JOSEPHUS ab AROMATARIIS, uti pauci ei adstantes.

(3.) Dolor circa Gutture & fauces insignis, & admodum urgens, tam ardens & rodens, quam pullans aut etiam crebris pungens.

(4.) Febri quoque adeò acuta, & continua in Angina, quamvis interdum typum Tertianæ continue aut Tertianæ produxerit, seu cujus Paroxysmi ultra 30. horas durant, habeat, prout vel exquisita magis vel modè est Angina. In illa est acuta, cum pulsu in principio tensivo & quasi convulsivo, magno & undoso, inflat pulsus Peripneumoniarum, qui tamen in progressu, & in his, quos suffocatio vehementius urget, parvus, & rarus, tandem creber ac inæqualis, magis observatur, iuxta GALENI delineationem, siquidem Pulsus ita describit: Angina pulsu transiens quadam præcipitudo est & commotio similis, magne & undas, ut pulsus Peripneumoniarum: Quinqueque vehementer est illi infensus, habent parvum & raram, ubi jam augentur, crebriorem & inæqualem. In hac tamen subinde Febri Lenta commotio solet esse.

(5.) Lingua rubet, ac insigniter tumet; videt etiam ejusdem motus plus minus impeditur, ac Fauces Angina præcipuis scilicet simul è Lingua Filum viciduum propendit, seu copiosa mæna vicidua ac glutinosa contentib obducitur, quod nihil aliud est, quam Lymphæ ac Glandulæ, speciatim Tonsillæ affectis inquinata ac inquinata, nempe mucida, filia, amara & tenax, quæ succedivè Linguam & fauces incurrat, scilicet etiam est arida aut filia, interdum scabra.

Omnia hæc symptomata sunt periculosa & graviora

Si

(O) Epidemicam quoque febrem non Anginam Pedanchonem vocavit noster M. Aurelius Severus.

in Angina, ut plurimum remissiora in Tonsillarum Inflammatione: vid. RIVIERUS & SENNERTUS. Interim, *qua pars magis laborat*, an Pharynx, an Larynx? ex lesionibus respiratoriis, item deglutitionis, & sita doloris ac Tumoris, periclitandum venit.

Tonsillarum quoque Inflammationibus occasione *Lymphæ vitiatæ*, ipsiusmodi scilicet & acidæ acritatis, concitatis, Phlegmæ Continua, sed magis Leuta, est iuncta, Fauces quidem rubent, sed magis inflammatae sunt, Tonsillæ verò tumide insigniter prominent.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*, Inflammationes hæc tribus modis finiuntur: aut enim evanescunt & retrocedunt subito, aut discedunt, aut suppurantur, aut Ægrem suffocando interimunt: Et si suppurantur, in speciem Tonsillarum Inflammationis, abeunt interdum succedente in Ulcera durissima, & difficulter curabilia.

Quod si ex dictarum partium Inflammationibus mori contingat, Æger, ut plurimum suffocatur interit; & quidem duplici ratione: vel à Tumore, vel Pute ad pulmones deluio: vid. FORESTUS l. 15. *observ.* 25. de Angina in Pus mutata, quoad ad Pulmones, & pectus rursus iter suffocavit Ægrem.

Quò magis faucium est angustia & spirandi difficultas, eò periculosius Malum; ut plurimum enim intra quartam diem strangulat; interdum vero, sed rarior contingit, per modum Crises, sudore, Hemorrhagia, aliove modo terminatur: refert Exemplum FORESTUS l. 15. *observ.* 24. Cymaches verò quarto die per fluxum Menium criticum curavit: vid. HIPPOCRATES *Prognost. sect.* 23. §. 3. 4. 5. *Coac. præsent. sect.* 3. §. 96. *sect. 4. aphor.* 43. Contra, quò magis ad extrà Tumor terret, ut respiratio liberior fiat, v. g. in Parasychnche, ubi exteriores Pharyngis Musculi magis inflammantur, illi cum robore, & Tumore Collis exterioris, & interdum ad pectus extenso, si cum Tumore magis interno, sed exili: media ratione se habet Synanche, ubi interiores Pharyngis Musculi inflammantur ad Fauces, & Collum plura minus periclitantur.

Quò verò fauces & Cervix magis rubent, eò minus periculi: Partes enim magis externas inflammari indicio est: vid. HIPPOCRATES *Prognost. l. 1. alleg.* 3. *sect. 6. aph.* 37. & *sect. 7. aph.* 49. Qui testis, licet contradiere videatur observationem eundem HIPPOCRATIS, quum *apud. 166. §. 100.* 36. allegat, decidi tamen profect, diligenter considerat Ruborem partium externarum, qui fit per Metastasin; & illam qui fit per Epigenesin leventiorem: quorum hic lethalis, ille minus periculosus existit: vid. LAURENTIUS *anat. lib. 5. qn. 5. p. 143.*

Fit interdum in Angina, Tumore & Rubore foris apparente per Metastasin Casus pectantis in principio subito evanescit, sed in Pleuritidem mutatur, quæ conversio est admodum periculosa, *ixta. Coac. præsent. sect. 3. 1002. 101.* nisi ad locum minus periculosum alium materia peccans convertitur, aut critice discussa fuerit, quod præcipue ex maligna ægri dignoscitur: Nam inflammatio, quæ facile & subito evanescit, ad interiores faucium partes recurrendo, Suffocationem infert, aut alio in loco inflammationis periculolosiora contigit: Sic AMATUS LUSITANUS C. 5. *curat.* 37. periculosum Anginæ in Pleuritidem transitum obesse: vid. HIPPOCRATES *7. aph.* 11. Nam vel ad Cerebrum transferretur, unde Cephalalgia, Deliria, Phrenitis; vel ad Pulmones, unde Peripneumonia, Pleuritis; vel ad Cor, unde Syncope: etiam ad alia loca, unde varia Mala. Pertinet hæc *aphor.* 10. *sect.* 3. HIPPOCRATIS: *Quibus in Angina in pulmonem Mali fit conversio* i. e. qui Peripneumonici sunt, *inter septimum diem moriantur si vorè hoc efficiant, Empyrii evadunt.* Apophorismum hunc optimè explicat LINDANUS, nempe ea Angina, quæ effit in arteria aspera extra Laryngem, si suppuratur, ut magna ex parte fit, si contigit eam Membranam, quæ succingit asperam arteriam, per Materie suppuratæ rursusqueantem & pravitatem rumpt, ut Metastasin materiam hæc in pulmones, intereunt intra septimum diem; Inflammatur enim ab hoc materia decubita pulmo, hinc Peripneumonia; aut suppurat Pulmo, unde Empyema: Conf. HIPPOCRATES *Prognost. sect.* 23. *text.* 13. & *Coac. præsent. sect.* 3. *105.* & FORESTUS l. 5. *obs.* 24.

De cætero ex spæ quæque citius tardiusve producente in Angina, Salutis & Mortis signa petuntur: dum Anginæ si non brevi cõla exiguat, lethale: *iuxta. Coac. præsent. sect.* 3. §. 141. ut si almis arida spata fuerint, §. 109.

In Angina sine signis (nempe Colicis in ipso quasi critice) Dolores in Caput converti, lethale inquit HIPPOCRATES. Nam cum sine Crisi à materia translatione fiat, manente eadem faucium angustia, Morbum non immittit, sed augeri indicio est: vid. *Coac. sect.* 3. §. 112. item si ad alia partes sine ejusmodi signis Dolor extendatur, v. g. ad Crura, Hypochondria, *iuxta* §. 113. & 124. & *lib.* 5. *Epidem.* *text.* 36. §. 12.

Febris cum Angina conjuncta sæpius effit continens, seu eodem tempore continuè Ægrem affligens; interdum typum Tertianæ Continuum repræsentat; interdum Hemitritici.

Ista Angina, quæ a Tertiana Continua produci, seu cuius paroxysmi 36. horas perdurant, ut plurimum solet effit lethalis, observante LINDANO in *Hartmanno*.

Quò minus oculis fit litur Tumor, tam in faucibus, quàm extra eas in Collò, eò minus imminet periculum; quia interea Laryngis & Pharyngis partes sunt obesse: quò magis verò ab extrà conspicuus Tumor, eò tutius. Obvenerit hoc contra perierim usum Adstringentium & Repellentium, quibus in principio adhibitis Tumor coegit, ut interiores partes magis occupet. Certe interna talis inflammatio paucis est tuta, unde ex omnibus Anginis specibus omnium gravissima & periculosissima effit *Synanche*; ubi musculi Laryngis sunt inflammati: hinc *Perisychnche*; levior adhuc effit *Synanche*; levissima omnium *Parasychnche*.

Deinde Anginosa, sicut fibrillatilis & fluctuans, *forma circa Os apparetur sæpè lethalis signum est*, teste HIPPOCRATE *sect.* 2. *aphor.* 43. idque imprimis, quando cum tali circa Os Spuma magna adit respiratio angustia insignis.

Tandem si in Angina Vento Rarissime locutio eihil aut parum sanguinis fundit, molum signum est; contra si locutur fluat.

CURAE.

Consideravimus inflammationem faucium & Collis, partiumque illarum, tam internarum, quàm externarum; Superest, ut nunc consideremus *Curaem*, quæ ipsius insistenti *Sæpe* collit.

- I. Ut heterogeneum, si quod est impulsum, v. g. spina, tollatur.
- II. Ut sanguis stagnans tollatur, ipsique motus naturalis restitatur.
- III. Ut, si illud fieri nequit, per suppurationem id educatur.

Priori Indicationi quomodo satisfaciendum, ex Chirurgia peti debet: Nunc ratione secundæ observandum, illam perici partem sanguinis missio revulsoria est derivatoria, partim Diaphoretica & stentatione humoris impati, per *absorbentia* & *insensitiva*. Uxo verbo: Cura in omnibus est eadem, quoad Remedia *Spæra*, cum reliquis inflammationibus. Quoad *Extrema*, quæ speciem mercurii considerationem *Gargarisantia*, *Emulsiões*, *Cataplasmata*, & similia *Resolventia*, quæ, Fudum, Ovis, Tonsillarum, Laryngis, Pharyngis & vultu & palatum partium inflammationibus solent effit peculiariora.

Pro legitima ergo cura Anginæ ac cognatarum Inflammationum faucium, observandum.

I. Internè in Angina & relique faucium Inflammationibus etiam omnia ea conveniunt, quæ aliis in omni Inflammatione, speciatim *Pleuritidis*, in usu esse solent, ver. g. *Mictura simplex*, *spiritus Nitri dulcis*, *Dens apri*, *antimonium Diaphoreticum*, *Sallivolutiva*, &c. Sic VALERIOLA *obs.* 22. l. 2. refert, quid *Rufus* *Dentis apri* ad d. l. cum *Oleo amygd. dulc.* & *Saccharo cand.* propinata sit optimum remedium Anginæ, non minus quam Pleuritidis. In specie quæcumque animalium *extrema sua horrore* præ reliquis eminentiam habent, & in specie PARACELSO & HARTMANNO insigniter commendatur, interno & externo usu in principio Anginarum; impurgata enim hæc, & imprimis Avium Extrema, sunt Salo volatili nitrolo quasi ammoniacali, quæ omnes Inflammationes, imprimis Anginas, discutiendo & resolvendo solunt. Præ cæteris v. g. *serpens Equinum*, in specie *admirari*, quippe expulsum succo, vel huius parum in petu ordinario maceratum & expulsum si assumatur, expedit sudore, egregie convenit, & Anginam in prima herba detruccit; id quod etiam de Albo Græco seu *serpente Cæli* ad dr. ut & de stercomibus Ovium & Caprarum, similiter affirmari debet: extorret conveitit auid cum fesclore Hirudinum, hæc hæc & similia Remedia cum debito sudore, in Inflammationibus administrata, in specie in paroxysm Anginarum, & quædiu Ægri deglutire possunt, mulcum opus adferunt, quoniam febrem compescunt.

scunt, Sanguinem resolvunt, & ita Inflammationem tollunt. Conveniunt ergo in omnibus à Causa interna enatis imprimis Acidum infringentia, Sanguinem dissolvantia, & mediantes blando sudore partes assurgentes, quo tempore adhibita insipiente sunt salutaria. à. g.

℞. Aqua Prunell. ʒiij.

Spiritus Nitri dulc. ʒss.

Dant. Apipulveris, vel Lapilli, Camer. præp.

Antimoni Diaph. ana ʒss.

Lend. opiat. gr. ii.

Syr. Sempervivi ʒi.

M. S.

Potio Sudorifica.

Vel

℞. Antimoni Diaph. vel Recard. Min.

Dant. Apri, vel Zhor. suas igne, vel Max. Luc. ppi.

Nitri antimoniati. ana ʒi.

Sacch. ʒiij.

M. l. Pulvis. D. S.

Pulvis Refrigerans.

Urgente febrili siti convenit Julepsus de Floribus Papaveris, eorumque Tinctura cum spiritui Nitri dulci.

In horum usu & quidem cum Diaphorici, seu sudore persudendum, modò *Ægri* illa deglutire possunt: cum Canalis ex Syringa, quam RIVERIUS *Pr. l. 6. c. 7. & c. 3. Obs. 72.* pro alimentis & Medicamentis per Gulum ad Ventriculum impellendis, non semper applicari possit, nec cum effectu adhibetur.

II. In Tonsillarum, ac quilibet partium Oris, Anginis, & In genere in omnibus Inflammationibus, semper simul Lymphæ habenda est ratio, tam quæ nimis crassa, interdum simul acidâ, aut alio modo vitiosa, hinc inde Partes ferè omnes Oris internas densè inerscutit, cuius etiam adnec circa Glandulas & in Vasis Lymphaticis hæret; cuius vitii per Medicamenta interna *Antiscorbutica, Sanguinea, Astringentia, item Volatilia, & Astringentia*, ac similia succurrendum est; unde & liquor cornu Cervi succisurum expellendo sudorem in principio Inflammatarum Tonsillarum est nobilis.

Cum his III. Si ita visum fuerit, mox ad *Vena-sectionem* accedendum erit in Corpore Plethorico, sive si præmittatur sudor, sive si postpositur perinde est; Nam interdum utrumque in Angina benigna locum habet. Et quidem *Vena-sectionem* in Pede propter Revolutionem universalem, postmodum *Vena* in Brachio alterutra vel utroque propter Revolutionem particularem, sive Averionem, & quidem in Brachio *Vena* Ranzæ sub Lingua propter derivationem, insituentia est. Has inter Vena-sectiones interdum una alterave sufficit, interdum omnes administrandæ sunt: & quidem desiccantibus mensuris, vel iidem in fluxu suppressis, vel Hæmorrhoidibus, vel is Inflammatis, cum Angina conjunctis, vel concurrente alio simili vitio, semper in Pede secunda est Vena, secus ac FORESTUS *l. 4. de SENNERTUS Pr. l. 2. p. 1. c. 4.* rem sibi conceperant. Cæterum Vena-sectionibus solis non bñdum est, quoniam sæpius *Ægri*, quando videntur meliores, subito non raro suffocati intereunt; cuius rei Exemplum notatu dignum videbitis in BARBETTE *Pr. l. 2. cap. 5. de Angina*, ubi post iteratas Vena-sectiones *Ægri* videbatur sanatus, qui tamen subito suffocatus est. Quin etiam præter Remedia interna, ipsa Vena-sectione interdum aliquoties repetenda est, pro Circumstantiarum Subiecti, Temporum anni, affectuum adynamiarum, ratione: vid. FORESTUS *l. 19. Obs. 16. in febril.* & SYDENHAM *de Morbis Acut. l. 5. c. 7. i.* ubi ut, propter Corpus est juvenile vel senile, prout Plethora major vel minor, prout effervescencia febrilis impetuosior vel remissior, prout Incrementum Mælogiacutus remittens, vel minus adfectus fuerit, extensus Vena-sectione nunc semel, nunc sæpius administratur, idque eo magis, quò minus interna Remedia ob Fascium occlusionem exhiberi poterunt: cautius tamen in Angina Maligna insituentia, & vis nisi in primo Morbi principio.

Cæterum quidam cum Vena-sectione etiam *Puncturam Inguinali* insituentem fassent, quam commendat ad illustratam videbitis in RIVIERI *Præf. l. 6. cap. 7. pag. 198.* ZACUTO LUSITANO *l. 1. Præf. Admir. Obs. 95.* BONETO Mercurio Composit. *p. 15. §. 5.* BARTHOLINO in *Observat. Tr. de Angina Præf. epidem.* Imò RIVERIUS modum eam administrandi prolixe tradit. Verùm subinde est periculosa, & nonnisi ab esperto & erudito Chirurgo caute peragenda venit; qui rariore apud nos fuit, hinc merito ab illa abstinemus. Tutiores sunt Cucurbitule incisæ Cervicis, scapulis, & mento admodum: vid. ZACUTUS LUSITANUS *l. 4. Obs. 94.* Quod attinet Vena-sectionem

Ranzæ sub Lingua: hæc tantummodo in statu Morbi convenit, præmissis scilicet reliquis Vena-sectionibus, quando Inflammatio jam nullum amplius augmentum capit: Secatur tunc cum in finem, quia Ranzæ sunt illa Vasa, per quæ naturaliter Sanguis reduci solet, qui in locis vicinis flagrans Inflammationem infert, uti etiam is impediens flagratio, & revocatur in motum naturalem Sanguis fecit, Vena Ranzæ: de quidem si aperte hæc ipse quocunque in casu bene statim cum impetu & quasi saltu, bonum signum est, si verò parum vel nihil Sanguinis fluitet pro malo, imò lethali signum habetur: vid. M. A. N. C. *Ann. 3. p. 376.* Interdum sola hæc Venarum Ranzarum sectio præcaveat Anginam, si accedente Angina præservatiois gratia mox appetantur, idque spectatum eo in casu, quo Corpus non est nimis Plethoricum, nec Fervor ac effervescencia sanguinis febrilis adeo intensus est, sed quando tantum coarctat is impedimento aliquo sanguinem in sua refluxu impediendo: si in tali casu mox in principio secetur Ranzæ, prævenitur Malum: Aliis nonnisi in perfectæ Anginæ statu utile erit illas secare. Huc etiam spectat, si *Hæmorrhæ*, Venulis his applicentur, de quibus videtur: ZACUTUS LUSITANUS *l. 1. p. 278. cap. 12.* Nec obstat, quo minus in casu urgente, & suffocationis periculo imminente, etiam sine alia evacuatione prævia Vena hæc aperiri liceat: vid. ZACUTUS LUSITANUS *l. 1. pag. 187.* & ROLFINGIUS *l. 3. Conf. 6.*

IV. Observandum, in Angina Febrim Malignam Symptomaticam, seu quod ferè idem est ac Anginæ Epidemicæ, nihil attendendum prius, quam ut specifica illa Malignitas corrigatur, & appropriatis *Sudorificis, Julepibus Opiorum*, maturè discutatur se eniciatur: quoniam curato Morbo, Symptomata ferè ipso ac facillè acquiescunt. Et in tali casu locum non habent, aut saltem nonnisi casualitèr & in primo principio, antequam Malignitas debacchari incipiat insituantur Purgationes & Vena-sectiones, ad scdò P. L. TRÆUS, & DECKERS *l. 1. p. 49.* monent. Quin potius præmissis ferè Clymate, solis-lubrificatis, & Alexipharmacis studiose est insitendum, quibus nempe Ebullitio febrilis sedetur, ac malignitas rejicitur. *℞. verò Medicus caveat sibi in tali Angina non haurit taliter appropriatum, ne ipse similiter ab hac Malignitate corripatur, eum ferè admodum contagiosa esse solet.*

V. In Anginæ Cura *Pomeria* à quamplurimis insigniter commendantur, v. g. ab HARTMANNO in *san. Pr. Chymiatr. p. 150.* & BARTHOLINO *de Angina Præf.*, & quidem monente HARTMANNO in Angina insitiente & confirmata; item à RULANDO in *Empir. Obs. l. 1. p. 95.* qui sæpius cum fructu usus fuit iidem. Ulteriorum singularissimum usum videre poteris in RIVIERI *Præf. l. 6. c. 7. & Cent. 2. Obs. 10. & 11. item in C. 4. Obs. 60.* & in aliis multis locis, qui Aquam Benedictam Morbum non raro intrà biduum dissolvere perhibet. Verùm & laudem & vituperium merentur, & causæ admodum in bonum legitima usus procedendum est. Legitima ergo observanda Occasio, cum Anima omnis Præceptis, in Vomitoriorum usu: *Duo enim sunt tempora, in quibus conveniunt Vomitoria, nempe Principium, aut perinde admodum statum Morbi.* Quod Principium Morbi, hinc admodum profusa sunt Vomitoria: Fit enim, interdum sæpe, ut dicit LINDANUS, ut Causa Occasionalis remota Anginæ sit vitiosa Excrementa in Stomacho & in primis visibilibus, in specie Humor, quem vocant Bilem Aëruosam, in qua, ubi notum est, peccat Acidum imprimis, dum illa Bile subtilia & morcantia effluvia mittit ad Oesophagum & Fauces, ubi ipsorum stimulo fit Inflammatio & Angina. Quando ergo *Ægri* tellantur, in sub primo Principio Morbi percipit vitiosos sapores in Lingua, æruginosum, acrem, amarificum, plūs minus aërosum cum aëre quodam, quæ Soda, in Gula quondam titillationem, seu quæ erationem, fluctuationem in Stomacho, nascentem, ac anxietates Præcordiorum, id quod ferè similis fit in Angina, in tali casu protinus & adductè opera danda est Vomitoria, in specie Antimonialibus, imprimis *Aqua Benedicta Rulandi* seu Infusione Antimoniali, ut ita præcaveatur futura symptomata, dum non tantum quocunque vitiosus Humor ex Ventriculo tollit, sed fluxa vim emeticam etiam interdum sudorem movet, ita quando gravitas in Hypochondriis sentitur, Vomitoria itidem conveniunt. Præterea in Angina Maligna & epidemica grassante, & quæ per Contagium afficit *Ægros*, de quibus videtur WIERUS in *Observat.* non secus ac in Pelle vel febrilibus Malignis contagiosis, opacum videtur consilium, mox in primo Principio interdum luppeditare Vomitorium, utpote in quibus

quibus eorum usus est maximè necessarius, modò maturè
administretur.

Cumque post primum Principium conuenientiam Vomitionis in periculis *Maris Status* tempe et in calis, quando scilicet iam facta est suppuratio, & symptoma maxime uigent, iam quando Faeces abesse non preclude, dum perit angustiam, & inestupidum loci, aut profundius sunt fitus abfcessus suppuratus scapali aperiri sequi, quin potius ea tumore imminuit suffocatio, nisi sponte perierit, metus fit, ne ruptus abfcessus in Pulmones intraret, & similiter Ægrum suffocet, aut in stomachum irumpat, & eundem suffigat viciet. Tali sub anxio statu, uel alias ardens fuit anxilia, uel abfcessus aperitur vi, ne delapsurum relinquantur Ægrum, ultimum quod refugium est vomitus, quo quasi concutitur abfcessus iam maturatus, & ita ruptus. Pus per superiorem effluat; quod R. VERIUS C. 4. & RULANDUS obferunt, alii confirmant. Periculose equidem est Remedium, dum Faeces occlusæ, provocare vomitum, propter suffocationis metum, quæsum TRINCAVELLIUS l. 5. c. 7. testatur. Facinoram quandam ex assumpta Cassia secuto vomitu strangulatam fuisse, *deserit nam satis tamen est Remedium, quod est unum*, dicit CELSUS. Quod & Medicamenta Vomitoria non possunt fempus deglutiri, nihilominus tamen, 6. tantillum deglutire possunt. Equi, sufficiens Infusa Antisomolalia; 6n vero nil deglutire queant, vel Pluma Oleo illa subinde irritanda Fauces, vel liquor vomitorius iidem Tubide irritandus, *aut Mercarius Velle Melle* exceptus Fauces illiendos. Hic enim modis ad vomitum provocat stomachus. Cula concutitur, & ita abfcessus rumpitur.

VI. *Purgantia*, quædammodum in quibusvis Inflammationibus Internis, ita in Angina quoque via locum habent, nisi primas vias statim in principio pharmaco blandiendi, progressu temporis Clysteribus, evacuare mens sit, quos ætiodie repetere convenit.

VII. In *Tonfillaria*, *Inflammationibus* supedis subinde reperiuntur, præterit illa, quæ ex Lymphæ vitio, v. g. fluctuant aliove simili habitu, crebris recidivæ, præterit ubi Acetæ aut aliorum Circumstantiarum ratione à princ. malum non bene curabile existit, *Fomentis* Decoctionibus convenientissimum est Consilium præteritativum. Suppes enim evadit, ut qui semel in quadam parte Inflammationem suppuratam fuerint passi; & forsâ Fermei nigrescit aliq. residuum manens, & facili occasione ex irritatione undecunque facta, præterit in Corpore Cacochymico, mox recidivæ Inflammatio, idque facili in locis glandulosis; Quibus in Cæcus pro Cura Palliativa Fomentis videtur convenientissimum, potissimum cum Amp. singulis anni repetere, fomentum sub merito à Natura excruciatum præteritæ **ZACUTUS LUSITANUS** l. I. *Præf. Admir. Olf. g.* refertur Unde non inconveniens erit, Itam in Angine principio p. primam fanguinis mifcitione Vesicatorum Cervici apponere; vid. *RI-VERSIUS. P. c. 16. c. 9.*

VIII. Non confundenda sunt Inflammationes, allicque fauces partemque vicinam tumores, sive à sanguine, sive ab aliis contentis excitantur, cum *Prussella*, illo nempe Linguae & faucium symptomate, quod in *Pekelio Actus*, ac in specie *Crocutus seu Hungarici*, familiare est. Utiprimo hoc evenire solet, ut omnes dà Angina trahentes practici remedia contra *Prinellam* usitata ad Anginam simul conferant, facile cum legitis confusioe. Est talis *Prussella* distans *Strepida* tunc in specie ex *Causis*, *Temperamentis* major (annuus) aut adfringentibus vulgo, sed quæ ex ratione, non video) *Prussella*, *Masilgion*, *Sal Ammoniacum*, *Mittum*, *Butyrum*, *Lardum*, &c. quæ ipsa nimis Anginis, nisi aliis temperata vel caute applicata, convenire possunt. Quando talia laudet PARACELSUS, respicit ad prinellam, symptoma illud Febris ardens & Morbi Hungarici; adeoque non in Angina, sed prinella locum habet, qualia sunt:

24. *Aqua Semperviv. maj. Ed.*
Succ. ep/d. medior. exp. Will.

Amesbury, 31.
M. E. C. Goodfellow.

D. S.

Dissolvens Gargarisma:

Yes

J. Comp. Neurol. No. vi.

Herb. Semperv. maj. M. lii.

Contundantur, succus exprimatur;

D. S. ut antè.

Succus hic in Prunella, Febri ardentis ac morbi Hunga-

cici comite, non verbò in Anglia, conveniet.

New

24. *Agua ex succ. Semperviv. maj. Tib.*
Succ. Cact. flaviat. Bvi.
Sol. Ammon. Zili.

M. pro Gargarismate.

D. S. ut ant

IX. *Enteræ* *semel* ipsi partibus inflammatis, Fauces, Tonsillæ, &c. applicabilis, uti fuit *Gargariæ* *Oris*, *Lites*, *Cataplasmata*, *Onguenta*, *Emplastra*, &c. *Emilia*, eo sint directa, ut () quantum possibile, resolvant & discutiant faugum, namque, & inde natam Inflammationem, & talia sunt blanda *Incidentia*, quæ pœnorantia volatilibus, &c. scopis hic contrarius est vulgari methodo, quæ in principio *Repellentia*, *Adstringentia* & *Refrigerantia*, quæ tamen pœfusa fuit, suadet. Quid hic tamen hoc fieri nequeat, () ejus suppositionem, hinc maturationem adducunt; uti fuit *Temperata* & *Emollientia* () Tandem maxime abscessum aperiant, eadem, aut acrioribus mista. Item *Auxilia Chirurgicæ*, aut deoque *Ymerica*: () Apertum abscessum purificant & consolidant per *Valerianæ* & *Adstringentis*: () Partem restitutam denuo sument, ac naturalium eorum ejus resiliunt, nempe per *Adstringentia*, ne harum atonia in causa sit, ut sæpius accidit Inflammationibus.

In principio epidemiarum ratione vulgaris medendi methodi in
Gargarismis refulcentis flosa raro usurpantur, sed ad-
stringentia, nunc flosa, sunt dicuntur adhibita, ut nempe
inter partes Oriti & Fuscium nonnulli addidit
alium Tumoris purum intermedium incrementum præve-
niunt, ne deglutitio aboleri, aut suffocatio inferri possit
vellet quam præparare hoc flos, ex doctrina repellentium
manifestum, ac præterea periculum est, ne humidi ad-
stringentibus superiora falcim loca proximè fringantur. Tu-
mor autem & Inflammatio partium inferiorum se intenden-
tur, & ad interiora converterent, hinc frangulansque me-
tus incenditur, ut reddè comprobant MARTIANUS in
Opera, lib. 2. de *Morb. Coll.* 5. §. 2. HEURNIUS in *Præsi-*
de Angina, ac SYLVIVS in *1. Pract. cap. 9. §. 2. & sequenti*
etiam DECKER 3. in *Comment. super Eran. Barthez.*
p. 37. ut tacitum quantum periculi, in Angina Maligna ex
quomodo repellente metuendum. Repellentia tunc damna-
ta, quam repellere est impossibile, ac sunt tuores, que
nec non refluunt Sanguis, cum contrà adstringentibus sit
fluxum & reflexum impediunt, easasperant tumores;
unde cauti flos in lectione prædicuntur quod hoc pū-
dum, cum pland isofolis dicitur camphuratum, in hoc
passu, præcelsis. Potius ergo gargarisma talia conveni-
unt in declinatione Morbi, ut adstringentibus talibus
partes per Inflammationem læsæ & plus minus telasæ
limentur denso, & in debitum tonum restituantur. Solu-
tione in principio convenient refulcentia, & hinc Emol-
liscientia: tam gargarisma, quam Cataplasmata. Vitanda
tamen flos omnis Affluxu, & Emollientis quod, ne nimio
horum usus affluat fore pauciora. Quod gargaris-
matum usum observandum est, ex quodammodo suspensa est,
quia partes inflammatas omnis commovetur, que tamen
potius quærent polluantur, ne ea motu dolor, ex dolore
tumor, adeoque Inflammatio falcim doloris ratione se
intendatur. Cum enim partes fuscium doleant, difficulter
& non sine dolore Ægri possunt gargarire: nec gargaris-
mata siphonis vi, easque magna, impisci debent: violen-
tior enim fuscium partes inflammatas magis irritat: Sic
in Anginolis nihil mollescit illi, quam gargarizare, cum
propter lucam Aeris cum aqua gargariando in angustia
falcium labor, motus, dolor, & Inflammationem potius
augent & easperant. Propereq; falcim in principio conveni-
entia gargarisma, in progressu autem ex falcim lucam
omnis prædicta est, que hunc cum motu; & LINDANUS
tales suos Ægros nunquam gargarizare, quiu potius tan-
tummodo de gargarisate uoum alterum Cochlear aut
q. l. in Ore tenet, ac ea sensim ad fauces depellere respo-
ndent Corpore atque pauliper flos insigni agitatione tene-
re, & se postmodum ex Ore denus emundare jubet, mo-
do sæpius repetat. Nam quod frequentius, sed melius est,
ut ita brevi operatio succellere se cæcet: vid. RIVE-
RIUS p. 1. a.

Pro his scopis inter Remedia, quae aut gargarizando, aut illinendo, aut externe tanquam Cataplasmata applicando, ad Anginas ac cognatas Inflammationes usurpantur, sunt eodem iure cum aliis ad Inflammationem extrinsecus admodum. In facie ea, quae

1. Sanguinem stagnantem resolvat, & tumorem incipien-

Sem. Sinap. 3℔.
Ros Dia-Mor. (vel si minus adstringere volueris) *Ros Dia-Nucum* 3℔.
 M. pro Gargarismo.
 D. S. ut supra.

Vel

℥℥. Flor. sambuci M. ii.

Chamom.

Herk. Melior. ana M. i.

Alk. Grac. 3℔.

sem. Eruc. contus. 3℔.

Pufful. minor. 3℔.

Coqu. in l. q. Cerevis. feruatur.

Colatur. 8℔℥. adde

Sal. Ammoniaci 3℔℥.

M. pro Gargarismo.

D. S. ut supra.

Item sequens Gargarismus Resolvens, & Discutiens, quem

dedit in Colleg. formul. cap. 4. & id. formular. class. 4. §. 16.

℥℥. Rad. Leuif. 3℔.

Apv 3℔. vel 3℔.

℥℥. Flor. sambuci M. i℔.

℥℥. Malus M. i℔.

Pufful. may. contus. 3℔.

Coqu. in l. q. Aqua comm. vel decoll. Herd.

Colatur. 8℔℥. adde

Sal. Ammoniaci depur. 3℔. ad det.

M. pro Gargarismo.

Gargarisma Resolvens.

Mell. Mercurial. 3℔.

Spiritus Theriacal. 3℔.

(aut in Angina Maligna ac Contagiosa *Spiritus Vin*

camphe. 3℔.)

Spiritus sal. Ammon. 3℔. ad i.

M. S. ut ant.

Vel in decocto quodam diluto dissolvatur q. f. Sal. Tartari,

& sal. Ammoniaci, ut ita sui juris fiat Sal volatile, ac ita pe-

netrare queat, addito pro temperanda Volatilium acrimo-

nia aut Mellis refuso, aut Symplo Palarum, aliove simili tem-

perante. Sanè loco Gargarismatis domestici optime in his

calidibus convenit decoctum Hordei vel Avenae, in quo pa-

rum Sal. Ammoniaci dissolutum est, imò sola urina huma-

na calida aut calefacta loco Gargarismatis adhibita, multa

Composita superat.

Item;

℥℥. Herk. Merf. Diab. M. iv.

Scabif.

Vernac. ana M. i.

Alk. Graci 3℔.

Coqu. in l. q. Aqua simpl. pro Gargarismo.

D. S. ut supra.

Vel

℥℥. Aqua merf. Diab. 3℔.

Beton.

Scabif. ana 3℔.

Ros Nucum.

Dia-mor. ana 3℔.

Alk. Grac. 3℔.

M. pro Gargarismo.

S. ut supra.

Vid. Colleg. Pharmacum, in Suburatum. Præter talia Gar-

garismata resolventa, ulterius etiam Externa pro simili-

bilibus scopis in usu esse solent; v. gr. pro discutiendo & resol-

vendo Tumore convenit Cataplasma supra laudatum ex ob-

ferio re. confusa cum pinguedine porcinæ, quod RULAN-

DO p. 101. in principio, & incremento est egregium: Vel

Bercus Caprillum cum Aceto & Melle; vid. RULAN-

DUS pag. 98. Insuper appropriatissima Cataplasmata, in

principio, & incremento Morbi convenientia, parantur ex

Nido Hirundinum, & Albo Græco; de quibus infra ubi de

suppurantibus. Pro scopo autem resolvendi, & discutiendi

Nidus Hirundinum cum Vino coquendus. In omni Inflam-

matione speculum est sequens Oleum, tam in Inflamma-

tionibus à Frigore, quam Calore ortis:

℥℥. Sulphuris circ. pulverif.

Sal. Tartari ana det.

Probi mixta liquefiant blando igne in lobete; massæ fri-

gestæ & pulverisatæ affundantur

Olei Amygd. dulc. 3℔.

Camp. 3℔.

Strot in digestionem per tres dies:

adde

℥℥. Hyperic. M. 8.

Iterum digerere, & ului serva.

Vel

℥℥. Olei Amygd. dulc. unc. i.

Spiritus sol. Ammoniaci q. f. pro consistencia Li-

nimenti.

M. D. S.

Unguentum Dissolvens.

Quod extrinsecus locis tumensibus calide crebère illinendum.

Vel ex Terribintina, cum sola velatili Urina, non sola Am-

moniaci malaxata, & hinc cum Unguento Diacithas, Empla-

stro de Mellis mista.

Vel

℥℥. Empl. de Mell. q. f.

malaxetur cum Oleo Philophar.

vel Ol. de Illiat, faciat aut Cere.

D. S.

Emplastrum Resolvens.

Externè enim applicatum incipientes inflammationes Ton-

sillarum, & facium tollit & discutit.

Vel

℥℥. Ung. Diacith. 3℔.

Olei Lil. alb.

Chamom. ana 3℔.

Philof. vel faciat. 3℔.

M. pro Linimento extereo, S.

Unguentum Resolvens.

Quid si verò nequeat discuti talis Tumor, in progressu

Morbi pro maturando Abcessu, ob dolorem, & excoriatio-

nem Faciam, & Philogelo, nil, quod tantillum acre sit,

sed simpliciter dulcia temperata Emollientia adhibeantur,

ne dolores exacerbeantur. Quo in casu in incremento, & sta-

tuale convenit Gargarisma temperatum emollientia, & ad

suppurationem disponens:

℥℥. Rad. Liquirit. 3℔.

Abali.

Per ana 3℔.

℥℥. Chamom.

Refar. yak.

Hyperic. ana p. ii.

Dafyl. Noii.

Ficuum Noii.

Sem. Foenugr. 3℔.

Alk. Grac. 3℔.

Coqu. in decoll. Rapar.

Colatur. 8℔℥. adde

Syr. Capill. Veneris,

Japhin. ana 3℔.

M. pro Gargarismo. S.

Gargarisma Leniens.

Nam propter Dolorem, & Fauces excoriatas in progressu

Morbi vel minimis acris sunt admodum dolorosi. In pro-

gressu ergò Morbi talia Dulcia ac blandè Detergentia, &

detergendo Maturantia conveniunt:

℥℥. Rad. Alth. unc. ii.

Liquirit. unc. i.

Herk. Malv. M. i.

Chamom.

Mellif. ana M. 8.

Fic. ping. contus. Noii.

Alk. Grac. 3℔.

Coq. in l. q. Aqua comm. vel decoll. Rapar. vel fer. La-

tit; vel ubi minor adeit Aetius & nimius dolor, ipso

Lacte cum Aqua misto vel Lacte chalybeato, pro Gar-

garismo: (nam Serum Lactis, & ipsum Lac calidum

in Ore detentum potenter deterget, dolores leniunt

& Abcessum maturant.)

D. S.

Gargarisma Emollientia.

Vel

℥℥. Herk. Malva,

Mellif. ana M. i.

Rad. Alth. unc. i.

Fic. ping. No. vi.

Coqu. in l. q. Lactis; aut ubi Ardor & Inflammatio In-

temior, in ferro Lactis, Colatura à 8℔℥. ad 3℔℥. usque

vel ita orbi, vel addatur

Syr. Vitar. vel Mell. de Gum. f.

M. pro Gargar. Anodyno & Maturante in statu:

D. S. ut ant.

Cui, si Materia suppuranda pituitosa ac viscidior fuerit,

aliquid Rapar. Vitis, una incoqu. Vid. Coll. form. l. a.

Præter ea Gargarismata, etiam externè conveniunt Em-

plastra, Unguenta, & Cataplasmata. Inter Unguenta usita-

rum

tum est Unguentum Dialithæ cum Oleo Chamom. vel Amygd. dulcium: inter Emplastrum, Emplastrum de Melibato: inter Cataplasma, Emollientia & suppurantia: v.g. sequenti modo conuenienter solent ordinari:

℞. Madull. Papis tridit. ℞℞.

Rad. Alib.

Lil. alb. ana ℞i.

Sem. Lini ℞i.

Fennagrat. ℞℞.

Cogn. in Lactæ dale. q. l. ad confus. Pulvis: trahiciatur per Setaceum; adde

Ol. Amygd. dale.

Lil. alb. ana ℞℞. vel ℞vi.

Buty. rec. ana solut. ℞iii. vel ℞℞.

Cerei ℞℞. ad ℞i.

Stell. evar. No. i. vel ii.

M. applic. pro Cataplasma. omnibus horis repetendum: &

Cataplasma Emollientia ad Collum.

Temperata enim huiusmodi temperant acrimosam Salium in Inflammatione suppurantem effectuentiam; & quod magis temperant acrimosam, eo magis Dolorem minuunt, & suppuracionem promouent.

Vel

℞. Fl. ping. No. vi.

Herb. Malua.

Melilot. ana Mi℞.

Cogn. in l. q. Lactis:

Colaturæ ℞ii. adde

Mell. de sumat. ℞i.

M. f. Cataplasma suppurans contra Tumorem Tonsillarum.

D. s. ut supra.

Vel

℞. Herb. Malua Mi℞.

Melilot. Mi.

Flor. Chamom.

Samb. ana Mi℞.

Ficuum ping. par. iiii.

Cogn. in l. q. Lactis ad putrilag. trahiciatur per Setaceum.

Pulvis trahitæ ℞i. adde

Puls. Sem. Lini.

Fennagrat. ana ℞i.

Olei Lil. albor. ℞i.

M. pro Cataplasmate.

D. s. ut supra.

Cataplasma suppurans & Discretiens cum Myrrha vid. in HORSTII *lib. 125 & 126.* *Vel*

℞. Capas cavam, iunmitte Theriacam,

& impone.

Ceterum appropriata hic magis sunt ea, quæ sunt ex Nido Hirundinum (quod plus stercoreis habet, eo melius, quod nitrosum, & ammoniacale imprimis conuenit in cura Anginæ) sobigitur & coquitur cum Melle, Azung. Porci, inspergendo *Alk. Graecum*, & sic fit Cataplasma, simplex quidem, sed admodum egregium in cura Anginæ.

Vel

℞. Nidi Hirund. cum fere. No. i.

Alki Graei Mi.

Hæc coquantur in *Vino*, in principio Morbi, ubi discretiendum; vel in incrementum & statu, ubi maturare & Dolorem sistere animus est, in *Lactæ*: trahiciatur per Cribum, & sepius applicetur instat Cataplasmatibus Colli & Faucium regionis; quod admodum egregie conuenit.

D. s.

Singulare Cataplasma ad Collum.

Qui autem compota Cataplasmata desideravit, præscribat Emplastrum seu Cataplasma de Nido Hirund. MYNSICHT. in *thesaur. foli. alrim. pag. 520.* Item Pauli Lutheri, in SENNERTO ubi de Angina; item BARBETTE & DECKERS in *Chirurg. ubi de Inflammatione, in specie de Angina pag. 55 & 58.* Vel potest fieri tale Cataplasma compositum.

℞. Nidi Hirund. cum fere. Num. i.

cui adde

Herb. Malua.

Althæa ana Mi.

Flor. Chamom.

Melilot.

Sambus ana Mi℞.

Farin. Herd. ℞iii. (vel huius & Farin.

Faber, ana ℞℞.)

Tom. II.

Cerei ℞i.

Olei Ros. ℞i℞.

Chamom. ℞℞.

M. cogn. in Aqua vel Lactæ, & instat Cataplasmatibus applicetur.

D. s. ut supra.

Vel

℞. Rad. Alib.

Lilior. alb. ana ℞i.

Flor. Chamomill.

Melilot.

Malua ana Mi.

Sem. Fennagrat.

Lini.

Psylliana ℞i.

Alib. ℞iii. ad unc. ℞.

Nid. Hirund. No. i.

Alk. Graei unc. i.

Fl. ping. No. iv. vel vi.

Incis. & coctus cogn. in Aqua simpl. vel Lactæ, vel Sero Lactis, ad consistentiam Pulvis: Pulvis trahitæ adde

Olei Lilior. alb. unc. i. vel ii.

Buty. vel Chamomilla ℞vi. ad unc. i.

Puls. Nidæa comb. ℞i.

Cerei ℞i. vel ℞℞. ad ii.

Stell. evar. No. ii. vel iiii.

M. pro Cataplasmate Resolvente & Emolliente in Inflammatione Tonsillarum.

D. s.

Cataplasma Emollientia.

Omnibus 4. vel 5. horis repetatur.

Hic ipsi cataplasmatibus *Cyperus in sub sicut. uellum unc. ℞.* vel etiam *succus Ceperum* conuenientissimè additur, imprimis in Inflammationibus Nothis, ubi non sanguis purus, sed magis pinitosus, seu Chylus magis temperatus Inflammationem excitauit, cum succus Ceperum potenter maturat, simulque abscessum rumpat. Loco seminum, eorum Farinæ Pulvis trahitæ addi possunt: c. ℞.

℞. Nid. Hirund. cum fere. Num. ii.

adde

Herb. Malua.

Althæa ana Mi.

Flor. Chamom.

Samb. ana Mi℞.

Farin. Herd. unc. ii. vel iiii.

Cyp. sub cin. coct. No. i.

Cogn. ad confus. Catapl. adde

Olei Chamom. unc. iii.

M. s. ut supra.

Applicetur externè Anginis & Faucium Inflammationibus.

℞. Nid. Hirund. cum fere. Num. i.

Cyp. sub cin. coct. Num. iiii.

Flor. Sambus. Mi. ii. vel iiii.

Cogn. in cerevisia vel Lactæ

Pulvis trahitæ adde

Alki Graei unc. ℞.

Olei deffilur. Chamom. ℞℞.

Cum l. q. Olei Chamom. coct. vel Lilior. albor.

F. Cataplasma. D. s.

Cataplasma Emollientia.

Vel

℞. Nid. Hirund. No. ii.

Alk. Graei.

Rad. Liliur. albor.

Althæa ana unc. i.

Fl. ping. No. iv.

Flor. Chamomill.

Melilot.

Malua ana Mi.

Sem. Fennagrat.

Lini.

Althæa ana unc. ℞.

Cyp. ℞vi. (BARBETTE præp. pag. 12.)

Cogn. in aqua Prunell. & semperuio. ad puz. 12. postea

trahitæ per Setac. adde

Puls. Nidæa comb. ℞℞.

Ol. Lil. albor. q. l.

M. pro consistentiâ Pulvis S.

Puls. externa ad Collum.

Applicetur calidè: Experimentum est D. MICHAELIS. Loco Cierum Nocturæ usurpari possunt Cineres Hirundinum.

T t t

Vel

Vel

℞. Rad. Alib.

Lil. alb. ana ℥i.

Cypar. super ciner. coll. dr. vi.

℞ di Ruland. No. I.

Pianum.

Daffyl. ana No. iij.

Alb. Græc. ℥℥.

Coqu. in C. q. Aqu. hordai.

Colaturæ ℥i. adde

Favæ. tritis.

Sem. Lili.

Favægr.

Rad. alib. ana ℥i.

Vitell. avæ. No. ii.

Croc. Orient. ℥i.

Olei Chamom. ℥i.

M. pro Cataplasmate,

D. S. ut suprà.

Præmittantur his Cataplasmatibus ceteræ Inunctiones ex no. q. Dialtham. vel aliis Emollimentibus suprà dictis, & deinceps Cataplasma applicetur pro meliori operatione, quod toties repetendum & reiterandum est, quoties succetur, succum enim nullus est ulius.

Suppurata his ipsis Inflammatione, pro meliori abscessus apertura Facies illinatur interne cum Melle, vel solo, vel cui additum sit q. i. Albi Græci, quæ probè permixta & subalida illinuntur cum Plasma vel Penicillo; hoc namque admodum maturat abscessum, & suppuracionem promovet: Vel Malt aut Sympus de Rosi siccis cum cineribus Hirund. tubachum, & abscessus illium optime solet maturare, & aperire; aut etiam, si fieri potest propter dolorem, parum Maltis Ammoniaci addendum est, & erit eo melius: item Noctua combusta cum Melle mixta & illita promptè abscessum aperire adestur. Quidam commendant tanquam specifi- cum ad Anginam Filium purpureum, cum quo strangu- lata fuit Viperæ, si Colla circumdatur; de quo Experientia confidenda: Res mihi videtur admodum dubia. His ipsis si sponte aperitur abscessus, res salva est: verùm si hoc non fiat, coquat Gargarisma ex Simpi in Hydromelite, c. g.

℞. Hydromel.

Sem. Simpi ℥i.

Hoc coctum in arc detineatur & gargarifetur donec abscessus apertus. A SENNERTO in præci. ubi de Angina, laudatur ad erò reolvendum: in suffocationis discrimine admodum præstans habetur.

Alii recipiunt spiritum Viterioli, cui plasma leviter in- tincta, hac ipsa stringunt abscessum: ut ita pumptur.

Vel

℞. Viti alib. vel etiam aqu. font. ℥iij.

Olei Viterioli gutt. xxi.

M. D. S.

Gargarisma Aperiens.

Hoc sæpius gargarifetur ac eluatur iidem Os, ac Fauces: sic enim cito ruptus fuit abscessus, & est Expositum RU- LANDI in Thesauris suis.

BARTHOLEIUS Cui secretum ad rumpendum Abs- cessum commendat Cataplasma externè applicandum, scilicet ex cremore Radic. Ireos recentis, cum Butyro & Oleo violaceo, quod mirabil cum successu abscessum tumpere adestur.

Aliis irritis Secretus, Tussis, ac tandem Vomitus provocandus est, quæ abscessum nonnihil aperiant. Quibus etiam irritis, Scalpello incurvato, si pateat abscessus, (si aliquo modo videri potest,) aperiendo & incidendo, ut à suffocatione liberetur Ager. (P.)

Quod si suffocationis imminere periculum, aut modis hi- sic nec Tumor, nec abscessus, removeri aut aperiri queat, ne suffocetur Ager, Laryngotomia, quæ Germani pavidi abhorrent, admittenda potest; auxilium tamen aliud est fa- ciet tutum, & absque ullo periculo coniundum, de quo vide Chirurgi prædici, v. g. BARBETTE in præc. &c.

Aperto abscessu, tertio loco Utas in faucibus mundandum & denum consolidandum est, pro quo scopo iservit Gargaris- ma ex Aqua Mulia, in qua aliquoties Ferrum ignitum sit extinctum, si eadem eluantur Fauces: vel

℞. Durell. Hard. ℥i.

Mell. rosæ ℥iij. vel ℥iv.

M. D. S.

Gargarisma Eluens.

Quod sufficit: Item adhibetur Decoctum Plantag. cum Rad. & Falus Quercus vel Mespilorum, cui Mel aut Rob Diamoroni additum sit, quæ purificant, & consolidant: vid. RULANDUS p. 38. Vel mixtura TIMÆI l. 2. Cap. i. sub Lintho specie utrapoda; item Decoctum Veronice cum Melle; quibus in abscessibus contumacioribus, & quæ con- solidari noluunt, addatur parum spiritus Viterioli, quantum saltem ad blandam aciditatem necessarium est, parum me- lliis purificat, partim consolidat abscessum, utut probè ob- servandum sit, quod foetida ac contumacia Tonsillarum ulcera ordinariò ferè pro fundamento habere soleant Lucum Ventrem.

℞. Herb. Prunell.

Veronicæ.

Salvia.

Scabiosæ ana M. i.

Rad. Liquirit. ℥iij. vel unc. 8.

Alum. crud. ℥i.

Mellis rosæ. unc. ii.

Coqu. in C. q. aqu. simpl. pro Gargarismo.

Colatura D. S.

Gargarisma Eluens:

Vel

℞. Herb. Prunell.

Veronicæ.

Salv. ana M. 8.

Rad. Polyod.

Liquirit. ana dr. iij.

Alum. crud. dr. i.

Mellis rosæ. unc. l.

Coqu. in C. q. aqu. simpl.

Colatura adhibetur pro Gargarismo purificante & consolidante: D. S. ut antè.

Quod si propter lætorem Scorbuto Ulcera talia faucium sint emaciaciora, optimum est, si Mell rosæcum imprægnetur cum spiritus Salsæ med. restitutus q. i. ad suavem accen- tum quo ipsa multa præstari possunt in Fauces & Oris Exulcerationibus.

Quid si feriditas sua Ulcera, ad Viride Aëris recurrerendum erit; necpe vel ad aquam Viridem PLATERII, aut HART- MANNI, quam videt. in epis. pr. Chym. cap. 52. inf. a & y. Quibus ipsis stringantur Ulcera Penicillo, & hinc vel Gargarisma, vel Lixur cum Melle rosæcum instituitur; vel horum loco recipitur Chirurgi Unguentum Myrticæcum, sub- iungunt cum Melle rosæcum, ita ut acrimonia ejus nonnihil temperetur. Hoc ipso cum Penicillo attingunt & mundificane Ulcera, præsertim fœdida, aut jam ad Gangramam decli- nantia. Crassiditas postmodum talia ulcera desolam Vomiti- cum Melle, quod est potestius est, si de alumina aliquan- tum simul addatur. Tandem & Linimenta cum paxillo aluminis pro consolidando abscessu non sunt incongrua; hinc ad imitationem TIMÆI von Goldenklee, c. g.

℞. Rad. Bræc. Flor. dr. i.

Myrr. dr. i.

Alum. sulfid. 8. ad ℥iij.

Mell. rosæ unc. iij. ad unc. ii.

M. F. Linimentum Ulcera mundificata consoli-

dant. S.

Unguentum consolidans ad Collum.

Conf. TIMÆUS von Goldenklee in casu lib. 2. cap. 178, qui sequens habet Linimentum:

℞. Rad. Bræc. Flor.

Angelicæ.

Caryophyllat. ana dr. i.

Aluminis sulf. ℥iij.

Mell. rosæ. unc. i.

Misc. & loco abscessus illioctur.

Tandem si necessarium fuerit, ad corroborand. Partes lāsas in fine Morbi sat Decoctum Prunellæ, Plantaginis & Flo- rum Rosarum in Vino decoctis; quibus addatur Sympus Dia Noctum q. i. pro Gargarismo blandè adstringente.

Vel

℞. Aqu. Prunell.

Plantag.

Brænicæ ana unc. ii.

Rob Nicot.

Dia. Mor. ana unc. iij.

M. pro Gargarismo Adstringente.

D. S.

Gargarisma Adstringens.

Quod

(P.) Diligenti Chirurgi agnus in gymanisgulam immisi securis scapelli vicem ad Abscessum rumpendum apud nostrates lapsissimè gerunt.

Quoad *Anginam* Notum seu *Pirastum*, alias *Alham*, optime hanc petrascat *MINDERUS* in *Medic. Milit.* p. 109. & seqq. In hac Venesectione haud opus est, nisi in Plethoricis, ne alius major contingat. Convenient potius in principio sudorifica, & post haec purgantia leniora, cum externis resolutivis. Nempe ubi lentor viscidus obidet Linguam, prodell *Absterfus* Fauces mediane Lintecolo cum Aceto, & fiat postea gargarium cum *decote foras Ligustri*, *Salvini*, & *Origanii*, rad. *Pyrethri*, sem. *Sinapi*, in *Aqua cum pauca Aceto*, vel cum *Aqua florum Ligustri* & plantaginis, additis *Myrrha*, particula *Salis Ammoniaci*, item iuxta *DECKERI Praes. Herbeti* p. 51. Spiritu *Vini*, & Spiritu *Salis Ammoniaci*; sin verò *Aphtha* adhaer. loco *Salis Ammoniaci* addatur *Alumen*; loco *aceti* etiam *fascis Sempervi* recens, unguis cum *Sale Ammoniac*, utilis est pro abstergenda Lingua. Quibus si tumor suppetat, appropriata superius recensita sublimantur: vid. *SENNERTUS lib. 2. part. 2. c. 24.* purificato cum succo *Sempervi* recens inungi potest cum *Ros Nucum* vel *Dia-Mer.* subactis cum pauco *Melle refecto*. Colla vero exercit admoveatur resolutiva, qualia sunt *Salvia*, *Hylopus*, *Serpillum*, *flor. Chamomillae*, radix *Levisti*, *Liquiritiae*, &c. Quid si verò ex inflammationis augmento & symptomatum circa vesperam exacerbatione in Abiceffum vergat, resolutivis diutius adiungantur emollientia, v. g. *Herba* & *Flores Melliloti*, *Violarum*, rad. *Althaeae*, *Malvae*, sem. *Lini*, *Foenugr.* *Carice*, *Lac tepidum*, *Oleum Lil. alb.* *Chamom.* empl. de *Melliloti*, &c. *Rupus Abiceffus* vel sola *Aqua amula*, vel gargarismate ex decocto *florum Rosar.* *Plantag.* *Veronicae*, rad. *Liquirit.* & *Consolidae maj.* cum *Melle simplic.* & rosato detergitur, & ad cicatricem usque mundificatur.

Propter materiae affinitatem consideremus *Aphthas*.

MEMBRUM I

De Aphthis.

IN Infantibus *Aphtha* dicuntur Germanice *die Schwaammigen*, quae nihil aliud sunt, quam *aliquis* *keratio* aut *seria Exulteratio* oris parvum, *subinde* & *Ulcus* *ac Ventriculi*; id quod patet tunc in reiectis excrementis, cum quibus Squamulae recipiuntur, quae leves quasi Crustulae. (Q)

CAUSAE.

Aphthae succedunt ferè *Febris* ingentibus & ætiologis, suntque pullulae, quae succedunt in *Ulcuscula* abent, & in *Febris* vehementioribus excitantur ex acrioribus *Humoribus*, & ferè illis *Febris* superveniunt, quae *Homines* *crudi* *Ventriculi*, seu qui *arguuntur* *pro parva* *recem* *reverti*, corripiant. Hunc si Medicus evacuare in tempore neglexerit, *Aphthae* necessarii sequuntur. Ut autem *Ventriculus* purus sit, nihilominus interdum *Aphthae* oriuntur, nempe à *Saliva corrupta*, *Salis* & *acri* *Humore*. Quae à *Ventriculo* initium capiunt, in imis faucibus observantur, Quae verò ab *Ichore* *salivali* corrupto, plerumque inculcasse loquitur Linguam, quae tunc fit arida, pallida, viscosa, & valet, prout peccant *Humores*.

DIAGNOSIS.

Aphthas futuras in Morbo cognoscimus ex *sapore* & *faugine*; qui toto morbi decursum non dormierunt: in *Sopore* incidenti, & tunc *Aphthae* produnt: singulis accidit, si sunt ex *ventriculo*, & tunc plerumque sunt deteriores.

PROGNOSIS.

Pessimè autem sunt, quae ex *Ventriculo* non purgato veniant: totum enim ducum per *Calum* usque ad *Fauces* obideret solent.

Optima *Species* *Alba*, quae planè candida, sanguis, molles, quando inflat floccorum videtur tumere: Sed quando sunt *globosa*, *viscida*, *substantia*, *compakta*, tales significant morbum periculosum & diuturnum.

In Infantibus dicere possumus naturam *Aphtharum*, quae sunt ex corruptione *Lactis*; Non raro namque corripitur Infans *Aphthis* primis septem diebus. Nihil autem Tom. II.

melius, quam *Lac ipsum* præbere: inde enim abstergantur, modice humectantur & molliuntur.

Sunt & *Aphthae rubrae* & *molles*, priusbus deteriores, *livida*, *viscida*; *Nigra* vero omnium pessimae.

Malum signum est, non facile coqui, emolliiri, humectari, & longo tempore siccas, aridas, compactas, planas aequalique manere, & quidem diutius durantes.

Longum morbum significant *Aphthae* quae intra triiduum veniant & abeunt: Has enim sequuntur novae, adeo, ut *Scipius* succedere solent, & tanto futurum est longior morbus, quantum Medicus frequentius purgat. Nil enim peius, quam sepe purgare, eo tempore, quo *Aphthae* adhaer. vel etiam proximè adhaerunt.

GUR A.

Curatio tota consistit in *Humectatione*, quae emolliat & leniter calefaciat. Cum verò *Aphthae* coctae sunt, abstergere illas oportet vel *Spongula* alligata *Racillo*, vel *Linteamini*bus; alterumtungi debet in *Decotto* *Emolliente*, *flor. Salviae* in *Aqua* *Fenariarum* decoctum: Quando igitur *Lingua* incipit exasperari; id quod praecedit *Aphthas*:

℞. ℞. Sali maj.

Detratur pellicula ab utraque *Folii* parte, hinc in *Aqua* *Rosarum* imponatur, ut *humida* *lervetur*; postea imponatur *Linguae* ad *humectationem*.

Pari ratione adhiberi possunt *Folia* *Pernellae*, aut *Monte* *lego* *Sem-Cydoniarum* cum *Aqua* *Pernellae* extraita. Cum autem jam adhaer. *Aphthae*, optimum est *decusum* *Rosarum*, ex quo expressus succus imponatur *Linguae*, humectat & abstergit. Si parum *Salis* *Pernellae* vel *Niori* addatur, ardorem simul restinguit. Vel *Oleum* *Rosarum*, in quo *Saccharum* quantum potest dissolutum *Oris* illinatur; vid. *M. A. N. G. Aves. 4. Obs. 15. p. 73.* Aut

℞. Herb. Bellidi. cum tunc M.J.

Ficuum ping. Noxi.

Coqui. in *Aqua* *communis* *q. l.*

Colaturae addo

Salis *Pernellae* *parum.*

M. D. S.

Aqua *Os* *purgans* & *refrigerans*.

Quo humectantur *Fauces* & *Linguae* *lesae*.

In maximo *autem* *Oris* *facilitate*.

℞. Butyr. rec. infus.

Misc. cum *Saccharo* *candulato*, ut

℞. infus. Salis S.

Unguentum *Os* *leniens*.

Tententur in *Ore*, emolliat & absterge.

Addi potest parum *Salis* *Pernellae*.

Quod si ulterius progrediantur *Aphthae*, degenerant in *Ulcera* *Oris* succedunt defecientia; quae ipsa *Oris* *Membra* etiam ex aliis causis nata frequentius ferè curantur *Abstergentibus*, quae inter est decoctum *fol. Ligustri*, vel *Aqua* *destillata* sub forma gargarismatis, vel *foecus*.

℞. Niori. Rosar. M.J.

Coqui. in *℞. Aqua* *simp.*

Colaturae addo

Mell. q. l.

M. D. S.

Aqua *Os* *purgans*.

& adhibeatur.

Addi etiam potest *Herb. Plantag.* effectum eo meliori. *Decusum* *Satureiae* in *Vino* à quibuldam laudatur, sed suspecta quia acris est quasi ignea: potius praedicta conducunt; item *Phlegma* *Ventriculi* cum *Aqua* *Pernellae* & *Plant.* *missum*, egregium & in *Ulcibus* *Oris* parvumque vicinarum: *Ros* *Dianthi*, item *Dia-Norum*, detergant & purificant *Ulcera*: Quibus in malo contumaciori parum *Spiritus* *Vinoli* aut *Salis* *refrigerant* pro suavitate acida addi possunt, praesertim si scorbuticum subit vitium. In huiusmodi *Ulcibus* *Gallici* optimè sunt *Aqua* *Viridis* *Plateri* aut *Hartmanni* de quibus supra dictum. *Cruiser. & HILDANUS* *Cassar. 6. Observ. 18.*

MEMBRUM II

De Uvula Exulterata.

PAr ratio est *Uvulae Exulteratae*; undecunque etiam oritur, in qua etiam haec ipsa Remedia, in specie Gargarismata

Tet s HAR-

(Q) *Aphthae ferè ab* *acriditate*, accendi, propter ignem illarum caliditatem. *Hypocriti* aliarum quoque, & praecipue *puerorum* *parvorum* *ulcerula* *superficialia* *Aphthae* dicuntur.

HARTMANNI Pr. Chymiar. pag. 164. *polydrosus* commo-
dus ulari pari potest, qui in affectibus Ori communibus &
Angina effi praestant.

Sicut de his & cognatis Oris ejusque partium Malis vi-
detur: ceteris laetis.

M E M B U R M III.

De Uvula Prolapsu.

Uvula verò Prolapsum seu Relaxationem optime curare
docet HILDANUS Cap. 2. *Observ.* 21. Icus & In-
strumentum singulare pro Uvula nimis tumente abscinden-
da describit BARTHOLINUS *Comment.* 2. *lib.* 12. Portio-
ne abscisa, pro Haemorrhagia accenda nonnunquam suffi-
ciat Colluto vel pulvis Adstringens, Instrumento certo ap-
plicandum.

Aliis recentem Uvulae Prolapsum curant;
Recipeudo *Formam* eam, Spiritus Vini humect. 3i.

Succini albi 5i.

Mellich. 3ii.

Mista Verticij imponant.

Item Oleum Succini solum, vel Unguent. Roselli ex
Gummi Elemi cum eodem malaxatum Bregetati applicant;
vid. WEDELIIUS de *Compul. Med.* pag. 181. una cum Gar-
garismate, & decollo *Stomaci* Lignorum *Mero* & *Sale Prae-*
parato.

℞. Decoll. Prunell. 3i.

Sol. Ammoniaci dr. 3.

Alum. crud. dr. 3.

M. f. Gargarismus; 8.

Singularis Gargarismus.

Vel

℞. Ros. Prunell. M. ii.

Plantag. M. i.

Gall. pulvis. 3i. ad dr. vi.

Coqu. in l. q. *Aqua simpl.* vel *Ferraria*.

Colaturae 3av. adde

Syr. de Ros. sic. 3i.

Alum. crud. vel ass. 3i. ad dr. 3.

M. pro Gargarismate in prolapsu, & faciem extoria-

tionem;

D. S. ut autè.

Item *Sal deprecipitum cum pauca* *Silice* applicari potest
Uvulae prolapsae. Loco *Salis communis* optimum est *Sal*
Ammoniacum, subinde Uvulae applicatum, *Spiritus Ala-*
minis commendat alii.

Quod si simul Uvulae Inflammatio addit, optimum est de-
coctum *Herbae ad Rad. Taraxaci*; *Suffusio Succini* Ore exceptus
specificum est RULANDI; Vel *Semen Cannabii* in Poica
peram coctum & colatum, pro gargarismate adhibendum,
est unum ex optimis remediis; Vel *Rad. Tormentillae* &
Uvularis herba antiqua *propositis* in *Cerevisia* secundaria
coctae, & Colatura cum modico *Melle* edulcorata, adhibea-
tur pro Gargarismate; vel decoctum *Vincetoxicum* cum
Vino paratum. Nemo Uvula est parva glandula in imis
faucibus à Palato pendens, laza quadam Membrana tecta,
in qua tanquam in sacco pendet; Non enim hac tegitur, sed
praefer hanc, propriam membranam suam obtinet. Dissil-
lat ex ipsa glandula tenuis filivialis humor sui generis in
Membranam perforatam, & per hanc à Palato; quoties
autem materia est viscidula, membrana oppletur, & impedi-
tur influxus, quoque fit laxitas & distensio membranae, modo
dilectis corrigenda. Quibus si dolor ex irritatione, aut di-
spulso inflammatoria exinde accedat, Syr. *Diactyli Montani*
parum modo dilectis addi potest.

ARTICULUS III.

De Inflammatione Stomachi, ejusque abscessu.

Post Paucem non raro quocumque inflammatur stomachus, quae
Inflammatio est affectus periculosa, & si quis alius,
periculosus.

CAUSAE.

Causas habet easdem, quas reliquae Inflammationes in
generi: In specie interdum assueta actio aut vitiosa In-
flammationem Ventriculi inducunt: Sic etiam Acidulae de-

glutiae subinde Inflammationem Ventriculi periculosissi-
mam inferunt, de qua HILDANUS *Cent.* 1. *Observ.* 34.
ubi notat Inflammationem Ventriculi cum Febre Ardens
& horridis symptomatibus conjunctam ac deglutata Acicu-
la. Inflammatur rarissime Ventriculus integer, id quod
est malum adeo furiosum, ut penitus sit desperatum, aut
saltem unum alterumque ejus Orificium.

DIAGNOSIS.

Quoad Signa: Inflammatio stomachi facile cognoscitur
imprimis, ubi cum Febre ardente acuta conjuncta est si-
milis aliquid Tumor in praecordiis, circa Ventriculi regio-
nem sub Costis Noctis dalens insigniter, cum gravi Assu
eiusdem loci, Siti inextinguibili, Corporis inactione, & Vi-
giliis.

Malum est, ut dicit, peracutum, supervenient subinde
Deliria, item Convulsionem non raro lethales, speciatim si
Orificium unum alterumque fuerit inflammatum; saulant
Ægri, & assueta serè evomunt.

Non confundantur autem, sed distinguantur Inflammatio
Ventriculi cum Inflammatione Lobi Hepatis, vel Musculo-
rum rectorum Abdominis, ubi ventriculo incumbunt. Nam
in Ventriculi Inflammatione ardor & dolor magis in profunde
sunt; Hepatis autem Inflammatio magis circumscripta est, Mus-
culi verò recti externi Abdominis in Thoracis confinis
occupant regionem, ac dilectis symptomata magis exteriorum
vergent.

Item Inflammatio stomachi raro est sensibilis, nec potest
contingi; Loborum verò hepatitis, Musculorumque abdomi-
nis nunc patent sensibus, nunc manu contrahi possunt.

Potè in Ventriculi Inflammatione levissima & peracuta
adfunt symptomata, sicut ac in Loborum Hepatis & Muscu-
lorum Abdominis Inflammationibus; in his siquidem mi-
tiora urgent symptomata.

PROGNOSIS.

Ventriculi Inflammatio est malum periculosa, ex quo pau-
ci evadunt, tertio vel quarto die finiri solet, & serè semper
lethalis est, imprimis ubi in principio Vires infundit.

Interdum, sed raro, ad suppurationem tendit; Quo fa-
cto, melius est, ut abscessus aperiat; intra Ventriculum,
& per inferiora exeat, quam si extra Ventriculum, in-
tra Abdomen effundatur; quod malum; Pius enim Perito-
neum aut Intestina inficere, aliamve quamquam partem, &
medante Gangrena Ægrum interficere solet.

CURA.

Quoad Curam: haec eodem modo se habet, atque reliqua
cum Inflammationibus in genere curationes. Ante omnia Sa-
tisferis tumorem discurrentibus insidendum est. In specie
tamen cautio in Venesectione adhibenda est, quod monet
FORESTUS l. 10. *Observ.* 1. ne plus, quam opus sit,
sanguinis evacuetur. Cùm enim gravia symptomata affe-
ctum hunc comitari soleant, syncope etiam, ob Dolorem
vehementem & virium summam imbecillitatem, propterea,
ne vires nimis prostrantur, summa cautio hic adhiben-
da erit. Pergravis ubi in principio & progressu Morbi non
est adhibenda; irritanda enim ventriculum, magis malum
exasperat, uti hoc confirmat exemplo quodam ab alio petito
FORESTUS l. 10. *Observ.* 31. de Puella, quae cùm
tertia die ab Inflammatione ventriculi famisset purgas,
quarta die interit. Clysmata tamen blanda & Absterge-
ria convenienter injici possunt: vid. FORESTUS l. 19.
Observ. 31. Alias in Cura primatum obtinent sudorifica.

Remedia igitur interna in principio & incrementum sunt ex
Papav. rhod. & *Cardus benedictus*, imprimis ex *Mero* parata,
ut in specie Nitro Antimonio; sicuti solo Nitro, tam
periculosa quam ferre, Decollo Herodi soluto & Impidus propi-
nato, curavit Filium suum Inflammatione Pylori laboran-
tem LINDANUS super Hartmannum. Unde illud postu-
m praestare ita.

℞. Decoll. Herod. 3i.

Nitridor. vel antimoniac. 3i.

M. D. S.

Potio Refrigerans.

Præterea Potui interivit desuam aut Decellum *Liquiritia*
rufa in *Aqua simpl.* cum successu adhibendum in Ventriculi
Inflammatione à RULANDO, vid. *op. Theaur.* pag. 175.
Conveniet & hoc praestitum cum Nitro depurato, aut spiri-
tu Nitri dulci in parva quantitate imprægnatum, sapius ha-

hustum non in congruum est ad Inflammationes Vetriculi ; fieri cum *spiritus Niri datus* copiose potest exhiberi. Porro *Mintura simplex*, *Antimonium diaphoreticum*, *Anticholericum Jusseli*, cum Noto depurato milium & propinatam convenienter usurpari possunt. *Saccharum etiam Saturni*, item *Cryſtalli Minerae Saturni* parata etia Minera cum *spiritu Nitri*, cum Aceto diluata acuto, sunt egregiae ;

Vel

℞. Niri depur. vel antimoniat gr. xv. ad ℥i.
(melius est in hoc calce depuratam & antimoniatam ,
quam siam .)

Antichol. Pot. ℥℥.

Sacch. Saturni gr. v.

M. f. Pulvis pro doſi :

D. S.

Pulvis Refrigerans.

Vel

℞. Pulpa Tamar. ℥℥.

Tartari vitriolati. Tach. gr. xv.

Suc. Mineral. ℥℥.

Cam. syr. Viol. q. l. f. Bolus :

D. S.

Bolus Refrigerans.

Quoad *Externas Inflammationes Vetriculi* convenientia ; laudant quidam , imprimis *DEODATUS in Panch. Hygiasio*, succum *Cancerum* buvialium , calido una cum Aceto subactum , in principio applicantes ; qui tamen minus conveniens : quoniam potius proderunt *Cataplasmata* vel *Unguenta* ex *Plantis Aromaticis* in *Vino* vel *Aqua decoctis* parata , ut ita partem discutiant , partim ad suppurationem blandè promoveant. In principio *Fokus ex Chamom.* & *Rosæ rubræ* imprimis convenit , in *Vino aut Gistim Aqua coctis*, & crebrius applicatis. Vel fiat *Fokus* aut *Cataplasma* ex *Foliis Cassiæ rubræ*, *Scabiosæ*, *Dentis Leonis*, *Fiebus*, *Uvis* palmæ & similibus , que in *fere Lactis decoquantur*, & ita extense applicentur : *Aquam Plantaginis*, & *Solanum* cum *Saccharo Saturni* pro *Focu* insigniter commendat *PARACELSUS* ad *Curam Inflammationis stomachi*. Quod si ad *suppurationem* videatur vergere *Malum*, fiat *Fokus* vel *Cataplasma*.

℞. Fol. Bram. urſæ.

Rad. Alth.

Ros. rubr. an. M℥.

Quibus ad putrilaginem coctis , addo

Farin. Horde.

Flos. Chamom.

Sem. Foenugræ. an. ℥℥.

Cam Olive Rosæ & Chamomill. f. Cataplasma.

D. S.

Cataplasma Emulsiens.

Quo tempore , præter mox laudatam *scabiæ* , & interdò , *Rosella cum Fiebus*, *Malva*, & similibus , in *fere Lactis coctis*, adhiberi possunt.

Tandem , ut citius maturetur *Abſceſſus*, fiat *Cataplasma* ex *stercore Columbino*, & *Fermento*, ad *imutationem SENNERTII l. 3. præz. ubi de Inflamm.* *Intestinali*, quod fortassis est , & ad *aperitionem abſceſſus* disponit.

℞. Sem. Foenugr. ℥℥.

Sterc. Columbin. ℥℥.

Ferment.

Mell. an. ℥℥.

Ole Chamomill. ℥℥.

M. pm Cataplasmate , quod applicetur stomachi regioni inflammatae.

Quoad *abſceſſum* : internè convenit *Tormentina* egregiè , qua nihil melius est , quocunque modo usurpata ; hæc enim cum *aqua abſſinib* mediant *Ovi Vitello soluta*, si hæc tereatur , resolvit , maturat , mundificat & consolidat *abſceſſum*, imprimis si cum *Aqua Mollis* formatur ; sicut etiam *Aqua*, *Succus*, *Syrupus Scabiosæ*, & omnia ex *Herba* hac parata , internè frequenter usurpata , vel sola vel cum *Melle mista*, simili modo conducunt & sanant quocunque , præsertim *Ventriculi*, *Abſceſſus*, & diſponunt , ut is interiora versus aperiat. Quibus & *spiritum Tartari* rectificatum annuatim addendum iuvante : e. g.

℞. Aqu. scabiæ ℥℥.

Spiritus Tartari rectif. vel Carm. de Tribus ℥℥.

Syr. de succ. Serab. ℥℥.

M. D. S.

Potio Maturans.

Quod si aperto *Abſceſſu* jam genitum sit *ulcus*, usurpetur *decollum Herdei* vel *hyſſopi cum Melle*, item *serum Lactis* aut *Lac Chalybeatum* ; mundificant & consolidant : *Decollum* quoque *Rad. China* cum *herba Scabiosa* partium coact. Item *Ceras Cervi asium*, *Terra sigillata*, *Bulas Armenæ*, &c. *Oleum seu Balsamum Majshis* cum *Oleæ Hyperici* excerptum fuit in *Calterius Fragaria* ; de quo vid. *BECKERUS p. 182. de Calterius Fragaria*, ubi plura hæc facientia reperiuntur.

Vel

℞. Aqu. scabiæ ℥℥.

Menth. ℥℥.

Cinnam. spiritoſa,

Acet. distill. an. ℥v.

Lapill. Cancer. prepar. ℥℥.

Ammonii Diaphor. ℥℥.

Extr. Flor. hyper. ℥℥.

Syr. de Symp. Fern. vel scabiæ ℥℥.

M. F. Potio : S.

Potio Mundificans coactilem sanata.

Dosis cochlear. ii.

Vel

℞. Extr. flor. hyper. liquid. ℥℥.

Bals. Peru.

Scaphuris anſſ. an. ℥℥.

M. D. S.

Balsamus Mundificans.

Dosis gutt. v.

Ceterum *BARTHOLETUS sr. de respirat.* ad *aperitionem* *Abſceſſum Vetriculi* eæa singulare hac in parte laudat *Lapidem Pavonis* seu *Malachitem*, quem *Abſſinium* reducere dicit , *Abſceſſum* ruptum , in *forma pulveris* ad *tri. assutum*, summi mundificantem & consolidantem. Verùm cum exmoſeat , quid hic sit *Lapis*, miror , cur cum obtradat . (R)

Quod si ex acerbis concolivis aut similibus *Assumptis* *acrolis* aut *causarum fuerit Vetriculus*, præmissi in principio *Vomitio*, *Lacticia*, item *Terra sigillata*, sunt convenientissima , item *Tragacanthum* in *Aqua Fior. Rosarum*, solutam ; vid. *BARTHOLINUS cent. 6. §§. 21.*

Vel

℞. Mucilag. Sem. Hyſſ.

Cydon.

Tragacanth. cum Aqua ros. exte.

Syr. Violæ.

Rosæ. solut. an. ℥℥.

M.

Vid. *BARBETTE in pr. p. 114 & 116.*

Aliis rarum *Malum* est *Inflammatio Stomachi* ; *Exempla* tamen videt. in *AMATO LUSITANO cent. 3. cent. 39.* *FORESTO lib. 18. observ. t. 10. 31.* item *ZACUTO LUSITANO Medic. princ. lib. 2. observ. 63.*

ARTICULUS IV.

De Inflammatione intestinorum.

CAUSÆ.

Iuxta *Stomachum* etiam *inflammantur* subinde *Intestina* , quæ præter alias *Causas Internas*, omnibus reliquarum partium *Inflammationibus* communes , interdum pertinet , & quæ siacum *Alvi obſturbatione*, interdum *Hernia*, interdum *Dysenteriam* immediate suppleſſam , interdum quoque *Externam* lesionem , v. g. violentam *Conuſionem*, &c. præsupponunt. De *ileo tibi* notum est , quod contumacem tecum tibi *Inflammationem Intestinorum* ; sic de *Hernia* quoque patet , quod *Intestina* in loco herniæ ad *Inflammationem* perveniunt. *Inflammantur* *Intestina* , tam tenuia quàm crassa , ut *freqventius* tenuia .

Ex *Causis Externis*, non tantum à *Corporis* *Incœlescentia* *FORESTO l. 21. observ. 18.* sed etiam *Abdominum* *Refrigeratione* *Intestinorum* *Inflammatio* observata fuit ; qualem etiam observavit *RHODIUS C. 2. observ. 71.* ab *incurvata* *Colla* *iporia*, *Colon* *pungente* .

DIAGNOSIS.

Quoad *Pathemata Inflammationis Intestinorum*, quibus *Malum*

(R) De *Malachite lapide*, ejaque quatuor speciebus aliqua habet *Lemery Diction. des Drogues* : *Nomen* & *us* *Malva*, quod *Lapis vitriolæ* *Malog* *colorem* *emulſetur* .

lenta vasa in Brachio, & hinc ante aliorum applicationem optata danda est, ut protinus Alvus solvatur & aperta servetur. Fit hoc quidem cum aliquo dolore & inflammationis aggravatione, omnia tamen hæc Symptomata gravissima sunt, si Fæces retentæ sunt induratae polimodum excernuntur: Ob id ergo protinus Clyster leniens & emollicus ex Lacte, ac etiam ex alio decocto emollicante in Lacte paratus, vel ex decocto foliorum & florum Verbasci, Parietariæ, & foliis Melissæ injiciendus; addatur Saccharum. Quid si verò indurata jam sint Fæces, & Sælis Genua, poterit dissolvere easdem, addens. Quod si unum Clyster alterumve iniectionem & revulsionem non sufficiat, aliud injiciendum cum Oleo Rapii, seu Rapii sylvestris, & Lini mistum; hoc enim est appropriatum, & sic præcavetur Abscessus: Si ipsa autem quali Manus & blandè Clystera applicandum, ac dolor & Ardor augeretur. Formulas dedi *suprà* *sect. 9. Cap. 1. Art. 2. ubi de Passione diara.* Si verò minus Extrema talia scopo sufficerent, aut Clystera nequeant injici ea metus majoris irritationis, convenientissimum erit, ut per blanda *Passulata* aperiantur Alvus, & Buidia servetur, uti andivilla *suprà* *l. 2. & sect. 17. Cap. 3. Art. 6. ubi de Mela Hypochondriaco.* Aeris enim quæcumque, fortassis Intestina stimulantia, ac inter ea imprimis *Lazariæ Rufinæ*, fugienda, ne horum visciditate Malum reddatur pejus; hocque probè observetur in Filulis Ani, quæ per *Resinosa* semper solent exasperari; ac proin *Passulata* Lenientia sufficiunt.

Externè fovetur Anus cum decocto Agrimonie & Menstruæ Sarcenicæ ex Aqua & Aceto, vel horum loco cum vino collatum, quod est appropriatum difficilium in Inflammatione Ani; Vel decoquantur hæc simplicia in Aqua Calcis vivæ, quod decoctum ita medicatum nobilissimum est, in specie si metus Gangrenæ imminet; vel etiam Aqua Calcis vivæ, in qua ebullierit Chamomilla, commodè adhibetur. Folia etiam & *Rosæ Verbasci* in Aqua vel Sero lactis *colla* pro Fota itidem egregiè convenient ad hujusmodi calidos Abscessus; quas *folia Salicis* & *Ferrulæ*, aut etiam si dolor nimis urgeat, commodè parum *fel. Myrsinæ* simul addendum est, cautè tamen, *Mucilage Seminis Hylli* aut *Cydoniarum cum Aqua Temperata* extrahita, addito *Saccharo Interni*, & applicata, est utilis. Sin Acrimonia vera scribitur externis, nil melius est quam Lac, vel simplex, vel cum Linaria, Chamomilla, ac floribus Sambuci decoctum, & in forma Foculi vel Cataplasmati calide admodum: item Lac cum Albumine Ovorum agitato mistum, & ita pro Voto applicatum, convenit etiam in Pudici Ardore & Inflammatione, in specie Piperatorum & serum adcrentium contactu facta, teste PLATERO in *Obser.*

Et hæc utriusq; in incipiente Inflammatione possunt usurpari.

Internè Diaphoretica & Sudorifera blanda sunt optima. Quid si Inflammatio Ani dicitur nequit, & jam factus sit Abscessus, præter Emollientia & Resolventia imprimis confert *Bals. Sulphuris* ad extrâ *Relandi*, ex *Sulphure cum Oleo Papaveris* paratum, quod optimum est Remedium, & deservit ab HARTMANNO in *Prax. Chym.* ubi de *Mammillar. Affectionibus*; hic enim & maturat & mundificat, & consolidandam promovet, & præceptis immoietes Filulas præcavet:

Item

℞. Lact. chalybeat. ℥i.
Terebinth. cum Mell. Ool. sol. ℥vi.
Mell. refati ℥i.

M. pro Enemate, pro Exulceratione Intestini recti:

D. 3.

Clyster Ulcerationum mundificans.

Item præparatur Unguentum Nicodem, ut vocatur, & describitur in *Anat.* WECKERI. (S) quod *Bals. Sulphuris* pessimum optimum erit Remedium pro curando hujusmodi Abscessu. Hoc ipsum tamen maturè faciendum est, quia alias in Filulam degenerat, quæ inordinum in Vesicam Uteriariam hiat.

Ad Hemorrhoidum Exulcerationem Linimentum ex Auro Palmiatante, cum Oleo Amygdalarum dulcium paratum, singulare est Anglorum Experimentum.

Si Abscessus in Filulam abierit, hæc facile non curatur; optimum tamen Remedium esse dicitur *Oleum dulcis Moruari*, quod vid. in AGRICOLÆ Commes. in *Supplum. Interni*, ubi Intestinum Rectum exulceratur, ulterioresque polluat *Potiones Vulneraria*; & *℞.*

℞. Herb. Hedæ. terr. M. li.

Plantag.

Semin. ana M. ss.

℞. Curan Cervi ℥i.

Cocu. in l. q. Agna.

Calat. unc. viii. addde

Syr. Cuscutæ.

De Symp. Fernul. ana unc.

M. D. 3.

Potio Vulneraria consolidans, & mundificans.

Tet. haustiat in die cum gutt. 4. Bals. Sulphuris.

ARTICULUS VI

De Mesenterii Inflammatione aliisque affectibus, & inde ortu Abscessu.

PERgimes ad Mesenterii Inflammationem, cujus Tumores & inde nati Abscessus sæpe sapient sunt exigui & sive Chiracium & latentium admodum Morborum, & sive mitabilium curbarum, & complicatorum affectuum, qui mirè vexant Aegros, & Medicos insigniter turbant; sicut & variformes sunt passiones, quæ ea affectio Mesenterii originem docuit. Affectus hi addeb lateantes sunt & occultati ex eo, quoniam difficillimè cognoscuntur, cum Mesenterium in profundo situm, aliis quoque partibus hinc inde circumseptum sit, & propter lenium obtusum minus clara sit ejus Pathemata, unde suspensum & Aegros & Medicos saluat, ut raro de his possimas esse certiores. Accedit præterea & hoc, quod corpus Mesenterii variis Glendulis sit intermixtum, quæ ipse diversimodè affectus similiter variis Abdominis Symptomata inferunt, tam per se, quam ratione Lymphæ adeoque eventit, ut tam intricati Affectus orientur: Item accedit textura, divaricatio, & distributio Nervorum per Mesenterium spariorum varia & mirabilia, unde uno affectu alie etiam partes facile per consensum simul afficiuntur, ut nequissimus ob id rectè distinguere proprios Mesenterii affectus ab aliis. Affectus seu morbi, qui vitio Mesenterii occurrunt, tumores & Abscessus, sunt variè & vagi, interdum frequentius, idque in paulo obocisioribus, plus minus doloris, nunc circa Dorsum & Lumbos Dolorem, nunc in Abdomine, ac præsertim circa Umbilicum; Termina infestantes, lentè tamen omnes & diuturni; subinde cum *Febribus Erraticis* complicati, ac continuè aut saltem vagis *Æstuationibus* & intercurrentibus interdum Horroribus levibus comitati, quæ Symptomata propria sunt ferè membranosa partibus affecta. Corpus simul ut plurimum successivè emaciatur, Respiratio evadit difficilior, & subinde aliquid molesti, quod ipsi Aegri facis explicare nequeunt, in profundo Abdominis, circa & infra Umbilicum & circa Præcordia hic periclitare afficiant. Venter nunc inflatus ac plus minus tumet, ut interdum Aegri quasi Tympanitide laborare videantur; nonnunquam redditur Abdomen, nunc ad interiora dorsum versus quasi retrahitur, dolor autem & Toror Lumborum aut Abdominis subinde per intervalla recurrit, & sæpe multa annis affligit; Flatulentie plures infusum Aegros vexare solent. Frequentissimè tamen Mesenterii Inflammationes alii Tumores inde nati & occultati Abscessus sequuntur, hinc etiam variis Glandularum tumoribus duris scirrhis & Arruosis Mesenterium afficiunt, qui nunc suppurant, nunc manent sine suppuracione, sicut & Stratonata, Atheromata, Melioides & similes Tumores intra duplicataram Mesenterii congeruntur. Infantibus quibus affectum est Mesenterium, non raro Atrophia & Tumores quasi tympanici Abdominis supervenire solent. *Fæces Ardentes* seu metastasi critica in Abscessus Mesenterii terminantur; quin & illis Febribus aut Morbis complicat

20-

(S) Unguenti mirabilis Nicodem descriptionem unam tribui Mesum Weckerus, effigie: *℞. Myrrhæ. Aloes. Saccocollæ an. ℥i.* Mellis despumari *℥vi.* Vini alibi *q. suff.* Cæque igne lento ad spissitudinem. Ulcera paritibus & fistulas parit, carum implet, glutinat, cicatricem tegit, purulentiam acet. Alteram dat ipsi: *℞. Myrrhæ. Aloes an. ℥i.* Vini alibi *q. suff.* Tritis tenuissimè Vinum paulatim affunde, semper miscende usque ad Mellis crassitudinem: utere. Addebat remanenti, ex eodem, Chalciteos 5 ℔. Olei Myrtini, Vini parum: Mijce.

Inflammationis, & inde nati *Abfcessus Meferenterii*, eos intricatos & moridos magis reddunt, unde non inepte erindo SENNERTIUS derivat Febres Semiterstianae l. 3. Praef. p. 445.

Curatur tamen huc Pathemata Meferenterii scdnt ad alii Chirurci affeetus, Cachectici aut Hypochondriaci, inter quos quidem per Salla Salsa, Tartaria, Vitriolata, Nitrofa, Absfergentia, & hinc per Mariadla & Nolaria, item Aromaticia, Amara, Apertientia aut Heparica vulgo dicta, interpositis blandis Purgantibus, quem modum supra scilicet 3. & scilicet 17. Cap. 3. Artic. 1. de Cachectia tetigit. Tractentur tamen caute & sine violentia; alias exasperantur & deteriores evadunt ob Nervos tunc irritatos. Externis Emplastrum ex Gummiaribus, de Cirata, de Nicotiana, Emplastrum Visculae de Rauli tam Mercurialis, vel ex Gummiaribus & Mercurio, descriptum à BARBETTE in Anat. Praef. p. 557. Plura videb. supra scilicet 3.

Multa praeterea Tumorum & Abfcessuum Oculorum in Meferenterio hinc inde prolant observata: v. g. Callum inter Venas Meferenterii marum lethalem; item Calculos in Meferenterio, refert SCHENCKIUS in Observat. l. 5. Hydrozem à Vesicula Meferenterii recenfit TULPIUS l. 4. Observat. 34. Meferenterium lapidofum, hinc Atrophiam lethalem PANAROLLUS Pent. 5. obs. 19. Abfcessum Meferenterii, ubi cum Fibrina Vermiculata excreti. THONERUS l. 1. s. obs. p. 173. Tumorem Meferenterii durum circa medium Pancreas per Emollientia curatum videbitis à FORESTO lib. 27. obs. 4.

Ex Scirrhalis Meferenterii Tumore Hefticam incipientem, Menfes albos, Tormenta TRINCAVELLIUS l. 3. Caust. 22. pag. 370. Meferenterium Scirrhalum fu Hylerica in M. A. N. C. Ann. 4. obs. 32. p. 107. Glandulas Meferenterii induratas & auctas, Ventrem tumidum reddentes, apud PLATERUM l. 3. obs. p. 464. Sed de his & similibus Meferenterii affeibus, tam veris quam falsis, praeter ceteris omnino optime scripserunt FERNELIUS in Parob. Speciali, & post hunc MATTHAEUS MARTINI de Morb. Meferenterii affeibus, qui tandem meretur, & hinc SENNERTIUS l. 3. Praef. ubi de Meferenterio Meferitis. In his uti vera falsis, & bona fide missa malis, cum licet non Theoriam planabilem, sed pro temporis illius ratione mancam, ex sanguinis circulatione, Lymphae & Glandularum obfervatis aliisque hederis Experimentis emendandam, nec Remedia bonae notae offeant; horum tamen Niftria observata, Diagnofis, Prognofis, & Praef. satis commoda, pro ulteriori indagine uberores occasionem subministrant.

Speciatim jam confideranda est Meferenterii Inflammatio, & hanc subsequens Abfcessus.

Satis ante frequenter sunt Meferenterii Inflammationes, quoniam copiosissimam habet Vasa Sanguinea, simulque copiosissimam intrinsecum est Glandulas, unde facile excitatur Inflammatio, sicut fere cum aliis Morbis conjungatur, ac sub aliis Morbis se praefentare solet, idque imprimis, dum illud ob varios calas Inflammationem pati quovis, in specie accedente Intestinarum Affeetu: Unde Meferenterium aune solum, idque rariis, nunc una cum Intestinarum parte, inflammari solet. Si hoc, melius est pro Medico, qui ita faciliis casu cognoscere potest, prius pro Aegro magis patiente; quale Exemplum habet CHIFFLETIUS obs. 31. de Meferenterii & Intestinarum Inflammatione cum Umbilici dolore conjuncta.

CAUSAE.

Es Causae, quae Inflammationem Meferenterii inducunt, praeter eas generales Inflammationem reliquarum Causar, duo imprimis sunt Specialis in Meferenterio, nempe Dysenteria & Hernia. Dysenteria enim pravè curata, in specie suppletta, ac adstringentibus impetivè tradita, faepissime in Inflammationem Meferenterii periculum & lethalem degenerat, observante hoc HILDANO, LAMONIERE, & MATTHAEO MARTINI r. 1. p. 27. Quoad Herniam vero, dum in hac, ubi cum Intestinis tenuibus Meferenterium simul in Scrotum descendit, non potest non Meferenterium contrahum, aut visioe compressum, Sanguinis circulum turbare & impedire, & ita Inflammationem incutere. Praeterea & Febris Ardens per Metallum quali criticam materiam morbosam in Meferenterii Abfcessum terminatur, ut supra jam distinx.

DIAGNOSIS.

Quod attinet signa Diagnofica, Inflammatio haec non fecus ac reliqui ejus tumores & Abfcessus, diftincte agno-

scuntur, quia latent in profundo, & saepius sunt indolentes aut dolentes, licet pro Uterinis, Colicis aut Nephriticis Pathematibus subinde habentur, cum Nausea & Vomitus subinde accedant. Nihilominus tamen in Inflammatione Meferenterii percipitur qualis Punctus in abdomine, ac imprimis in ejus profundo, quod in specie sensibile fit, dum Aeger se in lecto volvit; ardet simul adest non raro Pericordium aut circa Umbilicum; Dolor praefentatur in profundo Abdominis cum leni tamen ardore abfcessus; cum quo etiam ardore percipitur Transitus quidam sensus vel Ventriculo & circa ejus regionem, & in Abdomine, idque tamen circa vehementem, & quae nonnisi pressu animadvertitur, Duritiam, interdumque adfunt Egestiones chylifae ac plus minus dolores, extra tamen Ventriculi vitium praefens excitatur: ratio facile patet. Dolor vehementis aut acris adest nullus, sed tenuis, obtusus, plus minus pulsatorius urget: Adfunt signa Inflammationis reliquarum Abdominis partium, quae alias facile confunduntur.

Observandum ergo, ne confundatur Inflammatione Umbilici cum Inflammatione Meferenterii, sed probè distinguenda est. Nam Umbilicus in parte sui interna non externa, circa Musculos Rectos non raro inflammatur & suppuratur, unde Pus per eum evacuat. Nempe in Umbilici Inflammatione circa regionem ejus in profundo Dolor magis sentitur, Tumor apparet promissus & propior, qui in Meferenterio est remotior, Ardor & Febris lentè magis intensè, Aegerque in Abdomine maiorem Tensionem perferit; Quando verò Inflammatio ad Abfcessum pervenit, percipit tunc Horrorem, interdum Rigorem, cum superveniente insigni Aestu.

Cauti etiam sumas, ne Inflammationem Intestinarum confundas cum Inflammatione Meferenterii: Nam circa Umbilicum tres vel quatuor sunt Digniti, ubi imprimis locus est Meferenterii, in quo praeter alios tangi atque cognosci potest ejus Inflammatio aut abfcessus; Nam si ipsi non adest Inflammatio, non potest percipi tamen si ipse Umbilicus inflammatus, percipitur propior Tumor, qui in Meferenterio est remotior.

Febris diversae etiam in Meferenterii Inflammatione & Abfcessu adjunguntur, pro diversitate loci inflammationis: Sin profunde Meferenterium inflammatum, suppuratum Febris non sunt Continua, sed Lenta, Languida, alioque Stili insignior aut gravioribus Symptomatibus, & quae interdum circa vespertinam exacerbat, oriuntur: Interdum multa Febris indicia adfunt, teste RHODIO m. 3. obs. 95. Sin verò circa exteriores ejus partes, ubi ipse abdominis contentia praefertim conjungitur, Inflammatio Meferenterii accidat, praeteritum cum luctisim, tunc symptomata dicta omnia exultant graviora, Febris ardens plus minus acuta, non raro Semiterstianae conjungitur, & graves dolores affligunt, innovente SENNERTO cap. de Inflammat. Meferenterii lib. Praef.

In genere, dum Suppuratio est, ne alias in quavis Inflammatione, Febris, Dolor & Symptomata reliqua sunt graviora. Dum Abscessus suppuratum rumpi incipit aut rumpitur, Horror insignis, interdum Riger quatuor Aegrum, cum superveniente Aestu non raro ingruit, quem Purra, praefertim per alvum, excretio successe comitatur: Confir. HORSTIUS lib. 14. obs. 35. & 36. Item BARTHOLINUS Centur. 4. Epist. pag. 49. & c. 4. Hist. 96.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis, Inflammationes Meferenterii aut resolvuntur, aut frequentissime suppurantur, & in Abfcessum abeunt, aut distius durando, in fibras degenerant, qui non tam in Meferenterio inflammato, quam ejus Glandulas observati sicut sunt.

In abfcessibus Meferenterii supervenientes erant Diversiones subinde salutare sunt: vid. BARTHOLINUS Cent. 6. hist. 41.

Suppurationes Meferenterii admodum sunt lentae, ac nonnisi tardè sum abfolvant cursum, unde etiam Aegros vis in confectis fondionibus impediunt. Diuturno hoc malo assidui successe aut ad Tabem & Hileam, aut tandem ad Cachectiam deveniunt. Eructant pure, post abfcessus ruptionem, aliam in locum quam alvum, excretioni idoneum non repereant, gravis affeetus Colica similis non raro observatur. Sin verò in abdominis eavum effundatur, tunc Membra vicina vel inficit, ut Graegram concipiant, vel acedine corrodit, & Malorum quamplurimum author est.

Interdum abfcessus ruptus optime non tantum per alvum,

vam, quod sepius, quam, quod rarius, per Urinam, rarissime per Uterum expurgatur, Intestina corditis, & eadem fiderata seu splacata reddidit: Exemplum suggerit TULPIUS Observ. 37. 1. 2.

Ut autem discernatur, nec confundatur, Excretio paracenta facta ca Meleniterio, ab Excretione paracenta vitæ Exulcerationis Intestinorum, observetur hoc signum abesse diffusum, quod si confertum uno impetu, & copiosè & sine dolore, per Alvum fluent paracenta, eaque plerumque permixta cum sanguine plus minus, ex Meleniterio esse: quod si verò paracenta pauciora, & tardius cum magis terminibus, ac præcedente Febre acuta sensim ac successivè effluat, Signum est, esse ab Ulcere Intestinalium, ac horum cum Meleniterio simul concurre.

Observationes singulares ac præ aliis curiosas Inflammationis Meleniterii, ejusque abcessuum, cum gravissimis symptomatibus, secuta tantum excretionis copiosa paracenta, videbitis in BARTHOLINO Cens. 4. Epist. pag. 490. Item in C. 4. Hist. p. 96. fuit etiam rarum est, quod refert RHODIUS cap. 2. Obs. 95. de abcessibus Meleniterii interitum sine Febribus observatis, ut ait dixi ut plurimum adit Febri lenta; & TULPIUS l. 2. Obs. 37. ubi morbolem habet eadem, Inflammationem scilicet Meleniterii suppurati, & ad abscessum dispositi.

Potè evenit interitum in Meleniterio abcessu, ut emittatur Urina copiosa, eaque laudabilis cum sedimento laudabili: quod si fiat sine leviamine Aegri, quin potius cum Incremento dolorum, & malum est, inquit enim fluxum colliquescit, Aegrum Tibi ac Heclicæ, brevique post mortem traditurum.

C U R A.

Cura scè cum reliquis Inflammationibus est eadem, mutatis solum mutandis, ratione nempe partis affectæ, & conjuetorum symptomatum.

Notandum saltem, quod Venæsectio nil proficit, nec ipso morbo, nec Sanguinis effectiveness sebit adeo acutis existentibus. Pyæ cæteris tamen Sanguinis quibusvis evacuationibus Vasa non Hæmorrhoidalium aperta, præsertim per Mirandus applicatio eadem, luo cum fructu in Meleniterio Morbo insitit infelix, natura monstrante viam, & per dicta loca subinde felici cum successu se ipsam exonerante.

Purgatio quævis potèrè dicta sine vehementi ex se & per se potius est nociva, irritat erabonem, & abique euphoris Aegri evenit. Clysmata vero Emollientia, Lenientia, Abstergentia & Anodyna, pro circumstantiarum ratione subinde inieci, imprimis quando jam per Alvum purgatur abcessus, sepius sunt utilisima.

De cætero tota Inflammationis Meleniterii Cura consistit in Resolvendis & Emollientibus, ut rectè loquitur HARTMANNUS in Pr. Chym. Alii quidem Resolvendis Interdixit; his vero emollientibus Externis, Internas scè sunt nota ex superioribus, præter, quæ in specie Tartaria, v. g. Tartarus variolatus, Liqueur Tartari sol. Tartari citè paratum, Tinctura Tartari. Spiritus Tartari simplex, aut Carminativus, Tinctura Vitrioli Martis Zovvifari item alia blanda Martialis, Est. Martis cum Sapo Pomum, Tinctura tartarizata Martialis Endovici, item Effusio Amara aperticem dictæ, ut Alphonso, Crestauri min. Femaria, Cardui ben. Chelidoni majoris, Gummi Ammoniacum, &c. Quibus adiungenda sunt, speciatim si Febri lenta addit, Diaphoretica Antionialia; unde Antionium Diaph. præsertim martiale, hinc etiam Bezardicum Martiale, Anthed. Fox., & similia in morbi cursu sunt præstantissima & frequentè usurpanda. Externè applicatur Emplastrum de Cicuta usitatum, vel solum, vel cum Gummi Ammoniac subactum, juxta curiosam HARTMANNI compositionem, est egregium in tali casu; hac tamen simul observata Cautela, ut, si circa dolorem Emplastrum hoc emolliat, & Inflammationem discutiat, res bene se habeat; si vero dolorem intendat & exacerbet, malum Signum est; certum enim est, scilicet jam esse Inflammationem ac abcessum, adeoque Emplastrum removendum erit, & ab eodem abstinendum. Alias quoque præter consueta Emplastro, Cataplasma & Fomenta Emollientia ex Betonica, Salina, Agrimonia, Chamomilla, Verbasci, Meliloti, Lilii albi, Asphurbi, & similibus in Vitis coquenda, & cum spongia vel aliis appropriatis applicanda, conducunt. Quod si cum Inflammatione & abcessu Meleniterii Febri lenta plus minus conjungatur, internè Martialis & Antionialia reliquis super enarratis addantur Remedia, præsertim Lep. Cancer, Anticell. Per. &c. cum paucis Sale Ammoniac socianda erunt. His ipsi vel resolvendi Inflammatione & abcessus, vel ut-

Tom. II.

plurimum suppuratur, unde rupto abcessu sequitur tandem Puris ut plurimum per Intestina vel per Urinam excretio, eaque in principio confertum, & postmodum successivè, continuatur, ad perfectum usque abcessus expurgationem. Interdum remittit Puris excretio, post aliquot dies tamen recurrens, idque crebrius, mutata sic vicibus, quando nempe in quanto sufficienti collecta excreatur. In hujusmodi Inflammationibus & abcessibus Meleniterii adhuc notabile est, quod refert MARCELLUS DONATUS in Hist. Med. Hist. lib. 4. Hist. 2. p. 1. supervenire læpè iis copiosum Urinæ Profusum, sed sine allevatione doloris Aegri. Ob sedimentum autem, quod in Marule undè reperitur, laudabile, nullam salutis spem concipere debet Medicus cum illud colligamentum potius quoddam Corporis contabescens exilat, non autem genuinum Urinæ sedimentum. Quod si ergo Remediis hæcundis dictis Inflammationi relati nequeat, led degeneret in abcessum, tunc Abcessus ita factus est expurgandus, manifestandus, & consolidandus: Et quidem dum apertus est, quod docet Rigor & Horror cum Phlogi, Alvus Clysmate acriore inieci simulanda est, & Diureticis Pa promovendum, ut marat id evacuetur. In Manifestatione verò & Consolidatione Abcessus eadem omnia conveniunt, quæ alias in phthisi, ab Exulcerationibus partium internarum orta, sunt proficua, & Experitis Test. 17. Cap. 1. Art. 3. laudata; speciatim Terebinthina & omnia Terebinthina, hinc Vulneraria Vegetabilium reliqua, primatum obtinent, unde Balsamum sulphuris terebinth. aut succinum, ni Intestini Febri obsteret, item Bals. Peruvianum in Julcalo calido vel Ovo forbit ad gutt. vii. s. xii. Acc. aliumtum, Pululæ de Tereb. item Tereb. Cyprica cum Vitello Ovi assumta, reliquis præferuntur merito Remediis MARTINIO laudatis; quibus subinde & blandiora Martialis, præsertim in forma liquida, Tinctura, Extracta & Effusio Martialis quæcunque, v. g. Effusio Martis liquida, Extracta Martis cum Sapo Pomum, item tinctura sulphuris, vitrioli, & Tinctura Asphurbienda addenda; quia abcessum & manifestandus & consolidandus. Hinc Acidulæ cum fructu usus fuit THONERUS in suis Observ. p. 173. Potiones Pulveraria alius notæ sunt, speciatim tamen in hoc casu proficua sunt Agrimonia, Hypericum. Pegicaria, eru appetitum abcessum Meleniterii Remedium. Dersum Ligni Sauti & Sassafras in principio ruptionis abcessus insigniter conveniunt; quibus addenda & Radix Glycyrrhizæ, Scorzoneræ, Ficus, Juniper & similia quæ manifestandus abcessum & Purulentias acres simul temperant & absterunt; item Dersum Rad. China cum Passillo, & minoribus & majoribus, Glycyrrhizæ, Rad. Scorz. Caryophyll. Cinnamome & similibus, in Sero Lactis purandum, vel Aqua etiam, ut per prius modo melius fuit: Formulas videb. in MARTINIO. Serum Lactis etiam est egregium abcessum & consolidandus Ulcerum internorum, ratione sum nitrofitatis: id quod vel solum propinetur, vel dersum eam Rad. Cichorii, Liquiritia &c. nupretur. Rhubarbarum, tam pro scopo abcessu, quàm scopo adhaerentia & quasi vulneraria, non negligenda vident. Sed plura de his videb. in specie in modo laudato MARTINIO.

Cæterum Tumor Meleniterii Duri, Scrophulæ, Scrophulæ vel ipsi suppurant, & simili modo curantur, vel præmissa Internis Martialibus, ad Salia volatilia & penetrantia accedendum. Externè verò usurpanda Empl. ex Gummat, vel sola, vel cum addito Mercurio vivo, uti & prodest Emplastrum de Ranis cum Mercurio, à quo nullum periculum metuendum est.

ARTICULUS VII

De Inflammatione Pancreatis.

Quæ hæcundus de Meleniterio dicta fuerunt, etiam de Pancreate scè monenda sunt, cuius Morbi & Affectus ut perquam occultus fuit, ita plurimum difficultis & Intricaturum Morborum solum est origo fuit. Est pluribus paucis annotare sufficit.

Tumor Scrophulosus Pancreatis cum affectione Hypochondriaca, vel potius scorbuta, elegantè curatum videb. in RIVERO Cens. 3. Obs. 85. RIOLANUS Ambrosius, lib. 2. cap. 16. in Thome Melancholico Pancreas amputanda sua & pondere ipsum Hepes aquant totum Scrophulæ, multis Glibulis specie Ovi columbini referunt refert: & CATTIERUS Obscur. 5. Pancreas innotatæ æque flu-

V u n

pendo

pende magnitudinis allegat, ex quo Renis in suo loco naturalis dimotio facta sit, cum Hypochondrii dextri dolore gravissimo, & Dyspnoea gravi. TULPIUS lib. 1. 2. Observ. 32. cum flatuato Menterii pendente ibi est, quod Aquam intereum mentebatur, Pancreas pingue & ponderosum refert. *Abscessus in Pancreate* lentum perpetuas vigilas, Lipothymias, aliaque gravissima symptomata inducentem, refert SCHENCKIUS l. 3. Observat. de Morbis. *Pancreas suppuratum* lethale BARTHOLOMÆUS Cræter. 2. Hyber. 39. Pancreas Lipidum, Vomitum lethalem contumacem causans, PANAROLLUS Præf. Observ. 44. Rüm corruptum & sphacelatum, & Vomitus continuum lethalem BARBETTE in Præf. Puellam per 8. annos miserè vesatam & Hædica Febre mortuam, in qua pancreas scirrhum & induratum, vid. apud PETRUM PAWIUM Observ. 14. Mortem repentiam ex pancreate sphacelato vid. M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 99. p. 230. & Ann. 3. Obs. 45. Ex *Pancreatis Encephalitis* maritima in M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 31. p. 57. Interdum pancreatis morbi superveniente salubri fluxu cruento curantur, auctore BARTHOLOMÆO Coss. 6. Hist. 43.

ARTICULUS VIII.

De Omenti Tumoribus.

Nec omittendum hic penitus Omentum, quod nihil aliud est, quam expansio quadam membranacea, ex duplici constans membrana, in figuram orbicularem ad instar marisipii accupari explicata, pluribusque Vasis sanguiferis & copiosis pinguedine intertexta, laceris non saltem superficialibus, sed anfractibus quoque ac circumvolutionibus eorumdem impleta, cuius repleta non absurdè Epiploa seu *Ommentum* vocari solet. Altera enim & exterior ejus Ala in fundo Ventriculi & hujus communi tunica oritur, simul atque in Hepatis apice Lienis cavo committitur; anterior autem & publica mox Diaphragmate a principio Menterii & Collo sub Ventriculo collocato, hinc ultra Umbilicum descendit, rursus ad Inguina atque expanditur, ita ut Heroici laterales ex hujus dislocatione non adeo infrequenter contingere possint, ac communiter creditur & dicitur.

Vasa Omento intertexta sunt:

1. *Vasa Epiploica*, & Gallico-epiploica, dextra & sinistra, ab Hepatico & Splenico-coeliacæ ramo emergentes.
2. *Vasa ex duplici ejus Ala*, ampla radice protuberantia, quæ in quatuor pariter caecis, eisdem cum Arteriis nonnihilbus insignite, conflunt, ac demum in Menterium & Splenicum Venæ Portæ truncum se exonerant. His
3. *Accedunt Nervi* existissimi à Plexibus Abdominis diversis, potissimum primo & quinto emergentes & propulsantes.

Vasis hic communibus MALPIGHIUS de Omento peculiariter *Adiposæ Ductus* addit, qui valde potest. A BARTHOLOMÆO, HILDANO, aliisque *Glandula* quoque plures Omento adscribuntur: sed harum potissimum sunt morbozæ aut Protuberantia adiposæ, præter binas saltem; quarum altera masticola non procul ab illius cum Pylozo commensura deprehenditur: altera minor Lieni adherescit, utaq; hæc duplex, uno triplex nonnunquam, conspicitur.

Usum Omenti tandem quod spectat: hunc FALLOPIUS in Obs. Anatomica rectè observatissimè pronunciat, & nonnumquam est, cum ea, quæ circa eandem GALENUS VESALIUS, & GORDÆUS scripserunt, commentis similia videntur; imò, quod hic hoc MALPIGHIUS præfert, sufficientia sunt, ut ipse fateatur.

In hoc, tanquam in butta, Humores, vel flatus collecti, item glandulae ejus subinde scirrhusæ aut strumatosæ factæ, varia pathemata inferunt. Conf. BARBETTE in Anat. Præf. sicut & admiranda Omenti Tumores videbitis in MARCELLO DONATO Hist. Med. l. 7. ab HOR-

STIO adscribit; item in HORSTIO Decad. 6. Præf. 10. HILDANO Coss. 3. Obs. 62. Quibus SCHENCKIUS in Observ. de Omento addatur.

ARTICULUS IX.

De Inflammationibus Partium Thoracis inter-narum, in specie de Inflammatione pleurae, Pleuropneumonia, Peripneumonia, Pleuritis vera, & notba.

Omnia frequentissimæ Inflammationes sunt præ reliquis, quæ afficiunt Partes internas ad Thoracem pertinetes, & ferè semper sunt ab aliqui sanguinis in Praecordis grumescencia, & accensione, sanque frequentias Erysipelacea, tunc magis Humore seu Sanguine; quæ ratione v. g. pleuram inflammatam decalpo calidiorè, quam naturaliter est, observavit RIOLANUS in Anatomic. pag. lib. 3. cap. 5. p. 358.

Frequentia autem harum Inflammationum dependet ex eo primario, quod Thoracis interiora, nempe Sanguis in Pulmonibus *Aeris alterationibus* vel maxime sine expolita, cum occasione & vitio alteratus Sanguis promptissimè loca Thoracis lateralia & alia ejus partes afficit, quæ partium harum Arterias proximè sunt cordi, unde vel simpliciter vel respectivè sæpius Inflammationes excitantur; & hi Thoracis inflammatorii affectus VINCENTIO BARONIO Traët. de Pleurisyum. in genere *Pleuropneumonia* appellatur; quæ pollmodum, prout mox hæc modalia pars inflammatur, in specie variis initiatur appellationibus. *Inflammatio enim atrialisque Pulmonum partis dicitur Peripneumonia*; si altera vero *Pulmonum medietas* inflammatur, vocatur *Pleuritis*; quia in hac semper ferè simul illius partis membrana, *pleura*, est inflammata, sicuti contra cum Pleura semper quoque Pulmo illius partis observatus fuit inflammatus.

Communis quidem inter *Pleuritidem* & *Peripneumoniam* hæc affertur differentia, quod in illa pleura, in hac *pulmonum* tantum afficiuntur; utraq; tamen interdum conbiantur, & invicem transtantur. Suot interim nonnulli, v. g. ZECCHIUS Confal. Med. Conf. 16. in Append. PLATERUS lib. 2. Præf. p. 409. & l. 3. p. 365. cujus rationes amplius deducit HOCHSTEDTERUS Decad. 6. Conf. 4. p. 92. & LALLIUS A FONTE Conf. 91., qui putant, observatum semper fuisse in Pleuritide correptis, quod non solum pleura, sed pulmonis medietas simul in illo latere inflammata fuerit: munus propriis auctoritate HIPPOCRATIS de Loe. in hom. Text. 24. quibus quidem SENNERTUS & RIVIERUS respondent: vid. *infra* locis. Nihilominus raro hanc Inflammationem pleurae sine pulmonum Inflammatione existit: Id quod pariter confirmat modernorum Anatomicorum observationes in pleuritide demortuas: Conf. SENNERTUS lib. 2. Præf. p. 2. & 16. de Pleura, Quæst. 1. (T)

Loco pleurae interdum quoque cum Pulmonibus inflammatur *Mediastinum*, duplicata nempe pleurae sub parte sterni anteriori, quæ Inflammatio tamen peculiari nomine caret; quin & *Diaphragma* interdum inflammatur cum Pulmonibus, cui ordinario supereminere solet *Delirium* leve, quod speciali nomine *paraphrysis* & *parapneumonia* appellatur solent veteres, à *phreza* quod Diaphragma significat.

Non autem solum lateralis afficitur pleura, sed etiam interdum simul cum Pleura & Pulmone *Membrana Humeri*, item *Membrana Juguli*, & similes vicinæ membranae, afficiuntur, observante TULPIO l. 2. Obs. 1. cum Pleura ita inflammata impossibile videatur, quin & Inflammatio *Musculis omnisque Interstatiis internis* communicetur. Siquidem interdum accidit, ut in vera pleuritide phlegmone versis exterioribus muscularibus eo magnitudinem affectus simul tendat, & dolor etiam primo actu percipitur; quin curiosum est, quod observavit BARBETTE, interdum oem-

(T) Sicut in Pleuritide demortua Pulmones simul cum Pleura inflammata observari solent, quæ necesse est in multis Pleuritibus, fieri possit, sedem in his, qui Morbum superant: contra bei enim nulla Anatomica inspectio Acuta habere parat. Describitur igitur faciemdem est inter veras Pleuritidem, Peripneumoniam, & Pleuropneumoniam, Pleuritis idem enim vocatur solus Pleura inflammata; Peripneumonia, cum soli Pulmones, Pleuropneumonia vero cum Pleura simul & Pulmones inflammatione afficiuntur, quæ ægræ plurimum jugulatur, illorum Calavera calidè subijciuntur anæmice.

pe Diaphragma juxta Processum inferiorem ignaris representasse speciem Nephritis seu Renum inflammationem. Præterea, quoad hiliarium Pleuropneumoniam in genere & in specie, conf. VINCENTIUS BARONIUS *Traité de Pleuropneumon.* lib. 1. cap. 1. & p. cypus velligia testit SCHNEIDERUS in *Dissert. de Pleuropneumonia*.

C A U S Æ.

Causa præterita Pleuropneumonia, sub quo nomine omnes Inflammationes Thoracis comprehendit, est sanguinis coagulatio atque flagratio, ab acido in eo peccante orta, cujus ratione hic ad facilem & succellivam sui coagulationem & coagulationem atque dissolutionem, & hinc vel in Pulmone, vel in Pulmone & Pleura simul, aliisve vicinis locis hærendo, acido simul membranas partes vellicando, & ad crebriores contraturas stimulas, hos affectus inferit: Conf. HELMONTIUS *Traité de Pleur. Fœtus*, HOLTERHOFF de *Erwer. Midler.* Part. 2. Sect. 1. Hinc sanguis, qui Vena sedita emittitur, subinde nunc semigravissimus prodire observatur, teste GABELCHOVERO C. 4. *Caract.* 70. & 79. nunc promptissime coagulabilis existit, ita, ut forè exundo congruere, teste HELMONTIO *cit. loc.* ipsi vero extravasato pellicula tenax subalbida viscida supernatare solet, teste WILLISIO in *Pharm. Rat.* Part. 2. p. 178. & 178. Relicta Acidi huius peccantis velligia in parte affecta, etiam curato abscessu, ætius crebriores in eodem loco ferre solet. Quod si sanguis haud perfecte coagulatus minis firmare interitus inhaerens, minorem quoque Dolorem inferat, faciliè resorberi, & hinc per *peripneumoniam* ad diversas partes transferri potest.

Causa remota harum inflammationum in Thorace obvenientium, sunt variae: Frequentior imprimis solet esse frigoris externi haustus, post moderatos calores aut Corporis motus & incalcescentiam; Sanguinem enim coagulando, cum ad flagrationem dispoñere potest: Et quidem est una ex frequentissimis causis, five ætè inspiratis, five potus ingurgitatus fuerit frigidus: Sic HORSTIUS lib. 3. *Observat.* 10. Pleuritidem observat ex haustu Vini frigido post Æthum & Corporis Refrigerationem: RIVIERUS *Obs.* 14. & DIONISIO POMARET *communis* ex nimia Causa & potu frigido pleuritidem notat: Conferat. HILDANUS *Com. 4. Obs.* 25. qui habet Peripneumoniam ex indelicta *salutaria*, & hanc excipiente potu frigido: F. ORESTUS lib. 16. *Obs.* 31. observat Juvenem, post Exercitium, ex aqua frigida potu in pleuritidem incidente: HORNUNG in *Cyph. Med.* pag. 276. observat Peripneumoniam in Clerico concitata ex eo, quod bene potatus sæpe in Templo cantasset: Vid. etiam M.A.N.C. *Ann.* 1. *Obs.* 285. p. 124.

Occasiones Pleuritidis quoque præbent *Potus spiritibus nimis ingurgitatio*, *Metas vomitionis*, &c. Præterea ordinariæ *suppressiones sanguinis evacuationes* non raro dant pleuritides, in specie tamen *Menstrui suppressiones*; pari enim ratione ac Menstrui suppressione Dysspermiam procurant, ita & pleuritidem generare poterunt, quorum etiam occasione acidi dant vitiosum interitum colligi solet: Sic DEODATUS in *Præf.* pag. 219. observat ex Menstrui ante legitimum tempus emissionem hemoptysin cum pleuritide: Iamperit hinc *Cæsar TIMÆI à Goldenh.* lib. 2. *Cap.* 7. quod etiam sæpe observat, ubi habet exemplum Mulieris Pleuritide ex *suppressione Menstrui suppressione* propter Causam in Baviam frigidum: Præterea *Dyspermia suppressionis* aut adstringentibus male curata non raro dant pleuritides, observantibus Auctoribus omnibus, in specie SENNERTO in *Præf. cap. de Pleurit.* item SCHNEIDERO *Traité de Pleuropneumon.* Unde etiam HELMONTIUS rectè aliter (quod bene observetur prius) Dysspermia & Pleuritides non differre in radice, sed tantum quoad locum affectum. Imprimis consideranda Aeris *Confusio Epidemica*, & *Malignitas*: Hujus sequendi ratione non raro pleuritides grassantur subinde Epidemico more, quo tempore pleuritides tales & Peripneumoniam ut plurimum sedit Malignæ, & Contagiosæ plura minis, quod multorum prætorum testantur Observationes, v. g. FORESTI lib. 16. *Obs.* 34. WIERI in *Obs.* 241 de *Pleur. Malignæ*, BARONIUS de *Pleurapneumonia in Præf. & c.* 1. item BARTHOLINI pag. 69. lib. 2. de *Interditi Bibliotheca*. Facit hæc LÆLIUS & FONTE *Conf.* 31. & 31. qui observavit Anginas, pleuritides & Peripneumoniam coarctandam, & simul vulgariter grassantes, in quibus sedit Cadavera, quæ catervatim mortua fuerant, Pulmones ingentibus abscessibus correptos, ex quibus aper-

tis Pus copiosum & fœtida materia effluxit. Hinc patet, quod hi affectus differant non radice, sed loco affecto; unde etiam eodem modo curantur, ac omnis in alium species mutatur; de quo vid. RHODIUS *cap. 2. Obs.* 11. ubi habet exemplum Ægri, qui ex Angina in Peripneumoniam, & ex Peripneumonia in Pleuritidem incidit; ita ut tres sint unus idemque morbus, unam eandemque habeant Methodum medendi, & differant tantummodo loco affecto. *Pleuritis* quoque *essentia* non raro supervenit Pleuritide, qualis etiam observata fuit post Morbillos in M.A.N.C. *Ann.* 4. *Obs.* 7. pag. 10. adroque tanquam Symptoma aliquod illdem subinde se associat, ut rectè SYDENHAM in *obs.* pag. 155. *Pleuritidem nunc æstivalem* sui primarium affectum, nunc Symptomaticam Febris, esse sedit. Similiter scabiet *retrogressa*, ubi Asthma, sic & Peripneumoniam & Pleuritidem inferit, observatur hoc A.M.A.T.U.S. LUSITANO Cap. 3. *Car.* 62. ubi Scabies sicca retrogressa Pleuritidem intulit, Insupè *periodica* subinde est Peripneumonia & pleuritidis, idque, uti rectè intulit HELMONTIUS, tunc temporis, ubi non adeo fuit rite curata, & Fermentum remanet: & quidem periodum habet interduum annuum, teste ZACUTO LUSITANO lib. 3. *Præf. Adm.* *Obs.* 111. vel aliis modis crebrius recidit, de quo vid. BORELLUS C. 4. *Obs.* 81. de Viro septem vicibus Pleuritide detento, qui tandem hydropem perit. Tandem *Causa Extranea*, Cæcus, Idus, indeque nata: Contusiones, aliæque pathemata similia, quæ sanguinis ordinarium motum per Vasa Intercolliata plus minus remaneant, ad Pleuritidem dispoñunt: Sic ex *Risæ & Strumatorum simulata* Pleuritidem notam videbitis in BARTHOLINI *lib. 2. Med. Vasa.* lib. 2. pag. 139.

Hæc sedit sunt Causæ ordinariæ Pleuritidis & Peripneumoniam.

Denique *Pleuritis Notæ* à Verisimilibus Intellentionum oriunda à QUERCETANO in *Pharm.* & BARTHOLETO *Traité de Pleurit.* lib. 3. *cap.* 3. observata fuit. Et hæc pleuritides se manifestant, quod præter pleuritidis signa simul adfuerint signa Intellentionum affectuum: videatur A.M.A.T.U.S. LUSITANUS *Cap. 3. Car.* 51. item ZACUTUS LUSITANUS lib. 3. *Præf. adm.* *Obs.* 7. *cap.* 3.

D I F F E R E N T I Æ.

Observandæ sunt ob id *differentia*, quod tempore

- I. Alia est vel *benigna*, vel *Maligna*: interdum *Epidemica*, de qua *supra* & quoad necesse acidi pleuriticum singulariter corruptum acrimoniam perquam hostilem & venenatam acquirit.
- II. Alia est *primaria*, alia est *secundaria*, seu quæ alios insequitur Morbos: v. g. quando Scabies retrogressa Pleuritidem inferit; vid. A.M.A.T.U.S. LUSITANUS C. 1. *Obs.* 62. vel pleuritidis Febris continuus aut affectibus Thoracis aliis supervenit.
- III. Alia est *simplex*, alia cum Peripneumonia aut cum alterutra reliquorum Thoracis partium inflammatione, v. g. Diaphragmatis, *juncta*.
- IV. Quædam est *periodica*, quæ sæpe recurrere solet, imprimis non rite curata: vid. BORELLUS l. a. item ZACUTUS LUSITANUS l. a. sicuti non iniquitas est multoties recurrens in uno subiecto affectio: alia, & quidem ut plurimum, non sunt *periodica*.
- V. Porro (quæ omnium Differentiarum solennis magis est) Pleuritidis nunc est *Pura*, de qua silem hæc locuti sumus; nunc est *Notæ*, quæ alias extraordinarias agnoscit Causas: *Pura* est inflammatio mediocris Pulmonum & Pleuræ illius lateris, *juncta* hinc cum Febre acuta aliisque symptomatibus superioribus explicatis; *Notæ* vero sine Febre, aut cum Febre lenta admodum.
- VI. Pleuritidis tandem est vel *Ascendens* vel *Descendens*, ratione Loci, Doloris, & Extensionis. Fundamentum hujus divisionis consistit in distributione Valorum descendendum, & ascendendum, per quæ Sanguinis refluxus impeditur inflammationem inferit. Hinc *Ascendens* consistit in duplo spatio triam Costarum superiorum, quæ nempe sunt intra secundam, & tertiam Vernebram, & jugulo numerando: *Descendens* vero Pleuritidis dicitur, quæ consistit in reliquarum quoque Costarum inferiorum quatuor spatio, i. e. intra tertiam & quartam, quartam & quintam, quintam & sextam, sextam & septimam, *Ascendens* dicitur, quia spatio illa intercolliata recipiunt Vasa sua cetera à truncis supra Cor, & Vena nempe & Arteria Azygali: *Descendens* vero Pleuritidis, quia spatio illa accipiunt Vasa à truncis infra

fra Cor, nunc ex inferiori trunco Arteriae Magnae. Hæc Differentia scitè necessaria & probè observanda est, ob legitimam administrationem Venæsectionis.

Pleuritis Notha est variæ, imprimis quadræ.

(1.) Illa, quæ à SENNERTO ita dicitur l. 2. *Prax. p. 3. cap. 16. ubi de Pleuritide*, p. 225. & 230. quo loco intelligit Inflammationem Molecularem Thoracis ætæternam & internum Intercoastalem, in qua Febris est nulla, aut non adeo acuta, sed saltem levis, Tussis pariter nonnulla rara & Catarrhalis, sine cruentorum expectoratione, Pulsus minus durus, Dolor mitior, saltem pulsus, minus pungens, & qui externo contactu minimè exasperatur, adeoque cum Vera Pleuritide parum vel nihil habet commercii, nisi cum Vera graviore hæc simul iuncta sit.

(2.) Est illa, quæ utiçto magis Pleuritide Notha nomine venit, eoque Dolor insignis pariter in una altera lateris, sine Febre ac siti, aut saltem cum Febre Catarrhalis simili, sine cum Pulsu quoque ferè laudabili, nisi in quantum doloris ratione immutatur & frequentior redditur; Tussis adest aut nulla, aut si quæ est, non adeo frequens aut vehemens, saltem Catarrhalis aut Lymphæ vitio, unde & Febris Catarrhalis similis tunc ferè jungitur. Cuncta autem hæc Symptomata, uti vulgò à Flatu oriri asserunt, oriuntur ex acido vitioso, vehiculò Lymphæ sub Seri flagrantia intra Pleuram delatò, sine huius Inflammatione, sine Pulmonum alteratione, & potius Dolor Pleuritidis, quàm Pleuritidis appellanda venit. Atque talis affectus in Scorbuto aut alijs febribus generis nervosi obnoxius, non raro observatur, cum appetitu non raro laudabili, pulso naturali, Dolor tamen non adeo fixus est, sed locum sæpiù mutat: vid. DRAWIZIUS de *Serck. Tit. 7.* & WILLISIUS l. 2. Item Symptomata hoc est, Variolorum & Morbillorum eruptionem interdum antecedens, aut scabiem intempestivè curatam excipiens: vid. SENNERTUS *Prax. lib. 3. p. 3. cap. 6.* Item Gallico Morbo affectis aliquando accidere solet: vid. SENNERTUS *loc. suprà alleg. pag. 256. Quest. 11* item WILLIS, *Pharmac. Ration. l. 2. p. 159.*

(3.) Ad huiusmodi Pleuritidem, malè sic dictam Notham, seu potius dolorem Pleuriticum, etiam pertinet ille Dolor pectus, qui à fluxibus aut Vaporibus, Pleuram ac Muculos Intercoastales disvelentibus ac dissendentibus lubinde oriri dicitur. De quo vid. SENNERTUS l. 2. *par. 3. c. 6.* Nulla enim in hoc observatur Febris, nec Tussis; nihil etiam cruciatu, licet Tussis superveniat, expulsiur, dolor quoque vagus est minimè perperuus, sed per intervalla recurrent, non tamen pullans, nec punitivus, nisi quando pars affecta manu comprimitur. Oritur ab humore seroso acri sine inflammatione singulari. Hæc cum Pleuritide Notha prout species, quia utriusque saltem externa est, præter Febrilemque desedum, à Vera facillè dignoscitur, & hoc commune habet, ut Aëri in Pleuritide Notha utplurimam in latus oppositum potius quàm in morbum latus partem affectam decumbere queant, sicut ac Pleuritide Vera, utpote in qua contrarium observatur: vid. AMATUS LUSITANUS *Cent. 3. Cur. 67. Annot. & Cent. 7. Cur. 62.* SENNERTUS l. 2. *p. 2. c. 16. p. 232.* & WILLISIUS *Pharm. Rat. p. 2. Sect. 2. cap. 9.* In Pleuritide Vera enim, cum Aëger decumbit in latus oppositum, pars Inflammata pondere suo divellitur, maioreque patitur distensionem; minus in Pleuritide Notha. Spectat hæc

(4.) Similis dolor Pleuritidis à Venarum Interfectione, qui ab horum putrefactione Vapore fieri dicitur, de quo videtur QUERCETANUS in *Pharm.* observatam à se Notham Pleuritidis speciem, quæ in omnibus Symptomatibus Veram & Legitimam æmuletur, ortam à malignis & acris aut Vaporibus, ab inferioribus scilicet in Pectoris regionem delatis, ex quorum Virulentia & acrimonia plene inflammatio, necnon Venarum erosio excitata fuit, unde sanguinis expulsiò, spirandi Difficultas, Febris, & alia Symptomata, ubi purgatio cum Aqua Benedicta Rudendi instituta, Sanguinis detractionis & Ecceproctici exhibitionis longè laticque præferenda. Imprimis tormen & corripitum incommoda tollere iubet, à quibus Imperpetuum hæc aqua Pleuritidis oritur, id quod præstarent Antimonialis. Simile ferè Exemplum recenset BARTHOLETUS de *difficili Respirazione lib. 3. cap. 3. pag. 548.* dum inquit; se eurasie Pleuritidem in quadam Virgine, cui omnia pleuritidis Veræ seu Legitimæ signa advenire in principio, quam tamen post primos dies Malignam ex pravo Vermium humore se manifestasse, & proliis absque Sanguinis missione saluè curatam: vid. etiam lib. 5. c. 21. ubi similia habet. De Lumbricis quoque vid. AMATUS LUSITANUS *Cent. 3. Cur. 51.* & ZACUTUS LUSITANUS lib. 3. *Prax. Hist. Obs.*

7. cap. 3. Item Pleuritidem à Verne RHODIUS c. 2. *Observ. 52.* SCHENCKIUS l. 2. *Observ. 95.* GERNERUS l. 3. *Epist. pag. 49.* BONETUS *Med. Sept. pag. 374.* RIVERIUS c. 1. *Observ. 75.* & HOECHSTEDTERUS *De cat. 7. p. 49.* notantur. Atque hæc pleuritidis Nothæ se manifestant, quoniam præter signa pleuritidis Nothæ communia adiunt simul quoque signa interfectionis aëriorum, & quæ Vermibus sunt propria, maxime à Ventriculi angorem secum habet conjunctum.

Pleuritis Differentia patitur Peripneumonia, quatenus I. vel primariò & linealiter Morbi interventus generatur, vel alius Morbis, v. g. Angina aut pleuritidis, *Insidat*; Quorum hoc iterum duplici modo fit; aut enim pleuritidis in peripneumoniam commutatur, dum priore Morbo cessante alter excutitur: aut Morbo laterali Pulmonali supervenit, i. e. illi manenti bene combinatur. Hinc II. alia peripneumonia est simplex, alia pleuritidis iuncta. III. Alia benigna est, alia maligna, de qua vid. BARONTUS l. 2. cap. 7. §. 9. & 10.

Circa Diaphragmati aut Mediastini Inflammationem peculiare nil occurrat prædicto attendendum.

DIAGNOSIS.

Diagnosis Inflammationum partium Thoracis, earumque signa & symptoma comitantia, quædam sunt vel communia omnibus inflammationibus, quædam vel propria magis & distinctiora, pro partium affectuum ratione varia.

Signa communia Pleuritidis, Peripneumonice, Peripneumonice, Diaphragmati & Mediastini inflammationum, sunt hæc: Nempe

1. Adest in omni Thoracis Inflammatione respiratio plùs minus difficilis, aschola, adeoque simul frequens nempe & parva, nec sufficiens necessitati Naturæ.
2. Deinde adest Febris Continua acuta, cum insigni ardore utplurimum, & insigni febrili Symptomatum syndrome conjuncta, interdum Tertianæ typum observans.
3. Pulsus est admodum frequens, celer, magnitudine moderatus, qui saltem in progressu parvus fit, & in specie durus simul, ob Arteriarum tensionem insignem quasi convulsam, à Membraanis inflammatis affectis pleuræ quasi ipsamodicè contractis. Talis Pulsus interdum, quod sæpius observavi, Pulsus est inæquitrans, quo nunc quarta nunc septima pulsatio deicitur; est hic, quem vocat alius *serrenum seu ferracum*, qui licet aliis à LINDANO in *Collegio seu Martmannum* pro signato habeatur, eum tamen suo sensu explicatum Pleuritidis ferè proprium plurimi testantur Medici.
4. Facies in omnibus hæc pectoris inflammationibus rubet insigniter, *Gruvi* turgent, *Gena* sunt quasi inflatz & efflorescent, nisi declinaverit morbus ad mortem; tunc enim facies concolit: Est quidem mirandum est, si altera saltem Pulmonum medietas seu Pleura, e. g. Lobus dexter fuerit inflammatus, Rubor Faciei seu Labiarum respondeat saltem laterali parti Pulmonum affectæ, itaut si dextra pars Pulmonum sit affecta & inflammata, etiam mala dextra robeat, & contra. Durat hæc Rubor Genarum à principio ad finem usque & tunc cætera allegata symptomata magis in uno, quàm altero latere, observantur.
5. Tussis semper eorumis, frequens admodum & molesta adhuc in principio quidem scilicet, hinc progressu temporis sensim repulsiur materia tenuis, æquola, nonnulli spumosa, mox variè tincta; hinc spumæ totum se eruentum, tandem verò albescit, crassescit & spissescit, sitque muciliginosa & tenax, & tunc vocatur *spumæ collum*.
6. In omnibus Thoracis Inflammationibus Caput dolet insigniter, & adiunt simul *Agrypnia*, *sinusque* intensissima, & similia febtilia symptomata fatigant Aëgro, interdum cum supervenienti delirio.

Hæc sunt signa communia.

Quod verò signa & Symptomata propria magisque distinctiora horum affectuum à se invicem, ex oriuntur ex speciali Partis affectus habitudine, & sunt:

- (1.) Quod in Peripneumonia adit major admodum respirandi difficultas cum summa Pectoris angustia, anxietate atque Inquietudine, ita quidem, ut Suffocatio Aëris magis urgeat, adeoque hic interdum nonnulli credi cogantur spiritum docere: Interdum nec bibere, nec loqui commodè possunt, ob Respirationis angustiam, qualem respirandi difficultatem HIPPOCRATES vocat *Sublimem Respirationem*.

(2.) Dolor

(2.) *Dolor* in Pectore gravatius, profundus admodum, Spinae Dorsi quasi attingens, & obscurus aut inter tussendum solum observabilis, quique tamen in Thoracis etiam ambitu, si Pleuritidis fuerit iuncta; quando verò membrana succingens Pulmones simul inflammata non fuerit, dolor semper remissior est.

(3.) In Peripneumonia primis diebus Vomitus magis familiaris fuit, secus ac evenit pleuritide, observatur PISONE Tr. de Colluv. ser. p. 320.

(4.) Febris adesse continua, ut plurimum Acuta, cum Symptomatibus laetioribus, atque Febrem mollem, seu Epistola subinde observare solet LINDANUS. Contra in Pleuritide semper conjunctus observatur Dolor ambosit lateris seu Pleuritidis affectus acutus, quando inspiramus, aut postiorius ausus, & tunc impetis mollius; cujus originem ab acido, & fendi modum per contracturam fibrarum pleurae eleganter explicat HELMONTIUS Tr. Juvens Pleurae. Adeoque rarum est, quod refert LINDANUS dolorem huiusmodi postiorius non in omni esse Pleuritide: utet & Pleuritidis sine pleuritide lateris dolere observata fuerit à ZACUTO LUSITANO in Hist. Med. Princip. qualem & ipse TULPIUS observavit.

Necesse est, quod praeterea addit BARRETTE in Praxi, quod nempe pleura in regione dorsi, ubi adnascitur Diaphragma, inflammata, interdum ab incautus habeatur pro Pleuritide, licet hoc fiat cum summo detrimento Aegri.

In Inflammatione Diaphragmatis simul extrema Collarum spuriarum circa finem lateris imprimis dolent, & ista Ventris pars, ubi Diaphragma est extendit, dolorem percipit; dolor tamen exiguus est, inspirationem solum aliquo modo turbans, & saltem molesta quidam iuxta sternum inspirando percipitur. Tussis magica iuxta in principio aequè ac progressu morbi existit, & si humida, nec cum tam copiosis excreta, atque in pleuropneumonia, adesse solet. Et denique cinguli inflat supra Lumbos, Ventrem dolor ambit, & Hypochondria tendi se costringi videntur. Facile tales delirant Aegri, quod delirium Paraphrenitidem appellant. Exemplum elegans Diaphragmatis Inflammationis, vid. in PLATERO Obs. l. 1. pag. 187. Respiratio est irregularis, modo parva, modo magna, modo frequens, modo rara: etc. solent etiam nonnumquam accedere convulsiones, & palpitatio interdum videtur Diaphragma: vid. PLATERUS l. 1. p. 170.

Denique in Inflammatione Mediastini paria sunt modo dicta observantur, ut plurimum in anteriore Pectoris regione incallescens, & dolor quidem nonnihil gravatius in de sub sternum percipitur, citra tamen punctum, aut citra insignem aliam molesta, nisi fuit inspirando. Tussis verò quod omnia inflat pleuriticoeum se habet, nempe in principio, postmodum humida, in qua tuba & flava reiciuntur, non tamen adeo copiosa observantur. Pulsus qualis pleuriticoeum.

His Inflammationibus subinde paria ac pleuritidis habet Symptomata; in eo tamen distinguuntur, quod dolor sit in latere dextro & circa dextrum Hypochondrium gravatius, non postiorius, ut dolorosa quidam plus minus sensiva molesta ad jugulum usque ascendere videatur: Pulsus est undosus, non durus; Tussis fida, non adeo frequens; nec tanta respirandi difficultas.

Quia si progrediatur malum, ita ut pleuritidis & omnes Inflammationes haec degenerent in Suppurationem, tunc hanc sententiam quidem monstrat rigore, qui certum est indicium, & qui necessarii omnes internarum partium, praeterit membrarum, Suppurationes comitatur; nec non exacerbatio doloris, Febris, Vigilantia, ac similia Symptomata: saltem verò jam Suppurationem monstrant dolor immensus, Febris remissior, respiratio liberior, & virtus vitalis non adeo debilis. Verum licet confecto pure & Febris & dolor miteant, tamen instante disrptionis tempore vehementius cum Horrore Aegri denovo febescunt, ac difficiliter ferè quam antea respirant.

PROGNOSIS.

Prognosis affectus huiusmodi, uni cum Mediastini ac Diaphragmatis Inflammatione, periculosus admodum pronuntiatur; ita tamen, ut ex his Pleuropneumonia variis quilibet, ceteris paribus, levissima omnium sit Pleuritidis, etiam interdum pulum intermittentem habere videatur, qui in ea minima periculosus est: vid. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 337. p. 319.

Vehementior autem & periculosior est Peripneumonia, neque quod morbi genus juxta CELSUM plus periculi, quam doloris habet.

Adhuc vehementior & periculosior, ceteris paribus, est Diaphragmatis Inflammatio, quae acutissimus morbus est, atque Aegrum cito in summum discrimen deducit, saepe jugulat; & sicuti etiam Mediastini Inflammatio est periculosior pleuritide.

Quod si absque interitu Aegri sinatur haec Pleuropneumonia & haec conjuncti affectus, curatur, Vcl

(1.) Intense diffusiis & Respirationis ipsius Inflammationis; id quod fit nunc Critice, nunc Medice.

(2.) Quando successit per spem ceteris rejectionem solvitur.

(3.) Quando Inflammatio successivè suppuratur, ac in Abscessum vel Empyema abit, quam suppurationem sicut ostendunt dolores, Febris & Vigilantia exacerbatio.

(4.) Si per ratam ac singularem materiam morbificam Metastasis terminantur; v. g. nunc per Peritenditum, nunc in singulares morbos articulares, nunc in abscessum in Sura, nunc in Ulcera Tibiarum.

Si terminantur resolutione vel per sudores, vel Diarrhoeas, vel trina copiosum Fluxum, vel Haemorrhagias, vel alia modis, imprimis est observandus motus Naturae criticae, qui nullo modo impediendus, sed, si possit, potius promovendus: nam in diebus critica Naturae sibi relicta imprimis solennes tales insitit Evacuationes: vid. AMATUS LUSITANUS Centur. 7. Curat. 21., qui refert pleuritidem suam sine Venesectione die 14. per sudorem criticum curatam. Porro PISO Trall. de Colluv. ser. p. 329. in Edition. in quarto observat pleuritidem die 7. per sudorem curatam: VALERIOLA lib. 4. Obs. 4. habet Historem curiosis pleuritidis gravis in gravida 2. mensium, quae solius Naturae quae sine Venesectione die 4. per sudorem fuit curata: & c. l. aliam refert gravidam pleuritidem, quae variis licet aliis adhibitis remedia, tandem die 7. r. & 14. robore Naturae per copiosos sudores fuit curata; item lib. 7. Obs. 6. simile ferè refert exemplum.

Quod attinet Haemorrhagias, v. g. Narium, Haemorrhoidum, aut medium fluxum, Haemorrhagiam septimo die criticam in pleuritide salutarem refert LOTICHIVS lib. 3. cap. 3. Obs. 3. item FORESTUS lib. 16. Obs. 33. & Obs. 37. habet pleuritidem per fluxum sanguinis ex naribus die 14. curatam: sicut pleuritidem in peripneumonia conversam per fluxum medium die Critico sanam item Obs. 36. & 39. refert: Pleuritide miferi exemplum per sanguinam miltum curatae habet FERDINANDUS Cens. 3. & pleuritidis magna in Gravida post Partum ob Uteri eximiationem curatam in FERDINANDO NIP. 13. observatur.

Si interdum superveniant Diarrhoeae Criticae, per quas Pleuropneumonia feliciter solvitur: ipsamet casus superioris anno Mulierem, quae ex Pleuritide sebat in partu, in quam tamen Uterus omnis purulentia per Diarrhoeam criticam feliciter expurgabatur: PANAROLLUS Pans. 1. Obs. 36. observat senem septuagenarium Pleuriticoeum, superveniente Diarrhoea sanatum: Sic Diarrhoea salutaris pleuritidis supervenientibus observatur in AMATO LUSITANO Cent. 7. Cur. 7. ZACUTO LUSITANO lib. 1. Prax. admirand. Obs. 1051. Desperata pleuritide per alvi fluxum curata in VALERIOLA Obs. 4. & 5. lib. 1. Nec obstat Aphor. 16. Sect. 6. HIPPOCRATIS; Diarrhoeam, quando supervenit pleuritidis vel Peripneumoniae, periculosam esse, de qua imprimis videtur CASTRO, Qua ex quibus p. 17. ACTUARIUS cap. 18. l. 5. & PLATERUS Prax. Medic. Tom. 2. p. 14. qui ideo in pleuritide purgantia rejiciunt.

(1.) Cum per alvum materia peccans minime expurgari possit.

(2.) Cum corpus accendat.

(3.) Cum Diarrhoea, quae aliis facile supervenire & nocere solet, promoveatur.

Affert universis haec qd. Regulae cum observationes insinuat contrarium referent; ejus tamen solutio non quaerenda in certa Temporis diversitate, quasi scilicet in principio, non in statu aut declinatione, Diarrhoea fit periculosa, cum juxta AMATUM LUSITANUM & VALERIOLAM l. 1. item ZACUTUM LUSITANUM l. 1. pag. 303. in statu & declinatione potius salutare observetur Diarrhoea, si scilicet signa caustionis praecedant. Nec à Medicis & parvitate morbi differentia petenda, quasi Diarrhoea mitiori pleuritidis seu peripneumoniae supervenientibus bona; vehementiori mala existat; ejusdem quidem VALERIOLAE Exemplum allegare alind videntur, utpote in quibus morbus vehemens & desperatus admodum fuit. In Principio

capio autem pariet ac Incremento Morbi Diarrhoea immo-
detata supervenient, & quidem cum debilitate Aegri, ut-
plurimum est funesta.

Dyspnoea fortassis sunt bonae; lumen enim ingrum ab-
fcessum & evacuationem ponit per inferiora.

Inflammatio Pleuripneumoniae saepius est letalis.
Porro in Pleuripneumonia observandus est specialiter ap-
phtus HIPPOCRATIS 12. *Seftion. 1.* qui est: *In Pleuriti-
de* (quod & valet in reliquis Thoracis Inflammationibus)
si *spitum* in Pleuritide in initio, intra tertium diem scilicet,
apparet cruentum, *breve* Morbum indicat, si vero *seridum,
longum*: Nam Pleuritis, in qua nihil expititur, est pericu-
lissima. Sic quoque Aphor. 1. *Seftion. 5.* dicit: quid Pleuri-
tici sinti *Quartiduum* dies non superat per spitum repurgati,
Empyrii sunt: Qui vero ex Pleuritide *Empyrii* sunt, si in 40.
diebus repurgantur, *si die quoque raptim* scilicet, liberantur, alio-
quin in Latum seu *Thyris* incidunt, uti habet Aphor. 15. *Seft. 5.*
Nempe pleuritide plerumque die decimoquarto termina-
tur, aut saltem 20. dum nempe suppuratur; & quidem si
Aeger quarto die expuat spitum album, leve ac aequale,
eius tertio vel quarto succedens, in septimo terminabitur.
Si in septimo tale spitum primario apparcat, concurrenti-
bus aliis signis bonis, Morbus ultra 14. dies non exten-
ditur.

Spitum autem nullum aut iterum suppurem, dolore &
gravitate pectoris superfluo, paucum, tenue, crudum, bi-
lucum aut cruentum valet, (utrumque scilicet unum) item
glutinosum valde, serugiosum ac nigrum, malum; item
si cum spito copiosius Dyspnoea aut dolor non rem-
ittant.

*Non tamen semper spiti paucitas & supposita malum signum
esset*, cum saepius per alias vias Natura Materiam peccan-
tem criticè deturbet, scilicet per Haemorrhagias, Diarrhoeas,
per sudorem: vid. VALERIOLA C. 4. *Off. 1.* R. HODIUS
C. 2. *Offic. 14.* per Urinam vid. SCHENCKIUS
Off. 1. 2. p. 243. & 352. item HORSTIUS l. 3. *Offic. 10.*
R. HODIUS l. 2. *Offic. 6.* BORELLUS C. 1. *Offic. 17.*
l. 2. ubi in p. a. convertit materia per Urinam & alium ex-
creta sunt.

Paria quoque de *Pleuripneumonia* dicenda sunt: Ea in gene-
re est malum acutum, frequentissime periculofum, non ra-
re letale.

In specie *pleuritidis* magisquam *Urina* in morbis his ut-
plurimum habenda est ratio. Ut enim *urina* sint optima-
e & satis coctae, si tamen spura sunt mala, periculum por-
tendunt & contrahunt; ac Urinae in principio laudabiles,
sanguinis recrementa cuncta in locum afflicti deposita esse,
testantur: contra, etiam si urinae sine malis, spura ve-
ro bona seu coctae, melius; indicat enim, quod Natura cel-
teris expellit malum, & tales paulatim per solutionem hanc
evasuras esse. Nam in his morbis ea spura conditio signa
quam ea Urinis fuitur: siquidem spuri conditio signa
propria Coctionis hujus Morbi suggerit, unde per hujus
conditione magis pars Prognosis influenda est.

Nihilominus *urina* in principio crassa computens, si citi-
us quartum non turbetur, sed attenuetur, letale est. (V)

Pleuripneumonia in pleuritidem transmutatur, bonum est;
convertitur enim materia peccans ab interioribus ad exte-
riora, quoniam hoc raritas enorgat: Pleuritis autem peri-
pneumoniae combesta hujus periculum intendit.

Pariter Peripneumonia Pleuritidis & Anginis superveniens
vel per utriusque immutationem contingens, mala, & intra
septem dies moritur; si non effugiat, Purulentum eva-
dunt: vid. HIPPOCRATES *Seft. 7. Aphor. 11. & Seft. 5.
Aph. 10.* nisi spitum maturè satis coctum, copiose & facili-
ter excernatur, cujus Phænomenon rationem WILLIS l. 2.
Pleur. Ration. P. 2. *Seft. 1. c. 9.* explicat. Sicuti contra quoniam
mire subinde per Peripneumoniae Metallales pluriquam fun-
dit, vid. in WILLISIO l. 2. 177.

Peripneumoniae si non resolvuntur, *suppurantur*; & quae
suppuratio fit, si dolores exacerbantur, Vigiliæ continuantur;
hoc enim signum est tendere eam ad suppuracionem, juxta
ipsum HIPPOCRATIS *Aphorismum* inquitur: *Cum Pa-
si, Malum magis est, felle autem Pura omnia Symptomata re-
mittunt, & quieti redduntur, Respiratio fit liberior, Vir-
tusque vitalis emergit.* Quando verò Abfcessus rumpi in-
cipit, insigniter Rigor cum intensissima exacerbatione feb-
ris pressio est, ut & difficillior Respiratio.

Vimus copiosius & biliosius in principio pleuritidis & pe-
ripneumoniae apparet, saltem praesentiat; in progressu
verò admodum periculofum est.

Pleuritici dolore levati, & tamen *Fusis* tristi *Oculis*
perturbatis, signum est materiam per Pleurefios Metallaleam
in Cerebrum, casuque, utplurimum letalis est; indicat
enim Phrenitidem, seu Inflammacionem Membrarum
Cerebri.

Porro Pleuritide in principio leviter apparet, & usque ad
quintum diem sic procedens, leato verò exacerbata, utplu-
rimum est letalis, interdum verò difficilis saluatio.

Item pleuritici subinde delirant. Delirium hoc, quando
fortem sequitur pleuritidem, res est non sine periculo, in
miorem ac leviorē pleuritidem cum tristi Facie Ocu-
licque perturbatis, tuoc periculum subest utplurimum aut
Malignitatis latentis, aut Metallaeorū pleuritidis in caput.

Alia Prognosis pleuritidis & Peripneumoniae de summa
etiam a symptomatum gravitate majore & minore, vel & in
vitiis: Ratione illorum Febrii moe summe acuta, Siccitas
Agrypnia, Delirium, Convulsiones, Hemiplegia, Respi-
ratio valde anhelosa, Orthopnea, Vomitus, Tussis ma-
gnae, & sicca, dolor ingens cum dolore circa Caput & Co-
stas, aut universalis Irigido, periculum summum porren-
dunt; & contra Symptomata pauciora ac mitiora, neque
Coryza ac Serenitas in his Morbis suspicione causae, quae-
tens Membranas Cerebri in consensum trahi iuvant. Ra-
tione haram, quatenus saepe his Symptomata recessum
satis horrendis, si pulsus adhuc firmit, & spiritum vigeat
adit, melior & agrotantium spes est, quoniamque huius-
modi ac paucioribus symptomatibus Pulvis debilis ac Viri
oppressi fuerint; per primis illius parvitas frequentia, &
durities nimia accedat, utpote cum quo nullum evasit
GALENIUS testatur. In magnis tamen doloribus cum Fe-
bre addece jussis, si pulsus fuerit parvus, neminem ter-
reat: conf. BAR. HOLINUS c. 5. *Off. 37.*

Pulsi pleuritidis & peripneumoniae suppuratam & ma-
lè curatam, sequitur phthisis phlogosialis.

Qui semel pleuritide fuerunt correpti, illi levi occasio-
ne eam experiantur.

Cetera ad *Dyspnoea* & *Prospnoea* pertinentia videbunt in
SENNERTO *de lae*, vel in *epi Epistomae* RIVE-
RIO, qui eadem latius prolite tractant.

CU.

(V) Quam non rari Pleuritidis etiam suppurata materia per Urinam vias educta sit, ex suis Medicorum sententia ne posuerit,
illam intra Venas iterum resuscitavit ad cordis atriumque Ventriculorum deorsum, ac praeinde per Arterias Emulgentes ad Renes de-
scendit, in istem simul cum Urina fecerit. Verum nonnulli Anatomici animadvertentes maximam communem, quae intercedit
inter Venas Arterias & Emulgentes, patenter hanc esse viam, per quam immixtum materia Pleuritidem facitum ad Urinam urge-
na demandaretur. Id quidem valet contradiere generalibus regulis circulationis Sanguinis, quibus constat, sanguinem, reliquum
que bonorum cum Sanguine communem, per Arterias ferri & Cordis ad partes, per Venas vero revochi & partibus ad Cor. Vnde
quoniam nobis huiusmodi innotebat, ad legem hanc eadem sit & immutabilis in Arterias & Venas interna, ac in Arterias & Venas
externis: quomodo sapè videmus in flum corporis patenter male Naturam aliquam ratione aberrare, & nos per liquorum
muta sui molis vias; hanc praesens & ratione alienum exaltissime patenter hanc materia Pleuritidem fecerit, per Venas
Arterias ad Emulgentes, & Renes transire.

Notat autem dignum est, quod ait Riolanus Anthropogr. lib. 3. cap. 2. qui primus post Anatum tres Valvulas in Venis
Arterias, detexit: harum prima est in arteria Venae, dea alia dicitur opposita & alternatim disposita medio caudis sui affixa.
Ei autem mox illa dicitur esse subditi, ut scilicet irreverit affixum, ob quodam Respiratorum motum, sanguinem in hanc Venam
admittit, alioquin ratione differretur, ut cum motum Sanguinis irreverit Pleuritidem inferret. Imi subditi, in Corporibus Pleuritidis ob-
mactis, antea tamen se in Venis Arterias Valvulam deprehendisse. Verum si verum est, sanguinem per Arterias in partes co-
quendi, revochi per Venas, verum quoque erit quid motus Valvulae, qui ceteris Sanguis revochat, ob motum est Inflammationis
vis motum: qui autem negat ceteris moveri per Venas Sanguinem si desit Valvula, quoniam si affixus Valvulae cum obice
sunt & repugnans confluentia Sanguinis. Obice igitur ex Valvula erant Pleuritidis & reliquis Inflammationibus, qui San-
guinem facile excreverunt habent, quippe fortasse Arteriae Venae expletae fortis sunt, ne plus ille adducere quoniam huius red-
dere valent; non vero ti, qui ex Rioloano amicum in Venis Arterias, Valvulam obtinent.

Omnes hule cognati morbi simili modo tractantur, quoniam Cura tribus gaudet Indicationibus. Nempè

I. Sanguis stagnans est resoluendus, & blandis fuderis, tam generalibus quam specificis, Acidum corrigentibus, in naturali ium crasso revocandus.

II. Hoc si fieri nequit, Excitant, & copiosa Spontanea, quantum possibile, est promovenda, in principio quidem Temperantium seu locustantium moderatum opo, in progressu vero per Incidentia: siuicida huc variè, prout ipsi condito, & Expectorationis ratio requirerit.

III. Siu & hæc sint frustra, Suppuratio Inflammationis expectanda, ac adjuvando per Pectoralia temperata, Anodynis mista, & Pus contextum educendum.

Pro his icois melius obtinendis observandum pro

CURA PLEURITIDIS VERÆ.

I. Sæpius in primo Morbi insultu esse institueudam Venæsectionem, camque aliquoties interdum esse repetendam, prout necessitas & conditio affectus requiserit, Interim tamen notandum, cam semper simpliciter necessariam non esse, quia potius tunc temporis appropriata remedia, ac in specie Diaphoretica Dissolventia, quæ sanguinis Grumos relinunt & sudorem movent, eltra Venæsectionem non raro Malum tollunt: vid. HELMONTIUS Tract. Pleur. Foræ, quæ est egregia, HOLT ERHOFF de Errorib. Med. t. 2. §. 2. Quoniam hoc certum est, quod si sine sudore per Venæsectionem Pleuritidis careat, nihilocius ad Suppurationem tendat, quæ tamen pot sudorifera pollet præcaveri. Ac si hæc per se nullum locum obtingit Venæsectionis, saltem ubi copiosior affluat sanguis, & nimis aentis seu præcepto Morbi ad statum motus, in tali casu per accidens interdum instituta, & repetita Venæsectione aliqualis levamen affert: sic LINDANUS necessitate coactus Mulieri Gravida intra 24. horas quinque Venam secavit, argenteo nempè affectu. Propterea de Tempore non multum deliberandum venit, siue vespere siue mane siue medio noctis fuerit; dum necessaria est (quod cambus in nostro Climate rarior evenit) institueuda est. Pluribus hanc de Venæsectionis in Pleuritide esse controversiam ventilatam, vid. ab HOECHSTEDTERO deced. 7. pag. 107. & M. A. N. G. ann. 2. & 10. observ. 190.

Ubi ergo secunda est Vena, observanda erit Differentia Pleuritidis Ascendentis, & Descendentis. Nam eadem pro usu Revulsivæ instituitur in pede, si est Pleuritidis ascendens; aut in Brachio, si est Pleuritidis descendens. Ascensivæ vero seu revulsivæ particularis sanguinis gratia fecerit in pede Vena, & quid metuis, oppositi lateris, si est descendens in Brachio vero pro averfione, si est ascendens, &c. Quibus pauca prolata: illæ Controrivæ de loco Venæsectionis, quas egrotantes Veteres indigni fervore, decidi possunt: Conf. WILLIUS Pleur. Ration. part. 2. p. 204. Præstat autem ut Venæsectio fiat aliquot vicibus, nec longis intervallis, neque magna quantitate, ut loquitur rectè HILDANUS. In Peripneumonia Cura Venæsectione nec Revulsoria, nec averfiva, nec Derivatoria locum habet: Quod igitur à Corde recipit, & denique iterum remittit, Interim sæpius ferè in ultimis Pleuritidis Benigna absque Venæsectione curari preest, per Diaphoretica, Volatilia præsertim & specifica. Jam vero licet in Pleuritide Benigna Venæsectio, si non parat, non necesse; in Maligna tamen esse letum trahens, sed semper esse necesse, in qua nunquam sine periculo Vena aperitur; ergo ab illa abstinendum. Refert BARTHOLEUS l. 2. si diu disturni Prævi esse comperit, omnes ferè, quibus in Pleuritide Maligna Vena tunditur, mori, eorum periculo defungi, qui sine Phlebotomia sine curati: Videtur etiam GESNERUS l. 1. Epist. p. 19. qui similiter asserit, Venæsectionem esse inutilem in Maligna Epidemica: Videtur etiam Observationes. Quod si in Pleuritide Maligna eras arbitror, ut in Epidemica non adeo semper locum inveniat: DODONÆUS enim observ. cap. 21. p. 38. refert, in Pleuritide Epidemica administratam Venæsectionem salutare; negleam vero lethalem.

II. Observatur: in Pleuritide aut in Peripneumonia Purgationes omnes esse frustaneas, subiendo nocivas; disponunt enim ad Diarrhoeas causticas, in specie, ubi spiritum copiosius replem retrocedit, adeoque cavemus nobis à Purgantibus, ne motum Naturæ impediamus. Purgatio ergo in Pleuritide non convenit, quia sanguinem exagitat, & in Partem affectam altius impingit, nisi ad destinationem Ma-

lum pervenit. Et si interdum conveniat purgatio, ut plurimum tamen ante dum septimum periculis est: Videtur RIVIERUS cons. 2. observ. 98. Imprimis vero procedente spū abstinendum à purgatione, per Experimentum confirmante hoc SACOT LUSITANO l. 1. p. 100. admod. observ. 107. & 116. quidquid enim in contrarium dicitur quidam præfici, in specie RULANDUS in Thesoro præficus p. 129. ubi defendit acriter, quammaximè evitandum esse in principio Pleuritidis sortem Purgationem, & Exemplum refert picro, tumque per Vomitus & siccum est Aqua Rosellina alicuraturum. Quidam cum RULANDUS Vomitoria valde laudant: Verum de Vomitoriis vid. Iudicium datum suprà art. 1. in Angina. Sanè per se nil valet in Pleuritide, potius nocet, adeoque ab his est abstinendum, cum humores ad pectus magis commoveant, per accidens vero, ubi fomes & vitiosa excrementa, in specie acidum, & aeruginosum in primis vis & lutescentia flagnaverit: In tali casu primo in principio (ad quod nihilominus Medicus raro vocatur) prodest Vomitus; Deinde etiam in morbi declinatione, facta suppuratione, vel ad abscessum pampendum, vel hoc raper ad ulteriorem Periculi evacuationem Vomitus aliquando committere potest: Bene hic disertè LINDANUS, dum dicit; sic in Cura Peripneumonia non audeo Vomitorium dare. Nec video, quid possit nisi statuat Ventriculus omnibus aeruginosis Graditate, à qua sanguis vitiax impetum faciat in pulmonem, sed in tali casu non respicerem ad Purgationem, sed ejus radicem, nempe Ventriculæ malum. Ita nec in progressu Vomitoria conveniunt; nil enim pulmonibus nocuatur est: Si enim tempore purgantur, Diarrhoea accidit, cum Alvis per se mollis sit; illa autem accedente spiritum non coquitur, nec pus maturatur, & pereunt ægri. Interim Clysteres, ubi Alvi obstructio, magno cum fructu injici possunt.

III. Observatur, ex omnibus Remediis generibus, quæ huic morbo misere opitalantur, nil melius esse, quam Enderica & Diaphoretica, in specie Anti-pleuritidis junda. Exomobas enim Auxilia in Pleuritide primarium est sedor, qui ex toto Corpore, & imprimis circa Thoracem, provocandus, & sic citò & secundo omnes Thoracis Inflammationes curari possunt: ut quid omnes elegantiores præficus ferunt, vid. BARNIUS & SCHNEIDERUS citatis locis; item PETRUS JOHANNES FABER Cap. 8. 10. & 20. qui plurima Pleuritidis curavit per sudorem, cum Antiemica Diaphoretica propinata, præmisso Clystere, interdum etiam Venæsectione, applicando exteriè Balsamum Sulphuris cum Emplastro Diaphoretico Rosolida. Confirmat hoc pariter HILDANUS c. 1. Cap. 53. item RENEALMUS in observ. 22. qui pleuritidis aliquot sedâ Vena Flava Animæ diaphoreticis exhibuit, & statim præcedente sudore omnes Dolores punctionis abiecit. De Antiemica Diaphoretici usu vid. etiam M. A. N. G. ann. 3. observ. 72. Et si in ipse Natura vel viam monstrat, toties per sudores spontaneos pectoris curans ejusmodi Inflammationes, Imprimis in principio adhibeatur cum specificis aliis Volatilibus, in statum vero fixiora; vid. LUDOVICI ph. p. 237. Singularia enim Encheireta est Pleuritidis mediæ mori in principio Alibus volatilibus, & Opiatis, Aëris quantumvis maximo stil obstante.

V. Multo quidem in principio Morbi, id est, quando Natura ad spiritum nondum inclinat, præficus præficus plures Expectorationes, ica talia, quæ succedunt materię expectorationem & spiritum movent. Nam talia cum Tussim stimulant vel adjuvant, non solum materiam crudam emittendam sollicitant, quod tamen frustra fit, sed & evacuationem Thoracis, Pulmonum, ac Pleuræ interant, quibus in principio dolor intenditur, & mala hæc exasperantur, ut rectè observavit GABELCHOVERUS c. 1. Cap. 93. libet mihi cauti, ne Expectationibus nimis maturè usurpatis exasperetur Morbus, & intendatur Inflammatio, ac prout saltem in Incremento ac florē Expectatoria disolvuntur usurpant. Et hæc inter remedia, quæ spū Calidum aut Suppurationem Inflammationis faciunt, malum, dicit LINDANUS, Decilla pectoralis, quoniam Symplicia & Saccharata. Nihilominus pectoralis habemus in Liquiritia & in passillis. Saccharum mali pectoralis additur; nam constat, omnia dulcia, & Mellita facile aspersa in Ventriculo, cui nil nocuit, quod illud sivevis Acidum. Præficus autem Radices & Herbe pectorales, sed omittantur semper ipsa dulcia, nec credatur, gaudere pectus dulcibus; gaudet equidem dissidis, & quæ non habent qualitatem succedentem, res dulcissimas, ut Saccharum. Liquiritia igitur convenit, quæ tamen in paucis quantitatibus sumenda, cavendo ne urinat; tunc enim prava, & æris fit.

V. *Opus* non negligendum sunt in Cura harum Inflammationum, sed *asserpere* saltem ab *principio* & *Incremento*, saltem ad *luscandam* nimium Morbi vim, & *luscenda* pathos dolorosa, qua ipsa quoque ad *curtendum* materiam expandent *cruditatem*, adeoque eandem coquendam seu *incassandam* multum *præstare* solet: vid. W EDELIIUS *opul. p. 122. & 123. In fura* verò & *declinatione* vitanda sunt ne *impediatur Expellens*, atque materia cocta nimis *perniciet* sit *inhæreat*, id quod sine *asserpatione* periculum vix fieri potest: qualem observationem ZACUTUS LUSITANUS l. 2. pr. *admir. observ. n. 125.* testatur. Solum *Papaver rhæas* cuique *Flori* seu *apertum* *specificum* in toto Morbi decursu locum habet.

VI. Bene observandum est, ut omnia, *quæcumque Mri* *hinc*, *calidi* *asserpant*. Nil nocentius est in his affectibus, & quod magis *exaspere* eodem *facit*, quam *frigidas potus*, qui coctionem impedit, Excretionem remoratur, Tussim provocat, Inflammationem intendit & luscendo pulmones respirationem difficiliorum facit, que omnia in *culda* *pau* contrario modo se habent. Est autem potus optimus *decantum* *herbari* & *Liquiritia*, idque in toto morbi decursu: item *decantum* *papaveris rhæas* cum *Syrupo Scabiosa* aut *Mulano* aut *Cappisano* *visceri*. In contagiosa seu maligna *decantum* *Rafay* *Cervi* *crudi*, vel cum *vel* *floris* *Papaveris*, aut etiam cum *Serpapavillo*, optimum est *potulentum*. Potui ordinario addatur Gelatina *Devis* *Apri*, & *Tindura* *Florum* *Papaveris* *eratici*, cum *Sern* *Lactis* *parata*, Julepis: hinc pro potu ordinario, imprimis si *Febris* *ardens* *conjuncta*, interserviat Julepi, quos dedi in *Coll. Formular.*

Vel

36. *Flor. papav. erras. Mj.*
Violar. M. 8.

Infunde in *q. d. spiritus Nitri* *dolub.*
Infunde in *q. d. decant. priap. vel Cervi* *Cervi*;
Stent in loco calido horis aliquot.
Colat. *Wij.* adde

Syr. Flor. papav. erras.
Violar.

Stachys. an. 8j.
M. S.

Julepis Refrigeras, & Dissolvens.

Premissa igitur vel omisi Venæsectione progrediendum statim est ad *speciem Pleuritidis*, languorem flagrantem dissolventia, sudorem prolificentia, Inflammationeque erysipelacea silentia; circa que notandum, quod eadem sint, quæ in *dyssenteria* & *angina* alias locum habent, uti rectè loquitur, & experientia comprobavit HELMONTIUS: Deinde, quod omnia ea *specifica*, que conveniunt in *Pleuritide*, etiam convenientissimè in aliis quibusvis internarum partium Inflammationibus à causa interna emanatis, ut facium, stomachi, intestinorum &c. profit, cum omnes ejusdem sine naturæ læpilis erysipelaceæ. *Appropriata* talia remedia in Pleuritide ex Regno Vegetabili sunt papaver erraticum, Flores Acaciar nostratis, Bellidis rubræ, Rosarum rulturæ, Chamomillæ, Carduus benedictus, Cardus Maris, Papaver album, Taraxacum, Scabiola, Pimpinella, Ulmaria, Hedera terrestris, Chæretisum, Radix Bardanæ, Eryngii, Semen Cardui benedicti, Cardui Maris, Papaveris albi. Aquæ destillatæ sibiurum simplicium, in specie *Aquæ Florum* *Acacie*, *Aquæ florum* *papav. rhæas*, & *Aquæ florum* *Chamomillæ*, *lyssip.* & similes: singulariæ per ceteros omnibus hæc tria, *papaver rhæas*, *Carduus benedictus*, & *Maris*, quocumque modo uljurata, nunc simpliciter, nunc reperta vice, expectando sudorem, sunt optima, etque his parata ut *Aqua*, *Syrupi*, *Tindura*, *Pulvis* *Florum*, *succus* & *Conferia* horum: sunt convenientissima. Utium hujus decantatum habet VALERIOLA lib. 5. *observ. 5. & 10.* Item ex Sem. Cardui ben. & Maris sunt Emulsiones cum aliis, que in Cura Pleuritidis sunt elegantissimæ: v. g. præscribitur Emulsion, quas dedi in *Coll. formular.*

37. *Sem. Card. ben.*
Mar. an. 3ij.

Papav. albi (ratione doloris) 3j.
Cum *q. q. aquæ Chæretis. Card. bened. & Flor. papav. erras.* l. Emulsiō
adde

Dent. apri *prepar.* vel *maxill.* *Lutii* *pfe.* 3j.
ant an 3j. ad 38.

Antimoni diaphor. 3j.

M. edulcorat. parum.

D. S.

Emulsiō Confortans contra Pleuritidem.

Subinde bauriatur expectando sudorem: imhi expertissima est in desperatis catibus. Vel

38. *Sem. Card. ben.*

Maris an. 3ij.
Cum *q. q. aquæ Chæretis.* vel *Card. bened.*
F. Emulsiō adde

Lap. Caner. prep. vel *maxill.* *Lut. pfe.* 3j.
Antimoni diaphor. 3j.

Edulc. cum *Syrup. papav. simpl.* D. S.

Emulsiō Leniens contra Pleuritidem.

Item.

39. *Aquæ nimar.* vel *Chæretis* 3ij.
Encas. mineral. gr. xij. vel *xvj.*
Syr. flor. papav. erras. 38. ad 3j.
M. D. S.

Potus contra Pleuritidem.

Subtilissimus adhuc in Materia Medica, Pleuritidi curandæ dicata, & præter Papaver rhæas, Carduum benedictum & Maris; etiam prodest Chæretisolum, ejusque Aquæ destillata, utpotè alias lazis decantatum ad sanguinis Grumos quocumque retinendos. A multis laudatur Radix Bardanæ, Sarcut Scabiolæ, & præ cæteris succus Taraxaci seu Dentis Leonis, item succus Pimpinellæ seu Sanguiniræ. Quod *animum Taraxaci*, cum hoc egeret & expertam præscribit *misturam BARBETTE* in *san. praxi* l. 3. cap. 2. Compositio hæc est:

40. *Succ. Tarax. depur. 3j.*
Aquæ Plantag.

Reas. an. 3ij.
Propolis. 38.

Ocul. Caner. crudent. 38.
Syr. papav. erras. 38.

Misc. in phiala.

Loco Aquæ Prophylactica: sumi potest Acetum destillatum. Hac mixtura sola Mulierem periculosa Pleuritide laborantem liberavit, Cochlearia aliquæ hauriendo singula horæ quadrantebus.

Ad hujus imitacionem concinnior erit sequens Formula:

41. *Aquæ Card. ben.*
Chæretis. an. 38.

Theriac. 3vj.

Succ. Tarax. depur. 3j. ad 38.

Lap. Caner. prep. 38.

Syr. papav. erras. 38.

M. D. S.

Potio Dissolvens contra Pleuritidem.

Mixturam Aquæ Ager quovis quadrante horæ, 2. cochlearia, operationem ejus mirabilimè.

Potio succum Taraxaci est imprimis decoctum Eryngii.

Quod ad radicem verò Bardanæ, CASTRO *perparat* Quam summam copiam grumosi sanguinis, per spumam intra biduum revelli, atque Venæsectione curavit Pleuritidem, primo *arteriæ* applicando, & singulo biborio *reparando* Linthea duplicata cum *Spermate Anarum* non destillato, sed per se servato, applicando, & ita per biduum continuando, hoc enim est singularissimum Remedium ad quoscunque Inflammationes compellendas, si applicetur. Secundo *arteriæ* Radice Bardanæ seu Lappæ majoris Vere collectæ crecente Luna, Autumno vero decrecente Luna.

Servantur Radices, se in umbroso loco siccatæ & pulverizantur dantur dosi Cochlearis 3. in vitro quadrante Vini, vel decoctum Bardanæ ritè paratum cum appropriatâ sudorificum Pleuropneumonicis convenit.

Perinet hæc ratione salis volatilis Ligonum, *Pulvis farinæ*, utrumque est nobile specificum Pleuriticum D. HORSTII *Junioris*, dum *Farinam* bene tritam lavat *finem* cum *Aquâ Florum* *Lambæ*, exsiccet, & ita pulverisat; hujus Pulveris ita preparati dosi 38. ad 3j. in *Aquâ* *Camellæ* vel *de* *papaveris rhæas*, vel *Aquâ* *specifica* *quidam*, propinat expectando sudorem: Sic Pleuritidem *ipsum* *pulvere* *Farinæ* *camini* ad 38. in *Aquâ* *Cardi* *bened.* *dis* *sepius* curatum habet RIVERIUS *Centur. 2. observ. 77.* Laudantur quoque *Flori* *Ruxi* 2. de quibus vide RIVERIUS *pr. l. 3. cap. 2. spiritus Tartari, Pulvis*, &c.

Uterius quoque *Pripi* *Ceti*, *Cervi* & *Tamari* cum *lingularis* Remedia à quibusdam ad Pleuritidem commendantur, quorum rationem vel pulverisatorum, præ reliquis *tamari* *Ceti*, ad 38. in *Aquâ* *specifica* *assumitur*, ant ex us paratum *decantum*, seu corpus *Juleporum*, cum aliis permiscetur & optime propinat. Hinc & BARTHOLETUS in Peripneumonia & Pleuritide Maligna *Rafayum* *Pripi* *Tamari* commendat; cui tamen revera Ceti & Cervinus præferendus.

rendas, aut alia Alexipharmaca ordinari possunt.

Conveniunt ulterius partes Animalium dæmæ, *Salicæ volatilis* turgide, Acidum sanguinis subnecens, præsertim in principio, & multo magis exinde parata *Salia volatilia* & *Spiritus arsiæ*, mediante sudore subtilissima Remedia, quæ sunt *Lapilli Cancrorum*, Dens *Apri*, Caloris, Maxillæ *Lucii piscis*, aut quilibet *Offa Lucii piscis*, *Lap. Carpinum*, *Percarum*, Tali *Leporis*, *Corallia rubra*, hincque alia genera *Marina*, ut & *Coru Cervi* & *Ebur*. Ex quibus speciatim *Dens Apri* & *Offa Lucii piscis*, *Lap. Carpinum*, & *Percarum*, aut cætera *Marina* primas tenent, utpote quæ per se à di. ad dr.ß. vel ju. præterpropterea in convenienti Vehiculo insigniter commendatur ad pleuritidem. Commode etiam propinquantur in Emulsionibus: & in specie sal volatile Maxillarum *Lucii piscis* primatum ducit, tam in Maligna, quam Benigna Pleuritide. Loco hujus Salis volatilis tamen etiam *Salia volatilia* alia substitui possunt, uti & *Pulveres Antipleuritici* compositi *Augustinæ*, *Myrsinæ*, *Ladovici*, *Weddellii*, *Trag.* Antipleuritici *HARTMANNI* in *Praxi Chym.* Porro in *Sanguine Niri* legitime præparato expertissimum Remedium est contra Pleuropneumonia, ad dr.ß. propinatum in Aqua appropriata. Methodum parandi hunc legitimam beneficio abscissionis Testium ex *Mirco*, videb. decriptam apud *HELMONT.* Tr. *Sextuplex* Dlg. §. 75. & hinc à *ZWELFFERO*: quod si ab ejus usu non statim sequatur sensibile levamen, repetatur aliquoties, idque faciendum mox in Principio, antequam facta sit Suppuratio; facta enim Suppuratione frustra adhibetur Remedium. De hoc Sanguine, ut & *Dense Apri*, vid. *TACCHENUS* *Merb. Princ.* p. 126. Partes virtutes habet *Sanguis leporis* rite collectus, si nempo Legus, à Canibus in vocatione captus, virus stranguituler laqueo, ut sanguis in unum conflatur & grumescat, aperitur postmodum, & sanguis in fumo secatur. Dosis est à dr.ß. ad dr.ß. Vid. quæ dixi de *Dysenteria Soli.* p. Cap. 3. *Artic.* Hæc quoque pertinet *Bezoar German.* seu *Ægagropile* (X). Hic adnumeranda *Stercora Animalium* Sudorifica & Antipleuritica vi pollentia quæ hic non sunt negligenda, quoniam mirè conveniunt in Cura Pleuropneumonia. Præ cæteris expertum est præsertim apud Anglos, *Stercor Equinum* masculinum, si scilicet Pila una Stercoris hujus recens excreti haustili potus ordinari infusa, aut cum Vino, vel aqua papaveris erratici macerata & subada, probè exprimitur, & succus illi expressus propinetur mox in principio, & quotiescunque id molis, expectando sudorem, & quotiescunque fuerit repetendum. Conferatur *WILLIUS Phlegm. Ratior.* Part. 2. p. 121. & 209. de *HAMEL de Affl. Corp.* pag. 310. & *HELMONT de Pæriosis*. Hinc non credit *Adam Crænum*, & *Paulus Stercoris Columbinæ*, à dr.ß. ad dr.ß. in Liquore conveniente propinquant, quem Pulverem Secretum Magnatum ad euzardam Pleuriam *PANAROLLUS* *Cræz.* 4. *Observ.* 26. Affirmat: Aut maceretur hoc Stercus cum Aqua Papaveris erratici, & hinc facta expressione propinetur. Ab aliis admodum extollitur *Stercor Ovinum*, nempe recipiunt Stercoris ovilli Pilas, subigant in Mortario cum Aqua Papaveris erratici, vel Cardui benedicti fen scabiosæ, & excoibent statim in initio: quod facit *LINDANUS*, & vocat mobile Medicamentum: Nam, dicit, præstat id è *Sal nitrosum volatile quasi ammoniacale*; *Habent enim Stercora epifam Sal ammoniacum*. Porro multum convenit quoque *Sperma Cervi* à dr.ß. ad dr.ß. in Vehiculo calido assumptum; Nam hoc ad Sanguinis Grumos dissolvendos conducere in profecto est; hinc etiam usu *Sperma Cervi* cum *Cassia* misli curativè Pleuritidem ex suppressione Menium natam *TIMÆUS* *non Galienus in cas.*, imprimis si ex Tereore subito mens fluentes supprimentur, & ita Pleuritis oritur.

Denique quoad Regum Mineralia: excellit imprimis *Spiritus Niri dulcis*, seu potius *Spiritus antipleuriticus*, imprimis ubi urget *Æstus febrilis*; magis tamen sic convenit, dum nempe *Spiritus Vini* digeritur & cohobatur aliquoties à Speciebus Antipleuriticis, postmodum hic *Spiritus subtiliori Vegetabilium* substantia imprægnatus, loco spiritus Vini simplicis miscetur cum parte dimidia spiritus Nitri invicem, digeritur, & cohobando destillatur; egregium dat spiritum Antipleuriticum, cujus dosis dr.ß. ad dr.ß. in Aqua cardui benedicti, vel alia appropriata; expertum est Remedium.

Tom. II.

dium in Pleuripneumonia; sudorem movet, Inflammationes solvit, & simul expectorationem promovet, Febresque sistit, qui aliis in omnibus Inflammationibus internis fatus commendatur. Loco hujus paratur à quibsdam non inconcinne *Tinctura Resacardica*, recipiendo loco *Spiritus Niri* *Spiritus Niri*, & ita ulterius lege Artis procedendo: nobile est Remedium ad di. in Aqua appropriata, has Inflammationes fudore mediante levans.

Hic adnumeratur *Mixtura simplex*, *salubris*, ejusque *floræ*, qui optimè pariter conducit, & non ultimum Remedium dant in Pleuritide à di. ad di. vel solum, vel cum aliis: conf. *WEDELLIUS* loco citato. Hinc quoque *Pulvis Pyris* egregium Remedium est contra Pleuritidem, ad di. repetiti, vicibus propinatus, tam Nitri, quam sulphuris ratione. Pertinent hæc quilibet *Sulphures Antimonialis* seu fudorifica, & hinc etiam *Cinnabaris Antimonii*, *Antimonium Diaphoreticum*, *Resacardicum Minerale*, *Martiale*, *Resacardicum Solare*, *Antimonium solari irradiatione calcinatum*; sub qua calcinatione & pondus augetur Antimonii, & singularissimum vim alexipharmacam acquirit: Sub qua operatione multum est reconditum. Pertinent hæc *Pulvis Antipleuriticus BARTHOLETII*, quibus nullum præstantius Remedium inveniri aliterit *L. 3. de Dyphn.* c. 3. p. 457. Compositio est hæc:

℞. Extr. Flor. papav. rhod.
Mel. ark. rubr.
℞içi quor. an. dr.ß.
℞. Dentis apri.
Cera. Rhinæ. an. dr.ß.
Maxill. Lucii piscis. dr.ß.
Cor. interm. avell. dr.ß.
Ard. Mineralis. vel Nitri ammoniacalis. dr.ß.
Mag. carall. dr.ß.

Cum Tinctura seu *sauc dentis scabiosæ* f. *Pasta*.
Dosis di. cum Aqua Flor. Papav. erras, vel etiam cum *al. amygd. dulc. unciß.*

Quod ad Formulas huic scopo applicandas, præter Emulsiones & Mixturas supra dictas:

℞. Aqua Chærefel.
Card. ben. an. diß.
Maxill. Lucii piscis. vel Lap. canor. prop. vel
Antimonii diaphor. dr.ß.
Sal. vol. Maxill. Luc. piscis. gr. xvi.
Laud. Opia. gr. ii.
Syr. scabiosæ. unc.ß.
M. D. S.

Mixtura Discutiens coactilem sumpea.
Vel

℞. Aqua Chærefel. vel Papav. erras.
Pi. Sambæ. an. unc.ß.
Maxill. Luc. piscis. dr.ß.
Sal. vol. carand. vel Ceruæ Cervi gr. xii. ad xv.
Laud. Opia. gr. ii.
Syr. Flor. papav. erras. vel alius approp. dr.ß.
ad unc.

M. pro tribus doibus, sat caput coactilem semper benè agitando; D. S.

Mixtura Diffolvens.
Vel

℞. Aqua Papav. erras.
Scabiosæ. an. unc. l.
Antimonii Diaph. di.
Sal. vol. Maxill. Luc. piscis. gr. xlii.
Laud. Opia. gr. ii.
Syr. Papav. erras. unc.ß.
M. D. S.

Mixtura Discutiens pro usa vice,
Vel

℞. Aqua flor. Acæ.
Card. Mar.
Chærefel. an. unc.ß.
Pulv. Antipleur. Ang. di.
Antimonii Diaph. diß.
Laud. opia. formos. gr. l. ad iiß.
Syr. Papav. erras. dr.ß.
M. D. S. ut antel.

Xxx

Vel

(X) *Ægagropila* ab *Ægagros*, *Rupicapra*, (*ωῦ ἀγρὶ enim est Capra & ἀγρὶ agrestis*) & *pila*: est enim *pila*, vel *globus ex sterculis laniæ confectus*, in *Ventriculo primo* vel *secundo Ruminantium* occurrenti, cujus interior substantia *sterculis & filamentis est*, cortex vero *sapi amarus*, nonnquam *ingens*, raro in *crustam lapideam abiens*. De *Ægagropilis* differentiationem edidit *Velchius*. *Pila* hæc in *Ventriculo Vascorum*, ex *pili obliquitate lingua* & *propria cute divisa*, ac *dehiscit*, compellat, ac *crasso ventriculorum glutine* in *curiosam substantiam faciens superinducta*, non solum deprehendimus.

Vel

- ℞. Aqua rard. mar.*
Charesol.
Papav. errat. an. ℥i.
Spiritus Theriacal. camph. ℥iij.
Lapill. tunc. prepar. vel Dent. Apr. sine ℥ss. vel
Antimoni diaph.
Maxill. Luc. pfc. an. ℥℥.
Sal. vol. Maxill. Luc. pfc. gr. xii. ad xv.
Laud. Opus. form. gr. iii.
℞. Papav. errat. ant. scabios. ℥vi. ad unc. i.
M. D. S. ut apta.

Vel

- ℞. Dent. Apr. prep. ℥iij.*
Lang. Hircin. prep. ℥℥.
Laud. Opus. lang. gr. ii. vel iij.
M. pro Pulvere:
Divid. in tres part. aequal. S.
Pulvis Dissolvens.

Vel

- ℞. Maxill. Luc. pfc. ℥i.*
Sal. Card. ben. ℥℥.
vel. Dent. Apr. gr. v.
Laud. Opus. gr. i℥. M. f. Pulvis
S. ut antea.

Vel

- ℞. Sang. Hirci prep. ℥i.*
Beccard. Mineral. ℥℥.
Laud. Opus. gr. i.

M. f. pulvis.

- div. in 2. part. aequal. S.*
Pulvis dolorem sedans & dissolvens.

Vel

- ℞. Maxill. Luc. pfc. vel paco. antiphon. ℥℥.*
Sal. vol. Cerna Cervi vel Maxill. Luc. pfc. gr. vi.
Laud. Opus. gr. i℥.

- M. f. Pulvis in principio & incremento; S.*
Pulvis dissolvens.

Vel

- ℞. Arcan. duplicat.*
Surtia prep. vel Flor. sulphuris ana gr. xv.
M. f. pulvis in pleuritide cum Febre acuta.

D. S.

Pulvis Refrigerans.

mor Dolor & calor remittunt, & materia cocta sine ulla difficultate commodè rejicitur.

Vel

- ℞. Arcan. dupl. ℥i.*
Antimoni diaph. ℥℥.
M. D. S.
Pulvis calorem sedans.

Vel

- ℞. Arcan. dupl. ℥℥.*
Maxill. Luc. pfc.
Antimoni Diaph. ana gr. xv.
M. div. in 2. part. aequal. S.
Pulvis Alterativus.

Vel

- ℞. Mixt. simpl. rind parat. vel Tinctura Beccard. ℥i.*
Spiritus Cerna Cervi. offus. ℥℥.
℞. Opil. rardat. ℥i.
M. pro duabus dof. S.
Mixtura sudorifica.

Vel

- ℞. Spiritus theriacal. camphor. ℥iij.*
℞. Cerei ℥i.
M. D. S.

- Essentia discutiens, & leniens: ʒo. usque*
ad 60. guttae pro i. dof.

Pro meliori confirmatione doctorum, notanda venit Observatio in Muliere plebeja 42. annorum. ad quam pleuritis gravissima & jam desperata laborantem die demum septimo decubitus sui vocabatur: aderat Tussis gravis, excretio viscidæ, nonnihil sanguinolenta, dolor in latere dextro, qui prius fuerat in sinistro, palpitatione Cordis, sudor frigida in peripheria Corporis, summa debilitas, Pulsus quia qualibet vice intermittens, omni momento suffocanda videbatur, Sitis clausa, Vox rauca. Huic præscripi sequentem potionem.

℞. Aqua Papaver. errat.

Card. ben. an. ℥℥.

Maxill. Luc. pfc. prep. ℥i.

Sal. vol. Maxill. Luc. pfc. gr. xii. ad xv.

Laud. opus. form. gr. ii.

Syr. scabios. ℥℥.

M. f. Potio.

Quæ exhibita fuit coelestem, & exinde superveniente copioso sudore mirabile levamen omnium symptomatum percipit: continuato etiam hujus Mixture usu, successivè convalescit.

Interim ut expectorationem Materie viscidæ quæ cum tussi supererat, melius promoverem:

℞. Aqua scabios.

Hyssop. ana ℥℥.

Spiritus Sol. Ammoniaci an. ℥℥.

Syr. scabios.

Polar. ana vuc. ℥.

M. D.

Cepit coelestem.

Cùm egregiè quidem & copiosè viscidæ rejiceret, tamen de Ancietatibus repetentibus, ut & Doloribus intensè recrudescentibus, denotè competeri cepit, cum Respirationis difficultate, ob id mihi expectorantibus ad Sudorificæ interna ac cellum feci: Ergò conscripsi:

℞. Aqua Flor. Papav. errat. ℥iij.

Lapill. Cancer. prep. ℥i.

Sal. vol. Maxill. Luc. pfc. gr. xv.

Laud. opus. form. gr. i℥.

Syr. scabios. ℥℥.

Misc. f. Potio.

Usurpabat repetitis vicibus cum copioso sudore & succellu. Item

℞. Aqua Flor. Papav. err.

Card. ben. ana ℥℥.

Lapill. Cancer. prep. ℥i.

Sal. vol. Max. Luc. pfc. gr. xv.

Laud. opus. gr. ii.

Syr. Flor. Papav. errat.

Scabios. ana ℥vi.

M. pro potione.

Pro dolore pectoris leniendo externè simul ordiebam:

℞. Ung. dialth. ℥i.

Olei amygd. dale. ℥℥.

distillas. cumia. ℥i.

Camph. gr. ii.

M. f. Linimentum.

Quod caliddè illitum crebro lateri dolenti optimè proxit. Hic continuatè per Dei gratiam sanata fuit. Sed cùm adhuc Ægra copiosè viscidæ tussiendo rejiceret, pro reliquorum harum evacuatione sacris Raptui rectus paratus cum faciliore per copiosam sputi excretionem optimè contulit. Sed cùm curata, nihiloominus tamen adhuc Tussim hominidam, difficilem nonnihil Respirationem & alia pauciora symptomata, adeoque metus labelet de Plethit Pulmonali imminente; ob id

℞. Charesol res.

Neder. terris. res. ana q. v.

Concilia coq. in Cerevisia.

Affumit mane & vespertè calidè bonum huiusmodi, continuatur aliquandiu, bene profuit, & hoc plethit etiam impedivit.

Supervenerunt tamen adhuc sudores nocturni continui plano rivo emanantes, emaciantes & debilitantes insigniter. Pro his tollendis præscripsi.

℞. Antika. Pot. gr. xv. ad ℥i.

Laud. Opus. form. gr. i℥.

M. pro pulvere.

Affumit omni vespere vel ante carnem, sed moderatissimam. sub introitum lecti, hunc pulverem: cum aliquoties fumissit, præsentiarum opem sensit, & penitus convalescit.

Sic Vita ætatis constituta gravi pleuritide correpto, cæcus Pulsus cum semper post tres pulsationes intermitteret præscripsi octavo demum die vocatus sequentem potionem:

℞. Aqua Flor. Papav. errat.

Scabios. ana ℥℥.

Antimoni Diaph. ℥℥.

Syr. Nicotian.

Scabios. ana ℥vi.

Spiritus Nitri dale. q. f. pro grato sapore.

Misc.

Potionem hanc his usurpavit, prima statim vice sensibile levamen exinde percipit; sed altera vice mirè recrudit Morbus (sicut alias superius Notatæ cum salubri volatilibus magis præfatus observavi, quod hanc cum spiritu Nitri dale, unde Pleuritidis acutiss præmissi sudorificis volatilibus præferebunda) ut moribundus videretur omnibus, & semper quidem

dem circa vesperam Morbus recrudescit, precedente *gravi rigore*, inquitur vehementissimo calore, sub quo & delirium & inane imbecillitas evadit, unde 10. die præterpositæ præcipiunt:

*℞. Sem. card. bened. ℥iij.
Cum aqua papav. errat. & scabios. q. s.
F. Emulsio: adde
Mentill. Luc. pif. ℥iij.
Sal. vel. aurum. gr. xij.*

Miscendo f. Potio, quæ edulcorabitur saccharo. Assumptæ cohibitionem, mirè proficit.
Reliquas expurgandas puli facit *Raphani cap. saccharo* pro Expectoratione, sed buxus continuo & nimio ulu *Diantheam* & quasi *Limonium* incutit: hinc

*℞. Spiritus Nitri dulc. ℥iij.
Utiarbat pro dosi 30. ad 50. uisq. gutt. bis in die, & benè consulit.*

Sed propter calorem vesperi recurrentem, *fuldorem naturæ* copiosum, & *tussim* continuam, sequentes præscripsi Pulveres:

*℞. Anicell. Pot.
Flor. sulphuraria ana ℥ss.
Mista pro duabus dosibus continuavit aliquoties.*

Item
*℞. Aqua Papav. rhoad. ℥iij.
Animonii Diaphor. ℥ss.
Syr. Flor. Papav. ℥ss.
Spiritus Nitri dulc. q. s. pro grato sapore.*

D. S.
Potio confortans & refrigerans.
Melancholico cuidam Peripneumonia laboranti cum dolore gravativo pectoris, difficili respiratione, & capitis atque Ocularum dolore, præscripsi sequens in incrementato Marbi:

*℞. Confero. heder. verr. ℥i.
Animonii Diaphor. ℥ss.
Sal. volat. succin. ℥ss.
Balf. Peruv. ana gr. v.*

M. cum syr. scabios. & F. Bolus.
Cum citra manifestam causam aliquot noctes infirmos duceret:

*℞. Conf. Her. Barrag. ℥i.
Conf. alcerem. gr. xv.
Sal. vel. succin. gr. iv.
Lund. opiat. gr. ss.
Cum syr. Papav. F. Bolus.*

Ordinabat etiam spiritus Sal. Ammoniaci, cum speciebus Carmineis mistus.

Hic remedia ritè adhibita & subinde restituta, si non succedat per inflammationis discussionem, adeoque Diaphoresin & sudores, legitima morbi solutio, promovenda erit spiritum, & adjuvanda materiam intra pulmones partem vicinas congesta alteratio seu *Cutis*, & hinc *Exspulsi- variis*, utpote cum tunc ordinatio naturaliter supervenire solet. Hic conveniunt alia nota, in principio quidem remporaria Sputi acrimoniam, &que *lacrassantia*; Postmodum vero, quando spiritum album, crassum, & viscidum emittitur, insuperant *assuetudine*, *incidentalit*, & *expectorantia*.

Ad promovendam spiritationem profuit potius decolla *Pulveris*, quam syrupi aut Linctus Pectorales, quoniam minde perferunt tales *Agri* Saccharata. Convenit ergo in principio Decodum Hordei cum radice Glycyrrizæ, Helenii, Scabiosa, cum syrupo Violarum, de Jambis, de Tussilag. Papaveris, &c. Item Decodum & Rob. Palliarum, Decodum Helenii, Scabiosa, Violarum, Polyditi, Varnicum, Salvia, Tussilagine & Papaveris erratici, aliaque similia temperata, ad *manus*, ut vocant, *Cutem*; & Expectorationem blandè promovent: Cum vero copiosius spiritum appareat incipit, usurpandum venit *decollam hyssopi* cum melle *refusa* ad promovendam meliorem excretionem materie. Ad coctionem quoque si quid aliud, impellit facit Oleum *ferminusum Lini*, & hinc Oleum *amygdal. dulcium*, sed receter expectis, tam à Veteribus quam modernis Practicis, Expectantia dicitur, laudare: Nempe TACHENIUS alicubi spiritum Vini camphoratum cum ana Effluvia Croci, cum Oleo Lini vel amygdalarum dulcium datum, raro fallere assentit:

Vel
*℞. Olei Lin. rec. expr. ℥iij.
Syr. Violar. unc. vj.*

*Aqua hyssop. unc. iv. v. vel vi.
Dentur unc. ij. vel iij. pro dosi, aliquoties in die: S.
Potio solvens coctionem,*

Tam. II.

Vel saltem Oleum Lini recess sine igne extrahum, cum saccharo mistum, & ita exhibitum egregie confert:

Vel
*℞. Olei Lini ℥iij. vel iij.
Misceatur cum syr. fenicij vel aqua Card. ben. aut quancunque vehiculo.*

Quò suos Pleuriticos egregie reficit GESNERUS in *observ. & Exp.*

Sic PISO cum expertum habet Oleum Lini ad unc. iv. cum Pulvere dentis apri ad dr. i. mistum, & ita propinatum, præsertim in principio: D. CAROLUS REIGERUS adhibuit Oleum Lini cum speciebus Diatreos felici cum successu: vid. M. A. N. C. ann. 4. obs. 7. p. 12. Plura qui cupit de oleo Lini, vid. GABELCHOVERUM *ent. 4. cur. 61*. Hujus locum Oleum *amygdalarum dulcium*, sed recens, ad ℥ss. ad iij. in principio morbi propinatum crebris, egregium est, emolli- lig, Dolorem lenit, expectorat, subducit alvum, &c. Confer. THONERUS & PLATERUS, quibus in ulu fuit. Pertinet huc Experimentum *Quercetini & Barbitoli*, quod est *Pomum carumum*, & dr. i. *Toris replatum*, & ita ad ignem coquendum, hinc deglutendum, aut cum unc. iij. aut i. aquæ Card. ben. propinandum; hoc enim multos reficuisse refert RIVIERUS *ent. 1. observ. 56. & C. 2. observ. 63*. Quidam Mallichen addunt: Quidam indunt ℥ss. Thoris, & superaddunt simul ℥ss. Florum Sulphuris, & ita coctum assumunt, & præstantissimum remedium esse dicit FONSECA l. 2. conf. 15. Alias quoque, ubi spatio copiosior, profunt spiritus Salis Ammoniaci simplex, anisatus & succinat, Tincturæ Sulphuris. Conveniunt etiam Flores Albi dulcis, sen ipsa Albi dulcis probè pulverisata, & permixta cum syrupo seu Confera Violarum, syrupo de Tussilagine, Papaveris rhoadis, & in specie de Jambis, qui egregie temperant acres Humores seu succos, & Expectorationem blandè promovent: id quod satis notum est.

Quò si facta coctione fortis expectorandum sit, conveniunt *incidentia & Expectantia* in specie hic dicta, v. gr. *simplicia* postmodum addendi sunt syrupi de hyssopo, de Erythimo, Nicotianæ ritè præparati, de quo vid. EPIPHANIUS FERDINANDUS *Ag. 12. & 45*. Mel rosatum, Spuma Ceti, spiritus Nitri dulcis, &c. Quibus omnibus tamen præfero *succum Raphani* receter expressum, mirabiliter expectorantem. In specie spiritus Nitri dulcis moderata dosi dictis remediis additis multum ad expectorationem materie coctæ promovendam facit. Item *aqua mellea* in difficili Anacardi per spiritum, princeps est remedium, cui simul *speciem variis ac Pulveris* incoqui possunt. Huc pertinent Potiones suprà annotatæ:

Vel
*℞. Aqua hyssop.
Scabios. an. ℥ss.
Spiritus sal. ammoniaci anis. ℥i. ad iij.
Mentill. Luc. pif. ℥iij.
Syr. Dianth. seu Violar. unc. i.*

M. D. S.
Mistura Pectoralis, coctionem fumenda.
Vel

*℞. herb. Charif.
Hyssopi.
Scabios. ana Mj.
Rad. Liquirit. unc. ss.
Enal.
Polyditi. ana ℥iij.*

*Pincum ping. Num. vi.
Coqu. in l. q. Aquæ.
Colature ℥ss. ad ℥iij. adde
℞. Croci ℥iij. ad unc. ss.
Syr. Miel. unc. ii. vel iij.*

M. pro Potione maturata & expectorante.
S.

Potio Expecturans.
Inter symptomata Pleuritidis vocantia in toto Marbi cursu, præ cæteris oil magis urget, quàm *dolor ille punctatus*, acutus, mitè excrucians *Agros*, Pro quo linendo præter internum Laudanij Opiati utum, conveniunt externè variæ Anodyni & relaxantia. In principio, uti dixi, applicat *Spuma Ranaum* bono cum successu; Item spiritus Vini camphoratus, aut crocatus est egregius; CLAUDERUS *re. de Bullam. Corpor. sal. ammoniaci p. i. & Ciner. Clavul. ad p. ii.* in aqua simplici vel aquis destillatis fontium, in sedantia & sopientiis pondionibus pleuritidis admodum commendat; Vel linatur Linimentum super præteritum, vel *Unguentum Pleuritidis*, *Myrsicibil in armament. medic. Chymic. p. 15.* calidè applicetur, item Oleum Antipilepticum PETRI

X x x 2 CA

CASIRO, quod describitur in M. A. N. G. Ann. 1. Obf. 39. p. 49. (Y)

24. Ung. Alb. 3i.

Olei Amygd. dale. 3b.

M. D. S.

Unguentum Leniens.

Simplex est Unguentum, sed experimentum RULANDO & ZACUTO LUSITANO, cujus effectum pariter observavi, si singulis h. bonis aut triboribus ad summum loco dolenti illinatur, ad imitationem RULANDI Addere solojuncum Obf. deffiliat Camia 3i. & gr. ix. Camphora, meliori cum effecta. Conveniunt Oleum Jalsminum, Seminum Lin, Chamomillæ, Hyperici, Anethi, Araneorum, Lilium alborum, Papaveris, Hyoscyami, Scorpionum, Florum Veratci, septem Plurum Myrsi, Sevum Hircinum, Unguentum Pectorale, Empl. de Meliloto, de Mucilago, item Iteatum, & de Cumino, quod DECKER 5 Pr. Barbæ, pag. 78. & 79. describit, item Emplastrum de Meliloto cum Oleo Hyperici aut Chamomillæ aut Philophorum malitatum; Oleum etiam Camphoræ excellens est, ut & Oleum Chamomillæ destillatum, & Oleum Cere, Plagade Morie montani (cui posse substitui arbitror Sevum Hircinum) est Experimentum PARACELSI, qui tale Medicamentum ordinat.

24. Fing. Mar. mont.

Olei Chamomill.

Rasar. ana 3ii.

Amygd. dale. 3i.

M. f. Linimentum.

Vel

24. Fing. Mar. mont. vel Apr. 3i.

Olei Amygd. dale. 3b.

destillat. Chamom. 3i.

M. D. S.

Unguentum Leniens,

Vel

24. Fing. Mar. mont. 3b.

Olei Chamomill. 3ii.

Albiss. 3i.

destillat. Camia. 3b.

Cruci 3i.

Camphor. 3b.

M. f. Linimentum.

D. S. ut supra.

Item evanescit Balsamum Sulphuris cerebinthiacum, & Rulandi, superimponendo Emplastrum Dis-Sulphuris Rulandi.

Diſſa applicatur tepide, & imponatur desuper Lineum crassum, vel Lapis calcæſtus, ut melius penetret remedium; Item

24. Ung. Diſſil. 3i.

Empl. Filii Zach. 3b.

Old Jerr. Plur. Myrsi. 3iii.

Hyoscyam. ext. 3ii.

destillat. Auric. 3b.

Camph. 3b.

M. pro Unguent. Resolvente.

D. S.

Unguentum Resolvens.

Calidè illinatur aliquoties, repetendo desuper Laterem calescentem.

24. Emplastr. de Meliloto.

Fili Zach. an. 3i.

Cum f. q. Olei verbasini f. Emplastrum Resolvens.

D. S.

Emplastrum Resolvens.

Saccus Caulium seu Brassicæ & ex eo paratum Unguentum à multis simpliciter est expertum: Sic factum Emplastrum ex lucis Caulium cum Pulvere Camini insigniter commendatum est à GABELCHOVERO Crat. 4. Cur. 63. Sic etiam ex Pulvere Caulium cum Pulvere Cumini, Caryophyllorum, & Melle, expertum Emplastrum fit contra Pleuritidem BARTHOLEI. Quibusdam singulare habetur Emplastrum iubeque, præmissis præmittenda, applicatum:

24. Ficus arab. 3b.

Sulphuris tri. 3b.

Cera flu. 3vi.

Terebinth. clar. 3b.

Old Chamom. q. l.

M. pro Emplastro.

D. S. ut in præ.

Præmissa Venæsectione, si opus est, & sudorifero, calidè applicetur.

Hoc etiam pertinet ferebus Gallinarum cum Oleo Chamomillæ, quod certè admirandis præstat virtutes. Fementa quoque parari solent ea Malva, Althæa, Flor. Sambuci, Meliloti, Chamomillæ, &c. quorum prolixam catervam apud Authores invenietis: c. 5.

24. Herk. Chærefel.

Nephth. hortens.

Fol. Myrsinum.

Flor. Sambuci.

Melilot.

Chamomill. an. M. i.

Cypar. sub ciner. affat. 3iii.

Various Tabar.

Lupinus. an. 3i.

Nid. Hirsut. No. i.

Coq. in f. q. Laſt. obstr. ad consilium. Cataplas-

mat: adde

Camph. 3i.

M. pro Cataplasmate Resolvente ac Maturante:

D. S.

Puls Resolvens & Maturans.

Quod si nec per sudorem, nec per spiritus explorationem desinat Pleuropneumonia, seu quæcumque inflammatio Thoracis, necesse est, ut scilicet suppuratur inflammatio, & ita in perfectum abſcessum abeat; circa quem

1. Suppuratio promovenda.

2. Abſcessus perfecti rapti adjuvenda.

3. Abſcessu aperto, partis ulceris mundificatio & consolidatio, ac simul parvis sacris, instituendum.

Suppuratio hæc in pleuritide frequentius contingit, in qua punctum saltem Apoplema colligitur intra pleuram, idque frequentius, nonnunquam simul ea parte intra palmenum siliu lateris, idque rarius: Nam hoc revera spum solvitur, dum illud spum suppuratur. Semper tamen in Suppuratione hoc negotium ad utrumque respiciendum. Pleuritidis formationem intra Pleuram, nunc rupto abſcessu intra cavum thoracis fuit, nunc intra faciem ex dilatata pleura colligitur. Præhæ hoc observavit LINDANUS, qui dicit: *Antiquos semper credideram, Suppurationem facta Pus insensum in cavum Thoracis atque Empyema fieri: Verum sibi tantum illud illis parvis in parte anti agnoscit, quod vidi in filia Di. Filialis, quæ in Pleuritide incidit, quæ in Suppurationem transiit. Cum Chirurga Candelam exploratorem exploravit alibi: sed inde nihil petivimus colligere: Nam Pus mortuum cum diffusa fuerit invenimus Membranam, facientem Pleuram: dilatatum in immensum Sacrum, in quo subsistebat cunctis Parentibus illud tamen magni Medici, hoc de re rescriptum, amari esse putabant. Verum hic frustra fuit Paracelsus facta, & infero alibi. Ad Maturationem autem abſcessus promovendam optima remedia sunt Nicotiana, Hedera terrestris, Chærefolium & Scabiosa, quæ quatuor aliis suppurantibus omnibus præferantur; unde usurpetur Symplicium de Nicotiana, de Hedera terrestris, de Symphyto Fernuli, de Hyssopo.*

Externi verò ad suppurandum abſcessum, ejusque apertionem, convenit Lac cinchum cum Malva arborecente, & ita sub forma Cataplasmatibus crebris impositum; mirè eam materat & rumpit abſcessum. Fieri etiam stercoris Asini, non minus quam stercoris Caballini, in Aqua appropriata vel Vini dissoluti, facta iam suppurazione maturat & rumpit Apoplemata: vel conveniet etiam Emplastrum Filii Zach. vel alia Emplastrata externè applicata: Vel apponatur Cataplasmata ordinaria, ad maturationem & ruptionem abſcessuum aptata.

Ubi facta suppuratio, opera danda, ut abſcessus rumpatur, & Pus evacuetur. Apertum abſcessum factum coagulum ex spissatione puris cum chore plus minus eruenit. Ut autem rumpatur sic aperitur abſcessus in tempore, optimum remedium est, si Pus sit ut stantur excoctus, & patiens alta voce clamando de lateri in lateri volat. Optimum elicit, ut, quociens certi effusum de maturato abſcessu, saltem perferatur spiritus intercalis, cum hoc securè fieri possit, modo locus, in quo abſcessus continetur, certè & exatè cognoscitur pulsi, qui nonnunquam robore, Tamore & dolore ad extra se manifestat. Neque enim in eo loco, quo

(Y) Oleum hoc Auripurgatum paratur ex decoctione Corticum Cucurbitarum longiorum in Oleo Olivæ: quod calcina, & per siccationem cinem trahiatur, deinde calidè & sibi applicetur. Hæc geminam etiam curam subſequens legere est apud Ephemerides Germ. Ann. 1. Obf. 10. Expertum habemus in Praxi.

quo in Empyemate, & Pure, jam in Thoracis cavitate collecto, scilicet heri solet, apertio infundenda; sed ex pondere, dolore & calore locus, in quo abscessus hæret, investigandus, & intra duas collas leuiter apertendus, &c. sed *canti omni precedatur*: Quam apertio quoque in abscessu intra pleuram locum habet. Ita in Pulmonem quendam lea simul suppuratio fiat, necessarius Empyema expellendum venit. FERDINANDUS in *Mé. Méd. gn. & 25. Dorsum Takari* & illius post convenientem digestionem paratum Syrupum, neque *Takari sumum*, ad rumpendum Vomica suppuratorem lea Empyematicorum, & evacuandum pus, non potest sufficienter commendare. Ex testor Deum, me anno elapso tussimque a morte revocasse Mulierem, quam erat per tres menses pleuritica & suppurata cum Febre Hædica, quæ ab illius *Dorsis*, nempe Nicotianæ, assumptione per tres dies, & ab ubi fumo accepto, tribus vicibus plus *Bvi. Puris albi, tribus diebus Tussi evomuit, & nunc est sana. Dorsum est hoc*.

℥℥. Fel. Takari. ʒi.

Billant in Aqua *Altili* Bil. ad consumptionem medietatis, addendo in fine

Fel. Malva.

Bravæ, ursina.

Volar. ao. M. i.

Colentur, & cum *Sapa melle.* & detur calidiusculum pluries.

Fumus vero est;

℥℥. Fel. Takari;

Reponatur in Cineribus adhuc ignitis, & Fumus per Filiculum seu Embolum assumatur.

Cum quibus & *Terebinthis* usum subinde adhibuit.

Falla ergo *Raptores* abscessus, & poris in Thoracis cavum evacuatione, ad evacuationem huius, *Pomice* convenit. Ad istius verb *Mandisandum* & *Confidendum*, vel si alio partes antea inflammatae labem putantur, præter remedia pus expellentia, eadem sere Medicamenta, imprimis ex *Nicotiana*, *Hedera terrestris* & *Chærefili*, sunt experta; quam Hedera terrestris enucle succum & Syrupum L. I. N. D. A. N. U. S. præsertim omnibus aliis remediis ad curandos abscessus suppuratos; egregie enim Apoplexia mundificat, & denique consolidat, ne *Æger* in Empyema desperatum & phthisin incidat, Nam & Hedera terrestris, *Creem. Gunderman*, & *Chærefili* sunt Vulneraria, & in latione partium inflammatarum, post Peripneumoniam residua, & exinde imminente phthisi, optime conveniunt. Quibus spiritus seu Oleum *Terebinthinæ*, & cum eo paratus Balsamus Sulphuris *terebinthinæ* & anisatus, flores eius & modicum Sulphuris siccum, item Sympus Sulphuris *Willmii*, item Balsamus *Peruvianus* & huius tinctura commode adhiberi possunt. Sunt enim optimum Oleis pleuritici mundificativum & consolidativum; vid. Collig. LANGII *suprà* *Tubum cap. de Peripneumonia*.

Huc referenda sunt omnia ea, quæ *suprà* *Sell. 17. cap. 1. Artic. 5. de Phthisi Pulmonalis* ex eorum Evulcatione monuit, & etiam *suprà* *Cap. 2. de Empyemate* monuerunt. Pucus toto Morbi curis fit Decoctum Hordei & Liquefitæ, vel Decoctum Papaveris theodici cum Syrup. Capillorum Venetis. Convenit etiam purus Sulphureus quicunque, secundum HELMONTII hypophesin præparatus.

Et tamen de Pleuritide vera,

CURA PLEURITIDIS NOTHÆ.

Quoad Pleuritidem Nottham: Prima ista, quæ est ab inflammatione partem externam, inernis *Diaphoreticis*, ad quaslibet inflammationes *suprà* laudatas, & externis *Saccharo* ad *Pomice* dissolutiones levatur, nisi plethora aut ingens sanguinis agnatio languinis missionem quoque urgeat.

His diebus occurrat *Juvenis inflammationis sub Axillis* insigni correptus, factis post aliqualem supurationem apertione, supervenit altera abhine die inflammationis, quæ mediom pectus occupat, cum dolore ad tactum sensili, respiratione difficili, ita ut sere erectus in lecto subsistere cogatur. Erat *Pleuritis Nottha primi coeli ex SENNERTO*, quæ facili evanuit fuit per Potiunculum ex *Lapilli Cancerum* cum *aceto destillato*, *suprà* *Artic. 2. ubi de inflammatione in genere*, commendatum; quam bis intersavit cum blando sudore.

Aliquando gravia *Pleuritis Nottha secundæ modi* occurrat in alio, cum dolore gravissimo punctionio;

℥℥. Aqua Scabiei.

Card. bened. ana ʒi. ii.

Spiritus sal. Ammoniaci ʒi. ii.

Essent. Opii ʒi. ii.

Corall. rub. præp. ʒi. ii.

Syr. Scabiei ʒi. ii.

Mile.

Capiebatur coctilem.

Anno 1675. *Cataractus Epidemius* totam sere Germaniam pervadebat, sub quo quidam gravi dolore punctionio in altero solum saltem lare maxime affligebatur, occupante spatia Costarum Notharum & a regione Spine Doris lumbis sursum anteriora versus ad Sternum usque adscendente. Resiciebatur in taliter constitutis quibusdam eructis & vicidia glutinosa, horrida, non tamen putrelenta. Aderat simul in principio ardor intercus cum pulsi crebro, celsi, magnitudinis & vehementia moderato, qui tamen, uti & Excretiones, doloribus cessantibus cessabant. In hac ratione Lymphæ acris peccantis, rationis causæ materiali, Salina volatilia, ratione doloris vero, in quo Pleuritici Notha cum Vera certat, Opiata adhibebatur, additis Speciebus in Pleuritide vera aliis usitatis, adeoque profuerunt spiritus salis Ammoniaci, Dens Apri, Liqueor *Coræ Cervi* succinatus, Tinctura Tartari cum Spiritu Salis Ammoniaci soluto, Sal volatile Lucii piscis, unde ordinabatur alia Mixtura:

℥℥. Aqua Card. bened.

Flor. Papav. errat. ana ʒi. ii.

Spiritus sal. Ammoniaci anis. ʒi. ii.

Land. Opiaz. gr. vii.

Syr. Chærefili ʒi. ii.

M. F. Potio.

Capiebatur coctilem.

Coldam, qui vesperi circa Costas totos doloribus punctionis cum intensissima Pectus angustia, Æstu magno adhauc, Pulsu magno, præcedente frigore, affligebatur, præscripsi:

℥℥. Aqua Flor. Samb.

Scabiei. ana unc. ii.

Lap. Cancer. præp.

Dent. Apri præp.

Animonii diaphor. ana ʒi. ii.

Sal. vol. Marill. Lacti ʒi. ii. (cujus loco etiam aliud substitui potest) *gr. xii.*

Land. Opiaz. ferm. gr. vii.

Syr. Card. ben. unc. ii.

M. P. Potio.

Mixturam hanc aliquoties in die hauserit, & sudorem urgebat, unde altero mane magnam partem levabatur, reliquis per sudorem & expectorantia sublevis.

Cæterum Urinæ in hac pleuritide notha erat crassæ, turbidæ, cum copioso sedimento, quod præcipitatum erat sub effervescencia ex Lympha & sanguine. Pro hoc scopo, Naturæ iuvamen præstans, præmissis sudorifero, diuretica adhibebatur, inter quæ prævalebat tinctura Tartari, ratione *Alci* *Sexi* v. g.

℥℥. Aqua Mentha.

Serpilli ana unc. ii.

Tinctura Tartari ʒi. ii.

Spiritus sal. ammoniaci ʒi. ii.

Syrap. Med. terrestr. ʒi. ii.

M. f. Potio.

Capiebatur etiam huius Mixturæ loco tinctura Tartari cum dimidio vel tertia parte spiritus salis Ammoniaci, pro dosi 40. gutt. Arcanum quoque duplicatum *Myrsinæ* die bis ad ʒi. propinavi, præsertim ubi Urinæ lateritæ apparebat, pro quibus corrigendis proficuum erat: Insuper cum his interitis pro doloribus mit-gandis applicabatur exteros, ubi tamen Litus & Unguenta oleosa, item Emplastrum mucilaginosa nocebant, aut saltem nil juvabant, quia sœtem porum obstructionem procurabant; quo potius Foculi calidi sicci omnem spei paginam explebant, adeoque *Ægri* ad forascentem sedentes sensille levares dicebant, ubi præsertim blanda Frictio cum pannis calidis accederet. Quod si vero Dolor anteriora magis affligeret, Sacculi tunc Avena impleti & calefacti loco dolenti, permittendo subinde eisdem, imponebatur, ubi Avena quidem nil saluti promittere potuit, nisi quod calorem forere apex fuerit. Tandem quoque egregium erat illud Emplastrum, ex sale volatili Urinæ & *Terebinthinæ* collas, & scilicet

℥℥. Sal. vol. Urinæ ʒi. ii.

Terebinth. unc. i.

Hæc mixta in Mortario rediguntur in consistentiam spissorem; quibus pro consistentia Emplastri acquirenda,

da, addebat nonnulli *Empi. de Mellite*, hincque inducitur super *aiantem*, & applicabatur aliisque *lindone*.

Restat unus adhuc *Scrupulus* eximendus *ex Opio* & *Opiatrum* *usum* hoc loco allegatum: Scilicet *posset* horum *usum* esse *suspensus*, cum *impediat* Naturae *motum* in *Lymphæ* *vitiis* *Expeditione* *consistens*, nam *non ille* *Spiritus*, ita *quoque* *humorem* *motus* *sistit*. *Observari* *quippe* *in Muliere*, cui *liquorem* *Coronæ* *Cervi* *succinum* *cum* *Essentia* *Opii* *prescriptam*, *coquebam* *fuisse* *ex* *hujus* *usu*, *esse* *ipsæ* *vaporem* *quid* *circa* *Pectus*. *Sciendum* *tamen*, *Opium* *scilicet* *non* *cuius*, *sed* *saltem* *symptomata* *palliat*, *simul* *autem* *atrociora* *ex* *doloribus* *contionis* *immotio* *præcave*; *hinc* *quo* *commodiorum* *agendi* *occasione* *accipit* *Medicus*, *reus* *usurpatori* *poterit*; & *quidem* *in* *principio* *de* *incremento* *ejus* *semper* *convenit*, *quando* *nempe* *Tussis* *fœca* & *Febriçula* *vesperi* *affligere* *solet*; *in* *statu* *verò* *Opia* *in* *utrum* *non* *sunt* *vocanda*, *quia* *nam* *colle-* *cta* *est* *materia* *mucosa*.

Tertia Pleuritide Nucha ab *Acido* *acri* *intra* *Pleuram* & *muculos* *intercostales* *sistit* *collecto*, *per* *Diaphoreticæ*, *Salis* *volatilis*, *Opia* *mista* *tolitur*, *in* *specie* *Spiritus* *salis* *Ammoniaci* *anistæ* *cum* *dimidia* *Essentia* *Opii* *misto*, & *propinato*, *expellendo* *fluorem*, & *patiens* *melius* *se* *habuit*. *Egregie* *quoque* *conducit* *Ascorbinum* *diaphoreticum* *cum* *Maxilla* *Lucis* *piscis*, *Dente* *Aspi*, & *Opia* *propinatum*: *vid. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 72.*

In Pleuritide Nucha, *que* *est* *de* *Sore forabiles*, *Diaphoretica* *maximi* *usum* *sunt*, *quibus* *quavis* *variis* *Venenæ* *juvenda*: *vid. DRAWIZIUS de* *Scorbato* *Tit. 7. potissimum* *cum* *per* *Hæmorrhagias* *Criticas* *illa* *interdum* *solvatur*, *v. g. Menstrum* *fluor*, *vid. RIVERIUS s. 1. Obs. 47. Imò* *in* *Scorbato* *Antiscorbatica* *illis* *miscenda*. *Valent* *hic* *etiam* *Sacculi* *ex* *Reloventibus*, *aut* *Unguentum*, *quod* *DR. A. WIZIUS l. 1. p. 252. describit* *sequens*:

℞. Sac. Rostæ. aquat. unc. viii.
Alstib. unc. v.

Butyr. rei. unc. vi.

Bulliant *lento* *igne* *ad* *consumptionem* *humiditatis*: *adde*

Olæ *diffusil. Suetis. nisi* *non* *refrigerat. ℞.*

Chamom. ℞ii.

M. f. Liximentum.

Si *in* *Flavibus* *hæc* *fuerit*, *Carminativa*, *Discutientia*, *atque* *Diaphoretica* *interna* & *externa* *conveniant*. *Non* *raro* *tamen* *Venæ* *sectione* *quoque* *opus* *esse* *testatur* *RIVERIUS C. 3. Obs. 63. & FORESTUS l. 16. Obs. 42.*

Quod *attinet* *Pleuritidem Verminaliam*, *ac* *Medicamentis* *verminolam* *progeniem* *enecantibus* *curatur*. *Pro* *cæteris* *convenit* *Aqua* *Mercurialis* *seu* *Hermetica*, *parata* *ex* *Aqua* *Cardui* *benedicti*, *in* *qua* *agitatur* *fuerit* *aut* *aliquantum* *ebullit* *Mercurius* *vivus*; *ubi* *(subdistinguit* *Mercurius*, *decantata* *Aqua* *propinetur* *cochleariatim*; *ita* *omnes* *vermes* *certe* *interfici* & *exturbat*, *quibus* *ejusdem* *afflicti* *ipse* *cessat*. *Conf. RIVERIUS C. 1. Obs. 75. Sic* *quoque* *phlegma* & *Spiritus* *Vitrioli*, *item* *phlegma* & *Spiritus* *Sulphuris* *in* *convenienti* *Vehiculo* *inspuratus*, *Vermes* *egregie* *abigit*: *v. g.*

℞. Aqua *Vitæ.*

Card. bened.

Ferrur. an. unc. iii.

Syr. Hyperic. unc. lb.

Spiritus *Vitrioli* *dale. gutt. vi. vel* *x. vel* *q. l. pro* *modica* *aciditate*.

M. D. S.

Potio *contra* *Vermes*.

Hæc *Mixtura* *capitot* *cochleariatim*; *hanc* *tamen* *negligantur* *Diaphoretica* *interna*, *ac* *Resolventia* *externa*.

ARTICULUS X.

De *Inflammatione* *Hepatis*, & *inde* *orto* *Abscessu*.

Uterius inter *reliqua Viscera* *Hepatis* *etiam* *interdum* & *fatis* *periculose* *inflamatur*, *quod* *ipsum* *inflammatum* *interdum* *abit* & *degenerat* *in* *Abscessum*, *totum* *cuius* *Parenchyma* *desuallens*. *Non* *enim* *tantum* *in* *SCHENCKIO* *leguntur* *Exempla* *abscessus* *in* *Hepate* *post* *Inflammationem*, *ubi* *totum* *Parenchyma* *suppuratum* *fuit*; *sed*

etiam *imprimis* *FORESTUS* *egregium* *habet* *casum* *l. 19. Obs. 10. de* *Hepatis* *Apothematæ*, *seu* *inflammatione* *in* *abscessu* *mutato*, *qui* *in* *Uterum* *malignum* & *depaucent*, *tandem* *que* *in* *Gangranam* *letalem* *abit*. *Vocatur* *aliis* *hepatitis*.

CAUSÆ.

Rariores *equidem* *sunt* *tales* *inflammationes*: & *in* *specie* *quod* *causas* *agnoscunt* *easdem* *inflammationes* *Hepatis*, *quas* *reliquarum* *partium* *inflammationes*: *subinde* *tamen* *externa* *causa*, *in* *specie* *consilio* *circa* *regionem* *hepatis* & *causæ* *ab* *alto* *in* *Hypochondrium* *dextrum*, *disponunt* *ad* *hujus* *inflammationem*; *Item* *præter* *has* *nonnullas* *quam* *Emplastra* & *Unguenta* *amnis* *calida* *hepatis* *ac* *Romachi* *regioni*, *ubi* *lobus* *hepatis* *tunc* *attingit*, *admotæ*, *hujus* *inflammationis* *causa* *fuit*, *uti* *etiam* *Gurcularis* *hepatis* *regioni* *crebrè* *affixæ*, *non* *raro* *hepatis* *inflammationem* *interiunt*: *Conf. HILDANUS C. 7. Obs. 46. & 47.*

DIAGNOSIS.

Quod *Diagnos*: *Hepar* *esse* *inflammatum* *ex* *symptomatis* *adpositis* *cognoscitur*. *Causæ* *autem* *considerentur* *omnia* *symptomata*, *quæ* *sunt* *admodum* *diversa*, *dum* *inflammationem* *Hepatis* *comitantur*; *hinc* *circumspectus* *requiritur* *Medicus*, *prout* *nempe* *inflammatio* *est* *vel* *in* *parte* *hepatis* *gibba*, *vel* *convexa*, *vel* *prout* *eadem* *est* *in* *parte* *convexa* *seu* *sinu*. *Nam* *si* *inflammatio* *hepatis* *est* *in* *parte* *gibba*, *magis* *urgere* *ferè* *solent* *symptomata* *Pleuritidis* *simillima*, *seu* *quæ* *alias* *observari* *solent* *in* *Pleuritide* *Vetri*; *si* *vero* *inflammata* *magis* *sit* *pars* *ejus* *convexa*, *urgent* *magis* *symptomata* *stomachi* & *intestinarum*.

Non *facile* *Hepar* *inflammatum*, *aut* *si* *inflammatur*, *Febris* *tamen* & *Æstus*, *ac* *cognata* *symptomata* *non* *adèe* *interiunt*, *quam* *pro* *ratione* *partis* *esse* *deberet*, *quia* *nempe* *hepar* *parvam* *habet* *Arteriam*. *Jam* *verò* *in* *omnibus* *inflammationibus* *à* *sanguine* *arterio* *magis*, *quam* *venoso*, *interiunt* *solent* *symptomata*. *In* *genere* *verò* *percipitur* *in* *omni* *Hepatis* *inflammatione* *dolor* *obscurus* & *tenuis* *ratione* *Membrarum*, *ac* *gravitatis* *ratione* *Visceris*, *si* *que* *circa* *regionem* *hepatis* *in* *dextro* *Hypochondrio* *ac* *pro* *profundo*, *qui* *sui* *suppurati* *punctio* *plūs* *mihi* *credere* *solet*.

Equidem *non* *raro* *apparent* *dolores* *punctorii* *in* *Hypochondrio* *dextro*, *qui* *tamen* *namque* *nam* *ex* *Hepate* *inflammato*, *falsè* *que* *dicunt*: *Hepar* *pungit*, *aut* *moles* *quid* *ibi* *esse* *corripant*. *Sed* *revera* *tunc* *vizum* *in* *Colo* *hæret*, *ac* *vicinis* *partibus*, *quæ* *apertæ* *sunt*, *ad* *dolorem* *talem* *reperferunt*. *Adèe* *simul* *in* *inflammatione* *hepatis* *non* *Febri*, *ut* *quidem* *magis* *acuta*, *ubi* *major* *est* *inflammatio*, *non* *verò* *minùs* *acuta*, *sed* *sepiùs* *lenta*, *pro* *ratione* *circumstantiarum* *in* *eo* *inflammato* *observabilium*, *prout* *nempe* *inflammatio* *vel* *intencior*, *vel* *remissior*, *ac* *non* *profunda* *plūs* *mihi*, *non* *externas* *magis* *partes* *occupat*: *vid. FORESTUS l. 19. c. 7. in* *Schol. Nam* *perpetuè* *inflammationis* *magnitudinem* *vehementia* *Febris* *analogicè* *comitatur*.

Quod *si* *hepar* *inflammatum* *similifaciat* *diaphragma*, *cui* *per* *ligamentum* *latum* *firmiter* *est* *annexum*, *dolor* *ad* *jugulum* *adscendens* *percipitur*, *quasi* *ad* *inferiora* *traheretur*, *præsertim* *dum* *vehementius* *Æger* *inspirat*, *idque* *propter* *pondus* *hepatis* *inflammati* *diaphragmati* *mediante* *Ligamento* *lato* *alligati*: *Ob* *id* *Tussis* *arida* *(seu* *inanis* *per* *intervalla* *affligit*, & *difficilis* *respiratio* *Ægros* *cruciat*, *non* *secus* *ac* *in* *lacere* *opposito*, *unde* *ferè* *supra* *interos* *Ægri*; *Pulsus* *est* *frequens*, *cæter*, *inequalis* & *adèe* *simul* *itis* *intestini*. *Anorexia*, *Lingua* *arida*, *calor* *modicus* *totius* *corporis*; & *c.* *Item* *in* *specie* *urgens* *hæc* *symptomata* *quasi* *pleuritica*, *si* *pari* *hepatis* *gibba* *fuerit* *inflammata*: *Sic* *verò* *hepatis* *pari* *convexa* *laboret*, *præter* *suprà* *memorata* *symptomata* *generalia* *urgent* *in* *specie* *symptomata* *stomachi*, *lingularum* *frequens* *oboritur*, & *perpetuè* *ferè* *insurgunt* *Ægri*, *Vomitibus* *Bilis* *subinde* *superveniunt*, *interdum* & *Diarrhæa* *adèe*, *item* *Nausea*, *Anorexia*, & *similia*. *Si* *verò* *pari* *gibba* *afflicta*, *acris* *est* *dolor* *circa* *Cordis* *foveam*. *Decubitus* *in* *dextrum* *latus* *est* *difficilior*, *dolor* *ex* *prelura* *excusatur*, *tumor* *manifestus* *apparet*, *partes* *ad* *jugulum* *dextrum* *fursim* *trahi*, & *symptomata* *cætera* *partes* *Thoracis* *apparenter* *afflicta* *sequi* *videantur*.

Cum *vero* *dixi* *diagnosim* *capitis* *in* *Pleuritide* *etiam* *adnot*, *ob* *id* *occeffe* *est*, *ut* *attentè* *adstringatur* *Pleuritis* *vero* *ab* *inflammatione* *hepatis*, *in* *specie* *cum* *symptomata* *hæc* *multos* *fecerint*, & *non* *paucæ* *exempla* *proferant* *curata* *ita*

Quibus hepatis aut Lien supparatur est, illa plerumque hemor-
rhagia Nasium supervenit primis septem diebus, paucis an-
doctino, rarissime decimo quarto, & confert illa hemorrhagia,
si è directio fiat.

Pessima signa Inflammationis sunt Febris ardens, sitis
ineasibilia, Lingua icaba, Refrigeratio extremorum, dum
interiora uruntur: Vomitus item niger & portaceus.

Mori proximum Venter intumescit rupeo abscessu, & fri-
gidum sudant circa collum & Faciem, atque animo lin-
quunt.

Cum hepatitis Inflammationem Febris ardens & continua
comitatur, malum est, quia vehementer Viscus inflama-
tum significatur.

C U R A.

Quod attinet ergo Curam Inflammationis hepaticædem
est cum omnibus reliquis Partibus internis inflammatis, five
Pulmo, five Fauces, five Ventriculus, five Remes inflama-
mentur. Unde omnia antipileurica, præsertim Campho-
reæ mista, etiam hic in usu erunt: saltem quoad spumum
variatur cura; simul quoque ad Partem afflicta, cujus tonus
facile lardi potest, & qui amaris præteriter conservatur,
semper respectus habendus est. Nam præmilla vel omnia
Pneumonia in Brachio, & hinc in Pedes, blandaque Laxa-
tione cum Pulvere Comitis de Warovitch de Tribus, imprimis
Diaphoretica, v. g. mixtura simplex ad dr. i. Liquor coctus Cer-
vi succinat, Salsa volatilia, Spiritus Nitri dulcis, Antime-
lasm Diaphoretica, Iosuliferum Magnam Fubri, Bezoar-
dum Joviale, ut & alia ex Jove, dens apris, stercis sulphu-
ris, & similia conveniunt: e. g.

℞. Cornu Cervi sine igitur gr. xv.
Antimonii diaphor. ℥b.
Sali vol. cornu Cervi vel Piperis. gr. viii.
M. F. Polvis: S.
Pulvis hepaticus resolvers.

In principio & incremento affluuntur in aquis distis hepa-
ticis, aqua Agrimonia, Cichorii, Endivia, Taraxaci, &c.

℞. Antimonii diaphor. ℥ii.
Bezoard Jovial. gr. xii.
Sali tart. levis. ℥b.
Laud. Opia. gr. ii.
M. pro Pulvere,
div. in 3. part. æqual.
D. S. ut antè.

Purgantior reliquia & nimis omnia prætermittis, Ni-
trum antimoniatum, Nitrum simpliciter depuratum, &
quælibet Nitrata, item antihellum Poterii interitus laen-
dari albescit: item saturina, v. g. saccharum saturi,
Crystalli mineræ saturat cum Spiritu Nitri, & similia,
quæ plus in recessu habent. ZACUTUS LUSITANUS
l. 3. Prax. admir. obs. 39. & 40. cum expertum commendat
Casium fistulolum recentem conditam, item æolum, fructum
quendam peregrinam ex Guinea allatum. Quibus omnibus
amara quævis, hepatica dista, associari possunt. Pro potu
ordinario interserviant Temperata, imprimis si Inflammatio
pergere minetur ad Abscessum: qualia sunt Jaspium ex de-
cello Radice Cichorii cum Floribus Papaveris erratici, cum
Nitro & saccharo: sed oportet dare calidum, & minime con-
ferretur: vel detur decurtum hordei & Radicis graminis cum
Radice Cichorii, Passulis, & castillo Liquiritia, & Symplo-
macis aut Capillæram Veneris. Circa finem tamen Inflammationis
addenda simul diversita, Radix apii, Petroselinii,
Agrimonie, & similes. Sub principio autem & incremento
Morbi operam demus, ut discurrat Inflammatio, & præca-
veatur Abscessus.

Cum his Internis Extensæ in Inflammatione hepatis cir-
ca principium conveniunt Liniamenta & Epithemata peno-
trantia, discutientia, & ardorem compescientia, calidè ta-
men applicanda: e. g.

℞. Ung. Dulcis. unc. ℥.
Ol. Alisph. dr. ii.
distill. Anethi ℥i.
Camph. gr. ii.
M. D. S.
Unguentum Hepaticum leniens
& resolvers.

Spiritus Vini blandè camphoratus, cum Aqua Plantaginis
vel Rosarium dilutus, vel solutur cum Linco multiplicato
calidè applicatur: i. KELSERO laudatur: Vel præscribitur
tale Epithema:

℞. Aqua hyssopum.

Plantag.

Nymph. ana unc. l.
Nitri depurat. dr. ℥.
Camph. in Spiritu Vini solut. gr. xv.
M. f. Epithema,
applicandum cerebrum calidè
D. S.
Epithema hepaticum.

℞. Aqua flor. sambuc.
Chamomill.
Hyssopum.
Plantag. ana unc. l.
Spiritus Vini camph. unc. ℥b.
Nitri depurat. dr. i.
F. Epithema.
pro Inflammatione hepatis applicandum;
S.
Epithema Refrigerans.
℞. Aqua hyssopum.
Nymph.
Lil. alb.
Plantag.
Rofar. rub. ana unc. ℥b.
Bech. Jantarai.
Camph. in Spiritu Vini solut. ana ℥i.
Nitri depurat. dr. ℥.
M. S. ut antè.

Et hoc tepidè admoveatur regioni hepatis cum Linco
multiplicato.

℞. Aqua Flor. sambuc.
Chamom. ana unc. ii.
Spiritus Vini camphorat. unc. l.
M. S.
Epithema Resolvers.

Insuper ex aliorum consilio Nitrum, cum aceto rosaceo,
& succo Sempervivi majoris, vel Telephi (forte No-
se Germanice vocant) solutum, sub forma Epithematis
externè tepidè regioni hepatis admoveiri potest: Vel imi-
temur FORESTUM lib. 39. obs. 32. & 39. qui mirè com-
mendat in Inflammatione hepatis, ad Abscessum quoque
tendente, discutienda hunc Fotum.

℞. Flor. Chamomill.
Melilot.
Rofar. rub. ana p. l.
Sem. Anis.
Fenugul.
Lil. ana dr. ℥b.
Santal. rub. dr. i.
Coqu. in q. aqua simpliciter:
Colaturæ adde
Acet. Vini unc. l.
Aqua Endiv. unc. ℥.
M. F. Epithema pro hepate: S.
Epithema hepaticum.

Tandem casum & curam singularem Inflammationis
hepatis ex nimia salacitate sanare videb. in JOEL, in sua
Praxi Lib. 3. sect. 4. artic. 3. ubi de hepatis Inflammatione pag.
11. quo loco habet peculiare Remedium, nempe Jecora Gal-
li nigri in Aceto dissoluta & propinata, dum dicit: tibi In-
flammatio hepatis ex immoderata Venere salacitate est oborta,
cui tempore tunc, sublegetur hepatis corruptio & resolu-
tio: quare statim post Venæsectionem (que an conveniat du-
bito) sequens haustus est propinadus.

℞. Gallinæ aligram viventem per medium pedum
dissolutum,
Jecurque ejus adhuc calens in aceti rosacei ℥iv. con-
jicit, & minutissimè conterit, ut tota ejus substans-
tia in Aceto resolvatur: tandem colat & tepidè
Ægroti propinat.

Deinde sequens Potiois quotidie haustulum tepidum
summo mane offert.

℞. Rad. Liquiritia.
Cichor. ana unc. ℥.
Rhabarb. dr. ii.
Fler. Crat. min.
Hepar. ana ℥b.
Cort. inter. samb. M. l.

Contusæ cum Aqua Jili. in Mariæ Balneo coquantur
per 3. horas:
Cujus Liqueoris colati quotidie accipit ℥iv., in quibus
dissolvit

Sperm.

flammationem, eademque remedia hic locum habent. Operum enim danda est, ut quantocytus discutatur ac dissipetur inflammatio, ne niale curata, quod alias facile fit, in Scirrhum eius contumacissimum degeneret. *Salvæ* fessio, quam in *Linitis Affectibus* & præcipue ejus Inflammatione, commendant, Fundamento caret. Præter alia, imprimis Remedia *Saturinus* primario convenire dicuntur in Liene inflammato, qualia sunt *Saturini Saccharum*, *Crysalis minere Saturni*, *Saturus Diaphoreticus*, ad imitationem *Jovis Diaphoretici* paratus, ac similia internè cum reliquis Diaphoreticis in Aqua appropriata propinata.

Externè *Emplastrum de Ciste*, mixturam cum paucis Oleo *Campara* applicari solet. Equidem fuisse nonnulli, ut eidem addatur *Saccharum Saturni*: at melius Linimentum immiscetur cum Oleo *solaceo* & Vitello *Ovorum*, *POPPIUS* applicat *Tiberiacum*, aut ejus loco *Rob Sambuci*, cui *Saccharum Saturni* permiscuit, & sub forma ipsius Linimenti regioni *Splenis* illinit; id quod pariter in Renum Inflammatione quoque locum habet.

Quod si verò inflammatio hæc in Scirrhum degeneret, conveniunt Unguenta, Linimenta & Emplastra incidentia & resolutiva, qualia *suprà* dicti. s. ubi de *Cura Morborum Chronicorum*, annotata sunt: c. g.

℞. Empl. de Mell.

Cumini Ammon. in Acet. quocunque subacti,
an. *℥i.*

Liquefactis adde

℞. Pulv. pulv. ʒi.

M. & malax. cum Oleo dissolut. Tincturi,
Inducatur super Alueam in forma unctæ,
D. S.

Emplastrum Resolvens,

ARTICULUS XII.

De Renum Inflammatione & Exulceratione.

CAUSÆ.

Inflammantur etiam *Renes* ex ipsâ *Causâ internâ*, aliarum Partium Inflammationibus communibus, subinde acido vitio, ex primis viis eo delapso.

Causâ Externâ, in specie occasionaliter subinde excitatur ex nimia Corporis *exercitatione*, v. gr. *Equitatione*, quando Corpus *Expositione* fuscissimum, facile dat Renum Inflammationem. Interdum etiam supervenit *Calculus Renum* insignior, qui aut nimis magnus dissidens ac comprimens, aut minor, nimis dolorosus pungens, atterens, & ad ipsos irritando, inflammationem interdum supervenit: uti etiam ex nimio *Utriculi* exercitio subinde *Renes* ad inflammationem disponuntur. Excitant hæc quoque non raro *Lesiones æternæ*, ut *Lapsus*, *Idus* & *Vulnus*, in *Lumbis* percussa, item *Diarrhoeorum* Medicamentorum abusus, Quæ inflammatio Renum in specie *Nephritis*, sicuti inflammatio Hepatis *Hepatitis* appellari solet.

DIAGNOSIS.

Signa Renum inflammationum & Symptomata concomitantia ordinaria sunt: *Milis Ardor*, dum Urina exundo plura minus fervere, & servendo quasi adurere partes percipitur, adeoque etiam *stranguria* & mictus frequens, cum acerbis cruciatu, ita ut tales *Ægri* crebris quidem, sed & parvis mingant: Urina interdum suppuritur, Corporis flexio ferè ejus impossibilis, vel admodum graviter fieri potest, dolet à retrò, & Deobtus in dorso exacerbât Dolores. Urina sunt paucæ & flammæ, interdum etiam aqueæ & clare, sed quæ semper sine ulla impedimento in Vesica exeant. Dolor interdum ejus pulsans, si ænepe ista Renum pars superficialis inflammatur, in qua Arteria fons miris inferre; obtusus, si centralis aut media quasi carnea Renum substantia magis inflammata sit. Calor & dolor lumbæ graviter, lancians & tenus, qui ejus partium continuitatem & consensum cum raro sursum dorsum aquæ & verius Collas nothas, ut *Ægri* nec erigere se, nec commodè incedere possint, interdum dorsum ad ad inferiora, secundum Uterum ductum, ad Vesicam, item *Concussione* & *Femora* utque extenditur. Concomitantur huic Febres vehementes, continuæ ac inordinatæ. Supor Cruris etiam in regione Renis inflammati percipitur. Supervenit interdum per consensum Vomitus biliosus, utque latus contrax. Interdum, li-

cet raro, observante hoc HIPPOCRATE, non *Rene* inflammato, alter, licet sanus & non inflammatus, cessat agere officium Urinam secretendi, ut sapienter omnimoda fiat *Ichuria* seu *Urina Suppre*: conus rei causa & ratio videtur esse, quod *Rene* etiam sanus ex consensu cum inflammato ratione suorum fibrarum, aliquid convulsi & quasi ipsamodi patiatur, unde porulis coarctatis Urinæ cesset transitus; vel videtur causa esse, quod sanguis nimis copiosus per univerfum serum per Emulgentes ad *Rene* sanum promotum, nimia sua copia ipsi ipsi quodammodo viam præcludat, quominus suo transitu per *Renes* separari queat. Symptomatis hic interdum Alvi suppre accedit, quod huic Morbo peculiare FORESTUS lib. 14. observat. 30. ait, cum extremum frigore.

Ceterum, ut ritè *Distinguat* *Calculus à Nephritis* seu Renum inflammatione, nec confundatur, præter signa inflammationis Renum Diaphoretica, uteris consideranda sunt signa distinctionis horum Affectionum à se invicem; Unde observatur:

1. Quod *Nephritis* perpetuò sit juncta Febri continua Synocha; *Calculus* vero minime aut admodum raro addit eadem.
2. Quod *Dolor* in inflammatione sit magis continuus, & pulsans plura minus similis; in *Calculo* vero sit magis interpositus seu periodicus & gravior.
3. Quod plerumque *Renes* inflammari comitem habeant Urinam ardentem, quæque stillicidium fere mictionis difficulratum; contra verò res se habet, ubi *Renes* exulcerati sunt obstricti, in quo affectu Urina sapienter admodum libera fluere solet, & non semper Ichuria se offert, sed tunc demum, ubi *Calculus* ipis Uteribus firmetur fuerit impedius: vid. UNZERUS & CHARLETON Tr. de Calculo.

PROGNOSIS.

Inflammatio Renum periculosum est malum, & in non adeo robustis, imprimis macilentis, & Viribus exhaustis, frequentius letale, præsertim si Febri acuta cum delirio addit.

Urina alba, tenuis, ac purulenta absque Febri ac cæcærem Symptomatum remissione, & cum Crurum ac Femorum extrusione, Mortem pertendit.

Hæmorrhoidum Fluxus Renum inflammationi superveniens est fatalis.

Tandem, nisi inflammatio Renum discutatur, sed imparetur, dat Ulcera Renum difficilis curabilia, & quæ sæpius ad mictum cruentum disponunt, vel in phthisia Renalem transeunt, de quibus inferius.

CURA.

Pro hujus *Cura* ex eodem fundamento, quo de inflammationibus in genere dictum, Remedia sive sunt discutenda, & quæ sunt perspicua inflammationum internarum. Cum omnibus inflammationibus quoad *Externam* secundum *Cura* Angior procedendum; quoad *Internam* aut secundum *Cura* Pleuritidis. Ante omnia languinis stagnatio per Venæ sectionem resolutur ac derivatoria solvenda, post Clysteris collatiensis injectionem infundenda. Pro *Evacuanda* fiat *Purissio* in *Beschio* sub principium Micti, & si Plethora addit; in progressu vero per *Aporthesi* in Talo seu Malleo: vid. FORESTUS lib. 24. obs. 30. & 31. & RIVIERIUS Cent. 2. observ. 15. Forlan optimo cum successu *Hæmorrhoides* per *Hæmorrhoides* possent aperiri. Iam in his, qui Hæmorrhoidibus afflicti, ac quibus tument, hæc omnino aperiri debent, cum si Natura ex moreat, valde proficuum hoc observetur. Quo facto, vel pro circumstantiarum varietate omisso, notandum, quod necesse pariter propriè dicta quæcumque, nisi per ipsam dolorificè sitidens *Cystitis* laesa cum Terebinthina in Vitello Ovi soluta interdum commodè injici possint, ut etiam que sunt ex Parietaria, Malva, summatibus Anethi, Floribus Sambuci, Violarum, Chamomille, Semine Lini: aut ex his parata Formæ item ex *Lactis* ejusve *Sera* cum Nitro simplici vel astimulata. Clysteris quoque secundum RIVIERIUM Cent. 4. observ. 7. addi potest Aqua Benedicta *Rulandi* ad ʒij. vel iij. Sin Cruribus Ventriculi combinetur, conveniunt Laxativa mitiora ex Manna, Tamarindo, Symplo Rosarum solutiva, aut Mercurio dulci, quem HARTMANNUS in affectibus Nephriticis extollit. Nocent autem *Diuretica* in principio, ut æque cum nimis Urinæ fluxum promoveant, & inflammationem irritant, adeoque nonnulli in

in declinatione Morbi, ubi dolor remiserit, & materia Cocta deprehendatur, pro reliquoque absterfione conducunt, & quidem temperata tantum, & quae simul vim anodynam, sanguinemque congruatum solvendi habent, vid. FORESTUS l. c. Obs. 31. v. g. ex fructibus Alkekengi, Althaeae, Liquiritiae, Terebinthinae; item ommissiones seminum a. frigidorum malorum, Violarum, Lapilli Caecorum &c., licet & Nitrum & Nitratum locum habent.

℞. Aqua Alkekeng.

Crosta.

Urtica. ana ℞i.

Aceti diluti. ℥vi.

Spiritus Sal. dulc. ℥℞.

Tartari vitriolati. gr. xv.

Syr. Med. terreftr. ℥℞.

M. S.

Mixtura Renes refrigerant, coxilem impet.

Dosis aliquot cochlearium.

In ipso ergo Morbo conveniunt *alterantia*, quae sint Nitratum quocunque, ut Nitrum erythralium, praeterit Nitrum cum Antimonio fixatum, item *Saccharum Saturni*; quibus adnumerandae emulsiones seminum quatuor frigidorum malorum cum Semine Papaveris, Lactice, Portulacae, Valerianae, junctis simul feminibus Cardui benedicti, Cardui Mariz, &c. ad *Plenitudinem lantidum*, cum Aqua Equiseti, Florum Nymphaeae, Petalulae, Sempervivi, Lalluae; item Symplicis Nymphaeae, Petalulae, Papaveris, & similibus. Alias *Emulsiones Cancrorum fluvialium* seu *Aflucarum* rectos expressis, qui blandum Alkali in recessu habet, tam cum Juicaco quam *Decoctis Nymphaeae, Prunorum*, &c. exhibitis, tanquam singulae remedium merito ab HARTMANNO in *Praxi Chymiatrica* commendatur; & non absurdum est, quia ad quasvis inflammationes Cancri internae mihi conveniunt, quorum Alkali macrum inflammationes poenter resolvit, & vi diuretica simul Renibus speciatim coarctare videtur; non fecus ac ipsi Lapilli Cancrorum acidum sanguinis absorbendo conveniunt: Decoctum florum Papaveris erratici & Acetose; item Terreae, & absorbentia, cum Opiatis interdum miscenda & propinanda sunt.

Inter *Extensa* cum his internis sedandis & discutendis inflammationi regioni Renum applicatur succus Nymphaeae, Sempervivi majoris, succus Plantaginis ac Portulacae cum succo Cancrorum fluvialium expresso, addendo iidem Camphorae; Oleum item Camphorae illitum, est nobile; quibus etiam interdum parum de Olio pro silendo dolore addi potest. In principio per reliquis convenit Camphora cum Olio Amygdalarum dulcium, vel Rosarum, vel Violarum, vel septem florum *Myrsinoli* soluta, quod crebriter illitum ad inflammationem Renum est egregium; in Camphora enim maximum est *sedativum inflammationum*, dicit LINDANUS: vel distilla Oleum Hyocyami expressum, aut oleum Papaveris expressum, pro illusione externa convenit: item ex *lyce Nymphaeae, Sempervivi majoris* & succo Cancrorum fluvialium, vel cum Olio Rosarum, aut aliis Oleis, vel cum *Unguentis* mediante Vitello Ovi mutab in Mortario plumbeo mixtis fiat *Linas*, externae egregius; cui urgentibus doloribus tantulum Opii crudi addi potest: vel Unguentum ex succo Sempervivi majoris & succo Cancrorum fluvialium cum *Olio rosae* ad humiditatis phlegmaticae evaporationem ebullitis, hinc in Mortario plumbeo diuturna agitatione, ut ramenta Saturni se insinuant possint, misis, sit *Unguentum refrigerans*, quod applicatum conducit, quia absorbet acidum inflammationem excitans. Huc spedit & Unguentum Renale *Myrsinoli*. Denique Unguentum ex Alumine crudo pulverizato, & cum albimine Ovi misto, frigide applicatum laudatur & LANGIO in *Fabrino cap. de Renum inflammatione*.

His vero irritis, dum relinqui nequit inflammatio, Renum suppuratione expectanda, eaque debitis externis promovenda est: Interni per temperata ex *Decoctis Herdi, Glycyrrhizae, Malvae, Parietariae*; Externi vero *Cataplasmata ex Emulsionibus*, in Lacte coctis, applicanda. Ulcere rupto, Midus sit parulentus. Esandae non raram est

ULCER RENUM.

CAUSAE.

Ulceris Renum frequentissima causa est eorum *abscessus* & inflammatio, ut utem *calculi* asporientes, Renes atterentes, successivè eos ad Ulcerationem disponant. Sicut etiam quodvis *aere*, vehiculo feri per Renes transcolatum, eosdem erodere & hinc exulcerare potest: quo pertinet etiam *pus* aut

Tom. II.

Sanguis atris, ex aliis locis ad Renes fluxus. Eodemque *Lac. Viscerae* quoque subinde exulcerat, teste HORSTIO l. c. Obs. 43. licet & *Onchocera Venerea* inconfusè supposita Renem infensum ardet, & hinc non tardè exulceratio, inaequalis lolet.

DIAGNOSIS.

Exulceratio Renum praeter dolorem in Lumbis rodentem, plus minus simul gravitatem, *Urinae parvitas* crebris ostendit. Hinc *Sed. A. Aphorism. 75. HIPPOCRATIS*; si quis *Sanguinem aut Pus* ex Renibus, *Renem aut Vesicam Exulceratam* significat. Sic *Aph. 76. Quibus cum Urina crassa exiguam Cantarella* & soluti *Pili* exierint, *si à Renibus exstiterint*: quod etiam GALENUS in *Caem*, se vidisse neget, ab aliis tamen observatum est.

Causas antecedentes antecedentia ferè ostendunt. In specie *Ulcera* *est ex Inflammatione*, multum puris apparet in Loto, & eodem mingitur, apparet album, sed cum steret, deponitur pus: quod si bene est coctum, & Urina sanctorum similis, suppurationem libelle indicat.

Si vero *Urina* *est ex calculo*, mingitur Urina alba instar Lactis ebullit, statim subsidet, & plane alias est consistens instar cinerum, quo etiam colore refert, & minore gravitate excremitur.

Praeterea dolor morficans & rodens in Lumbis sentitur, à ferro acri & nitroso, quod in transitu irritat & rodit, nulla cum calore sensu.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: Ulcera Renum sunt difficiliter sanabilia, & satis periculosa, saepius lethalia.

Quae sunt ab inflammatione suppurata, minus sunt periculosa, faciliora curatu: *quae vero sunt ex calculo* in Renibus, periculosiora sunt, & non raro in totius Renis consumptionem degenerant.

Sic quae ab erosione sunt Ulcera, etiam periculosiora his, quae ab inflammatione.

Quo magis inveterata quoque fuerint, eo difficilius curabilia existunt.

Alioquin *Ulcus Renum Lambos perforasse*, ibique in *Fistulam degenerasse*, curiole exemplo notavit WILLIS de *Urina*, pag. 364.

Dejectiones ferentes sunt bonae; innuunt enim ruptum abscessum, & evacuationem puris per inferiorem.

CURA.

Quoad *Curam*: *Mundificatio* & hinc *consolidatio* utraque facient paginata, ubi prius universo Corpori ejusque contentis propeclusum fuerit, partim *evacuando*, partim *temperando* haec ipsi, ne occasione horum magis exasperetur Ulcus; in quem finem *Mentha* à pluribus laudatur vid. RIVERO in *Praxi* pag. 146. HORATIUS AUGENIUS lib. 12. *Epistol. pag. 693. VALERIOLA lib. 6. Observat. pag. 453. Hinc Mercurius dulcis* pro mundificando Renum & Vesicae Ulcere cum Terebinthina in forma Pilularum usurpatus, admodum laudatur ab HARTMANNO; *Pilulas* in Ulceribus & Veneribus Renum proficuas videt. in HARBETTE *Chirur. Part. 2. Cap. 7. lib. 3. pag. 336. & Pilulas Quercetani*, quae in Dysuria occurrunt. Lac Terebinthinaceum PLATERI in *Obs. lib. 3. pag. 304. Mique ad 350. ex Terebinthina* cum Vitello Ovi agitata bene, & io quovis Li- quore appropriato soluta: Vel

℞. Resin. Aegy. vel Laric. 3℞.

Mist. Ovi No. 1.

Mell. (quod abstergit) 3℞.

c. l. q. Aqua Flor. Faler. c. Potio lactea.

D. 5.

Lac Renes Purgans.

Hinc *Serum Lactis* vel *Hydromel* copiosè potum, item *Decoctum herbarum & radicis Fragariae*, sed imprimis *Hyperici*, proferum est ad Ulcera Renum; unde ex semine Hyperici Eleduarium ad Ulcera Renum TIMAEUS *ex Galieno* in *Capit. pag. 422. & DOERINGIUS in Tr. de Medici- dat. Decoctum radicis Petroselinii* commendat; quo etiam pertinet Decoctum Chamaedryos & Decoctum Cicorum rubrorum pro purificatione Ulcerum, quod SEBIZIUS in *Tr. de Facult. Medicam.* laudat. Praeflissa Mundificationibus pro Consolidatione *Decoctum Ligurarum* cum *Agrimonia, Hyperico, Chrysosilio* & Decoctum Agrimoniae cum Hyperico in Vitis, quod POTERIUS etiam, uti & D. MICHAELIS in *Collig. Iohanneana* singulariter commendat; & Decoctum

Yyy 2

He-

Hederæ terreftris cum Chamaefolio in Vino, vel Chamaefolio in Vino vel Cerevisia, &c. sunt optima. Quo etiam pertinet: *Rhizomum Hartmanni ex Confera Reforum & Malagrum Seminis hyperici*.

Vel

H. Herb. agrimon.
Flor. hyperic. ana M. i.
Liga. Lentil. unc. iß.
Rad. consol. maj. unc. ß.
Sem. hyper. dr. iiii.

Infusa & coacta deunt per Decoctio: S.
Species ad Decoctum.

Pertinet huc *Decoctum ad Ulcera Remm* *Quercetani*, vel *ihud*, quod dedit in *Colleg. Formular.* Vel

H. Rad. Chios unc. l.
Liquirit. ras. unc. ß.

Agrimon.
Chamaefol.
Heder. terreftr. ana M. l.

Flor. hyperic. M. ß.
Rasur. cornu Cervi unc. l.

Coqui in C. q. aqua simpl.
Colat. Biji. addit.

Hydr. de Symplyt. Fernat. unc. iß.
Rhiz. Valner. Mich. unc. i.

M. D. S.

Potio Renes sanans, pro aliquot vicibus.

Terebinthina Cyprica optimum est auxilium, detergit *Renas*, & per inferius derivat. Dosis à dr. ii. ad unc. ß. In specie convenit, si ex abscessu Eascleratio fuerit orta: quod etiam præstat Malum de capite à gutt. a. ad xv. Ut consolidantia eo melius operari possint, inter hæc eminent Remedia ex cancri fluviatilibus, sive succis, sive eorum in pleuridonio exsiccatorum Pulvis.

H. Cancer. fluviat.

Plenilunio ponantur in Vase terreo non vitreato ad os Furni, ut exsiccetur paulatim, ne crementur: postea contendantur in Mortario lapideo.

Renum & Vesicæ Ulcera egregie curant; quibus dicta quædam Vulneraria appropriata, in ipocæ ex iis simplicioribus, quæ suo loco infra ad Miliur cruentum landabuntur, superaddenda sunt.

Nullum efficacius autem Remedium ad Renes exulceratos dari, quam *Trochiscus de Altheæ*, videb. in AUGENIO lib. 12. *Exp. pag. 695. Sympom. Magistralium in Ulcere Remm*, expertum videb. in HILDANO *cent. 6. obs. 42.* Denique *acidularum* ulus non penitus contentendus in Ulcere Renum de quibus vid. HILDANUS *ibid. loc.* item HEER *ibid. 1. (2.)* Nempe mundificando optimè conveniunt, tum consolidando. *Decocta Vulneraria*, item *Rhizomum ex ascherbenis* cum *Bala armena*, *Terra sigillata*, *Lupulii Canopyum*, *pusa Cervi ossis*, & similibus, imprimis conducunt.

Observeur tandem, quid internum Renes magis in parte extrema Dorsum versum, sapuerunt, & Apoplexia Musculorum Dorsu circa spinam spinali cum tumore dolore occupet: in quo casu ab extrâ facta Abscessus Aperio est optima, ut extrinsecus in Lunbis eorum Pus queat evocari; de quo vid. HORSTIUS in *ibid. pag. 260. lib. 4.*

ARTICULUS XIII.

De Inflammatione, & Ulcere Vesicæ Urinariæ.

CAUSÆ.

Inflammatur etiam *Vesica urinaria*, sed ex Causâ Internâ rarissimè, nisi calculus vel referendus; vid. FORESTUS l. 25. *obs. 27. in Syph.* frequentius vero Occasionem Externam, scilicet in specie à *Cynophoro*, aut illa violente in regione Pubis & Perinæi accepto; vid. BONETTI *Septuaginta. pag. 1232.* & FORESTUS *ibid. 27.* frequentiori Ignitione. Denique supervenit eadem etiam interdum *señsioni casuali* inepte, vel in Operatione, vel post Operationem si nimium hoc seño non rectè tractetur Vesica, ejus corpus, quacunque etiam ex Causâ lætetur, aut alio modo læditur, sicut & Inflammatio Vesicæ accelerari solet, si Agri post

Sectionem Frigidâ potens; tunc enim subinde ad summum die quarto, interdum citius, supervenit ejus Inflammatio, quæ tunc temporis in Gangrenam lethalem, cui infra biduum Mors supervenit; aut si Malum est minus, in pessimum Ulcus fistulosum degenerat. Hoc unicum periculum ex Lithotomia imminet, alias scilicet nullum; quod si præcaveatur, Operatio est securissima. Patet etiam *Cynophorus* quoque tam externo quam interno usui inepto, acrimonia sua rodendo, Vesicæ Inflammationi nonnumquam occasum premere, quod observatum ex Vesicæ interno ex Cantharidibus extrâ apponit, cons. *Méte. A. N. G. ann. 2. obs. 105. pag. 274.*

DIAGNOSIS.

Ceterum Pathemata, quæ ordinariè Inflammationem Vesicæ comitantur, sunt *Tensio*, *Durities*, *ardor*, *Tumor*, ac *Dolor* in regione Pubis & Vesicæ; & quidem admodum is est sensibilis, ac levissimo tactu exasperatur; cui, accedit Urinæ in Vesicâ suppressio seu Urinam reddendi impotentia, & in specie, si Inflammatio Vesicæ in loco infimo prope Collum: Item supervenit propter contumaciam cum Ano *Tensio*, interdum Alvi suppressio; adeit simul *Febri* acuta, plûstamen aut minus, prout major vel minor fuerit Inflammatio, & vel partem membranæ, vel simul circa Collum carnosam, affecit; quibus interdum Vigiliæ & Deliria superveniunt; unde rarum est, quod observatum HILDANUS *cent. 3. obs. 68.* Abscessum Vesicæ ex Causâ ab alto, sine Febre & sine Dolorè.

PROGNOSIS.

Utut rara sit Vesicæ Inflammatio, quoniam minuta admodum & cillia Vasa habet; eadem tamen vera & periculosa iusta FORESTUM gravissimam & periculosissimam est Morbus, quia ut plurimum lethalem, ex facili impervientem Gangrenam; In Partibus nempe nervis facilis Gangraena producit, adeo ut ex omni Vesicæ Abscessibus nullus sit deterior Inflammatione; intereunt enim Agri quæntur ad summum septimo die; interdum, si symptomata mitiora, evadunt, sed raris, cum Metallâ Materie morbosæ circa Hypogastrium & Perinæum, per *Erysipelas* aut urinis suam copiosiorum, de quo SENNERTUS *Præ. lib. 4. Part. 8. lib. 2. Cap. 4.*

Inflammatio & Abscessus, quæ sunt circa Collum Vesicæ, ubi inter Fibras musculas, interdum *suppuratur*, & in pus mutatur, succedente quædam Vesicæ, curata difficillimum.

Mutatam verò jam esse Inflammationem in Abscessum, innuit imprimis Doloris, Febri & Ardoris remissio, HIPPOCRATI E asserente.

Facto postmodum abscessu, si alvus ruptur intra Vesicam, pus cum urina effluit; si vero ad exteriora tendat in cavum abdominis aut Perinæum, supervenit abscessus in linguinibus, ibique sibi viam parat.

CURA.

Remedia eadem ferè conveniunt, quæ in Pleuritide & Inflammatione Renum sunt utilia; & in specie, cum urinae aut Alvi suppressio Malum sepius exasperent, ob id, quantum possibile, removeantur. Hæc optimos esse *Clyster Andromæ* ex solo Lacte, aut ex Lacte, in quo Nitrum depuratum dissolutum est, inieciis, quibus etiam Terebinthina addi potest, *Interdum à Purgantibus & Diureticis* *Hærdi* cum Nitro depurato aut antimoniato, cui interdum aliquid Sacchari Sacrum addi potest, est optimum. Alias profuse Emulsiones seminum Portulacæ, Lactucæ, popaveris albi, quatuor Frigidorum maiorum, & Inflammationi *Renis* *Interdum Emulsiones*, quibus semper Nitrum aut saccharum factum addendum; hoc enim & omnia factorum internum Inflammationem sunt optima Remedia. Spiritus Nitri dulcis etiam hoc non negligendus. Denique spiritus Viterbi philosophicus (qui revera est spiritus Salis rectificatus) difficultat interdum assumptus ad compescendum Febrem conjunctam est optimus.

Externæ quoque conveniunt imprimis *Balnea seu Injections*; item *Fomenta* humida ex Aqua tepida cui incocta sunt Radia

(Z.) *Remm*, immò & aliorum viscerum Ulcera *absurgunt*, mundificam, atque ad cicatricem anali perducant, Aqua nostra Luculliana, & quæ de Pisciparelli applicata, non solum Acidularum more ubertim opta, sed etiam ad unctas res & alia, delicatioribus, jejunis stomachis propinatæ.

dia & Folia Malvar, Althææ, parietariæ, folia falicis, Capita papaverina, & similes herbar Diaphoreticæ seu carminantes, cum lineis multiplicatis, sed blandè, appolita. Hinc post Infusum vel sotum blandissimè inungatur pe-
den cum oleo Anethino, chamæmelino, papaveris albi, Rosarum aut nymphaeæ, & similibus, in quibus campore dissolutum sit, ut ibi discutitur Inflammatio, vel etiam fucus Cancrorum fluvitulum expressus cum oleo Rosarum & nymphaeæ in mortario plumbeo ductus, addendo, saccharum Saturni, vel oleum ejus per deliquium extra applicari potest, & in asperitatem doloris additur simul oleum Papaveris aut hyocyami expressum.

Denique cum interdum metus sit super venientis Gangrenæ in inflammatione vesicæ, hæc ut præcavetur aut inhibeatur, insinuetur confusum RIVERII de Prævi, subentis ut admoveantur cataplasma roborantia ad Gangranam alias usitata (de quibus in Chirurgia) v. g. es Radice scorzonæ, ex Parisiæ Fabarum & Lupinarum in Vinæ decolla, addendo simul Alivæ, Myrrham, & postmodum Camphoram aut Spiritum Vini camphoratum, pro meliori penetrantia.

Hicse modis, si possibile, detur opera, ut *difficultas Inflammatio*, sit minus, *suppuratio*, & hinc *abscessus* & *alvus*, & expectanda: *Alvus* promovenus emollientibus & temperantibus, sæpiù hæctenus recentia.

Quidam vesicæ inflammatae liquores refrigerantes, inopto satis consilio, inopere jubent, eùm tamen syringa non applicari, nec liquor laici, aut si iniciatur, commodò reici non possit: Vid. HERGULES SAXONIA *loc. allegato*, Quoad

ULCUS VESICÆ.

Præter inflammationem suppuratam etiam *Callosi* & *scabiosa* vesicam ludentes item *Cantharides* interitui propinquant, interdum vel gargarè admovent, item *Acris acida* sub vehiculo primo ad vesicam delata, vesicam punic ad scabietem nunc excoriationem & esiccationem, disponant: vid. MYCILLI, M. A. N. C. *Ann. 8. obs. 56. pag. 144.*

DIAGNOSIS.

Comitatur ulceratam vesicam ulnus purulentæ excreptio, ita quidem, ut si vesica incipiat exulcerari, primo sanguis exit, si sit perfecta, pus, si magis adhuc, squamæ & ramenta, quæ Græcè *scabietis*, (A) si gravis & consummata est Exulceratio, gravis Factor in urina est. Dolor adeo gravis in pectine & pube: quoties Aegri mingunt, urinae difficultas accedit; sæpè & tenefimus, & Membri virilis erectio.

Ne autem confundatur exulcerata Vesica cum mentus urinæ ulceratione, observandum: Si Pus & Sanguis præcedant urinam, aut statim in primo exitu appareant, aut etiam sine urina effluant, in pene vitium est: si vero talia cum urina permixta sint, in vesica malum est. Propterea si in pene vitium est, inter mejudum dolor percipitur: quod in Vesicæ ulceribus non accidit, nisi iuxta ejus collum ulcus constitat.

PROGNOSIS.

Sunt autem omnia vesicae alicuius difficillimè curabilia, ut plurimum incurabilia; periculosiora quæ ex Erosione; gravissima, quæ à magno calculo, quæ sine extracto calculo curari nequeunt.

CURA.

In Cura præmissis Internis universalius conveniunt

1. Acrimoniam humorum Temperantia propter Urinam imprimis, & exulcerationem subito exasperantem.
 2. Ulcus sine morbo obdurgentia seu mundificantia, obfermentum Ulceris acidum & hinc pus; vid. *decet*, 12. ubi de remediis exulcerationum cura.
 3. Confidentia, ob resolutionem partis evasæ.
 4. Anodyna, propter dolorem imprimis urgentem.
- Talia tam interdum quam externis adhiberi solent. Est quidem Acro temperant lac, Althææ, Liquiritiæ, Passulæ, Viola, Volaria, facinus quatuor frigida majora: binc decollum chamæphoræ in Lacti mirè laudatur à quibusdam crebrius usurpatum: sic experta potio THONERII, in *obs. pag. 176.* quæ, ut

ait, quasi miraculosum effectum præstitit, & exulcerationem cum urina cruenta subulit:

℞. Herk. agrimon.

Plantag.

Eqvise. ana M.℞.

Rad. liquorit. mund. ℞iij.

Decoquantur in

Aqua plantag.

Inten. ana q. f. ad consumptionem tertie partis:

In colature M.℞. dissolve

Mell. rosæ. ℞iij.

Miscetur.

Simul Ager singulis horis per syringam portionem in Vesicam inject.

Mundificantia Terebinthina, decolla Vulneraria cum Mellis, Balsamum sulphuris terebinthinatum & succinatam, oleum Terebinthinæ, Mercurius dulcis, trochisci de Albrekengi de Canabæ trochisci Gerardi, &c. quæ specificè laudantur.

Confidentia decolla Lignorum cum vulnerariis, uti agrimonis, hypericæ, plantago, hedera terrestris, &c. quibus addatur corallia, lapilli cancrorum, Terra sigillata, Rosula Armena, succinum, stichura Sulphuris vitrioli, stichura antipithica, &c.

Delevum incantat opata, Papaverina, Lactinia, in specie, si à cantharidibus fuerit malum, &c. De Lacte ait AETIUS, nescio an post illam aliam remedium servandum saltem hoc id sit habendum? nam & asperitatem levis, & exulcerationem dicit: cui etiam serum substitui potest.

Ex his variæ possunt fieri formulæ;

Pro prima & secunda indicatione.

℞. Rad. Liquirit. ℞i.

Alth. ℞i.

Saxifrag. ℞iij.

Herb. agrimon.

Plantag.

Torment.

Herb. terrestr. ana M. i.

Flor. Malv. arbor.

Nymph.

Violar. ana M.℞.

sem. alth.

Papav. alb.

Parietar. ana ℞iij.

Fruct. Albrekengi. No. vi.

Sem. Cicer. rub. ℞i.

Herb. mund. M.℞.

Coqu. in q. q. Aqua simplicis:

Colat. ℞iij. addo

Syr. violar. sal.

Agrimon. extracto,

Capill. Veneris,

Mell. rosæ. ana ℞i.

M. D. S.

Potio temperans.

De qua bis vel ter quotidie bonum haurium Ager capiat.

Terebinthinæ imprimis conducunt, in specie PLATE-

RO usitata suis sequens mixtura terebinthinata:

℞. Terebinth. ℞iij.

Mellis ℞i.

Vitell. Ovi No. i.

Vini Malvæ. ℞iij.

Diluta servanda ad usum.

Dosis ℞i.

Vel

℞. Terebinth. unc.℞.

Vitell. Ovi No. i.

Mellis unc. iij.

Agitentur in mortario, donec albescant:

addo

Vini alii,

Aqua Parietar.

Flor. Fabar. ana unc.℞.

Syr. Limon. unc. i.

M. D. S.

Mixtura mundificans.

Imò solum Lac, cui terebinthina cum Vitello ovi soluta,

cum paucis Saccharo permixta, sufficit pro leniendi scilicet & temperandi scopo.

Nec

(A) Ab Idois, Ulcus, est ignis, Ephelcis, quasi Ulcus crassa: quandoque a Galeno sumitur pro ramis, seu cruribus exiguè guttatis, quæ à sanguine expulsi sunt: tussis reici solent: ejiciantur autem signum est de Hemorrhoidibus squamæ quæ sunt sanguinis, & Pulmonum Ulceribus tussis volumina demissa.

Nec Acidula ad Ulcera Vesicæ mundificanda rejiciendæ sunt; vid. RIVERRIUS lib. 12. Cap. 9. SCHOLZIUS conf. 155. & 161. & TULPIUS lib. 2. Observat. 53. ubi refertur Ulcus Vesicæ deperatum, per *Fons quodam* usum curatum. (8)

Sic pro tertia indicatione)

℞. *Rafar. Liga. Lacti. Bili.*

Rad. fariseparill.

Liquiriz.

Eryng. ana. ℞i.

Herb. Agrimon.

Veron.

Rafar. terr. ana. M. ℞.

Flor. Rafar.

Violar. ana. p. iii.

Pessal. mas. ℞i.

Coqu. in l. q. Aquæ ad Bili.

Colatura capiatue crebrius;

D. 5.

Potin resoluens.

Nobilis est observatio THONERII lib. 3. de morb. ref. Obf. 3. pag. 179. ubi refert eructationem ingentem Vesicæ cum urina recenta, & intensissimis doloribus, post Cal. cusi per ichthinem extractionem, aliis omnibus frustra adhibitis, post quodam ex Radice Liquiritiz curatam.

℞. *Rad. Liquirit. raf. unc. i.*

Pessal. min. M. i.

Jujub.

Sclag. ana. M. ℞.

Rad. China unc. ℞.

Incisa & confusa dentur.

℞. *De bio. M. i.*

Herb. M. ℞.

Coquantur in mens. Aquæ, &c.

Hinc

℞. *Herb. agrimon.*

Aquifer.

Plant. ana. M. ℞.

Rad. Liquirit. mand. ℞i. vel unc. ℞.

Decoxit in aqua Plantag. & Heron. ana. q. f. vel sola Aquæ Ferrariorum ad consumptionem tertizæ partis.

In colaturæ Bili. dissolvit.

Mell. ref. unc. i. ad unc. ℞.

Misc.

Et Ager singulis hris portionem per syringam injelet. Interdum etiam fasiculam & Alchimillam addidit. Ad di etiam potest essentia Myrris cum spiritu Vini tartarisato parata, vel Refine Alori ℞i. ad unc. ℞. Vid. Colleg. Formul. & Idea Formulæ. Class. 4. §. 35.

Inter Externa injicienda sunt varia; vel per catheterem vel per syringam: quo pertinent elysmata Terebinthina, & supra Sect. 9. cap. 3. Artic. 1. ubi de Dysenteria, præscripta sumatur etiam *Lac reseri*, *Serum Lactis*, *Mellum*, *Succus quassii*, vel *Plantaginis*, aqua ferrata, in qua Radix *Symphlegis* modice bullierit. Convenit Aquæ calcis viva cum *Sief albi* Rhodi secundum BARBETTE in Chirurgia, vel Iniectiones PLATERO adhibere usitate sunt:

℞. *Rad. Liquirit. unc. ii.*

Citer. rubr. p. i.

Cort. Fabar. unc. i.

Rad. Plantag. M. i.

F. Decoctum in aqua:

Adde parum Lixivii.

In decocti huius Bili. dissolvit

Terebinth. in Melle dissol. unc. ii.

Misc.

In graviore maln potest addi Unguentum Egyptiacum.

Tandem heri potest suppuris Consolidativa;

℞. *Herb. Equiset.*

Plantag.

Summ. hyperic. ana. M. i.

Rad. Bistort.

Crocol. mas.

Lil. alb. ana. unc. i.

Cort. Granat. dr. iiii.

Coqu. in aqua Ferrar. Bili.

In colat. dissolvit

Terebinth. rhod. Opia unc. ℞.

Res. armen. ℞i.

Misc.

Inperlio sanant.

Vel

℞. *Herb. Equiset.*

Plantag.

Summ. hyperic. ana. M. i.

Rad. Bistort. ℞i.

Cort. Granat. ℞i.

Coqu. in aqua obalybenta.

Colat. Bili.

adde

Terebinth. Loric. cum Vitell. Oviset.

Mell. crudi per tranfil. decip. methodo

Avicell. ana. unc. i.

M. F. Injeclio.

D. 5. ut antd.

Quæ per syringam in vesicam injiciatur.

Hæc pertinent Iniectiones & elysmata Terebinthinata, propoita in Colleg. Formulæ.

Vel

℞. *Herb. Alchimill.*

Summ. hyperic. ana. M. i.

Coqu. in l. q. Aquæ calcis vivæ:

Colat. unc. i. adde

Syr. de Symp. Fernel. unc. i.

℞. Vulnear. ℞i. ad unc. ℞.

M. pro Iniectione. 5.

Injeclio mundificans.

Est ad titens in Cello viles, & inde sanguinis per postem egressum, præter interna convenit Injeclio:

℞. *Vitell. Roman. ℞i.*

Aquæ comm. Bili.

f. Decoctio.

Vid. FORESTUS lib. 26. Obf. 1. *schol. in fas.*

Nec Theriacum usus ad Eructationes Vesicæ & Rem negligendus; vid. confil. SCHOLZII pag. 183. (C)

Sed de Vesicæ eructatione curandavid. in specie HORSTIUS Observat. 471. & hinc PLATERUS in Observationibus.

ARTICULUS XIV.

De Inflammatione Membrarum Cerebri

Seu Phrenitide.

PORRO inflammatur interdum quoque partes superioris Ventris, Membrana nempe Cerebri, & insula, utat variis ipsum Cerebrum vid. FONTANUS Anat. c. 6. FORESTUS l. 10 Obf. 11. in *schol.* RHODIUS Cent. 1. Obf. 39. & WILLISIUS de Anim. Brat. lib. 3. cap. 10. Nam cerebrum ipsum si inflammatur contigit, brevi ad corruptionem & hinc mortificationem tendit, adeoque a MONTANO mulierique aliis dubitatur, an cerebrum vere inflammari possit? vel si contingat, an sub curam Medici cadat? De ejus tamen Membranis, imprimis Mater tenuis, res extra dubium est quod inflammationis possibiletatem, cum copiosis reiperis sint Arteriis, quibus respondent Venule in Sinu terminatæ, simulque perquam sensiles sint, in quarum valis si contingat sanguinis introitus & circulum impediri, sequitur Inflammatio: quæ Membranam Cerebri vel solitaria, vel cum parte quadam Cerebri sociata inflammatione, modernis vocatur Phrenitide live Phrenitis, sed perperam, & perversè Vocabulorum usu. HIPPOCRATI enim & Græcis Authoribus Diaphragma vocatur, rem, quod ad intelligendum in lectione Veterum *oio* probè notandum; unde Phrenitis proprio ac genuino sensu est inflammatio diaphragmatis, quæ ordinarij iniequitur Delirium. Dicitur autem *oio* Diaphragma, vel quia Antiquis Mentis sedes fuit reputatum, vel quod in diaphragmate affecto & inflammato Mens per-

z. (B) Vide qua men. Et. 2. notavimus.

(C) Theriacale nostras Aquæ di Gargitello & Subveni homini dicitur, pro balneum nro, efficacissimas experimus in Reum & Pess. p. cauterizantibus: Imo ipsam hujus Syringæ receptæ, ac in Urinam certo quoniam agnoscitur fuit, etiamque insidiosa rejectæ, ut Spynsteris resistitur superari in Vesicam immittitur, hujus Ulcera prær cunctis fidei sanant nisi a Calculo in Vesica contento illa foveantur.

periturus: quam Veterum opinionem, quod obiter moneto, renovavit BARTHOLINUS in *Examinis Parvulis, Med.* qui statuit in centro Diaphragmatis nervo sedem esse fundametalis Animæ: Cùm igitur Interpretes mentem HIPPOCRATIS non intellexerint, Phrenitidem interpretati sunt per Delirium gravius, Febris Ardentibus superveniens, idque ob ignorantiam *ſylis Hippocraticis*: Adeoque Phrenitis proprie & genuino sensu erit *Diaphragmatis Inflammatio*, apud Veteres Græcos fatis frequens, cùm & ejus in *ſylis Hippocraticis* crebra sit mentio. Nam hoc obli-vetur, quod omnia Vocabula Græcorum Medica in vo-terminantia semper significant inflammationem ejus partis, cujus acceptum denominationem, ut apparet in vocabulis *Nephritis, Hepatitis, Pleuritis*, & sic per consequens *Phrenitis*.

Antiqui quoque Inflammationem Membranam Cerebri, aut ejus Cerebri vocant *Sphacelum* seu *Sphacelismum*, uti patet ex Aphorismo HIPPOCRATIS *ſyl. 2. ſect. 7*, ita sonant: *Quibus Cerebrum ſideratum eſt intra tres dies interueniſſe uerū hinc ſuperueniunt, ſani ſunt*: Ubi per *ſiderationem* seu *Sphacelum* Cerebrum inflammatum intelligitur. (D) Hoc male Interpretes explicantes ſiderationem Cerebri, cùm poſſunt explicandum ſi & quibus Cerebrum inflammatum eſt. Taſta conſuetio Vocabulorum ab HIPPOCRATIS tempore orta fuit. Partium igitur Mortificationem totalem HIPPOCRATES & Veteres vocant *ſideraſis*, quæ hodie ab aliis *Sphacelus* dicitur: adeoque *Sphacelus* ſecundum HIPPOCRATEM & Veteres proprie & genuino ſenſu eſt Inflammatio Membranam Cerebri, *ſideraſis* verò Antiquis *Mortificatio* *ſideraſis*, quatenus ſcilicet pars omniſis erat extincta; ſerpens verò adhuc extinctio, dum eſt in ſeri, *gangræna* vocabatur, quod Vocabulum adhuc in tali ſenſu in uſu habemus. Proprie ergo *Sphacelus* in genuino & proprio ſenſu eſt *Membranam Cerebri Inflammatio*, utut idem adhuc ſignificet *ſideraſis* seu Mortificationem, via ad quam eſt *gangræna* Phrenitis verò proprie eſt Inflammatio Diaphragmatis, ſeu Sphacelus eſt Inflammatio Cerebri & Membranam ejus: Conf. SENNERTUS *Pr. lib. 1. Part. 1. cap. 23. p. 403. & 405*, Sed cùm verba valeant ut Nami, recepto uſu *Phrenitis*, Modernorum vocabulo, Veterum *Sphacelum*, id eſt *Inflammationem Cerebri*, ejusque Membranam & inde natam Febrem Acutam plūs minūs continuam, peracutumque ac grauiſſimum delirium, intelligamus.

In Phrenitide ergo Modernorum, ſeu iſta Inflammatione Cerebri Membranam *Calor, Rubor, Dolor & Puſſus*, tanquam neceſſaria & quali *Pathogenomica omni Inflammationis ſigna*, ſunt obvia. Quæ ratione partis affectæ, ex Inflammatione & impediti ſanguinis motu, eſt inteſſibilis, quoniam Inflammata Meninges intus dolent, cùm certum ſit nullam corporis partem ſenſibilem eſſe, quàm eſt Membranas, & quidem dolo acerbiffimum, & horrendus laceratus percipi ſolet. Hinc videmus veros Phreniticis (ut plurimum enim conſiſtunt Phrenitis cum delirio in Febris ardentibus ſuperueniente) avellere capillos præ nimio dolore, & immenſo quali furore caput immaniter contere: propter quem etiam acerbiffimum dolorem malam adob eſt autumut tercio die ſit lethale; quoniam propter dolorem illum ſenſibiliffimum ſpiritus animales nimis diſſipantur, & facile iſtanc partium inflammationem ſequitur Gangræna, & inde Necroſis. Præterea hi *Ægri* propter ſpiritus animales impetu & inordinatè motos mot delirant, adeo ut quæſiti de circumſtantiis caloris vel doloris, v.g. eas ſufficienter exprimere nequeant: Unde talibus inſigniter delirantibus tandem grauiſſima ſymptomata, in ſpecie convulſiones, ſuperueniunt, idque tunc præcipue, quando jam Gangræna imminet. Præterea *Puſſus* in capite adeſt vehementiſſima, de

quo in primo principio conqueruntur *Ægri*, propter Arteriarum in Cerebro motum impeditum; & quanta talis puſſus & inde *Dolor capitis puſſuſque ſis*, exinde poſſit colligi, ſi attentè alpeſcat Collum; apparet enim tunc, quod vehementiſſimè pulſet Arteria Carotis, idque propter impeditum legitimum ſanguinis tranſitum in ſuis extremitatibus. Ex quo colligi poſſet, quantum impetus & quantæ puſſatione ſanguis afluens & in Cerebro vel loco inflammationis ſub Cranio ſtagnans, inferre valeat.

Modernæ ergo uſu *Phrenitis* triſe *Delirium inteſſibilem* & *Membranam Cerebri Inflammationem veram*, *Febris ardens* & *peracuta conſiſtunt*; & hoc, uti dicti, erit Veterum *Sphacelismum* seu *Sphacelus* Cerebri, utut jam adhuc majori abuſu ſerè quodcuque delirium grave, Febris ardens aut malignæ ſuperueniens, ſimiliter vocari ſolent phrenitis.

Patec ex his, veram ſeu Veterum *Phrenitidem* rariffimum eſſe aſſectum, & quem ſerè intra biduum vel triduum infeſquitur mors.

CAUSÆ.

Cauſa Phrenitidis interna ſunt rare, niſi forſan præcedem ſanguinis quendam excretionem puſſellam, aut alius inflammationis Metallæſis, occasione verè Phrenitidis ſui ſphacelo ſubſiſtiſſet. Sic enim in Puerpera propter ſupercapitæ nonnihil Lochia, Phrenitidem obſervauit HORSTIUS *lib. 1. Obſ. 25. & 26*, uti etiam idem obſervauit Phrenitidem ex ſuppreſſione Hamorrhoidum, *cir. loc. Obſ. 46*. Fit etiam interdum, ut Pericranionis ſeu Pleuritides non raro per metallam materiam abſent in phrenitidem veram, ſunt temporis utplurimum lethales. Exempla ſubſiſtiſſet SCHENCKIUS *lib. 1. Obſ. pag. 61*. Ex quidem curam phrenitidis ſuperuenientis pleuritidis elegantem deſcribit BARTHOLETUS in ſua *ſilva de Reſpiratione laſa*. Inflammatio cerebri per abſceſſum ſoluta veram Phrenitidem repræſentat, videri poſſet in LOSSIO *Obſ. p. 18*, & Veribus v.g. PARACELSUS *l. 1. ſ. 2*.

DIAGNOSIS.

Ex his *ſigna Phrenitidis* per ſe patent. Nempe Phrenitidem immergere, concluditur ex Vigilis pertinacibus, ſomnibus turbulentis, ſermonis Immodico, mutante morum, Urina primo craſſa, mox tenui, imò diaphana, capite taſtu calidiore, oculorum torritate, item dolo capitis intus, præcipuis circa Occiput, & Arteriarum Collis atque Capitis puſſatione nimia.

Delirium verò ſimpler à Phrenitide in hoc diſtinguitur quod illud ſit leuius cum intervallis; hæc vehementior & ſerè continua cum intenus doloribus capitis, quorum ratione hoc ſtepſus fricant: Reſpiratione diſſicili, Febre continua & ſicet nulla, quævis hujus cauſæ adſint. Si Inflammatio quædam ſubſit, in Gangrænam degenerans, ferocia remittit, Oculis clauſis proſtrati decumbunt, & lethargici evadunt *Ægri*.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognofis*: Vera *Phrenitis* ſeu Inflammatio Cerebri ejusque Membranam utplurimum affectas eſt peracutæ, utplurimum lethalis, juxta HIPPOCRATEM *lib. 7. Aphor. 50. & lib. 2. Epidem. ſect. 3. Mæren. 4. pag. 733*, & tercio vel quarto die, ad ſummum ſeptimo ſiniens, ita ut brevi poſt ſuperueniat Necroſis pericula, *Ægrique* convulſi interant. Nam & PROSPER ALPINUS *lib. 1. de Med. Mægyr. cap. 13*, reſert; vidille ſe in *Ægypto* Phrenitides

pland

(D) Quæſtione uero Spacelus & Sphacelismum à Præſtici accipitur pro integra & conſumata partis mortificatione, cuſus primis gradibus Gangræna dicitur; nihilominus tiam Hippocrates hoc voce utitur de Cerebri Inſpectu, haud ſanè de illius mortificatione intelligendum; qui enim eras corrupti & Sphacelismum eſſe poſſe Cerebrum, uita ſuperſiſſet aut enim ille citat *Aph. 50. ſect. 7. quid ſi quibus corruptus eſt, ſeu Sphacelus totumque eſt Cerebrum, ſi tertium dicem uiri ſuperuenient, convaleſcant*: & *lib. 2. de Morbis* (ut & *lib. de Fracturis*, & Articulis) de hoc Cerebri Sphacelismo verba facit, *ſiquis ſigna & ſymptomata præ tradit*. Netas autem Mercurialis Sphacelismum non nequaquam præſiſſet hic & alibi ab Hippocrate ſummi: quod & ille à Galeno deſumpti, qui in Comm. cit. *Aph. 50. ſect. 7. ſuntur proprie & genuinæ verbi ſignificationes eſſe* *ſphacelus*, *Corrupti*, *arantes adortis* in hoc, verbum illud nimis pro Cerebri corruptione intelligendum eſt; aſſicit enim Hippocrates poſſe hoc morbo detentum mortem poſt triduum eligere: quod impoſſibile videtur in Cerebri Sphacelo, qui ab eodem Galeno deſignatur *Corruptio ſubſtantiæ unicuiqueque partu*. Hinc ſeriatſt ſphacelum eſſe poſſe quodammodo adducitur Hippocrates verſum: Quibus Cerebrum ſideratum eſt & c. per ſiderationem non conſumtam mortificationem intelligendum. Sed Textus Græcus habet *ſphacelus*, h. e. Sphacelo corrupti. Quævis autem Plantarum & palmarum quod Cerebri & Siderum injuria accideret crederetur. Sideratum appellatur haud tamen Sideratū hęc poſſe Sphacelus eſſe aliud importat, quam Plantarum corruptionem & mortificationem. Hęc ſunt que de Sphaceli ſignificationem aſumit Auctor, niſiſi autem que auctoritate deſiſſet Auctor miſer omnino vellet, Cerebri Sphacelum aliud non eſſe, niſi Membranam Cerebri Inflammationem.

placē lethales, ita ut tertio vel quarto die jugulaverint Aegros.

Alia in inflammationis Cerebri incremento dejectiones Alvi alycantes, & Urinae crudae alidae & pallidae exsistentes, pessimae sunt, ut plurimum enim Aegri intereunt, teste HIPPOCRATE Sect. 4. Aphor. 71. sicut etiam GALENUS lib. 1. Praxid. Comm. 1. lib. 12. nullum phreneticum, quin similes Urinas emiserit, phlegma vidisse scribit; & cum limiles Urinas reddidisset Philus 2. Epid. 3. Aeg. 4. vehementer insaniuit, & quanto deo defunctus est. Huiusmodi phrenitis fons est, & convulsioem tandem accerere solet. 2. Epid. Aeg. 4. Urinas rances se pallidas habuit, circa meridiem vehementer insaniuit.

Si quis in phrenitis vera Dentibus stridet, Delirium grave imminet, iam verò iam adit delirium, convulsio lethalis est in proximo.

In inflammatione Cerebri Membranarum, quibus, ut loquitur HIPPOCRATES, tremulae aut obfuscae sunt delirant, id est, si Aegri sunt minus furiosi, sunt periculosiores, quam quibus tunc delirant tumultuose, id est, interdu phrenetici apparent, quasi dormiant, aut quodammodo quieti sunt, aut nihil minus faciant, quin variis hinc inde insomniis conturbantur, & in se ipsis delirant, adeo ut interrogati licet, inopē respondeant: & tales phrenetici cum talibus variis insomniis & tremula delirantia, ferè periculosiores sunt, quam phrenetici magis furiosi, cum vociferationibus, Artuum contortionibus & similibus.

Lethalem phrenitidem denotant Dyspnoea, Facies cadaverosa, sudor syncopicus, lingua & manus tremulae, stridor dentium, rigor, si floccos legant Aegri, stillicidium varium, dejectiones, & urinae minus tinctae inservantur. Sin verò Febre mitecente delirium non cesset, anphurum in Lethargum, Maniam, aut Melancholiam mutetur; ita quidem, ut affectus soporosi ex phrenitide raro curentur; hinc notatu digna fit observatio ZACUTI LUSTANI lib. 1. Prax. Admir. Obs. 15. quavis in illo subiecto somnus non adeo profundus extiterit.

De cetero phrenitis solvitur vel per sudorem, vel per largam variam haemorrhagiam, vel per Diarrhoeam, qualem etiam annotavit FORESTUS lib. 10. obs. 1.

Quid si inflammatio haec suppuretur, letalis est; unde rarissimum est, quod HERGULUS SAXONIA refert de quodam phrenetico servato, cui pus per os & aures eruperit.

C U R A.

Superest Cura, quae tamen illi habet peculiare prae ceteris in Febribus acutis de delirio conjunctis, & sub delirio commodius tradatur, cum in phrenitide curanda ad duo respiciendum sit: nempe ad ipsam Febrem ardentem inflammatoriam, quae non secus ac pleuritidis & aliae similes curanda; & hinc ad urgentia pathemata, imprimis dolorem capitis & delirium. Adeoque convenit Venesectionis largissima in principio interdum repetenda; quin & praemissis Clysmatibus, & Vomitorio in omni morbi principio mos Sanderifera adhibeatur, ut sanguinis stagnatio maturè primo vel secundo die discutiantur; nam nisi hoc maturè fiat, superveniente Necrosis Aegri intereunt. Inter alia etiam Julepus sequens est elegans.

℞. Bard. mundat. M. li.

Rad. Sicc. ʒi.

Liquirit. ʒss.

Tol. Acetof. M. ʒi.

Ilor. Berreg.

Rosar. ruber.

Violet. ana p. li.

Pessal. mia. cont.

℞f. Cer. Cer. ana ʒi.

Cran. human. ʒss.

Coqu. in f. q. Aqua.

Colat. ℞iv. aciduletur cum Spiritu Vinelli q. f.

Reliquam curam relegatam volo usque ad Membrum 5. articuli 3. Capiti. & Sect. 3. lib. 2. ubi suo tempore plurius tractabitur.

ARTICULUS XV.

De oculorum inflammatione, Vera & Notba.

Inflammatur subinde etiam Oculi, malum satis frequens & ubique cognitum, quod in specie vocatur ophthalmia:

Est vitium contradistinctum Lepidant, Epiphora, & similibus.

Ophthalmia autem est vel Vera, vel Notba, seu Sicca etiam vocata: Illius duo sunt Species, vel Sanguinea, vel Sarafica seu Lymphatica proprio nomine Epiphora dicta, coincidentem ferè cum Lippitudine, nisi quod Lepidant & Epiphora saltem habent proximi rationes nonnulli differant. Inflammatio Sanguinea est inflammatio Tunicae Adnatæ, cum Rubore, Ardore & dolore, Tumore & Lachrymis, sive plus nunc minis fluentibus: Haec verò est affectus suo modo Catarrhalis, nempe copiosa & continua lachrymarum destitutio ex oculis, quae nunc acres sunt, adeoque dolorem, morsum, ardorem, ruborem junctum habent, & vulgo dicitur hamer seu rorarius calidus, nunc miores sunt, & sine symptomatum talium syndrome affligunt, diciturque hamer seu Catarrhis frigidus: sicut Lippidus est affectus limis palpebrarum, in quo copiosissima Lympha lachrymalis, tam ex glandulis angularibus, quam etiam glandulis palpebrarum à STENO NE detectis, erumpit; ratione cuius notabili cum Ophthalmia similitudinis GELSIUS Ophthalmiam Graecorum, Latine Lippitudinem appellavit.

S U B J E C T U M.

In Ophthalmia Vera afficitur Oculi quoad Membranas communes, in specie quoad membranam externam, quam adnatam appellat, subinde verò etiam Cornea & Uvea non leviter afficiuntur; quae membranae, imprimis extimae, contextae sunt ex copiosissimorum Vascularum textura, tum Venularum quum Arterioarum: Impedit ergo motu sanguinis in his Vascularibus sequitur inflammationem, adeo ut Valvulae hae sanguine stagnante distensa magis fiat confusa, & subinde totus oculi bulbus itersumque rubeat. Cum verò membrana haec adnata intus connectatur cum Tunica Sclerotica, à dura matre orta, & hinc mediante etiam cum Uvea à Pia Matre nata, ipsa adnata à pericranio originem ducente, propter hanc Membranarum Oculorum connexionem cum Cerebri Membranis mutas partium adharum conspiratio & plura pathemata per consensum originem. Nempe ratione Pericranii fit, quod in gravi Ophthalmia simul Capitis Dolor, si non pulsatio, tamen contractus, praeter gravitatem, percipiatur. Pater etiam ratione conjunctionis cum internis membranis oculorum, & hinc Membranis Cerebri, quare contafamilis Crani, & internis Membranarum Cerebri, interdum supervenit Ophthalmia, eoque ut plurimum quarto aut septimo die, interdum nono aut undecimo, accedat, aut alter fluxus oculorum cum eorundem rubore; ut in Nephelidia Patavinae aliquoties observavi: quae ipsa fuerunt signa periculosa ad imminutionem mortis, quatenus obiderantur in fida Cerebri Membranarum lesione, aliqualem inflammationem, & exinde Gangraenam & Necrosin. Certe si haec sponte sequantur, periculum signum est. Nam dum stagnat sanguis Cerebro ejusque Membranis per Arterias Cerebros affectis, fit ut uberius affluat ad oculum, ubi impeditur in motu, & Ophthalmia insit. In Epiphora ad Glandulas, ex quibus tale stillicidium oritur, imprimis respiciendum, sive fiat in Oculorum Angulis, sive Palpebris: de quibus videatur STENO in Observ. de Glandulis Ocularum & Nerium.

C A U S A E

OPHTHALMIAE VERAE.

Causa Ophthalmiae in genere est Spina Oculi alieni in externa eius superficie infra, cujus occasione oritur dolorosa Fibrarum stridura, Sanguinis remora in motu, Lymphae ejus uberior per glandulas infusio: vel est quocunque hostis aut inimici, acutum aut acre, perfrictum si Oculum affecerit, plus minus irritaverit, sicque ad inflammationem occasionem dederit: eoque vel Internum, vel externum.

Causa Externa, ut Contusio, Lysio, Vulneratio, Pulveris aversus in oculum illapsus, ut & fumi metallici se infusantes in Oculum, aura asperior, &c. satis sunt cognitae: Sic enim Pulveres afficiendi partes Oculi sensiles, & irritanda, faciunt ut sequatur contractura Fibrarum in Tonicis oculi, & ita sanguis stagnans inflammationem inducit. Unde colligi potest, cur har, ut inflammatio oculorum semel facta, nec adeo rectè curata, subinde recidat: nempe fit illud ob tantillum Fermenti remanentis.

Causa verò Interna sunt omnes eae, quae quocunque ratione occasionem dare possunt, ut sanguis stagnet in Vascularibus minutissimis: sic v.g. in specie Variolae, quarum sanies acris &c.

& acido salis oculis infensissima, propter fermenta acra relicta, frequentius Ophthalmias, & quidem pertinacissimas aut frequentius recurrentes post se relinquunt, ut *supra* ex LIP-SIO in *elegant* Tr. de Variolis monitum, ubi exemplum habet frequentius recedentibus Epiphoram, modo in uno, modo in altero oculo, ex male curatis Variolis. Nam oculus semel inflammatus facile levi de causa postmodum denovo inflammatur, ita ut nunc in hoc, nunc in altero, nunc in utroque oculo recurrat, licet propter robur partis tunc laesum, vel propter eisdem Tomia laxatum, & etiam propter fermenta acra plus minus purulenta in parte relicta. Nempe tantillum fermenti remanens intra tunica oculorum est infus spiritus facile infus, quod exitum facillime inflammacionem oculorum infert &c. Imprimis si alia solenne Sanguina in Corpore evacuationes negligantur & supprimantur, si levis acrida in oculo irritatio, Inflammationem inferunt, hinc suppositus Menfes, hinc tinea Infantum, vel male curata vel sponte evanescens, propter reliqua acra salium (a Morbilla, Variolis,) sequuntur non raro Ophthalmia. Exempla habet GABELCHORUS *Creatar*. 4. Car. 18. de Inflammacionibus oculorum propter omillas solennes scarificationes: item Ophthalmiam observat ex recentis Menstruis *Creatar*. 3. Car. 61. Infantes pariter ex *curant* purulenti *faciunt* oculis, subinde in Ophthalmias pertinaces & contumaces incident. Speciatim tamen acra quodcumque ex Corpore excreandum, cum Sanguine aut Lympha lacrymali, aut quacunque occasione ad oculos delatum, irritando oculum ad Inflammationem disponit.

Ultima *varietas modi afficiendi, Ophthalmia* interdum est *Epidemica*, & interdum *Catastrophica*, item *Periodica*. *Epidemica* est ex Aere nempe incrementi, & effluvis acrioribus inquinato, quo oculus ferient Inflammatio oborta: qualem *epidemiam* gravissimam Ophthalmiam observavit AMATUS LUSITANUS *Creatar*. 7. Car. 10. *cataphala* observata fuit, e. g. si quis Ophthalmias intueretur, simul quoque eodem malo corripitur ratione Atmosphere: quæ ab aëre oculi recepta hinc irritando & vellicando infus Pulveris acris ad Inflammationem disponit, vid. FORESTUS lib. 9. *observ.* 4. ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. *Prax. Hist.* cap. 13. PLEMPHUS *Ophthalmolog.* lib. 3. *cap.* 22. & SENNETUS lib. 1. *Prax. ubi de Ophthalmia*. *Epidemica* denique, & modo in hoc, modo in alio loco recedivam est, a Variolis natam, videbitis in LPSIO l. 2. *pag.* 70.

Differantia etiam habet Ophthalmia *Gradualis*, & in tres *Gradas* dividitur: si enim Inflammationis scilicet initium addit, cum nempe oculum cum Rubore & Calore humidior fiat, & nonnihil doleat, dicitur *Tarda* (E), seu levior oculi Inflammatio, ut plurimum habet occasione externa nata: Quod si Inflammatio supra dicta insignior, præcipue ex Causis Internis, oritur, est Ophthalmia *non Tarda* dicta: Si vero facta sit Inflammatio intensior, ut & palpebræ afficiantur, & quasi inverteantur, cum insigni tumore, nec claudi possint, Albumque supra Nigrum oculi intumescat, ira ut Nigro quasi subsidebat hiatus veluti in oculo appareat, *hypocrypsis* (F) dicitur, ut plurimum ex Causa externa nata. Conf. SENNETUS, ubi de Ophthalmia.

G A U S E.

EPIPHORÆ ET LIPITUDINIS.

Quædæ Causæ Epiphoræ & Lipitudinis, ex sunt triplices: I. Est nimia *Glandularum* aulorum *Laxitas*, quando cædem undecunque, præsertim sub aëre propria, vitæ, aut alias irritatæ, flaccidæ & nimis spongiosæ reddite, per patula nimis ac patenti Foramina Lympham copiosam continuo effluere ac potius elabi sinit, ipsa Lympha alias naturaliter tunc constituta; unde hic affectus nulli insigniori symptomati est adjectus, nisi aliquali oculorum Rubedine, ex sanguineis vasis, quo copiosius & faciliore ejus effluxum, & ob inania semper vasa maiorem turgescunt. Malum hoc *Strabismus* & *Morbiditas* est familiaris; hinc sponte illacrymari in acutis Morbis periculolum ex HIPPOCRATE: illud (in Senibus) quo nativam ratione & Etatis imbecillitatem, dum flaccidæ & quasi detritæ sunt

Tom. II.

Glandula: Hoc verò (in morientibus) propter morbosam funnam prostrationem virium, & hinc spiritum animalium defectum, & glandularum flacciditatem. Facit huc defectus Caruncula Lacrymalis in affectu Græci *εἰς* (G) dicto, quæ Caruncula nihil aliud est, quam substantia tenet carnea, parva glandula Lacrymalis sita, & se infus operculi Lymphæ & glandularum Lacrymarum habens, unde ea vel reoliata, vel ferro ablata, vel à Lympha acris vel Ulcera effusa, vel imminuta, sui absentia fluxu cellæ infert continuum & involuntarium Lacrymarum fluxum: quin & *Rubor oculi* laesum, seu quando glandula oculorum semel laborant Epiphora, & seipsam postmodum ex imbecillitate hinc contrada idem patiuntur malum; unde Sordium, puris, &c. proveniunt, quibus ocula & vicine glandula irritatæ continuo plorant: de qua oculi glandula maiore, vulgo Caruncula Lacrymalis dicta, vid. WARTHON *Adenograph.* cap. 26. *pag.* 160. Hæc est prima Causa Epiphoræ.

II. *Causa Epiphoræ est Læsis & irritatis oculi sensibilibus* ab externa Causa, quocumque modo oculum continuo irritantibus, ut substantia ejus glandulosa læsetur. Quo pertinet pulvis in oculum illapsum, item effluvia acris, v. g. copacea, aliata & piprata, quo salibus volatilibus turgida oculos pungunt & mordent; etiam Aer externus nimis frigidus aut asper, qui oculum lædit: ex quorum totum læsione & irritatione copiosius, & continuo Lymphæ vitiosæ ad oculum contingit affluxus, & sic Epiphora Catarrhalis. Durante effluxu ductus ex copiosius affluente Sanguine, & obexhaustum latere ejus pro impendio Lacrymarum, ab oculis nonnihil spicillat, ut in angustissimis illis vasculis stagnans, Ophthalmiam tandem seu oculi Inflammationem inferat, modum maiorem, modum minorem, cum ejus rubore, dolore & tumore, de quibus *supra* dictum.

III. *Epiphoræ Causa propriè Catarrhalis* constituit: quando nempe ex vitio Lymphæ Catarrhalis habituali, ab interna Causa profecto, per modum Catarrhi præternaturalis Lacrymarum fit effluxus; propitque & frequentius Epiphora constituit. *Vitium Lymphæ* est, quando eadem nimis acris & salia acida in Corpore exsistit, qua concurrente, oculi debilis spongiosa magis substantia glandulosa effusione Lacrymarum copiosam facillè excitare potest. Unde hæc Lympha acido-salsa continuo oculis rodit & vellicat, unde eorum pruritus; & interdum palpebrarum evulseratio. Ex pruritu & Irritatione magis magisque Sanguis à Lympha affluxus promovetur; Nam omnis Lympha sub se continet subtilem quandam acorem adhergentem & detergentem; hinc fit, ut in naturali statu oculi tali Lympha Lacrymali humectati, sit facile mobiles, & ab omni sordibus purificati; simul vero atque hæc Lympha Lacrymalis fit nimis acida, tunc non raro variè oriuntur oculorum mala, imprimis externa, v. g. dolor, oculorum rubedo, pruritus, tumor, Corrosiones, Lipitidines, Inflammatio oculi periculosa, Pusulæ, Ulcera, Fistulæ Lacrymales &c. quæ & in Cæcitatem interdum terminantur hæc Epiphoræ Catarrhales, quæcumque ab acrimonia Lymphæ nonnihil corrolia membrana oculorum sunt aspera, ex asperitate crassæ, ex crassitie tandem opacæ minisque peripicua, ita ut exinde necessario sequatur Cæcitas.

*Causæ huius Epiphoræ Raræ sunt omnes eæ, de quibus *supra* loca in Catarrhis dicam. Inter hæc sunt assumpta quedam ad eam disponentia, ut Nuclei malorum Perficorum, de quibus vid. RHODIUM *Creatar*. 8. *Observat.* 80. *pag.* 43. in ipso Epiphoram ex eju Malorum Perficorum vortem: Interdum specialiter concurrere potius nimis in Vitiis acidulis oculis nocent: Interdum etiam Parentum concupit vitium, cum Hæreditate materna aut paterna oculi Infantum disponantur, ut accedente interna Lymphæ vitio similem in Epiphoram incident.*

Cæterum omnium horum affluum ordinarios comes est copiosissima Lacrymarum destillatio; quæ, si affectus est oculi, degenerat a naturali more, & sunt in dupli differantia, quæ adhuc observanda pro Cura melius instituenda, idque, si ex Causa interna oritur Ophthalmia: Nam interdum Lacrymæ effluent acris, *tenues, acido-salæ*, vel quasi phismius *corrosivæ*, pruritus ascerentes, & Cutim malorum corrodescentes, idque in Inflammatione periculolum est, utpote quæ tunc magis dolet, ardet, & infus Erysipelata cuticulam infestat, idque tunc vocant *Catarrhum acrum*, licet non

Z z z

non

(E) Α' ταραχος, commotio, turbatio: Oculi enim leviter perturbantur.

(F) Χύμας. Chermolis, d' χαμω, liscio, debilio, quid nigra Oculi subsistens, & albo emittens, hiatus enjunctum similitudo oritur.

(G) Ρύσις ὄκου, vitium Oculi, cum caruncula lacrymalis continere nequit, ex erigione nempe, vel simili Caruncula lacrymalis vitio: ὑδακρυον ῥύσις est Oculi fluxus, d' ῥύσις, fluxio, fluxus.

non semper vitium catarrhale adit, sed innuat Lympham Lacrymalem admodum aerem salinam & rodentem, quibusdam Ophthalmia biliosa dicitur: Interdum lacryme non sunt correfcæ, ac sine acrimonia ulla, sed potius subdiles, simplices infidæ, & in his Ophthalmis subdile oculi palpebræ quasi conglutinantur & invicantur, & tunc Lymphæ lacrymalis magis effusa, magis viscida & tenax esse solet, oculum irritant & conglutinat, concurrunt tamen tunc simul aliqui Nutrimenti proximi in parte laesa, vel in Glandulis, vel in superficie oculi, alteratione, quod depravatam Lemæ ordinari vocatur; unde hujus imprimis occasione inviscari palpebræ solent; quæ Lymphæ tamen effusa melior est, quam tenuis & salina.

Ex quæ lacrymarum differentia quatuor Ophthalmia tempora distinguenda: nempe principium est, quando humor tenuis ac plurimus defluit: Augmentum, quando dolor augetur, humorque fit crassior: Status, dum magis coctus videtur humor, h. e. temperatus, adeoque crassior, ut etiam palpebræ conglutinetur: Declinatio cum symptomata remittunt.

Licet autem hæc Lacrymæ sint ordinarius symptoma, tamen distinguuntur eadem: Nam interdum se habent in alia causa, interdum in alia prodit. Communiter dicunt: esse Catarrhalem, sed male, cum etiam ex rebus extrinsecis illis sit copiosior lacrymarum proventus obtingat, licet oculum sit indolis. Ergo attendendum, an vitium sit à Causa externa? an verò interna, à qua generatur lacrymæ? Aliud namque est, quando fit epiphora in pueris ex tinea preloata; aliud est, quando ex irritatione quadam externa: Hinc politeri in casu adstringenda prout, ut priori ea noceat.

Quoad Ophthalmiam arthram, seu, ut aliis vocatur, siccam, hæc est illa, in qua lacrymæ ferè nullæ exsiliant, ut plius minus nodis palpebræ coagulati soleant. Talis Ophthalmia sicca nil commune habet cum vera, præter ruborem: oculi enim rubent, plius minus tumet, æque plius minus prurit: unde tres ejus sunt gradus.

1. Quæ est cum pruritu, & exigua fluxione salina & acrem commixta habet, & dicitur *Arthra*. (H)

2. Quæ cum pruritu & dolore levi & aliqui gravitate sine fluxione est, adeoque saltem rubri & tumidi sunt oculi, & dicitur *Epiphora*. (I)

3. Denique sine pruritu, fluxione, & cum duritie ac asperitate palpebrarum est, & dicitur *Sicca* seu pura lipitudo. (K)

Oriuntur ex subtili, falsa vel acri Lymphæ, oculos naturaliter humefcente, alterante, & ita oculos male afficiente,

DIAGNOSIS.

Manifesta fit Ophthalmia per se ex dolore, ardore, rubore, & tumore oculorum, & ipsorum palpebrarum; quæ omnia sunt signa Inflammationis communia; sicuti etiam per se, & ex relatione Aegri manifestum erit, an Ophthalmia à causa interna? an ab externa originem doceat?

Sanguis Inflammationem excitans nunc per vias oculi exteriora movetur, nunc per interiora, si per exteriora, tumor, dolor, Pulsus in fronte ac temporibus, percipiuntur: si vero à Vasis & Membranis interioribus, dolor profundior & vehementior erit, pruritque in Palato ac Naribus sentitur, ac hæmorrhagie frequentes erit.

Signa Diagnostica Epiphora per se patent: easque tantum distinguende sunt, partim ex relatione Aegri, partim ex sententia Medici.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis: Nulla Ophthalmia est negligenda, in specie si est à causa interna, quia semper oculorum necesse est sit læsio: Interim tamen una major, altera minor existere solet, hinc secundum supra mentis gradus, magis vel minus periculosa ac corabilla est.

Ophthalmia vera per se, seu per se, constitutione, facilius vel difficilius curatur.

Ophthalmia per se, seu per se, Membranis Cerebri internis, dura nempe & pia Mater, & à partibus circa Cranium contentis, saviore & periculosa habet symptomata, & difficilius curatur, quam ea, quæ sit per essentiam afflicto oculo.

Dolor diu in Ophthalmia per se, seu per se, signum est; materiam enim aut corrodentem, aut dissidentem, aut suppurationem arguit.

Ophthalmia distans, aut sepius recurrens, facilius Vilus hebetudo inlequi potest, partim ab Membranis intrinsecis, partim ab humores impuros redditos.

Quando res eo devenit, ut Inflammationem non possit derivari, vel digeri, vel suppurari, ferè perit oculus. Interdum suppurat, & tunc periculum Cæcitatis & Gangræne patitur imminet; quod si eo devenit malum, melius est dimittere oculum, quam cerere perire & mori, adeoque oculum maturè extirpandum est, ne per consensum Cerebri Gangræna communiatur, & mors superveniat.

Ophthalmia differentibus aliis curatur: si sepius recurret, periculum Cæcitatis minuitur, dum occasione suggerit, ut Nebule, Panni, aut cicatrices in perforatione Utræ & Corneæ emantant, vel nutrimentum proximam corruptum, & in humore Aqueo succellivè conglutinatum, infusum inducat.

Ex Ophthalmia, quæ supervenit graviore capitis læsioni, frequenter est funesta & lethalis.

Ophthalmia laborantem superveniens Albi præfluxum liberat: vid. HIPPOCRATES *lib. 6. Aph. 17.* & GALENUS *lib. 1. contra Indolentiam cap. 1.*

Taraxia à causa externa nata, si maturè curatur, sine periculo est; periculiosior autem est Chemosis, seu Ophthalmia perfesta & consummata.

Nihil Ophthalmia non adeo periculosa est, quam vera; distans tamen est, & admodum chronica.

Quoad Ophthalmia ferè, seu Epiphora Prognosis: Infantes frequenter lacrymari solent, & quidem sine insigni periculo, quoniam Dura, & procedente Aetate sponte hoc vitium corrigitur: Invenitur autem autem natus maioribus accidens, contumaciore, facili Epiphora lacrymarum potest ferre.

Qui in Febribus aut aliis morbis acutis videntur Inflammationem, nec oculi tantum affligi, aut Crispi per Inflammationem sollet, inconvenientem est: si vero citra & præ Inflammationem hoc facient, malum signum est; innuit siquidem afflicto cerebrum, & resolutionem faciliat, ut vocant, & periculum portendit, teste GALENO & HIPPOCRATE *lib. 4. Aph. 55.*

Epiphora verò, quæ sit ex Inflammatione Lacrymalis, ferè est incurabilis: si uti est pessima, quæ à Carum, quocunque ex ratione abata, oritur; uti facilius est curato, quæ est ab illius erosione, quam emissione.

CURA OPHTHALMIAE.

Quoad Curam.

I. Causa Externa quælibet, oculum hostiliter afflicta, sunt remota, hinc causa interna respiciendum: Et tandem

II. Sanguis in oculo stagnans resolvendus, & ad naturalem statum & circulum reduendus, & inde orta Inflammatio remota est.

Cum verò causa interna imprimis sit duplex, ob id vel Sanguinis motui, qui oculum tumefacit & inflamat, per Revulsoria remedia prospiciendum, vel acre quocunque oculum vellicare & irritare corrigendum.

Inflammationi leviori, imprimis ex causa externa nata, & ubi non est tantum Aegri periculum, ut in Rubore, ac moderato dolore, pauci interna saltem ex Pharmacis fonte sufficienti remedia. Ubi verò Tumor & Inflammatio sunt magna, aut gravius imminet periculum simul per remedia interna curantur, quibus & alia ex Chirurgia sunt pro Revulsione, Abscessione & Derivatione adhibenda.

In graviore epiphora Ophthalmia, imprimis ex causa interna nata, si Corpus vel peribrium, vel Sanguinis evacuari suppressio fuerit, remedia admodum necessaria erant, cum interdum facta sit Venesectione sensibili alteratio in Inflammationem subverta fuerit. Convenit ergo pro scopo revulsione universalis quidem Venesectione in Pedo, pro scopo averfione vero in Brachio, pro scopo derivativo, si fieri poterit, in Fronte. Et quidem quod in Pedo secunda sit Venæ, confirmat & illustrat egregium exemplum LINDANI supra Hartmannum, dum dicit, se vidisse, quantum valere Venesectione legitima in Ophthalmia in Chirurgo Amstelodamensi, eni dexter oculum fuit inflammatus, ut patet ex Hist.

(H) *Vasa* est scabies: hinc Pterophthalmia quasi Scabies & pruritus Oculorum.

(I) *Arthra* est aridus: siccus: quare Xerophthalmia est sicca Oculorum Inflammatio.

(K) *Sicca* est durus: hinc Sclerophthalmia, quasi Ophthalmia cum Oculorum duritie conjuncta.

Historia superius in *Prolegomenis* Cap. 3. Art. 2. allegata. Unde rectè dicit LINDANUS: quod in principio & gravi ophthalmia primò veneficia sūt inlicita in pede pro revulsione, hinc in Brachio, loco contrario Oculo inflammato, pro revulsione particulari, quæ vel sola in leviori ophthalmia sufficit. In Pede secatur vel vena saphæna, vel, quod melius est, vena poplitea, utpote quæ satis conspicua, & satis manifesta est. Quod vero attinet derivatorum veneficiorum: sanè ad derivationem nil melius est, quam venam frontis incidere: sed hoc habet incommo- dum, ut subsido pro secanda vena Frontis laqueus Colla iniciendus sit, ut pro meliori illius insensibilitate venæ jugulares contrahantur, ubi periculum imminet, ne coarctatis ista venis jugularibus simul insigniter augeretur Oculorum inflammatio: unde non asperienda est, nisi tundi possit vena Frontis sine hac adstrictione, & per se pateat, & potius omnino eadem est relinquenda. Non tamen nisi permissis hæc venæ Frontis incidatur; siquidem post eam impetivisse sedam ophthalmiam gravissimam, Vilus & loquax perditionem observavit HILDANUS *Creat. 5. Oph. 11.* interdum etiam pro derivatione arterio- mia temporalis in ophthalmia contumacissima instituitur: vid. NICOLAUS FONTANUS in *respons. & Curat. Med. I. 1. p. 30.* ubi habet exemplum ophthalmiam per intervalla sæpius recurrentem, idque cum periculo Vilus, quæ tamen in- cisione arterie temporalis curata, & *Funiculo* in brachio præservata fuit. Nec in casu difficiliori venarum jugula- rium incisio incepta & adeo, ut vulgo creditur, periculosa est testante HILDANO *Creat. 4. Oph. 14.* ut tacemus NICOLAUM FONTANUM I. A. MERCATUM, & RIVERIUM, qui omnes ex GALENO arteriotomiam com- mendant. Primò igitur veneficium in parte remotiore, hinc propinquiore, ut vena Frontis, vel penè aures administranda, nec auscultans ZACUTUS LUSITANUS *lib. 1. Præf. Oph. cap. 17.* ubi in ophthalmia magna & atrociori primò a parte affecta sanguinem mittere jubet.

Hæc etiam pertinent *Cantharidibus sanctis* posè Aures applicandæ, vid. RHODIUS *Creat. 5. Oph. 79.* qui scilicet harum ulum habet, ut ut tarò in usum vocentur. Quo etiam speciat *Hystricia* Nuchæ, in cervicæ, loco venæ Frontis secandæ, ut etiam ponè aures applicata, sub pin- nula sine lobo, quæ pro æstione utilissima ac sanè pro- ficua sunt; mirum est, quantum hæc juvent in inflammatione Oculorum, vid. LUDOVICIUM in *Pharmac.* Utque enim hæc saltem sint remedia privilegia, & medentur Oph- thalmiæ à posteriori, tamen verissimum est, quod multum illi valeant. Neque ipso credidissimè horum fructum adeo insignem esse, nisi ipse eandem vidissim. Et quidem nuchæ applicata juvant sensibilibus, si rectè sunt, quæ ibidem arteria cervicalis se dividit in duas partes, in interio- rem, etiam ad Oculum progredientem, & in exterioriorem circa Nucham hinc inde diffusam: unde vesicatoria, dum in Nuchâ faciunt dolorem, audierem ex linguis promoven- tem fluxum, dum ex ramo hoc interiori fit derivatio quasi ad ramum exterioriorem, ut minori impetu ac copia sangui- nis ad Oculum affluat. Quibus autem non est cutis sanabilis, faciliè non conveniunt vesicatoria, ut hydropeici; nam ad Gangrenam disponent, vid. ROLFINGIUS.

In contumacissima ophthalmia, ubi non sufficiunt vesicatoria, cum ulcus superficiale post aliquot dies deorsu- sedatur, *Serapion* applicetur Nuchæ, (quæ apud Veteres di- versis membris applicata in usu fuerunt,) perquam molo- tum quidem, sed potentissimum & summe proficuum in Oculorum affectibus diuturnis remedium (L), quod po- tentius & cum maiori efficacia ferream eliminat, atque ejus stagnationem corrigit: tandem aptem apertum servetur, quousque levamen æger inde sentiat, & de quorum egregia præstantia in ophthalmia vid. GABELCHOVERUS *Creat. 4. Oph. 38.* in *schol.* HORSTIUS *Doc. 7. quæst. 1.* HILDANUS *Creat. 5. Oph. 41. & 42. & Creat. 4. Oph. 6. & 7. 14. 19. & 21.* GLANDORIUS *cap. 7. & 24. & SCULTETUS lib. 1. Tab. 3. Figur. 1. & 2.*

Loco cuius tamen adeo molesti, in ophthalmia vel inver- teratis contumacioribus, vel ex causa interna crebrius re- currentibus, quales in specie in *Infantibus* observantur, fœ- ciali optimo consilio non rarò in Brachio vel pede illius la-

Tom. II.

teris, seu palliativum remedium, excitandi fuit, qui im- m' sit mirum est, quantum possint, in infantibus etiam quæ- que vel lex ascorum, qui sub pubertatis ætate, si ita visum fuerit, deinde consolidari poterunt. ROLFINGIUS ta- men in *Epiph. Meth. cogn. & cur. part. temporis affectus* pag. 91. fonticulum in cervicæ vel bregmate excitat; RIO- LANUS *Enchir. Pr. pag. 155.* in cavo Auris pollicem; & RIVERIUS *obf. à Morbis comm. 7.* in Nucha fove spatio intercapalari; denique, & quidem commodissimè, in bra- chio lateris Oculi affecti. Aut loco secæci in Nucha re- medium est quasi vicarium fonticulum auricularis, *Auricu- lare quasi fonticulum*, ex *Radice Thymlæ arteriolescentis* (est illa *Thymæa* in specie, quam TABERNÆMONTANUS *lib. 3.* nomine *Thymæa graminoides* describit, loco cuius & *chamæa vulgaris* seu *Mexerem*, item cortex Radicis Eri- thæ, & hellebori nigri, potest substitui,) qualem fonticu- lum auricularem, ex radice vel hellebori, vel lanreolæ deus Mexerel confectum, seu singulare nobis communicavit Dr. D. MICHAELIS: de quo etiam vid. RIVERIUS *rem. 4. obferv. 100.* item VELSCHIUS *additionum. cent. 1. obf. 67. annex. appendic. Miscell. A. N. C. ann. 4. p. 59.* BAR- THOLINUS *r. 4. obf. 10.* TIMÆUS *lib. 1. Epiph. 23. pag. 52.* & TABERNÆMONTANUS *lib. 3. pag. 20.* Nempe radícula dissecta in fibrillas, quæ lobo aurifer- foratè immittuntur, nempe efficitur in orbiculum dividitur, postea maceratur in liliivæ ex vitium cineribus factu, vel in Aqua, in qua nitram solum sit, sine præpara- tione enim Aures corrodit & inflamat, quæ acrimonia etiam acidis obediunt potest. Perforata Aures, sive Butyro pingui trajecto, promota suppuratione, secunda vel tertia die fibrula radice vel orbiculorum imponitur, quæ Hu- mores poterit ex capite ellicere; singulis diebus recens im- mittitur, prior tamen excusata & purgata secunda & ter- tia vice ulum eundem præstat. Confert non solum in gravi- ori ophthalmia, sed & in *suffusionibus* incipientibus, aliisque malis visum hebetantibus; item in *Epiphoria* magnam alfert com- modum. Hujus locum *Radice hellebori* recipit TIMÆUS *con. galenicæ in Epiph. 20. lib. 1. pag. 52. (M)*

Cæterum vesicatoria dictis locis applicanda variè paran- tur, ordinario quidem ex feraceo, cantharidibus & Aceto; mala tamen, cum excident vesicæ dolorosam, & præ- ter hæc id noxæ scum ferunt, quod vesicæ excitatæ non adeo commodè solvant. Potius hæc sequenti modo:

2. Empl. citrinum:

Subigantur hoc cum *Pulveris cantharidum* quantitate de- bita, pro ut major vel minor excitanda est vesica, & in forma Emplastri applicetur Nuchæ, ex seculum ex- citat vesicam.

Vesica fœcilis facta aliquandiu servetur aperta, pro quo scopo vulgo quidem solum Bracice rubræ calefactum ap- plicant, quod quidem aliquid præstat, brevi tamen iterum coalescit vesica. Et peccant hæc Chirurgi: nam utut folia illa cum caule applicantur, tamen iterum coalescit vesica. Præter hæc admovent quoque emplastrum de spermate Ranas, sed hoc adhuc penus est, quin potius opimum pro aperture servanda est, ut applicetur emplastrum ci- trinum, vel emplastrum de ceruâ, vel de spermate Ra- narum, cui pro stimulo tantillum pulveris cantharidum ad- ditum sit, talis nempe quantitas hujus, quæ solum irretit & pungat, non autem valeat: ita quidem vesica semel ex- citata ad aliquot septimanas optime potest in continuo fluore conservari. Pulvis huius pro subiectione variatè plus vel minus sumendum est, plus scilicet in illis, qui cutim densio- rem, minus, qui molliorem obtinent. Aliis ex canthari- dibus nil periculi imminet, nisi quod excident in quibusdam mîdium eructum, Eulcerationem vesicæ, vel strangu- riam, quod tamen inter mille vi uni contingit. In delica- tioribus subiectione loco seracorum & vesicatoriorum etiam sacculus HARTMANNI sufficit, ex pulvere seu Farina feminis Eracæ vel Usapi paratus, qui Nuchæ applicatus cutim rubefacit, & ophthalmiam inhibet: vid. *Pr. chy- mias. pag. 99.*

Confert quoque *saphirus* in ophthalmiis & nimia Ocu- lorum Lippitudine, si circulus circa Oculum ducatur.

Præter hæc & *Interus ex Feste Pharmacopœia* ophthalmiam contumacioris, aut ex Lymphæ dyscrasia fœpæ recidivæ-

Z x x 3

tes

(L) Ex Situ per Cervicem trajecto Ganglionem fallane, atque inde mortem fecerat vidimus: *Isa fœcilis nervus* quodam à Chirurgo ferro perforet adhibens.

(M) Sapè, ut *verum* fassamur, peritantes & recidivantes Ophthalmias curavimus Auriculæ lobo quo ignis ferri perfora- to, ac ramulo *rhymælae vulgaris*, vel radicle *hellebori nigri* in furcram immissa, ad sanem pro longum tempus inde pro- ficuendam: facta enim diverticula, Oculi ab Inflammatione immunes facti sunt; imò & Pylæ: bebetudini medicina facta est.

tes curandæ veniunt; adeoque, præter *Purgationem* cum *Jalapâ* scilicet, *Douilla Lignorum*, Radicis chinæ & *Lasioparillæ*, præsertim ligni *Juniperi*, & omnis *juniperina*, sunt optima, & à *ZACUTO LUSITANO* lib. 1. *Prax. Histor. cap. 13.* commendantur. Sic *HORSTIUS* lib. 2. *Observat. 32.* observat ophthalmiam contumacem aliis irritis *Dentelle Safforæ* & *Liquorum* curatam. *RULANDUS* quoque in *Theat. Pratt.* pag. 61. refert de Muliere quadraginta annorum quæ Oculi robore, dolore, & lacrymis & cæcitate diu affecta, post alia plurima tentata, decem dierum spatio hæc convulsi. *Purgata* fuit prius *Pilulis* hinc *Dentelle Ligni Safforæ* per decem dies iis, post *Sudorem* impoluit *Aquam Ophthalmicam ex Antimonio*, & sic convulsi. *Cont. GALENUS* lib. 13. M. cap. 11. & *ROLFINGIUS* lib. 3. *consult. med. 4.* ad *Sanctorem* ophthalmiam *Antidotum* magna habenda est ratio: Nam *Ophthalmia ex Famæ metallicæ*, frustaneis externis, per interna mineralia curata fuit ab *HORSTIO* lib. 7. *Observat. 27.* Sic *BARTHOLINUS* ophthalmiam in prægnante, quoties Uterum gerit, portanter recurrentem, *Sternutatoriis* & *Venæsectione* curavit *Cont. 6. Histor. 38.* ophthalmiam *Galligam* *Mercurio* curatam videtur in *ZACUTO LUSITANO* lib. 1. *Prax. Observat. 45.* Denique *Cinnamomum* jejuno stomacho comestum fluxiones in Oculum promoret, teste *PANAROLLO* *Præf. 2. Obs. 28.* Quibus insuper accedunt alterantia Cephalica & exsiccantia vulgè dicta, exempli gratia *Feniculum*, *rosmarinus*, *euphrasia*, *Betonica*, *valetiana*, & ligna aromatica, horumque decoda & offentia.

Quoad remedia externa seu *Topica*, ipsi Oculis admoveenda sunt varia: prædictis pluribus in usu est communis, ut applicant *Lac* imprimis *muliebrem*, nunc solitariam, nunc alium mixtum, sed pessimo consilio: item interdum propter dolorem quidam applicant *Opium*, sed pessimum periculo cum eventu: *Opium* enim demulcet quidem dolorem, sed simul in ophthalmia illud & omnia *Opia* sunt nociva, quia facili inflammationem ad *Cacitatem* & *Gangrenam* disponunt & inhibent insensibilem transpirationem. Sic quoque *Lacticia* nocet: *Lac* enim quocunque *frecenti* infillit oculos, incruat eos unctuositate sua, & quasi fordibus inficit unde impedit insensibili transpiratione ejus: tunc maxime necessaria, inflammationem potius augeat: Si verò *Lac non pressa* applicetur, nocet subtili suo acore, quoniam *lac muliebrem*, sicuti omnia alia *Lacticia*, facili acorem contrahit & ita accendens oculum reddit, *grumescit*, & in *Cascaum* abit; qui *Grumi* Oculis incumbentes eos excitant maxime fuscis, adeoque ophthalmiam majorem reddunt: unde cavendum nobis ab opio & *Lacte*, nisi summa urgeat necessitas. Reddè igitur *LINDANUS* dicit; sic facillimè vidisse *Lac* & opium applicatum, nusquam tamen felicem usum observasse. Quæ ergo conveniunt in ophthalmia externæ, sunt imprimis *Sperma Ranasarum*, vel per se servaturum, vel secum *TACHENIUM* destillatum; item *Aqua Cameræ* *flavellatum* es illdem confusa, & cum putrescente incipient, maturè destillata, elicita, in specie *Aqua Cameræ* *flavellatum* cum *Chelidonio* majori aut succo ejus destillata: de modo vid. *MYNSICHT in aram. chymic. pag. 296.* item *CROLLIUS* in *Basit. Chym.* Item Oleum seu portio liquor *Ficthori* cyani, liquor *Borum Calcatrippæ* aut *florum* *Hicthori* per deliquium sunt, quos omnes *Antiores* *unatim* commendat. Parandi modus vid. in *SCHROEDERO*, ubi de *Chelidonio*, & *HARTMANNO*, ubi de *Ophthalmia*, item in *SENNERTO*, ubi de *Ophthalmia* pag. 76. Sed observanda sunt encheireses: Flores *Rore* matutino humidi Vireo includatur, (Vitra sint crassa, & quo crassiore crassa *Siracena* adducatur, eo melius est); materia fœtenda est aliquando in aere siccat, ne dirumpatur. Raro una vice sequitur liquor, reliquatur donec bene coquantur *Panis*, & distilla. Nobile remedium est; in quoque ophthalmia egregium. Succus *Baccarum Herbe* *paridis* expressus excellens habetur remedium ad ophthalmiam & *Epiphoræ*; vid. *VELSCHIUS* ad 30m. 25. cap. 1. *anac. Anac. 4.* M. A. N. C. Huc pertinet phlegma spiritali vitrioli epileptici, quod altera vice prodit, oleum *charchari* per deliquium, spongiæ *Sambuci*, Aquæ *florum Sambuci* aut *calcatrippæ*, infusæ & applicatæ. Moelligines etiam feminis *Pisylli*, *cydoniorum*, *sœnugræci*, *althææ*, cum *Aqua chelidonii* majoris aut alia appropriata extrahunt, addito *saccharo Saturni*, & *cantillo camphoræ*, etiam sunt egregiæ, cum *lacte* multipliciter applicatæ; in specie si à causa externa oriatur ophthalmia: ver. gr.

Æ. Aqua Pl. Cyani 3i.

Mucil. sem. cydon. cum aqua sperm. Ræ. extr. 3i.

Crui gr. vi.

M. l. Epithema.

D. S.

Epithema Refrigerans & leniens.

Vel

Æ. Mucil. sem. Cydon.

Hermi.

Sacchar. cum aqua Chelid. mei. vel sem. Cyani extr. ad 3i.

Sacch. Saturni gr. vi. id. ad 3ii.

Dissolvantur cum l. q. *Aqua Fœniculi*, vel *Chelidon. major.*

vel *Euphras.*

ut percutat pro collyrio.

D. S. ut antea

Nam ipsum *saccharum Saturni* cum *Aqua* appropriata dilutum & Oculis impolitum, est egregium antiophthalmicum.

Vel

Æ. Aqua Euphras.

Penic. ana 3i.

Album. Ovi Num. i.

post conqussationem dissolve

Sacch. Saturni 3i.

M. S. ut supra.

Applicatur tepide cum linteis.

Saccharum fœviale, ut vocat *LINDANUS*, est præstissimum, quod sequens est;

Tetatur *saccharum Candi* probè contritum in *cyatho* vel *scatella flammae* *seva*, an *asurgata*, cum *sevo Cechleari Ranneo*, itaque tandem, donec *saccharum* bene tritum & agitatum fiat insillat *Plumbi* lividum, & quo magis livet, eo est melius. Nec potestis nimis diu terere, & sic habebitis optimum ophthalmicum, quod vel in forma pulveris scorum potest Oculis insillari, vel cum aliis appropriatis admisceri; ver. gr.

Æ. Aqua Plantag.

Rosif. vel sem. Ranas.

Penic. ana 3i.

Sacch. Candi fœviale 3ii. vel 3iii. ad 3i.

Tutif. prop. 3i.

Crui Or. gr. ii. vel iii. ad iv.

M. l. exinde collyrium.

De quo ter vel quater in die gutta: aliquot in Oculum insilluntur, Dicit esse usum optimum, refrigerare & discutere dolores. In principio enim morbi, dum dolus, rubor, fervor, & lacrymarum acrimia fluxus urget, absorbentia metallica appropriata imprimi conveniunt, quia sunt in specie tuta preparata, rubrica, cretula, creta, & hinc flores *Zinci*, flores *Jovis* à *BARBETTE* laudati, quæ sunt appropriatissime absorbentia & correctiva acris plus minus acidis, Oculis inflammantia: quibus addatur *Mater Perleorum*, *Lapidæ Cameræ*, *Lapis calaminaris* exactissime præparati: verbi gratia.

Æ. Aqua Pl. Cyani

Euphras.

Verber. ana 3i.

Tut. prop. 3i.

Matr. Perl. prop. 3i.

M. D. S.

Aqua ophthalmica.

De qua Mixtura insilla aliquando in Oculis, & simul mardentes pecias impone.

Vel

Æ. Aqua Chelid. maj.

Euphras.

Penic.

Ruta ana 3i.

Tut. prop. dr. i.

Margor. prop. gr. vi.

Camph. gr. iii.

M. S.

Aqua ophthalmica singularis.

Vel

Æ. Aqua Plantag.

Penic.

Sperm. Ranas. ana unc. i.

Tut. prop.

Cerass. pulverif. ana dr. 5.

Camph. gr. vi.

Crui gr. ii.

sicut in loco calido:

D. S.

Collyrium

Facit

Facit huc Collyrium Lippis tantum Ophthalmiam an Variolis
facillime recurrentem. Casus nobilibus & curiosus: Descri-
ptio rudis hæc est:

℞. Tur. præp. ℥i.

*Vitriol. alb.
Sarcocoll.
Mell. alb.
Alcis lene ana ℥i.*

*Camph. gr. xv.
Aqua Fœnicul.*

℞. r.

Chelidon.

Pimpinell. ana ℥iij.

Album. Ovi Num. i.

Offi. Sep. ℥i.

M. f. Collyrium.

Quo ipso post Variolas secutam Oculi Ungulam seu Un-
guem etiam feliciter fuisse.

Vel in eodem casu convenit sequens Formula, quam de-
dit *an Caffey. Formula.*

℞. Aqua Plantag.

Euphor. ana ℥i.

Tur. præp. ℥℥.

Camph. gr. v.

Crocigr. ii.

M. pro Collyrio; S.

Collyrium.

Infunditur aut applicatur Oculo; Visum præservat à Va-
riolis.

Porrò Phlegma Aluminis primò prodians insigniter lau-
datur à POTERIO, & etiam aliis. Egregium etiam est
Albumen Ovi cum aqua Spermatis Ranarum bene con-
coctum, in principio applicatum. Egregiè etiam con-
venit Albumen Ovi cum *frago aluminis* probè conculsum &
concoctum in patina stannea tandem, donec *thymum*
consensum adeptum sit, tunc solutario, tunc ana, respo-
du albuminis Ovi, vel parum *agae Rafarum* aut *fœniculi*
addendo: Conf. BORELLUS *ana. i. elix. 37.* hoc exten-
ditur supra Linteum duplicatum, & tepidè Oculis applica-
tur, conducit in principio Ophthalmiam.

℞. Aqua Tormentill. vel Rafar. vel Flor. Cyani.

Plantag. ana ℥i.

Album. Ovi Num. i.

Alum. gr. v. vi. ad viii. vel ℥℥.

Coquantur probè:

D. S.

Mistura Oculis refrigerans.

Cum quo colicidat, si recipiatur *Lysicharg. aur. pulverif.*
q. v. idque decoquatur in *auri Vini q. i.* ita surgit Liquor
dulcis adstringens, quasi aluminosus, qui filtratus per chartam,
& cum Linteo Oculis impoñitur, egregiè prodest.

Infusa etiam *antimonialis* optima: nempe Aquæ des-
tillatæ Florum Cyani & Calceatippæ, Chelidonii majoris,
Euphrasie, Fœniculi, &c. optime infunduntur Croco Me-
tallorum, Vitro Antimoniæ, aut, quod melius, Capiti
mortuo Butyri Antimoniæ pulverisato, quæ probè filtran-
tur, siquidem ad hunc modum parantur *agae Ophthalmicæ*
Crocoli & Rosædi, quæ Oculis infunduntur, vel cum Linteo
multiplicatis, sunt egregiæ, addendo fimo, ubi Ardor ure-
get, Saccharum Saturni aut parum Camphoræ, v. g.

℞. Vir. antimonii pulverif. ℥℥ ad ℥i.

Infund. in

Aqua Flor. cyani

Calceatippæ vel Euphras.

Sperm. Ranar. an. ℥i.

Stent in loco calido per noctem: mane filtrantur; adde

Sac. Saturni ℥℥ ad ℥℥.

Camph. gr. iii. vel iv. ad vii.

M. D. S.

Collyrium.

Infunditur Oculo, & cum Linteo multiplicatis tepidè ap-
plicetur eidem.

Quod si intensus Æstus simul adfuerit, addi possunt sac-
chari Saturni ℥℥, & Camphoræ gr. v. Vel

℞. Vir. antimonii pulverif. ℥℥ ad gr. xv.

Infunde in

Aquæ sperm. Ranar. vel Fragæ. ℥iij.

Stent in loco calido per noctem: mane filtrantur; adde

Crocigr. vel Sacch. Saturni subtilissimi pulver. ℥i.

℥℥ ad ℥i.

Camph. gr. vi.

M. S.

Collyrium.

Pertinet denique huc etiam *Vitriolum album*, Germanicè
Gallin. cælestis, & hinc Vitriolum Cyprium, quæ egregia ad
Oculorum Inflammationes sunt Remedia, si scilicet eorum
uorum Albumini Ovi indurato & excavato iudatur, ut lique-
scat; sic enim fit Collyrium Ophthalmicum magnæ com-
mendationis: in specie misceri possunt cum Tutia præpara-
ta, ubi Lacrymæ aciores adfuerint. Vel

*℞. Ov. gallinæ. integrum ad duritiem coctum, &
empto Viscello excavatum:*

Cui immisce

Sacch. Saturni gr. vi.

Vitriol. alb. gr. viii.

Camph. gr. ii.

Mell. Rafar. ℥℥.

Hæc indantur Oro, & fiat expressio fortis: expressus

Liquor infunditur subinde Oculo:

D. S. ut supra.

Ubi observetur, quòd tale Collyrium imprimis conveniat,
ubi Lacrymæ nonnulli sunt crassæ, & ubi irascitur Pal-
pebra Oculorum.

Quantum enim valent Milleum ex Vitriolo albo in Oph-
thalmis, vid. in RIVIERII *Praxi*, BARBETTE *cha-
rurg. p. 150.* & THONERO in *op. obs. pag. 116.* ad cu-
jus imitationem aliquoties præscripfi:

℞. Aquæ Rafar.

Plantag. ana ℥i.

Solan. ℥i.

Vitrioli albi ℥i.

Solve, filtra, & adde

Tur. præp. ℥℥.

M. D. S.

Collyrium.

Hoc collyrium bene agitur cum linteis induratis & ex-
pressis: tepidè applicatur Oculis, quod egregiè proficitur
dum aliquot grana camphoræ addita fuerint.

De Aqua rosarum vid. TACHENIUS in *stippæ. elym.*
cujus loco potius Aqua Rosarum Cyani vel spermatis Ranarum
sunt sumi potest.

Alum. formosan vid. in *collig. Form. & a. Vel. v. r. r. r. r.*

℞. Aqua chelid.

Camphoræ ana ℥i ad ℥℥.

Vitriol. alb. gr. iij. vi. vii. ad ℥℥.

dissoluit & filtrata adde

Tur. præp. gr. iii. iv. v. vi. ad ℥℥.

M. pro collyrio, Oculis applicando.

D. S. ut supra.

Vel

℞. Aqua chelid. maj.

Flor. Cyani

Calceatippæ ana ℥i.

Vitrioli albi gr. xii.

solutum filtratur per chartam:

adde

Tutia præp. ℥℥.

M. D. S.

Collyrium.

Vel

℞. Aqua Fœnic. vel Rosæ.

Euphor.

Flor. Cyani ana ℥℥.

Vitrioli albi gr. iv. vel viii.

Solutionem filtra per chartam emporeticam:

adde

Sacch. Fœnic. ℥i.

M. f. Collyrium.

D. S. ut supra.

Vel

℞. Vitrioli alb. ℥℥.

Aqua Chelidon. maj.

Fœnic.

Flor. Cyani ana ℥vi. ad ℥i.

filtra & adde

Tur. præp. ℥℥.

M. S. ut supra.

Calidè infunditur Oculo. Vel

℞. Aqua Euphor.

Flor. Cyani ana ℥℥.

Vitrioli de Cypro ℥℥.

solve & filtra:

adde

Tur. præp. gr. xv.

M. S. ut supra.

Ac

que agitata lavicem pro Collyrio Oculi infilla, aut in Oculi fimentur.

Decodum Offum boborum & Puleurum Tritici est soletum BURKHI in epiphora, uti hoc videbitis in eisdem *Epist.* de humoris aculeorum refectant pag. 54. Liqueat seu Oleum Florum Cichorii, & Cyani, uti & liquor Feniculi saccharatus ea BARTHOLETO, sunt egregii. Descriptioem communicavi *supra* in *Cura Ophthalmi vera*. Quia Theria preparata cum aqua Feniculi Oculis infusilla admodum temperat aciditatem; item saccharum Saturni, Cerasula, Mucilago feminis Cydoniorum cum saccharo Saturni, Florum Zyneli, Lapilli Caucrorum minutissime pulverisati, Succinum pulverisatum, & denique Lapis Calamianus preparatus, qui singulari Remedio dicitur fuisse PARACELSI in talibus casibus. Modus preparandi est:

℞. Lap. Calamianus. ℥i.

Pulverisetur subtilissime & superfundat.

Spiritus Vini q. s.

Hinc incendatur & coagulatur spiritus:

Romancenta iterum pulverisetur, & superfundatur

Vini albi clari, aut loci Vini aqua. Rorari. ℥ii.

vel lii.

& ita f. Collyrium, mane & vespere applicandum.

Tandem potest etiam usurpari Decodum Foliorum Cydoniorum, laudatum a RIVIERO in *praxi* contra Ophthalmiam, quod excerptit ex SOLENANDRO: Nempe

℞. Fol. Cydon. primo Vere collecta. integror. lib. i.

illor., & a corruptione diligeat praeservat.

io. M. l.

coq. in aqua parisi.

qua decodit subinde Oculi humectantur ac Irrorantur. Insigniter commendat hoc ipsum ad discutiendum ruborem, & etiam curandum Ophthalmiam.

Vel albumina ovi Num. i. cum Saccharo Joviali & aqua rosarum miscetur, & vespere oculis applicetur. Vel albumina ovi temperata cum succo semperervi & Flor. Tubarum imponuntur coactur. Egregium est, si dimidium Pomii Bursiformis putrefacti Nucis alligatur: Vid. D. LANGIUS in *medell.* Alia, ut Lapis Haematites, Aqua Sigilli Salomonis, Aqua Rosarum, Infusio Sumach, aqua Ophthalmica Maximiliani Imperatoris, &c. ea praestis sponte innotebant.

Quod si Pulveres in oculos incidentes vel aliae res inducant epiphoras, tunc optime tetrahantur hi ipsi beneficio Lapillorum Cancrorum, si scilicet hi imponantur oculis, ita, ut pars cava oculi bullam tangat, & ita clausis Palpebris agitentur hinc inde in oculis, & inde subito illapsa extrahantur. Vidi hoc probatum. Semen scharae oculis intrusum etiam ad extrahendas res alienas ex oculis admodum laudatur. Si incidat in oculum Felcula vel Pales, extrahatur cum frustulo faccini, prius panco bene affricci. Si scob. Ferri vel Chalybis in oculos inciderit, Magnez oculi aperto applicandus secundum experientiam HILDANI *cons. 5. observ. 21.* Modum chirurgicum rem illapsum extrahendi per Instrumetum, vos docebit HILDANUS *cons. 2. obs. 6. item cons. 4. obs. 18.*

Denique si Lymphæ concutatur vitium, vel nimis acrimonia, ea, quae in Ophthalmia Vera fuisse laudata, conveniunt: In specie opera dauda, ut Acrimonia salia temperetur, & acida corrigatur.

ARTICULUS XVI.

De Inflammatione Aurium earumque Ulcere.

Denique inflammatur etiam interdum aures, nempe auri interna, eoque Membrana meatum auditorium subiugens eidem subiecta esse solet.

CAUSAE.

Praeter Externas occasionaliter haec Inferentia, qualia sunt vel Vulnerata, aut contusiva, necnon acribus intrusis, quorum exempla videbitis in FORESTO lib. 1. cap. 3. & HILDANO *cons. 2. obs. 15.* subinde auri sponte sua ea causa interna eadem constituit. Nam in Parotidibus dolor auri inflammatorius percipitur, qui tamen mox transit.

DIAGNOSIS.

Cognoscitur ex insigni ardore in Auri, ex dolore conti-

nuo tenivo & pulsatili vehementissimo in Auri, & cernitur interdum Rubor quidam auri externae, quod magis nemp ad exteriora vergit Inflammatio; quae ubi fuerit gravior, ad Malas, & tempora usque se extendit; sicuti, ubi magis interiora inflammantur, pulsatorius dolor gravior esse solet; in quo casu & Febri & subinde delirium etiam, imo & interdum motus convulsivi superveniunt: vid. FORESTUS lib. 1. obs. 5.

PROGNOSIS.

Interdum satis periculolum malum Inflammatio Aurium esse solet; in tantum letale est, & graviora symptomata conjuncta habet: nam haec insensibiliter desinitur, aut suppuratur, & in abscessum degenerat, qui auri auri post se relinquit.

Dum suppuratur, res non caret periculo, propter febrem & conjunctum dolorem, quo interdum cerebrum ejusque Membranae periculolissime afficiuntur, siquae delirium superveit.

Pueris & Juvenibus periculolus est, quam senibus: hi enim brevi & auri diem lepium mori solet: su vero superveniat suppuratio, & materia in pus laudabile convertatur, major spes reconvallescentiae expectanda. Sic enim EPIPHANIUS FERDINANDUS *histr. med. 14. lib. 1.* refert Inflammationem Aurium, & Dolorem interitum cum Febre acuta, Delirio gravi, &c. per excretionem copiosam puris die mori sono. Inflammationis lepium, criticè curatum. Mirabile Inflammationis Auris Exemplum est, quod BARTHOLINUS *sest. 3. Epist. 17. pag. 67.* refert, in abcessu auri erumpens pus & vena simul fecit dentem, sine defectu dentis illius in Maxilla.

Subinde hemerici alique similes chronici affectus capitis, per abcessum auri solutur observantur; vid. HORSTIUS lib. 2. obs. 10. pag. 444. utut nec auri suppuratio propter erosionem Tympani, vel ipsius Nervi auditorii, aut alia symptomata graviora supervenientia, omni periculo, ad minimum Surditatis, careat; adeoque insensibilis Inflammationis Difficilis tutior est, quam suppuratio. Unde si auri Inflammatio interiora magis occupaverit, & suppuretur, superveniat interdum auri duriora, pus ab auri abcessibus natum Tympani membranam eadem, quae quandoque integra rejicitur, interdum potredine absumitur; vid. HORSTIUS lib. 9. obs. 5. Ceterum quod dicit, Tympani hanc excretionem observatam fuisse citra auditus lesionem, dubito, & suspendo hac in parte iudicium.

CURA.

In cura Induricta repetita, & Fraxellie, aliaque universalia praemittenda sunt; loco vero Venae sectionis scarificationes pone aures institui, aut harum Venis hirudines admodum possunt, utpote quarum usu sivas & desperatas auri Inflammationes solutas ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. *prax. admir. observ. 64. & lib. 2. princ. hys. cap. 14.* testatur.

Externa quoque nonnulli causae & consideratis probè omnibus circumstantiis applicanda: Nam galia plus interdum nocent, quam proficiunt. Vid. *Mistellae. A. N. C. ann. 6. observ. 82. pag. 157.* Id quod in specie de actu Frigiditatis aut repellentibus intelligendum venit, quae etiam rejiciuntur a RIVIERO lib. 3. *prax. cap. 3.* SCHNEIDERO de Catarrh. specialif. pag. 181. SEPTALIO *animadvers. lib. 6. §. 103.* & HERCULE SAXONIA *praxif. p. 1. cap. 22.* Optime curatur, vel quando maturè discutitur, vel quando suppuratur, & degenerat in abscessum. Opera igitur dauda est, ut discutatur quantocyùs Tumor Inflammatorius: quod si fieri nequeat, ad supurationem perducatur.

Discutatur Tumor Oleum Chamomillae cum Balsamo sulphuris mistum; Balsamum squidem sulphuris per se nobile est: interm si hoc paulo acrius sit, miscetur cum Oleo Chamomillae. Praeterea etiam conducit oleum Chamomillae, vel oleum Rosaceum, in quo Milipedes vel Lambrici bullierint, vel oleum scorpiorum, & Lin. oleum decoctionis Lambricorum reteritum, vel Milipedum, &c. tepide auribus infusillatur, vel oleum Rosaceum cum Mucilagine feminis Cydoniorum applicatur, aut cum Bombace iidem intusina inmititur; Oleum Mellisauri eorum egregium est remedium ad Inflammationem aurium, & laudatur admodum a PETRO JOHANNES FARRO *cons. 53. & 54.* & ZACUTO LUSITANO *histr. med. princ. hys. 39.* utpote quod non solum anodynum est, sed etiam in principio Inflammationem discutit, suam vero supurationem subito aperit. Nobiliss est oleum, in quo Conci-
Duvia-

fluuat: les. contusi bulliunt, quippe tale ob alcali fuscipium laudatur a THEODATO in *Panob. hygi.* tam ad inflammationem aurium discutiendam, quam mitigandam, si solletur, efficacissimum enim est ad dolores & ardores aurium curandos. *Decollum albidum, Ceraurij minoris, ab-rosani*, & alia aromata auribus immittit, vel spiritus Vini, vel spiritus Salis Ammoniaci cum mica Panis calida auribus applicetur (N). Videatur SYLVIVS *de morbis infantum cap. 9. paragr. 87.* Inflammationi vel applicationi hanc ipsam cum Bonacae auribus: Item succos deservivi majoris auribus: collulas egregie convenit in inflammatione; nam citius aperit: v. g.

℞. Succ. Sempervivi mai. 3℔. ad li.

Ol. Rosar. vel scirpini.

Lumbric. terrestr.

Chamomill. ana 3℔.

M. D. S.

Mixtura Relinens.

Applicetur cum Bonacae auribus, vel insillatur, *Fomenta aurium* ex decocto Plantarum emollientium & discutacitum externe applicata egregie conducunt.

Hic & similibus si non discutatur inflammatio, sed ad abicellum pergat, proptercurus ad suppurationem, pro qua promovenda speciatim convenit Cataplasma ex Medulla Panis albi in Lacte codi, addendo Vitellum Ovotum, ut describitur à RIVERO.

℞. Medull. Panis alb. 3℔.

Coq. in lacte caprino ad pulvis conficiendum.

deinde adde

Vitell. ovor. Num. ii.

Ol. Rosar. 3℔.

Croci 3℔. vel 3℔.

℞. Cataplasma.

quod extra applicatum auri suppurationem promovet.

Sicuti in specie Cataplasma Cepacea, aut Capita A'lii sub cineribus coda, bene coctusa & auribus applicata, has inflammationes & maturant, & abicellum aperient: v. g.

℞. Cera. sub ciner. asar. Num. i.

Enterij 3℔. ad 3℔.

Ol. Chamomill.

Amig. d. aut. ana 3℔.

Croci 3℔.

Miscantur, pulsentur, & calide in forma Cataplasmat' auribus inflammatis ad suppurationem tendentibus applicentur. Conf. RIVERO lib. 3. prax. pag. 206. FORESTUS lib. 12. obs. 4. AMATUS LUSITANUS cent. 7. curat. 92. & HOFERUS in *Mercur. medic.* pag. 62.

Vel

℞. Herb. Malv.

Alib.

Violar.

Flor. Chamomill. ana M℔.

Rod. Alib. pulveris.

Lil. alb. ana 3℔.

Caric. pingv. num. vi.

Coq. in l. q. aqua ad consist. Cataplasmat.

adde

Medull. panis tritici. 3℔.

Farin. farag. 3℔.

Ol. Chamomill.

Lil. alb. ana 3℔.

Vitell. ovor. 3℔.

M. D. S.

Cataplasma Maturans.

Post Inflammationem aurium sequitur subinde abscessus, adeoque

ULCUS AURIUM.

Ulcera aurium aliis sunt vel viva vel apparentia: Viva vel ex abscessu post inflammationem nato, vel ex acriori Lympha co delata, Meatum uterius exulcerante: Apparentia ulcera sunt, quando sanies subinde multiformis ex auribus effluit, nunc cum, nunc sine praecedente earundem dolore, qui effluat subinde diu durat, & quo cessante varia capitis, &

cerebri superveniunt symptomata, quae levantur sub sin- aus continuatione; uti in infantibus rubore observatum est, qui per humorem aurium Finis plus minus fordidus à plu- ribus malis, tam externis quam internis, levati solent.

PROGNOSIS.

Vra aurium ulcera, si diuturna aut inveterata sunt, facili- ter in Aphlam degenerare solent, vel erodendo occasionem Membranis suggerunt, aut Hyperaemia (Gcr. *Waldstein*), succrebat, quod auditum obturet.

Pur quod effluit, si sit album, aequale, substantiae medice- rit, melius est, quam si inaequale, foetens, saniosum &c. fuerit.

CURA.

In cura observandum est, ne apparentia huiusmodi ulcera aurium, seu effluus eorumdem plus minus saniosus citib nimis sanentur, praesertim in subditi vel hamidioribus, vel excretionibus capitis catanici, vel affectibus Cerebri & capitis internis onosali, idque in infantibus imprimis observandum, ne major nota inde oriatur, sufficit, si modo mundus fervet Meatus auditorius, id quo optime me- dicat' urina humana asequitur.

Quand ulcera Viva: praemissis praetendendis internis, v. g. purgantibus, aut Sederis, aut Essentia Liguorum, &c. U- cus mundificandum, & hinc consolidandum venit. Mundifi- cat optime urina humana infusa, aut urina, in qua Rosae Ligni Guajacii maduerit, item Phlegma urinae spirituosum. Vel

℞. Vini alb. subtilis dulc.

Urina Puero. ana 3℔.

Melle 3℔.

Effluant leviter.

D. S.

Mixtura Mundificans.

Quibus tepide Meatus Auditorio insillatus, aut cum To- runda iidem ebria immittis, ac mane & vesperi repetis, ulcus mundificabitur.

Item succus, vel syrupus, vel essentia albidum, aut Mor- bii, cum poco Melle rosae, item Symplo Melleana, egregie conveniunt. LYSERUS in observo. pag. 133. refert Ulcus periodicum auris curatus per insillationem suavi Morrali, misti cum Melle. Sic alumen assum cum Vino mistum, in a- rem si insundatur, potestissime ulcus exsiccat. Puer decem annorum furdus ex Vatioli permanens, & cui per tot annos Sanies ex auro fluebat, liberatus fuit succo Cypa & Lin- damelle insillato, teste FORESTO lib. 12. obs. 7.

Denique si antiquum & ferdidum ulcus fuerit, applicanda venit urina pueri cum poco ugentis Aspiculae impragnata. Haece si mundificatum & abicellum fuerit ulcus, id quod ex eo patet, si minor fordidus ac puris quantitas effluerit, pro consolidatione illis modo dictis Turia & Pampulyx addenda sunt, praesimodum pericula consolidatione. (U)

C A P U T I I.

De Sanguinis extravasatione in peculiarem corporis cavitatem.

ARTICULUS UNICUS

De Empyemate.

Absolvimus doctrinam inflammationum in genere, & etiam in specie. Jam dictum fuit in principio huius lectionis, quid praeter sanguinis impedimentum refluxum impediatur etiam necrosis ejus circulus, quando in penitus extra sua Vasa effunditur, idque vel ex illidem intra spatio, partim intercutanea, in Echyemomate seu Sugillatione (P), aut quan-

(N) Spiritus hae in Auro immissa, praesertim in principio Inflammationis, sicuti asphurum odorem exasperare, & phlegma magis accendere: satis igitur est ugentis dolore, malitiosis & oleosis uti.

(O) In Pueri Aetate ad Ulceris curatiorem Eliar proprietatis obsequio turunda insillatur, post ingentes cruciatus Ulcus adeo absteris, ut nullus huius Meatus Acusticus integri conservaretur, nec formidinis vestigia relinere: testis jam putaturo.

(P) Echyemoma & Echyemosis, quod idem fere sonat ac *εχχινωμα* & *εχχινωσις*, est Sanguinis & humorum in partem aliquam effusus, qui puri ipsa primam rubei, non levelet, idque asphurum ex consensione oboritur: quare Sugilla-

tio

quando effunditur intra Corpus & inferiores ejus Cavitates, vel quando penitus extra Corpus effunditur, ut fit in *Rumoris*, & hinc constituit alteram speciem seu impedimentum Sanguinis Circulationis. Quando vero Sanguis plane extra sua via in Cavitate Corporis quocunque modo effusus, mox ad corruptionem tendit, Acorem contrahit, hinc coagulatur & conglutinator, tandem in loco calido successivo fermentando suppuratur: hinc Puris inde nati Collectio in quodam Corpore Cavitate infertur. *Humoris* etiam nomine, Empyema dicitur, ab *Aphrasia* seu *Pneumia* dictumque, quod *Collectio Puris in quodam Pore* ex inflammatione partis ejusdem indicatur. Ita dum Pus colligitur in Pulmone sub *Empyema*, est *Pneumia Pulmonum* aut *Emphyse*: si vero colligitur Pus in quodam Corpore, Thoracis vel Abdominis, cavo, *Empyematis* nomine venit. Cæterum erit *Empyema* duplici modo: vel

1. Quando ex Sanguine in Cava interna in quodam cavitate extravasat *Corruptione*: v. g. quando quis ex Volnere Thoracis patitur effusionem Sanguinis in Thoracem; & si Sanguis transmutatur in Pus, est *Empyema primi generis*: vel
2. Ex *Pneumia* sive *Aphrasia* quodam Viscere inflammatione interna veris *rupina*, cujus Pus tandem ex parte in cavum Corporis infuit: v. g. quando ea Pleura suppurata ex tandem rupta Pus effunditur in Thoracis cavitate; est *Empyema secundi generis*.

Veteribus alia horum vocabulorum fuit acceptio, dum proprie loquendo *venica* Latini est id, quod Græci *Empyema* (Q), seu *Collectio Puris* in aliqua parte, præsertim interiore, & *Empyia* proprie sunt, quibus Pus in aliquo Viscere oboritur: quod purulentum Hepar HIPPOCRATIS *Sell. 7. Aphorism. 45.* idem quod *Empyema*. Tale Malarum Latini dicebatur *venica*; Ita enim CELSUS. *Moderum* est ignoratio substituitur *Aphrasia*, & in specie *Pulmonum purulentum* hoc *thoracis venicam* appellant. Quomodo vero frequentissime post Pleuritidem Puris in cavitate Thoracis collectio, rupta *venica*, fieri solet, ob id *Empyema* primariv de Puris in Thoracis collectione intelligitur, locundius tamen etiam, si in aliis locis colligitur. Frequentissime, dixi, quod post Pleuritidem suppuratum sequatur tale *Empyema*, quoniam pus in cavitate Thoracis tandem effunditur. Verum singulare est exemplum, quod refert LINDANUS *super Harimantem*, si nempe observare in quodam Puris, Pleuritide suppurata affecta, facta Thoracis aperture per extraxione, & facta exspiratione cum Cindicia (secundum leges Paracelsi Thoracis) cerea; nihil tamen Puris fuisse excretum: Mortuo tandem Patre in Thorax per scrutinū Viscerum fuit aperius, & inventum fuit, quod scilicet Membra Collas succingens, seu Pleura, dilatata fuerit in immensum Sacrum, in omni purulenta materia, tanquam in suo receptaculo fuerit comprehensa.

Tom. II.

kin dicitur. A' xphi succus, humor: quod d' xphi fundo. Jure quare distinguat Galenus inter Phlegmonem & Echy-monem: in Phlegmone enim Sanguis per Mufculos cavitate sola nature contemplata sit aciem naturam sui partes effunditur; in Echypho vero in spacia effusa, qua Penis a facie: hoc autem nonnulli ex fibrillarum disrptione accidit.

(Q) Empyema a *pus* pus; hoc autem d' *pus*, putrefactio.

(R) Puris ex Sanguine reflexione generativum hoc pallo accidere putat Sylvius Delebo: cum nempe in Sanguine in partium subsistentia mox incipiant evanescere partes spirituosæ magisque volatiles ac subtile, tum acides tum salinas temperare solut; unde utraque acrisa salia acris in se mutuo infurgunt, effervescentiamque, ob partes Sanguinis oleosas præsentis; colliduntur, quia paulatim Sanguinem ita corruptum, ut in Pus vertatur. Hæc Sylvius.

Ego vero addiderim quid ad mutum effervescentia, quem concipiunt partes salinas acidesque Sanguinis, non tam ipse ex seipso mutantur, quod tantum compeditur partium spirituosarum jam fuit extricata; sed etiam existim ad illam non pertinere, imò esse veluti causam effervescens, Spiritum animalium qui multa materia obest, ad effervescentiam concipiendam necessaria, surgens ad partem inflammationis velutius consensum impetum atque nuxum, qui scilicet particula acida salis neque concipit effervescentiam concipiam. Idque vel ex ea verum esse existimaverim, quod Sanguinem a corpore animalis eductum, grævis illam quidem effervescens possidet, nequaquam vero in Pus verti expellatur, etiam ex illa particula spirituosæ, magis quidem ex Sanguine in parte corporis reflexione, revolvens. Imò ausim dicere, nec Sanguinem effusum in ampliores corporis cavitates posse in Pus verti, sed tantum generari, quod ad illam jam effusi particulas Spiritum animalium alio peritioris contrahere non possit: & si quocunque ampla corporis cavitate Pure referat invenimus, illud non tam in ipse cavitatibus generatum est, quàm ex circumstantibus Tuberculis & Venarum Ulcerum Ulcerum distillatione illuc confluit.

Atque hinc reddi potest ratio, cur membra Gangrena affecta Sanguinem qui in corruptionem tendit in ipsi vasis exsiliat, minime vero in Pus vertatur; ad partem enim Gangrenam præsentem Spiritum animalium non perveniat, atque adeo, quam non possit particula Sanguinis effervescentiam concipere ad Suppuratum necessarium, Pus non generatur. Ad hoc enim in Gangrena in membro aliquo introductur, non sufficit si Sanguis ex illo munus circularem amittat; sed requiritur ut distingat influxu Spiritum, perit quippe in Sanguine mutus fermentativus & intestinus.

Hæc quippe hypothesis infertur per vero habere passum affertum Clariss. Viri Caroli Drelincurti, qui referent Dom. Guycot, quod scilicet, Sanguinem intra Vasa subsistentem non posse putrefieri, & in Pus verti, sed tantum generari, arum, aridumque ex divina natura reddi. Idque & Ratione & Experimentis probat. Sic enim maximum putredinem, corruptionemque præcipuo ab Aeris alioque pendere, quæ quidem illarum particularum integrum solutio atque scissura præsumitur:

ita

hens, ita ut aperto Thorace nihil potuerit Puris evacuari: id quod sæpius fieri arbitror.

C A U S A E.

Causa, propter quam Sanguis aut Echyphomata constituit, ut extra sua via intra cavitates partium effundatur, conglutinetur & suppuratur, raro aut nunquam sunt *Internæ*, sed semper *Externæ*, aut imprimis *Injuria Externa*, nempe vulnera punctum facta, vel *Causæ* partium Internarum. De *vulneribus* pertranstribus natum est, quod non sine Sanguine ex vasis in cavitate Corporis singulari effusione haur. Ex *Causis*, si lacerantur vasa Intercutanea Capillaria, & Sanguis in partibus subcutaneis exteras hæreat, erit Sanguis *diffusus* seu *Echyphomata*, ad Chirurgum pertinet: in vero interiora loca occupet, hinc est considerandum.

Ad *Causas* pertinet in specie *Causæ ab alto*, in quo vel *Rupitur* vasorum, vel partium violenta *Causæ*, aut earundem nimis valida *Causæ*, vel alia *Laceratione*, ea laceratis plia minus valia Sanguis per vasa lesa effunditur, inque certam Corporis cavitate infunditur, ita ut hæc consensio sit una ex primariis Causis. Sanguis ergo extra vasa effusus ex his Læsionibus exteras, in *Cave* collectus, & ex vimali consensio precepta, mox ad corruptionem tendit, hinc Sanguis ita enagelatus immediate Acorem præternaturalem antea occultatum contrahendo spissificat seu coagulatur, aut in Grumos ibit. Similis hic est ratio utque cum Lacte, quod facile levi ex corruptione aciescit, & magis magisque grumescit: id quod merito magis facit Sanguis Lactis generis, in quo particula salina copiosior exillunt, dum nutritive temperationis & oleæ in partium nutrimentum abeunt. Sanguis occulto tali *Acorem grumofum* succedente incipit *fermentare*, dum acidum in Sanguine coagulato cum Alcali volatili Massæ Sanguineæ factæ copiosius concurrat, donec mutua Fermentatio tandem in huius tertium, nempe *Pur*, abeat. Omne autem Pus est saporis salis, quatenus nempe generatur ex Alcali & Acido: album & lacteam vero a præcipitatione Sulphuris Acidum Sanguinem, soluti ab Alcali ejus volatili (quod antea dabat colorem rubrum) facta per acidum præternaturalem, unde, illustrans rem Chymia, emergit Puris color albus, & tunc mutato nomine *Empyema* dicitur: cujus duplicem fundi Modum supra insinavi.

Quodvis ergo modis generatur *Empyema* vel immediate in Sanguine in partium cavitate effusa, corrupto & suppurato: vel *mediate* ex Sanguine partem quendam prius inflammatione, hinc Apothema faciente, cuius pus ex parte in Cavum Corporis infuit, *Empyema* constituit. *Prioris* exemplum suggerit Vultus Thoracis penetrans cum capulo Sanguinis interiora verius infusus, hinc la pus corruptione: *Posterioris* exemplum dat Pleuritidis suppurata, cuius pus rupto Abfcessu in Thoracem effluit. His modis generatur Pus ex Sanguinis effusione in cavitate Corporis. (R)

Aaaa

DIA-

fluviatiles confusi bullierint, quippe tale ob alcali fuscipem sandatur a THEODATO in *Paneth. hygiæ*. tam ad inflammationem aurium discutiendam, quam mitigandam, si inflillatur, efficacissimum enim est ad dolores & ardores aurium curandos. *Decellam albissimam, Crystallum minorem, et alia aromata auribus immissa, vel spiritus Vini, vel spiritus Salis Ammoniaci cum mica Panis calida auribus applicetur* (N). Videatur SYLVIVS *de morbo infantum* cap. 9. paragr. 27. Inflillatur vel applicatur hæc spica cum Bomace auribus: Item lactus Semperivi majoris auribus inflillatur egregie convenit in inflammatione; nam etiam aperit: v. g.

24. *Succ. Semperivi. mas. ʒi. ad li.*

Ol. Rosar. vel serpyll.

Lumbic. serpyll.

Chamemill. ana ʒi.

M. D. S.

Mistura Resolvens.

Applicentur cum Bomace auribus, vel inflillentur, *Fomæta aurium ex decocto Plantarum emollientium & discutientium extetne applicata egregie conducunt.*

His & similibus si non discutiatur inflammatio, sed ad abscessum pergat, proprietas *ad suppurationem*, pro qua promovenda speciatione concoct Cataplasma ex Medulla Panis albi in Lacte codæ, addendo Vitellum Ovotum, ut describitur à RIVERO.

25. *Medull. Panis alb. ʒi.*

Cogn. in Lacte capris ad pulvis consentiant.

deinde adde

Vitell. over. Num.ii.

Ol. Rosar. ʒi.

Croci ʒi. vel ʒi.

ʒi. Cataplasma.

quod extrâ applicatum auri suppurationem promovet.

Sicuti in specie Cataplasma Cepacea, aut Caput A'lii sub cineribus codæ, bene confusa & auribus applicata, has inflammationes & maturant, & abscessum aperiant: v. g.

26. *Cypar. subriar. esset. Num. i.*

Esset. ʒi. ad li.

Ol. Chamemill.

Amigd. dulc. ana ʒi.

Croci ʒi.

Misceantur, pilleantur, & calidè in forma Cataplasmatæ auribus inflammatis ad suppurationem tendentibus applicentur. Conf. RIVERO *lib. 3. prax. pag. 206. FORESTUS lib. 12. obs. 4. AMATUS LUSITANUS cent. 7. curat. 92. & HOFERUS in Hæral. med. pag. 62.*

Vel

27. *Herb. Matr.*

Alib.

Voler.

Flor. Chamemill. ana M. li.

Rad. Alib. pulvis.

Lil. alb. ana ʒi.

Caris. plaga. num. i.

Cogn. in ʒi. q. aqua ad consentiant. Cataplasmat.

adde

Medull. Panis tritæ. ʒi.

Yucca. fenogr. ʒi.

Ol. Chamemill.

Lil. alb. ana ʒi.

Vitell. over. ʒi.

M. D. S.

Cataplasma Maturans.

Post Inflammationem aurium sequitur subinde abscessus, adeoque

ULCUS AURIUM.

Ulcera aurium alia sunt vel Vera vel apparentia: Vera vel ex abscessu post inflammationem natæ, vel ex arteriæ Lymphæ obclusa, Mcatum interius exulcerante: Apparentia ulcera sunt, quando fames subinde multisimè ex auribus effluit, nunc cum, nunc sine præcedente earundem dolore, qui effluxus subinde diu durat, & quo cessante vacia capitis, &

cerebri superveniunt Symptomata, quæ levantur sub fluxus continuatione; uti in *infantibus* subinde observatum est, qui per hujusmodi aurium Fluxus plus minùs solidos à plerisque roalis, tam externis quam internis, levati solent.

PROGNOSIS.

Vera aurium ulcera, si diuturna aut inveterata sunt, facile in *Stulam* degenerare solent, vel erodendo occasionem Membranae suggerant, ut *Hyperfæroma* (Ger. *Wulstschub*, succreascit; quod auditum obstat.

Per quod effluit, si sit album, æquale, substantiæ mediocris, melius est, quam si inæquale, foetens, saniosum &c. fuerit.

CURA.

Interne observandum est, ut *apparencia* hujusmodi ulcera aurium, seu effluxus eorumdem plus minùs saniosi citò minùs faneant, præsertim in tubercula vel homidiocibus, vel excretionibus capitis cutaneis, vel abscessibus Cerebri & capitis internis obnoxii, idque in iofactibus imprimis observandum, ne major noxa inde oriat, sufficit, si modo mundus servetur Meatus auditorius, id quo optimè medicose urina humana affluat.

Quod ultra Vera: præmissis præmittendis internis, v. g. purgantibus, aut Sederis, aut Essentia Lignorum, &c. Ulcus mundificandum, & hinc consolidandum venit. Manducet optimè urina humana infusa, aut urina, in qua *Rosæ Ligni Cinapæi* macuerit; item Phlegma urinae spirituosum.

Vel

28. *Vit. alb. subtilis dulc.*

Urina Puerae. ana ʒi.

Melle ʒi.

Ebulliant leviter.

D. S.

Mistura Mundificans.

Quibus tepidè Meatus Auditorio inflillatur, aut cum Terundula iidem ebris immittis, ac mane & vespere repetitis, ulcus sonduficabitur.

Item *succus, vel serpus; vel essentia albuschii, aut Martis*, cum paucis Melle rosæ, item *Syrupo Rosulano*, egregie conveniunt. LYSEUS in *observ. pag. 123. refert Ulcus* periodicum auris curatus per inflillationem *Junci Martialis*, milli cum Melle. Sic alumen nifum cum Vino misum, in *ulcerem* si influndatur, potentissimè ulcus exsiccat. Puer decem annorum lardus ex Vatioli permanens, & cui per tot annos Sapoies ex aore fluebat, liberatus fuit *succo Cypæ & Rosulano* inflillato, teste FORESTO *lib. 12. obs. 7.*

Denique si assignum & fœdum ulcus fuerit, applicanda venit urina parvæ cum paucis urgetis *Aspicæ* impregnata. Hisce si mundificatum & absterfum fuerit ulcus, id quod ex eo patet, si minor lardus ac puris quantitas effluerit, pro consolidatione illis modis dictis *Turba & Pampelusa* addenda sunt, pro ejusmodi perfecta consolidatione. (O)

CAPUT II.

De Sanguinis extravasatione in peculiarem corporis cavitatem.

ARTICULUS UNICUS

De Empyemate.

A Bsolvimus doctrinam inflammationum in genere, & etiam in specie. Jam dictum fuit in principio hanc ictionis, quod præter sanguinis impedimentum refluxum impeditur etiam ulterior ejus circuitus, quando la penitus extra sua *via effunditur*, idque vel ex lidem *intra spacia*, partim intercutaneis, in *Echyymatæ* seu *Sugillatione* (P), aut

(N) Spiritus huius in aures immittit, præsertim in principio inflammationis, solum suppuratum dolorem exasperare, & phlegma magis accendere: satius igitur est urgete dolere, malitius & olevis mi.

(O) Jo Pueri Auri ad Ulcus curantem Elixir proprietatis abique uranda inflillatum, post ingentes cruciatibus Ulcus adeo absteris, ut nullis spatio Meatus Auditorio integre consolidaretur, nec formamini vestigio restit: testis sum oculatus.

(P) Echyymoma & Echyymosis, quod idem fere sonat ac *εχχυμα & εχχυμωσις*, est Sanguinis & humorum in partem aliquam effusio, quæ pars ipsa primùm rubet, mox livescit, idque suppuratum ex crustatione oboritur: quare Sugilla-

quando effunditur intra Corpus & insigniores ejus Cavitates, vel quando penitus extra Corpus effunditur, ut fit in *Humerohæmâ*, & hæc constituant alteram speciem sui impedimenti Sanguinis Circulationis. Quando verò Sanguis planè extra sua vasa in Cavitate Corporis quocunque modo effusus mox ad corruptionem tendit, Acorem contrahit, hinc coagulatur & congruitur, tandem in loco calido succellere fermentando suppuratur: hinc Puris inde nati Celsus in quadam Corpore Cavitate insignit. *Humerus* alius varus, *Empyema* dicitur, ab *Apyemate* seu *Pneumâ* diductum, quæ est *Collectio Puris* in quadam *Effusa ex Inflammatione puris* eusdem *Inducta*. Ita dum Pus colligitur in Pulmone aut Renibus, est *Pneumia Pulmonum* aut *Renum*: si verò colligitur Pus in quadam Corpore, Thoracis vel Abdominis, cavo, *Empyematis* nomine venit. Ceterum oritur *Empyema duplici modo*: vel

1. Quando ex Sanguine in *Causa externa* in quadam cavitate extravasati Corruptionis; v. g. quando quis ex Vulnere Thoracis patitur effusionem Sanguinis in Thoracem; & si Sanguis transmutatur in Pus, est *Empyema primi generis*: vel
2. Ex *Pneumia* five *Abscessu* cuiusdam Visceris inflammati interiora versus ruptæ, cuius Pus tandem ex parte in cavum Corporis effluit; v. g. quando ex Pleura suppurata ac tandem rupta Pus effunditur in Thoracis cavitate, est *Empyema secundi generis*.

Veteribus alia harum vocabulorum fuit acceptio, dum propriè loquendo *venia* Latinis est illi, quod Grecis *Empyema* (Q), seu *Collectio Puris* in aliqua parte, præsertim interiore, & *Empyis* propriè sunt, quibus Pus in aliquo Visere oboriatur: scit parvulum Hepar HIPPOCRATIS *est. 7. Aphorism.* 43. idem quod *Empyema*. Tale Ma-Ju-Lena Latine dicitur *venia*; Ita enim CELSUS. *Modèrni* ex ignoratione substitunt *Abscessum*, & in specie *Pulmonum parvulus* aut *stercus venia* appellant. Quomodo verò frequentissimè post Pleuritidem Puris in cavitate Thoracis collectio, rupta vomica, fieri solet, ob id *Empyema* primariè de Puris in Thoracis collectione intelligitur, secundariè tamen etiam, si in aliis locis colligitur. Frequentissimè dixi, quod post Pleuritidem suppuratam sequitur tale *Empyema*, quomodo pus in cavitate Thoracis tandem effunditur. Verùm singulare est exemplum, quod refert I. LINDANUS *super Herimiam*, se nempe observasse in quadam Puero, Pleuritide suppurata affecto, facta Thoracis apertione pro extractione, & facta exploratione cum *Candela* (secundum leges Paracelsi Thoracis) certa; nihil tamen Puris fuisse excreatum: Mortuo tandem Puero-30 Thorax pro Icrastine Viscerum fuit apertus, & inventum fuit, quod scilicet Membra Cæcæ succingeret, seu Pleura, dilatata fuerit in immensum Sacculum, in quo omnis pusuleta materia, tanquam in suo receptacula fuerit com-

pressa, ita ut aperto Thorace nihil poterit Puris evacuari: id quod simpliciter fieri arbitror.

C A U S A E.

Causa, propter quam Sanguis aut Echyomata constituit, aut extra sua vasa intra cavitates partium effunditur, conglomeratur & suppuratur, rarè aut nunquam sunt *Internæ*, sed semper lésiones, aut imprimis injuriæ *Externæ*, nempe *vulnera* pondus facta, vel *Causæ* partium interiorum. De *vulneribus* pertranstantibus orem est, quod non sine Sanguine ex vasis in cavitate Corporis singularem effusione sunt. Ex *Causæ*, si laceratur vasa Intersectanea Capillaria, & Sanguis in partibus subcutaneis exterius hæreat, eritque singularis *Empyema* seu *Echyomata*, ad Chirurgiam pertinent: si verò interiora loca occupet, huius est consideratio.

Ad *Causam* partem pertinet in specie *Causa ab alto*, in quo vel *Raptum* valorum, vel partium violenta *Concessione*, aut eandem nimis valida *Concessione*, vel alia *Laceratione*, ex laceratis plüs nimis vasis Sanguis per vasa lesa effunditur, inque certam Corporis cavitatem infunditur, Ita ut hæc concessio fit una ex primariis *Causis*. Sanguis ergo extra vasa effusus ex his Lésionibus exterius, in *Cavo collectus*, & ex virili consorcio profligitur, mox ad corruptionem tendit, hinc Sanguis ita coagulatus immediatè Acorem præternaturalem autem occultatorem coarctando spissificat seu coagulatur, tunc in Grumosabit. Similis hic est ratio atque cum Lade, quod facili levi ex corruptione accescit, & magis magisque grumescit: id quod multo magis faciet Sanguis Lade similis, in quo particula salina copiosiores caillant, dum nutritive temperationes & oleum in partium nutrimentum abeunt. Sanguis oculo tunc Acorem *grumefactus* succellere incipit *fermentari*, dum acidum in Sanguinem coagulatum cum Alkali volatili Maffia Sanguinis facis copio concurrat, donec mater Fermentatone tandem in salum tertium, nempe *Pur*, abeat. Omne autem Pus est saporis salis, quatenus nempe generatur ex Alkali & Acido; album & laevum vero a præcipitatione Sulphuris Maffia Sanguinem, soluti ab Alkali ejus volatili (quod antea dabit colore rubrum) facta per acidum præternaturale, uode, illaustre rem Chymia, emergit Puris color albus, & tunc mutato nomine *Empyema* dicitur: cujus duplicem fuit: *Modum* super iudicavi.

Duo ergo modi generatur *Empyema*: vel immediatè ex Sanguine in partem cavum infuso, corrupto & suppurato: vel mediatis ex Sanguine partem quandam prius inflammante, hinc *Apyemata* faciente, cuius pus ex parte in Cavum Corporis falluens, *Empyema* constituit. *Præterea* exemplum suggerit Valens Thoracis penetrans cum copio Sanguinis interiora versus infusus, hinc in pus corruptione: *Præterea* exemplum dicit Pleuritide suppurata, cuius pus rupto Abscessu in Thoracem effluit. Hi modi generatur Pur ex Sanguinis effusione in cavitate Corporis. (R.)

A 222

DIA-

rio dicitur. A' xuris succus, humor: quod d' xim fundo. Jure igitur distinguit Galenus inter Phlegmonem & Echyomatum: in Phlegmone enim Sanguis per Maf ubrum cavitate sua ratione conservabitur secundum naturam sui partes effunditur; in Echyomate verò in partem effusi, quæ Venis abiacent: hoc autem nonnisi ex florissimum disrumpente accidit.

(Q) Empyema a viti pus; hoc autem d' viti, putrefactio.

(R) Puris ex Sanguine reliquante generationem hoc patto accidere putat Sylvius Deleboe: cum nempe ex Sanguine in partibus subsistente mox incipiunt evanescere partes spirituosæ magis volatiles ac subtiles, rem acida tunc salina temperare solent: unde utraque acrisse facta acris in se mutui insurgunt, effervescuntque, ob partes Sanguinis alieque præterites; cædunt exstant, quin paulatim Sanguinem ita corrumpunt, ut in Pus vertatur. Hæc Sylvius.

Ego verò addiderim quod ad motum effervescens, quem concipiunt partes salina acidaque Sanguinis, non tam ipse ex seipso incipit, quod tantum compeditur partium spirituosarum jam fuit extricata; sed etiam rursus ad illum accenditur, immo esse videtur rursus effluens, Spirituum animationem (qui multa materia cælesti, ad effervescendum concitanda necessaria, torquet) ad partem inflammationem vehiculi consensum impetus atque mixtum, qui scilicet particula acida salis neque emicet effervescunt concipiunt. Idque vel ex ea verum esse existimaverim, quod Sanguinem corpore animalis eductum, gravior alium quidem observare possumus, nequaquam verò in Pus verti expellabimus, etiam ex illis particulis spirituosæ, magis quàm ex Sanguine in parte corporis refrigantem, evolvens. Imò autem dicere, nec Sanguinem effluens in amplius corporis cavitate posse in Pus verti, sed tantum transmutari, quem ad illius jam effusi particulas Spirituum animalium alio perstringere commodi non possit: & si quondam ampla corporis cavitate Pure repleta invenimus, illud non tam in ipso constitutum genus est, quàm ex circumstantiis Tubercularum & Viscarum disrumpente, vicinarumque Ulcerum dissolutione illius confusum.

Atque hinc reddi potest ratio, cur membra Gangræna affecta Sanguinem qui dem conglomeratum etiam in ipso vasi exiit, hinc, minimè vero in Pus vertatur, ad partem eam Gangræna præbens Spiritus animales non perducant, atque adeo, quam non possit particula Sanguinis effervescens incipere ad Suppurationem necessariam, Pus non generatur. Ad hoc cum in Gangræna in membris aliqua introducat, non sufficit si Sanguis in illis motum circularem amittat; sed requiritur ut denegat infusus Spirituum, perat quem in Sanguine motus fermentativus & infusus.

Hinc igitur hypotesis infusibilis per verobabere possumus assertum Clarj. Viri Caroli Drelincurtii, qui refertur Dom. Guycor, phlegmâ infusibilem, Sanguinem intra Vasa subsistitum non posse putrefieri, & in Pus verti, sed tantum grumescere, arum, aridumque ex diuturna mora reddi. Idque & Ratione & Experimentis probat, At tunc minorem parendem, cur raptimque præcipue ab Atris alium pendere, quod quidem illorum particularum integritatem saltem atque fecunditatem promoveat:

D I A G N O S I S.

Signa. Causarum gramus in quodam locis latet? an Sanguis in quodam locis coarctatur? Causae autem in quodam locis coarctatur? Causae autem in quodam locis coarctatur? Causae autem in quodam locis coarctatur?

Cavities autem Corporis infiores, in quibus Sanguis coarctatur, impii sunt tres: vel Abdominalis, vel Pelvis, vel Caput.

In specie ergo 1. Sanguinem collatum & congruatum in abdomine habere, notatum est, quod sit per Vultus Abdominis, in specie conuisione & calu ab alto, Hoc, praeceps vultus penetrans, impii ostendit Abdominis coarctationem, hinc inde sparsus livor, primum per superficiem Abdominis, & quasi plumbea Nigredo; post Sanguinis effusi grumescitiam & suppuratorem, durities quaedam & Rursus Abdominis ad tactum in superficiem Abdominis, praeterea in loco, ubi est Sanguis grumulosus, non simpliciter ex repletione, sed ex tensione Membrarum Peritonei: quae quasi spatio laborat, horrentibus partibus viventibus Cadaver Sanguinis (S). Ad hoc non raro superuenit spasmus vagus, ex contentu cum stomacho affecto, inter virum desolationes insignes, respiratio nonnulli impeditur, & interdum tumor & abscessus circa liguina, per quos Sanguis effusus interdum feliciter evacuat, & similia symptomata.

Quoad 2. in Pelvis effusum collatum Sanguinem ibique congruatum & suppuratum, monstrat, praeter causas antecedentes, insignes respiratio laesa, Tussis admodum molesta, dolores Pelvis vari, immunes & frequens syncope, Virum prostratio insignis, Gravitas seu pondus circa Collas Nectas, extremorum frigus, Febri plus minus acuta, quae omnino comprobatur modis laesionis: v. g. si quis cadit ab alto, & frangit Collas, consequenter propter rupturam valvorum Collis subdiaphragmatis necesse est lequatur Sanguinis in Pelvis effusio: Item si quis fuerit postmodum ex cunctis laes, mox infra Collas, ubi sunt Venae & Arteriae, tunc est signum effusi Sanguinis in Thoracem, & factum ejusdem congruatum, corruptio, & est Empyematis. Denique, quoad 3. in Capite & sub Calvaria ejusdem collatum est Sanguinem congruatum, monstrat, praeter lesionem externam, dolor eius gravitativus, item sensus insignis pulsationis in Capite hinc inde perceptibilis, propter motum Arteriarum impeditum, Oculi nonnulli sponte lacrymant, uti art. 15. cap. 1. de Ophthalmia dictum, & rubor faciei,

superueniunt etiam varia symptomata. Stomachi, impii vomitus biliosus, nausae, ac interdum, sed raro, singultus &c. quae pathemata si superueniunt laesionibus Capitis, signum sunt, Sanguinem in Capite esse effusum & grumulosum. Sanguis nunc per Os, nunc per Nares, nunc per Aures, exitum molitur, quae magis Sanguinem intra Membranas cerebri effusum & congruatum indicant: Quibus sepe inter vel octavo die accedunt rigores peritoniales, Aphasia, & similia, quae gravis malum portendunt; Interdum Agri obdormiunt, aut brevi post laesionem spasmus redduntur: accedunt denique causae antecedentes, aut valida contritio Cranium alligentes, aut loci facillime Cranium dividentes. Sanguinem vero intra Calvariam effusum ac congruatum suppurat, tellantur Febri superuenientes interitum, plus minus acuta, pro varietate circumstantiarum, item arduum in illa parte, in qua fit suppuratio: accedunt insigniter pericardium anxietas, vigiliae, & interdum delirium, &c. In specie ex rigore & Febri suppuratio se manifestat.

Hae ipsa potenter enarrata signa etiam ostendunt Sanguinem in alio loco congruatum ac suppuratum tendere, quia interdum in loco quodam externo, v. g. si Sanguis coagulatus in Abdomine haerent, circa liguina oritur abscessus, in quo & per quem Sanguis congruatus & suppuratus postmodum feliciter evacuat.

Empyema jam factum, seu pus collectum facili ex eo cognoscitur, quod remittit Febri, Ailus ac reliqua symptomata, quia potius fluctuans quodam puri hinc inde percipitur.

Quod autem aliterum situm Empyematis, ea est quando Abscessus suppuratus est inflammationibus sacri aperitur, & ex eis aperit pus in Corporis quodam cavitate effunditur, inter quae illud gravissimum est, quod fit post Pleuritidem & Peripneumoniam suppuratam; quae uti sunt aliter in d. g. in, ita & difficultior cognitionis & curationis.

Cum ergo frequens sit Empyema Thoracis, & suppurata Peripneumonia natus, specialiter probe cognoscendum est: hinc loco omnium propositum, ut de reliquis similem quaerit iudicium. Signa autem, five sunt à Voluto, five inflammatione aut Pleuritide (praeter ea, quae Pleuritidis suppuratae comitantur, si materia intra quatuordecim dies sputo non rejiciatur, vid. HIPPOCRATES lib. 3. Aphor. 8.) sumptur autem Vomica circa viginti, interdum triginta, aut quadraginta interitum diem. Dum enim vomitur Vomica, rigor fit, & Febri intensior supervenit: vid. HIPPOCRATES lib. 3. Aphor. 3. ubi Tussis continua & frequens,

ita ne si quacumque indolentia hac Aeris alio crearetur impetuque, mixta à corruptione distillans praesentur. Sic fit cetera, aqua, sale, conditura quacumque impetu distillantem emittentem, quomodoque mixta putredini obnoxia ad longum tempus conservantur: quomodoque videmus flores, synthetica in Recipientes Boylei clausi dum instillari conservant.

Hae sequuntur aut. Sanguinem effusum in partem aneurysmatis flagitare, & in Pus conversi posse; vultum si in suis Canalibus coarctatur, etiam per plures dies subsistit, praesensque signum. Nam in partem poro effusus in globulis praecipitur (ne apparetur), atque fit motus sui auras ad reflexum peritoni, impetibus habet; Signa igitur ita concurre, atque adeo innuunt partem aneurysmatis, cuius nobilissima pars inspirata, & transpirata grumulosus illis ita immoratur, ut ex illi pauca distillat, atque distillans, plurimum autem praesentans atque in Pus vertitur. At cum Sanguis intra sua Vasa subsistit, horum membrana densa, atque laxa, qui in interstitiis praedita sunt, utrumque denegat particulis Aeris, ne illius particulae vim faciant, atque corrumpant.

Ratiocinatio autem Experimenta quomodoque, & praecipue quia Sanguis in Vasis, in Aneurysmatis, atque in Haemorrhoidibus ad longum tempus conservatur, nec tamen in Pus vertitur: quomodoque & in membranis amputantibus, Sanguis in Vasis quocumque casu repleatur subsistit, autem sua praesentans. Quia & Clarissimus Autor in Canibus, Sanguinem interceptum inter duo ligamenta trunci Caricivici, & post labamadas aliquo Sanguinem nequaquam putredine, sed grumulosum in diadema saepe saepe ostendit. His igitur argumentis patet Drelineurcius Sanguinem intra Vasa subsistere in Pus verti non posse, sed tamen cum extra Vasa effunditur.

Quomodo autem id verum esse doceamus, praecipue in Vasi majoribus coarctatur Sanguis, verum si remota fiat in Vasi capillares, qui in Sanguine infusum praeter naturam dilatantur, ut aliquoties accidit, accitio inde dicitur, atque, ex coarctatione spirituum, fermentantur; hanc videtur quare Sanguis ille ex fermentacione praeternaturali non possit in Pus mutari. Quod si Sanguis & Carotici ligatura arctique facta detentus non putrescit, fit quia Sanguis in subsistit nequaquam inungere fasit, sed hoc suum ferat amplitudinem: dilatatio vero in Vasis, Aneurysmatis atque Haemorrhoidibus obferatibus jam illa est oblique dolere, atque oblique violenta fibrorum distentione, & oblique spirituum effusio, ex quorum alium fermentacione suppuratoria oritur. Non negaverim tamen id mihi vultu in Praxi observare, quid Separationem fieri semper Sanguinis extra Vasa exierunt sequatur.

Verum est id concedendum, hanc quoque autem id facinus Argumenti Drelineurcii pondera casu. Nam habet quidem vim Aer corpora mixta praefaciendi, nequaquam tamen esse Putredinis alepaca causa est reputandum. Siquidem corpora in omni Terra visceribus abscondita putredine quocumque & corrumpuntur. Ita si hoc Argumentum aliquid probaret, nimis probaret, atque adeo nihil. Nam si Sanguis in Pus conversus ab aere pendit, Sanguis in scissilem effusum deberet in Pus verti, quod falsum est. Atque insuper si Sanguis in Vasi contentus praesensque signis, quippe qui cum aere communem non habet; nec Sanguis intra Viscerum cavitates effusus in Pus verti possit, nam Aeris externi impetu non pateretur. Hae autem falsum est experientia teste, & facit idem Drelineurcius, qui Hippocratem citat dicentem 6. Aphor. Si in ventrem Sanguis praeternaturaliter effusus fuerit, is suppuratur necesse est. At interdum quod principis dicitur, Pus in cavitatibus corporis contentum, patet ex Ulceribus circumstantiam partem deplere, quam ex Sanguine in istas cavitates effuso genitum esse.

(S) Horum hic partium viciorum talis est metaphisica.

quens, item obscura, & quasi è profundo caveque prodita, bonus est obscurus, quia tunc hæc Tussis alio est à Diaphragmate, non vero pulmonum: illud enim gravatur ab incumbente pure. Porro inter tussendum sentitur. Egri in cavo pectoris consensum aliquam & fluiditatem, ac imprimis in eo Thoracis medio, ubi est pus effusum, quia materia Diaphragmati incumbens, per Tussim agitata, & subleata, denudat recedit, adeo ut sæpe nihil excreatur; In progressu vero post multos denum tussendi conatus materia plius minus putulenta excreatur, & tandem etiam aliquid stansio. Febrii adest, quæ in principio magis acuta esse videtur, in progressu vero mitior & laeta magis redditur, ad Medicinam ferè naturam accedens, quæ velper præsertim exacerbatur, & circa noctem vehementior est. Respiratio semper est gravis ac difficilis, una cum sensu gravativo pectoris, quando patientes flant sit sedent. Si verò decumbunt, in specie in Docto sonant aliqualem fluctuationem, & decumbendo optime se habent, & sine molestia ferè respirant. Quando verb inclinant, v. gr. Calcos aut solvere aut ligare volunt, videntur suffocari; hinc enim à pondere puris incumbentis Diaphragmati, & pulmonis inundantis, Diaphragmatis motus ferè antrotrium versus impeditur. Antrotrium subinde vesant, superveniunt interdum palpitationes Cordis, item sudores aliquantuli nocturni; ultimas leniunt frequentissimè Expectorationes ex pectoris cavo ad Os descendentes insar aque calide, ac in specie Mucosæ regione partis affectæ subinde Plogosi quadam, nunc apparetur, nunc transiunt, sudet, ita ut quando Empyema nullum latet occupat, Mala quoque sinistra Plogosi patitur. Tandem in ulteriori Mali progressu percipiunt frequentes Soporæ quandoque tetrum, cenerum, & quasi prædium contusum in Ore. In Plogi talium hoc est singulari, quod cerebrum vicibus in una aut altera pulsatione intermittit, idque in specie, si tangatur in Carpo Lateris siccidi, in altero Carpo Pulsu fulsente se res habentes; ita ut intra quatuor Pulsationes semel penitus cesset, quod etiam in Pleuritis fit gravioribus, Plogi in Thorace erumpunt cum reliquis Pithis aut Tabis placentibus; vid. *lib. 3. ap. 15. Prognost. Sec. 16. §. 11. 12.* Ac denique, si in dextro latere est Empyema, tunc decumbentes in eodem bene habent; Sin vero decumbunt in sinistro Latere, malè habent, & contrà. Tumore Intercoastalis mollior comparet, vid. PLATERUS *observ. p. 734.* aut potius, annotante RIVERO *pro. lib. 7. cap. 4.* Latens affectum Tumorem oleosum manifestat à tenuitate Matris aliquid transudatione. Plura videbitis in HIPPOCRATE *Prog. 4. 16. §. 6. 7. &c.*

P R O G N O S I S.

Prognosis variat in his affectibus pro quantitate sanguinis effusi, & pro qualitate Loci in quem effusus est, quod etiam intelligendum est de Pure. Nam sanguinem collectum plura minus congruatum subitè evacuari, aut si hoc non citò fiat, suppuratum facile per vias naturæ confusæ, vel per fistulam & apertum quoriam in loco abscessum excrevit, optinuum est. Si hoc non fiat periculosum est; nam ea pure revento interdum Gangræna, & partium corruptio letalis inferunt.

Casus ab alio, percussione, & lationibus Capitis si superveniunt Vomitus, functum est signum; immit enim gravem læsionem Cerebri, Cranii, & Meningum, & nisi tempestivè insinuat Trepanatio, Mors sequitur.

Febrii interdum periculosa his affectibus superveniunt, interdum altera internam partem, adeoque Pithis & tabes accedunt, interdum gangræna, & consequenter mors sequuntur.

Ac in specie Empyema Pectoris, ut plurimum ex læsione pulmonum, nisi maturè euerit, Pithis pulmonalem & Tabem infert; si vero sanguis in cavitatem abdominis effusus suppuraret, frequenter apostemata circa Lingula infert, itaque fistularetur.

Sanguis in capite infra cranium collectus est malum peracutum, & ut plurimum letale, quia citius Ægrum Morti tradit, antequam ad supurationem veniat, proin et maturè exitus præcipitur.

Urina rubre, turbide, cum sedimente multo in lateribus Natulæ, indicant committere læsionem Visceris casualis interni, præprimis à causa externa, à Vethere, vel casu; hinc natura malum à bono segregat, & pro leviore Ægri indit. Principè aures illud sedimentum in lateribus indicæ Pinguedinem realem dissolutam, & cum urina excretam.

(Tunc tempore Dr. D. ETYMILLIUS nobis monstravit Tom. II.

arum solum elois consensum dissensu, ab Maferrii lib. 1.)

*Prognosis in Empyemate Pectoris HIPPOCRATES 2. Progn. tex. 17. §. 9. 10. &c. innit, evasores scilicet, quæ Febrii aut ruptura defert, qui citum citius apparet, aut amplius sinit, nec Diarrhæa laborant, & Putrem, album, & egale exspugnat; contrà moritur, quibus symptomata illa permanent, aut recedunt, cum Puri flavi, viridi, lividi, fucidi, viscidis & spumæ apud: quibus accedit Diffusum major miserve, quorum illa ad Partem cepiam exsistit sufficit, hæc salutem præmittit: item *lib. 3. ap. 15. si Empyema intra quadraginta dies & nollet stant, aut alia ratione, v. g. per urinam, non expurgetur, in Talem degenerat.**

Suppuratio, quæ utramque Thoracis partem occupat, periculosior est, quam quæ unicam.

Quibus robustis viribus per per Alvim aut Vias urinarias copiose excrevit, evacuat.

*Quicumque suppurati uruntur aut secatant, si pus purum & album fluat, evadunt; fecus quibus subcruentum, fœtidum, &c. vid. HIPPOCRATES *lib. 7. ap. 45.* item quorum pus speciem argenteum velut ignis tingit: vid. WILLISIIUS *Pharm. Rat. p. 2. pag. 19.**

C U R A.

In Cura considerandus est sanguinis effusus, & postmodum pus ex eo genitum. Sanguinem effusum & congruatum quod attinet, sive illud sit à Vulnere, sive casu ab alto acciderit, est primario est incumbendum, ut

1. Sanguinis grani resoluatur. Erhinc

2. Per convenientes vias quancitòs evacuetur.

3. Quod si sanguis affusus vel diffusus ante suppuracionem commodeque evacuari nequeat, suppuratè promoveatur & febris aduncta tunc nonnihil mitiganda est.

4. Per fistulam per d. sitas vias quancitòs evacuetur.

5. Læso partem à pure care d. P. in integrum restituenda, quod in omni Empyemate aequitè obtinet.

*His illas convenientes, per quas tam languis, quam pus, quam pus exinde genitum, ex corporis cavitatibus evacuetur, sunt hæc, ad quas vel sponte vergit Natura, & constrictur nobis imprimis à Loco, in quo sanguis congruatus hæret, quando interdum evacuat per vias confusæ, alvim, sudorem, urinam, interdum per alia Loca, vel quod docet ars per vias inconfusæ Arte Chirurgica factas, dum sanguis in cavitatibus collectus, vel grumulos, vel omnes exinde genitæ purulentæ, optime evacuantur earum perforatione; v. gr. si in abdomine hæret sanguis vel pus, fistula debita. Periclitari, aut Vulnere majore dilatatione, si punctum sicutum est illud, dictis via aperienda, vel alio modo infra Umbilicum cum Lancetta vel Scalpello fiat apertura 2 Thoracis apertis, seu intra quintam vel sextam Costam (à supremis numerando) Scdio, optime evacuat sanguinem & Empyema Thoracis. Ac denique, si faciunda apertio in nullo, optimus remediis est eius Trepanatio, v. gr. Cranii Perforatio. Hi sanè modi sunt optimi, qui citò & tuto satis curant, modò, quod legitimum viam, maturè insinuantur hæ Operationes Chirurgicæ, & temporis habebatur ratio, & non perverso consilio more, aut vanquam, aut tardè nimis insinuantur, quando vel Vires sunt prostratæ, vel sanguis iam tunc firmior congruatus est, vel quando pus ita est alteratum, ut commode evacuari nequeat; quin potius, quod celerius insinuantur tales operationes & perforationes, quod promptior & optatior est successus: de quibus tamen Cauteis & Requisitis aliis videantur Rerum Chirurgicarum Scriptores, in specie SCULTETUS in *armam. chirurg.* HORNIUS in *M. v. v. v.* & imprimis THOMAS FIENUS in *lib. 12. chirurgiæ*, ubi insignes operationes describitur, ac denique GUILLEMAU Gallus, de *Operas. chirurgicis*.*

Quod si verò modis pharmacæuticis agendum sit post casum ab alto, vel etiam alio casu, pro sanguine plùs minus grumoso, in quodam corpore loco existente, dissolvendo & dissoluto evacuando; subinde necesse est, ut in gravioribus Vulnibus & his supervenientibus flagrantibus & Extravagationibus sanguinis, in primo principio Plogositi insinuat, idque in specie aut in corpore Plethorico, aut Ebrio, aut subiecho, cum sanguis alius est aptus ad insinpiendas turgescencias febriles. His in casibus convenientissima est sanguis missio ad certum poodus, pro circumscriptione ratione, ut ita immutetur aliquantulè sanguinis quantum, & impetus ejus per Vasa se effundens impediatur, ne in Vasis uberius turgescens, confertim nimis, & nimis copiosè per vias lesam in Corporis Cavitatem irrumpat; observando tamen semper circumstantias & regulas Revul-

sonum quoad locum Venæsectionis, in quem influit sanguis, ut nempe in contrario seu opposito loco Venæ sectionis aperiat; v.g. dum suspicio est sanguinem fluere in abdomen, aut per inflexio Thoracis Vasa in Thoracem, sectionis in Brachio; si vero ex superioribus Thoracis Vasis, secetur in pede; sin in capite, Venæsectio Brachii ferè sufficit.

Facile vel omnia Venæ apertione maturè sanguis omnis grumosus resolvendus est, & resolutus, ut dixi, vel deus nature per convenientes vias evadendas, vel per mentis Artificiosos arte exhibendos. Resolvunt grumosum sanguinem omnia, quæ absterge acidum plus minus, qualia sunt Pulveraria plurima, ratione alcali plus minus occulti, vi cuius absterge acidum cessat coagulatio. Equidem latus campus horum patet, quæ inter in specie eminent Rubia Tindorum, & hinc artificiale illud Tindorum usuale paratum, Germ. Cray, quod in specie aceto ebullitum & potum egregie dissolvit grumos: e.g.

℞. Rad. Rabie tincl. prop. 3℞.

Ebull. in l. q. aceti;

Colat, capiat per duas dosibus,

D. S.

Potio dissolvens per duas dosibus.

Æger io lecto se probe contect, sudoremque expectet.

Sic quoque laudantur Radix Tormentillæ, Bardanæ, Symphyta majoris, Bellæ, Caryophyllatæ, Polygonatæ, Scabiosa, Abinthium, Abrorum, Hypericum, Bellæ minor, quam singulariter tanquam secretum commendat HARTMANNUS; Chæreolium, Cardus benedictus, Locatium, Hyssopus, & in specie Hedera terrestris; item Babina, Verbaicum, Geranium Robertianum cum Vino decantant; succus Geranii, Arnicæ, de cuius usu egregio vid. Juss. d. N. C. ann. g. 1789. n. 2. nempe radix eius, Folia & flores a pup. l. ad ii. in Robustis decoquantur in cerevisia, decoctum calide propinat imperando sudorem; Semco Cardui benedicti & Martæ, Chæreolus, Hyperici, &c. item conveniunt Rhabarbarum, radix Angelicæ, Vincetoxicæ, Pimpinellæ, Antholochæ rectandæ. Aquæ horum simplicium, in specie Chæreolus, Scabiosa, Alkekengi & Cynosomi, tyrrupus acetosæ Cerei, Scabiosa, Hyssopi, &c. Reliquis tamen omnibus palmam referat acetum Vini, in quo Lapilli Cancrorum sunt soluti, ubi evadet liquor urinosus egregie diureticus & sudoriferus, qui sanguinem congruatum dissolvit, & dissolutum per convenientes vias evacuat. Hoc pertinet *Sperma Ceti* a 3℞. ad 5℞. in Cerevisia vel alo Vehiculo calido propinandum, quod nobilissimum & expeditissimum est remedium & mirabilis efficacit; in specie si sanguis congruatus sit in pectore, cum Respiratione difficili, Expectorationem promovet; Vid. *diff. de Sperma Ceti* cap. 1. §. 8. Porro Callorem, sanguis hinc secundum HELMONTIUM *tr. Pleura Farra*, ritè collectus ad 3℞. propinatus, Munda ad 5℞. hic etiam communiter laudatur, sed oibis valet, quia non habemus genuinam; Vulgaris enim est liquamen ea corporibus Bituminæ, & Albalibio conditum, unde tutius ab eo abstinemus deficientem gemina. Hicce addunt Bezor Orientalæ, Lapilli Cancrorum, Lapides Percarum, Carpiosem, Bovini Felle, album græcum, dens apri cum aceto, Corallia cubra, & Marina quæcumque seu ex piscibus parata, egregia sunt; Mastilla Lucii piscis, succinum album præparatum, Carbones Tiliæ ad 3℞. vel 5℞. in aqua Chæreolus propinatus commendantur ab HARTMANNO. Officinalia cum Aceto destillato propinata, Marga Saxorum, Terra Hibernica, Terra sigillata, Bolus Armena, Terbinthina, Fuligo vel pulvis sacculus ex Carbonibus Tiliæ. Lapilli Cancrorum, & herba Chæreolus, cum 3℞. datur in aceto. Hinc pulvis Augustinorum ad calum in aceto Vini, vel destillato, species Diamuræ *Myrsinæ*, iterus Palsæ in aceto dissolutæ & propinatus, &c. in sanguine coactore tunc singulari: Item hic admodum præparanda *humana ex canina*, quæ ad 3℞. ad 5℞. infusa, & in potu cerevisia assumpta, est egregia in casu ab alto; item Antimonium diaphoreticum, Besoreum minerale, & reliqua consueti sulphuræ Antimonialis ita, &c. Acidum plus minus abstergentia; Essentia Myrrhæ, Florum Hyperici, in specie essentia quæcumque Vulnerariæ, Tindura, succus & extractum Florum Bellidis, Tindura Cereolarum *Myrsinæ*, spiritus Theriacalis camphoratus, spicius Tartari, Liquor Cornu Cervi succinatus, Mixture simplex, Tindura Bezaradica, & similia, quæ in genere ad sanguinis grumos, adeoque in casu ab alto in casibus Chirurgicis post Vulsura adhibentur.

Cæterum in propinandis his remediis contra calum ab alto, seu contra sanguinis grumos resolvendos, siue causa

externa siue interna occasione dederit malo, observetur necessario hæc Cautela: ut nempe cum his sanguinis grumos colentibus temporè talia melleantur, quæ sanguinem congruatum resolutum simul per convenientes vias evacuare queant, adeoque simul, vel ut alius laxior, vel urina aut sudor uberius fluat, opera danda est; quod enim confert, ut dissolutus cruor in corpore hæreat? Unde si sanguis dissolutus hæreat in abdomen, aut locis alio vicinis, & adfuerit huius inclinatio ad feculum, aut natura per alvum ejicere inclinet, simul laxantia remediis istis, v. g. Folia Senæ, vel, quod melius, Rhabarbarum, aliaque lœmilia blanda adfergentia addenda erunt; nam & ipsum Rhabarbarum, simul sanguinem resolvit: e.g.

℞. Herb. Chærefol. Mi.

Rhabarb. el. 3℞.

Fol. Senæ, flos Ript. 3℞. vel i℞.

Sal. Tartari 3℞.

Coqu. in l. q. aqu. simpl. leniter;

Colat. adde

Lapill. Cancr. prop. 3℞.

Sperma Ceti 3℞. ad 5℞.

Sal. tartari cal. ang. 3℞. ad 5℞.

Syr. fructif. q. l. pro dulcoratione.

Misc. pro bina dosi;

Idque quando nimis blandè evacuandum est per inflexiora.

D. S.

Potio Resolvens bene agitata per duas victus.

Vel

℞. Herb. Chærefol. Mi.

Sal. Tartari 3℞. ad 5℞.

Coqu. in l. q. aqu.

Colatur. infunde per noctem

Rhabarb. el. 3℞.

Fol. Senæ, flos Ript. 3℞.

Manc exprime, & adde

Lapill. Cancr. prop. 3℞.

Sal. tartari cal. ang. 3℞.

Syr. fructif. q. l. pro grato sapore.

Misc. datur per duas dosibus.

D. S. ut supra.

Vel

℞. Deco. Chærefol. aut per quod melius, Indurr. 3℞.

Infunde hinc tepido adhuc per noctem in loca calida

Rhabarb. el. 3℞.

Fol. Senæ, flos Ript. 3℞.

Sal. Tartari 3℞.

Manc adde Expressioni

Lapill. Cancr. prop. dr. i℞. vel i℞.

Sal. tartari cal. dr. i℞. ad i℞.

Syr. Myrr. iter. q. l. pro grato sapore.

M. D. S.

Potio Dissolvens per aliquot vicibus.

De hoc subinde Æger capiat haustum; ita enim sanguis solvitur, & per inferiora excrevitur.

Si verò in Pectore, vel locis vicinis, & remotioribus sanguis congruatus hæreat, & Natura inclinet evacuare per urinam, Diuretica sunt addenda, quæ sanguinem resolutum per vias urinarias amendant. Sin ad sudorem natura Ægri vergat, & in partibus aut Vasis magis exterioribus hæreat sanguis, tunc sudoriferis præsertim suat optima, quæ celotulus in sanguinem extramittitur.

Facit hoc etiam egregia Cura LINDANI, qui curavit aliquando Fabrum quendam lignarium, & summo tecto decidentem, dum ipsi redes edificaret, & duas Colas frangentem, simulque sanguinem multum exsurgentem cum succubationis metu, unde collecti, sanguinem in ipsum Cam peccoris effusum esse. Paravit ergo decoctum ex Beasica rubra, Artemisia, Consolida Sarcenica, & Floribus Bellidis minoris: cui deorsum infudit aliquid Rhabarbari, & hinc post infusionem addidit aliquid *Spermatæ Ceti*; tunc sumit scorum *Lapilli Cancrorum*, & illis ad eminentiam transversu digiti affudit acetum Vini, & cum feryor defebisset, dedit aceti huius bene agitati cochlear unum, & miscuit cum uncis quatuor vel quinq; prioris decocti, & ita hauriendum dedit, ex quo potu sanguinem congruatum aota, postea resolutum protinus melleje cepit, & quidem integras Matulas, cum magno levamine, & tertio die continuato potu venit missi, quæ agerent ceteri operarii: Vid. *comment. in præz. thimari. Harmaniani*.

Ac siue potius præstat a Diureticis incipere; in fine autem non inconvenientem est, aliquid in diuresum subnectere. Adeoque convenit in dictis calidissimis Mixture Polystropha ex Lapilli

bus Cancerum cum Aceto distillato, Diaphoretica & Diaretica, c. g. confici possunt tales formulae:

℞. Lapill. Cancer. prop. 3℔.

Acut. Vin. 3℔.

M. D. S.

Mistura Resolvens pro una vice.

Vel

℞. Lapill. Cancer. prop.

Sperm. Ceti,

Sang. Hircin. legitime coll. vel Antimonii

Diaphor. 3℔. ad 3℔.

M. pro 3. doibus in Aceto assumendis:

D. S.

Pulvis Dissolvens.

Vel

℞. Sang. hircin. prop. secundum Helman. 3℔.

Terra Sigill. vel Marg. Sacer.

Antimonii Diaphor. ana 3℔.

M. Div. in 3. part. aqu.

D. S. et supra.

Vel prescribat talis Pulvis contra casum ab alto.

℞. Lapill. Cancer. prop. 3℔.

(cum Aceto sunt magis diuretici)

Rhabarb. al.

Sperm. Ceti,

Caster. vel Myrrha,

Sang. Hircin. leg. prop. ana 3℔.

M. & Pulvis: S.

Pulvis Dissolvens pro aliquot vicibus.

Dosis 3℔. in decolla Chersofolii vel Fanculi. Item

℞. Lapill. Cancer. prop.

Officelli. prop. ana 3℔.

Rinc. Mithras. 3℔.

M. D. S.

Pulvis Confolvens.

Aliis conveniunt etiam pro Scopo sudorifero & diuretico prescribuntur potiones, supra Art. 1. Cap. 1. ubi de inflammatione in genere commedatur, vel mixtura polychresta hylis, quæ est:

℞. Aqua Pluv. Papav. errat.

Scabif. ana 3℔.

Spiritus Theriac. camp. 3℔. ad 3℔.

Acut. Vin. 3℔. ad 3℔.

Lapill. Cancer. prop. 3℔. vel borum & Masill.

Lucis pifit ana 3℔.

Syr. Fluv. Pap. errat. vel Scabif. 3℔.

Miscantur.

Capiatur coctilem.

℞. Aqua Arseni. vel Scabif.

Chersofol. ana 3℔.

Acut. Vin. simpl. distillat. 3℔.

Cerall. rub. prop. 3℔.

Lapill. Cancer. prop. 3℔.

Laud. Opia. gr. ii. vel 3℔.

Syr. Card. bened. 3℔. vel 3℔.

M. D. S.

Mistura Dissolvens coctilem sumenda.

Hæc est Potio generalis, usari potest coctilem unum, vel pro hinc aut tribus doibus, & parvus per sudorem, partem per Urinam operatur.

Notandum. Quando hæc miscetur, fieri effervescentiam, & ita ex his prodire concretum novum.

Vel

℞. Aqua Ceraf. nig.

Lil. convall.

Mellif. ana 3℔.

Acut. Ruten. 3℔.

Lapill. Cancer. prop. 3℔.

Cinn. Antimonii 3℔.

Sac. volat. Saccin. gr. xii.

Syr. Fluv. Yand. 3℔.

M. pro aliquot doibus.

D. S.

Potio Resolvens pro 3. doibus.

Item juxta Clysmata repetita etiam.

℞. Aqua Chersofol. 3℔.

Ceraf. nig.

Lil. convall. ana dr. vi.

℞. Myrtici. 3℔.

Spiritus Sal. Ammoniaci dr. i.

Lapill. Cancer. prop. dr. 3℔.

Syr. de Betea. 3℔.

M. D. S. ut supra.

Capiatur coctilem.

℞. Aqua Menab.

Chersofol. ana 3℔.

Acut. Vin. 3℔.

Lapill. Cancer. prop. dr. 3℔.

Cerall. rub. prop. 3℔.

Cinnab. Antimonii dr. 3℔.

Laud. Opia. gr. iii.

Syr. Card. bened. dr. vi.

M. pro 3. doibus.

D. S. ut supra.

Vel

℞. Aqua Chersofol. 3℔. vel iii.

Acut. Vin. dr. iii. dr. vi. ed 3℔.

Lapill. Cancer. prop. 3℔. ad dr. i.

Terra Lema. vel Cerall. rub. prop. vel Antimonii Diaphor. 3℔.

Syr. Hederg. terrigr. vel de Betea. vel Card. ben.

dr. ii. ad dr. vi. M. S.

Potio Alterativa.

Capiatur pro doibus doibus, vel coctilem.

Quod si Caput simul læsum fuerit, & merus adit convulsivum, in his casibus loco Coralliorum 3℔. vel dr. 3℔. Cinnab. vis Antimonii (T) addi potest commode, quæ utilis est, si fudet consertim Ager: Vel

℞. Lapill. Cancer. prop. dr. i.

Antimonii Diaphor. 3℔.

Myrrh. al. gr. xii.

M. pro 3. doibus.

possunt etiam gr. ii. Laudani Opia. addi:

D. S.

Pulvis Caput confortans.

Si gravius fit malum, necesse erit, ut prescribatur decollam Pulverarium, cui addi potest mixtura ex Lapillis Cancerum cum Aceto parata.

In illa Ager utatur crebrius Chersofolio misum in cilio in fulculis pro multiglicie scopo.

Sanguis ita extravasatus suppuratur & fit Empyema. Empyema verò quod attinet, epifque Carum, sive quando Pus lacum est, & in cavitate quadam fluctat & stagnat, præsertim Thoracis, tribus scopis abolvenda venit:

1. Ante omnia evacuatio Puris, sive mediata sive immediata, per convenientes vias est necessaria.
2. Dum hoc fit, simul Acrimenia ipsi acuticorrigenda seu temperanda.
3. Læsi Partis vel a Pure vel ab Adfessu indulta, debitis remediis restitenda: id adduc in quolibet observandum est Empyemate.

Cum verò præ cæteris Empyemata Thoracis sint frequentia, hujus curationem proponemus, ubi quæ de hoc dicuntur, de aliis simul intelligenda sunt.

I. Pro primo scopo eadem observanda sunt, quæ supra in cæsa ab alto pro sanguine gramoso dissolvendo, semper per convenientes vias institucunda venit Puris evacuatio. Viam evacuationi Puris dicatur, pro varietate partium & ipsæ variant, siveque vel Naturalis, vel Artificialis: Illæ, quibus Natura molitur evacuationes, & quæ subinde per variæ loca inimicabili arte purulentia evacuat, ut dom v. g. Pleuriticozum, vel alias in Thorace suppuratorum purulentias, tunc per Urinam, nunc per Alvum, nunc frequentissime per flatum evacuat, imò per porulos in iate Corpore Scabim (de quo vid. Hildanus. d. 26 C. Ann. 1. Observat. 146. pag. 130.) solvi observatum fuit. Sane Pus Empyis per Urinam excretum cum dolore quasi Nephritico & Stranguria refert HILDANUS lib. 3. Observat. 10. simile videt. apud PANAROLUM, item BORELLUM Cap. 1. Observ. 17. & RHODIUM Cap. 1. Obs. 19. & 25. SCHENCKIUM Obs. pag. 243. & 251. Ipsemet curavit Mulierem gravi Pleuritide correptam, cui suppurat superveit fortissimè materie purulentia Urina, qua per decem vel pluris dies continuatè cum sensibili allevatione ipsa sanabatur. Preterea simul Phlegma ac Tabem per Pulveres ex Aethiodico Partis, Myrrha, Lapillis Cancerum, Antimonio Diaphoretico, Balsamo Sulphuris teretibus, & Elixir Proprietatis raro propinabam, quia hoc semper Alvi fluxum silebat, ut necesse esset, eam deinde provocare Clysmata. Sicut iam supra Art. 10. & 11. cap. 1. hujusmodi variz excretioes circa Hepatis & Lienis Adfessum insinuatæ fuerunt. Facit hoc quod refert HILDANUS Centur. 3. Noster. 39. nempe Ulcus

(T) Hæc sanè audent 3℔. vel 3℔. Cinnabaris Antimonii prescribere: vix ad gr. x. fortius exhibent.

cus diuturnum in Brachio ex ista Sclopeti, quod quia per *U-nam* Pus excrebatur, Ulcus iocabatur, quamprimum vero Ulcus recedens flebat, tum patiens rursus Urinas laudabiles nullo pure permittas reddere. Per quas vias materia Empyreatica in Pelle v. g. deferatur ad Urinam, aut Aliam, aut etiam ad Os per Exspirationem plures Auctores litigant. Conf. SENNERIUS lib. 2. *Prax. ubi de Pleuritide* Quæst. 3. WILLIS Pharm. Rational. Part. 2. pag. 550. & 501. *Mifcellan. A. N. G. Ann. 3. Obs. 113. pag. 393. & Ann. 6. Obs. 41. pag. 75.* His in casibus, si moluitur aliquid Natura, semper Milder ejus est Medicus, dum, quo illam vergere videt, eo simul motum illius promouet: v. g. quando in Pleuritide suppurata redditur Urina purulenta, denter Diuretica, sin vero in Empyemate Pectoris Diarrhoea purulenta apparet, Alvim stimulantia & laxantia, si Natura inclinet ad Os mediante Tussi, propinquant Vomitoria vel blandè temperata, expectorantia vulgè dicta, si verò raptè abscissa & hellestia jam Empyrema Pectoris, Naturam nil moliri observat, pro copia Puris, dum Vires adhuc constant, evacuanda, similiter vomitoria conveniunt, casus insignes utilitates pluribus PISO de *callosis feris* declarat, quippe qui mirabiliter contenta & Pectoris purulenta evacuat. Ita ut unicuique Vomitus plus exsternat, quam septem diebus Tussi reficitur: modo abest periculum spui Sanguinis, in quo Medicus horreat vomitoria: contra si illud abest, tunc iudicet vomitum. Quod si tamen, sub metu licet spui eruenti, Natura inclinet evacuare per Os, sublevari Medicus Fauces lubricantia & expectorantia, hinc *Spumam* Impetris promovendum, ut ubi medio, ceu per proximas vias, modumque magis ordinatum, Puris fiat evacuatio. Pro quibus scopis conveniunt secretum FREITAGII ad Asthma, *artic. 1. cap. 2. silius. 14. descriptum*; item Nicotiana effi egregia, cujus usum supra lib. 1. a. ex FERDINANDO declaravi.

In spate hoc promovenda habenda simul ratio qualitate materia purulenta evacuanda: quæ quod acrior fuerit, ac recondi, eo magis temperantia, simul usurpanda sunt, quod si verò non acra, sed crassius sit Pus evacuandum, Incidentia & aspergentia magis in usum vocanda. In specie Mel & ex eo paratum Hydromel seu Aqua Mulsæ, Oxytel Squillitico, &c. inter expectorantia primatum ducunt: in qua adusa Hyssopus, Scabiosa, Parietaria, Helenium, Iris Florentina, Marrubium; Liquiritia, Jujubæ, Passulæ, &c. pro Indicationum varietate simul incoqui & propinari possunt: sicut etiam decoctum ex Scordio & Scabiosa tota, cum Oxy-melle Squillitico edulcoratum, & calidè haustum, egregiè conveniunt: Vel fiat *Mixtura Ragedorant.*

*M. Agn. Hyssop. 3ii.
Asthmat. 3ii.
Oxy. Squillit. 3vi.
Syr. Nicotian. 3ii.
Emet. 3ii.*

M. D. S.

Mixtura Expectorant coctileatim.

Capiatur pro lubito.

Artificialis via pro evacuando pure sunt Paracetica, quæ ubi priores illæ Naturales vel non succedunt, vel non suffecerunt suspicio est, in tempore infitui potest. Vid. SYLVIVS lib. *Prax. 2. s. 10. p. 18. In tempore dico*; ut quando Natura Empyreica non expurgat per Urinam, statim instituta Paracetica, ne Pus in Saniem convertatur, nec vires frangantur, aut Pulmo à Sane corruptatur. *Pantient* etiam à quibuscumque intra Costas inveniunt. VOLCAMERUS in *M. A. N. C. Ann. 9. & 10. Obs. 19. In Schol. mentionem facit Emplastrum Nivirimentis Rhengensis*, seu potius *Colei*, cuius in edocendo pure in Abdominis Cavitate contento vires insignes expertas est, adjuvans intus Potionibus Transmutatis.

II. Pro secundo vero scopo, quæ attrituale Puris & ejus usum verrigunt, h. e. ut alius dicunt, Ulcus aspergant & mundificant, optima sunt Sulphurea Remedia, pinguedine sua quodcumque Acra, in specie pus salum, temperantia, & balsamica quasi sua vi lesionem partium à pure oriundam contingenter ac præventivè, & ulteriorem progressum aspermant & Puris inchoantia; & sine Sulphurea optima sunt in omnibus Empyematibus Paracriticis temperantia. Talia sunt Sulphur & antimonialis fixa, ut flores Sulphuris, Antimonium Diaphoreticum, Antiechidicum Pomeri, Bezoardica Mineralia, Myrrha, Pulvis Pectoralis Lindani, cum Antimonio Diaphoretico, Balsamum Peruvianum, Balsamum Sulphuris.

III. Ex variis, quæ Infusum Puris potè Abscessum suppuratum & Empyema resoluunt, & eam quasi consolidant, sunt Vulneraria: quæ inter eminet *Hedera terrestris*, quæ ubique

simplex est, Impetris in Empyemate Pectoris post Pleuropneumoniam suppuratam orto: sic pertinet hoc *Scabiosa* & *Chorofolium*; quod Trifolium simplicem, ut ita dicam, in Viscerum lesionibus ex Empyemate contraria multum valet: item *Ligustrum* & *Radix* sudoriferarum *dec. ossa*, in specie *Ligni Salsæ*, *Radix* Chinæ & *Ligni Guaiaci*, quæ hic sunt optima, partim paracriticis corrigunt, partim labem partibus indolentem corrigunt: vid. *ARGÆUS Cap. de Capitis Pulver.* & SYLVIVS *Prax. lib. 1. cap. 24. §. 12. pag. 196.*

Cæterum dum hi tres scopi intenduntur, observandum, ut semper simul habeatur ratio (1.) Puris, ut hoc vel prius vel simul evacuetur, adeoque cum Vulnerariis Pus promoventia adhibenda erunt: (2.) Adjuncta Febri, ne hæc plus minus intensæ magis intendatur; Nam semper conjuncta effi Febri Lemæ, plus minus ad Hæcticam inclinans. Hinc præmissa puris evacuatione quacunque.

M. Agn. Hyssop.

Scabios. ana 3℔.

℔. Sulphuris 3℔.

Antimon. Diaph. 3℔.

Bezoard. Jervol. 3℔.

Syr. de Nicotiana. vel Hyssop. 3℔.

M. ℔. Potio.

D. S.

Mixtura Mundificant coctileatim.

Usurpatur vel pro duobus dosibus vel coctileatim ad corrigendam partem paracriticam in Empyemate, partim ad corrigendam aoriam à pure indolentem partibus: cui, si introfuerit Febri, simul nonnulli Spiritus Nitri dulcissimi poterit.

Vel

M. Agn. Papav. errat. 3ii.

Act. desillat. 3ii. 3ii. 3℔. ad 3vi.

Lapill. Caner. 3℔.

Antimonii Diaphor. 3℔.

Syr. Flor. Papav. errat. 3℔.

M. ℔. ut antea.

Capiatur coctileatim, præprimis tempore Aëlis.

Vel

M. Amygd. dulc. Ambrif. 3ii.

Am. Melis.

Papav. alb. ana dr. ss.

eum ℔. q. Agn. Papav. errat. f. Emulsionem

Cui adde

Maxill. Lucii pisc. dr. ss.

Antimonii Diaphor. vel Antiechid. Pot. 3℔.

Edulcoretur cum pauco Saccharo:

D. S.

Emulsiõ Mundificant.

Capiatur supis, & quando placeat, impetris in Aëlis.

M. Conf. Rosar. rub. 3ii.

Ellecl. Diaphor. Fract. dr. ss.

Conf. Alchoron. dr. ss.

Cavall. rub. pr. 3℔.

Antiechid. Pot. dr. ss.

Syr. Rorag. vel Ros. Tunicæ, vel Rosar. rub. 3℔.

M. ℔. Electuarium.

De quo usurpetur ter in die, mane, à meridie, & vespere, quantitas Cassianæ, vel Nucis Juglandis.

Nec inelegans est *Liquor Betulae rotas collatus*, supis in die, etiam in ipsa Febre, haustus, tam solus, quam cum potu ordinario mistus; vel in mediocri nam *Puris indolentis* dissolvantur 3ii. vel 3ii. *Galatina cornu cervi*, vel *Rosæ Officinalis*, &c. Egregiè proficiunt, ubi hausta effi inflammationis & defectus Virium.

Decoctum Chæresolii, item Hedera terrestris, certè egrogium est, & præ cæteris Vulnerariis excellit, præmissa puris evacuatione, in Empyemate quocunque curando, omnibus cæteris præferendum; aut ex hoc succo paratus Symplicum item Efficacia, quæ aliis addita, aut cum Antimonio Diaphoretico assumpta, sunt nobilissima; aut denique, si ejus locum semper cum decocto Guaiaci permiscetur. Certum est, quod Hedera terrestris fit inextinguibilis in hoc casu; hinc lant, qui maxime assintant.

M. Sacc. Hedera. rorr. 3iv.

Prægi 3ii.

c. ℔. q. Sacchari f. Syrupus,

addendo

Thuris,

Myrrh. st. ana dr. ss.

M. D. S.

Succus sanans.

Et subinde asurgetur.

Urticaria decoctum Radicis Cane, propinando cum emni ejus basilla dr. ad dr. i. *Antimonii Diaphoretici*; hoc enim mirabiliter suppurationes quascunque adhaerere & corrigi, anguinem granulom, & Epyemea, imprimis pedofras, tollit, & cum radice Ching vel Ligea Guapari aut *salsifras* simul coquenda sunt Hodera terrestris, Marrubium, Tullisago, Consolida major, Capillus Veneris, Hyssopus & Gimales, praeteritum ut viciid aliquid addit, & similes aliis plantis pedofras. Non opus est multa addere, simplex sufficit Decoctum, cum quo propinquet *Antimonium Diaphoreticum*, aliisque sulphurea, lumendo decocti bonum hautilum, quotidie bis, mane & vespere. ARCAEUS hoc *alegare* egregium modum docet curandi Epyemata, & Vonicas pulmonum beneficio Decocti Ligni Guapari, cujus methodus est optima, & qua ipia aliisque Epyematically lueri curati. Nec incommode Ligna Salsifras hic recipiuntur. C. E.

24. Red. Chin., in select. indiv. $\frac{1}{2}$ fl.

Rad. Lignaria, 3v.

Sentati rubri 511.

Infunde in aqu. rosae. ℞vi.

Macerentur in Balneo Mariae per 24 horas :

TABLE II

Puffin. min. cognatus, Gill.

Coquantur blando igne ad remanentiam $\frac{1}{2}$ v.

COLUMBIA, D. C.

Potio Pedus mundicatus.

Vel

24. Ref. Lign. Caniac, Ri.

சாதிக்கப்பட்டவர்களைப் பற்றி
கவலைப்பட வேண்டாம்.

Macerar per 2. horas in aqua commun. 15 vii.

Coq. ad consumpt. 25i

add

Hart, Peter, 1997.

Com. Ber. Interior.

Herb. Perenic. ana M. I. ad M. II.

Red. Lignin. 25%

Gen. Terminal. 3x1

Refol. min. consp. Eii.

Costs and revenues: \$15

Colatura D. S. ut supra.

De quo docedo: Egerat minimum tet in die, etiam tempore pallii, capiat, subungendo & alia remedia, ut Myrrham, Elixir proprietatis, ob Aloën & Myrrham.

Sulphur puriter epique Flores, item *Balsamum Sulphuris*, tam *verebimur*que, quam pro ratione partis affectu *pulveris*que cum Oleo Juniperi, *anarum*que cum Oleo Anisi pediculis, aut cum Oleo Succinai, guttas ex. *facinuram*, si veritas sit et sulphur communi, five ex sulphure Antimonio, aut ex POLEMANNO, quod maximifimum: cui non incommode potest subijci *Balsamum Peruvianum*, de Capabo, item *Tinifloram sulphuris*, &c. Egregia sunt ad quamvisque purgationem, & intestinum parvum ac Vicerum corruptionem curantur: propinquant ad aliquot guttas in vehiculo decocti Hedera terrestris, manifestumque Utera, & uterorumque corruptionis progredium præcavet. Sed hec posteriora sunt valutilia, acris & nimis calida, unde ratione Febrium minus conveniunt, sed saltem temperata aut fusa Antimonialis optime conveniunt: si autem Volatilia usuranda, & ignis eorum, imprimis Balsamum sulphuris, Calor permissior, convenienter miscetur cum Saccharo Saturni vel Antiseptico *Patris*, que diuina in Cibus etiam sunt egregia, & inhibent notam alias inducentem vel metuentem: vel fusi *Dissoluti* *Strophis* capitis sacchari, vulgaris quidem, sed nobilis Plantæ, cum cantillo sacchari temperatum, quod propterea egregium est Remedium, promovendo simul materiam purulentam effluunt per Urinum, in quo usurpatur Antisepticum *Patris*, vel Flores sulphuris & similia. Lac quoque *capitulum* cum *fastu*que refato uterumque pro ultimo hoc Scopo est egregium: vid. M. A. N. C. *ana. t. infero. t. pag. 78.* Conferatur etiam WILLIS. *Pharmac. Rativo. p. 5.* ubi de *Purificis* et *Empyem.* Testa-

hiansina denique, & quacunq; ex ea parata, impicinis Emulſio Terebinthinata cum Vitello Ovi, Melle, Succo Citri, & aqua Fragorum vel Vini, ſuam etiam hic laudem merentur.

C A P U T I I I .

De sanguinis extra Vasa effluxu.

ARTICULUS I.

De Hemorrhagia in Genere.

Tandem etiam vitatur sanguinis motus, quando hie ex Iam Valis & receptaculis penitus extra corpus effunditur: idque in hamorrhagijs: quæ vox, dum derivatur à *mico* sanguis, & *itis* fluxus, generaliter quancunque sanguinis effusione præter naturam extra corpus inanit, atque ratione loci, per quem fluit, & ratione motus, quo effluit, diffinita habet rationem, ac in specie postmodum varias fortissimè appellationes: ea Naribus enim hamorrhagia Narium; ex pectore hamorrhagijs & per Vomitus Vomitus cruenti; & ex alvo fluxus Alvi cruentus; ex Valis Anæ fluxus hamorrhoidæ; & Velicæ Miliæ cruentæ; & in Fœminis ex Valis Uteri, Menfis, hamorrhagia Uteri; & Lucis alimæ, &c. dicitur, utpote ex unius generis causis dependentes.

CAUSÆ.

Causa hemorrhagica quaecumque in genere sunt; vel (1.) ipleurum extimorum Oculorum in Veois, & Ateris apertio qualis spontanea & bifentia, & dicitur alias commuiter *Aenaphem* (V): vel (2.) ipleurum Valorum violenta imio & soluta natus, esse hanc fiat a causa externa per instrumenta acuta, quae pungendo, incidendo, contundendo, vel quavis alio vulnerandi modo imant, esse fiat & causa interna per humores acidos, & acres extimantes Oculorum Valorum erodentes, aut ipsas Tunicas Valorum teniores penitus perforantes, quae posterior species vocatur *Diergia*, item & *Stenosis*. Quidam addunt (3.) *Stenosis*, quae tamen admitti nequit, si quidem intelligitur talis funguinis tunicas, quae per Valorum Tunicas transiit, possit, quod tamen extra Oculorum apertione, vel ipleurum Tunicarum Valuis vix esse credibile, cum scilicet non in Valis iuxta Venter, sed in subfiantia partium tantum committere licet: sed enim talis densitas fatique validum, & tenacius Venarum, multo magis Arteriarum Tonicum, non impossibile fit, per eadem tantillum transiit, quod de ipsa massa sanguinea integra, utut Sero transiit per eadem non demergatur fit.

Cæterum locus *Vafa*, per quæ effluit in hæmorrhagia sanguis, sunt imprimis *Arterialis*, nam ex Venis vi & nunquam effluit, nisi his ipsæ *sum infuso aut vasa*, ut in Vulturibus; alias maxime arteriarum per *Anastomosis* fit apertio. Sanguinem autem, qui sponte effluit, *Billare* ex *Arteriis*, patet ex eo, quod omnes hæmorrhagie, v. g. *Narium*, sunt *Billatim* guttatimque, & subinde notabile spatium temporis inter unam vel alteram guttam cadentem observetur; id quod liquidissime patet venire ex *Arteriis* nunc dilatatis; nunc subsidentibus, non autem ex Venis, ratione *Pulsus*. Nam dum *Cor* sanguinem per *Arterias* impellit, eo ipso etiam idem per *Arterias* apertas expellitur subsidente vasa *Arteria* in systole, sanguis non amplius adeo conferunt effluit, & ita successivè sanguis *Billatim* erumpit: id quod simili modo etiam patet in *Arteriomolis*, viæ erronee vi studiose adimistratis, in quibus etiam subsistit tandem & repetitis vicibus pro pulsus ratione sanguis erumpit: ex Venis vero

(V) Anafistolis est *σπασμός*, relaxo, apertio: quod dicitur, os, quasi dicat, facio os laxius & apertius: *Aperturæ enim officina Ventræque & Antrorum, ac Sanguis effusus Anafistolæ.* Quom verò Vasa Sanguinem continenda leduntur, ne illorum membra dividantur, & sunt Sanguis: tunc generali vocabulo dicitur Diaptesis *διάρρηξις*, divisio: d. *διάρρηξις*, aufero tollio. Si hac divisiō fiat crasse, & causa tempore corruenda, dicitur Diabroxis, *διάρροξις*, d. *διάρροισμα*, seu *διάρροισμα*, perdo: *σπασμα* enim est comedo, depasco. Si verò & causa scienda est peremptoria, appellatur, Rhexis *ρήξις*, stratura, ruptura, & *σπασμα*, vel *σπασμός* frango, sumpto. Diapidesis remota videri dicitur, cum Sanguis per Ventræ porum transiit: & videri transit: *διάρρηξις enim est transitio, d. *διάρρηξις*, falo: Galenorum Diapidesis est *διάρρηξις* in *σπασμα*, ruptura nempe Vasis: cum enim Vasa vel rumpantur, vel Sanguis saltu *διάρρηξις*, hoc est exiit.*

verò uno ductu effluit. Ut prout probabile sit, nisi promiscuè Vasa aperiantur in hæmorrhagias arterias solum sanguinem fluisse. (X)

1. Quoad causas hæmorrhagarum venarum, Anæsthesia seu Oculorum Valsorum aperta fit vel vitio sanguinis, vel vitio vasorum, vel utriusque. Vitio sanguinis fit propter eundem vel abundantem, vel turgecentem, vel fereceptum tui asquecentem; vitio vasorum vero propter hæc inæqualiter stricta aut laxa.

Ad hoc Anæsthesia vasorum est quadruplex (Y) 1. Nimia sanguinis abundantia seu Plethora vera aut absoluta, eaque ratio: unde annue sanguinis miliones Plethoricis solent negligere frequentius hæmorrhagias excitare solet: unde e. g. Suppressionibus mensium superveniunt hæmorrhagie Narium, sputum cruentum, & quidem sine damno ac cum euphoria.

2. Est Plethora respectiva seu apparentis, eaque frequentior, propter nimiam sanguinis turgecentiam vel andam Fermentationem in Vasis, dum sanguis vehementiori Motu intellio, vel Potu generoso, vel alimentis aromaticis, magis calefactis & turgescit, aut etiam quando effervescentia tetricis nimis ebullit; sic enim sanguis turgecentis mole quasi ausus ordinariis Vasis & receptaculis contineri diffinita noque, quia per officia Vasorum capillarum dissenta erumpit: quod fit frequentius in principio, & incrementum febrium continuatur, tam Benignarum quam Malignarum, item vasorum ac morbillorum, in quibus spasmoticis sanguis & extraordinarie ebulliens Officia Vasorum aperit, & erumpit; quod in specie contingit in febribus, & in febribus, & accedat suppura quædam sanguinis evacuatione ordinaria: quod testatur Fluor ille Mensium nimis ab Arterio, Terore &c. de quo vid. LOSSIUS lib. 4. c. 6. r. 6. Similiter tamen in his, & ad illorum Vasorum sanguine pertransiente plus minus irritatum, hinc ad sanguinis motus variationem, respicienda habenda: hinc ad Obeli frequentem hæmorrhagie Narium sunt obnoxii, propter Vasa compressa ab habitu corporis singui, quia Vasa non possunt cessare, inde patet apertio: item Vini potiores, Licet et nimia dediti, ad hæmorrhagias frequentius inclinant, quod illa hæmorrhagia Narium testatur, quam a Mulli, & Vini Hispanici ingurgitatione: ORESTES lib. 1. c. 6. r. 12. observat.

3. Est sanguinis nimis tenuis, & fluxilis, ob abundantiam in nimis Seritque nimiam aquositate; unde fit, ut in tali constitutione, & Fibrarum, & Membrarum Tonus laxetur, & ipse etiam sanguis sua tenuitate facile officia Venarum permeet, eademque ita aperiat. Unde hinc ambobus concurrentibus, dum nempe a nimio Sero Fibre flaccide sunt, & ita Tonus a sanguinis fluxilitate laxus, unde consequenter languis tunc effluens minus tinctus de munda in debita consistentia compicquit, quin potius liquidus & loturæ Carnum similis; sicuti contra in prioribus duobus casibus, quando nempe nimia sanguinis copia hæmorrhagiam inducit, ipse languis crassus, turgescens, Blandus & copiosus solet effundi, idque cum impetu, cum tamen aliis sanguis tenuis existens pedestem effluit, & quasi per Vasorum Officia hiantia suadet; plurimum tamen & hic Acrimonia sanguinis plus minus salis, aut acidulæ, adeoque occulte reserpa accedere solet. Vulgo vitio hepatis hæmorrhagia hæc, in qua serola effunditur, coagulare dicitur, unde ex defectu huius sanguinis nimis sanguis serolis generetur, qui insensit tam hæmorrhagiam 1. Sed falsum est: sicut enim error alter alterum tradit, ita & Curabitur, & Epistematæ regiuni Hepatis applicanda male suadetur. Reverè autem vitium hoc in casu hæret in

primis vitis, & laia inde digestionem prima, cuique deficiat periclitare in duodeno, & inde nata vel feruente vel acrimonia sanguinis, ac in specie si alimenta nimis colliquescant. Dispositio simul concurrunt nimis potus, urinae deficiens exeretio, aut sudoris paucitas, & conserui supplelio.

4. Vitio denique vasorum Anæsthesia oritur, quando per hæc æquabilis sanguis circulus per Arterias in Venas intramptur, ita ut æqualis vel per Arterias distributio, vel ex arteriis in Venas transvasatio impediatur; idque foret ab spasmo fibrarum arteriosarum, tum (r.) ipsorum vasorum languis, quam (s.) parum, Vasa recipientium. Adeoque fit ex priori modo contingat, uti in uno altero. Sero eujusdam Arteriarum fit constrictione, & quasi per eundem liberior sanguinis motus impeditur, unde Scirulus vicinus majori sanguinis mole dissensus, necessarii in extremitate aperitur, & sada ita Anæsthesia sanguis effunditur, spleneticis hoc videtur. familiare, quibus interdum superveniunt sanguinis vomitus, ita tamen, ut percipiant prius fortes pulsationes circa Splenem, loquens vicina, quæ pulsationes innuunt motum sanguinis nonnulli impedimentum per Arterias in Splene; unde si fuit turgida, Ramuli arteriarum vi aperiantur in stomachum, & ita Vomitus sanguinis inferunt. Hinc quando cum ingui capitis pulsi fit hæmorrhagia Narium, ipsum est impediri sanguinis per Vasa vicina: unde Vasa Narium aperit, & hæmorrhagiam infert. Rursum acri, hæmorrhagia narium abacum, qui stipulimollem quandam in finis Thoracis parte percipit, autem hæmorrhagia Narium superveniat. Quid si inferiori modo accidit, ut Fibre nervæ partium recipientium quancumque ex causa irritate sit fortius stringant, & ita sanguis Vasa plus minus coardent, ex impetu sanguinis per Arterias eius influxus adhuc contingit, sed non refluus, qui plus minus impeditur per Venarum magis flaccidarum aut mollium Ora contrita, per vicina loca, quæ data porta, exit, Arteriarum Anæsthesia facit, loque hæmorrhagiam infert. Sic nempe nimis Narium intatio ab Euphorbio &c. Hæmorrhagias sæpe gravissimas inducit: vid. KERKRINGIUS Spicil. pag. 100.

Perthet aut Anæsthesia sed Semihæmorrhagiam hæmorrhagias admodum, & crebris ingruentibus, per quoscumque loca sunt; Partim ob sanguinis crassum plus minus situm, & ad Diathesin acidam plus minus declinatum, in primis sanguis tenuis simul est salis aeris, adeoque facilius aperiunt, occiditque præbens; Partim propter Tonum laxatum, quo relaxato Vasa eorumque Fibre debilitant, & admodum flaccident, unde Vasorum ostii minus costrictis hæc hifcunt hinc fit, ut hypochondriaci, Scorbatici, & Cachectici variis & stupidis hæmorrhagiis magis raro int obnoxii, ita ut sanguis non unctum, sed libram, effluat: vid. MEARA in diatriba contra Pyretolog. Anæsthesia, LOWRIUS resp. contra Mearam, & M. A. N. C. vol. 1. c. 6. r. 6. observat. 90. pag. 130. quia ob Tonum fibrarum partium vicinarum & relaxatum paralyticis affectibus obnoxii sunt, quo relaxato Fibrae Tono & Vasis sanguis effluit, ipse serolis, cūque acrior fit scorbaticorum sanguis, hinc in hæmorrhagiis recidivantes incidero solet; hinc Mulieres Scorbaticæ etiam nimio Menstruo Fluxu laborant, item Viti scorbatici eorum hæmorrhoidium Fluxus patitur: Partem denique quod Scorbaticorum acervum Syllæm pathematis convulsivis obnoxium admodum fit, unde irritatum quodam in loco, & spinis lappis scorbaticis hinc ubi visus non tendi Fibre, pulsationes aut Tonos serolis, hinc hæmorrhagiæ etiam solent. Comprehendit hoc notabili

(X) Falsè colligit Auctor Sanguinem fluere ex Arterii tunc dilatis, vitio subsistentibus, ex eo quod guttatim effluat: nam si hoc verum esset, singula gutta Sanguinis singulis Cordis pulsationibus responderent, quod falsum. Liquore enim si copiosè & cum impetu & canali effundatur, non guttatim, sed continuo fluxu fluunt; deficiente vero idem non quantitate & impetu, guttatim decedere incipiunt. Et primum quævis frequentioribus, non rarioribus & rarioribus guttis: neque enim fluxus non guttas coarctari adeo graviter, ut aeris resistens superare valeat. Nec autem quævis singulis deficiat quantitate & impetu, siquidem (maxime si canali effluat non satis sit angustum) decedere nequit, nisi post longum & longum temporis intervallum; hinc fit ut liquores copiosè & magis vel minus præditi, assidue non interrupto fluxu effluant; postmodum cum illorum copia vel vis diminuat, minus guttatim defluunt, non guttatim, sed ut gutta ipse primum frequentius, ac gutta ipse primum decedat. Sic Sanguis si ampliori effluat, adeoque majori quantitate, & magis impetu, & Vasis effluit, sive ex Arteria, sive ex Vena erumpit, semper succedente fluxu fluxus (est in Arteriovenis p. Cordis distole & sistole tunc fortis tunc debilis sicut) & ita si Vasis existantem, effluat angustum, vel nulla porus vel minima quantitate effluat, semper guttatim debillabit, sive ex Arteria, sive ex Vena fluat. Sic ex seramundum in digitis extremitate ac salis Sanguinis guttula rarissime extrahuntur: videmus vel Vena vel Arterii capillari perisist.

(Y) Aut Auctor quadruplicem esse Anæsthesiam vitio Vasorum, eaque enumerare incipit. Verum manifestum est, tres priores Anæsthesias species non ad vitium Vasorum pertinere, sed ad vitium Sanguinis; illis enim ait c. 1. Plethora veram, 2. Plethora apparentem seu Sanguinis turgecentiam & fermentationem, 3. Sanguinis effluum vitium remittentem & fluxilitatem. Quarta tantum Anæsthesia species vitio Vasorum, c. 2. est.

Observatione WILLISIIUS Pharm. Rarior. Part. 1. Quam etiam referendum spatam cruentam ab Ulcera pedis diuturno coalescente, quale RHODIUS Casar. 2. Observ. 35. annotavit.

In hacenus enim dictis Anatomicis casibus, tam ad sanguinem quam vasculorum plurimum respiciendum venit, ita quidem, ut frequentissime acidum, confluxum sanguinis motum ad organum præternaturalem concitans, aut itidem acidum plus minus sufflam Vasa, eorumque aut partium vicinarum fibras vellicas, considerandum veniat. Hæc de Anatomicis.

II. Diarrhoea & Diarrhoea inducunt omnia externa, quæ aut incidunt, aut parantur, aut contusum. Vasa aperiant; uno verbo: omnia externa, de quibus in Chirurgia. Ex causis internis est quodcumque acre, imprimis acidum aut acidofalium, utriusque Vascularum corrodens: quæ inter intermedium Lymphæ acris nimis & acido-salis multum habet in recessu, aut etiam ipsa crasis Massæ Sanguineæ acido-salis redditur. Pertinent huc suo modo quæcumque nimis arida inspirata. Nam hæc, ut Narium vasa irritare, ita & Pulmonum vascula emovere valent, unde diuturnum partium hæmorrhagia facillè postmodum superveniunt.

Causæ occasione plures etiam sunt: nempe (1.) Motus corporis nimis, e. g. Sternutatio, Tussis, Vociferatio, Vomitus, & pondus incongrua elevatio, unde v. g. Menfes nimis: vid. FORESTUS lib. 18. observ. 14. & 16. (2.) Alesis morbi vehementiores, ut Ira, Gaudium; hincque Menfes nimis ex LOSSIO supra allegata (3.) Aeris insepel applicata, ut Helleborus albus in Sternutatio, Suppositoria, & Eodem acris, Hæmorrhoides concitantes: vid. FORESTUS lib. 23. observ. 4. necnon purgantis acris, e. g. Scammonium, de quo vid. MONAKDES lib. 12. cap. 3.

DIAGNOSIS.

Quod attinet signa Differentialia: Diagnosi ipsius hæmorrhagæ per se patet; Differentia saltem causarum observanda sunt, pro quarum variatione varias etiam est sanguinis effusio modis, dum sanguis, qui effluit, floridus, rubicundus, copiosus, &c. innuit causam anatomicam propter aliqualem sanguinis abundantiam & turgescientiam: observandum tamen simul cum his est causarum antecedentium impetus.

Sanguis effluens in loco, cum forti regionis plus minus vicinæ pulsatione, innuit impedimentum plus minus sanguinis motum, per unum alterumve Arteriarum furorem.

Sanguis effluens tenuis, apertus, & instat loturæ caruium, ut loquuntur, plus minus signum est nimis sanguinis serositatis & aquositate.

Denique humores acres excedentes præ præcesserint, non possunt causæ latere, observatis simul cæteris concurrentibus signis; manifestè plus minus acris salis sanguis effluens gustari solet.

In genere adhuc notandum, sanguinis fluxum futurum interdum prædicere Hypochondrium tensionem atque pulsationem, & difficultatem spirandi; imprimis si solenior quædam sanguinis evacuatio suppressa fuerit, aut causæ quædam sanguinem exagitans præcesserit, vel symptomata dictis combinetur; quamvis etiam sine his frequentius illo fluxus contingat.

Ex qua parte autem hæmorrhagiam expectanda præter consuetudinem, quæ quidam ad Narium hæmorrhagiam, vel hæmorrhoidum fluxum proclives sunt, rationes & symptomata partium, & Morbi præcedens idea, v. g. Variolarum, quæ Narium hæmorrhagiam adjunctam sæpe habent, monstrant.

In specie hæmorrhagiam per Nares imminuent indicant dolor Capitis & Cervicis, pulsus arteriarum capitis & colli ausus, Vertigo, Oculorum rubor, Aurium tinnitus, ac Narium pruritus: per fluxum arteriarum difficilis respiratio & tussis: hæmorrhagiam uteri imminuent, præter tempus Menstruum consuetum, monstrant rensis in regione Hypogastrica & Lumbis, eorum gravitas & æstus, hæmorrhoidum fluxum nimium innuit præter tempus consuetum, Pulsus in Hypochondriis, Lumbis & Dorso, Venarum ani dolor & tumor, atque tæneismus.

Pertinent huc præ cæteris hæmorrhagiarum differentie prædè dignoscende: hæmorrhagia enim est vel spontanea, vel non spontanea; spontanea sunt opera Naturæ exonerantis Corpus, ut in fluxu Menstruum patet, aut hæmorrhoidum, aut hæmorrhagias Narium periodicis, &c. Spontanea iterum vel critica est, vel symptomatica: Critica hæmorrhagia fit in fine Morbi nam euphoria Ægri, quam post Tom. II.

Materiam coctionem Naturæ in Morbo facit; ut unâ periculum curet: Symptomata sunt, quæ in principio aut incremento Fœdum ardentium & Variolarum superveniunt, suntque ex organo sanguinis, molietis effluens. Non spontanea sunt, quæ subtrahunt in curu Morbi accidunt, citra euphoriam, vi, aut erubato externo. Unde spontanea critica non est curanda, quia est laudabilis Naturæ conatus, qui potius promovenda, nisi nimis sit, & cum insigni Virium prostratione fiat, juxta aphorismum HIPPOCRATIS, 2. Sect. 1. Spontanea symptomatica cautè tractanda est, nisi sit immodica, ac nili impediat alium Naturæ conatum, relinquenda: sic e. g. supervenerit in incremento Variolarum aut Pectehiarum, non retrocedant, soporificatur: similiter critica, si nimis sit, maturè compellatur. Non spontanea quæcumque symptomatica, cum Morbus sit, aut præcedat ex habita Corporis morbo, necessariò est sistenda & præcedenda. Denique hæmorrhagia est vel hæmorrhagialis, vel accidentalis: hæmorrhagialis crebris, & vel brevi vel nulla præcedente occasione, reddit & affligit: Accidentalis yerb raro, nec nisi magna data occasione, contingit & affligit: Accidentalis est vel cum Febre, vel sine Febre; ibi ad turgescientiam & ebullitionem sanguinem simul plus minus respiciendum; item, an critica magis an symptomatica fuerit?

Absoluta fuit theoria hæmorrhagiæ in genere una cum signis Diagnosticiis. Superfluo signa prægnostica.

PROGNOSIS.

Quod prægnosticum in genere observandum, quid omni hæmorrhagiæ exercitæ plant præternaturali, ita quidem, ut etiam critica suo modo aliquid præternaturalis sit nulla enim, præter Menfes & Lochia, naturalis est: vid. FORESTUS lib. 6. observ. 21. In febri. Adeoque omnis, nisi tempestivè suppressatur, periculosa, & aliquid mali portendit, præter illam, quæ Morbis aliis, præprimis cum Febre luctis, criticæ supervenit, illoque solvit, aut certe notabiliter immutavit: optima talis crisi fit per hæmorrhagiam: vid. ZACUTUS LUSITANUS Præc. adim.

Minus quoque periculi portendit hæmorrhagia Plethorici aduicti, quibus evacuatio solenior suppressa, aut Membrius aliquid detruncatum fuit, cui sanguis destinatus, nunc verò cohibitus, plethoriam facit.

Moderata & consueta & plus minus periodica hæmorrhagia, quocunque in loco fiat, si subditi conditio respondeat, & hoc facile seriat, salubris, eam deficientem varia mala, non secus ac excedentem, iniqui solent. Moderata igitur talis non silescit est.

Hæmorrhagia quæcumque à causa intrinseca cæteris pulvis & periculosiores & cautius tractanda, quam quæ ab externis.

Hæmorrhagia nimis quæcumque, uti ad animi desipia, dæmonia, & virium prostrationes immediatè disponunt, ita mediata Cachexias & Hydrops successivè inferunt.

Periculosior est, quæ copiosior, & quæ faciem citrinam, plumbeam aut fuscam reddit, cui convulsiones superveniunt, quæ puerilis & Melancholicæ, aut à quacunque causa emaciatis corporis, quæ Maribus, ebi accedit, non sedat, quam rigor excipit, upote qui de spiritibus exhaustis testatur: nam morbus chronicus, scilicet Tæben, Hydrops &c. hæmorrhagias immodicas sequi non adeo infrequens est.

In specie, ubi sanguinis fluxus super venit extrinsecum refrigeratio, propius est syncope.

Diarrhoea Atterit & Venæ Inguinis & plurium, aut ejus Diarrhoea, periculosissime & curatu difficles sunt, nisi harum Vulneribus remedia immediatè applicari possint.

Quæ ab Anatomicis vitiis sanguinis, vel absolute vel respectu abundantia, nascitur, curatur facillime.

Quæ verò vitiis sanguinis ferreantur, tardè & quasi medio modo se habet.

Quæ est ab artemisia sanguinis, hujusque fluxu impedito, difficulter sedatur, pessimum si posterit casus causam pertinacior, v. g. Scirrhus Hepatis, agnoscat.

Quæ vitiis Vascularum contingit, præ ratione Morbi primarii plus minus curabilis esse solet.

Difficiliores sunt hæmorrhagiæ, quæ sunt ipsi Arteris, quam Venis; item quæ à Vitis majoribus, quam quæ à minoribus ruptis, contingunt.

CURA.

Quod ergo attinet Curam: in ea ante omnia considerandum est, an curanda sit hæmorrhagia, an veri facienda? de quibus

quibus super. Deinde in Naturali distinguenda est Cura in eam, quæ sit *tempore Paroxyismi*, adeoque est *Cura curativa*, & eam, quæ sit *extra Paroxysum*, adeoque *Præservativa*. Tertio probè considerandum, an *istæ Hæmorrhagiæ* sit *Morbi sollicitæ* & *primariæ*? an *verò secundariæ*? & si hoc, an sit cum Febre; an sine Febre? Hinc omnes Hæmorrhagiæ *spontaneæ* & *Critiæ*, per quæcunque loca fiat, item quæ naturæ solenniæ est, & cui adiecta, similiter in illis, quibus ejusmodi solennes sanguinis evacuationes suppresse, nonquam curandæ, nisi forsan modum excedant, Vireque notabiliter exsolvant, nec ipsi Evacuatio quasi succedanea instituitur, *Symptomatiæ* verò Hæmorrhagiæ quæcunque sistende sunt.

Considit autem cura hæc vel in proximum *Causarum* immutandæ, vel Affluxus inhibitione, vel Sanguinis avertione, per Venæsectionem, Cucurbitulas, Hirudines, & fonticulos; vel in *Visum* præter naturam apertorum fibrarumque partium coagulatione atque obturatione, per interna sanguinis impetum coercentia, & Externa, quæ Vasorum ora adstringunt, & sanguinem profusorem incalescant. *Diarrhææ* verò *Vasorum* per *internam*, ac quodvis temperantia, & *Externa*, vala plus minus acriora adstringentia, consolidantia, emollientia, &c. sunt restituentia. *Externa* ista, eorumque administrandi rationem, in sequentibus, ubi de Hæmorrhagiis in specie, pluribus explicabo. Hac vice *Internæ* curis hæmorrhagiæ speciei plus minus applicabiles consideranda veniunt.

Quoad *Anaesthesia*.

(1.) Sanguis nimis, Vasorum ora aperit immittendus lentè per pauciores Digram Valschugæ etonem; consensum verò magis per sanguinis missiones quasvis, nunc Venæsectiones, nunc scarificationes.

(2.) *Demurgentes*, ut in Plethoræ, vel *Præcipitantes*, vel *absorbentes* Fermenta illa acidia volatilia, vel Acidia, aut blandia, aut fortioribus, volatilia Acidum figetibus & coercentibus, compoſcendæ: qualia sunt v. gr. Acetum, Tinctura Florum Bellidis, *Spiritus vitæ*, Hæmorrhagiæ Narium scorbuticis labinde benignæ: Conf. M. A. N. C. Ann. 3. *Observat.* 196. pag. 176. Nitrum in Aqua fontana solutum atque propinatum: vid. RIVIERUS *Cent. 4. Observat.* 48. & AGRICOLA *Chirurg. parv. pag. 190.* Pulvis hepaticus rubrus, Tinctura lapidis Hæmatis, saccharum Saturni, hincque cum Vitriolo Martis parata tinctura antiphtisica, Corallia, Unicorni fœtile, terra sigillata, Lapis hæmarræ, uſcæ, Camphora, & opiatæ. Hæc etiam pertinent vegetabilia nitroſa & moderatè adstringentia seu Valscheria, nempe portulaca, plantago, sedum seu tempepylum, &c. *Opiatæ*, *Camphoratæ*.

(3.) Item aquas & nimis feracis & tenuis maturæ corrigendæ, temperandæ, & in debitam consistendum revocandæ, vel *Exsiccantibus* aut *Indurificantibus*, aut *Inaerantibus*, & deinde *Zynanthæ* Seram spirituum per alvum, vel Vesicam, vel per habitum Corporis, & Digestioni primæ propiendæ.

(4.) In *Anaesthesia* vero visum Vasorum, Acidum istud, Nervorum ipsorum, necnon aliqualem absorptionem inducent, corrigendum per vulgò nota *Aperientia*, in specie Martialis, in Morbis Convulsivis & Hæmorrhagiis habituales pro eradicanda radice optima & de quibus alio loco dicam.

(5.) Quoad *Causas Remotas* *Diæreticæ*, si hæc fiat visio *Sanguinalis arteriæ*, fuerit acres illæ erodentes abundantur per blanda temperantia, & sanguinis crasni corrigentia, ut Palliata, Lacticia, Martialis & similia. Si visio Vasorum arteriarum, Valscheria adstringentia & incalescentia, sunt convenientissima.

(6.) *Laxitas* denique atque *profusus* *Peristernum* præternaturalis Condensandus atque Roborandus, quorum hæc *Repletoria* dicere licet, corrigitur: qualia sunt, præter Alestentia dicta & mox dicenda, Stercus Asinum, Lichenes Equorum, de quibus vid. de HAMMELT *Tractat. de Affect. Corp. pag. 311.* talis suis, vid. BARTHOLINUS *Cent. 5. Hist. 97.* Aqua ex typhis Cervinis, Pulvis spirituum *Cretæ* & quibus denum accedant *Narcotica*, v. g. semen Hyoscyami, Laudanum Opium, Eleazarum Diacordii &c. item Crocus Martis cum Aceto paratus, Vitriolum Martis, Acidulæ Artificiales, & Tinctura Antiphtisica Michaelis.

Pro his scopis obtinendis, *Obſervo*. I. Convenit *internam*, ut dixi, *Venæsectionem*, seu aia Sanguinis evacuatio. Dico *internam*; nam peracta

Chirurgorum est consuetudo, ut in omni Hæmorrhagiæ Sanguinem mittere velint. Verùm hoc stultum est, licet Sanguis non abundet, & jam tum effluat, eundem velle ulterius evacuare; scilicet in quavis hæmorrhagiæ sanguis parè pallivè habet, moretur nempe eo, quo Spirituum morientium & Orgasmodum impetu pellitur, & effluit ubique Vasorum ora aperta sunt, utur Occasionalis Causa interdum in Sanguine hæreat. *Non ergo Sanguinem evacuando, sed Causas Occasionales*, live in sanguine live in Paræ, per quam fit effluxus, hærent, removendo corrigendæ sunt. Unica ergo abundantia Sanguinis, live *Pléthoræ* causa, & quibuscumque in casibus apparet, live turgescit, aut inde natus Impetus ad locum, per quem effluit, postulat Venæsectionem. Ibdem etiam in solenni Evacuacione sanguinis suppreſſa sanguine detrahido locum habet, necnon in Hæmorrhagiæ præternaturali periodica, paulo ante hujus invasionem; vid. FORESTUS *lib. 24. Observat. 9.* in *ſchol.* hæmorrhagiæ verò à fluxilitate aut acrimonia corrodeente Sanguinis, & reliquis omnibus causis, quæ oriuntur, ubi vana & insulsa est Venæsectio. Ubi verò secunda, ubi fluxione *legis Naturalis*, *Derivatio* & *Absorptio* observandæ, quas Venæsectio parciore & aliquoties reiterata, item *ſcarificatio* aut *Cucurbitula* præſtante. Sanguis quoque à parte affecta avertitur per *Interſpirationem*, in specie per Ligaturas & cucurbitulas, tam scarificatas quam non scarificatas, Parietibus tamen potius remotioribus quam vicinis applicandas.

II. *Purgantibus* ipſæ etiam sunt ridiculæ, & quæ tales non conveniunt, nisi interdum nimia abundantia Laticis aequi, nimis fluxilem aut acrem facies sanguinem, sui ecretionem urgeat: in tali enim casu ufique purgantia bleda per inferiora conveniunt, ut in tali casu recte eadem commendat FORESTUS *lib. 24. obs. 12.* FORTIS *cent. 1. Conf. 92.* & RIVIERUS in *ſua Præf. lib. 4. cap. 5.* & confirmatur etiam hoc ipsum per Experimentum RONDELETTI, qui curavit quandam singulis diebus duas vel treslibras sanguinis rejectentem, solis Syrupi serosis humores evacuantes; feri enim copia, quod vehiculum sanguis est, subinde Fluxus hujus est Causa, præſertim si acrisioris fuerit: Quia & per *Sudores* vel *Diarrhæas* apophum Laticem uberioſum cum ſilibus heterogenis emittentibus hoc commode fieri poteſt. Ut enim *Sudor*, dum acta flux, dissolvat Massam Sanguineam, eamque ita fluxiliorem reddat, postmodum tamen ubi cessavit sudor, Sanguis iterum depuratus nonnihil crassescit, ipſificat, & saltem turgescit aut heterogenis liberatur, miror evadit aut docileſcit, ita hæmorrhagiæ plus minus suffaminatur & cessat. In specie, ubi cum Fluxu fuerit hæmorrhagiæ symptomatica, per Sudoriferâ non quæ dem voluit, sed additis Opium compendenda venit. *Conf. lib. WILLISII Pharm. Ration. lib. 2. p. 412.*

III. *Opia generalia* sunt Hæmorrhagiarum Remedia, dum & Irritantur sensum in hac vel illa parte undecunque citatam opium, & spirituum morientium Impetum plus minus retinunt, adeoque quovis rapidioris sanguinis mole concitatos motus quietiores reddunt, quo ipsa cartholica *Exuvium*, id est, Sanguinem silens, merito habentur, interne & externò adhibenda. Experimenta hujus rei novissime retulit Medicus quidam Hæmæus, MICHAEL BERNHARDUS VALENTINI, in *Epist. ad D. D. Widdum, Archiatrum Spiraensem, de Nova Matricis & Morbæ Maloſis Anatome*, ubi sunt ostendit, quantam Opium in Nervum Equi ac Uteri hæmorrhagiæ valent. Vid. etiam HORSTIUS in *Obſerv.* ubi Attertia loco Venæ sectæ admotione opii fuit edata.

Ex dictis poterit, Remedia ad Hæmorrhagiæ ultata esse

(1.) *Valscheria* & *adstringentia*, Sanguinem parim insipiantia, partim vi alicuius, Acidia vitiosa absorbentia, partim Vasorum lacerationes restituentia, ut *Plantago*, *Portulaca*, *Filicella*, *Bellis minor*, *Rafæ*, &c. Vgl.

(2.) *Absorbentia*, tam Martialis, hincque cognata Corallia, hæmarræ, Terra, &c. item Animalia, ut Cornu Cervi sine igne, Elur sine igne, Unicorni cornu, &c. Hippocampi, &c. Sanè martialis plurimis scopis in Curis hæmorrhagiarum satisfaciunt, in specie hæmorrhagiæ ex nimia Sanguinis Acrimonia, item ex Obſturatione Vasorum sanguiferorum, item hæmorrhagiæ habituales hypochondriacorum, Scorbuticorum & splenicorum, quæ subinde sunt supende, Vomitu sanguinis splenicis fœpulis recurrente, (sive sit revera talis sine non, loquor cum vulgo) optime siliunt Martialis. Hujus rei singulare Exemplum habet LOWERUS contra Menstrum *cap. 3. pag. 19.* ubi habet hæmorrhagiæ supendam Chalybeatorum usu curatam: Conf. M. A. N. C. *Ann. 2. Observat. 223. pag. 314.* & *Ann.*

3. *obferuat.* 126. pag. 176. Sunt præstantissima, partim quod acidum vitiosum, hæmorrhagie occasionalem causam, absterbeat, partim quod radicem in primis viis, unde affectus spasmolici hæmorrhagarum superueniunt, excindant; quin etiam in Sanguinis feracitate tenax & falsa optimè conferret. *Martialis* nempe remedia per se semper adstringunt, per accidentem vero *aperiunt* unde perinde est interdum, si in hæmorrhagiis *martialis* dicta *aperientia* live *adstringentia* usurpentur, modo acida vitiosa primarum viarum, & inde dependens sanguinis crassus vitiatas corrigantur, & affectus convulsivi hinc producti in radice emendentur. *Observari* hoc aliquoties, in specie in Mulieribus menstruantibus, in quibus liquor Martis Solaris rite usurpatus & Menies decedentes, & superimittit eisdem nimis fluentes; quod etiam circa *Tissuram Virescentis Martis* observari, quæ aperit Menstruum obstruções, & tamen in inordinato & sæpius recurrente fluxu cum fructu, pro eodem sistent, observari. Adeoque in Cachecticis, Hypochondriacis, Scorbuticis, &c. cum sanguinis fluxibus præternaturalibus, vel cum iisdem naturalibus, sed vitiosis aut inordinatis contingentibus, aut deficientibus, aut excedentibus *Martialis* pro curatione utramque faciunt paginam, quippe quæ (ut & Animalium partes pariter) nonnisi absorbendo aut acida vitiosa Fermenta & inquinatum Massam Sanguineam saltem corrigendo, operari solet: Vel

(3.) In hæmorrhagiis *feridis* ferum imbibentia & *laxantia*, ut Ulla, Terra, aut aliunde Evacuantia, ut *purgantia diuretica*, præsertim ex classe Vlnetariarum. Vel

(4.) Sanguinem *attemperantia* & quasi *edulcorantia*, ut Passulæ & Passulæ, quæ planè singulare suum remedium in curandis hæmorrhagiis nimis, in specie Cachecticis & Scorbuticis; quatenus temperat acce quodcumque, & sanguinem dulcem & minus rosum reddit. Sic ipse novi exempla Infantum, imò & Adultorum, frequenter hæmorrhagiis Narium obnoctiorum, solo frequenti Passularum usu curantur. Hinc quoque Lac & Lactisolia uti curant Scorbutum, ita eorum usus hæmorrhagiam corrigit.

Ex his patet facile *remedium formula*: v.g. in hæmorrhagiis ex *turgescere* nimis Sanguine cum *impetu febrili* & phlegmæ vaga, convolvit potio ex alomine & spirito Vitælii superius præscripta, Apocema SYLVII in *Prælix*, 2. & 3. §. 34. pag. 187.

Vel

℞. *Aqu. Plantag.*

Temperat. maj. ana ʒiʒ.

Syr. Papav. alk ʒi.

Tiact. fer. *Bellid.* cum phlegm. *Vitælii* par. ʒiij.

Spiritus Vitis q. s. ad gratam aciditatem.

M. D. S.

Mixtura Sanguinem silem per aliquot vicibus.

Capiatur cochlearum pro habitu ad silendam sanguinis turgescientiam.

In hæmorrhagiis *habitualibus* ex eodem sanguine *turgescere* ex acido volatili, v.g. in Vini potatoribus, &c. adeoque in his, qui vulgè ex sanguine bilioso & hepate nimis calido hæmorrhagias pati dicuntur,

℞. *Dent. Hippoc.* prep. ʒiʒ.

Corall. rub. pr. ʒi.

Lap. Hamat. ʒʒ.

Sacch. Saturni ʒiij.

Laud. Oplar. ʒʒ.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Vaporans.

Capiatur subinde mane quantitas Oculi cuspides,

Item

℞. *Extr. Flor. ʒiij.*

Eber. fusc igne.

Dent. Hippoc. ana ʒʒ.

Corall. rub. pr. ʒi.

Hamat. pr. ʒiij.

Com. f. q. *Syr. Rub. rubr. & Papav. errat.* f.

Electuarium.

D. S.

Electuarium Sanguinem silem.

Extradum silem paratur sequenti modo:

℞. *Flor. Ref. rub.* p. ii.

Papav. errat.

Bellid. rub. ana p. i.

Per multiplicem infusionem in Aqua simplicia, hinc expressione & infiltationem, f. l. a. Extradum.

Sic paratis *Extradum succum* ad imitationem ANGE-

LI SALÆ, ubi de *Extradis Vegetabilibus*.

In hæmorrhagiis *habitualibus* ex Sanguinis tenuitate ferfa.

Tom. II.

℞. *Pulsul. min. coagulata*, aut *verendum Pulsul. B.*

Elabarb. el. ʒiij. vel ʒiij pro habitu.

Tartari vitriolati Tach. ʒi.

Com. f. q. *Syr. Pomer. f.* Electuarium.

D. S.

Electuarium Sanguinem temperant silem.

Capiatur mane & vespere duobus horis ante cenam quantitate Cækanæ: Vel

℞. *Pulsul. min.* vel *Confero. Refar.* rub. ʒiij.

Elabarb. el.

Corall. rub. pr. ana ʒʒ.

Eber. fusc igne ʒi.

Dent. Equi mar. ʒʒ.

Extr. Mart. cum succ. Pom. ʒiij. vel ʒiij.

Com. f. q. *Syr. Rub. rub. f.* Electuarium.

D. S. ut supra.

Utile est & per sudorem occurrere tali hæmorrhagie:

℞. *Cornu Cervi* alk ʒi.

Terra Scyllæ. ʒʒ.

Laud. Oplar. gr. ʒi.

M. pro 2. doibus.

Cum sudore usurpandis.

D. S.

Pulvis Sanguinem silem.

In hæmorrhagia ab *arteria Sanguine*, à *Lympha* aut *Yessove*, omnibus modis concitata, sanè polychreia est *Mixtura SYLVII* lib. 2. *Prælix* cap. 9. §. 20. Ad cuius imitationem sequentes, amnes reliquis compositionibus superare videntur:

℞. *Aqu. Plantag.* ʒiij.

Cinnam. ʒiij. ad ʒiij.

Aer. Vini ʒiij. ad ʒʒ.

Corall. rub. prep. ʒiij. aut loco horum *Crkii*

Martis adh. ʒʒ.

Terr. Scyllæ. ʒi. vel ʒʒ.

Laud. Oplar. gr. ʒiij.

Syr. Myrtin. vel *Portulac.* ʒiij.

M. D. S.

Potio Sanguinem silem.

Capiatur pro aliquot doibus.

Vel

℞. *Aqu. Portulac.*

Plantag. ana ʒʒ.

Cinnam. dr. ʒiij.

Aer. Scyllæ. ʒʒ.

Trochisc. de *Caraba.* vel *Terr. Scyllæ.* vel *Bellid.*

Aer. ʒiij. ad dr. i.

Corall. rub. pr.

Vitælii. ʒʒiij. ana ʒi.

Laud. Oplar. gr. ii. ad iv.

Syr. Corall. *Querc.* vel *Myrtin.* vel de *Rubi fusc.*

dr. vi. vel ʒi.

M. D. S. ut ant.

Capiatur cochlearum, cohibent enim fluxum Hæmorrhoidum nimium & symptomaticum.

Huc quoque pertinet *Electuarium Hælidæ Paduani*, de quo infra, ubi de *Hæmoptis*.

In hæmorrhagiis *symptomaticis*, e.g. *Febrim* malignarum, præscribi potest sequens:

℞. *Aqu. Scorzæ.* ʒiij.

Tenell. *Cornu Cervi* ʒi.

Aer. Scyllæ. vel *Scyllæ.* dr. vi. vel succ. *Clivi* ʒi.

El. Diacord. *Præ.* dr. ii. ad dr. iii.

Antimonii Diaphor. dr. i.

Syr. Rubi Idæi ʒi.

M. pro tribus doibus

D. S.

Mixtura Sanguinem silem, pro tribus doibus.

Hic observatis, in genere ad hæmorrhagiam quæcumque, pluribus indicationibus, nempe adstringendo, consolidando, vasa claudendo, & Sanguinem temperando latiscentia, imprimis sequentia, & quidem ex *Rege Vegetabili*, sunt: *Portulaca*, *Plantago*, *Symphytum majus*, & ex his paratus *Syracus* compositus, quem videb. supra *Scyllæ*, 6. cap. 2. *Polygonum*, *Millefolium*, *Folia tenella Quercus*, *Rosæ rubræ* inodore, *semen Samach*, *Corticis Granatorum*, *Lyfimachia*, *Bursa Pastoris*, *Flores Balsamici*, *Sanicula*, *Pyrola*, *Polygonum*, *Bellis minores*, *Ruta*, *Vinca perivica*, *Hedera terrestris*, *Urtica minor* & *Radix Persicæ* maioris, (vid. RODERICUS de *Castro de Merb. Med. lib. 2. cap. 5.* & RIVERIUS *Pr. lib. 4. cap. 8.*) *Symphyti* maioris, *Tormentillæ*, *Pimpinellæ*, *Sanguisorbæ*, *Millefolii*, *Bifloræ*, *folia Quercus tenerioris*, *Miscus terrestris*, *quercinus*, &c. *Fructus Myrtilli*, *Acacia nostras*, *Galla*, *Ru-*

Bbb b

bj

bi, horumque Simplicium Decoſta & Sympy, Aqua & Sympyus Portulacæ, Plantaginis, Sympyus de Symphyto, Sympyus Cancellorum, Myrtillorum, de Hedera terreſtri, &c. quæ omnia adſtringunt, & Sanguinem quodammodo localiter; æquæ ſemen Portulacæ, Laſucæ, Urticæ; item Papaver & Pipaverina, Semen Hyocyami, Opium, & quælibet alia hujus generis Anodyna certo experimento hæmorrhagias ſolunt. Pertinet hæc Radix Acori aquatilis ſeu *Pinguiculi*, & ex hoc paratum *Uſſar Adſtringens D. Lengü*, ex lucco nempe cum Saccharo in conſiſtentiam Sympy coſpilato; & ſane egregium eſt remedium adſtringens, & quodammodo ſanguinem inſpillans, indeque in quocunque tam ſanguinis, quam aliorum humorum fluxu commendo; item ſyrupus Coralliorum, ſyrupus Myrtillus; in ſpecie, ſuccus Urticæ majoris rectius expreſſus ad nocias aliquot intereſt aſſumptus contra quancunque hæmorrhagiam Narium, ſputum Sanguinis, Vomitus cruentum, ab omnibus laudatam experientum eſſit; in ſpecie vid. RIVERIUS in *Praxi*, ZACUTUS LUSITANUS, & AMATUS LUSITANUS, qui non poſſunt ſatis commendare hunc ſipum, iſtote quo variæ hæmorrhagiæ & hæmoptyles curatæ ſunt. Datur hæc ſuccus ad ʒiſs. ad ʒiſs. vel ʒiſs. Quidam Sympy in ſucco Urticæ in prompta habere ſolent, quem ad recurrentes hæmorrhagias ſolent ſubinde propinare: ſic Urticam majorem vulgarem contuſam plantis pedum & volis manuum, item Membrum virili, applicatam maxime commendat BORELLUS *Cms. 1. obſerv. 93.* ſe ſungi Betulæ ramenta ad miraculum hæmorrhagiam externam ſolunt, teſte CROLLIO *Paſſ. Chym. pag. 308.* TACHENIO *Morb. princ. pag. 189.* Porro *Melcaſ ſeu Uſſar Crani humani* ea Cranio violenter intercepti delumpſa, nobilis & mirabilis eſt in ſileodis hæmorrhagiis, quatenus per Mumiam Microſcopia impregnati eſt, doſi a gr. xii. ad ʒiſs. vel ʒiſs. propinatur in Aqua Burſæ Paſſoris cum ſyrupo Coralliorum &c.; externo & interno uſu periculoſiſſime ſiſtit hæmorrhagias; & divinum vocatur remedium à LANGIO; Proſtitit enim exempla hæmorrhagiarum deſperatam beneficio hujus Urticæ feliciter curatam: vid. BECKERI *Medicus Microſc.* & HILDANUS *ſcript. 27.* LINDANUS reſert, ſe Comitſſam, cui nullis remediis ſedari poſſuit hæmorrhagia, reſtituiſſe per ſolam Cranii humani Uſſam; unde & HILLERUS in *Cms. 1. Cura 30.* confirmat, ſe periculoſiſſimam hæmorrhagiam Narium ex potu Vioi eſcitant, per ʒiſs. Cranii humani, & ʒiſs. Urticæ, cum aqua Burſæ Paſſoris ſedatæ. Externè inditur Naribus, aut ubi Sanguis alius effluſit, compoſcit inſigniter ſuam hunc. De variis ea hoc paratis Medicamentis, tum internis tum externis, vid. M. A. N. C. *ans. 2. obſ. 53. pag. 100.* Loco hujus tamen ſolet ſubſtitui Muſcus Prætorum ſylveſtrum & quercionis, qui tamen minor eſt pretii. Hicce accenſetur ſanguis Draconis: verum eam genauiſſe raro apud nos habear, caveamus ab uſu ejus, & potius exhibentur Maſliche, Sarcocolla, Thuſ, Myrrha, Aloë, Gummi Arabicum, Mumia, Succinum, & ſimilia ſanguinem temperantia & inſcrutiantia. *Paſſal* ſuprà laudatam fuerunt, & conducunt in ſpecie hæmorrhagias ex vicio ſanguinis actitoris, ſeroſioris, acido-ſalioris &c.; Nam tali ex cauſa hæmorrhagias habituales nraſ crebrior Paſſularum minorum comitio ſublevat. *Rhabarbarum* denique non tam pro ſero evacuando, quàm ſanguine alterando, & craſi ejus reſtituendo, in hæmorrhagiis & ſeroſiore ſanguine conſert. *Cumſum* non negligenda, quæ ſpiritus afficit, & Fermenta peregrina acida ſanguinis moriſcæ eorrigit.

Ex *Regno Minerali* reliqua remedia ſuperſt *Mars*, omniaque *Martialis* ſuprà laudatæ, & ſubſeſta reliqua *Martialis*: qualiſ ſunt Lapo Hæmatites, qui virtute Martiali conſert ad hæmorrhagiam, tam in ſubſtancia preparatus, quàm ejus tinſtura; Terræ Martiales, Bolus rubra, item Armena, Terra Sigillata, Terra Vatrioli dulcis, & quæ huc ſuo modo pertinent, Coralla, eorumque Tinſtura, Vatriolum Martis, & acidularum potus, &c. Ex omnibus convenit Tinſtura Sulphuris Vatrioli, quæ reverà eſt ſaltæ Tinſtura Martis adſtringens, ad omnes & quancunque ſanguinis hæmorrhagias eſpertiſſima. Equidem paratur valgo ex capite mortuo Vatrioli Martis bene edulcorato, ſed meliorem modum decocto:

ʒiſs. *Vatriolum Martis nativum*, & ſi non habetur genuinum (nam nihil debet participare de Venere, alias ſi tantillum Veneriſ addit, doſo ſanctitatis adſtringentiſ facit vomites) ſolve Vatriolum in Aqua, & injice *Lithumam Ferri*, ſic præcipitatur omnis Venæ & præcipitata in forma cruſtæ cupreæ ſupernat ſolutioni,

quæ filtrata inſpilleſcit & dabit *Vatriolum Martis genuinum*.

Hoc ſuſſo:

ʒiſs. *Solutionem Vatrioli hujus Martis*, & inſiſtit illa eidem guttatum *Lithumam Salis Tartari*, vel elum *Tartari præſtipatum*, ſic cadit Crocus Martis in ſundum; hocque ſat tamdiu, donec ſat ſaturationis punctum: filtratur; (liquor blando igne evaporatus ſeu cryſtalliſſatus dat *Tartarum vatriolum Tacheni*.) Crocus reverè præcipitatur edulcoratur probe copioſa aqua ſimplici, lotuſque eaſcetur, ſic habebitur pulvis ſavus ſollis Croci, qui præſertendus eſt omni alii Croco Martis adſtringenti, & eſt egregius in erodeſe Capitis, & Ulceribus manatibus.

Porro *Crocus* hic præcipitatur ſolvatur in ſpiritu Nitri, vel ſpiritu ſalis compoſito, ita ſic inſignis efferveſcentia & incalcſcentia; Solutio filtratur, adſtrahitur per rotortum ad conſiſtentiam Mellis, nulla remanens poſſumodum poſtatur in locum calidum cum ſpiritu vini præſtipato, & digeratur, ac habetur Tinſtura Martis, quæ filtrando ſeparetur; & hæc Tinſtura vulgo Tinſtura Sulphuris vatrioli, reſtitutam Tinſtura Martis appellatur.

Hæc Tinſtura adſtringit, & eſt nobilis & egregia in omni hæmorrhagiis, ritè parata, datur ad guttas x. xxi. & xl. in quocunque vehiculo uſurpata.

Facit hoc quoque *Extrallum Martis adſtringens HARTMANNI*, quod habet in *Praxi Chymicæ. cap. 30. de Hemorrhag. Narium*, eſſique compoſitum corpus ex Terra & Marte; conſert tam externè, quàm internè, in manibus detentum. Eſt experientum LINDANI, cui inſiſtar omnium remedium eſt; utpote quo Potum deſperata hæmorrhagia Narium laborantem curavit. Datur ad gr. x. vel iſs. cum Conſerva quodamdeſſente in forma Bol. Item Saccharum Saturni & ipſum hæmorrhagias compoſcit. Similiter facit hæc hæmatites artiſticiſ ex Vinis Martis & Saccharo Saturni. Modum habet GLAUDIUS in *P. 3. Tausſchlander Weſtſarck*. Proceſſus eſt legimus, utat non raro diſtus Auctor mentitur. Item locodularum *Liquor Martis Solaris* ad hæmorrhagias chronicas ſæpius recurrentes conducit, præternaturalium autem Fluxus Sanguinis ſileſcens, & contra naturales aut debiles aut inordinatos reſtituendo; item pulvis *Hæmatitis* cum Aceto aut ſucco Granatorum acidorum propinatus; item liquor Sytypticus ex Terra Sigillata cum lypta Vatrioli vel Nitri paratus; item Tinſtura *Antiphlogiſtica* ex Saccharo Saturni & Vatriolo Martis parata, egregie convenit in quancunque hæmorrhagia. Quibus Eſſentiæ & Extralla Martialis quancunque commodè annumerari poſſunt. Spiritus Vatrioli ſuprà laudatus coagulando blandè ſanguinem, hæmorrhagiam ſiſtit, in ſpecie quæ ex turgeſcentia aut ſimili ebullitione ſanguinis oritur, quatenus organum quæ ſiſtit & blandè coagulat. In quo calu etiam Nitrum depuratum, & omnia Nitratæ, interno & externo uſu, in ipſæ interno, cum ſradu uſurpari poſſunt, etiamſi hæmorrhagiæ per iracundiam excitatæ fuerint, & a FELICE WURZIO tamquam ſpeciale Arcanum contra hæmorrhagias commoedatur. Pertinet hæc *Pulvis Sympatheticus ex Vinis Martis* bene depurato, & radiis ſolaribus, Sole in Lincæ verſante, eſpofite & calcinatio paratus, proſuſa externo, qui Sanguini effluenti, ſive ex Utero, ſive è Naribus, ſic Pedure (de omniſus habeo experientiam) inſperſus, aut ſiletem, ſi lineum Sanguine iſſo adhuc madidum eo ſiletem adſpergetur, aut Lineum erore effuſo eſſentium ſolutioni doſi pulveris immergatur & applicetur, certo & mirabili experimento ad hæmorrhagias quancunque ſileſcens maxime proſicius eſt, quæ ita ſympatheticè curantur: vid. DIGBY in *Orat. eleg. de pulv. Sympatheticis*.

Ex animal *Regno* conveniunt in genere ad hæmorrhagias, Animalium partes duræ, in ſpecie *Elæph. ſine igne*, *Univerſum verum*, *Dias Hippocraſti*, *Cornu Cervi aſſum*, &c. abſorbent vitioſa acida, & incraſſantia Sanguinem; item remedia ex Ranis, *Sperma Nararum*, cujus Aqua deſtillata interneſt buſſis, & externè convenit, quod ſolitario cum puſco aſter ſeſſe applicatum, ſingularem ſum obtinet hæmorrhagias compoſcendi; inde etiam ex hoc paratus Pulvis Spermiæ Cerviſ eſt admodum commoedatus ad hæmorrhagias, doſi ʒiſs. ad ʒiſs. gr. xv. vid. SCHROEDERUS. Permittitur etiam aliis in quancunque forma: aut etiam pulvis Agrícola ſequens:

ʒiſs. *Sorb. Naturali*,
Thariſ,
Myrrh. ana ʒiſs.

Cms,

Croci,
Camphor. ana ℥i.
M. F. Pulvis.

Qui cum aqua *Spermacis* *Rosarum* imbibitur, & lentè excruciat. Nam licet *Myrrha* continet, quæ aliis facilè hæmorrhagias relaxat, nihilominus tamen *Spermacis* immo-
center usurpari potest, nunc foliaria, nunc alia mixta: v. g. ad contorcendam hæmorrhagiam:

℥i. *Lap. Hyemal. pulvis.* ℥ss.

Spiruol. Croli. gr. xv.

Laud. Oplis. gr. iij.

M. L. Pulvis:

divid. in 2. part. æquales.

D. S.

Pulvis contra hæmorrhagiam in duabus dosibus.

Nam *Papaverina* & *Opiata* quævis semper remediis contra hæmorrhagias nimis addenda sunt, impemio si dolor adjuvius sit. Vehiculum horum Pulverum potest esse:

℥i. *Aq. Rosal.*

Semperviv. maj. ana ℥i.

Syr. Plantag. vel Portulac. q. l.

M. S.

Aqua ad Pulverem.

Potè Excrementa quorundam Animalium singularem vim habent ad hæmorrhagiam silendam. Cætera omnia antecellit *Stercus Asinum*, *Suillum*, & *Stercus Canis* ossa rodentis, quæ tria totò apparent sterida, sunt tamen reverà expertissima contra quæcumque hæmorrhagias, externo pariter & interno usu. Sanè, præter Pulverem ex his paratum, ex *Stercoribus Suillo & Asinno* expressit succus, qui ad ℥ss. ad ℥i. vel ℥ss. in convolvit Vehiculum propinatus, est efficacissimus; aut ex horum succo cum Saccharo fiat Sympus ad hæmorrhagias, qui vid. lo. *PRÆVOTIO*, & in *JOELIS Præst.* Hi ipsi Sympsi admodum egregii sunt in compescenda hæmorrhagia: item permiscetur hi succi *Rosarum* cum succo *Urticæ*, & ita iterò propinantur. Conf. *RODERICUS à CASTRO de Morb. Mul. lib. 1. cap. 5. pag. 48.* & *ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Præx. Hyßer, cap. 2. num. 4.* Vel, quod alii faciunt:

℥i. *Succ. Ros. Asin.* rec.

Syr. Myrrill. vel Myrrin.

Portulac. ana ℥ss.

Aqua Plantag. ℥vi. ad ℥i.

M. pro Haustia.

D. S.

Potio hæmorrhagiam silens pro uno haustu.

Vel

℥i. *Succ. Ros. Asin.* ℥ss.

Syr. Myrrin.

Aqua Plantag. ana ℥i.

M. S. ut supra.

Stercus Canis verò pulverisatum in substantia convenienter admodum propinatur, loco quorum quidam pro secreto commendat ipsam sanguinem proprium per quæcumque loca excreta, arefactum, & à ℥ss. ad ℥i. ipsi *Agro* in li-
quore appropriato propinatum, item externè, si fieri potest, loco hæmorrhagie applicatum ipsam mirificè sistere dicunt: vid. *SCHMUK in Carat. Magnæ-Magnæ, De Lact. Suprà dictum.*

Sopereff adhuc *Bufa*, mense Julio, ant Sole in Leone ex-
sistente caput transfossus, & ita enecatus, atque siccat, & in sindone rubra appensus, quæcumque hæ-
morrhagiam ex nimio spiritu fervore & impetuoso motu excitatam, ob pavoris ideam ex Hominis præsentia contrahit, feliciter sistit; vel etiam si tantum sub axillis lateris illius, quo sanguis huius, applicetur, ut probè incale-
lescat, vel etiam, si tototummo bufo excrucietur in manu detineatur, donec incaleat. Speciatim convenit ita *Bufa* in hæmorrhagiis *Narium Symptomaticis* in principio *Febrium Malignarum*, in specie *Variolarum* admodum periculosis: In his bufo dicto modo præparatus, aut etiam recens confusus sub axillis applicatus, aut etiam regioni cordis appensus, perquam egregius est, tam ratione malignitatis, quam ratione urgentiæ symptomatis. Juxta *Bohones & Rana*, in specie virides, excisatæ, & omnia ex *Rana*, earumque Pulvis in Vino rubro propinatus mirificè hæmorrhagias sistit; quæ vivæ contrusæ, earumque Spectra, pariter applicari possunt ad quæcumque, tam virilem quam muliebrem, hæmorrhagiam compescendam.

Unum adhuc de *pariam*, propriis internarum, hæmorrhagiis curandis notetur, ut his sedatis Medicamenta graviora sanguinis dissolutio propinentur atque applicantur, in principio tameo moderata, v. g. *Sperma Ceti*, *Marga Saxonum*, *Lapilli Cancrorum*, *Terra Hibernica*, & cum adstringentibus, v. g. *Polvere Spermiolæ & Agricolæ* modò commendato, temperanda. Progreffu temporis & potentiora sola & cum sudoris aliquis provocatio exhibenda, quæ, præter diaphoretica, sunt radix *Polygonati*, *Caryophyllatæ*, *Rubus Tinctorum*, *Charredium*, *Sabina*, *Verbascum*, *Geranium Robertianum* cum Vino Decoctum, *Terebinthina*, *Faligo*, sanguis *Hirci*, &c. Nisi enim talia applicantur, metuendum, ne grum præterfentes acrimonia constarent, hincque, erodendo, novam hæmorrhagiam aut Ulcus, aut simile quod Corpori detrimentum parent.

In hæmorrhagiis à *Cantharidibus* convenit *Lac*, Decoctum Nucum Pinæ cum Vulo quercio, *Passillæ*, *Ichthyocolle*, *Gummi Arabicum* & *Tragacantha*: vid. *JOEL Præx. lib. 3. pag. 280.* quæ omnia acrimoniam hanc vel illam corrigunt.

Restant tandem ipsa officia Vasorum atque Periariorum confringendi ac coagulandi. Quibus medetur *Emplastrica*, sive conglutinantibus sive adstringentibus. Utraque saltem externa sunt; & priora quidem albumen Ovi, *Thos*, *Sarcocolla*, sanguis *Draconis*, *Masticæ*, *Aloë*, farina *Fabæ* rum: vnde *PARÆUS pag. 384.* dimidium Fabæ in hæmorrhagiis ab *Hirudinum* tactu commendat, parti afflicte applicandum: Item bujus loci est *Galina* seu *Columba* per medium dissecta, & calidè applicata, quatenus harum sanguis grævescens officia vasorum obturat. Posteriores generis item duplicia sunt; Scilicet eadem vel austeritate notabili polleant, nempe *Virolium*, bujus spiritus, *Indura Sulphuris Vitrioli*, *Crocus Martis* adstringens, *Indura Lapidis Haemadiliæ*, *Acerum simplex & rosaceum*, *Lac Virginis*, fructus & succus *Acacie*, succus *Hypocistidis*, *Billets*, *Millefolium*, *Muscus terrestris*, postissimum quercus, de *Tegula* & *Cranio humano*; vid. *HILDANUS Centur. 2. observat. 5.* Flores *Rosarum*, *Balaustiorum*, *Cortex Granatorum*, *Myrtilli*: Vel sanguinem costringentia, hancque imbibentia, quæ Vasorum extrinsecis firmius adhaerescunt, adeoque has obturant, scilicet *Bolus Armena*, *Terra Sigillata*, *Gypsum*, *Alumene album*, *Pili Leporini*, & *Crepitus Lupi*. De *Argilla* cum *Aceto* in *Capitula pedata*, & fumo *Succini albi*, vid. *RULANDUS lib. 2. obs. 15. pag. 73.* *Stercore Porcino* ac *Asinino*, vid. *FORESTUS l. a. observ. 13.* de spiritus Vini redificato, spiritus *Terebinthinae* & *Opio*, *HORSTIUS lib. 9. observ. 12.*

Atque ex his varia commendatur compocia, e. g. *ligum* ille *Aspurgicus Gallarum*, qui cum secretum ad quæcumque hæmorrhagias, etiam ex vasorum sectione, laudatur. Liqueorem hunc mihi rasofissum examinavi, expertaque sum, quod sit oibis aliud, quam solutio *Aluminis*, cui dimidium præterpropter de *Virolio Martis* fuit additum: Nempe hinc *Aluminis* partes & una *Virolis Martis* mista & soluta in liquore appropriato, dant hunc liqueorem. Hoc probavi ita: Insudi Decoctum Gallarum huius Liquori, & ecce! precipitatus est in liqueorem nigrum, de-
ditque distinctus *Aluminis* crystalli. Liquor huc externè, quæcumque loca admodum, ubi effluit sanguis, cessatissimum remedium fuit deprehensus. (Z) Ad imitationem bujus facile alius liquor potest parari; vid. *WEBERUS Tr. de Liga. Symplicis*: Item

℥i. *Linat. Martis* part. l.

Spiritus Martis part. iv.

Digerantur in loco tepido, affundendo

℥ss. Myrrill. vel Aqua pluvial. destillata

q. l. pro solutione & dilutione, ut commodè filtrari possit.

Filtrato Liquori addatur

Solut. Alum. crudi in refracta dosi, & usui servetur.

Vid. *BARTHOLINUS Aff. Haemorrh. vol. 2. observ. 123.* Huc quoque pertinet Pulvis ille *Chirurgus Hallandici* familiaris, quem *TULPIUS lib. 2. observat. 49.* describit; scilicet

℥i. *Bol. Armen.* ℥ss.

Calcis vivo,

℥i.

(Z) Probaturus est *Liquor* iste. ℥i. *Aq. Plantag.* ℥ss. *Rosat.* ℥ss. *Aluminis* usui ℥ss. *Sacchari candi* ℥i. *Virolis* i. spe. ℥ss. *Urticæ* pueri ℥i. *M. fibræ & servæ*; imbibantur peria & applicantur. Inter exhibetur ℥ss. cui addit *Spiz. Virolis* ℥i. iv.

Verioli nfi,
Alum. nfi ana dr. vi.
Lep. Mamm.
Alum. levis.
Sang. Dracon.
Terra Lemn.
Cruci Martis.
Mumia ana dr. ii.
Mafick.
Thebri., ana dr. i.
M. f. Pulvis subtiliffimus.

ARTICULUS II.

De Hemorrhagia Narium.

Considerabimus jam speciales rationes diversarum hemorrhagiarum, inter quas in principio hemorrhagia Narium se offert, seu sanguinis fluxus praternaturalis ex Naribus, in quarum intimam superficiem terminantes Arteriola hemorrhagica illas excitant. Subinde copiosissimus sanguis est, & qui per plures poros ex Naribus effluit, quem tunc ex sinu Cerebri Falcoformi aut ejus Vasis apertis ad Nares pervenire multi afferunt, quod tamen falsum, sicuti sufficienter hoc dogma rejicit SCHNEIDERUS Tr. de Offe Crisiform. p. 412. & Jegg. ubi sufficienter demonstrat, nullo modo ex sinu Falcoformi decidere quancunque sanguinis guttulam. Quin potius Vasa, ex quibus in hemorrhagia Narium effluit, sunt propagines Rami arterialis ad Carotid. interna, qui juxta processum Mamillares, plures inter, Surculos quosdam per foramina ossis Cribratos, transmittit ad Membranam Narium superiorem glandulosam, per quos Vasa, seu per quas Arteriolae & Lymphae simul affertur materia, per glandulosam istam teatutam excremda, ita ut ex orificiis illis apertis, & propter continuam à Lymphabumefactionem naturaliter laesioribus, Narium hemorrhagia accidat: Conf. WILLISIIUS Pharmac. Ration. Part. 2. pag. 40.

CAUSAE.

Præter causas internas cum aliis hemorrhagiis communes, externas inter, motus animi vehementiores, ut Ira, Gaudium, &c. hemorrhagiam hanc interdum excitant: quo pertinet etiam illa hemorrhagia Narium, quam cuidam ex virulino Borta, & Carnis vitulinae coagulata contigit RHODIUS Casuar. 2. obs. 89. refert; item Pulveris Sternutatorii fortiores inspirati, aut alia quævis inspirata acriora inopie applicata. Hujus exemplum habet KERKRINGIUS in spirit. obs. 31. ubi lethalem observat hemorrhagiam Narium ex Helleboro albo in sternutatorio natam.

DIAGNOSIS.

Quoad signa Diagnostica. Imminentem eam ostendit motus sanguinis sursum versus, cuius indicia sunt dolor Capitis & Cilli tensivus, Tempus verò dolor gravis plus minus pulsans, Oculorum talgo vel splendor, Lacryma copiose involuntaria, Rubeo Malarum, Genuerum Pruritus, Tinnitus aurium, Tussilis Narium &c. quæ et interdum aliquis Mucosus tremor accedit.

Hæc signa tam in quam extra Morbum hemorrhagiam Narium pronunciant.

Imo & pulsus in corpore durus & quasi vibrans, Arteriarum Collis & Capitis aestus, hemorrhagiarum recurrentium, & quidem vitæ Valorem, signum esse solet.

An autem Sanguis ex Vasis Narium in Cerebri promanet, dignoscitur ea hoc, quod sanguis ex Narium Vasis parces & illiusmodi foret: ex vasis Cerebri autem majori fluxu & impetu effluat; sicut ex his libris viginti quatuor sanguinis proflavit BAHNINUS Theatr. Anatum. lib. 3. cap. 3. notat.

Si in Febribus acutis & ardentibus Lacrymæ involuntariæ profluunt, his sanguinis eruptionem ex Naribus expectare convenit, ut loquitur HIPPOCRATES.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis: ea insinuanda est, tam de imminente, quam præsentem.

Hæmorrhagia Narium, quæ fit in Morbis acutis, & quidem præprimis in flatu, funesta est. Si fiat confertim cum euphoria Aegri, est salutaris: stillitidum verò sanguinis, id est, exigua sanguinis & stillatim facta ex Naribus eruptio & fluxus in Morbo acuto, præsertim Maligno & die quarto, malum signum est, nisi forsan causa externa vel excita verit, vel ejusdem incipientem fluxum inspiciendo vel retinendo impeditur.

Nocibile est, quod HIPPOCRATES jam olim monuit in affectibus Hepatis & Lienis, dum dicit: Fluxus Sanguinis à Naribus non à dextro factus, (id est, qui in Nare dextera est), h. e. in dextra, si Lien laborat, & est sinistra, si hepatis malum; nam tales hemorrhagiae, si debent esse profusae, non iter, id est, cessantiam, ferri debent.

Quibus in Febribus ardentibus Aures obstruuntur, hia non soluta Febre, deitare necesse est: solvit autem inter alia & sanguinis à Naribus eruptio.

Interdum in Morbis acutis Aegri convulsantur Nares, quod pessimum signum est; inquit enim Naturam molari aliquam hemorrhagiam, quæ tamen propter imbecillitatem & imminutum sanguinis circulum non procedit.

In Febribus Malignis aliisque Malignis Aegros sanat Critica hemorrhagia, quam imminente indicat furdiaz in flatu veniens.

Si in principio Variolarum larga Narium hemorrhagia advenit, & sponte cesset, bonum est, & facile evadent Aegri.

Eruptiones sanguinis à Naribus sæpius sunt nemodum copiosa, ad aliquot librarum pondus accedentes, adeo ut etiam ad libras quatuor sanguis efflueret, hoc tamen citra Aegri Virium lapsum. Item observatum fuit ad libras octo vel decem eacrum fuisse sanguinem non citra periculum, utut absque Vitæ judicio.

Alias nimis copiosa hemorrhagia Narium si affligat, eadem Prognosis faciendâ, quam heri in genere de hemorrhagia nimia indicavi. Tam legiores enim sanguinea evacuationes, quam ejusdem plus minus, sunt etiam planè non cœsuetæ, saltem intempestivæ suppurationes Murbos excitant: hæc quidem pathemata Cerebri & Nervosi generis epilepsia, soporosa, &c. illæ, absumendo spiritus vitales, spasmus, Cachexias, Singultum & Convulsionem.

CURA.

In Cura hemorrhagiam Narium imprimis attendenda est causa proxima, an sit nimium effectus Anæsthemosis? quæ frequenter, an verò expositio Vasorum seu Diastemosis? A) quæ varior. Interea tamen eadem, quæ de hemorrhagia in genere Artic. præcedente habemus dicta; saltem in hemorrhagia Narium ex nimia turgescencia & fervore Sanguinis conveniunt blanda acida, Sanguinem, & hujus impetu ad Nares, quantum possibile, cohibenda, & quodammodo coagulanda: quæ sit spiritus acidi ex Mineralibus, Essentia Martis adstringens, Tinctura Sulphuris Vitrioli, liquor Symplicis, syrupus sacchar ex succo stercoreis affini, mistus cum syrupo Myrtillorum, item Opium & Opiata, quorum formula, uti & aliorum, supra Artic. 2.

Vel

℞. Elæ. sicc. ignis,
Terra sigill.
Cera. rub. præp. ana ℥i.
M. f. Pulvis.

D. S.

Pulvis contra Hemorrhagiam.

Si verò Narium hemorrhagia læpè recurrit ex nimia tenuitate serosa, conveniunt Passulata crebriè unspata, in specie sub forma Elechnari Artic. auver. præscripta, de quo mane jejunio stomacho & vespere duabus horis ante coenam expiat quantitas Caffee, vel Noci juglandis, vel quorum placet, ut corrigatur sanguis. Convenit in genere in quocunque sanguinis vitio, & quod Veteres alias derivant ex hæmatosia levia vitio hepatis, Moderni verò deducunt ex vitio Fermentationis sanguinis. Un adeit Lymphæ acrimonia, præter ea, quæ supra in hemorrhagia in genere dicta, convenit & potio sequens:

℞. Aq. Ferulæ.

Plantag. ana ℥ss.

Auri. destill. dr. vi.

Terra sigillat. ℥i.

Cera. rub. præp. ℥i.

Spiritu. Crill. gr. xv.

Land.

(A) Vasorum eruptio potius est Diastemosis, quam Diastemosis, ut superius dictum.

Naris 3i.

Camp. cum Spiritu Vini 3i.

M. f. Epithema,

D. S. ut supra.

Cum panis multipliciter tepide regioni hepatis applicandum.

Potest ex *saligine*, *albumine oui* & *aceto* destillato ovis *frontalis* parari, quod egrediatur conferre, & raro in graviore hemorrhagia fallere deicit: vid. de HAMEL de Affect. Corp. pag. 312. Conuenit etiam albumen oui probè subactum cum Alumine: nempe Frustulum Aluminis recipitur, agiturque cum albumine Ovi, additur parum Aquæ Rosarum, quæ inuicem subacta, in forma emulsionis euasidam spissat imponitur. cum linteis multipliciter fronti & temporibus ad stentendam hemorrhagiam. Succus urticæ etiam cum linteis Naribus inditus Sanguinem fluentem sistit. Sic *Sperma Canarium* cum pauco *Alumine*, vel cum aceto subactum, fronti ac temporibus applicatur, vel linteum in eo aliquoties inunctum, iterumque exsiccatum, idque repetitis vicibus, tempore usus fronti ac temporibus inpositum, egregiè hemorrhagias deprimat.

24. Aqua Spiritus Rosar. 3iv.

Auct. Rosar. 3i.

Spirital. Crall. 3i.

M. S.

Epithema Externum.

Applicetur tepide Fronti. Vel

25. Spiritus Rosar. cum Melle & Alum. aserv. 3vi.

Sach. Saccar. 3i. ad 3ii.

Camp. 3i. ad 3ii.

M. pro Epithemate,

D. S. ut antè.

Applicetur ut supra.

Ut superius *Monasterium* & *Cucurbitulas scarificatas* Revalutionis gratia usurpari auctum fuit. Ita pro eodem scopo non pauci applicant *Cucurbitulas non scarificatas* Hypochondriis, hepatis nempe & ileo regionibus, ratione lateris, ubi per Nares Sanguis effluit, ita quidem, ut stillegat Nare dextra applicandas Cucurbitulas cum flamma suadent regionis hepatis, Nare sinistra vero alia regioni fient. Prostant observationes apud Veteres; sic AMATUS LUSITANUS *Cent. 2. Curat. 100.* mediante *Cucurbitula* splenis regioni admotæ, & Epithemate frigido testibus applicato, ingentem hemorrhagiam Narium sedauit. Veruntamen frustra & nociva sæpe fuit eius applicatio, quatenus hoc Remedium saltem sapit hypothelin, quod ex hepate & splene miratur sanguis ad Nares; unde hic cautus non esse debere monet RIVERTIUS, alique Practici, cum interdum *Cucurbitulas* tales admotas sequatur gravis *Inflammatio* Viscerum sub *Cucurbitulis* siturum; quare exemplum refert RIVERTIUS & HILDANUS in suis Obs. adeoque cauti in applicatione harum sumus. Porro *Nucha Versuta magna* impoñit locum interdum ioveniunt: Conf. M. A. N. C. ann. 6. observat. 90. pag. 130. Quo pertinet *Cucurbitula* supra pedes, in superiori puta Sacrum parte, admotæ, vel scarificationes illarum, quæ miraculis illar hemorrhagiam Narium sistunt, Authore FORESTO lib. 12. observat. 24. coarctat enim sanguinis fluxus sursum, & coarctat impetus ad loca superiora. Ad dicta Epithemata pertinet *Frontale POTERII* *Cent. 1. Cur. 67.* ex *Croto Martis*, *Bala aromata*, & *Opi*, cum *Oleo Rosarum* mistis, & temporibus applicatis; quo ipso contumacem hemorrhagiam curavit.

Quoad auxilia & remedia *versis* scopis, eminet *Alumen*. Hoc vel ita integrum Naribus intruditur, vel Pulveris forma infunditur: c. p.

26. Alum. pulveris. q. pl.

adde

Lacca Pillæ, quæ Germanis vocatur *Engel-lack* (est compositum ex Creta) q. l. pro coloris suavitate.

M. f. Pulvis.

D. S.

Pulvis Sanguinem sistens.

In hemorrhagia Narium nimia Naribus insufflatus, vel cum Turbida in aqua vel albumine Ovi humectata, vel alia ratione Naribus applicatus, efficacissimè graves Narium hemorrhagias sistit: vid. M. A. N. C. ann. 1. obs. 22.

pag. 90. ann. 2. annot. ad obs. 22. pag. 103. & 404. item BORELLUS *Cent. 4. obs. 7.* & 50. Par ratio est *Vitrioli*: *Hujus salinis*, vel ad albedinem calcinati *pulvis*, distilis modis applicatus, coagulatio sanguinem, & adstringendo orificia valorum, egregium est; item caput mortuum *Vitrioli*, si in istud aliquot gutta sanguinis incidant; item caput mortuum *Vitrioli* cum *Alumine* Ovi mistum, & in illar turunda Naribus applicatum. A RIVERTIO *Cent. 2. obs. 23.* Oxyeratium, ad albis *Pulvis Lichenum* equinorum maribus insufflatus, aut fumus & Vapor *stercoris* *Suilli* commendatur; de quo vid. RULANDUS pag. 74. *Stercora enim animalium*, in specie *Suis* ad Afini egregiè usus sunt in hemorrhagia Narium, vel Naribus inflata sub forma *Pulveris*, vel cum succo *Plantaginis* mistis eorum succus expressus, cum *Bombee* vel *Turunda* Naribus immisus, potenter sanguinem sistit; imò, ut JOEL refert, *Stercus Equilæ* etiam recens excretum, & Naribus admotum, solo oleo hemorrhagias Narium sistit, quod ipsum unum est ex externis remediis: Vid. M. A. N. C. ann. 9. obs. 56. Unde quidam capula gerunt pulverem *stercoris* *Suilli*, et in casu necessitatis eundem ostiunt, aut Naribus intrudendo sanguinem sistant & compiant. De Pulvere *Bucinum*, vid. HARTMANNUS pag. 114. & HOFERUS *Merz. Med. lib. 2. cap. 10.* Ex *radice Salpætris* *Vitrioli*, pauca aqua *Plantaginis* diluta & Naribus immissa, virium magnarum deprehenditur. Sic *Phlegma Vitrioli acidulum*, cum potentissimè sanguinem inspisset & coagulat, Naribus immisum fluxum reprimat. Facit hoc etiam decantatus *Liquor Stypticus* seu *Essentia Styptica* recentissima *Calliclætenis* in lecretis habita, quæ tamen reverè ex *Vitriolo Martis* & *Alumine* solutis & mistis principaliter constat: si enim in hoc *Liquorem* *Gallæ* inieciuntur, nigrescit. Author est *Gallus Vivient*: vid. in specie BARTHOLOINUS in *Art. Med. Historiæ*. Vol. 2. observat. 41. pag. 116. & obs. 233. pag. 122. necnon Vol. 3. obs. 2. M. A. N. C. ann. 9. & 10. observat. 116. & WILLISIUS *cinæ* *læ* quo ipso, uti in genere quæcumque hemorrhagiz quibuscunque in locis externis usarum siliuntur, ita in specie & Narium hemorrhagiaz supponitur. Scilicet ex hac ipsa ratione *atramentum* laudatur, quod quocunque modo Naribus applicatum & intratum, peritum *Glossipium atramentum* scriptorio imbutum, aliquantulum expressum, & in Turunda forma Naribus immisum, ratione *Vitrioli* Sanguinem cohibet. Vel

27. Aqua Plantag.

Ruyss. passif. ana 3i.

In quibus dissolve

Vitrioli Martis 3i.

Alum. 3i.

M. D. S.

Externè applicandum, vel in Nares intrahendum, vel inspersionum.

Vel

28. Alum.

Vitrioli ana 3i.

Phlegm. Vitrioli 3i. ad 3ii.

Ebulliant ad dissolutionem Contentorum; Liquor filtratus Spiritus Vitrioli aliquot guttulis aditus aciduletur.

D. S.

Aqua Sanguinem sistens.

Vel

29. Alum. crudi. 3i.

Terra Vitrioli dulc. gr. xv. ad 3i.

Phlegm. Vitrioli Spiritus Vitrioli ana 3i. ad 3ii.

3i. ad 3ii.

M. S. ut antè,

Inieciuntur Naribus. (C)

Sed forsitan Spiritus Vini pro se reddiscatus, Naribus paulo profundius iniectus, omnibus his præstat; siquidem ad illo quivis sanguis fluidus, etiam calidus & adhuc recens, citissimè mirabili cum spæsculo coagulatur solet.

Faligo Furni superius laudata cum *albumine Ovi* mista, Turunda illata & Naribus immissa, egregiè sistit hemorrhagiam; vel simpliciter de *Casaplatate* ex *Aceto* cum *Argilla* in combusta supra dicto Naribus omnimodè immisum fluxum Sanguinis sistit, aut etiam *albumen Ovi* cum *alumine subactum* dicto modo applicatur. Nempe est in saligine acidum cum

(C) Sic ad Hemorrhagias quæcumque sistendas familiariter nitimur Aqua Arteriali diluta, quid Sanguinem etiam ex Arteria fluentem sistat. Ejus compositio est: 26. Colcothar. Vitrioli. Alum. 3i., Sacch. candi ana 3i. Urine junice. hom. Aq. Rosar. an. 3i. Aq. Plantag. 3ii. ana simul omnia agitentur in mortario, postea mixtura in phialam vitream inieciatur, & aservetur pro usu, quo tempore per inclinationem liquor erit effundendus. Hæc Aqua nitimur ad extræ, peritas in ambobus applicandæ, & in Naribus, in Narium Hemorrhagia, inieciendæ.

cum terribi particulis admixtum, à quibus vis adstrictoria. Praeflantissima Fuligo est illa, quae à fuso Vasorum & Capillorum aëreum, quae in culla usurpantur, emittitur: Fuligo cutis separata ex Naribus intrusa, vel pulverisata cum sanguine patientis mista, & Turundarum forma Naribus immixta, sanguinem sistit; Remedium etiam à WILLISIO citato hoc tanquam expertum commendatur. Sic denique decolla adstringenda Naribus immixta haemorrhagias subinde periculosas sistere valent: Conf. M. A. N. C. ann. 2. observat. 223. pag. 324. & in annotat. ad hanc observat. p. 403.

Præter dicta adhuc observandum, Tapica hoc in casu non Naribus saltem esse attrahenda, sed Periculis etiam quidem impendenda, v. g. Masticæ de Tegula Aceto imprægnata, de quo vid. BARTHOLINUS ann. 5. hyst. 97. Ut illos taceam, qui certa Remedia dentibus atterendo aut linguae subdendo fluxum Narium sanguinolentum sibi posse sibi perfundere, v. g. Radicem Cichorii albi circa fœtum S. Jacobi in meridie collectam, aut Radicem Nigellæ sibi Nigellæ, quam inter similes Plantas masticatam, & Naribus inditam, primum hoc in passu obtinere SENNERTUS, & SIMON PAULI perhibent.

gentem sanguinis ex gingivæ eruptione curavit. Quocumque in casu convenit decoctum gargarizandum, quo coaguletur sanguis, hærentis radicis dentis evulsis: vel fiat decollum ad gargarizandum:

℞. Rad. Tormentill.

Rhiz. an. ℥iij.

Coll. cons. ℥ss.

Sem. Papav. alb. ℥ij. vel ℥ij.

Coqu. in ℥ q. aqu. simpl.

Colatur. addæ

Boli Armen. vel vulg. ℥ij.

Alum. vel tartari, aut asul purum.

M. in forma gargarizantis: in Ore aliquamdiu detineatur, donec cesset hæmorrhagia gingivarum:

D. S.

Gargarisma sanguinem sistens.

Convenit etiam hoc modo aqua spiritui Salis ebris proelucendo Ore. Conf. M. A. N. C. ann. 3. obs. 316. pag. 334.

Alius irritis Cauterium æthere admovei potest: Conf. M. A. N. C. ann. 3. obs. 2. pag. 37.

ARTICULUS IV.

De Sputo Sanguinis.

ARTICULUS III.

De gingivarum hæmorrhagia.

POst Nares etiam subinde Gingivæ gravem hæmorrhagiam patiuntur, eamque facit copiosam, adeo ut observaverit SCHENCKIUS lib. 2. observ. HOLLERIUS comment. 2. ad ap. 18. lib. 2. sect. 2. Cæc. Hipp. 118. Ierusalem sanguinis ex gingivæ fluxum. Fluxus hic ex gingivis, si est spontaneus, nunc est Criticus, de quo præter SCHENCKIUM vid. ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. præf. admir. observ. 86. nunc Periodicus de quo SCHENCKIUS lib. 1. observ. ZACUTUS LUSITANUS tent. 5. carat. 3. ARNOLDUS BOOT cap. 7. nunc vagus. Criticæ hæmorrhagiæ gingivarum Morbum solvunt: Periodicæ affligunt, quando alias confecta sanguis in certis loco evacuationes sunt suppressæ: tunc enim non raro periodicè per gingivæ solet effluere. Vagæ verò sunt, quando ex variis causis effluit sanguis per gingivæ, & præter supra nominatas causas, cum aliis hæmorrhagiis communes, in specie subinde est vel gingivarum laesio febricitans, & continua cum aliquali extrinsecus æthere vasculorum à saliva nimis acris, aut Sale febricitans salis-acris facta, de quo aliquid fult. 17. cap. 3. artic. 6. ubi de febricitans: vel est Naturæ Constitutio, quæ certo à statuto tempore per illas vias solet exonerari. Sequitur tamen etiam, quod frequentissimum est, hæmorrhagia frequenter ex gingivis post ineptas dentium evulsiones, quando arteria radicalis in dente laceratur, quam subinde desperata ferè hæmorrhagia gingivarum subsequitur.

CURAE.

Hæmorrhagiæ gingivarum, quæ est spontanea, ut trivialis, aut Periodica, non est curanda, sed cura salutaris relinquenda, cui succedat hæmorrhagiæ evacuatio. Nam verò, quæ est non spontanea, sed est à febricitans, ex laxitate acutæ gingivarum, vel ex erosione Vasculorum ex saliva acris, curatur imprimis optimè per Astringentia, in quibus primum obtinet Tinctura Lacce Myrsicæ, item Lincimatum illud, quod habet DECKERS in suo comment. super præf. Barbetti, ubi de febricitans pag. 176. in edit. 12. illud enim est egregium in hac febricitans hæmorrhagiæ gingivarum: item decollam radicis Tormentillæ cum alumine. Si verò ortur hæmorrhagiæ hæmorrhagiæ ex dente evulso, curatur eadem optimè vel cum Bombace tintinctura Tinctura sulphuris viriduli, ut alias vocatur, & Alveolis applicito, hinc enim subito cessabit sanguinis fluxus, ut id per Experimentum observavi: vel hujus defectu applicetur solutio viriduli, quam sanguinem sistit: vel imponatur Gummi Arabicum, quod ipsum glutinose sua sanguinem ex arteriis ob dentem evulsam emanantem inspissando, consequenter statum ejus sistit: vel applicetur decantatum Emplastrum Galeni, ex Aloe, Thure & Pilis Leporis, coctis, & cum albumine Ovi exceptis, gingivis impositum. Tale ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. observ. 85. ultraparavit feliciter, & in Tom. II.

POst sanguinis ex gingivis fluxum non raro per Os etiam rejicitur ille in affectu, qui vocatur spatum sanguinis seu Hæmoptysis appellata (D). Idque ad differentiam vomitus sanguinis, de quo supra sect. 6. cap. 2. adhuc fuit. Jam verò sanguinis, qui spatuendo seu vomitu rejicitur, ex variis locis promanare, & hinc in Os derivari solet: nempe nunc ex summis Narium ornat, nunc saltem ex Palato, nunc Gingivis, nunc Fauces, nunc Oesophago, nunc in Larynge, nunc ex Pulmone, nunc ex Bronchiis, omnibusque aliis vicinis locis. In specie autem istud sanguinis spatum in considerationem venit Medicam, & etiam speciali omnino hæmoptysis vocatur, quando sanguis cum Tussi ex Respirations Organis, speciatim ex pulmonibus, per Oesophagum rejicitur, & est consideratione dignum. Manat sanguis tunc ex arteriis, ex pulmonibus, vel ex arteriis Trachealibus, ex arteria nempe Aorta oriundis, ut rectè & accuratè has distinguit WILLISIIUS Pharmac. Rational. P. 2. pag. 251. Nam ordinari quidem cum Tussi sit hæmoptysis, nempe quando Pulmo affectus est, ut profundiores Tracheæ rari: Rarissimum enim est, Hæmoptysin veram vitio pedoris contingentem absque Tussi observari, quando nempe saltem superior Tracheæ pars afflicta est: quæ exempla hæmoptycos ex vitio pulmonum ortæ sine Tussi vident. 10 M. A. N. C. ann. 2. observ. 45. pag. 29. ann. 9. & 10. obs. 125. pag. 309. WILLISIIUS loc. cit. & RHODIO ann. 2. pag. 13. & 14. in quo casu cum aliquali plus minus hæmoptysis prævio, sanguis erumpit: sicuti è contrario non omnis sanguis, qui Tussi rejicitur, præcedit ex Thorace est. Interim frequentissimè eidem Tussi adjungi solet.

PARS AFFECTA.

Pars affecta in hæmoptysi nunc est superior Larynx, omni, quæ cavitas, nunc intermediis Ductus Tracheales, nunc eorum ultimæ extremitates orbiculares: adeoque ipse pulmo. Quæ pars affecta differentia præbe attendenda sunt ad explicandos diversos Hæmoptycos Modos.

C A U S A E.

Causa Hæmoptycos sunt vel in sanguine, vel in Vaso, seu hæc hæmoptysi, live Diaplysi, aperiuntur. Ordinariæ illæ causæ supra art. 1. ex generali Hæmorrhagarum Theoria patent: In specie tamen frequentiores sunt dum. Nempe frequentior est.

(1.) Rarietas insignis cujusdam Vasis in pedore aut Pulmonibus, quod fit ex Clavore nimio, & forti corporis Nitro & Tensione Pulmonum hujus Gestatione graviore cupisdam nrois, quæ spiritus cohibetur: item ex Casu ab alto, Plagis pectoris ictibus, ex Tussi nimis concitata agitante Pulmones: item ex copioso effluore Rubeo, de quo vid. ZACUTUS LUSITANUS in lib. 1. præf. hyst. cap. 6. dum

Cccc

(D) Aijerunt ab ipso Sanguine, & vitiis, spuo: hinc aijeruntis, Sanguinem spuens.

dum ex hoc Hæmoptysin lethalem observavit; Saltatione omnia ROLFINGIUS *Medic. comm. lib. 2. sect. 3. cap. 53. pag. m. 122.* quæ omnia Ruptione Valvularum in pectore & pulmonibus interire queunt. Disponunt ad faciliorem talem Hæmoptysin ex hac causa imprimis letalissima quidam sanguinis evacuationis suppellex, præsertim in partibus corporis interioribus: Sic enim nihil frequentius est, quam quod suppellex mensium & hæmorrhoidum sublequetur sanguinis ipsorum, & sanguine nunc circa præcordia plus minus coarctant, flagrant in pulmonibus, & Anæsthesia Valvularum inferre, qualis Hæmoptysin Periodica ex Menstrui Fluxus jaminatione observata est in M. A. N. C. *ann. 9. & 10. observ. 37.* Perinet hæc, quod observavit DEODATIUS in *valat. pag. 219.* de Hæmoptysin insigni cum pleuritide suppurata, occidua ex nimis citi meningi emanante. Plura exempla videb. in SCHENCKIO *obs. lib. 2. & BORELLO* *sent. 1. obs. 24.*

(II.) Causa frequenter est *Valvularum*, imprimis in pulmonibus, *Bryse*, facta aut ab *Externis* ulsionibus, v. g. *Puncto Sulphuris incensi*. Halitu aque foras: sub laboribus chymicis, &c. vel ab *Internis*, quæ omnino frequentissimas in Variolis, *Lympha* in specie nimis acris & acido-falla, scorbutica, aut alia simili labe inquinata, succellit Vasa tenealia pulmonum equedante, & ita Hæmoptysin procurant, quam libidine solet precedere Tussis quædam sicca nocturna serena; quam Hæmoptysin, vel ab acriori *Lympha* oritur, frequentissimè Ulcus, & Vomica pulmonum, & Plithuris pulmonalis infestari solet. Præterea perinet hæc, quod observatum narrat RHODIUS *anat. observ. 35.* quod post sanatum Podum Ulcus supervenit sanguinis ipsorum, dubio perculis retrogresso sermone ulceris acris & corrosivi, mediante massa liguina ad pulmonem delato, & madam sanguineam inquinante, ac partes pulmonales erodente.

Hinc sunt *ordinaria Spæi Sanguinis causa*. Rarum est, quod *Arteria* cum potu assumptæ, & in sanguinibus remens, itaque sanguinem emulgentes, ipsam cruentum inducunt. Exemplum huius rei videb. in SCHENCKIO *lib. 2. observ. & BORELLO* *sent. 1. observ. 24.* Sic non minus curiosum est, quod *Thoracica alia* in quibusdam hoc malum excitavit, Authore WILLISIO *Pharm. Rationali. p. 2. pag. 155.*

Observandæ ulceris sunt *Hæmoptysin Differentiæ*, dum utrumque (1.) Sanguis, qui rejicitur, vel est floridus, vel semigrumulosus: (2.) est vel copiosus, vel parvus & paucus; prout nempe conditio vel Valvæ apertæ, vel impetus sanguinis undequeque concitati talis est: (3.) vel facili vel difficulter ejicitur: (4.) quod Hæmoptysin nunc fit *revera*, nunc *latentia* & hæc (5.) vel *Paga* vel *Periodica*. Sicut *Hæmoptysin* inveteratarum *periodicarum* immemoriam, quin potius cum ephorbia & gremum contingunt, plura hinc in de præstat exempla. *conf. BARTHOLINI* *Art. Med. Medicinæ. vol. 1. pag. 146.* de THIERYMAYER *conf. lib. 2. pag. 24.* Sic *anæsthesia* *Hæmoptysin* observavit RHO DIUS *sent. 2. observ. 34.* sic diurnam *Periodicam* sanguinis ipsationem notat AMATUS LUSITANUS *sent. 6. cur. 49.* Cuius seculæ est singularis, cum *Eger* singulis horis interdiu calipuit sanguinem, noctu vero, licet vigiles, non: *qui delat* libidine est *Hæmoptysin*; nunc vero tam *delat* plus minus conjuncta, vel confusio in pulmonem, vel gravatio obesa corandem, vel rodente & plus minus irritante in Asperæ Arteris, & cetero casuum nempe variate.

DIAGNOSIS.

Quod attinet *signa*: Hæmoptysin per se patet. Cum autem ea tam variis locis, Naribus, Palato, Oesophago, Larynge, &c. possit eici sanguinem cum ipso, necesse est, ut imprimis attentus sit Medicus ad cognoscendum *Locum*, in quo est Vasa istius sanguinis fundens: quod ut cognoscatur, *paris affeclis* *differentia* probe attendenda, & artificia li concludat causæ Antecedentes, & excretionis Modus, examinanda sunt.

Causas Antecedentes quod attinet: considerandum, an ex suppellex conquiret evacuatione sanguinis, vel ex prægresso Clamore, vel Tussi serena, vel casu ab alto, vel contusione pectoris, vel capitis; vel ex ritu rerum acrimo & similibus, supervenit ipsorum cruentum, ut consideret & quantum partem causæ antecedens primario afflixerit. Utinam ex suppellex conquiret evacuatione sanguinis, vel ex prægresso clamore, vel Tussi serena, &c. semper est suspicio læsionis Valvularum in pulmonibus; secus, si aliæ præcellerint causæ.

Quod autem *externis modis*: attendatur, an spiritum cruentum ejiciatur cum Conatu, & Sereuæ Invi? an cum Tussi plus minus laboriosa? item an Sanguis ejiciatur plus minus floridus? vel observetur, an spumescat, vel non spumescat? an paucus, vel multus? an periodicè recurrat, vel non? & quæ sunt alie similes circumstantiæ & concurrentiæ Pathematica observanda. Sanguis nempe, qui *aspirantibus* levi oblique Tussi, ex Ore ejicitur, est taliorum ex partibus superioribus palatinis, Naribus aut vicinis superioribus, qui vero levi *Serena*, exputat, est ex Naribus, capite & Larynge, Oesophago, summatæ Asperæ Arteris, ac in specie si paucus fuerit, ex vicinis locis, is scilicet, qui ab Thorace præcisè non spedit, & congruatur proficit. Conducit hæc causæ Antecedens Laryngem aut Oesophagum afflicti. Qui vero copiosus & Tussi, præsertim reiterata, profunda, & accedente Conatu, rejicitur sanguis, ut plurimum ferè est ex Thorace, & latis in specie pulmonibus; ubi tamen hæc cautela ascendatur, ut Tussis præcedat sanguinis Sputum. Non tamen semper omnis sanguis, qui Tussi rejicitur, præcisè ex Thorace est præterea & alia concurrentia signa simul perpendenda erunt: nam sanguis confertus ex Oesophago, & lachrybus erumpens, & Laryngem plus minus affligens, ipsorum sanguinis cum Tussi inter se potest, aut Malum non sit in Asperæ Arteris vel Thorace, sed tunc Tussis aut sequitur, aut conjuncta est cum sanguinis Sputo. Quod si tamen Tussis præcedat, & post hæc sequatur ipsorum sanguinis, signum est: sanguinem provenire ex pectore, aut pulmonibus, aut Asperæ Arteris, unde *Sputum* in sanguine excreto apparet ut plurimum sanguinis ex pectore, & specialiter ex pulmonibus erumpens, signum est, idque imprimis, si cum Tussi præcedat & floridus evacuetur, idque imprimis, si *limbo* *de* *laryngis* in eas profundum concurrat, si *Aspiratio* plus minus difficilis, aut alia symptomata afflicti pectoris indicantia adstet. Spuma fit, quando sanguis aliquandiu cum Aëre quasi concutitur, quo commodè in ipsam aut. Quod si sanguis, qui ejicitur per spiritum, sit *floridus*, *crassus*, & magis rubicundus, tenuis, ex Arteris emansit indicio est si vero *spumescens*, crassus, grumulosus plus minus, aut obfuscus, ex Venis effluit, necque tam ex pulmonibus quam pectore ibidem extravasatus proficit.

Pari modo sanguis *copiosè* *repulsa*, magis est ex pulmonibus & pectore; minus copiosè excretus est lachrybus est videtur. Qui quo dilutius in pulmone, Thorace, aut loca viciniora hæret, & ita demum ejicitur, niger, obfuscus, plus minus grumulosus observatur. Sic quoque sanguis periodicè qui cum spuma ejicitur, ut plurimum est ex pectore, rarus alio loco promane.

Qui ex *Thoracis* cavo, minime spumosa, sed grumulosi est.

Qui ex *Gutturis* & *asperæ arteris*, est floridus ac paucus.

Qui denique à *Membris semioribus*, nigricans & paucus per horum symptomata rejicitur.

In his ergo articulis stochasma utatur Medicus, ac considerare paratæ afflicti, ut eam ad curam dirigere possit.

PROGNOSIS.

Quod *Prognosis*: Omnis in genere Hæmoptysin est *levis*, & periculosa. Ea latis pulmonem Vena ipsorum sanguinis oriundam, ipsius *tricar* & *primæ* pulmonum vel *Asperæ* Pectoris. (si enim sanguis non exeat, in *Pu* mutatur,) hinc *plethica pulmonalem* & *Talem*, interdum *Peripneumonia*, post se trahit, præsertim si præcedens inlegetur hæmorrhæ.

Quod verò ex Vasis pectoris latis, & aliis locis est spiritum cruentum, minus periculosum esse solet.

Interpretabitur nimis *suppellex* *Hæmoptysin*, in specie, qui sublequetur vel sanguinis Turgecentium vel suppellex hæmorrhæm sanguinis, interdum non raro interire sicut Tabem periculosa, & Peripneumonia.

Hæmoptysin, quæ fit ex pulmonibus, periculosior est ea, quæ ex pectore, h. e. minus pectorem subest, & latis aut pulmonem Vasa, quam Vasa Intercoastalia.

Denique spiritum cruentum si est *primarius Morbus*, periculosior est, quam si est *Morbus secundarius*, h. e. qui pleuritidem, Peripneumonia, aut alios pulmonum afflicti, inlequitur.

Sputum sanguinis periodicum, si sine pulmonum singulari noxa contigerit, minus periculosum est, quam si cum pulmonum vicio junctum fuerit.

Prognosis speciem videb. in BARTHOLINI *Art. med. Neph. volum. 1. pag. 10.*

ba Prunella in vino rubro si propicietur; quorum etiam succi aut tyrci uncatum propinat commendatur; Aquæ vero horum simplicium nihil valet, cum vis specificæ alexi-hicæ addicere nequeat. FONSECA lib. 1. conf. 8. dicit, quod sanguis non erumpat, si manducet quis in venæ-sectione Portulacæ semen, de quo experientia consulenda. præter hæc *symplyum majus* specificè medetur hæmoptylæ, live blandè decoquatur, live tyrcus *Fernæli* propinetur. post hæc est imprimis *hædra terrestris*, quæ in ipso sanguine est plantæ mirabilis, idque imprimis post paroxysmum nam temperat acris, consolidat vaia rupta etiamque, & sanguinem dissolvit congruatim: hæc *tyrcus*, *Dioscoridum*, vel *conferva* egregia. Fiat ergo ex conferva hædræ terrestris, additis aliis appropriatis, tale electuarium non inelegans; v. g.

*℞ Conf. hed. terr. ʒiij. vel ʒij.
(vel hædræ & conf. rad. symphyt. maj. an. ʒi.)
R. ac. ʒi.*

*Terra sigillat. e. spiritus Mercurii imprægn. (si circumstantiæ id patiuntur; sin inipicio erofionis, abstinemus ab ejus usu) ʒʒ.
ad ʒij.*

*Hæmat. pr. ʒi.
Trochisc. de carabe (qui dissolvunt sanguinem, resoluuntque ejus grumos, & temperant acris) ʒij. ad ʒʒ.*

*Laud. opiat. gr. iij. ad vi.
Cum syr. de symph. Fernæli vel Portulacæ.
M. D. S.*

*Electuarium adstringens.
De quo subinde in die magnitudo Nucis Castaneæ vel juglandis capitur.*

*℞ Conf. hed. terrestr. ʒiij.
Rad. symph. maj. ʒʒ.
Extr. facies. Plantag. ʒiij.
Mucos. pr. ʒij.
Beb. armen. pr. ʒij.
Mastich. ʒi.
Laud. opiat. gr. vi.
Cum l. q. syr. de symph. Fernæli. l. electuarium;
D. S. ut antè.*

Appropriata magis hæc sunt trochisci de carabe, vel trochisci quoque de terra sigillata, de spodio, pulvis stæragri, quem SCHENCKIUS observ. pag. 241. & PERÆUS in Noëlog. lib. 1. Differ. 10. describitur, Terra catechu, centummodius rotundæ; succus Urticæ ab AMATO LUSITANO can. 6. hujus & FORESTO lib. 6. observ. 26. RIVERO, & ambigat ferè Authoribus plenis baculis laudatus, species diaphantissimæ *Myrsinæ*. Cum siccatus scabellus, quæ vulgo inepie Mater ligosis dicitur, in Aqua plantaginis propiciatur, hæmoptocum diuturnum curavit empiricus: Vid. VELSCHIUS Millem. obs. 27. crast. 1. annex. Ann. 4. & 5. M. A. N. C. parò trochisci certè de carabe multis scopis satisfaciunt: hinc in quæcumque hæmoptylæ ex quacunque causâ acris sufficit hæc formula:

*℞. Aqu. Rosæ. passif.
Plantag. ana ʒij.
Acet. Vini acerr. vel destillati ʒvi.
Troch. de Carabe ʒi.
Sperniel. crall. gr. xv.
Rham. pr. ʒʒ.
Lapill. Caner. pr. gr. xv.
Syr. Portulacæ ʒi.
M. D. S.*

Potio adstringens.

Detur pro aliquot dosibus. Vel

*℞. Aqu. Plantag. Portulacæ.
Chresol. ana ʒi.
Tinctur. sulphur. virideli ʒi.
Trochisc. de carabe ʒij.
Laud. opiat. gr. v.*

*Syr. de symph. Fernæli.
Fornal. ana unc. ʒ.
M. l. potio.
D. S.*

Potio adstringens pro aliquot dosibus.

Ubi tamen loco trochiscorum de carabe *Electuarium Diacordii Franzosii* etiam si misui. Multum usurpari potest. Omiter moneo, Aquis ex plantis adstringentibus non adhiberi, ut adstringent, quia nullam vim adstringentem obtinent, sed loco vehiculi.

Hinc pariter *conferva Rosarum* rubrarum antiqua item pulvis summationum & *plislarum coarctationum cynobati*, Ges. *scallanf Kunzæ*, egrgia specificæ sunt in hoc malo, (E) non secus ac *Oleum lini* coactum niurparum mira præstat: Confer. M. A. N. C. ann. 6. & 7. observ. 209. pag. 308. De succo Urticæ superius locutus sum. Sac & spiritum Vitrioli commendat CASTELLUS, seu potius Oleum Vitrioli in *salsi opisthi*, in Aqua Plantaginis, vel alia appropriata, quia coagulando sanguinem eundem condensat, ejusdem eruptionem sistit, & ita in paroxysmo hæmoptylæ nimis optime convenit; quod ex experientia propria confirmat HOFFMANNUS, & THONERUS in consilio 37.

*℞. Aquæ plantag. ʒvi.
Syrup. de ros. fer. ʒi.
Spir. Vir. rectif. vel ejus et ʒi.
M. l. mixtura.*

De qua subinde aliquot cochlearia ab Aëro capiuntur; tam in ipso, quam vomitu sanguinis admodum convenit; in specie ubi simul ebullit nimis aut efferveiscit sanguis.

Vel

*℞. Herb. centummod.
Vinc. peruvine.
Plantag.
Bellid. ana M. l.
Flor. rosar. rub. M. ʒ.
Rad. tormentill.
Utric. ana unc. i.*

*Coqu. in l. q. Aqu. Ferrar.
Colat. unc. viii. adde*

*Syr. de symph. Fernæli.
Flor. Hyperic. ana ʒvi.
Spiritus Mercurii l. ad aliquam modum;
D. S.*

Potio adstringens.

Conf. simul HARTMANNUS, ubi de sanguinis fluxu. Sed in *huic* acidi vitriolici, curæ, dicit LINDANUS, ne propinet, si aliquis Utricis in fœniculis sit solutus, aut aliquanti mucus phlegmaticus, aliis necesse hic magis pulmonebus. Prodest aliis ad fervorem sanguinis restringendum, quatenus acris serum præcipit, & ducit ad vias urinarias, aliis, si copiose fluxit sanguis, addatur adhuc euphorbia Lindani, quod nobile est remedium simplex, familiaris ipsi esputum contra hæmoptylam, paratum ex Pomodoro cotoneo:

℞. Poma Cydonia, live matura live immatura, quocunque modo haberi queant.

Eaque discinde minutim in tenues lamellas, quas oque diu in Diplomate in Aqua communidonec penitus mollescant; quo saclo sepea Aquam decoctionis ingerit; & laminas Pomorum benè molliatas fortiter exprime.

Hujus succi expressi cochlearia ii. vel iij. ter quaterve in die propinat, quod ipsum egregiè in hæmoptylæ conducere asserit præmissa venæsectione, utat etiam corrosi fuerint pulmonebus: Aquæ verò isti, in qua decocta Poma, per residentiam clarificatur, addit tantillum *fascchari candi*, vel *distillum Herdei*, in quo *pulsula crinitissima* codæ fuerunt, & propinat simul aliq. *fascchari* pro potu ordinario: quo ipso se gravissimas hæmoptylæ, etiam ex erofione pulmonebus ortas, curasse, & nonquam sine succellu usum fuisse, asserit.

GESNERUS in *opisthi* pag. 109. commendat malum erydonium excavatum, drachma una Theriac impletum, aliisq. & propinatam, quo ipso egregiè aliquot hæmoptococ

(E) Pulvis Fungi Melitenensis aliquoties ad ʒi. & amplius in Vino vel Infuso distillat. exhibitus, curam ass. Hæmoptylæ superaverit composuit. De eo verba facit Paul. Boccone Icon. rar. Plant. pag. 80. & Tabulæ exhibet num. 41. vocaturque Fungum typhoidem c. cœneum Melitenensem: palmatis est interdum majoris, altitudinis, Pungum nemum explicare capitale disco plati referens: Periculis crassus est, longus, scaber, & sanguis: Capitulum Pediculo paulo crassius, & ipsum fungum, perunguam succum fundens, si virgineis digitis premas, ac minoris typhæ pediculi clavam aliquoties refert, unde nomen. Per maturariem gravis minimis innumeris, Punctis non distinctibus, exasperatur, undique Cœci colore splendens. Æstat in sepalo Melicæ Insule adjacentæ, Scoglio del Generale dicto, invenire est.

cos restituisse asserit. De succo, syrupo & pulvere *stercoris Aluini* & suilli super addita fuit; vid. quoque *BALLO-
NIUS lib. 1. epid. & ephemer. tussis. 22. pag. 62.* Ad Hæ-
mopteyin in specie *stercoris Maris* a 3℔. vel 3℔. ad 3℔. cum
sacro Plantaginis commendatur in sputo sanguinis, addito
saccharo paucis pro gratia saporis, tandem mane stomacho
iuncto, & vespertini in introitu lecti, dandum per aliquot dies.
Convenerit in specie, si fuerit hæmopteyis ob ruptum pul-
monum vas. Cætera, ut *Lapis hamatitus, balas armena,*
Martialis, in specie *Tinctoria sulphuris viridoli* a guttuli 22.
xv. ad 22. in vehiculo appropriato, & *tinctoria Aniphibio-*
fica, ex supra dictis jam nota sunt. In male graviore autem ex
causis externa sæpe recidivante, decolla *Pectoralis ex lignis*
sunt egregia, de quibus confer. *WILLIUS Pharm. Ra-*
tional. part. 2. pag. 167. & 171. Ex quibus facile varie
possunt fieri formulæ; c. g.

℥. Tinctoria aniphibiof. 3℔.

D. S.

Tinctura consolidans 30. guttæ, sero ac mane sumende.

Vel

℥. Tinctoria lap. hamat. 3℔.

D. S. ut antè.

Dentur guttæ 20. ad 30.

℥. Tinctoria sulphuris viridoli 3℔.

D. S.

Tinctura adstringens.

Dentur guttæ 30.

℥. Aqua Plantag. 3℔.

Tinctura maris adstring. 3℔. ad 3℔.

Syr. papav. alb. 3vi.

M. D. S.

Potio adstringens.

Dentur cochlearim.

℥. Terra sigillat. 3℔. ad 3℔.

Lapilli. Cancr. prop. 3℔.

Laud. opiat. gr. i. vel ii.

M. E. pulvis: S.

Pulvis adstringens.

Vel

℥. Conf. Rosar. rub.

Rad. symph. maj. ana 3℔.

Terra sigillat.

Hamat. prop.

Corall. rubr. prop. ana 3℔.

Pulv. lapar. rub. 3℔.

Laud. Opiat. gr. iiii.

Cum Syr. de symph. Fern. & de corall. quercetum.

f. Elecuarium.

D. S.

Elecuarium adstringens.

Vel

℥. Conf. heder. verr. 3℔.

Corall. rub. prop. 3vi.

Antibell. Pater.

Hamat. prop. ana dr. 3.

Pulv. sem. Hyoscyam. 3x.

Cum L. q. Syr. Pectoral. f. elecuarium.

D. S.

Elecuarium adstringens.

℥. Conf. Rosar. rubr. 3℔.

Vinlar. dr. vi.

Hamat. prop. dr. iiii.

Sam. pater. alb. dr. 3.

Cum Syr. de symph. Ternell. f. elecuarium.

D. S. ut antè.

Vel

℥. Conf. Rosar.

Heder. terrestr. ana dr. vi.

Hamat. prop. dr. iiii.

Corall. rub. prop. dr. i.

Terræ sigillat. 3℔.

Cum Syr. papav. simpl. f. elecuarium.

D. S. ut supra.

Extensæ quæ dixi applicanda esse testibus in hæmorrhagia Narium, commodè possunt applicari iisdem in hæmorrhagia pulmonum, si fuerit sanguinis.

VII. Hic postissimum observetur, quod *superius Aris, 2. de hæmorrhagia in genere* dictum, scilicet excretionis aliquantum sedata *resolventia & expectorantia* leniora esse iungenda, ne sanguis extravasatus ulcus creet; qualia sunt spermæ ceti, cornu Cervi, Antimonium Diaphoreticum, lapilli Cancræorum, unguentum Potabile rubrum, syrupsus de scabiola, Osmeyl Squilliticum, Oleum succini,

quod ex *CÆSALPINO RIVERIO* commendat. Tandem & VIII. pulmonibus lætis *Pulverarii & Balsamici* prædicendum, c. g.

℥. Herb. scabiola.

Rad. terrestr. ana M. i3.

Rad. Torment. 3℔.

Sam. Asip. soc. 3℔.

Coqu. in L. q. Aquæ & cerevis. an. p. æqu.

Colat. 3℔. addè

Syr. Heder. verr.

de symph. Fern. ana 3℔.

M. F. potio, S.

Potio consolidans.

De qua pro lubens hauserit.

Crassi *Ann. 1678.* Jurium *Stadifum* gravi hæmoptey laborantem, ipso ex aliquot annorum tussis humida, spirita munda libero, nativa corporis constitutione, aliisque familiis superveniens ab phthisis disposito; cui in paroxysmo propiavi *Misuram quam Polydrosam supra art. 1. in hæmorrhagia, ab acris sanguine, à symph. aut erosione. etc.* concitata, laudata cum usu & spem cessavit. Hinc pro reliquis gravioris resolvendis præscripti;

℥. Aqu. chypres. unc. iiii.

Acet. vini dr. iiii.

Lap. cancr. pr. dr. i.

Antimonii diaphr. gr. xv.

Syr. scabiola. 3℔.

Misc.

His præmissis, ad imitationem *SYLVII* præscripti *Decollum pectorale ex lignis*.

℥. Raf. santal. rub. 3℔.

Liga. sassafr. 3℔.

Macerentur per 22. horas in Aqu. rosar. 3viii.

Coqu. ad consumpt. 3℔. addè

Herb. heder. verr.

Vernale.

Cam. hyperic. ana M. ii.

Sam. Fœnic. dr. vi.

Passul. min. coagul. 3℔.

Coqu. ad remanent. 3viii.

circa finem decocti addè

Rad. Liquirit. dr. iiii.

De colatura capiebatur bonus haustus mane & meridiæ & sub introitu lecti.

Usa horum remedium contemnam malum fœvere desist, ipso. Ego cætera commodè habente, saltem quod calor quasi heclicus ab omni patu, cum tussis moderatè humida, & copiosissimis sudoribus roborat, etiam sub primis homini horis, superesset. Inter cædæ demulcentium calorè heclicum ordinavi sequentem pulverem:

℥. Lap. Cancr. prop.

Antibell. Pater. ana dr. 3.

Corall. rub. pr. 3℔.

M. pro 2. vel 3. dosibus.

Item ob fœderes nallares, debilitantes & emaciantes, coarctandos optime consuli: pulvis sequens:

℥. Lap. Cancr. pr.

Antibell. Pater. ana dr. 3.

Arca. daphn. 3℔.

Laud. opiat. ferm. gr. iv. vel v.

M. pro 4. vel 5. dosibus vespertinis, hora 5. præterpropter à meridiæ assumentis.

Vid. Diff. de Cysti virtute diaphoreticæ cap. 3. §. 2.

Aliam Hæmopteyin ex organo massæ sanguineæ crassi in *Italiam* quondam juvenis, illari, vegeta, & gracili, cujus vasa sanguine turgescerant. Hæc septima vice gravida erat, ultimique Gestationis tempore agebat, cum ante menses quatuor vel quinque tempore æstro ex cursu & motu in Horto in spiritum cruentum incidisset, breviter quidem cessavit, sed antecedente septimana ex improviso vespertini cum tussis hecæ copiosum sanguinem horum spumum emisit, cessante tussis lectum petens, suaviter dormit, nam vocatur Medicus ordinarius, qui, pater pulveres confortantes ratione fecit, ordina, ut cucurbitula scarificata applicetur scapulis & Brachiis pro averione sanguinis: sed Ego vocatus non probavi consilium; parum enim evacuant, & tamen sanguinem versus Pectus alliciunt, & mensa est, ne circa vespertinam hæmopteyis major recurrat, quod etiam factum fuit. Quapropter altero die iussu venam secare in brachio ad 3℔. vel iv. simul ordinando sequentem militarem:

℥. Aqu. Plantag.

Pectoral. ana 3℔.

Acet. Vini dr. ii.

Corall.

*Corall. rub. prop. di.**Serra figillat. di.**Syr. Fler. papav. prax. dr. vi.**Misc. pro 1. doctibus*

Interim nullum sanguinem recipit, sed saltem subinde secret, & quoties secret, toties ipsum ementum rejicit, quod saltem ex capite laryngis derivatum fuit; nam levi creati ex palmantibus non potest pelli. unde judicavi, lationem saltem esse in larynge. Vespere: sanguis ipsum receperat, eodem impetu, unde nigra delabatur, sicut fortis se movente; unde ordinem quietem, prohibebam Vinum rhenanum, sed imperando dulce, simul quæ præscriberebam sequens alostachium:

*℞. Conf. heder. serr.**Ris. rub.**Coffa ana dr. vi.**Hamat. prop. dr. iii.**Corall. rub. prop. dr. i.**Terræ figillat. di.**Cam. syr. papav. th. c. electuarium.*

Libenter ordinem Alostachii de carabe: sed quoniam nos ingreditur opium crudum, propter sanguinem timui. Electuarium sæpe sompiti, & multos dies fuit sine spiritu creverunt.

In hamoptrii alias ex ergasmo sanguinis & spirituum egregie convenit *sampura*: vid. IOEL pag. 179.

Præservativè conveniunt *lae* & *acidula* cum medicamentis traumaticis.

Inter *Externa* convenit pulvis *sympatheticus*. Busto tempore balsamico, Junio & Julio, per caput transmissus tam, pulvis subicitur: vid. FABER & HELMONTIUS *Tam. pul.* conducit etiam immerisio testium in Acetum rosatum, vel lotium in Aceto immerisio & circa testiculos obvolvendum.

S E C T I O XIX.

DE MOTU SANGUINIS AD VISCERA LÆSO.

Sequitur motus sanguinis ad viscera: quæ sanguis sub circulo inferiore per arterias descendentes alluit, sicut lien, hepat, & renes. Interim de *lien* & *hepat* myribs pauca momenta restant, quæ non supra fuerunt mota.

C A P U T I.

De Lienis affectibus.

Sanguis in totum corpus distribuitur ex Cordis: ut idem operatur, & beneficio (spiritus Vitalis in esse vitali conservet. Verum præter hunc usum etiam in singulis partibus ac visceribus internis idem sanguis aliquid patitur, non tamen modo quatenus in quibusdam singulare & determinatam patitur alterationem, sed etiam, quatenus sic separatio quædam singularis casum sanguis ab eodem, utpote cum videamus, in *hepat* & *felliculo* (separati) in *Renibus* Urinum, in *glavdulis* partem Materie lymphaticæ ex sanguine una expurgari, & sic in reliquis partibus. Speciem pro varietate partium distinctum distibuitur, & quidem, pars altera deorsum per arterias aortæ truncum deferretur, cuius insignis portio per ramum splenicum, alias dictum coeliacum, lienis inferitur, qui annis per venam splenicam in truncum venæ portæ, & ita in hepat deferretur, sicuti simul omnis sanguis ab intestinis etiam restituitur per venam portæ hepat infunditur, quæ quoad hunc usum arterie ferè officio fungitur: qui sanguis omnis per fureculum venæ portæ in hepat distribuitur, venæ cavæ tandem inseritur. Exilis est arteria, quæ ex ramo arteriæ splenicæ seu potius ex arteria coeliacæ, ad pancreas, item ad hepat, uti etiam ad folliculum felleum inferitur, quæ arteria hepatica: cum cum vas choleodochi & nervis hepaticis pectis, intra capsulam communem coarctetur. *Causa* lienis *hepat* cum hepat, quæ omnis sanguis ex lieue immundat in hepat abut, ostendit peculiarem in officio consensum, ita ut probabile sit disponsi in lieue sanguinem, ut eo facilius in hepat alterari, & bilis ex eodem confici ac transcolari queat. Præter quæ vas etiam codium admodum nervi ea pari nervorum vago lien inferuntur, sicuti lymphaticæ quædam vas non tantum ad codiæ ex lieue ad receptaculum commune pergit, ipsi hepat & folliculo felleo copiosius admodum lymphaticis infunditur in receptaculum commune le unguantibus. An in lieue vas lymphaticæ, vid. RUY-SCHIIUS & BLASIIUS: copia lymphaticæ hepati minime illa apud RODBECKIUM.

Lienis vicus est *sustentans potius nervos*, quam propriè dicta sanguinea: nempe consistit in congerie membranarum, in cellulis & multiplici coarctatione ciformatarum, per quæ glandularum minimarum copiosi racemi Uzæ horum emulantes dispersi sunt: uti hoc ipsum eleganter describit MALPIGHIUS *Tract. de structura Viscer-*

rum, ubi de liena; id quod etiam mediante statu circa lienem demonstrari potest. Veteres dixerant, lienis substantiam esse tantum *Purechyma*.

Lienis vicus *quædam sum* aliam non est simpliciter ad se vitale animalium necessarium, cum Canibus & suis bene utilis sensibili functionem lesionem excindi queat; sed tantum ad *hepat* esse consistit, ita, ut ad maiorem saltem sanguinis perfectionem, sed accidentalem tamen, facere nitur (vid. M. A. N. C. *Ann. 1. obs. 39. p. 181*). DEKRI in *Burletis*. Generationes habent communes poli causam lienis BARTHOLINIUS & FIORAVANTO. *Idea* notat ex casibus liene humano; sed experientia non est nulla: vid. MAJOR in *shing. infus.* Quoniam ipse etiam convincit, quid ex, quæ HELMONTIUS de *ut* lienis statuit, deque ejus cum ventriculo diuturnata preter, de fermenti inspiratione a lieue, de primæ conceptuum formatione, somni & Vigiliarum sede, vultus generativa ex splene, in *Tract. sedis animæ*, item *in diuturnitas* &c. omnia falsa, nec minus veritari congrua esse.

Pro usui lienis melius cognoscendo observandum est, quod lien *an* *vero* singulari sit definitus, adeoque recipiendo nec digerendo cuidam humoris aut excrementi sit destinatus: unde erim receptio fusi melancholici, & cum in stomacho eructatio per vas breve, ex veterum sententia, etiam sponte corruit, & preter anatem, cum sufficienter destruit CONRINGIUS *Tr. De Grav. & de sanguinis cap. 12. & 14*.

Modernorum quod attinet sententia: tot ferè de Lienis sunt sententiæ, quot Medicorum capita. Plures verum sententiam, sed suo modo correctam & magis exactam arripiunt, quatenus omne sanguinem crassum melancholicum in eo magis fermentari, nec sanguinem plquam perfici, nec chylum crudum in eo alterari, nec excrementum tartareum in eo fermentari, & ad promptiorem separationem disponsi afferunt. Confer hic MOEBIUS in *suis fundamentis* pag. 381. item VELTHUSIUS de *ut* lienis, item SYLVIUS *Dissert. de ut* lienis.

Frusta reveta lien non est conditus, quæ ad sanguinis laudabilem & naturalem statum, pro universi corporis convenienti salute, & conservandum & restaurandum, multum conferre, & fructus ejus & connerio demonstrant: sed *quod hoc sit*, quod consistit, quæritur? Probabiliorum videtur, in lieue ratione copiosissimarum glandularum, uti & ratione multiplicatione aerorum ad lienem distributorum, & sensui ac motui minime inservientium, preparari *certain quædam fermentum subacidum*, insigniter tamen volatili, quod sanguinem, ipsi insulsum, imprægnat & disponsit, ad promptiorem fermentationem ac spirituoscentiam, simulque hoc ipso partes sanguinis heterogeneas nec rite miscibilis facilius separari faciat, ut commodius per convenientia loca, in specie renet evacuari possint.

Illustrant hæc: quod observetur itis, quibus lien bene constitutus est, eorum corpus ferere; quorum verò lien viciatè augetur, eorum corpus immundum! Ad hæc amicos spleneticos revera tales, seu in quibus lien male affectus aut tumens

dus deprehenditur, hi omnes sunt salivatores, teste HIPPOCRATE, & tales Aegri optimè per Medicamenta Saliva Usuram provocantia curantur, teste LAURENTIO in *Centesimo*. Notum ubi experientia testatur, Urinas, quae sub ipso morbo fuerint crude, teneae, restituta Lienē prodire turbidas, obcuras, & cum copioso sedimento coctas, tandem lenius clarificare, & ad naturalem colorem redire, Ad haec Lien Animalium, vel affatus, vel coctus, vel alio modo preparatus, si guttetur, deprehensus est auctori, potius, & plus minus accretis saporis, teste WALAEO in *Explic. de motu Sanguinis*, item HIGHMORE in *Dignif. Anatomica de Splene*. Hoc insuper notabile est, quod Splenis Animalium, in specie Cervi & Bovis, preparati, aut in decocto vel essentia usurpatis, affectibus Splenicis & imprimis Cachexiae Virginum & Menstruis suppressis, specifice curantur.

Quoad affectus Lienis praeternaturales; ejus aetiolodiam, quando vigiat Vicius vel

- (1.) Intemperie; ratione Spiritus infati.
- (2.) Quando leditur in Conformatione sua, ex ejus Infarctu & Obstructionibus, indeque nato Tumore inflammatorio, & tandem Scirrhelecentia.
- (3.) Denique, quando leditur in Qualitate, ratione speciei ejus Fermenti plus minus alterati, aut deficientis, vitio percipitur spiritum Animalium, copiosius alias ad Lienem distributorum.

Viciis tamen hinc Lienis non sunt adeo frequentia; & si tamen adiant, sunt nocte hereditaria, nam, idque frequentius, aliis supersuadet Morbis Chronicis, in quibus vulgo, seu alijum ignorantie, Lien acculari solet.

ARTICULUS I.

De Lienis Intemperie.

Non levis quidem abusus circa Affectus Splenicus occurrit, dum Praesentia & Rationes in Hypochondria sinistra occurrentes, & nescio quae mala alia, subinde Spleni, licet insani, attribuantur; quod tamen falsum est, cum Splenis substantia ferè insensibilis incepta sit tali dolori. Interim non penitus recedendi sunt, sed ferè se produnt, imprimis Intemperie ejus per symptomata convulsiva, seu spasmos ratione contentus Nervorum, & hinc perturbationem Menstris. Praeterea se produnt ordinario dolore gravi orato, quasi concludente, (minimè omnium populiorio, quem apud nullum Splenicum observare potui) tensivo, ex ejus Inflammatione, aut gravativo ejus pondere, & subsequenter Spasmi.

CURA.

Lienis Intemperiem corrigere difficile est, nisi acidum ejus praeternaturale alteretur, resolvatur, & eliminetur.

Pro Suppo Evacuatoria:

℞. Mercurii dulcis.

Ext. Mellis. nigri. ana gr. xv.

Trech. Alb. gr. i. vel ii.

Cum Salut. Martis cum Smer. Fem. f. Pilulae.

Pro Suppo Alterativo usurpatur Martialis, vesperi & sub lectummodo lecti, volatilis plus minus aromatica.

Externè Lien impotatur Emplastum de Rani cum duplo Mercurii, vel solum, vel cum emplastro Splenetico ubrato, vel cum Gummi Ammonico: malaxetur cum Galbano Peracelli, vel Oleo destillato Succin; Vel

℞. Empl. de Nicot.

Ran. cum duplo Mercurii ana q. f.

Malax. cum f. q. Olei Tartari fundis, aliquoties super Cornu Cervi usum fricetis.

Applicetur sine indolore.

Haecena dicta Exemplis illustrabo: *studiosius quidam repetendo dolore Hypochondrii sinistri profundo corripiebatur, superveniente Lipothymia gravi cum Aphonia ferè, & Spasmi, motibus convulsivis, & doloribus lancinantibus in omnibus Artibus, praesertim Manibus. Malum radicatum erat ex Splene.*

Alteratur quidam conquireret de continuo dolore in Hypochondrio sinistro, quasi compressivo, levamen sentie egre: cum applicatione Emplastri de Nicotiana cum ana Tamaris (vel istis emplastris in Collig. Form. & M. Form. Class. 5. §. 5. praescriptis) sed corripitur hinc Haemorrhia gravi parvis sinistræ, urgente praeterea circa regionem temporum illius lateris dolore, turbante simul Caput in-

egrit. Remoto verb Emplastro, in isto latere evanescit Haemorrhia, redeunt Hypochondrii molestia. Totus Affectus erat ex Splene.

Mulus doleat Hypochondriaco sinistro profundo & quasi lacerante afflicto: sentiebat eandem dolores lancinantes & lacerantes, universum Abdomen torqueri, & totum Intestinoorum suum recurrentibus creberrimis doloribus affligi. Afflictus revera erat Splenicus; ob Fluxum Lienarum nervum, ex male habente Splene in Spasmos actum.

studiosus Nobilis in pueritia, diuturna Quartana, & hinc Hydrope affectus, tandem ab hoc, mediante copioso Urinae fluxu, curatus, redditus erat summè Splenicus, cum mentis perturbatione & melancholia. Nempè quater insignior Tempellatis, in specie vero aut autumnali tempore, immineret mutatio, toties sensum Palpitantis in imo fere profundo Hypochondrii sinistri prope Spicam Dorii ferè percipit, quam Dolor gr. avallatus & obscurus Lienis in isto loco comitatur: hinc Caput turbati, anxius ipsi reddi, &c. incipit, adeo, ut uno altero die, antequam contingeret, Tempellatis mutationem immineret, distis in locis & modis ipse perciperet, cum alias in dicta regione nullam pulsationem perciperet, animosus & bilis, optimè Animo & Corpore valens esset. Adeoque & hic Quartana confirmata Splenicum simul afficiens, & hujus mali affecti Praesens Splenicodica, quam HELMONTIUS urget, & hanc sequentia melancholia Parhamata, consideranda veniunt.

Ne quidam per aliquot dies nocteque laboraverat sequentibus Pathematibus: ante meridiem laetus & vegetus erat, hora vero prima praeterepropter à meridie dolorem citulum gravantem, vellicentem, quasi contudentem in Hypochondrii sinistri profundo percipiebat, ex quo loco brevi post insignes dolores lancinantes & conterentes universum Abdomen cum insigni hujus quasi tympanica Inflatione occupabant, unde misere affligebatur Aeger, dolores & cruciatus illi sursum versus ad Pectoris regionem etiam protendeantur, hinc subinde vomitus super veniebat, tunc lenis & motu volucario destratus, Rachia cum digitis tendebat, & ita cum distis Symptomatum usque ad ingruentem noctem torquebatur; nulla Febris aderat, nocte moderate dormiebat, mane commodè se habebat. In Paroxysmo à Vomitu levamen sentiebat, iniectionem fuerat Clystima, inde post ternam evacuationem in Panaxymia melius habuit. Vocatus ego disti, esse affectum convulsivum, & elique dolores Splenicodicos, natus ob Fluxum Lienarum nervum ex male habente Splene in Spasmos actum, unde per consensum quilibet reliquis symptomata nata: male habebat splen, ut suspicabar, ex causa vitio, &c. omnia ejus turbante.

Pro Cura ergo paulo ante meridiem dedi Liquori Martis Solaris gutt. xxx. Exteriori regioni splenis applicandum fuisse Emplastum de Nicotiana, ordinando simul Clystima, tempore, quo redit Panaxymia, incipientem. His administratis nullus Paroxysmus rediit. Altero mane dedi gr. ii. Tartari Emetici, & sequentibus diebus omni mane liquorem Martis Solaris continuandum fuisse, & sic penitus nullo amplius redeunte Paroxysmo, convalescit.

Vixit annorum 13. ex hereditaria materna Splenetica, & hinc moniali Melancholica, sub primo laevo Insultibus epilepticis corripiebatur, levioribus quidem, omni nocte tantum recurrentibus: praeterebam Tincturam Vitrioli Martis Zuvseri, ejus 56. ad 5i omni mane capiebam, hinc pro abstergendis primis viis praecipit:

℞. Tartari vitriolati. gr. xv.

Sacchar. sulphurati. gr. ii.

Trech. Alb. gr. i.

Miscetur pro Pulvere,

Hinc Vomitorium ex Symplo Emetico.

Sub vili horum sub ingressu lecti jussu capere Pulveris Epileptici antimonialis gr. iij. ad iij. idque omni vespera.

Quibus ita adhibitis, & sedato Paroxysmo, pro radice Morbi in splene evellenda praecipit:

℞. Lignis Mart. Solar. 3℔.

Capiebat 13. guttas omni mane.

Externè Emplastum de Rani cum Mercurio, malaxatum cum f. q. Olei destillati Tartari foecidi, applicabatur region splenis. Quibus continuatis non amplius rediit malum, idque ob tutius, quid aliquo temporis spatio interej. Quo Measles primi supervenerunt.

ARTICULUS II.

De Lienis Conformatione Lesa, & Inde
Natis Tumore, & Scirrbo.

&

ARTICULUS III.

De Fermenti Splenetici Lesione.

Quod attinet vitium ex Conformatione lesa, ut tumores, Scirrbus & similia, &c. Magnitudo & Color Lienis uti singulis Animalibus est proprius, ita & Homini etiam suo Magnitudo ejus multum variat, Color vero, qui in Fortu est ruber, in adulto semper deprehenditur obscurior & nigricans. In se & ratione sui usus ad Chronicos saltem affectus disponit. Iste & Affectionum Melancholicarum sedes ordinarij dicitur. Interim tamen, Authore SYLVIO alioque, in Melancholicis affectibus mortalis sepiusmodi salus & sanus Lien quoad sui structuram repertus fuit; ex quo tamen non statim concludi debet, plane insentem esse Lienem in talibus Morbis, cum quoad Fermentum visum specifice, aberrat fieri posse multivaria, ipsa structura materiali adhuc salva. Ut ergo Chronicorum affectuum, speciatim Hypochondriacorum, Scorbui, Quartanæ, Melancholicarum, &c. primum fontem stomachum exilimo; certum tamen est in dictis affectibus, in specie confirmatis, simul vitium Splenis subesse, à quo ipso hujusmodi affectus fere longè contumaciores, curatu difficiliores, & Aegris propter multiplicia vaga Symptomata molestiores esse solent, Ob id huiusmodi morbo, ut dictis in affectibus, in specie inventientis, semper simul ad spemque ratio habetur pro meliore Cura, & hujus vitia quæcumque maturè præveniuntur, aut simul curentur.

C U R A.

Lienis Inflammatio Art. 11. Cap. 1. Sect. præcedentis transcripta est.

Infarctus verò, Tumores, & Scirrbus leviores aut incipientes, emendant omnia dicta Aperientia, item Gummatia, uti superius Sect. 3. ubi de Morbis Chronicis in genere, egimus.

Quoad Fermenti Litis restauracionem hanc vitia, nisi talibus, quæ spirituum Animalum defectus restaurare valent, curare possimus; quæ sunt omnia Volatilia assumptum, de quibus infra l. 2. Sect. 1. cap. 1. plura, ubi de Spirituum Animalium vitio.

Convenient ergo pro Splene curando imprimis Martialia, & Sarmentia, acidum solum absorbentia, & ita per accidens in hunc Fermenti Splenetici occurrentia; hinc Alitalia volatilia, præ reliquis omnibus Tartarosa volatilia, imprimis spiritus Carminativus de Tribus, & similia Carminantia, præcipuis ubi adeit dolor tenuis; dolori verò gravatiro spiritus Salis Ammoniaci penetrans & aperiens, uti universis Corpori in Morbis Chronicis. Ita imprimis Spleni coferre; item aperitiva Martialia. Cum quibus simul Diuretica, imprimis Tartarus vitriolatus, Sal digestivum hypochondriacum, Tinctura Tartari, Liquor ferre solutæ Tartari, Sal Martis compositum, est ana Vitrioli Martis cum Terra soluta Tartari, sedulo jungenda, & crebrius repetenda erunt. Refert enim SCHENCKIUS lib. 3. Observ. de Lienis, quendam Lienis Tumore laborantem per 15. annos annatis his vel ter per Urinæ profusum infusa Atramenti convalescisse.

CAPUT II.

De Hepatis Læsiõibus.

Alterum est, cui occurrit Sanguis, est Hepar cum anexo Folliculo Felles, quæ invicem sibi inter texta & connexa conspiciunt circa Bili generacionem, separacionem & distributionem. Hepatis quod attinet Viscus, & Usum; hujus

Parenchyma ex Glandularum globulis copioso Sanguine suffusus & irrigatus compositum, eleganter demonstratum est à MALPIGHIO in *supra citatis Tractatu de Structura Viscerum*. Huic cum in Sanguificationis negotio dictæ fuissent Exequiæ, omnes statim Hepar Calentium esse Bili asseruerunt: id quod iam structura ejus glandulosa ulterius confirmat, quod Bili in Hepate secreta à Sanguine derivetur partim immediatè per ductus Choleochos in Intestinum, partim verò in Folliculo Felis præ collecta exinde etiam ad Intestinum per Ramum Cysticum abeat. Jam verò certum est eam Bilem, quæ per ductus Hepaticos, eternitur, ex Hepate oriri, in eoque secretari ex Sanguine, per Venam Portæ velis: id quod experimenta MALPIGII & FRACASATI confirmant, cum etiam Canibus Fel cum suo Folliculo excidendi possit, salvis Ductibus Choleochicis, & juxta adhuc Bili ad Intestinum moto per Ductus Hepaticos duraret: quæ ipsa contra Hypothesin SYLVII notanda sunt. HELMONTIUS dicit, Vultus Folliculi esse lethalia, sed non tam Folliculi, quam propter Hepatis copiosa Vasa, unde Sanguinis effusio maxima.

Ut autem certum sit, omnem Bilem, quæ ex Ductibus Hepaticis oritur, reverà elici ex Hepate; dubium tamen superest de Bili, quæ in Folliculo Felis continetur. Hanc non in Hepate, sed in ipso Folliculo ex Sanguine, per Arteriam propriam in eum transmissis, produci, vult SYLVIVS pag. 6. §. 53. & SCHWAMMERDAMMIUS de Respirat. lib. 3. c. 2. pag. 16. Unde Sanguis eo delatus per Perforacionem à Bile iam præseme in similem Bilem mutatur: ex quo etiam potius ingressus ex Folliculo in Hepar ex coïnfectis, quam contrarij quæ Folliculo injectum Atramentum denegret Hepatis Parenchyma, ut vult FRACASATUS. Huic verò Hypothesi obstant experimenta MALPIGII, qui ligatis Arteriis Hepaticis, & absclisipariter Folliculo Felico, nihilominus continuum Bili proventum ex Sanguine Venæ Portæ observat.

Hepatis officium veritatem simpliciter riven Bili elaboratione: secreta nempe in Hepatis Glandulis materia Sanguine, ibique certo modo alterata & mutata in Bilem, partim immediatè per Forum Choleochum Hepaticum ad Intestina derivatur, partim mediât in Vescicula præ collectam per Ductum hujus Cysticum ad Intestina perire ablegatur. Plura hoc pertinentia videb. in Colleg. Inferit. l. 1. cap. 13.

Quoad Læsiones Hepatis præternaturales: non sunt adeò frequentes, ut specialem considerationem mereantur: Vel I. Communes sunt reliquis partibus, quales sunt Conformationis vitia, ut obstruções, Tumores, Inflammationes, Abscessus, Scirrbi, &c. de quibus in superiores hujus loco dictum.

II. Lædunt Hepatis Functio, læso Spiritu læsto, &c. ut vocant, in Morbis Intemperatis, dum Intemperies excedit, vel occasione Acidæ vitiosi ad infusa Spinæ infusa Spiritum læscentis, vel dum deficit Intemperies occasione Spiritus deficientis, aut exhausti: Vel

III. Sunt Hepati proprii, & nunc lesam Bili generacionem consistunt, quando nempe Sanguine vitio læditur Functio Hepatis circa secretionem Bili; aut Poti ejus sunt vitiosi, quando nempe Hepar ineptum est, ut in eodem ut generetur aut tranfoletur materia Bili, unde Biliæ ut nimis falsa, aut nimis pinguis, aut nimis aquosa, aut inertis, aut plane non generatur, ita ut potius ipsius Bili præternaturalis vitia, quam Hepatis morbofa Pathemata, dici debent.

Bili autem vel deficiat, vel laetetur, ut plurimum sunt Morbos Chronicos, Cachecticos & Hydropicos, ut summatim: item vitis Bili ad Iterum suo etiam modo dependant; sicuti Bili degenerat à statu naturali Scorbuto, admodum fovere, & Malum gravius reddere solet: Sicuti etiam depravata & vitiosa acrimonia prædicta, indeque vitio cum acido effervescent, Phlogos vagas solet excere; de quibus videri possunt ea, quæ supra Sect. 17. C. 3. Art. 4. ubi de Bili egimus: Conf. utem SYLVIVS l. 1. p. c. 44. & seq. Valgò Morbi Chronicis, tantumnon omnes Febres intermittentes, Malum Hypochondriacum, & similes Morbi, Obstruções Hepatis, Lienis & Mesenterii adscribuntur, ex quibus Obstruções, tanquam Causis remotis, postmodum tales affectus contumaces oriuntur; quibus ipsis etiam postmodum per Medicamenta, Aperientia dicta, molari volunt. Verum tales scilicet Obstruções reverà sunt simpliciter affluunt ignorantia, cum à nullis nequam demonstrare sint, aut explicare, quomodo tales Morbi exinde oriuntur? Interim tamen non nego, subinde in his affectibus subesse Intumescencias Hepatis & Lienis, non

tar etiam deprehendi Scirrhus in his Visceribus: sed hi Tumores non sunt causa illiusque affectuum, sed potius ea illegitima cura illis affectibus supervenit, cum nempe ex vitia sanguinis Crassi, indeque deficienti Hematolico coacervari facit crudi, et cum sanguine circuli, hinc inde in Viscerum porulis flagrant, donec densius agglomerati Visceris Tumorem inferant, et tandem proprio Acido coagulati in Scirrhus indurentur: suntque tales Viscerum affectus producti potius morboſa, quam talium Morborum radices. Oriuntur potius illi affectus Chronici utplurimum ex vitio Dietæ, et depravata Digestione prima, seu Chyloli, qua Chylus vitiatius, utplurimum vitiosus acidus sanguini infusus, ejusdem Grafti naturalem pervertit, Fermentationem ejusdem depravat, Corporis Nutritionem inquinat, et reliquos Corporis facies, tam Lympham, in speciem Pancreatis, quam Bilem, vitiosis qualitatibus et fa-poribus tingit, unde et consequens vitiosa fœces alvum et rum & Chylis separatio, et Chyli in imprimis vitia ab illis fœces vitiatius inquinatio, contingit, unde eandem postmodum tot ac tanta symptomata oriuntur. Vitiolum illam succorum constitutionem per Salia edimendam Veteres Anaxoriam fœc conaristoteli Viscerum appellavit: intelligentes hoc ipso imprimis Hepar, et stomachum lætium: id quod Moderni potius per Facultates Salinas, & flari naturali de-moneantur, indeque depravatas succorum Grafti explicant.

Curantur autem Hepatis vigia vera, *Conformationis* quidem, per *adventitia supra dicta*.

Zaccaperis vitia curantur, corrigendo acidum vitiosum illud, ipiritum afficiens, & confortando Tonum Heparia per amara & moderatè styptica, ut sunt Rhabarbarum, albu-

Sanguis & Billa errans, defectus nempe & depravationes, & reliqui Morbi Chronici, Visceribus lætis dicati, præmissis Vomitoria nunc per Martialis, quæ Acidum vitiosum

permarum viarum, & alios Sporēs vitiosius abstergent, & præcipiant nunc per Remedia Salæ volatili oleo prædita, primario *amara Hepati* dicata, secundario *aromatica*, quæ pluri nunc minus arida, prout vitium Bili requirunt. Verillimum enim effi illud prædicum efflatum: ut *acida stomachica sunt amica*, ita *amara spiritus Hepatis balsama*; & ob id iustè barbarum *amara hepatica* etiam dici solet, non tam evacuas quam corrigens Bilem. Imò Cochlearia, Absinthium, Rosmarinus, Centaurium minus, Chelidonium majus, Marubium autem familia, vulgo *fringilla* aut *aperientia* appellata, & quæ *supra feli*. I. ubi de vitii separationis secum in Intestinis, item in Ictero laudata, in aëfibus, ubi subest vitia Bilis, adeoque in aëfibus Chronicis, sunt optima Bilem restaurantia: sicut etiam Aromaticia, ut Cardamomum, Cubebe, Galanga, Piperata, Crocus, &c. etiam acunt Bilem, etiamque volatilem & acriorem reddunt, nunc parando Nodulos, Vino infundendos, nunc decocta, nunc effusos aperitives, &c. quorum virtute salina imprimis de Alcali volatili participant, vitiosa Crassi malla sanguineæ, & inde vitiorum succorum, corriguntur, ut stomachi tonas, & fermentum emoldeat, & ita Teger restituitur. Quæ pertinent non iocunde Salis volatilis plus minus aromatica, spiritus Salis Ammoniaci oleosus, spiritus Tartari volatilis, spiritus Carminatives, spiritus Corvi Cervi, qui omnes habent Oleum secum: item fusa, ut Sal Digilivum hypochondriacum, Arcanum duplicatum, &c. Bilem etiam citiorè laxantem aimis pangunt, in specie acrem, indeque vitiosè effervesceat aëtem, corrigunt imprimis Acida, primario spiritus Natri dulcis, & spiritus Sulphuris per campanam. Tandem in fluxu quasi naturali conservant, aut vitiatam blandè corrigunt Puffule, & Puffalata, unde pulpa Puffalorum cum pulvere Rhubarbari imprægnata tam nobile Hepaticum dicitur, seu potius Bile corrigivum.

S E C T I O X X.

DE SERI SUPERFLUI SALIBUS RECREMENTOSIS
IMPRÆGNATI PER RENES EXCLUSIONE LÆSA.

Tertium Viscus, cui occurrat massa sanguinea, sunt
 Rentes, in quibus fecerunt *Lixivum volatile*, seu
Latem aequosum, Sale volatili Gallo oleo, seu
 composito ex Acido, & Urinofo, impregnatus.
 Sanguis enim ultior per Arterias Emulgentes distribui-
 tur ad Rentes, ex quibus per Venas Emulgentes redit,
 ut ibidem serum Salibus partim superfluis, partim re-
 crementosis, aliisque sanguinis impuritatibus, impregna-
 tum trancoleatur & separetur. Etenim Latex aequosus aliis
 serum commune, tam succorum nutritivum quam Excre-
 mentorum, vehiculum, cuius medio illi per universum
 distribuitur Corpus, hic vero in certis Colatoris separan-
 tes & amandantes: quod si fiat per Rentes, Urina appella-
 tur; si vero per Cutis poros, *fudoris* nomine venit: vid.
PISO de Catarr. ferosi, BARBATUS & SCHENCKIUS
 de *Jen. & sanguine*.

Est autem urina duplex, ut rectè distinguitur HEL-
MONTIO, *Urina potus*, et *urina sanguinis*. *Urina sangui-*
nis est Lixivium quoddam volatile, Aqua nempe falo falvo
volatili quâ ammoniacali imprægnatâ; alias Liaviva fimo
Salliafina. Sal hoc volatile gillum conflat in Acido, & Alca-
li, ambobus volatilibus, quæ tamen temperata sunt par-
tibus fulphureis vel oleosis fatis copiosis, ut hoc ipsum de-
monstrat Anatomie urinae Spagyrica, quæ pater, quod per
se det Phlegma, & remaneat Magna Flavum; cui vero ab-
sorbetur Acidum, & prodit spiritus urinosus: si Calce
viva abstrahatur, purissimum conflat Sal alcali, de quo
vid. HELMONTIO de *Liabivis* t. 3. WILLISTUSUS
de *urinis*, et quæ habet MOEBIUS in *notis*, quæ fedi-
tatem præcipit. Spiritus urinosus nempe potage
fulphureum, unde de colore spiritus fimo Anatomie
dicitur purus. *Urina potus*, est quæ mox falo labore
digniora præbet in primis viis fecerunt, et quæ fuprà, ubi de
Motu Chyli feli. 3. Hæc urina, ut patet, tamen et
ipfa est falia; quæ falido partem volatilis est, tum in ex-
tempore in falum mutatis, tum ex naturæ furore, & Bile

in falſum volatile abſeueſcit; partim verò, & quidem ma-
xima ea parte; hæc falſo eſſi hæc, ea Sale communi cum
alimentiſſimo, quod hoc modo immutatum ferè de-
nuò exſecritur, & poli urinez deſtillationem in Capite
mortuo reperitur, ex quo ſimiliter ſpiritus acidus tanquam
ex Sale communi deſtillari poteſt, vid. HELMONTIUS *de*
Lithiaſi p. 4. & *Colleg. Inferior.* p. 2. c. 14. Sed cum hæc urini
Potus nihil hic nobis necetici.

In omni urina sanguinis, à Medico observanda, tres Con-
ditiones probè sunt attendendæ, nempe

2. Urinae Color.
3. Ejusdem Consistens.
3. Ejusdem varia Contenta.

Omnes has proprietates habet *urina* ratione particularum in eisdem Latice aquoso dissolutorum, insit nemp̃e Liavii communis a Salibus imbutis diversimode affecti: Lixivium, quod plura habet *Salia*, eo magis rubescit; Nam *Salia* semper de Oleo adhuc aliquid habent. Quod si Contenta *Salia* oleosa purulis Latricis continetur, nisi probe unita, ut Radii luminosi aequaliter maxima ex parte transcant, fit *urina clarea*, seu perspicua: sed vero particulae contentae Liquoris purulis non nisi aquo unitae, ut impediatur Radiorum progressus, *urina fit turbida*. Quod si Radii luminosi transcentes ex parte quadam vi refringantur, & ita modificentur, *urina fit colorata*, pilis minus intensè, prout magis minime a Salibus contentis copiosioribus vel paucioribus talis radiorum refraçtio contingit. Quod si Contenta illa in vehiculo aquoso sint pauca, *urina quoad Consistentiam est tenuis*: Quod si eadem sint copiosa, *urina est crassa*.

Quoad *Chylus*; hæc vel Naturalia sunt, vel præternaturalia. Naturalia hæc Contenta sunt nulla; Equidem, ubi ritè sunt Digestiones, in specie prima, abique Contentis urina excerni solet: Quod si verò errore primæ Digestionis, imprimis propter errorem externum *læse*, non ritè digeratur totus *Chylus*, & ita consequenter in secunda Digestione non ritè totus assimilatur, pars hæc crudior à parte aquosa imbuta una cum urina excerni-

ARTICULUS II.

De Lienis Conformatione Lasa, & Inde
Natis Tumore, & Scirrbo.

&

ARTICULUS III.

De Fermenti Splenetici Lesione.

Quod attinet vitium ex Conformatione lasa, ut tumores, Scirrhos & similia, &c. Magnitudo & Color Lienis uti singulari Animalibus est proprius, ita & Homini etiam sano Magnitudo ejus multum variat, Color vero, qui in Foetu est ruber, in adulto semper deprehenditur obscurior & nigricans. In se & ratione sui usus ad Chronicos saltem affectus disponit Lien, inde & Affectuum dictorum Melancholicorum Sedes ordinariè dicitur. Interim tamen, Auctore SYLVIO aliisque, in Melancholicis affectibus mortuis fœssimè salvus & sanus Lien quoad sui structuram repertus fuit; ex quo tamen non statim concludi debet, planè insontem esse Lienem in talibus Morbis, cum quoad Fermentum ejusdem speciem, aberratio fieri possit multivaria, ipsa structura materiali adhuc salva. Ut ergo Chronicorum affectuum, speciatim Hypochondriacorum, Scorbti, Quartanae, Melancholicarum, &c. primum fontem stomachum existimo; certum tamen est in dictis affectibus, in specie confirmatis, simul vitium Splenis haberi, à quo ipso huiusmodi affectus sunt longè consummationes, curatu difficiliores, & Aegris propter multiplicia vaga Symptomata molestiores esse solent. Ob id studiosè monco, ut dictis in affectibus, in specie inveteratis, semper simul ad splenem ratio habeatur per meliorem Cura, & hujus vitia quaecunque maturè præcaveantur, aut simul curentur.

C U R A.

Lienis Inflammatio Art. 11. Cap. 1. Sect. præcedenti transacta est.

Infarctus verb, Tumores, & Scirrhus leviores aut incipientes, emendant omnia dicta Aperientia, item Gummata, uti superius Sect. 8. ubi de Morbis Chronicis in genere, egimus.

Quoad Fermenti Lienis refractionem: hanc vii, nisi talibus, quæ spirituum Animalium defectus restituere valent, curare possumus; quæ sunt omnia Volatilia assumpta, de quibus infra l. 2. Sect. 1. cap. 1. plura, ubi de Spirituum Animalium vitio.

Convoicant ergo pro Splene curando imprimis Martialis, & Saturnina, acidum nimium absorbentia, & ita per accidentis lesionem Fermenti Splenetici occurrentia; hinc Alcalia volatilia, præ reliquis omnibus Tartarea volatilia, imprimis spiritus Carminativus de Tribus, & similia Carminantia, præprimis ubi adeit dolor tensivus: dolori vero gravativo spiritus Salis Ammoniaci penetrans & aperiens, uti univervo Corpori in Morbis Chronicis, ita imprimis Spleni confert: item aperitiva Martialis. Cum quibus simul Diuretica, imprimis Tartarus vitriolatus, Sal digestivum hypochondriacum, Tindura Tartari, Liqueur Terræ solutæ Tartari, Sal Martis compositum, ex ana Viteroli Martis cum Terra solutæ Tartari, sedulo iungenda, & crebrius repetenda erunt. Refert enim SCHNËCKIUS III. 3. Observe de Liene, quendam Lienis Tumorem liberantem per 15. annos annatis bis vel ter per Urine profusionem inflat Atramenti convalescisse.

C A P U T II.

De Hepatis Lesionibus.

Asterum Viscer, cui occurrit Sanguis, est Hepar cum annexo Felle suo Fellico, quæ invicem sibi intertextæ & connexæ conspiciunt circa Bili generatorem, separatorem & distributionem. Hepatis quod attinet Viscer, & Usus; hujus

Parenchyma ex Glandularum globulis copioso Sanguine suffusis & irrigatis compositum, eleganter demonstratum est à MALPIGHIO in supra citatis Tractatu de Structura Viscerum. Huic cum in Sanguificationis negotio distat fuisset Exequitur, omnes statim Hepar Colossium esse Bilis afferre: id quod jam structura ejus glandulosa ulterius confirmat, quod Bilis in Hepate secreta à Sanguine derivetur partim immediate per ductus Choleodochos in Intestinum, partim vero in Felleculo Fellis prius collecta exinde etiam ad Intestinum per Ramum Cysticum abeat. Jam vero certum est eam Bilem, quæ per ductus Hepaticos, exoneritur, ex Hepate oriri, in coque fecerari ex Sanguine, per Venam Portæ vello; id quod experientia MALPIGHII & FRACASSATI confirmant, cum etiam Canibus Fel cum suo Felleculo existendi possit, Givis Duobus Choleodochis, & jugi adhuc Bilis ad Intestinum motu per Ductus Hepaticos durante: quæ ipsa contra Hypothesin SYLVII notanda sunt. HELMONTIUS dicit, Valvula Felleculi esse lethalia, sed non tam Felleculi, quam propter Hepatis copiosa Vasa, unde Sanguinis effusio maxima.

Autem certum fit, omnem Bilem, quæ ex Duobus Hepaticis oritur, reverà elici ex Hepate; dubium tamen supersit de Bile, quæ per Felleculum Fellis exoneratur. Hanc non in Hepate, sed in ipso Felleculo ex Sanguine, per Arteriam propriam in eum transmissi, produci, vult SYLVIIUS Diff. 6. §. 23. & SCHWAMMERDAMMIUS de Rebus. Sect. 3. c. 1. pag. 46. Unde Sanguis ex delatus per Fermentacionem à Bile iam præparat in Similem Bilem motetur: ex quo etiam potius ingressus ex Felleculo in Hepar ex eo immotescit, quam contrariò quæ Felleculo injectam Atramenti denigret Hepatis Parenchyma, ut vult FRACASSATI. Huic verò Hypothesi obstant experimentis MALPIGHII, qui ligata Arteria Hepatica, & abscisso prout Felleculo Fellico, nihilominus continuus Bilis proventus ex Sanguine Venæ Portæ observat.

Hepatis ergo officium vixit simpliciter circa Bile elaborationem: secreta nempe in Hepati Glandulis materia ex Sanguine, ibique certo modo alterata & mutata in Bilem, partim immediate per Porum Choleodochum Hepaticum ad Intestinum derivatur, partim mediât in Velleculam prius collectam per Ductum hujus Cysticum ad Intestinum prout allegatur. Plura hæc pertinentia videb. in Critic. Infrat. 2. l. cap. 13.

Quoad Lesiones Hepatis præternaturales: non sunt abò frequentes, ut specialem considerationem mereantur: Vel I. Communes sunt reliquis partibus, quales sunt Conformationis vitia, ut obstructions, Tumores, Inflammationes, Abscessus, Scirrbi, &c. de quibus in superioribus suo loco dictum.

II. Læditur Hepatis Functio, laeso Spiritu infuso, seu, ut vocant, in Morbo Intemperie, dum Intemperies excedit, vel occasione Actus vitiosi ad Inflar Spinæ infusæ Spiritum laesentis, vel dum deficit Intemperies occasione Spiritus deficientis, aut exhausti: Vel

III. Sunt Hepati proprii, & omnes ipsam Bilem generationem constituunt, quando nempe Sanguinis vitio læditur Functio Hepatis circa secretionem Bili; aut Porus ejus fuit vitiat, quando nempe Hepar ineptum est, ut in eodem aut generetur aut transcoleatur materia Bili, unde Bilis aut nimis salia, aut nimis pinguis, aut nimis aquosa, aut inertis, aut planè non generatur, ita ut potius ipsius Bili præternaturalis vitia, quam Hepatis morbofa Pathemata, dici debeant.

Bilis autem vel deficiat, vel inertis, vel plurimum foveat Morbos Chronicos, Cachecticos & Hydropicos, ut superius monuit: item vitia Bili ad Icterum suo etiam modo disponunt: sequi Bili degenerat facta à statum naturali Scorbti consummodum fovere, & Malignum gravius reddere solet: Sicuti eadem depravata & vitiosa acrimonia prædicta, indeque vitiosis cum acido effervescentis, Phlogosis vagas soles effere: de quibus videri possunt ea, quæ supra Sect. 17. C. 1. p. 2. c. 44. & Cap. V. Valgò Morbi Chronici, tantum non omnes Febres intermitteutes, Malignæ Hypochondriacæ, & similes Morbi, Obstructionibus Hepatis, Licois & Mesenterii adscribuntur, ex quibus Obstructionibus, tanquam Causa remotis, postmodum tales affectus consummes oriantur, quibus ipsi etiam postmodum per Medicamenta, Aperientia dicta, moderari volunt. Verùm tales vitia Obstructiones reverà sunt fœssimè affligi ignorantia, cum à nullis unquam demonstrantur sint, aut explicantur, quomodo tales Morbi exinde oriantur? Interim tamen non nego, subinde in his affectibus subsiste Intusmectentes Hepatis & Lienis, non

rare etiam deprehendi Scirrhus in his Visceribus: sed hi Tumores non sunt causâ illorum affeccionum, sed potius ex illegitima causa illis affeccionibus superveniunt, dum nempe ex vitia sanguinis Crâs, indeque deficiente Hæmatosi coarctati succi crudi, & cum sanguine circuli, hinc inde in Viscerum porulis flammant, donec densis agglomerati Visceris Tumorem inferant, & tandem proprio Acido coagulati in Scirrhus indurentur; suntque tales Viscerum affeccionum producta potius morbida, quam talium Morborum radices. Oriuntur potius hi affeccionum Chronici ut plurimum ex vitio Dietæ, & depravata Digestione prima, seu Chyloli, quæ Chylus vitiatu, ut plurimum vitiosè acidus sanguini infusus, ejusdem Crâsio naturalem pervertit, Fermentationem ejusdem depravat, Corporis Nutritionem inquinat, & reliquos Corporis succos, tam Lympham, in specie Pancreatit, quàm Bilem, vitiosis qualitatibus & saporem tingit, unde & consequens vitiosa secum alvinaurum à Chylis separatio, & Chyli in imprimis viis ab illis succis vitiosis inquinati, contingit, unde exinde postmodum tot æ tanta symptomata oriuntur. Vitiosam istam succorum constitutionem per Salia desinendum Veteres *Auspirationem* seu *contrarietatem Viscerum* appellabant; intelligentes hoc ipso imprimis Hepar, & Stomachum læsum: id quod Moderni potius per Facultates Salinas, à statu naturali degenerantes, indeque depravatas succorum Crâses explicant. Curantur autem Hepatis vitia vera, *Conformationis* quidem, per *aperientia* *suprà dicta*.

Interprimis vitia curantur, *corrigendo acidum* vitiosum illud, spiritum afficiens, & confortando Tonum Hepatis per *amara* & moderatè *septica*, ut sunt *Rhabarbarum, alisulchum, &c.*

Sanguinis & *Bilis erroris*, defectus nempe & depravationes, & reliqui Morbi Chronici, Visceribus læsis dicati, præmissis Vomitorio nunc per Martialia, quæ Acidum vitiosum

primarum viarum, & alios saporis vitiosos absorbent, & præcipitant nunc per Remedia Sale volatili oleo prædita, primario *amara* Hepati dicata, secundario *aromatica*, nunc plura nunc *arria*, prout vitium Bilis requisiverit. Veticillimum enim est illud prædicum effatum: *ut acida stomachi sunt amica, ita amara sunt Hepati balsama*; & ob id ita barbarum *anima hepatis* etiam dici solet, non tam evacuat quam corrigens Bilem. Imò Cochlearia, Albinum, Rosmarinus, Centaurium minus, Chelidonium majus, Marubium aut simili, vulgo *sebrifaga* seu *aperientia* appellata, & quæ *suprà sect. I.* obi de vitii separationis secum in Intestinis, item in Ictero laudata, in affeccionibus, ubi subsistit vitia Bilis, adeoque in affeccionibus Chronicis, sunt optima Bilem refluantia: sicuti etiam Aromaticia, ut Cardamomum, Cubebe, Galanga, Piperata, Crocus, &c. etiam acutum Bilem, eamque volatilem & acriorem reddunt, nunc parando Nodulos, Vino infundendo, nuac decocta, nunc essentias aperitivas, &c. quorum virtute salina imprimis de Alkali volatili participante, vitiosa Crâs massæ sanguineæ, & inde vitiosiorum succorum, corriguntur, ut Stomachi tamen, & fermentum emendetur, & ita *Eger* resiliatur. Quo pertinet non incommode Salia volatilia plura minus aromatica, spiritus Salis Ammoniaci oleosus, spiritus Tartari volatilis, spiritus Carminativus, spiritus Corvi Cervi, qui omnes habent Oleum secum: item fias, ut Sal Digestivum hypochondriacum, Arcanum duplicatum, &c. Bilem econtra luxuriantem nimis pinguem, in specie acrem, indeque vitiosè effervescente apam, corrigunt imprimis Acida, primario spiritus Nitri dulcis, & spiritus Sulphuris per campanam. Tandem in statu quasi naturali conservant, aut vitiatam blandè corrigunt Palsule, & Palsulata: unde pulpa Palsularum cum pulvere Rhabarbari imprægnata tam nobile Hepaticum dicitur, seu potius Bilis correctivum.

S E C T I O XX.

DE SERI SUPERFLUI SALIBUS RECREMENTOSIS IMPRÆGNATI PER RENES EXCLUSIONE LÆSA.

Terrium *Mens*, cui occurrat massa sanguinea, sunt *renes*, in quibus fecerunt *Lixivium volatile*, seu *Laxer aquosus*, Sale volatili salio oleo, seu composito ex Acido, & Urinato, imprægnatus. Sanguis enim ulterius per Arterias Emulgentes distribuitur ad Renes, ex quibus per Venas Emulgentes redit, ut ibidem serum Salibus partim superfluis, partim recrementosis, aliisque sanguinis impuritatibus, imprægnatum transeat & separetur. Est enim Latæ aquosus aliis serum commune, tam succorum nutritivorum quàm Ecrementorum, vehiculum, cuius modum illi per universam distributionem Corpus, hi verò in certis Calorificis separantur & amandantur: quod si fiat per Renes, Urina appellatur: si verò per Cutis poros, *sudoris* nomine venit: vid. *PISO de Celso, ferola*, *BARBATUS & SCHENCKIUS de fere & sanguine*.

Est autem *urina duplex*, ut rectè distinguitur ab HELMONTIO, *Urina potus*, & *urina sanguinis*. *Urina sanguinis* est Lixivium quoddam volatile, Aqua nempe sale lixa volatili quasi ammoniacali imprægnata; alias Lixivia sunt Salia fias. Sal hoc volatile salium constat ex Acido, & Alkali, ambobus volatilibus, quæ tamen temperata sunt partibus sulphureis seu oleosis satis copiosis, uti hoc ipsum demonstrat Anatome urinae Spagyrica, qua patet, quod per se det Phlegma, & remanet Magna flavum, cui verò, tam urinae quam Magnati, si additur Alkali, ab hoc absorbetur Acidum, & prodit spiritus urinosus: si à Calce viâ abstrahatur, purissimum colligitur Sal alkali, de quo vid. HELMONTIUS de *Lixiviis* c. 3. WILLISTIUS *rr. de urinis*, ex quo sua habet MOERLIUS in *lystis*, quæ fideliter exscripti. Spiritus urinae semper habet contagium sulphureum, unde se colorat; spiritus salis Ammoniaci autem est purus. *Urina potus* est, quæ mox sub labore Digestionis primæ in primis viis feceratur, de qua *suprà, ubi de Men Chylis* *sect. 13.* Hæc urina, utne pallida, tamen & ipsa est salia: quæ salido partim volatili est, tum ex asfampis in salum mutatis, tum ex pancreatis succo, & Bile

in salum volatile abeunibus; partim verò, & quidem maxima ex parte; hæc salido est fias, ex Sale communi cum alimentis assumpto, quod hoc modo immutatum ferè denud exacerntur, & post urinae distillationem in Capite mortuo reperitur, ex quo similiter spiritus acidus tanquam ex Sale communi destillari potest, vid. HELMONTIUS de *Lixiviis* c. 3. 1. & *Colleg. Instruct.* p. 1. 1. 14. Sed cum hæc urinae Porus nobil hic nobis negotii.

In omni urina sanguinis, à Medico observanda, tres *Conditiones* probè sunt attendende, nempe

1. Urinae Color.
2. Ejusdem Consistentia.
3. Ejusdem varia Contenta.

Omnes hæc proprietates habet urina ratione particulærum in ejusdem Latice aquo distillaturam, insar nempe Lixivium commune à Salibus imbutis diversis modè affecti: Lixivium, quod plura habet Salia, eo magis rubeat; Nam Salia semper de Oleo adhuc aliquid habent. Quod si Contenta salia oleosa porulis Laticea continens sint probè unita, ut Radii luminosi aequaliter maxima ex parte transeant, sit urina *clara*, seu perspicua: in verò partem contentæ Liquoris porulis non sint æquè unite, ut impediantur Radii, non progressus, urina fit *turbida*: Quod si Radii luminosi transeant ex parte quadam sui refringantur, & ita modificentur, urina fit *colorata*, plura minus intense, prout magis minusve à Salibus contentis copiosis ribus vel parioribus talia radiorum refraçtio contingit. Quod si Contenta isti in vehiculo aquo sint pauca, urina quod *Consistentiam* est tenuis: Quod si eadem sint copiosa, urina est *crassa*.

Quod *Contenta*; hæc vel Naturalia sunt, vel præternaturalia. *Naturalia* hæc Contenta sunt nulla siquidem, ubi ritè sunt Digestiones, in specie prima, absque Contentis urina exacernt tolet: Quod si verò errore primæ Digestionis, imprimis propria errorum externum læsæ, non ritè digeratur totus Chylus, & ita consequenter in secunda Digestione non ritè totus assimilatur, pars hæc crudior à parte aquosa imbibita una cum urina exacerntur

tar, & *sedimentum sanerum* consistit. *Præternaturalia* vero contenta sunt recrementa salino-sulphurea, alique vitio Chylorum, & Hæmatosus succellivè in massa sanguinea congesta, quæ ubi ad saturitatem ferè sanguinem impleverint, per fermentationis moram separata, & inflat Fæcum præcipitata, à Latice aquoso limbibus cum Urina juna excernuntur.

Prout ergo sic habent Chyli, & sanguinis digestionem, ita etiam habent in suis attributis urinae. Hinc si Salia reliquæque urinae consistentes partes, per Fermentationem bene subactæ, & à Latice aquoso ritè imbibitæ fuerint, urina est clara; si vero hæc non ritè inter se sint mixta, urina fit turbida. Quod si verò fermentatio sanguinis vitietur, & partes ejus salinæ depravatz salte, nec inter se, nec cum reliquis ritè uniantur, nec subigantur, id quod ordinariò fit ex Urina, tum inter se, tum cum aliis partibus intermixtis, proportionè, & æmetria læsa, ex Chylo præcipitè, & primæ digestionis vitio orta, urina fuit *æque, & turbida*, donec fermentando fit mutus subigant sanguinem consistentes partes salinæ, & heterogeneas, nec ritè miscibiles portiones, extrudent, & quasi præcipitent: quo facto, æquabilis sanguinis redit fermentatio, ac tales urinae copiosum *sedimentum* seponendo separatæ facies succellivè deponunt, adeoque ad naturalem Colorem, & Consistentiam denudè redeunt; prout etiam ipsa Salia Lixivium hoc consistentia copiosius hinc Liqueorem impreguant, & in specie, prout magis vel minus cum particulis pinguibus, ac oleosis unita ac subacta fuerint, eò plus vel minus instilla apparebant. Speculari in Morbis, *Cælimis & Cræstis* materiz, ut vocant, morbosæ signa æstimanda sunt. Nam urina, quæ excernitur tenuis aut pallida, aut intencè tincta, sed clara, *Græda* dicitur, in qua nempe nulla Salium heterogeneorum am factè est separatio in sanguine; contra urinae crassæ turbidæ, copiosum *sedimentum* deponentes, aut multiplicibus contentis saturatz, *Cælimis* signa exhibent, seu recrementa vitiosa & salia heterogenea copiose ex sanguine extradi, & inflat Fæcum præcipitari ostendunt: Conferatur hic SYLVIVS *l. i. prax. c. 55. Nihilum* in urina, in morbis tam Chronicis quam Acutis, est signum redeuntis in stomacho fermenti, & recuperatz plus minus digelitionis: & omnis turbida urina lateus plus minus Acidum continet: Vid. *suprà* *sect. 15. cap. 1. ubi de febribus, in genere*.

Sanguis ergo ad renes per Arterias Emulgentes delatus patitur ibidem *feri salinis turbis separationem*, hujusque simul certam *Alterationem*, ita, ut materialiter quidem urina in sanguine existat, sed non formaliter. Testantur hoc acribitas, & proprietates urinae singulares in colore, Odore, sapore, &c. distinctæ admodum à Latice sanguinis ferè, & in nullo alio Corporis succo reperiuntur; adeoque *Medium separationis*, seu ferè totius Urinae mechanicum sunt renes, quorum structuram mechanicam Translocationis specialis accommodatissimam eleganter docet B. E. L. L. NUS *tract. de urinâ, & struclura renum*. & MALPIGHIVS *in scrutinis. Viscerum*, quod nempe per Fibras, quas obtinent fistulosas, certo modo conservatas, renum Parenchyma maximam partem consistens, tanquam per minutissima Filtra & spongiosas angustias traiciatur serum pro urinae materia. *Medium vero Alterationis*, ut uberius dimittat serum, & à quo simul serum determinat pro urina proprietatem acquirit, eà *fermentum* quoddam peculiare, Renibus insitum, naturæ salinæ volatilis urinalis, ac effectu & proprietatibus hercoreum, & Loti putrefactivum dictum HELMONTIO, de quo vid. *tract. de Libribus, imp. cap. 4.* (in renibus codis Odo facilius urinalis deprehenditur à reliqua fermento urinario.)

Quod Translocationem ergo mechanicam, sanguinis ad renes per Arterias Emulgentes delatus ad Membranam usque extremam tendit, ubi Fibræ occurrunt tenues & perforatz, quas seu Filteram subintrat liquidior ac fluidior sanguinis pars seu serum, parte sanguinis effluore à Venis Emulgentibus absorpta, & deorsu Venæ Cavæ infusa. Serum iam Fibras illas seu Canaliculos intrans ad Corpus usque Papillare tortuosum promovetur, per cuius porosulos traducitur in expansione interius Membranam, Pelvim dictam, ex qua tandem per continuatam ureteris ductum in Vescicam delatatur.

Quod verò attinet *alterationem fermentativam*, quam patitur urinae substantia inde ipsa per renes transitu, fit eadem beneficio fermenti renum salini acidi, de natura, ut probabilissimum videtur, lixiviali seu alcalina, à quo & sanguinis fuso, & ita copiosior feri separatio promovetur, simul ipsa

urinae materia peculiarem odorem, & quodammodo saporem acquirit, taleque simul consistentiam, ut promptè ac facilius per renes transcolari possit: vid. de hoc imprimis WILLISIVS *Deur. Rationali p. 1. pag. 128. 129. & sequ. de Diurisi*, &c. HELMONTIVS *de Libribus cap. 4. §. 30.* TACHENIVS *in Clavis Medicinæ Hippocr. cap. 5. §. 30.* Quæ enim olim gressiva est urinae per Translocationem in renibus facta secretio, imò insufficiens, imò minus subtilis videtur, nisi lixiviale accedat fermentum.

Urinae per ureteres filantes excipit *Vesica*, ob id *Urinaria* dicta, quæ moderate plena nil sentit incommodi; qui verò urina fit nimis copiosa, nimis & dolorifica ejus fit dissensio; vel si sit nimis acris, Vesicæ fit vellitatio, ut in stranguria, tunc excretionem urget; hinc urina ceu liquidum ipone effluit, adjuvantibus Fibris circuli musculi-
lois Membranz Vesicæ secundæ, quorum contractione angustata Vesica Urina expellitur. In subsidium etiam veniunt Musculi abdominis recti, & horum appendices pyramidales, qui se contrahendo succentem Vesicam ita premunt, & ita Urinam usque expellunt.

C A P U T I.

De Læsa Urina in Renibus secretionem.

His præmissis, *Læditur hæc urina secretio in renibus quatuor modis*:

1. Quando nulla fit, & est *abolita*.
2. Quando eadem est *imminuta*, & non sufficiens præ necessitate naturali.
3. Quando est *Nimis* seu *Anxia*, ita, ut continuis & excessivus adsit urinae Fluxus, ejus extremus Gradus vocatur *Diabetes*.
4. Quando eadem est *depravata*, ut quando v.g. alio, quam ferè debet, modo, urina excreta conspicitur; quod accidit, quando aberrat Natura à naturali modo, vel colore, vel consistenzia, vel contentis, vel alii proprietatibus, dum excretaur cruenta, purulenta, nimis pinguis, & similes: de quibus WILLISIVS *de Urina*, item SYLVIVS *in praxi*.

Urinam dixi Læsam, constans duobus partibus, aquosa nempe, & Salibus superfluis salis oleosis, seu compositis ex Acido volatili, & ex urinali seu alcali volatili, imprægnata. Hi duo saporis in urinis omnium inveniuntur, & mutua unione Sal volatile silium constituunt. Et quidem hæc de *urina sanguinis* imprimis intelligenda; nam de *urina potus* hic nihil nobis negotii. Jam verò in *istis urinae secretionibus strucluræ hæc præ constitutens urinam* probè attendenda, & nunc hæc, nunc ipsa consideranda, cum juxta veramque consistentem partem ladi possit ejus *secretio*. *Attendum enim v.g. ladietur secretio juxta Latium aquosum*, qui nimis copiosus, paucis contentis salinis saturatus, & tunc urina urplurimum est pallida & tenuis, alio nomine *Græda* dicta, qualis urina excreta solet in scirrhis Hepatis, & Lienis in Morbis Chronicis, uti etiam in principio Februm. *Extera interdum contenta salina sunt nimis copiosa*, vel propter defectum Latice aquosi casuunt pro Jædum, aut absumpti per sudores &c. vel propter copiam Salium vitiosorum in massa sanguinea cum urina excrendendorum, ut fit in Hypochondriacis, in scorbuticis, & similibus, ubi urinae ruritæ, & rutilantes copiosissimis contentis sunt imprægnatæ. Hæc in *genera* de læsa secretionem urinae. Jam in specie

A R T I C U L U S I. E T I I.

De Urina secretionem imminuta, & abolita.

Imminuta urina secretio est, quando minus ejus transcolatur, quam decet, ratione nempe proportionis ad serum in massa sanguinis: quando enim parum inest feri, ut in his, qui parum potant, aut copiosioribus sudoribus dissuunt, aut serum albi colligitur, ut in alcite, in his casibus urina pauca emissa non potest dici præternaturaliter imminuta, quia in his serum non nimis abundat, sed proportionaliter feri

fecit in Sanguine residua Urina respondet. Tunc ergo est imminente urina fecunda, quando tam parca emittitur, ut debita proportio non respondeat assumptioni, & inde collecta Sero in Massa Sanguinea, sicuti ablati vocari debet, quando nihil excretur, id quod alias dicitur *Ischuria seu urina suppressa* (differunt saltem gradu & proin ubique eadem applicari poterunt.) Hic desectus Urine in genere consideratur, fit vel vicio Renum urinam non excrecentiam, vel vicio Ischuriae Urinam non excrecentiam. Multi cum AETIO Terr. 3. ter. 3. c. 11. Ischuriam habere pro affectu Vesicae proprio, quandoque scilicet urinam hac ipsa colligit, nec reddit: quo sensu GORRAEUS in *Urina Med. pag. 199.* aperit docet, Ischuriam propriè dici Urinam in Vesica retentionem. Communiter autem eius significatio ampliatur, ut illam quoque Urinæ compressionem comprehendat, qua vicio Renum contingit, vacua omnino Vesica.

Ischuria ergo communiter triplex duplex: *Vera*, seu quæ fit Vesica plena existente; & *Artificia*, seu ubi hac urina vacua est, quædam bulus nihil à Renuis adducitur: Quarum hanc *urina secretione*, illam eisdem *Ischuriam latam*, pronunciare licet. Distinguntur ambe, & uterque parthenata, de quibus hæcenus, nulla Tentio, nullum Debet ac urinam stimulis, simileve quid circa Vesicæ regionem, & in Hypogastrio observetur, nec Cathetere immittit Urina proficit, dum contra la hac *Æger*, quando sensus & bona intacta, de Tensione ac Dolore molestissimo dictæ regionis, immixtum insigni & frustaneo conatu conqueratur, imò hæc ad tactum timida cum molestia quoque Insigni deprehendatur. Hoc loco silem Ischuria vicio Renum non secretionem consideranda est, cuius leviores Causæ immittuntur & desectus urinae secretionem efficiunt. De Ischuria vero vicio Vesicæ in *supra. Cap. agitur.*

MEMBRUM I

De Ischuria Renali, seu Urinae secretionem abolita.

CAUSÆ.

Causa proxima, propter quam non secretant renes urina, est vel in ipsa Sanguine in eo, ut ab hoc separatur materia urinae, vel, idque usurpationem, in ipsa Renuis redditus ineptia ad urinae secretionem. In ipsa Sanguine frequenter vitium hæret, vel in qualitate, vel etiam certo modo in quantitate. In qualitate, quando massa sanguinea tota, ejusque serum seu Latex aquosus, adeoque omnes ejus partes, ex laesa *crasi* ita sunt disposita, ac firmiter inter se se connecta & contexta, seu, ut loquitur WILLISIUS *Phar. Rat. Part. 2. pag. 166.* quando Sanguinis compages ita est serrata (F), ut amplexibus his arthoribus se extricare, & Serum per angustos Renum poros & tubulos commodè transire, & in iis ex reliquo sanguine legitime urina fecerari nequeat. Vitium hoc nunc à Lymphæ austertate seu Acute præternaturali, nunc Visciditate, oriri videtur: vid. PLATERUS l. 1. & SYLVIVS *Tract. de Cach. §. 19. & 195. & l. 1. Præf. c. 55. §. 1. & 9.* Observari hoc solet sæpius in Febrium statu Cruditatis, imprimis in Morbis Chronicis, Cachymia, Cachexia, &c. ad Hydropem inclinantibus, Leucoplegmatia, Hydropem, Affectibus Hypochondriacis, Se orbis confirmato, &c. vicio aut Scierth Hepatis aut Lienis conjunctis: in talibus enim *pusca* urina neplurimum *est serrata*, ejusque simul crudæ, seu paucis contentis in Latice aquoso saturatæ, aut tales *Ægri* alias sint copiosi salivatores, alioque affectus à Seri abundantia patiantur. (Pedes tumidos). Verum post Medicamentis appropriatis, imprimis Salina, vitium Sanguinis Crasie alterantia, & Scierth Viscerum resuscitantia, ubi autem gaucha & cruda sunt excreta urina, evanet, ut urina succellivè copiosa & diversimodè affecta, crassa, turbida, interdum nigra excreatur. Fieri hoc videtur ex eo, quod ex laesa Viscerum circa sanguinis perfectionem functione & vitata

Tom. II.

Sanguinis Crasie, talis hujus mixtura fiat & compositio, ut nihil aut parum per angustos poros Renum fibrosos fecerari aut separari possit; unde postmodum alterata per remedia Salina, maxime Alcalina, ista sanguinea massa, & renovata ejusdem miscela, tunc heterogeneæ particule ab aliis separatæ & præcipitatæ à Latice aquoso uberius imbibantur, & ita figuratæ redduntur, ut facillimè Renum meatibus ingredi, & ita sub forma Urinae copiosæ, turbidæ, crassæ, &c. excreari possint. Imò hoc referri poterit RIVIERUS *Crit. 1. Obs. 1. & 39.* ubi quidem Ischuriam Causam Valsæ Emulgentibus tribuit, quæ hæc ob Plethoram nimis dilatas se contrahere nequeverint: Item fortia M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 112. & Ann. 4. Obs. 159.* Cujus tamen Symptomatis Aetiologiam WILLISIUS *Pharm. Ration. p. 1. Sect. 4. cap. 3.* tam per propriam, quam LOWERI Experimentum ab humorum fibrillose combinatione deducit. Præter dicta, urinae secretio immittitur, si Serum Sanguinis alterum ablegatur, & à viis urinariis averatur, v. g. in Cataractis, sudore nimio, Diarrhoia, Hydropem, &c. quibus præteritis urina parior, remota verbò uberior, secretur atque excreatur.

In quantitate Sanguis peccat, quando in propter nimiam abundantiam, aut propter ejus crassitiam, aut quæmque aliam rationem, legitime licet circulator, parum tamen aut nil in Renuis ex se dimittit, simul vero ac fecatur *Urina Brachii*, & quæ quantum ita immittitur, secretus urinae fibrillosi (G): quæ Exemplum addimus quodam curiosum habet TULPIUS *Hist. 2. Obs. 1. c. 43.* ubi quidem Ecclesiæ singulis Piculitulis Urinae Suppressionem affligebatur, quæ non excrebatur, nisi vel declinaret Luna, vel per Venæ sectionem in Brachio; quoties enim Vena Brachii secabatur, toties Urina liberè mitteretur. In Anatome postmodum defuncti reperi fuit Pelvis Renis sinistri additum dilata, ut ferè Vesicæ vicem & magnitudinem expleverit. Ratio ex qua factum fuit, ut secta Vena fluere urina, vid. apud TULPIUM, qui egregium habet de hoc casu Discursum.

Rare autem sunt hæc Secretiones urinae immittit, quæ sunt ex vicio Sanguinis: frequentiores sunt Ischuriae, quæ vicio Renum sunt, quarum triplex ferè subest Causa.

- (1.) Quando Renum Caruncula, id est *Arteria Fibrosorum renalis* *Pori & Canales*, sunt additum angustii, obstruuntur, aut infartii, ita, ut per illos nihil Seri possit transudare. Vel
- (2.) Hi ipsi inepti sunt redditii, quod minus fecerari possit urina, idque vel ob *Tonum carum resolutum*, ut in *anosis*; ita ut sit *Paralyticus*, siue sit nimis *quæ firmus*, ut in *spasmus* carum contractione vel Convulsione. Vel
- (3.) Denique vicio *ipsum Perment* renalis urina supprimitur, quando illud deficiens, aut inept, aut alteratur, & pids minique corruptum, non sufficit negotio, ut subsine in affectibus Cachecticis, Hydropicis, aut ad Hydropem inclinantibus, quibuscum Hypochondriacis, alioque Chronicis Affectibus, &c. manifestum est, in quibus deficiente renalis Fermenti acrimoniam urinalem volatitem potissimum Causam existimus.

I. Quædam ergo *Primum viciu*: inter ea, quæ obstruunt Canales fibrosos Renum, sunt (1.) interdum Sanguis gramus, vel ex Casu ab alto circa Renes collectus, vel ex aliis partibus, in quibus sanguis gramus hæret, per sanguinis circulum ad Renes derivatus, & ibi collectus, id quod Causæ antecedentes confirmant; sicut & ex sanguine in Pectore extravasato, & sic scilicet resolutus, fit Midius eructans. (2.) Est etiam *Par vel ex Ulcere Renum*, vel ex aliis partibus abscissi laborantibus, cum sanguine ad Renes derivatum, quo ipso fæcit urina supprimitur; id quod patet ex Antecedentibus, vel Renum vel aliarum partium Vomitus aut Suppurationibus suspicari licet; sicut etiam Peripneumonice supputatæ per Urinae fluxum purulentum feliciter solvantur. Circa Pus ejusmodi notandum, hec aliam interdum Urinae Suppressionem intelligere: vid. SANCHEZ in *suis Obs. p. 374.* de omnimoda Urinae Suppressionem hec alii, post ejus Corporis sectionem Renes exulcerati & purulenti reperi sunt. (3.) Obstruunt Renes Humores pituitosi, crassi & viscosi, vicio Digestionis primæ,

D d d d

tam

(F) *Pec* hac serrata, pro stricta & compacta, non solum à Willisi phrasi, sed ab ipsa Latine lingua proprietate proprius abhorret: scilicet potius Italianum Barbarissimum, Willisi Pharm. Rat. P. 1. Sect. 4. cap. 1. hac loquendi formula feri semper videtur: Sanguinis massa stricta nimis & compacta, Serum aliaque contenta excreta non facillè dimittit, &c. Serum Sanguini importunius adheret, ejusque amplexibus se extricare nequit &c.

(G) *Urina* ex abundante Sanguine surrumpente Arteria & Vena Renum, ischuriam Tubulis educti Urina dicitur emittitur, atque adeo hujus Secretionem, vel in Pelvem descendit impedire. Quæ sit, ut depleti Sanguinis missione Papis, repleti Tubuli non amplius comprimeantur, & Secretioni Urinae non erit opus surgatur.

nam cum urina potus ad Renes delati, quam etiam cum sanguine ad eodem distributi, qui obstruunt Renum porulos, eosque obturantes, ineptos reddunt pro urinae secretionem (H): Tale Exemplum est, quod recenset AMATUS LUSITANUS *Cras. 6. Cap. 12.* de puto contumacia Ictheria laborante, ubi nimiam crassitatem et visciditatem Lactis Nutricis. Assumpserat pro Ientaculo Vir quidam de cetero sanus Calem, quem vocant Hollandicum, ad sitietatem, Cerevisiam tenuem ac diureticam superbibendo: Elapsis aliquot horis Urina eitra illum Velicæ Renumque dolorem supprimebat, ut ne guttulum quidem excrevere ad tertium usque diem poterit. Innotescit hoc vitium, quando talium humorum presentia in Corpore observatur, qui nempe Ictheria et primas vias obident, aut quando urina alias effluit solida, exsternitur turbida ac crassa, cum sedimento copioso mucilaginoso, postmodum tale Contentum in Urina deficit præteritus simul gravitate in Lumbis. (4) Frequentissima causa est *Calculus* Renes obident, et eorum Mensus ac Tubulos obstruunt, Renes irritant, et ad inflammationem disponunt, indeque frequentiter Urinam suppremit: quale exemplum habet LOTICHIUS in *Obs. lib. 4. fol. 376.* ubi refert omnimodam urinam per 12 dies suppressionem, eamque lethalem, in qua Rex denter ex Ulcere omnimode absumptus, finisset verò copiosissimis Calculis fuit relictus: Sic BARTHOLINUS *Cent. 4. Epil. pag. 91.* observat Urinæ suppressionem ex Calculo Renum lethalem uodecim diebus, &c. quorum admodum frequentium omnium prædictorum observationes sunt plene. Plura infra. (5) Hicce annoveranda sunt emperimenta, nempe Tumores, v. g. Nephritis, & (6) Constrictura, v. g. Frigus externum, si Lumborum regio præprimis æstibus magis ipsi exponatur.

II. *Quoad secundam Renum Viam* confertur ad Ictheriam, dixi esse *Tumorem plurimum minus vitium*: Notum est, quod Renes consent copiosis Fibris & Tubulis excavatis quasi, per quas fit Urinæ transitus. Hinc præter Obstructiones & infarctus imprimis Totius Fibrarum Renalium observandus est, siue laxus sit in Atonia, siue nimis stritus in Spasmo. Quando ergo Fibre renales laborant Atonia, seu quasi resolutæ sunt, sunt flaccidæ & connivunt, unde supervenit suppressio Urinæ: Nempe hæc Atonia est illud vitium, quod vulgo vocatur *Imbecillitas Renum* ex Facultate Secretorie aut Attrahente læsa natam. Jam verò, cum omnes ille partes argant per strucham partium mechanicam, inquantum hæc facultates illis, qui attrahere possunt, et dicamus, consistere hæc reverts in Atonia Renum, id est tali Nervorum renalium & Canaliculorum debilitate laxitate seu flacciditate, ut defectu imprimis spirituum animalium non sustentantur in debita Tensione, quin potius de Nervi & ipsi Canaliculi fibrosi postmodum quasi resoluti & flaccidi concidunt, indeque Orificia connivent, ita, ut propterea parum vel nihil de Sero Sanguinis transierant, ac ea sanguine fecerit possit. Exemplum liquidem aliud illustret videat. in BARTHOLINO *Centur. 4.*

Epil. 18. 38. & 39. qui ex Paralyti Scorbutica omnium partium Corporis inferiorum, seu infra diaphragma talem relaxationem & Ictheriam refert. Perinetur hoc observatio HORCHSTEDTERI in *Obs. Detad. 5. cap. 10.* ubi Ictheria longior ex externa Renum Refrigeratione in Marmore Nive frigidatæ, unde postmodum Epilepsia & Mors, & *Detad. 6. Cap. 1.* ab abusu Narcoticorum. Quibus insuper accedunt alii Renum Morbi, e. g. Erolio, Scirrhos, (1) Ulcus, Vulus, &c. quod pertinet Morbi Acuti Febres Ardentes, Variolæ, &c. tandem Ictheriam consensum habentes: unde Ictheriam tandem abique omni dolore, supervenientem alii Morbis Acutis, cum Signum singulare Ictherie ob extindam Facultatem Attrahentem, seu Atoniam Renum, habet HORSTIUS l. 4. *Obs. 45.* vid. etiam SCHENCKIUS l. 4. *Obs. p. 462. & segm.* ubi aliquot talia sunt Exempli Ictheriarum lethaliu viam Renum, non potentium transcolare Serum, uti ulla adfuerit Obstructio, sed quia potius molles & resoluti apparuerunt. Perinetur hæc Suppressiones illæ Urinæ, quæ ob *Dors Venarum Laxitatem, aut Ictum, aut Lapsum, aut Vulus Splenis Medullæ* accidunt, ac in genere quævis alia Ictheria, vitio Nervorum plius minus resolutorum eveniens, utpote quæ ipsa non minus à Paralyti aut Laxitate Fibrarum renalium ac Vesicæ interdum contingere, non impossibile est. Huic Atoniæ contrarium interdum observatur vitium, nempe *Strictura Renum, & nimia Fibrarum perferarum & glandularum renalium angustia*, quæ spatio quodam contradiam, qualem nonnunquam in Colica Reni pot videntur, & qualis fit interdum in Adhæsis Calculis, dum uno Rene læso à Calculo, grumifera sanguinis irritato, alter ab omni Obstructione salvis, subinde cessat agere; quod fit ex crispatura & stridura Fibrarum, quatenus nimis Renis Fibris convulsis, & ita ex nimia stridura & crispatura Poris clausis, clauduntur etiam alterius poris, ob ramificationes nec voss communicationem, & ita Ictheria inducitur: vid. F. ORESTUS l. 24. *Obs. 26.* in *Schol. item BARTHOLINUS Cent. 4. Med. Hæst. Vol. 4. p. 103.*

III. Tertia denique Causa erat ex parte *Fermentum parum* plus minus deficiens, nec satis acre, aut alio modo vitiatum ac depravatam, unde etiam deficit plus minus transmissio, ut *supra* innuimus: si nempe deficit Fermentum in sua Acrimonia salina volatili urinosâ, lib cubus defectu cessat operatio Secretionis Urinæ, quam tale Fermentum promovere solet; sicut hoc ipsum in Hydropicis patet, in quibus ex defectu aut alteratione Fermenti Renalis adhæ Ictheria. Plura videbitis in WILLISII *Pharm. Rerum. pag. 165.*

Hujus etiam loci sunt, quæ Urinæ secretæ defluationem ad Vesicam turbant, *Urterum nempe angustia* Urinam non transmittens horumque *Vulnura* atque *Ulcera*, Urinam ad cavitatem Abdominis deponentia; quæ quidem rariora sunt: vid. PLATERUS *Præf. Tom. 3. c. 3.* Angustia hæc oritur vel obstruentibus, e. g. Calculo, vid. SALMUTH *Cent. 2. Obs. 32.* & TULPIUS l. 2. *Obs. 45.* (K) Sanguinis Gra-

(H) Hanc puto Causam fuisse Ictheria Renalis, quæ charissimum fratrem jam septuagenarium hoc anno 1721, iterum ac tertio, mensis feri spatio, afflicti, tandem extraxit, cuiusque Obitus adhuc luctu. Prædictus (post quamprimum in Villam-tione errata) coësum crudum Urinam profluvium, quæ quaque insolentem, & al Sapa naturam accedentem, colorem exhibere: hunc subsistere per quatuor dies: fluxumque passit, sed aqua & percolata: post biduum iterum suppressa, & quatuor frata die denud appere coepit, ex quo sicut quantitate excrebatur, donec penitus subsistens, insensum tandem die, post immensam respirandi difficultatem, & ægrem al mortem perducere. Copiosa enim Urina potus, plurima & crassa mucilaginosa fuerat, ad Renes delata, quæ admodum primam Spurium Diachem, & variam Urinæ apparatus producere, sic denum Renum canaliculis obstruere inseparabiliter Ictheriam excitavit.

(I) Cadaver Eminentiissimi Vincentii Card. Grimani in hoc Regno Præpositi, anno 1710. Renalis Ictheria demorata, exhibuit utroque Renem scirrhus duritie a duo mabilem, ne anatomici cultui vim fieri claudere illarum superficies inæqualis erat, & orosæ tuberosa, ac quamprimum Hydras parvula Urina repleta, irredivisus maculis imperforis, exhibebat. Pelvis eorum parvula item Urina quantitate repleta, Renum Pingula formosissimi illarum adhaerentibus subsistens. In Vesica parva Urina guttula coësum, argue in ejus colli levis inflammatio: serialis ex frequenti, sed non necessaria Catheteris immisso. Quoties igitur Urina fecerit perierat, Glandula, imm & Tubuli, Renum in scirrhus naturam successimus?

(K) Ictheria, quæ præmaturis nimis duri diebus spatio nobis ablati Excellentissimum Matuloneum Ducem, dum Vienna innotuit anno 1717, iter Neapolim redire pararet, fuit anatomicæ dissectionis patris Clariss. Viri Plo Nicolao Garelji S. C. & C. M. C. C. Med. Gabrieli Longobardo ejusdem Maj. Med. & Consil. Francisko Cestaro Excellentiissimi Defuncti Ducis Medico, aliisque Facultatis Medicæ Viennensis Professores & Chirurgi error habuit à duplici Calculo, quorum unus dextrum uretrem, digitis à Pelvi diffinita, alter sinistram uretrem, diffinita duorum digitorum à Rete ejusdem lateris, exaltissimè obstruere, ut ne guttula quidem urinis i Renibus in Vesicam descendere poterit: urina autem alio uramque Pelvem sua copia defluerat, ut vel levis scita à ferro in Rene incisio, maxime cum ingente resiliit. Dextri Renis Pelvis, Ovis Gallinæ magnitudinem exsuperans, tres alios continebat Calculos, quorum duo minores, tertius pondus gran. 350. acutiori sua parte in ureteris Orificium vergebat. Antequam urina supprimeretur, quatuor alios Calculi diversæ magnitudinis, Nephritis distinctis variis infestationibus, & semel quaque observata urina cruenta, Nobilissimus Ager excreverat. Notum dignum est, Ictheria hujus præfatum Angnam septima die supervisse: non infrequens hujus Morbi Symptoma.

mo, vid. SALMUTH l. a. Mucro viscido, vid. BAUHNIUS *Theatr. Anat.* l. 1. a. 32. FORESTIUS l. 24. Obs. 15. & SULZMANNUS *Obs. Anat.* pag. 62. l. a. Nervorum robur Affectibus spasmodicis, e. g. in nephritide soda, vid. DRAWITZIUS *de febre* tit. 9. aut colica convulsiva, vid. WILLIUS *de Anat. brat.* l. 2. a. 15.

Hæc sunt causæ, propter quas fit Ischuria renum vitio. Sequitur

DIAGNOSIS.

Hæc Ischuria, quæ fit vitio Renum, caute consideranda est, ne confundatur cum Ischuria vitio vesicæ urinariæ obveniente, ideoque Causæ antecedentes & symptomata probè penitenda sunt.

Signa Urinam esse suppressam vitio Renum, sunt ea, quando nulla Urina adeit in Vesicæ, adeo ut immisso licet cathetero, seu intrusione cuspide canaliculi argenteæ, & facta etiam assidue, exploratio instituitur, nihil tamen excreatur Urinæ. Accedit, quod nullus visus Tumor circa regionem Pubis, nulla Graviditas Perineæ, aliæque similia symptomata Vesicæ, Urinam alias suppremitur, adiunt.

Quod si accedant signa renum calculosorum res est clarior, utrum tunc esse ex calculis renes obstituentibus obstruendum Urinæ.

Quod si extra calculi suspitionem gravitas circa Lumbos, variæque symptomata corporis ex sero regressu & retro pulsione contingant, res est clarior.

Superveniant autem suppressioni Urinæ symptomata varia, prout nempe feri utriusque in renibus plus minus alterati metastasis ac translocatio in partes solidas varia, vel sanguinis aliorumque contentorum alteratio & immutatio plus minus gravior facta fuerit. Symptomata ista sunt Angustia & Anxietas præcordiorum, sudor suædus, urinosus, item Halitus fetidus, Torpor sensuum & omnium Facultatum internarum animalium, non raro Epileptica æsthesia, interdum acies, & postea Tumores ostentati, Vermis, aliæque similia symptomata adiunt. Sudor fetidus lætendum plus interdum minus urinosus est; qui nrosus sudor præsupponit iam alterationem quandam à Fermento remota factam, ita ut Urinæ per pelvim transdus sit interclusus, & nihilominus pergere non poterit.

Quod si vitium sit ex obstruptione Renum causæ antecedentes impetum eam ostendunt. Si enim adhuc crassi & viscidus humor obstruente, apparet ex similibus vitii, nempe quæ monstrant crassos humores, e. g. nempe latellæ & primæ viæ obducæ; item quando Urina ante excreta fuerit turbida & crassa cum sedimento copioso & mucilaginoso, superveniant Urinæ suppressio cum gravitate Lumborum, signum est Renum à tali materia obstruendum. Si vero sanguinis granales obstruant Renes, monstrant illud imprimis Antecedentes causæ, vel casus ab alto, vel si Urina cruenta ante emissâ fuerit, & Ischuria superveniat, aut Egitatio, aut fortis circa renes percussio, aut similia Signa & causæ, etiam causâ obstruente clara est.

Per denique infarcire renes, colligitur ex abscissis aut Ulcere renum alias conficiis; item quando est Empyema aut vomica ex viscere nobiliore, ubi per sanguinem circum eum defertur pus: vel quando alias observata fuit paralytica cum Urina excreta, atonia renum, affectus paralytici, vel universales, vel plures minus particulares Nervorum laesiones ipsarum verò Dolores circa regionem renum ut plurimum excreant.

Fermentum vitium patet, si aliiis causis fere absentibus reni debito ac consueto odore & sapore urina excreantur: unde ex collatione ac syndrome symptomatum iudicandum est de Ischuria renum & Vesicæ.

Calculi signa suo loco habebimus.

PROGNOSIS.

Prognosis quod concernit: est vel generaliter & omnibus Ischuriæ speciebus communis, vel specialior, seu ad certos casus restricta.

In genere grave ac periculosum Malum est urinae suppressio, & quidem hæc, quæ Renum fit vitio, periculosior est, quæ fit vitio Vesicæ: vid. M. A. N. C. Ann. 4. obs. 159. pag. 302.

Item Urinæ suppressio, quæ fit vitio renum, si sine dolore, magis periculosa est, quam quæ est cum dolore tenso, cuius phænomeni rationem ANTONIUS SANTORELLUS de sensu nature lib. 23. a. 15. reddit.

Quod si symptomata supra dicta adiunt, utpote æsthesis & anxietates præcordiorum, &c. ne introductum quidem feri

in renem parenchyma, indicium erit, adeoque sæpè lethalis est Ischuria.

Et quidem quibus Urina suppressa est Renum vitio, si deus non Agat septimum ante diem morbo incipit, servari possunt si minus, ut plurimum intereunt: quæ communis prædictionem est sententia: quod tamen non semper contingit sed fere ut plurimum ad 10. aut 12. diem Iuppitini potest, antequam mors superveniat.

Licet tamen post septimum diem urina denud profuere incipiat, copiosa etiam & varia: tamen partim ob intestinam Febrè nullam sanguinem, partim ob vitium partibus solidis affridum, postmodum intereunt: vid. TULPIUS l. 4. Obs. 29. & RODERICUS A FONSECA T. 2. cap. 87. Adeoque rarum est, quod Ischuria 11. diem curata fuerit: vid. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 30. pag. 51. Ann. 4. Obs. 159. item Ann. 6. Obs. 112. pag. 149. Ann. 9. Obs. 78. pag. 209. de Ischuria 10. diem curata vid. Ann. 3. Obs. 39.

Interim tamen quidam dicitur, quod minus diu Urinæ suppressæ supervivere possunt; testantur enim Observationes, Urinam per plures dies suppressam ex vitio Renum, tamen curatam esse. Sic RIVERTUS c. 4. Obs. 45. & TULPIUS l. 4. Obs. 26. observat Ischuriam 11. diem: item HORSTIUS l. 4. Obs. 45. quatuordecim diem Ischuriam ex Calculo Renum, & nihilominus tamen tandem curatam: FORESTUS l. 26. decessit ad 12. diem, ac CORNARIUS Obs. 21. Urinam etiam 14. diem suppressam observat: Ischuriam 22. diem propter Tumorem liti Abscissum in Collo Vesicæ non lethalem, vid. in M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 176.

Perè tamen inter 14. dies ingulnaret Agri, raro ad 20. vivunt: Et quidem si cum Urina ita suppressa aut suda copiosius, aut fœtior crebrior, aut uberior Seri per alium locum effusus concurrat, diutius supervivere possunt Agri, & minus periculosum est malum. Sic FONSECA l. 1. Cap. 87. ad 17. dies noscitur, ac per multos menses; item lib. 2. Cap. 96. refert Monialium Patavium, quæ supervixit; licet per 6. menses Urina fuerit suppressa, quæ tolerat quotidie circa Ventræ & Umbilicum. Exemplum notata dignum telerit PISO de morbo ac fœra Colliculi fœli. c. 4. Cap. 6. pag. 95. Ischuria in Monali 19. diem, sed tamen conjuncta cum sudore perpetuo, adeo ut postmodum etiam curata fuerit: sic observata fuit desperata Ischuria vitio Renum, in qua per umbilicum copiosius sudor fuit effusus, vid. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 108. p. 394. Ipsemet aliam quando observavi Ischuriam vitium renum 17. diem in Muliere, quæ in decima septima die ex usu Emulsionis feminalis Violarum solvabatur, sed cum gravibus Insultibus epilepticis, sine tamen interitu Agri, quæ tamen post aliquot septimanis recidivans lethalis erat; alii contra citius & ante septimum diem ex Ischuria renali perirent; e. g. inter triginta horas, vid. HOECHSTEDIERUS Dec. 6. Caf. 1. Aliis utipiam prognosin suggerit FORESTUS, nempe suppressio urinae, ad decimum vel undecimum diem durans, periculum mortem solet inferre, ac rara proin Exemplis in contrarium prostantia non denegant hæc Essè veritatem.

Insuper urinae suppressio, quæ est à Calculis renum majoribus, si vel dissolvitur, vel emittitur nequeat, ut plurimum est lethalis, quia vix potest curari.

De cætero, si à resolutione seu atonia renum evenierit Ischuria, semper fere observata fuit lethalis, adeoque ab HORSTIO, SCHENCKIO, & similibus Authoribus, Receptio totius urinae in morbo, sine doloris sensu, instantis Mortis signum esse asseritur.

Denique suppressio urinae, cui singularis supervenit, & ubi odor Urina in Agri ore ac fœtus percipitur: item à spinali Medulla ingenerat læta, incurabilis ac lethalis est. De hac HIPPOCRATES lib. 2. Prædict. Medulla spina si quis laboraverit ex lapsu, seu alia de causa, homo & Cruribus impotens sit, ut neque, si tangatur, percipiat, & Ventræ ac Viscæ, ut primis temporibus neque ferreus neque arum excernat, nisi castis immutetur: Mors, non argente humilis, feriat & urina prodeunt, moritur postea non multo interposito tempore.

CURA.

Quod Curam ut suppressa urina revocet, removenda est imprimis suppressio causa renes obducens: adeoque quod causæ proximæ, vel corrigendum sanguinis vitium, vel Renum præternaturalis diffusio. Nempe impedimenta in his removenda, Tones debitus conservandus, Fermentum rationale accendendum.

Quod attinet sanguinis vitium, hæc succurrimus vel in Ple-

Plethorici per leuem *Diuresin*, prout Observationes superius ex RIVERO Cant. 1. Obs. 1. & 19. item ex TULPIO lib. 2. Obs. 43. allegatae, confirmant: vel cum utplurimum occurrant in morbis chronicis, & lictoria tunc fit prodiuturnum morbum, per dyctericis sanguinis correctionem, pro affectus primarii varietate, *Alterantibus* alique *appropriatis*. Methodo in morbis chronicis consistit, de qua vid. *supra* sect. 17. Cap. 3. Art. 2. de Cachectia, eadem curabitur. Hinc diureticorum quosaelevis erit habendus, ita ut nunc acida, nunc urisalia, nunc nitrosa, nunc terrea, nunc sulphurea, propinentur.

Quod verò attinet *Renum dispositionem pernaturalalem* removendam, haec imitari debet pariter per huius varietate: subinde necesse est ad saepe fructuosum, praemittere levem alium dispositionem per assumpta *Laxativa* in forma pulveris, quae primas vias laxat, ac blandi evacuant, eum saepe observatum fit, Alvo urisalia simul in fluxum concitari Urinam; e.g. Tartarus vitriolatus, terram foliatam tartari, &c. (quae sunt blanda diuretica simul) cum blanda stimulo acuta; uti de vi laxativorum ad urinam fluxum promovendum vid. HARETTE in *Praxi* cap. de *suppressione urinae*, ubi Viro, Ulcere renum laboranti, cum superveniente per biduum urinae suppressione, praescripsit hunc Haustum:

2j. Symp. de cichor. cum rhubarb.

Refar. solut.

de Cnic. seu de carthab. ana ʒi.

Lapill. cancr. præp. ʒi.

Aqua Crem. q. l. Miste.

Vulgatissima haec est mistura, & tamen blande Alvim & euposiam urinam provocat.

Hic interius adduntur *Clystera Terebinthina* iniecia, cum Oleo terebinthinae aut succini parata, de quibus in *Cura calidis Renum agitur*, utpote cum his ipsis saepe praerogatur uberior urinae secretio. In specie, si alit vitium renum obstruendum, quod fit à sanguinis Gravis, curanda venit per sanguinem granulorum retinenda, *Diuretica* quae inter in specie *Rubia Tinctorum* quae radix, & inde paratum *Craep*, *Sperma Ceti*, succinum, & succinata quolibet, quae à multis singulariter commendatur in retentione Urinae. Omnis enim vis diuretica à sal volatile succini cum HELMONTIO derivanda, sive malum fit à crassis humoribus, sine sanguine conglutatum, sive Pire, lapilli cancrorum cum aceto assumpti, & alia simplicia *Pulsaria* selecta, Charesolum, Agrimonis, Hederæ terrestris, quae per se sunt diuretica, ac fensculum; item hypericon, eius flores & semen, & similia plus minus diuretica, quae *superius* sect. 18. Cap. 2. de *sanguinis conglutamento* habui, conducunt. Hypericon item potenter urinam movet: unde etiam limeret, cum fit vulneraria, in putulentis & sanguinis gravis convenit, iungendum simul externè regioni renum & lumborum oleum Scorpionum, Oleum Ceræ, item petroleum, & similia. Sin vero Obstruendum renum fit à pore, Terebinthina, simplicia vulneraria, in specie *Malum sulphuris* terebinthatus aut juniperinus, succus aut syrupus de hederæ terrestris, *Elentia* & extrahum Agrimonis, hyperici, &c. prolunt. Quod si pituita tenax & glutinosa renum meatum ac tubulos obstruxerit, *præmissis laxantibus*, Creditatis pituitosa per alvim evacuantibus, (quod probe observandum est, ne intempellivo incidentium diureticorum usu copiosior eruditatum pituitosorum ad renes fiat delatio, sicque malum potius augeatur, quam imminuat) convenient hanc *dispositionem*, pro varietate scilicet casualium, diuretica blanda, imprimis raphanacea quolibet, Allekengi, succus limonum, vel solus, vel cum vino, succus parietariae cum oymelite, in specie *salina*, ut tartarus vitriolatus, tinctorum tartari, sal volatile succini, *Spiritus urinae*, *Salisae volatilis*, spiritus urinae, sine sal eius volatile, item sal volatile ammoniacale, & similia generis remedia, hinc Mixture SYLVII in *Praxi* lib. 2. cap. 5. §. 62. sunt proferenda. Radix raphani, in specie eius succus, item Armo-racae. Radix in vino infusa & pota, ubi vel arena, vel sabulum, vel mucus viscidus obstruere renum tubulos, in specie conducunt, & renam promovere. *Succus limonum* & *Citri* admodum egregius est in hoc casu, egregie incidens & dissolvens mucum viscidum in renibus, si ad unum vel alium, utque ad iv. in aqua appropriata assumatur, multum laudatur ab AMATO LUSITANO *Crem. 5. Obs. 71.* sicut & HELIDAEUS PADUANUS succum limonum cum Oymelite propinat, ubi renes à turbidibus viscidis, quas removel, obstruunt: in quo casu etiam spiritus salis dulcis non est incongruus in decocto diuretico, v. g. radices

petroselinii in Lure electis rubel, praesertim *Spiritus vinici Philophilus*; unde apozema SYLVII lib. 1. *Prax. cap. 59. §. 61.* non inconveniens erit. CNOEFELIUS *cap. 3. M.A.N.C. obs. 208.* extollit spiritum salis ammoniaci acidum per le præparatum in omnibus obstruendis exitum Valorum, tanquam praesertissimum remedium, imprimis in hoc casu: in quo casu ex *pygalibus* conveniunt Fructus allekengi, qui sunt egregium diureticum, radix rubiae Tinctorum, quae est admodum efficax. Herba parietariae, ejusque succus recens expressus cum oymelite assumptus, Experimentum est HELIDAEI PADUANI. Sed necesse est, sit parietaria non tamen quilibet, sed ea, quae in rudibus parietum antiquiorum cretici: ratio, quia hae sub nutrimento secum sal nitrosum in parietibus ratione calis vix latens attrahit, ratione cuius salis nitrosi hae parietariae ad infusum est diureticum, quancunque ratione data imprimis succus eius expressus, & cum saccharo in syrupum redactus, ut eam propterea quodammodo in suppellectilium urinae, ac immixta hydropicorum, cum singulare lecretum habeat. Quod fit à *Calculo* fit renum obstruendum, conveniunt hinc multae pellentia *Diuretica*, vel eundem *Dispositio*, utut rara, &c. methodo inferius loco explicanda. Abrotani Comm. pulverizata ad ʒi. cum tancillo nati ias commendantur, quibus ob Calculum urinae supprimitur: vid. SIMON PAULI in *Quadrif. Retan.*

Quod si siccitia oritur vitio Renum in *Renum* in *Renum* in *Renum*, tunc la *Aturia Nervina Aromaticis*, imprimis terebinthina, Baccæ juniperi & juniperina, nobilia sunt, unde & malatiacum juniperinum, quod est egregium remedium, praesertim commendandum, item Spiritus Baccarum Juniperi & Oleum distillatum, cum Juniperina ratione virtutis aromaticae sint servanda: item decoctum & infusum diureticum in *Calig. Term.* stimulant Urinam. Cinnabarina & succinata, specificè conducunt. Primitum obinet sal volatile succini excellentissimum diureticum quod HELMONTIO merito audit *Aqua remedium Diureticum*, si a gr. vi. vel xi. in aqua appropriata usurpetur.

Sin vero ex *centralibus salinis* librum renalem vitium oritur, curanda est per *Clystia*, item Cinnabarum imprimis cinnabarinum antimonium cum sale volatili succini: Quo forsitan quoque facit quod DECKERUS in *Prax. m. f.* *Medicamentum* cum decoctione quadam diuretica datam misceat Urinam provocare. Huc spectat vitium in pul-nem redactum, à nemine haecules, nisi à GESNERO lib. 3. Obs. 4. §. 6. commendatum.

Quod si *fermentum renale* hebetatur, aut interius plus minus factum fuerit, hocque in causa fit, tunc semper conveniunt propter hoc dicta *Diuretica*, nunc acida salina urisalia, tam volatilia quam fixa, dictum fermentum renale acutentia, & acrimonia sua quasi stimulantia, & lecretorum promovere: nunc simul oleosa temperata: v. g. conducunt Radix raphani, tam orbicularis quam armoracae, succus raphanorum, & quancunque ex raphano præparata remedia: item radix armoracae vino infusa & pota, quae multum valent lo stimulantia urinae. Quibus merito addenda Capita *Alia & Cope*, sal volatile spiritus urinae per fermentationem, spiritus salis ammoniaci, spiritus Lumbicorum per putrefactionem, infusum cantharidum, sal fixa salis ex simplicibus diureticis, ac tandem terebinthas, Juniperus, lemo violarum. In specie quod attinet Caput *Alia*, hoc sale volatili aeri insignitur sunt turgida, quae quae singulariter fermentum renum acutunt, & minuitur coacta cum Vino assumpta, vel cum Aqua Vitae juniperina propinata, egregie possunt urinam. Hic juncti debet *Semen Erysimi*, quod Germ. dicitur *Wilder frass*, salinum, & acre gustu, ad ʒi. in forma pulveris assumptum in Vino albo, quibusdam singulare ad retentionem urinae est Experimentum. Vid. FONSECA lib. 2. *conf. 10. & lib. 2. conf. 96.* De parietaria *supra* dictum. Flores tunicæ, & in specie *Cynni*, *Calyptropis*, praesertim juncti, in Urino cocti, vel Conservae forma spiritus salis acidulati & propinati, blandè urinam cient. sunt remedium Agricolae usitatum. Ulceris *Folia Riber nigra*, urinae odorem spirantia, egregie urinam pellunt: item hederæ arbores, ejusque Baccæ sunt usitatae: Glomi Cyposibati, & eorum pulvis, & ejus paratus spiritus Hartmanni, sunt fati decantati. Herbae Ononidis & hederæ terrestris sunt fati usitatae. Denique *Succus Passinae laur.*, seu *Silicis alutiae Machabae* perquam egregie urinam promovere, etiam aliis rebus irritis, in specie puerorum succum supprellis miro effectu hic succus stimulat, *Salis volatilis*, spiritus & sal tartari, item Tinctorum nephretica diuretica *Ammoniaci* clystifloris, parata ex antimonio, Nitro, Tartaro & illislibus solariis (sunt

Silices certi, Germ. *fohen rath* invenendi, quos putant im-
pregnatos occulto Auri semine) invicem nullis, spiritus
etiam Carnivorus, quae omnia spiritus volatilis Tartari
maximam partem participant, optima sunt Diuretica, Urinae
pellicula; idque inprimis in locis, ubi copiosius Vinum
hauserit: Imprimis spiritus Tartari, si eoque volatili-
tate Arte, ut fiat spiritus Salis Ammoniaci, habetur
potentissimum Diureticum, in specie Calcareum præfer-
vatum. In specie inter alia Diuretica eminet *Sal volatile*
Sucri, quod nobile est, & HELMONTIO commodè
Diureticorum Apex vocatur, loco ejus tamen Oleum de-
stillatum est egregium, imprimis in Sanguine grumoso ra-
tione ejus Salis acris commodè adhiberi potest. Pertinet
huc *Joselle*, in specie *Lumbrici*, *Storachi Lucanici*, *Cucur-
bitella*, *Alelli*, ac imprimis *Cantharides*. Hæc Infusa Sale vo-
latili acris subtilissimo perquam diuretice infingunt polient,
adeoque perquam in Ictericis conveniunt: ex Lumbricis
nempe terrestribus spiritus per fermentationem seu putre-
dinem paratus & rectè rectificatus, vel recentis Vini contri-
ti & expressi, egregie profunt. *Pulsio Alsterum*, aut hi ipsi
Vino infusi & expressi & potati, multum conveniunt ad
proliciendum Urinam. *Cantharides*, multis videntur suspec-
tæ, quia non tantum interne pinguat, sed etiam extrin-
sic applicatæ, imò etiam in manu detentæ, ac in bursa gestatæ,
Vescicæ & vias urinarias evulserant, ut misio cruenta
subsequatur. Vid. LANGIUS Tom. 1. Ep. 47. SOLENNAN-
DER Conf. Med. 3. p. 13. SMETIUS Olf. Mif. p. 44. &
SCHENCKIUS lib. 7. Olf. Med. p. 873. Nihilominus ta-
men non semper contingit, teste SENNERIO Tract. de
Dysur. cap. 2. p. 14. sed Vini ritè infusæ & macerata ita
concurrunt, ut potentissimum Diureticum subministrant,
si Vinum filtratur, & aliquot Cochlearia propinquantur, ob-
servatis obsequendis cautelis. Modum salutarum infunden-
di videlicet in BARTHOLINO Conf. 5. Mif. Anat. 83.
Urum verò eorum felicem in Cyn. 4. Epif. 21. pag. 93. Epif.
33. pag. 143. Epif. 56. pag. 346. Epif. 65. p. 400. WILLI-
SIO Pharm. Ratior. pag. 154. quibus jungatur M. A. N. G.
Ann. t. Olf. 133. pag. 296. ZACUTUS LUSITANUS
Præ. Adm. lib. 1. Olf. 31. WELSCHIIUS Schol. in Olf. 19.
RUMLERI. Quod si præter speciem miducrentem suspec-
tentur, tunc huic conveniunt potest liberior Lactis haustus,
Sale Tartari imprægnatus. Quidam *Magistrum ex Canthar-
idibus* cum spiritus Nutri præparant, quod cum Oleo Tar-
tari precipitatur; sed vis diuretica potius perverritur, vid.
LUDOVICI Pharm. binc potius laudatur *Essentia Diureti-
ca ex Cantharidibus* per Tincturam Tartari parata, de qua
vid. WILLISII Pharm. Rat. 2. p. 157. Loco horum
spiritus Lumbricorum, vel ipsi Lumbrici v. vel ut
Alelli bene loci, iusteo inclusi, contriti, Vini infusi, ex-
pressi & potati, promptè Urinam efficiunt, de quorum effi-
cacia vid. HILDANUS Conf. 6. Olf. 30.

Huic Animalibus ascribimus addendum quoque vñ illud
quidem, sed optimum remedium, *Fimus* utcumque *Equinus*,
observavit enim FORESTUS, Urinam ad quatuordecim
dies coactæ in rustico suppreffam, aliis iteris, Fimo
Equino curatam, infundendo hujus *Uii*, in Vino Rheno-
um, exprimentis & exhibendo, & ecce! Urinæ largior secutus
est fluxus, ratione Salis ammoniacalis, quo est imprægna-
tum. De *Hircis* res nota est, quod sicut Cervas totum est ale-
ospharmacis, ita Hircus est diureticus; unde Urina Hirci
calida pota, Omento & Intestinis hircinis ad Venæm ap-
plicatis, in desperatis casibus admodum laudatur. Juxta
hæc, *Salix* sive *urinae acris* & *salis diuretica*, aut his similia,
aut cognata *Crocus* sive *terrea*, animalium partes duræ,
penæ cæteris *Marine*, conveniunt: v. g. Lapides Cancrorum,
qui egregium temperatissimum in se habent Sal Alkali, Vi-
no aut Aceto infusi, & ita simul potati, pro Urina elicien-
da nobilissimi sunt: nam cum acido sunt egregie Diuretica,
in specie ubi Sanguinis Grumi adsunt, in quo casu cum De-
cocto Cherezolli, vel Rubie Tincturam, vel Hyperici,
ceu Valsæriorum, exhibentur. De *Gieribus*, rubris,
eorumque Decocto diuretico, res est nota. Post Lapides
Cancrorum sunt Testæ Ovorum, in specie eæ, ex quibus
jam exclusi sunt Pulvi, quæ vel crudæ, vel calcinatæ, quod
melius, ut quibusdam placet, ad *Uii* assumptæ, omnia re-
liqua superare dicuntur à BARBETTE; calcinatæ sunt
inchar cupuldam Calcis vivæ, quæ per se, vel Vini infusæ
assumptæ poterit Urinam pellunt. Potentioris tamen ad-
hoc efficaciam sunt Testæ Ovorum struthionum, quæ vel
crudæ assumptæ, vel in spiritus Salis dissolutæ, ita Lim-
nem egregie diureticum constituunt. In Operculis Cochlea-
rum, quæ sponte sua Vere novo erumpentes remouent, sin-
gularem prædicant virtutem diureticam, & insular Arcani

fummi in Urinæ suppreffione & Calculo commendant non-
nulli, si Pulvis ejus cum tantillo spiritus Salis misius, sive
per se part. ii. cum parte una Lapidum Cancrorum, pro-
pietur: Vid. M. A. N. G. Ann. 9. Olf. 79. Pertinent hæc Sa-
lia fixa cineritia ex Plantis Diureticis & Nephriticis debent
calcinari prolata, ita nempe, ut non perfectè alcalifien-
tur, sed potius salia penæ maneat: Nam omnia Veneraria
& omnia Diuretica in se habent Sal siliam, & etiam illud
in Cineribus reliquant. Verùm si nimis calcinetur, abeant
in Sal Alkali, de quibus TACHENIUS in *Alipor. Chym.*
unde etiam Tartarus vitriolatus potentiss est diureticum,
quàm ipsum Sal Tartari silius; adeoque *Sal Fimi columbini*,
Siquem Fæherum, *Sal Gossila* ritè secundum TACH-
ENIUM paratum, *Sal Prunella*, &c. Urinas egregie ciunt.
Sali Fimi columbini non cedit ipse *Fimus columbinus* nitro-
sus, Vini infusus, solutus, expressus & propinquant; blan-
da enim Vini aciditas concurrens cum Alkali stercoris dat
tertium Saliuum, alias vis effert diureticum. Huc sciunt
Tartarea remedia, ut Spiritus Tartari volatilis, & Sal
ejus volatile, quæ in Ictericis ex Vini potu orta multa præ-
stant: Sal Tartari, Tartarus Virioliatus, Tinctura Tar-
tari, omniaque Tartarea, Cremor Tartari cum Sale Tartari
junctus, Tartarus tartarizatus, de Rina, sequenti modo præ-
parandus.

26. Sal Tartari *Uii*.

Solve in f. q. Aqua comm. copiosa:
Filtrato liquori ebullienti blando igne asperge suc-
cessivè

Crem. Tartari pulvis. *Uii*.

Insipiscitur leni igne & pulveris: Huic affunde
Spiritus Vini simpl. q. Lad extrahionem vel solutionem:
Sicut in loco calido, & filtra pro unctura Tartari
tartarizata.

In *Silicibus calcinatis*, & subinde in Vino extindis, latet
etiam vis diuretica non vulgaris; Nam vinum illud extra-
hionis Silicum Urinam remouent præparat.

Omnibus his anquerantur *Succus Berula*, seu Aqua be-
rubina ex Arbore sicula profluent, egregiam scilicet Diure-
ticum: Vid. HELMONTIUS de *Lithiis*, de quibus Deo
volente, ubi de *Calculo Renum*, plura.

Tandem *Terebinthina* quacunque ratione usurpata, est
egregia in Urinæ defectu, singulariter Renibus & affec-
tibus Urinaris dicata: Nam Terebinthina est singularè re-
medium ad Urinam suppreffam, ad detergendos & abster-
gendos Renes, eorumque corrigenda vitia; in specie Oleum
destillatum Terebinthinæ, & Balsamus Sulphuris terebin-
thiniosus, item Pilulæ de Terebinthina appropinquat
conducunt, vel ipsa *Terebinthina pura* à *Uii*, ad *Uii*, cum f. q.
Stelli Ovi s. i. vel q. f. & *Aqua Graminis* vel *Appropinquat*
q. f. addendo nonnulli *Succi Limonis*, hæc mixtura insillat
Emulsionis, quæ egregie Urinam promovet, & Renca
mundificat. Conf. PLATERUS in Olf. ubi de *Affec. ur-*
inariis pag. 110. 114. & 180. item TIMÆUS in Epif. p. 244.
Addendum est nonnullam *Mel*, præsertim in Pure Re-
num, utut non omnibus æquè convoniat, cilm Mulieribus
quibusdam propter Mellis locietatem bysterica Pathemata
excitare solet: c. f.

27. Terebinth. Vinet. *Uii*.

cum f. q. *Stelli Ovi*, & *Aqua Gram.* vel *Fragr.*
E. Emulio. Sed est ingratum.

D. S.

Emulio Urinam promovens,
Vel

28. Terebinth. Vinet.

Mellis ana *Uii*, ad *Uii*.

Stelli Ovi Num. 4.

Succ. Limon. *Uii*.

Aqua Gram. q. f.

M. in consistientiam Emulsionis.

D. S.

Emulio Urinam promovens pro aliquot vicibus.

Est egregium Remedium; nam Succus Limonis per se
est egregius, ubi Renes sunt infarcti à crassa Materia &
Humoribus, si *Uii*, vel iv. assumantur.

29. Terebinth. *Uii*.

Stelli Ovi Num. 4.

Mell. refin. *Uii*.

Vini vel *Uii*, ad *Uii*.

Aqua Paristar.

Succ. Fabar. ana *Uii*.

Succ. vel Symp. acrois, *Citr.* vel *Dialib. Fern.* *Uii*.

M. D. S.

Singularis Emulio pro aliquot vicibus,

Do-

Dosis uncl. ad unc. ss.

Item Emulso ea sola Terbinthina cum Aqua Frago-
rum, mediante Ovi Vitello.Semen tandem *Vielarum purpurearum*, & inde cum Aqua
Veroicæ, vel appropriatâ, parata Emulso, euporillon est
optimum, & HARTMANNO & GRATONI insigniter
commendatum, Urinam, imprimis vitio Renum suppres-
sam, blandè simulque Alvum laasat, Vocatur Emulso *Al-
pharaberrica*, c. 8.24. Sem. Violar. purp. ʒiij.
Lichperm. ʒi.Cum f. q. Agn. Petrosel. vel Fragar. f. Emulso pro ali-
quot dosibus: addi simul potest Testar. Ovorum pulveri-
fatar. vel calcinarum, vel Testarum Ovorum Struthionum, vel
aliar Pulveris, sed candidi, Quam Edulcoratur parum
D. S. ut suprâ.Conf. Idea Form. Class. ʒ. ʒ. 6. & Coll. Form.
Præter hanc in oia etiam sunt Emulsiones ea Nucleis
Pescorum & Sem. Geniis, ut & similibus; c. 9.25. Sem. Violar. ʒiij.
Nact. Persic. ʒi.Cum f. q. Agn. Petrosel. & Fragar. f. Emulso.
D. S. ut suprâ.

Item

26. Agn. Ononid. vel Askekenzi;

Petrosel. nna onci. ad unc. ss.

Matras. puerilis. ʒi. ad ʒi.

Spiritus Lumb. terr. per part. ʒi. ad ʒi.

Tartari volat. vel Carminat. ʒi.

Olii distillat. Terbinth. gutt. iij.

Syr. Medar. terrefr. ʒi. ad ʒi.

M. D. S.

Potio Urinam promovens.

Capistur coactilam. Item

27. Tartari vitrisat. ʒi.

Saliu Strp. Fabar.

Fimi colamb. ana ʒxv.

Pulv. Sacchari gr. iij.

M. pro Pulvere.

Div. in ʒ. part. æqual. ʒ.

Pulvis Urinam promovens.

Externè promovet Urinæ fluxum Insudum cum Oleo
Scorpionum & Unguento Dialthæ; sicut & Petrolum
hoc in casu externè silium nobile est: quibus addendam est
Oleum distillatum Terbinthine, Cumini, & Camphoræ:

Vel

28. Thezaur. Dialth. ʒiij.

Olii Scorpion. ʒi.

distillat. Terbinth. dr. i.

M. f. Linimentum: ʒ.

Linimentum Urinam promovens.

Vel

29. Petrol. alb. dr. iij.

Olii Scorpion. dr. i.

distillat. Bacc. Junip. vel Terbinth. dr. i.

Mili. pro Litu blando.

D. S. ut antè.

MEMBRUM II.

De Calculo Renum.

Causas inter, quæ Meatus renales obstruendo Urinæ
Secretionem impediunt, crebrior est Calculi RENUM,
qui præterea etiam Urinæ Excretionem per Vescicam non
raro tollit. In Renibus quandoque quando hæret, Secretionem
& Distributionem, quodam verò in Vesica subsistit, aut ejus
Collum & Meatum obstruit, urinæ Excretionem impedit.
Calculus seu Lapis ille frequenter Renes & Vescicam assige-
t, lithariam interdum inierit, unde pergitur ad Gene-
rationem & Curam Calculi, tam Renum, quam Vescicæ.
Epidem Calculus in se non est Morbus, sed saltem *Predictum*
morbosus, effectus scilicet illius renalis affectus, qui mi-
nus propriè Lithiasis dicitur, & significat *Dispositum* talem
Renum & Vescicæ calculum / s. quæ facile Urina mutatur, &
succesivè generatur Calculus. Prodiuam verò hoc morbo-
sam Calculus ipse, à PARACELSO propriè *Dualis*, no-
mine Lapidum humano propriè (Calculi nomen tantum est
metaphoricum) vocatur, quasi diceret Concrementum
quoddam ea duobus Contrariis mutuo coagulatis & arctè
junctis. Quod attinet Calculum Renum & Vescicæ sub uno
conceptu considerantur, quia se mutuo subsequuntur sæpius.

Notum autem alias est, observatos esse Calculos ubique in
universo Corpore, tam partibus solidis, ut Renibus, Lin-
gan & Cerebro, quàm Liquidis, ut in Folliculi Felle li-
quore, & in Malla Sanguinea (ubi observatum quid in
Venatione Calculus cum Sanguine proliferit) genies;
frequentissimus tamen & ordinarius eorumdem nodus sunt
Renes, Vescica urinaria, & hinc Vescicæ felles, nempe
propter Sal alcali copiosius ibidem hærens: & si in aliis par-
tibus observati fuerint, rariùs tamen hoc factum fuit. Ibi
verò Calculi, quando Vescicæ incumbunt, ut plurimum ex
Renibus, utpote in quibus Acidum manifestum cum Alcali
volatili & terrea Urina substantia coagulatur, (vid.
TACHENIUS Hipp. Chym. c. 14.) vel Calculi minuti
forma, vel Arenarum majusculam facie, successivè in Ves-
ticam illapsi sunt, ut ibidem retenti successivè augmen-
tentur; adeo ut credam, rarissimum esse Vescicæ Calculum,
qui in eadem prima rudimenta concretioni ponat; ut om-
nes majores Calculi, qui amplitudinem Uræterum, tam na-
turalem, quam morbozè aulam, superant, omne suum in-
crementum in Vescicæ acquiescunt. *Dico morbozè aulam*
Observatum enim, quòd quo sæpius Calculi per os transie-
runt, eo magis solent diffundi: In his enim, qui sæpius cal-
culu laborant, ex crebriori Calculorum majorem transire
Uræteres interdum ad Dignit amplitudinem diffendi reperi-
untur; unde quo sæpius Calculi afficiuntur Egri, et mi-
nùs solent habere, ratione dilatationis Uræterum. Quando
igitur in Vescicæ hærent Calculi majores his Uræteribus, in-
salubilis est, acquisivisse illos augmentum in Vescicæ.

CAUSA.

Hi Lapidis sunt Concretum tertium falsum, ex Sæpe vo-
latili Urinæ cum Acido stomachali oberrante coagulatum.
Quod attinet Medium generandi, seu Causam Efficientem Cal-
culi Renalis: materialiter & formaliter ex Urina oritur. Non
considerandum est Modus, quo generantur Lapidis veri in
Macrocosmo cum humisodi Concretionis arenæ Calculi
in Microcosmo dilapz eam ubiqueque est ratio. Nam quod
plures de Sæpe petrosæ, spiritus lapidæz aut Gargenis pro-
ferant, qui vel ipsoz in Petras abeunt, vel alias res in Pe-
tras transmutant, saltem nuda sunt nomina, nil explicatis-
sima; quin potius Causæ Efficientes, quæ cum Materiali co-
cidit, hæc videntur per modum *Coagulationis duorum Salum*
contrariorum & præternaturalium, Acidæ præternaturalis
& Alcali volatilis urinosi. Nempe Calculos generantur,
dum Acidum mauciliu, adeoque vitiosum in speciei ge-
nitionis præter error ex stomacho dilapsum, occurrat ibi
contrario Alcali volatili seu urinoso puriori in Renibus vel
reliquis partibus, cum quo promptissimè & necessitate Na-
turæ concurrente coagulantur invicem in Concrementum
arenosum. Hoc ipso in concursu si simul *Inter se* *Inter se*
Inter se, in omni Urina reperibilem, & quicquid coagu-
lationi optum, simul apprehenderint, id eam Urina Putis
ad vias urinarias delatum cum his duobus una Coagulum
falsipit, & ita Arenas, ut majores & diversis ita & si-
miores constituit, & in silicem Concrementum abeunt. Hæc
adeo duræ evadunt exinde Arenæ calculi, quarum fir-
mitudinem seu duritiem mirandam in poliendo & corroden-
do Vitro exploratum videre possumus in PANAROLLO
Petr. 4. Obs. 25. qui patet Petr. 2. Obs. 35. Arenularum,
tam albatum quàm coloratum, diversitatem cum Micro-
scopio examinavit in Petr. 1. Obs. 33. Nempe *Triplex Calculus*
est Diversitas, ut plurimum nunc Altorum, nunc *Zobor*
rum, nunc *Ruforum* seu Flavorum, qui frequentissimi. Fla-
vidus est simpliciter Urinæ solius progenies, ea Sale nempe
Urinæ coagulato: Calculus Albus fit, quando sub coagu-
latione duorum horum Salium simul concurret Mucilago quæ-
dam vitida, ex vitio Nutritiois renalis oriunda, aut ex
attritis Membranulis Renis transiendis; quæ una cum Salibus
illis concreta Calculos Albos constituit: *Rufus* *fractus*
econtræ & obfcuri Calculi sunt dam miosissimæ Sanguinis
guttæ ea uno vel altero Vasculo, aut eroso, aut lacerato,
transfudantes, simul coagulatur, & concrevit: hinc
Calculi Cnndidi sunt longè duriores, quàm Rubri & Rubi.
Plura de Generatione Calculorum vid. in M. A. N. C. Ann. 4.
& 5. Obs. 167. pag. 220.

Hæc duo Elementa falina Calcinos componentia consi-
derantur ex examine *Calcularum Chymici*: Hi enim quando dis-
sillantur, Oleum fætidum & empyreumaticum, Spiritum
urinofum, insar Urinæ, & Sal volatile in notabili quantita-
te præbent, remanente Capite mortuo insar Calcis vivæ:
vid. TACHENIUS l. 1. & HELMONTIUS Tract. *Tor-
toris non in part. ʒ. 7.* An verò Alcali hoc urinosum, fru-

Nullis

flus calculi à distillatione reliquo & friabilibus planè de-
moñstrat, eadem solidissimum iterum reddat, prout TA-
CHENIUS perhibet: nix Affertur fides sit posset Authorem.
Ex hoc interm per ardele

2. Sal volatile oleosum ac inosum.
3. Simul subtile Acidum propter effervescentiam in fuso-
ne salis alcali.

Ex hoc habemus duas Coagulationes, una Salis, Acidum
de Alcali, quod duo invicem confuso se ununt, & quid-
quid simultaneè Coagulationi aptum, arripitur & coagulant
in consortium Lapidum. Idem calculus per Calcinationem
quoque alcalifatur; & cum dupla portione Carbonum mistus
igne Reverberis per quique aut lex toras calcinetur, post-
modum cum Aqua calida solvatur, filtretur, & crystalli-
fetur. (2.) Confirmat id Oder & sapor calorem; omne-
nem calculus, etiam per aliquot annos asseverati, Uri-
nam spirant; sicuti triti aut affriti, item pulverisati. Nec
(3.) aliud voluit, v. g. HELMONTIUS Tract. de Li-
thiis, qui aliam producit Mechanico chymicam rationem
generandi, s. nempè Coagulum fieri voluit de spiritu qua-
dam viâ, concurrente cum spiritu urinae; non focus ac spi-
ritus Vini resublimissimus subito coagulat in consilientia-
m opacam seu Ossiam albam, cum permixto spiritu urinae
volatili per fermentationem parato, aut loco huius,
spiritus Salis Ammoniaci cum sale Tartari parato. Id quod
fieri putant ratione subtilis Acidum in spiritus Vini adhuc
reperibiles, Alcali volatile in spiritum urinae arripientis;
utut integrum Experimentum adhuc claudicat, cum non
proprie dicta Coagulatio, sed saltem apparet, & Pingue-
ditas ex spiritu Vini Præcipitatio fit: Nihil crystalliforme
apparet in Ossis hac HELMONTII, est ergo Præcipita-
tio Pinguedinis ex spiritu Vini; spiritus Salis Ammoniaci
enim Phlegma spiritus Vini talem assumit, underratio
patet, quare idem spiritus urinae à Calce viva abstractus
non amplius cum spiritu Vini salis concreverit solet.

Ut idè duo Elementa calidi, Acidum & urinosum, me-
diis coagulantur, quoad Acidum observandum est, quod
ordinatio ferè Artificii confirmat; fœt etiam calculus seu Li-
thitici, & contrarij, aut calculi ostia ut plurimum sint,
aut evadunt etiam Arthritici: quatenus bi duo Morbi de-
pendent ab Acido præternaturali in stomacho genito, quod
pro varietate Partium quæ affligit, variis dat turbas, & quod
Articulari Dolorem iniecit, in Renibus coagulat calculum.
Porro utrumque Malum Commune & Endemium videtur
in Locis, in quibus Mæta bibuntur copiosiores & acidiora pro
potu ordinario, ut fit in Regibus aut daouibm sitis, e.
g. Francien, Merovin, Austria, & similibus locis. Nempè
idem videtur esse effectus acidum, quod Artuum nervo-
sas partes pangens & rodens, synechiam in lissidem coagulat in
Nodis, quod in Renibus similibusque in locis Alcali urina-
rio occurrent, istud in calculum cogit. Adeoque in talibus
acidum copiosius sub Jussu urinae sapor occultatorem oritur
ex primis viis, v. g. ex Vini copiosis ingurgitato, inde-
que citra Vomitus retento, hinc vitiosè digesto: quod Acidum
vitiosum ex stomacho dilapsum, uti suo ista acore val-
verit corpori est hostile, & ubique Dolores ac punctiões
infect; ita copiosorem salinis urine contentis materiam
suggerens, seu illuc pertingens, sub forma spiritus seu Acidi
pulvis fixioris sub urina potus, & in eadem reperietur Alcali
quoddam volatile, ab acido debito non ritè saturatum,
subtili hoc aggredietur, & in calculum cum eo coit. Expe-
rimentum etiam habemus elegans, Visum in Tabula & calculum
coagulari: recipiatur nempè Nitrum per Carbones
persicè fixatum, miscetur cum parte glieni, fundantur
ignis forti, coeant in Vitrum; hoc effusum in Laminam
murchaleam, citò pulverisetur: hinc affundatur spiritus
Vini, & brevi post tingeret colore rubro hyacinthino; ef-
fundatur, & novus spiritus affundatur, tandem menstrum
spatio sit Oleum rubicundissimum, cuius aliquot guttes in
Vitrum Vini insillunt cum coagulant Vinum in substantiam
gypicam, similem calculo seu Topho in articulari
podagricorum. Ratio est, quia Alcali Neri urinosum cum
spiritu Vini exaltatum arripit acidum Vini, quod coagu-
lat in calculum seu substantiam topheam. Propter hoc aci-
dum vitiosum Visi tales Litices etiam afficiunt sunt purgij,
præcipiè ex colica, seu artuum post colicam contractu-
ra, affectu apud nos raro, ac reverà colicam convulsivam
gravissima specie, ab Acido in testibus torminoso,
in artibus verò suspensivo. Facit hoc imprimis Exem-
plar calculi cuiusdam, cuius omnia contenta liquida Acidum
intensè spirabant: Conf. M. A. N. C. ann. 2. observ.
p. 344. hinc est, quod THONERUS in abs. ducit
Melancholicos esse dispositos ad calculum, misis Billiois

quæ in Melancholicis abundat Fermentum seu faccus cal-
culosus, Ratio, quæ confirmat, hæc est, quod in Billiosis
predominatur sal volatile Alcali, in Melancholicis verò
primas obtineat acidum. Facit ergo videmus, THONE-
RUM esse in nostra sententia.

Exhibetur igitur locum acidum obiecti, nunc ipsum urinae,
nunc vero expressi sub elapsum copiosius, inde Uri-
nam magis impetuantem & salisorem reddens, & ita copio-
sorem aut firmiorem calculum generationem promovens. Unde
etiam Venetia subinde à calculo præservant, contenta
primarum viarum eliminando: id quod etiam faciunt vel
Terra lapidea fixa, seu calcinata, quatenus Acidum absorbe-
bunt, vel per Alcalia, tam fixa quam volatilia, acidum in
salsum mutantis, & per urinam evacuantis.

Præter hoc acidum, alcali præsentia in calculi generis illu-
strat, quod frequentissimè alcali, imò in tota Economia
animali humana frequentiores non, quam in Renibus, &
hinc in Venica fœlica, reperiantur; quia in his locis mani-
festius reperitur Alcali volatile urinosum, quod promptè
potest corripit ab acido vitioso, eodem naturaliter confusis
Urina sit salis, & consequenter Alcali jam ab artu fit sa-
turatum, & vitæ eodem, quæ tali generari poterunt cal-
culi; Nam cum salis sapor ex acido & alcali volatilibus, do-
bita proportione de coagulatione unitis, originem ducat,
tam cum acido quam cum alcali permixtibilis est, sine al-
terius immutatione: Unde in cætera sanis, ut ut urinae in-
sillitior acidum, aut licet urinae in Corpore permiscetur
acidum, v. g. in stranguriis, quæ oritur ab acido insensibili
ex primis viis præternaturaliter urinae permixtum, tunc
tamen non generatur calculi, quoniam acidum per se
solum non sufficit, & sal urinae tunc temporis naturaliter
constitutum est, h. e. sal volatile urinae salium, seu à com-
pari suo acido debito saturatum existit, unde non potest
coagulari ab eodem, vel alio quavis vitioso acido, ac salis
quidem ac turbida nonnihil, non verò in Arenulis
spissata excernitur urina. Aliud quid ergo subest: nempè ut
coaguletur alcali urinae ab acido ex primis viis delapso in
Lapidem, necesse est, ut sapor urinae salis dividatur, i. e.
ut illud alcali volatile urinae per se existere incipiat, &
purius ac manifestius fiat; Dum enim ista urina facit susci-
pit putredinem Fermentum, ab acido proprio nonnihil se-
paratum, nec debet saturatum existit, aut ita promptis ab
acido plus minus naturalis aut vitiosis corripit, & ita in
calculum costringit potest. Fit hoc, quando urina in Re-
nibus alterationem præternaturalem; uno nomine, ali-
quem putredinis præternaturalis socam, incurrit, quæ levi
putredine dissolvitur nonnihil ejus mixtura, & ita sapor
ejus salis dividitur ista alteratione, ut abundans sal Al-
cali, & proprio prædominans acido, ab eo nonnihil sepa-
retur, & utraque salia hæc adtiva manifestiora fiunt, do-
nec novo & planè heterogeneo coagulationis modo sociat-
ur, aut præternaturali acido vitioso, Alcali denud sub
Coagulationis jugum mittatur, & demum in Calculum
coeat: v. g. videmus, quod urina sanorum hominum clara
& perspicua excreta, 6 ad tempus in matula, præsertim
stannea, aut vase vitreo fœteret, imprimis tempore æstivo,
aut in loco calidiori, ut corrupti & leviter putrescere in-
choet, cujus indicium Fœtor existit; quod tunc areolat, &
successive calculi crusta, parietibus seise affigant, quod fit
per putredinem, separatis salibus proprium Urinae Aci-
dum, debile licet & paucum, Sal tamen volatile proprium
aliquali putredine separatam ac resoluam, denud novum
Coagulo spissat, & ita in novum Concretum, Arenulas,
cogit, quæ insit Tartari lateribus maculas adherent; nempè
nunquam urina, nisi cum Alcali fœt præcipitatio aut put-
rescentia, suum sal volatile promit, ubi simul etiam terrestris
& quasi substantiam labarum putredine de se reddit. Hæc
Mechanica subministrat viam indagandi, quomodo altera-
tio hæc urinae putredinis in Renibus, seu Lithiis aut dispo-
sitio ad Calculum, fiat: nempè adeit in Renibus Fer-
mentum putredinis, præternaturale, quod disponit urina-
m in Renibus ad aliquam sui putredinem, & consequenter
proprie texture dissolutionem, unde sal volatile quodam-
modo liberius salium, ab acido præternaturali digestiōis
primæ cum particulis suis terrestribus (per putredinem po-
tius genitis, quam formaliter præexistentibus) simul facili-
ter coagulat in Arenulas & Calculos.

Illustratur & confirmatur hoc negotium imprimis Nihilis
HELMONTII Tract. de Lithiis & supposito, qui ex ista
Alparagi copiosioris contraxit Nephritidem. Alparagus
enim eo ipso, quo intensè faccidum reddit Urinam, qui tot-
notè nota est certa inchoat in Urina putredinis, eo ipso
cam ad aliqualem putredinem, & ita salium divisionem dis-

ponit, unde vitiatum sale alkali oleoso, separatque ab occurrente vitioso acido, facile sunt calculi, sicut contra *Motis, Janquetus & Trebichina*, dum balsamica vi renibus auxiliata urinam à Corruptione præstent, & suavolentem reducant, etiam lithiasis suo modo fuit remedia.

Alteratio verò hæc Urinæ *Putredinis* fit in Renibus ab horum Fermento alterata, plurius minus enervato seu inerto reddito; quod sicuti suo flatu naturali consensum promouet urinæ secretiōnem & eam certo modo alterat; ita, si fermentum hoc in renibus fuerit præternaturaliter alteratum & corruptum, vel deficit in debita alteratione urinæ, & sic degeneret & disponatur per renes colata urinæ ad præternaturalem sui potestatem in Renibus, fit, ut corruptione ejus sal volatile oleosum spargatur, & cum acido præternaturali concurrente tales afflicti calculi oriantur. *Lithiasis* ergo hujus dispositione renum ad calculos *erectio* in fermentum reum corruptæ: ipsum verò eius productum seu calculum *est* *sal volatile Urinæ, coagulatum ad acide Urinæ, mediante alteratione Urinæ putredinis*; unde quia difficultate corrigibile est hoc vitium, difficultas ista est lithiasis eradicatio. Cæterum fermentum hocce renum vitiosum in quo fundamētum lithiasis consistit, est primum acquiritur, nunc *vis* *Diap*, ut ab *Alparago*, aut similibus simplicibus diureticis, quæ omnia urinam reddunt frepidam: unde Fermentum reum labeficitur, atque, ut probabile videtur, occasione vitiosi acidii fermentativi ex primis viis, adeoque vitio fermenti ventriculi sui urinæ potus, aut quocunque alio modo, ad renes transmissi, enervatur: nunc *communicata lithiasis*, seu transplantata, idque vel à parentibus ad liberos, vel etiam eum *Lesio Nutricis*, quale Exemplum *Lithiasis ex nutrice* contrahit habet *HELMONTIUS Tract. Infaustis Nutricis ad Vitam longam*; Sicut alias in vulgus notum est, *Hereditarium malum esse Lithiasis*.

Ex his patet *Dispositionem quandam certam* *lithiasis renibus ad generandum calculum*, falsumque esse dogma, quasi hic calculus vel alius alteratus præcise generaretur: sub quacunque enim diæta in prædispositis oriuntur calculi, in quo dispositio verò nulli, licet eodem nutrimento videtur. Punius enim septem individua, nunc idemque alimentum & potum assumpta, ubi sanus ea alimento non generat calculum; cuius autem renes in fermento debili corrupti sunt ex omni alimento in lithiasin incidit. Interim ramen in *dispositio est ratione alimentorum quadam differentia*; prout scilicet.

1. Eadem *plura minus in primis vis accensum*, plus vel minus dispositum ad calculi generationem.

2. Prout *magis vel minus eadem gloriola fuit*, catenæ quoque in dispositio plus minus duri gerantur videtur. Hinc *pl. Lactinia & Cælestis*, similitudo assumpta, & ipsius renaturatur calculi; non quod materiam, quæ facile in calculos abit, in se continent; sed quoniam hæc partim acido vitioso in primis viis facile coarctatur, partim alkali terreo promptè in calculum coagulabili sunt imprægnata, & postmodum eum urinæ potus ad renes colata promptissime cum reliquis salibus coagulatur: vid. *SALMUTH. casu. 2. Obs. 99.* qui exemplum habet, ex abatu eali, calculi vesicæ lethalis ad magnitudinem Ovi gallinæ coarctati. Vix ratione salis acidii huius prædispositum ad calculum, quatenus magis acidum coagulabile continet.

Hoc modo producantur ex his causis occasio aliorum ut plurimum nunc parva tantum *arantia & granula in renibus*, in specie in pelvi: rarius in alia majusculis compingit arbitror: salia enim dum coeunt, minutissima graula coalescunt, quæ facile sunt solubilia, quæ læsione membranarum & pelvis, & transudatione succi nutriti aut sanguinis, accessione novarum invicem conglutinate, tandem in *maiores lapides*, nunc verò mox in *maiores & durissima* *saeta monstra & topus coarctati* adeo ut in confirmata etiam malo totum Renem parenchyma huius ipsi in Lapidem mutatum observatum fuerit, quæ non raro tota Pelvis, omnesque hinc producti tubuli, lapideo tali Con-

cremento sparsim iofardi & repleti reperiuntur. Notari dignum talis rei Exemplum subministrat idem *SALMUTH. casu. 3. Obs. 30.* de calculo totam reum ambotum casitatem repleta, & urinæ per uribum quandam in lateribus calculi excavatam procedente (L.). Arenule autem istæ seu calculi minores geniti velociter augmentum capiunt per Uretres in vesicam urinarum delapsi: vis enim continetur calculus primarius in Vesica; laia autem plus minus Pelvi, ut Uretrem tunica nerva: item ipsa etiam vesica attritu calculi nonnihil vitata plorat hæc partes læsæ nutrimentum suum proprium chylum sub forma *Atelaginis* efflat ac ipsæ, quæ ipsa mucilago postmodum una cum Urina calculorum accretæ, interdum admodum copiosa, habetur vulgo pro pituita, ex qua per calorem arefacta calculi generantur. Alit falso, eum uti dicit, reversi sit Alimentum Vesicæ proprium & Uretrem, ex eorum latione in Vesicæ cavum destillant, & ita accretum; quod præter *HELMONTIUM* jam olim demonstravit *JOUBERTUS in Praxi*, ubi dicit, istum Mucum esse partium Nutrimentum, quod ipsam læsæ dimittant. Jam verò hæc ipsa mucilago, uti aliquando ejus subinde adheret Calculo, ita sæpe circa calculos parvos in Vesica conservatur, unde postmodum successu supervenientibus salibus coagulabilibus, simul in coaguli consorium rapitur, & eandem Calculi primū minimi oritur augmentum insignie. Nam isti Vesicæ Calculi majores lamellatim concreta reperiuntur, seu in quibus infus Ceporum corticis, vel *Lapidis Bezoar*, vel *Lapidis* ea Felleo Bovis felleo, sibi manū incumbunt, qui ipsi cortices huius felleo, quæ talis mucus pedetentim coagulatus à salibus istis, Mucum in Coaguli consorium præcipitantibus. In centro parvus ordinarius Lapillus, vel invicem coarctatus arenule, & renibus per uretres eo delapsæ reperiuntur, quæ per succum nutritivum, & alia ad calculi fœu topiaria accidentia successu augentur & coarctantur, quod eleganter declarat *BOYLE in Philosoph. Experiment. Part. 2. p. 29.* fœu reperiens in *BORRHO. Cent. 2. Obs. 63.* qui etiam observat calculum Vesicæ, in quo diffusio Nucleus lapideus iuvens est, qui, areculæ inflat ex renibus descendens, in Vesica eandem augmenta lamellatim acquirit.

DIAGNOSIS.

Quod atinet signa *calculus renum*, aut etiam *vis* *Calculus Renalis* aut Vesicæ signa saltem sunt à posterius, nunc symptomatica, quæ ejus occasione superveniunt, & a se eum non est morbus, licet morbida symptomatica inferat, propterea Audires Prædicti *duo etiam dispositiones* in calculo, nempe in *parvo*, & extra *Paroxysmum*.

Adeoque Symptomatica sunt pauca vel nulla, dum calculus seu arenulae sunt quæ in Pelvi vel Utericibus, aliq. quod dolor aliqui gravitatis, & calculus major subit, afficit, siquidem calculi etiam insigniores subinde in renibus latent, absque ullo præternaturali symptomatico; contra *M.A. N. C. Ann. 4. Obs. 29. pag. 31. & 23. Obs. 33.* Adeoque tunc tolerabile est tempus extra *Paroxysmum*. Gravia verò & varia tunc sunt symptomatica, dum calculus & Arenule moventur, & ex renibus ad Pelvim & Uretres, & hinc ad Vesicam trudentur, & tunc tempus est *paroxysmum*.

Symptomatica omnia oriuntur ex acuto dolore calculi ad Membranas Pelvis & Uretres, unde hæc *spasmo corruptæ* & alias partes per consensum simili spasmo affici faciunt, propter quem consensum ratione nervorum etiam tum ex plebibus melenicis derivatur, & Vomitus & colica tormia supervenire solent; sicuti in Malieribus hysterici excitantur *Paroxysmi*. Adeoque plurima ista & sæpe min symptomatica, quæ calculi alioque dolores Nephritis insequuntur, partim ea spasmi variorum partium, partim ea retenta plus minus, & per metastasim aliorum translata urinæ, oriuntur.

Omnia autem hæc *Symptomatica*, quæ aliter ex doloris impressione dictarum partium originem ducunt, non sunt propria

(L.) *Mentisferum* fuit *Lapidum*, in Renibus Ven. Servi Dei Innocentii XI. Pont. Max. reperiuntur, *Historem* à Cl. Lancisio communicatum, illorumque Iconem, videre est in *Lithotomia Th. Alghisi*, atque apud Mercati *Mecall. thesaurum* in tota Cl. Viri & amici *suavissimi* Petri Affati ad Amm. 8. Cap. 2. *Lapis in dextero Rene contentus fœu erat*, qui in *sinistro* novem pendens: per utriusque superficiem Canaliculi quidam excavati erant, per quos urinæ à Renibus *juvantia* (seu potius à Renum torrice glandula, in quem substantia Renum omni faceret) in exiguum & asprum Pelvis cavitatem deplebat. Hinc bene inferi Cl. Lancisius ad urinæ secretionem, glandulorum tantummodo Renum corticem esse necessarium: in hoc enim Cadavere Renum substantia per tota absente erat, Urina tamen secretabatur. Quod quidem cum Malpighii sententia exalio consensu, qui eandem consensum simili Observationem in Rene sinistro Excell. Ducis d'Estre fœu.

propria calore, sed etiam alia Doloris Nephritici alia causa & non præcedit à calculo nati, v. g. doloris Nephritici febriatuum, per acriter Salia ista Partes appropinquat, communia, ut & eandem originem habere solent: vid. & RIVIERUS Praxi lib. 24. cap. 1. & DRAWIZIO de febribus cap. 9. Quinimo post multiplex per consensum Pathemata cum facile symptomata Nephritica, Colica, Hystrica, &c. confundi solent, adeo ut non pauca proflant Exempla calculorum pro colicis perverio modo curatorum, ut inde cauti & accurati finis in Signis.

Symptomata ergo, quæ in Paroxysmo affligunt, sunt varia, ut etiam latius exercitatus Medicus fallatur. Imprimis quando Calculus incipit moveri, oritur dolor acutus, modo interitior, modo remissior, in regione Lumbi, minus tamen pungens; illic modo sinistroriorum, modo dextroriorum vergens, prout Ren dexter vel sinister est affectus, ac proin rari Dolor punctionis lenitur: simul & sensus & Dolor gravitior, plus minus obfus, seu sensus Ponderis gravitatis & prementis in diutius locis adesse solet, adeo tamen mollior & cum tantis anxietatibus iunctus, ut nec interdiu, nec noctu quiescere queat, dicantque Ægri: esse istum, ac fieri tantum Placidi quæ in terra, quopio explicant Dolorum istum. Ubi verò movetur Calculus ex Renem Pelvi ampliori in Uterum angulus, tunc Dolor lancinans, lacerans, & molestissimus redditus, & pungens magis, excitatur, neque cessat, donec calculus ex Uteru denudat ad Vetricæ cavum descendat, aut ad Renem cavum remarit. Signum notabile est quod refert BARTHOLINUS Com. 4. Hystr. 6. p. 27. quod in Lithia interdum adit Hemieria, istius in specie lateris, cuius Ren calculo est affectus.

Urina subinde variat, cum fuit paroxysmo ingruento, Urinæ paucæ, acres tamen seu admodum stimulant, & aqueos misungunt. Subinde perfecta exsuffragio sequitur, sic uterque Ren simul afficiatur. Interdum, imò sæpius, Urina apparet intensè rubra, crassa, ferè fubercula & quasi sanguine effusa, & quidem interdum reverè est ex permixto pauco cruore & Vulnere partium, seu laceratis Vascularibus, à calculi asperitate emanante, &c. Interdum tamen talis Urina subulora & quasi sanguinea, peripica tamen est, absque sanguinis consorcio; quin talis Urina interdum subnigra, crassa sæpè fit à copiosis salibus solutis, & cum Urina una excretis, leni, ut alii vocant, Tartaro resoluta (ex quorum conglutinatione colliguntur Arenule) quod frequenter fit in scorbutis ac Malo Hypochondriaco. Non igitur terrestres Medicos, quod fit sanguinea, monente HORSTIO in obs. Subindè imprimis, ubi calculi est in motu, aut etiam in calculo Vesicæ, Urina excretur pallida, aut saltem parum tincta, cum copiosa Materia crassa, viscidè & glutinosa, in fundo Matule hærente, & mediam Urinæ partem subinde replente, quæ Materia est nil aliud, quam Nutritum proprium Partium membranarum, Pelvis, Uterum & Vetricæ, à calculo lesarum plus minus, & sic cum Urina extravasatum: de quo vid. imprimis WILLISTUS de Urinis Cap. 3. pag. 364. & 365.

Interdum Arenule quoque in calculis cum Urina excreantur, quæ sandum Matule petunt. Verùm subinde excreantur etiam Arenule similes in non calculis, quæ frequentissimè sunt Coloris rubi & sunt friabiles, non sunt Arenule Renales, sed sunt Arenule Hypochondriacæ, seu Salinis exhalat febribus: si verò non sunt friabiles, sed duræ, & subinde grandiores, & quæ sandum saltem occupant Matulam, sunt Arenule Renales, & ad calculum disponentes.

Uterius in Paroxysmo calculosi non possunt se erigere, nec Corpus incurvare à sub talibus symptomatibus super Gravis, ex illius f. regione affecti Renis, frequenter est perceptibilis, ita ut si Ren dexter solet calculum, dextrum quoque Coris flupet, & contrà. Hoc tamen non fit semper, sed in primo saltem calculi paroxysmo: qui enim frequentius calculo laborant, minus solent Crurum Pathematis affligi. Percipitur etiam Dolor transversus, & quasi contractivus, ex regione Lumborum per longitundinem Ossis Sacri deorsum usque, iuxta Os Ilium, secundum Uterum ductum deorsum in regionem pubis & Vetricæ terminans; unde etiam in Viris similiter Transversus illic lateris, cuius Ren est affectus, spasmus quodam correptus retrahitur sursum ad Os pubis moleste & dolorosè, quod ipsum observetur pro diluendo spasmu.

Interdum quoque Transversus limbi corripit. Ægros calculo Renum laborantes; idque observari in Femina, ac notat quoque TIMEUS von Cudenkle in Epist. pag. 342.

Præterea superveniunt simul fuit calculo Renum Accidens: Peridionem, Nausea, Appetitus dejectus, morarè

Tom. II.

difficilis Respiratio, quasi cingulo confringeretur collæ interiores, ita ut quidam Alibi viderentur laborare, cum tamen Aliebus Nephriticos hoc Symptoma indicat; idque in consensum Renum & Diaphragmatis non immerito videtur repetere SANCORIUS in Comment. in art. parv. Calest. P. 2. Digress. 35. p. 994. Item Viminis enormes subinde insequuntur motum calculi Renalis, Imò Convulsiones Digitorum, Brachiorum, Pavores dormientium &c. subinde calculo Renum supervenire observantur; Dolorum quoque tirillatorem sentient in extremitatibus Glandiæ Præ: vid. Acl. Med. Nafsa. Vol. 4. pag. 103.

Frequentissimum omnium symptomatum fuit Termina colica acerbissima, cum Nausea & Vomitu, ac similibus cognatis symptomatibus iuncta, quæ fuit nil aliud, quam Termina convulsiva, propter Nervos in Pleas Meleenterio spasmus correptos, ad dila partes, nempe Renes, Intestina & Stomachum derivatos. A Nervulis enim Renalibus, qui in Renibus Dolorum sunt organa, ex Dolor spasmus correptis, continuatur idem spasmus ad Plexus Meleenterii fures, qui simili spasmus affecti; Plexus enim Meleenterii fures derivant ad Stomachum & Intestina, unde per consensum afficiuntur propter Spasmodum. Adeoque calculi Renum in Viris colicam convulsivam, in Mulieribus Pathemata Hystrica dista, inferio solet, ut etiam hæc Nephritica colica exercitissimè fallat Medicos. Imò in Gravidis calculos interdum Dolores Partus mentiri solet: vid. HOFERUS: semper tanta patiatur Termina, ut non secus, ut decies Dolores Partus fulsiner. Pulsus est durus propter spasmus, aut convulsivam contractionem Fibrarum Arteriarum.

Inter hæc Symptomata non reperiuntur promiscuè in omnibus calculis, sed modo hæc in hoc, alia in aliis, ac interdum urgent talia Symptomata per consensum, nempe Vomitus, Dolores colici, Passiones hystricæ, &c. antequam percipiantur Ægri ullum Dolorem circa Renes. Interdum colicam patiuntur, antequam calculi in Renibus sentiantur: vid. SENNETUS de calculo renum. In specie Stupor erum innuit calculum.

Cæterum origo tam variorum symptomatum est saltem ex consensu, ratione connectionis Renum cum aliis partibus per Nervos & pleas. Notam enim est ea Anatomia Nervorum, Nervos Renum oriri ex plexu Meleenterii, qui oriuntur ex Nervo parii Vagi, & Intercostalis unde vel uno Nervulo Renum spasmus convulsio à calculo, alterius Renis Nervi spasmus convelluntur, qui semper continuantur ad plexum usque: hinc omnes Nervi ex illis plexibus similiter convelluntur, adeoque colica illa convulsiva in calculo, frequens Vomitus, retractions Testiculorum, Tenesmus, Dolor quasi parturitientium, qui sunt spasmus Uteri & Intestinarum: similiter ex hoc spasmus difficilis Respiratio, & omnia reliqua symptomata spasmotica, per consensum nempe Nervulorum deducenda sunt. Sic v. g. punctionura Nervi in Brachio dat convulsionem & spasmus brachii. Dum verò, quando calculus est quietus, nec irritatur Ren, nec convelluntur Nervi Renum, & omnia hæc symptomata, modo calculi fit in Vetricam delapsus, vel excretus, cessant.

Prode ergo distinguenda Pathemata calculi ab affectionibus cognatis, in specie à colica per effectum, & colica Nephritica. Hoc ut ritè fiat, observandum est, quod in Colica nullus adit pedis stupor; item quod in tali Colica Ægri so possint erigere, cum si, qui calculo Renum laborant, ne plurimum incurvat: sunt, quasi palus per Vertebrae rectæ transversæ, & non sine Doloris exacerbatione spasmus rectæ extendere, & in rectam lineam hedere possint: id quod quasi primarium Diagnosticum. Colicus Dolor fit subitò, modo remittit, modo succedit, cum calculi Renalis Dolor ferè fit continuus. Et quidem imprimis localis Doloris manifestat, an ex calculo, an ex alia causa sit? Nam junctus fixus Dolor in Dorso, calculum innuit, siet alia simul concurrant symptomata: nec in Nephritici talis marmura aut agitationes in Intestinis coarctantur, atque in colica. Alia quoque Urinarum est conditio. Dolor quoque vagus in Abdomine modo antrosum, modo retroriam, modo à dextris, modo à sinistris, colicam innuit. Plura hæc scientia vid. in SENNETO lib. 3. Prax. ab calculo Renum, RIVIERO, & DRAWIZIO de febribus pag. 9.

PROGNOSIS.

Quod Prognosis concernit: calculi Renum Morbus est gravis, sed etiam admodum periculosus ratione Doloris atrocis, sed etiam admodum periculosus ratione symptomatum

Eccc 3 va.

variorum, in specie quando Inflammationes, interdum Exacerbationes Renum, Vigiliæ, Febres, Ictus, Ictus Jethales, & gravissimi Morbi nec vix generis, supervenire solent.

Et *Femina* Calculo Renum frequenter laborantes, si Gravidæ reddantur, facili moriuntur, aut Abortum patiuntur, vid. PANAROLLUS *Pent.* p. 46. l.

Certe, quod majores aut asperiores Calculi, ad respericulosos; & contra quod minor & glabrior, ad minus periculosos; Pertinaciter Renibus impauctis, subinde Ictus, Ictus Jethalem, aut Epilepsiam tandem lethalem excitat.

Calculus Renum *si* *strepit* affligit Aegrum, Inflammationes certe, & has ordinariæ sequentes Exacerbationes Renum inferre vid. M. A. N. C. *Ann.* 1. *lib.* 16. & *Ann.* 2. *lib.* 11.

Calculo Renum, si ad plures dies necesse periret, neque ulla Medicamentis cedat, superveniens *Frigus Extremum*, aut *Insolens frigidus*, idque Imprimis cum incommoda Urinis Suppressione, Mortem in propinquum inuunt.

Contra si *Urina* tenues anæa excreta, emittuntur crassæ & turbidæ, ac in specie cum Sabulo, Arenulis, & quasi Frustulis lapideis, bonum signum est comminuti quasi Calculi & minis sulci.

Interdum *certas* quasi *Periodos* observat Calculus Renum, cum, ut HELIDÆO PADUANO in *Observat.* pag. 156. li. *lib.* 1. motus in quarto, in septimo ut plurimum solet prodire, cæteris nempe paribus; si enim sit magnus, non valet. Sic *Typum tertiarum* aliquando observavi in Viro ex Calculo Nephritico, dum tertia quaque die à meridie Dolores Abdominis & Lumborum ipsamodi reverterentur, & per noctem durarent, donec sponte successe remitterent.

Lithargis ex Nephritide ut plurimum ictus est.

An unquam curabiles sit illa ad Calculum præcedendum *Difficilis*, quam Lithiasin vocant, meritis dubitant, nisi forsitan in primo statim Principio cum observare contingat, qui tamen Casus via debilis videtur. Minus tamen adhuc spei sperare illis, quibus Affectus hic *Mardianus*, aut cum *Urine Renum* contingit: vid. HIPPOCRATES *Aphorism.* 6. *lib.* 6.

C U R A.

Cura Calculi Renum est vel in *extra Paroxysmum*: In *Paroxysmo* habetur saltem respectus ad Motum Calculi prædicti, & inde nata symptomata spasmolodica dolorosissima. Ergo ante omnia *Dolores* & Partium inde nati *Spasmi*, & hinc Uterum *Contractura* sistende; hunc quantum possibile Calculus prædicti Diureticis blandis & appropriatis promovendus, (vid. LUDOVICI *Pharm.* p. 449.) vel *Spasmi* confringendo: idque quod citius, & ed melius, ne sub mora intra Corpus Calculus incrementum nimium capiat. *Erilium Renale* si quibuscumque iactant habeo pro Non-Ente.

Extra Paroxysmum verò si *subit* Calculi, respiciendum, ut præcavimus, ne denot regrederentur; si *vero* *novi* jam incipient *gessant*, ut mature Diureticum ope ejiciendi, antequam Dolorem pariant, ne nimium incrementum capiant.

Ea autem, quæ in genere Calculos ejiciunt, sunt *Diuretica* quæcumque: Nam specialia Calculum pellentia, ut sic, non dantur. Quæ enim pellunt, id faciunt vi diuretica, quatenus protrahunt Urine fluxum: aliud quidem est pelles Calculum, aliud comminuit Calculum.

Prohis Scopis observandum

I. Ut *Diuretica*, aut *Lithonetrica* dicta, quocumque modo pellentia, imprimis fortiora, in *Principio* *insurgent*, dum urgent Dolores & Spasmi partium Abdominis, quoniam Malum exasperant; nec prius applicentur, antequam omnes Dolores & Spasmi cessant, quia aliis vi attritus Calculi irritant dolorifica crispatione vel contractione lo angustant, & hinc Malum exasperant: Si in *stare* fortioribus Diureticis violentius præceditur Calculus, Crabrones irritant; adeoque quod gravior Dolor in Paroxysmo est, ad minus aut mitiora adhibenda Diuretica. Saltem ergo in *Declinatione*, sedato Dolo, primis viis repurgatis, & acrimonia Humorum nonnihil temperata, Diuretica, sed nonnisi temperata, nec sola, sed cum Opiatis mista, usurpanda sunt, ne Calculus validè nimis commotus exacerbet Paroxysmum. Simil, quantum possibile, artificiosis conjungere ex collectione Circumstantiarum *Calculi Magnitudo*, an sit hic major Uterum ductu, aut æqualis, aut minor? Si minor, tunc tuto in tantis symptomatibus postsumus usurpare Diuretica Opiatis mista, ut citò ejiciatur: si æqualis, sostenatur symptomata, & idoneis Pellentibus mature promovetur, ne majus capiat incrementum, & postmodum difficile per Uterum transiant. *Quid si Calculus* *major* sit *vis* *urinaris*, ita ut ejicere eodem sit impossibile, tunc cessandum ab omnibus Pellentibus, quia impossibile est promo-

vere, nisi prius confringatur. Ergo infringendum, vel ita, seu impossibile, desistendum, cum *Aperit* per *Externam Chirurgiam*, si non impossibile, saltem periculi plenissima sit. Verum cum non semper concludendo periculi Medicus affligi, an parvus aut magnos dolores Calculus? cum non raro variis formis aut asperitatibus indat; hinc tutissimum est, ut sedato Dolo tam *internis* quam *externis*, prædicti Calculus per Diuretica, quantum possibile, promovetur, cum quondam Dolores continuant, tandem Membranam ac Uterum majore contrahere ac ipsius viget; à quo penitus Calculo via intercluditur.

II. Quia prædicto Calculo, ac Dolorebus Nephriticis urgentibus, Urina subinde acrior ac salior observatur, à quo Dolores exasperantur; ob id in Paroxysmo simili talia administranda, quæ illam *urine acrimonia* tollere, & ita *Dolorem* nonnihil immouere possunt. Id quod faciunt omnia ea, quæ vulgò dicuntur *emolles*, *viscosæ laxare* in Calculo; quod tamen per se est ridiculum: Nam si talia Assumpta deberent laxare Renes ac Meatus urinaris, necellum esset laxare prius Stomachum & Intestina, utpote quæ propius attingunt. Talia autem sunt *Emollientes Oleis*, quos quatenus laxant vias Calculi, ut Veteres dicebant, non HELMONTIUS merito ridet, sed potius, quatenus acrimonia urinae temperat & tollunt, inde tanto Dolores leniunt; quibus sopitis, crispationes & dolorici ipsam Meatus tolluntur, ac ita vel sponte ad debitam amplitudinem viæ anæa ardore redeunt.

III. Cum symptomata Colica, Flarulentia & Borborygmi, Alvi obstructio plus minus, similiaque symptomata, in Paroxysmo Aegrius admodum cruciunt, ob id opera danda est, ut *primò* *vis* *ad* *stercora* *quæ* *tantum* *sua* *libet*, ne hoc ipse coactur vix Malum exasperet, adeoque Diuretica sicut post principia, Ergo semper in principio & fine Paroxysmi opera est danda, ut Alvus laxa sit; aliis Colicæ & alia dicta Pathemata Abdominis ingruunt exasperantur. Prædicte ergo calculo, & urgente Paroxysmo doloroso nephritico, pro Alvi aperienda nil æque convenit, quam blandus *Glyster*, aut *Emulsi* aut *Andrym*, iocundus, qui certe tempore subitus multum ad leniendum Dolorem confert, & sæpe totum Curacionis negotium absolvit: vid. SCHENCKIUS *observ.* pag. 475. Et quidem parantur ex Lacte, urina, Radicibus Liliorum alborum, Altheæ, Liquiritiz, Herba Malve, Violariæ, Parietariæ, de qua vid. SIMON PAULI *Receptaria*, *Botan.* pag. 109. Veronica, Summitatibus Anethi, Floribus Chamomillæ, Meliloti, Sambuci, Semine Fœnugræci, Oleo Viliarum, Liliorum alborum, Amygdalarum dulcium, Unguento Glysterico, Pinguedine Caponis, Coniculi, Butiro rectis, &c. Ubi.

- (1.) *Decolla simpliciora* compositis magis præferenda; Decollum v.g. Chamomillæ, Malvæ, Parietariæ, Violariæ, aut juxta CRATONEM Veronicæ.
- (2.) *Ex Lacte paratis* male varia Simplicia, præter dictam Veronicam, aut Flores Chamomillæ radicitus, Radicem Altheæ, &c. iococipi.
- (3.) *Glysteres* in minori quantitate esse injiciendos, præcipuis in Prægnantibus ne mole sua premant, & Dolorem augent, distitis vero retineantur: vid. ZEGGIUS *Conf.* 50.
- (4.) *Si emulsi* *vis* *ad* *stercora*, Oleum Dia-Colocynthidis, & Eleutheria Purgantia addere convenit: Item Trebinthina, Renibus & Uteribus grata; & si Dolor aliquantulum defuerit, Baccæ Juniperi, sal volatile Succini, similiaque Diuretica. Quin nudus Glyster ex Urina fœtus Pueri conducit, vel cui Semina carminativa incocta sunt, qui lenit Dolorem & Calculi motum blandè promovet. Exempli gratia:

℞. Herb. Parietariæ M. i.
Malva
Violariæ ana M. ʒ ad M. i.
Flor. Chamom.
Samb. ana P. ii. vel iii.
Rad. Alth. dr. vi. ad unc. iʒ.
Coop. in C. q. *urinae Pueri* vel *Seri Lactis*;
Colaturæ *unc.* viii. adde
Terebinth. cum *Vitello Ovi* *℞.* ʒii. vel ʒss.
Olei Lil. alk. unc. ʒ ad dr. vi. & unc. i.
Scorpion. dr. i. ad dr. ii.
M. per Clysterat: S.
Clyfina Leniens.

Cui etiam *Uteri arimonia* ʒii. addi possunt; Blandè abstergit, simulque nonnihil stimulat Renes acrimonia

monia volatili, ut ſub exſiccione Glyſmatis irritetur calculus propter contiguum ſitum: Vel

℞. Herk. violat.

Malva,
Parietar.

Flor. chamom. ana M. i.

Coqu. in l. q. Urinae humanae:

Colaturae addde

Olei Lil. alb. ℥℥.

deſtillat. ſuccini gutt. x.

M. pro clyſmate:

D. S. ut ſuprà.

Vel

℞. Flor. chamomill. M. ii.

Herk. Peren. M. i.

Rad. alth. ℥vi.

Liquirit. ℥℥.

Coqu. in Lacte vaccae:

In Colaturae ℥vi. vel vii. diſſolve.

Elſt. leniv. ℥i.

Terebinth. cum Vinell. Oviſol. ℥℥.

Olei ſil. alb. ℥vi.

M. f. Enema emolliens. S.

Glyſter Emollient.

Vel

℞. Flor. chamomill. M. ii.

Herk. Peren.

Charſoll. ana M. i.

Bacc. junip. ℥i.

ſem. Dauci ℥℥.

Coqu. in l. q. Urinae porci:

In Colaturae ℥℥. diſſolve

Terebinth. cum Vinell. Oviſol. ſol. ℥℥.

Olei ſcorpion. ℥℥.

deſtillat. Bacc. junip. ℥℥.

M. f. Enema magis diſcreticum: S.

Glyſter calculum promovens.

Vel

℞. Decoſt. emollient.

Carminat. ana ℥i℥.

Terebinth. cum Vinell. Oviſol. ℥i.

Olei deſtillat. Terebinth. ℥℥.

Miſceantur pro Clyſmate:

D. S. ut ſuprà.

Vel

℞. Spec. Emoll. M. i℥.

Sal. tartari ℥i.

Coqu. in l. q. Aquae:

Colaturae ℥i. addde

Terebinth. cum Vinell. Oviſol. ℥℥.

M. f. cly ma:

D. S. ut ſuprà.

℞. Spec. Emoll. M. i.

Bacc. junip. ℥i.

Rad. liquirit. unc. ℥.

Coqu. cum l. q. Aquae:

Colaturae ℥vi. addde

Elſt. leniv. unc. ℥.

Terebinth. cum Vinell. Oviſol. ℥i℥.

M. pro clymate.

D. S. ut ſuprà.

Vel

℞. Decoſt. Fl. chamom. unc. vi.

Urinae humanae. unc. i℥. addde

Oleideſtillat. Terebinth. aliquot guttas.

M. f. Enema.

Aut ſi contumacia ſit Alvi obſtruſio:

℞. Laſt. kahal. vel Decoſt. Flor. ſambuci aut Chamom. cum Laſt. unc. vii. ad ℥i. addde

Terebinth. cum Vinell. Oviſol. ℥i. vel ℥i℥. ad ℥℥.

Mat. violat. vel ſac. ℥vi.

Miſc. f. enema pro una vel duobus vicibus applicandam.

D. S.

Glyſter aperiens & calculum promovens.

Vel

℞. Spec. carmin. m. ii.

Coqu. in Urinae humanae. q. ℥.

Colaturae unc. vii. addde

Oi. deſtill. terebinth. ℥i.

Miſc. ſut clyſter:

S. ut antea.

Vel

℞. Spec. Emollient. M. i℥.

ſem. quatuor calid. maj.

Sal. tartari an. ℥i.

Coqu. in l. q. Aquae ſimplic.

Colaturae unc. i℥. addde

Elſt. leniv. cum Aquae. unc. i.

Olei deſtillat. terebinth. ℥i.

Viſell. Ov. Num. i.

M. pro clyſtere:

D. S. ut ſuprà.

Vel

℞. Olei Lil.

Rapar. an. unc. v.

M. pro clyſtere.

D. S. ut ſuprà.

Addi etiam poteſt Elſt. Di. Calam. ℥vi.

Post clysmata dolorem & ſpasmus partium internarum insigniter leniunt *Elſt. & Fomenta*, ſi nempe iſdem inſiſtens *Ager*, ex vegetabiliſſima Emollientibus, Carminantibus, Nervinis, nonnihil diſcretis, vel ſic diſtis Lithontripicis parata. Sic quoque ſufficere poſſunt Balnea Aquae tepidae, quibus inſiſtent aliquando *Ager*: loco eorum tamen fieri poteſt balneum Medicatum ita:

℞. Herk. Malva,

Alth.

Parietar.

Mercurial. an. M. ii. vel i℥.

Flor. Chamom.

Sambuc. an. M. i℥.

Bacc. junip. unc. i℥. i℥. ad unc. v℥.

ſem. Lini,

Fennugraci an. unc. i℥.

Incluſa omnia duobus Sacculis ſineis decoqu. in aqua: Cui *Ager* uſque ad diaphragmatem regionem inſident, Dum vero inſidet, obſervetur; ut diſti ſuccali balneo incoſti admoveantur regioni Lumborum, & anteriori Umbilicali regioni.

Vel

℞. Herk. Malva,

Alth.

Parietar. ana M. i℥.

Summit. chamom. M. iv.

ſem. fennugraci unc. v.

Bacc. junip. ℥i℥.

Inciſ. & contul. D. S.

Herbz contra Dolores Calculi.

Decoſta tepida inſidet *Ager*. Vel

℞. Herk. Malva,

Parietar. ana M. i℥.

Summit. Aneth.

Flor. chamom.

Mallico. an. M. ii.

Rad. Alth.

Lil. alb. an. unc. vi.

ſem. Lini

Fennugraci an. ℥i℥.

D. S. ut antea.

Species pro Balneo.

Vel

℞. herk. Malva,

Mallico.

Flor. chamom.

Sambuc. an. M. i. ad M. i℥.

ſem. Lini,

Fennugraci an. unc. i. vel unc. ii.

quatuor. calid. maj. an. unc. ℥.

D. S. ut antea.

Inciſa & contula M. f. Sacculi Num. ii.

Qua calidi, vel ſicci, vel in Lacte coſti, applicandi Lumbis pro doloris ſolatione.

Vel

℞. herk. Malva,

Alth.

Parietar.

Flor. Chamom.

Sambuci an. M. i℥.

Bacc. juniper. unc. vi.

Inciſa & contula in clud. duobus ſacculis.

D. S. ut antea.

Coquantur in Aqua pro Balneo: ſacculi admoveantur regioni Lumborum & regioni anteriori Umbilicali, ot dolores, & ſpalmi remittant.

Quibus vero diſpiciunt Balnea, iſis ſufficiunt *Tons. humi-* di cum ſacculis inſtitui: e. gr.

℞. Herk. & Flor. Chamom.

Salv.
Serpilli, ana M. l.
Rad. Juniper. ℥i.
Sem. anis.
Anethi an. ℥i.
Iocif. includ. faccal. No. l. D. S.
Fetus Leniens.
Vel

℥. *Norb. Charafel.*
Parietar.
Fior. Sambur.
Chamom. ana M. l.
Sem. Lin. ℥i.
Fiant facculi aut Fotas.
D. S. ut antè.

Prætereà cum his Potibus & balneis blanda diætetica, Interdum Calicolum nonnulli stimulantia, usurpanda, ut scilicet sub ista lumentationibus calculus simul promoveatur per ureterem nonnulli flaccidum.

Post balnea, vel etiam hæc his, conducant *inunctiones* antea ad emolliendas partes & spasmos Ureterem distendos, doloresque leniendos, que sicut ex emollientibus suaviter laxantibus & lenientibus: quibus interdum penetrationis gratia addenda sunt Olea quædam destillata, partim servina, propter partes membranaceas in & circa Renes (palmo affectas, partim diætetica, ut blandè promoveatur urina & calculus, cum Oleo Amygdalarum dulcium Papaveris, Hyssopiani, Chamomillæ, Scorpionum, Liliorum alborum, unguento Dialthææ, modula Cervina, ploguedio asferina, Oleo spicæ, petæ albo, Baccarum Juniperi, faccini, terebinthinae, Camphoræ, &c. v. gr. fiat Linimentum Emolliens.

℥. *Ungu. Dialth.*
Olei scorp. vel *expres.* sem. *Hyss.* ℥i.
M. pro linimento: S.
Unguentum leniens.
Vel

℥. *Ungu. Dialth.* ℥i.
Olei Amygd. amar.
Scorpion. an. ℥i.
Petræ. ℥i.
M. pro linimento.
D. S. ut antè.

Cum his crebrius locus dolens circa Lumbos, regionem umbilicæ, abdomen, & doctum oreterum allinatur; potest etiam illiniri regioni umbilicali. Additur huic compositioni merito *Petræolum*, quod merito à PANAROLLO Part. 2. Ol. 2. seu externum remedium nobile mirè commendatur, & calculum immuere creditur, ubi tamen iussit, si modo promoveat eum: e. gr.

℥. *Petræ.* alb. ℥i.
Olei Juniperini vel *Terebinth.* ℥i.
M. D. S.
Oleum calculum promovens.
Vel

℥. *Ungu. Dialth.* ℥i.
Olei Scorpion. ℥i.
Terebinth. ℥i.
M. pro linimento: S.
Unguentum calculum promovens.
Vel

℥. *Unguent. Dialth.* ℥i.
Olei Petæ. alb. ℥i.
Misc. pro linimento:
D. S. ut antè.
Etiam ℥. *Olei spicæ*
addi potest.
Vel

℥. *Unguent. papal.* ℥i.
Olei Scorpion. ℥i.
M. D. S. ut antè.
Vel

℥. *Olei Lil.* alb.
Chamom. an. ℥i.
Petræ. alb. ℥i.
Ol. destillat. spicæ.
Bacc. Junip. an. ℥i.
M. pro uso externo: S.
Oleum leniens, & promovens.
Vel

℥. *Ung. dialth.* vel *anodyn.* ℥i.
Olei Amygdal. dulc. ℥i. (vel *Junip.* & *Lil.* alb.
ana ℥i.)

Scorpion. dr. ℥i.
Petræ. alb. dr. i.
M. pro linimento: S.
Unguentum leniens, & promovens.
Addi pro lubitu potest
Olei destillat. Bacc. Juniper. dr. ℥i.
Vel

℥. *Ol. amygd. amar.*
Chamom.
Lil. alb.
Scorpion. ana dr. ℥i.
Petræ. alb. dr. ℥i.
destillat. spicæ.
Bacc. Junip. ana dr. ℥i.
M. D. S.
Oleum ut antè.
Vel

℥. *Olei amygd. amar.* ℥i.
Pinguet. Gallin. dr. vi.
Petræ. alb. dr. i.
Ol. destillat. Bacc. Juniperi dr. ℥i.
M. f. linimentum: S.
Unguentum ut suprà.
Vel

℥. *Olei Petæ.* alb. dr. ℥i.
Papav. expr. dr. ℥i.
Hyssopiani expr. dr. ℥i.
M. pro linimento anodyno
D. S. ut antè.
Vel

℥. *Ol. Papav. ros. expres.* ℥i.
Hyss. expr. dr. i.
destillat. Turcin.
Mais andr. ℥i.
M. S.
Oleum dolores sedans.
Vel

℥. *Ol. Petæ.* alb. dr. ℥i.
Sem. parav. vel *Hyss.* expr. dr. ℥i.
destill. *Jusculi* dr. ℥i.
M. D. S.
Oleum leniens.
Vel

℥. *Ungu. Dialth.* ℥i.
i. l. *Petræ.* alb. dr. ℥i.
Juniperi dr. i.
Ess. Opii dr. ℥i.
M. S.
Unguentum leniens.
Vel

℥. *ung. dialth.* vel *Seri. Ceru.* ℥i.
Olei Petæ. alb. dr. ℥i.
destillat. Junip.
Camphoræ an. gutt. x.
Opii ℥i.
M. D. S.

Unguentum leniens & calculum promovens.
Vel

℥. *Ungu. nervin.* dr. iii.
Olei expres. *Hyssopiani* dr. i.
destillat. terebinth.
Juniperi an. dr. ℥i.
M. S. ut antè.
Vel

℥. *Ungu. dialth.* ℥i.
Olei Lil. alb.
Amygd. dulc. an. ℥i.
Scorpion. ℥i.
Petræ. alb. dr. ℥i.
destillat. Juniperi ℥i.
M. D. S.

Unguentum dolores sedans.

SCHARFIO lib. 2. de usu Juniperi pag. 172, in usu fuit sequens:

℥. *Olei Scorp.*
Melisse.
Chamom. an. ℥i.
Amygd. amar.
Aril. cyasfati an. ℥i.
destill. *terebinth.*
Juniper. an. ℥i.
Petræ. alb. ℥i.
Misc.

Vel
 2℥. *Ol. Amygd. dale.* 3℥.
distillat. succini 3℥.
 M. D. S.
 Oleum Leniens.

Vel
 2℥. *Alci communis* 3℥.
 Subige cum l. q. *Butyri non salis* in confusentiam
 Unguenti S.
 Unguentum leniens.

Vel
 2℥. *Unga. dialth.* 3℥.
Ol. Lil. alb.
Amygd. dale.
Myriciam exs. an. 3℥.
Scorpiu. 3℥.
distillat. succini 3℥.
 M. f. Linimentum.

Pertinet etiam huc *Linimenta Membr. antrod.* ubi de *Ichthura Renali*, præscripta: Vel

2℥. *Unga. Rosat. camp.* q. v.
 addit

Laud. opari. q. f.
 M. f. linimentum:
 D. S. ut suprà.

Pertinet huc Unguentum Nephriticum *Myrsobasi*, & eius *Andryum*; item Unguentum hoc, quod commendat CRATO.

2℥. *Unguent. rosat.* unc. 5℥.
Ol. Amygd. amar.
Scorpiu. simpl. an. 3vi.
Amygd. dale. unc. 5℥.
 M. i. Unguentum.

Quin etiam dictis Unguentis oleum Camphoræ convenienter addi potest, vel genuinum, vel per dissolutionem Camphoræ in Oleo Amygdalarum dulcium paratum, quod est egregium: Nam Camphora peculiarem vim diureticam, passis notam, obtinet. Addi etiam potest oleum distillatum Cumini, Oleum distillatum Baccarum Juniperi, Oleum Terebinthinae, seu Remedia nervina, admodum grata, item oleum distillatum succini quoque addi solet; sed quia est nimis penetrans & diureticum, metus est, ne exasperet Dolorem. Similia ergo linimenta crebrius usurpentur, illinendo regioni lumbari vel Umbilicali. Justa hæc conducit Emplastrum de Meliloto, cum Oleo Chamomillæ, & Anethi malaxatum, addendo oleum Cumini, & Petroleum regioni lumborum applicatum bene confert.

Vel
 2℥. *Empl. Nephrit.*
Tacamah. an. 3℥.
Balsam. peruv. 3℥.
 M. pro Emplastro.

Extendatur super *Alutam in forma quo adnotat*
 D. S.

Emplastrum Leniens.

Item si *Renam Caler interius*, præparatur Cataplasma *Crocæis*, quod hic maxime commendant, ex Cancris flavatilibus eorumque succo, subactis cum oleis blandè emollientibus: vid. CRATO lib. 5. cap. 17. Nempe

2℥. *Cancer. flaviat.* an. 3.
 quot contulos coquit in Lacte, & succum fortiter exprimit:

Medulla panis albi unc. 3℥.
Yucc. Ovar. No. 11.
Butyri ros.
Ol. chamom. an. unc. 1.
 Crui 3℥.

Mile, pro cataplasmate applicando.

Sicuti & BRUNNERUS simile Cataplasma ex Cancris confectum cum Malva, raphano & parietaria, pro lenendo dolore, & eodem nonnihil moderando, subactum, regionem renem applicatam, admodum commendat in Paroysimo nephritico, de quo vid. SENNERIUS pag. 114. Item Cataplasma ex Medella panis albi cum lacte. Huiusmodi lixiv crebè renoventur calidi superimponeudo postmodum facculis, aut etiam post balnea eadem illiniri soletur.

Cum his & similibus Externis, etiam *Internis* Malo proficiendum: & quidem, ubi dolor est remissior, aut nonnihil placatur, (hæud citius videat. RIVERIUS pr. lib. 14. cap. 1.) primæ viæ repurgatæ, & acrimonia humorum temperata, blanda tunc *Diuresis* conveniunt, qualia sunt

Tindura Nephritica, spiritus carminatives de Tribus spiritibus Nitri dulcis, &c. de quibus infra, cum aliis interius usurpentur. Interdum ergo in principio convenit blanda aliqua *Laxatio*, primas vias abstergens, respiciendo tamen simul nonnihil Reines, & modicè Calculi excretionem irritando: &c.

2℥. *Tartari viriatis.* gr. xii. ad xv.
Salt. Guss. gr. iii. iv. v. vel vi.
Scamm. rosat. gr. iii. vel iv.
Ol. distillat. Juniperi, vel *Terebinth.* gutt. i.
 M. f. Pulvis in principio Paroysimi assumendus: S.
 Pulvis Aperitivus.

Vel
 2℥. *Arcan. dupl.* gr. xii.
Scamm. prop. gr. iii.
 M. f. Pulvis: S.
 Pulvis Laxativus.

Vel
 2℥. *Corall. rub. prop.*
Maxill. Lucii pjs. an. 3℥.
Aurif. salm. gr. v.
 M. f. Pulvis.
 M. S. ut antè.

Detur in Jusculo calido.

2℥. *Rad. alth.* 3℥.
Helleb. nig. 3℥.
Zingib. gr. xii.

Tartari viriatis. gr. xvi.
 Coqu. in l. q. Aquæ;

Colaturæ adhuc calidæ infundatur per noctem in loco calido.

Rhabarb. elect. 3℥. ad 3℥.
 Mane iterum colet, & addatur
Syrupi Damasc. 3℥.
 M. D. S.
 Potio Laxativa.

Vel
 2℥. *ros. mia. camphor.* unc. ii.
 Ebull. in l. q. *Aqua simpl.*
 Colaturæ ferventi infunde per noctem.
Sol. sem. fusc. unc. 5℥.

Crem. tartar. 3℥.
 Mane ebulliat paulatim.
 Colatura D. S.
 Potio laxans aperitiva.

Vel
 2℥. *Syr. de ribes.* cum *Rhab.*
Spina cerv. an. unc. 5℥.
Scamm. prop. gr. iv.
Aquæ rosat. 3℥.
 M. D. S.
 Succus Laxans aperitivus.

Vel
 2℥. *Psyll. min. laxat.* unc. 5℥.
Lapil. cancer. prop.
Arcan. dupl. an. gr. v.
 M. S.

Pulsula Laxativa.

In specie etiam pro tali scopo conveniunt imprimis *Terebinthina* in principio, Alvum simul moderatè laxantia, & simul renibus calculis insigniter conducencia: hinc Piliule ex terebinthina cum rhabarbo usitatissimè in principio affectus præscribantur; Rhabarbarum enim à PARACELSO singulariter ælimatur. Item sunt Emulsiones ex Terebinthina, de quibus heri dixi, aut sunt pilule de Terebinthina *Myrsobasi* præscribendo a 3℥ ad 3℥. pro dosi: item Catharticum Terebinthinatum *Myrsobasi*. Nam certum est, quod Terebinthina insigniter conveniat in nephritide: sic enim FORESTUS lib. 24. observat. 10. observat Matronam Calculo Renum & morbo articuli affectam, quæ imprimis terebinthinæ usu fuit curata: item FONTANUS in *Compl. & rebus* pag. 116. refert septuagenarium Dolore Nephritico diu caecratiatum, qui tandem usu Terebinthinae Venetæ exedone quantæ Lapidem fuit curatus. In quem finem terebinthina leniter inspissata in Piliulas redigi potest, ita ut singulo 3℥. vel 3℥ gr. iii. vel iv. *Scammæ* simul permisceantur: quæ ipse ita parat pro dosi in Vehiculo assumptæ, in principio paroysimi sunt egregiæ: &c.

2℥. *Terebinth. col.* 3℥.
Tartari viriatis. gr. vi.
Scamm. prop. gr. iii.
 M. f. Piliulæ: S.

Pili.

Pulvæ Laxativæ.

Vel Sant Pulvæ ex Terebinthina, Succino & Rhabarbaro à PARACELSO laudatæ: vid. HOFERUS in *Herold*, 172d. pag. 275.

*℞. Terebinth. par. ℥i.
Rhabarb. pulv. ℥i. ad ℥i.
Succini præp. ℥i.
Cinnam. ℥i.*

Cum f. q. Olvi Terebinth. f. Pulvæ pro aliquot doſibus,
Vel

*℞. Maſſa Pilular. de Terſh. com Rhabarb. gr. xvi.
Tartari vitriolat. gr. vi.
Trach. Alband. gr. ii.
F. Pulvæ;
D. S. ut ſuprà.*

*℞. Maſſa Pilular. de Ann. gr. xv.
Tartari vitriolat. gr. v.
Kassai, Trach. Alband. gr. i.
Cum Effent. Menth. f. Pulvæ,
D. S.*

Pulvæ Laxativæ.

Nam Purgantia fortiora nullo modo conveniunt in principio Affectus Calculi.

Sic etiam convenit Emulſio Seminis Violarum Nephrocathartica, cum Aqua Veronica, aut cum alia Aqua appropriata, in ſpecie hedera terreſtris, cujus ſuprà Membris Antea de ſcibaria mentio facta, quæ ipſa ſecura poteſt dici Nephrocathartica: præſcribitur à ℞i. ad ℥i. in principio Paroxyſmi ophethici: Cui propter Doluris rationem & Pauperem ſimul addi poſſunt; c. p.

*℞. Sem. Violar. ℥i. vel ℥i.
Melli Solis,
Papav. albi an. ℥i. ad ℥i.*

Cum f. q. Aqua Alkekeng. vel Menth. vel Fragor. vel Verca,
f. Emulſio ad ℥i. vel iv.

*addo
Aqua Cinnamom. ℥i. vel ℥i. ad ℥i.
Lapilli, Ferrar. præp. vel Cancrar. præp. ℥i.
vel ℥i. ad ℥i.
Sacchari parum,
M. D. S.*

Emulſio Nephrocathartica,
Vel

*℞. Amygd. dulc. Ambrof.
Sem. Melon. an. ℥i.
Violar. præp. ℥i.*

Cum f. q. Aqua Mentha & Fragor. f. Emulſio ad ℥i.
addo
Lap. Ferrar. præp. ℥i.
Sacch. parum,
M. S.

Emulſio Aperitiva pro aliquot vicibus,

Conf. M. A. N. C. Ann. 6. obſerv. 102.

Evacuatio ita primis viis, & ſublaris impedimentis, dum adhuc urget Doler, & hæret Calculus, propinanda talia, quæ quantum poſſibile eſt, Dolorem tollere poſſunt; Vel

*℞. Olii Amygd. dulc. rec. extref. ℥i.
deſtillat. Macti ℥i.*

M. S.

Oleum Lenitivum.

Cum quibus tamen ſimul ad acrimoniam humorum temperandam reſpectus habendus, Opiata ergo conducunt, ſed Appropinquata miſta, in ſpecie ubi urgens graviora ſymptomata ac proinde proſtat Eſſentia Urinaria anodyna D. Michael ex Vegetabilibus ſcilicet diureticis cum ana opii & ſalis Tartari, quibus Aqua aſſunditur: ſem in digeſtione, deinde evaporatur & ſuperfunditur Spiritus Vini: Item accipitur Malvaticum Juniperinum cum Eſſentia Opii miſtum, de quo cochleatum hauſtatur ad ſuſſendos Dolores, & mitigandum Paroxyſmum.

Vel

*℞. Lapilli. Cancr. præp. ℥i.
Cinnab. Animoniæ vel nat. (propter ſpasmus partium internum) ℥i.
Laud. opiat. gr. i. vel ii. (vel Pulv. Anodyna, Ludov. gr. iii.)
M. f. Pulvis;
Pulvis Lenitivus.*

Detor pro dñi in graviore Paroxyſmo.

De his vid. in ſpecie LUDOVICI in *Phar.* p. 449. & *Jelleg. Phar. matricia Ludovic.* Vel ad imitationem WEDELII:

℞. Lapilli. Cancr. præp.

*Sperm. Cori an. ℥i.
Sal. volat. ſuccin. gr. v.
Laud. Opia. gr. i. vel ii.
M. f. Pulvis;
D. S. ut ſuprà,
Vel*

*℞. Lapilli. Ferrar. præp. ℥i.
Cinnab. Animoniæ,
Sol. volat. ſuccin. an. gr. xii.
Laud. Opia. gr. iii. ad v.
Muc. pro 3. doſibus,
D. S. ut ſuprà,
Vel*

*℞. Aqua Petrosel.
Alkekeng. an. ℥i.
℞. Opii ℥i.
Syr. de Alth. Terrelli ℥i.
M. S.*

Miſtura Dolorem ſedans.

Inſuſ Opiatorum ſimul cauti, ne iſdem abutatur.

*℞. Tinſtura Baſſ. Peruv. vel Capivi cum Tinſtura
Tartari par. ℥i.
Eſſent. Opii ℥i.*

*M. D. S.
Tinſtura Calculum leniens,
Detor an. guttæ pro doſi,
Vel*

*℞. Tinſtura Tartari acerr. vel compoſ. vel Rhabarb.
Tartariſ.
Spiritus Carminat. de Trib. an. ℥i.
Eſſent. Opii tartariſ. ℥i.
M. S. utantè,
Vel*

*℞. Milleped. viv. No. xii.
Contunde cum Tinſt. Terr. acerr. ℥i.
ſiltratæ addo
℞. Opii ℥i.
M. S. ut ſuprà.*

*Doſis 30. vel 40. guttæ.
Vel*

*℞. Olii deſtillat. Terebinth.
Bacc. Janq.
℞. Opii an. ℥i.*

M. S.

Oleum Calculum promovens pro aliquot vicibus
Ubi Dominus ſimul & ſingulat:

*℞. Extr. Acerr. veri gr. xvi.
Caſter. vel Zedair. gr. iv.
Laud. Hyſſer. gr. v. vel vi.
Cum Olii Terebinth. f. Pulvæ & S.
Pulvæ Stomachales & Calculum lenientes,
Vel*

*℞. Aqua Menth.
Mellif. cum Vino,
Cinnam.*

*Carbunc. an. ℥i.
Spiritus Cocklear. ℥i.
Tartari vitriolat. ℥i.
Laud. Opia. gr. ii. vel iii.
Syrup. Cori. Auranc.
M. D. S.*

Miſtura Stomachalis & Calculum leniens
cochleatum ſumenda.

Vel

*℞. Aqua Fragor.
Alkekengian. ℥i.
Cinnam.*

*℞. Cancr. ℥i.
Trib. Over. calcin. ℥i.
Niri depur. dr. ℥i.
Laud. Opia. gr. ii. vel iii.
Syr. de Alth. Form. dr. vi.
M. S. ut ſuprà.*

*℞. Lap. Ferrar. præp. ℥i.
Pulv. Epilept. animoniol. gr. iii.
M. pro Pulvere;
Div. in 3. part. æqual. S.
Pulvis Leniens,
Vel*

*℞. Lap. Cancr. præp. vel Corall. rub. præp. ℥i.
Auri Diaphor. gr. xv.
Camph. gr. ii. +*

M. pro

M. pro Pulvere.
Divid. in 2. part. aequal. S.
Pulvis Leniens contra Calculum.
Vel

℞. Corall. rub. prop.
Lap. Perlar. prop. an. gr. xlv.
Auri diaphor. gr. xii.
Camph. gr. iiii.
Muc. pro Pulvere.
Div. in 2. part. aequ. S. ut ante.

℞. Corall. rub. prop.
Lap. Perlar. prop. an. ℥ss.
Salis Genui. gr. lv.
M. S.
Pulvis Sodas.
Vel

℞. Tacamahac. part. ii.
Bals. Peru. part. i.

F. Emplastrum Stomachale in forma ostiata adque
Sindone: S.

Emplastrum Stomachale.

Mulier quædam, alias Nephritica, coquebat aliquan-
diu de Appetitu prostrato, cum carnis nausea & potus con-
sueti fastidio, adeo ut ipse Conceptionis conceperit: sed
post supervenientem Menstrum fluxum prehensum tam a-
cerbi dolores in Lumbis lancinantes, & ad Pubem usque
excurrentes, cum tali crurum tremore, qualis alias Puer-
peris sub partu labore accideret solet, & ita summo quasi
parturientiæ conatu nihil aliud, quam Mucosa sum-
mo cum dolore, una cum Urina, excrenebat, ita ut quo-
ties Urinam emitteret, Mucosam tale quid unâ eliminaret:
stimulus pro Urina admodum erat frequens; dum excrene-
bat; dolorem dictum percipiebat, & etiam dum non ex-
crenebat, subinde excretorios illos quasi puerperiales expe-
riebatur conatus; Urina emissa erat minus tincta, aliquan-
tisper turbida cum sedimento copioso, viscido, albedo, non
tamen purulento. Indicabam; Malum esse Nephriticum,
nam primitus occasione calculi Renalis, & inde produ-
cti erosio in pelvi membranacea; uno idem calculus
ulterius progrediendo affricu suo læsere plus minus vesicæ
eolium; quo facta fuit, ut non solum dictarum partium
degener Nutritum chylosum tam copiosi Muci speciem
suggereret, sed etiam imprimis ea irritatione Vesicæ dolo-
ros excretorii conatus supererigeret: ob id pro abstergen-
dis his locis & mitigandis symptomatibus, præmissis Clyma-
te:

℞. Aqua Charafel.
Alkaken. an. ℥ss.
Auri Vini ℥iij. ad ℥ss.
Lapilli. Cæmur. prop. ℥i.
Laud. Opit. gr. iij.
Syr. Rader. terr. ℥vi. Mifc.

Capiebat cohibeat, quod factum cum euphoria, & sym-
ptomata Lumborum maximam partem levata fuerunt. Hinc
pro istis scopis præcipi:

℞. Massa Pilular. de Terabint. Smp. ℥iij.
Div. in 2. part. aequ.

Cepit, bene habuit, symptomata plerumque evanuerunt:
sed natus Vesicæ excretorios subinde rediit, calculo nempe
in Vesica existente, uter mucosa materia multum im-
mineretur, ne tamen foras exulceratio colli Vesicæ su-
perveniret, præcipi:

℞. Mfct. Hyper. ℥iij.
Dabam pro una dosi.

Aqua tamen nullam utilitatem percipit. Ob id Balsamo
Sulphuris terribinatio uti jubebam: sed antequam hunc
amitteret calculus oblongus cum Urina una emittebatur,
unde levamen insignis in omnibus. Pariter tribus ab hinc
diebus cum continuato fuisse Balsami usus, adhuc aliq-
uid minor, calculus prodit, post cujus excretionem adhuc
Muci aliquantulum rexydum fuit, sed quod brevi cessavit.
Pro reliquis ergo nephriticis removendis spiritum Salis
Ammoniaci aliquandiu continuavit, qui ipsi optime con-
tulit.

Oleum Amygdalarum dulcium, vel cum vel sine lapide Per-
carum, & Syrupus de Althea Feracis, (quod nonnulli etiam
cum succo Citri aut Limonis miscunt) similiter in usu est.
Emulso ex Amygdalis dulcibus, & seminibus dictis qua-
tuor frigidis majoribus, Violarum, Nucini Pericorum, &
similibus, quibus lapides Percarum, aut Lapilli Caor-
curum addi solent, subinde in hoc casu in usu sunt, quæ
hauriuntur ad dolorem leniendum, & blandè Urinam cien-

Tom. II.

dam; potissimum si hujus Emulsioni aliquod Papaveris al-
bi, hujus Syrupi, aut Laudani Opitaci addatur; Nam hæc
Narcotica ipsam Renum horumque Mearum non tan-
tum medentur, sed Somnum inducendo spiritibus robur ad-
ducunt, hinc excretionem Calculi insigniter juvant: vid.
HOFFMANNI M. M. pag. 437. & DECKERS Error.
Præf. pag. 636. Item Decoda Emollientia, simulque Ano-
dina, blandè temperantia, & Urinam pellentia, quorum
Formulam vid. in BARRETTÆ Præf. ubi de dolore N-
phrit. Ad imitationem hujus

℞. Rad. Alth. ℥i.
Liquirit. ℥iij. vel ℥ss.
Herb. Malva M. l.
Sem. Violar. ℥ss. vel ℥vi. ad ℥ss.
Coqu. in l. q. Duroff. Herd.
Colaturæ Bif. ad Bif. adde
Syrup. Papav. albi vel errat. ℥ss. ad ℥iij.
(vel de Jupah.
Violar. an. ℥ss.)
Lapilli. Cæmur. prop. ℥i.
M. D. S.

Potio Lenitiva Urinam pellens.

Instat omnium etiam hic convenit Decodum expertum
FORESTI, quod præscribit lib. 2. Obs. 26. 27. & 28. &
descriptum prostat in SENNERIO lib. 3. Præf. ubi de
Calculi Renum, pag. 112. quod Decoda curatæ Vurum de-
scripta Suppressionis Urine ex Calculi Renis similiti Ureteri
impulso laborantem cum intensissimis doloribus, tamna
virium prostratione, & cum jam per sex dies non guttulam
quidem urine emisisset, insuper hoc Decodo Foresti, Urina
consensim emissa, & Lapilli cum impetu protrusi, &
Eger curatus fuit. Præscripiti est hæc:

℞. Sem. Malva.
Alth. an. ℥iij. ad ℥iij.
Cicor. rub. ℥iij.
quantor. Frigid. maj. an. ℥iij.
Herb. ℥iij.
Cicor. piagu. No. viij.
Scleroph. No. viij.
Rad. Liquirit. ruf. ℥vi.

Coqu. in Aqua Bif. ad dimid. partis consumptionem.
Sicuti Decodum non incongruum à ZWELFFERO cor-
rectum videt. in Pharmacop. Ræf. pag. 12.

Ad imitationem ergo hujus Similis Composita possunt
parari.

Addi simul possunt Decoda hanc certa proportione vel
Racca Juniperi, vel Summi Hyperici, aut Senni Dani, vel si-
milis, quæ illud magis appropriatum reddere valent. Deri-
vum Plenum Chamemilla singulariter excellit in Parosym-
nephritico (vid. SIMON PAULI Quæd. Botan. pag. 235.)
& Veronica, quod CRATO l. a. extollit. Item hujus loci
est Decodum Nymphæ, quo oib. promptus ad Ureterum
contractum laxandam, & dolorem placandum in Parosy-
mophritico à TACHENIO Hippoc. Meth. cap. 14.
pag. 97. Edut. 2. extollitur. Præterea non inconlultum est
Consilium TIMEI quo Quind. lib. 2. jubentis, ut omni
haustu Decodi cujusdam addatur aliquot guttes Spiritus
Salis dulcis communis, cum hujus vis egregie sit diuretica.
Sanè spiritus Salis extremo igne proleclus, adeoque acido-
sissimus, singularis est ad promovendum & refrigerandum
Calculus: vid. TACHENIUS l. a. n. 10. Inflammatio æque
erosio partium subit; loco quo tamen & spiritum Ni-
tri à SYLVIO tanti estimatum, utrumque vel simplicem,
vel dulcem, commodè potius uteremur, qui magis est diu-
reticus. RHUMELIUS recipit spiritum Salis, miscet cum
salu volatili Succini, coagulati in formam crystallinam, &
potentissimum est Nephriticum diureticum.

Quibus ita peractis, si immineat dolor, & Calculus
ulterius promovetur, res bene est: ubi vero, licet dolo-
ribus aliquis pathematis plus minus placatis, Calculus vel
in Renibus, Ureteribus, vel Vesica, adhuc hæret, hæc ac-
cessus ad ea, quæ Diuresi blanda & speciosa urinam promo-
vere possunt aut, si grandior, propensior ea erunt, quæ
Lapillum, quantum possibile, diffingere valent, ut ita con-
tractus & comminatus est commodius possit propelli.

Subtilissimus heri in cura, quæ pertinet ad calculum, &
dictum fuit, in Parosymio esse efficendum, ut calculus
promoveatur, minima tamen molesta, unde tam internam
quam externam dolor demulcendum: Et his sedis propensio-
da, quæ vi diuretica polleat, & simul cum Urina pellant
calculum; aut loco horum dentur simul Libriontriplex seu
calculus frangeantia. In heram tamen n/ in hoc obferendum,
ut ubi ad tempus fuisset adhibita fuerint medicamentis, sub-

Ffff

614.

filare, & quā feruē permittantur Naturæ, ne illo uis
nimis pā, quam par est, ad Renes moueantur erudites.
Galenus cū hoc in loco *Offert*. EPIPHANI FERDI-
NANDI *lib. 54.* ubi dicit, inuolubilis lege obseruandum
esse, ut quāquā a tūmedia abstineamus, dum refert ex-
emplum doloris Nephretici, pro quo post novem dies & no-
ctes plura remedia propinata & applicata abijit ubi uis
effusa: sed cum postmodum per 10. & 17. quies Naturę
tulisset resolu, hæc ipsa sponte sua sub fine undecimi plures
Calculus recipiendo, & cum liberavit. *Diarrhetia* bajulans
uisantur in specie in *Parasym calcis*, sub intritu
Renes: vid. RIVERIUS *1.4.*; ut dum hujus uia relaxan-
tur uiz & demulcentur dolores, illorum ratione melius
promoueatur Calculus: Sic etiam blandus *Motor Corporis*
Calculi defectionem Renibus promouet, qui alius a *Gaul-
dia* in exitu promouetur, a motu uero vel tertia retarda: uti
Coul. *Art. Med. Hagrefin.* Vol. 3. pag. 33. Sunt qui *Pomina*
eundem in finem commendant, sed non sine notabili meli-
ora & periculo: vid. BARTHOLINUS *2798. 55.* Cau-
tius quoque Diarretici utendum, si mēis cruentis com-
binetur, præcipua calidioribus & aromaticis, habebuntque
tunc potius locum Terrę & Emollientia blandiora: Com-
mendat eundem in finem FORTIS C. 3. *Cens. 95.* Ther-
mas vitriolatas asstringentes æquę ac Calculum promouen-
tes: Alii non ubique terrarum hæc prælo sunt.

Dissectis tamen libris, longè præteritis sunt *Librorum* propria dicta, in quibus ipsos coningentia remedia (M), de eorum exegitibus, et de eulibus, speciatim *SYLVIA* dicta, et *Caf* et *PANAROLLUS*, *Offid*, alique magis nomina Medici. Ied nimirum *Chy* mix (ign. ti), iane ridet eos, qui dicunt. Calculum in Corpore humano Emu compa huius iterum posse dissolvi, vel in minores particulas defringi. Et iane res non caret verapulo, utut simpliciter non neganda, licet rara fin, subtiliora talia trospida, quæ revera calculum confingunt.

Difficillitas prima, ob quam impediēdis videtur calculi solutio, est: *quia est concretum Terres salfum, & duobus falibus, Alcali & acido volatilibus, firmiū tamen nexū juncta, oriundū, intercedente substantia* quādam Terres firmiter coagulante, adeoque nec *acida* nec *alkalia* cum dissolvere possunt, quia calculus est verissime et saturatus, & tanquam ex ambobus compositus, unde difficile videtur reperiri tale Menstruum, quod concretum tale salfum adeo litrum, æqualiter de Acido & Urinæ participans, in Corpore comminuet & dissolvat, utpote cum talia concreta se equaliter miscere Menstruis acidis & uriosis, neque tam ab illo possunt perficte dissolvi. Necessē ergo est, ut remedium calculus frangens ita fit constitutum, ut ferat de utroque, Acido nempe & Alcali, participet, ut ita Concretum tale salfum penetrare, & illud amica sua vi denū blandē, & ita quasi liquefaciendo, resolvere possit.

Secunda diffinitio est, quod posito, talia remedia Menstris reperiri, quae extra Corpus solvant Calculum; hanc ipse tamen longo illo transitu, donec ad calculeum perveniant in vasa fibrositica non parum infringantur. Unde erant, qui calculos humanos excretos certis & variis liquoribus incipiant, expectantur, quod liquor citius & felicius calculeum dissolvat, ut postmodum eodem liquore & intus propinata eundem effectum in Renibus & Vesica obineant. Hæc enim præconcepit Hypothesis est remota, quia est falsissima. Nam longe aliud est dissolvere calculeum extra Corpus, quam in Corpore. Et tunc talia extra Corpus in Calculum operentur, in Corpore tamen sunt languida; quia talia Lithotriptica in prima viis, in stomacho & intestinis, bilis & succi Pancreatici subali, vel acidi attractu, ut & intermedii locis, ac denique in Renibus & Urina insigniter alterantur, necessario alteram novam acquirunt naturam seu testuram, indeque alterata & imbecilla vim diffundens: calculeum omnino exsunt, quod ipsum interdum non eundem derelicti compaginis in omnibus Nephriticis videri calculos, quin subinde multum variat duritie, firmitate, ac similibus plai mioda proprietatibus. Cæterum expectum est ex omnibus vulgaribus Menstris hæcenus tentatis, spiritum Nitri maximam habere vim in calculo, vel comminendo, vel friabilem reddendo, & quasi molli-ferando. Ergo remedium illud Lithotripticum, necesse sit tale, quod illa insigni alteratione in primis viis locatum, adhuc maximam partem integrum transcat ad vias urinarias, ibidemque calculeum concrecenti imminuat.

*Tertia difficultas est, quod Remedium Lichontripcticum, quod calcium, utpote concretum durum, dissolvere valet, una debet esse corrosivum, sed quod citra Stomachi, intestinorum, & aliorum locorum noxam posse propinari; cum hac ipse partes sint longè molliores, & facilius dissolvantur, quam concretum calcium, partisque attritu calca antea plius minus laesæ ab acrioribus remediis admodum læduntur, indeque dolores alique pathemata exasperantur. Verùm hoc ingenii phantasiae ali nullius momenti, cum statuta falsâ hypothesis, quasi calculus non esset dissolubilis, nisi per corrosivum, adeoque unum ex Menstruorum requisita sit, ac corrosivitate gaudeat. Malè autem ad corrosivitatem in calculum frangentibus respicitur. Corrosio enim est respectu saltem tribus rebus ratione gestus, adeoque planè accidentarium consequens; siquidem etiam reperit dantur *menstrua* plius minus dissolvant, aut planè non aut parùm corrosiva, quæ tamen validissima etiam concreta diffingunt. Nil dicam de *Roxy Menstris*, & ex hoc rite parata Menstrua minus acri, quod tamen magnam vim habet resolvendi & infringendi Corpora. Notum est do *Guo Laermbergii*, in quædam *inædumita* solvebatur, ut penitus intar *Cere liqueficeret*. Similiter de Menstrui solventibus *Chymistorum* rita elata est, quod licet rite inspiciatur, effeciam tamen suam in Mineralium solutione probant. Et *Domini BOYLE* in *Philosophia Experimentalis*, & de *Origine Pyramum* refert, schubere tale Menstruum ferè infidipum, æqualiter tam cum acidis, quam liquoribus Alcalinis, fine effervescencia & ulla alteratione ac immutatione miscibile; id quod innuit, quod de utroque particeps quod ipsum tamen Menstruum insipidum, etiam *Amias Feræ* subinde virtute superat (scilicet ex basi *Viridis Aris*, & Sale Ammoniaco conficitur) ac taceam *Mercurium vivum* huius amalgamatione. Auri & Argenti, hæc ipia alique Metallâ in minimas partes dissolvere, utut ipse sit infidipus; adeo, ut *Corrosivitas Menstrui valorem non desinit*.*

Quid igitur est, quod maxime confidendum in Menstrui
 Quod Menstrui, quod ponderat confidetur. *Propter illud*
formam, quod est inter particulas Menstrui solventis, &
particulas, se poros Corporis solvendi, ut hinc utriusque
Corporis particulae mutuo nec se invicemungere valeant:
Et enim particulae latius Menstrui sunt figurate, & con-
formate, ut easse respondeant porulis Corporis, praepra-
ae circa solutis, in verò hæc duo ullo modo contraria,
nullam habent convenientiam aut proportionem repu-
ndant, frustra est hæc solutio.

*Propter illius materiamalem originem dicitur ex coarctatione
se identificare in Radice & Effluvia; hinc dicitur: Membris
delictis quæ hominem cum rebus dissolvendis. Hic Caverna
est Agnoscere per Medulla Saluberrima, Salina per Medulla Sana
& Aquam optime folvitur; id est, requiritur in Membris
quod singularibus certa quadam habitudine ad ipsam rem solven-
dam. vid. RECHERUS in Phlog. foetoris lib. v. pag. 372.
WILLISIUS de Fermentatione pag. 63. Hinc v.g. Aqua
dissolvit Saccharum, Alumen, Vitriolum, & similia; Aqua
non dissolvit spiritus Vini; contra Serum, Ceram, Bitumen,
Succinum, Terebinthinam, & familia lubefacta, licet
molliora quam vel Alamen vel Vitriolum & similia,
Aqua non dissolvit, Spiritus Vini probe rectificatus dis-
solvit Succinum & omnia corpora refinosa, que non resolvan-
tur ab Aqua; alihomous tamen spiritus Vini hic probe
rectificatus non attingit Saccharum, neque Sal commune.
Porro Aqua Fortis, seu spiritus Nitri redificatus, dis-
solvit Lunam aliquae Metalla, sed non Aurum, aut Lignum;
aut Ceram aut Phosm: Huic Aqua Fortis si iniciatur aliqñd
spiritus Ammoniaci, tunc promptè folvit Aurum, sed non
attingit amplius Lunam. Hinc videmus, quòd Aqua v.g.
quamvis ejus particule facillimè se insinuant in poros
Corporum salinorum, etiam promptè eidem Corpora sa-
lina dissolvit; jam verò, quoniam pinguiora porali rotun-
ditate & cavernoli in Cera, Botorum, Succino, &c. ita sunt
conformati, ut particula aque estrinfica quidem lambe-
re, sed ipso poro intrare nequeant, propterea etiam Cor-
pora talia oleosa pingua non dissolvuntur ab Aqueis. Mi-
nutiffimæ contra particule Vini Particulæ etiam derore
Succinum intrare, ac in illud infinuare possunt, adeoque
etiam hoc elegantissimum tinctorum dissolvere, quo parti-<
culæ spiritus Vini improportionate Saccharo molli, idem
relinquant. Hinc est, quòd soluta falia communia aut falia
Ammoniaci mifflura cum Aqua Forti fiat Aqua Regia, seu
Menstruum pro solvendo Aur, itaut non amplius attingat
Lunam, ã discrepantiâ scilicet radicalem cam Menstruis*

illa enim adjectione Salis Particulæ mensuræ ita succunt immutatur, & ex adhesionē & conjunctione mutata taliter reddere figuratur, ut promptè Aurum ingredi, nullo verò modo Lunam subintrare possint.

Ex his patet, omnino dari Menstrua, quæ instatilis stomachicæ & Intestinales Calculum in Remissionem attingunt, & eundem dissolvunt; dispar cum ratio; ut taceam, *gestum male corrosivum prædium exhibere*. Multa enim nobis insipida & dulcia videntur, quæ in se admodum acris, & plius minus corrosiva, ut Arsenicum, Mercurius vitæ, Sulphur Antimonii, Mercurius vivus, &c. Lingua ergo incertus iudex est Menstruorum. Ut taceam Acra, respectu corporum Corporum acerrima, nobis & Ventriculo nostro esse innocua, nec in obiectum appropriatum agere: v. g. scit videmus in Aceto, quod solvit Corticem taceamus lap deum Ovorum dorum, subintrant verò Membranam taceam ut mollem non attingit, copiose à nobis etiam assumptum in stomacho est innocuum. Si itaque ista Concreta terrea, nempe Corallia & Testa Ovi, dissolvuntur ab Aceto, integratè tamen Membrana manente, quoniam etiam possit dissolvi à medicamentoso Menstruo calculus, ut illud lichenium non attingat? Sic Cancharides acrimonium suam circa Renes & Vesicam saltem explicat, ex exulcerando, quæ tamen stomacho, quem immediatè ingrediuntur, Intestinis & aliis partibus nulli innocue. Ergo præter hoc, quod datur Menstruum insipida, attendenda etiam est varietas Menstruorum, quæ non simpliciter in corrosivitate, sed in particularum eius textura, materia & conformatione mechanica consistit. Unde nullum dubium est, dari posse talia Remedia, quæ in Menstrui, citra asalem Gullus acerbitate, partem ex sui textura, partem ex admissione variorum succorum nostri Corporis promptè Calculos Rénales in Corpore aggredi, eorum Poros penetrare, & Particulæ nitidas disfringere aut comminute possint; eaque imprimis ex prosapia salina, ut in *Concreta Calculi salium subtiliter penetrare & dissolvere*. Unde non ad corrosivitate in specie respiciendum est in Remediis calculum frangentibus.

Confirmant hoc Observationes quædam Calculorum in Corpore dissolutorum. Nihil dicam de PARACELSI & HELMONTII *Lada*, quia, cum rarum sit, & neuter possit ostendere, apud incertum non meretur fidem. Sed urge saltem, quod *Pericaria & Sacca Betula*, item *Semen Dauci* sint ad Calculum frangendum destinata, quorum sequentes ad continuatè usum calculum communi obiectum fuerit. Hinc enim Dn. BOYLE in *Philosophia experimentali* aliquot exempla refert, per solum Dauci Semen fradum fuisse Renum Calculum. Sic Pericaria quoque secerum est quorundam Anglorum, AUGENII & LAUREMBERGII, contra Renum Calculum, quod ejus Aqua diutius continuata Calculum ita comminuit, ut frustulatum ipse fieret ejusdem. Experimentum etiam ad Calculum Vesicæ immittendum fuit *Milipedes*, de quibus infra dicam. Hæc omni modo sunt corrosiva, tantum acris volatilia. Sic ipse quoque amicum, Medicinæ Dodorem, Dreidæ, novi, qui spiritum instillat Salis Ammoniaci ex Tartaro habet volatili infusum, mediante quo crebro usurpato, aliquoties Renum calculos felici experimento intra Corpora comminutos, frustulorum patrum forma successivè expulit. *Sal Vini rebus hinc bene preparatum, uti postmodum habebimus, & ipsum observatum fuit, aliquando dissolvit calculum, & frustulatum eundem eiecisse*. Reverè ergo dantur Lithonetrica, modo præparare studeamus tales liquores, vel talia mensura, quæ assumpta citra violentiam, calculi poris se infundere, eosdem permeare, & ita coagulum ejus subtiliter solvere possint. Observanda tamen hic est sedulo diversitas calculum in duritie, de qua *suprà*; unde & aliquis varietas tam in ipsa remedia, quam eorumdem effectibus circa calculi dissolutionem observanda erit. Quædam enim sunt potentiora & magis universalia, quorundam verò magis particularia & imbecilliora, quæ saltem quosdam calculos, & in quibusdam tantum subiectis, possunt dissolvere, quos in alia subiectis inertes relinquunt.

Sed talia *rara Lithonetrica præparata sunt rara & paucæ*.

Sufficit, ut loco horum in Paroxyfimo, calculi, sedatis maximam Partem Paroxyfimi Doloribus & gravioribus symptomatibus, Diuresis plius minus acris, aut fortia appropriata, sed male Lithonetrica dicta quibusdam, in usum adhibeantur, quæ partim in Paroxyfimo, partim extra Paroxyfimum ad præventionem possunt inservire sive in præservatione opotio operentur Acidum absorbendo, ut Terbacca, Lapides minerales & animales; sive vi diuretica Renum & loca urinaria absorbendo, ut omnia Raphanacea, liquor Betulæ, &c. seu balsamica vi Fermentum Renum com-

Tom. II.

servando, ut Juniperina, Terrebithinata, &c. Diuretica talia à quibusdam, male licet, Lithonetrica dicta, sunt multiplicia: & quidem ex *figuralibus* Herba & radix Liquiritiæ, Radix Foeniculi, Petrofelinæ, Pimpinellæ, Lappathi majoris, Apii, Raccæ Juniperi, radix Rubie tinctorum, Eryngii, Bardanæ majoris, *Osmunda*, cupa *Escentium* egregiè Lithonetricam vid. in *Colleg. Pharmacut.* in *Schedæi Pharmacut. Medicor. thym. P. 1. in Reges Vegetab. pag. 16. De Semine Bardanæ in M. A. N. G. Ann. 3. Obs. 122. & Ann. 6. Obs. 102. Impetris omnia Raphanorum genera, Sale acridiuretico prædita, conveniunt: Nam Raphanacea non tantum præservant à calculo abstergendo Renes, sed etiam calculi geniti excetionem Diuresi fortiter promovere; hinc lasum eorum cum spiritu VINI TACHENII *l. a.* commendat: ac præ cæteris Raphanus orbicularis prodest, Cere decantatus succus Raphani ad 3ii. mistus cum ass. *Vini Malvæ* ad TIMÆO *non Guldæ* laudatur. Eminet hæc inter radia *Armoracæ*, quæ *Vini lasa* recens, & aliquoties hausta, volatili suo Sale Renes abstergendo à calculo præservat, eundem verò præfectum fortiter pellit. Alii insuper Armoraciam, tam radicem quam Folia incisa, infundunt Vino, & Vase clauso per quatuordecim dies in cella relinquant, quem *liquorem* per Alembicum *destillatum* ad calculum promovendum hæc mirè commendat Islerim tamen ejusmodi remedia Allacia acrisa non, semper inique ita sunt, cum ardores Renum in illis solent intendere, qui alia isdem veantur. Ufurperunt autem talia Diuretica præmissa, ut dixi, præmittenda, tam Internis primas vias respicientibus, & symptomata mitigantibus, quam Externa Anodynis emollientibus. Commode etiam propiæqueant sub introitu Balnei, ut eo commodius tunc operari queant. Pertinet hæc porro Hedera terrestris, Item Capilla Veneris, Chæroleum, Parietaria, Fragaria, & Veronica, de cujus Decocto & Aqua destillata vid. M. A. N. G. Ann. 1. Obs. 107. p. 245. & CRATO in *Canth. Folia Quercus tenella*, Agrimonia, &c. conveniunt etiam Cepæ & Allium, præsertim ejus capita, quæ Sale volatili acridi penetrant diuretico, tam acidum, calculi coagulatorem, corrigunt, quàm Renes abstergunt, eorumque Fermentum ad calculum disponens suo modo alterant. Hinc multis non incongruè in usu positum est singulari novitatis caputulum, vel aliquot saltem Alii Dentes, 6. 7. 8. 9. &c. minutim conficere, & in Aquæ seu spiritus Raccarum Juniperi cochleari uno vel altero, vel spiritu Vini haurire, ad præventionem & curacionem calculi, ejus remediis efficaciam laudat BARTHOLINUS in *Epist. Medicinab.* Medicus quidam eæ optimum Experimentum contra Calculum vendidit legens.*

Æ. Herb. Neder. var. Soc. M. i. vel ii.

Capital. Alti No. i. vel ii.

Diffringuntur in frustula, affundatur

Spiritus Vini 3ii.

Stet per dies & noctes aliquot probè clausa, deinde agitati & probolati liquoris detur Cochlear. i. vel ii. pro præventionem singulis plenitudo & novitatis hoc enim certissime præservare, & continuatè usum calculum curare alicui.

Cortices Avellanae riores etiam laudantur. Abrotani Pulverem cum Nitro SIMONE PAULI *Quadrup. Betæ. pag. 13.* extollit. Hæc pertinet & *Fraxinus*, in quo, imprimis Semini, non contentenda est vis contra calculum, præsertim in Oleo destillato ac Sale volatili *Semini Fraxinis*; hinc etiam in ejusdem Cortice interiore, quæ singulariter laudantur à GLAUBERO *Coof. Alti. Augst. Nr. 43.* Hinc non inelegans est hoc *Oleum Lithonetricum* admodum balsamicum & potens, quod contra Lithiafi alii conficiunt, & taquam secretum in calculo Renum commendant.

Æ. Cort. Rad. Frax. inter. 3ii.

Nitro. Jaap. rec. 3ii.

Terrebith. 3ii. ad 3ii.

Terenda tetantur, & cum Terrebithina miscantur, & in 3ii. Aquæ in Vase obturato in digestionem vel per triduum ponantur per tres menses, postmodum destillantur leni igne, ut dent *Oleum* potentissimum, cuius guttæ viii. vel x. in *Vino albe* capiendæ, mirè conducere dicuntur tam præservando quam curando Calculo.

Porro laudantur Raccæ Juniperi, Hedææ arboreæ, Ciceris rubri, fructus Alkekengi & Avellanae, quarum egregiam efficaciam expertus est A M A T U S LUSITANUS in *Cyn. Cynobati colli seu cooditi commendatur*: vid. UNZERUS de *Calc. p. 965.* & BORELLUS *Cen. 3. Obs. Fiff 2.*

Jer. 22.

for. 32. Item horum Arilli & Oleum inde expressum, & spongia, quæ simul anodyna est: vid. CRATO lib. 6. Conf. 83. & SIMON PAULI *Quadrup. Razau. pag. 65. & 37.* Præter dicta *Rosa Gerani*, *Virga aurea*, item flores Cyani & Calceitæpæ, *Semen Mili Salis*, in specie semina Hyperici, Dauci & Cumini, vulgaria quidem Remedia, sed optima Nephritica, & plus habent in recessu. In Hyperici semine res est clara, quod manu contritum & contusum Tercebinthine spiritui & lapii; jam autem nota est vis Tercebinthine contra Calculum. Conuenit ergo cum ea, tam vi balsamica, quam diuretica; unde ZAPATA in *Clauo Med. cap. 104* mirabiliter excolit ad præseruandum Calculum sequens *Receptio*:

℞. Pulv. Hyperici. ex Sem. in Julis vel Autumno collecti & calcisati. ℥iij.

Succ. vel Conf. Ros. vel Vin. vel Rak Junip. ℔i. ad ℔ij.

Misc. fiat Eleuarianum.

Dosis est ℥ss. omni septimana semel vel bis per circumstantiarum ratione, tribus aut prandium horis usurpandum.

Laudatur quoque hoc ipsum tam Præseruationis quam Curationis tempore ab EPIPHANIO FERDINANDO tanquam expertissimum, *Mss. Med. 54.* De *Dauce & Semine* ejus quantum in Calculo valeat, imprimis vid. HELMONTIUS *Tract. de Lithiâ*, ubi Experimentis, & Rationibus compubar ejus vim antinephriticam & Agli partim ad Præseruationem, partim ad Curationem Parosyri nephritici frequenter utatur hoc Semine, tam in substantia, quam, ut moris est, in Cerevisia medicata, addendo Cerevisiam dum fermentare incipit, Dauce Semine consulum, itaut fermentando recindatur à Cerevisia, & vi lithostriptica imbatur; hac enim ratione per talem Cerevisiam Nephriticum multum præstant in curando & præuocando Calculo, quod ipse nori. Conf. BOYLE in *Philos. Experiment. De Jampore*, ejusque Baccis & Lignis, item de *Ligas Nephritica* Indis Orientalis, res per se nota est, quid hoc in casu præstet? ex quibus paratum decoctum vel Infusum potenter Calculosos relinquit, uti videre potestis in SENNERTO, ubi de *Calculo*, item in Scriptis ejus, qui scripserunt de Extoticis, in specie in BAUHINO. *Gummi Cerevisiam* solum in Vino, vel sub forma Pilularum inflat Tercebinthine propinatam egregie præseruat & pellit Calculum. Item in *Prescrip. acris* sponis multa laicitate contra Calculum, apud omnes in consensu est, cujus Aqua destillata in Balneo Mariæ, & aliquoties à recenti Planta cobabata, experimentum est quotiesdam Anglorum contra Remum Calculum, cujus nota se præseruat, quod pluribus explicat BOYLE l. i. *Sacche Ciriati Linum* ad ℥ij. com Vini Maluati ℥vi. ad turbandum Calculum non injuria à TIMÆO seu *Galen. lib. 4.* aliisque laudatur, sicut succo Parietariae & Veronice, item Rob Juniperi. Rob Cynosbati, & ex his paratum Maluaticum Juniperinum, aut Cynosbatinum; non secus ac *succus seu Aqua Betula*, mensis Martii collecta ex ramis tenellis Betulae, non trunco, & in aqua Acidularum gradatim potata, elegantissimum & decontaminatum est contra Calculi Pathemata reuocandum: de quo vid. HELMONTIUS *Tract. de Lithiâ cap. 5.* ubi videris egregia de succo Betulae, & egregiam Cerevisiam moderatam contra Calculum. Post HELMONTIUM cum etiam commendat CHARLETON de *Spirita Gergis seu Calulo pag. 179.* BARTHOLOMÆUS in *Art. Med. Hoffm. P. 1. Observ. 19. pag. 49.* BOYLE *Philos. Experiment. Tom. 1. pag. 105.* Item de Cerevisia medicata cum Betula vid. *Colleg. Pharm. la SCHROEDERI, Pharmacop. Medicæ-Chym. Part. 1. Selt. 1. pag. 31.* FRIGERUS de *Ferment. pag. 178.* M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 155. pag. 278.* Et *Ann. 4. Obs. 301. pag. 276.* Ex his aliisque quamplurimis inuestigabiles sunt vulgo *Essentia*, & *Extratta*, Nephritica dicta, composita, imprimis ex Hyperico, Baccis Alkekenigi, Parietaria, Cynosbato, Albo, Hodera terrestris, Baccis Juniperi, Veronica & similibus, cum Spiritu Baccarum Alkekenigi, Clouorum Cynosbati, vel Spiritu Vini tartarizati parata: quibus pro lubitu Opium addendum venit, ut eo maiorem vim anodynam possideant.

Nec prætereundum est Arcæam contra Calculum TIMÆI seu *Galen. lib. 4. in l. 3. Epi. 32.* tale:

℞. Nephra (h. e. Asferia). Calenda Maii ante Solis exortum collecti. M. viij.

Lefusa (Sera) vrid. M. iij. Exprime ex his succum; adde

Vin. rubri ad pondus omnium:

Misce, & filtra.

Exhibeantur quotannis primo, secundo & tertio die Maji in auroa ℥vij. purgato prius Corpore. Agit ob Sal volatile nitrosum Amerinæ, & Sal volatile Roris majalis, quo ante Solis ortum Herbe imprægnatur.

Porro pertinet huc etiam *Salia*, tam Alcalia quam salia, in specie Nitrum & quæ nitrosum sunt propiæ, ad Calculos solvendo, & vi diuretica promovendo, optima: speciatim tamen excellentiæ bel Salia ex dictis Vegetabilibus Diureticis parata, ut Sal Geniue, Sal siliis Fabarum, Sal Ononidis, Stercoris Columbini; & in specie omnibus his meliora *Sal volatile Sueuici*, & *Sal Thina* egregia sunt Diuretica Antinephritica, Nitrum fixum, & omnium maximè Spiritus dulcis, nobilia sunt remedia, quæ multum obtemperant in Cura Calculi: & imprimis Stercoris Columbini, præter communem Authorum consensum, in specie vid. FORESTUS lib. 24. Obs. 25. in *Serul.* Hinc recipiunt quidam *Stercoris Columbini*, moderate calcinati, & Sal eadem nitrosum in Vino acidulo propiæ cum nobili Diuretico; uti & alii recipiunt Stercoris Columbini, illudque macerant in Aceto per diem, & noctem, postea filtrant: *Aceti* hujus p. ii. addunt *Mellis* depur. part. i. misceant & propiæ cum probatissimum Remedium contra Calculum. POLEMANNI *Sal Lithureuræ* recipit etiam Nitrum; cuius præscriptio est hæc:

℞. Nitri purissimi ℔i.

Fluat in igne, solielendo desuper frustum *Sulphuris communis* magnitudinis Fabæ, quo deflagrato aliud inserpinie, donec hujus *Sulphuris* ℥ss. absorbpta sit: Ubi omnia refrigerant, ac denso pulverisita fuerint, denud eodem modo procedatur, atque hoc tertia vice repetatur. semper succrescit *Sulphuris* ad ℥ss. adijciendo. Jam

℞. Nitri ita præp.

Salis Alstrib. ana ℥i.

Succini ℥ss.

Rosæ albi ℥vi.

Olei dissoluti. Succini. Div.

Misc. pro Pulvere.

De hoc dosis, quantum tres cultelli cupides capiant, propinetur una vice, bis ter vel quater in die, per circumstantiarum variatione. Omnem liburam ea partibusurinaris evertit, & Calculum recentem comminuit.

Italice etiam addatur *Sal Camphorum*, quod in Parosyris Nephritico ad sistendum dolorem Nephriticum & promovendum Calculum est egregium, cuius preparatio hæc est:

Fiat ℔l fixum ex Nitro mediantibus Carbonibus:

Hoc Nitrum exponatur aridi, ut liquefact ad Pulvis consentiant saltem: Huic affundatur

Ole. Viridis rubri ana;

Et si ea ebullitione, & eadem cellante abstrahatur Liquor ea Retorta forti igne, & remanebit *Sal candidum* subacutum; quod ipsum præter alium singularem Nephriticum etiam aliquid singulare obtemperat in via Pharmaceutica & Alchimicis in puncta solutionis Corporum.

Porro præter dicta *Salia Nitrosa*, vi nephritica etiam innotuerunt hactenus ipsi *Lapides* tam Mineralis, quam Animalis, ad pellendo & præuocando Calculos, unde v.g. *Lapis Jadæus*, *Lapis Lyale*, *Lapis Spongia*, *Lapis Nephriticus*; *Lapides seu Oculi Cæcerorum*, *Lapis in Velica Apri* five *Bovis* reperitur, *Mandibulae Luvii piscis*, *Dentes Tractarum*, *Lapides Persearum*, *Carapæum*, *Aquila*, item *Tere Osseum*, maxime *Struthionis*, &c. præcellunt in Calculo curando. Verum hæc ipsa raro per se solent conuenire, sed acidum, Calcoli coagulatore, in Corpore peccans saltem temperant, acrimonia ferri arinarum in Parosyris temperant, ac mutatione sui saporis in salum tertium, vim diureticam egregie acquirunt. Melius est, si dissolvantur cum Spiritu Salis composito, ex Sale Communi & Sale Ammoniaco parato. De Ovis Struthionum cum *Spiritu Salis* solutis, vid. TACHENIUS l. i. Dant *liquorem Nephriticum* salium præstantem. In Pelliculis mucilaginosas spiritus Salis Testas Ovorum solvit, quæ Pellicule urinæ poris sunt. Si his autem Pelliculis addatur *Sal fixum*, præcipitat se Pulvis, quod probat, Pelliculis his adhuc acidum adfuisse. Faciunt hoc *Liquores Nephritici* dicti, ex hisce *Lapidibus* parati, quibusdam in alio, pro varietate Authorum vari: v.g.

℞. La-

℞. Lapid. Cancer.

Lapid. Indur.

Lyncis

Spergie

Agulis

Glauc. Maria an. qu. v.

Solvantur in *spiritu Salis dulcoratis* rite *destillare* (id est, ultimo ignis gradu elictico) vel *spiritu Salis compo.* Solutio lapidis adstrictioris decantatur, filtratur, coagulatur leni calore in Vitro ad siccitatem. Materia hæc succata iterum pulverisanda, & hinc in Cella per deliquium dissolvenda, filtranda, & ita pro usu asservanda.

Liquor hic salis elegans diureticus ad 20. vel 30. guttulis in declinatione Paroxyimi Nephriticæ ad eliminandum calculum in Vino frequenter propinatur, pellit Calculum per urinam instar massæ coagulatae, seu massæ crassioris. Alias calculus ex Falle Bovis delinptus & pulverisatus, ad gr. v. assumptus, admodum probatur contra Calculum dicitur æmulum; nam spiritus Salis fit ita diureticus, & infigoiter expellens. In *Canceris foveolatis* singularis latit vis antinephritica ratione virtutis diureticæ, quæ in Alcali eorum latet, unde Decoctum Cancrorum fluvitilium Oculis prægnantem egregie ad eundem, & præservandum commendatur Calculum. Item

℞. Cancer. foveol.

Coqu. in Vino in Olla probè obturata tamdiu, donec pulverisari possint.

Huius Pulveris dr. i. propinata aliquot desperato Calculo laborantes, & incommittibiliter ejulantes refectuit, atque hoc certum est.

De Calculo baculus vid. *Colleg. Pharmacop.* in *Secranderi Pharmacop.* part. 1. *fell. 3. cap. 8.* Dosis ℞i. ad dr. i. Urinam pellit. Quibusdam hæc accedit superfluitio, quod proprius Calculus deoratos præstare ad Calculo dicunt. Promovet quidam urinam, sed curative & præservative nil valent.

Disidis modo Lapidibus vicariis sunt *Tess. Ovarum*, & quidem Tessis Ovarum communibus meliores sunt Tessis Ovarum, ex quibus exclusi sunt Pulli: omnium optima sunt Ova Struthionum. Unde etiam *Tess. Ovarum Struthionum* ingredi sunt solent Liqueorem Nephriticum. Alias etiam *Tess. Ovarum calcinatæ* a multis laudantur. In specie RAR. THOLINUS multa habet de virtute Tessarum Ovarum calcinarum contra Calculum in *hist. Naturæ* imprimis in *Cant. 4. Epist. pag. 431. & 326. refert. Aquam Nephriticam* Decoctum talis Calculi Tessarum Ovarum mirè prodesse, & in specie *Aquam Calcis Ovarum* ad Calculum io maciliam dissolvendum, multum prodesse refert. Nam Ovarum Tessis, un & Marina testacea, calcinando in Corpus instar Calculi vivæ abeunt, cujus Calculi vivæ Lialviom ad Calculum in paroxismo promovendum est laudatum. Sane in ipsa *Calce vivæ* vulgaris singularis vis antinephritica relidet, unde & spiritus Calcis vivæ *Bailli* rite paratus seu singularissimum Calculum frangens laudatur; loco cuius Sal ex Calce viva cum Sale Ammonico calcinando, & eliaivom paratum commodè substitui potest. Unde etiam ex Calce viva cum Tartaro Tinduræ Nephritice parati solent non inelegantes: Sic famosis aliquando Medicus *Tinduræ Nephritice* habuit talem: v. g.

℞. Calcis vivæ q. iv.

Tartari crud. part. ii.

Coqu. in Olla cum *Aqua fons.* (Tartarus enim alcalisatur.) Liqueor filtratur, coagulatur, & emergit Sal fixum plant singularis nature: quod ipsum vel eradum usurpari possit; vel fundatur, hinc extrahatur cum *spiritu Vini probè rectificato*, donec rubescat, & saporem uriniolum, & fortiter penetrantem acquirat. Hinc sub nomine Tinduræ Nephritice, quæ est egregium Remedium in Calculo in & extra Paroxysmum, similibusque Morbis Tartareis, à ℞i. vel dr. 5. ad dr. i. usurpatur.

Quo pertinet *Antinephriticum* D. HELVETII, qui scripfit de Vitrulo aureo ex Calce viva.

℞. Calcis vivæ q. v.

assuende

Aceti destillati optimi ad eminent. trium, vel

quatuor digitor.

Coque, frigesce, decanta, inspissa, seu ad siccitatem evapora: Sal candefac io Crucibulo, & extrahet vel cum *spiritu Vini*, vel cum *Vino Hispanico*.

Dosis gutt. 10. ad 20. in Calculo.

Eutrope contra Podagram ℞i. infunditur in Vinum aut urinam propriam, & eo laventur partes podagra affectæ.

Tandem *Lumbri*, & horum spiritus per putrefactionem paratus, egregium sunt Nephriticum, qui adhuc superantur ab *Asillo* rite preparatis, de quibus infra *membr. 2. art. 1. cap. 2. ubi de Calculo Vesicæ*. Speciatim *Scarcab. Majales* pro cæteris inquisitur conveniunt: imprimis *Ala horum superius* ac dure pulverisata, & propinata in Vino usurpatæ egregium dant Antinephriticum. Vel

℞. Scarcab. Majal. mensis Majo, vel medio Junii capto, & abique atactu manus coactos: Sollosa in spiritus Vini, lusscati ita blandè effuscat: sic effuscati discinduntur, & in eorum medio reperitur illud Liquidum viscosum, quod eximitur & alteratur. Dehinc ipsum Corpus pulverisata, misce cum proprio Liqueore uctuolo, ut acquirat consistens debitum, Post

℞. Huius Balsami dr. i.

Olivi destillat. Aneth.

Caryoph. à gutt. iiii. M. f. Pilule.

Harum Pilularum ℞. gr. ii. & propina Nephriticis & Arthriticis, mane jejunio stomacho, in Aqua Flor. Sambuci, vel Rosarum. *Æger moderatè* vivat in Dieta, sic brevi post excitabitur Stranguria, quæ per 30. dies durabit. Si autem non statim superveniat Stranguria, reiteretur secundo die, & optatum habebis eventum in curando Calculo. *Conf. Colleg. Pharm. in Secranderi Pharm. part. 1. fell. 2.*

Huc pariter pertinet *Scorpionis*, si nempe Pulvis factus ex quatuor, quinqve, vel sex Scorpionibus lavatis, sicque vivis per 24. horas in Vino Malvatico relictis, postmodum in Olla supra Folia Salvizae positis in Furno blandè crematis. Dosis gr. iiii. iv. aut v. in Ovi sorbilli vel Vini propinata, Calculum promovet.

Grilli domestici, in Rusticorum Hipocaulis familiares egregium sunt Lichentropicum, si nempe uous alterve, abjectis capitibus, alis ac pedibus, in Aqua Petroselinæ vel alia appropriata macegerentur, & lique tamdiu, donec in Liqueorem laetum facessant, Liqueorem propinquet: maloties Experimentum hoc factum, & ad miraculum in Urino retentione fluxus secutus: quin etiam vel integer vel relictus Calculus prodire conclusi fuit: vid. M. A. N. C. *aanp. & 10. 16. 17. 71.* Huc etiam facit *Essentia Regulæ* avis Gælicæ, quam vid. in *Dispensat.* quæ valde commendatur io Calculo: Nam Regulæ avis singulariter convenit in affeibus urinaris, in specie io promovenda Urina, & pellendo Calculo.

Ex disidis Diureticis sequentes *Formule* concinnandæ:

℞. Aqu. Herod. terrestr.

Petrosel.

Alkekeng. anuoci.

Malvas. Junip. unc. iß.

Spiritus Lumbrie. terrestr. ℞i.

Salis Ammoniaci, vel urina ℞iß.

Syrup. Herod. terrestr. ℞i.

M. i. Potio: 5.

Mixtura Diuretica coctileam sumenda.

Vel

℞. Radix. alch.

Petrosel. an. ℞i.

Rubia tincl. dr. vi.

Liquirit.

Race. Junip. an. ℞ß.

Ficuum fig. Num. viii.

Frust. Alkekeng. Num. vi.

Sam. Malva.

Vitlar.

Urtica an. ℞i.

Coqu. in l. q. *Aqua comm.*

In Colaturæ his dissolve

Syrup. de quinqve Rad. ℞i.

Spir. Salis dulc. ℞i.

M. D. S.

Potio Diuretica.

Vel

℞. Malvas. Junip. ℞i.

Spiritus salis ℞i.

M. D. S.

Ellixir Dioreticum.

Dosis ℞i. ad ℞i.

℞. Tindura Tartari.

Antimonii an. ℞i.

M. D. S.

Tindura Diuretica.

Vel

℞. Lign. Terra. fel. Tartari ℞i.

Tindura Tartari ℞i.

M. 2. ut antè.

ARTICULUS III.

De Urina Secretione nimis aucta.

Hæc de Calculo Renum occasione Suppressionis Urinæ. Cæterum hæc vitium est immodica & nimis Urina Excretio, dum plus effluit ex Corpore, quam ut assumpta potestante Materia, aut Serum in Mâs Sanguine proportionaliter suggerere possint, in Affectu qui alias dicitur *Diabetes*.

MEMBRUM UNICUM.

De Diabete.

Alias *Diabetes* nomine duos vitia insignuntur, idque promiscue, adeoque nec abique confusione. Nam primum est *Diabetes*, (*mingere nimium*) quando immodice Urina effluit, & plus quidem, quam bibendo Homo assument, cujus rei exemplum supradictum supradictum DIGBY in *Oraculo de Pulvere Sympliciter* sicuti etiam SCHENCKIUS in *Observat. lib. 3. m. de Diabete*, aliquot profusi busj Urine profluvii habet exempla: Inter alia testetur quendam, qui quotidie supra quatuor Cantharos minit, ut vix Quadrantem biberet: Idem notat exemplum Puellæ plus paucis dictis miscentis, quam ut tota ponderaret: Item BARTHOLINUS in *Alis Hæstius*, Volum. 1. *Observat. 5. pag. 14.* refert Virum, qui per aliquot septimanas quotidie ad fixas Urinæ emissit: Vid. etiam M. A. N. C. *Ann. 2. Observat. 162. pag. 260. & Observat. 167. pag. 265.* uti etiam TULPIUS, qui l. 3. *Observat. 86.* *Diabetem* refert ejuſdem, qui quotidie sex libras mingeret, ut parum vel nihil biberet. Cum modo dicta copia nimis Urinæ excretionis simul intensissima sitis, debilis Urinæ, Mæles totius Corporis, Febris continua lenta, Ader in & circa regionem Dorsæ lumbarem, & similia symptomata, ut nomine symptomata infusa confirmat, aut infusa Tabis Dorsalis, sicuti etiam cum Urina copia aliquid piagne externi, & tandem ut plurimum Mors subsequi solet. Equidem non rarum est, copiosiores Urinæ excretionis Naturæ opus esse, quæ e. g. in Febre acuta mæles critica aut hæc simili se ipsam à Morbis liberat, unde cum Aegri euphoria contingit, nec adeo diu durare solet. Si vero Ruritæ talis Urina sit *Diabetes mellitus*, paulatim & insensibiliter crescere solet, ita ut Aeger in principio haud adeo curet, sed successivo uberius quantitas proſit, & quæ renas, aqua, nno nomine hoc diſcrada, quam & Oris fecies & Sitis, Virium insignia deficiunt, & Viscerum internorum ardor aliquid sensus, &c. comitantur. Quod si Urinam aliquando contineat Aegri, Lumbi, Coxæ & Testes cum gravitate intumescunt. Alis autem sensu etiam *Diabetes* dicitur citra nimis Potulentum & Liquidum assumptum, aut placet aut, aut parum admodum mutatur per vias urinarias Excretio, ita ut non raro Forma, h. e. Color, Odor & Sapor assumptorum Liquidorum in Excretis per Urinam adhuc sint sensibiles, quem Coeliacæ & Lienteris similem GALENUS lib. 6. de Loc. aff. cap. 3. pronunciat. Exempla huius rei non sunt paucæ: Sic BARTHOLINUS Cent. 1. Hist. 68. talem *Diabetem* Calculi recentis, Vinum rubrum assumptum mox per vias urinarias eadem forma denum reddentis: uti etiam HOFERUS in *Her. Med. pag. 171.* Vinum rubrum immutatum per Vesicæ excrementum refert, adeo, ut decocti Medici quidam illud Vinum pro Urina fœguisolemta haberent: sic HILDANUS Cent. 5. *Observat. 53.* refert *Diabetem* ea usu Acidularum, in quo Lac Amygdalarum assumptum non immutatum tandem cum Urina excretum: sicut ROSTIUS quoque in *Observat. pag. 397.* observat

Diabetem miram, in quo Vinum & Emulſio Seminis Violæ & Amygdalarum dulcimen eodem modo, ut assumpta fuerunt per Urinam, denud excreta. Imò observatum fuit, Grana Aulæ, Semina Coriandri integra, Semina Ficum comestorum, & denique Radiculas Apulicolas, & similia unâ cum Urina sãne reddita: Vid. SENNERTUS in *Præfati de Diabete*. Quoad Semen Coriandri legi in Chirurgo Gallo PIGRÆY, qui dicit, quod viderit Grana Coriandri post passum assumpta pro homacho roborando, postmodum cum Urina reddita: De Semine Ficium ipse vidit exemplum, quod post Decodum Ficum, in quo Semina inerat, potam, unâ semina cum Urina reddebantur: Mirabilia Urinæ excreta vid. in M. A. N. C. *Ann. 2. Observat. 157. p. 248. Obs. 162. pag. 266. & Annotat. ad Obs. 157. p. 401.*

Cæterum hi duo Affectus distinctissimi, uno nomine *Diabetes* vulgo veniunt, quæ tamen Voæ propriæ, & secundum Vocabuli vim posteriori affectui, nempe immodica assumptæ excretionis, convenit. Dicitur enim *Diabetes à dissipatione*, quod est eius præfixum, ita ut prior species, nempe *excessus Urinæ Excretio*, imperpetrati *Diabetes* dicitur, & *Diabetes proprius sit Affectus*, in quo Potentia citis per Corporis transiens, & propterea meliori doctrinæ gratia, *Diabetem in Veram & Naturalem* seu *Sparium* distinguere.

Veræ est illæ posterior, cujus typum hic dedimus, nempe immutata ingestorum potulentorum per Urinam excretio, Exemplum videt. in BARTHOLINI Cent. 1. Hist. 68. HOFERUS *Her. Med. pag. 171.* & HILDANI Cent. 5. *Obs. 53.* Notum seu *Sparium* erit copia, saltem & colligata Urinæ excretionis, excedens longè Potulentorum quantitatem, cum Tabæ, Sitis, Febre & similibus affligens. Exemplum videt. in citato DIGBY, *Oraculo de Pulvere Sympliciter*, & SCHENCKIO *Observat. item TULPIO lib. 2. Obs. 6. 45.*

Hic quoque tertius, & quasi intermedius gradus addi potest, *Cuticula* nempe *Urinalis* seu *Maternalis*, quando nempe Chylus cum Urina aut loco Urinæ prodit, qualem T. L. MÆUS vœ Galdenico, lib. 3. Cap. 43. sub præfixo *Maternalis* terminum annotavit.

CAUSÆ.

Quoad Causas, de his distinctis distinctas Causas narrabo.

Quod ergo attinet *Diabetem Naturalem* seu *Sparium*, id est nimiam, seu copiosissimam Urinæ excretionem, huius Causa investigata perquam est difficilis. Ex quidem hæc consideranda veniunt.

1. Unde tanta Materia quantitas, quæ excrevitur?
2. Quare in specie eadem per vias urinarias amandetur?

1. Quoad *Quantitatem Urinæ excretionis*, quæ sepius, interdum duodecim, excedit potulentorum quantitatem, quod exemplum supra allegatum BARTHOLINI in *Alis Hæstius* testatur, hic queritur: unde urinae tantæ quantitatit origo? Aliquid lucis afferent eorum exempla, qui lesigniter, licet copulenter, per usum tamen remedium *Diabeticum* admodum emaciati fuerunt, mediante nempe copulo hunc per Diarcticis concitato urinas profluvio. Exemplum habet HELMONTIUS *Traſact. Jur. Dinam. lib. 5. 59.* item *Aſſolutio & Tuffis lib. 44.* item *Latex Ham. Noſtrel. lib. 44.* item SCHENCKIUS *Observat. lib. 3. ubi de Diabete*, qui etiam refert, Obefos crebra medicata subitò extenuatos, sicut alios nimis Corpulentum per salivationem Mercurialem curata fuit; uti à BORELLO Cent. 2. *Observat. 18.* refertur, continens Masticatione Foliorum Tabaci crassitatem & pinguedinem Corporis insigniter fuisse immutatam. In omnibus his per Colligatissimum modum, tam contentorum Corpora, quàm ipsius pinguedinis, hæc ipsa in testatam feculam reſoluta illis modis fuerunt excreta: sicut *Pargan-*

ab illo præservatur, quàm si sit Medicamentis Diarcticis affluat abſolutis se ingurgiet. *Diarcticorum* enim Medicamentorum non solum tantum abſoluti in Calculo liberatur, quia potius illorum vi, maxima crudorum humorum sabarra à primæ viæ, ad Renes dila, preſervatum Remem ferventem pro Arterialium & Calidiorum generationis suppeditant materiam. Falsè igitur ſibi gaudere, qui Arterialis in fundo Matris conjungentes exantem, credentes à Diarcticis illas abſolutas, necessariis in Calculum abſolutas niſi abſoluta ſuſſent: ignari quid illa non alia ex ratione in Renibus ſui genita, niſi quia quæ Diarcticorum ad Renes exantem materia tranſducta ſit. Commodior ergo eſt pro huius Marbi Preſervationis Adſtringentium Medicamentorum uſus, quoniam quæ canalis à primæ viæ ad Renes tendentes anguſtiores potius reddi poſſunt, quàm aperiores: ut ſcilicet crudi humoris in Ventriculo quæſſus appendice ſtabilitatis viæ ad Renes præſervatur, atque ad materiam pro Calculorum generi præſervetur, præſertim ſi per patentes Inſignium ductus extra corporis conſinia ea deturbetur. Equidem ſi efficacior Remedium pro præſervatione à Calculo diſtensionem facias, illa Adſtringentia & Reſinoſa invenies.

Via acriora simili colliguntur vi ratione alcali aeris humores astringere, & flaccidam feri teat uram mutare solent, ut succi colligescunt forma liquaminis eaeant. Hoc posito, arbor, Massam sanguineam, & hinc reliquos Corporis liquos, primario ipsam partem ejusdem chylom nutritivam, ipsam etiam rorem & succum Corporis nutritivum, ipsamque adeo tandem pinguedinem resolvit & colligebit, atque ita satiscere in consistentiam ac formam aquosi Latiscis, ac ita sub ejus forma per loca urinaria eacernit. Hinc tam *urina Diabeticorum* horum eacere mira *duleudo*, & pinguedinis aut rois chyloli liquefacti cum salibus urinaris misti, motus temperata, & in dulcedinem vergente teatuta: *Confer*, WILLISIIUS *Pharm. Rat. Part. 1. pag. 164. & 173. Hypo Colligescunt Confo.* & inde genita copiosa urina lubrificantur nobis, dum fluxus huius dispositus est, ut praecipue per Renes, non vero per alia loca transeat; unde causa simul investiganda est in *Renem Fermentum* nimis acri, quod ex natura falsa degenerat in succellum urinosum *acrimoniam* insignem volatilitatem feri sanguinis, similem acri illi volatili tali, quod in Camburibus, Aclis, Scarabaeis minoribus, ac his cognatis infestis, deprehenditur, quae ex primis viis derivata, mediante Chylo sanguini, & hinc universo Corpori, communicata est; quae *acrimoniam urinosam* resolvit, attenuat, colligat, & ita *acidum pingue* talia coagulans dissolvendo, satiscere cogit sanguinem de nutrimento corporis chylom, & ex eo producatum pinguedinem, Patet haec *acrimoniam colligescunt* urinosam ex eo, quod in *Diabete* incipiente *urina semper acri*; & ob eas rationem cum ardoris insignioris sensu eacernatur: item quod hae Nodus Diabete serbatur a Pradictis eodem modo atque *Pulvis Nitricus*, per ea nempe quae *acrimoniam feri* salum nimiam temperare valeat, qualia sunt verbi. grat. *Lithium*; & denique, quid hae Diabete Nodus inter alia causas remotas ea *aliqua remedia* *Diuretica*, contenta Corporis attenuantium, ac Renes stimulantium excitari solent, quod patet ex *observationibus TULPII loc. supra citato*, & HELMONTIO l. 1. a. de *ex AMATO LUSITANO* *Coar. 2. observat. 49.* ubi testis fuit Diabete ex usu Vini inacrioris, & Mariae Frenculii margini, quae potens est Diureticum; item SCHENCKIUS in *observat. pag. 455.* ea Diureticum usu Diabete naturae memorat: a nimio succi Betulae, cuius vis diuretica nota, oia, Diabete lethalis observatus fuit in M. A. N. C. *Ann. 2. st. 198. pag. 300.* item a potu Spermaria Ranarum insignem Diabete LÖSSIIUS habet in *observat. pag. 314.* & ex abusu Theae GRIMMIUS in *Constat. Medico Chym. pag. 435.* Nam nimis Diuretica haec Alcali subtili plus minus praedura in accide salum volatilis in primis viis abundo, hinc acriorem reddit massam sanguineam, caeteraque contenta, hincque liquefactum humorum astringit, & simulando simul Renes, sub forma Urinae excretum facient. Hinc est, quod acida volatilia potentes ob vim diureticam, quam in primis viis acquirunt, etiam Diabete eacernat: sic ex *Grithonium* usu Diabete notat SCHENCKIUS in *observat.* item ea Pomaceis, item ea abusu Vini Rhemani, unde invariabilem Diabete notat WILLISIIUS *Pharm. Rat. P. 1. cap. 3. pag. 171. (O)*

Acrimoniam autem hae sanguinis cuique feri, colligunt Fermentum Renum, dependet a *Fermento* ea primis viis, nempe *Ventriculi digestio*, quavis ratione vitato aut alterato, adeoque prout Ventriculi primi Digestio basis est reliquarum omnium, ita & huius ratione vel macri vel pingues redimunt; & consequenter ea alterato eodem pingues emaciari denno possunt, prout scilicet Fermentum eius spirituosum plus minus acri vel temperatum fuerit, indeque similis noxae chylus Corpori undique distribuitur, quo tota massa sanguinea, hinc & alia liquida, & tandem etiam solida afficiuntur, itant ab *acrimoniam alcalina*, destructio Acido pingui, cuius missionis in sanguine feminili Vinculo, liquefactum in talia ferola Liquamina; sicut crebrius ex primae Digestionis errato, indeque acri colligativo Fermento enato, fluxus Alvi colligativus exoritur, cum insigni ex Corporis macie, Virium debilitate, vel sicut remedia Purgantia ferit simili colligescuntia operantur; ita pariter simili ex origine aliud acri volante fermentum, contentorum Corporis colligescuntia, & in ferolum consistentiam resolvuntur, rursus potest, quo factu facit massa sanguinea in substantiam aequalem. Quod etiam intelligendum de pinguedine, antequam coagulata sit ab acido blan-

do: hoc itaque destructo, necessario illa degenerat in liquidum ferolum; unde BARTHOLINUS *lib. 1. Hypo. lib. 1. obs. 5.* Diabete Spuria periodici mentionem faciat, qui sine ulla Corporis consumptione evidenter contigit.

Dubium adhuc est saltem, *unde tantum quodammodo acria exorta* per tam longam remem, quae alios non aequale totum massae sanguineae, & omnibus huius fucis? Non incongruum est, quod nonnulli existimant, nempe cum Aeria inspiratione effluvia aquae cum massa sanguinea esse absorpta, & in urinam transmutata. Sicut enim omnis Alcalia haec volatilia sunt vacua, unde humidum ea Aere attrahunt, & prompte liquefact; ita forsan acri hoc alcalium in massa sanguinea, ad instar reliquorum alcalium, imbiturine humiditatis ea aere ambiente tota inspiratione, copiam urinaris Latiscis augere. Sed non est adeo probabile. Certum tamen est, illa Alcalia, quod magis acria, ed magis acri exposita, copiosum phlegma attrahere.

II. Quod polletas, *Quare colliguntia succi ac pinguedinis in specie per Renes, urinae sub forma, expurgantur?* Non est solum textura *relaxata* & ferocitatis fluidi, facile per poros Renum transmittit, sed quoniam ipsi Renes simili affligit, & ab acri *volatili acido falso Fermento* ignibiliter vellicari & irritari videntur, cuius occasione, dolor, ardor, &c. circa Renes in Lumborum regione peregrit. Spirituum quoque impetus ob magis hinc coactur, adeoque & massa sanguinea ob oberius quasi movetur, non secus ac ea stimulo purgantium ad intestina, & stimulo Mercurialium ad Glandulas Ginguivum, uberius movetur & excernuntur contenta Corporis.

Atque *Diabete speciem*, nempe *genitiam*, quod artione oritur hae ipsa *ex nimia laxitate & apertura viarum infernarum*, licet nondum sufficienter detestatur, per quas *urina potius* ea primis viis ad Renes vel loca urinaria mandatur, concurrente forsan simul *Phlegma nimis laxo*, elibi finiente potest. ea cum fluidiora, antequam perficere iter alterata. Equidem fateor, vias has potius urinae potius nondum detestas esse: Nihilominus autem plures rationes firmiter persuadent, ob quas eam existitiam affirmo, considerando impossibile esse, ut ea primis viis potius late alteratione, huius negatis, detestatur. Fieri enim nequit, ut Semina integra Coriandi & Anisi, frustula Radici Apii, eacerna cum sanguine rapi, & hinc inde per Vasa capillaria circulari poterit; item, quia Vium subrum, aut Emulsi Amygdalarum dulcium & sanguini permiscuit & circulari cum eodem, sine insigniore alteratione nequeant, adeoque quae data proxima via & occasione ea primis ad loca urinaria transeunt. *Conferuntur* hoc ea, quod inter causas remotas hunc Diabete verum, seu viarum laxitatem disponentes ingrimis sint *ardula*, Jan vero, uti reddo asserti HELMONTIUS, aculeae via ascendunt supra Diaphragma. Nam eadem via haud, imprimis continuo eorum usu, subito per urinam denno transeunt limpida & clara in eodem quanto, & in eadem feri forma, quae fuerunt assumpta. Ab hoc ergo subito ac fupis repente aculearum haustu transita laate ite viae, ex primis viis ad loca urinaria descendentes, etiam potentes liberetorem concedunt transitum, & sic talis Diabete supervenit. WILLISIIUS quidem Diabete hunc verum in *Pharm. Rat. P. 1. Sect. 4. cap. 3. omnino negat*; sed contra Experientiam, quatenus GALENUS l. 1. a. bis cum vidisse dicit, & BARTHOLINUS cap. 1. *Hyp. 68.* refert, Urinam Vio in Paroysmo nephritico epoto adeo similem redditam fuisse, ut ignaris pro ipso Vio propinari poterit; sicut & B. SYLVATICO ibi narratum fuisse dicit, de quodam, qui Curis & Marafino senili emaciatus post emulsionem & consummata mox urinae illorum odore tinctam excreverit.

Sic etiam HILDANUS in *lib. observat. cap. 5. observ. 59.* ea usu Acidularum observat Diabete, in quo Laxa Amygdalarum immutatum transit; patet ZACUTUS LUSITANUS *Prax. Adm. observat.* 30. quinquies tale quid se observasse; sicut & LÖSSIIUS Cervicem immutatam redditam refert. Et JOHANNES PIGRÆY, Chirurgus quidam Gallus, in *Jus Chirurgia* refert, se vidisse Grana Coriandi, durante Acidularum usu post passum pro roborando stomacho assumpta, immutata esse Urinae redditam. Unde etiam PETRUS PAW in *observat. pag. 5. quarta Centur. Hypo. Bartholinianum anecdotum*, in Diabete motuo Renes admodum flaccidos & frequenter Liquidorum transitu observavit. Verum, ut caustimo, non flacciditate

(O) Spuria Diabete feri indubium scimus in Illustrissimo Archiepiscopo N. N. ex immoderato Frigide usu: inveni nempe reddito Ventriculi fermento, ac fauci bianchis, ob frequentem aqua mastic transitum, Renum canaliculis.

ditate Reſolutionis ſei paralyſticam, aliis enim potius ſupprimetur Urina; ſed faciliſſime nimis aperiunt, quæ Renes inſar ſpongioſe potius molles & ſlaccidi, ſiſque admodum permeabiles redditæ fuerint. Poſt acidulas etiam frequenter, calculus diſponit ad hanc Diabeteſ. Deſignæ tamen eſſe, quod SALMUTH Com. 2. obſervat. 53. obſervavit talem Diabeteſ potius plandè immutari in Febre Maligna.

DIAGNOSIS.

ſigna Diagnoſis quod accitit, *ſigna Diabeteſ veri*, ſeu immutari potius tranſitus, faciliſſe patet, modo conſiderentur aliſſima potuſſima cum excreta Urina.

Diabeteſ verò Nephus, hic copioſum urinae profluviū, cum paucitatè inſenſibiliter ereſcat, in principio vix preſentitur. Interdum enim ſit, ut copioſa nimis excretio ſit Naturæ opem, conſuetudine autem appetitæ Eggi levamine; verūm ubi copioſum micturitionem continuatam debilitas Virium, Corporis macies cum pinguedine urinae ſuperſtat, Oris licetitas & ſitis inenſuſſima, unde etiam Diabeteſ *Diſſolvens* audit (P), Ardoſ æ calor in dorſo, & ſimilia ſymptomata ſequuntur, ſignum eſt Diabeteſ periculoli. Interdum utrumque talis eſt tenuis, aquoſa, & pallida, uno nomine admodum croda, Carſium eſt, quod obſervavit WILLIſIUS in Pharm. Rat. pag. 164. & 172. quod nimis Diabeteſicorum admodum dulcitate, propter Alkali urinae acorem ſulvena pinguiſſa, unde ſapor mutatur. Particulari enim ætore ſalutari, v.g. Diuturniorum, Menſtrui autem antiquiſſima Gelatiſſima, & ſpiſſiorem ſanguinem conſiſtunt, quia & acrimonia particulatim ſubſtantiam Cancroſam inſar hinc inde, & aſiſiduo ſuo alterant purgatiſſima & carni muſculoſæ teatuturam molliorem, nec ætoreſcentem, adeoque hoc modo reſolvunt deſub eadem. Ea hoc urinae Diabeteſicorum micturitione derivanda videtur.

PROGNOSIS.

Quod Prognofis: Diabeteſ verus parum habet periculi, quia interdum ſponte ceſſat, æque partiſim faciliſſe curatur, partiſim non adeo nocivus.

Rarum eſt, quod duret per totum Vitæ curſum, quod ſine ſorta obſervatum in M. A. N. C. Ann. 2. Obſervat. 175. pag. 274.

Diabeteſ verò Nephus, ſeu copioſum urinae profluviū eſt periculoſum malum, & ſæpe lethale, imptimis uſi in principio, maturè nempe cogniti, curetur; deducit enim ſuccreſcit ad Tabem ichthalem Homines.

Idem quoque poſt immodicum Laborem, poſt nimium Venerei exercitium, poſt Chronica deſignæ Febres, pleſque ſumme incenſibilis eſt.

CURA.

Quod mediendi rationem: In Diabeteſe modo tres obſervandæ ſunt Indicationes.

I. Ante omnia *temperanda eſt Arterum* nimia alcaliſſima volatiliſſima ſeti, tam per remedia ex Fobre Pharmaceutico, quam Diætetico.

Unde ratione Potus Diætetico.

II. *Alimenta chyloſa ſucculenta temperata & ſubpinguia ſubſiſtenda.*

III. *Nutritivum moderatum interpolato uſu nimia ſuccoſum Colligatiſſimo, & urinae ſecreto nonnihil impedienda, additis ſimul blandis adſtringentiſſimis, & renes æ partes excretoſas.*

Ea quæ primo ſopore conveniunt, in ſpecie ſunt Sulphurea, quippe quæ ab Alkali diſſoluta ſua temperant, & hinc præcipitante compoſcent; & æſcoriaſia hinc ætore moderatè auſtera eidem alterantur quaſi ſegregata, & plura miſce adſtringentia. Quæ verò ex Potu Diabeteſe, ſunt alimenta ſucculenta, imprimis Lactiſſima. In genere rectè aſſereſſe videtur ZACUTUS LUSITANUS lib. 11. Med. Præſ. lib. cap. 17. Huius æſſectus curationem in quamplurimis convenit cum Hedica Febre; quia tam in ſex Rebus Nonnaturalibus, quam etiam in mediendi ratione, in ordo ſeris audus, ut Corpus refrigeretur & humedetur, firmetur Renes, & earum quæſerans caliditas attemperetur, ut loquitur ZACUTUS LUSITANUS l. 2. imprimis ſecundum ea, quæ curæ ſex Reſ Nonnaturalis, ac in ſpecie

Tom. II.

Alimenta & potuſſima obſervanda ſunt.

Ante omnia ergo quod Pharmacum Finitum conſideratur in hoc Noſto Diabeteſ: Appetit enim BRENDLIUS in Conf. 31. cui alii conſentiant, ex PLATERO aſſerit, præcipuum corationis eſſe Vomium, iubendo, ut, dum maxima Ager conſueſcit ſit, copioſam deglutiat frigidam, hancque repente revomat, quod ſit ſingularis quatuor dictus. Certam hoc eſt auxiliū pro reſolutione. Item ZACUTUS LUSITANUS dicit: præſtè Potuſſis ſi perſerim quibus ſalſa vel ſulphurea Pinita in ſponte abundat. Conf. etiam EPIPHANII FERDINANDUS Conf. 37. item H. RATIUS AUGENIUS Tom. 1. lib. 12. Epil. 3. & RIVIERUS Pr. lib. 12. c. 6.

Hoc ergo præmiſſo id ea, quæ ſervant acrimoniā diſſiſſimam, eſt accedendum, quæ inter appropriata imperiſſima ſunt remedia, quæ præparantur ex Plantagiſſis & Perſicula, Myrtillo, Papaveri, ſive eorundem Sacri, ſive Syriaci, aut Dioclyſis uſuſtat: vi enim ſua ſtyptica aliquali ſimul nonnihil increaſſant Corporis ſuccos, eorumque colloqueſſationem impediunt: Item Lapis Hamaricus, tam Naturalis & eius præparata variæ, quam Artificialis ex Vitriolo Martis & Saturni Saccharo paratiſſima: Imbimur enim he Hematites quaſi veras primitus à GLAUBERO eductas, tandem contra Diabeteſe Nephem deſcriptas in M. A. N. C. Ann. 3. obſervat. 143. p. 227. deſcriptas ſub nomine Lapiſ Chymici, qui revera nonnihil aliud eſt, quam Lapis Hamaricus præſticiſſis, Proceſſus eſt legitimus, & nobile remedium per experientiam probatum. Loco huius etiam Saccharum Saturni cum Vitriolo Martis miſtum; hinc etiam tinctura he diſſa Sulphureis Vitrioli aut Martis adſtringent, ex Croco Martis & ſpiritu Nitri parata, tinctura Martis Solaris, Saccharum Saturni, & ea ex Vitriolo Martis parata Tinctura Aſcorbica uſuſtari poſſunt. Hematites nativæ quoque in Vehiculo acido eſt uſuſtandus, operetur vi acido aſſerta. Conveniunt etiam Carallia, & varia ex huius parata, imprimis eorum Solutiones & Tinctura cum ſucco Citri, vel Limoni, Myrtilloſum Carallium cum ſucco Citi, vel Miſtura ex Carallio cum Aceto polychryſa SYLVIO uſitata, de qua vid. lib. 1. Præſ. cap. 30. p. 185. pag. 573. & M. A. N. C. Ann. 3. obſervat. 183. pag. 345. qualis in cura Diabeteſe ſæpe experta ſuit. Vel

2. Aqua Plantag. lib. 1.

Acet. Vin. ſimpl. vel diſſillat. 3.

Carall. 160. pulver. (preparatur enim magis diſcontinuat ſunt, unde non danda)

vel Temp. Syll. 3.

Lap. Citiſſi 3.

Syl. Perſiculi 3.

M. D. S.

Miarum Adſtringentium circummagtanda.

Capiatur coſtatione.

Potus Alumen, & ut alii volunt, ſpiritus Aluminis, cum conveniunt Vehiculo eſt egregium remedium. Et huius ſunt ſollicitiora, præter quæ tamen etiam Diætetum & Salutare pinguedine ſua ſulphoreis temperata impregnata, hoc etiam invenitur; item Troſchiſci de Carabe, de Terra Syllatiſſima, Vehiculo ſubſecido aſſumpti proſunt optime. Quibus ſpecialiſſimè uſuſtando tempore Oſtior ſunt intermiſcenda, ſalutariſſima, BRENDLIUS & RIVIERUS l. 2. Anſiſſima Troſchiſci, Benardicum Troſchiſci imprimis quando ardent Febres, item ardore ibi regione Lumborum, item Ardentium Saturniſſima & ſimilia, ſunt optima. Tandem Aqua Calce viva, ſive ſimplex ſive ſimpliciſſima, ſubſiſſima haulla nobile & ſingulariſſimè eſt experimentum contra hanc Diabeteſ in vid. WILLIſIUS in Pharm. Rat. Part. 1. p. 174. & 177. doſis lib. 4. ad v. & v. ter in die. Alii, ut Cornu Cervi album, Cornu Martis adſtringent, &c. vel ſponteſſis diſſis manifeſta evadunt.

Et hæc ſufficiunt ſunt primo & tertio indicatæ.

Cum his quod ſecundam Indicationem, ea, quæ temperant, & Nutritivum ſuggerunt, ſimul in anſum uſuſtanda: inter quæ eminent Lactiſſima, quæ temperant, æ præſentim Lac Chalybeatum: Hinc Itali æ Veteres commendunt Lac Aſinicum; in quo imprimis Ferrum candens exſiſtunt, & ita Chalybeatum ſaciunt, quod cum Miluſiſſima præſiſſima permiſſum ZACUTUM LUSITANUM l. 2. Præſ. Admin. obſervat. 7. commendat, quæ ratione Diabeteſe deſeruat curatur. Loco Aluminis aut Capſiſſi Lac Bubbolum commodè etiam uſuſtatur, imprimis cum Chalybe probe impregnatum; Item Emulſioſſima ſalſa ex Amygdaliſſima

G. G. G.

adſiſſi

(P) Διὰ τὴν διὰ τὴν, ſitis. Hinc nomen Herba, Dipſacus (quæ Vergem paſſeris appellat, & Latræm Veneti) quod pro amipſoriam, quod non ſitiat, in coſtaco etiam aliterum ſubſtantiam compoſitæ aqua ſemper coſuetur, ad ſum in maximis æſtatis calidioribus expelluntur.

alutibus, Semicibus quatuor Frigidis majoribus (que ipsæ tamen in paucis doli addenda) & minoribus, cum semina Papaveris albi, &c. exque creberris & copiosis busulis subinde usurpanda sunt: vid. GRIMM. l. a. qui Diabeterum cum Macie ex abusi porus Thee curavit cum Dintæ ex Lade, & emulsionem Seminum quatuor Frigidorum majorum, quibus Syrupus de Nymphæa, & Syrupus de Papavere est intermiscendus. Lac Chalybeatum semper cibis est adiungendum (seu permiscendum, & tempore nodus seu vesperatio Opiata non negligenda.

Interius Sacculi & Fomenta ex Plantagine, Folis Quercus &c. in Aqua Chalybeata cocti; subinde regioni Renum applicentur: Item Caceri fluviales aut recentes contusi, eorumque succum rectè expressis, dicto loco admoveantur.

Diabetes propriè dicitur & Vitis, seu potulentorum nihil immemtorum transitus, convenienter curandus venit per Adstringentia talia, quæ stomachum nempe & primas vias blande adstringendo roborant, qualia sunt in specie Martialis, & Vegetabilis adstringentia Aromaticæ: Nempe par ratio est, atque quando in potu acicularum subinde usurpanda sunt omni passim blanda Aromaticæ & Adstringentia, quæ stomachum nempe & Viscera firmant. Fugienda autem sunt in hoc Diabete Cydonia & Cydoniata, aut saltem non crebè nimis usurpanda; utent enim sine adstringentia, summè tamen sunt Diuretica, uti hoc non tantum observat BARTHOLOMÆUS Crat. 5. Hb. 25. sed etiam SCHENCKIUS in observat. Ergo Martialis & adstringentia cum Aromaticis & alla Vegetabilis adstringentia, quæ ex Plantagine, Tormentilla, ex Consolida majore, Mentha, & similibus parantur, item Decellum Prunorum sylvæstrum, Decellum Corticum Aurantium, Quercuum & similia usurpanda veniunt. Crocus Martis adstringens, etiam Tinctura Sulphuris Vitrioli, Bolus Armea, Terra Sigillata, cum Confectura Rosarum vitrualea, & Confectura Radicis Symphyti conducunt. Potus sit Plantago in Aqua Chalybeata cocta. Tandem cum singulari Experimentum commendat, si recipiatur Crista Galli, calcinetur, eaque manu & vesperi Ægro in propria eius Urina propinquet, quod cum probabili secretum contra Diabeterum vendit, & ex fide, qua accipitur, communico.

Qui plura de his cupit, adeat præter MOEBIUM & WILLISIIUM de Urinis, SYLVIIUM in Praxi c. 55. qui tres Authores sufficient.

ARTICULUS IV.

De Urinæ depravata in Renibus secretione.

Veritas adhuc in visis Urinæ secretionis, & superest *Depravata Urinis in Renibus secretionis*, cuius modi non tantum sere sunt innumerabiles, dum scilicet divergimodè affecta Urina in Colore, Consistentia, & Contentis excernitur; spectant tamen sub Praxi Medicam eadè.

1. Urina nimis Pinguis, & Oleaginosa.
2. Urina Rubra Sanguinolenta.

MEMBRUM I.

De Urina pingui & oleaginosa.

Quod attinet *Urinam Pinguem* seu, ut alii vocant, *Oleaginam*, diversimodè accipi potest. Nempe hic ante omnia distinguendum inter urinam Pinguem, quæ est talis saltem ratione *superficiis*, & ratione *consistentiæ*. Quod *consistentiæ*: an scilicet in eadè tota Urinæ materia excrcta Oleum quoddam repræsentet, vix credo, usi forsitan in Diabete vero pinguis & oleosa alampsea sub forma propria denum excernatur, quod tamen nunquam me legis non memini. Aliis etiam Urina talis, perfectè scilicet Oleaginosa, fieri nequit, ob incompatibilem Aquæ cum Oleo miscellam, quæ nullo modo possunt conjungi, nisi sit Sal Alcali fixum in Urina, Pinguedinem solvens, ut videmus in Saponibus, Cum verò in Urina tantum sal Solum volatile, non vegetorum Alcali insit, idè nec Urinæ pinguis & Oleaginosa excretio quod Consistentiam concedi potest. Pinguis ergo sipe excernitur Urina, quando nempe in *superficie* eius quasi crusta aut pellicula pinguis superstat; quæ ipsa tamen crusta, probè distinguen-

da, an sit vera pinguedo? an verò sit solum crassa salina, pinguedinem saltem mentiens? uti in Scorbutica & Hypochondriaci usuevit fore. *Differencia ratio* in eo consistit, quod talis crassa superstat, si coquet ex Concentratissima salinis in pelliculam insipillat, quod tunc ad latus iuxta lucem aspecta varios colores infat cauda Pavonis, vel inflat Iridis in sua superbie repræsentat; id quod insalubile signum est crassæ salinæ ex Malo Hypochondriaci aut Scorbuti, in quibus salis heterogenea abundant. Testantur hoc omnes solutiones salium ad Pelliculam insipillatæ, quæ pingues videntur. Ubi autem vera est pinguedo, quæ Urinæ superstat, siue nullo colore solet esse conspicua, & etiam subinde quasi guttulas repræsentat, quæ & ipsæ deficiunt in crassa Urinæ salina. Pinguis autem sit talis Urina ex Colligatione partu pinguiori Malle Sanguine, in specie pinguedinis Corporis, unde pinguedo talis frequenter apparet in Urinis, Febre ardente colligata, acutissima Hæctica, Tabæ, Ulceribus Renum, & similibus afflictorum. Et hæc ipsa Colligatio oriri videtur ex defectu acidi debiti in Malle Sanguinis, quod ipsum aliis insipillat & blandè coagulat pinguedinem nutritivam, cuius defectu ipsi denum liquefit pinguedo, & ita cum Urinæ denum excernitur; quæ tamen cum non possit ita dem Urinæ misceri, supernat, & sub figura Osci conspicitur.

CURA.

Quod Curam: curatur hæc crassa salina, pinguedinem in Urina mentiens, facili, curato Morbo primario; ac in specie conducunt *Martialis*, acidum peccans absorbentia, & hinc *Polivitis*, illud ad vias urinarias deducenda, ac per Cutem emittenda. Urina verò, cui *pinguedo vera* supernat, curatur sponte, modo primarius curatus fuerit Morbus, in specie per *acida blanda*, pinguedinis liquefactionem impedienda, tamque coagulanda, ut spiritum salis dulcem.

MEMBRUM II.

De Mitsu cruento.

Potèd *Urinæ cruenta* seu *sanguinolenta* excernitur, quando ipsi permiscetur sanguis, nunc copiosus, nunc paucius quidem; unde interdum minis tincta lotura: Curam similis apparet Urinæ, interdum verò intensius rubet: si magis tincta, ipsa ac crassa, apparet, vel potius ex opaco nigrescit, ita ut etiam Lintum immersum suo robore sanguineo indicat, & interdum cum sanguine in fundo matula subsidente apparet. *Sanguis iste*, qui tinctur Urinam, ut plurimum ex *Renibus* effluit, seu in Renibus ipsi permiscetur, interdum tamen etiam in *Utericulis*, interdum etiam in *Testiculis*, interdum ex laeis Arteriosis in *Pene*, quale exemplum vid. in GRAEFIO lib. de Organis Generat. Viror. pag. 151. Rarior verò ex *alio* quocumque loco urinarius exoleatur, utrum Urina simul excernatur, ver. gr. in Casu ab alto, aut si grami sanguinis in pedure, vel alio quodam loco hæreat, qui succellat ad vias urinarias defluant. Id quod tamen fit rarius, & citra ullam viam urinariam incommodum; sicuti rarum est, quod propter inflammationem aut emulsionem Hepatis. Urina cruenta interdum emittatur. Ex causis etiam antecedentibus facili cognoscitur.

CAUSÆ.

Causæ Urinæ cruentæ, non secus atque aliarum hæmorrhagiarum (est enim miasa cruentis species hæmorrhagiarum) in genere oriuntur interdum ex *Anafluxu* Valsorum Sanguiferorum in viis urinariis, interdum, idque frequentius & creberris, ex eorum *Disruptis*, vel *Disruptis*, seu ruptis Valsorum Sanguiferorum in locis urinariis. Quod *Anafluxus*, seu aperturam Valsorum: hæc frequenter fit autem viis *Contestatur*, in specie impetu sanguinis, aperturæ viis irruptione concitatore oscula Valsorum; autem *viis* *Disruptis* Valsorum renalium, quando potuli Renum sunt nimis aperti cum eorum Tabulis, unde sanguis per hiances poros unâ cum lotio variè transmittitur: adeoque à Tabulis Renum nimis apertis missionem cruentam interdum accidere rectè allegit WILLISIVS *Pharm. Rat. pag. 166.* quod vitium Vesicæ quoddam *Immobilitatem* *Renum*, etque huiusmodi miasa ferè insolens, nimisque intensa tinctura Urinæ, minique crassa. Quod *sanguinis impurum*, inferentem Valsorum Anafluxum, sequitur interdum miasa cruentis post Equitationem asinam, item post nimium motum

motum corporis, ſultam animi, & facile in renibus impetu in ſanguine concitato, urifici aperi, & ita Miſtus cruentus in urini poſſet: Vid. HILDANUS *enarr.* 6. *obſervat.* 46. In ſpecie *Miſtus cruentus per anſam* nunc eſt *ſpontaneus*, nunc *non ſpontaneus ſeu ſymptomaticus*: Ille nunc *crucius*, nunc *periodicus*, nunc *vagus*, &c. eſt. Precedente autem ſolet *dolor gravitatis & reſtatis*, uti & comitari ſolet huiusmodi cruentam Miſtionem perceptibilis in iſto loco, in quo ſanguis ſuo impetu anſationem inſert; ſequitur enim interduſ ſolennes excretionis ſanguinis ſuppreſſas Miſtus cruentus; hinc etiam FORESTUS *lib.* 24. *obſervat.* 7. loquitur: *arſum cruentum ex alio deſapſiſtatione emitti videtur, idque ſapſiſt etiam ex nimia venia in adoleſcenti nobili, in mulieribus etiam menſibus ſuppreſſis, & in aliis haemorrhoidibus fluxu conſuſis & reſtatis*. Truncata etiam Manu vel Pede, aut pleno corpore, ea abſceſſibus ulcereque cruento, urinam cruentam emittam fuiſſe ſcio: id quod ulteriori obſervatione confirmat de Miſtu ſanguinis, ea ſuppreſſas haemorrhoidibus per intervalla oriundo, HILDANUS *enarr.* 1. *obſervat.* 11. Quin & *Periodici* quibundam urinae cruentae Miſtio obſervatur: vid. praeter SCHENCKIUM in *obſervat.* SALMUTH *cap.* 3. *lib.* 47. de Miſtu ſanguinis periodico & quaſi menſtruo, qui cohibitus Mortem intulit. Criticus obſervatur ſanguinis Miſtus, dum morbi ſolvuntur Urinae ſanguinolentae excretionē: Sic ZACUTUS LUSITANUS *lib.* 2. *prax.* adde, *obſervat.* 69. Miſtum cruentum *crucium* in febre ardente obſervavit; ſicut etiam *pluridius* interdum per ſanguinis Miſtum judicant obſervant ab HILDANO *enarr.* 2. *obſervat.* 31. & SCHENCKIO *lib.* 2. *obſervat.* 20. ex MARCELLO DONATO. Pertinet hoc *ſui abſus* ad Miſtum cruentum diſponit, de quo vid. ZACUTUS LUSITANUS *mod. princ.* *lib.* 139. Item *diarrhoea* ſociata aut accitior, v. gr. poſt ſpiritus Terebinthinae animam doſi, Miſtionem cruentam reſert HILDANUS *enarr.* 5. *obſervat.* 52. Tandem *abſus* ſomni anſationem vaſorum, & ita etiam Urinam cruentam inſert, dum in actu venero nimio praecipue circa veſicam & partes genitales via ſanguifera nimis turgida biſcant & aperiuntur, quae aprae linguem fundunt: talia exempla non ſunt rara: inter alia reſert FORESTUS *lib.* *obſervat.* 10. & 13. miſtum ſanguineum ex nimia Venere, qui *ſpangia* Aceto calido inſuſi, & lumbis ac partibus genitilibus, circumſcripta, curatus eſt, Acetum enim temperando tempera Aſium, & blandi Vaſculorum ruſorum Oſcula adſtrinxit.

Hic de Anallom.

Quoad *Diarrhoea*, & in ſpecie *Diarrhoea*, hic frequenter Causa Urinae ſanguinolentae exiſtit, *viz* *Conventoria* acritum, aut erodentium, aut aliquando leidentium Vaſculadiorum locorum, dum nempe a Sero nimis acri Vaſculadiorum Causa circa vias urinarias eroduntur: vid. FORESTUS *lib.* 2. *obſervat.* 6. 11. 12. & 13. Quo etiam pertinent *Exulcerationes* & *Exarationes Renum & Viſae*, quas ipſas partem propter Eroſiones Vaſculorum non raro Miſtus Cruentus, partim ſenſus Doloris plus minus rodentis, aut etiam alius in parte aſſecta moleſtus comitatur. Tali ea Causa Miſtus Cruenti Scorbuticis, Catarrhis, & ſero acido-ſilſori. aut alius plus minus corroſivo praeditis, accidere ſolent: *Calculus* iſdem aſperitate ſua laedens & lacerans Renum, Ureterum aut Veſicæ Membranas, ſubinde etiam Miſtum inſert. Faciunt etiam hoc imprimis *Cantharides*, de quibus notum eſt, quod aut inepte aſſumptae, aut etiam extrinſecus cum Veſicatoriis ſine iudicio applicatae, imprimis alique Acidis, Miſtum cruentum ſubinde admodum doloroſum, & Veſicæ exarationem inſerunt, in quo ſimal Penis ereſcit, & ſimal ad Venereum excitatio adeſſe ſolet: Vid. FORESTUS *lib.* 24. *obſervat.* 7. Dico, ſi applicatur *alique Acidis*: Committitur enim ex Pulvere Cantharidum, Fermento & Aceto Veſicatoria parantur. Ubi tamen obſervandum eſt, quod talia viſeſtoriam imminuant, & eorum corroſivitate & Sal volatile nitroſum temperent, quò minus poſeater quidam poſſunt veſicare, ſed minus etiam hac ratione interduſ nocent. Cantharides enim habent Sal volatile nitroſum, quod cum Acidis deſtruitur: alique Acido vero ſpſcitae Cantharides Miſtum croceum inſerunt, quod quotidiana loquuntur experientia, Miſtum & *ſermitis* cruentum habet SCHENCKIUS *obſervat.* *lib.* 3. *obſervat.* 194. Pertinet hoc curioſa iſta Obſervatio & Hiſtoria, quae habet HORSTIUS *lib.* 4. *obſervat.* 42. Miſtionis Puralentis & Sanguineae ea *Urinae Causa* eſt, propter Carunculam ibidem loci ex Acidularum uſu ſuppuratam. Praeter Cantharides etiam obſervatus ſuit Miſtus cruentus ex *aliqua Aliis*, teſte SCHEN-

Tom. II.

CKIO in *Obſervat.* Item ex nimio *Alumini* Urina Cruenta enata reſertur in BARTHOLINI *Alb. Med. Hiſt.* *volam.* 2. *pag.* 167. Tandem in Morbis Malignis, ac ſpſcitam in Variolis, ſupervenit ſubinde Miſtus Cruentus, qui, quando oritur erofione Vaſculorum aut Veſicæ, eſt pellimus & admodum ſuſuſus, cum ordinarij intereat Aegri. Exemplum in SCENCKIO, HOECHSTEDTERO, item in SALMUTH, aliſque ſimilibus inveniantur, quod acempe Sanguinis Miſtus in Variolis ſere ſemper fuerit lethalis. Forſi & iſti Miſtus cruenti, qui in aliis *Febribus Malignis* obſervantur, hoc pertinent, ut quando Haemorrhagia Penis nimis in Febre Maligna, aut Haemorrhagia Narium lethalis: Vid. HOECHSTEDTERUS *Decad.* 1. *Caſa* 3. Quin & in *Feſe* obſervata ſunt Urinae ſanguinolentae, quae inter peſſima tunc temporis reſcitur ſigna. Tandem *Urethram* vulnerata, exulcerata, & c. etiam Miſtum cruentum intulit, GRAEVIUS de *Organis Viril.* p. 150. *reſert.*

Hae quoad Causas Miſtus cruenti Internas.

Quoad Causas Externas: quilibet *violens* *Mutis* roptioni circa loca urinaria occasioneſ iuggerens, Miſtum cruentum inſerre valet. Talis ſunt ſaltus nimius, calus ab alio in Doriū aut Lumbos, Thorax valeturatus: Vid. RHODIUS *Cent.* 2. *obſervat.* 19. Item conſuſio vehemens circa loca interioria ſalia.

DIAGNOSIS.

Sequuntur *ſigna*, quae ſatis ſunt clara, quoad *Diagnos*: Nam Urinam eſſe Croceam tinſtam, facile per ſe patet, *modis* *diſtinguatur* *Ruber* *Urinis* *Sanguinis* a *Rubedo* *Sadina*, quando nempe contentis copioſioribus ſalinis moleſtis perit unitis cum liquore continetur, idque ſere vi Acidi, Rubens repraeſentatur color; quae Urinae differentia facile cognoscitur. Urina enim rubra interdum emittitur, cui nihil Sanguinis eſt admixtum, ubi Urinae rutantes & quaſi ſanguineae excerni ſolent. Rubedine haec ea contentis ſalibus ordinarij eſt perſpicua, elara & quaſi fulgida, ac non adeo creſcit, vel inſar Cinabaris, vel incarnati nonnihil coloris, ſuggerit: eorumque eſt a Sanguine rubra, ſemper eſt opaca, turbida & creſcentia plus minus, proat plus minus Sanguinis eſt permiſtum. Unde & a Salibus contentis orta Rubedo ſplendet quaſi: ſimili namque ratione ac Liaivium lotricum, quod magis eſt Alcalibus impregnatum, eo magis ad Rubedinem vergit; ita & Urina quod magis Salibus turgit, eo magis flavescit aut rubefcit: quae verò eſt a Sanguine, alique ſplendore ubique minime clara obſervatur. Iſta interdum in Febribus, interdum in ſcorbutis, Malo Hypochondrico & ſimilibus, ſubinde accidere ſolet: Hae etiam in aliis Aegris deprehenditur.

Et Urina Cruenta, ſi ea Sanguine conſtat, ſi aliquandiu ſteterit, uno altero die *Craſſamentum* ſeponere ſolet ea intente rubro quaſi nigreſcens, & Sanguinem granuloſum exaſe reſerens.

Verum cognoscendum ulterius, *ex quo loco aſſeſt* *Sanguis* *preſent*? Si enim eſt ea aſſeſt Renum aut Veſicæ, ſemper dolor aut gravitatis, aut acutus rodens percipitur circa locum aſſectum: Quorum ille quoque dignoſcitur, ſi Sanguis copioſior fuerit, & Urinae inſimili permiſceatur; item liquidus, ac non granuloſus ſubſideat. Hic, ſi Sanguis parior Urinae non aquaſiter perſundatur, cum granulaceis ſubſideat, ac cum Doloze Urina prodeat.

Interdum tamen *aliqua* *Mutis* *arinaris* tale quid comingit, cuius laſi ſigna praecedunt, Sanguis ſine Urina eſſiſit, & mox contentis ſubidet.

Si eſt ea alio loco Sanguis, alios partis aſſeſt ſigna & ſymptomata concurrent.

Ex quibus vero *Caſis* *oriatur* *Urin* *Cruenta*, oſtendunt antecedentia & adiuncta. Hinc de omnibus Miſtus eruentiſ differentis Medicus ſit curioſus, quoad indagandas Causas, an nempe ſit ex Anallom? an ea Diarrhoea? & ſi eſt ea Causa externa, Sals, Cantharidibus, &c. potest ex Aegri relatione; ſin a causa interna, examinandas eſt Aegri, an ſit Scorbuticus? an ordinarij aliis Sanguinis excretionis ſuppreſſione laboret? an percipiat dolores circa Renes aut Veſicam: Nam ſi caſus ab alto praecedat, ſoſa laſia, & circa quae Sanguis exaravatus heret, non poſſunt eſſe incognita, in quibus ſuſpicatur Sanguinem deſerbi ea aliis locis ad Renes.

Si aliis adiunt Symptomata Calculi, ſemper de Renibus; aut de Veſica aſſeſtis, horumque horatione, ſuſpicio ingruit: vid. FORESTUS *lib.* 2. *obſervat.* 6. 11. 12. & 13.

G E E E

item

item Ulcera Vesicæ aut reum antecedentia aut concomitantia ex Diuresi midium cruentum ostendunt; simul adeo se iolet dolor acutus rodens, moricans, in specie mollis circa pubem, aut velicam; item si præcefferit stranguria, dysuria, &c. manifestum signum est, Midium cruentum esse ex excoitatione & erosione valculorum.

Obseruandum simul mori notari, siue criticus, siue periodicus, qui serè citra alius partis urinarie affectum contingit, ne impediatur, & pro morbo habetur, qui tamen salutis.

Quod si Malum sit à Causa externis, à Cantharidibus, à Radice Rubiæ Tinctum, quæ colore rubro inficit Urinas, item si ab eâ Prædicti indici majoris, seu Opuntie oritur, quæ ipsa etiam tingit Urinas, ex relatione Agri cognoscendum.

In specie si sit à Cantharidibus, adesse simul solet intensus Stimulus Venetis, itaut Penis sit tendis & rigidus, & Agri ad Venerem indigenter simulatur, & si quæ sunt alios singules Circumstantiæ.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis: omnis Midium Cruentum, imprimis copiosius ac sæpius recurrent, periculosum Midium est, inuens eadem varique symptomata, quæ hæmorrhagias nimias insequi solent: Nam verb. grat. ex Midio Sanguinis diuturno Mysterium obicitavit SCHENCKIUS lib. 3. observat.

Minus periculosum, est Sanguinis Midium ex Pudentia, & à Calore; magis periculosum, quæ erosione ac exulceratione Vessæ, cum metuendum est, ne in Vesica subsistens periculum Urinæ suppletionem, aut sui corruptela varia symptomata inferat.

Omnium maximè periculosus est, qui ex Renibus, præsertim erexit, aut eorum, ut vocant, ambellente, Malum ortum fuerit.

CURA.

I. Quod ergo attinet Curam: in hac primario multiplex Causarum Remotarum varietas attendenda, & hoc Cura nonnihil varianda; unde Causa remota, adeoque Anasæsthesi tam præfessionis quam Remediis adstringentibus curanda; Discreti autem vel Discreti Vulnerarii Confidentibus & Appropriatis corrigenda, hunc in specie Acrimonia Seri erodens aut exulcerans temperanda, & Vis æquiva vel totum Vulnerarii & Adstringentibus consolidanda; speciatim tamcum, cum frequentissima Causa Interna solet esse Acrimonia Seri erodens, & plius minus exulcerans, hæc imprimis Acrimonia temperanda, adeoque maximam partem ad Hæmoptis dicta Remedia, conducunt. Imò cum Serum urinarium plius minus acrimonem Midium Cruentum undecunque ortum exulcerare solet, semper una attendendi Scopus probè attendendus venit, vnde Papaverinum ac Opium, item quæ supra Sect. 18. cap. 1. Art. 12. & 13. circa Exalterationem Renum & Vessæ fuerunt mentioni, locum inveniunt.

II. Vnde ita interdum locum habet. Nempè pro Sero vel Renalferis vel Diuresibus, quando nempe occasione solennis cuspidam Sanguinis Excretionis suppressæ Midium Cruentum ortus fuerit, quæ ratione per Phlebotomiam Midium Cruentum ex Meri nimia potione in Plethoricis curavit ZACUTUS LUSITANUS cit. loc.

III. Purgantia, quæ milia, non convenient, cum faciliè acrimonia sua exasperare Malum queant. Salm Rhubarbarum est, quod curare, & magis pro Scopo alterative, quam laxative, adeoque in seruitute Corporis Habitu, aut in acciori Sanguinis Crasi, item in Reum ambellente Rhubarbarum est optimum. Hinc Phlegmæ Rhubarbarum Sæpius plantaginis; item Pulvis Rhubarbari parum terrestris, & in specie Pilule terrestris cum Rhubarbaro aliquandiu continuatur, nobile sunt experimentum HOFERII Hæc, Med. pag. 176.

Hic ita præmissis, Remedia vel sponte patent. In genere quoque quæcunque Remedia supra Sect. 18. Cap. 1. Art. 1. de Hæmorrhagia in genere dicta, & Inter hæc in specie Mixturem Polydrocha SYLVII in Idea Præx, ubi de Cruentio Vomitu, locum habet:

2℞. Ag. Plantag. 3℞.
Cinam. 3℞.
Acri diffillat 3℞.
Corall. rub. pr. 3℞.
Sang. Dracon. 3℞.
Laud. Opiz. gr. ii.
Syr. Myrtin. 3℞.
Mile.

Hæc Mixture coactatim sæpius assumpta curabit plerumque Valsorum rupturam, & septa multorum expectorationem Sanguinis Effluxum brevi tallet, secundum Experimentum GRAEFFII Tract. de Organo. Genit. Phorum pag. 199. ubi Exemplum habet Midium Cruentum periculosissimum ex Iactis Penis Arteris propter Calum; quem alius irritis idâ Mixture Sylviana egregiè curavit. Item Marialis & Opiani conducunt.

Cum verò semper ad Acrimonia Seri urinarie acidulâ plius minus respectus sit habendus, præ exteris ob id conuenientiora quovis modo usurpata, item Plantag. & speciatim ejus Succus ad 3℞. vel iv. hantus, & omnia ea his parata Remedia, quæ simplicia, & melius: Vid. RIVERTUS. Sympus item compositis ac succo radice symphyti, & succo lorum Plantaginis, quem communicavi supra Sect. 6. cap. 1. ubi de venis Græcæ. Pott hanc est Equisium, cuiusque Decoctum, quod & ipsum egregiè conducit. Hinc Confusio mæpæ, Mellefolium flore noli, cuiusque Decoctum, quod egregiè commendatur ad Consolidationem. Convenit quoque Bursa pastoris, Hedera terrestris in Cerevisia cocta. Decoctum Auriculae Maris & Pimpinellæ Italianæ in Lacte caprino commendatur ab HORSTIO lib. 4. Observat. 92. Hic in specie addatur Acrimonia, seu Exasperatione vulgaris, quod imprimis remedium ab omnibus Prædictis expertum contra Midium Cruentum quovis modo usurpatur, tam interne quàm externe, adeo ut etiam in ipsa Renum & Vesicæ Exulceratione probè conducit, siue Acrimonia sola, siue eadem cum Hyperico mixta, usurpatur; Unde LINDANUS Agrimoniam miscet cum Quinquemilio, & Mellefolio, cum selecta simplicia contra Midium Cruentum. Hic imprimis sociandum Myrtis, tam plius quàm ejus Sempis siquidem hoc etiam speciatim est ad Ulcera Renum, ratione odoris sui & asperitatis combinati, unde etiam cum hoc TIMÆUS von Goldenklee per Ekkehartiam elegans contra Exulcerationem Renum quæ prolat in Calibus, ubi Medicamentum, Descriptum pag. 451.

Vel

2℞. Herb. Agrimon.

Mellefol.

Succum. hyper. stor.

Melle Prun. sylvestr. ana M. i.

Rad. Symp. 3℞.

Sem. hyper. 3℞. vel sil. ad 3℞.

Ischi. & contr. coq. vel in Hæc (cui tempore est addatur parum de Lap. Caner.) vel in Aqua. Ferac. vel in Lacte, vel in Sero Lactis Chalybeato:

Colatura eduletorum cum Syr. de Symp. Prun.

D. 3.

Potio Adstringens.

De Decocto hec habuit subinde Haustus, addendo simul, si Decodio sola fuerit in Lacte vel Sero Ladis, Lactis, Caner. in Decocto. Egregium est ad compediendum Midium Cruentum. Vid. sect. 18. cap. 1. art. 12. decollum in ulcere ream prescriptum.

Egregiè quoque conducit tam preservative quàm curative hedern terrestris, siue in decodo cum Aquæ & cerevisiæ ana, siue in extrado, ebulliendo nempe eam in aqua, vel in succo exprimens, & colatum faccharin condendo.

A quibusdam etiam insigniter laudatur Sella Armena ac tota eiusdem plantæ. Porro Chamæpitys seu iua arthetica commune est experimentum POTERII, cuius decodum in Julculo carnis paratum in Midio cruento & alceribus renum optimum, & speciatim SULZBERGERI est. Item pertinet hæc decollum ad Midium cruentum Myrtis in suo Armenum, quod est egregium. In specie hoc Ovalum ad 3℞. cum 3℞. Belli æterna assumptum omni mane experimentum est, aliquoties comprobatum, uti hoc videre est in FORESTO lib. 12. observat. 19. quod etiam expertum est cum succo; item TIMÆUS von Goldenklee in Causa lib. 1. cap. 2. pag. 180. qui sæpi hæc bolum Armenum cum lacte Ovillo feliciter propinavit; imprimis conducit, si ab acrimonia seri & exulceratione partium, siue etiam casu ab alto, cruentus Midium oritur. Adhuc succum & omnia steruata, in specie est hoc parati Trochisci de carabe etiam in hoc casu cum fructu usurpari possunt, si cum vel sine Terra sigillata sumantur in aqua Plantaginis, una cum pauca Acero acidulari; sic enim melius operantur. Conferatur TIMÆUS von Goldenklee cit. 23. pag. 248. ubi trochisci de carabe ad 3℞. cum Belli æterna 3℞. in aqua Plantaginis, quo iæpui probatum remedium laudatur: Quibus in malis contumacior opus addenda. Hæc quoque trochisci Gardani, & species Dis-Plantaginis Myrtis pertinent.

Caravi

Carad aliquando Vesicam, Mischu Cruento laborantem, ex Acrimonia Seris scorbutica nato, propinando Trochiscos de Carabe cum Lapillis Cancrium & pauco Sacchari Saturni, Sed utriusque huiusmodi, coactantiam tamen sanitatis conciliavit liquor martis solaris, doli guttur. decem ad quindocim omni mane ad aliquot dies continuatus.

Hanc & Tinctura ipsa Polycresta, Tinctura sulphuris Vitrioli, & Tinctura Antiphosphica ex saccharo lactari, in quolibet Mischu Cruento sunt proficue: ista quidem, ubi magis est adstringendum, hinc vero, ubi magis est temperandum. In specie tutius Martis hamatiter inter ea, quae in genere ad haemorrhagias nimias conducunt, & ex eo parata Remedia conveniunt, ita ut assumptus cum copioso Lacte etiam ad Mischum Cruentum à Cantharidibus esortum proficit: loco huius commodè etiam terra sigillata, & quaecunque pingues, Item Salus Armana, in iussu vocatur: Acrimoniam eodem insigniter temperat. Quotiesque pertinet haematemis artificialis. Emulsionem etiam ex feminibus lactiferis cum liquoribus adstringentibus parari possunt, & g.

M. Sem. quatuor frigid. maj. an. 3i.

Papav. albi 3iij.

Aqua Plantag. vel Urtic.

Melleosul. an. 3ß.

Rosar. 3ß.

F. Emulso; coi addo

Ceraul. rub. 3r.

Urtic. frigid. vel terr. sigill. an. 3i. vel 3iij.

Edulcorata cum parom syr. Agrimon.

D. 5.

Emulso adstringens & temperans.

Optima autem per se nota sunt: in specie stellanarium Hali-dai Pedicularis ad ipsum sanguinem ex coactura Violarum, & semine Hyocymami, supra sess. 18. cap. 3. artic. 4. laudatum, commodè hic applicari potest.

Ut pro sepe vulnere hinc consolidatio est melius operari possint, inter hae eminent remedia ex Caveris flaventibus, five succis, five eorum in oleo linio exsiccatorum Pulvis utroque: quibus dicta quaedam Vulneraria appropriata, in specie est iam dictis simplicibus ad Mischum Cruentum laudatis, superaddenda sunt. Ultra canerina & Vegetabilia haecenus dicta, praeter expertus est coactum terebinthina usas crudus, adstringendo & consolidando omnibus scopis satisfaciens. At in specie, ubi Mischu cruentus ex Diacresi Valorum fuerit: Uade vel peno Plantari Terebinthina, quae vid. in alfero. cap. 3. g.

M. Terebinth. 3vi.

Mellei 3i.

Vini Malvas. 3iv.

Vitell. Ovi No. 1.

Diluantur, ferventur ad osium.

Dosis 3vi. Optimè conducit lo Mischu cruento, & parulento.

Vel

M. Terebinth. 3ß.

Vitell. Ovi No. 1.

Mellei 3i.

Agitentur in mortario, donec probe miscuantur:

Addo

Vini albi,

Aqua Forietar.

Pter. fabar. an. 3ß.

Syr. Limonium utri. i.

Misc. P. Lac.

Confer. Colleg. formalor.

Vel Pilula ex Terebinthina cum Rhabarbaro torrefacta paratae, quae continuo olo ad Mischum cruentum desperatum singulariter commendat HOEFERUS l. 1. Quibus Rhabarbarum additur ob vim suam nephriticam Renibus dicatam: sicuti ad acrimoniam sanguinis & Seris, & inde ortum Mischum Cruentum, succus Plantaginis cum Rhabarbaro assumptus commendari solet ad Exulcerationem Renum & Vesicae: Vel Pilula Barbette in Chirurgia lib. 2. cap. 12. sunt optima remedia: Oleum vero, & spiritus Terebinthinae, & Balsamus Sulphuris terebinthinatus, sunt nimis acris. Unde potius Terebinthina recens, vel cum Vitello ovi soluta, vel cum ovo forbili, aut cum Vitello ovi, & aqua Fragorum in formam emulsionis aut Mischum lacteam redacta.

Denique hae externae subungatur usas pulveris sympathetici, vel caput mortuum Vitrioli non adeo exacte calcinatum.

Quod si ex Renum, & Vesicae vitio ore aut exulcerata Mi-

nos cruentus oritur, praeter ea Interna, quae haecenus suo loco fuerunt recitata, speciatim conducunt Injuctiones similes in Vesicam, quales supra sess. 18. cap. 1. art. 12. in Vesica exulceratione laudavi. In specie

M. Aqua Plantag. unc. ij.

Trochisc. de Carabe 3i.

Misc. l. Injunctio: 5.

Injunctio Adstringens.

Vel fiat Injunctio etiam in exulceratione Vesicae non incongrua:

M. Herb. Agrimon.

Equiseti.

Plantag. an. M.ß.

Rad. Liquirit. mund. 3ij.

Decoqui. lo aqua Beem. vel potius in aqua thaly. servar. (ut etiam aqua vitriolica)

In Colat. 3ß. dissolve

Melle. Rosar. unc. i. vel 3ß.

3ß. reser. Alur. cum spiritu Vini extr. unc. 3ß.

M. S.

Injunctio Purificans.

De quo Ager singulis horis portionem per Syringam lo-jiciat.

Huc etiam referendi Clysteres Terebinthinati pro Inj-ctione in Vesicam, quos descriptos reperietis supra sess. 9. cap. 3. artic. 1. ubi de dysenteria: Imò locum Lac. cui Terebinthina cum Vitello ovi soluta, permixta cum pauco Saccharo, pro temperandi & leniendi scopo sufficit. Ferrius est Injunctio ex Emulsionem Papaveris albi cum Lapide hamatiter preparata, vel succus Plantaginis cum pauco Lapide hamatiter per Syringam Injunctus. Si à Galiculis & Arenulis sit linguosis Mischus, quomodo curandos, vid. RIVIERUS in praei.

Quod si fiat, ut sedato Mischu Cruento, ac etiam purifi-cato ulcere Renum vel Vesicae, sanguis conglomeratus adhuc haereat in vesica, tunc, per hic ipse suppressionem Urinae in-ferat, dissolvendus est per Remedia Appropriata, quae ta-men non nimis erit danda, ne aperiantur denovo Vasa. In quocumque imprimis Succina, quod sanguinem coagulatum dissolvit, & cruentum cohibet, & omnia Succina, pro ceteris sunt egregia, quae sanguinem resolvent, & eundem fluentem solvant.

Cetera vid. supra, sess. 18. cap. 3. artic. 1. ubi de hamo-rrhagia.

C A P U T I I.

De Urina per Vesicam excretionem laesa.

Urina ex renibus secreta & alterata in vesicam per arterias deflinit, raptim ibi coactur, donec vel nimia copia Vesicam distendat, vel acrimonia sua eandem irritet, sui excretionem urgeat, unde aperto Spinctere in Collo Vesicae haec sui coactione urinam expellit, idque secu- dum liberum voluntatis arbitrium.

Laditur autem haec urina per vesicam excretis iuxta le- gem urinae in Renibus Secretorem prius praeterpropter Modis.

1. Quando omnino urinae excretio obolet, & uri-na supprimitur: id quod fit in Nephritis, vitio vesti-cae contracta.
2. Vitiatur urinae excretio, quando eadem augetur certo sensu, id est, quando à Dormientibus aut Vigilantibus urina involuntarie effluit, ut in urinae Incontinentia.
3. Denique, quando depravatur urinae excretio ita, ut haec ipsa cum doloris & ardoris sensu, non abique Aegri nisi & coacta fiat, ut in stranguria & dysuria, & similibus affectionibus.

ARTICULUS I.

De Urinae excretionis abolita.

MEMBRUM I

De Ischuria Vesicali.

CAUSAE.

Quod suppreſſam aring excretionem ſeu Ischuriam Veſicalem: hanc ſuprà nunc ex vitiis reſum, nunc ex vitiis veſig, oriſi aſſertum ſuit.

Suppreſſitur urinae excretio, ſeu ſit Ischuria vitiis veſicae, vel vitiis veſicae urinae non emittentis, vel vitiis Canalis, urinarii, urinae non tranſmittentis. Requiritur autem ad naturalem urinae excretionem

1. Urina Conſiſtentia, de qua io Ischuria vitiis Renam jam actum.

2. Urinae penſentis ſtimulus.

3. Veſica ab urina ſtimulata contrahit.

4. Relaxatio Musculi ſphincteris oriſicium Veſicae ſtingentis.

5. Motus penitus, per quem urina excretnitur.

Veſica non emittit urinam, vel quia ipſa ſe non ſtringit pro illius excretionem, vel quia ſphincter eius pertinaſius ſe claudit. Non ſtringit ſe veſica, vel vitiis quia paralytico, vel vitiis relaxati Fibrarum toni, quando nempe eſt nimis diſtenta: Causae verò non emittit, quando eſt obſtructus ab intrà, aut quando eſt compreſſus ab extrà.

Veſica ſi quia paralytica, quando ſeuſus & Motus ejus contrahiſſe eſt torpidus, ita, ut quavis Veſicae plenae ac urinae copia diſtenta ſit, non tamen ſentiat ſtimulum urinae, aut quando Veſica ſe contrahere, & ita urinae expellere nequit. Nam notum eſt, quod media membrana ſit fibroſa, & gaudet Motu perſiſtente naturali. Quod ſi egiſſe Fibrae hant inepta contrahendi, tunc Veſica non poſſet expellere urinam, utut alias ſe ſphincter laxet. Id quod ſe vel univerſaliter, verb. grat. in Miſthodici vel particulariter, verb. grat. a Medulla oblongata parte inferiorem, aut Nervis ſacris, inſi nempe, ad Veſicam qui decedunt. Sic enim AMATUS LUSITANUS cent. 4. obſervat. in obſervat ſuppreſſionem urinae propter Veſicæ reſiſtentionem ſeu Paralyſin ex diuturna mota in aqua frigida contraham. Facit etiam huc Iſſe Nervorum Veſicæ conſtrictionem interſervitium, ſub inepta Teſtis extractione, unde doloroſa Miſio, & terè urinae ſuppreſſionem indiſta ſait, teſte HILDANO cent. 4. obſerv. 61. Sic pariter ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Med. princ. obſerv. pag. 146. ex terpidi Veſicæ ſenſu urinae ſuppreſſionem ontat. Quod etiam pertinent vorteberram laxationes, aut ſſas, aut loſas, aut ſpinalis medullae vulnera ſſo in loco circa Os Sacrum, unde Nervi ad Veſicam diſtributi maximam partem produunt, quibus compreſſi vel lacerati, non percipiunt urina ſtimulus, & ſic non emittitur urina: vid. GALENUS l. 6. de Ur. aff. cap. 4. Facit hinc, quod aliquando obſervavi in Viro, qui non aut ſaltem diſſiciliter urinam poterat emittere, priuſquam Minu regionem Oſſis Sacri probe friſicaret, tunc urinae ſegregabatur fluxus. Forſan iſſe ſagaciter in ea ſuaveſ negotium huc illuſtrat.

Quod diſſententis nimio veſig: ludit huc neceſſario Fibrarum eas muſculorum totum, propter quem eadem ſe amplius contrahere nequit ſiquidem diſtente nimis, & ita quodammodo laceratae Fibrae muſculoſae, propter urinae compoſitionem diſtincti retentam, ita in ſuo Toto lacerantur, ut nimis diſtente Fibrae amplius Veſicam contrahere nequeant, & quavis tota replatur Veſica, nil tamen omnino excredere valet: ex. gr. quando ſuſſubundi noluit ju-

ſto tempore emittere urinam, ſit, ut poſthinc Veſica in Toto debilitata ſe nequeat contrahere, & ita urina ſuppreſſimatur: qualia exempla reſert SCHENCKIUS lib. 3. obſervat. 5. pag. 484. ubi notat Ischuriam periculoliſſam ex eadem cauſa urina nimis dia in Veſica cohibita: ſicut ſimilem obſervationem habet FORESTUS lib. 25. obſervat. 14. Unde Eger, quoties volebat urinam emittere, toties manibus calciaſſis abdomen comprimebat, & ita urinae exprimebat. Quod Malum, utut apparenter leve videatur, nihilominus tamen ordinariè ſerè inflammatio veſig, & hinc Gangrana lethalis inſuperunt (Q). Videtur a FORESTUS l. 4. obſervat. 2. in ſchol. GALENUS l. 2. a. PAREROLLUS Pentec. 1. obſervat. 72. HILDANUS de Liſtina cap. 3. PARÆUS l. 16. cap. 48. & RIOLANUS Encicloid. anat. pathol. lib. 2. cap. 3.

Huc quoque laſtiant Vermes in Veſica ſtubdantes, laniando & pungendo Fibras Veſicæ irritantes, hincque ſuppreſſionis urinae Authores: vid. SCHENCKIUS lib. 3. obſervat. 312.

Pertinent etiam huc veſicae alera, & vulnera, cujque laceratio & Traſa, item inflammatio (vid. FORESTUS l. 25. obſerv. 27. & 28.) quæ vim ejus contrahendi turbant: nanciam Veſicam conſtrictionem indurati ſeu ſoliditate preternaturali (vid. BONETI Spitalierum lib. 3. ſect. 24. obſerv. 16.) & Paralyſi ſeu laxatae ſtubdantiae ejus carnoſi, ver. grat. a Coitu ſenio; vid. BALLONIUS Epidem. & Epidem. lib. 2. pag. 156.

ſphincter quoque abdominis, dum quancunque de cauſa non ſufficienter contrahuntur, & Veſicam compriunt, Ischuriam excitare poſſe non impoſſibile eſt: quod de Tumoribus eorumdem HILDANUS 279. 56. ſuſcipitur.

Quod ſphincteris vitiis; hujus debita Relaxatio atque Colla Veſicæ apertura deſicit, quando hic ſpasmus quafi ſeſſectus, pertinaſius ſe ſtringit: Id quod interdum obſervetur datur in dolobus abdominis ſpasmoticis, quorum accuſatione ſubinde ſphincter ſtingit, & urina ſuppreſſi ſeſſit, uti hoc in Calcis convulſis ſubinde obſervavi, atque imprimis in dolore abdominis ſcorbutici: Item in dolore nephritico, ceu non raram Pathema pluribus deducitur a DRAWIZIO Traſa de Scorbuto cap. 9. pag. 354. & WILLISIO de Anatome. Brutorum lib. 2. cap. 15. Ischuriam, quæ Cervix Veſicæ obturatur a Calcio, BARTHOLINUS Cent. 2. 279. 61. ſummatit. Forſan huc Cambaribus pertinet, neque de quibus reſert Dn. DEHM de Scorbuto cap. 88. & 133. quod ex veſicæ torſis, ſuris admotis, urinae ſuppreſſio nata fuerit: adeoque ſimulo continuo & irritatione ſphincteris veſicæ, adeoque ſuppreſſione convulſiva ejusdem ſtrutura, vel ex nato irritantis vicinarum partium tunc, & hinc Colla veſicæ & meatus urinarii compreſſione, Ischuria talis originem traſſe videatur.

Quod vitiis canalis ſeu meatus urinarii, urinae non tranſmittentis, ea ſunt varia: imprimis ſe offert ejus anguſtia variis ex cauſa enata. Eſt enim anguſtias vel obſtrictus ab intrà, idque frequentius a calculo veſicæ eandem inſarſcente, quod frequentius: vid. ZACUTUS LUSITANUS prax. admir. lib. 2. obſervat. 75. 76. & 77. item caruncula ſeu Verruca poli exſtem in aliquo loco neſthram, ex quo etioſis loco caro parva, verrucæ inſar, plus minus dura & ſenſilis, enaſcitur, urethram penitus occludens; quæ caruncula frequentiffimè gonorrhoeam diuturnam virulentam inlequitur, & per catheſes vel ſandole impoſitionem, ubi ſita ſit, optime cognoſcitur: qualem ex veſicæ ſondo ad urethram eſurgentem, hancque coſtigantem, in forma quadam SYLVIVS Pr. lib. 2. cap. 57. 6. 7. ſummatit: Ischuriam quoque a carunculis urethrae cavitate occupantibus reſert RIVIERUS cent. 1. obſervat. 21. Reſeratur etiam huc ſchirrus ubi gallinaceæ magnitudine Collum veſicæ obturatur, quem HILDANUS cent. 1. obſervat. 65. deſcribit: vid. BARTHOLANUS cent. 1. obſerv. 52. FORESTUS lib. 25. obſervat. 10.

RIO

(Q) Samma Veſica a copia Urinae diſtenta, niſi Fibrarum lacerationem faciat, impedimento eſſe nequit quæ Urina emittatur. Fibrae enim muſtrices eam diſtentionem, & letem quavis, dilacerationem patiuntur, vim emittentem clatiſſimam ſi ſanum diſſenduntur, obſque quid lacerentur, poſſunt ex diſtentione majorem vim elatiſſimam acquirere poſſunt. Exemplum apuſſionem ſepeliat Arcus Clavide, quæ ſanum diſtenta, niſi lacerationem patiatur, maxima vi Sagittam impellit. Fieri autem poſſet, ut Veſica a copia Urinae contracta maximam dilatacionem obſque Fibrarum lacerationem paritur, nec tamen Urina emitti poſſit: hujus autem rei cauſa eſſe potera levis Tumor, etiam Pibagoſi juſſus, in collo Veſicae ſaſſus, ab Urina ſphincterem diſtincti laxant: ita ut Uterus canalis obſtrictio non poſſit Urina emitti, etiam manu extrinſeca Hypogaſtrium comprime. Loque confirmat Obſervatio Steph. Blancardi morali, ex diſtentione Calceorum rem, qui Ischuria Veſicae ex reſente dia Urinae interierat, ſphincterem tranſſationem atque inflammationem depreſſionem. Et ſane eam Urinam dia, vel ſponte vel neceſſitate cohibemus, ſſam talem redicere, levi quidem dolore ſenſu in collo Veſicæ aſſictur: urinae & ſerè inflammatio partii argumetum.

RIOLANUS *Antropogr.* lib. 1. cap. 28. aut alter ille, cuius de *Lithiis* cap. 3. meminit. Item *pituita viscida* & glutinosa, quod recens natis folet; nec colligitur in Vescicae aut Remibus & Utericulis in calculo laesio, five cum Urina eo defleat vicia dignissima primae; obstruit Meatum urinarium, & Icturiam infert. Quod facit nimia *crassitas Lactis Nutricis*, Icturiam in puero quodam inducens? vid. **AMATUS LUSITANUS** lib. 2. *Pr. Admir. observat.* 12. sic **ZACUTUS LUSITANUS** lib. 2. *Pr. Admir. observat.* 66. Urinae Suppressionem lethalem ad *Pilamentum crassiusculum* Calami scriptorii inducunt refert. Et sane, quicunque humor viscidus in Vescicam delapsus, angustat Meatum, Obstructionem infert: Inter quo humores spem etiam sanguinis grami in Vescica urinaria resistunt, (vid. **GALENUS** lib. 6. cap. 4. de *Loc. aff.*); item *Pur crassius* et Vescica Ulcere, vel Renum, vel aliarum partium eo delatum, & circa Vescicam Collum collectum, obstruendo Urethram infert Icturiam periculolam. Quia & quaecunque comella, quae prompte cum Urina potius ab loca urinaria moventur, aut *validiora Diuresis* intempestive assumpta, nempe vel mox post alimenta, vel aetiam primas vias adhaerentia praemisita sint, subinde Icturiam inferant, dum oblatione celerioris & copiosioris feri urinarii secretionis, tanquam vehiculi nutrimenti & excrementi, una chylosa cruda, aut etiam alia contenta viscida ferri puitulosa, ad loca urinaria rapiuntur, ibique mediante obstruendo Urinam supprimunt. Sic etiam *ex potu vini rancore*, nec rite defecati, partim Renes, partim Uteres infarciunt Urinae suppressionem observavit **HILDANUS** *Cent. 4. observat.* 33. qui etiam observat periculolissimam Urinae suppressionem *ex usu Terribilissima* post cibos crudos & viscidos assumptos *Cent. 3. observat.* 59.

Ab extrinsecis vero compressis est Meatus urinarius praeter naturam in eiusdem radice obortus, quo inter eminentes *tumores proflatarum glandularum* in Colla Vescicae collocatarum fieri solet: Fit semper nonnunquam, aut post nimium Exercitium Venereum supprimitur Urina, quale exemplum habet **FORESTUS**, **PLATERUS** & **RIOLANUS** *l. a.* necnon **RHODIUS** *Cent. 3. observat.* 37. Nam tumefacta spongiosa praestat seu glandulosa, si diutius subiacet tumor, necessario comprimit Urethram, & ita impedit Urinae transitum. Sic, cum effem Romae, mortuus est Princeps Tuscianus ex contumaciissima Urinae in Vescica suppressione, cum gravi dolore, quam neque Catheter, neque Candela ceres, neque res ulla alia periclitari poterat: post mortem, Cadavere aperta, nihil vitii in Meatu urinario aut Vescica inventum fuit, praeterquam inflammationem, & tumor durus proflatarum ad radicem Penis fissuram, observatus fuit, a quo tamore lethalis Urinae suppressio exorta fuit. A *Punctis nimium induratis* **SCHENCKIUS** Icturiam observavit lib. 3. *observat.* 8. cap. 485. Tandem *Inflammatio Collae vesicae*, vel Inflammatio etiam *Peninis*, quatenus angustat Meatum urinarium, etiam Urinae suppressionem infert. Exemplum tale legitur in **ZACUTO LUSITANO** lib. 7. *Med. Princ. Histor.* pag. 149. & 150. Icturiam de Tumoribus Vescicae Cervici adnatis habet **M. A. SEVERINUS** de *Affec.* pag. 276. **BARTHOLINUS** *Cent. 1. Epist.* 43. & **RIVIERUS** *Pr. lib. 12. cap. 18.* Item, dum Urethrae Canalis post Vulnera aut Ulcera coalecit, aut, quod **HILDANUS** *Cent. 6. observat.* 46. addit, quando idem Canalis in decrepitis coadit, ut anfractuolus & obliquis talis per Cathetrem se interdum deprehendisse testatur, Icturia fieri solet. **PLATERUS** lib. 3. *observat.* pag. 564. refert, *Glandem Penis* in Propria ita fuisse obstruam in recens nato Infante, ut ne quidem guttulum Lacrimae roderet. Similes bilisarias videb. in **BONETTI** *Supplicat.* pag. 1337. Nec dubium est, simili Urinae suppressione urgeri Feminas, quas *Atranas* (R.) vocant, & vel a aetate vel alio errore Vulva occludatur in totum.

Hae de Causis.

DIAGNOSIS.

Quod setinet *signa*: Icturia Vesicalis & Renali dissinguitur, quod in hac, aut vitio Ureterum, nulla Gravior, nulla totius, nullus dolor circa pubem percipitur, adfuntque potius Renum & Ureterum afflictorum pathemata.

(R.) *Aeterna*, imperforatus, & *eterna*, persuro, & *peristone*. Quare Aetati dicuntur in utroque sexu, quibus *Atus* vel *Vulva perforata non sunt*. *Atranas* autem hoc locum vocat *A. Feminas*, quibus imperforatae quippe est Urethra, ut *finibus nequaquam Urina emittit*: namque apertae autem sunt *Feminae*, est *Vulvam habent imperforatam*, paralem sicuti *atrum Urethra* meam: ut Urinam quidem emittere, *Vitium* autem admittere, vel *Menstruum sanguinem* Eubrotis semper expellere non possint.

Contra, si vitium in Vescica haerent, atque ea Urina repleta sit, quam exacerare non possit, Tumor & protuberantia circa Vescicam contingit; Aetate quoque, quamdum Vescicae sensus saluus est, de tensione & dolore molestissimo, & insigni Urinam emittendi nix, frustanea tamen, conqueritur ac Medicus, si regione Vescicae contrectet, tumidam eandem, sed non abique insigni dolore, percipit, Icturia haec ex vitio Vescicae eveniens, Malum est per se facile cognitum, saltem casuam primariam periculatam necessaria est, ac imprimita cauae antecedens, una cum modo afflicto, quomodo nempe talis causa prima Icturiam infert quae.

Causas has dignoscimus partim ea Vescica aut aliarum partium vicinarum afflicto, partim ex rebus praegressis & concomitantibus. Attentius ergo sit Medicus ad investigandam causam proximam Icturiae: e.g. *Vitium Ictus* ac paralyticum latere nequit ex indolentia & insensibilitate Vescicae, vel regionis Vescicae, licet distente.

Vitium Pissuram distentiarum latere nequit ea eo, quod Urina antea fuit nimis diu retenta, & quod admodum licet Syringa nihil effluat, postmodum vero, compressa regione pubis manu, Urina produatur.

Causam veram vero esse in oculo pias minus *metu urinarius* seu Urethra, ex eo patet, quod ingens tumor in pube, ubi sita est Vescica, sique admodum dolorificus, in ea percipitur & quod ex levi loci tumens compressione hic dolor insigniter exasperetur.

Si adell insensibilitas Vescicae, vel dolores circa ea fuerint signum est oriri ex *Vitio Ictus*: si praetercesserit nimia Vescicae distensio & retentio Urinae, haerbit vitium in Vescica ab *arania* contractum. Unde vero sit *angustia Meatus urinarii*, ea adiunctis & antecedentibus concludatur licet: nempe ea signis Calculi Vescicae, ea Mictu cruento antecedente, ea casu ab alio, Vulnere, Ruptura partium vicinarum, &c. quae suspitionem de sanguine congruato & extravasato inferre possunt. Materia viscida lapsus cum Urina excreta, aut etiam Pus, obstruere meatum ostendit, si Aeger solutus sit cum urina subinde talem materiam reicere, quod malum hoc subinde solet recurre. Iudicium humilimum suppressionum, praeter tumorem & dolorem Vescicae ex retenta urina aptum suggerit *Catheter*, qui introfusus per Sphincterem Vescicae penetrat, & ita aperiendo Meatum urinarium, & removendo impedimenta, Urinae fluxum promovet. Vid. **RIVIERUS** *Pr. lib. 14. cap. 8.*

PROGNOSIS.

Quod *Pregna*: *Suppressio omnis Urina* malum est periculolam, & qui diutius durat, eo est gravior, quia acutum dolorem, sive Inflammationem, & interdum ea nimis doloribus epilepticis Convulsionem infert, ut plurimumque diu necat.

Melius tamen est, si Aegri ea Urinae suppressione percipiunt dolorem: Nam Retentio Urinae totalis in Morbo suo *delato*, instantis Mortis solet esse signum; innot enim iam deficientem vim sensibilitatis Corporis.

Ita, quae sit ex *Vitio Paralyticum* Icturia, item, quae ex *nimia Corporis* aut *Distensione* oritur, contumaciissima, & insuper periculolissima esse solet: vid. **PANAROLLUS**, & **HILDANUS** *l. a.*

Pari ratione fit habet, quae & *Spiritus Cervicis* aut partis cuiusdam vicinae Tumore incurabili artur, Collum ic, & Meatum urinarium consistunt aut compriment.

Brevius morituros denotat Tenellus & Singultus. Contra frequentius solvitur ea, quae a Grumo Calculove minore inducitur.

CURA.

Quod ergo attinet *Curam*, in hac *variensis causarum* imprimis habenda est ratio: Unde

1. *Atrophia*, impedientes transitum Urinae, imprimis removenda.
2. *Morbus Diuresis*, praesertim Glina, seu Urinam agnomia sua promotoria, propinanda.
3. *Retentio Vescicae* subinde *Malande*.

Sin ergo Malum est & *vitio Morborum*, vel *Vitio* *insensibilis*

Sanguinis fuerunt infusata, sunt aggregata: imò etiam Vesicæ ungienda: cum quibus simul debetis Catheterem usus non negligendus, qui tamen, ubi Vesica simul, aut alias, inflammata, locum non habet.

Quod si sepprimatur Urina à Caruncula inter Meatum urinarium genita, hæc quantoculus remouenda est, illius Erosio & Ablatio tentanda, Methodo ab AMATO LUSITANO Cens. 4. Observ. 14. delineata. Convenit in specie iniquum:

24. Merc. Precipit. ʒij.
Oleo. de Cereb. ʒij.

Misc. pro Linimento.

Pro magnitudine affectus aliquid Olei Viridis addi potest.

Supra osseam Candelam ponitur, & hoc ipso Caruncula aliquoties, sed modeste, in die attingitur: vel Mercurius Precipitatus dulcificatus, seu Turbith Minerali cum Emplastro Triapharmaci Caudæ cereæ apponitur, & dicto modo utiatur: Videb. VELSCHIIUS Medicinam. Cens. 1. Obs. 54. unum. M. A. N. C. Ann. 4.

In Malo leuiori Candelæ ex Cera alba, cui admiscetur Ammoniacum crudum puluerisatum, vel, qui melior, Cerasus Metallorum, leuiter aufert Carunculam. Quod si grauius aut pertinacius fuerit, Magna ex Mercurio Sublimato & Viridi Aëris cum Cereæ applicetur: Conf. M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 91. pag. 152.

Obseruandum autem, ne Virgæ aut Candelæ sint ex pura Cera, quia facili nimis frangantur, sed admiscenda est Terrebina. Cens.

24. Cereb. alba ʒi.
Terrebith. Præp. ʒi.

Liquefat Cera, post addatur Terrebithina: quibus liquatis tingatur Elythria, fiatque Candelæ.

Unguentum de Calce viva, Fuscum Felis Wursti, cum Melle refuso etiam Carunculam abluunt: Conf. BARBETTE in Chirurg. pag. 169.

Quod si exela fuerit Caruncula, pro Consolidatione reliqui Ulcusculi Unguentum Album compleratum immittam consilidat.

Applicetur tamen Candelæ Corrosiua imbuta cautè, ne ex nimia corrosione Gangrena obonatur, cuius Exempla videb. in LUSITANI Observ. pag. 159. Cætera pro hoc Scopu uisitata Remedia videb. in SENNERTO lib. 3. Præp. item BORELLO Censur. 1. Obs. 79.

Externè in quacunque Ichthura convenientissimè est Fomentum supra laudatus ex Semine Anisi, Petruvini, & similibus in Vaso coctis, hæc remedia ex Aëre & Cere cum Oleis, coctis aut frictis, Pabi aut Pedini applicatis, Ichthura Vesicæ optimè tollant. Cereæ albae coctis in Vaso decoctæ, insitit Fomenti applicentur;

24. Cereæ sub ciner. tella: Vel Adde
Fingul. Anser. ʒij.

Misc. sub forma Linimenti: S.

Unguentum Urinam promouens.

Insitit hoc ipsum Umbilico & Pubi; subit enim promouet Urinam. Probatum hoc est in multis Casibus, & aliis nil iuuantibus. Concreuens etiam est Perineo applicatum, si à Pueris abusu suppressa sit Urina, prout in tali Casu expertus est HILLERIUS Cens. 1. Cens. 27. Vel

24. Cereæ, alk. arid. Num. vi.
Cap. Allii Num. i. veliv.

Contolis in Mortario adde

Oleo. Anser. q. l.

Oleo Scorpion. parum.

Adpergantur aliquot gutturæ Olei destillati Juniperi.

Misc. pro Cataplasmate.

D. 6.

Cataplasma Urinam promouens.

Applicetur regioni Reum & Pubi.

Poli hæc egregium etiam est Cataplasma in Parientaria (intelligit semper ea, quæ crescit in Parientibus antiquo propter rationes supra dictas) confusa, cocta cum Cere & cum Oleo Scorpionum, insitit Cataplasmatibus Pedini impolita.

Tom. II.

quod Experimentum singularè est HELIDÆI PADUANI. Morari fessilio, dicit FORESTUS lib. 25. Obs. 1. Vel decoquat Parientaria, cum Vino, & subigatur cum Cepis in formam Cataplasmatum: Vel

24. Herb. Parient. M. li.

Charcol. M. li.

Flor. Chamom. M. li.

Isellæ coqu. ad molliem, adde

Burzel rec. ʒij. vel ʒij.

Oleo Scorpion. ʒij. ad ʒij.

M. f. Cataplasma.

D. 5. ut supra.

Applicetur calidè Pubi, & deuper opusculum calidum. Hoc ipso Ichthura Puerperæ ex Frigore substat desperata curauit FORESTUS: vid. l. 1. Notabilis est Casus.

Tandem etiam in Ichthura ex vitio Vesicæ conuenit Litus externus cum Oleo Amygdalarum amararum; item cum Oleo Nuculorum Perficorum; item fatis Linimentum cum Unguento Dialthææ, & Oleo Nuculorum Perficorum, Oleo Scorpionum, acuto cum aliquot guttis Olei destillati Terrebina. Succini & similibus, regioni Pubi, Perineo & Umbilico inuadendum, de quo supra distam.

Vel

24. Olei Petra albi ʒij.

destill. Bass Junip. ʒij.

Excip. cum f. q. Unguent. Dialthææ pro Litu externo;

D. 5.

Unguentum Urinam promouens.

Denique Oleum Mastiches destillatum inuadum Umbilico, remotiorem Urinam egredè possit. Tandem quorundam dicitur Experimentum, ut Aëro lascio immittatur Pedes in Aquam feruidam, seu benè caleant; sic enim perterrefactum Aërum subitò Urinam reddere asserunt. Quod etiam prodelle dicitur Io. Tassi. (5)

MEMBRUM II.

De Calculo Vesicæ.

Quod si Calculus Vesicæ Meatum urinarium obturauerit hic remouendus venit. An unquam aliquis in Vesicæ calculo productur, dubitat FERNELIUS, omnemque, qui in ea reperitur, rudimentum laum in Renibus testile; id, Vesicæ verò postmodum incrementum simpliciter putat, idem, quod in contritis Vesicæ calculi Nuclei saporis reperiatur, directi à reliqua eorum crobo coloris ac substantiæ, nullumque obseruetur calculo laboras, nisi qui Nephriticis doloribus vexatus fuerit. Et quidem Calculi Vesicæ frequentissimè ex calculo Renum primariam iurisdictionem ducunt: Conf. M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 109. pag. 147. Læsa enim Uterum Tunicæ neruosa, ipsa etiam Vesicæ calculi motu nonnulli attrita, plorat hæc partes læsæ Nutrimetum proprium sub forma multagulis crassa & spissa; quæ mucilago uasum Urina calculosorum excreta habetur vulgò pro Pituita, ex qua per calorem arefæ. Obgeneretur calculus, cum tamen reuera sit Alimentum proprium Uterum ac Vesicæ, id Vesicæ cauum destillans, & ita concreuere. Hæc ipsa tamen mucilago, ubi aliquando eius subside adhæret calculo Renali eo delapsa, in huius augmentum cedit. Accrescentibus enim plurimis Arenulis, aut aduenientibus Salibus coagulabilibus ex Urina, simul in calculi consocium rapiuntur, & exinde Calculi Vesicæ augmentum oritur. Hinc Vesicæ calculi maiores Imellatium concreti reperiuntur, insitit nempe Ceparum, Coruice uno si præ alterum concreto, facili tamen à se inuicem separabili. Siquis unquam vidit Lapideum Reccur, vel Lapideum in Vesicula solis Brovi, in tales Lamellas pariter in calculo Vesicæ inuenit, ita, ut in centro paruas Lappulas, cel compactæ Arenulæ reperiuntur, quod eleganter declarat BOYLE in Phil. Experimentis. Censur. & BORELLUS Censur. 1. Obs. 62. & VELSCHIIUS Hæret. 2. pag. 32.

Nihilominus auctor, utur frequentissimè tem ita se habere concedi debeat, idem quod platum calculi rudimenta lux pri-

Hhbb

ma

(5) Cum Catheter in Vesicam nullo passu immitti potest, a lingue nec urina per Urethram e ierit, sicut in adfæ Chirurgi Paracelsus in Peringo infusure, ac Siphone in Vesicam alique introducto, urinam elucere. Verum Ol. Mery propria & reperia Experimentis elucet, eis Panluram hanc securiorem esse in regione Pubi celebrare, quàm si in Peringo. Iste primus illam sufficiens ad latas partes inferiorem Musculi Recti Abdominis (ut nempe videret Arteriam & Venam Epigastricam, quæ per internam superficiem huius Musculi rapunt) atque ad Vesicam peruenit, i qua urinam bene cum successu elucit. Atten- tamen idem fassur, commodiorem & omni periculo expertem esse Paracelsus hanc, si supra symphyon Offium Pubis, inter- dus Musculus Pyramidalis infundatur: quod sepe felicitur experiri esse fassur.

ma Renibus debeat, in Vesica verò morbosum incrementum recipiat; contrarium tamen quoque, id est quompiusmodum Calculus *ipsum primum Vesicam* per prima Minera agnoscere diversa persuadent.

1. Quod multi *Puruli sine Nephriticis Symptomatiis* antecedencia Calculo laborant.
2. Plures etiam Calculi & Vesica protracti, quoad Nucleum & Corticem *eundem subsistentis modum*, quoad interiora & exteriora, habeant.
3. Calculus Vesicæ non raro *adeque* per Tunicam quondam: vid. RIVIERUS *lib. 14. cap. 2. (T)*

DIAGNOSIS.

Signa Diagnostica Calculi Vesicæ sunt serè difficilissima, potissimum in principio Morbi; grandior autem redditus Signa serè faciliora præ se ferre: vid. SALMUTH *Crit. 1. Obs. 15. RIGOLANUS Anthropol. lib. 2. cap. 14. HILDANUS de Lithiæ Vesicæ cap. 3. & Schlegelographus HOLLE-RIUS lib. 1. de Morb. Intemperat. cap. 50.*

Consequari interim licet Calculum in Vesica ex sequentibus. Nam percipitur imprimis *impedimentum quodcumque in Vesica*, ita ut sentiant Aegri quasi aliquod obstaculum, quod se opponit Meatus urinarii sub Urinæ excretionem, quod se opponit cursui Urinæ subitè suppressam, ut assiduum ad Urinam mittendam stimulus, & summi mependi difficultas & Urinæ Stitilicium.

Item *Quæ in consensum trahitur*, & uia Tenesmo affligitur, quod immo ex potissimis id Signis: Imò Tenesmo hic interdum est tantus, ut ex crebriori egerendi conatu scilicet Procidantiam Intestini Recti comitati solet.

Uterius Aegri Calculo Vesicæ correpi percipiunt *obscuram Dolorem Perinæ* sed Colli Vesicæ, qui circa finem Misionis exasperatur; & si Calculus majorem molem contrahat, *Pondus* in Perinæ & tota Pædini regione.

In *Penis Glande* seu Balano est *Dolor & Pruritus* ac continuatione Membranæ internæ Vesicæ ad Glanidem Peni, ita ut Aegri interdum putent, Calculum hæere in Balano seu Glande: vid. HILDANUS *Crit. 6. Obs. 49.* ut hinc Urinam reddituri Glanidem fricent, compungant & protrahant.

Subinde continuam *Erectionem* atque Tenesmonem Peni patiuntur, idque ac irritatione Membranæ Vesicæ internæ cum Membranis Meatus urinarii circa Radicem Peni.

Sanè HELIDÆUS PADUANUS cum expertissima

Calculi Signa Vesicæ habet, præter Urinæ difficultatem: si poli mingendi deciduerint etiam addit *debiliorem excretionem Faciæ inferiorem*, & si Aegri, dum aliquid Palam, & simile quid humo attollere volent, *dum se inclinant*, in parte Vesicæ anteriori circa regionem Pubis *Dolorem & quasi Puncturam sentiant*.

Præterea poli vehementi Corporis Salu, vel Motu *Motum Calculi in pectus Aegri* percipiunt, modo non sit adnatus: Nam interdum per Membranam poli laceratam Vesicam ita ei adnascitur, ut tanquam in Capula videatur contentus, quo in casu est difficilissimè cogniti.

Porro immisso in Vesicam Cathetere, aut immisso Digito in *peditem* ab experto, faciliè revidens Calculus in Collo Vesicæ fluat. Nam observatur quidam, quod Calculus quasi conglutinator hæret Membranæ Vesicæ, unde tunc Cathetere opus est, quia graviter doctissima Calculi.

Item si inter mingendum *supprimatur Urina*, Signum est satis certum, suppressam esse Urinam à Calculo Vesicæ. Corporis *Inquietudo* varia adeit, quæ Aegri præcipuis Crura exagitant, & transversum complicant, Cosas & Pubem comprimant, Abdomen ad humum reclinant, imò si Calculus major fuerit, via recti hære, equitare, aut per Alebrosia loca ambulare possunt.

Et denique in Malo diuturno *Mutatio* ista, cujus antea mentio facta fuit, necnon lutea ac argillosa, expositæ cum Urina excretæ solent, quæ non ut Materia, sed ut Productum quoque Calculi erunt agnoscenda: vid. LINDANUS *de Lithiæ Vesicæ cap. 3. & RIVIERUS Et lib. 14. cap. 2.*

PROGNOSIS.

In *Prognosi* Calculus Vesicæ malum est difficilissimum curum. *Facilius* tamen in *Femine* propter brevitatem & limitatitudinem Colli Vesicæ in Matrice, *Assiduis & periculosus* in Viris, quorum Uterus est longior & angustior.

Calculus Vesicæ *propterea Membrana inclusus*, & firmissimè hærens, serè incurabilis est: vid. TULPIUS *lib. 1. Obs. 5.*

Calculus Vesicæ subinde *nonnulli* *struunt*, tolli potest; quæ, nisi rite tractetur, nec se periculo caret, quia scilicet aut extrahi licet, impedit tamen aut Vesicæ *Inflammationem* lethalem cum Gangræna, aut certe *Fistulam* supervenire potest, & sic Aegri exanimati agunt vitam. Imò nec felicitate scilicet à Recidiva plane immunes: vid. HILDANUS *l. 1. cap. 6. & 8. (V)*

C. U.

(T) Calculi Vesicæ adherentes, ac propria cysti inclusi, jure negant quompiusmodi Prædicti: haud enim *quasi similis* est, Calculus à Renibus per Ureteres in Vesicam delapsus, post hujus superficiei isti adhaerere, ut liberum in illis final cum Urina motum non obtineant. Minime autem *conspicere possimus* (quod Authores quidem lucis suavitia parvi imaginari solum), *Succum* trassum viscidissimum ex Fesica ultra extillivum, parvi caloris majorem semper spissitudinem à septum, in Membranam tantum fieri, quæ primo Calculum compellat, mox illam Vesicæ superficiem ita agglutinat, ut illius inter Membranam veram potum consistat. Quocirco, *nonnulli*, id *conspicere possimus*, si animaliter etiam in variis Corporis motus & finis, in frequentibus *Masculorum Abdominis & Diaphragmatis*, asperitatem carneiformem Vesicæ contrahentes, in mollem Vesicæ ipsam substantiam, in assiduum Urinæ per eandem fluxum, *similique* causas, quibus impossibili reddidit hoc Calculum Vesicæ porietibus adhaerescere. Præterquam quod qui *nonnulli* credit post sanam & prius ex ntere extillivum aptum esse ad terge Membranam formidiosis? Tandem illi pro compertissimum habent accuratioris Anatomici, in Cysticum Tumoris *græsi* haud ita formari Membranam, sed prius exillivum, & quompiusmodi *interfocionis* succo quidem extraneo firmiori & coarctate reddi, atque magnitudine notabilis.

Ut igitur rationem reddamus Observationum Anatomicarum, quibus Calculi Vesicæ adherentes & propria Membrana inclusi innotuerunt, *motibus* potissimum *divinus* in Cl. Littere sententiam, qui ad Calculi huiusmodi *Membranam* commoveri, sed prius inter Vesicæ ipsam *interius* lateri. Quam enim Ureteres sari libere Vesicam perforant, ut aliquantisper inter illas Membras perirent, uterque in internam hinc superficiem; fieri facile potest ut Calculi per istam aperturam, in hac obliqua Ureterem in Vesicam inferiorem remoram nacti, ibi hæreant, nec in Vesicæ cavitatem delabantur: imò nova accedens à Renibus materia lapidea, inibi incrementum sumam, Adit insuper cæcus A. se visse genum Calculi, qui in hac Ureterum inferiorem, sanam sibi taceat: atque inter Vesicæ Membras, inque augmentum susceperat. Calculi igitur huiusmodi membrana Vesicæ subfissuri, ab ipso incrementum nacti, ut quibus Vesicæ adherentes, propriæque Membrana inclusi, Anatomici videri poterant.

Trahit demum malum, quo Calculi isti in Membranis Vesicæ intercepti deprehendi in homine possunt: suspici enim *nonnulli* fistulam Cathetere in Vesicam immisso, minime de illorum existensia certi esse possumus, quam Calculi Membrana commoti, si à Carcinomæ apice surgantur, nequaquam solum (revidens Calculi Vesicæ inclusionem) *videre* quoniam. Quare Dom. Littre indicat *digitum* *fistula* & natus in Anum vel vaginam Uteri immisso, duum Calculi corpus, semper circa Vesicæ collium *stabilis* ostendit *descente* vero per iter Urinæ in Vesicam Cathetere, hujus ac *digiti* apice Calculi hunc & suum *correspondens* deprehendit. Unde *nonnulli* *signum* Curatilis morbum deducit, ut scilicet *digiti* & Cathetere comprimatur jam deprehensus in Membranis Vesicæ Calculus, deinde *iterum* hinc redigatur Cathetere, *scilicet* extenuetur ad *luculentum* *signum* Membrana Calculum obtegere, usque quo hic liber fallus in Vesicam cadat, Lithemia & vulgari apparat extrahendus. Adhuc *fieri* facinus, sed ut ipse h. Joh. Audaces fortuna juvat, timidoque repellit.

(V) *Classicus* Vir Nicolaus Capassius in Regia Universitate Neapolitana Prim. Juris Civilis Professor, multifera eruditio, atque acris iudicio celeberrimus, innotuit, *apertum*, atque *amici* *mei* ex *avunculo*, postquam Lithemiam Romæ passus fuit, quia *Lapis* *ovum* *ostentum* magnitudinem *equum* *edidit*, quoniam *mei* post *annum* *interum* Neapoli *eandem* *fellum* *fieri* & *causam* *annum* *infinitum*, ut *secundo* & *multiflori* *Lapide*, ad *Renis* *hujusmodi* *mollem* & *figuram* *accidentem*, *excreverat*. *Iusta* *suspicio* *non* *provisi* *Lapidi* *fragmentum* à *prima* *stissione* in Vesicæ *vellem*, *nova* *lapideæ* *materiæ* *accessum* in *secundo* *Calculum* *evadit*. *Nunc* *superius* *grates*, *amicorum* *delicium*, *optima* *fructus* *valitudine*.

C U R A .

Calculi Veficæ *uram* quod attinet, hæc eoffem, quos reum calculus, fopos habet, fcihcet ut Materia autedens reimpetive evacuetur, calculique generatio inhibetur, ipique calculus maturæ extra corpus eiciatur . Quod fi *negatus expelli et Magnitudine, comminatur*, vel Medica *interius* compungit, vel injectis, doloreque foletur : *fi nec hoc procedat fuffidantur* .

Quoad *interius* : præter laxativa, acidum abforbentia, & doloresurgente, Diuretica validiora, & etia ipia, quæ cap. 1. art. 1. & 2. *Membr. 2. in calculo uram* funt laudata, etia in Veficæ calculo promovendo funt convenientia, diutius tamen continuanda, quia longiore mora vis eorum numhil infringitur : vid. FORTIS C. 4. *capit. 3.* Præ caeteris interius *agrimonia* commendatur à FORESTO l. 5. *obferv. 3.* & omnia reliqua, quæ fupervis cap. 1. art. 1. & 2. *Membr. 2.* habemus de calculo reum . In ipfæ aqua, & decodum *Perfaris* in calculo reum & Veficæ ab Angli laudatur, & fuccus Betulæ, imptimis & Ramis mediocrius effatit proleffus, aut ipfius Betulæ Frondes eifolites fiv Virgule conquaffatæ, & cum femine Dauci, vel Becabunga ceterifque parandæ incolæ : de quibus vid. HELMONTIUS *Præf. Chymicar. p. 252.* Item aqua ex *Capo defiffata*, cuius efficaciam fingularem RIVIERUS l. 4. & l. 5. *obferv. 14.* confirmat : item *fanguis et urina hinc et Tauri* utriufque embryonæ, vel etiam urina Hæci recedat madati pora admodum commendatur in calculo : vid. HELMONTIUS l. 4. & HARTMANNUS p. 254. & 270. *Hæmaria et Benigna* in Jufculo carniæ cocta, & coquidie ebibita, efferum eft in calculo à POTERIO *cent. 3. p. 73.* ficut veficæ Lapilli Cancrorum ad 36. cum fucco Limonum alumpit : vid. POTERIO *cent. 3. p. 74.* denatium *Matica* cum *Rapæ* & melle ufurpatur fuit à HORSTIO *in obferv. pag. 462.* A TURRIANO *in Jarr. lib. 4. c. 8.* commendatur *Criffallus* & huius liquor. Specialitè *Affili* vel *Millepedæ preparati*, vel potius conquaffati in Vino Rheumate preffo, continuo ufu mirabiles funt ad comminuendum & quafi labefactandum Veficæ calculum, fecundum HORSTII, AUGENII, & LAUREMBERGII experientiam : quorum ufun & compofitionem, cum ipfe Authot rartit fit, vid. in SENNERTO lib. 3. *præf. cùm de Calculo Veficæ p. 245.* LAUREMBERGIUS, qui huius medio fe curavit, fingularem *de Calculo Veficæ* cum *Affili* curato addit *Tractatum*, & ante eum primus huius experientiæ mentionem fecit HORATIUS AUGENIUS T. 2. l. 9. *Sp. 5. v. gr.* cum fpiritu Baccarum Juniperi aut Tinctura Tartari conquaffetur, hincque fuccus expreffus per plures dies & noctes porrigatur, e. g. num. æt. vel fæa. cum fpiritu Baccarum Juniperi 36. ad 36. pro doli : aut fæa færa pulveris affumatur, &c. Et tanè præter ifta experientia peria refert BOYLE *in Philof. exper.* quod etiam in Anglia curatus fuerit Veficæ calculus per talem ufun Millepedum, quem ipfe defcribit AUGENIUS : & ipfe LIL DANUS *fuper Hartmannum* tellatur, le fos calculum reum, & Veficæ iffo Afellorum ufu curaffe . Spedant huc pulule ex Salibz Baccarum Hedera & Naffurtii aquatæ, Criffallus Tauri ac Nutri an. part. æquæ cum Terebintha paratæ, quarum RIVIERUS *obferv. alleg.* mentuit : Item calculus humanus emique fpiritus, & Sol volatile, vid. HARTMANNUS *præf. pag. 250.* & HOEFERUS *Mem. med. l. 3. c. 4.* Item Electuarium, quod MONTAGNANA *conf. 182.* defcribit, Vel fucci ex fucco Parietariæ 36. Vin 36. fucci Limonum, Olei Amygdalarum dulcium an. 36. vel fuccus Cancropum doaurum cum Vino expreffum, vel cum fyropo Violarum & Althææ temperatus, à MAYERNE laudatur . Interdum, ubi calculus eft in motu, & tamen non benè procedat, Malumque desperatum, Pomibz convenit, in fpecie in Malieribus : cuius egregium exemplum videb. in MORELLO *cent. 3. par. 74.* & POTERIO *cent. 3. cap. 74.* ubi in exa desperato Calculi Veficæ propinquit Sal Vitrioli depuratus in Jufculo Carnium, & ita excierio Vomitu cum impetu Calculus Veficæ prorupit . Sed certos non effe convenit de illius mole, ne major

Tom. II.

aut acutus loeret . Hæc de Interitis .

Externa in Veficæ calculo tollendo primaria funt ea, quæ in Veficam injiciuntur, ut alteretur ab iis, & confumatur calculus, quæ tamen admodum rara funt, imo hæctum nulla cognita . Nam fi fuerit acidus, eam corrumpit : fi uilofus, foluturus eum in Mucaginem mutabit . Verùm dico, Liquorem illum debere effe temperatum : Nam quod non impoffibile fit, ut per urethram folvatur calculus, confirmat M. A. N. C. *ana. 2. obferv. 158. in Schol. p. 330.* quod Pariliis quidam Empiricus talem Liquorem habuerit, & beneficio talis aliquot calculos Veficæ comminuit, & fruftulatum epei curaverit : & ZECHIUS *conf. 11.* Sanguinem Vulpis & Hirci calide iniectionem eandem in faciem laudat, quod etiam MONCONIUS *Perpage l. 3. p. 3.* tellatur . Sunt, qui *felationem Heronis* Calamini calidius, cum parietaria decodi, vel ejus aquam pro hoc loco commendant . Alias etiam *Balanæ* ex emollientibus, item *fomenta* & *Complafmate* ex Anodynis, & moderatè pellectibus, fimilibutque in ufu effe folent .

Fomentorum, & Balnearum præfcribendi Formulas ex Materia Medica præfuppono .

Item *traffiones* hinc cum pinguedine Hircina, Coniculi, Petrolei, Oleo Scorpionum, Amygdalarum amararum, Succini, Cerae, & fimilibz, circa regionem pubis & Perineæ, nam Petroleum etiam renibus externe iniectionibus, eorum calculum promovet : & ob id maximum remedium vocatur à PANAROLLO *Præf. 2. obferv. 5.* Unde etiam externe, & regioni pubis cum nodè etiam potèft innigi .

Vel

24. *Paral. albi 36.**Chicxpr. Papæ. 36.**Myf. 36.*

M. D. 5.

Oleum Leontici contra Dolores dorsales .

Singulariffimum eft *Cataplafma* fædum ex albo *Cypæ*, cocta in *Vino defiffato* Parietaria, & oleo *Scorpionum*, quod ipfum Pubi & Perineo admoventum, quàm calidè fieri potèft, Cataplafmate hoc ufu quidam funt duobz viciibz, quibus fe curavit à calculo Veficæ, quem fibi jam excindendum decreverat : Vid. HOEFERUS *Hæral. med. pag. 175.* item HORSTIUS *in obferv. pag. 460.* Injiciuntur quoque *Chyfteræ*, quorum Formulas dedi *fuprà* *membr. 2. art. 1. & 2. cap. 1.* ubi de *calculo reum* . Tandem fi hæc irrita fuerint, opera danda erit, ut *fellione* removatur calculus . Sedio hæc ut peragatur, ex Chirurgicis petatur : cui addenda illa Veficæ Cervicis perforatio, quam in defperatis RIOLANUS *Tractat. Anatomie pæthol. lib. 2. cap. 30.* & ZECHIUS *conf. 58.* defcribit & commendat . Facile verò excindatur calculus Veficæ, & nullum fubei periculum, nifi fuerit admodum ingens (X), aut metuetoda vel *Vifæ Inflammata*, vel fupervenient *gangrana* lethalis, vel *Pythia* potèft feditionem relida .

Hæctous de calculo, occasione fuppreffionis urinae .

ARTICULUS II.

De Urine excretionè aucla .

MEMBRUM UNUM.

De Urine Incontinentia .

IN Affeclibus, qui in urinae excretionè lafa conveniunt, adhuc veritatur, & abfolvimus jam abfolvum Veficæ vitio . Contrarium hinc vitium eft *aucla* feu *frequentius* *urinae excretio*, feu quando urina ad voluntatis imperium & arbitrium diu fatis retinetur nequit, & præter voluntatem effluit, quod vitium communiter aliàs dicitur *Urinae Incontinentia*, fco *Involuntariae Urinae profufio* .

Vitium hoc *duclit* modo affligit Agros : aut enim dormientes : aliummodo urina coactone nequeunt, ut in Leclimings, feu iis, qui flagula permittunt : aut vitium hoc

H h h b a

diar.

(X) Calculus non folum magnitudine notabilis periculofam facit *Lithofantem*, fed etiam fi fubritis & afperitate ingruat fiv . Imo fi magnus, fed tamen levis fit, minus periculi minatur, quàm fi afper & acutis angulis barrens : afperitate enim magis vultus dilacerat quàm magnitudine . Hinc laevi vel trofte ex *Lithoremis* prægnantiffimum fere piffum, haud Agros ingruat, fed Calculi : fi enim hunc mox à Veficæ eductum lavem, & non modicè magnitudinis obferemus, bonum prædicere poterimus : contra verò fi afperum, & præfertim carunculis à fubftantia Veficæ difculfo conciliam, illum apprehendamus .

diurna pariter ac nocturna tempore infectum est, ita ut vigiliis ac dormientibus æqualiter Urina involuntario effluat. Quæ etiam spectat, si urina satis diu retineri nequeat, sed ad mictionem trepidantem urgeat.

PARS AFFECTA & CAUSÆ.

*Subiectum & causa huius affectus proxima, quam Veteres **Constrictum lasum** aiebant, est deficiens Constrictio Sphincteris Vesicæ: Sphincter enim Musculus Vesicæ est, qui Fibris suis circularibus Collum eius investit, fortiter contrahit, atque claudit, ita ut omnisi voluntatis imperio relaxatus, urinae transitum permittat; quando verò vis huius constrictoria in Fibram legitime Tenu relaxandam tollitur, vel vitatur, eo ipso etiam urinae Incontinentia adest. Causa ergo proxima erit: **deficiens Sphincteris Vesicæ Constrictio.***

*Causa remota, per quam debita Sphincteris huius constrictio, modo sympathico modo idiopathico, deficit, est I. Paralysis, vel relaxatio viâ Nervorum continens, sive universalis totius corporis, sive partialis, scilicet Vesicam & Sphincterem afficiens, dum nempe ex impedimento Nervus injectionis spirituum animalium irradiatio debita fieri nequit. Si ergo ex quacunque causa, vel interna vel externa, laeduntur Nervi ad Sphincterem abeuntes, eisque fringentes, spiritibus relictis Fibra relaxatae se minus stringunt, & incontinentia urinae interit. Similiter quoque contingit hæc Sphincteris relaxatio interdum **à casu** vel **à alio**, si quia ad regimen Lumborum, Ovis pubis, aut Ovis Sacri impingatur, ubi nempe Nervi ex Spinali Medulla derivantur ad Vesicam: sic laeso etiam **Ventriculo** in latus illis sub iugis urinae Incontinentiam inferit, qualia exempla videb. apud SCHENCKIUM in *observ. lib. 3. ex RENIVENIO in *observ. lib. 3. ZACUTUM LUSITANUM l. 2. Med. princ. lib. 123. Item refert A M A T U S LUSITANUS cent. 2. obs. 11. de quadam, qui ex lapsu in Dorum virginitatem retinere non potuit, ex ultima Vegetera affecta. Imò auctoritatem Mera in aqua frigida & ipsa reclusa Sphincterem Vesicæ, & sic urinae Incontinentiam inferre valet. Pertinet hæc, dum morbis acutis, Ægrique summe debilitatis, superreipit urinae Incontinentia ex defectu spirituum animalium, adeoque Viribus penè exhaustis: id quod & *Aplecticis* ordinario fere accidere solet, in quibus involuntario & Exces alvi & vesicæ effluunt.***

*Deficit etiam II. Sphincteris Vesicæ constrictio **et fibrarum Sphincteris etiam animam relaxantem**, sive **Tonum omnium lasum**, idque sæpius propter animam Dementia, si nimium dilataretur Sphincter, ut non possit iterum in firmum naturalem redigi. Causa hæc subinde assilgit in specie Mulieribus præcipua: in partu difficili, sæpius propter animam *Fatorem magnitudinem*; hinc enim, dum Pectus eluctari nititur per illas angustias, Vaginam uteri, & simul collum Vesicæ, effert per Sphincterem, Vaginæ uteri implantatur, non dilatando causa est, ut sæpius postmodum urinae continere deprecant. Exemplum tale recitat PLATERUS in *observ. pag. 256. de Mictu involuntario, ubi Cervicis Vesicæ in partu dilacerationem, & quasi fissuram.**

*Tandem III. Quando Fibra Sphincteris constrictoria omnino Intercedit, ac plius miola intensè laeduntur, etiam cessat urinae retentio. Fit hoc non tantum in mulieribus istarum partium luctis, sed etiam imprimis in Lithonia, seu Lectione Calculi Vesicæ, incoacta inflata, Fibrisque Sphincteris in Colla Vesicæ plius minus difflis, ut ubi id postmodum retineri nequeat: Exemplum vid. in SCULTETI *Anatomia. Chirurg. observ. 63. Pertinet hæc etiam obstrictum inapertum, quæ Vesicæ Collum aut Carunculum Myrtiformem majorem, ostio Vesicæ præpositum, in parturientibus subinde digitis aut unguibz lacerant, & inde non raro gravissimam Incontinentiam urinae inferunt. Ut taceam in diffidituri partu rumpi quasi Vesicæ Sphincterem; vid. HENRICUS ab Heer. in *observ. 14. Item SALMUTH in *observ. C. 1. obs. 39. Fit hoc interdum etiam in Mulieribus propter *Prælasum sive Jacturam*, in qua casta etiam ex dilatatione & relaxatione Fibrarum Membranae Vaginæ, sinuque relaxatione Fibrarum Sphincteris, subinde urinae Incontinentia oriri solet: Vid. BARTHOLOMÆUS cent. 4. *hisp. lib. 2. pag. 213. ubi utrinque Incontinentiam refert ex alio vesp. cum Prælaso uteri.*****

*Cæterum pertinet hæc suo modo vitium istud, quando in *inania* diu retineri nititur, cum quidem potest retineri urina, sed non satis diu, & subinde emittatur necesse est, atque nisi hoc fiat, sponte effluit: id quod fere propter continuum ac lentilarem in Vesica Stimulum contingit, ita ut sæpe*

& parum eacernatur, absque tamen dolore in excretionem, aut absque ulla molestia, in vero retineri debeat diebus urina, tunc Vesica dolet, aut irritata excretionem stimulet. Contingit hoc interdum in Calculo Vesicæ, qui incombent Colli Vesicæ clauso, sua male aut asperitate, a liav ratione continuo irritando, Mictionem urget: item contingit hoc etiam interdum Gravidis ultima Gestationis mensibus dum Moles uterina premit Vesicam, aut subindemodo discedit Vaginam uteri, inque per consequens Ostium Vesicæ simul dilatat, node continuo percipitur stimulus, nec sufficienter urina retineri potest.

Facit hoc etiam vitium, quando excoriata aut exculcerata est Vesica, in specie eius Ostium: sic enim ab excoaratione ad excretionem stimula Vesica urina mittit, ut propter teretis frequenter & impetio mingatur.

*Denique etiam *visu & tactu* ducuntur, & gravior ad hoc vitium disponit, dum Ægri crebris tussibus simul urinae emittunt, quod etiam observavit SALMUTH cent. 2. *observ. 30. Item PLATERUS lib. 2. *saarum observat.* in specie in Mulieribus corpore magis obeso aut habitorio preteritis: nempe concutitur in Tuti cum Diaphragmate quilibet abdominis partes internæ, quibus concussis etiam Vesica concutitur, & Sphincter se laxat, itaque ex magis, qui nimis in obsequio corporis habuit partes externæ cedunt, ut ita quæ impetu protrudatur tanquam ex Siphone urina. Fit denique hoc etiam Malum in casu, quando Vesica ob suam angustiam, & nativam parvitetatem, urinae multam, aut diu, retinere nequit, tam nativam sub prima Generatione, quam accitiam propter Tumorem vel proprium vel partium vicinarum, ex quarum compressione agitur, ut urina diu facta retinere nequeat, v.g. in inflammatione Musculorum Rectorum abdominis in Pals regione Vesicæ superfluentum: vid. TIMEUS *non Goldschke lib. 3. Cap. 43.***

Hæc sunt vera & propriè dicta urinae Incontinentia, vigilantibus pariter ac dormientibus conveniens.

*Verum, quod *improprie dictam Incontinentiam urinae*, ita quando interdum aptimè retinetur urina, sedu vero *Intercedit* saltem fragula permittunt, vitium istud aut est *in illius* *facultatis animalis*, i. e. ea deficiente activitate, & ita turpore spirituum animalium, ex aut eorumdem defectu, dum sc. hi aut deficiente aut torpore non satis firmam Tonum Fibrarum Sphincteris Vesicæ constrictoriarum. Tude videmus, quid in specie *Infantibus aut senilibus* propter ignem torporem aut spirituum vitium hoc frequenter fit, dum nempe spiritus animales nequeunt valide per Nervos ac Fibras nocturnum tempore irruere. Interdum etiam huius in ultimo senio obvenit ræduna Incontinentia urinae; quin & interdum Morbis acutis supervenit, ex prostratione nempe Facultatis Animalis, seu ex defectu spirituum animalium. Frequenter autem solet affligere Senes propter Facultatis Sphincteris semiparalyticam, & propter spirituum animalium vigorem deficientem. Imprimis & his familiaris est urinae Incontinentia, qui sub consistente Ætate nimis indulserunt pecti, & qui obnoxii fuerunt calculo. Interdum etiam adulti, ex prava consuetudine fragula legit permittant. Facit etiam hoc *Imaginatio vis*, quoniam nonnulli à nimio pota, acriter urina, aut sensibilibus Vesicæ malori stimulat, lectum permittant, somnium se Matulam credere: Otrorum non tam Medicamentosa, quam Flagris alitque fraudibus cedebat.*

DIAGNOSIS.

Quoad signa diagnostica, affectus hic facillimus est cognitus: Nam si Ægri tacent, loquuntur fragula, & volumenta: Sæpius casuum diversitas partem ea relatione Ægri, partem ex antecedentibus circumstantiis explicandam venit, vid. RIVIERI praxis lib. 14. cap. 7. & TIMEUS non Goldschke l. 2.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosin verò, istud urinae profluvium, quod dormientibus saltem obvenit, levius est, quam quod vigilantibus contingit.

*Quod si addit talis urinae Incontinentia ex *visu Nervorum* paralyticorum, & in specie vitio cerebri, aut Spinali Medullæ, difficilis curata & periculosa est affectus, nempe ex vitio Sphincteris eacortus: vid. PLATERUS *observ. pag. 303.**

In Senilis Urine Incontinentia est ut plurimum immedicabilis, nisi quod interdum foras Theriac idem succurrat.

In Febrili Acutis aut aliis Morbis Acutis, siue a Delirio, siue spirituum resolutione proveniant, superveniens Urine Incontinentia, summum periculum innuit & mortem ut plurimum portendit: indicat enim deficientem penitus vim Animalem, & deficientes spiritus Animales, tonumque Nervorum jam laxitatem.

Puerperis ea latiose violenta superveniens Urine Profluvium raro curatur.

In Puero interdum per incrementum annorum subinde sponte cessat, sc. intra annum viginti quintum: Nam ubi tunc non cessat, metus est, ne ex HIPPOCRATIS mentis sit immedicabilis. Observat tale exemplum TIMÆUS vero Galdankler in *effluis* lib. 5. Conf. 25. pag. 251. de Pueri Incontinentia Urine laborante incompeabili, quæ ipsa tamen succedente ætate sponte Naturæ curata fuit.

C U R A.

Quod attinet Curam Incontinentiæ Urinæ; in hac imprimis Causæ Remotæ corrigendæ, hinc frequentissime in malo hoc *Mafculus Splenis* Adstringentibus & Nervinis aromatis roborandis, siue internè propinentur, siue externè admoventur. Pro quo Scopo in genere conveniunt omnia Adstringentia. Nervina simplicia Antiparalytica: Et quidem si malum adhuc à Paralyti seu resolutione, Remedia Externa non tantum Vesicæ, sed etiam Lumbis, Ossique Sacro, ubi sc. Nervorum Vesicæ est exortus, imò ipsi Cerebro, applicanda erunt. Purgantibus aliisque Evacuantibus hoc in casu via videtur opus, nisi Humores pueritiles ac leviros abundare conspiciat, ubi decolla sudorifica ex Lignis singularis efficacia à QUERQUO L. u. proclamantur.

In genere ergo ad quæcumque Rerè Urinæ Incontinentiam laudatur quedam Euphorbia, per usum Appropriatam observata, ut *Calamintia & Mentha*, & omnes his cognatæ simplicium species cum Vino colide, & ante passum hauriæ. Deinde Alchimilla & Agrimonie uisus, Calamintia additæ, specificè quocumque modo conveniunt ob vim adstringentem vulneratam. Hic accedet Calamintia, quod imprimis in affectu nervino paralytico egregium est Remedium. Galanga non levis atque Ligum Aloes resinosis subtilissimè pulverisatum ad Zi. cum cyatho dimidio Vini alio generati, aut etiam in Ovo torbali assumptum, mane & tempore intermi infigitur in hoc prodest. Item Plantago, Radix Consolide majoris, Cyperi, Noces Caprelli, Equisetum, Succinum, Flores & Semen Hyperici, Semen Agrimonie, Glandes & Medulla Glandium, Mastiche, &c. Cetero Pulvis *Mafculus* ad Zi. crebris haustus in Vini haustu admodum citra confert; ubi etiam Myrrha, si propinetur in Vino Decotionis seu Infusionis Calamintia. Ulterius Theriacque Pulvis, item Gummi Arabicum ad Zi. in Vino assumptum, laudatur, præsertim quando occasione Stimuli præternaturalis non bene retinetur Urina. Unde JOEL sequenter commendat Pulverem ad Incontinentiam Urinæ paralyticam; v. g.

*Zi. Calamintia,
Myrrha, ʒ.
Castor. ana Ziij.
Gland. ʒi.*

Hæc pulverisata subtilissimè propinentur ad Zi. cum Vino Bonitate.

Glandes singulare sunt Adstringens. Specimen inter talia convenit Guttae Gullitollum, tectum, & cum Vino propinatum ad Zi. est unum ex optimis Specificis, tam in diurnâ quàm in nocturna urine Incontinentia, quod mirè laudatur à SOL. EN ANDRO Stell. 4. Conf. 11. v. d. SENNERIUS l. 3. Præf. ubi de Incontinentia urinæ, ac HORSTIUS in *Problem.* item HARTMANNUS in *Præf. Chym.* & LINDANUS. Commendat etiam hoc Puerperis, si à Partu difficilis malum exitum fuerit, HOFFERUS in *Merz. Med.* pag. 340. Pueri Pulvis *Eranacei* combusti vel calcinati, inter alia etiam speciem optimam & certissimam est ad omnem Incontinentiam urinæ, quod B. D. MICHAELIS frequenter, felici aliquoties cum successu, adhibuit; qui retinet etiam, quandam Medicum, qui 20. annos hoc Affectu laboraverat, postmodum solo hoc Medicamento feliciter curatum fuisse. Ipse etiam in Puero 12. annorum, post morbum acutum urinæ Incontinentia laborante, hunc Pulverem *Eranacei* cum *Medulla Sacerum* mistum, cum succosâ adhibuit. Hinc BARTHOLEUS in *Encyclop.* cap. 104. contra urinæ Incontinentiam adhibet Pulverem compositum in *Historia Tunici Peritrici Gallicanæ* (quæ exlicca-

ta est instar Corii pulverisabilis) part. I. & *Cinris Eranacis* (qui tanquam singulari speciem in Vehiculo calido usurpatur (part. iij. quæ duo pulverisata insigniter commendatur ab eodem. Unde etiam *Eranaceus* est basis Pulveris experti *Montagnæ* pro illis, qui ledum permigant. Compositio est hæc:

*Zi. Tunici. Stomach. Gallin. pulv. ʒi.
Herb. Agrimon. ʒi.
Eranac. combust. ʒiij.
Mile. f. Pulvis.*

Dosis Zi. cum Jure, vel Vino propinatur. Porro Vesica sua vel Apri tota, item Vesica Capræ effusoria ad Zi. data valdeperè commendatur ab HARTMANNO *Præf. pag. 269.* Præ cæteris Vesica Capræ præ Vesica Suis & Apri commendatur. Hicce additur Medulla Lapidis, Getm. det *Stein-Merk.* quæ apud *Jenenses* & *Rochicenses* invenitur; est etiam expertum speciem contra Incontinentiam Urinæ dosi Zi. ad ʒi. in Vino generoso propinatur, quo TACHENIUS Nobilissimè quendam urinæ Incontinentia laborantem citra spem & expectationem curavit. Unde quidam admodum commendat hunc Pulverem compositum in Urinæ Incontinentia:

*Zi. Pulv. Medull. Lapid. ʒiij.
gran. mastich. ʒi.
Ligni Aloe resinosi exalati pulveris. ʒiij.
M. fiat Pulvis pro aliquotibus dosibus.*

Propinetur pro dosi dr. i. in quocunque Vehiculo.

Item hoc spectat Pulvis per *Lithinias*, quam Officialia suis usum HEOCHSTEDTERUS *Doc. 2. Hist. 2.* describit. Pūis in ventre Luchi inventus & propinatus commendatur ab HARTMANNO; sicut etiam unæ aliæ, qui hunc ipsam pro singulari vendunt Arcano. Porro *Pudenda Suis* seu *Pulvis Suis*, quocumque modo præparata, tam in Pulvere propinata est cæca, quàm ex eadem paratum Farciem Aëro ostendunt, singulari est Experimentum: non tantum commendatur à SCENCKIO in *Thes. Med. 6. 2.* cæcâ Remedium simpliciter ubi observatum in *Piaz.* sed etiam D. MICHAELIS aliis irritis in usu tunc urinæ Incontinentia, tam vigilantiam, quam dormientum. Hoc tamen observat SCHMUKIUS, quod Farciem ex *Pudendo Mafculi* pro Maleno remedium factum, & Formellæ pro Femina. Aliæ *Cicis Pudendi Suis* conveniunt, & loco Farciem substituitur, quo 160. Puer 18. annorum, ab incute ætate hoc malo affectus, curatus dicitur: Conf. M. A. R. C. Ann. 2. *Obs. 21. pag. 36.* ac Ann. 9. & 10. *Obs. 250.* Alii loco Pulvis fusile unguis Porci castris siccatæ & subtilissimè pulverisatas in haustu Vini, vel Potu communi propinant, ad libidinem urinæ Incontinentiam, *Mures* exsiccatæ & pulverisatæ, vel Mures in Butyro elixi & ita propinati, *Sejus* expertum sunt speciem contra Urinæ Incontinentiam, tam vigilantiam, quam dormientum. Conf. M. A. N. C. Ann. 6. *Obs. 11.* pag. 124. FORESTUS lib. 25. *Obs. 23.* Item Genes corum. A GALENO laudatur Cerebrum & Testiculæ *Euphorici* aut combusti: item *Cochley* cum Testis combusis; ubi Stercus Leporis propinant, item *Stercus capra:* v. d. BRUNSCHWEIG pag. 67. & hæc ipsa promittunt ad quæcumque urinæ Incontinentiam, tam diurnam, quàm nocturnam, sunt proficua. In specie vero, si dormientibus sitient contingat hoc malum, tunc ex experientia HELIDÆI PADUANI convenit Pulvis capularum Glandium in Aqua, vel Vino chalybeatis. Item Terra Sigillata cum Pulvere Calorei in Junonibus & Zi. Adultis aut in haustu Vini, vel Aquæ Pariterque sub introitu lecti propinetur: item Pulvis Pulmonis Hædi totus, & ad dr. exhibiti, eam speciem commendatur. Facit etiam hoc Pulvis *Angustanum* per *Lithinias*, quem etiam commendat HEOCHSTEDTERUS *Doc. 6. Cap. 2.* in *Solut.* ubi habet mixturam contra Incontinentiam Urinæ nocturnam. Pulvis est hæc:

*Zi. Pell. Stomach. Gallin.
Mafch.
Galang. ana dr. i.
Agrimon.
Lapill. Cancer.
Alchimill. ana Zi.
Carnol. Gland. dr. iij.
Mure. Myrrh. dr. i.
Eranac. comb. ʒi.
Sacch. ʒiij.*

Mile. f. Pulvis. Deter dr. i. ad dr. i. in Aqua Plantaginis.

Denique cuidam cum singulari experimentum venditur *Rena viridis* per medium icillæ, & Remibus applicata. Nutrites

trices & Mulieres interdum Pueris penem confringunt cum quodam viscido, ac levisus permittunt, sed fit hoc cum summo periculo. Exemplum vid. in BARTHOLINO *Cent. 3. Hist. Anat. 51. pag. 103.* Ubi ex Penis conditione periculosa recitata notat symptomata.

Laceratio & diffusio spinditrix Vesicæ à Partu difficili curatur, per Trochiscos de Carabe, Glandes quernas, Bolum Armenum, Guttur Galli tollum, &c.

Hic occurrunt etiam *Extrava*, inter quæ imprimis *Balnea* & *Fomenta* laudantur, facta ex incodis Plantis Nervinis atque Adstringentibus, ut Mentha, Albinthio, Floribus Rosarum, Balanithorum, Radice Tormentillæ, Bistortæ, Folis Quercus, imprimis Radice symphyti, quæ etiam deorsum utuntur Virgines; vid. HOESIEDTERUS & similibus, ut ex HORSTIO lib. 5. Obs. 10. constare potest. *Balnea* hæc sunt cum Aqua Ferrariorum, quæ vitiolæ præcipue, adeoque adstrictoria est. Loco horum Articuli summi speciemus *Therma* sunt proficue in Malo contumaciori, idque primario Scinibus. Harum enim infusio Vis. 72. annorum ab Incontinentia Urinæ fuit levatus. Novi tant qui à Potu, mox atque unicum Potum hauriret, continuo eoque periculo doloroso Vesicæ cruciatus, & ad continuum medium simul, afflictiore; aliis multis irritis profuerunt interea *fascia* decoctionis Catinæ & Gallinarum calida, loco Potus assumpta; externè vero *Therma*. Iuxta hos Infusus convenit etiam *Infusio* Lumborum & regionis Pubis cum Oleo Absinthii, Mallicis, Mentha, Rutæ, Castorei, Unguento Nervino Augustinorum, item Syrtacæ liquida, Balsamo Peruviano, Oleis Nervinis destillatis, Oleo destillato Macis, Terrebintine, Juniperi, Succini, Semine Dauci vel Carvi. Item *Emplastrum* Oxycroceum vel Nervinum, vertebra Lumborum applicatum, malacatum cum Balsamo Peruviano & Oleo Succini, commendari solet à JOELE Pr. lib. 6. pag. 134. item à TIMÆO *de Caudiculis in Casp. pag. 338.* Tandem singulare Remedium est *Pulsis Balsamici* vivi in nova olla ussi, & in sacculo Collo appensi, quod est Veterum experimentum ad quancunque Urinæ Incontinentiam à quancunque causâ; vid. HEINRICUS ab HEER Obs. 14. Putabam primitus falsam hæc esse relationem; tamen confirmatur simile exemplum à DIGBY & BOYLE in *Philos. Exper. pag. 217.* ubi refert, in Angliâ fuisse reiteratum hoc experimentum idque felici cum successu in Incontinentia Urinæ ex læsione Vesicæ in Partu difficili, cujus Curationem videb. in M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 225. SENNETO lib. 2. Prax. P. 2. cap. 9. pag. 466. qui eandem curat Balneo & Unguento Catellis. Quodam hoc Unguentum seu singulare commendat contra Profluvium Urinæ mulieribus, seu potius Urinæ Scitilicidium, quo subinde Mulieres post Partum difficilem affligi solent:

℞. Lq. Calamiae. in Aceto destillato & Aqua Rosar. sic vel res laci & submiss. pulveris. fusi 3ij.

Litharg. Argent. 3ij.

Cera. prop. 3j.

Olei Rosar.

Chamemill. ana 3j.

Agitentur simul per horas duas & cum *Axungia Hiridis* 3ij. f. l. a. Unguentum, bene agitando ad horæ quadrantem, donec consistens debitas acquirat.

Hoc ipso leniter inongenda est Pars affecta, ac linteis cooperta; miræ dicitur efficacie, vidique sæpius comprobatur.

Puerperis post Partum, à laceratione & diffusione Spinditrix, conveniunt Infusio & Focæ ex Radice Consolide, Folis Quercus, Hedera, Gypso usso. Bolo & Vitriolo, Sulfurum ex Pice, Thure & Mallicis: vid. PLATEIUS l. a. Unguenta ex Catulis Stramonii: Item, ubi Incontinentia Urinæ ex *Ulcere* Nucleationis:

℞. Aquæ Rosar.

Plantag. ana 3ij.

Sacr. cand. 3j.

Cera. 3j.

Litharg.

Alum. crudi

Plantag. ana 3ij.

Camp. gr. v.

Unga. Egypt. 3j. M. S.

Aquila.

Quod si diutius modis non cessat malum, pro *Cura palliaria* *Fascia* quardam arte applicanda veniunt in Matibus, quibus Urina continuo depluens colligatur, ut cum minore subsidio vivant: qualem Instrumentum videb. in HILDANO

Cap. 6. Obs. 54. & 55. Fœminis verò inferviat, quale ab HEER l. a. fuit explicatum.

Habituus ita Imminutus & Audam etiam Excretionem Urinæ ex Vesica: Nunc sequitur.

ARTICULUS III

De Urinæ Excretionē depravatā.

Depravata denique Urina est *Xerema*, quando Urina cum *Dolore*, *Ardere*, insigni *Diffusione*, vel alio modo præternaturali excremitur: quæ inter vitia communissimum ferè est *Stranguria*.

MEMBRUM I.

De Stranguria.

Stranguria dicitur *Urinæ* visio, à *Cutis*, Latine *Urina* *Stridulosa*, quia in eadem Urina guttatim excremitur, idque cum acerbò dolore Colli Vesicæ, & Urethra, tam in quàm post Mictionem, remanente nihilominus continuo ad mingendum stimulatione. Et quidem in suo genere similis Stranguria est *Affectus* cum *Tenacis*, ubi continuus est Conatus excrementi excrementa, una cum gravi dolore sub Excretionem. Nam sicuti se habet Tenacis in Podice ejusque Spinditrix, dum uterque continuus irritatur, & sicut in Tenacis peccat Acidum in subiecto viscido, ita in Stranguria peccat Acidum in subiecto viscido, quod ad Vesicam delatum Stranguriam inducit. Equidem abundanter hoc malum orti volunt ex Refrigeratione Abdominis & partium urinarum, in specie Vesicæ, vel à Potu etiam frigido interitus assumpto; Unde Germanis vocatur *das Kalte Stiche oder pisse*, quod sc. oritur Refrigeratione præsupposita. Alii hæc Theoria falsâ est.

CAUSÆ.

Potius *Causa Proxima* hujus Stranguriæ est vitiosa *Urinæ Aciditas*, quæ Acute suo, fibris nervis inimico, simulanda Vesicam, in specie circa Collum, ubi admodum sensilis existit, & redendosus transitu Mestum urinarum, continuum ferè mingendi Conatum acerbissime dolorem diu permanentem infert. Urina verò putratim prodit, quia, dum Vesicæ Spinditrix se lauat, ut Urina effluit, ab Urinæ Acrimonia acidula vesicæ subito demò se fringit, post demò se lauat, & iterum fringit, & sic porro, unde guttatim prodit. *Dolor* ille primario percipitur tam in Urethra, quàm in Vesicæ Colla, idque post Mictionem; ille tamen, qui Urethram affligit, acerbior est illo, qui Vesicam & eius Collum afficit. Ratio est; licet enim Urethra & interior Vesicæ Membrana sit continuata & una eademque substantia; tamen Vesica interiora est oblita Mucro crasso, nonnulli viscido, qui eam ad instar Intestinorum obliques ab Acrimonia Urinæ plus minus solvæ descendit, itaque minor est Acido in Vesica oritur dolor; & nil aliud est, quam superfluum Nativæ nram Membranz Vesicæ transiendum in cavum proprium; quò cum caret Urethra, ad acerbissimum à transeunte cruciatu Urinacida, qui Acor Urinæ est ex parte Urinæ unica Causa Stranguriam inferens. Hunc Urinæ Acorem peccatorem confirmat HELMONTIUS in *Tract. Pleura Vesicæ*, qui demonstratur in Urina Stranguriosior peccare Acidum, fumere subter Urinam naturalem, l. e. constantem ex Sale volatili, seu composito ex Acido & Alkali volatilibus, & huic addere cantillum Vini acidi, & incipere in Vesicam urinarum; sic enim subito percipi dolorem Stranguriæ simillimum: item quod in *Phlogema Lugdunensi* taliter affectorum urina gustata manifestum erat lingue representavit. Confirmatur hoc utriusque per curam, quæ per talia, quæ acidum corrigit in primis vis, illudque destruat ut obrundendo demulcent, peragitur: hinc etiam urinae opacæ & turbidæ, albicantes & plus minus lacteæ, & hoc in specie in senilibus, excrementum, quod vitio digestionis primæ laborant & innotant enim urinæ tales digestionis eruditatem acidi.

Acet hic in urina viscidæ, Stranguriæ urinarum, natales habet suos primis in vis, seu in stomachi digestionem, quicquid in duodeno perfectione vitata, ex cruditate acidæ, eaque utri-

phorismum vitio assumptorum. *Causa dyspnoica est inertia fermenti Ital.*, non debite fermentantis in duodeno Chylum: dum omne assumptum, imprimis potulentum, non digesta rite, sed score, aut stomachi suo proprio adhuc tincta & inquinata, à stomacho elapso raptimur ad intestina sine transmutatione in alium, & ita rapiuntur cum urina potus ad vias urinarias: unde potissimum in Vesica collecta hanc suo acore stimulant, & stranguriam inferunt.

Confirmat hoc quotidiana experientia, dum quisque observare potest, quod potus non rite fermentatus, sed facile adhuc fermentescibilis, indeque accitentes, aut *Pisum maritimum*, vel *mustum*, vel *Cerevisia* nova non rite defecata, aut copiosius, aut intempestive assumpta, & familia subinde intolerant stranguriam: Vid. HOEFERUS *Herc. med. lib. 3. pag. 135.* item GUILIELMUS FABER *fol. 574.* Talia enim facillime præternaturaliter in primis viis accitunt, & acorem conceptum perniciatius retinent: unde nec adeo facile, nec in stomacho, nec in duodeno à Bilis Sale volatili oleo temperari possunt, quin ulterius acore pergat ad loca urinaria, ibi urinum inquinat, & suo acore imbecit; quæ urina erio acidia facta hostilitate sua contrarium stimulum inferit in Vesica, & exinde Malum Stranguriam excitat: Unde urina in sensibus simul crassa observatur, quæ citius ex eruditata acida ex primis viis ex delata, interdum quoque ex Vesica excoriata, Nutritimentum proximum plorante.

Aliis undecunque natæ *aurantiores, exulcerationes*, item *atriationes* à calculo, ita Vesicam disponent, ejus interiorum superficiem adeo irritabilem reddunt, ut nullius rei accitentes contactum, etiam urinae naturaliter constitutæ, nisi cum summo dolore ac molestia, adeoque continua Irritatione perferre queat, quin continua adit Stranguria: unde & *ulius* *viscer* aut *Reum*, occasione acrioris puris, Stranguriam molestissimam inferunt: sed sarrum est, quia talia potius ad Dysuriam disponent.

Causa ergo proxima Stranguriæ est continua irritatio Vesicæ, ab acido præternaturali in urina, unde contiguum mingentium Conatus cum ingenti dolore inter mingendum oritur. *Causa remota* est digestio prima non rite peracta, in specie vitio assumptorum. *Causa* vero *dyspnoica* est inertia Fermenti Fellic. Et hæc quidem est Stranguria ordinaria.

Præter hanc ordinariam Stranguriam datur etiam *Virulenta Stranguria*, utpote hæc magis ad Dysuriam referenda sit, is frequens, qui laborat Lue Venerea, ac quæ difficillime est curatur, ac subinde in ulcus penis & phyllostatum ejus terminatur; quin & hæc Stranguria Virulenta cum quibusdam consensuac committitur, obstruente SCHENCKIO *lib. 3. observ.* Originem habet ex prostratis glandulis circa radicem in penis inquinamento Venereo infectis, & ita Lympham acrem plus minus corrodam plorantibus. Interim rariu est, quod oriatur Stranguria admodum pertinax ac torminosa *ex incantatione*; quæ exemplum Stranguriæ contumacioris singulari refert HELMONTIUS *Tract. de Lithiâ*, quam per faciem Bercula, seu cervicisam betulinam curatam refert, cum ipsa Bercula ad incantationes sit singularis.

DIAGNOSIS.

Stranguria per se patet ex relatione *Ægrotum*, quibus Malum hoc insigniter est molestum. *Caustum* Differentiæ est circumstantia antecedentibus est cognoscenda: idè interrogandus est *Æger* de vitio *Assumptorum* assumptorum, cum simplicissime ex causis exterius oriatur.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: Stranguria, si ex vitio urina, periculosa non est, utat admodum molesta.

In *Senibus* autem Malum cuncta perquam difficile, propter deficiente digestionem primam, & merum Fellic.

Cæterum diuturniorem aut contumacioris Stranguriam, ulcus vesicæ interdum pedemur inferri solet.

Quæ ex vitio vesicæ est, curatu difficillima, ac subinde periculosa est.

CURA.

Cura Stranguriæ quod attinet: in hac imprimis

1. *Acidum* urinae corrigendum ac temperandum.

2. *Viscer* qualescunque læso restituenda.

Quoad *Præ*: ante omnia imprimis *Virulenta* est restitucandus, intè quæ in Malo contumacioris primatum obtinent *Mercuria*, quorum utilitatem in Stranguria & aliis urina-

vils affectibus multis commendat RIVERIUS *in pr. lib. 24. cap. 9.* & confirmat per experientiam HILDANUS *cent. 6. observ. 52.* Porro ad restitucandum Stomachum præter Vomitoria etiam pro scopo averterio *purgentia* blanda interdum propinantur; quæ inter sunt imprimis pulvis de Terebintina cum Rhabarbaro, præter vim laxativam simul acrimoniam urinae temperantes, Jalapa cum Terebintina; item spiritus Dia-Turbi cum Rhabarbaro, ac deique extractum Panchymagogum cum Mercurio dulci, idque imprimis in Virulentâ Itargaria ex Lue Venerea, vel quæ ad aliquam exulcerationem vult terminare. Sunt qui Galiam quoque hic commendant; Experientia tamen multorum practicum docet, illam non rari dolore augere: vid. HORSTIUS *lib. 4. observ. 4.* FIGRÆUS *Chirurg. lib. 7. cap. 4.* & HILDANUS *l. c.*

Quoad *posterior*, ea, quæ in Vesica Exulceratione supra fuerunt posita, secum obtinent.

Inter *remedia præ corrigenda acris acide* egregie convenit radix Glycyrrhiæ, ejusque decoctum, ac radix Malvæ cum Nummularia in jure pulli: vid. GABELCHOVERUS: Portulaca, Sonchus levis, Glandes pulverisate, aut etiam in specie Gallicæ, Flores Violarum, Nymphaeæ, Chamomillæ: Fructus etiam Alkekengi, & Trochisci de Alkekengi, cum & sine opio, optime conveniunt in Stranguria. Per cæteris quoque *coctis aurantiorum* pulverisati, aut etiam Tinctura seu essentia Costeum Aurantiorum cum spiritu Vini tartarizato parata, aut etiam, idque primario, Oleum destillatum Corticum Aurantiorum ad aliquot guttas assumptum, optimum sunt ad Stranguriam experientiam. Convenit præsertim si à causa externa assumptorum Malum ortum fuerit: Horum enim Sal volatile oleum, acidum potenter destruit, & acuit Bilem eadem ex ratione. Pulvis *Nixis* *Melchata* curat Stranguriam ab usu Cerevisiæ crude vel novellæ entam, Cerevisiæ immixtis: Vid. de hoc facellus FORESTUS *lib. 25. observ. 2.* Insiper *albus*, quæ spiritum urinae odorem, in usu sunt, & tam Baccæ, quam Folia: item Gemmæ Ribes nigre ad 36. cum *Semen Dani* in Vino rubro decoctæ, singulariter commendantur à FORESTO *lib. 25. observ. 4.* quo gravem Stranguriam curam tant refert. Porro *destillatum Rapum* domesticum ferre sine pari remedio est, atque specifice GABELCHOVERI *Crat. 3. var. 2. p. 6.* utpote qui hoc decoctum in affectu urinae, præsertim in Stranguria & Dysuria, feliciter adhibet, & in quacunque Acrimonia acido-salis est optimum: Conf. CRATO & SYLVIVS *in præci.* Conveniunt quoque *Semen Canna*, quatuor Semina Frigida maiora, ex isis cum cum Papaver albo paratæ Emulsiones: Nam hujusmodi oleosa femina Acrimoniae urinae obstant. Quo rectius nec oleum Amygdalarum dulcium cum Sympo de Albura, additis Lapidibus Cancræum ita assumptum: Lac ipsum hujusque Serum incoctis præprimis Floribus Cynali & Calcaripæ, Malvæ Radix & Flores: unde horum Confervam RIVERIUS & AMATUS LUSITANO *cent. 6. observ. 52.* & Foliorum decoctum FORESTUS *l. 25. observ. 4.* & GABELCHOVERUS *cent. 1. observ. 21.* in Stranguria mirè exollunt. Pariter Pulvis Radicis Althææ cum siachro, aut hujus cum Juhbis decoctum, item *Semina Mucilaginosa*, & exinde parata decocta & Sympa: vid. HARTMANNUS *præc. pag. 371.* Item habet loci est Alibumen ori cum aqua Rosarum consusatum, decoctum Florum Chamomillæ cum Lado, ac decoctum Bassiacæ rubræ, de quibus idem FORESTUS *l. 4. observ. 5.* Decoctum item Herbe & Baccarum Alkekengi cum Palsulis non immerito laudatur ab AMATO LUSITANO *stat. 6. Cap. 92.* qui miras virtutes habere dicit. *Balsamum Peruvianum* sunt, qui exhibent à guttis x. xv. vel x. ad summum 3i. Interius assumptum in Vehiculo appropriato, miras in contumaci Stranguria habere dicunt viri cui tamen à LINDANO merito præsertat & specifice commendatur Balsamus illa Indicus de Capis dictus, ad guttas aliquot in *decotto Persefolii* assumptus, utpote quod nobile etiam experientum in Stranguria contumaci. In specie, quæ comitatur Gonorrhæam Virulentam, vel Lue Veneream: non fecas ac Balsamus Sulphuris, Oleum Cereæ, Succini, Macis, si ab erotione Vesicæ Malum, in aqua aut decocto appropriato, v. g. *Ciccorum rubrum*, propinatam, locum invenit.

Quid si *perniciatius fuerit malum*, & vitio digestiois solo à cruditatibus ibidem detentis sit Stranguria, id quod v. g. in *Senibus* frequenter venit, conveniant *Aromaticæ*, & horum Oleo florentibus grata hujusque digestionis faverent, v. g. Galanga, Zedoaria, Nucis Moschatæ, Crocus, Costes Aurantiorum, Species Dicumini: item *Powr* *visi Hispanici*, aut *malvatici*, aut *malvaticum Juriperianum* misceantur.

pentur; vel etiam convenit *Nasum*, in quo *Silice* *candefacti* aliquoties sunt extingui; Fit enim sic *Vinum Diureticum*, omnis acidi absorptum: propter quam rationem in Stranguria etiam conveniunt *sabilla alcalifata*, v. g. *Lapilli Cancrorum*, qui imprimis acidum Stranguricū absorbent. Ac si in cancria absoluta est Stranguricū cura, vi alcalina diuretica pluribus scopis satisfaciens. Hinc sunt, qui recipiunt duos cancores *Buvisiles*, quibus cancria in mortario contulis affundunt aqua appropriata vel *Cerogivis* q. l. succum exprimunt, & contra Stranguriam propinant.

Quibusdam in usu est, ut propinent oleum Amygdalarum dulcium cum Syropo *Althææ Ferulæ*, quibus adduntur *Lapilli Cancrorum*. *Livivum* ex Testi *Ovorum calcinatis* cum *Vino panceum*; item *Nirum* in *Vino* datum, spiritus Nutri dulcis, spiritus Salis marini dulcis, qui ab *HELMONTIO* in Stranguria Senum laudatur, &c. Pariter huius loci sunt *ferriura absorbentia*, scilicet *Lapides Pericarum*, Teste *Ovorum*, *Corne Cervi* usum, *Creta*, *Sal Tartari*, *Sal Silicum*, *Stipicum Fabarum*, *Tinctura Tartari*, spiritus Tartari, spiritus Carminativus ex tribus, ex Nitro, Tartaro & spiritu Vini, qui insuper laudatur: item, ubi alia incusum sunt adhibita, *Boracis* &c. exhibentur: Item spiritus Vini bibulus, dum cubitum itur, preservat a Stranguria (V). Specula huc quoque succinum & succinata, v. g. Trochisci de Carabe: item Vesica Capreei seu Capellæ preparata, hancque pulvis simplex vel compositus, quem *HÖCHSTEDTERUS* deacid. 6. cap. 2. describit. Pacient huc etiam Pulvis *Quercetani*; quibus utitur in omni Stranguria, in omni Dysuria, & renum exulceratione, Earum Compositio hæc:

℞. *Thuris*,

Myrris,

Maßick, an. ʒi.

Succini,

Croci an. ʒi.

Camph. ʒi.

Aromenii diaph. ad pondus omnium.

Cum *Terebinthina* distil. f. Pulvis.

quorum dosi sit ʒi. ostendo aliquandiu.

Tandem *Cepa* non ultimam fuit Stranguric Remedium: Nempe *Cepa* minoris incisā infundatur in aquam simplicem vel *Althææ*, per 24. horas, aqua infusiois hausta Stranguriam cessat. Nam Sal volatile *Cepæ* egregium est remedium diureticum, & simul absorbet acidum. Ratione Calculi, & alceris Vesicæ, quomodo hæc tollenda, petatur ex suis locis.

Ratione *Dietæ* breviter monendum, cuncta Acrâ, Motusque corporis vehementiores, v. gr. Equitationes esse vitandas: vid. *GABELCHOVERUS* l. a. item frigus, hinc Potulentia cauda calide assumantur. Hinc varis heri possunt formulæ; v. g. in principio:

℞. *Terebinth. Cyp.* ʒi.

Mag. Jalapp. gr. vi.

f. Pulvis: S.

Pilulæ Evacuantes.

Vel

℞. *Massa Pilular. Terebinth.* cum *Rhab.* gr. xv.

Mercurii dulc. ʒi.

Extr. Troch. Alk. gr. i.

M. f. Pulvis.

D. S. ut antè.

Vel

℞. *Extr. Panch. Crocilli*,

Mercurii dulc. an. gr. xv.

Extr. Troch. Alk. gr. i.

Cum *Tinctura Tartari* f. Pulvis.

D. S. ut antè.

Vel

℞. *Conferus malva.* vel *Vielar.* ʒi.

Ref. Jalapp. gr. iiii ad xv.

Tartari vitriol. gr. viii.

M. f. Bolus, in hinc usurpandus: S.

Saccharum Evacuans.

Vel

℞. *Tinctura tartari acerr.* ʒi.

Olei deßillat. Cerv. Aurant.

Mac. an. gutt. xii.

M. D. S.

Tinctura Leniens.

Dosis 20. guttæ.

Vel

℞. *Extr. Cerv. Aurant.*

Zedair. an. ʒi.

M. f. ut antè.

Dentur 40. guttæ pro doli.

Vel

℞. *Olei deßillat. Cerv. Aurant.* ʒi.

Zedair. ʒi.

M. S.

Oleum *Gugulare* contra Stranguriam.

Vel

℞. *Olei deßillat. mac.* gutt. lv.

Galanga.

Rac. *Jalap.* an. gutt. lli.

Sacch. albif. ʒi.

M. f. *Electuarium* pro a. vel ʒ. doßi.

D. S.

Saccharum Leniens.

Vel

℞. *Extr. Dia-Cum* ʒi.

Pulv. Bot. mæst.

Lapill. Canc. prop. an. ʒi.

Cum *Sacch. int.* q. aqua simpl. sol. f. Rotula, aspergenda cum *Oleo deßillat. Cerv. Aurant.*

D. S.

Rotula Lenitiv.

Dosis No. v. vii. &c.

Vel

℞. *Mirridar.* ʒi.

Oli. deßillat. Rusc.

Corn. Aurant. an. gutt. iiii.

M. D. S.

Saccharum Sedans.

Opiata tamen mieds conveniunt in his malis.

Vel

℞. *Conf. Flor. malva* ʒi.

Calam. arom. condit. ʒi.

Sper. Diagalang.

Dianemin. an. ʒi.

Lap. Canc. prop.

Succin. prepar.

Mac. *Maßick.* pulv. an. ʒi.

Cum *Extr. Vielar.* vel de *Althæa Fern.* f. *Electuarium*: S.

Electuarium Leniens.

Convenit quoque *Pulvis supra* sect. 21. ubi de *Calicia* descriptus.

℞. *Malva Junc.* ʒi.

Spirits Carm. de *Tribus* ʒi.

Syr. Carn. Aurant. vel de *Jupab.* ʒi.

M. S.

Succus contra Stranguriam pro aliquot vicibus.

Vel

℞. *Oli. Amygd. dale.*

Syr. de Alth. *Fernel.* an. ʒi.

Succ. Cancr. flav. cum aqua malv. extr. ʒi.

Lap. Cancr. prop. ʒi.

Misc.

Vel

℞. *Sem. a. frigid.* maj. an. ʒi.

Pap. alb. ʒi.

Cum l. q. destill. rad. *Alth.* f. *Emulsiot*

adde

Aque Cinnam. temperat. ʒi.

Lapill. Cancr. prop. ʒi.

Extr. de Alth. *Fernel.* q. l.

M. D. S.

Emulsiot Leniens.

Vel

℞. *Rad. Alth.* ʒi.

Liquirit. ʒi.

Rad. Althææ &c.

Malva.

Humulus. an. M. l.

Fruct. Ichthys.

Althææ. an. No. x.

Coq. in l. q. aqua simpl.

Colaturæ *Rob.* ad ʒi. adde

Syrup. de Jupab. ʒi. vel ii.

D. S.

Potio Leniens.

Vel

(V) *Vinum* & *Vini Spiritus* saponis Stranguriam & Dysuriam cæciam: cum scilicet *Ferulæ* digestione turbat, & aciem *Cruentam* creas: quod spiritibus potibus similis est.

Vel
℞. Terribilis. vng. vel Cyp. 3℞.
Diffoiv. cum f. q. Melli Ovi
adde paulatim
Vini Malvac. 3vi.
Syr. de Alch. Fern. unc. 3℞.
M. D. S.
Emulſio leniſſima.
Dofa unc. i. ad unc. 3.

Ne atrox confectio, nephritica & podagrica affe-
 ctibus crebris obnoxia, urgente intenſo hyemis frigore ruſſi
 ſicca ingenti & valida, crebris poſtus conſuetione, affli-
 gebatur, qua quidem pauca ſaltem & viſcida eſciebat. Lo-
 cum, ubi tuſſis excitebatur, monſtrabat arteria in collo
 aſpera arteria: accedebat levis inſaſo podagrica circa
 manum dextram & cubitum ſiniſtrum. Ego vocatus, pro
 urgente Tuſſi ſicca, mota propter acrimoniam lymphæ,
 cum veſtigis hinc inde Podagræ, præſcripſi ſequentem po-
 tionem:

℞. Aqua ſcabiſ.
Ment. ana 3℞.
Spiritus fal. Ammoniaci anſ. 3℞.
Flor. Salspæria 3℞.
Syr. ſcabiſ. 3vi.
Miſc.

Interdum etiam gr. i. ad gr. 3℞. de Laudano opiate tem-
 pore veſpertino addidi. Hinc tuſſis quidem evaneſcebat,
 ſed podagra exaſperabatur; unde iterum præſcripſi:

℞. Spiritus fal. ammoniaci 3℞.
Cochleari 3i.
Miſc.

De quo ter, mane, à meridie & veſperi ſub introitum
 leſti ſuæ guttas ſumebat, impoſito ſimul aliquali ſudore;
 ſed ſudare non poterat propter pororum conſtrictionem.
 Hinc continuo ſpiritus ceſſavit quidem affeſtus podagri-
 cus ſine ſenſibili ſuperveniente evacuatione, ſed ſecunda vel
 tertia die ſuperveniebat ſtranguria cum gravi dolore in
 lambis & Vefica. Alci enim volatile ſpiritus ſalis Am-
 moniaci deſtruxit quidem acidum; unde paroxyſmus podag-
 ricus ceſſavit. Sed quia acidum hoc non in totum cor-
 ruptum, ſed partibus ſervie inſuſum, ope huius ſpiritus tan-
 tum reſolutum, & in motum conſtitutum fuit, & à ſero
 abſorptum, ſtranguriam intulit. Pro acido ergo temperan-
 do & urina promovenda præſcripſi:

℞. Amygd. dulc. ambr. 3℞.
ſum. Malac. 3℞.
Papav. albi 3℞.
Cum f. q. aqu. alkæſcop. f. emulſio ad unc. viii.
adde
Lap. jerear. pr. 3℞.
Miſce & parum edulcora.

Optimè conſerebat hæc poſeo, unde ter vel quater repe-
 nita fuit cum plenaria ſanitate.

Tandem ad derivandam acris ſerum per alvum, blan-
 dum laxativam præſcripſi:

℞. Conf. roſar. di. 8.
Tartari vitriolat. gr. viii.
Ref. Jalapp. gr. v.
M. l. bolus.

Unde 6. vel 7. per alvum exterevit, & ita penitus con-
 valuit. Hinc

℞. Cort. aurant. di. 8.
Lap. jerear. pr. vel roſ. ror. calc. 3℞.
Olei diſſillat. cort. aurant. gutt. ix.

Cum pauco ſacharo f. pulvis pr. 3. doſibus:
 Vehiculum erat viſum dulce, vel in quo ſlices candeſce-
 ſſent ſoli.

Externe ea ſunt pauca: v. g. ſerum commune ſeu cande-
 ſcit liqueſcendum, umbilico calide largiter inunctum conven-
 nit, quæſtus nempe ex vefica ad umbilicum uſque ura-
 chas continuatur. Loco illius tamen ſerum Hircinum cum
 aliquot guttis Olei diſſillati maris. Cera, Corticum aurantio-
 rum, maſtiche, & optimè coſect, umbilico illita: ver-
 gr.

℞. Erol hirc. 3℞.
Olei diſſillat. Cera,
Cort. aurant. an. gutt. v.
Miſc. pro litu.

Solum quoque oleum diſſillatum Corticum Aurantio-
 rum umbilico illitum optimam præſtat levamen. Item
 non inconveniens erit inter mingendum, Penem in aquam
 vel lac tepidum aut Decoctum anodynum demergere.
 Non incongruum etiam eſt, ſi inſtituatur ſeſſumigium ad
 Tum. II.

imitationem RULANDI, quod habet in ſchoſauro Pract.
 ſeu curat. empir. lib. 3. pag. 591. nempe

℞. Raphanus.

Incidatur & decoquatur in Vino, Vaſe bene obturato
 quibus probè ebullientibus imponatur Vaſ ſella bene
 perforatæ, cui æger inſideat, & veficæ regionem inſu-
 fumiget, ac ita hoc ipſo euporith meatus reſerari,
 ſtranguriam demulceri, & orinam deſſere & tempo-
 rari, affirmat allegatus Author.

Conſere etiam hoc ipſum in ſuppreſſione urinae ex vi-
 tio veficæ.

Alias uſitatum eſt quaſi ſympſimarum & magariſi curari
 ſtranguriam; ſcilicet addeſcentem ſocum Cineribus calidis
 adhuc repletum: hinc abſurgunt iſti cineres, & largiter
 permungunt adhuc ſocum calidum: ſe enim exſiccatur
 vel elicitur ſumus, qui largiter exſiccandus eſt circa locum
 veficæ, ſed à partibus genitalibus, ſicque curari ſtranguri-
 am aſſerunt. (Saxius eſt, ſi viciuſum calorem per ſuturam
 poſſet penetrare, at largius extenſum mayorem de ſe dare po-
 ſſet capere.)

Conveniant Chyliferæ, nunc arteriæ, ſi alvus fuerit con-
 ſtumaciſ, tunc emolientes & anodyni magis, inſpecie ra-
 laſſa, vel ſolo, vel cum ſerpilla, malva, alihara & ruta,
 parietaria, &c. cocti & injeſti. Eſ quibus etiam bene poſ-
 ſunt habere, item emplaſmata ex parietaria & ruta, cum
 laſſe & oleo Scorpionum cocta & applicata: Vid. AMA-
 TUS LUSITANUS cur. 3. cur. 92. Quinimò & ipſa
 injeſſio laſſis in veficam, imprimis laſſis chalybeis, eſt
 egregia in ſtranguria. Quæ ſunt optima ad acrimoniam
 urinae temperandam; vel loco huius oleum Amygdala-
 rum dulcium recens expreſſum ſimili modo inſurpatur, quod
 ipſum temperat acrimoniam Acidam urinae; item emul-
 ſiones ſemium a. frigidorum, albumina Ovarum conſul-
 ſata, & troſchici alkæſcopi ſyringa veficæ immiſſa.
 SANQUEZ in ſchoſauro ſui, lac cum quibdaſſa pedicu-
 lis vivis per ſyringam Veficæ immiſſum eſſicax reperit.
 Venter verb totus inferior oleo rolarum, ſymphææ, un-
 guento Refrigerante Galeni, roſaceo & oleo Scorpionum
 inungatur.

Emulſes, & quibus totius ſubarum veficalium laſſas, con-
 veniunt Theriaca, quarum infeſus vicia urinaria optimè
 corrigunt: id quod in Syndico Dreſdenſi ante aliquos annos
 expertum audivi. Hæ quocies fuit uſuſus ſtomacho, toties
 optimè ſe habuit; ſimal ac in grandis vel coena tantillum
 bibite, intenſum dolorem in cervicæ ſenſit, cum ſtranguria
 continua & diuturna. Urina ejus erat non laſſa, nec pu-
 rulenta, ſed in ſuperficie blandè pinguis; tandem Theriaca
 curatus fuit, & per biennium ſe bene eandem habuit.
 Audvi tamen, malum voluiſſe recrudere, quod propter inter-
 ſum bilis in ſenſibus facile fit; hinc in iſi ſtranguria difficili
 eſt curatuſ.

MEMBRUM II.

De Dyſuria.

HAbitus ſtranguriam, tanquam effectum concernen-
 tem vicia urinae excretionis: ſed præter ſtranguriam
 vitatur etiam urinae excretio in aſſeſtu ſtranguriam ad-
 modum cognatuſ, nempe in dyſuria ſeu urinae difficultate,
 quando nempe cum magno mingendi conatu & labore
 Egri, accedente non levi dolore, urina effluit. Dolor ille
 accedens, cum inter mingendum quaſi ardens ſenſum in-
 ferat ſeu exprimat, ob id etiam malum hoc alioſomine
 etiam ardens urbis venire ſolet. Conqueruntur enim Egri
 in tali aſſeſtu: uris, ut ſi aqua calida corruerit, ſui ſolent
 exprimere hoc urinae malum. Cæſarius eſt hic aſſeſtus cum
 ſtranguria, diſſertat tamen ambo à ſe invicem in eo:

1. Quod in dyſuria urina non guttatim, ſed ſine inter-
 ruptione, & ſæpius in debita quantitate, utur
 cum conatu & labore, in ſtranguria vero guttatim,
 effluit.
2. Quod etiam dyſuria dolor tantum inter mingendum
 percipitur, non verb atero, aut raro etiam poſt
 miſtionem, uti in ſtranguria, ubi poſt miſtionem
 dolor adhuc urget; qui dolor quoque alterius
 planè generis eſt, quam qui in dyſuria aſſeſit, cum
 hic ardoris quidam ſenſus tubet.
3. Quod rariuſ ex propria urinae acrimoniam, ſæpiuſ
 verb partium urinalium, veficæ puta, aut vi-
 cinatum partium aſſeſtus, in ſpecie quidem Lau-
 ſu vel craſſo, pills minus excoſciatio, aut erul-
 catio

eratio orificii vesicæ seu principii Mestus urinariæ dysuria inferatur. *Stranguria* verò taltem à sola urinæ acrimonia nimia acida originem ducit.

A. Quod in *stranguria* urina cum continuo ad ingendum Stimulo, tenebris podicis non abstinis, ex-cernatur, *dysuria* nihil huius faciat.

CAUSÆ.

Causa horum symptomatum quomodo differant, nonnulli equidem, & inter hos SENNERTUS Pr. lib. 3. p. 1. sect. 4. cap. 4. & 5. erueret conati fuerant; sed multis contradictionibus se immergerent. Causa ergo talis urinæ difficultatis ac ardoris fuit dysuriæ aut in ipsa urina, quæ excretaur, aut est, idque frequentius, in partibus urinariis, vesicæ nempe & partibus vicinis, per quas eadem excretaur. *Ha ipsa* enim præternaturaliter affectus, etiam ad urinæ naturaliter constituta præterfluente insidentur, & hinc doloris sensum concipiunt.

Quod ergo attinet primò *urinam*: hæc quidem, licet rarius, *Dysuriam* gravem aut habitalem inferit, quando nempe *acris nimique salis, acida salis, aliaque* ratione mutata esset; live hoc fiat à *salibus* copiosis imbibitis, ut fit in hypochondriacis & ictericis, qualem *dysuriam* lethalem ac acrimonia fertur scorbucum cum mira penis retractione observavit M. A. N. C. ann. 4. observat. 155. pag. 197. live eadem fiat à *Pars* actiore nimisque salis permixto, quod pus aut exulcerationem renum aut vesicæ, aut aliarum partium exulcerationem inferit, & cum urina permixta, & acrimonia sua vesicam assurgere solet. Pertinent *hic cantharides* vesicam ulcerantes, & corrosivo suo veneno urinam impregnando *dysuriam* inducentes, aut applicatas externè, aut perperam propinatæ internè. Pertinent huc quoque *mercurialis*, imprimis præcipitata non raris præparata, quæ alias ad gonorrhæam virulentam adhiberi solet; nam & hæc ad *dysuriam* disponere, observavit FORESTUS, qui vid. lib. 15. observ. 37. de quodam nauta, qui gonorrhæam laborans & mingendi difficultate, cum uirgultis pilulis ac Mercurio præcipitato paratis, eandem in urinæ ardorem duplo majorem incurrit.

Sed rarius est, uti dicit, quod urina præcise affecta *dysuriam* inferat; frequentius est, ut aut ipsa *partes urinariae* aut vicinæ *malè affectæ* *dysuriam* inferant, live per *diffusionem*, live per *congestionem* fiat, ut plurimum vesicæ aut ejus collum, aut etiam motus urinarius excoletur, aut exulceratur, ingentem & acerrimum concipiunt dolorem, dum urina traheatur, & si quæ alia, censè hæc est frequentissima causa. Hæc etiam non raro *vesicæ calcule* eandem attritu suo succedente nonnulli excoletur, aut alio modo circa collum, quo continuò incumbit, lædens, urina etiam naturaliter constituta, nunc *stranguriam*, nunc *dysuriam* perennam, inducere solet. Præter calculum epam *axillarem* *Collis vesicæ* *dysuriam* gravem inferit, ut etiam mitissima urina non sine dolore laboribus emittatur. Pertinent *hic proflatus malè affectæ*, seu glandulæ illæ, quæ in radice penis juxta Collum vesicæ sunt sitæ, imprimis à *Congestione venarum* per conglobum inguinalium affectæ, unde & Gonorrhæa virulenta *lunæ* subinduit, & lubido etiam exulceratur, quibus exulceratis ab urina præterfluente, immemuratur, quibus exulceratis ab urina præterfluente, immemuratur, quibus exulceratis ab urina præterfluente, immemuratur. Quæ de his affectibus loco-lymphæ blandioris elaborata succum aerem præ valentem corrosivum venera intelligunt, quæ ipso succo, dum atherum, per quam fuit excoletur & *labris*, & hoc ipso *dysuriam* admodum crudelem inferre solet. Difficillime curæ tunc est talis *dysuria*, sustinendum in alio per terminatur, quando & hæc ipsa *exulceratur* cum quibusdam continetur & moritur, uti observat JOHANNES SCHENCK. l. 3. observ. Verum præter affectus per *diffusionem*, etiam per *congestionem* vicinarum partium substat *dysuria* interdum inferitur. Sic enim *affectus* *diffusionis* in mulieribus, aut affectu *infectionis* reperiuntur, uti frequentius est, quam supervenire *diffusionem* *dysuriam*. Hinc propter *inflammationem intestini recti*, & teneasum & *diffusionem* molestem observavit AMATUS LUSITANUS lib. 6. cap. 14. item in consensu cum *hemorrhoidibus* doctores Urinæ ardorem & *diffusionem*, eundem polimodum per *elytra* et Oleo violarum, annotat SCHENCKIUS lib. 3. observ. ubi de *hemorrhoidibus*.

Observandum simul est, subinde in modò dictis affectibus, *stranguria* & *dysuria*, externi materiam *crassam*, mucilaginosam & pituitosam, quæ ipsa, ut dicit, nihil aliud est quam momentum vesicæ spermaticum, aut partium illarum urinariarum proximum, quod ea partibus illis lesis

& nonnulli excoletur continuo catillans, sub forma talis mucilaginis crassæ aut lactis una cum urina excretaur, à qua mucilaginis urinæ ardor magis augeri solet, quatenus motum urinarium nonnulli collundendo difficultatem affert in mendo, ut non abique conatu, & non abique labore, urinæ fiat excretio. Hinc est, quod refert VESLINGIUS in *obs. anat.* à *Borholius editis* pag. 146. quod in demortuis ex *dysuria* vesicæ mucosæ & lentæ albicantæ materia plena observatur.

DIAGNOSIS.

Signa hujus *dysuriæ* *diagnostica*, per se & ea se faciliè patent, cum relatio *Ægri* eadem insinuet.

Imprimis autem emulæ antecedentes considerandas, & speciatim ad excoletionem vel exulcerationem vesicæ respiciendum, quæ ex excretis cum urina & circumstantiis antecedentibus faciliè patet.

PROGNOSIS.

Quod prognosin *dysuria* variam habet per se, pro variis causis.

In genere *malum est perquam molestem* quidem *dysuria*, non tamen per se *lethale*, neque subinde continuè admodum & *diuturnum* sit, sub qua diuturnitate, & ex quocunque sit causa, periculum est, ne exulceretur tandem vesicæ, aut saltem ejus exulceratio insigniter exasperetur, aut etiam si diutius affligat, urinx incoherencia liquareveat.

In *senibus*, cum sequatur ordinariò aliquæ vesicæ exulcerationem, difficultè & rarissimè curatur, nisi forsitan pus Vini malvatici, aut frequentior usus infusorum gallinaceorum eandem sublevet, licet idem vinum malvaticum, uti etiam pulvis *hemorrhoidalis* Quercetani, optimè committit, si conjuncta cum illo mucilaginis materia crassa & alba, &c.

Quæ est cum excretionem *Mucilaginis vesicæ*, est periculosa ea, quæ est *limbali* *mucagine*.

Si à mucagine crassa, quæ interdum in *dysuria* effusa exstat *sapporibus* *urinx* ea obstruuntur canalis, per quem fluit, malum est periculosum, aut saltem molestem.

CURA.

Quod attinet *curam*, in hac attendatur ante omnia ad causas, adeoque

1. *Acrimonia urinæ* lædens temperem;

Et hinc

1. *Partes urinariæ* quocunque modo læsæ, in specie Vesicæ exulceratae aut excoletæ, *sopoliuntur*.

Ac denique

2. *Vicinarum partium* affectus matutè removeantur.

Convenit ergo in *dysuria* *temperamentum acrimoniae* *urinx*, & hinc *hæmorrhoides*, Vesicæ excoletam consolidant, adeoque omnia, quæ in *stranguria* conveniunt, etiam matutè mutandis, huc applicari possunt. Pluribus scopis in *dysuria* insitit oleum amygdalarum dulcium, quod perquam egregium est sapientè usurpatum; item oleum amygdalarum dulcium cum syrupo de albica permixtum, aditus Lapillis percarum, & pulvere Lapillorum excoletum in forma potuiis mista & crebrius usurpata. Malva etiam, emulque conserva sorum, aliisque Malaces, specimè commendatur, quatenus egregiè urinæ aut peria acrimonia abundant, scilicet Vesicæ irritatæ demolent, & loca læsa quasi mucagine temperant obducunt. Hinc *sanctam* *formam* *malvæ* per experientiam comprobant mirè laudat AMATUS LUSITANUS Crat. 6. cap. 31. ubi ardorem urinx cum canicularum missione beneolice conservæ ac floribus malvæ curavit. Constat & HOBCHSTEDTERUS decad. 6. cap. 2. *foli.* Ut & *syrupo de malva*: Exemplum videb. in HORSTIO *junioris* *obs.* & observat. pag. 50. Item *mucaginam* *seminum cum dactylis* *atib.* paratæ, & cum hoc ipso propinatæ, sunt exoptatissimæ HARTMANNI in *praxi chymica*. potius à his *dysuriam* fiat, quod vel ita, addito *Lapide cancrum*, usurpetur; vel addatur nitrum, & potus erit gratus. Decoctum pariter *Forsythi* *supra*, *Mentha* 2. *Aristolis* 1. *Et* 2. ubi de *calculo renum*, laudatum confert. *Decoctum herb. & hancuram* *alkalæ*, *Et* *alkalis* est, & haberi possunt, cum passulis itidem in *dysuria* singulariter est laudatum; vel *decocum* *sorum* *strophyl.* *Potulicis*, *seminis* *linc* cum *faccharo* & *Nitro* adhibetur. Similiter *Decoctum sorum* & *herbæ malvæ* cum *passulis*, *Jupis* & *seminis*, pro usu interno admodum

dūm commendatur: Nam, si quid aliud, certē *Dactylum Graecum* *Seselin* cum Aqua Sempervivi omni mane ad ℥i. assumptum, & GABELCHOVERO ad Dyuria laudatur. Alii Grana *Seselin* incola decoquunt vel in Aqua Sempervivi majoris, vel Hordei, vel Decodum ad ℥i. omni mane usurpatum infingunt Ardorem & Dolorem urinae lenire dicunt, idque imprimis, si tantillum de *Cere* fuerit additum, uti hoc commendat GABELCHOVERUS *Cons. 1. Cur. 22.* STOECKERUS in *Praxi* laudat Decodum Hordei, *Seselin* & *Glycerithae*, mane vespereque haustum, usque cum syrupo *Papaveris*. Commune est porrifon est *Pulsis Radice Althea cum Sarcocolla* millos & usurpatus: *Emulsiōes ex Amygdalis dulcibus, Semine Melleum, Nucleis Persicorum*, additis *Lepiditis Percarum*, sunt egregia. Porro *Lac, Sacum Lactis, & omnia Lacticia*, uti in omni Dyuria singulariter conveniunt, ita in specie proferunt in ea, quae est à *Cantharidibus*, quarum corrosivi Venenae appropriatae medfca & alexipharmaca est in Lacte: In quacūque Laccapoliolum assumptum, vel decocti sunt in eo Flores Chamomillae, qui sunt Anodyni; & cum illud magis Anodynum sit; loco Florum Chamomillae non inconvenienter etiam est, si cum Lacte ebullierint, aut flores Cyani vel Calcaritpae, qui egregie sunt diuretici, sic enim Lac fit magis absterivum. Hauriantur autem Lacticia copiose & calide: id quod pariter de omnibus potulentis intelligendum, ut, quantum possibile, calide hauriantur; cum certe *Potus frigidus* assumptus, aut Aer frigidus extra susceperit, infingunt Serenarium & Hicburium solcant exasperare. Ulteriori Terribilitas & omnia Terribilitas, uti in aliis affectibus urinaris, ita & in Dyuria, vitio Vesicae causa, optime conveniunt, quocunque modo assumpuntur; Excretionis enim & Excretionis inchoatae sunt, & morbus tollitur. Cautē tamen spiritus seu Oleum Terribilitas adhibeatur, quia nimis acris sunt. Potius Pulveres conveniunt, v. g. Olibani, Myrrhae, Malliches, Succini, Noli Armenae, Sanguinis Draconis, & praecipue Antimonium Phlogoreum excipientur cum Terribilitas, sicque redigantur in Pulvis, vel gr. Pulvis Quercitanus contra Dyuriam & Stranguriam, supra Membris i. laudatur.

Facient hoc sequentes Pulvis ad ardorem urinae experte *Alibenguri*, Medici olim Halensis. Compositio est haec:

℥i. Succi Liguirit. depur.
Laccini,

Talis an. q. v.

Incorporentur cum Terribilitas Cyprica, i. Pulvis, Dentur mane & vespere, jejunio ventriculo. Dosis ℥b. ad ℥i.

Facit etiam haec Pulvis *Sulis* ad Dyuriam admodum commendatus, compositus ex Tellis Ovorum, semine Urticae & Succino; cum *Succinum* & *Succinea* omnia admodum profunt. Unde etiam Trochisci de Caraka, item Trochisci de Terra Sigillata, uti etiam Trochisci de Alkekengi, in Officiis usurpantur ad Dyuriam, idque in specie, ubi eulceratio aut excretio locorum urinariorum subest. Remedia quoque ex Myrrha & Malliche sunt optima. *Urtica Caprae preparata*, item *Urtica Atri* sive *Urtica masculis* sicca & pulverisata, ad Stranguriam & Dyuriam praestantissima dicuntur Remedia, ita ut *Egri* miraculi instar levamen sentiant, uti loquitur HOECHSTEDTERUS *Docud. 6. cas. 1.* ubi etiam habet quendam de Malva. (2) Hicce etiam addatur Oleum destillatum Carvi, quo THONERUS in *observ.* aliquot Dyurias graves subito curavit, guttulas v. propinando. Pulegium quovis modo assumptum ad Dyuriam commendari solet. Pulvis Nucleorum Persicorum cum calicibus, infingunt conducit in Dyuria pertinet, etiam seculi, uti hoc per experientiam refert GABELCHOVERUS *Cons. 1. Cur. pag. 19.* Loco huius Dactyli sunt ferè salubiores; et si enim tale quorundam suporifon paratur:

℥i. Dactyl. q. v.

Offa Iuna redigantur in Pulverem tenuissimum; Caro verò sciandatur in particulas, & in chibano calcetur, pulverisetur in mortario, & misc. cum Pulvere Offium, addendo.

Sacchar. aliff. part. xxi.

Huius Pulveris mane & vespere caplatur tantum, quantum mucrone Coltri ferret aut bis accipi potest, continetur aliquandū, idque in Millaia sequenti.

℥i. Syr. de Alib. Fern. vel de Japut. ℥iij.
Tom. II.

Cicler. cum Rhubar. ℥i.

Aqua Myph.

Laccini.

Chamom. an. ℥iv.

Cianam. lallef. ℥b.

M. pro Vehiculo illius pulveris.

Hoc expertum commendatur in Dyuria.

Item

℥i. Lac. Persar. prop.

Off. Sap.

Canar. calcin.

Puls. Nuc. Mofeb. an. ℥b.

Extr. Opil. ℥i.

M. F. Pulvis.

Vel

℥i. Conser. Violar. ℥b.

Rob Junciperi ℥i.

Puls. Sem. Niper. ℥iij.

Lapill. Canar. prop. ℥i.

Piscar. prop. ℥b.

Land. Op. gr. lb.

Cum i. q. Syr. Scaldia & Electuarius.

D. S.

Electuarius Leniens.

Vel

℥i. Conser. Hedera terrestr. ℥b.

Rob Junciperi ℥i.

Sem. Violar. prop.

Niper. an. ℥iij.

Lapill. Persar. prop. ℥i.

Extr. Opil. ℥i.

Cum i. q. Syr. de Alib. Fern. f. Electuarius.

Extendit Serpentina calcidam, & partibus urinaris applicatum, dolorem sedat, & urinae promovet, quod expertum à se esse dicit MONTAGNANA *Cons. 18.* Cataplasma ex Althea, Malva, Melilite, Paritaria, cum Lactis aut Oleo Scorpionum Pubi imponatur, aut saltem Rata & Paritaria in Oleo Scorpionum cocta & appolita praesentissimè juvant, dicit AMAIUS LUSTANUS *Cons. 6. Cur. 22.*

Vel

℥i. Herb. Paritar. M. li.

Chorefel.

Flor. Chamom. an. M. i.

Isell. coqu. in Lactis ad mollitiem;

Pulvis per setaceum trajecit adde

Buyry. ret. ℥i.

Obi Scorpion. ℥b.

Misc. pro Cataplasmate.

Imponatur calide regioni Pubis, & desuper Operculum calefactum.

Potest Clisteris crebris in usum sunt vocandi, nunc blandē Stimulantes, nunc Lenientes, ex Lacte, aut similes Clystera Anodyni, qui Dolorem & Calorem miagandi admodum levant; nam quod contumacia est Alvis, eo intensior est Dyuria. Unde utilissimus est eorum usus, de quibus, ut & Balneis, vid. supra.

Tandem Iniectiones ex Lacte vel simplicis, vel Decodionis Anodynorum, item ex Oleo Amygdalarum dulcium conveniunt: loco quarum in Eulceratione Vesicae Iniectiones primò Mundificantes, hinc Consolidantes instituantur: V. g. Iniectione Mundificans in Eulceratione Vesicae:

℥i. Rad. Liguirit. ℥i.

Cor. Fakar. ℥i.

Sem. Cicer. rubr. Pag. I.

Fol. Plantag. M. i.

F. Decodi. in Aqua, addendo parum Lilioli. In

Colat. Bi. dissolve

Tereb. len. vel vulgar. in alk. dissol. ℥i.

Unguentum Aegyptiac. tantum, quantum ferre possit.

Idque saltem quantum necesse sit, misc. pro Iniectione.

D. S.

Iniectione Mundificans.

Vel

Iniectione Consolidativa.

℥i. Ramul. Equiset.

Fol. Plantag.

Sem. Niper. an. M. i.

Rad. Chorefel. max.

℥iij. 2

(2) Ad sedandum atrocissimum in mittiē ardorem, etiam à Calculo Vesicae ortum, efficacissimum experti sumus: Grana arabicum, vel integrum ad aliquot grana deglutitum, vel in Aqua florum Sambuci assiduum, additis tantis Maceris, ad plures dies juxta Sennaebo.

Bistrea,
Termantilla an. ʒi.
Cort. Granat. ʒiil.
 Coq. in ʒil. *Aqua Ferrariae*, vel *Martiana*:
 In Colatura dissolve
Trechb. alb. ʒi. ʒi. sicut fuit Opi ʒi.
Sali Armen. ʒi.
 Misc. pro Iniectione.
 D. S. ut suprà.

Ante commendavi Lactilem interius & externè: Quo etiam pertinet Experimentum SANQUÉZ de Pediculis vivis cum Lacte iocellis, *suprà*, Membra 1. ubi de Stranguria,

allegatum; quod etiam laudari adivi à D. MICHAELIS.

Item præter iocella convenit hoc unguentum expertum ad urinae difficultatem.

ʒl. *Unguenti Martiar.*

Agricop.

Olei laurii, an. ʒi.

Misceantur optime: S.

Unguentum singulare.

Hoc blandè calidè unguatur regio Pubis, & subitè fluat urina, idque absque dolore. (A)

Hac de affectibus urinaris, & qui ad illas pertinent.

S E C T I O XXI.

DE GLANDULARUM USU, ET NATURA LYPHÆ, EJUSQUE IN GLANDULIS SEPARATIONE, ET MOTU DEBITO LÆSIS, INDEQ; ORTIS CATARRHIS IN GENERE ET IN SPECIE.

UT pateat connexio cum superioribus, notandum: quòd Sanguis (de quo jam *superius* Sect. 19. etiam dictum) ad omnes partes moveatur aequali circulo, in quantum quibuscum (ut etiam dixi) aliquid patitur, imprimis quidem in Visceribus; quoniam tenent solentes quædam secreciones ab iisdem factæ: Quoniam etiam facit, dum post Reos Sanguis per Arterias moveatur etiam in partem viscerum, ad Glandulas per universum Corpus disseminatus (de quibus vid. concinè agens STENO Tract. *Observat. de Glandulis & Musculis*, sicut de iisdem specialiter quoad structuram agit WARTHONUS in *Adnographis*) ut in iisdem ex sanguine & spiritibus animalibus aliquid separatur, quod ad constitutionem & elaborationem Lymphæ requiritur, idque tam in Glandulis Conglobatis, quam Conglomeratis. Utræque hæ Glandulæ versantur in elaborando peculiari quodam Humore, Lymphæ à BARTHOLINO appellato, qui etiam pro varietate Glandularum distribuitur diversimodè. Et quidem omnis Lymphæ iofra Cor per ductum Thoracicum infunditur in Venam Axillarem sinistram; sicut Lymphæ in regione supra Cor tandem etiam per Axillarem sinistram infunditur & admiscetur sanguini. E Glandulis conglomeratis per sin-

gulares ductus in certam quandam corporis cavitatem effusus, peculiariter obtinet nomina & officia, ut sunt *saliva*, sicut *Pancreaticus*, *Lacryma* &c.: E Glandulis verò conglobatis, tam regionis inferioris quam superioris, per peculiaris Vasa, Lymphaticis dicta, tanquam in Venâ Axillari sinistra infunditur: Vid. de his in specie SYLVIVS *Diss.* 5. & 8. item BARTHOLINUS de *Vasis Lymphaticis*, item RUDBECCIUS *Tract. de Vasis Hepatis & Glandularum sinist.* Ubi enim sunt Glandulæ Conglobatæ, necessarii oriuntur Lymphaticæ Vasa. Omnibus autem Glandulis Conglomeratis infertur Nervus.

Glandulæ ergo omnes, cum habeant cum Lymphaticis commercium, ita ut passim reperitur Vasa Lymphaticum, quod non ex Glandulis ducit originem, perit Glandularum hæc esse sensum, ut præparent Lympham, eamque præparatam per Ductus certos aliorum derivent; & quidem per Ductus Lymphaticos in Glandulis Conglobatis in Venam Axillarem sinistram; per Ductus verò peculiari Excretorios ex Glandulis Conglomeratis in certam cavitatem quandam. Similis Glandularum structura similis in genere humorem ab eis emulgeri demonstrat, ita quidem, ut Lymphæ nomen Glandularum in

(A) *Labet hic Consilium sublevere, olim Illustris. Dom. N. N. Episcopo Ostunensi Dysuria ab incerta causâ laboranti, missum.*

Napoli 15. Julii 1718.

Dysurias Urinae, seu Dysuria, quæ ductus ab hinc annis angitur Illustris. Dom., ex ab ipsa præterfluente Urina acritate, ex à spiritibus vitio, vel alio quacunque corpore in Vesica coactis ortum trahit, in dubio adhuc est: etiam ex morbi historia me Urina qualitates novimus, nam turbida sicut vel clara sit, nam mucosa, arenosa, vel sabulosa sedimen præferat; nec minus multum motatur, nampe an Urina assidua an gustatim reddatur, an cum iofeso, & conatu etiam facti simul dejectum. Quævis de causâ igitur, probabile est primarias viscera, in corpore Hypochondriaca affectu laborante, primas alimentis digestiones laesæ esse, atque adeo maximum di. iis præcursum ad organa urinaria deposti, ac Urinam acriter reddere; ita quæque hæc improbabile erit Calidè cujuscumque, in homine Nephritide aliâ affectu, retentionem, atque in Vesicâ delapsam universam luctare posse sciamus. Diversa igitur hæc esse Morbi causa, quoniam committit quædam sua habent, propriis & peculiaribus signis suis præli discernenda. Multis cruciatu patit quidem ab Urina spiritularem extimulante, atque corrodente acrimonia creari; verum si ex motu corporis vitium, præsertim vitium vel equitationis facto, exierit, quod à Calidè Vesicæ cultum laborante & diutissime oritur, non levis est suspitio. Attamen ex eo quid morbi per intervalla recedit, si intervallorum spatio æger ab omni morbo præli immunis sit, & Urina absque ullo incommodo reddatur; non leve idem erunt argumentum, Dysuria causam prius Urina acritatem esse. quam Vesicæ Calidum.

Prægnatissimum pro causâ variatam variam est, ut patet. Cursus item varius erit tandem ex rationem. Quæ ad calculum (si aliquando est) dirigitur, quippe quæ nonnulli Liberetia est, consilio prætermittimus. Quæ Urina acrimonia respicit duplex est: vel in Paroxysmo, vel extra illum. In Paroxysmo ex ipsa erant Emulsi sicut fr. 4. frig. maj. cum syr. de succo Violæ, vel de Abbas Fornelli: Iniectiones ex Oleo Amygdalarum dulcium, & Aqua Rosarum: Infusio & Semicupia ex Decocto Malva, Balsam. Acacia, Gekopisali &c.: Fotæ item in regione Pubis per Perinas ex solis Malva, Abba & Chamæmeli. Extra Paroxysmum primariam digestiorem cura etiam industria habenda est: Quæ, cum per tempus luctat, temporaria medicamentis ad primum sum vocanda, post quæ Jura consuetas juxta methodum Speciali parata ad longum tempus sunt propinanda. Nec Specifica ad Urina acrimoniam temperanda sunt neglegenda, ut sunt Gummi Arabicum, Tragacanthum, Gummi concarium, Pilula ad ardorem Urinæ Quercetani, & similia: capenda item à Diarreticis, præsertim salinis, ne major fiat ad Organa Urinæ ex primis viis crassior humorum metallas. E menje exulsi aromatica omnia, præsertim pipæta & salsa cibaria: Vinum ipsi, nisi obest ventriculus interdicatur, in cuius locum Aqua Agrimonia vel similia substitui poterit. Animi demum sollicitudo Vitiis vitium infensa, quoad fieri poterit, vitetur, ac reliqua pro salute Illustris. Domini adhibeantur, quæ ad illius conservationem quæmaxime facere possit Eruditiſſimus Rector reparabit.

CAPUT I.

De Lymphæ vitiosa generatione.

io hoc conveniat, quod sit liquor aquosus spirituosus, copiosissimè acidulus. Conglomeratur verò diversitas etiam certam quandam in humore inde elaborato innuit diversitatem non essentiali, sed accidentali, diversis nempe ubibus destinatur: Sic essentialiter quidem conveit Lymphæ quæcumque cum saliva verbi gratia, & succo Pancreatico; accidentali ter tamen pro diversitate Glandularum in textura, in quibus elaboratur, differunt. Unde etiam diversas functiones administrare apti nati sunt, verbi gratia dum alius usus est salivæ, alius lacrymarum, alius succi Pancreatici, & sic porro, prout variant nominis dicti liquores ex diffinitione Glandulis oriuntur.

Materia ex qua componitur Lymphæ, maximam partem haustur ex Massa Sanguinea: idque in specie in Glandulis Conglomeratis, quæ spongiam solent ex sanguine Arteriarum emigisse liquorem serosum limpium, & ut probabilissimè putatur, occulte acidulum, quibus se locare videntur spiritus animales per Nervos ad Glandulas derivati. Conglomeratarum verò Glandularum Lymphæ eodem modo ut sanguine elaboratur. Interim tamen admodum probabilis videtur illa Hypothesis, quæ spiritus animales in partes per Nervos alias, condensatos simul maximam partem, cum hac Lymphæ constitutæ afferit; ita quidem, ut hi ipsi, dum laboribus non absumuntur, omnes cum alimento partium aquosiori se jungant, & ita subtilitatem suam spirituosam amittant, ac deinde in aequali subtilitatem condensentur. Hic ergo limpids liquor a Glandulis imbibitur, & humori ex sanguine emissio permittitur, Lympham Glandularum Conglomeratarum constituere videtur; de qua Hypothesis vid. SYLVIVS in *Supra* cit. Diff. 5. item SEGERUS in *Diff. de Quidditate & Materia Lymphæ*. Dicit verò, quod ex sanguine in Glandulis elaboratur succus vel liquor quidam acidulus, qui temperetur à spiritu illi volatili condensato, hoc Gistum Lymphæ subacidus interdum observari confirmat; vid. BARTHOLINUS *Cent. 2. Diff. 55. & 59. Cent. 3. Diff. 95.*

Ufus Lymphæ in Glandulis Conglomeratis est, ut excreta per ductus excretorios in determinatas cavitates vel loca, certis functionibus & alterationibus proferat, de quibus sub specialem partem usum. Quod verò attinet Lymphæ usum in Glandulis Conglomeratis elaboratæ, & in Venâ Axiillarem solutam infusam, hoc non adeo est evident; in genere tamen quæ prope Cor cum sanguine committitur, & immediata Cordis Ventriculi dextra infusio cum sanguine, certum quandam pro sanguificatione atque renovatione sanguinis in Cordis & Pulmonibus adjuvanda usum hujus Lymphæ arguit; quod Lymphæ ascendente ab inferioribus cum Chylis in ductum Thoracicum miscella ulterius confirmat. Unde dicendum videtur cum SYLVIO *Exerc. 2. Lympham*, quatenus est succus subtilis spirituosus volatilis, disponere sanguinem certo modo ad eam fermentationem & spirituositatem, quam in se transit per Cor & Pulmones patitur; Ubi nec neglegendum puto, quod Chylus, dum à Lymphâ diluitur, hoc ipso facilius cum sanguine permiscetur, & ab eodem subigatur & assimilatur.

Considerata Theoria, nobis jam incumbit *vitis Lymphæ* evolvere. Jam ergo visitatur & leditur hæc Lymphæ *generatio*, & debita eius in partes *Distributio*, tribus imprimis modis.

1. *Dum ipse vitiosus generatur*. Degenerat nempe à naturali crassi & textura, tam in quanto quam in quali, quatenus generatur aut nimis copiosa, aut nimis acida, aut nimis salia, aut alio modo vitiosa.
2. *Dum eadem vel naturaliter vel præternaturaliter constituta vitiosè distribuitur*, & ex Glandulis Conglomeratis in partes & cavitates infunditur.
3. *Dum eadem cum naturaliter quam præternaturaliter constituta impeditur in suo Motu* ex Glandulis Conglomeratis per Vasa Lymphatica.

A prioribus duobus vitis Lymphæ oritur *Catarrhis* dicti, seu omnes *Catarrhales affectus*. Et quidem prius vitium hinc varia & distincta producat pæthema, pro Glandularum & partium vicinarum varietate; cum Glandulæ sint fontes, ex quibus omnes *Catarrhi* originem ducunt. Quando enim ex vitiosis Glandulis vitiatæ Lymphæ generatio, ita ut hæc eadem facta acida, aut etiam nimis salia, aut alio peregrino sapore infecta, indeque distribuitur in partes, in specie ex glandulis conglomeratis, tunc oriuntur *Catarrhi*. Alterum dat *Affectus Catarrhales* propriè de dictis. Tertio vero Lymphæ vitio, nempe in Motu impeditur, oriuntur omnes *Hydropes particulares*, & *Tumores Serosi* particulares.

Vitiatur Lymphæ generatio tam in quanto, quam in quali, vel *Quali*, vel *Subjuncti* vitiis. *Quali* seu materiei ex qua (quæ maximam partem est serum sanguinis) vitio vitiatæ generatur Lymphæ, quando hoc serum parvius vel coarctius, remanet, vel à contento chylis rore crassius, dulcius vel vitiosè acrius fuerit; nam & hinc necessarii Lymphæ varia vitia contrahit. *Subjuncti* denique vel Glandularum vitio vitiatæ Lymphæ generatio, quando earundem Tumor & Textura secretoria, & alia requisita ad Lymphæ Generationem necessaria non tibi se habent.

Frequenter vitium est, quando obstruuntur, hincque plus minus incommode, utplurimum à materia Lymphæ generandæ viscidior, vel gelutina chylis magis turpida, quæ undecunque coagulata aut inspissata, tam à frigore aliave causa externa, quàm interna, sique in pectus abiens, Tumores glandularum majores aut minores, meliores aut duriores, benigniores, & cum sensu pectoris maligniores, constituit. Circa quorum affectuum Theoriam & Praxin consolendus veni SYLVIVS *lib. 1. Pract. cap. 49. 50. 51. 52. 53. & 54.* Ubi saltem hoc simul addiderit pro his *Affectibus curandis*, illis præfertim, qui ex obstruendis Glandulis originem ducunt, præter Mercurium dulcem pro purgatione, optima remedia esse *sudoriferâ ex Lipois*, præfertim *Tincturæ*, parata; esse *græcæ*.

M. Raser. Ligni Juniperis. 3ii.

Suff. 3ii.

Corr. Lign. Juniperi 3ii.

Herba Rosmar. M. lii.

Rac. Junip. 3ii.

Infusio in Aq. eiq. & Vinâ 3ii.

Macerata per 24. horas, coqui in Balneo Mariæ in Cucurbita cum fido Alembici usque ad mediam;

Colatum & destillatum misce, & adde

Spiritus Sal. Ammoniaci 3ii.

Syr. Flor. Calend. 3ii. ad lii.

M. D.

Potio Catarrhum dissolvens.

Hoc ipso, præmissa Purgatione Mercuriali, nuper Formicæ cum Mercurio suppressione, Tumores Parotidæ & Glandularum in Collo habentem, cum Capitis Gravædine, Narium obstructione, Oris siccitate & difficili anhelu, & Pectoris ac Pulmonum quasi repletionem, interdum suffocationem quandam minant, resiliunt, capiendū omni mane bonum haustum calidè, & expectandū hinc in lecto sudorem.

CAPUT II.

De Lymphæ vitiosa Distributione.

ARTICULUS I.

De Affectibus Catarrhalibus.

Catarrhi vocis quod attinet in sensu Hippocratico quæcumque decursiva seu desquens aliusque humoris, utplurimum acrioris, in quodam loco vel parte innuit, adeo ut ratione hujus sub generali Catarrhorum nomine etiam Diarrhæa, Diabetes, & alii similes Morbi HIPPOCRATI *Catarrhi* audiant. Verumtamen in specie, & nunc usitato Catarrhi seu Desquens nomine, innotuit *catarrhus* Decubitus seu E-lusio Lymphæ aut Lichoris tenuis, seu jam serum hoc fit misce & insipidum, sive acra, asperum, salinum, ad aliquam certam & determinatam partem. Et hoc est propriè *Catarrhus*, nempe *præternaturalis à Sero plus minus vitiosè in quæcumque parte soluta alteratio, seu functionum lapsio*. Vocatur Catarrhus *1.º*, seu. (B)

Ulterius Veterum de Catarrhis *Hæpatois*, quid nempe ex Intem-

(B) Imò à *catarrhis*, deslato. Unde *catarrhis* *catarrhis*, deslato.

Intemperie Stomachi frigida & Jecoris calida exhalant copiosi vapores sursum, qui in Capite, tanquam Alembico, à loci frigidity denuo condensati in Liquores seu Aquas serosas, cumulat, postmodum exinde per foramina Ossis Githriformis, tanquam per rostrum Alembici, succedunt in partes inferiores, easque interiores, Nares, Fauces, Oculi, Aures, Gulum, Aferam Arteriam, Pulmones, &c. defluunt, & ita *Catarrihus Interni* constituunt: Val quod per loca intercypantia externa, inter Membranas nempo Cranii extimar deriventur in totam Corporis peripheriam, etiam ultimos Artus usque, à quibus *Dyslasiatides*, seu, ut vocant, *Dyslasiatides* varia mala, in specie Arthritici affeetus & similia oriuntur, satis notum est; Nam *Amatium* ex intemperie frigida copiosum Phlegma generat; Jecur vero ex intemperie calida incandescit stomacho illud Phlegma in vapores & fumos resolvitur, qui copiose ex Ventriculo exhalantur, & evaporantes *Catarrihus externi* constituunt, dixerunt. Et hæc est Veterum hypothetis adeo decantata, & à multis adhuc recepta.

Sed hanc Theoriam Veterum sufficere discussit tam HELMONTIUS in *elegant Tr. Catarrihus Delirum*, prolato, quam etiam SCHNEIDERUS in *Opusculis suis prolato de catarrihus*; ejuque prolixia Volumina hunc coelestem continent, quid afferat & defendat, non à capite seu cerebro depleri feram pro catarrihus, sed illud ex Arteriarum vasculis à Massa Sanguinea facultate expultrice apertis, isoponi, & per Membranas transudando exori; unde pro variatæ Membranzum, per quas fiat ista Transudatio, & pro variatæ feri, ex sanguine per Arteriam ita esclusi, & hinc inde isoposti, varii etiam oriuntur Catarrihi. Et totum hoc est, quod habet SCHNEIDERUS in omnibus suis Libris; correxit tamen suum sententiam, & loco Membranzum Glandulas posuist. In qua doctrina glaciem prius frigerant SCHNEIDERO tam HELMONTIUS, quam etiam CAROLUS PISO in *arabide Scripte de cellulis formis*, cui SCHNEIDERUS maleum debet; sic & PISONI multum debet WILLISIUS, quoad Pathologiam Cerebri.

Sed, ut propius ad rem accedamus, equidem in hoc non culpandi sunt Veteres, quod feram statuerint Materiam catarrihus, utut Lympha vitia Moderni hoc asserunt: Nam feram Materiam colleclum, quod HELMONTIO dicitur *Latex aquosus seu Humor nigellus*, proprie loquendo, Modernorum est Lympha, & revera in radice conveniunt; utut in explicanda causa & fendi modo Catarrihorum errant, Glandularum Valoremque Lymphaticorum natura & usu nondum cognitis: Vid. SYLVIIUS lib. 1. in *Præf. de lassa Transfolatione Lymphæ*. Serum autem catarrihorum est materia, quoties nunc immediatè ex Arteriam cum sanguine excreant, & motu suo plurimè impeditum, & in spatiola partium molivum effusum, etiam varios affeetus, quos vulgo pariter catarrihus vocant, infert, nunc vero, idque primario mediati, mediane nempo lue in Lympham mutatione, & hinc ex Glandulis Conglomeratis in certa loca effusum, catarrihus propriè dicitur seu *Dyslasiatides*, aut rectius loquendo cum Modernis, in *Inflammationem* constituit. Materia ergo propriè dicitur Catarrihorum est Lympha Glandularum conglomeratarum (C) tam naturaliter, quam præternaturaliter constituta, copiosè, & imprimis uberrimè, in partes effusa. Fomes vero, unde scaturiat hæc, dictum, quod Glandula circa Lympham elaborandam & distribuendam sunt occupata; dum secundum STENONEM in *Observat. de Glandulis & Vasculis* nullum datur Vas Lymphaticum in Corpore, quod non oriatur à Glandula quadam, vel in Glandulam non terminetur. Fomes ergo catarrihorum sunt merib *Glandula conglomerata* unde glandula saltem vel in vicina loca, vel qua cum Glandula habent correspondentiam, propriè dicti Catarrihi affligunt, statimque prima Catarrihorum denique est Massa Sanguinea. Cum ergo frequenterissima Glandularum conglomeratarum & conglomeratarum terraria circa cerebrum coherant (nam totus eius cortex lue substantia cerebri corticibus minutissimarum Glandularum est textura, demonstrante hoc MALPIGHIO in *Scritinis Nervorum*), cum itidem in cerebri medulla copiosè Glandulae sint compicte, vel etiam in locis Cerebri vicinis, Oculis, Panthibus, Larynge, Auribus, &c. copiosè & insigniores sint Glandulae, ac denique colla & Aferam Arteriam copiosè adha-

reant glandulae, & hinc caput & partes respiratorias infervientes præ reliquis externis Aeris invariis & lationibus sine expostis; ob id non mirum erit, si propriè dicti catarrihus affligant frequenter caput, ipsique partibus vicinis, hinc *fauces ac Aferam Arteriam*, ac consequenter *pulmonibus & pueris*, sint molesti, i. e. ratione causæ efficientis externæ & materialis proximæ ad Catarrihus hæc partes sint dispositæ, idque ad magis, quò magis externis injuriis, in specie Aeris, modis dicitur partes sunt expostæ.

Dixi modo, Catarrihorum Materiam esse Lympham; Fomes vero Glandulas. Quod vero attinet Membranas SCHNEIDERI, in specie binas *pituitarias, anteriorem & posteriorem*, ac totas, & catarrihus accurate delineatas, per quas materia Catarrihorum ad eodem transiende dicitur (ut ut in *ultima Tract. de Catarrihus* addidit, si ipsi etiam Glandulas, tanquam opacula Vasculum) observandum est, quod rectius alii his Glandulis, quæ Gribus aut Transfolatoris, originem Catarrihorum adscribunt; imprimè eum hæc ipse Membrana SCHNEIDERI à parte posteriore texturam copiosiorum Glandularum habere adnotentem, ex quibus Glandulis, quæ fontibus, per Valvæ minuta ureteralia Membranas ibi perforant, omnes Catarrihi excurrent, sicuti naturaliter per hæc Valvæ Lymphæ, Fauces & Nares aliaque partes oblinent, hoc modo excreantur: Vid. STENO in *Obs. de Glandulis & Medullis*.

Per hæc igitur Glandulas Conglomeratas Lympha aut nimis abundanter per loca eascula, aut vitiatè simul præparat, & ita excreta, Catarrihus constituit, i. e. defluit Lympha aut copiosa, aut vitiatæ ex Glandulis, imprimis conglomeratis circa Caput, Fauces, Collum, Laryngem, Aferam Arteriam, aliaque similes vicinas partes, & proximè constituit Catarrihus. Unde buic Lymphæ dispositioni non tantummodò Panthium *thoracis partium inferius*, sed pro var in Lymphæ vitio variè etiam simul Symptomata superveniunt. Si tant hoc ita nil obstat, quin *Gomphus florum*, *Flus albus Miliarum*, *Salivatum* quilibet, quin & interdum *Diphtheria*, ad Catarrihus referri queant.

CAUSÆ.

Vidimus Catarrihorum Materiam, nempo Lympham vitiatam; vidimus Fomes, nempo Glandulas in Membranzum tegmine reconditas: quare pergo ad causas, à quibus ita movetur Lympha vitiosè, aut generatur vitiosa, & consequenter Catarrihi. Equidem ipsa, cum humore in partem, spontaneo impetu nonnisi fluidi gravis rathus, dorsum inovebitur, adeoque purè successivè sese habebit ad hoc, ut vitiosa, aut plus minus vitiatæ, per Glandulas conglomeratas moveatur, & ita spirituum influxum movetur, & Organorum lue Instrumentorum dispositionem Catarrihus influxum imitabitur. Ut igitur per Glandulas quæ conglomeratas catarrihali Lymphæ fiat excretio, Causæ proxima, propter quam Lympha vel naturaliter vel præternaturaliter constituta effunditur, & ita vitiosè distribuitur, semper est *vitiatæ & Læso* quadam in parte quadam plurimè sensibili, in qua vel eius vicinia sunt Glandulae copiosæ. Hujus enim irritationis lue lationis occasione Lympha oh Fihrum striduram ex Glandula vicinis uberius capitur, & ita semper restituta concinens quasi rivus eo derivatur; quæ ipsa, quò plus vel minus à statu naturali recesserit, eo magis vel minus gravem afflicum Catarrihus constituit: v. g. sicut Spina Digito infusa. Causa est Sanguinis effusio & inflammationis in loco, ubi plura sunt Vas sanguifera, ita similis Spina, v. g. *Acidum* inspiratum, aut inspiratur Fumus Sulphuris, ibidem Lymphæ uberiem effusionem, indeque *Rauidum* aut *Tumorem* subinde chronicum, & Materiam mucosam copiosam excreantem facit; ut si eadem Pulvis incidit in Oculum, mox à irritatione dolorosa effunduntur copiosæ Lacrymæ, quæ Lacrymatio est quasi Catarrihus à causa externa ortus. Quod si vero ab interna oriatur talis copiosa Lacrymatio, tunc rectè dicitur Catarrihus. *Læso ipsa*, prout nunc magis superficiali, adeoque irritatione quadam saltim partis fuerit, vel prout nunc gravius, quæque non sensum saltem partem afficiat, sed etiam texturam eius & spirituum influxum simul alterare valeat, etiam Catarrihus, nunc graviores nunc leviores, isert, in quæque ferre, loco laudabilis alimentis vitio spiritus innot ex

(C) Imo prius Conglobatarum, quærum motus est, etiam juxta Authoris sententiam, Lympham, seu Catarrihorum materiam fecerunt. Conglomeratæ vero Glandulae succurati peculiarium secretionis potius dicantur esse, Succorum autem horum vitia & Signamenta passim quidem peculiariter Catarrihus, determinatæ Corporis partes efficientes, inferunt; verum frequenter etiam casum universalem Catarrihorum materiam Lympham, in Conglobatis Glandulis secretæ, subministrat.

proprie Digestionis & Coctionis læsione vitiosum continet excrevit Excrementum, quod similiter nondum Alimentum corruptum, Partem magis magisque lædet, unde Catarhus habitus, seu perennis Catarhi featurus, ut in *Phthisi* manifestum est, de qua infra.

Causa ergo Proxima est Irritatio quædam molesta, ubi sunt Glandulæ, sive Irritatio illa fiat à *Fermento* acido, sive ab aliis Causis, perinde est: v. g. si Fermentum aliquod acrium in Parte reliquum tandem assilgit, nam mox in Glandulis vicinis copiosè Lymphæ effusio, & consequenter Catarhus, producitur.

Causa Remota, & quidem Materialis irritans, & nunc saltem sensum, nunc spiritum lotium magis afficit, ut sit varia, tam *Externa*, quam *Interna*, speciatim tamen est Acidum acre, vel *Salis acidum*, quod Occasionem dicitur Catarhalis Desolationi subministrare acque inferi. Non est excludenda hic *Causa Effluvia Formata*, quæ est spiritus impetu faciens, & occasione illius Irritationis Catarhalis Lymphæ Excretionem efficiens.

Causa externa, quæ irritat Partes & Loca glandulosa, Occasionemque subministrat Catarhis, sunt speciatim *Aëris Injuriæ*, inspirati nempe vitia, ratione cuius evenit subinde, ut *Epidemici sunt Catarhi*, quæ nunc cum, nunc abique *Malignitate* & sic ex eadem ratione Febres Malignæ Catarhalis Epidemice observant frequentius ferunt, hyberno tempore communissimæ. Epidemici hi Catarhi ab Aëre inspirato originem discunt duplici modo, quatenus *Externa* inspirata *Partim* Lympham ac Serum inquinant, & præternaturali ejus Alterationi occasionem præbent; *partim* quoque, quatenus *injerunt Loca*, per quæ transeunt, Nares, Fauces, &c. unde ibidem Lymphæ vitiatæ, quæ Catarhalis oboritur in dictis locis fit: Facetis. Sæpius tamen hic vitia Aëris epidemico etiam ex alia ratione Aër vitiosus Catarhis Occasionem præbet. Quo il pertinet, quando cum Aëre *Yani acres metallicæ & mercuriales* inspirantur in Laboratorum Chymicorum & Auribrorum, quorum acidum Gas & Particulæ acres acidas Membras Narium, Fauces, Laryngis, & sub his repositas Glandulas copiosius, contumax irritatione ad Fibrum contrahunt & copiosius Lymphæ Excretionem stimulant, quæ et ipsam Lympham non raro vitiant, ut acrimoniam acidam, spissorem, aut aliud modo vitiatam qualiter, acquirat: Sic *Frigus* patet *externam* Aëre mediante vehementiori ad diutius humum similiter has Partes lædit, et quæ ad Catarhalis Desolationem dispoit: Similiter, quando non ex incoherencia Aëris autumnalis & hyberni, Ruedo, Tussis & Coryza assilgit, quæ ab Aëre extrinsecus inspirato dicta loca irritat, unde Asterrationes, Tussis &c. non secus acque in Sternatatione acrimoniam Inspiratorum irritantur Narium Membræ & Vasa Lymphatica excretoria, ut eadem Lymphæ copiosa, subinde Mucro crasso imprægnata, profluat. Imò hi Nares vel vicina loca ab alia præternaturali Causa irritantur, idem omnino evenire solet: sive enim Aër inspiratus, sive Pulveres Sternatatorii vellicent Nares, idem est: v. g. si Solutionis Vitrioli, in specie Veneris, aliquæ guttæ inspersione Nariibus, sive Lymphæ copiosa desillabit, & habet Coryza Artificialis, Hemorrhagia illius lateris &c., acrimoniam autem illius Solutionis rodatur Membræ Narium superiores, unde Lymphæ copiosa desillabit solet. Jam Laris huc & Irritatio interdum eo usque procedit, ut etiam Alimentum, seu Nutritamentum Partis læsæ proximam exinde vitiosè alteratam appositioni fiat ineptum, adeo ut sit forma Muci crassi, spissi, variis coloris & consistentiæ, una cum Lymphæ non raro excretores. Porro non raro Frigus externum etiam post Corpora inuicem Asilum aut omnem Motum unde Caput exceptum, aut pleno Oro hamulom, prompissimè ad Catarhon disponit: Tunc enim ex improvisi assilgit in *insensibili Transpiratione*, quia subito clausi Poris Transpirationi coarctatur, & id, quod insensibiliter alias exhalare deberet, in Lympham quodammodo spissatur, unde cum Salibus acerbis fit prædium omne id, quod transpire debet, (ut patet ex sudore) talis Lymphæ asperius seu serior & salior redditur, quæ copiosius per Glandulas, Capitis imprimis, emulsa, aut hinc inde depulsa, Catarhos huc soggerit.

Hæc de Causis Externis.

Causa Effluvia Interna, quæ Loca glandulosa irritando, & Partem quandam lædendo, & ita ad Catarhos disponunt, sunt due:

1. Est in *ipsa Parte*.

2. Est in *ipsa Tere* seu Lymphæ effusa, quæ serio irritando Partes facit, ut focellivo effluum Catarhis fiat.

Quod priore in *ipsa Parte* quidem Causa Catarhorum hæret, quando aliqua præternaturali, inflammatori Aëre, ex Digestione privata læsa in Parte quadam enatum, & successivè coactum, periacidum in eadem hæret, & quæ si *Fermentum*, in specie acidum salum, Senium molestem Parti intus, unde occasione talis Irritationis sub Digestione particulari copiosius ex Loca vicino Lymphæ exsunditur, & ita consequenter Catarhus excitatur. *Hucus Exemplum fit Charallor Phthisis hereditaria*, focellivo *Phthisis Catarhalis* insistent, vel acedum illud Farmentum circa Dentium vitatorum radices hærens, Dolore, Tomori, ac similibus Pathematibus Catarhalibus occasione præbens. Lymphæ ipsa verò Causa Catarhi est, quando eadem dem præternaturali *Acrimoniam Acidæ* affecta est, dum per Partes distribuitur, eas irritat, ac necessario Dolorem commovet, & ita ad uberiorem sui Excretionem stimulat. Ut res per Exemplum fit evidens, observandum est, quod sub Laboribus Chymicis Gas acidum Sulphuris vel Aërii inspiratum irritat Laryngem, ac Tussim &c. ex Lymphæ præternaturali effusione *Ruedo*, unde *Serum* copiosum, inferat, & hoc est, quod Catarhus à *Causa Externa* dicitur. Quod si ex illa occasione Larynx & Pulmo graviter læsi fuerint, ita ut Nutritio, ea deficientia spiritus Insiti, Alimentum proximam debet stimulari nequeat, sed illud plus minus subinde depravetur, occasione nata inde molesta & Irritationis sæpius recidiva in Lulus aut Ruedo excitatur, & de Catarhis ex *Causa Interna*, Digestionis nempe depravata errat, exsistit. Facile enim sit, ut evanescente læt Mulo, in dicta loca remaneant reliquæ & dicta Digestione depravata, quæ successivè evigilando Irritationem faciunt, ut tuper veniat non a *Phthisi* Lymphæ catarhalis: sicuti v. g. post Curam Ulceris tantillum Fermentis, quæ depravata Digestio, fit deinde gravis Lymphæ Effusio, unde dicitur Catarhi *Acidæ* & *Phthisis*. Quod si verò Lymphæ, naturæ alteras humectans Laryngem, extra occasionem talem datam, in le acrior, salior & acidior fuerit, hoc ipso Laryngem vellicendo successivè Tussim, Ruedom, & spatum, copiosum, & tandem *Phthisis Catarhalis* fit dicta inferet. Patet ito etiam cum Oculo: *Ferula* Oculo illa loca Dolorem, Calorem, Tumorem, & copiosè Lymphæ continuam Effusionem loferit, quæ Mala à Causa Externa nata, quæ Catarhorum Oculi representant. Quæ Pathemata si ab interna oriuntur Causa, seu sponte superveniunt, dicuntur Catarhi, si scilicet talis quædam Tellura à Variolis Oculi infixa manent, cuius occasione crebrior *Ruedo* Catarhi excitatur: v. g. si in Scorbuto acrior Lymphæ Oculum, utpote tenerior, foras iserit, dicta superveniunt symptomata, quæ consequente Catarhum vitio Lymphæ enatum. Quod si vero talia Pathemata post Variolas in Oculis superveniunt, ex Fermento præternaturali in Palpebris hærente, & ibidem Digestionem progreum vitante, & huc Oculi continua Irritatione, illa symptomata cum crebriori Recidiva insincent, est Catarhus natus ex particulari Parte vitio.

Ut præfatus exanimemus has Causas, Catarhus, qui ex ipsius Partis, etque privatæ Digestionis læsione oritur, supervenire solet, quando Pars quædam vel à Violentia Externa, vel à quacunque Causa Interna lædatur, ut ita spiritus lofosus seu Archetis debilitatur, ex tali enim occasione, Digestione particulari deficienti, Cathari crebriori recidivantes superveniunt: vid. hic præter HELMONTIUM *Tractat Catarh. Deliramenta*, imprimis PETRUS JOHANNES FABER in *sun Patholog. later Causas* alias ad Lymphæ vitia *diffusantes* imprimis confidenda vitata *Amachi dighe*, dum nempe Venericulis impositis non sufficiens est digenderia & coquenda lofosus (propter Senes imprimis obnoxii sunt Catarhis propter Digestionem primam successivè deficientem), sive quod ejus *Fermentum* sit nimis iers & debilitatum, sive quod ipsa *Assumptio*, imprimis parulenta copiosè nimis assumpta, eas vni infringat, unde locum avertit hic vugurum illud: *Petulae generant fluxum*. Idque tunc imprimis, quando accedit *panes* *thia* *crecto*, aut imminuitur insensibilis Transpiratio, vel senilis sudor: Hinc etiam propter *Frigus Aëris* ambienis, & imminuitur insensibilis Transpiratione, *freque* *in* *thens* *sunt* *Catarhi*, quam alius Anni temporibus. Ventruculus ergo in illo causa colligat potius, quam revera concoquit Assumpta, Chylum facit asquum nimis & vitiosè acidum, ut etiam vitiosè salum, unde sanguis aut ipse asquior & acrior generatur, inde & necessario etiam tan-

dem Lymphæ in quibusvis Glandulis elaborata simul vitia-
tur. Unde & Tabes ex acrimonia sanguinis ordinari aut
pateant aut concomitantur *Raucoedius, Taffer, Corica*,
similesque ex acrimonia Lymphæ orti Affectus; unde Vete-
res erroneè *Tabes istas à Diffinitionibus à Capite orti* vo-
luerunt ob salium dampnatum, Raucoedem, Tullum &
Coryzam ex Capite originem habere, cum revera ea Glandu-
lis particularibus Locorum afficerentur, & Lymphæ acri-
filla sua acrimonia dicta Lymphæ irritante, aut exulcerante &
ad Phlegmæ dispensata, Tabes & dicti Catarrhi derivandi
sint. Sed quoad alia subiecta, in specie *ferbæis* obnoxi
sunt acrilibus & corrosivis Catarrhis vitio stomachi, & inde
ingestionis totius Massæ linguntur & Serii ortis, unde
etiam Lymphæ salivæ sordiosiorum adeo salia, acris &
acida est, ut Gingivarum Fibris erodere, eas flaccidas red-
dere, & hinc omnino exedere solet unde & aliarum Glandu-
larum, tam Conplementarum quam Conglobatarum,
Lymphæ similiter male affectæ necellariò non raro Catarr-
hos ac *Febres* dabit *Catarrhales*, plus minus levas, &
plus minus intensas, quæ originem ducunt à Lymphæ
vitio, quæ Sanguinis infusa naturalem Fermentationem
turbat, & ad præternaturalem Effervescentiam dispo-
nit.

Jam quoad *Differentias Catarrhorum*: Catarrhus omnis ra-
tione modis affligendi potest distingui in *Accidentalem & ha-
bitualem*, Ille est, qui ex Improvifo, & quasi fortuito casu, vel
ex incidentia, Partis supervenit, & ejus spiritum Intus af-
ficte, adeoque facile debilis essit, & ferè Occasione eare-
na propulsiat, vethi gratia Raucoed & Tullus ex nimis diu-
rurn Concoctione; Lymphæ enim, quæ naturaliter Fances iro-
rat, si fit acrior, acida & similis, & acrimonia sua Fances do-
lorent irritat, tunc maxis Lymphæ sequitur Effluus & ma-
ior Catarrhus. Hinc ex tali Causa supervenit Phlegma
Catarrhalis, quatenus ex tali Lymphæ Fances ad Tullum, & ex
hoc Phlogos &c. disponit, donec tandem Phlegma Catarrha-
lis inferatur. *Habitualis* est, qui sepius in eodem Loco graviter
recrudescit seu recidit, & succellivè spiritum Intus gra-
viter labefactat, ac vel levi Occasione data repetit, & nunc ex
vitio Hereditario, nunc Contentorum notabili Dystrafia
supervenit, & ita firmiter in Parte radicatum Causam aut
Occasionem innuit. *Causa hereditaria Catarrhi Recidivantis, seu
habitualis* est partim Loci semel affecti *Infus Tonus*, ex ip-
sius Intus deficientia, unde Fibræ ex levi Tono lasantur,
adeoque ex levi Tono facilius Lymphæ copiosius quocun-
que modo restituitur receptio: quibus accedit & Glandula-
rum laesio Tonus, quæ eandem spongiosioris & tumidiores
facit: facilius Lympham præternaturali modo effundi faci-
tate: partim verò est *remansit Fermentum præternaturale*
in Glandula & Loci plus minus vicinis ea Digestione
privata laesa enatum, quod plus minus commoror & ex-
asperatum, irritatum illas Partes sensiles, Catarrhum in
eodem Loco sepius provocat, & recrudescere facit. Non
secus enim ac simile tale Fermentum in Loco quodam
exulcerato relicto crebrius Lymphæ recidivare facit: ita
simili ratione Fermentum præternaturale acido-acre in
quodam Parte relicto, ob id Topicum dictum, crebrius
Lymphæ recidivare facit. Unde & Velgas per experimentum
elocutus dicit: *Catarrhi ubi simul alius obnoxius, sepius
radice solent*; idque, ut dixi, propter Partis Robur levi-
us aut inæquale, ut HELMONTIUS icidè explicat,
idque aut propter Atoniam ejus, aut propter spiritus In-
fusi aliqualem defectum, indeque Digestionem laesam.

Potè etiam Catarrhus, qui *eam sensibili Materia causam
Excretionis* est conjunctus, sub duplici substantia Lym-
phæ extra Corpus solet fieri Excretio: nunc tenuis aquosa
plus minus actis; nunc crassiuscula, viscidula: Sub priori Schemate
incodens dicitur *Catarrhus Tenuis, Salinus*. Actis: sub
posteriori *Catarrhus Crassus & Crassus*. Hinc *Tempera Parasymp-
tomica Catarrhalis* probè distinguenda sunt, pro quorum ra-
tione Catarrhus nunc Tenuis, nunc Crassus dicitur. Nempe
in principio omnis Catarrhus, quæ talis, solet esse plus
minus Tenuis, seu Crudus, Salinus, Actis, succellivè tam-
dem evadit Crassus, & Coctissimus. Lymphæ nempe, quam-
vis sacra, si fuerit, eadem Tenuem seu Crudum pro Lym-
phæ ratione constituit Catarrhum. Dum verò diuturnior
aut copiosior Lymphæ Irritatione lasatur Pars,
& succellivè nasatur, adeoque superficialior exoritur,
tunc Nutritivum Partis laesè proximè se associat, quæ
Lympham a se tenem spissiorum, antea acrem tempera-
tam, dulcem, & quasi iniquam reddit: id quod fit in
Inveterato & Seno parasymp- atque hoc *Materialem* & *Inter-
sternalem* appellare solent, cujus Excretionis, & Partis Ig-

ne Spontanea restitutione, *Dolentia parasymp-* absolvi-
tur. Tandem *various Qualitatis ipsius Lymphæ effluus*, & Ca-
tarrhus inferentis ob observatur, quod nunc *fit minor*, seu
insipida, dulcis, &c. idque rariùs; interdum, idque fre-
quentius, eadem est *actis*, in specie acida, nunc acidius-
plus minus corrosiva, à qua Acrimonia Partes membrano-
sas Catarrho affectæ laedi & nonnulli excoriat: solent; unde
mos dolet, insigniter rubet, & aliqui Inflammationis,
plus minus tamen, patiuntur, ut v. g. in *Erythra*, *en-
tericis Catarrhis* subinde est manifestum; Imò Partes af-
fectæ perfectè exulcerantur, ut v. g. in Coryza diuturna, aut
in Tussi diuturna obvari solet; unde aut Narium Organæ
aut Oris Emulcerationes Catarrhis aut diuturnioribus, aut
frequentioribus succedunt.

Ab his ergo symptomatibus seu Productis Catarrhi mor-
bosis, nempe à Dolore, Rubore, Inflammatione &c. Diffe-
rentia inter *catarrhus* vulgo appellatum *calidum vel Fie-
gidum* explicanda, qui Catarrhi propriè non sunt tales, sed
ab iidem talia symptomata inducuntur. Nam in Catarrhis
à Lymphæ insipida, seu dulci, sepius infimal præternatu-
raliter crassa, uberius effusa, aut cui mos copiosius Mucus
adjungitur, *catarrhus Frigidus* appellari solet; à Lymphæ
verb acriori & corrosiva Catarrhus è excitatione fuerit, pro-
pter excitatum partium affectum Phlogoson, *catarrhus
calidus* dicitur.

Hæc ipsa, tantummodo omnia, mutatis paucis mutantia,
applicat. etiam possunt ad *catarrhus minus propriè dictum*,
ex Seri cum Sanguine infusione per Arterias, nunc im-
mediatè, nunc mediatis, in Lympham mutari, sed ob Fibrum
aliqualem, quo Irritatione undecunque fitam, Arteriam,
aliquam remota & in Parte plus minus conservatioe-
tam, hincque Partis variam, tam ex læsione plus minus
sensili, quam Seri plus minus insipidi aut acris, paucis
vel copiosius effusi Alterationem & Functionem laesam.
Sic enim ex *Refrigeratione* Partis cuiusdam nobis nota vel ali-
quali Sedationem, nunc in variis Partibus musculis, in
Scapulis, Brachiis, circa Femora & similia, &c. Dolus plus
minus sensilis, Catarrho adscriptus percipitur. Vnde
dicitur Catarrhus, quod non verum est, sed, ut sepius
evenit, quod sub quiete nostræ Membra denudantur, ut
Aëri externo exponuntur, aut nonnulli madida Aëri li-
berrimè committuntur, tunc ex impedita Transpiratione Do-
lor talis solet percipi: Nempe *subitè clausi pori, id quod
insensibiliter alias exhalare deberet, in Lympham non
spulatur, unde intelligitur Muculosum & crassum sub
Themata* ex Parte Irritatione plus supervenit. *Inter-
fusi ferbæis* in Loco quodam, speciatim in Pedibus, illius
Irritatione, & hinc dolorosa Alteratione, hinc *Laxi-
tudo & Laceratio*, præterit *nonnulla*, qui Catarrhi tri-
buntur, oriuntur: Sic perit ex *Detritum Irritatione & do-
lore*, & hinc Fibrarum stridura natus Tumor Mastilæ
doloris, itidem Catarrho tribuitur: ex Sero paulo acriori *Stro-
ram* fortuito irritante natus *dolor in pleuræ Stetha*, Catarr-
hus quoque tribuitur.

Causæ hi catarrhi Nobis agnoscuntur easdem, quousque
dicti Catarrhi: Nam quoad *Materialem*, Serum vel im-
mediatè ex Arteriis cum Sanguine elapsum, vel mediatis
in Lympham plus commutatum; hanc constituit: Quod
enim *Effluens Detritum*, insequenter *Læsi* in
irritatam vel ex *Detritum externa*, præterit *Refrigeratione*
Partis, v. g. post Sudorem, vel ex *Infusi Seri* pro maxis
Lymphæ distribute acrioris, in specie acido-salis, pars
nervosa aut membranosas vellacant; vel *Habitualis in M-
ex vitio Fermento* ob laesam Digestionem privatam, spen-
tus Intus vitio collabefactam, nato, quod data occasione
quavis excitatum, ex Irritatione tanquam Spina infusa
catarrhales Afflus insert. Per Catarrhales tales Detri-
tiones ipse Glandulæ, per quas fit Lymphæ vitium trans-
fuset, non leviter leduntur, quia earum Tonus interum
insigniter lasatur, ipsæque exinde promiores fiunt, ut se-
pius & copiosius Lympham viciatam transmittant. Unde
ea robore Glandularum laesam ad alias Glandulas in-
quali, facilius & sepius ex interna Causa mata Catarrhi
unam eandemque Partem postmodum afficiunt, adeo ut in-
spissius recurrere, & unam eandemque Partem afficere depre-
hendatur.

Tandem pro *varietate Partium afflictarum*, in quibus fit
Lymphæ Effluus & inepta Distributio, etiam Catarrhis
variis specialibus Nominibus insigniri solet: Nam qui per
Nares erumpit, ipsique vicinas partes infestat, dicitur *ry-
za*, qui infestat Oculos, *Lippinus* aut *Erythra*; qui infestat
Laryngem, ipsique annexam Asperam Arteriam, cum-

que nimis humectat, *branchas* seu *raucedo* (D); qui acrimonia sua nimis Membranam eius continuo irritat & pungit, qualis est titillat. *Tussis catarrhalis*, usque plurimum tempore vesperino affligens; qui vero alias partes, generalis *catarrhis* seu *rheumatismus* ... *fluor*, vel *defluxio* nomine venire solet: Si Artus inoleat *Lymphæ vitiosa*, communiter dicitur *catarrhis frigidus*, *catarrhis æstivus*, &c. quo ipso citra sensibilem partis mutationem dolor acerbus eandem excruciat, aut etiam lenius ac motus partis hebetis, aut omnino tollitur, aut etiam sensus quidam formationis percipitur. Quæ symptomata ea tali *Lymphæ arsi* nimis, insipissime nimis acci, originem ducunt.

Denique interdum *conjecta esse solet* cum *catarrhis febri* plus minus acci, *catarrhalis* ob id dicta, de qua *supra* *est*, 15. *adi de Febribus*, non tantum in *catarrhis* epidemice affligentibus, sed etiam in *catarrhis* cæteris, inter usam alteramve personam observabilis; & eandem Febrem nunc leota plus minus, nunc magis vel minus intensa esse lolet, prout magis vel minus vitium *Lymphæ*, præterit glandularum conglobatarum, sanguinis in Vena Arteriali finitralis infusæ, junctum fuerit; unde etiam ipsa *febris effluens* aut major aut minor excitatur, & vesperino tempore, aut nocturno præterit, hæc ipsæ Febres exasperatur & incrementum capiunt, & præcedentibus levissimis horribilibus & doctis refrigerationibus momentaneis, subinde mollescere esse solet. In Senibus propter spiritum infatum omnis deficientem difficillime curantur.

Abolivimus superius Theoriam catarrhorum, dicendo, quod materia sit *Lymphæ*, fones sit glandulæ, causa modo interna stomachi & Mæli Sanguineæ, modo externæ læsiones. Sed si omnia hæc rectè consideremus, manifestum evadit, omnem catarrhi hæc doctrinam traditam non tam *Merito* ipsum, quam *Prædictum morbum* respicere, adeoque à posteriori saltem rem declarare: Si quidem tam *Lymphæ* ista ex glandulis conglomeratis effusa, quam feri plus minus vitiosa & sanguine refluxo separata, aliqualis in parte recentio, nonnulli *Effluvia sunt ex confluxione la-* *sumis* ejusdem morboe in parte illa catarrho oblecti, ita ut & in Theoria seu fons modo primariæ ad læsionem istam & irritationem, ejusque causam, quam sequitur catarrhalis influxus, & in Praxi ad irritationis illius mitigationem & læsionis correctionem, barumque causarum remotionem, respiciendum sit potius, quam ad catarrhi istius effusionem & diffusionem. Illis enim deficientibus nunquam rursus catarrhi; sunt illidem sublati sponte hi ipsi languescunt & evanescent.

DIAGNOSIS.

Symptomata, quæ insequuntur *catarrhis*, & insar signorum Diagnosticonum interire possunt, variant pro particulari catarrhorum varietate.

In genere tamen frequentissimis catarrhis præcedunt *gravis capitis, sensuum & actionum animalium super, artuum lassitudo*; supervenit fœcibus refrigeratio quodam in superbie corporis, in specie de *hærritatio* duri levis, vaga tamen (ut *si Aqua salida præfunderetur*) Quin etiam observatum fuit in talibus, quod imminente catarrho *urinae* spurculosa, circulus faciei, folet emitti, quæ pro signo imminentes catarrhi habetur ab HOFERUS in *Herc. Med. pag. 30.* sicut alias *urina in urinis* apparet, quamquam falso, à BARTHOLO in *Hist. Anatomis* habetur pro signo capitis affecti.

Accedit à graviore catarrho *febris* levis, plus minus subinde, eaque imprimis vesperino ac nocturno tempore, quo exacerbatur, & ad diluculum perdurat, cum qua noctu affligente corpus insigniter incalcet, interdum autem Febre lente nunc *coryza* & lippitudo, *tussis, rãucedo, fluxus copiosus*, ocoe dolores artuum lancinantes, aliaque symptomata pro speciali catarrhorum varietate varia, simul cum febrili incrementum capiunt.

Antecedens causa & ipsæ catarrhi præsentiam facillè perscrutatur, frigus nempe exterius susceptum, refrigeratio corporis post exercitium, tempus autumnale aut hyemale, & similes causæ antecedentes appropriantem catarrhum Medico curioso perscrutatur.

Tandem ipsæ catarrhi *causæ sensibus obnois est*, idque imprimis, dum supervenientibus variis excretis per Nares, Os, Fauces, & similia loca secretis se prodit, vel quando

horum defectu dolor in quodam loco plus minus acerbis, usque plurimum interdum intermitens, vesperi & noctu magis affligens, ægrum cruciat quibus specialia, pro catarrhorum speciali differentia, signa accedunt, de quibus, ubi de *specificis catarrhorum*. Huc pertinent signa tussis, rãucedo.

Ante omnia autem consideretur: *an nemus catarrhus ad sit in Lymphæ tenui & arsi? an verò insipida & crassa qui per excreta se ipsum prodit.* Si enim peccaverit *Lymphæ* tenuis, acris, acida salis, tempore vesperino & nocturno, dum pori corporis magis conuient, magis affligit cum gravibus symptomatibus; itemque purum vel nihil in catarrho tenui solet excreta per emanatoria. Catarrhus verò ex *Lymphæ* crassa aut viscidior, aut cui onirimentum primum in mucum degoerans simul permixtum est, equaliter ferè omni tempore affligere, & varia pro varietate transitus *Lymphæ* ejici solet.

Intensiora porro omnia sunt symptomata in *salute catarrho*, contrà remissiora in eodem *graviditate* dicto: Robor, ardor, tumor, dolor rodens plus minus, imprimis lancinans, cum majori vel minori corporis phlogi, quo & excoctio, aut tandem etiam supervenens exulceratio catarrhum tenuem & corrosivum, alia calidum, seu ex *Lymphæ* acido-salis oriundum launant: si verò talia symptomata deficient, *Lymphæ* est mitis, & simul excreantur mucosa, viscida & crassa, vocatur catarrhus frigidus.

Catarrhi Særbærum conuocantes sunt, & præ cæteris crudeles, & licet correcti videantur in uno loco, superbi tamen somite in Massa Sanguinea, *Lymphæ* & Ventriculo, subinde in alio loco denuo scaturiunt.

In specie, quæ dicta fuor, magis catarrhum ex *Lymphæ* vicio oriundum respiciunt; si verò catarrhus est *ex proprio partis vicio*, ejusque viciata plus minus digestione pervata, hanc insinuat imprimis crebrior ejusdem in eodem loco eodem modo recidiva, levi etiam ea causa excitabilis. Item tales Tempellatæ mutationes perferunt, & aliqua mollescit, quam lo loco catarrhis obnois perferunt, manifestari solet: id quod fit ob partis debilitatem propter spiritum infat aliqualum defectum, qualis pars debilis longè promptius alteratur ab impressionibus externis, quam pars alia robusta illidem magis resiliens.

Cognoscendum est ulterius: *an ex interna sit causa catarrhi?* an verò ab exteriora partis læsione originem malum duxerit? *Externa læsio* facillè patet, & ab ipso ægro observari potest; siue ille versetur in Aere frigido, siue hauriat copiosa frigida, siue hauriat fumes metallicos in laboratorio, siue ex alia sit causa: Hæc enim non latent ægrum, nec postmodum Medicum.

Intus verò Ventriculi cruditas præcedens, & hanc insequens sanguinis & *Lymphæ* vitium ferè ex eo cognoscitur, quod catarrhi sæpius recurrant: idque aut in eodem loco, ubi pars læsa ob vitium totum seu robur iniquale facillè recipit, & receptum promptius erantitit *Lymphæ* vitiatam; aut certè si non in eodem semper recurrunt loco, saltem ex uno remoti catarrhi promptè in vicino, aut loco priori conuocato, denuo se manifestat, & ita subinde repetitur accedens.

Tandem quod *Dignis* *stomachi viciis* Catarrhis ex *Lymphæ* & sanguinis vitio nascitur, potest non tantum ex Urinis, quæ subinde pallidæ ac teneæ conspici solet, sed etiam, quod ægri tales frequenter sint *stomatitæ*; id quod etiam observat HOFERUS in *Herc. Med. pag. 30.* & etiam, quod non raro multum & facillè sudare solet, simulque de vitio stomachi subinde fit querellæ, & quæ sunt similia Signa Antecedentia, quoad Causas: Vid. HELMONTIUS *Tract. Catarrhi. Drivum. & Tract. Tussis & Asthmæ*. Membrane per univærsos corporis consentiunt, hinc ex læsione capitis totum corpus horripilationibus afficitur.

Catarrhi speciales suo loco specialiter cognoscuntur.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: *Catarrhi de causa & læsione externa* provenient adhuc recens minus periculosus est, quam qui *internum* habet somitem, aut in quo propter læsionem à causa externa pars affecta ita est debilitata, ut particulari ejus vicio ererit catarrhis recidivare solet, ac imprimis contumacissimi, facillimè recidivantes & pessimi ferè isti esse solet, qui à scorbuto.

Tom. II.

Kkkk

Dein.

(D) Branchus patit quæ Branchos dicitur hys Catarrhi species, quem Rãucedinem appellant Latini. Eju: nomen origi est fani à *δρυχης*, Fauces, guttur, hoc enim Mæli Fauces prehendit: *juva* trius ubi Scholæ Salerni conscribit: Si fluat ad Pectus dicitur *Rhœma* Catarrhus, Ad Fauces *Branchus*, ad Nares esto *Coryza*.

Deinde Catarrhos *Spilis in eodem loco recidunt* band contemendum malum est, & crebriori recidiva spiritus infusus debilitatur, hinc propter atoniam partis & robur inaequale facile malum habetale contrahere quae; huc enim facile illa pars ad alios Morbos dilabi poterit.

In specie *§ Laryngem* aut asperam affligit Arteriam, ex eodem varii Pectoris Morbi, subinde etiam in Pulmonibus phthisis, ex Lymphæ acri in Catarrhis in Pulmonibus derivata, oriri solent.

Si *crabro Tufis* affligit à causa incerta Agrotum, metus est, ne Mala Pulmonica, ver. gr. Vomica, vel Eacrisio Pulmonum, ac tandem phthisis Pulmonales superveniant.

Uterius quo magis ingravescunt Catarrhi, accedunt *Etatis incrementa*, eo peticulosiores solent affligere.

Catarrhi deslillationes & raudines *periculis magis sunt Senibus*, unde & ab HIPPOCRATE *secl. 3. Aphor. 12. item secl. 2. Aphor. 40.* & FONTANO *lib. 2. cap. 2. Meth. cognoscendi Morbos pag. 43.* inter Morbos Senum relictus, in illos graviores & difficilius curabiles sunt, undeque orti fuerint; partim quod Digestiones quaeque, imprimis prima Digestio in Stomacho, non rite peraguntur; partim vero etiam eorum Glandulæ laxiores almodum dispositæ sicut ad Catarrhorum copiosas Recidivas; partim propter partium solidiorem deficiens Robor ex Langore spiritus infusi; partim propter Seram & Lympham in talibus acriter & ferè acidiorem, ratione quæ acrimonia Regionum quarundam Incolis Catarrhi primis aliis graviores observantur, Tulleque ver. gr. Catarrhas frequentius in Erosione Pulmonum & phthisi degenerant, ut de Belgis SYLVIVS *Pr. L. 1. cap. 49. §. 3. & 4.* annotavit.

Catarrhi, qui ex Lymphæ motu nonnulli impedito, vel alia ratione *Cerebrum inuadunt*, periculosi sunt; & uti Senibus sunt familiares, ita varia & finitima illi inferunt symptomata, nempe Lethargia aut Paralytica aut alios systematis nervosi Morbos. Nam Glandulæ minutæ Cerebri, in specie plexum Choroideum, circa Lympham esse occupatas, & structuræ earum, & locus seu usus sufficienter demonstrat: qui & reliquæ Cerebri Glandulæ, pinealis, pituitaria, &c. simile omnino officium obire videntur. Ab his ergo Lymphæ non rite secreta, tam in quantum in quali, & non rite distributa, sed in Cerebrum deposita, illud inuadunt, & ita periculosa Capitis symptomata inferunt.

Porrò minis periculosus est Catarrhis, qui sicut per Nares, vel patalum Oris; magis suspensus vero qui *asperam arteriam* aut *Laryngem* inuadit.

In Catarrhi cum *subtili materia atretione* conjunctis, quod etiam in illi materia coacta relictur, eo tutiores sunt, quia periculum est, ne ex graviori læsione partis, gravior malum ipsi imminet. Quod tamen, eo periculosiores, quia metus habet, ne subfinitis acrimonia sua partes corrodat, aut etiam exulceret, hinc prava inferat symptomata.

C U R A.

His ita præmissis pergo ad *Curam* Catarrhorum, in qua semper tria *causæ* primariae sunt consideranda: nempe

1. *Causa Efficiens* temota.
2. *Ipsa materia catarrhalis*, seu Lymphæ effusæ conditio; Et
3. *Locus catarrhalis* seu Pars afflcta, & major vel minor ipsi indulta *Isola*.

Quod I. Ratione *causæ efficientis* plus minus irritantis considerandum: an sit Catarrhis à causa externa? an à causa interna? & hæc, an sit Lymphæ vitium? an vero topicum partis afflctæ vitium?

Quod II. Materiam scilicet *catarrhalem*, observandum: an ea plus vel minus acris, aut mæis, insipida, tenuior aut crassior extiterit?

III. Ratione *partis afflctæ* consideretur præservatio, ne recidant Catarrhi, in specie roborandæ eadem, & à recidiva præservandæ.

Catarrhus, qui à *causa externa*, & læsione in specie *Acris*, curatur, & percipitur in suo principio, sensum irritationis tollendo, & ita Lymphæ affluxum præservando. Ob id in principio commode *apiari*, cum *salinis volatilibus oleis*, imprimis Succiniatis, mista usurpentur, expectando si heri potest, sudorem. Influantur etiam suffus capitis & Oris, aut Verticis insinuationes cum Oleis destillatis aromaticis. Nam Opium somnum tollit, & hinc humorum motum sustinuat; Salia volatilia vitia Lymphæ corrigunt, & per Diaphoresin poros aperiant, vitium partis topicum quasi abluunt; Externa ab ulteriori nota præservant. Si

verò jam incrementum sumpsit affectus, Opista minus tentant, nisi Universalia præmilla fuerint. Usurpentur ergo Salia volatilia oleosa, & ob id indicatio aut præsentia materæ peccantia adest, & evacuetur, speciem in Tufis & Stertore, per Os, quo ita, tunc Opista vel sola, vel Appropriata mista, denuo usurari possunt. Si vero Catarrhis oriatur ex vitio Lymphæ peccantis, ipsique vitiosæ constitutionis, hæc ipsa vitiosa acris, salia & acida, partes nervas vellicant & rotas *Armatas* & *Insatibiles*, in specie salibus volatilibus oleosis temperatis corrigenda, & *nunc per Urinam*, nunc, idque optimè per sudores eliminando. Eadem verò Lymphæ crassa vel nutrimento partis in miscelatione degenerato impregnata, attenuanda, incutenda & resolvenda; ipsi tamen obvertetur, modo parafacta sit restituta, sponte hæc rejiciat. *Fomes* verò etiam, imprimis Digestiois primæ vitia, & hæc reliques totius Mæis Sanguinem corruptelæ, in specie ab acrimonia salia emendanda: hinc Juniperina, Salisfata ac Myrrinata, ferè primum ducent eum exercitio moderato, idque imprimis extra Paroxysmum. In Paroxysmo verò salia volatilia oleosa, Opistia mista, propinentur. Nimirum, uti rectè monet SCHNEIDERUS, materæ, causæ, & loci ratio localis in cura Catarrhorum habenda.

Quid si Catarrhales affectus crebrius recidivantes oriuntur ex *vitio partis* & Glandularum, aut obstruendarum, aut alio modo læsarum, propter digestionis privatae lesiones, & propter reliquias quasi fermentativas in parte afflctæ, hæc ipsa ex parte removeantur, & hinc parsimur. Tunc Catarrhos curant imprimis *Sudores*, partium Solum eluentia & abstergentia, item *Spasmodica*, loco afflcto non huic vicino applicata; aut si heri potest, leni iussu paratum facta per abfcessum contumax vitium removendo: ut *Tumor catarrhalis Mala*, crebrius recurrentem vitio demit, et privata digestione læsa erigat, hanc evulsionem radicia curatur; in minimis, iussus Fastidiosi talis Catarrhus palliative curandus: sic v. g. *Tumores* supra prædicti recurrenti catarrhalis vitio, qui vix radicius curantur, nisi salia aliquando *saturantur* perflata, & inde nati abfcessus leptima mundificatione, & ita vitii particularia correctio: hoc enim modo, quicquid heterogenei fermentativi partem obfcedit, removeatur.

Pro his locis rite obtinendis *obfervandum* est: I. *Remedia*, quæ hic conveniunt, in genere videndum se *evacuaria*, quæ primum locum obtinent. Antecedendum igitur est: an, & quando, & quibus in casibus, conveniant? Per Alium quidem talia minus in Catarrhis commoda, quin potius feliciore & promptiore successu per Urinam, & hinc per *Sudores* evacuando, Lymphæ augmentum tollatur: Unde *Diuretica*, & imprimis *Sudorifica* ex salinis volatilibus ver. gr. Succini, Cornu Cervi, & imprimis salia volatilia aromatica ex Succino, Myrrha, &c. ac hinc ex *Ligno Sudorifico*, in specie ex Ligno Salisfatis, erunt optima: In Catarrhis enim si sicut moveatur, iporum inditus definit. Ubi tamen Catarrhus fuerit contumax, & magis universaliter plures partes Corporis affligatur, sit idem ex *flemachi* vino graviore dependat, vel etiam Copeus impurum ostendat, subinde necesse est ad *Purgantia* progredi: Imò interdum in recidivante & contumaciore mæis, ex vitio stomachi & Lymphæ orto, etiam ad *Purgantia* progendum suadet PROSPER MARTIANUS *lib. 2. Ant. 1. 102.* & RIVIERUS *in sua Praxis*, id quod confirmat per Experimentum in *Cantur. 2. Offensu*, quo ibi enim refert Catarrhum in Pulmones cum alpera Tufis defluere, cum insequenti gravi dolore Capitis, qui tandem curatus fuit per Vomitus, per Masticationem Foliorum Tabaci præcuratum.

II. In Catarrhis Chronicis & sæpius recurrentibus v. g. In Senibus, aut similibus afflctibus Catarrhalibus Scorbuto recurrentibus, imprimis quando ex Seri vitio accidat, ac partes nervas magis affligerit, semper ante *Novitiam*, interdum & ante *Pileolam*, vel *Evacuaria blanda appropriata*, vel à Catarrhalis præservantia, usurpanda sunt; cum affectus à Lymphæ oriatur, & partes nervas affligentis subinde Lunæ motibus assuetare soleant. Inter hæc remedia eminent *Faciliata*, Myrrinata, Sperma ceti, *Juniperina*, & similia temperata Oleis quasi *Salinis*, Lympham leniter corrigentia, & partes læsas roborantia.

III. In Catarrhis *calidis* dilis, aut à Lymphæ acrimonia vitiosa, præsertim salia, vel acris, teoni, &c. à causa externa, Opista optimè proinde præservant, & in principio Morbi curant; ac hinc Veteribus in tali causa, nempe in Catarrho, ut vocant, Tenui, *Pileola de Crigolisa* fuerunt in usu, quas dixerunt inspissare Catarrhum tenuem, edulcorare

corare catarrhom Acrem, ac refrigerare catarrhum Calidum. Quorum Ingredientia cum nimis sint eruda, minùque præparata Narcoticis composita, v. g. Opio, Hyoscyamo erudo, & similibus; ob id in delusendum ferè abierunt, ut in Belgio adhuc usurpatur. Eorum autem loco ferè Opiatis ritè paratis, ut Laudano Opiato & Hyssico, utimur, quibus Opiois catarrhus, admodum imprimis, attimè à teritur & curatur.

Sola tamen Opia vix usurpanda, sed, uti iam monui, coniuncto & Appropriato catarrhalibus Aromaticis semper mixta, nempe succino, sulphureis, Cephalicis, & similibus, ut simul vicia Lymphæ corrigantur, & præsertim Diaphoreticis audior ab eorum usu expellitur. Decantat admodum horum Opiatorum usum HELMONTIUS in *Affect. catarrhalibus Tract. catarrh. Delirium. Tussis & Asthma, Cough errant, & Jux. Duumvirat.* §. 62. 64. 65. & inter alia salicem prædicat Agnum, cuius auxilium Medicus sciat lethalia à Papaveri seipare, remoto auxilio existente potestatis in Duumviratu. Salutarior præterea quoque horum usus confirmat Experientia, cum ipsæ ex Modernorum consuetudine frequenter usus fuerit RIVERIUS, qui *sent. 3. observat.* 55. observat catarrhum conuulsam cum Raudine curatum per tria grana Laudani Opisti assumpsit, item in eadem *sent. 3. observat.* 69. refert catarrhum diuturnum cum Tussi per duplimum usum gr. iiii. Laudani Opisti curatum: & eadem *sent. observat.* 74. catarrhum lericum cum variis Febrim complicatibus, præsertim per Laudanum Opiatum curatum, observat. Assumantur ita Opia, cumprimis tempore vesperis sub læroito lecti, uti aliis est consuetum, vel aliquot horis ante introitum lecti, ut etiam paulo antè, quando moveri solet catarrhus; vel duabus horis ante cenam, quod melius est, cum cena parca & moderata. *Observandum tamen, ne abutimur his ipsi suspendendo nempe & inhibendo catarrhalem motum, ita semper in Calibus, quando catarrhali Influxione alius Marbus solvitur, vel quando Epidemius fuerit Affectus catarrhalis, vel quando ad incrementum iam pervenerit Mæum, in talibus Calibus non Ratic suspendenda Matera catarrhi: Plus enim documentis alias colligit, nisi *Diversitibus, Sadoris, Diuturnis & similibus* mella fuerint Opia.*

IV. *Chirurgia* in catarrhorum Cura ferè tacet, nisi in iis Corporibus interdum locum habeat, ubi catarrhi à posteriori jam removendi, Causæ nempe ferè sunt incorrigibiles, aut ubi sunt admodum contumaces, aut ubi sunt sæpius Recidivantes, aut ubi sunt similes Affectus vitiæ Lymphæ exorti admodum contumaces. Tunc enim à posteriori, non à priori, radicem catarrhi & Causam Efficientem non tollendo, sed Productum morbum saltem removendo, deceptivum & palliativum *Ponticalium* Remedium interdum est adhibendum, item *Vesicatoria*. Ista enim voluntaria Ulcera palliativè & à posteriori his tantum Affectibus Catarrhalibus moderatur, Aquam nempe exauriunt, non autem Fontem ipsum, ne nimium Seri aut Lymphæ catarrhalis inundatio Partem debilitet, aut Tonum eius nimium destruat. Productum morbum eliminare, Causas verò ipsas radicales relinquunt. Ubi tamen à priori, vel Partis viciæ topice, vel vitiæ Lymphæ, ex læta Digestione prima dependente, catarrhum contumacem & crebriori Recidivæ semper Medicus Medicamentis occurrere nequit, per Fonticulum à posteriori ferocem eius omnimodum mitigare intendat, subtrahendo scilicet huius melle Latitem plūs minus corruptum, & Crocum in parva quidem, sed continua quantitate, quem cum vitulo Laticæ, necnon uti alimenterio Succo, in Pns corruptum emogit, & ita imminuenda Materiam catarrhalem, imprimis vitiis ejusdem Partis sub Digestione lætæ eunt, horum Insultus minores reddit. Per se enim totus Fonticulus ad eadem valet, ad que Vesicatoria, & horumque Auxilia in Crueri & Latens seu Seri minuta quidem, sed continua, exsufflione consistunt, adeoque à posteriori & palliativè tantum illis propriè conferunt Affectibus, qui oriuntur à Scorbuto, qui à sordibus quibusdam viciæ primæ Digestionis, aut vitiæ lætæ in Sanguine Fermentationis, aut vitiæ specialis ejusdem Partis sub Digestione propria deficientia, evadunt, ita ut labes illa à priori propter Subiecti ineptitudinem radicitus, v. g. vel ob Senium, vel in Mulieribus propter Menstruum naturalem defectum, aut propter Characterem hereditarium, sit incorrigibilis. In talibus ergo Causis conveniunt Ponticali in Nucha & Brachio, ut nūa cum sanguine & Nutrimento laudabili vel Sero, evacuentur simul id, quod est nocivum, & etiam, quia excrementum omne per se Naturæ hostile ab

Œconomia vitali est prescriptum, propterea istud facili; imò facilius quam utiles Succo, separatur, & ita per Fonticulum excernitur. Sicut interdum fit ut ipsa Natura hinc inde in quibusdam Subiectis Cachocymicis spontanea facie in Partibus *Uteræ*, quæ clausi per Attem varios Morbos nec leviter incommoda inferunt; deonò verò aperta ab aliis Malis liberet, & Corpori sanitatem restituit: Vid. egregia huius rei Exempla in SCULIETI in *observat.* 55. & 57. Et fane id, quod SCULIETUS hic observavit in Uliceribus spontaneis, interdum etiam in Fonticulis intempèstivè occlusis observatum fuit. Præterea pertinent hæc *Vesicatoria*, quando v. g. in Affectibus catarrhalibus, in specie Oculorum, in Nucha incitantur Vesiculae: ubi notum est, quod hic Affectus in Oculo à priori non curetur, cum non moveatur illud quod irritat Oculum. Jam verò em hoc à priori fieri nequit, hinc ut saltem nimius Lymphæ affluxus, inhibeatur, saltem applicare Vesicatoria in Nucha ac prope Aures, adeoque à posteriori mitigantur symptomata; ac in specie conveniunt Fonticuli & Vesicatoria, quando aruit catarrhus vitiæ Partis topice & Fermenti peregrini. Hæcenus dicta declarabimus Exemplo: Notum est, qui patitur cariem Dentium & crebriorem Odontalgiam facili recidivantem, quod simul putiorum sepius Tumorem Malæ, tuncque dicunt: *Est catarrhus*: quod suo sensu verum est: Jam quicquid admoveatur, five sit Disiccantia, Resolventia, Vesicatoria, &c. à posteriori saltem & palliativè medetur: Radicalem enim Causa consistit in Evulsione Dentis, quia Partis ad vitiis topicum, quo evulsio omnia symptomata cessant. Quod si mrgo Dens evellatur, à priori curatur; Sin verò hoc nequam possit in Oculo, palliativè saltem, & à Posteriori Fonticulus & Vesicatoria Aëro succurrendum est.

V. Quod *Vinoflavum*, negotium hoc per se locum non invenit: Sin verò *Sabbatum* sit *Plasticum*, aut coacta sanguinis Evacuatio suffragia, &c. quibus & aliis similibus Occasionibus incenderetur Affectus Catarrhalis, consultum est, Venam secare observando *Arteriosam & Arteriam* regnari. Quin etiam, emd conterritum nimis fit Decubitus catarrhalis in quadam nobiliorum Partem, ad impetum illum rursusendum Venæsectione in loco opposito, secundum Revulsionem & Aversionem influens, iubinde solet in Praxi admodum esse proficua: vid. HERCULES SAXONIA *Præfati. Præf. P. 1. pag. 58. & 60.* & JULIUS CÆSAR CLAUDIUS de *catarrhis*. Si Tumor Capitis ex Odontalgia, appositus in Brachio fecatur Vena: Per se autem & primario non convenit, sed tantum pro Scopis Ventilatoria.

1. Jam perga ad *Remedia Interna*: Inter quæ (1.) primatum obtinent Opia, Causæ Efficientes aditamentum omnimodum tollentia: hinc (2.) Remedia vel *Sadorisera*, in specie Aromatica & hinc Valutia, quæ Partes elvant, earundem Formæ mediante Sero commodò ablegant, ac ipsum Sero simul corrigit ac minuit; tandemque (3.) *Aromatica* vel *Salutaria* quo tam fortiter ipsam Lymphæ vitiolam in stomacho corrigit & emendant, quam Partes solidas lætæ denud restituant & roborant, sunt utilissima in paroxysmis catarrhalibus. Hæc ipsa enim Indicationibus suprà factis maximam partem satisfaciunt.

Observata ergo legitima Medendi Methodo, Remedia simplicia in Affectibus catarrhalibus usitiora, magis appropriata, & imprimis catarrhis à Causa Interna enatis succurrentia, sunt *Scillitum*, quod est singulare catarrhalè, quodque ut dicit LINDANUS simul corrigit stomachum & ita Antecedentes Causas remotet; porro *Saturis*, *Thymus*, *Majorana*, *Menha*, *Rosæ*, *Hyssopus*, *Betonica*, *Salvia*, præsertim *Romarinus*, horum Flores, & omnia ex eodem præparata Remedia, Flores Lavendulæ, Lilium convallium, Lignum Salsifera, & omnia Salsifera, Guaiacum, Lignum Lenticulium, Lignum Juniperinum, & similia Ligna, quæ communia Decoda Sadorisera ingrediuntur: Quia & *Euphorbia*, & omnia Juliperina, & ea eorum Baccis parata Rob, Decoctum Ligni, *Malvacium Juniperinum* &c. Macis, Acorus venis & adulterius, Zedoaria, Cinnamonum, &c. & similia utilissimè usurpantur: quibus faciemus, quod insit omniū est, in Affectibus catarrhalibus, Succinum catarrhale, & quilibet *succinarius Myrrha* quodque, Extractum Myrrhæ, quæ egregia sunt: Tandem *salphur*, & omnia Sulphurea temperata, *Cinnabaris* tam nativa, quam antimonialis: *Salsisulphur*, tam simplicia quàm alia, *Cypota*, &c. prostant: & denique omnia ex & cum eo parata Remedia aliis addenda sunt. Quoad *Salsifera Lignum*, imprimis egregium præ omnibus est ad catarrhos Remedium, adeo, ut etiam propterea à BRUNNRO de

fais Confil. proprium Catarrhorum vocetur Alezpharmacum; sal enim aromaticum habet nobile, odorem & saporem fructuatum, ideo vocatur & Lignum Fomiculare. Corrigit optimè Sori & Lymphæ vitia, tam acidum quam salium, proptereaque cum simul per Urinam & sudores evacuat, abstergit vitia Partium topica, & ouas eis indulas eludit, simulque Digestioni primæ succurit; nobile enim est stomachicum. Unde commune Decoctum Ligni Sassafras & Ellicenti Ligni Sassafras, vel Tinctura Sassafras *Mynsichtii*, egregium est Remedium ad distendens & curandos Catarrhos, coctibus usurpatis, expectato blando sudore: vid. MYNSICHTIUS in *Armen.* quoad Tincturam Ligni Sassafras pag. 31. Pertinet hoc etiam *Essentia Catarthali* D. Michaelis, quæ paratur ex Ligno Sassafras cum spiritum Serpilli; liquorem Serpillum & ipsum decantatum simplex est contra Catarrhales Affectus, unde etiam Aquam tuam *Benedictam Serpilli* tantopere commendat MYNSICHTIUS in *Armenia* quæ nobis Pimpriatū ejus est; nempe

℞. Summ. Serpill. sanctæ. rui. qu. pl.

Hicque collectis ante ortum Solis dum nocturno rose adhuc madent, affundatur

Vini Malvæ. l. ut tres vel quatuor prætergr. diglitos emineat. Digerantur per dies & noctes quatuordecim in Balneo Mariæ vel Arena, hinc destillentur per Balneum moderato igne Aqua saltem spiritus, quæ deinde affundatur *summis Serpilli Summitatibus eodem modo collectis*, ac deinde dicto modo digerantur ac destillentur, quæ aliquoties ab alio Serpilli cohobatur, idque, quæ bis terpius, eo Aqua fit efficacior, & magis spiritus evadit. Tandem hæc ipsa Aqua seu spiritus Serpilli affunditur *Rosæ Ligni Sassafras*, & deinde digerantur, donec egregie impregnatur a Sassafras, & egregie rubescat; hæc ad ulum servatur.

Dosis bajus Tincturæ, prout magis vel minus spiritus fuerit Aqua Serpilli, ad gutt. l. vel lx. aut si debilis fuerit Menstruum, cochl. j. potest propinari, idque mane, meridie & vespere, vel etiam urgente necessitate quocunque tempore.

Pertinet hæc Aqua *ita contra Catarrhos descripta* ab HOFFMANNO in *Classe in annex. Thef.* pag. 6. Cujus Aquæ, necnon Benedictæ, dosis cochl. i. ad ii. nunc mane, nunc meridie, nunc vespere, vel quocunque alio tempore, propinari potest, elique egregium Præservativum & Curativum in Catarrhis, quæ Lymphæ vitia quæcunque corrigat & emendat; ut tacam vim ejus præservativam ab Apoplexia in Senibus, & Curativam in Vertigine.

In *Catarrhis Scorbaticis* miscenda sunt Remedia Sassafrata cum Summitatibus Pini recentibus, ut una decoquantur. In tali casu commodè miscetur hæc Tinctura Ligni Sassafras cum Remedio ex Abate alba, Essentia Pini balsamica, & erit egregium Remedium contra Catarrhum Scorbaticum, imprimis si simul imminet Paralysis Notha seu Scorbaticæ; aut Decoctum utriusque simpliciter fructuosè usurpatur. Essentia Pini cum spiritu proprio paratur, quæ in Affectibus Catarrhaliis a Lymphæ scorbaticæ urindis instat omnium est, speciatim si eum Catarrho Scorbatico Paralysis Scorbatica vel Notha velit imminere, vel companda sit. Scroboli enim tenelli Pineastris, Germanicè *von Hoffmann*, sunt singularissimum in Catarrhis Scorbaticis. Colligantur Coni seu Scroboli dicti Pini, vel Abietis juniores in fine Martii, & initio Aprilis, & coqui in Aqua simpli seu Cerevisia: Pulmodum 3iii. vel iv. bibende ante passum. Juxta Remedia ex Ligno Sassafras subinde & aliorum Lignorum Decocta fructuosè usurpantur possunt, uti videri potest in *offic. LOTICHI* lib. 2. cap. 3. *offic. 2. & lib. 3. cap. 1. offic. 1. & 6. scut & admodum fructuosus Decoctum Lignorum utis in Affectibus Catarrhaliis in POTERIO* Gen. 2. *off. 11. & Pharm. 199. lib. 1. pag. 331. & pag. 455. item GABELCHOVERO in offic.* qui etiam singulis Catarrhis Decoctum Radicis China contra Catarrhos fructuosè præstabit. Alii non sine ratione commendat Decoctum Ligni *Lansietii*, ex quo destillat *Melchic*: cum igitur *Melchic* sit nobile contra Catarrhos, nullum dubium est, quin Ligni *Leucisii* Decoctum æquè sit egregium atque Lignum Sassafras ad curandos Catarrhos: Cui tamen Ligno, ceo raro, potius Decoctum Ligni *Juagris* potest substitui. Pertinet hæc Decoctum *Sarapilla* & Ligoorum, quod vid. in *Colleg. Formular.* necnon Decoctum Lignorum Diaphoreticum Antiscorbaticum, de quibus in *Colleg. Pharmacop.* in Schræderi *Pharm. Part. 2.* item

℞. Rosæ. Ligni Sassafras. 3i.

℞. Quercin.

Lansietii. an. 3vi.

℞. Rosæ. M. l.

Antimonii in pos. ligr. 8℔.

Coqui in Aqua pluv. Mens. iv. in Balneo Mariæ ad Conspmt. 8℔.

Colatura D. S.

Potin singularis contra Catarrhos.

Pertinet quoque Decoctum Catarrhale MYNSICHTII in *Armen.* pag. 376. quod ex similibus paratur. Alias non minus, quam Lignum Sassafras, *Cortex Tamarisii* ad Curam Catarrhorum laudari solet; sic.

℞. Cort. Tamarisii. 3vi.

coqui in

Aqua simpli. Mens. vi.

ad remanentiam dimidie partis.

Hoc enim Decoctum vel salum usurpatum simpliciter est contra Lymphæ quæcunque abundantiam, indeque Affectus Catarrhales quocunque optatum Remedium.

Faciunt etiam hoc *Vino Medicæ* ex Infusione aut Decoctione illarum simplicium Vegetabilium parata contra Catarrhos, in specie ex Rosæ Ligni Sassafras, additis etiam Aromaticis, vult. gr. Juniperi & Rosæmaris quas SENNERTUS *Pr. lib. 1. pag. 712* habet: quæ inter est decoctum illud PARACELSI, quod pro tali agnoscit Radicem Caryophyllatæ & Acori adulterari:

℞. Rad. Caryophylli.

Acori adulteri. an. 8℔.

Summ. Majoran.

℞. Rosæ. an. M. lili.

℞. Rosæ. M. ii.

Infund. in Vini mens. aliquot;

Stent ita per odium.

De hoc Vino unus mane jejunio stomacho, & vespere interitum ledi, capiat haustus.

Vid. HARTMANNUS *Praxi Chymiatr. cap. 22. De PARACELSO in Consilio*, ubi prolat Vinum & Eluctarium, Radicem Acori aquatici & Caryophyllatæ singulariter commendat ad corroborandum Caput, & ad prævendum à quibuscunque Deformationibus Catarrhaliis: vel etiam POTERIUS *Gen. 3. cap. 61. Sic v. g. Sequens Vinum Medicatum admodum laudat LINDANUS in Cura catarrhorum, & ad Affectus catarrhales chronicos, succum Lymphæ & Uonachi vitiis gentios:*

℞. Ligni Guayac.

Cort. Tamarisii. an. 3iili.

Ligni Rosæ,

sassafras. an. 3iili.

Mor. Abietis. vulg. M. l.

Sculpent.

Lupul. vel Lupator.

Mentha.

Hyssopi. an. M. 8.

Rad. Emul.

Cort. maj.

Zedair.

Galaug.

Cinnam. an. 3i.

Vini Mens. iv.

Stent in Infuso, & de hoc Infuso semper sumatur bonus haustus hora una vel altera ante passum in casu, quando vitia catarrhi oriuntur ex vitio Lymphæ, aut ex vitio Digestionis primæ & massæ Sanguinis fuerint orta.

Rosmarinis nobile est simpliciter in catarrhis curandis, unde egregium est sequens Decoctum Catarrhale modò laudat LINDANI:

℞. Rosæ Ligni sassafras. 3i.

Rad. caryophylli. 3i.

Mor. Rosæ an. rui. M. l.

Vini generis Mens. ii.

Coqui leui igne Vale bene clauso in Balneo Mariæ horæ 6. vel 7. hinc remaneantur ab igne, ut refrigerant, & Colatura amara usurpatur eodem modo vel inter cibandum, vel in lecto calide, expectando blandum Sudorem.

Vinum est vili compositionis, sed egregiarum virtutum, & expertum in chronicis Catarrhaliis Affectibus. Decoctum fat secundum modum ZWELFFERI: Vid. etiam HARTMANNI *Praxi de Decoctis. Caryophyllata Radix*, dicit LINDANUS, admirabilis est in emendando sanguine & corroborando Potestate: unde *hic expressissimum esse hoc Vinum & magnarum virtutum in curandis catarrhis, cum & Potestate succavat, & sanguinem emendat, & in specie Lymphæ vitia egregie corrigit.*

Huc

anif. vel *Rosini* ʒiij. vel ʒʒ. *Rosin.* Opi
tarterij ʒi.

M. S.

Effluvia Catarrhalia.

Dosis, gutt. 40. ʒo. 60. expectando sudorem; vel miscantur in formam Potionis cum Aquis destillatis, & syrups appropriatis.

Item convenit Spiritus Salino-volatilis oleosus cum effluvia Opi: vid. *Differt. de Precipitant. usu & abusu*

ʒi. Aque Serpill.

Rosinmar.

Fanicali an. ʒi.

ʒʒ. Lign. Sassafr. ʒiij.

Sal. vol. Succini ʒi.

Syrupi de Hyssop. ʒʒ.

M. S.

Potio Catarrhalis pro aliquot vicibus.

Vel

ʒi. Aque Menth.

Myrrin. ʒi.

Cinnamon. ʒʒ.

Spiritus Cereæ Cervi effent. ʒʒ.

Salis volat. Succini gr. xv.

Syrup. de Hyssop. ʒi.

M. D. S.

Potio Sudorifica pro aliquot vicibus.

Vel

ʒi. Flor. Sulphuris ʒi.

Rosinmar.

Succini prep. an. ʒʒ.

Myrrin. ʒi.

Tragac. an. ʒi.

Extr. Cruci ʒʒ.

Laud. Opiani gr. iij.

Cum Sacch. ʒʒ. in Aq. Fanicali sct. i. Rotulae adpetegendae cum Oleo destill. anif. vel Succini.

D. S.

Potio in tussi Catarrhalia.

Vel

ʒi. Spec. Dia-Trag. ʒiij.

Onon. Arab. ʒi.

Laud. Op. gr. v.

Cum f. q. Sacch. in Emulf. Papav. albi sctus. i. Rotulae.

D. S. ut ante.

Monitum fuit superius, interdum opus esse pergere ad Purgantia, quae tamen semper miscenda sunt cum Appropriatis Catarrhalibus: unde *Messa Pilularum de Succino Cracov.* ferè primatum obtinet, uti hinc ita aromatice, & commode sensibus Catarrhalibus & debilibus prescribi possunt i. ver. gr.

ʒi. Mafes Pilulae de Succino Crac. ʒʒ. gr. xv. ad ʒi.
Extrac. Albi. vel. Crac. bene. gr. v. v. ad ʒʒ.

Rosin Jalapp. gr. ii. lil. vel. iv. ad v.

Stamm. sulphur. gr. i.

Cum Oleo destillat. succini f. Pilulae.

D. S.

Pilulae Catarrhalis pro una vice.

Blandè evacuant Lympham peccantem.

Vel

ʒi. Mafes Pilulae de Succino Crac. ʒʒ.

Stamm. sulphur. gr. iij.

Extrac. Trach. Alb. gr. iij.

Cum *Rosin* succini f. Pilulae:

S. ut ante.

Vel

ʒi. Mafes Pilulae de Succino Crac. gr. xvi. ad ʒi.

Extr. Agar. gr. viij.

Trach. Alb.

Stamm. sulphur. an. gr. ii.

Cum *Rosin* Ligni Sassafr. vel succini f. Pilulae aspergendae cum succino prep.

S. ut ante.

Vel

ʒi. Mafes Pilulae de Succino Crac. gr. xv.

Extr. Albi. ʒʒ. ad ʒi.

Trach. Alb. gr. i.

Cum Oleo succini, vel *Rosin* sassafr. f. pilulae.

R. S.

Pilulae Catarrhalis.

Et quidem in Catarrho à Lymphâ tenui, acvi, salia, resina Jalappa, in Catarrho verbò dicto Crasso, loco Jalappae gressallum Trachicheburum Albandi gr. ii. magis conveniunt.

In affectibus Scaturum etiam valent, immixta dosi Simuli. Alias etiam Jalappa ordinariè prescribitur; sive Solitaria dosi ʒi. addendo aliquod de Nivem, vel Arcano dupl. sic enim melius operatur; sive cum Mercurio dulci mixta propinetur. At si tenacior mucus se junerit, Colocyathidis locum invenit. RIVERO de usu est in graviore male instituta purgatione ex Mercurio dulci, addito scammonio insipsumato, vel Jalappa; ita ut purgandos catarrholos recipiat. Mercurio dulci ʒi. cum Radici Jalappae gr. viij. vel ʒʒ. uti videre potestis com. 3. Obf. 28. 31. 41. 45. ubi utitur hoc pulvere pro purgante Catarrhalis, idque imprimis, ut dixi, in Catarrho Tenui. In Catarrho vero spisso, seu ubi adest Mucilago crassa, colocyathidis convenit. Sive extracum ex Throchiscis, sive alio modo correctis. Correctio optima, quod obiter moneo, pro terram Foliosum Tartari, vel Sal Tartari. Porro Magisterium Gummi de Peru, seu resina Gummi guttae à gr. vii. ad ʒʒ. specificum dicitur purgans catarrholorum.

Aliis in usu est pro purgandis catarrholis usurpare helleborum nigrum, imprimis mensè octobris collectum cujusque Decoctum & Infusum; siquidem THONERO & FENOTTO de Medicam. Anthorbis, periculis catarrholorum cura consistit in helleboro nigro. Unde etiam POTERIUS in solo Observat. Decocto Melanogoga, seu remedia Melancholiam purgantia, una cum Ligno sassafras, & rectè, usurpare solet. Et credo, quod in Affectibus catarrhalibus penitus extirpandis multum valent helleborum, modo Virulentia laetitia corrigatur. Pulvis Aloëphragmæ, aliquot similes usuales, si radis mali fuerit in thimo & prunis vili, usurpari possunt, &c. sensibulum catarrholis Vina Medicata Laxativa prescribi possunt; et. gr.

ʒi. Bacc. Junip. ros. ʒi.

Calam. arom. ros.

Pol. seu. flos ʒʒ. an. ʒʒ.

Rad. helleb. nigr. crudi. ʒi.

Cinnamon.

Galang. an. ʒi.

Kingi ʒi. ad ʒʒ.

Crem. Tartari ʒi.

Vini Rhodani ʒi.

Stetit in loco calido per tres dies & noctes, at distillantur cremor Tartari, hinc coeque aliquot per Mennican Hipp.

adde

Sacch. unc. iij.

S.

Potio ad catarrhum Laxans.

Hæc de Internis.

Quod attinet Medicamentum Externum in catarrholis Affectibus usurpanda; applicanda sunt vel ipsis peribis affectis, vel Locis glandulosis catarrhos fuscantibus vicinis, partim novam inducunt tollendo, partim præcavendo. Haec ipse Glandula; quoniam nempe in capite aut circa caput patetque ipsi vicinis sunt confite aut locata, hinc in Affectibus capitis catarrhalibus Remedia imprimis Vertici, & hinc temporibus admoventur sub forma Lixuræ & Emplastrorum; in Affectibus verbò Faucium & Alperæ Aræmæ suffusum solum, ut melius penetrent, conveniunt. Infuso hi constare possunt ex Resinosis, v. g. ex succino, quod primatum obtinet, Sandaracha, Benzoe, Olibano, Malliche & Gummi Animæ &c. carbonibus injectis: expunctus sumus excipitur capite mediantibus Linctaminibus probè humefandi suffitu impregnatiss: e. g. secundum DECKERS in Praxi Barbette lib. 1. cap. 4.

ʒi. Succini dr. i.

Mafick ʒi.

M. f. Pulvis grossus.

Quo multos catarrholos restitutos perhibet. Vel

ʒi. Sandarach. vel Ononim animæ, vel Ladani ʒʒ.

Succini dr. ii.

Thuris.

Mefum an. dr. i.

Benzoe dr. ʒ.

Raf. Ligni Rhod. dr. i.

Misc. & contendantur grossi modo.

D. S.

Pulvis ad suffitum contra catarrhos.

Inter Externa illud primatum obtinet Oleum destillatum Succini, Bregmat, Vertici, locique vicinis illitum. Mirum est, quantum faciat ad præservandum & curandum catarrhum, imprimis si adfit nimis gravitas capitis, aut Lethargus, aut Torpor sensuum. Huic, ubi acutus & fortis visum fuerit, substatuatur Balsamum Peruvianum, qui

mgj

magis temperata, vel cum simpliciter illinendo, vel in Vitello Ovi peris dissolutum, & cum spiritu Juniperi mistum, parti laevi subinde affricando: Vid. TIMÆUS 308 Goldenle: c. 8.

℞. Bals. Peruv. ℥i.

dissolve cum

Wall. Or. No. 1.

addo

Spiritus Bore. Junip. ℥ii.

D. S.

Aqua externa contra dolores catarrhales.

Cum expertum commendatur in doloribus partium mucosularum, qui sunt a deflectionibus seu Catarrhis frigidis.

Juxta hæc est Oleum Mastiches, item Oleum destillatum Majoranae, Menthae, Oleum Macis, &c. Oleum destillatum Corvi Cervi potentissimum est, Vertici aut Temporum illitum, modo ejusdem factor non sit adeo gravis; alia eadem hoc Oleum fit surgendum sale volatili, est summum remedium. Observandum tamen, ut ejusmodi Oles penetrantiora & Membranas lesiles magis afficiat partibus extus admoveat sint, talia subinde vim eorum penetrantem ferre queant, cum, qui Capitis sunt debilitatis, ab humifundis fumosis, lætatur, & vel solo odore sternutatio & incipiens Coryza incipit existeret. Facit hæc etiam Uguentum Norfii ex Gummi Elemi, cum Oleo Succini malleato, imprægnato; vel Emplastrum de Betonica, item Emplastrum de Bregmate usitatum, item de Tacamahaca, quæ fuit optima Anticatarthalia, si malaxata cum oleo Succini vel Appropriatis, Emplastri forma Bregmati applicentur: v. g.

℞. Empl. de Bregm. aff.

Gum. Tacamah. aa. f. q.

Malax. cum f. q. Ol. Sarcini vel Bals. Peruvicis: Inducatur super Aluram, & obducatur Sindore rubra, in forma Orbis medii; f. Emplastrum pro Capite.

D. S.

Emplastrum pro Capite.

Vel applicetur Ceratum ex Ladano, Gummi Elemi, Sandaracha, Olibano, Stryace liquida, &c. vel ex Aloe, Pulgæ, Calamita, Ladano, &c. utraque à MONTAGNANA Antid. cap. 3. descriptis: Item Emplastrum ex Mastiche, Gummi Juniperi, Caryophyllis, & Ladano CRATONIS lib. 4. Cap. 15. Pertinet etiam hoc Fumo Tabaci seu Nicotianæ hæstus, cujus moderatus usus sanæ e-gregium est Remedium ad Catarrhus Capitis & Pectoris, imprimis si ex Lymphæ oriatur vitio, & omnibus hinc i-ficem debet esse commendatus. Sal enim eius volatile acerrimum penetrat, abstergit & resolvit hostile illud irritans, corrigit acrimoniam Lymphæ acidam, lucidat eandem cras-sam & viscidam atque flux lem facit, abundantemque per ductus salivales evacuat: vid. MAYOW lib. 1. cap. 9. Ra-tione vero Olei sui Narcotici, qui Opustorum virus emu-lat, insigniter sistit effluviis moras catarrhales, & irrita-tinas solum sopie & mitigat, ac vi salivatoria nimium Lymphæ proventum immittit. Concinnas est, si tali Ni-cotianæ, utitur: alias in Catarrho ad Brachia & Pulmoa-tes destitit, pro sumo simul permiscetur semen Ajiæ, Coria-ri, vel Pulvis Succini, Mastiches, Sandaracha, Stryax, vel Pulvis Cardamomi, aut Cubebarum, vel si irroretur aliquot guttis Olei Succini, aut Anisi; sic tam fit reme-dium magis appropriatum. Certi sitis, quod in affecti-bus catarrhalibus vis habetur per Remedium Fumo Ta-baci: omnibus enim efficaciter scopis. Nec metumus ab hoc fumo excoactionem capitis: Falsum etiam est ab usu huius simul nigrescere cerebrum, ut ait ad subsidentiam dispo-natur: Pulmones vero magis immedietate lædatur, qui a-ridi, equaliter, flaccidi, & hinc inde lividis maculis conspersi redduntur crebrius huius fumo huius, cuius rei experi-mentum videb. in THONERI Observationibus. Hi sunt ca-tarrhi propriè didi.

Ultioribus LINDANUS super HARTMANNUM mentionem facit catarrhi quali aëthi, ita enim dicitur. *Notandum eva-nit* (sunt verba LINDANI) *ut surgentes Hemorrhæ mans fructus dolores, præsertim in scapulis, interdum in humis, nunc in Brachia, nunc in Tumore alioque locis: id quod vulgè statim* (inquit) *referunt ad catarrhos, ubi tamen duo sunt observan-da.* (1.) *Non semper esse à catarrho, nec videtur esse à Phlogis in locis, ubi Mastichi se invicem contingunt, conclusio, ut illi dicunt, potius, dum Corpus nectis sub fragulis satur est pressabile, addit ut tunc Remora solent liberatè per habitum*

Corporis se evanescere: unde, si forsan Manus vel alia pars extra lectum denudata eximatur, concluditur iste insensibilis vapor, qui exiturus erat, & si datur admodum multus ibidem exierat, nunc factus, nunc vagus, & qui sponte remittitur, ac iterum ingruens fore videtur. (2.) *Interdum etiam fit, ut solammodo sub forma Phlogistica horrat. Uterque dolor satis molestus est: h, qui à Flatu, est vagus, qui agitatur, subinde remittitur, ac denique recrudescere, videtur: Si hi horrat Liquor, sicut est dolor & constantis, interdum per aliquos dies, Plura de huius catarrhi nostri Theoria audivimus supra. Curantur tales nos-tri catarrhi, si sunt gravesiores, per fustidifera, imprimis per silia Volatilia, vel spiritus Salino-volatile. Opiata mis-ta, qualia sunt spiritus Salis Ammoniaci, spiritus cornu Cervi, cranii humani, & similia. Hæc enim spiritus urino-si acidum vitiosum absorbent & præcipitant, Opiata ve-rò acorem temperant, & simul dolorem imminuunt. Ex-ternè cavendum est ab emollioribus oleosis unctis: Hæc enim inunda crustam quasi inducunt cuti, poroque constringent & implent. Emplastri itidem hec nocent. Optimum in hoc dolore & calu est Emplastrum ex Gummi Tacamah-a, soluto in Vino, atque catello super aluram vel Lin-team, & parti dolenti impostum: si non beatè hæreat, addi debet taurinum Terribilissim, quoniam facit, ut adhæreat. Hoc ipsum Emplastrum applicatum egregiè resolvit istas humi-ditates: id quod patet ex eo, quod sub illo upsurimam Membra fideat, & omnis dolor promptè evanescit. Con-venit etiam interdum cum hoc ipso compungere Gummi Ca-ranæ, huius part. 1. ad illius part. 1. recipiendo, dum dum ista Gummatia ita impostæ optimè resolvunt Lympham cras-sam. Quod si eveniat, ut cutis non beatè ferre queat Goma-tum applicationem, fere antolatur in pulvis, cum non omni cutis ferat Emplastri, quia mox in excoactionem incurruunt: tunc modis cura sollicitanda est per Tincturam, seu essentias spiritus Vini extractas, & ita iunctas, ut neque insudantur ex Arsenicis, quæ potentem vim habent i-cidendi, attenuandi, penetrandi, resolvendi, & ita simul exstingendi, v. g. quatuor Sermis calida maiora, Nigellæ, Erucæ, Allium, Sinapi, Majorana, Salvia, Scirp-hum, Origanum, Piper longum, & similia. Ex quibus ip-sis cum spiritu Vini paratur *Extempora* seu Tinctura diluta, quæ partes affectas fricenter manu, superimpositis lateis probè exalid. Sufficit quoque spiritus Vini à plantis Ce-phalæis nervinis abstractus, seuque Articularis ad extrin-sæcque solutis, nunc mista cum spiritu Salis Ammonia-ci cum spiritu Vini parato, externè calidè illinendo, & lo-cum dolorosum probè affricando, ita optimè dolores solum-tor. Sed rarum est, quod cutis non ferat Gummatum im-positionem, quæ omnium fuit optima.*

Huc quoque pertinet Sarcinis ex Succino cum spiritu Vi-ni irroratus, aut ex Chamæpityde cum Oleo Succini con-speruus: vid. HARTMANNUS Pr. pag. 93.

ARTICULUS II.

De Coryza.

Specialiter loquitur catarrhis frequentissimus est Catarrhus Nasium, qui vulgo etiam Coryza Græcis, aut qui caput gravat, latini Grævedo, & Germanis, der Schnupfen, dicitur (E). Eß, quando copiosa Lympha, tenuis & acris, in principio quidem per Nares, defluit, donec successivè adingente se nutrimento iollar partium ex earum læsione corruptæ, Liquor crassus, spissus, tenax, variæque subin-dole coloratus, insiepiatur. Simul percipitur io principio Ti-tillatio quedam in Nariis, superciliis Stertutationes crebriores, post incipit caput dolere, & quidem dolore gravativo. Naturaliter quidem à Lymphâ inipida modera-tè crassa intus obstruantur Nares, cuius Vasa & Pores vi-deb. in STENONE de Glanulâ Oculorum, Nasium, Orit &c. quæ ipsa Lympha blande humedat non tantum internam Narium Membranam, & defendit ab externis inspira-tis, sed etiam suo modo faciliat Odoratum. Ipsa tamen moderatè crassa tunc Aëris inspirati attenuata crassio-res partes relinquit, spissioris sub mucis forma emulgentis. Quod si verò præternaturali Lymphæ suo excreto, itant co-piosa, tenax, sicque minus temperata, sed acrior & sæpè acida effluit, vocatur Catarrhus Nasium seu Coryza, dum Lympha ista acrim, reddendo & irritando Membranam Na-rium, primitus steruationes frequentes (modum habuimus

est.

(E) Koryza, Latini Grævedo: hanc apam huius vocabuli corynchiolum invenio.

hæc, 14. cap. 3. Art. 1. ubi de Strumatione) deinde ex Narum lacione dolorem, hinc ruborem; interdum etiam eorumdem exaristationem & exulcerationem inferit; id quod iam suo tempore observavit FORESTUS lib. 13. obs. 15. cujus exulcerationis remedium sit Unguentum Pomatum seu de Ceraffa.

CAUSA.

Causa hujus Coryzae prout causas generaliter, speciatim interius, communem omnibus Catarrhis, (vixitum nempe Lymphæ de Massa Sanguine internam, quæ interdum motu Naturæ spontaneo per hæc loca tanquam Emmendatoria quædam auspicio expargitur) simpliciter solet oriri ex aëre externo, ut dubitem, an præmissæ oriri possit à causa interna & impuritas ex vitio Aëris aëtheris, vel inclementia hyberna aut autumnali. Aër enim hybernus effluvis acidis acutus videtur imprægnatus, unde talis Aër summi partem libi expostus, labia impuritas, faciem, maxillas, in specie Nares & Laryngem, solet lædere: & fructu facies, & manus exinde indurunt, & quasi corrodamur in digitas (quæ ipse sibi se optime tractant per lotionem, aut saltem humectationem, cum urina propria, tanquam remedium salte volatili prædico, quo alteratur Acidum; vel per illucinationem cum Modica vitulina vel Sæpe candela, vel Unguento Pomato, vel solo, vel misto cum Cerussa sicut Creta, abluendo & temperando acidum); ita à simili Aëre inclementiore, aut effluvis acrioribus acidis imprægnato, inspiratione hausto, ista interiorum Narum, & quævis Fauces & Larynx, ex irritatione ista mox copiosius transudant Lympham puram, tenuem, & ex latrone partium insigniter acidam, à qua in Naribus Coryza, in Fauces asperitas & dolor, (propter Membranam pituitariam.) in Larynge rucudo & tussis superveniunt: Hæc ipsa enim ut plurimum in Coryza tempore hyberno solet concurrere.

Subjunctum patiens Coryzae est summitas interiorum Narum, ubi est Membrana, quæ alius folio esse subiectum Officium, cuius structuram vid. in SCHNEIDERO de esse criticis, in quam etiam ex officio eribit inferuntur multi tubuli nervi. Quando ergo à dicta acrimonia vellicatur hæc Membrana, superveniunt fluxationes, quando tubuli aliquid convulsivi patiuntur; unde tubuli hii vellicatis, corrugatis, & convulsivi crispaturis affectis, similiter Membrana cerebri dura, hinc tubulis continua, simili ipsam crispatur, unde dolor gravatius capitis; & qui dolor similis videtur, quasi caput interitus stringatur; et quæ nunc in toto capite, nunc in altera saltem Hemisphaerio, pro Nare deorsum vel sinistram afflata. Notum autem est, quod Membrana Narum naturaliter humectetur à Lympha temperata, pro facili officio, & loquaciorum abluitione. Quando ergo irritatur hæc Membrana, sive à Lympha acris, sive ab Aëre inclementiore, exoritur eadem, & copiosius fit Lymphæ effluxus ex irritatione, & hæc effluens Lympha, abluendo subiectum vellicans, est principium Coryzae. Cæterum, coarctatur hic fluxus Lymphæ, nunc blandioris, nunc acrioris: in principio Morbo omnia saltem profluunt aquosa & serosa, succellivè magis magisque acris, nunc quando durat, tandem odoratas magis obtunditur, donec ab Aëris, simulque Lymphæ vitio læsæ, & nonnulli exoritur, Narum internæ partes dolent, rubent & plerumque nutrimentum proprium, sub forma mucilaginis crassæ, quæ Narum suprema obstruendo in præstatione tollit, usque dum hæc sponte effluat, & ita massa iocunda deletur. In faucibus hærens copiosum serratatum facit, & Laryngem incutit; frequenter Tussis rejicitur: Quin & non raro in faeces duritum in Naribus concrevit, quale exemplum observat HENRICUS ab HEER in obs. 28. Omnia ergo hæc recentia symptomata, generatio Muci, Rucudo item ac Tussis, ordinarij superveniunt, semper oriuntur ex irritatione Membranae Narum & Tubulorum nervorum ab Aëre inquinato effluvis acidis, unde & gustus cessans, inspiratio læsa, & alia facili derivanda sunt.

Præter Aerem inclementem inspiratum subinde etiam aliis externis possunt Coryzae inferre. Nam Strumationis acris, nimirum frequenter usurpata, continuo stimulo Membranam irritando, copiosam Lympham effluere facit, & tandem Coryzam producent pertinet. Mihi enim hoc ipsum evenit tempore æstivo (quo alias non sunt frequenter Coryzae) preparanti clystum Antisepticum: de quo autem, quo lacte frangebatur retorta, quo facili copiosius atraxi fumos, adeo ut postmodum per aliquot septimanas in Coryzam & tussim molestissimam incidere. Solutio

Vitrioli in Aqua simplici facta, Naribus attracta, gravem Coryzam cum dolore & æstu capitis admodum molesto solvit inferre, quæ Coryza aristatilis similis existit Coryzae naturali gravissimæ: id quod notandum contra nos, qui dicunt, Coryzam sanitati conducere & sunt enim talia in Naribus recrementis, quæ sub tali forma ante oculos præstebant in sanguine vel corpore.

Quando est à causa externa, aut aëre externo, Coryza, ut plurimum frequenter spontaneam ac tussim supervenire videmus, partibus scilicet ipsi, per quæ Aer rigidus transit, quæ copiosis glandulis hinc inde sunt oblectæ, Naribus tamen laeis & irritatis, hinc Lympham copiosam & vitiatam sub forma catarrhi plorantibus, imo ex partibus istis ita laeis continuis Aeris expiratione exhalantia miasmata feruntur quasi obtinent naturam, unde & contagiosa percipiunt Coryza, ita ut illa effluvia aliorum Naribus inspirando attracta, vel per halitum, vel per lintea, seu per pocula communia communicata, irritativa sua acrimonia instillar periculis Bernatzenii Membranae Narum vellicando, & hinc Narem itendo, ac Lympham alterando, similem etiam in altero subiecto Coryzam inferant, ut adeo rarissime & pacissimè Coryza à causa interna notetur. Ad hoc sane falsum est, quod Coryza semper fit salubris, ut vulgo docuit, per Coryzam purificari Massam Sanguinem, quasi existeret in Massa Sanguine. Nam ut ut hoc verum fit, si causa interna oriatur, quæ tamen Coryza rarissima est, non tamen semper procedit segnotum, cum ut plurimum occasiones externas agnoscit, & talia potius sunt in Naribus, & faucibus, quam quod alio delectatur. Qui vult hæc magis discipula, conferat in specie HELMONTII Tract. Tarsi & Alveoli, item C. riber. Delirium, ubi meries satisfactionem locorum dubiorum.

DIAGNOSIS.

Diagnos Coryzae facilis: etiam Aniculis nota est.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis: Coryza per se est malum infens, quod caret periculo: saltem observetur

1. Quod crebrior repetem Officium magis strandas, & Nares ad faciliem Coryzam disponat.
2. Quod Lympha effluens nimis gravis adeo graviter exulceret interiora Narum, & in Ozeam, vel Narium Ultra periculosa producat. De quibus Ozeam alio tempore. Imò observatum fuit, ex tubulis nervi nunc nulli erolis, supervenit excrecentiam carneosam, seu Polypum.

CURA.

Cura communis est cum aliis catarrhis: scilicet conveniunt ea, quæ superius Art. 1. de Catarrhis dicta fuerunt. Das autem tempora sunt observanda ad Coryzae curam:

- I. Tempus Coryzae incipientis, quando incipiunt fluxiones, & caput dolere, & Lympha apparet tenuis.
- II. Tempus Coryzae confirmatae, quando mucus obidet narium finitum.

Unde opera danda est, ut ratio prioris irritationis Membranae Narum internæ superioris, eique inde oriunda læsio, siliatur maturè & corrigatur: sic enim mox in principio supprimi potest Coryza; ratio vero posterioris est attendendum, in genus mucus nare abidens crassior & viscidior in progressu morbi maturè evacuetur. Quibus ipso pro conditione subditi patientis, & ipsius catarrhi, vel epidemici, vel non epidemici, copiosioris vel parioris, nunc blandi lætentis, nunc in specie subditi, facienda veniunt. Conveniunt ergo pila prima loco obtinendo in principio ad irritationem siliendam & læsionem præcavendam salia volatilia oleosa odorata, quacunque forma adhibita, in specie si causa interna oriatur: maxime tamen conveniunt externa vel Naribus applicanda, vel periculis inungenda, vel in Ore masticanda, vel inspiranda: hinc suffragia, Jambitiones, varia Odeuramenta, &c. Coryzam incipientem curant, & in prima herba suffragia, quæcorum inchoatam inducunt plus minus corrigunt, acidum vellicans temperant, & irritationem siliunt. Imprimis illucio Narum cum Oleo destillato Anisi, Succini, aut alio simili Oleo Aromatico. In specie Oleum destillatum Anisi, mox in principio illucio aut exaristationem Narum, est egregium. Oleum Saccini hæc superat, in specie si illucio Verticis, illucio quantum levat Coryzam, quin & Naribus potest illucio.

na, idque ad perficiendum effectum, si aliquot guttas olei destillati Caryophyllorum ipsi addantur: sed quoniam est aculeosum hoc oleum, ubi id tantillum Bombacis si insingatur, & inde insubere per Olfactum Naribus admoveatur, tam & sic Coryza tollitur. Item Balsamus Apollinarius Naribus silius, & permeat a Coryza in incipientiore constitutione Aeris, (quo tempore hyberum metu Coryzae Nares largiter insurgunt, ut inde interiori Nares coadunantur & locustentur, ut eadem per illius halitum quasi premonantur, quo munda ab Aere exteriori laedi possint) & eandem eam incipientem curat. Tandem solus oleus ex Cornibus & Ungula raspetis, v. g. Cornibus Bovinis, aut in preparatione Pellicum perceptus, etiam Coryzam recentem subleat siliis; sicut & proscium est, si raspetur huiusmodi cornu lima ferrea, quo siliis Salibus volatilibus excitata, & Nares penetrantibus, auferatur Coryza. Nec inconvensum est, si hanc suffusio pro Coryza: Naribus: sicut etiam in catarrhis Aer attrahatur inspirando inserti alperitatem Narium, Fauccium & Laryngis, similiter inspirati suffusio alterationem ab Aere per reliqua tollunt, & harum partium impressas Lesiones demum resiliunt, & quasi absterguunt. Sicut isti suffusio imprimis ex gummatibus, quorum accommorum Salia volatilia oleosa interiora Narium & faucium penetrando, acrimoniam Lymphæ, & corruptelam nimiam tollunt. Hanc inter excelsis suffusio, perferunt ut Succino: post Succinum Suffusio ex Mallice, Olibano, & similibus est expertus. Experimentum videbitis in BARBETTE praxi, ubi de catarrhe. Denique suffusio ex Gummi Animæ experimentum est HARTMANNI, intelligitur commendatur a LINDANO. Hic & similia Suffusio Naribus, Ore & tota Facie, reperitis vicibus, exceptus, vitium Lymphæ corrigit, & Lesionem hanc inducunt misigat, & periode hos affectus curat; v. g. suffusio supra in catarrhum cura præstatur: vel quoque præscribitur suffusio talis compositio Lindani:

℞. Gummi Juniperis. ℥ss.

Alma,

Succini an. ℥ii.

Thuris,

Myrrha, an. ℥i.

Bombacis (in infusibus faucium, & Laryngis, & hinc pulmonum; est enim anima pulmonum) ℥ii.

M. f. Pulvis: &

Pulvis ad suffumum contra Catarrhos.

Vel

℞. Gummi Animæ ℥vi.

Succini ℥ss.

Styrac. calam. ℥lii.

Thuris,

Myrrha,

Benz. an. ℥ii.

M. f. Pulvis:

D. s. ut antè.

Qui Carbonibus inedulis successibus excitat Suffumum suum, Naribus crebrius excipiendum ad subdandum Coryzam, quæ ipsa etiam capiti imponenda erunt. Semen Lini sive Scoræ Carbonibus impolutis, cois Suffusio in Nares attrahit, aut Semen Anisi calefactum, Linteo inclusum, & odoratum; item tenere faciem super Vase aquæ verè calidæ, a quibuldam laudatur. Peruenit & hac suffusio Tabaci, aliquot guttis olei destill. Anisi prius imprægnati, si scilicet ita præparatus Tabacus per Filulium consuetè attrahatur, & fumum inspiraretur. Convenit etiam, si recipiatur oleum Amygdalarum dulcium, in quo q. l. solutum sit Camphora, quod ipsum oleum extrahit olei Nali, vel intrinsecus superficiei: ejus illitum, eleganter Coryzam siliit. Perhibetur esse secretum TACKII.

Quid si verò eo usque processerit Malum, ut sub incremento & statu ejus pathemata graviora capitis affixerint, necnon copiosius, nimia crassius, nimisque viscidus Mucus Narium summatates occupaverit, & Nares obstruxerit, tunc æthereis, resolventibus, & acrimoniam eliminantia locum habent; unde optimus est suffusio assu ferum candens effusio, & ex Gummi Animæ, & Succino jam laudato: Sic etiam loco Suffusio conveniens est spiritus Salis Ammoniaci odoratus crebrius, qui penetrant acineunt Mucum, Matrem resolutam finaliter facient, & Nares aperient, ac Lesionem inducunt corrigunt: item oleum Camphoræ amygdalium jam laudatum, quo illinantur summatates Narium extrinsecus, vel interne earum superficies; sic Sal volatile Camphoræ optimè solvit Mucum instansentem. Ulterius pro simili Suffusio optimè conducunt Succinatæ ap-

propriæ, Lymphæ proritando fluxum, ejus benedictio Membranas Narium adhergentia, quæ & dictum Mucum crassum & viscidum eliminant. Fiant ordinariè ex Pulvere Tabaci, ex Floribus, & radice Liliorum convallium, Majorana, Euphorbia, & similibus.

℞. Pulv. Tabaci ℥ss.

Majorana,

℞. Lil. convall. an. ℥i. ad ii.

Olei destill. Salis. vel Rosmar. vel Anisi,

Majorana an. gutt. vi.

Misc. per Pulvere Sternutatorio subinde Naribus hauriendo.

D. s.

Pulvis Sternutatorius Aperitivus.

Hinc, si placeat, pro ditioribus subinde addi possunt

Ambræ gr. iii. ad v.

Myrrha gr. vi. ad ℥ss.

Misc.

Ita hæc conjuncta dant Pulverem Sternutatorium gratum.

Vel etiam fit elegans Pulvis Sternutatorius ex Pulvere radice Trœs Florentina, cui tantummodo aliquot grana Euphorbia pulverisati addantur; hoc enim potenter Materiam sua fortiori irritatone, rivoli instat, profutere facit.

Pertinet hæc etiam Pulvis Sternutatorius Helmontii in hoc casu expertus, æ Pulvere Radice Belladonna nigri cum Oleo Saetheri mistus, Naribus attrahit, quibus aliquot guttas olei destillati Caryophyllorum, vel Cinnamon addatur, quæ etiam ceu egregium commendat RIVERIUS in sua praxi. Vid. HELMONTII trass. Tass. & Aphora. His ipsi enim corrigunt Mucum, & demum liberant Nares. Item Salia Nicotianæ irrorantur aliquot guttis Olei destillati Majorana, & ita odorantur; vel exlicata pulverisati in blanda, sed egregia sunt Sternutatoria. Conveniens etiam est Semen Nigelle cum Majorana in forma Pulvis, vel sola, vel cum Camphora: Semen Basilici pulverisatum Sternutatorium non inconvensum est, in principio quoque Coryzæ usurpandum. Optima denique Sternutatoria sunt ex Theriaco; mitiora, si tantummodo ad albedinem calcinetur; potentiora, si ad aliquam rubedinem usque ferri comparatur; quæ inspirata potenter penetrant, omnesque Narium latebras emungunt. Ceterum, ne nimis acre sit, solvatur tantillum Vitrioli albi, seu ad albedinem calcinati, in aqua Majorana seu aqua Liliorum convallium, aut in aqua Salvia diluti, ita ut gr. v. vel vi. pro ℥i. aquæ sufficiant. Liqueor si filtratus & Naribus attrahatur qualvis Narium latebras emungit, & insigniter convenit Coryzæ.

℞. Flor. Lil. convall.

Herb. major. an. M. ii.

Misc. M. s.

Cocu. in C. q. aquæ & vini in Vase glassio:

Colaturæ ℥vi. adde

vitrioli albi ℥i.

Colaturæ per pannum densum ob Vitriolum.

D. s.

Aqua Abstractiva ad Nasum.

Quæ optimè quoque Mucum Nares obstruentem resolvit in situ Coryzæ.

Quidam usurpant Olei Nicotianæ, & olei Nigelle ana partes æquales cum aliquot guttis olei destillati Majorana; Vel

℞. Olei tris,

Nicotian. an. ℥i.

destill. major. gutt. lili. iv. vi. ad ℥ss. & i.

(vel Auger & olei destillati, faciem. an. p. aqua.)

M. s.

Oleum Aperitivum ad Nasum.

Subinde intra Nares attrahatur, vel cum Turunda Naribus immittatur, vel Naribus extrinsecus illinatur: Mucum Narium insigniter solvit, & elicit, siliuntque ita Coryzam Narium contrahunt.

Melius est oleum Anisi, si interiora Narium eodem illinantur; referat enim Nares obstruas, & si sit ab effluvis inspirata, Lympham remperat, ne fances & sanguinem feriat atremata: vel sumatur oleum Anisi, & ita Naribus cum Bombace in parva Turunda immittatur: ita enim egregiè resolvitur Mucus crassus, superiores Narium partes obstruens: vel oleum Succini, vel Oleum Caryophyllorum, quæ propter acredinem cum oleo Amygdalarum dulcium temperetur. TACHENUS Camphoram in duplo olei Amygdalarum dulcium solvit. Sic conveniens est, ut Naribus admoveatur nodulus cum siliis ex semine Nigelle centule, qui nodulus subinde olfactus admodum cortigit.

LIII

&

Tom. II.

& emendat Coryzam, in specie Nares obstruentem; est remedium TABERNÆMONTANI, quod insigniter commendat. Possunt addi Pulvis Majorana; aut comparsa ex Majorana, in specie Oleum Majorana; sum & hoc ipsam curat UZEMAM I. v. g.

24. Fel. Majoran. part. iii.
Sem. Nigell. contraf. 3ii. vel iii.
Dici defill. Majoran. gutt. iiii. vel iv.
Succini,
Anis. aa. gutt. i. vel ii.
M. l. Nodulus;
detur cum Siliis: S.
Nodulus odorandus.

Quod si caput pectoribacum sit, grave & obnubilatum, convenit vel Balsamum Peruvianum, vel, ubi fortius agendum, Oleum defillatum Succini, aut ejusdem Balsami Verticis illius; unde dolor capitis tenditur, etque pectoribus succellivis remittunt. Loco horum subhiberi etiam possunt Gnapth. supra laudata.

25. Flor. Arabis,
Lavend.
Stach. Arab.
Bafar. rub.
Lil. contrail.
Sals. aa. pug. ii.
Sem. Nigella.
Ros. Siniensis. 3il.
Styrac. calam.
Benz. aa. 3i.

Conci. & contraf. interpositur cum garris aliquot Olei defillati succini: sacud. sacculo quadrato ex fenoena rubra interposito.

D. S.
Sacculus Verticis imponendus.

Quod si pro derivatione Lymphæ catarrhalis prius pro perversione partium Oculi aliquod agendum sit, Pilula conveniunt vel Trachysi parvi ex Mithridate, mastice & Aliquis Salsis, & in Ora recent: Catarrhum enim & lesionem partium sillunt, Doleum Oculorum, Dentium Focetrem, & gingivarum corruptelam, &c. tollunt, atque in principio impetibus conveniunt.

ARTICULUS III.

De Tussi, rancedine, aliisque affectibus
Catarrhalibus.

EX modò dictis etiam Rancedo, & Tussi, Faucium Phlegmæ & dolor, gustus abolitio, humilique faucium affectibus Catarrhalibus, tam cum quam sine Coryza, ordinario attingentes curari possunt, cum omnia mutua invicem concurrant, & partium per Laccinam ex causa externa facilius, partem per Lympham ex glandula pituitaria superiute in Coryza depluentem, & hinc ad fauces dependentem, & ita Loca vicina magis magisque irritantem, originem ducant. De qua Membrana Pituitaria & per hanc transudante Coryza, vid. SCHNEIDERUS, partium trach. de affe. Cribiformi, partium trach. de catarrhis.

CURA.

In specie tamen quoad curam horum, similiter duo tempora observentur: incuba nemp. Tussi & Rancedo, & confirmata. In priori præter suffusa supra insinuatam, hic etiam conveniuntissimum, specialiter aptata, additæ Salibus oleosis, tempore vesperino in principio horum affectuum subhibita, multum conveniunt, idque ea Methodo Helmontiana: Quibus in principio Mali, ubi Lymphæ adhuc existente nimis acris & tenaci, aut nimis acida, aut corrosiva, partium affectu doloris Rubores, Phlogoses, &c. superveniunt, subinde acrimonia temperantia & demulcentia usurpanda, quæ alius inter alia dicuntur: qualia sunt Papeverina, & quæ sunt ea Juubis, Glycyrrhiza, Fiebus, Passulis, salphoræ; item Pilulis de Strace, &c. In tertia vero Merbi, ubi Mucus crassus & viscidus genitus illas partes obideat, pro expectoratione conveniunt expectorantia vulgè dicta, ex Hyssopo, Nicotiana, Orymelitha, Spiritu Salis dulci, spiritus Nitri dulci & similibus usurpanda, supra scilicet. 14. cap. 3. art. 2. memb. 2. & not. 3. ubi de Tussi, & rancedine alium

fuit, explicata. Mollitriculis nostratibus pensentissimum cussis & rancedinis a causa externa, Aëre nemp. frigido, remedium sunt Puffula major, macerate in Spiritu Anisi, quorum quodam mane tresco hominibus malicatis, & deglutitis fauces, & alperam arteriam prætervane ad insulit & lesionibus Aëris hybernæ: acuti etiam radit Zingiberis in India condita assumpta mane & malicatis, eidem usui confert. Indollos verb jam Catarrhus faucium, & Laryngis ferè curant per caricas, quibus in frustula dissecta aquam Vici seu spiritum Vini infundant, & hinc desuper accendant, & sic desagraviant, continud agitando; hinc frustula illa somnolenta nespertion tempore comedant, & sic Tussim & alperitatem faucium egregie corrigant, sique Lympham acrem & acidam temperant, & demulcent.

ARTICULUS IV.

De Epiphora.

TAndem præter Nares, Oculis subinde affligunt catarrhi, ex Lymphæ diluvio præternaturali ori. Naturaliter equidem humectantur Oculi à Lymphæ subtili, equo tempore, modatissimè salia, ut facilius eorum motus, & à salidine Lymphæ, continuata absterione eorum nitore claritas, ad Vilem summè necessitatem, conservetur: Hinc nimia frequentia, & copia caecernatur hanc Lymphæ oculorum, Lacrymarum nomine venit, quæ largitur manum subinde in Oculum, ubi sensibili, sed subtili, salidine imprægnata gullantur.

Lacrymæ aut naturaliter effluunt solo quanto efferentes in animi pathematia; aut præter naturam demittunt in statu morboso, vitioque Catarrhali.

Fontes hujus Lymphæ, tam naturalis quam præternaturalis, sat manifesti sunt, Glandula cum ille, quæ in ungue Cutho seu angulo sunt conspicua; cum etiam ex, quæ in interiore Palpebrarum facie sunt sitæ: de quibus imprimis consilendum est STENO trach. supra cit. de Valsi oculorum; ubi etiam habet nonnulla egregia de naturali Lacrymarum fluxu.

Lacrymarum ille nimius effluxus morbosus abesse aliis vocatur Epiphora: abusive dico; legitimo enim nō Epiphoræ vox in genere Humoris in quancunque partem influentis impetum significat (F); quæ ratione & uerit, & ventriculi Epiphoræ apud Veteres observatur. In specie tamen ex Moderatam abulū Epiphora nimiam Lacrymarum fluxum, seu catarrhum oculorum innot, de qua egi, ubi de Ophthalmia.

CAPUT III.

De Lymphæ motu impedito, indeque orto hydrope in genere, & in specie.

PRAETER affectus Catarrhales à Lymphæ, vel primario vel secundario peccante, entos, Lymphæ etiam peccat in motu, quando impeditur, ut in suo Motu flatur, & hinc loca vicina occupet; unde oriuntur Tumores aquosi, & scrophuli, seu Hydropis particularis.

Hydropis nomine sub generali concepta nil aliud intelligitur, quam aquarum, seu, uti loquuntur, serosorum humorum præternaturalis collectio; Latini aqua interius non incepte dicta, quam necessario Tumor & distensio partis, cum eius tamen Mollitie, & non raro Induratione comitantur, utut hoc ipso Vocabulo certa Hydropis species determinetur. Aqua hæc collecta vel totum imprægnat corpus seu tumefacit, vel saltem determinatam eius partem, Unde dicit Hydropem Universalem, qui dicitur impetio Anasarca & Læmptegmatia, cuius addatur Affectus Cachecticus, à pedibus succellivè ascendens, usque dum suffocentur Aëri; quos Hydropes Universales supra scilicet. 17. cap. 3. art. 2. & 3. discussi: hoc verb dicitur Hydropem particularem, qui per partium varietate, in quibus aqua colligitur, variat etiam, & specialia sequitur Nomina. Si enim caput sit hydropticum, seu quando aqua colligitur in capite, dicitur Hydropis capitis;

(F) Ab insipio infero, immo.

lus, si colligitur in pectore, eodemque vel toto, vel una
 talem ejus medietate, dicitur *hydrox pectoris seu thoracis*;
 si in pericardio pœrenaturaliter abundet lymphæ, est *hy-*
drox pericardii si Aquæ particulariter colligitur in abdomi-

nis cavo, vocatur *hydrox Ascitis*, ab *ascis*, *Uter*, quia
 abdomen insit Uteris repletum, tumescens & distensum
 apparet: qui hydrox Ascitis abdominalis particularis non
 confundendus est cum hydrope Ascitis magis Universalis,
 quæ Cachexiam comitatur, & præter abdomen etiam pec-

tedes universos ac totum tumescit, de quo jam *suprà* l. a. si-
 quidem Cachexia confusata vel in hydropem Anasar-

cam, vel in Ascitem partium inferiorum universalem ter-
 minari solet. In Utero collecta Aqua dicitur *hydrotheca*, seu

hydrotem uteri, si in scroto, dicitur *hydrox scroti*; in Te-

stibus dicitur *hydroscelus* si in partibus vel Membris externis

particulariter oritur in uno altero Membro, vulgò *Tum-*

ore aquosi aut serosi generali nomine appellatur. Imò in

Omnem bursâ copiosè. Aqua conclusa in inguinem Tum-

orem abdomen attollunt, qualia Exemplis HORSTIIUS

in *obseruat.* habet, & hic est Mulier, quæ videtur gravi-

dæ, & tamen tantum est Aqua collecta in Omento: item

in duplicata Peritonæo conclusæ Aquæ speciem hydropis

abdominis mentiuntur, quale Exemplum habet JOB à

MECKERN in *obseruat. Chirurg.* cap. 52.

Ex quibus distat patet: Hydropeum ab Aqua, *Uter*, di-

ctum, non esse alium, quam, ubi est Aqua. Hinc hydropis

dictus *Tympanites* improprie est hydrope, cum flatum tan-

tum, non verò Aquarum, in abdomine sit collectio; unde

de eo videtur, quæ *suprà* fact. 5. cap. 2. dixi de *crustibus* &

fluit. humachi. Unde tantum propter aliqualem similitu-

dinem Tumoris cum Ascite particulari, & quia raro absque

aquarum aliqui colluvie contingat, Tympanites eundem

etiam ad hydropes retulerunt.

Superiori septimana læteri discurrere de hydrope, tam

in genere quam in specie, & quidem tantum Præliminaria

præmissi: pergo in his, & præmoneo, quòd cum Ascites sit

in frequentissima hydropis species, & omnium maxime occurrat

in praxi, quæ dicuntur de Ascite, etiam de hydrope

in genere intelligenda sunt.

De hydrope Universalis, tam Anasarca quam Ascite,

omnium partium, Cachexias insequente, *suprà* l. a. mo-

nstratum fuit.

ARTICULUS I.

De Hydropibus particularibus in genere.

CAUSA.

IN specie quod attinet *causas hydropis particularis*, seu
 collectionis aquarum, aliter à Veteribus, aliter à Mo-
 dernis derivantur. *Præter* hepatis affectum accusant, quod
 nempe, ut notum est, recenter advehum sanguinem non
 rite præparet, unde fiat, ut tandem serum in abdomen do-

lissimum hydropeum intereat.

Sed his contrariatur (1.) *Moderatum* de sanguificationis

Organo hypothetis, cùm, ut notum est, defectum sit ab

imperio cruento hepatis, ipique publicè dictæ exsequie.

(2.) Adversatur hinc sententiæ omnes, qui observati-

ones Anatomico-Prædicas scripserunt, v. gr. BARTHO-

LINUS, TULPIUS & similes: Hi enim omnes aperte

ore clamant, siquidem Hepatis laesiones in hydropticis, in

specie asciticis, fuisse reperiunt: Hinc refert LINDA-

NUS *super Marimumanum*, & aliquando vidisse Encephali

Virginem hydropticam, cujus Ventre dissecto ingens aquarum

colluvies profudit, interne nullæ labes Viscerum ab-

dominis fuit inventa, donec cordis fuisse Ventriculos to-

tos putridis, corruptis, & Liquore insit aramenti forti-

ssimum plenus fuerit inventus; unde origo illius mali. Unde

etiam SENNERTUS suo tempore rejicit, quòd ex hepate

inde inventos in hydrope demortuis: Sed hoc commune
 habetur cum aliis Visceribus, & etiam subito reperitur
 exempla Asciticorum, in quibus post mortem aut hepatis
 aut Lienis, aut alius Visceris Scirrhus fuit inventus, qualia
 vid. in FORESTO lib. 19. *obseruat.* 29. & in SCHENCKIO
obseruat. pag. 433. Viscerum eorum quovis varia & multi-
 plex in hydropticis constituto præternaturalis observata,
 statim hâcenus nisi certi de parte solida, primario in hy-
 dropse affectu, colligi queat: Imò fieri potest, ut sine viâ
 aliquas Visceris hydrops salutaris, quando ab *erroribus exte-*
rioribus, à potu frigido confertum ingello, Aqua in abdomine
 colligitur, atque adeo non solus hepatis, sed & aliorum
 Viscerum culpa, imò interdum Visceribus penitus illatis,
 hydrope generari constet.

Quæstio autem superest: *an hic Tumores sine causa hydropi*
 an vero eum tantum antecedat? aut ex iâe sanguinis cum
 comitetur? sicut videmus v. g. Quartanas, Tertianas diu-
 rurnas, &c. sæpe habere comites Scirrhus Lienis; qui Scir-
 rhi Lienis aut hepatis superveniunt istis Morbis, adeoque
 ad morbos producta potius referendi, quam quòd sint ra-
 dicales eorum causas. Id quod etiam de hydrope Ascite,
 qui succedit post morbos chronicos, in specie Quartanas &
 Tertianas, observandum est.

(3.) Tertium quæstio est contrarium huic Opinioni, est
 quòd explicanda resset *Ratio & Modus*, si ex hepate ori-
 luppatur, *que fuit collectio & deflavit materia aquosa* in
 abdominis cavum, aut alias partes, v. g. in Caput, pectus,
 &c. Nam hæc est consuetudo Naturæ lex, per Experientiam
 quotidianam comprobata, simulque per insignia experimen-
 ta, quòd nihil excretaur ex massa sanguinea puram, nisi
 per Cribra certa, seu per certos, & determinatos Poros ad
 Meatus. Queritur ergo: per quæ loca? quomodo? per quas
 vias defluerent Aquæ, & colligantur, tunc in Capite,
 nunc in pectore, nunc in abdomine, &c. *Transfusa* est
 leveffugam, ex Vasis omne sanguinis. Tunc enim
 Venarum, ut taceam de Arteriis, tenaces admodum ac
 densas, non permittunt hos succos effluere ad loca determi-
 nata. Anasarcæ si adell, necessarium tantillum sanguinis
 adellat, ut ob id Serum insit loturæ carnis, & quæ san-
 guineorum observarentur in hydropticis, quòd tamen non
 Necesse est ergo, ut Veterum assertis missis, aliter expli-
 cetur hydropis generalis. Optimum autem & probabile *Jo-*
annem de Moderatum nonnullorum, qui particulares va-

riorum Locorum Hydropes optime dilucidant *per Vasa*

Lymphatica aut Lactea, quorum lesorum occasione com-

modiffimè illa Aquarum collectio deduci potest & Impedita

enim Lymphæ motu per hæc Vasa, quid aliud, nisi huius

in partibus stagnantis collectio, indeque hydroptica In-

mekentia insequitur? Quòd si per totum corporis periph-

eriam, ut in *Lænothymia*, vitio Glandularum & Lym-

phæduum obstructarum, aut alio modo infarctarum Lym-

phæ per Glandulas transcolatio, & ejus per Vasa ad mas-

sam sanguineam motus impediatur, *anasarca* aderit; sicut,

si in uno vel altero membro particulari hoc contingat, *ana-*

asarca particularis, ascites particularis &c. supervenit.

Primum, qui mentem huc ducit, fuit BARTHOLINUS

in *trakt. de Vaso Lymphæ*, c. 3. p. 245. quem tanquam præ-

ceptorum sequitur ejus discipulus SIMON HEINRICUS

PAULI in *anatomia anatomia diffusa* pag. 85. Causam

hydrocephali statim esse Lymphæ, quæ ex obstructis Vasis

Lymphaticis Jugularibus, aliisque Cephalicis iocet eum

& pectus, vel inter Cranium, & Meninges, colligitur.

Terit eadem vestigia similiter SYLVIIUS, nam in

Scriptis Theoreticis quam prædica, in specie ill. x. *praxi*,

cap. 17. & cap. 50. qui in specie *ascitis* ex hoc fonte deri-

vat. Sanè ubique per totum Corpus & quilibet Viscera

disperfa sunt Vasa Lymphatica, tamque per partes inter-

nas, quam per externas, quæ semper habent suam corres-

pondeantiam cum Glandulis. In his ergo lymphæ contenta

si impediatur moveri, five sint Vasa rupta, five erola, cùm

interim coarctus ejus sit proventus, necessarium tamen

lymphæ collectio seu *Tumor aquosus*, seu *hydrope particu-*

laris in illa parte, ubi sit Lymphæ impeditus motus, exci-

tatur, & tam in *Partibus internis*, v. gr. ex Lymphaticis

Capitis, *hydrocephalus*; ex lymphaticis pulmonum, aut ex

lymphaticis Glomerularum pectoris, *hydrope pectoris*; ex

lymphaticis Hepatis vel Lienis vel Testium, tam vitium

quam muliebrium, vel Lactis Thoracici &c. *hydrope*

ascitis particularis, & *hydrocele* inducitur, non secus ac in

partibus externis à lymphaticis Actum *Tumores Scirrhi*

potius externorum superveniunt.

Causa verò *Generalis*, propter quam non moritur lymphæ,

in ordinariis Vasis, est aut *Ruptio* aut *Erigo* Vascularum

Lill 2 Lym-

Lymphaticorum. Si enim in quodam loco glandulæ, & ex his derivata Vasa Lymphatica obstruantur, necesse est, eam Lymphæ fati continui provenire, ut exinde huius fiat collectio in glandula, aut eas eurius in Vase ita impediatur, ut necesse sit hinc Lymphæ in parte colligatur. Et eisdem *obstruuntur fit Vas Lymphaticum* (prelupponit hic etiam Vasa Lymphaticorum notitiam) à Materia crassa, & viscidâ, seu, ut vocant, pituita, hoc ipsum Vas obstruunt à Lymphæ per istud distribuenda insigniter diffunditur, tandem rumpitur, & ita Lymphæ successivè effunditur; aut etiam si ipsa Lymphæ fuerit acidior, salis, acriorque, aut alius quocunque Humor corticibus Vasa Lymphatica tenelle exierit, necessarii etiam Vasa Motus naturalis in ista parte fit impeditur, itaut Lymphæ exinde in quendam Locum præternaturaliter effusa & collecta *Tumores Aquosus particularis*, aut *Hydropem particularem*, inducat.

Confirmant hæc Hydropis particularis, per Lymphaticorum Vasa vitia, originem *Hydatis Viscerum*, (Bulbi aquei,) in specie *Hepatis & Lienis*, que subinde observatz sunt, aut præditi, aut comites Hydropis particularis, ut in specie hoc rectè observat SCHENCKIUS lib. 3. *observ. de hydropi item PLATERUS in observat. pag. 596.* qui observat Hydropem ex Lienis, & Hepatis Vesiculis, & SENNERTUS in *praxi*, ubi de *hydropi*. Equidem Hydatis hæc præ aliis partibus frequenter in pulmonibus, Hepate, ac Liene, & similibus Visceribus sunt observatz. De Hydatisibus insignioribus pulmonum vid. CAROLUS PISO in *trakt. de Colliculo ferula pag. 312.* De Hydatisibus insignioribus Hepatis vid. PANAROLLUS *Præter. 3. observ. 16.* qui quædam egregia habet: quia horum Viscerum Vasa Lymphatica magis exteriora ambiunt, nam de Humoribus horum seu Aquarum contentorum collectio magis fit conspicua. Scilicet diffusi in locis Vesiculæ Aquæ turgidæ, nunc minores ac copulantes, nunc præditi oves inspicuntur: quæ ipsæ sunt nihil aliud, quam Vasa Lymphatica, in quibus Motus Lymphæ fit impeditus. Hæc ergo Lymphæ in ista hæc propter interitibus crebrioribus in Vasis Lymphaticis *Velocitas*, equis sensum diffundit, & dum intercepit est Lymphæ diffundent intra Valvulas, quibus plurima Vasa Lymphatica sunt instructa, spatio illa intermedia diffundendo tumescit, & ita Vesiculæ Aquarum feciem repræsentat. Quod si rumpatur una altera Valvularum, aut ipsorum Vasa Lymphaticorum Lymphæ sub Membrana Visceris tenai coacta, & effusa, scilicet maiores Vesicæ & granulæ, ad Nuclei inglandis magnitudinem interdum observatz, exhibebit, quod tandem rumpitur aut erodit Hydatisibus Lymphæ extravasatio, in cavo Corporis quodam collectio, & ita *hydropi* postmodum particularis oritur.

Post Hydatis illustrat Hydropis ortum ex Lymphæ motu impedito *Aficiet seu hydropis abdominis viscerales dicti*, h. e. in quibus Aqua abdominis Tumorem quidem faciens, non in cavo eius fluctuaverit, sed potius Viscera copiosè & innumeris Vesiculis Aqua turgidis observata fuerint, itaut post abdominis aperitionem nihil Aquæ efflueret. Exemplum aliunde enarrat huiusmodi Hydropis Vesicalis SENNERTUS c. 1. *abst. de hydropi*, item TULPIUS, qui observat Hydropem Afcient ex copiosis Vesicis Mesenterii lib. 2. *observ. 34.* item vid. HOFFERUS in *Herc. med. pag. 129.* ubi similes Hydropes Vesicales reierit, item HORSTIUS lib. 10. *observ. pag. 513.* & 579. similiter & BARTHOLINUS *centur. 4. dist. 58. pag. 370.* observat Afcient ex Glandulis vel Vesiculis in Omento Seco repletis, necnon in *Afcit med. Hag. Volum. 1. pag. 17.* sicut & in VALERIOLA. Hæc ipsæ Vesiculæ pariter nihil aliud sunt, quam Vasa Lymphatica, & hinc partem interstitia membranosa, hinc inde ex Lymphæ in motu impedita, aut ratione intercedarum Valvularum in Lymphaticis Vasis tales Vesicæ repræsentent, aut rumpuntur licet Vasa, si tamen Lymphæ effluerit in membranis ambientibus supra dictis modo coactur, successivè in copiosis tales Vesiculas coarctatur, & colligitur.

ARTICULUS II.

De Afcite Particulari.

Frequency autem præ cæteris Hydropis particularis specibus est *Hydropis abdominis seu afcite particularis*, huius *difficili est ratio*:

1. Quia copiosè & insignia continent Viscera, & quæ omnia plus minus copiosis Vasis Lymphaticis sunt instructa, v. g. Hepatis, Lienis, Renum, Testium utriusque scilicet;

quibus speciatim accedant Vasa Lymphatica ab inferioribus locis ad receptaculum commune ascendentia.

2. Ratio secunda est, quia *mesenterii* etiam *infirmitas obsequi Vasi Lactis*, Chylum in se tenuem & simplicem vehentibus; quibus plus minus ruptis aut excis similiter afcites & eadem pathemata in abdomine sequuntur, quæ aliis Lymphaticis Vasis abdominis ruptis, nam quod his Lactis lapsi, etiam sequatur afcites, de hoc vid. SYLVIIUS cap. 17. *prax.*

CAUSA.

Quoad causas: equidem LINDANUS Afcitem Particularem semper à *Colliquatione* utriusque affert, quod tamen vir universale videtur. Plausibilissima est Lymphæ chylos alteritque humoris impeditus motus per Vasa Lactis, unde pariter omnia symptomata hic obvia derivari possunt. Addeoque Causa Proxima investiganda est vel in Vasi Lymphatico quocunque causa erodis; vel Vasi Lactis obstruendo, ruptis, & consequenter Lymphæ dilutionem parientibus; vel *ex sanguine*, quodam in loco coagulato, qui putrescendo transit in Aquam, cuius occasione supervenit interdum talis hydropis afcite particularis.

Res ut patet exactius, observandum est, Vasa Lactis ratione structuræ & compositionis reverà eadem esse cum Vasi Lymphatico; siletem contenti ratione à se invicem differunt, dum nempe vehunt Chylum diffundunt à Lymphæ. Hinc eam est, quod Truncus Lacteorum, & Lymphaticorum communis, nempe Ductus Thoracicus, sitque Liquor Liqueo vehendo, tam Chylo quam Lymphæ, ut delictans Lactis ergo hæc Venæ tenues, & aquilum Chylum vehunt, si aut ipse in Mesenterio obstruuntur, aut Glandulæ Mesenterii, per quas Chylus medianibus Vasis Lymphaticis primi generis trajicitur, in Lactes secundi generis, (de quibus imprimis videndum WARTHOVIUS) si inquam glandulæ aut Vasa Lymphatica obstruantur, necessarii inquit exinde Chyli effusio, & inde Tumor afciticus supervenit. Necesse est enim, ut Chylus, qui per se est admodum tenuis, & aquilus, utpote per angustulos intestinales poros percolatus, tunc subsistat, aut circa glandulas induratus, aut in Lactis obstruendo, hinc Vasa diffundat, eodemque tandem rumpat, usque ruptis in abdomen infuset, quod continuata congestione tandem diffendit, & ita tandem Tumorem afcitem inserit. Hanc Chyli in abdomen per nonnulla Vasa Lactis ex occasione quorundam glandularum obstruendarum dilutionem, unam ex extremis causis afcitis arbitratr SYLVIIUS cap. 17. lib. 3. Hanc quoque sententiam illustrat imprimis illud experimentum BOYLEI *trakt. de usu Philosophia Experiment. P. 1. pag. 38.* in quo relict Aquam Hydropicis cuiusdam per Pancreosin evacuatam, tunc spiritum, etiam, opacum, & album, gustu subulem, colore turbidum; blando igne leniter inspillatum dedidit Mysterium album, albumi ororum mixtum, magis inspillatum in Gelatinam plantæ etiam coarctavit, quæ alias Chylo, & Liquebus Chylo permixtis propria esse solet: sicut hæc ipsa, quæ dieo de vitæ Valorem lacteorum, & Glandularum Mesenterii, illustrat exemplis Afcitorum eorum, in quibus, reliquis Visceribus falsis Mesenterii tantummodo Glandes obstruunt; hinc utinam aut scirrhotis, inventæ fuerint: item quando ex altero Mesenterii, in quo dubio procul effusa fuerint Vasa Lactis, crebris observatus fuit Hydropis: id quod confirmat RONDELETIUS in *san. praxi lib. 3. cap. 15.* ubi inquit, id notatu dignum esse, quod ex frequenti dissectione Corporum observaverit, omnes Hydropicos Glandulas Mesenterii induratas vel scirrhotas habere: Sic TULPIUS lib. 2. *observat. cap. 33.* observat Hydropem Abdominis propter Glandulas Mesenterii edematosis; quod etiam PANAROLLUS testatur, uti etiam HOFFERUS in *Herc. Med. cap. 123.* Sic ex Ulcere Mesenterii quinquies Hydropem observavit TULPIUS lib. 2. *observ. 32.* uti etiam HOECHSTEDTERUS *Dissect. 6. cap. 6.* ex Glandulis Mesenterii edematosis, scirrhotis & exasperatis.

Ex his ergo frequentes sunt Hydropes particularis Abdominis, & sanè ubique præstant observationes. Afcites, nam ex *afflictis Mesenterii Glandulis*; hinc enim diffillat Serum plus minus chylum in Abdomen, ruptis Vasis Lymphaticis aut Lactis. Ex hoc sunt etiam causa est Afcitis particularis, qui supervenit quibusdam, quando copiosis potius frigidus ingurgitur in Afcit, aut nimis Veneris ardore, frequenter enim observavimus est, quod ex sola huius frigiditate post Afcitum nimium, aut corporis exercitium, sudorem nimium aut Afcitum febrem, aut nimium Calorem, inter-

interdum subitaneus ortus fuerit Hydrops Ascites: qualium exempla PISO Traill. de Cellulis ferè habet, dum refert Ascitem, natum ex Haustu frigida in declinatione Tertianæ: Simile etiam exemplum refert SENNETUS lib. 3. cap. de Hydrop Ascite pag. 711. Dicit nempe, se observasse in Puella, quod cum in Tertiana vehementer sitiens totam mensuram Cerevisiæ secundariæ bibisset, inde in Ascitem incidit. Item FONSECA lib. 3. Cap. 20. observat Ascitem ex Potu frigido Vinu post longum iter, dum Ager admodum esset exhaustus. Observatum crebrius fuit, quod Menses tempore Astitis ex haustu Cerevisiæ secundariæ in Astita reddantur Hydropici: Sic ex ingurgitatione Aquæ in Astita Tertianæ felus observavit Hydropem Ascitem RIVERIUS Cent. 1. Observ. 65. Conf. M. A. N. C. Ann. 6. Observ. 52. p. 85. Nullus ergo Potus frigidus nimis, imprimis Febricitantibus, præsertim tempore Paroxysmi porrigendus, utpote quamvis moderatè at intempestivè assumptus, coagulatione Lymphæ & Chyli intra Vasa Lactea, kinque Alici, non raro occasione subministrat. Utq; enim HIPPOCRATES frigidum Potum in Febris passim concedat: hic tamen notat texture nimis, quam Græcorum, aliorumque Regiones fervidiore inhabitantium, convenit: vid. POTERIUS de Febris lib. 3. cap. 9. Sic quoque rationem huius effectus, quod nempe et Potu Aquæ frigida sequatur Hydrops, ex obscuris Vasis Lacteis, eleganter reddit SYLVIVS lib. 5. Præc. 17. & cap. 50. §. 6. & 7. hanc, quod Mucus seu Pituita Intestinarum naturalis à calore vel Astita soluta, attenuata, & fluidior reddita, ex Intestinis in Vasa Lactea penetret; quæ postmodum à superveniente frigore, aut externo, aut ex frigore Potus seu Haustu frigido, denud coarctata, & incrassata Vasa Lactea & Melenterii Glandulas obstruat & infarciat; unde Vasa diffusa & rupta magis vel minus, Hydropi subitaneus sequatur, prout plures vel pauciores Lacteis hoc modo fuerint affecti: Vid. in specie SYLVIVS Tr. de Hydrop. & LOWEUS pag. 154. BARTHOLINUS Traill. de Vasi Lymphæ c. 7. SIMON HEINRICUS PAULI Ann. Med. pag. 89.

Ascites igitur hæc seu Hydrops Abdominis particularis in specie est collectio Aquarum seu Colluvies ferè & apud saltem in Abdominis quadam insigniore cavitare, idque subitò intra ocla fieri dicit, nonnisi quæ intret, cum Ascites Universam fecum accretat, Manus, Pedes & Artus omnes cum Manus hinc flaccide, molles, & succulente constabunt, primæque tumor est molli, post durus. Et non solum in ipso Abdomine colligitur Aqua; sed etiam infra duplicatam Peritonæam, cujus exemplum habet JOB van MECHREN in suis Observ. Chirurg. Belgicæ confectis, ubi intra cavum Omenti, ubi saltem Lympha flagrans intra parietum Vesicula membranosa in Melenterio, aut locis vicinis, Hydropem talem Abdominis repræsentat: quorum modorum apud prædictos bene inde leguntur observationes.

Verum præter Vasa Lymphætica erosa, & Lactes rupta, interdum liquoris alii Hydropi Ascites inferre possunt: Unde in una Causa Universalis quod Ascitem esse subulendum, sed omnes circumstantiæ probe expendendæ: v. g. ex Renibus affectis suppositum Hydropes generatur, adeo ut ex solo hoc fonte Hydropicorum Aquas deducat HELMONTIVS Traill. Hydrops ignotus, quod scilicet Renes non secretantes Serum, ab eis in Abdomen ex Renibus destillatione tandem supervenit Hydrops. Unde notum est, non tantummodo parcam & imminuat Urinæ in quamplurimis Hydropicis esse excretionem, & etiam non raro diffusus Hydropis ipsos Renes tumidos, & viscosè turgidos esse repositos: sic à Renibus turgidis & perspiratis, item ex Renibus emicratis, obortum Ascitem observat PLATERIVS Præc. tom. 3. pag. 139. & in obs. pag. 632. 630. & 638.

Potèrò alia etiam viscera Abdominis non raro etiam dant tumores ejusmodi & Ascites, ut non semper puros, sed potius Agnol-purulentos. Sic superius ex LINDANO habui exemplum Hydropi Ascitis pronati ex una Testicula, & c. Sic & Hydropem ex Testibus multatibus tumefactis oriri testat RIVERIUS in Præc. de Hydrop. BARBETTE in Anat. Præc. p. 152. dicit, quod Albuginis suppositis interdum supervenit Hydrops Ascites, quatenus materia viscosa & aquosa ex Tubulis uterinis in talibus subuldis in duplicatam Peritonæam infusa, cujus rei se testem ocularem efficassimam. Quo etiam facit exemplum prolians in Observationibus, Cætro Annem. LYSERIANNE, pag. 152. de Hydropem ex collectione obacata fertidè intra Cavitatem & Abdominis muscularis, ab Menses suppressis. Ascitem à viscera observavit DODONÆUS observat. cap. 34. atque PLA-

TERUS Præc. tom. 3. pag. 244. & ab Uteribus PLATERIVS l. c. 1. uti & BONEIVS Spæc. pag. 1095.

Ascitem particularem à Sanguine quod attinet, inquit subitò facta suppositæ, vel etiam extrinsecus facta in quodam loco Contusio, & ita interea coarctata partis læsio, ibique Sanguinis effusi facta Coagulatione, interdum ad hanc Hydropem disponit. Equalem notam est, quod aliter HELMONTIVS, dum derivat illam Hydropem ex Renibus; iniquitas ac circa quos Sanguis congruatur fuerit: colligitur; sicut etiam observavit Hydropem ex eugrammæ Sanguine. Interim hæc etiam non est universale, licet interdum vitium sit in Rene non rite emulgentes; prostantque alia exempla hoc confirmantia: v. g. in suppositæ Incisionem talem Ascitem particularem hic Lipsæ observavi, quæ nulla arte potuerunt revocari, copiosissime Aquæ in Omenti continerantur, quia Tumor circumscriptus erat circa Umbilicam: hevi post, intumescere Abdomine in immentam molem, concepit secunda vace, partumque edidit, denud lochia supponebantur, unde Abdomen magis intumescerebat, Candelæ lumen admodum translucebat, & suffocata Agra Abdomen sponte rumpebatur, & incredibili Aquæ copia evacuabatur. Præterea hujus rei se aliud offert exemplum, ubi ex contusio extrinsecus in Hydropicodro dastro in viro paupere, alias sano & robusto, Ascitem cum Tympanite particularem observavi; brevi enim post contusionem, Abdomine & ferat tumidis factis, tandem interit. Fortia hoc facit LOWEIVS experimentum Traill. de Cordæ Cæcor. 2. pag. 125. & 126. ubi similiter ex Sanguinis motu, ex Arteris in Venas impedito, Hydrocephalum ortum rececit.

In his Ascitis speciesbus Causa Remota est notabile vitium, occurrit aut in Chyli, aut in Hæmatosi. Nam materia illa, quæ cum Lympha simul colligitur, & stagnando tumorem ex celebratiori ferè inferit, nulli aliud, quam Chylus crassus, vitio depravat Hæmatosis collectas. Hic ergo Chylus, aut vitiosus aut Sanguini non assimilatus, ferè diluatur, ut in inferioribus locis locelli vel subulsi, ac dum simul Lympham inquinat, glandulas ac Vasa Lymphætica ubique obstruit, unde necessarii & Lymphæ flagrant, & periculis tandem Hydrops supervenit, progrediente succedente malo ulteriori, & Abdominis superiori potente. Hinc est, quod nimis Hæmatologia talis iniquatur Hydropi; sic observat MEARA in Enam. Fabr. Willig. pag. 10. Hydropem ex Hæmatologia nimis: sic SCHENCKIVS l. 3. observat, aliquot observat Hydropes ex diuturna & copiosa Narium Hæmatologia; item ex nimio fluxu Hæmatoidum, & simulque aliis nimis Hæmatologia; quia scilicet Malla Sanguinis nimis excretionem depauperatur, aut etiam, quando hic Hydrops succedit Morbus Chronicis, per cursum Morbi effectus hæc resista deficit in naturali fermentatione, unde inepta est Chylum ut assimilet, idque eo magis, quod hic ipse vitio stomachi suggeritur vitiatas.

Hæc est Ascites ordinaria ex Lympha sapius etiam ex Chyli crado, necnon Sanguine congruato collecto, orta.

Ceterum præter dictas interdum Extraordinarias & plarè singulares Ascitis reperitur Causa: Sic mirum quod refert BARTHOLINUS Cent. 1. obs. 74. de Hydrop Ascite subitaneo, ex pestilente diuturna Onchis graviori oborto: Item BORELLUS Cent. 2. obs. 24. observat Hydropem ex compressione nimia circa os Romachi; sed ut dixi, hæc sunt Causæ extraordinariæ. Non possum, quin quæ de Ascite Particulari habet LINDANUS super Hartmannum, proferam: hydrop, inquit, est duplex: unus ex causa frigida, alter à Causa calida. (Liquimus LINDANO hæc species, illamque ipse sensu abundare permittemus) Alie, inquit, est ab aqueitate & nimia Sanguinis dilutione; quia nempe Chylus nimis aqueus suppositatur Sanguini, qui in Sanguinem hinc convertitur inquit: Altera Sanguis, inquit, est à temperie calida, quando Sanguis caliginosus & ardens in hanc aream, qualis est, qui immediatè post Febris Ardentes sequitur. Hic posterior, inquit LINDANUS, vocatur hydrop Siccus; (videtur quidem contradidit, sed ab explicacione suspensata tollitur) prior vero vocatur hydrop humidus, qualis est, quando nimia macerant præter Abdomen. Nam, inquit, quæritur hic, quid sit hydrop Siccus Hippocrati in Soci. A. Aphor. 11. Omnes Aethores dicunt, esse intelligendum esse hydrop Tympanitidem, & sequuntur proferunt Galenum. Ego ex Hippocrate & aliis monstravi, esse intelligendum Ascitem, qualis est, quando nimia macerant præter Abdomen. Nam, inquit, quomodo? Sane dicit Ascitis frigida. Uno est, in qua ab Aquæ collectio non tantum inter tumores, sed etiam ferè tota & Pater, ubi interdum Pusilla aperitur, & effluit humor, & hac ordinaria est species: sed præter hæc videtur & species aliam;

aliam, ubi nullas nempe in Scroto Tumor, neque etiam in Pede, sed in Abdomine omnis humor colligitur, Pedes autem & reliqua Membra tumentur & moriuntur, ut squamas concipiant. Caput vero afficitur harenis, dentes est arida & ignavida. Et hic est hydrois Siccæ Hippocratis. Dicitur igitur Siccæ ab illa ariditate, quæ, & maris teras, & hydropica aqua sunt lata, quæ expurgatur. In hydrope Sicca Urina sunt styliada, inflat aqua pluri crassa. Inflat Pericranium, sed non habet illam crassitiam, sunt paucissima, & vis 2, vel 3, coheretaria, in ignem effatæ ardent. In Alcite vero Humida Urina sunt alba, pallide, & crassa, interdum non sunt afflati, sunt copiosa. Hæc LINDANUS. Exempla huiusmodi Afficit particularis videb. in Ipocie in HOECHSTEDTERO Decad. 10. Cap. 7. Obfer. 78. Et quibus patet, hydropem faciem cum apertis, qui fit ex vitio Melancholici, & imprimis Vasis lacteis; hydrope verbū hamidus, qui fit ex antecedente Hæmorrhagia, vitio Melle Sanguinem depravate, Hæc de Causis & Origine Hydropis Alcitis.

DIAGNOSIS.

Sequitur signa: Alcitis Particularis facili cognoscitur, falsum in eo Medicus sit cautus, ut artificiosa coniectura, & consideracione omnium circumstantiarum possit cognoscere, an in cavo Peritonæi? an in Omento, aut Utero, aut aliis similibus locis Aqua collecta continetur?

Dandus ferè medicus habet. Primam ejus invasionem præter signa Generalia in hydrope Universalis supra Sæll. 17. Cap. 3. Art. 3. recensita, prodiit Epigastrica regionis testis continuæ equidem, quam tamen Alimenta assumpta interduunt; malo vero ingravescente aut Abdomen successive intumescit, hinc Pedes & Scrotum, quando vitium hæret in ruptis Vasis Lymphaticis vel Lacteis Abdominis; aut verò frequentius inchoat Alcitis, ita ut prius pedes intumescant, & hinc tumor successively ascendat, & Abdomen occupet, tandemque perfectum Alcitem inducat. Et quidem, quando Pedes intumescunt, ut plurimum non sola Aqua, sed simul materia quædam crassior, ac ipsius concurrunt, adeo ut non solum tumor Scrolosus, & Aquosus, sed simul sit tumor Cæmetosus; uti fit quando in Cachecticus vel diuturnis morbis sequitur hydrops, & ita ascendente sensim tumor talis Cæmetosus, donec Abdomen occupet. Superiora e contra, nisi Anasarca adveniat fit, contabescunt, quomvis extrema Mammæ ob Pulmum debilitacionem aliquantulum inflantur. Æger in latos conversos fluctuacionem quamdam Aquæ inflat, interdum etiam murmur percipit, intumescit magis Latere, in quod incombuit; & quod magis inuemicit Abdomen in Alcitem, id magis contabescunt partes superiores, nisi quod interdum ad extremum, ut modo dixi, etiam Manus inflantur, & tumentur.

Supervenit tandem dyspnœa respirandi admodum molesta, præcipuis ab Alimentis assumptis, propter Diaphragmatis liberum impeditum motum, imò interdum Orthopnoea, ita ut Æger non, nisi Corpore erecto, quiescere possit. PLATERUS in obfer. dicit, quod Dyspnœa nocturna prænuociat Hydropem Alcitem s in ipso verò Alcitem fit Dyspnœa continua.

Interdum & sitis est admodum intensa, idque tunc imprimis, quando vitio Melancholici ruptis Lacteis fit Hydrope Alcitis; interdum sitis est parva, quando Massa Sanguinea est vitata Hæmatosi est gravata copiosis succis crudis, (non enim omnes Hydropi sitiant;) Tæstis etiam Sicca supervenit, aut, quæ in principio advenit, notabiliter augetur.

Ad hæc attentus sit Medicus, ne confusam Alcitem Particularem cum Graviditate, nam quod interdum cum hac confunditur, patet ex exemplis; sicuti hic navi Medicum, & etiam Hæle Saxoniæ, qui Gravidis pro Hydropici curarunt. Si quidem, & Mulieribus Gravidis subinde copiose Aqua intra Uterum colligitur, in quibus natat Fœtus; sicut etiam si semel nunc ante nunc post medium Gestacionis tempus Crura non raro tumefieri assolent, idque tandem, donec superveniat Partu mediastibus locis successively subsident. Ne ergo fallamur, nec famæ & Arti detrimentum concilietur, probè observentur signa quadam distinctiva, quæ inter optima sunt, quæ proponit LINDANUS, qui dicit; quod Hydrope degenerat in Graviditatem.

1. Ex Calore Faciei vivido & bene habito, qui est in specie in Gravidis, & cæteris paribus sanis, magis floridus, vividus; Hydropice verò malè se habent, sunt ut plurimum pallide, colore livido.
2. Distinguntur invicem ex Tumoris specie: æquidem in Gravidis Tumor Abdominis magis ad Præcor-

dila & sursum versus prominet, latera autem sunt cava, æque inæqualis, nulli, quod tamen raro, gerant Gemellos, tuos enim etiam Lambi sunt dæmoni; & in Ipocæ tunc magis ad Umbilicum & supra Umbilicum exurgit primo Gestacionis tempore, sicuti ultimo versus interiora: E contra in Hydropice totum Abdomen, etiam Latera, & Lambi, tumidi sunt, & magis inferius accumbit Tumorem post medium Gestacionis tempus.

3. Si Mater præcipitur aliquæ, nempe Fœtus, Graviditate præsumptio patet.
4. Denique certum & optimum signum est falsitas, sic nempe interdum Hydropi, quando se movent & possunt, percipiunt aliquam fluctuacionem in cavitate Corporis, quæ deest in Graviditate. Interim tamen fluctuatio non semper Hydropem Abdominis comitatur; quando enim Membra Peritonæi ex spatio est distenta sine fluctuatione, solent ibidem Aquæ contineri.
5. Orati in Gravidis, ut ut ipse malè se habeant, ut plurimum tamen potest esse fulgidus & clarus: In Hydropi vero nitor oculorum perit, ipsique apparent quasi coniti, lividi & sic porro. Vbi si Hydrops est siccus, oculi interdum apertissimi sunt fulgidi.
6. Porro anas in Gravidis non sunt aquei coletæ, & in Hydrope.
7. Hydrops admodum Naturam seu Membre præmi, quod non fit in Gestacione tantus.
8. In Hydrope, quo se convertunt, eo dilabitur in & Tumor; quod non fit æquè in Graviditate.
9. In Hydrope Menses interdum aqueos fluxum: Gravidis non, aut rariss.
10. In Hydrope laetæ Afficitur, in Gestacione non est prostratus appetitus, sed optime ut non raro.

Plura signa Prognostica distinctiva supra, ubi & in universali regimus, videri possunt. Quibus probè abstinere, via fillette post Medicum Hydrops.

PROGNOSIS.

Quod prægnosia: levior & minus periculosa est Alcitis Particularis, quam universalis, & facillime curæ, modo maturè Cura instituitur, ne occasione mentis Gestacionis viciatæ interiora Abdominis indicant, & si sit corruptelam disponantur; tunc enim per aciem letalis fieri potest Alcitis.

Alcitis Anasarca supervenientis melioris spei habetur, quin si ille solitarius fuerit, id est, propter Tumoris Viscerum Abdominis, v. g. Hepatis aut Lienis, aut propriæ Lactis, & Lymphaticæ ruptæ contigit; cum prioribus causis continens & Procaudica sicut tollant ut imminuat, posterioris verò utraque difficulter admodum aut plurimum incurabili casit, aut licet curatiorem, tamen subinde deorsu renascitur, & talis Hydrops e contra deorsu renascens letalis est, uti habet HIPPOCRATES in Obfer. Censis, item DEODATUS in volum. pag. 160.

In Hydrope post Cachexiam, & similes Morbos diuturnos Drilissimum nigram lethalem pronunciat PLATERUS in obfer. pag. 670.

Hydrops ex perverſe Purgantium usu admodum periculosa est, quia hæc admodum inquinant Massam Sanguineam; uti hoc habet POTERIUS Sect. 2. c. 20.

Hydrops post Febrem leviorē ortus, non est ut periculosus, nec adeo curatu difficilis, quam qui a septa vadit.

HIPPOCRATES Aphor. 43. Sæll. 6. hæc habet obervationem: Qui Lienos Dysenteria corrumpant, si Diutius diutius durante hydrope aut Lienaria superveniat, & morietur. Expositionem huius Aphorismi habet SENNERTUS in Praxis, cap. de hydrope, quæ latè est accurata.

Porro, quod minus arripit copia excrementi, tandemque est hydrops, quæ iterum copiosius augmeatur, sicut etiam dicit CÆLUS, tunc denum in Hydrope secundam valetudinem sperandam esse, cum plus per Urinam excrevit, quam fuit assumptum per Os. Nam optime Hydropi curantur per Diuretica.

Hydropi supervenientis Tæstis, malum, inquit HIPPOCRATES Sæll. 6. Aph. 35. Sæll. 7. aphor. 47. & M. A. R. G. Ann. 4. & 5. obfer. 148. p. 168.

Affectus vel Mænia in Cruribus erumpentes lethales sunt, observantur etiam hoc HIPPOCRATE in Epidemio.

Hydrops, qui oritur à *Portum urinarum*, Reum Urinum, Vescicæ, &c. ruptura aut euacuatione, ut plurimum lethalis est, nisi partes hæc celeriter coalescant, aut ariana per Ulcus Abdominis effluat.

Si Ascitis Aquæ à propinqua Medicamentis copiosè & cum euphoris evanescat, ac Venter detumescat, aliqua curatio spes est; sin vero medicamenta hæc nihil aut parum evacuent, sed viciat inde irritata cum abdomine magis intumescunt, omnino desperandum erit.

Thesauris particularis, in quo Aquæ intra Corpus membranulosum, Ommentum, Peritonæum, Thoracem &c. collectæ, cum eo Regri plures annos, cæteris paribus, sani manere possunt.

Tametsi *Stroph Actuum* particulares vix, nisi aliis superveniens morbus, lethalicum inferunt, ut eorum unus alterius difficultas, vel ratione Cause, vel aliarum circumstantiarum, sanetur.

Tandem *Hydrem interarum* Hydrops nunquam periculo vacat, sed ut plurimum sanatur exitu.

Hæc de Signis Diagnosticis & Prognosticis in genere & in specie. Ubi adhuc observetur: in eugestionis ascitis maximum haberi rationem *sanarum antecedentium*, in quibus legitime cognoscendum cado totius Causæ consilium. Et hoc est, quod reddit Medicum erudium, nempe iudicii viam cognoscendum afflicti & causis: de hinc in *Medico preferam iudicium memoris*.

Habituam Theoriam Hydrops in genere, & in specie superscripsi præcis.

C U R A.

In Causa Ascitis huius particularis attendendum est

1. Ut *Aquasitæ collecta*, quantum fieri potest, evanescat per viam, per quam evacuatio commodè, & cum mediis Regri euphoris fieri potest.

2. In Vasis Lymphaticæ, & Lactis salsæ Obstructione solvantur, vel *Excretæ* illorum consolidentur ut & *Sanguis granulatus*, si adell, maturè dissolvatur.

Præter hæc per *Purgantia*, Bile, utut raro, *Sudoriferæ*, & *Diuretica* *Diuretica*, annuum optimè per Abdominis Paracæ mefiam, modernorum more cum Acæ argentea faciendæ, de qua vid. BARBETTE in *Chirurg.* utilissima, & tutissima est hæc Operatio, præsertim in hac Hydrops specie, modò maturè instituitur, antequam colluvies excrementitia discursu resectione interrumpatur, & partes contentas solida hinc inde: modo etiam *Emollientia* sponte aptum talem Hydropem curat. Posterius fit per *Salsa Diuretica*, vel volatilia vel fixa, v.g. *Acetum Duplicatum Myrsinæ*. Sudor via alio Hydropem in Hydrope Universalis seu Anasaræ convenit. Simil tamen etiam Causarum antecedentium habenda est ratio, eaque variæ, prout scilicet eadem sunt diversæ; ut plurimum tamen *Morbus viscidus* vasa Lymphatica obstruens, & Lympham incrassans, incidendus, dissolvendus, & fluatilis reddendus. Uterius promovetur *consolidatio*, quæ sponte succedit, quia talia vasa, quæ rospermatice chylo nuctuata, sunt glutinosa, & sponte coeunt. Sed in specie, quoad hanc medendi methodum, vid. SYLVIVS l. 1. Præc. cap. 17. cum cons. SEN.

NERTUS. Quod si vitium Sanguinis congruati, aut aliâ causa collecta, morbum intulerit, per *Appropriata Naturæ* succurrendum, de quibus supra.

Remedia, quæ huc Scopo satisfaciunt, ubertim nota sunt et Ascite universalis: Hinc enim ex purgantibus convenit *Ziatrium*: c. 6.

24. Ziv. Ziatri. gr. 24.

Ref. Jalapp. gr. v.

Ext. Trach. Alband gr. i.

Olei destillat. Succ. Jalap. gutt. ii.

Cam. C. Malvar. Junip. & Pilule.

D. S.

Pilule Purgantes.

Vel

24. Succ. Iovæ mstr. per rosâ depur. 35. vel 3vi.

ad 3i.

Aqua Cinnamon. 3ii.

Syr. Pilear. 35.

M. D. S.

Succus Purgans pro una vice.

Vel

24. Aqua Præpar. 3i.

Pat. Jalapp. 3i.

Tartari vitriolat. 35.

Syrup. Rosat. solut. 35.

M. S.

Potio Purgans pro una vice.

Ex *Diuretica* Sal Gensilæ, Scipiam Falarum, Spiritus Tartari volatilis emittent: In specie in Hydropse loci Ascite particulari Nitrum & omnia Nitratæ sunt optima in tali caso, imprimis quando post Febrem vel in Febre ascitis talia supervenit subito, optimum tunc est Nitrum crudum probè depuratum: in pota quotidie assumitur in magna dosi ad 35.

Ex *Sudoriferis* verbè volatilia quæcumque in iuncta Tympanite. Præ cæteris Spiritus Nitri dulcis, & hinc Spiritus Carminativus de tribus, miræ sunt efficacie: BORELUS cæter. 4. observ. 16. Sanguinis humani Eliæte Hydropicos his curavit desperatos & conclamatos intra tres dies, 35. qualibet vice propinquas pro tres vice.

Quod *Externa*: habituam hæc *supra* in *Hydropse universalis*.

Fit etiam mentis apud praticos Hydrops per colligefationem, seu in quo Sanguis in Liquamina ferola fatiscit, de quo iam *superius* ex LINDANO quædam allegavi. Et est ille Hydrops, qui v. gr. Febres ardecentes immediatè sequitur, in quo extrema gracilescit, Abdomen contra intumescit. Talem Hydropem nomine Hydropsis Sicci ab HIPPOCR. lib. 4. Aphor. 11. insinuari afferunt. Rarus est hic Hydrops, & in eo curande observandum, quid nulla purgatione conductum, sed una & simpli Remedio, nempe Nitro probè depurato, tales Hydropicos curandi sunt, dando nempe quotidie solum Nitrum in Vina Rhenana, ita ut quotidie Nitri 35. absorbant, idque per 24. horas, nempe unum semel & semel, sed partibus vicibus, & quoties aliquid doluit, Nitro depurativum 35. addi debet, & ut præterea agendum. A Purgatione abstinendum: quoniam enim magis exasperabit, ranti magis non intumescunt, & Latius ad magis indolis subdantur & inflammantur, sicut in Diabete. Temperandus est Sanguis Nitro; hoc enim sedat sitim, temperat Aluum, & cit Urinum. Et quando hæc in tali Hydropse post Nitri usum non amplius sperandus, signum est præparandum *supra* vel Malt, & Ager in decantatione Marti consistatur, doneque spiritus datus bene aliqum conditum turbetur, & coalescant. Vid. LINDANUS.

ARTICULUS III.

De Hydrocephalo.

Intet *Hydropes Particulares* eminet in specie post ascitem *Hydrocephalus* seu *Hydrops capitis* (G), quando nempe colligitur Aqua in Iphera Capitis. Interim *Hydrocephalus* hic ratione *subijci* immediatè, in quo colligitur Aqua ordinariè solet esse triplex:

1. Prima species est, quando Aqua colligitur *inter partes cutaneas & cranium*.
2. Quando Aqua colligitur *inter cranium & ipsum cerebrum*, live sit *supra* live *infra Meninges*, in specie duram.
3. Tertia species est, quando Aqua colligitur *in ipso Cerebro*, speciatim in Ventriculis Cerebri, nimis copia cerebrum & ipsam Calvariam distendens, & ita *Hydrocephalum* infolens.

Præter *Hydrocephalum Exempla* sunt frequentiora: ratione autem illa quæ *Hydrocephalum* intercranium talem demonstrant, utut huius primus mentionem fecerit VESALIUS de *Struttura Corp. Hum.* lib. 1. cap. 8. de Puella, in qua Cerebrum à collectis Aquis omnimodè excavatum & singulariter distentum fuit. Præter hunc simile exemplum refertur à TULPIO lib. 1. observ. cap. 24. item cap. 25. de Putro quinquenni, *hydrocephalo* mortuo, in quo B. v. Aqua in capite inventum fuit. Cerebrum autem amissa figura globosa, induratum figuram conæ veli Fornicis, & ab exuberante Aqua adeo fuit distenta Medulla ipsius Cerebri, ut illar Membrana: utriusculæ adhæresceret Cranio, manentibus tamen semper salvis operibus Naturæ: Id quod fit, live in utroque ventriculo seu latere colligatur Aqua, live in alterutra solum medietate Cerebri Aquarum *Hydrocephali* collectio fiat; cujus exemplum videb. in TULPIO cæter. 2.

ob.

(G) Ab *idæ*, aqua, & *cranio*, caput.

differs. 25. Hydrocephali nempe dimidiati capitis, in co-
tus Cerebri altero Ventriculo ultra Biv. Aquarum tam
lit. Quae indoluit fuerunt, ut altera Cerebri pars plant illa &
utroque periferet. Illustrat hoc NICOLAUS
STENUS in *Antonie Capitis Vesiculi Hydrocephali* illustrata
vid. VAN HOLIOLINUM *Ad. Med. Ruffa.* vol. 1. pag. 249.
§ 19. Ceterum *differs* hanc Hydrocephalo imprimis sunt
omnino, quia in illis Ossa Capitis teneriora, quae non sunt
suturae fronsque iuncta, facilius bulant, & ob molliorem
talem obsequentia facilius diffunditur, unde Aqua facilius
colligenda cedunt. Alias raro observatur Hydrocephalus
interius in *Adultis*, in quibus propter Ossium Crani firmi-
torem compagem Suturae cedere nequeunt, adeo ut po-
tius alios Morbos Aquae in Cerebro collectae inferant. Non
tamen penitus deint: vid. HILDANUS *Ann.* 3. *observ.*
48. Nam Puellam Hydrocephalo notat PANAROL-
LUS *Ann.* 3. *observat.* 74. septimo anno percutem, in
qua Aqua per quidam Suturae dilatatae, partim per Cra-
nium perforatum egressa erat: ut eam extra Cranium
partes in adultis immiscere posse in Hydrocephalo extra
dubium sit: Sic PISO in eleganti scripto *de callum fressa*
notat Hydrocephalum in Puella 22. annorum, semel atque
iterum periodice recurrentem: ZACUTUS LUSITANUS
lib. 3. *Prax. Admirand.* *observat.* 12. Rispendum refert Hy-
drocephalum curatum in Viro, cuius Caput Caput Bovis
aequavit. In Infantibus etiam interdum vitatus in Utero
materno Situs (quando Embryo nimis cito se vertit) ad
Hydrocephalum disposit, quando nempe Infans cum capite
diutius Ossi Pubis insident, in quo posito interdum ad
aliquot septimanas observatur; Et hac enim occasione in-
cerdum in ipso Utero Matris, ex impedito Lymphae reatu,
in Capite Infantis collectae Aquae Hydrocephalum infer-
unt, qui propter molem Capitis necessarii partum diffi-
cili efficit; quam Causam urget PLACENTINUS in *ob-
servat.* sicut talia Exempla duo observata fuerunt Uratisla-
viae. Aliis *Imaginario matris* quoque signando Foram,
Hydrocephalum inferit, teste HILDANO *Ann.* 3. *observat.*
3. uti etiam MARCELLUS DONATUS *Hystor.*
med. mirat. refert l. 2. c. 1. quod ipsum gravissimum est ma-
lum, quando Hydrocephalo laborant Infantes, dum adhuc
in Utero Matris constituti sunt.

CAUSAE.

Causam Proximam quod aetinet; solet esse *Lympha stagnans*
in praefatis locis, propter eandem naturalem distributionem
impeditam, ex obstrukione Vaguum Lymphaticorum
nunc extra, nunc intra Cranium oriunda. Adeoque
hic ad Lymphae ductus respiciendum est, ut non tantum
videt PAULI in *Anat. Antea. Diffusa* pag. 85. sed vel ma-
ximè confirmat HERTODT in *Croquis* pag. 28. de Patro,
Hydrocephalo mortuo, in quo valia Lymphatica
Cerebri partim turgida, partim rupta visa. Interdum prae-
ter Aquas solas etiam Flatus simul colligi solent, qui cum
Aqua Caput diffidentes Tumorem Hydrocephali insigni-
ter augent; sed raro oriuntur tales Hydrocephali. Interdum
per artem agrytæ inducunt *hydrocephalum artificiale* per in-
iustitiam Aquae parva Nucha intra Cranium & co-
tim capitis.

DIAGNOSIS.

Signa Hydrocephali sunt facie manifesta, quia *conditio*
et *circumscriptio* Tumoris facili rem innotat, ac vel visus
vel tactus malum patet.

Differendum autem imprimis: an *status an verò haer-
sit* Tumorem Hydrocephali inferant? si enim Flatusque
an status peccant, nunc solium, nunc committunt cum Aqua,
solet adesse insignis coxis diffusio, ut caput leviter palpa-
tum inflat Tympani cunclam resonet. Deinde si digito
prematum tumor, non recedit, aut recedit nonnihil,
ad primum tamen statum illuc redit. Si vero est ab bu-
more solo, & quidem extra Cranium collecto, cognosci po-
test ex condicione Tumoris; videtur enim cutis mollis,
caput quasi splendescens observatur, & candela admodum
translucet, periculum nullum edit sonum, & facili digito
prematu credit, nec fluxum ad statum primum revertitur.

Quod si verò *inter cranium & cerebrum* coarctatur
Aqua, Tumor non est ad tactum adeo mollis, nisi valida
hat compressio, ob flantibus nempe Offibus; in specie Frons
ipsa quasi extra protrusa est, Palpebrarum tumor, oculi
tumidi extra orbitas quasi promine videntur, sex via
intra orbitas retinentur, simul etiam frequenter lacrymantur,

concurrunt insignis omnium sensuum hebetudo, & ad foun-
nolentiam inclinatio, cum dolore capitis tenso.

Quibus succedit temporis tam in Infantibus, quam inter-
dum in adultis, accedit *capitis intumescens ac maior* reliquo
Corpori minus proportionata, & saepe vi creditur, quae
exemplum HILDANUS *Ann.* 2. *observ.* 10. recenset.
His abscentibus circumstantiis, rumente nihilominus insi-
gniter capite, suspici est, in Cerebri Ventrículo radice
egisse Hydrocephalum.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*; difficile est malum & periculosum, mi-
nus tamen periculosius est *Hydrocephalus externus*, seu supra
cranium, & facili curatur. *Internus* vero, seu intra cere-
brum, periculosus est, & plerumque malum incurabile, quia
superveniente Lethargo, aut Apoplexia, aliisque gravissi-
mis affectibus, Aegri moriuntur. Intra cranium, & cere-
brum collectae Aquae subinde, utut raro & difficulter, cu-
rari solent.

CURA.

In Cura.

1. Ante omnia *Aquae sunt evacuanda.*

2. Caput ac Cerebrum Aromaticis volatilibus appo-
pitiis roboranda.

Quoad *Evacuanda*; hinc sunt vel *interna*, sensibilibus et
ethaerentis: vel *externa*, insensibilibus discutientia; vel
Media Chirurgica sed Cuiusmodi vias praeficienda.

Interna ergo, quae *evacuata*, sunt omnia Hydragoga di-
cta, in Hydrope quocunque usitata, quae pro robore in-
ferenti patientis determinanda, & praesertim in Infantibus in
quibus saltem miora & temperata usurpantur: e. g. *Mor-
ruis dulcis* gr. vi. cum syrupo Rosarum Infusivo, aut syrupo
de Rhubarbo, aut de Spina cervina, aut Manni, qui
tantillum succi & syrupo Rosarum sollicitum admittum est; im-
prodest blandum Infusum & Sympus ex mediano Cortice
Sambuci; seoti adultis generosior *Laxativo*, & eadem
quae in acute in us sunt, conveniunt, v. g. *Elaeum*,
vel post hoc succum radices Ireos recens, etc. *Clyster* etiam
tam Infantibus, quam adultis mirè conducunt; sed si sit
acres, & fortiter stimulant, v. g. ex radice *Beryonis*,
Ireos, Soidanella, Gratiola, Cortice Sambuci, & simili-
bus. Sic D. MICHAELIS aliquando Famulum coisidum
mercatoris huius loci Hydrocephalo laborantem Clysmatis
salsis ex ferre stimulantibus, & Aquas potenter eva-
cuantibus restituit. Laboraverat autem aqua Hydrope in
partibus inferiuribus, quo soluto tumor quasi ad caput rap-
tus fuit, ita ut non tantum Cutim valde distendit, sed &
oculos ex cavernulis foras protruderet, quin & Organa
aliorum sensuum laederet, & idem Bruti ad instar in sedem
jaceret: Sed iussu D. MICHAELIS *Clyma* sequenti appli-
cabatur.

℞. Herk. Salsodan.

Gratiol.

Fel. Eboli.

Astri ana M.ß.

Flor. Sanch.

Oreil.

Perfor. ana p. ii.

Cortic. Iurr. Sanch.

Frangul. ana ßß.

Rad. Iurr. asprat.

Bryon.

Ehila ana ʒiij.

Pulv. Colocynt. ʒi.

In Urina *Puræ* coquebatur; quo applicato, *fistula* simul
aliis faciendi, sanitati restituitur.

In Infantibus Clysther blandiores injiciendi sunt. Cum
his simul interne vel tinctura Tartari Infantibus ad gressus
s. commodè propinat pro stimulantia Urina; aut spiritus
Tartari volatilis, & quocunque volatilis ex Tartaro pro-
pter vim diureticam & penetrantem ad promovendum Uri-
nae fluxum commotè misceri possunt, viget etiam *spiritus*
Paracelsi ad *Hydrocephalum* ex Tartaro, Viçriolo & Radice
Vincetisnei (vid. HARTMANNUS) quocumque univer-
sate remedium est in Hydrocephalo; quem egregie com-
mendat POTERITUS *com. 2. observ. 2. cap. 11.*

Ceterum cum his Internis simul usurpanda sunt *Externæ*,
eque primario *Diffusivæ*, & tumorem insensibilibus *Re-
folvendis*, vel sensibilibus *Evacuandis*. Inter illa sunt *Cata-
plasmata* & *Fomenta* ex Aromaticis discutientibus, sicut &
Chamomilla, *Melissa*, *Artemisia*, *Stachys Arabica*, *Calame-
tha montana*, *Rosmarino*, *Allyssum*, *Origano*, *Pulegio*, *Cam-
ph.*

na, Sepilla & similibus, quibus Fatina Faharam, Fatina Lymphorum, Sercus Columbum, Caprillum, Semen Amu, & Camini, ac similia, commodè addi possunt.

Conveniunt etiam Olea Discentium, & Oleum Chamomillæ, Oleum Anethum, Oleum Laurinum, & similia. Hinc uin expectum est præstans Oleum seu Linimentum FORESTII lib. 3. Chirarg. Obf. 7.

24. Olei Chamom. unij. 3ij.
Sulphuris pulv. 3j.

Probe invicem mixtus, & digestione unitis, constituitur Linimentum.

Hoc diu continuatum externè tilium, insensibiliter emollit & dilatat Hydrocephalum: cui si addatur aliquot guttes vel 3j. Olei dissoluti Camini, vel Sarcini, vel alius Theriacis addatur Balsam Sulphuris Theriacinatus aut juniperis, erit Unguentum ob penetrantius. Imo nullum est dubium, quin ipsum Balsamum Sulphuris vulgare terebinthinatum, aut, hoc nobilius, anisatum, blanda manu igitur, potenter sit Hydrocephali diffusivum. Tandem AVICENNÆ & RODERICI à CASTRO Remedium fuit cochleare recutes in decocto quodam Cephalico, e. g. Scedrachis arabicæ, calamithæ montanæ, &c. contusæ, & in furma cataplasmati capiti applicatæ, quod & ipsum remedium modernorum experientia comperitum est, & in seroti tumore aliis mirabile est; item cataplasma ea cochleis contusis cum Pulvere Sercoris Capilli & Seminis Carvi. Conf. etiam M. A. N. C. Ann. a. Append. pag. 46. Tandem quoque *opus ex Lixivia Calcis viræ egregium admodum est remedium in discutiendo Hydrocephalo*, & quibuscumque tumores Serosi in partibus externis, qui scilicet in Puerorum Hydrocephala AQUAPENDENS usus fuit, & vix similem sibi habet. Facit huc illa Historia, que profluit in Observationibus Cætre Anatomice LYSERII anarisi, ubi profluit Hydrops Vulvæ in Ancilla quodam curatus simpliciter per Lixivium Calcis viræ; unde etiam in Hydrocephalo Lixivium hoc est egregium, & merito à SENNERTO commendatum Remedium, nunc quidem illud simpliciter & solum adhibetur; nunc verò, si in eo præstibatur Sulphur & Nitrum, quo decocto percutat caput suavit, ut dispareat tumor. Quia & huc Aquæ Calce viræ quodam Aromaticæ Cephalica, ut Rosmarinus, &c. infundantur, & Fomentum magis appropriatum reddi potest. Denique *essentia Rosinmaria, Salvia, Myrris*, & pro ceteris Lixi crebris repetendo, ad discutendum Aquas à quibusdam adhibentur. FORESTIUS in *lucis superæ* Pueris recitas nisi Hydrocephala correptis sula Oles Hyperici totius Inundatione, addita Pulvere Myrris, acylium attulit.

Hæc insensibiliter discutientibus, & similibus remediis irritis, ad *fellium Chirargiam*, ut sensibiles eraculentur Aquæ accedendum erit; obque in specie in Hydrocephalo Externis: id quod præstat imprimis *fellium*, quod sit in loco tumore maximo emittente, nunc per signum Crucis, quæ literæ V, nunc literæ H, de qua variorum inde in Chirurgia, in specie HILDANO *Comar. p. observat. 37.* annotanda videatur, qui consilium, *in Internis* verò, qui cerebri ventriculis occupat, & hinc extorulum plus minus fertur, periculosissima est, testu HILDANO *l. ubi* observat, & experientia testatur, non *semper* sine periculo illam Hydrocephali *fellium*, quæ mens Ganglionem, aut etiam mores inpermanat. Quia verò est intra cranium, & cerebrum, nonnulli caute, & perquam circumspicienda *fellium*, tractandus venit, observando cautelam, ne unica vice nimis exauriat. Conf. hic M. A. R. C. S. AURELIUS SEVERINUS in *lib. de Difficili Medicina*.

ARTICULUS IV.

De Hydropse Pectoris.

PRÆTER Caput, ut dici, interdum etiam, sed raro, Hydrops Pectoris observatur, quando nempe in cavo Pectoris fluctuat Aqua, vel Lympha plus minus copiosa, eaque Hydropem infert. Affectus quidem hic non semper est obviis, interit tamen hinc inde apud prædicos huius observationes profluit, in specie multa huius *Exempla* egregia, & curiosa observavit PISO *Tract. de Colluvie serosa* Conferatur etiam WILLISIUS *Pharm. Rarior. Volum. 2. fell. 1. cap. 13.*

Hæc huius Pectoris particularis *causa* sunt eadem, cum aliis Hydropis speciebus. Nempe nunc vitium est in Vasis Lymphaticis, & Lacteis, per quæ, impedito Lymphae motu, huius ex vasis rupis ac cæci effusus in Thoracem, & hinc collectus, supervenit; unde frequenter ex *Hydantibus* in Pulmone observatis Hydrops Pectoris natus fuit; Vid. BARTHOLINUS *Cons. 2. Hist. 66. Nam*, & hoc Lactis pariter, & Lymphæ Pulmonum, tam quæ ad Pericardium tendunt, quam furculos quodam ductos, subinde primario consideranda esse, non saltem confirmatur à BARTHOLINO *Cons. 3. Epist. pag. 327.* sed etiam imprimis à WILLISIO *Pharm. Rarior. 2. pag. 161.* Vel vitium est in massa sanguinea, quando v. g. simul cum Hydropse universali, vel cum Hydropse annuum partium inferiorum, simul etiam conjungitur superuevans Hydrops Pectoris: quia etiam ad maiorem Lymphæ copiam & Hydropis incrementum multum conferat Habitatio Corporis magis vel minus cachecticus, ut & vitium reatum, & aliam causam in Hydropse universali observabiles, nullum est dubium. Curialia, & singularis observatio hoc in punctu est MEARÆ in *lucis Hydrops Medici rarioribus* pag. 153. Hydrops nempe Pectoris ex *diffusa Hydræ* aborti. Sanè jam olim LAURENTIUS in *lucis Anatomie* observat singularem quendam consensum Pulmonum & Pectoris cum Testibus, adeo ut ipse notaverit à Tussi diuturna & vehementi ortum *Hydræ*; unde hanc controversiam de consensu Pulmonum, & Testium decit *l. a. lib. 2. Obf. 5. pag. 572.* Quia hæc in Hydropse Pectoris nunc in utraque Thoracis parte, nunc, utut rarius, in altera *apud medietate* hæreere observatur.

DIAGNOSIS.

Quoad signa Hydrops Pectoris: præcipitur in hac aptissimum in cavo Thoracis *Dolor* gravans ob materiam quæ abundantiā, & plerumque illud cum Empyemate commune signum, nempe Aquæ fluctuantis *sonitus* ubi scur, in imo Pectus, dum *Æger* Corpus movet: Que tamen materia fluctuans in hoc à pure distinguitur, quod hoc Inflammationis præcedat, illam verò non: hoc quoque brevius, illa diutius utramque, observatur. Cum Empyemate hoc quoque commune Hydrops Pectoris habet, quod ab Epithematum, aut cataplasmatum calidiorum applicatione angustia Pectoris intendatur, uti WILLISIUS *Pharm. Rar. P. 2. pag. 335.* confirmat; quæ tamen angustia Hydropis ab Empyemate per signum magis recentia distinguitur.

Tussis est fæta, cum nil externi queat, *Respiratio difficilis* & frequens, subinde turgit *Orthopnea* (quod signum pathognomonicum cum PISONE de *Morbis ex Colluvie serosa* lib. 1. fell. 3. cap. 7. RIVIERIUS *Præf. lib. 7. cap. 3. refert*), ita ut *Æger* non possit decumbens respirare, & imprimis vesperi ac noctu, ut & primo morbi tempore intendi, post mediam veru noctem denovo remitti observatur. Vid. BARTHOLINUS *Ar. Med. Hæstæ. Vol. 2. pag. 297.* quin etiam, dum in somnum inclinat, subitaneò quasi *Terræ* correpti denovo evigilat.

Pathemata hæc nunc in *ita Pectore*, quando reum est cavum impletur, nunc in altera saltem medietate præcipiunt.

Interit *tumor* Pedum supervenit, & si tumor cessat, *Mores Appetitus* præsternatur, inde tumor Pedum & *Palpitatio Cordis* supervenit, & imprimis, quando Corpus antea, riora versus moveatur, angustias insignes Præcordiorum præcipiunt, subinde quoque *Fæbrilis* accedit; vid. in specie PISO *c. 1.*

Tandem bi interdum iungitur unius vel alterius *Brachii Dolor* atque debilitas seu relolutio, cujus Phænomeni causas idem PISO *l. a. pag. 293. & 297.* explicare conatur.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: Hydrops Pectoris & Pulmonum, quia nonnulli à rupis Vasis Lymphaticæ ac Viscerum huius Ventris induratione dependet, Organa Vitalia & Respiratoria immedie afficit, periculosus est Affectus: imò brevis suffocatus, præcipim cum Pulmones cordi agglutinet, & *Pulsum Cordis*, vel ut causam, vel ut productum marbofum, comitem habeat. Hinc grave & periculosum malum est, & raro felix & faustus omnis, quin sapienti ad mortem deducit *Æger*.

Et licet idem affectus, siue Medicamentis quibusdam curas

ratus fuerit, live post apertionem Thoracis Aeger levamen fenerit, non tamen est adeo diuturna allevatio, quin recidendo male Ager suffocari incipiat: Vid. TULPIUS lib. 2. observ. 16. RIVERTUS Cent. 1. Obs. 11. & SALMUTH cent. 2. observ. 4. & 16. nisi saltem lateris Valis Lymphaticis minoribus, ac Visceribus integris contingat, & materia pecans per Ulcus Thoracis sensim effluat, qualem observationem WILLISIUS Pharm. Ration. P. 2. Bell. 2. cap. 13. perhibet.

At magis letalis est Hydrops Pectoris, qui Anasarca aut Astiti supercrescit.

C U R A.

In Cura facillimes sunt Indicationes, & ante omnia cavenda & vitanda sunt Aqua, & fermenta seu putrescentes partes interius Pectoris.

Pro Evacuacione conveniunt eadem, quæ in Astiti, tam Pharmaceutica quam Chirurgica. Quoad Pharmaceutica evacuat Aqua per Purgantia, Diuretica, & impeius per Indurifera. Pro Scopo Purgantia conveniunt ea, quæ in Aci-

te universali & particulari curando fuerint laudata; & primis fuerat Bryonia, & hinc fuerat Iruo nostrate laudari solet: Vid. HARTMANNUS in Prax. Chym. RIVERTUS cum facit Bryonia curavit aliquot Hydropes Pectoris, necnon Calamitane suos, & c. Mercurio dulci & Scammonio sulphurato mixtis: vid. centur. 4. observat. 3. Conf. & WILLISIUS c. 1. pag. 269. Possunt etiam dicere Aqua per sudorem aut Urinam, quantum fieri potest, evacuari, hinc ea quæ sudorem movent, sunt optima; & cum beneficio Dorsali trahiendi in Seno Hydropem Pectoris curavit RIVERTUS centur. 4. observat. 31.

Quoad Media Chirurgica: omnium optima est Paracentesis Thoracis, quæ maxime salubris, similis illi, quæ debet institui pro evacuatione Empyematis. Et hæc quidem operatio est facilis, tuta, & sine ulla periculo; & de qua vid. WILLISIUS Pharm. Ration. Volum. 2. pag. 163. ubi de Sanquini Spota.

Et hæc de hydropis species. 1. Hydrocele & hydrops Uteri ad Sexuum affectus pertinent; Tumores Partium externarum ad Chirurgiam.

S E C T I O . XXII.

DE SANGUINIS MOTU AD CORPORA CIRCUMFERENTIAM LÆSO, LÆSAQUE IBIDEM INSENSIBILI TRANSPIRATIONE.

Cutis nostra est Rete seu Nassa, ex triplici minutissimorum Vascularum capillarum seu Fibrarum genere tanquam tæe filamentis, artificiosè constructa, ex Vascularibus nempe capillaribus Venarum, Arteriarum, & in specie filamentis Nervorum, ex quibus contextitur Nassa Cutis, Spatiola intermedia replent Glandulæ parvæ Excretorius Valis Valis, exteriora verò spectantibus, instructæ, quæ Poros Cutis constituere videntur: Videatur STENO Tr. Molegis Specim. ubi in Titulo Anasome; item MALPIGHIUS Tract. de externis Tactibus Org. p. 32. & 39. BARTHO-LINUS Cent. 3. Epiß. 65. 67. & 97. PECHLINUS tandem de Purgantibus, & in Collegio nostra diffinit. Part. 1. c. 16. Cutis est naturæ tendinosa: In Cute propterea videntur in transversum fibres.

Glandula hæ Conglomerata ex Sanguine Vascularum capillarum emulgent copiosè partem ejus Aquam, Salibos oleosos superfluis acido salis, aliisque particulis inutilibus impregnant, quæ ipsa sub forma halitus per se insensibilium per Valcula Excretoria exspirant, adjuvante non parùm calore, tam ipsius Corporis exspirantis, quam Corporis ambiens, & Insensibilis Transpiratio appellatur; cuius insignem copiam, simulque pro varietate circumstantiarum variatam, & consequenter summam necessitatem, videb. in SANCTORII Medicina Statica, & supra Bell. 27. ubi de Nutritione.

In materia hæ insensibiliter transpirante considerandam est & sentiens & contentam. Contentum est Latex sanguinis aquosus. Contentum verò sunt partes sanguinis inertes, id est, tam superflue, quam diuturniores cum sanguine circuitu effluat facili, quæ sufficienter pro omni modo transpiratione, adjuvante simul inspiratione, attenuantur & volatilibus fuit, Salinis volaticis oleosis, quæ illum liquorem impregnant. Huius maxima pars, uti cum urina sanguinis ablegatur, ita residua portio in sanguine à ferro ejus dissoluta, dum cum eo circulator per partes continentes seu solidas, sapore suo salso infuso saporis ablegit & abluo nutrimentum harum roridum, non perfecte possit cellentem accreptionem assimilare ut coagulatum. (Vid. Bell. 17. de Nutritione, & cap. 3. Præleg. Artic. 2. ubi de sudore) sed jamdiuturniore mora inutile aut quodammodo excrementitium redditum. Hoc ergo simul absterfum, ne aliquid sordium à Nutritione remaneat, secundario insensibiliter simul exhalat. TACHENIUS in Hypocrate Chymica Sal volatile ex halitu insensibilis facit ex Indulsi Lavio maceratis, Lavium absterbet acidum insensibiliter transpirans, & Sal volatile liberatur: vid. Collegium infus. l. 2. Nonnulli ea- rent insensibilis transpiratione, ut insidua per tres septimanas tam pura permaneat: vid. Alia Socie. Reg. Angl.

pag. 103. ubi ex deficiente transpiratione insensibili Anasarca, & indolium per quinque & sex septimanas trini paritate non cessat insidua unum diem trito.

Quoad si massa sanguinea ex quacunque causa dissolvitur, & quasi liquefacit, indeque majorem concipiat calorem, uti vel in exercitiis Corporis, vel post assumptam satillia salina contingit, sudor oboritur, dum transpiratio in tantum augetur, ut copia materie à Glandulis imbibitæ confertum sub Gutularum minutissimorum foras erumpat, quæ nititur rivolorum specie promanant. Materia seu- sit hujus translocationis in statu naturali est eadem, quæ insensibilis transpiratione, scilicet quod copia mater excedat; sed cum si superius contingat sudatio, ex massa sanguinea nimis attenuata copiosè etiam partes utiles, ipsique Nutrimentum partium solidarum roridum attenuatum & liquefactum, simul forasque educuntur. Ut nihil dicam de partibus spirituosissimis in omni sudore evolutis; hinc enim est, quod nimis sudore debilitet, simulque Corpus emaciet, & exsuccum reddat. Sed in statu præternaturali quæcumque sanguinis, uti & partium contentuum heterogeneitatis asperitissimè & copiosissimè cum sudore excreantur, quando scilicet eadem prius à sanguinis artibus miscela separatur & quasi præcipitatur sunt, tunc enim ab aquosa partibus imbibitur, vel spontanea naturæ motu in declinatione morbi erit excreantur, uterum in fine purissimum Ferbrum in Intermittebus contingit, vel medicamento Diaphoretico attenuata & liquefacta massa sanguinea eadem excludit.

Hæc ergo Insensibilis Transpiratio & Sudor primarius est, ut pariteretur massa sanguinea, singulæque partes ab excrementis salinis aliisque, necessitate materie in sanguificatione & nutritione pronas; unde his excrementis turbatur sanguinis fermentatio, & progrediuntur immedie Febres: secundarii sunt, ut acceleretur perfidorem massæ sanguineæ moris, sanguis spissus attenuetur & resolvetur, ne hæc eius stagnatio, sed promoveatur potius ejusdem ventilatio.

Atmosphæram uniusquique Homo circa se habet, quem propter raritatem materie non videmus; hinc sub regimine Calor, ut Pelles propter copiosos Pilos, ubi Transpirationum quasi impeditur, calorem faciant.

An autem ex Præcordiis vel interioribus Visceribus immedie interdum sudor prorumpat, ut acutè hoc urget DEUSINGIUS Exercit. de Drup. Alim. pag. 257. & Append. pag. 345. item in Diss. de Leth. sect. 2. §. 63. id fere valde probabile, licet ob modum, quo hæc, & visum, per quas hæc, latentiam, res obscurissima sit. S. A. L. MUTH observavit sudorem Cerebrum: post Juscula calida sudor est.

est in tergo, post potum etiam frigidum sudor in toto corpore. In calore autem sanguis dissolvitur, si Frigus adveniat, Serum quasi coagulatur & condensatur, & eo magis Serum etiam separatur propter condensationem.

Sudor Frigidus in omnibus Morbis funestus est. In Acutis, quando Aegri non possunt sudare, & tandem Sudor est; hoc enim eo defectum Virium, Sudorque hic nil aliud est, quam Ros nutritivus partium Solidarum per poros Cutis sub forma sudoris emanans; hinc etiam talis sudor glaci noster, nonnihil viscus, percipitur, & est Signum lethale. *Sudor Parientiaris* circa Caput recte ab HIPPOCRATE malus dicitur; hinc rarissimum est, quod observavit SCHNEIDERUS, quod Sudor capitis aliquando fuerit criticus, & maribus solvens.

In Piaci observatur Sudor vel *Excedens*, vel *Depravatus*, raro *Deficiens*.

C A P U T I.

De Sudore Nimio.

Excedens Sudor frequens solet esse scorbuticus, qui copioso Sudore tantummodo dissolvitur, interdum pariter ac noctu: Hinc etiam *Phthibis confirmata* tempore nocturno Sudores copiosissimos solent effondere. Rationem non incongruam suggerit WILLISIUS in *Pharm. Ration.* quod nempe tales Sudores excessivi eveniant propter deficientem Assimilationem nutrimenti assumpti & chylum cum massa sanguinea, itaut tales Sudores sint *conglutinati*, & per quos succus nutritivus, qui assimilari nequit, furas emittitur.

C U R A.

Hinc in Cura respiciendum imprimis ad corrigendam sanguinis Crassam. Id quod fit in scorbuticis per usum *marerialium*, & *Salinum volatilium oleosorum*, nempe partibus visibus, tandem per osam *Lactis & Lactisiorum*. In Phthibicis imprimis hac aut tales Sudores compescendos convenientes est: sicut phthibicorum Sudores & inde natas debilitates palliative sistit Antitheticum *Potenti* cum Laudano Opiato, vespertino tempore assumptum; quod est optimum Sudores nimios suffragant: vid. *Dissert. de Opti Viri. Diaphor.* cap. 3. §. 8. *Idea Formae. Class. 2. §. 2. Collig. Formular. & supra sect. 17. cap. 1. Art. 2. ubi de Phthibis*, item SYLVIUS *ubi de Febre*

Sudorem. Conservis etiam Tinctura Antiphthibica, Tinctura Solis. In scorbuticis:

℞. Solut. Martis cum succo Pom. ℥℥℥.
Spiritus Cucklaar. ℥℥.

M. S.

Tinctura Scorbutica.

Past Sudorem nimium in morbis Acutis & Malignis:

℞. Aqua caraf. nigr. ℥℥.

Phlegm. Varioli ℥℥. vel Bujas loco Chff. anti-
monii ℥℥. vel ℥℥.

℞. Zuch. Mri unc. i. ad ℥℥.

M. D. S.

Potio confortativa cochlearum sumenda.

C A P U T II.

De Sudore Depravato.

Sudor Depravatus fit in specie ex ratione *Seri ejusque san-*
dentum, quae prout plus vel minus à statu naturali de-
ficiunt, ita etiam plus vel minus Sudores depravatos red-
dunt; hinc pro varietate depravationis sudoris varia etiam

subinde cura instituenta venit.

C A P U T III.

De Sudore deficiente.

Deficiens Sudor contingere solet, vel vicio *perorum*, vel vicio *sanguinis ejusque seri*: Vicio *Perorum*, dum hi ar-
etè plus minus clausi, intarsi aut obstruati sunt, unde Lo-
tiones corporis, Frictiones rerum calidarum, laterum ca-
lidorum applicationes, &c. Sudorem promovere. Vicio *San-*
guinis vero deficit Sudor, quando tam ardet substantia sero-
sa cum massa sanguinea unita est, ut convenienti seri fe-
cretio per glandulas fieri nequeat; id quod interdum in Fe-
bribus coctivis, speciatim malignis, usavenerit solet. In

tali casu Remediis Sodoros moventibus, tam positive, ut
Atrialibus Exis vel volatilibus, quàm privative calibus, ut
sunt lapilli cancerorum, Cornu Cervi, &c. simul acida
blanda addenda erunt, in specie acetum; hujus enim medio
deficiens Sudor commode potest excludi.





PRAXEOS MEDICÆ LIBER II.

D E

MORBIS FUNCTIONES ANIMALES
LÆDENTIBUS.

S E C T I O I.

D E

*Spirituum Animalium generatione ac distributione laesa in genere,
indeque sensus & motus laesioibus.*

POST Sanguinis ac Corporis circumferentiam Motum, cum non amplius superis affectus in Regione inferiori, pergo ad *Regimen Corporis superiorem*, scilicet ad Caput, & ibidem reconditum Cerebrum, & Systema Nervosum. Nemo uti moveretur Sanguis ad omnes partes intimas internas, in quibus preter hoc, quod easdem sustentet nutriendo, & vegetet Spiritu vitali perfundendo, etiam in quamplurimis singulari quid patitur; ita per Arterias Carotides & Vertebrales distribuitur etiam ad Caput, Cerebrum ac Cerebellum, in cujus Medulla hæc arterie rami quosdam hinc inde spargunt, maxima verò pars in Capillaria distributa Vaia ubique superficiem ejus densè irrorat; ita quidem ut eandem cerebri & cerebelli superficiem, *Cortex Cerebri* appellatam, ubique copiosissimè, *Arteriole* invelliant, Sanguinem ita ibi infundant, qui in Enurus Duræ Matriæ recludetur, & ita per venas jugulares, illis Sinubus continuas, tandem in Venam cavam refunditur: Vid. HIGHMORUS, Arteriole dicè ubique invellentes Cerebri superficiem, eandem *certum motum* tribuere videntur, qui tamen non cerebro est proprius, sed ultimum ab Arteriarum motu communicatus. *Motus cerebri* observat Depressivus & subalternus: Vid. SPERLINGIUS *Anthropol. Phys.* Probat: ita nempe iussur Arteriarum carotides nunc attolitur, nunc deprimitur cerebrum. In ipsa Cerebro ac cerebello duplex observabilis est substantia diversitas; Corticalis nempe tubercinaria, & Medullaris elegantior candida; illa ex copiosissimis Glandulis minutulis ovalis figuræ constat, in quas se insinuant dicta Vaia Sanguifera: Hæc ex Filamentis & ductibus nervæ delicatissimis invicem certa ordine convolutis, ex illis glandulis oriundi, est constructa: quæ ipsa postmodum hæc invicem separata ac divisa, duplici tamen adhuc Meningum Membrana involuta, Spinalem Medullam & nervos hinc inde distributos constitunt: de quo vid. MALPIGHIIUS *Tr. de frustis Viscerum*, ubi de Cerebri cortice, item in *Epist. apud de cerebro*.

*Glandularia talis diversitas diversum finem Usui inservit; qui tamen in hoc conspirat, quod nempe earum usus sit, ex Sanguine subtilissimum substantiam, spiritum animalium, suo modo coacervare & separare. Dari autem quendam spiritum, ab officio animalium dictum, ex hoc ferè illustratur, v. gr. quòd Nervo dissecto, & ita Spiritus Animalis fluxu seu irradiatione laesa, Partis infra sectionem sensus ac Motus petire solet. Objectiones contra hujus existentiam discuti-
las, vid. in ROLFINGIO *Exerc. anat.* Optimum eius*

scriptum est, Speciatim verò cortice mediate Spiritus volatiles sanguinis, *Vitales* dicti, separantur a sanguine, & per subtilissimè agillimèque Filtrationis modum penetrando, transeunt in cerebri Medullam, sanguine ipso crasso corpore ob Pororum angustiam, Vehiculè ejus aqueo ob pingues & oleum quasi cerebri Substantiam, exclusis, ita quidem, ut Spiritus Vitalis in cerebro hæc animalis, non per modum novæ cujusdam elaborationis aut fermentationis in cerebro periculis, sed per modum ac simplicem separationem, & quasi per filtrationem, vel per subtilem Irradiationem, sine nova ejusdem Elaboratione aut in cerebro fermentatione, aut in cerebro Transmutatione; de quo vid. WILLIS in *anat. cerebri cap. 9.* item SYLVIIUS in *diff. 4.* Spiritus hi, Animalis & Vitalis, essentia non differunt, sed paucis accidentibus. Qui jam separatus exiit, alias simul in Massa Sanguinea erat. Differunt tantum Loco & Nomine, adeoque sine formalis Alteratione Spiritus Animalis exiit.

Separatus ita in Cortice Cerebri glanduloso spiritus Vitalis, & agillimè penetrans in ipsam substantiam medullarem; in hac ipsa, seu regio palatio, spiritus isti volantes luminosi debitis motionibus, expansionibus & agitationibus, & inde per nervos in omnes partes radiolis ecurfusionibus, Operationes Animalibus proprias, sensus nempe, in speciem Internos, & Motus perficiunt.

Determinatur autem modò dictus spiritus Animalis numero & essentia motus, adeoque ex se indifferens, ad diversas ad actiones obundas à Partium organicarum dispositione & proprietate, ratione cuius nunc in hac Parte hæc functionem, in alia aliam perficit; Nam in ipse, qui v. gr. per Musculum movet pedem, in coarctat suo modò ad Viam, si esset in Oculo. Et sicut unus aer diversos sonos producit & formatione fibrillarum efficit, ac ab una Aqua variaz Machinæ moventur; ita & unus spiritus per organa varietate diversas edit functiones. In Operationibus quidem Exteris, nempe in *Instrumentis sensuum*, magis pulvè se habet, quatenus Fibras in Tensione conservat. Sed quoad Internos, & inde dependentem Motum animalem, magis activè se exhibere solet.

Ab hoc spiritu Animalis, & sentiendi habemus potestatem, & simul morandi activitatem, cum rationationis subtiliori actione: in qua uti Spiritus Animalis verè & soli Animæ, nempe *essentia*, tanquam principali Agenti, instrumentali interviæ; ita pro eius spiritus Animalis varia constitutione non tantum in latitudine Sanctis diversis Operationum Animalium in singulis Individuis ob-

serva-

servatur multiplex, sed etiam in constitutione morboſa variat in ſenſu & Motu, quoniam & diviſi intellectus Operationibus leſionibus oriuntur.

Naturalis ſpiritus Animalium, hinc Operationum Animalium, & inde dependens Ingeniorum Diverſitas, ex varia craſſi & Miſtura Maſſæ Sanguineæ, & hinc diverſa conſtitutione Cerebri, rationum compoſitionis materiæ, ratione pororum & Meatum, &c. dependet. Prout enim diverſa eſt Maſſa Sanguinea, iſtiusque Cerebrum, diverſi etiam emergunt ſpiritus, tam Vitales quam Animales, qui diverſimodè in Cerebro moventur & agitantur. Quoad cerebrum: variat huius Conſtitutio, tam ſecundum Compoſitionem ſeu Texturam naturalem, quam Conformationem mechanicam. Quoad Compoſitionem naturalem: præter Conſtitutionem ſeminalem, lub Generationis primordiis natam, multum variat eas dependet à Sanguine & Spiritu Influxu, variata enim ſit eius Nutritio & naturali texture, plures alie Proprietates, Qualitates dicuntur, & inde emergunt temperaturs in Caliditate & humiditate, Siccitate & molliſſe, &c. variant. Sicuti in ipſa Conformatione mechanicæ ratione pororum, Meatum & Ductum diverſitas dependendur, que omnia & Spiritum Animalem, eiſdem conſtitutione, Generatione, Diſtributione & Motum variat. Hinc illa in Affectionibus Animalibus inſeſſiſſe diverſitas choleſtorum, Melancholicorum &c. ex quibus Ingeniorum Diverſitas deducenda. Ergo Spiritus ſoliti Animales plures minus viſioſe geniti, præter naturam alterati, unum organorum corporeorum, tam cerebri, quam aliorum, varia Conſtitutione, quævis Leſione in Senſu & Motu inducunt.

Quod ſi dicti ſpiritus in debita quantitate & ſubtilitate blando & moderato, eoque ordinato, Motu agitantur, indeque Cerebrum implendo proprio motu quodammodo expandunt, & ita ex eodem leviſſimum Filamentorum, Cerebri medullarem ſubſtantiam conſtituentium, ductum, continuant quaſi rivulo aut radio in Corpus cuiuſque partes influant, omnium Adionum Animalium ſequitur Exerciſium, h. e. Vigiliæ: Vigiliæ enim ſunt Exerciſium Senſus ac Motus. In Senſu autem reſpectu quieti tantum ſunt Spiritus Animales, qui ſi Acu pungeat Membrum, Senſus ſpiritus præſentiam & aliqualem operationem offendit. Sin verò quocumque ex Cauſa perturbati inordinato, vago, & ſubinde impetuſo Motu errantur, in Cerebro erodit Deliria varia, ſpecialim Phreſetica, in Partibus verò reliquis ſpaſmi & motus Convulſivi ſubinde mirabiles producantur.

Dicitur Deliria fieri in Hominiſque ex perverſa ac inordinato ſpiritus Animalium Motu: Nam Functiones Ratiocinationis dependent ſuo modo à Spiritum Animalium Motu, quatenus nempe huius occasione Anima Rationalis diverſos Conceptus & Ideas ſibi fingit. Prout ergo ſi ille Spiritum Motus vel ordinatus vel inordinatus, etiam ipſe Mentis Ideas ſeu Conceptus vel ordinati erant vel conſuſi & vagi unde ibi legitima Ratiocinationi, hic conſuſa Mentis perturbatio, h. e. Delirium; ſuperveniet. Bruta enim non delirant; eſt enim Delirium læſio Ratiocinationis. Ex quidem Ingeniorum Diverſitas primario ab his Animalibus ſpiritibus, & hinc à cerebri conſtitutione varia, tum quoad conformationem non tam extenſam ſenſilem, quam quoad internum Meatus inſenſilem, tum quoad materiale texturem, alias temperiem dictam, dependere videtur. Hinc etiam his circumſtantiis plūs minus eſtate vel morbo mutatis, plūs minus etiam in eodem ſubjecto variat ingenii Habitus; de qua Ingeniorum Varietate videndi ſup. imprimis, qui ex profeſſo de Ingeniis ſcripſerunt, quos inter quatuor primatum obſeſent, JANUS HUARDUS, Medicus hiſpanus, qui ſcripſit de ſereno Ingenio; JOHANNES BARCLAIUS Polonicus Gallos, qui ſcripſit de non admodum, ÆSCHACIUS MAJOR, & NEUHUSIUS, Philoſophus Belgæ, qui ſcripſit Theſaurum Ingenii humani ſecundum conſtitutiones annorum. Omnes per diverſas vias uſum materiam trahunt, & ad unum ſcopum eſſentialiter. JANUS HUARDUS in ſereno Ingenio in genere varietatem ad ſubſta varia inclinantiſſimam ex Fundamentis Phyſicis Arſtoſoteli Galenicis ſcrutatur ſuit. Author eſt, ſi quis alius, elegans, tamen modo hoc obſervetur, ut ſcilicet ea, que ſi tribuit Cerebro ratione caliditatis, Humiditatis, & ſiccitatis, potius certo modo applicanda ſunt Spiritibus Animalibus, eorundemque variæ conſtitutioni, ſubtilitati, agilitati, torpori, & aliis ſimilibus proprietatibus. Nam quod attinet Temperaturam Cerebri:

temperatura illa tam Capitis (ut etiam aliis morſui) quam omnium partium, à Maſſa ſanguinea dependet, que quando eſt Calida, vel quando eſt Humida, etiam omnes partes, per quas tranſit, ſimiles proprietates acquirunt, que ipſe tamen parum ad Actiones faciunt, quia tantummodo leviſſe eadem modificat: Sicut videmus in Choleſticis ita dictis, in quibus Maſſa Sanguinea target Salubris volatilibus oleoſis, eos videmus promptos in actionibus, videmus agiles, & quadam cum ſerocia & audacia conſuſos. In his enim partes ſubtiliores & ſicilicet mobiles blanda in orbem circulatione lo Spiritus Animales volati ſiuntur: quin in Cerebro promptè moti & agitati, & à Maſſa ſanguinea calidior nonnulli fervidi, in iſtam augendam actionem erumpunt, ex mente HUARDI: ergo Caliditas & ſiccitas hic accuſata potius eſt Agilitas & ſubtilitas ſpiritus. BARCLAIUS in ſuo Animalium ſcriptis Politicæ & Phyſicæ magis quam Phyſicæ; leſio tamen eius hoc habet commodi, ut videamus, quantum variat Ingenia pro Climaſum diverſitate, pro vario Regionum ſitu, & pro conſuetudine diverſa ratione. Deo que NEUHUSIUS Philoſophus, ſcripſit in ſuo Theſaurum Ingeniorum ſimul Politicæ & Phyſicæ, ſed minus proſunde rem ſcrutatus ſuit, quin potius generaliter, nonnulli ſunt tamen, ea tractat. Hi tres ſimul conjungendi ſunt, & præmeditatè legendi; ſic enim magna lux in hac materia effulget. (H)

Hinc ſi ſpiritus iſti volatiliores celerius & agiliſſe moveantur, ſubtilitatem ſeu Atman Ingenii (quatenus nempe hoc in Corpore humano à Spiritum Animalium Motu dependet) Alacritateque ſingulari adionibus conciliat; eni ſi conſtitutio Cerebri mollior vel durior, indeque vel ſexiliſſe vel rigidiſſe acceſſerit, iſti Inconſiſtentiam, huc verò majorem Pertinaciam eſſeſent, uti v. g. in Gallorum Ingeniis patet. Quod ſi hi ſpiritus purus quidem, non tamen adeo ſubtilis ac agilis ſit, indeque tardiſſe, inordinatè tamen, moveantur, ænia & necerant, aut tamen nimis ſilicis, conciliat Ingenio, cum adionum quodam Materialium, ut in Italis & hiſpanis, & in iſis, qui dicuntur eſſe nature aliquantè Melancholicæ naturalis, manifeſtum eſt. Sin verò torpeſcant ſpiritus, miſis huc agiles, aut propter Forceſtatem Cerebri duriſſe nimis implicata, Motus ſpiritus minus ſit agilis aut ordinatus, ſaper & Ingenii hebetudo cum reliquarum Adionum Torpore obvia eſt, ut in Phlegmaticis ſic dictis, item in Ruſſicis, manifeſtum eſt. Ingenium quaſi Ingenium, id eſt, ratio iudicandi de rebus, eſt primo à puritate ſpiritus, & deinde Conformatione externa & interna.

Quod ſi Animalium ſpiritus uſque naturaliter nonnulli torpent, vel ob deſiciente quantitate, vel ob deſiciente ſubtilitate, indeque parvis ac tardiſſe influant, ſenſus quieſcent, & alia Quies occupat membra, h. e. ſomnus obrepit: non quod non ſit præſente ſpiritus animales in partibus Corporis, ſed quod non ſit ſufficientes.

Cauſa ergo ſomni eſt.

1. Quando ſpiritus deſiciunt, exhauiſti v. g. ob labores.
2. Quando ſunt torpidi & tardiſſe mobiles: quod ſi (*) ob cerebri aliqualem humectationem ſub eiuſdem Nutritio, vel quod ex continua ſpiritus ſub Vigiliis adione aliquid Aquei ſimul in cerebrum deſiliſſe: (H) ob ſeram Fixationem ſive condensationem ex Alacritate ſive Applicata Medicamentis Narcoticis.

Dupliciter Cerebrum humectatur; primo à ſucco nutritio, deinde à ſero.

Sed his & ſimilibus Phyſiologicis amiſſis, ad Pathologica revertor, & Præſtica, in quibus conſiderantur vitia imprimis ſpiritus animalium morboſa; ſpiritus enim illi Animales vitæ eſſe geniti, & præter naturam alterati, leſiones in Senſu & Motu inducunt.

Quod attinet eorum ſpiritus animalium generationem vitiatam; tria ſunt vitia, que in praxi occurrunt:

1. Quando deſiciant, & omniſſe pauci ſunt, unde hebetudo ſenſuum, imbecillitas corporis, deſectus in motu, &c. apparent; uti videtur eſt v. g. in Senibus, aut in iſis, qui gravi ex Morbo ſenſum convaleſcent, lo his enim talis Debilitas & Impotentia Adionum omnium adeſt propter deſectum ſpiritus Animalium.
2. Quando abundant.
3. Quando depravantur, & plūs minus à debita erant degenerant.

Deſi-

(H) Videtur que de Ingeniorum & Morum varietate ex Des Cartes notariſſimæ, Tom. 1. Inſt. Med. p. 1. cap. 19. col. 277. lit. H.

C A P U T I.

De Facultatibus Animalis affectionibus in Genere

A Ntequam autem in specie *Affellus facultatis animalis* consideremus, noranda in genere quaedam universalia pro iis, quæ in posteroribus dicentur.

1. *Totum fibrarum nervosum cecereb, cerebelli, spinale Medullæ, Nervorum inde natarem, & quarumcumque partium nervosarum, membranarum, tandem & Ligamentorum, ossiculi ex Fibris, sunt delicatissimi, sunt minui licitati, sed pante firmiores, confusæ. Quæ fibræ sunt sunt fundamentalia, et quibus pro majori vel minori, adhaereant latiore, unione, variae partes nervosae componuntur, & quidem fibræ maximè delicate constitunt infimam levem cerebri & Cerebelli, quæ subtilitatem maximam: deorsum vero constitunt nervos maximè quæ firmiores, & quo magis huic cerebro in spinalem medullam producet, eo firmiores sunt & magis robusti; & hæc huic pro explicandis Phænomenis paulo sensibilibus, rationis testatur in Naturali statu res quædem sunt, sed iam continuo quali Natura, aut Imperat aut Fim quædam obtemperant ad usum, quæ Vis, modo impetu utrum Spiritum Animalium roboraret, utrum Animalium partem tantum spiritum Naturalem, inierit; sicuti collit Fibre, si ab obiecto quodam externo commoveantur, colliduntur Passivum, sicuti sensum intrinsecum, dicimus sentire; & contra, si moveantur Natura ille elasticus impetu spiritum interius, fit Motor Membrarum, & voluntariis ille Involuntariis, itat spiritum diversæ actionum diversæ motos, & Fibrarum nervosarum diversæ actioni & constitutio, hanc collidunt omnium Phænomenorum, quæ aliis facultatis Animalis nomine venit, & totam fit dictam Animam sensum abfolvat.*

II. *Cerebrum & Nervus singularum quasi consensum habent ad extrinsecam Motu Lunae: cum observationibus suis conflat, in-
dicant Phases Lunae Afficere Cerebrum, nervorum, &
Partium nervosarum, in sensu ac motu consensum, plus
minus exacerbari, plus minus remitti: Itemque quod quae
cumque symptomata Lunae & nervorum, in specie Epi-
leptica, pro fluctationibus Lunae decreverint vel incrementis,
habeant suum augmentum & decrementum. Unde tales in-
ferendum Lunae fluctationes motibiles afficiunt tantum Partibus
nervis contingunt, & propriè Epilepticiis Epilepsiam
dicuntur, ubi est lesione partium fibrolarum remanet tu-
lis peculiaris sensus in Parte, ut Aegri percipiunt mutationes
Temporum, sensus non perceptive. Ratio, earum fide, quod
sistema nervosum magis alteratur à Luna quam à Sole: quia
Solis videtur Internum, & indigendum est speculacionibus
inde videtur haeremus. Quidam Philosophi fabulantes de
Sole, ratione eisdem radiorum, & exinde rati naturam,
& ratione spirituum universalis ex eo procedunt, in Ve-
getativam universam naturam derivare. Quod ipsum tam
exadè pater in Regno Vegetabilium, cum virtutis vegetativae
nostrae Vitalis quodammodo respondet: unde dicitur
Uri ratiōe Solaris Luminis sulphurei eisdem ac vegetativae
spiritus & Calor dependet, & certa ratione abesse vel
virtutis vegetativae in natura, & consequenter maxime vel
minime Vegetatio nostrae Vitalitatis oritur, ita è contrari-
etate modificato Solis Lamine etiam Luna magis afficit Po-
tentialitatem Animalem & Cerebrum; unde mutata sunt
Phasibus, & unitate motu Solis, subit etiam mutata
Cerebrum, Genus nervosum & familia. (I).*

III. Observandum autem omnia, *mirabilem confusum hunc Cerebrum & Partes inter commixtas cum ventriculis abdominalibus*, in specie cum *Ventriculis*, itant quoque propter locum contiguum confusationem sepe contingat, ut *Organi membrorum* subinde invicem confundantur, *crebroque* *Ventriculi Causam* proximam ac fontem habeant in *Ventriculo* & *primis viis*, sicut contra *Stomachi Affectiones* in *Cerebro* fontem obtinent. Sunt mirabilis affe inter has ambiguitates confusio, idque exemplis confirmari potest: veritas ex *Inflo Cerebro* supervenient *sobinde ordinatio Ventriculorum*, idque ex *Capite* aut *Cerebro* gravius percussio, sepe *Nausea*, *Appetitus delectus*, & *similia*, ex imminente *ventriculi Vermis*, &c. Hinc ipsi *HELMONTIUM* admodum turbatur, hinc observat *ex Practica in Tract. Diss.*

Deficiunt hi Spiritus, vel propter sui consumptionem, Laboris, Venere, Studii, & quibus cunctis nimis agitati in Cerebro addo sublestantur, ut promptissime dissipabiles existant; vel propter defectum debitum sanguinis spiritusalem, nam, in constitutione præteritæ eius cachectico cachectica, ac primario et vitio Diaphanæ prima, dum non ritè Chylus spiritusale sit in primis visis, quo faciunt sanæ, ac Alimenta mali fieri, & minus spiritusale fieri, & similia; vel vitio cerebri & eisdem corticis, inepti ad separationem Spirituum Vitalium ex Sanguine, propter vitium Conformationis & Lesionem Cerebri, Confusionem aut Consumptionem in Casu ab alto, Measum Obstructionem, & similia. In quibus casibus Poruli ac infensiles Measus Cerebri aut insidentes, aut compressi, aut omnino aboliti, & Sanguinis debitum circulum, ac spiritum Animalem ex eo separationem impediunt. His ergo deficientibus Sensus & Motus deficiunt, minus vel plùs, prout in vel magis vel minus deficiunt.

Interim deflagras his spirituum facile & optime curatur per Medusam spiritus collumpta, obid Acaletipis dila, aut Vinum generosum, Spiritum Liliorum convallium, Ceraforum nigrorum, Aquam Apoclidicam, Quintam Efficentiam Matheoli, Efficentiam Ambue cum spiritu Rosarum paratam, Spiritum Liliorum convallium cum fale volatili cornu Cervi circulatam, aut Sale volatili succini mistum, Spiritus volatilis, Olea defillata, aut ex his paratos spiritus vel salia volatilia oleosa, aliisque Aquas spirituosas aromaticas & similes, & quae alias in lithomyia adhiberi solent. Sicut & vitium ejus in transformatione erroris & Læsis externis, curata hac externa Læione, sponte delectus spirituum curatur.

Secundum vim spirituum Animalium est, quando abundans, & hinc Impetu quendam extraordinarium Alimento Animalibus, & ex nimia eorum agilitate insigne in promptu ordinem Alionum, tam in sensibus quam motibus, coadunant. Id quod videmus in his, qui alimenta laudabiliora usurpant, potiusque Vini generosi moderate indigent, ut agiles & hilariores fiant, accedente simul blando corporis motu, & vita celeris vacua.

Abundantia hæc spirituum *rare* Cavalieri offertur, quia sponte vel per loediam, vel per somnum, Natura aut Artificis provocatum, aut denique per motum vehementiorem corporis aut animæ in fluidis inferioribus cessat.

Denique *terris virioli generantur Spiritus Animales*, quando depravantur videlicet plius minus in sua Crasi, unde *mutas* eorumdem naturam videtur *Xerispiria* & *Anomalia*, unde craefus vitiatæ ratione idem vel *stupidus vel stupidi*, vel *fieri*, ius quasi immobiles, vel eorum nimis *agiles vel confusi & inordinati*, *mollis*, minus *subtilis*, plius minus *acres & intemperati*, &c. generantur, aut alio vi intelligibili modo virioli & depravati. Unde variis in *stentibus defectus*, & in *motu* exorbitantia, & *Anomalia* dependent. Spiritus animales enim sunt naturæ sulphureæ volatilis, vel nubil alio, nisi substantia oleosa volatilis, adeoque pingues, & in recessu alio, inflat subtilissimi ejujandam spiritus Vini. Equidem paradoxon fieri video: Dico tamen adhuc, esse eos nati per ad melius illudstantur eorum naturam) subtilissimi reficant spiritus Vini. Hoc præsupposito, depravat Spiritus animales generabuntur, quando vel in *motu*, vel in *sua substantia*, & hinc consequenter in *motu virioli* receduntur, *de substantia* quidem, quando degenerant a sua substantia volatili, quando degenerant a subtilitate, volatilitate & spirituositate evaduntque quasi phlegmatici, vel a sua puritate, ita ut spiritus nati heterogenea eorum naturam vitient, unde in natura & Crasi defectus sequitur. Deficient in *motu* quia per motum regunt eorum corpus spiritus animales, unde quando vel in motu deficient, dant *tempos*, vel quando nimia agilitate excedunt, vel quando vitantur ac depravantur motus eorum debitus in consensu agitatione, vel quasi explosivum, lædit Spiritum Animalium naturæ & officium. Vitiæ hæc, pro specialium hinc dependentium affectionum ratione, diversimode sunt curabiles, quorum cura in sequentibus patebit.

(1) *O. fuscicornis* subterranean *Philophorus* foundations

vivamus, *Jus Dnumviratur*, *Sedes Anima*, *Demon Idea*, *Ignis alius regimini*, &c. Ipsi optima, id est Theoriae & Reflectiones speculativae nil valent, & nullo modo admitti possunt: *crasiosas* interim notissimas est, at monium. Similiter ex imaginatione, verbi gratia ex Audito rei horridae supervenit Nausea, subversio stomachi, appetitus dejectus, & quae sunt alia symptomata, simpliciter ex Cerebro, & spiritibus in Cerebro, certo motu motis, enata.

Quo difficiliter consequitur aut digerunt, ex stomacho subinde patiuntur Vigilas, Vertiginem, &c. *Vertiginis fons semper ex stomacho oritur*: Nam Hypochondriaci si non omnes, de quo adhuc dubitamus, certe quamplurimi, dum jejuni sunt, Vertigine corripuntur: quod si verò aliquid & vel buccellam panis assumant, cessat Vertigo. Vir quidam frangit quatuor annorum gravi corripiebatur Vertigine, veiperi quidem laetus lectum praece manu evigilabat, & de lecto surgens in cubiculo praecedebat vertiginosus, haecque Vertigo usque ad meridiem durabat, assumpto autem falcule vomit, unde Vertigo cessabat. Hanc ergo Vertiginem simpliciter ex stomacho fuisse, inde persuasum habeo, quia quietus dicebat, urgente Vertigine fingi assilgere Anaxiastes praecordiorum; facta autem Materie morboae excretionis loci Vertiginem.

Quin puto, ipsam imaginationem & sensus exterioris sui modo dependere ex stomacho, & hypochondriis affectis; hinc enim, quando Mulieres ex Menium suppressione Pica laborant, Phantasiam pravam & Imaginationem laesam obtinent, cuius fomes tamen est in stomacho; unde ex affectu stomachi laeditur Phantasia, secundum quam nonnisi quom supervenit appetitus rerum ridiculorum: Sic hypochondriaci ex Hypochondriis affectis suar Melancholici, unde curato vicio in hypochondriis, cessat & Melancholia. Praeterea Motus Convulsivos universales radicaliter fieri ex affectu abdominis proba, quia Mulieres Hystericae lapsis superveniente Epilepsia corripuntur: Sic in Partu difficiliter abdomine affecto supervenit Epilepsia universalis, unde excluso Faetu cessat etiam haec Epilepsia. Ur videtur certum sit, in omnibus Operationibus in sensu, & Motu, nempe Internis, dependere cerebrum à stomacho, & hypochondriis, adeoque in praxi semper uno Oculo considerandum Cerebrum & Nervosum genus, altero verò conspiciatur stomachus, & hypochondria. Confirmat hoc, quod remedia excipient aut etiam solvant symptomata capitis, & Cerebri, dum adhuc existunt in stomacho: Sic *Pemissus* assumptus, dum incipit operari, Aegri corripuntur Vertigine, utat ipsam remedium corporaliter in stomacho sit, & simpliciter in stomacho operetur. Pariter manifestum est, quod spiritus omnia vis assumpta, ver. grat. *Hynocyma* semen, Opium &c. dum adhuc in stomacho haerent, facultatem Animalem efficiunt, & certas alterationes inducunt, ac in specie ad Somnolentiam dispoñunt: Vid. Exemplum HELMONTII *tract. Jus Dnumviratur* §. 22. de Causidico, pro Oleo seminis Anethi fumente *Sabinis* *Hynocyma* drachmas duas, qui deliravit & plane stupidus factus est; Semine autem hoc per Vomitorium reiecto, cessavit delirium & Stupiditas. Haec & similia exempla observare debent, ac in specie ad eiusmodi Phænomena jamdudum ingentem scrupulum HELMONTIO, qui videre est *tract. Jus Dnumviratur*, item *Ignis alius regim.* item *Sedes Anima*. In his Transactis mirabilia introducit exemplum affectionum cerebri ex affectu stomacho, & hypochondriis. Ceterum hic ipse Author in hoc puncto est plane paradoxus, quia primos conceptus fieri in Splene putat, quom conceptum executum sit cerebrum; Cans autem existerio Splene vigilat & somniat. Evidem quod observata exempla, est elegantissimum; quod superfluum verò Theoriam, & quidem officium Splenis, nullo modo admittit potest. Ceterum si dicendum aliquid, unde nam oritur hic somnus consensus Cerebri cum stomacho & hypochondriis? simpliciter per Nervos, ad has partes ex cerebro derivatos, fieri statuo. Quod verò has partes magis conspiciunt cum cerebro & Cerebello, quam alii partibus, id explicare conatur quidam Scriptor Gallus, nomine CORDEMOY, *tr. de differens anima & corporis*, ubi rationem ex prima formae formatione in utero derivat: Nam, inquit, *Embryo* sentit insipientis vix alibi, nec alla pars in homine vel in utero adhuc recedente, vel extra uterum suum, prius sentit, quam visum stomachi, dum ratione Nutritum per os affectus diversas patitur alterationes. Dum ergo idem sit prima sensatio, omnes alterationes statim imprimunt alimentis, qua imprimunt

faciant in Fetus, in ipso Oculis stomachi fuisse. Hinc accedit, ut etiam primi ex cerebro ex alimentis spiritibus animales & aliterentur, unde fons maxime patens, unde levi motu paratur via spirituum Animalium ex cerebro ad stomachum, ita ut in universis corpore aut detur pars magis sensibile, quam visum stomachi fuisse. Unde tam facili sit consensus inter cerebrum, Cerebellum & stomachum partemque vicinas, ratione Nervorum.

IV. Spiritus animales ten materiam admodum subtilem conditiones etiam subire certe modo materiales. Jam vero notum est, quod ex sanguine materialiter fiant, five illorum particulae sulphureo-laline, five lucidae, five opacae, five aliae sint naturae, & conditionis, necessarii pro varia sanguinis crassi patiantur diversas conditiones materiales, id est, ut, crasse loquendo, nunc sunt asperi, nunc mites, nunc dulces, nunc acres, nunc lucidi, nunc opaci: &c. unde pro varietate suae constitutionis, & inde naturam proprietatem, variant etiam eorum attributa, & consequenter nunc plus nunc minus appropriati, amici, vel hostiles Nervis torque eorum systemati in Medulla cerebri, & Cerebelli, itemque reliquis Fibris per totum corpus dispersis, existunt. Unde pro variis constitutionibus, & Texturis, materialiter ex Textura sanguinis enatis, etiam varia Pathemata secundum sensus Internos, & motus corporis, secundum Vigilias & somnum, eant derivanda.

C A P U T II.

De Facultatibus Animalis affectibus in specie,

feu

Morbis Capitis.

IN specie quod affectus Facultatis animalis, seu sensitivae & Motivae Virtutis, attinet, de his optimè agit WILLISIIUS *tr. de anima Brutor. lib. 2. spiritus nempe Vitales*, dum per corticalem Cerebri substantiam iterantur, ac transiunt in cerebrum Medullam fibriformem, alterius derivantur in Nervos, & inde in universum corpus, ac ita Motu suo extra cerebrum Vim motivam diffundunt in Organa sensuum, inde in naturalis subtilitate ordinatè moti marem Vim conciliandam Fibris eas sic disponunt, ut fortissimè tenè faciliè reddantur, & ab obiectis externis recipiant impressiones, per quas fit *Motus (K)*. Uti ergo, dum hoc modo continuo influunt Animantes spiritus Animales in Organa sensuum, ut promptè excipiant obiectorum externorum impressiones, & sic sensum Patietas fulscent, ita promptè variis Motus excitant, & obunt, qui in statu Animal vigilare dicuntur: ita quidem ut Vigilias dependant à continuo Motu spirituum Animalium extra cerebrum, & Cerebelli orbitas in Organa sensuum externorum, quorum privatio est somnus: quia duo necessaria vicissitudine in motu insequuntur naturaliter. Ac idò radices Vigiliarum primario in cerebro, minò verò in Cerebello investigandae sunt; sicut & somni ipsius. Unde dum sensibus externis fetiatur, feriat etiam sensus Internos, unde Animal dicitur dormire, Vacillare haec motuasi tollatur, ita ut somnus vel penitus deficiat, vel saltem paucior sit, & *causae sunt Vigilias*, vitium hoc vulgo vocatur *Agrypnia Graeca*, Latins *Pervigilium*, seu Vigilias nimiae. (L.)

A R T I C U L U S I

De Vigilis Nimis.

Sicut somnum naturalem in moderata spirituum Animalium Quete, hinc ad sensoria externa influxu cessante consistere, ex hactenus dictis supponimus: ita quiescentem hanc interrumpere, illoque ad Motum conciliare potest, Vigilias sed Pervigilium indicat. Atque hoc iterum vel aliorum Morborum symptoma est, v. g. Febrium, dolorum, Dispnoeae, Tussis, &c. vel sine alia Aegritudine evidenti.

(K) Impossibile Sensus, ut paulo infra.

(L) Agrypnia, *αγρυπνία*, quasi *aveia*, Vigilias, ab *α* privative, & *γρη* Somnus.

evidente, & ut Morbus solitarius, afficit, ita tamen, ut non solum hoc uno molesta singulari ferant, alii verò max. languorem & appetitum profectum inde percipiunt.

C A U S Æ.

Quæritur: quænam sit causa nimiarum Vigiliarum? Respondetur: omnis hic nimiarum Vigiliarum causa proxima est motus spirituum Animalium, aut animas aut saltem commoventes in Organâ Machine corporeæ, vel interna vel externa, cujus influxus, ut vocat, seu Motus ratione, promptè sensum obiectorum impressiones recipiunt, & postmodum per rationem Motuum in Organâ impressione similiter ipsi in cerebro commoti varias Animalis rationali Discursuum occasionem subministrant. Ubi verò in sensibus externis nil percipitur, necessarii Animal dormit, adeoque saltem ratione cæcurnorum sensuum, & hinc consequenter sensus communis, Vigiliæ vel somnus oritur.

Causa verò per se animi spirituum influxus seu remota est duplex:

1. Objectionem sensus externam, fortissimè Organon quoddam, tam intra quam extra corpus, afficiens, adeoque tuoc per quodam symptomaticum saltem le habeat Vigiliæ.
2. Est ipsam vitium morbosum aut spirituum Animalium aut cerebri, quo idem mobiliores sunt.

Spirituum Animalium vitium est, quando quavis ex causa mobiliores & quasi magis elastici redduntur idem. Cerebri vitium, cujus occasione isti in continuo Motu conservantur, est aut per se aut animæ aperte atque hiatus ex aliquo ejus ariditate seu Siccitate, commodè Nutrimenti defectu, unde etiam Cerebri Poris patulis spiritus in continuo fluxu Motu, unde tandem urgentur Vigiliæ; aut breviori quadam ipsarum Fibrarum Cerebri aut Membrarum ejus propter Nutrimetum acris aut salius, aut propter feram acris, unde quoque Cerebro commoventur.

Primam causam quod attinet, quando obiectum quoddam fortissimè Organâ sensuum afficit, necessarii spiritus agitantur, & fortissimè moventur, quæ Motuum secundum Nervi ductum ad Cerebrum aliquæ continuatur ceteros spiritus in Cerebro similiter movent, unde necessarii vigilet Animal. Hinc videmus, quod Clamor fortis, Dolus quicunque, tam externa, v. g. Cupitis, quam interna, v. g. Colicæ, Nephriticæ aut Ilacæ, &c. in senilioris externis spiritus in Motum inordinatos egerant, Somnum tollant, & Vigiliæ continuas inducant: item Tussis, quatenus concutitur sub iode totam potius & totam nervulorum Systemâ, necessarii in Vigiliæ deducit. Quin & Dyspnoea, Orthopnoea, &c. ordinarii Vigiliæ inferit, sed saltem symptomaticas, ob sensibilem illam molestim, quam in pulmonibus & præcordiis excitat.

Præterea obiectum spiritus afficiens sæpius in primis vitiis intelligendum. Sæpiè in omnibus Agrypnis pertinationibus vel vitium est in spiritibus Animalibus & cerebri, vel per causalem vim, ex vitiis primarum viarum, Digestionisque plus minus vitiatæ ratione, & unde quoque præternaturalis, quæ oritur vel ex assumptis vitiis, vel malè digestis, vel vitiis alteratis, vel perversè distributis, quæ irritando partes sensibiles in illis locis, etiam nobis non sentientibus, Agrypnias inferunt: verè gr. qui laqueis venant, infomnes noctes ducunt; gaudet Albus clausa est nimis, Somnum in terruptum habent. Agrypnia Infantum, item Pauperum in Somno, ex primis vitiis, præsertim circa stomachum, radicem habent.

Hæc de prima causa seu obiecto quod inducit Vigiliæ.

Quod secundam causam est ipsam vitium spirituum Animalium varium, a quo idem ad concitationes & pertinationes disponatur Motus: quod fit in junioribus & vegetioribus subiectis, laudabili & generoso Vitio & Potu, moderatius tamen, uterebunt, quibus spiritus nimis mobilis ac nimis agilis generatur, in his namque labinde Vigiliæ so. lent urgere. Pertinet hoc totius Cerebri Feror & incalcescentia in febribus ardentibus & similibus, cujus occasione velocius spiritus motui necessarii inducunt pertinationes Vigiliæ: unde etiam in Affectu, item in Juvencute, & Aetate Virili, in genere in Cholerico, promptiores sunt Agrypnæ, Somnigæ minus profundæ. Hoc lo Affectu ab Aere æstivo & fervidiore, item sub Climate æstivante arguit, & ab hoc spiritus Animales, quasi commoventur, hoc Vigiliæ

excitantur, In specie Miasmata peregrina & maligna, aut spiritus Animales irritando & corrumpendo, & inordinatè agitando, aut cerebrum ejusve Membranas præternaturali sensu afficiendo, pertinetque Vigiliæ inducant in febribus Malignis, quæ Deliria & variæ Phæcoles excipiunt, quia spiritibus Animalibus vinosis quasi minus sociabilibus sunt hæc Miasmata, unde eisdem turbant. Similis Miasmata spiritus exagitant & in Herba Thos aut Coffea Potione quoque concipere conveit. Quo etiam facit eius Carnium ferinarum, in quodam Vigiliæ movens: Vid. RHODIUS sent. 3. observ. 35. Ad hunc casum fontem pertinet etiam ipsa Animalis Rationalis, Cuius intentus vel Meditationibus & similibus occupatur. Cum enim hæc ipsa statum, seu Institutum, necessarii spirituum Animalium, quorum Motum gravius cura aut anxie Meditationes interuorem reddunt, necessarii Vigiliæ nimis inferunt. Pertinent hactandem animi affectus, ut Amor, Ira, inquisitio Terror, Pavor, Metus in gradu intenso, &c. in quibus ob velociores & inordinatior Motus nimis coadli spiritus hanc facili cessant, quia continuato Motu Agrypnias inducant.

Quod verò attinet Cerebri vitia: hoc Vigiliarum causæ evadit, si Meatus ejus patuli magis & laeviores existant, adeoque spiritibus Animalibus nulla repugna imponatur. In quo casu hoc peculiare observatur, quod ejusmodi Agrypniam nullum Torporem, nullam ad Somnum propensionem, nullamque aliam molestim inde percipiunt; eujus causæ aliquæ Cerebri & Fibrarum Medullæ Ariditas, & Squæ, ex defectu humoris nutritivi (vel quatenus hic non generatur, vel quatenus absumitur) Cerebrum humectant, & in Nutritione Poros angustant, ratione cujus inane quoddam tractibus illis medullaribus contingit; hinc Invidia ducitur Perrigillium inducit, de quo vid. MARCUS MARG. Phil. Præterea ref. pag. 392. Nempe Aliments, immoderata temperata, humectat cerebrum, & hanc irritat, Ipsique adeo spiritus quasi acriores facti fluere motu somnum inferunt; sed sub lædia, cerebri minus humectat, sed magis arid & poroso facta, spiritus spiritus Animales sublevis redditi Vigiliæ inducant. In hoc modo intelligenda est illa locutio plebeia; Agrypnia edit, id est, non per se dormio. Faciunt huc etiam aliam acriora & spirituosiora assumpta, & oleosa volatilia, tam arida, ut Pippata, Cinnamonum, &c. quæ alia, ut Affecta, Crisp, Eracta, &c. a talibus enim spiritus Animales sunt indigenter volatiles, acuti & quasi aeris, unde ex velociori motu irritantur quoddammodo cerebrum, & Genus nervosum alterantur, Vigiliæ inducit. Hinc Venæ nimis, abusive instituta, causat Vigiliæ nimias, quatenus quatenus est spiritus Animales indigenter commoventur, partim quatenus Venæ exauritur Rorem nutritium Cerebri ac partim spirituum Nutritione dicatur. Quo etiam licet Agrypnia & sudore nimis & Lienteria, item ab intermissione Purgantis usu, dum quidam vel fervore calculari ex huius Purgantis factus talis agrypnus per tres septimanas vid. M. A. N. C. ann. 6. observ. 185. p. 346. & Tabaci abusu; dum quidam ex nimio abusu Tabaci incidere in Agrypniam perdecem dierum. Equidem Tabacum per se est Narcoticum, interim est nimio usu prævalere Saleis volatilis aeris, quod Salivam excitat, & simul rorem Corporis Cerebri evacuat; Cerebrumque ita porosius reddit: conf. Melli Adad. Nat. Cor. lib. alleg. In specie similibus imprimis sequitur Symptoma est Agrypnia, vixque non tam ex spirituum vitiis, quam partem cerebri textura alterata, partim digestibus primæ vitio. Nempe Cerebri Poris, Nutritione in Somno nonnihil naturaliter deficiente, nimis aperti ac nimis pauli libertum spiritibus commoventur unde continuè permittunt, quorum plucida quidem, sed continuata Mœne, Somnus deficit (M). Quod Diffinitio prima vitium verò, non solum tamen primas vias intensius molestim spiritus turbant, dum minus commodè ex procedit, sed etiam deficientes Chyli nutritivi causa, Cerebrum partemque nervæ aridiores ac sicciores ferè redduntur: quare etiam hic Calefactientia, v. g. Vinum, alique spiritus, & somni conciliant, Ventriculi Digestionem vivando; minime vero humectantia, & refrigerantia commovent dila. Hæc etiam Agrypniam inferit Succi chylosi acrimonia, quæ ferèbatur interdum Inducere solet: quæ etiam species, quæ de Thee & Coffea supra addita. Accedit hic Somnus ad rem attentio; Somni enim continua sedulitas, & continuæ Curæ circa rem familiarem, quibus sensilis Aetate est exposita, calcar addunt spirituum Animalium continuæ &

(M) Vide quoque de Somni & Vigiliæ natura notandum ex Des-Cartes, hic Tenit. Instit. Med. p. 1. cap. 6. col. 4. p. 1. K. qui Cerebri humectationem partem ad Vigiliam quædam ad Somnum facere existimat.

Et magis continuo motui, unde Vigilie.

Denique *Melancholia*, *Mania* & *hæmæ*, præ aliâ mole-
stis partium Perturbat, stat quidem *Melancholia*
per quatuordecim menses fuerit vigili & insomnis: & talia
Melancholia, ut etiam per aliquot dies, in menses, in
continenti sit Vigilis, continuato casu hoc malum sine
Vitium debilitate perferunt; ac quidem multiplex ea fuit.
Nam præter *Phrenitidis* melancholici convulsam specu-
lationem supra insinuatam, eorum Massa Sanguinea
acrior, & visio digestio primæ acrior esse videtur, unde
Spiritus Aëiales & ipsi minus volatiles degenerant à de-
bita Cras, & aciores & asperiores, quodammodo acido-
res & asiores generantur ite inquinati, qui Fibras cere-
bri medullares impetuosis vellicunt, quæ commove motum
novum & extraordinarium ipsi Spiritibus deus imprimunt:
Unde ex perturbatione spirituum per eosdem poros no-
vi, præter alia Pathemata continue oriuntur Vigilie quæ
& Camphora curantur: in quo continuo Motu Spiritus
Animales ne fortissimè etiam Opaci aucteant, & Som-
num capiunt. Interim *Melancholia* & *Meditatio* sum pen-
sum hoc conficiunt.

DIAGNOSIS.

Signa *Diagnosis* per se sunt nota; *Eger* enim si non do-
mit, satis manifestè se vigilare.

Præ ceteris tamen cognoscendæ Causa Vigilie, quæ sunt
faciles, quando *Eger* latenter se affligi Caris, Affectibus
indulget. In Febribus Ardentibus & malignis facile pa-
cet, unde sint Vigilie.

PROGNOSIS.

Quod *Prognosis*; Vigilie nimie non sunt contemnendæ,
eum necessario omnes vigilie notabilem *Vitium debilitatem*
inferant, quæ in somno reficiuntur, ac præsertim non raro
in Febribus Acutis *Deliria* ac motus convulsivi post se
trahunt. Hinc HIPPOCRATES *Secl. 5. Aphor. 18.* à Vigilis
Convulsio aut Delirium, malum pronunciat.

Deinde Vigilie in *Acute* consistunt aut in *Acute* multo
plūs nocent, quam in *Acute* parvis aut *Acute* vix.

Interim Vigilie in *Acute* *Acute* diu nequeunt durare im-
primis in Febribus puerperarum, iuxta canonem; quod con-
traria *Acute* requirit, durabile non est: sed vel ad salutem vel ad
Mortem terminantur. In *Chronicis* vetè morbis, speciatim
in Affectionibus melancholicis, interdum satis diu citra noxam
continuantur Vigilie; ver. gr. in pœcia illa, cuius modò
et MARCO MARCI mentio facta fuit. Sic enim obli-
vatus fuit ordinem quadraginta quinque dierum continuam.
FERNELIUS *Pathol. lib. 3. cap. 6.* & SCHENCKIUS
lib. 3. Observat. refert vigilas quatuordecim mensem in men-
te capto.

Sed stat minù male sint in Chronicis talibus Vigilie
quam in Acutis; tamen quæ diu duraverint, ac tamen priores
Symptomata tandem post se trahunt, ac nonnunquam in
Delirium & Fatuitatem terminantur ad Stuporem reddunt
experiencia testatur: sic PANAROLLUS *Præf. 5. obs.*
ad refert Pacrum biensem les menses in somno, postea
Fatuum reddidit: Aliquando tamen minis exultat exi-
tus: vid. M. A. N. C. *Ann. 3. observ. 13.*

CURA.

In Cura Vigilium. Agrypnia Causarum remedium seu
Antidotum imprimis habendus est ratio, adeoque vel

1. Opellum externum, quocunque modo systema Ner-
vum afficiunt, partes sensibiles plàs morbis irritant,
& consequenter Spiritus Animales in Vigilias
Symptomata continem, removendum & silen-
dum; aut
2. Nimia Spirituum Animalium Agilitas & Impetus
blandis Anodynis, aut bene correctis Narcoticis
moderatè silenda, iuxta ad Motum blandiorem &
torpidiorem quæ disponendi; aut
3. Blandis Temperatis & Nutritivis & moderatis O-
leosis, Cerebri, *Uterusque* spirituum Animalium dyl-
crasie, propiciendum, ut spirituum Acrimonia tem-
peretur, & Cerebri Siccitas, hujusque Mea-
sum Amplitudo, per Alimenta boni succi, &
Humectantia seu Oleosis corrigatur; *Uterusque* au-
tem Dipsie vitiosa, si in culpa fuerit, emendetur.

Laetitia externa, quomodò removenda, ac hæc
diu partim constat, partim in vulgus innotescit, Causa
Tom. II.

Interim quia sunt, vel *Artemisia*, vel *Mentha* Sanguinis im-
petuolior, vel *Melancholia* heterogenea, patet, quod *Artemisia*
sua vulgò dila, nempe *Uterusque*, aut *Purgatio*, enim
Digestiva, &c. in Vigilis per se oil conficiant, sed vel pri-
us indicat tantum intus aliquis visus fuit, ac nempe per
accidos Causam Occasionalem auferant: scilicet quavis
v. g. Veneficis interdum, ubi Vigilie urget, postula-
tur, sit tamen hoc propter morbum adjundum, five causa
vigilium existat five locus: v. g. ubi peccat acrimonia scor-
butica, Cathartici aut Evacuatio per Sudorem, ubi em-
buatio sanguinea, Inflammatio dolorifica, &c. Veneficis
locum habet: vid. FORESTIUS *lib. 50. Obs.* 36. Sic etiam
refert DEODATUS in *Valdet. pag. 25.* Vigilias petina-
ces alius irritat per *Cathartici* *Uterusque* fuisse curatas
quodque per accidens tantum, nempe Ventriculi cruditati-
bus evacuatis, Vigilis aliquid contulisse, probabile vi-
detur.

Pro secundo verò scopo satisfaciunt Medicamenta hypnotica
& Narcotica dila, quæ figere solent spiritus potentior, &
promptè Vigilias silunt. Nam utur sunt molina, tamen
iocundum coactis Medicis iisdem utitur, sed fiat probè co-
secta. Hæc ipsi Narcotici sunt imprimis *Papaveris* uti-
tissima juxta Antiquis, eaque papaver insipidius Succus
aut expressione elicitis, dila Mecanum, quod est solium
Opium, aut Succus incisione sponte exillans, quod est ge-
minum Opium, quod correctum vigilas empetit; quia
unum est ex genere solanorum craticorum: sicut etiam om-
nes solanorum species narcoticam vim obtinent, Nactia-
na, Radia, Folia & Semen Hyoscyami, Mandragora
cujusque Radix, Flores Ligulæ, item Stramonium epique
Semen à BARTHOLETO commendatum tanquam sin-
gulari Narcotico, & quod simul biliarum inducat; uti
& species ejus nobilior, *Datura Indurum* dila. Hic etiam
Crocus ejusque præparata, & suo modo *Althæum* adde-
da sunt: quæ duo cum Papaveris & Opaci frequenter us-
urpantur, reliquorum enim usus non adeo tutus est; quem-
admodum ex Radice Hyoscyami ejus BORELLUS *Cent. 4.*
Observ. 45. Dementiam amovet. Alias notum est, quod
Opium altumum habet in calis Orientalibus, præter Somnum,
inferat Somnia jucunda; contrari vero septentrionalibus ru-
bulenta, gravis, ac Visiones Caedemonum, &c. produ-
cat. Es his ipsa Hypnotica variis *Acute* Camphora, & Vete-
rum & Modernorum. Veteribus in usu fuit Philonium Ro-
manum, Philonium Perficum Requies *Nictal*; Pulvis de
Cynoglossa, &c. quæ tamen ipsa remedia, cum cruda
Narcotica recipiant, juxta propemodum in delictuendum
abierunt. Loco eorumdem à Modernis Theriaca, Mithrida-
tium, Syrupus de papavere simplex & compositus, Dia-
cedium, Eledothium Disacordis, ac Laudana opati in-
nita, & similia imprimis usurpantur, iuxta quæ extra-
ctum Opil cum Tindura Tartari, aut per fermentationem
Langelæ, aut per dila eorumdem cum Sale Tartari aut alia
Salibus litivibus, item Fermentum Narcoticum *Com-
positum* excellunt. Et sane egregium est Laudanum Opium,
si rectè præparatum fuerit. Permiscetur cum Pulveribus
verbi gratia cum Alepharmacis mistum, sit Pulvis Anody-
nus Alsterius; cum Confortantibus, sit Pulvis Anody-
nus Confortans; item cum Alepharmacis liquidis sit Ef-
fectia Theriacalis Anodyna. Nam raro Opium arboritur,
quin Appropria adacta. Quibus etiam accentiens
Aquam Hypnoticam *Dorsacell*, Aquam *Uterusque* Lan-
gæ, Estrachum & Pulvis de Stramonio, quæ eisdem
habent virtutes cum Opio. BARTHOLEUS *Liquorem*
Somniferum quendam præparat hoc modo.

℞. Sem. Papav.

Crocum.

Stramon. suffr.

Contus cum l. q. Agne ponit in digestionem fini equi-
ni per quatuor horas, postmodum dilata, & ex re-
serta destillat lento igne.

Dosis est unc. ʒ. ad ʒ. tanquam blandum Somniferum.

℞. Trach. Stramon. Biv.

Contundit & bullit in

Aqu. lallæ: Biv.

ad tertie partis consumptionem:

Decoctum exp. imit & digerit in Sole, postmodum im-
bibit cum *Aqu. Ardens* seu *Spiritu Vini*, & calic-
cat iterum Spiritu Vini *Bumacit*, & demò siccit:
hinc Succi Siccit vel insipidit uncia addit

Quæ ʒ.

Olei Cart. elvi ʒij.

Misceat pro pasta pilulari.

Non

Dosis

evidente, & ut Marbus solitarius, afficit, ita tamen, ut ad unum hoc uno molesta singulari ferant, alii vero mos *La. gorem* & appetitum proflatum inde percipiant.

C A U S A E.

Queritur: quomodo fit causa nimiorum Vigiliarum? Respondetur: omnis iste omniarum Vigiliarum causa proxima est motus spirituum Animalium, aut nimia aut saltem continuata in Organa Machine corporis, vel interius vel exterius, cujus influxus, ut vocant, seu Motus ratione, prompte sensuum obiectorum impressiones recipiunt, & postmodum pro ratione Motionis in Organo impressione similiter ipsi in cerebro commoti varias Animæ rationis Dictionum occasionibus ministrant. Ubi verò in sensibus externis nil percipiunt, necessarium Animal dormit, adeoque saltem ratione exteriorum sensuum, & hinc consequenter sensus communis, Vigiliæ vel somnus oriuntur.

Causa verò perpetua aut nimis spirituum influxus seu remota est duplex:

1. Objectionem sensuum externam, fortis Organo quoddam, tam intra quam extra corpus, afficiens; adeoque tunc per modum symptomatis saltem se habent Vigiliæ.
2. Est ipsam vitium morbosum aut spirituum Animalium aut cerebri, quo idem mobilis sunt.

Spiritus animalium vitium est, quando quavis ex causa mobilioris & quasi magis elastici redduntur idem. Cerebri vitium, cujus occasione isti in continuum Motu conservantur, est aut per se ipsum ejus nimia aperiæ atque bias ex aliquo ejus ariditate seu Siccitate, commodoque Nutritionis deficietia, unde etiam Cerebri Poris patulus spiritus in continuo sunt Motu, unde tandem argueretur Vigiliæ; aut irritatio quædam ipsarum Fibrarum Cerebri aut Membrarum ejus propter Nutritionem acris aut salis, aut propter serum acris, undecunque Cerebro communicata.

Primum causam quod attinet: quando objectionem quoddam fortis Organa sensuum afficit, necessarii spiritus agitantur, & fortius moventur, quæ Motiones secundum Nervi ductum ad Cerebrum usque continuatæ exteros spiritus in Cerebro similiter movent, unde necessarii vigilat Animal. Hinc videmus, quod *Clamoris fortis*, *Dolor* quicumque, tam externus, v. g. Capitis, quam internus, v. g. Colicis, Nephriticus aut Illicis, etc. in sensibus interius spiritus in Motu inordinatos egerit, Somnum tollant, & Vigiliæ continuas inducant: item *Tussis*, quatenus concutitur subinde totam pectus & totam nervorum Systema, necessarii in Vigiliis deducit. Quia & *Diſſinæ*, *Orthopæa*, &c. ordinarii Vigiliæ inferunt, sed saltem symptomaticas, ob sensibilem illam moleſtiam, quam in pulmonibus & præcordiis excitat.

Præterea *stipulum* spiritus afficiens sapienti in primis vix intelligendum. Sæpe in omnibus Agrypnia pertimescitur vel vitium est in spiritibus Animalibus & cerebri, vel per causam est, ex vitio primarum viarum, Digestionisque pila morbis vitæ ratione, & indecunque præternaturalis, quæ oritur vel ex assumptis vitiis, vel malè digestis, vel vitiis alimentis, vel per versè distributis, quæ irritando partes sensibiles in illis locis, etiam nobis non sentientibus, Agrypnia inferunt: ver gr. qui *lurgis cœnant*, infomnes noctes ducunt; quia *Alvus elata* est nimis, Somnum in terrupit habet. *Agrypnia Infantum*, item *Pavoris* in Somno, ex primis viis, præsertim circa stomachum, radicem habet.

Hæc de prima causa seu obiecto quod inducit Vigiliæ.

Quod secundam causam: est ipsam vitium spirituum Animalium varium, à quo idem ad concitationes & pertinationes disponuntur Motus: quod fit in iniuriis & vegetioribus subjectis, laudabili & generoso Vitiis & Poæ, moderatius tamen, utenibus, quibus spiritus animis mobiles ac nimis agiles generantur, in his namque subinde Vigiliæ solent urgere. Pertinet hic totius Cerebri Error & incalſcopia in febribus ardentibus & similibus, cujus occasione velocius spiritus moti necessarii inducunt pertinaces Vigiliæ: unde etiam in *Ætate*, item in *Juvenute*, & *Ætate Virili*, in genere in *Choleriis*, promptiores sunt Agrypnia, Somnique minus profundi. Hinc in *Ætate* ab Aere æthio & fervidior, item sub Climate æstivante sanguis, & ab hoc spiritus Animales, quasi commoveantur, hinc Vigiliæ

excitantur, in specie Miasmata petregina & maligna, aut spiritus Animales irritando & corrumpendo, & inordinatè agitando, aut cerebrum ejusve Membranas præternaturali lentia afficiendo, pertinaces Vigiliæ inducunt in febribus Malignis, quas Delirij & variz Phrenesies excipiunt: quia spiritibus Animalibus vinolis quasi minus sociabilibus sunt hæc Miasmata, unde eosdem turbant. Similia Miasmata spiritus excitantia & in *Herba Thea* & *Coffea* Potione quoque concipere convenit. Quo etiam facit ejus Carnium ferinarum, in quodam Vigiliæ movens: Vid. RHO. DIUS sent. 1. obs. 35. Ad hunc calorem fontem pertinet etiam ipsa *Animalia Rationabilia*, Cuius intentio vel Meditationibus & similibus occupata. Cùm enim hæc ipsa utatur, cœa Instrumeto, ministerio spirituum Animalium, quorum Motum *graves cura* aut animæ Meditationes intentione reddunt, necessarii Vigiliæ nimis inferunt. Pertinent huc tandem animi *afflatus*, ut Amor, Ira, inſignis Terror, Pavor, Metus in gradu intensio, &c. in quibus ab velociore & inordinatis Motus nimis coacti spiritus hanc faciliè cessant, quia continuata Motu Agrypnia inducunt.

Quid verò animi Cerebri vitia: hoc Vigiliarum causa evadit, & Meatus ejus patuli magis & laiores existunt, adeoque spiritibus Animalibus nulla repugalia imponentur. In quo causa hoc peculiare observatur, quod ejusmodi Agrypniam Torpore, nullam ad Somnum propensionem, nullamque aliam moleſtiam inde percipiunt; cujus causa aliqualis Cerebri & Fibrarum Medullæ Ariditas, & Squor, & defectu humoris nutritii (vel quatenus hic non generetur, vel quatenus absumitur) Cerebrum humectantibus, & sub Nutritione Poros angustantibus, ratione cujus in se quoddam tradibus illis medullaribus contingit; hinc *Jædicia* diuturnior Perivigilium inducit, de quo vid. MARCUS MARCI Phil. *Historiam* 188. pag. 393. Nempe Alimentis, imprimis temperatis roridis, humectatur cerebrum, & blandè irroratur, ipsique adeo spiritus quasi aquosiores facti placidior motu somnum inferunt; sed sub lœdia, cerebro minus humectato, sed magis arido & poroso facto, ipsique spiritus Animales subtiliores redditus Vigiliæ inducunt. Et hoc modo intelligenda est illa locutio plebeia; *Agrypnia odit, idcirco non potest dormire*. Faciunt huc etiam alimentis acris & spiritibus aliis, & oleis volatilibus, tam aromatis, ut *Piperis*, *Cinnamonum*, &c. quam aliis, ut *Allicia*, *Coffea*, *Eruga*, &c. & talibus enim spiritus Animales sunt inſigniter volatiles, acuti & quasi acris, unde ex velociori motu irritantur quodammodo cerebrum, & Genus nervosum alterantur, Vigiliæ indebit. Hinc *Ætatis nimis*, abusive inſinuat, causat Vigiliæ nimis, partim quatenus ex spiritus Animales inſigniter commoveantur, partim quatenus Venis cœuatur Rorem nutritionis Cerebri ac partim spermaticarum Nutritione dicatum. Quo etiam facit Agrypnia *à Jædura animi & Lœntia*, item ab intertempore *Purgantis ætate*, dum quidam hoc fervore cauculari ex haustu Purgantis factus fuit agrypnus per tres septimanas: vid. M. A. N. C. ann. 6. obs. 185. p. 346. & *Tadani abusu*; dum quidam ex nimia abusu Tabaci incidit in Agrypniam septuaginta dierum. Equidem Tabacum per se est Narcoticum, interim ex nimio usu prævalet Sale ejus volatilis acris, quod Silvam excitat, & simul rorem Corporis chyloſum evocat, Cerebrumque ita porosus reddit: conf. *McCall. Acad. Nov. Cur. loc. alleg.* In specie *ſenilis* imprimis frequens *ſymptoma est Agrypnia*, idque non tam ex spirituum vitio, quam partim cerebri texture alenta, partim digestione primæ vitio. Nempe Cerebri Poris, Nutritione in Senibus nonnulli naturaliter deficient, nimis aperti ac nimis patuli liberissimi spiritibus commeatum quodque continuè permittunt, quorum placida quidem, sed continuata Motione, Somnus deficit (M). *Quod Digestionis primæ vitium* verò, non saltem circa primas vias intestinales moleſtiam spiritus turbat, sed minus commodè ac procedit, sed etiam deficientis Chyli nutritivi causa, Cerebrum partemque nervæ aridiores ac faciores fieri redduntur: quare etiam his Caleſcientia, v. gr. Vinum, alique spiritibus, somnum conciliant, Ventriculi Digestionem juvando; minime verò humectando, & refrigerando committere dicta. Modò etiam Agrypniam inferunt Succus chyloſi *aridioris*, quem *ſerſitas* interdum inducere solet; quo etiam ſpectat, quæ de Thee & Coffee supra addita. Accedit hic Senem ad rem attentio; Senem enim continui ſedulitas, & continuè Curæ circa rem familiarem, quibus ſenilis *Ætas* est expolita, calcar addunt spirituum Animalium contumaciæ

(M) Vide quæ de Senis & Vigiliæ natura notantur ex Def-Cartes, hic Tomis. Iosſit. Mod. p. 1. cap. 86. col. 35. lib. K. qui Cerebri humilitatem potius ad Vigiliam quam ad Somnum ſacra caſſimar.

de magis continuo motu, unde Vigilie.

Denique *Melancholici*, *Maniaci* & *furiosi*, præ aliis molestissima parturienti Pervigilia, sicut quidam Melancholici per quatuordecim menses fuerit vigili & somnisi: & tales Melancholici, ut etiam per aliquot dies, imo menses, in continuis sint Vigilie, continuo casu hoc malum sive *Virum delirantis* persequuntur; ac quidem multiplici ex fonte. Nam præter *Phantasmata* melancholici continuatam speculationem supra insinuant, eorum *Mella Sanguinea* acrior, & vino digestissima primæ acidior esse videtur, unde Spiritus Animales & ipsi minus volatiles degenerant à debita Crassi, & acriter & asperiores, quodammodo acidiores & hiores generantur ita iniqui, qui Fibras cerebri medullares impetuosis vellunt, que commotum motum novum & extraneum ipsi Spiritibus denud impediunt: Unde ex perturbatione spirituum per eisdem poris motu, præter alia *Parthenia* continue oriuntur Vigilie quæ de *Camphora* curantur: In quo continuo Motu Spiritus Animales ac fortissimè etiam Opacis auscultant, & Somnum capiunt. Interim *Melancholici* & *Maniaci* somni pen- sum hoc conferunt.

DIAGNOSIS.

Signa Diagnostica per se sunt nota; *Eger* enim si non dormiat, satis manifestè sit vigilare.

Præ ceteris tamen cognoscenda *Causa Vigilie*, que sunt faciles, quando *Eger* latenter se affligi Curat, Afflictibus insidens. In Febribus Ardentibus & malignis facile patet, unde sint Vigilie.

PROGNOSIS.

Quand *Prognosis*; Vigilie nimis non sunt contemnenda, cum necessario omnes vigilie notabilem *Virum delirantis* intulerint, quæ in somno relictur, ac præteritum non ratio in Febribus *Acutis Delirio ac motus supervenisse* post se trahunt. Hinc HIPPOCRATES *lib. 7. Aphor. 18.* à Vigilie Conculso aut Delirium, malum pronunciat.

Deinde Vigilie in *Acute* consistunt aut in *Sexta mulieris* plius nocent, quam in *Acute* puerilis aut *Sexu virilis*.

Interim Vigilie in *maris Acute* diu nequeunt durare imprius in Febribus puerperarum, iuxta canonem; quod casus alterius requirit, durabile non est; sed vel ad salutem vel ad Mortem terminantur. In *Chronicis* vero morbis, speciatim in Afflictibus melancholicis, interdum sagis diu citra nosam continuantur Vigilie; ver. g. in pœcia illa, cuius modo es MARCO MARCI mentem facta fuit. Sic enim obfervat fuit eodem quadraginta quinq. dierum continue. FERNELIUS *Psychol. lib. 5. cap. v.* & SCHENCKIUS *lib. 1. Obfervat.* refert vigilie quatuordecim mensem in mente capto.

Sed octo minus menses in *Chronicis* talibus Vigilie quam in *Acutis*; tamen quæ diuturniores, eo tamen peiora Symptomata ferunt post se trahunt, ac nonnunquam in Delirio & Fatigatitate terminantur aut Stupidos reddunt, ut Experientia testatur: sic PANABOLLUS *Præf. 3. obs. 10.* refert Puerum biennem fies menses in somno, postea Fatum reddidit: Aliquando tamen minus exiguè existunt: vid. M. A. N. C. *Ann. 3. obs. 185.*

CURA.

In Cura Vigiliarum, Agrypnia *Conferum remedium* seu *Antidormium* imprimis habenda est ratio, adeoque vel

1. *Opacum extraneum*, quocunque modo systema Nervosum afficiens, partes sensibiles plius minus irritans, & consequenter Spiritus Animales in Vigilias Symptomaticas commovens, removendum & sistendum; aut
2. *Nimia Spirituum Animalium Agilitas* & Impetus blandis Anodynis, aut bene coactis Narcoticis moderatè sistendi, siue ad Motum blandiorem & torpidiorem quasi disponendi; aut
3. *Blandis Temperatis & Nutritivis* & moderatis Oleosis, Cerebis, *Stomachicis* Spirituum Animalium dyscrasie, propiciendum, ut Spirituum Acrimonia temperetur, & Cerebri Siccitas, huiusque Mætuum Amplitudo, per Alimenta boni succi, & Humectantia seu Oleosa corrigatur; *Præteritis* autem Dyscrasie vitiosis, si in culpa fuerit, emendetur.

Langue exteriori, quomodo removenda, ac hactenus dictis partem constat, partim in vulgus innotebit, Causa

Tom. II.

Interne quæ sunt, vel *Artemisia*, vel *mentis sanguinis* impetuosus, vel *Immoderata* heterogenea, patet, quod *narcofalia* vulgo dicta, nempe *narcofalia*, aut *Purgantia*, etiam Digestiva, &c. in Vigilie per se oil conferant, sed vel prius indicati, tantum intuius aliquis usus sunt, ut nempe per accidens Causam Occasionalem auferant: scilicet quævis v. g. Venæsectio interdum, ubi Vigilie arguent, postulat, sit tamen hoc propter morbum adiunctum, siue causa vigiliarum cessat five secus: v. g. ubi peccat acrimonia scorbutica, Cathartici aut Evacuativi per Sudorem, ubi emulatio sanguinis, Inflammatio dolorifica, &c. Venæsectio locum habet: vid. FORESIUS *lib. 11. obs. 16.* Sic etiam sefert DEODATUS in *Volat. pag. 25.* Vigilie peritiam aliis irritis per Catharticum Magellanicum fuisse curatas quodque per accidens tantum, nempe Ventriculi convulsibus evacuatis, Vigiliæ aliquid contulisse, probabile videtur.

Pro secundo vero scopo satisfaciunt *Medicamenta hypnotica* & *Narcotica* dicta, quæ liget solent Spiritus potenter, & promptè Vigilias sistunt. Nam utur sint maligna, tamen interdum coactus Medicus iisdem utitur, sed sint probè correctæ. Hæc ipsa Narcotica huius imprimis *papaverinis* utilissima jam Antiquis, esque papaveri insipillatus Succus aut expressione elicitus, dictus Meconium, quod est nostrum Opium; aut Succus incisione sponte extillans, quod est genuinum Opium, quod correctum vigilias compescit; quia unum est ac genere solanorum exortitur: sicut etiam omnes Solanorum species narcoticum vim obtinent, Nicotiana, Radix, Folia & Semen Hyoscyami, Mandragora ejusque Radix, Flores Ligulari, item Stramonium ejusque Semen à BARTHOLETO commodatum tanquam singulari Narcotico, & quod simul bilaritatem inducat; uti & species ejus nobilior, *Datura inodora* dicta. Hic etiam Cræci ejusque præparata, & suo modo *Asphodelum* addenda sunt: que duo cum Papaverinis & Opacis frequenter usurpantur, reliquorum enim usus non adeo tutus est; quemadmodum ex Radice Hyoscyami elu BORELLUS *Cent. 4. Obs. 45.* Dementiam annotavit. Aliis notum est, quod Opium assumptum ab incalis Orientalibus, præter Somnum, inferat Somnis jucunda; contra vero septentrionalibus turbulenta, gravis, ac Visions Cacodemorum, &c. producat. Es his ipsis Hypnoticis variis *Suæ Compositæ*, & Veterum & Modernorum. Veteribus in usu sunt Philonium Romanum, Philonium Pericum Reques *Nisialis*, Pilulæ de Cynophila, &c. que tamen ipsa remedia, cum cruda Narcotica recipiant, jam propemodum in deficiendum abierunt. Loco eorundem à Modernis Theriaca, Mithridatum, Sympus de papaveri simplex & compositus, Diacodium, Elecharium Dalcordii, ac Laudana opata insinua, & similia imprimis usurpantur, inter que extrahendum Opil cum Tindura Tartari, aut per fermentationem *Langeletii*, aut per distillationem cum Ssle Tartari aut aliis Salibus lixivialibus, item Fermentum Narcoticum *Compositum* excellunt. Et si ne egregium est Laudanum Opacum, si rectè præparatum fuerit. Permissum cum Pulveribus, verbi gratia cum Alexipharmacis mixtum, si Pulvis Anodynis Alexiterius; cum Confortantibus, sit Pulvis Anodynis Confortans; item cum Alexipharmacis liquidis de Effentia Theriacalis Anodyna. Nam sard Opium subhibet, quin Apnoprietas addatur. Quibus etiam accensum Aquam Hypnoticam *Dorsivellit*, Aquam limoniferam *Langeletii*, Extrahum & Pilulæ de Stramonio, quæ eisdem habens virtutes cum Opio. BARTHOLETUS *Liquorem Somniferum* quendam præparat hoc modo.

℞. Sem. Papav.

Cucumer.

Stramon. sicc.

Contusa cum f. q. Aquæ ponit in digestionem fini equi al per quatuor horas, postmodum filtrat, & ex reorta destillat lento igne.

Dosis est unc. 6. ad 8. tanquam blandum Somniferum.

Pilulæ verbæ stramonii hoc modo præparat.

℞. Stram. Stramon. Bvli.

Contundit & bullit in

Aqu. lallus: Bvli.

ad tertiam partem consumptionem:

Decoctum exp. imit. & digerit in Sole, postmodum imbibit cum *Aqu. Ardens* seu *Spiritu Vini*, & escicaciterum Spiritu Vini buncat, & deinde siccatur: bioc Succi siccatur vel insipillatur uncia addit.

Cruci 3℞.

Olei Cere. citri 3℞.

Miscet pro pasta pilulari.

Nam

Dosis

Dosis à gr. i. ad gr. ii. quæ Pluribus præter Somnum blandum etiam quicunque Fluvium sunt.

Locus convenit *Essentia seu Pharmacum Phantasticum Bartholæi*, ac Laudacum hoc Opus, live et Fructibus Daturæ Iteuracum live Indorum eundem quod BARTHOLETUS in suo *Trat. de Respirat. lib. 3. cap. 1.* describit; scilicet ac Daturæ huius Pomorum succo expresso insipito cum spiritu Vini coquitur Tincturam; cui ad consistentiam Extracti impellere addit Crocum & Nucem Moschatam. Ac ita Daturæ insert somnum cum quadam læticia copiosum. Commendat etiam BARTHOLETUS Effentiam Opus cum spiritu Vitrioli volatili paratam, & spiritum Lolii, quem omnium præstantissimum proclamat. Spectat huc etiam Primum Aëris Veneris ac Vitriolocum sale Ammoniacum parandum; item sulphur Vitrioli Anodynum; quamvis huc posteriori nihil ejusmodi virium concedat BARTHOLETUS I. a.

Sed de Opiatorum usu in Agrypnia bene observandum quod movet WINGLERUS *Tr. de Opia pag. 244.* nempe quod Opium licet in Vigiliis singulariter utilis sit, tamen ut ait semper, nec in amplexibus attendendum. Est enim, quando Vigilia sunt infansit Crises signum; ubi ferè sunt omnia de Opia, nec Natura labor impeditur. Est etiam, ubi sensus diuturnus vigiliis torquetur, ubi potius Analgetica cunctantur, ut spiritus Diacubili dulcis, Diambra, Ambra, & similia. Est tandem etiam, ubi Vigilia sunt ex angustia Periculi, ex Despectu, in Hydrops, ubi Opia vice tantum usurpantur, necesse enim est ut somnus fortiter provocetur suffocatur. Ergo. Est etiam, ubi Vires exhaustæ sunt, spiritusque deficiunt, ubi quous minus opia conveniunt. Hæc WINGLERUS. Et si quando usurpanda sunt, usurpentur eadem in quantitate parva, partibus vicibus, ut recte monet SEPTALIUS, adeoque repetito crebrius in parva dosi eorum usu, quoniam eorum Animam laebatilis, & eos stupidi Ingenii reddunt. In Agrypnia Melancholici ahi facient, sed saltem Temperata adhibenda sunt ex Passulis, Liquiritia, Borragine, & similibus. Ex. gr.

℞. Conf. Flor. Papav. err. 3i.

Theriac. vel Zeli. diaphan. 3℞.

Laud. Opia. gr. i.

M. f. Bolus. S.

Electissimum serotinum pro una vice.

Vel

℞. Cinna. nardo. vel antimonii, vel Mag. Corall.

gr. xv.

Sac. saturnal. gr. viii.

Laud. Opia. gr. i. vel ii.

Cam 3℞. Croci 3℞. Pil.

D. S.

Pilulæ vespertine ad quietem.

Sumentur vespere hora ante passum.

Pro tertio siq. ut nempe temperatis Nutritivis Cerebris & Diffusis spirituum animalium præcipuatur, ad Vigiliis præfuit vulgo sic dicta *Refrigerantia & Humectantia*. Hinc Temperata plus minus alexisimola, & quasi lætificentia chylosa blandè nutritientia, ut *Lactuca*, & totus Lactucarum exercitus, cuiusque eius; huc ipsa etiam iam a GALENI temporibus est in uso contra Vigiliis nimias. Videatur ZACUTUS LUSITANUS *lib. 1. Med. Princ. Hist. 14.* ubi refert Vigiliis et nimis Meditationibus, aliis frustis adhibitis, per eam Lactucarum, & per Oleum Nymphae Naribus inuodum, curatas fuisse: Ubi etiam refert de GALENO, quod ipsi Lactuca fuerit Alexipharmacum Vigiliatium, & item *Nymphaea*, & ipsa Polia & Flores, imprimis externo usu. Papaver rhoeas & ipsum hic convenit, item Souche, Chondrilla, Flores Verbasci, & plura inde parata Remedia; In specie Fructus ses Nuclei & semina lactescentia, scilicet *semia quædam Trifida majora & minora*, Hordeum, Amygdalæ dulces, Piceæ, Pistacia, Nuclei Perficorum, ut & ea iidem, nunc solitaria nunc cum Semine Papaveris & Porcolacæ, factæ *Emulsiones* sunt usitate & in specie cum semine stramonii, cuius gr. i. vel ii. additis mira faciunt, de quo *sapra*. Hæc Emulsiones humectant blandè, temperant Acrimoniam turgescientium humorum, blandè nutriunt, & successivè somnum inserunt: vid. *SYLVIVS Pr. pag. 122. §. 25.*

Vel

℞. Sem. a. frig. maior. 3℞.

Papav. alb. 3i.

Amygd. dulc. 3ii. ad 3℞.

Cam 1 q. Apoc. Nymph. i. Emulsio:

ciade

Apoc. Clusam. 3℞.

Edulcor. cum syr. Nymph. vel Papav. vel cum

Ros. maris Chrysi perlat.

M. D. S.

Emulsio Confortans ad quietem.

Vel

℞. Sem. Papav. alb. 3℞.

Mel.

Amygd. dulc. an. 3i.

Apo. Flor. Sambur.

Acar.

Hypoc. Dornar. an. 3i.

F. Emulsio.

Edulcor. cum syr. Nymph.

S. ut aoter.

Hæc Emulsiones postmodum per Affectionem ratione, imprimis in Acutis Morbis, & alia Morbia *Appropria* ulceris addi possunt: Verbi gratia ponam agrypniam in Febre Melica, tunc

℞. Amygd. dulc. amb.

sem. papav. alb. an. 3i.

quævis frig. mag. an. 3i.

Cam 1 q. & Apoc. feracem, & Nymph. f. l. a. Emulsio:

Cui addi

Aqua Clusam. (ratione visium) 3℞.

Recond. Mineral. 3i.

Edulcoratur Rosalis mar. Chrysi perlat.

D. S.

Emulsio vespertina pro una vice.

Hæc autem subinde. Hic enim Bezardicum Minerale resistit Malignitati, in Febre, quam supposito, obviat.

Decollum Herdei scilicet cum Papavere & Radice Liquiritiæ commendatur à LINDANO in Agrypnia propter Incidiam vel defectu Roris notitiam humectant Cerebrum, licet *Herdei decollum* temperatum ipsum probolem extemporet *BORELLUS cent. 4. obs. 19.* in Agrypnia, Tuffi & Macie. Summatim; quæcunque *Dia Nutritiva* & quasi *similata* ad talem Agrypniam est optima.

Hæc de Interitis & Opia. Sed, ut dixi, imprimis habenda est ratio *Conformis* in specie ex *Indis* vel deficiente Rore nutritio & siccitate, ubi conveniunt Humectantia, Hordeum, Passula & Glycyrrhiza: item Emulsiones.

Quoad *Externas*, ad Agrypniam in genere usitata sunt vel *anodyna Narcotica Opia*, vel *blanda Humectantia*, tunc Temporibus ac Fronti, nunc Manibus ac Pedibus in forma *Pediluviorum* applicanda, quamvis eorum nunc SANCORIUS *Merb. l. 13. Cap. 2.* & PRIMEROSIUS *de Error. valgi lib. 4. cap. 45.* nullius efficacie indicent: scilicet *Epithemata* aut *Lotiones* ex Decodis Vegetabilium Emollientium & Aodynotorum, Florum Ligustri, Violarum, Panislyceæ, Jacæ, Chamomillæ, Nymphaeæ, Herbe Lactucæ, Foliorum Nymphaeæ, Solani, summitum Anethi, Felicium Salicis, Vitis, Violariæ, Corticis Mandragoræ, Capitum & Seminis Papaveris albi confusæ, & similia.

Emulsiones pariter ex Nucleis Perficorum, semine Papaveris albi, quatuor Frigidis maioribus & minoribus, Hyocyami, Lactucæ & stramonii (quibus HARTMANNUS semen Anthos, Fœniculi, & Anis addit) cum Aqua Nymphaeæ vel alia quadam specie, vel Lacte muliebri parata, Fronti ac Temporibus cum Lacteis multipliciter applicatæ; sicuti & Linteola Lactis tepido madida Fronti impolita insigniter conveniunt. Huius etiam loci sunt spongiae Cynobati, Ger. *die schlaff. Kuxen* & Liquor Vermiculorum in his reperitur *meale* Augusto collectorum. Vermiculi hi coalescentur fere contunduntur inter duos lapides, ut Liquor exeat, qui colligatur in Vitro & asseretur, quo Liquore illiusmodi Tempora; & etiam suave & blandum Hypnoticum sine omni periculo Narcoticis. Item *spongia semisera* ab HEURNIO *merb. lib. 2. cap. 7. descripta*, ex succorum *Nymphaeæ, Papaveris albi, Mandragoræ, Mororum immaturorum, Geriandri, Lactucæ* 10a 3i. ap. 3i. spongia ita humidata facta vel imprægnata, his succis, postmodum leni calore exsiccatæ, & Naribus admoveatur pro concilio somni. Hinc igitur *Emulsiones* ex Medalla Crurum Vitrioli & Cervi recentis, quæ Temporibus aliquoties tempore somni illig blandum somnum inducunt, vel accipiuntur Ausonia ex cruribus bovinis elixando in Aqua simplici elicita, quæ separata asseretur in Vitro, & radice solariibus vel alii blando calore exponatur, ut depuretur & post Temporibus illinatur. Item suavem infert somnum Piaguedo Lucii piscis, vel Leporis, Oleum Nymphaeæ, Anethinum, Papaveris albi, Nucia Moschatæ capressum, Hyocyami, Nucleorum Perficorum, & similia. Quo etiam pertinent Usquequum Populeum roccæ, de Alabastræ &

& Hypnoticum utatur; quibus aliquot guttur olei Hyocyami, interdum aliquantulum Croci, interdum aliquot grana opii, addi possunt, imprimis ubi cum Vigilis insistant Dolores Capitis. Denique pertinet hac Balsamus Hypnoticus *Mysicini*, & Cerumen ex Auribus Aſiei quantitate Plur. Temporibus illitum, in Agrypnia Februm Ardentium potens dicitur Narcoticum. Sed observetur, ne augatur dos; aliat nimis profundus & diuturnus somnus inducitur. Sunt qui *adorem* quoque ejusmodi Odoniferorum commendat, v. gr. Flurum Ligustri SENNETUS *fran. lib. 1. pag. 231.* item BACUTUS LUSITANUS *fran. lib. 1. p. 136.* Odorem decocti ex radice Mandragoræ, Hyocyami, Semine Lactucæ, Opio, &c. commendat. Quo etiam Odor Croci speciat, cuius gratia Sacculus, in quo hic asservatus fuit, à vulgo calcitrare supponitur. In M. A. N. C. ann. 6. *observ. 171.* aliquot prostant Euporbia innoxia conciliantia, qualia sunt: Aurei Leporinæ abscessus, & pulverari suppositus: Unguen illud seu Crassamentum unctuosum, quod Rotis molaribus agglutinator, Temporibus illitum; Cranium Humanum Agro infuso subditum; Sacculus Nidulæ aquaticæ cum Aceto Naribus illitus; Pinguendo item Lucii piscis eodem modo adhibita: pulvis ex Folis & semine Hyocyami albi Sacculo Capiti dormienti vel pulverari suppositus, quod habet LANGIUS *Epist. lib. 3. cap. 6.* qui etiam aliquando birundines post Aurei applicuit, & remanens gr. i. Opii Vulneribus imponere solent est; sicut etiam Turundam ex grano uno & altero Laudanij Opio cum alius Nidulis Naribus efficacissime inditam videbitis in TIMÆI *von Gulden-klied cap. pag. 94.* Præterea specifice hic prodest sanguis clidus A. animalium ruminorum: v. gr. recipiatur pulvis gallinæ tris vel quatuor septimanarum, subitoque discrumatur, quo sanguis clidus in Frontem patientis decidat.

Ceterum apud præcitos etiam *Chymata* & *supposita* magno cum fructu interdum ad somnum conciliandum injiciuntur, quibus gr. v. vel vi. Opium additur, ubi tunc interat usurpari nequit opium: sed hæc vix adhibeantur, nisi Vigilæ oriatur ex Intestinarum Dolore aut Fluxu Alvi; sicut violentum fuit remedium; & BACUTUS eodem LUSITANUS habet aliquot exempla mortuorum ex Suppositoria Opiorum. Probatur Glysterem habet SCHMUCK ex Cortice Radicis Mandragoræ, & Capribus Papaveris cum Semine, in Lacte codis, & applicatis.

Formula Emulsionum Externarum sequentes esse possunt

- ℞. *Pol. Vitis,*
Saliis,
Nymph.
℞. *Herb. Chamomill. cum Flor. an. M. i. vel ii.*
Rad. Rhod. ℞.
Gargaphyllat.
Poco Florant. an. ℞.
Cap. Papav. albi cum Sem. *causuf.* No. iv. vi.
vel viii.

Coque in f. q. aquæ simpl.

Quæ Decocto primo bene foveantur Tempora, hinc laventur Manus & Pedes, ac Linteis tandem involati sponte evigilescunt.

- ℞. *Pol. Lactucæ,*
Saliis,
Pol. an. M. i.
℞. *Ligustri,*
Nymph.
Chamomill. an. M. ii.
Cort. Mandrag. ℞.
Cap. Papav. No. 1. vel xii.
Incis. D. pro Pediluvio: S.
Species ad Pediluvium.

- ℞. *Olei Nymph. ℞.*
Aetheri ℞.
expr. Papav. ℞.
M. S.
Oleum ad Somnum.
℞. *Ol. Papav. expr. ℞. vel ii.*
Narist. expr. ℞.
M. S.
Unguentum Somniferum.
℞. *Ol. Papav. expr. ℞.*
Narist. expr. ℞.
Nuc. mosch. ana ℞.
M. S. ut antea.

Tom. II.

Vel

℞. *Olei Hyocyam. cum Ol. Pap. causuf. Lnd. ℞.*

Narist. expr. q. f.
M. S. ut supra.

Vel

℞. *Ol. expr. Papav. ℞.*

Narist. ℞.

M. S.

Oleum Externum ad Somnum.

Vel

℞. *Ungu. papal. vel depur. off. ℞.*

Extr. Opii cum spir. Vini par. gr. lv. ad viii.

vel loco hujus olei expr. sem. Naph. ℞.

M. S.

Unguentum Somniferum.

Vel

℞. *Ungu. papal. ℞.*

Ol. expr. Narist. dr. ℞.

dehill. Aneth. gutt. xii.

Extr. Opii ℞.

M. D. S. ut antea.

Vel

℞. *Ungu. Alabastri dr. ii.*

Extr. Opii ℞.

Ol. dehill. Aneth.

Aneth. an. ℞.

M. S. ut supra.

Vel

℞. *Ungu. Alabastri dr. ii.*

Ol. expr. hyocyam.

Papav. an. ℞.

dehill. aneth. gutt. vi.

M. S. ut supra.

Vel

℞. *Nuc. Persic. dr. ii.*

Sem. Papav. alb. dr. i.

Aqua Hypos. Dorac. vel Lact. mulieb. ℞. i.

F. Emulio: adde

Opii gr. vi.

Cervi gr. v.

M. S.

Emulio Externum ad Somnum.

Vel

℞. *Nuc. Persic. ℞.*

Sem. Papav. albi dr. i.

Anethi,

Hyocyami,

Lactuca an. dr. ii.

Cum aqua Hypos. Long. i. Emulio:

D. S. ut antea.

Temporibus ac Fronti applicentur.

℞. *Aqua Hypos. Long. ℞. i.*

Philom. Rem. dr. ii.

Camp. ℞.

M. S.

Mixtura Externa ad Somnum.

Vel ad imitationem RULANDI in perniciosi Malo,

imprimis quando simul adiunt Deliria:

℞. *Aqua Rosar. ℞. i. vel viii.*

Opii ℞. ad dr. i.

Croci ℞. ad ℞. i.

Misceantur.

Mixtura hæc imbuta Linteis tepide applicentur Temporibus, donec Somnus accedat.

De Senno Vigilis, aut etiam in Vigilis, que inscquantur diuturnis Curæ & Meditationibus, jam monitum fuit, non tam Auspicio quam Confortantia plus minus accerant, & Ventriculi digestionem primam promoventia conveniunt, vixque locum habent Humectantia illa aut Opiora, & quæcumque Narcotica, que sunt pessima, adeoque talia remedia sic dicta Calida, Potus Vini Malvatici, aut alius dulcis, item Aqua Vita Apoplectica & Armata, Effusio Aſthæris, & similia Somnum inducentia. In specie vero Viam dulcis & spiritus Vini à passu Senhus convenit, in Vigilis ex vitiis Cerebri dependentibus. Conferatur hic exemplum elegans HEINRICI ab HÆRER, qui *observ. 2. & 3.* aliquot grana Piperis albi conditi, Nuc. Moschata, Zingibere, Acoro vero & Ambra griles Vigilias sedatas tellatur; sicut etiam SCHENCKIUS *lib. 2. observ. 1.* refert Mulierem Patavinam quindecim diebus insomnem, tandem usu Panis cum Vino Malvatico macerati Somnum recuperasse, pariter remedia Ambra & Moschata laudantur in WEDELII *Opining. pag. 18.* Sic quoque Agrypnia in Afflictis sic dicitur

Nunc 2

Fri-

Virgilia, v. gr. in Catarrhis, per usum *Piperis albi*, item per *Eleutheria ex aromatis & calidis* optime sopiuntur. Spectat hoc etiam Consilium **RONDELEII** *Metb. curandi lib. 1. cap. 17.* ubi Ventriculo refrigerato, pro Vigiliis tollendis Olea & Unguenta Calida; illis autem, qui ob Morem & Curas vigilare, Vinum mercurialium aut Hippocraticum commendat. Alii in Vigiliis nimis à Cruditare Ventriculi spiritus Vinisum poli eorum commendare solent; siquidem omnia hæc promouent Digestionem, & ad Somnum blandum disponunt. Sic pariter in Agrypiis cum Vitiis exhaustione, spirituumque absumptione *Analeptica* talia ex *Pino dulci* sunt optima; aut si propinanda Papaverinis aut opiata, eadem *opacissima*, in exiguis admodum dosi, socianda, & sub *Analeptice* tempore Vehiculis propinanda sunt; quem morem *Veteres in Philoponum* compolitionibus observant. Jure-Consultus quidam ex diuturno literarum studio quatuor nullo fine Somno fuit, Ica ut jam putaretur plane satius, mentis præditiis prædicentibus, *Philoni Periti* drachma una cum Vaso *Melastasi* exhibita bis vel ter, ad Somnum sedit, Authore **ZACUFO-LUSITANO** lib. 1. *Med. prim. lib. 13.* (N)

ARTICULUS II.

De Somno Nimo.

Absolvens Vigiliis nimias, quibus ipsæ contrariam vitium est *Somnus*, & *super nimium*, dum *Agri* aut nimium in somnum sunt propens, aut actu nimis dormiunt. Multi autem affectus sub nomine *affectuum superferum* vel circumferri: sed cum insigni confusione & errore. Fit hoc, judicante sic **LINDANO**, quod propter oculos Fontes Hippocraticos alios Auctores promiscue feruntur, indeque in confusos errores promiscue lapsi fuerunt: quo non parum facit garritulus **GALENI**, cuiusque fallas auctoritas, cujus vestigiis alii insistentes, confuso admodum de affectibus soporosis rgerunt. Interim optime dilucit hoc affectus **LINDANUS** in *Metb. Med. & Chym. pag. 282.* cupus vigilia non terminus. Ceterum antequam ulterius in explicatione sopororum affectum progrediamur, distinguendum ante omnia est *Somnus præternaturalis & nimis ab impotentia vigilandi*, *Agri* quibusdam est nimia Vitiis prostratione familiaris. *Nimius somnus* est propensio in Somnam, ita ut *Agri* in Somnum inclinantes revera dormiant. *Impotentia vigilandi* vero est, dum scilicet *Agri* ex nimia Vitiis prostratione & Operationum Animalium imbecillitate oculos apertos non amplius tenere, nec Membra alia movere queat, sed insular dormientium quieti acient, utut revera oculis saltem clausis & conniventibus vigilant, nec perfectum Somnum capiunt. Quod patet ex eo, quod accitum persone cuiusdam inconlueret, aut ad eas audiam in qualem oculos non habi aperiant, gestus faciant, & se nonnihil movent, sed mox collabi oculos sinant, & quod interrogati præ imbecillitate respondere vix possint, omnia tamen audire indicant, & si oculos haberent apertos, omnia viderent, aut imponentes sunt ad obediendas actiones Vigilantium. Hic Somnus non est præternaturalis, sed solum Impotentia ad vigilandum, Germ. *ist ist ein Matter Schlaf*; ubi nullo modo usurpanda talia, quæ alias in affectibus soporosis conveniunt, sed potius restituerant, Confortantia spiritus, in specie Ambra, sunt optima.

Observandum porro est, *Somnum nimium esse alium Naturalem, alium Præternaturalem, alium Nonnaturalem*. Somnus nimis Naturalis est, quando quis ex habitu, consuetudine, aut alia causa nimium dormit, *Nonnaturalis* fit, quando quis ex Errore externo quodam ad nimium Somnum quali disponitur, v. gr. si quis ex abusu Opii (O) vel Vini, vel poli diuturnas Vigilias, poli Exercitia, nimium Motum, nimis Lassitudines aut Labores graves: & qualis Somnus trium dictum & nodum contingens ob præteritam Lassitudinem, in **PLATERI** lib. 1. observat. pag. 3. Considerat etiam **SALMUTH** *ess. 3. observat. 66.* de Vigiliis quidem insatiabilis defatigatio, adeo ut per biduum sine Somno esset, postmodum quatuor dies & noctes integras Somno consumpsit. Sic refert alius ex *Itineris scilicet*, qui octiduum horas profundissime dormivit. Hic & similes Somni Nonnaturales sunt, minime ad affectus præternaturales sunt referendi. Quo etiam facit, quando poli languinis excretionibus, Alvi profluvia, dolores magnos, anxiopathemata graviora soporosis concutimus, adeoque in genere in omni spirituum, præsertim fuscis & austeriorum defectu, Somnus imminet. Observandum quoque, quod imminet *Lipophymia* fit specie *Somnolentia* seu propensio in Somnum interdum supponit, ex spirituum Animalium defectu oriunda: v. gr. *Hysterice* in graviori paroxysmo subinde admodum somnolentæ sunt, quibus tamen *Lipophymia* imminet. Mulieres quædam poli partum debiles, somnolentæ sunt, sed cetera *Lipophymia* imminet. Poli largioris Ventriculorum alique languinis effusiones Somnolentia observatur, sed quæ revera *Lipophymia* imminet.

Sed quædam Somnus Præternaturalis nimium, adeoque *affectus* *superferus*, affectus multusque pertinet, qui cadunt sub considerationem Medici, variis Nominibus, sique confuso admodum insignita, uti patum refert. Genussum solum sopororum explicationem nominalem videbimus in **LINDANI** *ad internatibus Phlegmæ & Medici pag. 282. seq.* Placeat hic **SYLVII** terere vestigia: adeoque præternaturalis somnolentia, & inde dependens Somnus vel *folitarius* Malum est, vel eadem Somnolentia *Dolorem fieri eorum habet*.

Uti verò Somnus Naturalis ex imminuto spirituum in Organa externa influxu dependet, propter aliquem eorum torem, dum minus volatiles minime habiles, sed potius quali Phlegmatibus redditi, minus prompti sunt ad obediendas Animales Functiones per solitas impressiones, & excursionis; ita etiam in statu præternaturali Somnolentia venit. Dicitur autem fuit, in Somno Naturali esse imminutum spirituum influxum in Organa externa, nempe respectu Motus eorum in Vigiliis, non tamen penitus est abolitus: id quod ex eo manifestum, quia etiam in somno partes externæ moveri possunt. Dicitur etiam fuit ad Organa externa influere spiritus; nam in Somno interdum spiritus in Cerebro velocius fuit moveri, & agitari possunt; quæ ratione in somno occasione Animæ Rationali pro variis lucumibus subministrant. Somnia sunt vel *phantasia*, nihil significantia vel *significativa*, aliquid significantis (P), ut Pollutio nocturna a copia Genituræ.

Hæc inter affectus Soporosis in specie horum quique primariis specie considerantur: nempe (1.) *Carus*, (2.) *Coma*, *Somnolentia* & *Vigil*, (3.) *Insomnia*, (4.) *Noctambulæ*, & (5.) *Catalepsis*.

MEM.

(N) Adde ad Somnum conciliandum nonnquam non medicis valere musicum Instrumentorum harmonicis, sicut etiam ratiocinatio, leviter decurritur apud *superferum*, non solum narrationem, vel *lecturam*, & similia: hæc & curatio quædamque *superferi* & vocaliter, præsertim si ad certum temporis normam & rhythmum maleverit, Somnum accipit: ut experitur in Infantibus, qui Curam violentia sustinent, & incantatis Nutriam clamentibus, in Senibus laborant; nec qui novis *Tragicis* bellis violentis persequantur, atque universa domus ratiocinatio frangit, non fuit maxime tunc incantatio. Somnus concipitur. Illud autem verum est, maximum in hoc re (ut in quamparibus) vix habere Confortandam, sed fuscis in circumstantiis, sicut commode fuit inveniendum, Somnus obrepere solet, quibus obdormire spiritus consueverunt.

Notandum quoque ad Somnum & Vigiliam quantumvis fuit: Aerem quem respiramus: ita ut in hoc placidus dormiamus, in illo vero Somnum egerit non possimus. Quæ enim vis, non parum pro spirituum generi, eorumque obediendia in se, facit Aeris subtilitatem respirantibus hantibus? Uplurimum crassior Aer magis facit ad Somnum, tenuior ad Vigiliam; sic Hippocraticus dicitur, qui in immensum Aer per mensuram multo minus præterea infertur, non casum in crassiorum transiit, exemplo placidus dormiunt. Verum & in hoc etiam hanc Consuetudinem.

(O) Somnus ex Opio abusu factus potius est Præternaturalis quam Nonnaturalis: Opium enim nimis inter Causas Nonnaturales numeratur ut Vinum. Quæ occasione intendam, quid ex Observatione Ch. Geoffroi, Opio Tincturam spiritum vici eliciam atque Phrenitico exhibam, postmodum exacerbat, Aqua vero extractam, placidam ad aliquot horas Somnum inducit.

(P) Potius Semantica & Aicmantica, *superferi*, & *superferi*, d. superferi significo: etiam enim & superferi est Signum.

M E M B R U M I

De Caro.

Carus (Q) est *Somnus admodum profundus, ut Aeger vix aut nulla ratione domui exsistat* quare, *quoniam* *hæc* *admodum profunda, sed non tam mansueti & integra Respiratio;* & licet et fortiori subiecto, e. g. p. *anidura aculeis, fortius commotus excitatur, unum vel alterum membrum moveat, & loquatur, perfectè tamen excitari non potest; sed* *jacet talis Aeger Scali & Motu deficiente, saliva saltem respiratio, quæ sita enim non intelligit, multo minus ad hæc respondet. Uo nomine: Carus proximus ad Apoplexiam gradus, proprièque est Sopor gravis à Vio, & hic dicitur carotici, qui post Vinum nimium absumit ita profundè dormit* *insistat carotico, hic tradidit est appellatio porci* *ergo Carus non tam morbus est, sed ex illo Symptomatum genere, quæ ex quocunque Error interno manifestæ sunt, v. g. æb. nimis Exultans; Nam hæc interiore causa repente talis oritur somnus, reversa ad Apoplexiam pertinet, eritque primus Apoplexie gradus, seu Apoplexie levior. Hunc carus est, qui absumit Vini & spiritus Vini insequitur, (piritus enim Vini sulphureus non rite cum spiritibus Corporis humani mixtus, ut tam confusè permixtus consensum hominum infert, Præter tamen Exultantem vinolam etiam absumit Opi & Narcoticarum Carum perniciem infert, quæcumque ratione applicentur: Exemplum videb. in SALMUTH Cæs. 2. Observat. 97. ubi talis afflictus fuit indolis à drachma ana Opi per Clysterem injecti, & curatus per aliud Clyster ana Vini Malvatico injeclum. Pertinent hæc *Fani & Gas Carinum* incensorum haustii nam carbonis sulphurei narcotico fume imprægnati, quod ipsum legendo spiritus Carum infert. Exemplum videb. in FORESTO lib. 20. Observ. 32. ubi refert Carum à Fumo carbonum ad expugnandum frigus in Paroxyfmo Quartanæ. Ita sulphura Mineralia immatura inspissata disponunt ad carum. Facit hæc Carus & Halitus Peram nimis ferociter fœmensium, Vinorum, Corevisarum & similium exspirantes, qui ut suffocationis inferunt metum, ita etiam respiratio actuali somno profundæ quasi obnoxio Aegros periret & facit. Facit hæc etiam Halitus Galbæ viæ, parietibus recenter incubatæ, unde in tali cubiculo dormientes Aegri sunt carotici. Item facit hæc omnis Odo Cræti, qui vi narcotica ad gravem carum disponit, ut observavit GORELIUS in observat. in Famulo Aronastri, qui dormiens super sacculum Cræti semimonstris repertus fuit. Aliud exemplum videb. in Colleg. Pharm. in Schedæ. 2. p. 4. ubi de Cræto. Pertinet hæc abusus Fani Nicotianæ, cujus Oleum, ut ipsum est admodum narcotico, & vi narcotica sua Carotico reddit nimium hauseritis. Vid. OSWALDUS GREMBIS in Arbore integra & corrupta Humilis lib. 3. cap. 1. §. 37. Item Nux Jaglæ, vel potius, qui sub calore Juglandis diutius versantur aut dormiunt, cito corripuntur, hinc etiam à Græcis Veteribus Nuxes *noxiæ* dicitur, quod somno carotico fume Capitis Gravædinem inducat: vid. HILDESHEIM in Spielgel. 4. pag. 324. de Afflic. Capitis. Denique Hydrogryli *vel Mercurii Vapor* in toto haustis, uti varia inest symptomata facultatis animalis, ita pariter interdum carum infert. Authore PALMARIO de Merb. Cæcægræf, dum vapore Hydrogryli Naribus excepto Faber quidam aurarius flatum gravis somno correptus cecidit, & difficillimè postmodum curari potuit. Adeoque hi sunt præcipui Carotici, qui *in errore quodam exorsus in talem profundum somnum incidunt. Quo referendū etiam sunt ii, qui post græves Purgationes, Cæcægræfens Capitis, quique contumelios, sive casu ab alto sive quacunque Lesione cerebra, profundo somno sepulchri, & quasi Apoplexici, jaceant. Carus ergo pertinet ad affectus, qui oriuntur errore ætæto, æsthetics nempe aliquibus rei vi, aut ratiæ causa extrinsecus in Corpus, sive assumendo sive**

inspirando illata, & omnes hi affectus carotici proxime
ad naturam Apopleziæ accedunt.

M E M B R U M I I.

*De Comate Somnolento, & Vigili,
feu Cataplexia.*

Quoad *Coma* (R.), illud est duplex; vel *symptomata* vel *signi*. Si enim *symptomata* iungatur *comae delirio* tali, in quo excitati *Aegri* fere deliria loquuntur, ac deinde in somnum relabuntur, vocatur *Coma symptomata*, & *Cataphora* ab aliis dicta; hae enim duo *HIPPOCRATI* sunt unum idemque. Iniquem *Aegri* habent ad somnum propensionem, ita ut etiam actu dormiant, similiter tamen propter varia *Infortia* sub somno delirant, facile excutuntur, & excitati ad quaestis respondunt, simul quoque in profundum somnum relabuntur. *Coma* hoc propriè non est morbus, sed est *symptomata* tantum morbi, est enim quodammodo praetoratoratorum, qui *Febrientibus* interdum accidit, tam in *Febribus* continuis quam *Intermittentibus*, uti *Aegri* admodum in somnum inclinant, imò etiam læpè profunde dormiunt. In *Intermittentibus* quidem rariss, imprimis in principio *Paroxysmi*, sed postea Incremento, quando *Frigus* in *Aëlium* mutari incipit; tunc enim *Febrientes* tales tali *symptomata* corpori solent, in specie *hic Febres* diuturnae fuerint. In *Continuis* vero observatur *lepis Comae* *symptomata*, vel lo principio morbi, vel cursu, vel declinatione. In principio quidem, quando *Aegri* gravi morbo læpiti iacent, in declinatione, quando per metastasim materia morbosae sic raptu deorsum ad Caput. Si autem cum tali somno adiut Vigiliæ internae sine *Infortia*, dicitur *Coma signi*, in quo *Aegri* habent Corporis externo, & Organis sensuum externis, id est clausis & in somnum propensis oculis, atque Torpore, in somnum propendunt, ac etiam dormiunt, licet quoad internos operationes Animales revera Vigiliæ, seu potius fortiora adiut *Infortia*, dum tales somnando delirant, subinde *Fucibus* apertis clamant, interdum Membra Inordinatè movent, excitati rursu facile oculos aperiant, inceptè respondent & delirant. Uno nomine, adèc, quoad externa sensuum Organa, *symptomata* lumina; quoad interna, perpetuè Vigiliæ cum delirio. Tale *Coma* Vigili, quod alias etiam dicitur *Coma*, seu *Coma* (S), ita ut hoc & *Coma* Vigili pro uno habeatur, raro est affectus solitarius, sed usupurium aliis, v. grat. Phrenitidi, Lechargo, speciatim pessimum signum esse lolet imminuentium Phrenitidum & convulsivum, ut rectè observat FORESTUS lib. 6. *apud* lib. in *Sched.* adeo via ab aliis peculiariter cum postulat, modo illorum remediis adiungunt Cephalicis revulsiva, aut potius modo Vigiliis, modo sopori modis fat, prout scilicet hunc aut illas prevalere observamus, id est, aut perfectius somnos, aut perfectè Vigiliæ inducantur, in quo posteriore casu postmodum Opia totum negotium absolvunt. Conveniunt cataplasmata, qualia dabo. lib. 2. cap. 3. Art. 6. *de* *Cephalicis febribus*. *Coma* hae observantur interdum, sed raro, hae Febri: observantur enim fatis *Coma* ex crudis *Libris* Sambuci comestis absque Febri, in BARTHOLOMÆO. Art. Med. *signi*. Volum. 2. pag. 64. Sane, ut rectè dicit WEDELINUS de *Opis* pag. 46. rarissimè esse affectus soporosis, in quibus non simul Calor praeternaturalis percipitur; ita *Coma* usupurium sunt *symptomata* *Febres*, liquidem in *Intermittentibus*, praeterferim chronicis, non quidem in principio, sed sub Incremento, quando mutatur *Frigus* in *Aëlium*, statu & declinatione *Paroxysmi*, *Aegri* profunde dormiunt; quin & in *continuis* subinde *Comata* observata fuerunt, in quibus delirium vehementius subinde convulsiones imminentes praefragit. Non solum observantur in principio & cursu morbi, sed superveniunt etiam in declinatione, quando per

(Q) *Ex quo Super cum gravidine: an d'apo Caput, quid Caput vultu lat. Hinc Arteria ad Caput afferit linte: Ca-
rotides distantur ex eo, quia hic vincula exceptis. Cereb. seu Super indicatur.*

(R) *Kūpa* Coma: *Somnus profundus*; *est Prædictio per veritatem ad Somnum interpretatur*; *est significatio opus respondere videtur vocabulum Cataphra Kapa, lapis, impetus, quod nempe Egredientes in Somnum labantur, et impetu quodam debet invincibiliter in illum ferantur. Videtur Kūpa per synecdoch dictum, quod scilicet, dormio, et nasus pro, cubo dormiendi gratia: Galenus d *nasus* *est* *delictis*, *quod* *est* *comellari*, *erapuli* *indolere*.*

(S) *Tubercula* & *Tubercula*, *Typhomoria* & *Typhomania* d'v'm, fumus, & magis, Aukitia, vel uaria furor, infania. *Typhomania* enim secum faciem cum infuria & alia conjungit; ita ut affectus sit ex *Phrenes*, & *Vernis* mixtus.

metastasin materia morbifica defertur ad Caput, & ibidem Coma infert.

CAUSÆ LETHARGI.

& reliquarum

AFFECTUUM SOPOROSORUM,

M E M B R U M III.

De Lethargo.

Pertinet ad hos soporosos affectus tertio Lethargus, seu *Paralysis Latens* (T), Veteribus Ataxibus Subest, illius qui propriè est sopor profundus eisdem generis cum Comate somnolento, cum *Delirio* & *Insensu Obscurum* omnium rerum coniunctus, in quo affectu Aegri profundè dormiunt, & excitati hie, subito tamen in somnum demerelabuntur, stupidi simul facti & admodum obliuosi, ita ut Lethargici excitati, si interrogantur, respondent quidem, aliquid autem posthabentes, e. g. Matulam aut aliud quid petentes, dum illum ad hanc in manu tenent, Milionia tamen aut alios perhibentes obliuiscuntur, ita ut nesciant, quid eum re petita facere velint, ac in somnum relabuntur. Adhuc præterea *Delirium*; excitati enim Lethargici respondent quidem, sed incoherè & inconuenienter, non secus ac si, qui naturaliter ex somno profundo excitati non adeo subito vel appositè respondent, sed inordinatè & ridiculè loquuntur. Cum hoc Lethargo *Fæbris* læsa est coniuncta, eaque continua, quæ tamen sæpe veipertino ac matutino tempore exacerbat; & calor æstæ nec mordax est, *Pulsus* sunt frequentes & magni, *Urina* ut Juteatorum redditur turbida. Primariam essentiam Lethargi constituit sopor obliuio.

M E M B R U M IV.

De Noctambulis.

Pertinet quartò ad hos affectus etiam quando cum somno *Insensum* iuncta sunt, ut in Incubo & Noctambulis, utut reuera propriè loquendo non sit affectus morbosus. Est enim reuera res maximam partem naturalis, dum elatus Organus sensuum exteriorum Aegri tales dormiunt; valida verò Animæ rationalis, cum imaginatione, adhuc per Spiritus paulo huiusmodi agitato vigilat, aliquo posteriori etiam moveri quidam solent, nescientes tamen quorsum, adeoque est quasi *Somnus vigilans*, & *Vigilia somnians*. Uno nomine: est *validum somnium*, quod non secus acque non ipsi interdum in somno ea loquuntur, quæ somniamus, movendo Linguam, Laryngem & Maxillam inferiorem, interdum quoque Pedes aut Brachia movemus: ita hi *Noctambulares* moventur ad illas actiones, ad quas somnium dirigit, dum dormiendo surgunt, ambulant, & varia opera pro exorcedis ipsis vigilantibus alias insueta & horribilia, vel forandantia, vel impossibilia exercent, idque nunc elatus nunc apertis seu potius semiconvulsis Oculis. *Classis* quidem *Oculis* in his locis, quæ interdum sæpius peragere solent, in locis verò minus consuetis, in quibus etiam non sine nocumeto versantur. *Oculis* subinde *convulsis* solent versari, idque interdum eum damno, dum cadunt ab alto, interdum sine nocumeto. *Symptoma* hoc *Hypochondriacis* est familiarè, illique, qui simul ad Pathemiam Melancholicam nonnulli inclinant, adeoque suo modo est quasi affectus mixtus ex affectibus Melancholico & Soporoso, & quasi gradus quidam levior *Delirii* aut *Melancholiae Hypochondriacæ*, ac simili etiam ratione curandus venit. *Auscultator* vero subinde *Lunaticus*, unde nunc plus nunc minus affligit, unde etiam a quibusdam tales vocantur *Lunatici*, utut hoc nomine interdum etiam intelligatur Epilepsia inveterata secundum Lunæ phasies plus minus affligens, usitatis tamen hoc nomine Noctambulorum affectus venit.

Hos inter affectus primariam considerationem meretur Lethargus (nam cæteri aut sunt rari, aut à causa oriuntur externa, aut alios comitantur Morbos) qui reuera est morbus primarius, nec adeo rarus, simulque periculosus, & subinde in Peaxi occurrat.

Quod Causas Sæpius Præternaturales, eliquæ variorum motorum: sicut *Somnus Naturalis* dependet ex immixtione spirituum in Organis externis infuso, ex aliquali eorundem Torpore, dum minus volatilis, miolique subtilis, sed potius Phlegmatici facti, minus prompti sunt ad obediendas functiones Animales per solitas expansiones & excretiones; ita pariter Causa Proxima & ratio formalis Lethargi, & aliorum affectuum soporosorum in genere, est spirituum Animalium nimis Torpor seu Elasticitas fracta, & plus minus impediens motus intra Cerebrum, quo inepti funt motibus, & expansionibus debitis ad obediendas sensus & functiones necessarias, unde consequenter somnus supervenit. Causam Remotam, propter quam torpori redduntur & deficiunt in motu spiritus, suggerant ea, quæ naturaliter somnolentiam & omnium somnum inferre valent: nempe causæ sunt vel

1. Spirituum Paresitas & Hebetudo.

2. Nimis Aquositas ac Paresitas Massa Sanguinis, & in specie hinc Cerebri, indeque phlegmatica spirituum Animalium constructio, quæ inflat Spiritus Vini non ritè dephlegmatè deficient in debita volatilitate & mobilitate, & torpori redditæ sunt tales affectus.

3. Visceraria phlegmatica quædam, quæ speciali virtute spirituum Animalium impetum dheret, adeoque necesse seu suspensæ eos impinare & afficere valent.

4. Quæ Cerebrum mole sua comprimit, v. g. Sanguis intra vala stagnans, quam extravasatus, Cranium depressum, & Cerebri Tumores.

Quod verò Causæ hæc modo Coma, modo Lethargum, modo Carum producant, vehementer distinctum affectus, utitur ea eorum potentia maiore, partim quod exteriores, & corticales magis, quam interiores, & medullariæ Cerebri tractus horumque spiritus afficiant dependere: vid. RIVIERUS Pr. lib. 1. cap. 2. & WILLIUS de Anim. Brat. P. 2. c. 3. & 4.

I. Primò ergo spirituum Paresitatem & Hebetudinem somnolentiam eiusmodi auctorem existeri posse colligunt, quod quæ spiritus enervare ac dissipant, scilicet Hemorrhagiæ, coitus nimis, Vigilia, Lassitudo, &c. tales non raro producant: vid. PLATERUS de Nerv. pag. 6. & 7. quædam Catalepsia ex Amore pertinet, de qua vid. TULPIUS lib. 1. de Nerv. 22.

II. De secunda causa Remota, quod sæpe oriantur affectus soporosi à nimia Humiditate & Inundatione Cerebri, sit à Sero & Lympha, & ita à spiritibus Animalibus quæ phlegmaticè constructis, res minus dubia est. Nam quod attinet Aquositatem & Inundationem, ac Paresitatem Sanguinis & Cerebri, indeque orundum Torporem spirituum Animalium, notum est ea intrinsecus Cerebri, quod in huius substantia corticali separantur spiritus ex Sanguine, ita ut depuratilissimi ab omni Phlegmate aquosus, seu ab omni Laticæ in Cerebrum scaturiant, hinc non tantummodo substantia Cerebri medullari pinguis & quasi oleosa percipitur, nihil aut parum Aquositas admittenda, sed etiam hoc id Retacula in Cerebro hinc inde pro recipiendo Sero sunt excavata, nempe Ventriculi. Præterea repetitur etiam hoc inde conficere Glándulæ copiosæ, quæ, quicquid superfluum est Aquæ, absorbent, & sub Lympha nomine a thorac diverant, oim & ipsa tota corticalia Cerebri substantia, per quam imperius hi spiritus Animalia filtrato & quasi deflato, glándulosa ut, Lympham & Laticem uberrimè absorbent, & volatiles eundem generant spiritus Animalis. Quod è ergo fiat, ut nimis humectetur aut irrigetur prænaturaliter Cerebrum à tali seroso Laticæ aut Lympha, sit in illud influent, sive in Ventericulis ejus, & per colectionem etiam substantiam, flagrantem, vel etiam ex Massa Sanguinea, mediante Colluvie serosa variis recrementis onusta, in Cerebrum desillat, quæ ratione loci Crises Lethargum substatum, per decubitum Materiam morbosæ in Cerebro observat WILLIS est hic ipse tam in Anatom. Cerebri, quàm P. 2. de Anim. Brat. cap. 3. in Lethargicis quoque alia loca Sero inundata observat. A tali causa spiritus volatiles Animalis in Porulis Cerebri hinc inde referunt, propter impedimenta motus debiliorem expansionis, nimis

(T) Lethargus Ἀδυσία, Latine Veteribus, Somnus cum obliuione conjunctus: à δαδω obliuio, & ἄγροα velox: quod Lethargici cito obliuiscuntur.

mobiles, torpidores & quasi phlegmatici. ac minus mobiles redduntur, & hinc in Nervos radiatio admodum impeditur, unde pathetica soporosa Lethargia, item obliuiofitas, & ea perturbatio spirituum motu, delirium supervenit. Vid. quoad hanc materiam WILLISIIUS in *Anatom. Cerebri*, qui sepius in Lethargia Ventriculus cerebri aqua seu copioso fere repletus invenit; item *Tract. de Anima Brutorum* P. 2. *lib. de Lethargia* pag. 309. quod idem confirmat CAROLUS PISO de *Morbis Serebri* *lib. 2. par. 2. cap. 3. & 6.* Hic ergo repletus, id quod superius Laticis aquosi, necessitudo cerebrum inundat, & ita necessitudo occasione Lethargia præbet. Hinc illi, quod subinde in *Hydrocephalo striato Lethargia*, esse HILDANO *Cenot. 1. observ. 2. item Cent. 4. observ. 10.* Item CAROLUS SEVERINUS observat Iulianum Hydrocephalo laborantem, in eleganti *Tr. de oculis a hydrocephalo natum*. Hinc illi, qui confusio est sunt phlegmaticæ, naturaliter somnolenti esse magis solent, non secus ac naturaliter Influens propter eorum cerebrum fluidius, mollius & humidius, copioso fere toro inundatum, & spiritus animales ob id torpidiores minulque subtilis, admodum solent esse somnolenti. Hinc observatum fuit, quod a *exhibere capitis linciae* coma somnolentum eorum in Nobili Polono reituitur in M. A. N. G. *Annot. 3. observ. p. 541.* Sic quando incipiunt affligere catarrhi, & similes affectus capitis, serosa Lympha in cerebri partibus copiosius congesta, ante sui excretionem aënis humectando Cerebrum, ut plurimum ad gravitatem capitis, & extraordinariam quandam in somnum propensionem solet disporre; Hinc est, quod *supra profuso Urina* in calculo Renum subinde insignem soporem solet inferre: Sic Coma Vigilæ a fere eorum in Seneca refertur PISO *Tr. de Colluvie serosa* pag. 78. & SANCHEZ in *observat. pag. 350.* refert, quandam, qui cum laboraret Comate Vigilæ cum Febre continue in capite ejus inventi sunt Cerebri Ventriculi multa Aqua pleni. Unde etiam petenda ratio, quare Lethargici facies sit pallida, & tumida, Oculique tumidi, ut fere hi evenire solet, qui crapulam nondum edormiverint, vel Lethargici quoad Faciei habitum quasi Leucophlegmatici videntur. Facit huc Observatio DECKERI in *Braueri* pag. 36. de Lethargo gravi, *fermatiorie* curato, copiosissimum pus per Nares effluente. Sic Lethargum periodicum exstentem cum arthritide ea vitio fieri obiter a PISO *cit. loc.* fidem similem Lethargum periodicum singulis annis eodem die recurrentem notat BORELLUS *Cenot. 4. observat. 67.*

III. De tercia causa quaeritur: an extra æterna inspirata, assumpta aut admoda, etiam humores in nostro corpore ita præternaturaliter alterari queant, ut vim *anodynam* & pluri minus narcoticam acquirant, & cuiusmodi Narcosis ea causis inter se generari possit? Id quod affirmat a SENNERTO *Pr. lib. 2. p. 2. cap. 3. & 35.* ac WILLISIO de *Anim. Brutorum* P. 2. *lib. 2. cap. 3. & 6.* Quia extra corpus res non narcotice per certam materiam secundum minimam sunt supraflores, quod videmus in Mulo, quod ante fermentationem nullam possidet vim inebriativam seu supraflorem; quando vero Mulum incipit fermentare, exhalat Gas insigniter supraflorem; Vinum fermentatum pariter fit narcoticum, propter spiritus fermentationis in eo generatos. Sicut enim ea Mulo per fermentationem & secundum minima alterantem, sicut quoque ea Ligno & Carbonibus per combustionem natis & incalescent, emergit de novo Violentia talis narcotica, quæ antea formaliter in his non præexistebat; ita simili ratione nostro in corpore humores diversimodè alterari, ac similem violentiam supraflorem inducere ac acquirere possunt. Simili modo ac morbus Homini irati venenosus est: vid. RHEDI de *Uisura*; Arthritæ Florentinus, contra quem quædam scripsit CHARAS, natione Gallus. Hinc HELMONT *Pneumam inebriativam* soporosos affectus producere ait. Et talem vim anodynam etiam subinde in affectibus soporosis, præterit Lethargo, pro causa similiter agnosce WILLIS de *Anim. Brutorum* P. 2. *cap. 3.*

Quod ergo attinet vim narcoticam succorum corporis ex eorumdem præternaturali degeneratione eorum, spiritus animales generant, hanc insignem illam *dermendi necessitatem*, medium delirium, effectus spiorum effectibus simillimi confirmant. Quod quidem *narcoticum* quomodocumque admodum est iururicum; nullum tamen dubium est, esse constitutum in *sublimis acri*, in specie in Opio in sale volatili acri oleo: Nihilominus tamen, cum dentur etiam Salia volatilia maxime amaricantis, quæ talem vim non possident, dubium est, unde hæc prerogativa Opil? Propter Analogiam tamen Sal hoc volatili acce oleum cum bile in nostro corpore, certo modo afficiens, cum subiectum hujus virtutis, supliciter SYLVIVS *lib. 2. par. 2. ubi de fo-*

porosis affectibus. In quo tamen consistat hæc vis? not later: Experientia enim testatur, subinde in nobis tale Virus supraflorem generari. Sed observandum hic sedulo non necesse esse, ut præcisè ad corpus feratur ipsa violentia narcotica; sufficit enim si saltem in primis visus hæret ad instar Herbarum Gas inspirati, aut Opil assumpti, ad instar saltem Carboneum via inspirati vim narcoticam exserant, & suporem somnolentum inferantur; Nam & Virus in Hypochondriis eascentis & adbus delictis, caput tentare solet. Facere hoc videtur, quod in *Urga* quidem perquam somnolenti evadant. Detail vi narcotica in corpore genita facit hoc exemplum BORELLI in *obs. 36. Cent. 2. de quodam*, qui sepius Lethargo suis correptus propter Autum venenatam ea pollice emissam, per exteriorum assidue pollicis admotum, succellere curatum; Sic non raro in affectibus Hystricis supervenit talis somnolentia, & si reliquereut dormientes, denud unquam evigilarent. Facere hoc videtur curiosa Observatio RIVERII *Cenot. 2. observ. 16.* talis soporis gravis, cum passione Hystrica conjuncta, cuius Paroxysmum inhibuit propinquo Laudano Opium. Præter modò dictos affectus soporales subinde observantur adhuc alii sopores præternaturales, qui ad Comata in genere referri solent, sed confusè. Unde fors pertinet huc Lethargia a *Lumbricis* oriundis observata, de quo HOLLERIUS *Cenot. 1. par. 35.* qui vocat, soporem quandam certum, Lethargo similem, cum præcedente dolore circa oppositionem Lunæ recurrentem, a Lumbricis natum: Idem HOLLERIUS *Cenot. 2. observ. 24.* Cataphoram notat ea Lumbricis: Sic refert PISO de *Colluvie serosa* pag. 93. Affectum Lethargicum periodicè repentem cum arthritide, idque probabiliter a Sero. Nullum ergò est dubium, quin ex violentia narcotica in Corpore nostro genita observetur affectus Comatosus, Narcosis autem id agere, testatur inebriatio, Opia similique incantationes assumptæ vel admixta (vid. SENNERTO *loc. cit.* necnon WILLISIIUS de *Anim. Brutorum* *lib. 2. par. 3. & 6.*) ac somnolentiam modo intensiorem, modo remissiorem inducentia: v. g. ex Vino & spiritu Vini, vid. PLATERUS *Obs. pag. 27. ex Opio loc. cit.* Coma ex drachma una Opil per Clysterem injecti, videt in SALMUTH *Cenot. 1. obs. 20.* & Lethargum ex eis incuto radicis Hyocyami apud WILLISIIUM de *Anima Brutorum* *lib. 2. cap. 3. pag. 354.* item ea *Mulæ* balationibus ac Carbonum acceniorum fumis in PLATERI *observ. pag. 18. & 19.*

IV. Comprimatur exempla varia observanda: v. g. siu gainis extravasati in lætiosis capitis cum affectibus soporosis frequentius combinati; Tumor glandulosi super corpus calliosum suporem inducentis, observant PLATERO *obs. pag. 13.* & calli in dextro Cerebri Ventrículo, observant KERKRINGIO *spirit. obs. 37.*

Quoad *Febrim lentam*, quæ Lethargo semper est juncta, videtur hæc esse ex genere earum, quas *Lymphaticas*, seu vitio Lymphæ oriri, *supra* *lib. 2. cap. 13.* dicit ab *Febris*. Im Comate seu sopore Febris eodem fere causæ cum Lethargo obtinere solent. Verum in Comate Vigilæ præter dicta *Maligantia narcotica* imprimis habenda est ratio, dum ubi est, quod impedit, quod minus etiam Maligantia conjuncta delirium & somnum inferre valet, non secus ac quilibet Venena ac Narcotica violentiora præstant solent.

DIAGNOSIS.

Pergendum est ad *signa*: Affectus soporosi per se facile patent, saltem signa distinctiva eorumdem inter se invicem sunt attendenda.

Qui Lethargo laborant, obliuiscuntur animam, delirant cum perpetua in somnum propensione, excitati rursus sentiant in somnum, interrogati vi respondent: videntur quæ antea dicit. Fibricula levis adol, cuius calor tamen lentus, acris & mordax est, equæ continua, habet tamen continuè vespertino & nocturno tempore fusi exacerbatioes. Alvi excrementa plerumque sunt liquida, Urina redditur ut Jamentorum turbida, pulsus sunt varii ac inordinati, facies & oculi candidi & pallidi apparent, & quæ sunt similia signa.

A *Cere diglignitur Lethargus*, quod non variat à causa externa, & quod non adit Febris Lenæ; qui si adit Febris in Caro, hoc solet præcedere aut saltem est Febris vehementior, aut ea genere Intermittentium, aut Continuarum ardorem.

A *Cataphor* facile distinguitur Lethargus, quod *Ægri* non retinent Membra quasi rigida in eodem situ, sed dormientium insit eadem culpa habent.

A *Typhomania* seu Comate Vigilii distinguunt in hoc, quod in hoc aut quodam Febre gravi, eaque adens Maligna; item quod quidam Aegri in Comate facili evadunt, nec tam facile denud obdormiscunt, sicut ac in Lethargicis fieri solet.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: in genere rectè pronunciat HIPPOCRATES *lib. 2. Aphorism. 3. Comate & Vigilii, si modum exstiterit, est malum.*

Porro in quo *Morb. febrem laborem facit, malum*; idem dicit *lib. 2. Aphor. 3. Ita tamen, ut quo intensior somnolentia gradus, eo periculum majus sit*: vid. GALENUS *lib. 3. Aph. 24. & l. 2. de Symp. different. cap. 3.*

Somnus, ubi in acutis intenditur, ut malus cum distinctione est animadvertendus, quando in hoc fas malitia latitudinem habeat effectus dignum: si quis enim præter naturam & consuetudinem dormit, malum de terius; si autem tertius diei parte ad reliquam dormiat, ut in HIPPOCRATIS *Progn. l. 1. 11.* non occidit.

In specie *Coma*, quod ostendit in *Febribus ardentibus* acutis, periculosum esse solet, in statu semper lethale, cum, uti superius monui, nihil eorum subita Malignitas: minus tamen periculosum, si per casum partem inferiorem & in *Febribus intermittens* contingat; item qui evacuatio aliqua, v. g. Fluxus Alvi, Hæmorrhagia Narium, &c. accedat: periculosum autem in incremento.

Evigilandi impotentia, & fomai nimis, qui advenit Vigiliis in delirantibus, pessimum signum est.

Lethargia præ reliquis malum est magis acutum, utplurimum, non semper lethale, septem diebus sæpius interficiens; quos si Aegri effugiat, sanantur; vid. HIPPOCRATES *lib. 3. de Morb. Text. 85.* Sanantur autem hi affectus, vel evacuata tam sponte & critice, quam artificialiter materia viscosa per alvum, vel per copiosam per Nares emulsionem, aut sputum, vel per parotidem eruptionem, vel salivationem, vel puris ex acribus profusum.

His si adjugetur *Febri* & reliquorum symptomatum remissio, spes est, Aegrum convalescere: quod vero deoibus minus quam juvenibus periculosum existit, rectè à PLATERO per experientiam & rationem negatur.

Lethargia superveniens aliis Morbis gravioribus, in specie Cephalicis, ut Cephalalgia, vel Melancholia, vel Mania, vel Epilepsia, plagis capitis vehementioribus, & in corpore cacochymico, valetudinario, aut simili, item Nephriticis, Puerperis & similibus, lethalis esse solet. Item quo gravior morbus in principio fuerit, eo solet esse periculosior.

De cætero quo plura & atrociora sibi combinata gerit *Lethargia symptomata*, scilicet torporem immensum, difficultatem & inæqualem respirationem, tremores, spasmos, &c. eo periculum majus, contra, si leviora & pauciora, aut remittant.

Exigua autem *salutis spes*, si fluxus superveniat. Item accedentibus lethargicis symptomatibus, si erumpat *sudor frigidas*, imprimis in capite, lethale est.

Tremor Lethargia superveniens periculosus est: Ecentri superveniens præmitur salutari cærens paribus est; superveniens vero phrenitidi Lethargia lethalis.

Lethargus, qui causâ interna supervenit, in corpore alias sano, scilicet Cephalicis & idui non adeo vehementi, minus periculi facit, quam qui sub contrariis circumstantiis corripit: vid. HIPPOCRATES *lib. 3. de Morb. text. 5.* Qui spontè à causa interna, lethalis est.

Si per Purgantia, Vescicatoria, & Stereutoria fiat copiose materia effluxa cum Aegri levamine, spes adjuget; uti adhuc cum tumore coeunda: quod etiam intelligendum est de aliis.

Curi Prognosis semper est mala; præsertim si Febribus continuis alique Morbis cephalicis & Plagis succodat: sive autem ad salutem sive mortem terminetur, ab utroque vel in Apoplexiam, vel in Paralytiam & Spasmodiam: vid. WILLISIUS *loc. cit. sup. 4.*

CURA.

In cura Lethargi respectus habendus est imprimis ad causas remotas supra deductas, adeoque vel

1. Nimum pletum, Massam Sanguineam ac imprimis cerebrum immodicus, est evacuandum: nunc per Alvum, nunc per Sudorem, aut per Vescicatoria, nunc per Stereutoria & similia; Vel

2. Spiritus cordis excitandi: nunc Acidis, si Virulentia narcotica peccaverit; nunc Volatilibus acriteri-

bous plus minis aromaticis, & ita Virulentia narcotica contrahatur: ubi à nimia humiditate Cerebri malum originem duxerit, intercedit acribus, Senium Organa vellicatibus, Somnus nimis impediendus.

3. Cerebrum aromaticis, & spiritibus animalis in motu deficientes excitandi, & in statum naturalem redigendi sunt.

4. Lethon: externa, si adjuverit, per Chirurgiam curanda.

Quoad *primam indicationem*: inter evacuanda *Phlogosis* in Lethargo à sola Narcosi interna vii convenit: aut ubi à cellulæ recrementorum, mediæ sanguine & ferro Cerebrum inundata, malum ortum fuerit, Vescicatio ferè semper necessaria est pro scopo *anesthetici* aut *derivatoris*: & quidem primò in brachio, vel secundum quosdam rectoriores in Venis jugularibus (vid. WILLISIUS *loc. cit. pag. 319.* RIVERIUS *loc. cit. & RIOLANUS Ratchid. Anom. Patholog. lib. 3. cap. 93.*); postmodum, si opus fuerit, in Crure: sive liquis autis principibus, sive adjuvantis rationem habeat, modo Aetas & Vires illam ferant, que non tam ex adionibus nunc deficientibus, quam quales aore insulsum fuerit, æstimande. Quem in finem, & quo sanguinis eductio repeti queat, non oia vice tantum, quantum opus est, statim sanguinis emittatur, cum per iteram sanguinis missione revulso commedidit sit, Viræque magis conserventur. Quibus non sufficientibus altero de *Cathartica scariatica* intra scapulas, aut *Hirudines Fronti*, Temporibus, prope Aures applicari possunt.

Simul verò moa in principio acris & fortiter stimulantia *Clysmata* injecta, & *Suppositoria* optimo cum succedat conveniunt, præprimis si purgantis non possint conveniunt adhiberi; quibus imprimis addenda Salia volatilia: v. g. sunt tales Clystères ex Centauro minori, Majorana, Salvia, Origano, Albathio, Serpillo, Ruta, Pyrethro, Felle Tauri inspissato, Pulpa Colocythides in petia ligata, cum Elethario de Hiera picra cum Agarico, cum Elethario ludo, & similibus: v. g.

℞. Herb. Asfalt.

Centaur. min.

Fel. Tauri an. M. l.

Rad. Pyreth. ℥iij.

Pulp. Colocyth. in pet. lig. (aliter cruetras Intellina) ℥b. ad ℥i.

Coqu. in l. q. Aqua camom.

Colat. ℥ss. adde

℞. Mier. cum Agar. ℥i.

Fell. Tauri insp. ℥i.

Sal. vel. Sarcini ℥b.

Mell. Ovi No. i.

(Vel ubi fortis stimulantium Sals Gemm. ℥b.)

M. l. Clysm. & S.

Clyst. Adulgentes.

Aut

℞. Fel. Asari vel Neri.

Herb. Ruta,

℞. Centaur. min.

Starch. Arab. an. M. ℥.

Rad. Bryon.

Cratich. an. ℥b.

Pulp. Colocyth. in pet. lig. ℥i.

Coqu. in l. q. Aqua camom. vel Urina hom.

In Colat. ℥iij. dissolve

℞. Mier. pier. cum Agar. ℥i.

Fell. Tauri insp. ℥i.

℞. Caff. ℥ss.

M. l. Enoema.

D. S. ut supra.

Vel ad imitationem PLATERI Pr. Tom. 1. pag. 324.

℞. Succ. Bux. ℥i.

Rut.

Saturaj. an. ℥i.

Mell. Rosar. ℥b.

Ol. Nucum ℥iij. vel Diacetyrach. ℥i.

M. l. Enoema.

Item subinde applicentur *Suppositoria*, eaque etiam acutiora; nunc scilicet suppositoria acuta infusa, illius cum Felle Tauri, aut illius cum Oles Dia-Colocythides *Quercantia* vel præparatur de novo ex Melle inspissato cum Sals Gemme, aut ex Felle Tauri inspissato, cum speciebus Hiera picre, & similibus, quæ Melle conjugantur in formam Suppositoriorum applicanda:

℞. Apr.

℞. Spor. Rior. cum Agar. ʒij.

Sterc. Mur.

℞.℞. Tauri ʒij. an. ʒi.

Cum f. q. *Mell. anisat. vel Ror. f. Soppolitorum*,
Cum O'ro *Dia-Calayach. aut Myrbic. Illimendum.*

Quod si nec re uicatur videtur Agor, præmissis talibus,
piscaria largita & paulo actiora, item *diurantaria*,
summo cum succellu surpantur in lethargo, & tunc im-
primis, quando aguntur Affectus Comatosi in declinatione
uniusmodi Morbæ; tunc enim propter metastasis mate-
riæ n'opineatur: illa quidem *pro scopo Auerioris* hanc autem
pro *scopo Exarioris* ac limat *Evacuatoris*, sed nonnisi illis
p'ris præstatis: v. g.

℞. Pulv. Cambarid. ʒi. ad ʒij.

Euphorb. ʒij. ad gr. xij.

Caffor. gr. xv. ad ʒi.

Ferment. serr. ʒij. ad ʒi.

M. f. Cataplasma Veficatorium.

D. S.

Emplastrum Veficatorium.

Nam acris ac dolencia in talibus Aegris omnino requi-
runtur. *Vel*

℞. Empl. Citreæ. vel Diastyles. trosc.

p. iii.

Pulv. Cambarid. p. i.

Misc. & malax. cum Ol. Euphorb. pro Veficatorio.

D. S. ut antè.

Applicari non possunt ordinario modo Nuchæ, id est lo-
co circa Aures vel Collum, nec Vertici, nuncad imitatione
WILLISII Synypici, nec Occipiti, nunc Bra-
chiis, tunc Scapulis, pro Scopo Derivatoris; nunc Cro-
nicis pro Scopo Rerulioris: vid. WILLISII *de Anima*
Brutor. cap. de lethargo. Imo etiam applicentur parotidibus,
præmissis si has in Tumorem antelli observatur, cum in-
terdum Soporos Affectus per has relinquantur; & Lethar-
gam surditate solum ZACUTUS LUSITANUS l. a. *Præ. adubr. obfer. st. anocavit.* Quoties autem effica-
cine in his casibus Veficatoria sint, WILLISII l. a. duos
exemplis notabilibus testatur.

Coram *Paulina quædam ænorum*, quæ laborabat Tinea
Capitis, quæ evanescente supervecebat Epiphora Oculi
dextri cum sensibilibus Oculi Atropia, Hac cessante, super-
veniente Fabricia iusta, anni vespere exacerbatur cum
continua in somno propensione, quæ omnino superve-
nientia, ex Tinea Capitis de eisdem Fermento acris, me-
diante Lymphæ ad interiora rapto; Paella erat intolerabilis
omniæ remedia respuebat, unde deinde aliorum Remedi-
orum applicatio *hys ænorum* *hinc* ex Emplastro Citri-
no, hinc etiam cum Cambaridibus, quod Ingentum Vesi-
cæ efficebat cum copiosissimo Seris profusivo: unde altera
die omnis Febris & Somnolentia evanescibat, Epiphora
cessabat, & tandem tertia die restituebatur.

Quod f. ab his affectum aliquorum ledatum esse digno-
scat, mature scribentor *Purgantia.* Inter ea autem prima-
tum *diastyles* *remittit*, qui si commode potest soluitur statim
enim a principio, nisi a causa externa, aut a Virulencia
narcotica interna fuerit, obesse potius quam proficere vido-
retur, proinde contra communem agendi modum testatur WIL-
LISII *nos aut.* admodum proficere, ut tal Virulencia
narcotica, vel copiosi succi evacuentur: sic enim RI-
VERIUS *Cæ. 4. Obferuat. st.* Puerum quinque annorum
Veteris corruptore acris Clystere & Vomitu curavit. Hæc
inter, uti solet, et, emittent Emetica antimonialis, seu
Vioa Emetica: item Tinctura Nicotianæ cum Spiritu Vini
extracta, ad ʒij. propinqua. Loco Vomitoriorum si non
sufficiat illa, uti *hæc* necesse Vomitus infusus, *Purga-
tio per Aluum* instituitur cito, ocella temporum electio-
ne: Neque enim timidos aut canthabundus Medicus in pur-
gandis Lethargicis debet esse, & quidem fortè Medicamen-
to fiat, aliis enim eventus frustratur. Inter por tota im-
primis est purgans ex Scammonio, cui semper Cafforem,
quod Affectuum Soporosorum appropinquat vel Alexiphar-
micum, vomiticeum, & jam a TRALLIANI ætate
fuit celebratum: v. g.

℞. Caffor. ʒij.

Scamm. præp. ʒi.

*M. pro a. doibus, & detur in Vehicul. Oxy-
mellis.*

Quo curavit BORELLUS Virom quinquaginta quinque
annorum, uti videre est in *Cæs. v. Obfer. 52. Cæs. ZACU-
TUS LUSITANUS lib. 5. de Med. Præc. lib. 16. ad
FORESTUS lib. 10. Obs. 33.* qui curavit Lethargum bo-
nificio pilularum Cochiarum, cum Caffore propinatam.

Tom. II.

Alius Extratum Melanagorum Quædamque ʒi. ad ʒij. item
Extrac. Elula aut Trochiscor. Almandal a gr. viad xij. u-
surpatur, aut alius addi ra pro istum lo conveniunt. E. g.

℞. Extr. Phlegmag. Ror. ʒij. ad ʒi.

Caffor. vel Caffor. pulv. ʒij.

Trach. Almand. gr. ii.

Refia. Jalapp. gr. i. li. ad v.

Cum ʒij. Caffor. f. pilulæ.

D. S.

Pilulæ purgantes.

Vel

℞. Massa pilular. ʒij.

Hier. cum Agar. ʒij. gr. ii.

Mag. Jalapp.

Extr. Caffor. an. gr. iij.

Trach. Almand. gr. ii.

M. f. pilulæ.

D. S. ut antè.

Difficili Pilulis commode etiam *Asteriscus dulcis* addi po-
test, cum hic in similibus Affectibus aliis fit egregius.

Vel

℞. Cr. fall. Tartari gr. xv.

Scamm. præp. ʒij.

Mag. Gum. de Pera gr. iij.

M. f. pilulæ.

Pulvis purgans.

Vel

℞. ʒij. Jalapp. ʒij.

Scamm. ʒi.

Caffor. ʒij.

Extr. Dia-Caribam. ʒij.

M. S.

Essentia purgans.

Præmissis hinc modis narratis Universalibus, idque im-
primis in casu, quod oriantur affectus Soporosi & Collapsio
terrosa (nam si Virulencia narcotica affectus induxerit,
Vomitus sufficit), progressus faciendus est ad ea *Appropinqua*
quæ aut Spiritus A nimales excitant, volatiliant, & agiles
reddunt, eorum Torporem excutiant, & ita Somnolentiam
nimiam compescunt, acrimonia sua sublimi penetrando, &
Stimulum Organa velicando: aut eisdem plus minus rellin-
eunt & argent, aut Virulencia narcotice resistunt.

Io Casu *ex colluvie feræ* peccentis Alcalia acris vola-
tilia plus minus aromatica, ex Plantis acerbis Cephalica
desumpta, sunt optima; sicuti, quando Virulencia narcotica
peccat, Acida, imprimis Acetum, sunt optima. Utroque
in casu primatum docet *Cæssarem*, reliqua remedia semper
sociandus: singulari est Remedium contra Affectus So-
porosos, hinc quævis inde parata interna & externa; vel lo-
la, vel cum Acidis, vel Alcalibus mixta, præterquam ejus of-
fensum cum spiritu Salis Ammoniaci urisæ parata, lo largi-
ri dosi propiata est egregia. Conveniunt ego in priori Ca-
sa Ruta, Scapillum, Polegium, Origonum, Satureja, Sal-
via, Calamus aromaticus, Raphanus, Carduus, semen
Sinapi, Erucæ, Nasturtii, &c. quæ ipsa insuper laudan-
tur ad curandum Lethargum; Scilla de similia acris vola-
tilia, ex quo his parata Remedia, Spirituum Animalium
Torporem corrigunt: Hinc & Salis volatilis quæcumque,
tam acris, quam oleosa sicuti, in Lethargo & Apoplexia &
Caro, subriter usurpantur: nempe Spiritus Salis Am-
moniaci, spiritus Fermentum volatilis, spiritus Sennæ, Sinapi,
Sal volatile Urina, Sennæ, & quæcumque alia, quæ acris,
eo meliora, cum veliulo *Aqua Liliorum convallium* spiritus
sa propinata, sunt optima, quibus WEDELIIUS plus pe-
nitit in affectibus Soporosis, quam Spiritibus aromaticis
sulphureis: Videantur *Opuscula ejus pag. 46. 47. & 51.* Qui-
bus spiritibus *Olea & essentia Viperarum* adjuvanda, v. g.
Essentia Anihor, Majoranæ, Liliorum convallium, Rutæ
Cruci, spiritus & Essentia Citri, essentia Ambæ cum Spi-
ritu Rosarum, vel Spiritu Liliorum convallium, Cera-
rum nigrosum, Oleum anihor, Majoranæ, Rutæ, cry-
phyllorum, Salvia, Georæia, similiaque, tam simplicia
quam composita, per se nota, adduntur. Decodum *herba
Theæ* à modernis admodum decantatum optimè convenit,
Somnolentiam nimiam naturaliter discutient circa virum
dispensant, hinc commode cum aliis appropriatis, in spe-
cie post craspidam, usurpi potest. Est planta Sincosis
& Japonensis foliis myrtinis: hæc collecta coquitur in a-
qua, infusio Decocti, quod saporem acquirit aromati-
cum, haustus interius assumptus mirum est quam arceat
omnem somnum, ita ut quis etiam per triduum hinc somno
contius perferre possit: hinc etiam acris admodum Inge-
nium, Venetici, al filior, in Germanica Domo, in Impe-

O o o o

rio

rio Germanorum, est in usu. (V) Preparandi modus & de scriptio hujus Herbar videatur in TULPIO lib. 4. observat. cap. ult. item in WORMII Mor. pag. 165. Item BORELLO Creat. 3. observat. 39. item SCHROEDERO 10 Pharm. Append. item DEADAMII Valerianar. pag. 169. Denique est radix Iadica, quæ vocatur radix Cusi, quam ministrum externum usu esse ad curandum Lethargum refert KIRCHERUS in Regno Naturæ Magnet. pag. 45. De his scribis remedium toporæ spirituum exsiccantibus, vid. SYLVIIUS lib. 3. Præf. cap. 26. c. 8.

24. Aqua Mentha.

Ruta ana 3℔.

Aquil. 3℔.

℞. Caffor. 3℔.

Spiritu. Pulv. 3℔.

Syr. de Ruta 3℔. M. S.

Mixtura Emollientis cochlæatam fumenda. Vel

24. Spiritus Scorpil.

Corn. Ciri ana 3℔.

Sangu. Hum. 3℔.

M. D. S. Spiritus Emollientis. Vel

24. Conf. Salvia.

Ambros.

Lavand. ana 3℔.

Syr. Diacubus 3℔.

Pulv. Cerebrar. 3℔.

Sem. Sinaapi.

Caffor. ana 3℔.

Cam Syr. Flor. Pura. f. Electuarium: D. S. Electuarium Emollient ad Caput.

De reliquis infra sect. 3. Cap. 3. artic. 1. ubi de Apoplexia, piceat.

Quod si verò Virulentia Nervosa, vel ab externa vel ab interna excitata causa, affectus toporolus induxerit, conveniunt ad ea volatilia interne & externe: qualia sunt acetum Vini, Aceta medicata diversa, in specie Acetum Hyssicum & Myrsini. Acetum cum Calore infusum, Acetum & Osmell squilliticum, spiritus sulphurei per campanam. Veteres Osmell squilliticum fuerunt contenti: hodie spiritum imprimis Virioli volatili utimur, forma legitimum signum est, quod non guttatur, sed 10. corpus fibrarum in Alembico appareat. Paratur ex Vitriolo arctione calcinato, itat Phlegma saltem evaporet, remaneat spiritus volatili, qui postmodum per rectificationem ad spiritum fissiore separandus, sic enim fit spiritus Virioli volatilis esculentus in Cura Lethargi. Excitit hic etiam spiritus Acri viridis volatilis, vel per se adiecta Acrea, vel cum Aceto preparatus, qui loco spiritus Virioli volatilis potest commodè usurpari, spiritus Virioli regneratus, seu ex capite mortuo. Acri expulso, deinde destillatus (qui non tam est vitriolaceus quam potius nitrosus) & ipse commendatur ad Curam Lethargi, vel adhibetur spiritus Virioli Cephalicæ Doleris Michaelis, paratus ea eodem capite mortuo acri expulso, quod remanet higerit cum spiritibus Vegetabilibus cephalicis, Ceraforum nigrorum, florum Tiliæ, Liborum convallium, Majorane, Salvia: Hoc destillatum more solito, & post rectificationem, dat spiritum Cephalicæ, admodum penetrantem & volatilem, quia Cura Lethargi mirabilis est. Propinquat ad gutt. 10. vel 30. in Aquæ appropriatis, Liborum convallium, Rume, Majorane, Rorismariæ, Ceraforum nigrorum, Serpilla, Aqua quodam Apoplectica, & similibus. Admodum convenit, & egregie resistit Aegros, spiritus Virioli Epilepticus Quercetani cum Urina Pueri paratus, loco cuius spiritus Acri viridis iam doctus usurpetur. His præterea addatur Acetum Virioli volatilis benedictum, D.LANGLIO in sacretis potum, remedium quoniam singulare in affectibus Catarrhis, & etiam in affectibus Soporosis, Modus præparandi est hic:

Vitriolum in Crucibulo leniter calcinetur ad absorptionem Phlegmatis: calufo autem Phlegmate Crucibulum regitur operculo, & hoc conegitur Carbonis advis, ita ut per quædam inter horæ calcinatum easde rubefcat: hoc modo calcinatum pulverisatum, per sietæcum subtiliter trapiatur: postmodum.

24. Carbon. facinar. dard. bene pulverisat. ac per Retortam trahit.

Vitrioli flos pur. an. 3℔.

Bene missa indantur Mafi pleno, & satis patulo terreo, quodque igni tamen resistere valeat, impositus Car-

bonibus in Furno vecti, bene calcinentur, coctioem agitando cum ratibulo ferreo tam diu, donec nulla amplius scintilla in Miftura appareat: Hinc

24. Viriol. bene trahatur.

Affundatur acetum distillatum acerrimum, ponatur in Digestionem in loco calido, ut iactem Vale bene coctio, exspanatur Radix Iadica, idque per quaspo decem dies & noctes, hunc siletur Acetum per char- tam, erique sic paratam acetum Virioli benedictum: Dosis est à gutt. ad 3℔. in Aqua appropriata affundendum: In omni bus Catarrhis Frigidis, ut vocant, item in affectibus Soporosis, admodum commendatum.

Hæc ipsa interne & externe in Lethargo Narcoptico sunt optima; quibus omnibus semper Cafforum addendum est, summum specificum in his affectibus, tam in forma pulveris, quam Essentia, Extracti; vel Aqua Hirundinum cum Callosco, vel aliis modis, usurpetur: c.g.

24. Aqua Cereb. nigr.

Serpill. an. 3℔.

Acri Myrr. Musc. vel squilla 3℔.

℞. Caffor. 3℔.

Osmell. squillit. 3℔.

M. S.

Mixtura Emollientis ad Caput, cochlæatam fumenda. Vel

24. Sacch. preparat. vel Cerebrar. Mich. 3℔.

Cinnab. Antimoni 3℔.

Caffor. 3℔.

Divid. in 4. part. æqu. S.

Pulvis Capot confortans.

Quibus ac similibus rite administratis in fine Cura sades fore, ex Ligu imprimis parata, curam claudat.

Pull hinc & Sternutatoria & Apoplegmatica applicentur illa, eaque serva, facienda sunt in Radicibus & Floribus Liborum convallium, Calthore, Tarpetho Minerali, & paucis Radicibus Hellesbori albi, & Euphorbi; item ex Pulvere Nicotianæ cum Euphorbio, utat casit, quibus pro meliori penetrantia grana quædam Salis volatilis Uræ, vel Salis Ammoniaci volatilis, & c. addi possunt, in speciem Apoplepticæ: aut Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva paratus. Nam hæc Salia volatilia commodè peraguntur cum talibus Sternutatoriis scribibus, cum fortiter penetrans ceteris addita, dum interea alia acria Sternutatoria vellicant. Viriolum ad aliedum calmarum ad 3℔. solutum cum Aqua Mentha 3℔. constituit liquorem, qui naribus attraheatur subinde, pro Sternutatorio satis eleganti. Ad tertium autem diem, & post Purgantis operationem, diffundantur, ne Materiam peccatam ad Cerebrum magis commoveant. Apoplegmaticum ex Semine Nigelle, Radice Pyrethri, Confessione Anardina, Theriaca, & c. Sost. potatoria per peonam Naribus infundenda sunt: v.g.

24. Pulv. Nicotian.

Lil. convall. an. 3℔.

Rad. Helles. albi 3℔.

Caffor. gr. an. ad 30. vel 3℔.

Olei dissill. Major. gutt. vi.

M. f. Pulvis: S. Pulvis Sternutatorius. Vel

24. Syr. Dia Tobac. 3℔.

Caffor. an. 3℔.

M. f. Pulvis. D. S. ut antè. Vel

24. Syr. Dia Major. 3℔.

Pulv. Rad. Helles. alb. 3℔.

Caffor. gr. xli.

Olei dissill. Ruta gutt. vi.

M. f. Pulv. D. S. ut antè.

Vel Sternutatorium TIMÆI per Quædam in Affectibus Soporosis expertum, quod habet in Caff. pag. 10.

24. Helles. alb.

Caffor.

Piper. alb. an. 3℔.

Olei dissill. Ruta.

Naruran.

Salu. an. gutt. ii.

M. f. Pulvis.

Sternutatorium ex Tarbith cum pulvere Glycyrrhæ vid.

in BARRETTE Præconi comment. Decuri, pag. 76.

24. Theriac. Androm. 3℔.

Eur. Caffor. 3℔.

Pulv. Rad. Pyrethri 3℔.

Olei dissill. Saccin. gutt. vi.

M. pro Apoplegmatico, Palato illiando; S.

Electuarium Absterivum ad Palatum.

Cum his & æterne uis simul usurpanda, quæ aut spiritus

(V) Ther. Potum Authoris tempore variis, nunc adeo frequens factus est, ut nulli non in trisulis cum Caffæ & Choccolate præstet. Hæc utriusque Decaliter, singula, si vesperina præterea tempore adhibeantur, saltem saltem inaffusis, Sennam ab oculis arceat.

rus caecitas, eorumque Torporem discutere valent, acris, penetrantia, & tenuior Organa plūs minūs vellicantia; Admoveatur igitur crebris Naribus spiritus salis Ammoniaci acris, sal Uriam, vel oleum Tartari cum sale Ammoniaci, &c. in Vitro angustis sed longi colli, poterit Lethargicos ac Apoplecticos ac alios soporosos, uno secus ac Mulieres Hybericas, vacantes. Post hunc alias non inolegas Experimentum est HARTMANNI ea Aceto Caloreo imprægnato cum Linteo vel Spongia Naribus admodum, & Epithematis loci Fronti & Temporibus applicato. HARTMANNUS commendat spongiam cum succo Apii, Fenniculi, & Aceto rosæc vel rutæc, cui adspargit Pulverem Callorem, & ita crebrè Naribus admoveandum; vel succas Fenniculi, aut etiam in succo Rutæ recens expressis cum Aceto & Caloreo Naribus admotus, vel cum Linteo multiplicatis Temporibus, Fronti & Plantis pedum applicatus, admodum laudatur. Quo etiam facit *Acetum Radicum Rorissæ*, simili modo usurpatum; nam Acetum admodum convenit ad arrendum somnum & adducendas Vigilias. Hæc Aceta potentius penetrant, si cum semine Nigellæ, Rutæ, Callorem cæ, codæ, Laminæ ferreæ candenti affundantur, quod Vapor Nares Agri subeat: Vid. HOFFERUS *Nov. Med. Part. I. lib. 2. pag. 81. Interim & simul Tempora, Fronte, Nares ac Facies aquis apoplecticis ac spiritalibus, Oleis destillatis succini, majoranæ, anethi, rumæ, lactuæ, ferpilli, Nigellæ &c. horumque Balsamis, aliisque Cephalicis illinantur, cum ipsi etiam Linguis affricentur. Curavit WEDELIIUS loc. alleg. Affectum soporificum in puella spiritus salis Ammoniaci volatili, cum Aqua Liliorum convallium spiritibus propinato: extertit innuit Tempora, Mox & præcordia oleo succini, & camphore cum pinguedine callorem, & in succo appendit camphoram, Nigellam & callorem. Capiti quoque admoveatur *summa Nervina*, v. gr. Decoctum lactuæ, cujus etiam aliquæ guttæ auribus infunduntur: vid. SCHENCKIUS pag. 60. Artus nihilominus frigiditates superiorem tridentur. Sinapi etiam cum aceto subactum, si hoc ipso fricentur plantæ pedum, vel instat Epithematis applicentur, excitat Lethargicos &c. Item Epithema ex semine sinapi, piperis, &c. cum spiritus Vini & aceto: Vel sit acetum anethicum acre ex lactu & Decocto Baccarum Lauri, Juniperi, Zedoariæ, Herbe Rosmarinæ, semine Sinapi & Nallurti, & similibus v. gr.*

36. Olei destill. Sabin. 3℔.

Capit. 3℔.

Succin. an. 3℔.

M. pro Oleo, Temporibus & Facie illinendo.

Oleum Exspersfaciens.

36. Olei destill. Sabin. 3℔.

Capit. 3℔.

Succin. an. 3℔.

Capit. 3℔.

Cum 1. q. Balsami pro corp. Misc.

D. 8.

Balsamus Caput exspersfaciens.

36. Berk. Apii M. 8.

Sem. Nigell. 3℔.

Capit. 3℔.

Ex incisa & contusa (Nodus) aceto rosæcæ irrigandus.

36. Aqua Mirrad. cum Capit. 3℔.

Spiritus Cyball. Virid. Mirr. 3℔.

M. pro Temporibus & Facie irrigandis.

36. Aqua Mirrad. cum Capit. 3℔.

Spiritus Cyball. Virid. Mirr. 3℔.

M. pro Temporibus & Facie irrigandis.

36. Aqua Mirrad. cum Capit. 3℔.

Spiritus Cyball. Virid. Mirr. 3℔.

M. pro Temporibus & Facie irrigandis.

36. Aqua Mirrad. cum Capit. 3℔.

Spiritus Cyball. Virid. Mirr. 3℔.

M. pro Temporibus & Facie irrigandis.

36. Aqua Mirrad. cum Capit. 3℔.

Spiritus Cyball. Virid. Mirr. 3℔.

M. pro Temporibus & Facie irrigandis.

36. Aqua Mirrad. cum Capit. 3℔.

Spiritus Cyball. Virid. Mirr. 3℔.

M. pro Temporibus & Facie irrigandis.

36. Aqua Mirrad. cum Capit. 3℔.

Spiritus Cyball. Virid. Mirr. 3℔.

M. pro Temporibus & Facie irrigandis.

36. Aqua Mirrad. cum Capit. 3℔.

Spiritus Cyball. Virid. Mirr. 3℔.

M. pro Temporibus & Facie irrigandis.

36. Aqua Mirrad. cum Capit. 3℔.

Spiritus Cyball. Virid. Mirr. 3℔.

M. pro Temporibus & Facie irrigandis.

Sem. Eruci pulvis 3℔.

Pulv. Capit. 3℔.

M. 1. Epithema: S.

Epithema Extensum: Vel

36. Berk. Satureje,

Ruta an. M. 8.

Zedoar. 3℔.

Bacc. Jussip. 3℔.

Lauri 3℔.

Sem. Mustum.

36. 3℔.

Cogn. in 1. q. Aceti pro Epithemate.

D. S. or antè.

Quod si à sanguine extravasato, Cranio depresso, similivale quid contigerit, hæc per Remedia Approposita removeantur: de quibus in Chirurgia videri poterit, *Extraximus* scilicet, *Trochanem*, &c.

Comata Febrilis quocunque optime curat Acetum Naribus applicatum, quo validius, eo melius; unde & spiritus Vitrioli reliquis præferitur.

Comata Pigritia, præter modum allegata, curat Cataplasma ex Raphano recenti cum Ruta, Aceto, Fermentis 1. q. & Sale communi subacta, plantis pedum applicata, & subito reiterata: vel ex Ranzanulo cum *sapone nigro*, *sate marino*, & Fimo columbino, similibusque acribus in vice mixtis paratum Cataplasma dicto modo pedibus applicetur.

Quod si *Caras* ex Mercurialibus extorserit, aut Vaporibus venenatis Mercurialibus, aut ea est Nucum Juglandium contritus; item qui inspiratur Gas Liquorum fermentosorum sequitur &c. curatur, si Vomitus maturè instituitur, hinc *Acetum*, præsertim cum *Castoreo* imprægnatum, Naribus & applicandum, & etiam interit cum Callorem propinandum, ac postmodum spiritibus internis spiritus Animalis denotè volatilis. V. gr. ex Fumo Carbonum, Vaporibus venenatis, &c. si orisur talia Mæla. Vomitus præmittatur, cum Pars afflicta solet esse circa Oriothoracum stomachi, & tales Agri conqueant de angustia circa præcordia: In talibus enim apparet suffocatio, unde mox instituitur Vomitus per valida Vomitoria, post propinquantur interit Acida cum Callorem probè subacta, exque in larga dosi, v. g.

36. Aqua Menth.

Ruta,

Aceti rutæ, an. 3℔.

36. 3℔.

Syr. acut. Citri 3℔. vel Morisæ 3℔.

M. D. S.

Mistura spiritus escitans.

Capiatur crebrè cochlearim.

Naribus verò subinde admoveatur Callorem frustum Aceto intinctum. Eodem valent, si malum sit à Croco.

Quod si quis ex abusa Opii vel similibus in carum aut soporosis incidit Affectus, præmissio vel omisso Vomitu, accipiat Acetum Vini vel Rutæc, Acetum Vitriolatum benedictum, vel scilliticum, in quo dissolvatur Callorem, quod est opium. Hoc etiam figit Opium, & Opusculum totum oleum omnino destruit. Unde etiam Acetum assumitur à quibusdam ad præparationem Laudani Opaci. *Pamulus confusus Materialis* cum aliquando 3℔. crudi Opii pro reconciliando somno receperit, binas noctes & dies continet dormivit: tertia die vocatus Medicus recipere jubet *Acetum Spithelicum*, in quo Extraxum Callorem dissolutum fuit, quod instillat copiose ori, hacque Mixture Frontem ac Tempora, pulsat etiam Mammæ ac plantas pedum, & impetum Genitalia, irrogat largire, & indolis fricanda sustineat, & sic succellit deinde evigilavit, & ex Moribus sanis ereptus fuit. Si Affectus soporosis in Opio contritus his corrigi non potest, præscribuntur sinapi. Eruci &c. Salis quippe volatilis languentia illa Organa excitant. Clyster etiam ex Vino Hispanico curat Narcosis ex Opio.

Quod si ex *Extraxum*, abutis Vini, spiritus Vini ac simili potu generoso carus aut cuiusmodi Affectus soporosis oritur, præmissio Vomitus, si non sponte sequatur, Acetum Fronti ac Temporibus applicandum, vel solum vel cum succo Apii rasilum. *Epithema* verò ex *Succo Sempervivi majoris*, cum *Aceto* & *Mirra* Scroto aut Testibus admoveandum, ac subinde removendum; Potenter enim Ebrietatem discutit. Sic WEDELIIUS Affectum soporificum à spiritu Vini inductum curavit, applicando Testibus Lintea Oxycera imbuta, ubi statim Natura sponte se liberavit Vomitu, ubi postea propinavit Eliar cephalicum, cum spiritum utinotum salis Ammoniaci sortita sanatur: Videb. Opus pag. 37. Spiritus enim salis Ammoniaci volatilis, aut Fuliginis,

Oooo 2 corri-

corrugare & destruere Acidum volatile Vini, & inde natam Ebrietatem, si sudor expletur; sicut & ille ante Vinum assiluppit, facit ut non inebrietur: si post potum assiluppit, Crapulam statim ducit.

In Genere ut melius observetur Methodus medendi affectuum Spasmodicorum, considerandum, quod affectus Soporosi vel à causa externa, vel à causa interna nriginem ducunt. Si à causa externa, assiluppit vel inspiratis, post oculum convenit aciem & Calorem: Si à causa interna, habenda est ratio, an per se & primario Morbum constituant? v. g. Lethargus: an vero Febribus, aut aliis Morbis in statu diti am aut declinatione denud superveniat? Si per se Morbum constituant, attendendum, an Vis narcotica in succis nostris enata; an verb Colluvies recrementosa, in specie serosa, vel alia in Cerebri substantia effusa, non inducat. Quod si ergo per se ex Colluvie recrementorum originem ducant, vel alia Morbus superveniat, & Metallalis Materie morbosus suspicio fuerit, Vomitoria, Purgantia, & Clysthes, item Venæsectione aërioria & derivatoria, hinc sinuata & Veficatoria sunt optima; quibus tandem Acria volatilia, spirituum torporem eracientia, optime subungantur. Hinc enim & Comati Vigili, item Comati Soporosi Maligntiorum, Veficatoria Nuche vel Parotidibus, & Caputissima Pedibus applicata conveniunt: si verb ex causa interna, sive vi narcotica plus minus maligna, nriginem ducant Affectus Soporosi, post Vomitoria, vel premiffum vel omiffum, acria excitantia conducunt, seu quæcumque acria volatilia, sensum Organa fortis veficantia, & spirituum torporem ac immobilitatem corrigentia, vel in specie acria, acria, volatilia, Virulentia narcotice speciatim contraria.

MEMBRUM V.

De Catalepsi.

Pertinet utrimb ad hos affectus etiam *Catoche* seu *Catalepsi* (X), affectus rarissimus & summè mirabilis, qui est, quando in Egro cessat omnis sensus internus & externus, una cum cessante Motu, ita ut Egriorum Membra rigida & inflexa statuarum in sua positura, quæ Egros cogit affectus, pertinaciter persistant, impulsu tamen moveantur, sed tamen deinde in illa per Motum acquiescit figura fixa persistant. Oculis pertinaciter hiantibus, torvi vident, in eodem, quod ponuntur seu collocantur, Membra posita permanent. Non dormiunt tales Egri, sed videntur dormire, dum nihil sentiant, & tamen moveantur, non ab intrinseco, sed àlicui ab impulsu externo, inflexa Machine cuiusdam. Quamvis autem in gradu ipsi remissiore interdum somnihil videntur, ac subito Paralytico referant, immoti tamen utpote in fine Voce ac Tactu manent; hinc vulgò pro *Eclipsis* (Y) habentur.

CAUSÆ.

Id hoc affectu, quædam verò constanti sunt spiritus Animalis? vel quodam speciale eorum vitium? adhuc inexplabile est. Fixitas eorum spiritus esse, minime mobiles, quàm naturaliter esse debent, certam est. Simul tamen etiam eodem continuis sua præsentia Membra aluare, & in Tono debito conservare & animare, ex eo confirmatur, quod tales sent, sedant, impulsu progrediuntur, Oculos apertos servant, adeoque utat ipsi etiam hoc nesciant, semper figuram antiquam retineant. Unde ad *Convulsiones* referret *Catalepsi* VALENTINI dñs. *Inaugural. de Convulsivis*, et quodam *conferat* dicte esse eorum spirituum Motum, quatenus uno impetu Cerebrum reliquentes, in utrumque Musculum antagonistam intrant, nec inde statim retrocedere possunt,

unde Rigor ille notabilis. Hoc sive confirmat ex *Antecedentibus*, *Concomitantibus*, *Successibus*, & *Interitibus*: Hinc D. D. DOLÆUS *Catalepsi*, *Apoplexiam inversam*, haud in concinnè vocat in *Encyclopæd. Med. T. de Catalepsi*. Chymici derivant ex *Puris* quibusdam vitriolaceis acidis, spiritus Animales coquantibus: SYLVIVS *pr. lib. 2. cap. 24.* spirituum Animalium *Coagulationem* quandam, à spiritu quodam quasi insolato volatili acri, qui est similis spiritui Urinæ per Fermentationem parato, coagulante spiritum viscosum testificatum in quodam Coloforum candidum & spissum: Sed rem dubiam reliquit. Scriptores in hoc conveniunt, inesse certam quandam *spirituum Animalium coagulationem*, tam in Tono quam in partibus, id est, ut in illa spiritus non tantum in Cerebro, sed intra Nervos quoque & Musculos quasi coaguletur: *qualis vero sit coagulatio illa?* difficile dictu; cum nec spiritum illum Vitriolicum seu Acidum, quem nonnulli in hoc Morbo ipsi concipiunt, nec spiritum illum Urinalem aque volatili, spiritus Animales inflex spiritus Vini coagulantem, ut SYLVIVS suspicatur, concipere liceat. Rarissimus alius est affectus, & qui variis habet *Antecedentes causas*: Vid. imprimis HEINRICUS ab HEER *observ. 3.* ubi duo singularia *Catalepticon* exempla habet, RONDELETTUS *Med. lib. 1. cap. 20.* FERNELIVS *Patbol. lib. 5. c. 2.* Sic *TESTUS lib. 12. observat. 44.* in *Schol.* refert, Poellam, ... esse coegeretur, hoc affectu fuisse correptam: *Item lib. 12. observat. 41.* à *Frigore* quodam rigidu inflex *Catalepticon* fuisse reddidit, item FONSECA *lib. 3. consil. 95.* refert *Catalepsi* singulis septimanis recurrentem, seu hanc tantum durantem, in Muliere *post Menstrui suppressionem* obortam. HILDESHEIM in *apitol. affectuum capite pag. 124.* meminit cuiusdam Hypochondriaci *Catalepsi* correpti, idque, uti ipse affirmat, ex Vaporibus ex Liene accedentibus. A *vermibus* quoque aliquies *Catoche* observata est, qualia exempla refert MARCELLUS DONATUS *lib. 1. lib. 1. lib. 1. cap. 2.* & SCHENCKIVS in *observat.* ubi aliquot Historias mirabiles *Catalepticon* habet. In *Paralytici Febre intermittente* *Catochen* observavit DODONÆUS *observ. 46.* A *fractura* & *ruptura* Caricem accellarum simillimum *Catalepsi* affectum refert PLATERUS *lib. 1. observ. pag. 28.* Jucundum huius *Catalepticos* exemplum est, quod refert TULPIUS *lib. 1. cap. 22.* Juvenis Britannus impetibus Amori indalgens, ex *insipientia* *repente* *intermittente* *Catalepticos* factus est: cum verb illi attenderetur, desideratam eum habitudinem Amicam, quasi exaratus ex profundiore Somno a throno ad se rediit, & profuit. (Z)

PROGNOSIS.

Catalepsi Morbus admodum *periculosus* est, periculosior tamen, si graviora ipsi combinetur Symptomata, scilicet Dyspœa, Excrementorum suppressio, Visumque imbecillitas.

CURA.

Remedia hæcenus proficua sunt *Vomitoria anthemionalia*, *sternutiva* tui *respiratoria*, sive interne vel externe usurpata: Item *Cataleptica acria*. Sic HEINRICUS ab HEER refert Caspicum *Catochicum* factum, per *aere suppressionem* excitatum.

Locus tui superius de vitio spirituum Animalium ac eorum Generatione, à quorum legitimo motu, & expansione, aut aucta, aut imminuta, sequuntur vel Vigiliæ vel Somnus: Pergrò eunc ad *Passiones Animales*, sive ad *sensum* externum, & ad impressiones in istum factas, prout bi ipsi (nempe Sensus) ex impressione Obiectorum sensibilibus in Organa particularibus Machine corporeæ variè alterantur & induntur.

S E.

(X) *Catalepsi*, *Κατάληψις*, deprehensio, comprehensio; *ἀκατάληψιστις*, deprehendo, occupo; quod hoc Morbo affectu repenti prehenduntur, & ab eodem occupantur. Sic *Catoche* *Κατοχή*, detentio, retentio, *ἀκατοχή*, detineo, retineo.

(Y) *Eclipsis*, *Ἐκλειψις*, dimotio rei alicuius à statu in quærat; ab *ἔκλειψις*, de statu dejectio. Plerumque *Eclipsis* pro *Mentis emissione*, quæ in admiratione, timore, aliave causa accidit, sumitur.

(Z) *Rarissimus* morbus *Catalepsi* ab *Epilepsia* affectu frequentissime non parum differt. *Epilepsia* licet in utroque, cum vehementer afficiunt, sensus omnes perit, non sicut in *Apoplexia*; in *Epilepsia* tamen convulsiones, vel motus convulsivi

universum corpus requies; ac in vera catalepsi nullus est motus convulsivus, imò membra omnia datam quiescentiam sicut et suspensam conservare facit auctor. Catalepsi inquam paroxysmo preloso immobili veluti statas remanet. quod est Prædicti omnes fatuorum, non contentum tamen quod membrorum rigiditatem aut fixilitatem. D. Deidier Prof. Med. Monspeliensis, Epistola ad D. Gualdum Professore Avinionensem conscripta, plures narras Histerias catalepticas, quarum membra adeo facile solvantur, ac illorum qui naturali sono preloso sunt. Hoc tamen discrimine, quod demum membra elevat, si relinquatur, iterum proprio pendere deinde: contra in catalepsi post faciliem subversionem, restita membra hanc deinde, sed in se sua constantem remanent, qui pueris. Sic Homini sexagenario cataleptice Paroxysmo detenti, elevatis primis tibis & cruribus, mox brachiis humerisque, uno & trunco Spina inflexa, evadit his membris in eo sua quæ Observator conceperat, remanentibus, corpus universum solis nervibus lesulis nutans iuvando spectaculo subsistens. Et lesulo hinc ablatum Riger, ac passus in terram minima vi demissus, erectus veluti statua, sensibus omnibus erubuit, & comatus permansit; imò cruribus curatis & alteram anterram propulsu, non sine iusta admiratione incidere visus est.

Notat autem laudatus Auctor, quod quovis, ut prius diximus, non leve fit inter Catalepsi & Epilepsiam discrimen, in hoc tamen Aëro, atque in nervulis aliis & se observari, utroque Morbo simul copari afferit: Maxilla enim inter in duobus aliis convulsa erat, ut liquetum quædæmo, sive cibum sive medicamentum, sumere non poterit: atque in alia femore rithipæ talia afflicta erant convulsione, ut distendi nequaquam poterent.

Ut igitur comparationem horum, atque inter se alios oppositorum Morborum, optam redderet causam D. Deidier, putat Epilepsiam fieri, cum vasa Sanguinis in Cerebro sunt inæqualiter illa turgescent, itaque spiritus animales eorum inæquali fluxu descendere per Nervos in Corporis Mafculos: abundantius quidem verius eis, qui respondent Cerebri hinc ab infarctis liberis; paucius vero verius alios: hoc motu convulsivo. Et confirmat Auctor Epilepsiam, in quorum Cerebro Vena varicosa, Tumores arteriosi, & glandulosi, prope Stom. dura Mater, Plexum Choroideum, & basim Crani repert.

Catalepsi vero causam ait esse Seram superfluum in Cerebri emporio collectam, quæ ea ratione relaxat Fibras nervosas, ut obsequium externorum impressiones recipi & transmitti non possint: in Sensum abdit. Quoniam autem libera est determinatio & distinctio Spirituum animalium verius ea Membra, quæ ab extrinsecis motibus arguentur; hinc fit ut Membra non ad Aegrotantis arbitrium, sed pro spirituum influxu variis moveantur, in eo sua mansura, donec à novo agentis extrinseci impulsu ad novam determinationem spiritus non cogantur. Difficili autem Cerebri Catalepsi demeriturum hanc superflui Seræ dissolutionem non fuit effectus. Imò in cadavere hominis Catalepsi cum Epilepsia conjuncta demoritur, eorum Cl. Vieussensio difficili, duo corpora glandulosa, post magnitudinem sperantia, dura Mater prope Sinum longitudinem adhaerent, quæ ferebant, propria figura & modo respondent, in Ossibus parietalibus infusculant: universa vero Cerebri moles carneo Sero imbuta, hinc proposita Hypothesis confirmationem deducit citatus Deidier: quod nempe Seram Cerebri sublimatam amitti oportet, perfellam Catalepsi; tandemque, vero illa Cerebrum aliqua ratione comprimitur, & Spirituum influxum perturbatur, levem Epilepsiam inducitur. Reverti Maxilla & Cruram in hoc Aegrotante rigiditas, ut mihi quidem videtur, potius Tonicam Convulsivam, quam Chemicam, h. e. Epilepsiam, ut Auctor ait, ostendit.

Hanc D. Deidier de Catalepsi Hypothesin non levis argumentis infirmare conatur D. Pelcador Medici Tulerensis. Ait enim Seram hoc Cerebrum dicens potius aptum esse ad Comasum afflicto producendum, cum membrorum Paralyti copiam, quam Catalepsi, in qua membra passim quæcumque constanter conservant. Adde Observations, & primam Aetii, qui refert Catalepsi, ex nimia Sanguinis in Cerebro collecti abundantia factum, Nervorum Hæmorrhagiam sentiam. Apud Rondeletium de nostro Ettmullero citatum Puella 17. avarum per vim intus homini comitibus iuncta, quæ de illo cogitabat, ejusdem nomen audierat, vel ipsi appropriabat, ita Cataleptice paroxysmo corripiebatur. Demum Tulpus, ut notat etiam hic Auctor referit, refert Joannem Catalepticum regere evasile, quod à concepta in matrimonio Puella responderet: & à Morbo autem per diem integrum affligente extemplo liber factus fuit. Amasia nomine alia voce incantatur, quæque conjugii sponsione. Querit autem ex Deidier Dominus Pelcador, quomodo fieri possit, ut Itha sola intus mariti, vel solum nomen dulcis Amasia exaudiret, Seram in Cerebri emporio extemplo colligat, & Catalepsi creet, vel eadem flagrantis laxet habent, & solvat Catalepticam paroxysmum?

Feliciter igitur expositam D. Pelcador rationem reddi Causa Catalepsi, non tam postea Fibrarum Cerebri laxitate, quam errandem potius sententia præter naturam facta, ut scilicet illarum elater restat successu assiduum externum, nisi hac summo impetu rem facientia, illas ad relaxandum eorum: Causam autem hujusmodi vultus Fibrarum tensionem, rigiditatem, & veluti inflexibilitatem, si sic loqui licet, Spirituum ponit. Hujus Hypothesin occasione D. Pelcador invenit acceptam refert Ettmullero, qui, si inferius videlicet, Describit Melancholicis naturam in eo consistere ait, quod Anima assidue in unicam Ideam incursa sit: causam autem hujus afflicti applicationis putat esse Spiritus animales nimium quiescentes, minime mobiles, imò fixiores quàm ut possint volutuosam motuum & expansionem pro Idearum varietate, capaces esse. Quam ergo maximum habet Catalepsi cum Melancholia connexionem, ut passio illa hujus Sympetma non inopè reparari; hæc præter rationem erit, ex nimia Spirituum soliditate, ut ita dicam, posse ferre Ideam encitari, atque Fibrarum Cerebri valida tensione facta, Catalepticum paroxysmum premitti induci. Hic autem eadem premittimus solvi poterit, si sufficiens adde Causa (tensionem ex Anima passim fundi pendens) ad Spirituum torporem tollendum, atque ad Fibrarum tensionem momento temporis relaxandum: facilius enim est Morbo per viam, seu per tensionem saltem solvere, quàm eis, qui per viam h. e. per resolutionem orti sunt: quæ utinam facile comprehendimus, premitti possit eis Morbo & excitari & solvi, qui à transsumo Spirituum fluxum vel reflexum impudens oriuntur, quàm eis, qui à causa quæcumque humoralis ortum trahunt: præsertim si nullum manifestum evacuationum observemus.

Juxta propositam Hypothesin putat D. Pelcador reddi facili rationem posse Observationem Rondeletii & Tulpi: fortis enim Itha quædammodum potest momento temporis, Spiritum ferendo, Catalepsi inducere, ita contraria Itha Spiritus in motum agendo, eundem morbum solvere aptissima est. Nec obstat Observatio Aetii, ætatem crassius humoresque Sanguis, qualem Melancholicarum, premitti motum fluxum amittere potest: & qui refert Spiritus animales Sanguinis naturam sequi? Nec magis obstat, quod refert Henricus ab Heer, Monachum Catalepticum, multa impolitasque Pituita per nates reducta, convulsis: Nam quid videret, quoniam ab Acidis Pituitam congelant & Spiritus ipsi ipsi poverunt? Confirmat demum laudatus Auctor suam opinionem experimento ab Aug. de Zarata in Histeria Peruviana allato, Militem in conspectu Presencia Cilenfis, ingenti frigore demortuum, quem calidiora post quatuor menses rigida, veluti si marmorea fuisset, reperit fuisse, eundem membrorum fluxum conservantia, quem cum frigida mure prebentibus habebat, ita ut & rigorem similiter Equorum habentia rigentibus manibus haberetur. Quod jam maximum lucem afferre potest pro explicando phænomeno, cur catalepsi eundem ferere pervigil membrorum fluxum, quem illi concessimus.

Quænam autem hac D. Pelcador de catalepsi Hypothesi validioribus videtur argumentis innare, quàm D. Deidier, ætatem D. de Ville hujus discipulus, Magistri Theon non inopè defendit, D. Pelcador redarguit, quod catalepsi cum Ecclasi male confundat. Et cum morbi maximi inter se differant: Catalepsi enim enim prorsus exterrum sensu orbatur, nec eorum remittuntur qua accidere tempore paroxysmi; contra Ecclasi & vivissima & fortissima Itha,

S E C T I O II.

DE SENSIBUS EXTERNIS, EORUMQUE LÆSIONIBUS.

Ophica quibus præfunt Animales spiritus, sunt *sensus* & *motus*, utriusque vel *interni* vel *externi*.

Externus quod attinet *sensui*, cum hic revera consistat in passione seu motione Organi, insidua ab obiecto externo sensili, per certum ab hoc factum motum seu impressionem, adeoque solum in motione Filamentoorum nervorum Organi, *spiritus Animalis* in his hoc solum præfere videtur, ut suo inditum *Filamento nervi* Organum sensus proxime constituitur, in *debita sua* & *passione* conferent, quo facilis ab externis obiectis moveri, & ita *sensatio externa* fieri possit.

Exposita scilicet corpora nostra machina est quorumcunque corporum ambientium aditavit & insultus: Hæc ergo ambientia, dum in partem quandam agunt, id est motum certum inducunt in eus Nervis, quæ motio, seu ab obiecto externo facta impressio, continuo Nervi ductu ad Cerebrum usque seu ad Nervi originem continuatur, quæ Nervi ab eorum causa motum ibidem circa eus radicem insequitur determinatus spirituum Animalium in vicina Cerebri medulla motus ab illo excitatus, qui constituit *sensum internum*; occasione cuius determinati spirituum Animalium motus Anima Rationalis format in nobis conceptum seu ideam, representantem eadè rationem externam impressionis, siquæ tunc formalis cognitio seu *sensatio interna* per mediantibus internis perceptis: id quod dolor imaginarius eorum, quorum Membra fuerunt amputata, illustrare videtur; post Membrem enim amputatam observatur tamen dolor in digito majori.

Vires illæ obiectorum exterminorum, quæ vulgò *qualitates sensibiles* dicuntur, quibus ambientia Corpora agunt in certas Corporis partes, Organa sensoria distas, constituit solum in certa talium Corporum, quod minimas sui particulas, *Textura vel conformatio*, quæ prout hoc modo nunc in hanc, quæ alio modo in aliam Corpora partem agit, & certum motum inducit, tam varias qualitates sensibiles, seu in Organa sensus agendi potestates habere dicitur: vid. b. DIGBY in *Tr. de Materia Corporum* Tr. 1. c. 1. p. 3. B. O. Y.

L. E. in egregia scriptis de Orig. Formarum & Qualis. Rem exemplo declarabo: Suppono me Corpus Aurantium Frustulum in manu tenere; hoc Frustulum si hic revera est tantum Ens onicum, ex particulis minutissimis in unum corpus coactum, & tamen diversis in meis sensibus effectus producit: Vilus in eo *saporum* autem; Olfus *odorum* suavitentem; Gultus *saporem* amaricantem; Tactus denique *Frigus*, *Scabritiem*, *Mollitiem*, &c. deligit: Sensus diversimodè ita affici seu moti, Nuntios, ratione continuati ductus nervi, ad phantasmata mittunt, tanquam certiores futuris, quid quique in frustulo illo deprehenderit; ita et Ratio postmodum Flavescimem, Suavitentem, Amaritiam, Frigus, Scabritiem, Mollitiem, &c. separatim consideret; unde diversæ notiones in mente quasi tot diversorum Entium oriuntur, quæ tamen revera in illo frustulo nullatenus distinguuntur, nec aliud sunt, quam ipsa illa materia, pro via Organorum dispositione diversimodè me afficiet: v. g. eadem Particula Frustulum Coricis Aurantium contectans, quatenus peculiari modo sonitum Lucem reflectant, colorate nobis apparent; quatenus certo modo figurate Papillas Lingue vel Membranam Aurium afficiat, sapidè & odoratè sunt; quatenus denique inæqualiter contextæ, multas emittent, multæ deprehsæ sunt, Scabritiem quandam seu Superficie inæqualitatem Tactui præfentant.

Modus ergo quo obiectum sensile afficit Organum sensationis, non fit per talem qualitatē ex obiecto emanantem in Organum receptionem, ut *Particula Sonitus* (huius qualitatis quasi introitu) sonat, sed fit per certum motum, in quo Instrumentum sensus proximum cietur, cuiusque varium pro diversis obiecti materiali textura, & hinc aliæque alia ad Organum movendum aptitudine; & in hac eadem motione formaliter sensus externus, seu impressio ab obiecto in Organum facta consistit. Constant autem sensuum Organa variis & distinctis partibus, ita tamen subordinatis, ut una sit primaria, & cuius per Obiectum Externum motione fit sensatio externa, & hæc semper solet esse

Nerv.

Illa, quæ formativæ, integrit occupant, & eorum memoriam habent, quæ paroxyfmo detentis ipsi eveniunt. Puella ergo Rondeletii & Juvénis Tulpii bænd Cataleptici sibi repandis, sed postea Ectasici; atque enim in forem Lucem erant intentas, & Juvénis Amassa nomen exaudire: quod veri Cataleptici non accidit. Ceteris porò De Ville juxta Magistri hypochondri, Ectasim, quædam dicitur & ante Nervis contentiones, & quoniamhas Dehrii species, & fere Fibrarum Empiricis resistent præfissa: verum ratione contrariorum eorum in Catalepsi, & compendibus Superf. affectibus Fibras eadem necessariò relaxari. Quam autem relaxatam hoc pendere nequeat a spirituum animalium deficiet, hi enim facili influunt in Cataleptici membra, præmisi quæcumque fuerint conservantia; necessariò igitur sic de Sero præter naturam in Cerebro relaxantur, atque alibi Fibras Empiricis relaxant, salvo tamen motu spirituum animalium totius partis corporis.

Item respondit D. Pelicad. ut, quippe Passum Rondeletii, & Juvénis Tulpii, Catalepsi præfens non Ectasim, ab ipsa Antichris, aliisque post illa amobis, dictis esse: nullo facto inter Catalepsi & Ectasim discrimine, ut vult D. De Ville. Præterquam quod est velis inter hos Morbos discrimine facere; bænd quædam tamen illis dicitur appropinquare vocare licet, ut facti De Ville: qui ex eo quod panteris Ectasim pendere a summa Fibrarum tensione, referre ratione contrariorum, Catalepsi in summa eorumdem relaxatione consistere. Fausse Pelicadous hæc Fibrarum relaxationem admittentem esse in affectibus Superf. verum D. de Ville præbendam restare ait, de Catalepsi quoque id veri dicit. Nec admi facile illi esse ait exponere, quomodo Fibrarum relaxatam ortum habet a Sero, vel intra vel extra vasa stagnante, obfuso ex quod in illis impedimentum fuerit fluxui spirituum animalium, ut ait De Ville. Dumque negatum non in eo consistere ait, quomodo Fibra Cerebri relaxantur nec pariantur, sed in pariantur: atque insuper ostendere, quod ex postea spiritus animales ibere influunt in membra ad conservandum illam suam, quem per contrarii motus arbitrio acquiritur, & non prius illa constant paralytica: quon ex consensu eisdem D. Deider Paralyti in Nervorum partis illius resolutione & laxitate consistit.

In Morbi Juvénis diff. illi Juvénis contem. Juvénis Clarissimum Virum Hippolytum expulisse, ut inde major hæc Læfio non meritis fortis affligeret post. Illud tamen animadvertendum esse addere libet, non ad explicandum membrorum in Cataleptici rigiditatem sicut & flexibilitatem, concurrere posse hæc præternaturali Fibularum, quæ sita sunt in Canaliculis communibus Majorem Amplexificationem, quorum apertura & obfuctio, cum secundum naturam se habent, spiritus animales ex uno Mafculo in alium influunt, vel in alteram conferunt præfistum.

Admi quoque & jamdum Cl. de la Hire Jun. Observationem, de Floribus Dorocephali Americani Breyn. quæ tranca Planta hæret, si motu horizontaliter facio semicircularem movementum, in eo loco fit si remanent, quo pefueris, nec priorem, ut reliqui flores, recuperat: quare quon hoc phenomenon maxime respondet peculiari Cataleptici symptomati; hinc De la Hire hujas Plante Florem Catalepticum vocandum esse censet. Nam, autem hoc a. hæc Floris proprietas ex una parte pendere a summa pediculi flexibilitate simul, & aliter, quæ vergit diversum verum, ex altera verò parte a rigiditate sensili caupulæ, & cujus auxilio pediculus oritur: quare fit ut horizontaliter motus Floris de pediculi remanentem facili maxime motus obtemperet, atque ob suum elastum subjecti & resistentis de rigiditatem saltem, præmia adhibeat, quare fit ut si motus quo calcitravit, pefectis conferret, sed vero ex eo manifestum fit, quid eundem subito sustinente, Floris diversum datur hæret, ac vi propria statim resistentiam aliquam faciat non facile elevatur.

Nervus, cuius Filamenta tunc in Membranam expaſa, nunc in Capitula papillaria ſunt conglobata, reliquis partibus ſcilicet certum ſilem, cumque rarum, habentibus.

C A P U T I.

De Viſus Leſionibus.

Omnis ſenſus Externi quatuor numero recte comprehenduntur, quos inter eminet Viſus, nobiliſſimus præ omnibus reliquis, cuius Obſectum eſt Lux, primariò Solis & Igneis, & inde diffuſum in orbem Lumen, quod nihil aliud eſt, quam Igneis rarefactus. Lumen tunc vel immedie aut in recta linea, vel mediata, mediante nempe, à Corporis oſculi ſuperficie, Reflexione tali, tranſit per tunicam oculi Corneam & Humorem Cryſtallinum, donec impingat in Tunicam Retinam ſeu expansionem filamentorum Nervi Optici, ubi talem facit Motionem ſeu Impreſſionem, quæ ad Cerebrum ulque continuata à nobis dicitur Viſus.

Eſt ſcilicet Oculis reverà camera obſcura opticoſcopi in quo Humor cryſtallinus eſt vitrum lenticulari, in quo ut plurimum ſeri ſolet decuſatio Radiorum luminioſorum, donec impingat in tunicam Retinam, ubi obſectum Externum exactiſſimè, inverſio licet ſita, repræſentatur, & prout hi laeſionibus Anguli majores vel minores, etiam Res viſa major vel minor in Tunica Retina depiçitur, & conſequenter ita iudicatur.

Quæcumque ratiõne Radii luminioſi ad Oculum deveniant, pro Mediis, per quod tranſeunt, diverſitate, vel variis vel ſiſteriori, refringuntur diverſimode, unde Res non præciſe in eo loco, in quo revera exiſtit, apparet; nam Radii tranſeundo ex Medio rariori in denſius, ac Aere in Aquam refringuntur ad perpendicularem, tranſeundo verò ex denſiori in rariore, ex Aquæ in Aerem, refringuntur à perpendiculari.

Quod ſi Radii iſti luminioſi, qui ſunt ſubtiliſſima & tenuiſſima quorundam Materia, ſub ſua in orbem diſſuſione impingant in Corpora Opaca, reſiſtunt propter denegatum tranſeunt, plũs minũs exacte ad eos Angulos, ad quos incident, ita ut Incidentie & Reflexionis Anguli perpetuo ſint æquales: id quod in omnibus Speculis Concavis manifeſtum eſt; quando ex Radiorum reflexorum in uno puncto concurſu ſeu Cœſione emergit.

Corpus Opacum, à quo refractantur Radii, eſt vel Piliſum vel ex particularum in ſuperficie inæquali ſitu Alſum: unde Radios eodem ſerè modo atque incident reflectit, & ſe tale Corpus ſecundariò quali Luminioſum, ſolens dicitur Hoc veri Radios intra illas inæqualitates ſuperſiei ſeu porulos & meatus plũs minũs partim abſcondit, & ita cum Umbra miſcet, partim vero certa ratiõne, plũs minũs ſæpe, à primitiva figura mutatur, ad oculum reflectit; unde ſaliter modificatur Lumen Color dicitur.

Ita ut Color nihil aliud ſit, quam Luminis per corporis Opaci diverſa in ſuperficie tractura Modificatio & modificata ad oculum reflexio; Unde Colores ac Luce & umbra oriſi non inepte dicuntur. Hinc prout teſtura particularum Concreti mutatur impimur per ſolutiones & Præcipitationes, immutatur Colores; dum v. gr. Solutio Vitrali perſpicua, cum Decoctione Gallarum tantillum flavente permixta, Argentamentum conſtituit: de qua Colorum geneſi vid. BOY. LE Tr. de Coloribus. (A)

Viſus hiſi ladiur quætur Modi.

I. Quando penitus abſolet, ut in Carione; aut
II. Quando ſaltem immutatur, ut in Viſus habitudine varia, quæ propriè eſt, quando obſecta remota obſcure, aut Obſecta minuta, licet propinqua, diſſiciliter, & noſſim magna etiam obſecta, in diſtancia non adeo remota, clare diſtinctè cernuntur.

Quo etiam pertinet Nyctalepia, id eſt illud vitium, quando homines interdu rectè, velſepi parum, nocturnitatem accenſis candelis nihil videre poſſunt.

Vitia hæc abſolvi aut immutari Viſus ſunt, quando unum alterumve illorum requiſitorum ad Viſum rectè peragendum plũs minũs deſicit. Ad naturale autem viſus exercitiũ necesse eſt:

- (1) Ut Radii poſſint rectè per Foramen Pupillæ & per Corneam tranſire, adeoque Pupilla patet.
- (2) Ut iſta Cornea, pupilla Foramen obducens, ſitã perſpicua & exactiſſimè tranſduſiva ſit.
- (3) Ut poſt hæc tres Humores Oculi reliqui, ſpecialiter Cryſtallinus, in quo fit Specierum decuſatio, iſtis ſit pari, deſectis, & abique ullo Excremento heterogeneo perſpicui & pari.
- (4) Ut expaſio Nervi optici, Tunicam retinam efformans, tenſa, ſentier expaſa, ac à ſpiritus Animalibus debite impregnata ſit, quæ vel leniſſimo Luminis, aut puri, ut colorati, impulſu moveri, & ſic per Spirituum Animalium Motum ſignificati Viſo fieri queat.

III. Depreſſatur Viſus, idque variè.

- (1) Quando Res vel denſior, vel ſiſterior, quam eſt; ſicem Res una apparet duplex: id quod ſit ex diverſo Pupillæ ſitu, & ex diverſo ſitu Humoris cryſtallini; quando nempe v. g. in iis, qui ſtabiliſſimo laborant: in quibus Res omnis apparet geminata propter diverſam pupillam: ſiquidem hic mutantur planè Oculi, quibus mutari etiam Ares viſivi moventur: ſic etiam ſit propter diverſum ſitum Humoris Cryſtallini, ſi in uno loco magis ſuperiora verſus, in altero verſus inferiora & ſimiliter pergit, Viſus geminatur, & Res geminata apparet. (B)
- (2) Quando res integra diſtincta apparet, ex Re extranea diſimulim pupillæ occupante.
- (3) Quando res videtur perforata, dum pupilla à Materia opata in aliquo ſuo loco obſcuratur, ſeu quando Tunica Cornea à Materia heterogenea inſerulatur; ut Foramen pupillæ non ubique in Circulo ſit pervium & perſpicuum: Unde in quocumque loco eſt impedimentum, vitium in obſculo iudicatur: ſic ſi eſt in medio, Res in medio perforata apparet; ſi in ſuperiori vel inferiore pupillæ regione, Res altera ſua parte truncata videtur: ſi per medium ſui ſit obſtela, Res diſimulata apparet.
- (4) Depreſſatur Viſus, quando Res videtur apparere, quæ non ſunt; v. g. quando Splendores, Coruſcationes & Scintillationes Latentes, HIPPOCRATI verò Marmarige (C) diſta, ante Oculos velſepi videntur: item quando flocculi, Miſcæ, Filamenta, Fellucæ, Pulſiculi & ſimilia ante Oculos verſantur.

Præter ſit ex motu Convulſivo inſigni Fibrarum Tunicæ Retinæ præternaturali, ſimili illi Motui, in quem citatur ab Obſectis Externis & Radii viſivi propter ſimilem quoniam Motum internè excitatam, ſit idem iudicium quali tales

(A) Multa hic eſſent addenda & emendanda quæ à Authoris de Viſione hypotheſim, naturam Colorum &c. ſed cenſuimus minimis ne ad Diſperſionem & Opacum nimium divergere viſum, præſtigi quæ abſolutiſſime ad Membr. 1. Capituli 8. part. 1. Inſeruit. Med. Tom. 1. col. 138. & ſeqq. lit. M. N. &c.

(B) Duplex apparet obſectum non quod ſimpliciter eſt, quando duplex illius imago in Glauſula Pincalli ſuperficie deſcribitur: quod quidem accide, non nam ex diverſo Pupillæ ſitu, vel ex diverſo poſitu Humoris Cryſtallini, ſed poſitæ ex mutata & præſuſa diſtincti ſeu utriuſque vel alterutrius Nervi Optici, ita ut eorundem interna capitula non ad eandem Glauſula Pincalli puncta diſtinguntur, ad unicam ibidem eſſormandam imaginem: quod parer faciliſſimo experiri-mo; ſi enim digito Oculum unum comprimeamus, illius unum obſectum geminum exortit. Irregulari verò aſſecti ex ratiõne, vel natura vel morbo, Oculi diſſerit ſunt, ut quævis interturbis nobis illorum Oculi non altero ſuum minima obſistere videntur; ætatem illorum Nervi Optici, quæ parte Glauſula Pincalli reſpiciunt ita apud diſſerit ſunt, ut ad unicam eſſormandam in illius ſuperficie i. imaginem exactè concurreant. Quare ſit ut Irregulari nequaquam obſecta videntur geminata, ſed unica: imò ſi diſſerit Irregulari Oculum menta extrinſeca ad reſectum & æqualem cum altero ſuum compellere vellet, tunc geminatur obſectum, quod diſſerit, Irregulari Oculis conſequitur, unicam apparet.

(C) Marmarige Μαρμαρυγή, Splendores, coruſcationes, & purpurae, rutilo, reſplendens, Scintillæ, Luminis ante Oculos obſerjare videntur, ſi in tendib præſentim conſtituti iſti conſcribimus: quod ex ſentis præſentim etiam accide, quædamque obſerjamus. Argumentum ſunt, quæ ſunt de Luminis hypotheſim confirmat Deſ-Cartes: nam nempe, illi ſenſum excitari poſſit ſola ſentis Oculi comprimeſſione, arguit Luminis naturam in ſola cenata globulorum ſentis ſentis conſiſtere poſſe.

les Colores ante Oculos versentur. *Defectus* vitium est, in Huiusmodi Aquæ, in qua collocat sunt quedam Sordēs nempe in variis figuris extrinsece, faciunt ut talia Objecta videantur ante Oculos versari, & solent esse propterea lussu- biles talia filamenta.

Pertinet huc duplex illa *visus læsio*.

(1) Quando *Objecta remota optinē*, proxima vix vel om- nino non, vel diffusiim videntur, & vocatur *senum visio* (D). Fit quando Crystallinus Humor post- riora versus propius ad Tunicam Retinam recedit quod interdum Scurbus quidamvis, item Literarum accidet. Hinc

(2) Contrarium vitium est, quando interdum *propinqua* seu potius admodum, etiam minutissima, *amē & be- nē* videntur, paulo remota vix difficiliter, aut plane non, qui affectus vocatur *Myopia*. (E) Fit quando hu- mor Crystallinus magis anteriora versus tendit, & magis in anterioribus Radiorum visuum fit inter- sectio.

IV. Denique vitatur Visio, quando eadem quasi vide- tur *nugari*: quod fit, quando Objecta etiam naturaliter con- sistentia, vel nimis *ultrata*, & nimis *splendida ac lucida* appa- rent, ita ut Visus omnibus quasi namque gradum tribuat, & obiectum Visus intensius reddatur: unde veri solet, ut talis Visio non absque molestia aut dolore & Oculorum læ- sione percipiatur; verbi gratia, quando Oculos inflammatio- nem laborat, aut quando oculi ex percussione nonnihil læsi- unt; tunc enim levis Candela splendor inflat Lumi- nis Solis intensus ac nimis lucidus apparet. Causa est: quando partes Oculorum membranæ sunt nonnihil læsæ, ex quacunque fiat causa, in specie Tunica Retina, unde facta Irritatione fit admodum mobilis: hinc etiam ordinaria Objecta impingentia in Tunicam Retinam, eandem nimis movent, & sic ex Impellente tunc fortiore graduata, Ob- jecta nimis colorata, aut quasi splendida apparent.

Pertinet huc illa affectus, quando quidem *nulla permittit*, quorum quedam legatur exempla, ut ut talis Visio nocturna non fit continua, sed tantum, quando evigilant, vi- dent, quod tamen Visus acumeo pedetentim immittitur & tollitur.

Hæc in genere de Visus læsionibus: In specie jam confide- ramus *Affectiones Oculorum* frequentiores, & quidem eo or- dine, quo Radii visivi, à quibus primariè dependet Visio, Oculi Membranas & humores trajecere solent.

ARTICULUS I.

De Visu abolito.

MEMBRUM I.

De Impedito Radiorum Visualium per Papillam ingressu.

PUNCTUM I.

De Palpebrarum Paralyti.

UT ergo distam ordinem observemus, necesse est prius ut Oculi Palpebræ parent, adeoque Oculi ap- erti sit. Vitatur hoc in *Paralyti Palpebrarum* undecumque nata, quæ, dum attolli oqueunt, Oculum obstruat clau- duat.

CURA.

In hoc casu convenit Emplastrum ex Tacamahaca, & Carana in regione Frontis infima applicatum; vel Oleum diffusillatum Taracti nigrum cum pauca Cera in forma Em- plastrum admisceatur. Conf. M. A. N. C. *Ann. & Observat.* sto. pag. 298. Vel imitemur ZACUTUM LUSITANUM lib. 1. *Prax. adm. Observat.* 36. cui in Paralyti Palpe-

bræ post multa frustra tentata ex usu fuit unguentum ex balsamo Peruviano, cum Aqua Vitæ commistum.

PUNCTUM II.

De Ungue seu Panno Oculi.

INGRESSUS Radiorum per papillam Impeditur propter *con- vas perspicuitatem* albam: quod fit in specie ob Tunica quodam præternaturali, ab uso Oculi Angulo, & su- perius in Cantho maiore circa adum, frequentius nam- que ipsa succellivè accrescendo tandem ad papillam pervenit, & Corneam obtegit, quæ obtegit oculi scot- tra, forasque Pupillæ, foras clauditur, & nullus Radi- visus lumbis trahitur conceditur. Græci namque ita di- cunt *Unguis*, quasi ducere *visum aliam*, quoniam inflat Alæ obtegit papillam; Latini verbò *Ungula* seu *Unguis* aut *Pannus* appellatur (F).

Tunica hæc non semper uniformis exiit, sed habet suas *Differentias*, pene est *Plana*, tunc *Tunica*, & *albidus* circa solem & Lunam apparere solet, & propriè *Tunica* ap- pellatur & *Ungula*; interdum vero est *Crassus* & *Caruissus*, velut rubicundus Vascularum & Arteriarum nonnihil con- spersa, & tunc alio nomine dicitur *Pannus*, Germanis *in- fellter* dem *Ango* concupitur.

CAUSÆ.

Causa huius Tunicae est eadem cum reliquorum locorum Nervorum Excretionis in corpore; Nervæ enim putæ propriè saltem crescit & excrevit, quibus Sanguis portiones demum accrescit, quod in Chirurgia ad peculiare *Caput de excretionibus* pertinet. Præcedit nempe semper ali- qualis læsio Carnis illius, hoc est, *Glandula in tali Angulo sita*, una cum aliquis læsione Membrane adnata illius in- tali quidem, ut dissolvatur continuas carnis in illi An- gulo, unde succellivè membræ dictæ accrescit. *Movetur* hic: quando in ophthalmia, v. g. Variolis seu aliis simili- bus nocentibus, Læcyne salino acido aut aceto Carum in Angulo maiore inter nonnihil attotum, huiusque simul Membrane Oculi adnatae lædunt, occasione subitissi- me saltem talis erosione, Nutrimetorum Glandulae illius in Angulo maiore, & impemissimum nutrimentum illud membra- ne Adnatæ proprium, utrumque chylosum, per poros, ubi fit subtilissima corrosio, dum eo implet à Tono Fi- brarum lasarum coercetur, succellivè utroque & foras emanat, secundum Membrane læsæ determinationem à illius Spiritu soluto pariter in Concretum ejusmodi mem- braneum coagulatur & ita succellivè augetur, & juxta- oculi extensionem, ubicumque spatium inveniret se applicat, & ita continuo augmento in totum accrescit, donec inter- ger Oculum obtegitur.

Prout igitur ratione Læfionis nutrimentum illarum pe- tium lasarum, & in Membranam coagulatum, nunc plus nunc minus degenerat à statu naturali, & Acido præternatu- rali imprægnatum est, etiam *Tunicarum diversitas* oritur, ut alia dicatur tunc *Simplis* & *Benigna* alia verbò *Maligna*, & plus minus *Cancerosa*. Hæc quidem, quando pannus est non- nihil lividus, nigricans & dolorosus: quinimò prout antecedit læsio membræ & glandula in Angulo maiore fuit major vel minor, ita ut etiam minutissima vascula sanguifera simul læsant, ut hinc & sanguis cum nutrimento transi- dens sese admisceat & suo motu Vascula nova atque nova ex- crescentibus, continuo efformet, & Vasis sanguiferis reple- tus Pannus hic generari solet *Bravus* verbò est, pannus est can- didus, clarus, remaneat aded crassus & indolens: quando enim est omnis crassa alpeza, obscura & dolorosa, tunc talis pannus est *Cancerosus*.

DIAGNOSIS.

Quod attinet *signa*: Malum hoc per se Oculis patet. Con- ditiones Unguis vel tunice Adnatæ eius naturam repre- sentant. Tunica enim alba, indolens & tenuis, est natura- lissima; si vero sit crassa, dura, nigricans & nonnihil do- lorosa, Unguis est periculosus, nempe Cancerosus, prout

Ne-

(D) *Quasi* tum II. *in* *Frontis* Presbytia *Marbus* hic appellatur, à *probo*, senex: quod scilicet Senes afficiat.

(E) *Mutatio*, *Myopia*, à *Myo*, lusciosus: quasi dicitur *visus* *mutatus*, seu *mutatus*, claudens Oculos: *Myopes* enim dicuntur, qui in distantiis Objecta invenerunt, illa quæ proximè Oculis semper appropinquaverunt.

(F) *Propriè* hoc nomen dicitur *Oonyx*, à *onyx*, quod propriè Unguem significat. Galeas Oxylos nomen appellat quo- que collectionem Paris Unguis figuram referentem, in negro Oculi, cum inflammatione, juxta *Tridens*.

Nutrimentum fuerit magis vel minus corruptum.

P R O G N O S I S.

Quoad *Prognosis*: Unguis hic aggravescens, Pupillam obtegendo, tandem *Criatam* infert. Malum recens uti facili Medicamentis curatur, ita *Inveteratum* difficulter, & via sine Chirurgio potest removeri: neque hoc fit facili, quia nimis pertinaciter adhæret.

Si *Tunica* est *Causarum*, non attingenda, ne exasperetur, quia curato minore Malo, majus succedit, & subinde in Cancrum exulceratum degenerat.

Si enim Panno incipiente observetur, quod simul addit principium quoddam *sephalim* in Oculo, uti fit post *Variolas*, *Tunica* hæc non attingatur, sublato enim Ungue Sulfuris citius perficitur.

C U R A.

Ante *Curam* specialem, in genere, quæ in *Oculorum* *Cvariis*bus observanda sunt, præmittam.

I. Oculi, eam partes sint perquam sensibiles, adeoque facili irritabiles, ac texturæ admodum delicate, minimè fortis, sed levis, ac quantum possibile, *Temperata*, minisque acris ferunt remedia. Conf. FORESIUS lib. 2. Obs. 17. in *fol.*

II. Inter Interna Ophthalmica in Oculorum Affectibus felicissimè exhibetur *Droctum Safforis*: *linga enim experientia didici plurimum sacra in Oculorum Malis à Causa frigida & humida proveniuntur*, dicit FERDINANDUS NISER. 51. Hinc *frigiditas*, & omnis inde parata, item *Exophthalmia*, ac similis interitè conducunt. Facit hæc *Visum* Ophthalmicam egregium descriptum in M. A. N. C. Ann. 6. App. pag. 71.

III. *Visum* aliis in Oculorum Morbis non semper æquè convenit, præsertim si cum Phlogosi aut Lacrymarum acrim inflatu juncti sint, aut ab acrimonia Humorum ortu ducunt: interdum tamen, ubi opus est diffinitione, resolutione & attenuatione accuberi potest. Conf. BORELIUS Com. 1. Obs. 73.

IV. *Trigida* nimis Oculis admodum iisdem perquam nociva sunt; sentiantur *seruida* & *calida* nimis admodum, iisdem ferre nimis possunt. *Temperata* ergo & *Tepida* ut plurimum sint, præ oculis admoveo veniunt.

V. Ex *acidulorum* usû oculi præstè laedi videntur, cùm tamen foetummodo repurgentur, & consilium clarescant. Scio equidem quoddam ex *Acidulorum* Potu quasi occaecos fuisse, qui tamen secunda vel tertia die longè, quam antea habebant, clariorum lucidiorumque Visum sunt adepti: protruduntur nempe ex oculis *Fæces* & *Purulentia* quedam per Angulum Lacrymalem. Conf. MINDERERUS de *Vitriolo* cap. 11.

VI. *Atrialia* ergo & his cognata sunt optima Remedia, ac oculis imprimis proficua: hinc *Aque* ex Cancris tantillum putrescentibus destillate, item *Aque* Ophthalmicæ *Myrsinæ* ex Cancris & Chelidonio majori. Facit hæc polychæthos Liquor, nempe ex Floribus Cyani aut Cichorii per deliquium in Furno pistorio paratus (vid. SENNERIUS & HARTMANNUS) in quamplurimis oculorum affectibus convenit: item *Sperma Ranzarum*, de quo & exinde paratis *Aquis* Ophthalmicis vid. M. A. N. C. Ann. 6. App. pag. 83. Hinc ablatis oculorum cum Loeio proprio maritino multum iisdem conferre solet: Conf. BARTHO-LINI *Alia Med. Hist.* Vol. 2. pag. 253. Item *Phlegma* ex Urinæ & *Vitrioli* destillatione in *Aqua* Epileptica *Quercetani*, item *Phlegma* spiritus Urinæ per putrefactionem parati, egregia sunt; Unde etiam *Aqua Stercoris humani* destillata ad oculorum affectus multum est commendata: Hinc QUERCETANUS magnificat sequentem *Aquam*:

℞. Urinæ Puræ.
Vitrioli albi.
Talis ana ℞v.
Succ. Chelid. ℞iij.

Stent in digestionem per aliquot dies & noctes, postea destillentur & asserventur.

Tutius tamen frustraneam additionem arbitror.

℞. Rad. Chelidon. maj.
Falerian. ana ℞i.
Herb. Ruta.
Sider. mont.
Euphras. ana M.ij.

Tom. II.

Sem. Anis.
Fenic.
Lupul. ana ℞iij.
Flor. Calend.
Roser.
Borrag.

Confol. mal. an. M. iv.

Cancer. Rav. No. xv.

Omnia incide minutissime, & superfunde

Phlegm. Vitrioli.

Succ. Chelid. an. q. f.

Digerantur per mensem: postea destillentur, & in Alembico ponantur

Camp. ℞i.

Liquor prolatus dividatur in duas partes æquales: Una pars per se asservetur: alteri parti infundantur

Croci metall. ℞iij.

Stent ita per duas horas, postea filtretur, & reservetur usui.

Aqua Ocularis HARTMANNO familiaris fuit talis:

℞. Aqua fenic.

Anis ana ℞i.

In quibus solve

Vitrioli albi purif. ℞℞.

Ac postea Rad. Enula Campana pulverisatam cum iisdem digere: tandem colatura in Vitro mundo servetur.

Valeat ad Unguem, Albuginem, Cicatricem, Maculam, item ad Rubedinem & Caliginem & quamplurima oculorum vicia. Vel

℞. Aqua Ros. Calistr.

Cisal.

Seleni ana ℞i.

Vitrioli albi ℞℞. ad gr. xij.

Solutio filtretur per chartam: adde

Tutia præp. ℞℞.

Applicetur tepidè cum Linteo, vel infillitur Cautus, est optimum in Ophthalmia.

Estat etiam in THONERI Obs. pag. 116. Ad unc. i. *Aqua* sufficienti *Vitrioli* gr. iij.

Denique remedium pro affectibus oculorum *insuperabile* vocatur LINDANO *Mistura* ista, quam habet HARTMANNUS *Prax. Chimiæ*. c. 43. §. 3. pag. 304. quæ se in quamplurimis oculorum affectibus cum felicissimo successu ulum fuisse, refert.

VII. Optimus *strandi* *Medus* hujusmodi Collyriis Humidis est ille, ut *Ager* vel in dorso decumbat, vel stans aut sedens Caput probe retineat, ut utroque oculis perpendiculariter Caelum versus tendat, & ita guttas liquor aliquoties in die infillatur in Cautum oculi majorem; hinc oculus tegatur, ut ita liquor undique per oculi peripheriam externam diffundi queat; sic enim paucæ guttule plus commodi habebunt ac bins tali applicatione, quam si decies diachma una Corpore tracto oculi italem adstringantur.

VIII. In quibusvis verò oculorum vitiis *phlegmatica* & *fungosa*, sunt optimi: *Vesicatoria* quidem in Nucha aut post Aures in Morbis recentibus adhuc increscentibus sunt optima: Fomentis verò in Collo & hinc in Brachio ad eodem inveteratos, & jam in statu perfectio constitutos, admodum proficui observantur: sicut etiam moderatus *Erzhi* *nam* usus iisdem multum conferre solet. Conf. BARTHO-LINI *Alia Med. Hist.* Vol. 2. pag. 64. & Vol. 3. pag. 21.

In specie autem in *Unguis Oculi* Cura *Tunica* hæc præternaturalis ante omnia est removenda, aut *Medicamentis Absorptivis* & subtilis acrimonia blandè erodentibus & resolutivis, aut *opere Manuum* chirurgicis incessivè cum *Acu* detrahatur, vel cum Instrumento lepaetur. Hinc remota *Tunica*, blandè *Adstringentibus* Fibra ac hinc Poruli circa radicem Partis læsæ claudendi & firmandi sunt, ne revertatur deusd Malum.

Pro his ergo Scopis obtinendis, præ removendo hæc *Unguis* conveniunt Saccharum candum, Mel, Os Sepis, Cornu Cervi usum, Testa Ovorum calcinatis, aut Testa in Aceto acerrimo solum, siccatæ, & in subtilissimum Pulverem redactæ, qui Pulveres Oculis inspergantur, & similia blandè abstergentia subtiliter erodentia & detergentia *Unguenta*, item *Calcaria* extrinsecus applicanda, quæ inter ultatæ est *Aqua Ophthalmica Quercetani* blandè detergens;

℞. Aqua Euphras.

Chelidon. maj.

Fenic. ana unc. i.

Ppp

Cvss

Croci Metaller. vel Flori Antimonii (quorum loco etiam optime *Sulphur Antimonii* recipi potest) ℞.

Stent per aliquot septimanas in loco calido; filtratur. & usurpetur.

Esperata est in Ungue non adeo inveterato, & calide infillitur: Frigida enim maxime oculis nocent.

Vel

℞. *Antimonii pulvis.* ℞. ad gr. xv.

incunde in
Aqua Flor. Cyani,
Sulphur.

Panis. ana ℞.

Sicut in loco calido per noctem, mane filtra, & adde

Camp. gr. vi.

M. S.
Collyrium.

Hujus aliquot guttæ infundendæ sunt oculo, Aegro supinatus iaceat, & hoc interdum repetendum, prout opus fuerit. His si addatur simul parum Camphoræ & Croci, ut melius penetret, conveniunt etiam in Suffusione sive Cataracta:

℞. *Salis Gemm.* ℞.

dissolve in

Aqua Rosar.

Panis. ana ℞.

M. pro Collyrio.

D. S. ut antè.

Quo attingatur Pannus cum Penna, vel gutta una vel altera immittatur in Oculum super Unguentum, in specie conveniunt *sella piscium*, *Spermatum* sive Mustela & Lucii piscis, huiusque *Aqua distillata*, item hujus *Essentia*, mirè conveniunt in resolvenda hac tunica, in extirpato Oculi adnata. Preparandi modum videb. in SENNERTO *Pr. lib. 1. tit. de Visu Oculorum* p. 296. item in HARTMANNI *Praxi Oculi* cap. 19. pag. 99.

Vel in hujus deciectione, dum non semper potest esse ad manum,

℞. *Aqua Lucei bullit* vel *Sperm. Rinar.* ℞. ad ℞i.

Sell. Lucii pisc. ℞.

Mista stent in loco calido per noctem, mane filtrantur, & ita iollat Collyria applicantur.

D. S.

Aqua singularis.

Loco huius Fellicis Lucii Secretum BURRI in his casibus est *Sal humanum* destillatum ex Cœcubita vitrea humili per Alembicum æneum seu copreum, uti videre potest in *op. 2. tit. ad BARTHOLINUM de Numeribus Oculorum* p. 35. Alias ex *Stemora Anserum* juniorum, mense Aprilis collecto, etiam Aqua per Alembicum destillatur egregia, quæ olim dicitur fuisse oblata *Maximiliano Imperatori* ad obducitatem Visus, Tuolica Oculorum detergendas & alia Oculorum vitia, imprimis si superficies Oculi post Variolas laesa sit. Si perniciosa fuerit Paones, ad *Aquam Sapphorum Chirurgorum* progredendum, quam videbitis descriptam in SCHROEDERI *Part. 2. Pharmacop.* cap. 19. de *Aquis*, mox post *Aqua destillatas*, num. 3. pag. 157. Nempe

℞. *Yas Marum*

cui iohicetur

Aqua Calis vitæ cum Aqua Calcar. ℞. ℞.

Sal. Ammoniac. ℞.

Requantur donec coloretur.

Vel exemptorè recipi potest *Aqua Pansolvi* vel *Chelidoni majoris*, & in ea solvi *Sal. Ammoniaci* tantillum, ut moderatissime Linguam feriat, infundendo in *Perleto antea*, donec coloretur, sic variè dilui, & ita cum acrimonia pro lubitu infringi potest: filtratur & sic Oculis iofillitur, Operum est in detergendo Ungue, Albugine, Maculis & Variolis relictis, & Uiceribus Oculorum. Conf. TACHENIUS *Hesper. Chir. Edit. 2. pag. 11.* item RIVERIUS *Centur. 3. Obs. 45.* item *Collegium in Schroederi Pharmacop.* *Part. 2. Mem. Formalar. Class. 4. §. 19.* Ulterius de Chelidonio majori nota est eiusdem egregia vis ophthalmica, unde ipse succus ejus expressus, dilutus cum *Rore Fœniculi* infundente, & maturino tempore collecto, vel cum Aqua Euphrasii aut alia appropriata, præstant est Collyrium, quod absumit Tunica & Pannos Oculorum, illius aut infillitur.

Præter distillationem *Pulveris* quidam in forma fices Oculis infundunt, aut diluti cum Aqua, applicari possunt. *Virioli* autem etiam est egregium, quod laudet POTERIUS,

Imprimis observata digna est ejus Curatio Unguis Oculi post gravem Ophthalmiam relictis, *lib. 2. cap. 2.* contra inflammationem & Dolorem.

℞. *Virioli* Cypr. ℞.

Talis præpar.

Sarch. candi.

Callyr. albi Rosar. an. ℞.

Camp. gr. vi.

Aqua Rosar.

Flor. Euphras.

Rosar. ana ℞.

Misc. pro Collyrio:

Quo Inflammatio & Inlatus curata fuit. Hinc pro Unguis, tunc apparente, removenda:

℞. *Off. sapia* ℞.

Sarch. candi ℞.

Virioli alb. ℞.

Talis præp. ℞.

Misc. in forma Pulveris subtilissimi, qui vocatur Suet:

D.

Pulvis ad Oculos.

Inspergendus vel potius iofundendus in Oculum, applicando deluper Linteum Aquæ Florum Cyani vel Chelidoni majoris imbutum, & Pulvere hoc, quem ex POTERIO suppressio Anthoris nomine abdidit RIVERIUS *Pr. lib. 2. cap. 12. pag. 114.* optime detestit Unguam, eamque absumptis;

Vel adde huic Pulveri:

Aqua Chelidon.

Calcar. ana ℞.

Misc. prodest & agita.

D. S.

Collyrium.

Beneficio cuius Unguis Oculi aliquando perficitur sit curatus.

℞. *Virioli albi* ℞.

Aqua Rosar. vel Chelid. maj.

Euphras. ana ℞.

M. S. ut suprà.

Ad Peller Oculorum, pro Pueris in specie, convenit pondus Vitrioli, quod est augendum vel minuendum pro maturantia Aegri. Sanè Vitriolum album alius periculum blandè detergit, & Excrecentias illas præternaturales absumit.

Facit huc Collyrium LOTICHI in *op. pag. 107.* quo Unguentum fœ Pannum secundum Lunæ matrem tunc decrefcentem nunc decrefcentem delerit:

℞. *Aqua Rosar.*

Euphras.

Panial. ana q. v.

In distis Aquis misce sequentem Pulverem, quæ Milla cum Plasma Tunica: illatur, cavendo Pupillam, ut acrimonia Vitrioli tandem exasperet:

℞. *Lap. Hyematis.* ℞.

Virioli alb. leviter calc. gr. xv.

Stirra.

Croci ana gr. v.

Sarch. candi. ut ℞.

M. in forma Pulveris subtilissimi, cum Aqua superflua vel alia appropriata subigendi, & sic eam Plasma Pterygio illatur, cavendo Pupillam.

Facit hoc etiam Aqua Ophthalmica familiaris *Hartmanni*, utilis ad Ungues, Maculas & Albugines Oculorum, ad Cicatrices & similia vitia, quam super dedit.

Tandem aliis irritis in malo pertinaciter ad *Mercurium sublimatum* totò consuegendum est, imitando hoc in pundo PLEMPHIUM in *Ophthalmologia*, qui cœ Secretum mirabile & expectum in Puella, quæ per aliquot annos in Ungue Oculum fuerat cæca, laodat. Nempe

℞. *Mercurii Sublimati* gr. v. vi. usque ad ℞.

Dissolvatur in ℞ii. ad ℞. *Aquarum Ophthalmicarum*, c. g.

Aqua Rosar. vel Chelidon.

Euphras.

Frax. ana ℞. ad ℞.

Misce & filtra,

D. S.

Collyrium Chirificans.

Et de tali mixtura & solutione omni mane, item vespere, gutt i. vel ii. infundantur Oculo in loco Pano, donec removeatur, & sic *Præst.* absumitur Unguis: quin etiam curabatur hoc pacto suffusiones, *Gerem. de Scare*, de quibus postmodum.

De

De cetero, si aliqui est, qui confert ad delendas Occulorum Membras, et Tuum, ad *luc. form. Formam membrarum* Arborescens referunt habitumque, expellunt, qui per Pannum deparatus, et ita vel crudus, vel cum appropriatis dilutis Oculo infunditur; removere has Tui-
chis. Quo pertinent etiam RULANDI *de Agn. Ophthal-*
mici, mirabiles, quare una paratæ ex Formicis artificiali-
bus, et sitera Agna Ophthalmica ex infusione Viri Antimonii, quæ videt, in *op. Remed.* et sunt stupendæ in quibus-
damsæque Oculorum Vitiis.

Superius locus sum de Felle Lucii piscis: cu Experimentum commendatur omnia Zeta Lucii piscis cum Felle, Hepate & omnibus reliquis Visceribus, quae dissecta in minutas partes, adjectis M. i. Herba fennicula, opusquo Seminibus contusis, & conquassatis, & ita destillentur. Loquor, qui prodit, utilis est ad abstergendos Pannos & Oculorum Tunicas.

Quod si delicatius sit subiectum, aut sius Pueri hoc Ma-
lo correpti, qui non possunt ferre acrisulcus, & qui lacry-
mantur, aut Tunica sit recens, adeoque nondum invetera-
ta aut tenax, in tali casu sufficit Mel dilutum Pelvis enim, &
suppositis Carbonibus ignitis lenè calefiat Pelvis, donec
Mel lenem viriditatem contraxerit, corroditur sic Pelvis à
Melle.

Tunc ista Melle calido in loco Tunicis blandè illinatur
Oculus, donec deleatur Tunica. Fuit Experimentum FO-
RESTI lib. 1. c. 7. in febrili.

M E M B R U M I I

De Tunicæ Cornæ Vitæ.

HAecum de Sedibus Radiorum visualium ingressu per Pupillam, Sed praeiter hanc etiam evenit ispe, per *Cornu peripheria*, forasmi Pupillae obtenta, Vifum obfcurer, quando *trafficit* aut vitium *Colorem* contrabit: dum enim obfcuratur aut crafficit, Radios impedit; aut fi penetrat, omnia vitium Colorem repraeftantur. Et hoc imprimis in *Leucemate* vi *Ailagine*, quae est Macula alba in Corae, ubi quam Vifum leditur.

PUNCTUM I

De Nubecula, Albagine, & Sanguinatione.

C A U S Æ.

Vitium primum fit, quando in Nutritione Cornu peripicua vitata Alimentum chylosum, Serii tuberculi velliculi distributum, succellit nonnulli erallius & vicidius suggerit; hinc tollitur pituita & Pororum agnalis fit in Cornu, unde fit, ut accutata nonnulli Cornu argis omnia obfcurit & quali per Nubeculam appareant; imo li denfior fuerit hanc Cornu, planti Vilus perat; unde vitium hoc Latinis communiter *Nubecula Oculi* appellatur, propter quam impeditur Radiorum transitus.

Mium secundum fit, quando cicatrula ab aliqua Erosione vel Læsione consolida. Tuncque Corneæ, v. g. in Variolis, aut in ejus Ulciculis, aut post ejus Valsus, remanet. Talis enim cicatrula, non fecus ac alia cicatrino, cum cras-
sic fieri se spissior, minisque polita, quam reliqua Corneæ
pars, Albedinem repræsentat, quæ non rite permittit trans-
itus Radiorum visibulum, tuncque *Albugo* seu *Lencoma* spe-
cialiter appellatur. (G)

Vitium tertium fit, quando post idum vel Casum, item post Plagas Oculi illatas, vel similes injurias externas, laeduntur Vasa Oculorum, ex quibus effunditur sanguis, qui *offusus & conglobatus*, sive in albo Oculi fere Corona hæret, ita vitiales Colores, Cæruleum, Lividum & sanguineum inducit, Visusque impedimentum inserit: quod malum *sugillatio oculi* dicitur.

DIAGNOSIS.

Signa horum Malorum Oculis patent; Nam clarevis in-
Tom. II.

(G) Leucoma, *Leucom d. Albugi albus*: dicitur esse quod dactylum est: significat & album Ovi, & Albuginem Oculorum.

filis parvis cunjuliam Maculae albae apparere solet (tude etiam vocatur *Masala*): In *Albideria* vero cornua nonnihil albicans & (pissa cernitur: Ex in *fagillariae* Color Cerruleus, Lividus, &c. etiam fonte patet.

Causæ Antecedentes, nempe Contusiones, Plagæ, &c. ex relatione eorum patet.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis: Vicia hæc Cornem per se patens, &c., in specie *elearia*, difficillima sunt curatu, propter lumenam subtilitatem, simulque exquisitissimum sensum Cornem oculi Tunice, idque eo magis, quod crassior vel magis inveterata fuerit vel *Nubosa* vel *elearia*.

Sagittalis vero, nisi sit nimia, facillè removeri potest. In pueris tenellis, modè tractabiles sunt, facillè potest abstergi. Macula, & ipsa tenuis, quàm in ætate consistente, ubi ipsius & contumacia esse solet.

Pili Variolae, oculos infantes, imprimis observetur, ut insequens Macula vel cicatricula cito amoveatur, utroque in perfectam abeat pueritiam.

C U R A.

In *Cura Nobiliori* Materia crassa, inquinata perspicuitatem Tunicæ Corneæ, attenuanda, & discutienda ante removenda: *Leucomatis* Macula & eiarriens abstergenda & detergenda. In *Fungulis* lingua congruata revolvenda & discutienda. Propterea in duobus prioribus conveniant subtilia nonnihil acra & fortius penetrantia; mitiora, quidem in Nubecula, flectoria in cicatrice.

Pro Nubecula ergo & cicatrice delenda conveniens frequenter remedia: *femen Herminii* *Hyssopus scilicet*, Germani *Sebanthi*, in incipiente Nubecula tempore solum utitur, ut in incipiente purgare oculum a foliis, etoque abstergeri, & makuam Nubecula & Albogem. Quia conducit & *Uva* de *Monte RIVERIUS* in *Pedi*, et etiam *Uvae*. Unde etiam ad *Fagum* oculum, & hanc *femina* & *Folia* adhiberi solent a *POTERIO*, qui etiam *Folia* *Hormiatii* *Glycyrris* in oculorum Fumento, perhibet. Efficacia huius ratione est, quod hanc femina compulsum a *Lymphe*, oculus continuo humectat, & extrahit in *Mucosum*, quo itum effusum abstergendum *Albuginis* praestat. Aqua *Fellis* bubali deffiliata cicatrices oculorum delet. Aqua ophthalmica *Imperatoria* *Maximiliani*, & *Reveretani*, necnon *Fel* *Laici* *piscis*, perdis, *Bovis*, &c. cum *Aqua* *permatia* *Ranarum* temperamus, vel coram Aqua deffiliata, item *Efficacia*. *FORESTUS* in *lib. vi. differe. sc.* habet *Exemplum* pueri, qui es *Variolis* incidit in pupillam oculum, quo pupilla tandem fuerat extraxit, & erinde oborta est *Nubela* oculorum. Hinc noviss *secessu* colluvium

viand, 荤菜.

will. 3d. ad.

*Sarc. candi pulveri. ſubi. ʒi.
M. ſtat in loco calido per noctem.
D. ʒ.
Collyrium.*

*Spiritus Urine cum Vitriolo deſtillatus egregius eſt
Conuect etiam ſuccus Euphoras ſui Funiculi recens ex-
ſtratus, cui ſantillon Baliaſi peruviani admiſtum ſit; po-
terenter enim Albuginem diſcutit, ſuper blandè oculis illi-
tus: vid. RIVERſII Pract. ill. u. cap. 7. Vel locus hujuſ
magis penetrat & deterget Liqueor Funiculi ſaccharatus, qui
collygiunt ex ſaccharo. Candibus Funiculi excavatis indito
et reſiſto, ut liqueſcat: vid. ſuprà, ubi de epithelima ſeu Ze-
ſamæ. oculis. Liqueor hic et egregium remedium ad hu-
juſmodi externos coram deſectus delendos; Vel recipiatur
ſuccus Funiculi per ſcientiam nonnulli depravat, & ad ſtar-
tut ſaccharum ſimile; ſe magis appropriatum reddidit
Remedium ad diſtam hebetudinem corneæ, & cicatricu-
lam.*

Præ reliquis optimum specificum æt Liqueor oleosus ex Hepate Mullæm piscis in Maiore viori saltem palpebris illitus, acris enim admodum & penetrans essit: vid. HARTMANNUS *Prax. Chym.* penult. p. 27. pag. 98. & SENNER-TUS *Pr. lib. 1. Part. 1. sect. 2. cap. 36.*

In graviore verb Malo, in specie, electricula magis tensa, etiam cum penna subtilissime potest illuiri, quod etiam Unguibus, item suffusioni, conveniens admodum existit.

Pppp • oleum

Oleum Papiri, aut panis seu Linteum combustum, cum penna subtilissimo Oculo ditum loco Cicatricum, est optimum Remedium. Ubi validius agendum est, recipitur Aqua Mellis vel simplex, & quidem prima, aut secunda cum semina flava; vel Compota Ammi Lasciani. Simplicem quod attinet: Mel destillatum de primo Aquamillam, secundo flavam: Prima est optima, secunda acris: In incipiente Macula prima est optima, in graviore fumatur secunda: vid. SCHROEDERI *pharmaz. ubi de Mellis* cum Penna ista ad delendos Maculas & Cicatrices Oculorum est commendata. Hinc etiam convenit Aqua Mellis Compota a FONSECA *Tom. 2. cap. 1. rufi. 55.* & AMATO LUSITANO *antroz. 3. cor. 53. ubi Nubeculam gravatam dicitur.*

℞. Pulvis sem. Bil.

Succini, & Flor. farnas.

Expulsa.

Funicul. an. M℞.

Succ. cand. ℞i.

Destillantur in Balneo Marie igne fortiori: nihil.

Liquor prodens ad Oculum Nubeculam & cicatricem ipsi AMATO LUSITANO per Experimentum comprobatus est. Mel enim ablegit & resolvit Leucomata, præsertim si miscetur cum succo chelidonii majoris extracti; & ita blande illinitur. Succus Anagallidis Floræ ceruleæ, imprimis Florum ejus, expressus: item succus Chelidonii majoris expressus, vel solus Oculo instillatur, vel cum Mellis Rosaceo missus & applicatus, tollit Maculas; unde & hic commendatus fuit Aqua Anagallidis ceruleæ destillata, non minus quam Aqua Lencis bulbosæ destillata; sicut etiam integra Herba est singularis Ophthalmica: qui succus illatus egregie confert, quævis morbo: si discerpitur caule, Lique intus flavescere transiunt: ubi caule attingenda est moderata Nubecula vel Cicatrice. Sic dilute succus a Lactymis supervenientibus; & tandem deleatur Nubecula & cicatrice. Vel Felis Animsium cum Melle modico subacta, eisdem Litis forma Oculis applicatur: Vid. HARTMANNUS *Pr. Chymicæ. cap. 37. & rufi. Med. Nat. rar. ann. 2. observ. 126. pag. 108.* de Felis serpentum. Loco succi chelidonii succus Roræ etiam capi potest, qui instillata simili pollet efficacia. Tandem, gravis si fuerit Mala; Aqua sapphinea chiregorum supra laudata, vel cum Aqua Calci Rive in Pelvis: necnon vel hoc calce vivo cum solo sale Ammoniaci: & Aqua simpliciter appropriata, ut lenissimè Linguam feriat, in Vale æneæ vel orichalcæ, donec curuleum acquirat colorem: etiam egregie est ad dicta Oculorum vicia detergens; hac enim subacta fuit Macule drassimæ: ubi Oculo ea diuturna Ophthalmia progreditur: Vid. RIVERTUS *Cons. 3. observ. 45.* Tandem egregium est Experimentum PLATERI, qui omnes Albugines & cicatriculas feliciter curavit. *Id. r. obs. p. 112. & 113.*

℞. Pulv. Fumar. educt. acris. Quartarium ℞i.

(idem quod B℞.)

Incidentur minutim, & in Aqua Rosæ & Funic. coquantur, donec in Pulverem redigantur: cai contineantur permixti.

Muris. sem. Fanneg. Bil. vel ℞i.

Albun. Ov. Num. ii. vel ℞i.

Lep. Hæmæ. minutif. trib. vel preparas. dr. 5.

ad 5.

Cent. grana. pulveris. Bil.

M. f. cataplasma.

Oculo clauso imponendum, continuo gestandum;

& bis in die removendum.

Convenit, si impressis Malum obveniat cum inflammatione, & insigni Lactymam acriscularum flatu, in Albogine, & cicatrice. Pariter & HORSTIUS *Id. observ. 39.* Leucomata ex Variolis vasa semil cataplasma resolvable feliciter curavit; applicata simul in tali casu post aures Vesicatoris.

℞. Pulv. Ym. dulc. ℞i.

Coq. in 1. q. Aqua Funic. & Rosæ. ad consistentiam Pulvis.

adde

Muris. sem. Fanneg. Bil. 1. q.

M℞.

Applicetur per dies aliquot: Imprimis somni tempore, Post huius cataplasmati usum.

℞. Aqua. Rosæ.

Funic. an. Bil.

Margar. prep. 3. M℞.

Gajus solius ulia continuato frequenter Maculas & fusa.

fiones omnia educta refert. Conf. PLATERUS *Id. 5. TIMÆUS von Guldendob. Cap. lib. 1. cap. 11. pag. 48. Id. deo Form. class. 2. §. 23. & colig. Formular.*

Tandem Liquores ex Floribus ceruleis, aut Flav. Cyan. per distillationem seu colligationem in Furco phario parati (descriptionem videbitis in SCHROEDERI Pharmac. & HOFFMANNI Clave, HARTMANNO, & SENNERTI Praxi, ubi de ophthalmia) specifice sunt singulariter ad Nubeculas, & Albogines delendos. Porro curavit aliquando FORESTUS Paucos, qui ex Variola in Phlyctæna incidit, quæ exulceravit in Oculorum cicatricibus abierunt, cum Gallyrio ex Aqua Funiculi, adjecto Felis Anguillæ vel paucis saccharo. Tandem Palvis ex Oile sepiæ, imprimis calcinatæ, vel soliorum, vel cum saccharo albisima, in paucis quantitate Oculis instillatus prodest, uti etiam CNOEFFELII Palvis compoitus ex curvis serpentum, & Lapidis Cæterorum minutissimis triets & iocivitis missis in staphyræ, vel cum Melle illitus, vel cum Aqua appropriata applicatus, cicatriculas egregie delet; qui Palvis etiam Experimentum egregium est in Vulnibus, & in Ulceribus, item in cancro Oculorum, in quibus Oculorum Malis singulis rursus est. Hic etiam in casibus peculiariter convenit Aqua Ophthalmica ex chelidonio majori & cancri flavissimis destillata, secundum Methodum MYNSIGHTI & CROLLII in M℞.

Omnium fortissimum Medicamentum est Mercurius sublimatus, quem solum in Aqua appropriata, uti ad Unguentum laudavi, ita & ipsius usus casu ad Nubeculam & cicatriculas inopertus; sic enim in PLATERO *Id. s. prolix.* Observatio de quodam Chirurgo, qui curatus Nubeculam, necnon quæ errore sedulo, loco sacchari pulveris instillavit Oculo Patiens Mercurium sublimatum, unde gravis quidem nata fuit Oculi Inflammatio, sed hac subacta Nubecula simul omnino disparuit, unde ad huius imitationem levissima solutio Mercurii sublimati in gravi casu commendari; & eum iudicio tamen, applicari potest.

Cæterum defunctis remediis sæpe etiam assit quæ hæ Nubecula & cicatrice, post Parulas præteritæ, vel etiam si Ophthalmiam patiantur: quos ut curemus, non incommodum est, si Mater vel Nutrix malitiosæ semine Funiculi aut ipsam Funiculum, & halitum Oris moa immutat in Oculum infantis, idque frequenter; hæ enim sæpe Nubecula incipientem dicitur observare. Formetur, si post Masticationem etiam Lingua tamquam Albuginem, ut ipsa Salvia Funiculo ricta blanda cum i. g.

Quod si verò suffragillat super Oculi, seu sanguis in Oculis & in Tanicam cornem effusus & coagulatus, idque Virus impediatur, ad resolvendum & dissolvendum sanguinem grumolam convenit Fucus ex Aqua cherefoli, Forum cyani & Hyssopi, quæ cum Linteis multiplicatis calide crebro Oculis applicatæ & instillatæ suffragillationem auferunt, in Gravioribus Malis Semen cumini vel caryophylli teratur intra dentes, probeque multiter, hinc halitus Oris in Oculum suffragillatum frequenter immittatur, & mirè confert; & hinc est, quod BURRHUS in *Epist. ad Bartholinum* laudet halitum Oris simplicem: magis appropriatum redditur cum semine Funiculi. Vel in Maltæ conuaciori sumatur coma Hyssopi, eaque confusa ebulliat in Vino vel Aqua calida; Decocto isto in forma Foci postmodum calide largiter foveatur Oculi, idque crebrius, donec succosus sanguis extraxerit discutatur, & resolvatur; Nam aperit sanguinem extrudere conuacum asserunt, & confirmat hoc RIOLANUS in *Tract. de oculi. Oculorum*. Tandem altimum est & quasi Anchora sacra Decoctum Radicis symphoricarise, vel, quod melius, conuacum cum dimidio Radicis figilli salomonis, pro Foca aluparum certissime suffragillatorem Oculi tollit: & c.

℞. Rad. conf. maj. 3. ℞i.

℞. Rad. salom. Bil.

℞. Farnas. 3. ℞i.

℞. Farn. 3. ℞i.

Infusa & confusa hæc vel in forma Decocti vel cataplasmati, adeoque sub forma Foci humidis, applicentur; vel tria escipiantur Rusto recenti, & in foricam Linteis redigantur, quod catrinicis Oculis imponatur.

In graviore Oculorum Conuacione.

℞. Rad. Conf. maj. 3. ℞i.

℞. Farn. 3. ℞i.

℞. Farn. 3. ℞i.

℞. Farn. 3. ℞i.

℞. Farn. 3. ℞i.

℞. Farn. 3. ℞i.

℞. Farn. 3. ℞i.

Cura 36.

Cogn. bene secundum artem pro cataphasie.

D. S.

Puls. Resolvent.

Resolvit & discutit poeniter, ac dolorem simul insu-
per mitigat. Melius tamen est, si sub forma foci adhibea-
tur: *Pinguis enim Oculis fuit aditus*: quod etiam de Unguen-
tu Nihil notandum. Aut

2. Flor. Chamomill.

Sami. hyssop. an. p. ii.

Rad. Symph.

Sigill. salamin. an. 3ii.

N. f. Nodulus.

instillat foci humidus applicandus.

D. S.

Sacculus discutiens ad focium.

Vel

3. Flor. chamomill.

Cathart. an. p. i.

Eum. hyssop. M. f.

Rad. croc. mal. 3ii.

Sigill. salamin. 3 ss.

Instillat & contul. cogn. in f. q. spiritus vini:

Colaturæ 3ii. vel iii. adde

spiritus plet camp. 3ii. vel 3iii.

M. D. z.

Focius Externus ad oculum.

Tandem egregium est *Linimentum Maffebell contra Do-*
rem in Arum. Chym. pag. 503. quod, uti quacunq;
fucit *Coniunctionis* & *Livores* curat, ita speciatim Oculis
suggillatis convenit.

PUNCTUM II.

De Hypopyo

Leditur quoque Tunicæ Cornæ pelluciditas ab Hy-
pyo (H) seu pure sub Cornæ, dum ab hoc nunc tota
Pupilla, nunc ejusdem Limbus seu Circuitus tantum tegi-
tur.

DIAGNOSIS.

Suppurationi huic quia ordinariè occasionem præbet
Ophthalmus enormiores & suggillationes, commodè ex
Morbis præcedentibus dignoscitur, & ad motum Oculi mo-
vere eadem Materia, imò oculus suppuratus altero inter-
dum prominenter apparet.

Cura.

In Cura Pus educendum, præmittendo huic, si reliquæ
Inflammationes subiant: *Remedia in Ophthalmia superius con-*
mendata. Eductis autem illa à discutientibus, quæ vulgò
commendantur, nunquam speranda, sed ex Chirurgia po-
tenda erit.

PUNCTUM III.

De Phlyctenis seu Oculorum

Pustulis.

Pertinent ferè hæc *Pustule* in Adnata & Cornæ Tunica
subinde observabiles, grani M-iii magnitudinis, cum
Pruritu, Ardore, &c. Grani *Phlyctis* dicitur, quæ, si
hæta Pupillam sin. post sui eruptionem cicatricem relin-
quant, Valium abolerent: sin vero Tunicam Cornæm oc-
cupent, eamque cadant, Humoris Aquei præfationem facere
possunt.

CAUSÆ.

Oritur ex retentis Acrisbus transpirandis, sed ad Trans-
pirationem ineptis, adeoque retentis: hinc in Pustulam
collectis, quæ successivè rumpuntur & nunc exilis corpus-
cula, nunc Cicatrice post se reliquunt, suntque quasi
particularis *Oculorum status*.

(H) Hypopyon, *verruis*, propriè suppuratum, ab uno sub, & uno pus. *Vulgò à Medicis sanior pro collectione*
Puruli sub Cornæ Orali tunica.

(I) Hypochyma & Hypochysis *verruis*, Suffusio: ab uno, sub, & xii fundo.

CURA.

Unde in Cura ad Acrimoniam acido-saliam temperan-
dam respiciendum, cætera satagente natura convenit ergo
Aqua Vitrioli *Harrmanni*, quæ vid. in eius *Præcep-*
is. 9. 3. & cap. 28. Imò simplex Vitrioli albi solutio cum
addita Tincta sufficit: Saccharum Saturni, item Cerussa cum
appropriata Aqua infusillata, conducit.

Vel

4. Lepid. Calamin. præp. 5ss.

Tinct. præp. 3ss.

Sacchari Saturni 3ss.

M. f. Sief.

Oculo pedetentim infusillandum.

D. S.

Pulvis leniens ad Oculum.

Aqua Albuminis Ovorum egregia est, si Phlyctenæ a-
periantur & exulcerentur, detergat & consolidat.

MEMBRUM III.

De H. moris Aquei Vitii.

Porrò per pupillam transiens Radius visus ulterius pe-
netrat per *Humorem Aquæum*, qui propterea tenuis,
purus, & exactè limpidus esse debet. Posito jam, quod nunc
Pupilla sit aperta & perforata, nunc tamen permittatur libe-
rior transitus Radius visus per Pupillam ad Tunicam Re-
tinam, id est etiam impediri Visus. Si ergo in humore A-
queo, inter Pupillam Uveæ & Humorem Crystallinum im-
pedimentum aliquod se offerat, quod tunc transitum ne-
get, Visu tollitur. Fit hoc, quando Materia quedam, reli-
qua humore Aqueo paulo crassior & spissior, sensim in
eodem colligitur, quæ primò minutissimorum *Papillulorum*
forma sensim in *Filamentis* tenuissimis, Texturæ Araneæ-
rum similis, concrevit, donec hæc ipsa teatuta tandem
in tantum augeretur, ita ut perfectè crassescat, & spissel-
cat, & in *membrana* consistentiam conglutinetur & coalescat.
Membrana hæc vulgò *Cataracta Oculi* dicitur: Malum verb
ipsum *suffusio Oculi*, Græcis *νεφθαλμία* vel *νεφθωσις*, Germa-
nis *der Star*, appellata. (1)

PUNCTUM I.

De Cataracta & Glaucomate.

Cataracta est aliud, quàm Membrana quedam suc-
cervè intra humorem Aquæum, vel in eo intra pupil-
lam & Crystallinum Humorem obducta, quam vocant
Germ. *der Star*.

Non autem confundenda sunt mala plura hoc nomine in-
signita: sic enim dicitur Germ. *der schwarze Star*, id est,
Cataracta nigra, quando anterior Oculi pars fenestrata, so-
rens & diaphana apparet, ita ut nihil vitii in Oculo appareat
in illo Malo, quod vulgò *Opus Serena* dicitur. Speciatim
vitiis Cataractæ purpure dicta ingravescent, Germ. *der graue*
Star, id est, *Cataracta viridis*, appellatur, eo quod pu-
pilla ob Nubeculam subarenatam Colorem velut maxime
& viride centrum exhibet. Perfecta vero Cataracta, Germ.
der Weiss, dicitur: *Milch Star*, id est, *Cataracta alba*, sive
Lactea dicitur ob Pupillam ab albescente vitidogue humore
crassius obductam: hinc incretens illa Cataracta respo-
det depositioni cum Acu facienda: etiam dicitur Germ. *der*
sarsige Star, id est, *Cataracta immatura*, cum subtilis-
sima illa & quasi araneacea Filamenta nudum sinitque
adco cohererit, ut Acu mediantè abique disilcent pos-
sit subtrahi. Cataractæ vero *perfectæ*, in qua filamenta illa
in membranam crassitatem coalescent, adeoque ab acu
semovei possunt: Germ. *der reife Star*, id est, *catar-*
acta matura, dicitur: Cataractæ hæc nunc sita est post me-
mbranam Uveam, inter hanc & Humorem Crystallinum,
nunc sita est ante Uveam inter hanc Cornæm, utrobique
in Humore Aqueo; quædam Cornæ vel Uveæ accre-
scit, quædam non: imò suspicet, neminem adhuc esse issem,
atque reverè ex Filamentis Uveæ membranaceis, præter-

naturaliter oblongatis & excrefcentibus, originem habere.

CAUSA.

Commoniter *Causa* huius Suffusionis vel *Cataractæ* est Materia illa quasi nutritiva, ea qua in suo esse conservatur ille Humor Aqueus; five ea Arterius derivetur, five ex quibudam Glandulis Conglomeratis vicinis, earumque Lymphæ subtilissima originem ducat; five, quod alii putantque Sententia tamen minus placet) Aqueus Humor sit tantum simpliciter Spiritus Animalis, vel Opticus, in Aquam condensatus. Hæc ipsa Materis redditur impura, & inquinata Particulis crassioribus vel excrementosis, uti puritatem Humoris Aquei tollit, ita si tales Particulae vitales plus minus glutinosæ successivè italesque connectantur, & magis magisque coherant, tandem talem substantiam membranam, *Cataractam*, efformant; ita ut in principio saltem subtilissima Filamenta instar Telarum Aranearum soleant hinc inde in Oculo vagari, postmodum vero successivè videntur uniti, & varias figuras repræsentare, donec tandem magis magisque compacta obducunt Oculum, & membraculam incipient constituere. Sed, ut monui, probabilis omnino videtur *Membranarum*, Uveæ aut alterius cuiusdam, *Tubæ præternaturaliter excrefcentis* Suffusioni occasionem subministrare. Hinc si postmodum Membrana talis successivè coægensata totam Pupillam obtegat, Visus plane aboletur; plus minus, prout oempe densior vel rarior fuerit: si vero tantummodo dimidiam Pupillam obvelet, omnis diminuta saltem apparent: si tandem parva saltem incipiens *cataracta* medium exacte pupillæ occupet, omnia quasi *perforata* appareat, & hæc est *Suffusio Vera*.

Nam datur præterea etiam alia, quæ vocetur *Suffusio Notha*, sed minus propriè ita dicta, qualis interdum quibudam, imptimis hypocondriaciis, & quibus jejunia varia circa Oculos Filamenta vursari videntur, accidit, quæ etiam illi, qui diutius Crapula & Stomachi vitio laborant, datur aut *Patulenti*, aut *flacidi*, aut *huicæ*, filamenta aut similia ante Oculos verari videntur; aut quando Oculi penitus occæcantur, id quod in specie in flatu Febrium & morborum Oculorum, instante Crisi per hæmorrhagiam Narium, aut etiam in vitiis Cerebri, & hinc ea vitia Stomachi, oriuntur. Coriolum huius Suffusionis Nothæ exemplum refert TIMÆUS *von Galdenius*, in *cap. pag. 60.* in parosylo Febris Tertianæ tantum affligens, in quo Ager omnino caecus reddiquæ extra Propterygium optimè videns Coelum.

Malum hoc subitè transit, iterum recidit, & sic porro, & in aliis Sanis sapientissimè *Stomachum vitiatum* pro fomite agnoscit, quoque etiam modò exinde ad Oculum fiat transitus, excerptis saltem Febribus Ardentibus, vel ex Lympha etiam subtilissimè coagulata; hinc etiam Notha hæc Suffusio post Crapulam in hypocondriaciis assumpto fenticulo cessat; unde probabile est, eam per qualemcunque consensum ex Stomacho dependere. Quæ aliis morbis supervenit, his curatis serè cessat. In specie, qui ea vitio Stomachi hæc laborare solent, optimè Aloetia Ventriculorum purgantibus, in specie Pilulis ususibus Aloeticis, item Mallichinis & Aloephanginis, anni mensurali tempore purgator, sicuti etiam per usum Zingiberis, aut crudi uti in India conditi, mace jejuno Stomacho masticati aut ostanti torantur. Hypocondriaciis malum familiare est; quando vero edunt, cessat.

Distinguedum autem est inter *Suffusionem Vram*, & inter *Glaucoma*: quippe qui Affectus sunt distinctissimi, acut apud BORELIUM *Apud. Cæsar. 3. Observ. pag. 379.* alioque Prædicos, sæpe confuso fit. Origo vero confusio est, quia Veteres Græci non distinguunt *Glaucoma* & *Suffusionem*, sed insinde, eodemque nomine, ambos affectus comprehendunt; quia quædam *Suffusiones* se simili Colore offerunt; & quod Veteres Græci *Hypophyma* vocant, Juniores *Glaucoma* discernunt. Rex cæcior et potest, dico *Hypophyma* denotare *Suffusionem*: *Glaucoma* vero aliud esse, quam tale *Hypophyma* Crystallini vitium, quando hic debita sua Perforatitate qua se habet instar Vitri clarissimi, sit nonnihil opacus, & consequenter obtusè coloratus, adeoque Albedine sua seu obiecta, h. e. glauco, colore suffunditur & inquinatur; unde & Perforatitas eius laeditur. Hinc enim in tali humoris Crystallini constitutione evenit, ut neque Radii visui rectè possint transire, & Color rerum pertransiensium vicietur. Simili enim ratione, quo magis obducatur Vitrum; per quod artificialia sit Visio, ita etiam si Vitrum lentillare Crystallini humoris fuerit opacum, vel vitiosè coloratum, Glaucoma pretenit.

Vitium hoc *Senilis* tandem naturaliter serè supervenit,

aliis præternaturaliter, & quidem simpliciter ex mutata humoris Crystallini Consistentia, & majori opacitate, Densitate & Impuritate originem ducit; sic enim minus peripicus, sed opacus & nonnihil coloratus redditur. Confirmat hoc Mechanica Anatomica; si nempe Humor Crystallinus extra Oculum innatet, per eum insolat Lentis constitutum omnia objecta majora videntur, quod elegans est Spectaculum; si vero idem excideret, vel in Aqua ferri-dæ ebulliat, sit opacus, densior, & nonnihil albus. Hinc est, quod in senibus sit naturalis vitium hoc Glaucoma, ob vitium in iisdem Humore Crystallino. Quod si vitio *Ætatis* decrepiti accideret, incurabile est, utut possint præservari.

Quod si in Junioribus eriat ex nimis *Visu asæ*, five Crystallini sive Aquei Humoris vitio, convenit in specie, præmissis præmittendis, Fomentatio Oculi cum Spiritu Vini, Mediane Lintæ duplicato Oculi sub introitum loci impositæ, & per eodem ibidem contento, qua ratione Glaucoma etiam præservari potest. Melius est, si recipiantur Flores Borraginis vel Buglossæ, iustificandorum cum Spiritu Vini, quæ Tinctura applicata præservat ut erant in Junioribus imminens Glaucoma. Alii laudant Tincturam Buglossæ cum Phlegmate aluminis, addita aqua albuminis Ovorum destillata, paratam.

Causa Remota, quarum occasione humor aqueus periculis excrementitius inquinatur, & cum his quasi conglutur sunt intertempore Lacrymationes, ex qua BARTISCH *Part. 1. cap. 3. & HILDANUS Cent. 4. Obs. 15.* Cataractam observant: Oculorum Inflammatio, & Venu, tam intermissa quam nimis Frigida Potus, de quo vid. BARTISCH *l. a. & PANAROLLUS Part. 3. obs. 6. ac Ræce. 3. Obs. 30.* Contusio item & Vulnera, vid. HILDANUS *Cent. 5. Obs. 19.* Repellentium fortiorum, v. gr. in Ophthalmia, abusus, necnon externa corrodentium applicatio, vid. BARTISCH *Part. 3. cap. 1. pag. 37. & 39.* His quoque accedit Cataracta conata, qualem BOYLE *de Phil. Philosoph. Experim. Tam. 2. Part. 1. pag. 71.* sanatam refert.

DIAGNOSIS.

Signa in Suffusione Vera facili se manifestant, & in incipientie rarè salient: Nam conqueuntur *Ægrius cataracta* incipiente de variis Punctis, Filamentis, Insulis, Formis, Aranearum Telis, Rete vel Grana, & similibus ante Oculos obversantibus, Multis Oculi circumvolantibus, Obiectis sub alioque Calore, aut tepidioribus, multiplicibus, dimidiis, flis, &c. id quod ut plurimum rudimentum primi per cataractæ est indicium, acut non aequè semper in perfectam Suffusionem terminant: Conf. BARTHOLINI *Alia Hæstoria. Volum. 2. pag. 244.* sine Vitis sensim plus minus obducatur, & Color Pupillæ nonnihil glaucescat, quæ marines, aut Vitro nebulo similis, apparet.

Quamvis interdum Signa hæc planè desint, & ex improvisis & subitè factis cataractis oriuntur, & quidem non tantum occasione Causarum Externarum apud HILDANUM *l. a.* sed Internarum quoque, itaut Experientia testetur, aliquos Oculis hinc obdormientes, Carcos vigilasse, & ad hanc Lycopositas incidem Carcos se ereisse, quemadmodum FERNELIUS *Pathol. lib. 3. cap. 5.* HILDANUS *Cent. 3. Obs. 14. & BARTISCH Angustolus, five Oculorum servitium. Part. 4. obs. 32. pag. 44.* perhibent. Quod si Cataracta sit Perforata, Vitis omnino tollitur, & Pupilla Oculum incipienti nunc immixta Vitro contaminato aut saltem obducato aut minus perip eam similis, nunc Gyphi, nunc Argenti vivi, nunc vitruvianus, nunc lividus, nunc alius Color in eo apparet.

Tandem perfectus Color albus, aut etiam illic post pupillam, se exhibentes, jam perfectam *Suffusionem* inuunt, imò Suffusionem quoque Completam consensat per Experientiam consistit.

Cum vero hæc modò Vera, modò Notha sit, scientiam, in Notha rerum circumvolantium & observantium phenomena erescere ac decretere, imò interdum planè erascere, maiora autem frequentera observari Ventriculo repleto, vel Digestione prima peracta, item in Plenitudine & Aere turbulento. Omnia, tunc per fumum & nebulam videri videntur, interdum penitus Cæcitas inducitur, & si attentè inspicitur Oculis, insignis & profunda Albedo circa pupillam apparere solet: Econera si Vera fuerit, Coruscationes & Apparitiones illæ sunt continuæ, semper augentur adeoque Vitis magis magisque obducatur, ut plurimum unum saltem Oculum occupat, quemadmodum Notha ob Cæ-

Causam communem utrumque, aut si & Vera Oculum utrumque afficiat, contingit tamen hoc non simul, nec simpliciter.

Ipsa humor Aqueus idem effluere, & ita Visum plura minus impedire observatus fuit in affectu Anonymo, utat ad suffusiones a quibusdam idem referri soleat.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis horum Patheumatum: omnis suffusio nalam est difficile curabile.

Reus, & in qua Aegri obiecta omnia secundum Magisudinem, Figuram, Numerum, Motum, &c. adhuc dicuntur, Medicamentis difficulte potest; quod verò magis confirmata est Cataracta, ad densius concretit, in qua Aeger Lumen aut solus splendorem propriis admodum etia in vix aut non videt, Medicamentis nunquam, Chirurgia difficile curatur, licet etiam Oculo fano clauso pupilla aegra dilatetur.

Quo magis Latus suffusio, five in feri, five in facto, unde facilius curatur: *Distans* verò *ex conformata* difficultis, Unde Suffusio seu Cataracta *imperfecta* & *incipiens* in corpore alius bonae constitutionis, & medice Aetatis facilius & per sola Medicamenta curatur: *Facilis* verò non curatur Medicamento, sed semper Chirurgiam postulat, quamvis SCHENCKIUS *obser. lib. pag. 155.* & BOYLE *de thal. Phil. experim. part. 2. sect. 1. pag. 74.* hanc solis quoque Medicamentis interdum curatam perhibeat.

Vulgo multa de pupillae amplexibus & nigredine in Prognosi habentur, sed sunt fallacia. Nempe dicunt: quibus altero Oculo convenientibus & Palpebrae fricata, una alterius pupillam dilatari contingit, si pupilla admittatur, recipiendi Visum spem esse, aut per Medicamenta aut per Chirurgiam; quando verò pupilla non dilatetur, nec restringatur, ex iacurabili sit: item quæ *suffusa nigra* est, & quæcumque Splendoris Nitiditque capera, aullo modo curari posse, sed tamen hæc ipsa non adeo universalia sunt, quin revera subinde saluant. Distinguantur ergo exercitii gratia tria Tempora Suffusionis, itat *primum Tempus* sit, quando varia saltem Filamenta ante oculos versantur, & hæc est incipiens: *secundum Tempus*, quando filamenta coeunt in Membranam, quæ Visum impedit: *tertium Tempus* est, quando Membrana illa est adeo densa & firma, ut nullo modo possit videri. Prius Tempus Suffusionis curatur facili Medicamentis appropriatis: secundum vis Medicamento; non desperandum in tamen est, quia opem mediante Aco tolli potest: tertium Medicamentis planè non, Chirurgia difficile admodum, interdum frustra Cura suscipitur.

Porro Membrana hæc in qua Ager *Lumen clarum* admodum adhuc obicere videt, potest optimè Aca Chirurgica curari; si ea autem fuerit densa, ut Lumen, clarum licet, nullo modo alterationem faciat in Oculo, ut percipiatur, talis etiam per Chirurgiam incurabilis est.

Item si Oculo Suffusione affecto, alter Oculum compellitur, & inde *oculus aeger* nonnulli humidus sit, & pupilla in eo dilatetur, Signum adhuc habetur, curabile esse per Chirurgiam: si non, est Malum desperatum: si enim debet per Chirurgiam curari, Suffusio sit in secundo & tertio gradu, & Membrana iam sit facta, non in feri. Hinc distinguunt Chirurgi inter *suffusiones maturas* & *immaturas*: Matura est, quando, compresso Oculo Aegri; Membrana iatùs obstitit in eodem situ permanet, atque erat ante Compressionem; si vero post Compressionem incipit moveri, & fluideat, est adhuc Immatura.

Hoc coarctum etiam *Calvaria Membrana*, ratione cuius diffinitio diversis & quinqué primariis fuit specie, nimirum *suffusio alba* seu *Argentea*, *Chorea*, *Carnosa*, *Viridis*, & *Flava* seu *Bianca*. In specie *Color Albus* aut *Glaucus*, & inflat Cili, signum est, Cataractam Matram & aptam esse pro depolitione Chirurgica: quando verò *Color Membranae est Albicans*, sicut *Gier. Wit Sabine*, ea etiam planè abstergetur & Lividus, signum est densissime Cataractæ. Suffusio *C. rubra* & *viridis* instrumentorum vim eludunt; dum *Argentea*, *Chorea*, & *flava* per Chirurgiam interdum sanantur; modò hæc posterior noadum valde inveterata sit, utpote quæ Uveæ Tuoica firmius adhærescit, & corneæ atque offem Darietum contrahit, unde vulgo *Cataracta vitrea*, sive *felina*, audit, Cataracta autem, Germanis *Nigra*, planè non est loci hujus, utpote cuius formalitas non in Crassitie, aut Heterogeneitate Humoris Aquei, sed spirituum Animalium per Nervos Opticos denegato influxu consistit, ut *infra puncto c. Membr. a.* patet, & speciali termino *Gata Serræ* audit. Ea ferè nunquam curatur, quamvis eam coram HILDANUS *cons. 5. obs. 10.* & BARTISCH *l. apog. 11.* tententur.

Sicut autem *laeviora* similis Cataracta nec Chirurgia ceat, propter tenacitatem, quæ Corneæ aut Uveæ Tuoicæ arcibus conneditur, ut hoc haram iracratione vis detrahi queat, ita minus iracrata seu non *suffusiora* maturata instrumentis contagiare haud licet, ne discontinuata totum hamorem Aqueum erubet, aut mox iterum concretens magis callosa evadat, utraque autem ratione Visum enormiter laedit.

Adnotat esse *Tuoicæ diffis Pelliculæ* dignoscitur: 6 (1.) acriorum & ostentum extenorum nbus præterit; (2.) si Laseola albicantes, corneæ, flavæ, &c. idem Oculi, oblique spectati, transant, & vel jam (3.) in ipsa Corneæ, si hæc rectè inspiciantur, Pupula albicantia, id est, ipsa Suffusio splendidiore, appareat: imò Uveæ etiam coherere coactaditur, si post Oculi compressionem atque frustioem Pupilla non dilatetur.

Maturationem verò convenientem ante festum vel septimum Annum olim vis expectabant, hinc ad illud usque Tempus Operationem differrebat, cum tamen *sola Temporis mensura* Cataractæ Crassities ac Maruritis sufficiens determinari nequeat, ex quò Suffusioque alla citius tardius, vel pro diversis Materie quantitate, vel Coagulationis, v.g. Caloris, majore aut minore vi, eam acquirit: ita alio vis aate festum Annum Chirurgiam admittit, & si citius Instrumento tractetur, ab hoc inflat Laseis dissolvitur. Pariter si Operatio diutius differat, per eandem in Lamellis tenuiores inflat Glaciem frangitur. Cineses verò citius maturefecit, id est, sexipis intra quinque vel sex Menses.

Corneæ minus frequens & curata difficillima est, cum tardius ad soliditatem decemem pertingat, spiritus in terum valde debilitet, vel potius Humorum pelluciditatem destruat, itat Pellicula licet separata, Visus tamen obcuratus & imbecillitas remanet.

Viridis & *flava* citius maturefecit; posterior tamen, prone superius dictum, olim mox deiebat, inflat Corneæ durescit, hinc Chirurgiam respicit.

Porro Cataracta in *junioribus* potest facilius deponi, & sine Recidivæ periculo: in *Atatis autem senili* sponte laboria suffusio unius oculi, successit, ubi confirmata fuerit, etiam alterum oculum infestat, & ita Aegri perfectè cæcuntur: non potest deponi, & si deponitur, recidit, vel regeneratur, vel Senes non adeo periculum Visum recuperant.

Quæ cum *delere Capitis* præcedere vel postea, difficultatis curatiois est.

G U R A.

In Cura Suffusionis, in primo & secundo gradu calientes, *suffusio alba* seu *Argentea*, in humore Aqueo adhuc fluidus, ante fali concretioneem *dissolvenda*, & concreta iam, quantum possibile, *attenuanda*, *resolvenda* aut *dissipanda*, idque saltem in incipiente; sicuti firmis concreta mediante Aco deorsum versus ex situ suo removenda est.

Remedia ergo, quæ hic convenienter *laevata*, sunt ea, quæ Oculis in specie dicata sunt, *Remedia Ophthalmica*, qualiaunque fuerint: quæ inter eminent Millepedes, quorum usos interius pro curandis Suffusionibus mirabiliter extollit, & BOYLE in *Philos. experim. pag. 55.* Laudant etiam Euphrasia, cuius oleo septuaguaris Vitium recuperare testatur HILDANUS *obser. 59.* Item Decodum Viperarum cum Aquis Ophthalmicis paratum videb. in CLAUDINO *emuls. 56.* A plurimis laudantur Decoda Lignorum Sudo-risera cum Euphrasia, Chelidonio, Verbena, Feniculo, & Betonica parati vid. CLAUDINUS & ZECCHIUS.

Quoad *remedia externa*: necesse est subtilia, & quantum possibile, penetrantia sint, quæ Oculis infundenda veniunt, frustra alia laborabit. Utigilur melius penetrare queant, convenientes est, ut prius foveantur Oculi vel Seculo Emolliente, vid. HARTMANNUS *cap. 41. §. 3.* vel usurpetur Potus *Pomphig*, descriptus à TIMÆO *van Galden* *lib. 1. Epist. 24.* Quibus subungantur ea, quæ Oculis infundenda sunt subtilia: quæ inter præ ceteris emient *Aqua Ophthalmica Antimonialis*, quæ mobilissima sunt in quaplurimis Oculorum affectibus, & in specie Suffusionis: vid. *supra* *sect. 12. cap. 2. art. 15. ubi de Ophthalmo.* & *puncto 2. hujus* *sect. membr. 2. ubi de usque Oculi.* Antimonium eam in se habet subtile Sulphur aculeum, & penetrantissimum. Ergo propter tale subtile Sulphur sunt optima Infusa Antimonialia, quæcumque Tuoicæ Oculi penetrant, & ibidem Suggillationem delect.

Convenit ergo lesum Vitri Antimonii pulverisati; loco cuius Vitri non immeritò alii Caput mortuum Butyri Antimonii, vel Crocum Metallorum pulverisatum, pro infu-

infusione in Aquis Ophthalmicis, v. gr. Aqua Foeniculi, Euphrasie, Chelidoni majoris, &c. laudent: quæ Infusa in loco calido aliquandiu digesta, & hinc filtrata, additis aliquot granis Camphoræ, & Croci, in forma Collyriorum crebrius quotidie Oculis infundantur, & aliquandiu continuata, sint optima: v. g.

℞. Niv. Autimoni pulv. ʒss. vel gr. xv.

Infund. in

Aqua fer. Cyani,

Euphrasie,

ʒss. ana ʒi.

Stent in loco calido per noctem.

Manc hinc. adde

Camph. gr. vi.

M. S.

Collyrium.

Hujus aliquot guttæ infundantur Oculo, Aëro supramenteo, & hoc iterum repetendum, hæc enim ratione prouident Exempla curatorem Suffusionem. RIVERIUS pro simili infusione commendat Vinum album. Post hæc conueniunt etiam egregiæ Aquæ composita: ex Formicæ Ovis cum Felle Mustellæ picis præparatæ, quæ mirè à quibusdam laudantur. Nempè

℞. Ovis. formic. ʒv.

Fell. Must. psc. No. xxx.

Missa omnis lentissime destillanda sunt, exit enim sic Aqua turbida, quæ filtrata seruetur ad usum, & tempore respectivo pro Collyrio ad Cataractas delendam Oculis applicanda.

Et sanè credo, hoc non sine frustrancum: Notum enim est, quàm mirabilis, & singulari FORESTI Experientia confirmatus, sit Liqueur hepatis Mustellæ picis, qui extrinsecus saltem Palpebris clausis illitus (penetrantissimus enim est) est nobilis in Suffusione vel præuenda vel etiam confirmata curanda: vid. FORESTUS qui à se eperitum commendat. Hepat Mustellæ picis (Germ. *Aaltrapp*) à ligatur Ligno, postmodum imponitur in Vitrum, & exponitur Radiis solaribus tempore æstiuo, sic enim destillat & resoluitur in Oleum autè coloris æqui. Tempore hyberno non succedit, & dicunt hoc quidem fieri quia Mustella hoc tempore Venari indulget & generat: At verò hoc non relinquimus. FERDINANDUS verò in *libro, Med. mirab. 25.* laudat pro Collyrio Aquam destillatam ex Stercoris humani, in qua dissolutum sit *Fel Mustellæ picis*, aut etiam Leporis, cum tantillam Sacchari candidi, & Margaritæ subtilissimè præparatis: Liqueunt hunc Oculis infundere crebrius iubent, est egregius ad curandas Cataractas incipientes. Nec omittenda venit Astringia Viperarum, vel infusilla vel insana saltem. Chelidonem majus semiputrescentem, item Canceri fluviatilis dum incipit putrefcere, destillata suggerunt Aquam Alcali subtilissimè ebriam, insigniter penetrantem, & contra suffusiones utilem. Quod si non videtur sufficere hæc, confugiatur ad Aquam ipsam Ophthalmicam *Querretani*, quæ sub destillatione spiritus seu Aquæ Epilepticæ ex Vitriolo, & Urina Pueri, aliquandiu digestis, hinc destillatis, primò prodit; ubi duplex Plegma colligitur, utramque penetrantissimum, salum inuicem, quod sine sensu Oculum penetrat, & confert egregiè in Suffusionibus etiam jam factis resolvendis. Vid. SCHROEDERUS in *pharm. ubi de Vitriolo*, & TACHENTUS: vel loco hujus paratur extempore iquens admodum QUERCETANI, ex Urina Puerozum & Vitriolo. Plegma hinc elicium est subtilissimum, & quod peno arden fortiter dilucet Suffusiones: v. g.

℞. Urina Pueroz. ʒss.

Vitrioli alb. unc. iv.

Stent per aliquot dies in digestionem, & postmodum destilletur exinde aqua Ophthalmica volatilis instillatim penetrationis, oculis instillando, egregia ad Suffusionem.

Potest etiam ipsi Sacci Chelidonis majoris libra una admisceri, & ita inuicem destillari.

Nec minus penetrans est ille Liqueur, quando vel Albumen Ovi induratum interius excavatum perforatur & repletur Saccharo candido & Vitriolo albo, & ita suspenditur in cellam; sic enim destillat per deliquium Liqueur, diluens cum Aqua Euphrasie, qui egregiam dat Aquam Ophthalmicam.

Pertinet hæc etiam Aqua Hartmanni ex Lapide Crisilli & Sale, *Praxi sua chymica, pag. 206. descripta*, Extractum Chelidonis majoris, Succus nempe inspissatus, magnitudine aciculæ capitis Oculi impositum, multum laudatur in incipiente Suffusione ab HILDANO *cap. 59.*

De Anagallide flore purpureo, eique Aqua vid. HOLLERIUS *lib. 2. de Morb. Intern. cap. 21.* Liqueorem ex Pone, cum Semine Foeniculi, & Rutæ, cum modico Mellis mixto, & recenter ex furno prostratum, atque inter duas patinas flammæ conclusio, proleclum, commendat MERCURIUS *Trem. 1. cap. 87* & ZECCHIIUS *emph. 23.* Spiritus Vini cum Lineis multiplicatis Oculis impositus extollitur à TIMÆO *ex Guldensl. 8. Epif. 26.* Fortis spiritus Salis Ammoniaci cum Calcis virgæ tantillo acutus, præstantioris erit usus; quin via aliquod subitius noverim hoc ipso spiritus, qui pariter quoque cum Aquis appropriatis vel applicari vel instillari poterit.

Denique HARTMANNUS *in alleg. cap. 43. §. 3.* habet Aquam Ophthalmicam Zingiberatam, quam non potest sufficienter laudare LINDANUS in affectibus Oculorum ferè quibuscunque, in specie ad Suffusiones; testatur enim LINDANUS, quod aliquoties dicta aqua Ophthalmica Zingiberata suffusiones etiam factas curaverit, in specie quadam Mulierem, quæ in utero Oculo suffusiones habuerit.

In præservandis & curandis Suffusionibus his, obviandum simul, quod subinde etiam cum fructu & felici successu in principio ipse incipiente Suffusione, adhibentur *Phlegmata* in Nucha aut prope Aures; quæ multum faciunt in affectibus Oculorum, teste HILDANO *Epif. 67.* sicut in Senibus *Fonæantilla* feliciter inuruntur; talibus enim selicetomacissimè subinde & confirmat Suffusiones curatæ fuerunt: sed in confirmata parum valent. Conueniunt quoque *Serena*, & hujus iatrina alia: vid. HILDANUS *cons. 2. observat. 61. & 62. cons. 4. observat. 6. 7. 10. & 12.* GULDENPIUS *cap. 24. & SCULTETUS lib. 2. Tab. 3. fig. 2.* &c. Quod si hæc nimis molesta videantur, locorum egrorum quoque & singularæ remedium est *Serena* *Abdgeri*, nempe Radii Thymelæ arborecentes, sui Menstris, vel Laurulo majoris, (Germ. *Kellerwurz*) in Aqua Solutionis Nitri, vel Lixivio ex Cineribus Vitium, macerata & siccata (alias enim nimis acrimonia corrodit Aures) Lobo Autis peius Acu perfurata immittit, instat Fenticuli succulive Phlegma copiosum elicem, adeoque in gubnatis ab affectibus capitis Cataractibus, imprimis in affectibus Oculorum, & incipiente Suffusione, instillare est remedium. Hujus Thymelæ Radiis mentionem facit RIVERIUS *cons. 4. observ. 100.* item TIMÆUS *ex Guldensl. in Epif. pag. 52. de Perforatione aurium.* Conf. etiam BARTHOLINUS in *oculorum affectibus*.

In Subjectis habitioribus aut copiosis Sero turbulentis in principio Mali sumus Nicotianæ laudandus venit.

Denique si alia irrita, ipsa verò Cataracta in perfectam firmamque nondum coalescent Membranam, dubium, an non Salivario Mercurialis simili modo, atque in Venerea Lue instituta; penetrare intimè Mercurio, instillanda veniat: idque cò magis, si ex Lue Venerea oriatur. Inclinat ad hanc affirmativam FONSECA *lib. 1. cap. 29.* Per Experimentum verò felicem hoc illustrat BOYLE *Philosop. experim. pag. 65.* Conf. etiam SCHENCKIUS *observ. pbi de Lue Venerea pag. 159. (K)*

MEM.

(K) Quamvis insigni morbi sint Cataracta & Glaucoma, atque illorum Causæ quod A. præbuit inter mississimè conueniuntur; saltem tamen non esse operagremium existimamus, si breuiter de his Oculorum affectibus Differentiam, quon frequenter Audientibus in publico Lyceo attemptigimus, hic interferamus; in ea enim breuiter cognoscimus, quæ noxi à Clarissimis Medicis & Geometris de natura horum Morbum in medium inuella sunt & disposita, quammaximè à Veneris receptissima opinione abhorrentia.

DE CATARACTA ET GLAUCOMATE.

ARTICULUS I. Quid sit Cataracta & Glaucoma.

Cataractæ nomine utitur Livius, ut locum abruptum & precipitem in flumine designet, quæ aqua cum impetu ruit potius quàm fluit, ut fons Nili Cataracta: quæ rariore Nubis cum impetu interem profunditates Cataractas: Coeli aperturæ di-

vis.

mus. Cataractas quippe appellare oportet vel obitus, quibus aqua irruentis casus temperatur & sustinetur, quae frequentissima sunt circa Belgas: Insuper Cataractas Archibiti vocari ferunt quaedam vel igneus valvas in montimentorum portis, quae ad habitum inscriptiones ardent, vel ad militis ebediend, nunc dimittuntur nunc ardentur.

Aquid Medicus autem olim fuit Cataracta est Hypochyma, vel Hypochylis, quod Latine vertitur Suffusio. Estque Morbus ille Oculorum, quo ex Corpore opaco intra Corneam generis, ac radiatur per Pupillam transillum intercipiente, Cataracta suboritur. Differt igitur Morbus hic à Gutta Serena, quae Cataracta est oblique alio sensu illi in Oculo apparente: Differt quoque à Leucomate seu Albagine, quae est Vifus privatio ab opacitate ipsius Corneae tantum.

Glaucomatis vocabulum si late iunatur significat mitem caloris naturali in Oculo mutationem in praeternaturalem & glaucum, cum Vifus laesum: glaucus autem color, qui & caesus, est color melius ex viridi & albo. Iam qui talem colorem ex natura habent, etiam oblique laesum Vifum, glaucum dicuntur, quomodo etiam ab Hemero appellatur Jaspium Misaera juvenum caesi oculi habent. Proprie autem Glaucoma à Medico dicitur Capitis alia species, in qua Pupilla color, qui niger in senis est, videtur glaucus & caesus, vel margarita aut aqua transmarina colorem emittens.

ARTICULUS II.

Antiquorum de utroque Morbo Sententia.

Quemvis Oculi lib. 8. cap. 47. Synopsis Medicinæ, & Paulus lib. 3. cap. 22. indicunt, Glaucoma & Hypochyma, h. e. Cataractam, Veteri autem quiddam Mali genus esse existimasse, unde Galenus 3. aph. 1. scribit Glaucomata fieri esse hypochyma, & juvenumque digne ibi eorumque, nihilominus posteriori Graeci, Arabes, alique alio modo diffinitum esse Agrippianum existimant. Cataractam enim seu Suffusionem dixerunt opaci Humoris, in Pelliculam vel Pelluculam, & igitur Pupillam, concretum, quae Vifus impeditur ob impedientem transillum radiorum Luminis. Glaucomatis vero nomine appellatur haec novi corporis ante Pupillam foramen concretio, sed ipsius Crystallini humoris albidum transparentem, ut scilicet ex diapbase in opacum corpus immutatum omnino rabiis Luminis ingressum detegat. Quare Suffusionem Apui humoris, Glaucoma vero Crystallina laevis Morbum esse crederent: imò Aristoteles 3. de gener. animal. ait, Glaucoma esse fuciatum Oculi universi, quae ratione sensu omnino maxime eveniat; Galenus autem 10. de usu part. docet Glaucomam esse fuciatam & concretam humoris Crystallini.

Ubi autem opaci Humor in Suffusione concrevit, non convenit apud Avicenas: nam quidam inter Crystallinum & Vitrum illum sedem esse putaverunt, ut Arabes plerique: alii inter Crystallinum & Corneam: Graeci. Celsus lib. 7. cap. 3. post cetera praemissa Oculi anatem, ait concretos Humoribus duobus Tunicis, quae in unum vacuum esse propiusuræ. Magis tamen recepta opinio est, ut Suffusionis sedes sit humor Apui: quoniam humor Agneus accipit omne spiritum, quod inierjat Crystallinum & concretum Corneae superficiem; Cataracta huius est universum hoc spatium, sive ante sive post Pupillam, dummodo ab ea Pupilla foramen claudatur, & Luminis transillum intercipiatur. Aut Pupillam concretam vel rara est, vel Pupilla circumstanti transudatione coarctatur, unde nomine Leucomatis seu Albaginis appellari solet. Quae post Pupillam sit frequentior est, ac Pupillae exacte ratiola conficitur, est casu colore infecta. Nonnunquam & Pupilla ipsa foramen à se exacta à Cataracta obcluditur, ut hac interiori ipsa limbo firmior agglutinata impedimento sit, ut diluatur vel confringi Pupillae possit.

Receptissima pro secula opinio est praecipue argumentum verum esse Medici comes ad nunc asserit uique tempora regnatarum, quid praecipuum & fortissimum anicam Cataractam curandi modus esse Chirurgia operatur, quae nempe oculi laesum Aut transfigitur, atque admodum caspide Cataracta arepta circumvolvatur, ac in exiguum volumen redacta verum infernum Oculi parietem deprimitur, ut se libere remaneat: ratiola Luminis per Pupillam transillum, Vifusque opus iterum aboleretur. Sufficiens sane argumentum ab Aetio testatur (Aui enim casus Cataractam arripit à Chirurgia & ambrosio: pateret in Agri Pupillae clari conficitur) ad probandum Cataractam aliud non esse, nisi Opaci corporis post Pupillam concretio.

ARTICULUS III.

Recentiorum quoque de Cataracta Opinio.

Tamen autem recentior de Cataracta Opinio per multa secula viguerit, & ab omnibus recepta fuerit; nihil tamen minus non multis ab hac aetate nova incipit, de ea re sententia, Cataractam scilicet non esse Pelliculam aliquam inter Vitrum & Crystallinum humoribus suboritur, sed ipsam esse Crystallinum, qui temporis tractu opacus ex Morbo redditus transillum radiorum Luminis impedit: ac proinde Chirurgicam operationem in deprimentia Cataracta, haud consistere in deprimente Membrana opaca, quae nequam est, sed potius in ea, quod Crystallini humor opaci redditus: Atque caspide evocatur, deprimiturque in ipsum Vitri humoris fluidum, rursus interius parte Vitri invadente locum ab ipso relictum. Quomodo autem hac Opinio nuper in scholis Medicarum & Philosopharum obdormiverit; de ea tamen meriti non facerem Mariotus libello Nouvelle decouvertes touchant la Veste, Rohaultus tract. physico p. e. c. 35. Gassendus Phys. sect. 3. membr. post. lib. 3. pag. 321. Tom. 2. qui non illam ex Laffineo Chirurgi Parisiensi haussisse videtur: imo quae ipsam Laffineum Garnerus Rolinicus Medicus Germanus hanc eandem sententiam tenuit, ac citat Franciscum Quarenum Medicum & Chirurgum Parisiensem: ne praeferat Blegny in Zodiaco Medicæ Gallicæ, & Petrum Borellum in observat. Publici dumtaxat juris, ut ita dicam, facta est hac Opinio, cum Antonius Maitre-jean Traité des maladies d'oeil, & Dom. Brissau Traité de la Cataracte & de la Glaucoma penitioribus diffinitionibus ornatum & variis Experimentis fulcratum: imo citatus Brissau Regis Scientiarum Academiae anno 1705. publice examinandum illam proposuit. Ad eam autem probandum illud praecipuum Argumentum adduxit, quod in quibus Cataracta atropa est, non videtur nisi per Lentis convexæ: si ergo Cataracta non esset ipsa Pellicula inter Pupillam & Crystallinum pupilla, facta illius deprèsione, Crystallini humoris fovea Luminis refractionis faciens nulla admitteret esse Lentis convexæ: Lentis quippe convexæ requiritur, ut vicem praestet Crystallini jam deprèsio.

At Regis Scientiarum Academiae Sciti propositum infirmum opacum recipere primam valuerunt, ferri ex eo, quid si enim receptum nullum fore pro Vifus Crystallini humoris usum sarendum simul est, quod tamen sperari solum: praeterquam quod pro certa habuerunt quodam esse, qui post deprèsionem Cataractam, est per exiguum temporis intervallum, oblique alio Lentis viderant: quod ne vitaretur Dom. de la Hire scripsit ad probandum in operatione illa Crystallinum humoris nemine deponi, ut patet.

Verum cumque, quoniam anno 1705. moris observantibus nova de Cataracta Opinio à D. Antonio corroboraretur; negotium accuratius expellens, & ventilatum fuit, instituit hinc inde à D. Litte, Mery, Woodhouse, & de la Hire P. tertii experimentis: ac ad eandem revocatum fuit, non numer Apui & Vitrii locum Crystallini deprèsio subteritus, possent & illius, refractantiam vices quousque subire. Sententia igitur non aliam passa, sed pro dubia primam habita postea innotuit se illis differantibus, praesertim à D. Mery, illam evidentem confirmantibus, pro verissima recepta fuit. Imo non tantum necessarium esse usum humoris Crystallini pro refractantia radiorum probatum fuit à D. de la Hire P., qui calculo instituit, de modo à gradum illum refractantis, qui in reliquis Oculi Humoribus, & in concretis Corneae transparentis destiterat, posse sufficere propter à Lentis convexæ ante oculum posita. Quae si vera sit, jam videtur Glaucoma & Cataractam haud duos esse Morbos, quomodo enim ex utroque prius notatum: sed unum Crystallini humoris opacitatem, quam Glaucoma atropi vocatur, esse simul & Cataractam recenter. Nisi forte in Brissau res velis sententiam, qui ait Cataractam esse Morbum humoris Crystallini, non dicitur Glaucoma vero opacitatem humoris Vitrii, morbum profus deprèsionem & infanabilem: opacitas hac Vitrii humoris per intermedium Crystallinum translucens, postea quoque sub forma Corporis glauco seu casu, per Pupillam foramen extrinsecus conficitur, ac quoque pro Cataracta haberi. Sed Argumenta novam de Cataracta Opinionem probantia persequamur.

ARTICULUS 14. Observationes novae de Catarrha sententiam confirmantes.

Prima observatio est D. Briffizi, qui Militis in Stofione Tornacensi dormienti Cataractam, emissa: signis pro vasa hinc, et deorsum, postmodum felle calida, basi Pelliculam albam invenit, sed Crystallinum humorem operam reddidit, sub hinc Pterea deprefit. Hanc observationem variis argumentis et rationibus illustravit Regis Scientiarum Academiae anno 1703. proposuit; sed pro nobis habita preterit d. 4. de la Hère, ut dictum. Machi finis fore observationis: citavit Briffizius, tam in Cataractis, quam in viceribus Hominum: sed elegit, ut ille, cum Aha duram et renuente Cataractam deprefere tentavit, illam in quatuor frustula divisit, quorum duo per Pupillam in Camera anteriore oculi, nempe in spatium inter Iridem et Corneam transierunt; unum tamen Aha in posteriore cameram per Pupillam retransiit: tunc, altera remansit in parte inferiori, et exteriori Iridi, ubi vatericulis conjungitur: quæ observatio manui manifestissime, Crystallinum humorem durum reddidit in quatuor frustula divisiu fuisse, non Pelliculam.

Præter observationem D. Marchallii, Cl. Fagonio Christianissimi Regis Archiatro exhibitam: ut & aliam in oculis D. Baurdelotii ejusdem Regis Medici factam, in quorum una spatium non fuit Crystallinum, sed & Vitreum quoque humorem ad lineam profunditatem occupaverat: quomodo effluere propriè Glaucomæ appellat Briffautus. Præter quoque observationes de Cataractis irregularibus, quas vocat etc. A. c. cum sit illic velut granum Sinapi in medio Pupillæ confusum, cum fluctibus quoque vacillans in humore Vitreo, cum partio Lunaris Crystallini, vel alius tria puncta obscurata essent, & similes. Præter ipsius observationes D. Petitii Medici Namurcensis, Aubertii, quæ aliam, quæ recentior Laurentius Heisterus tradidit de Cataracta, Glaucomate, & Amaurosi. Illis tribus tantum, & quæ minime præterea, quæ recentior, cuius ad publicum rescriptum in subscricto D. Petit Chirurgo Parisiensis, qui in Sacerdotio, Juxaguaris ter degressum Cataractam, ac iterum senex persequens, tandem deprendit illam per foramen Pupillæ, seu ut tempore Summi dilatatum, in anteriorem oculi Cameram pertransiit, non sine Agri dolore, ut à Chirurgo pro Hypogæ habere: falli iniquis in parte inferiori Cornu transiit, Cataractam hanc, & humorem Crystallinum dorem & opacum extraxit, ac D. Mery, aliusque Medici & Chirurgi fecerunt: ipse D. Mery idipsum fateretur in Commentariis Academicis anno 1708. ubi aliam reserit observationem, & à se ipso, & ab aliis factam, novam de Cataracta sententiam confirmantes; id ut quomodo esse prius pro antiquam opinionem acriter pugnavit, postmodum veritate detecta ingressi palamque cedere.

ARTICULUS V. Recentiorum Argumenta ex Causis & Phænomenis Cataractæ desumpta.

Præter adhibitis observationibus et classica Experimenta ad usum de Cataracta Opusculum informatur præposita, præter quorum tandem certatim Recensitiis ex eisdem Morbi Aetiology, nempe ex reclusione Causticorum, quæ aliam præterea esse nata fuit. Et quædam sequentiis aritur Cataractæ ab Oculorum Inflammatione, non quæcumque, sed quæ cum tunc incutere solent, et ardore constantia est, quæque Xerophthalmiam vocatur: Ulteriori Ausa fervens, et Pulvis pyritus, res Fulgur aut Fulmen Oculum saltem sequens Cataractam momento temporis creatum. His autem et in Causis hanc Pulvisque causam in oculo utereturque purgatione, sed potius ex Caloris excelsitate a tunc, Crystallini humoris dissolutionem potius ostendit: quæmadmodum non videmus in exaltatis Animalium Oculis Lentem Crystallinam spacem et absumi redi.

Præter Cataracta à fide nostri iustitæ ex Conuulsione, vel à fide rursus, ex Alapa, vel ex quacunque forti Compressione. Item Epilepticis & Senibus præterire fide: morbo hic. hic autem ratiocinabilis laesum aut ruptum a testimonio Pij atheni, digne Fabriciam, ex quibus componitur Crystallinus humor, aut crassius vel acrimonia humorum ex Epilepticis & Senibus excedenti, tribuitur fuit, quæ cum retentione Pellucida spe æ. Facile enim ex mutata fide in Crystallini, quæ ex impetu Legerum per aliam moram, quædam subiret petet: sic enim videmus in demeritis Animalibus, alba post mortem esse. Quibus fulgorem non fuit auertere, sed Cataractam et in apparet, absque ulla Pellucida generatione, sed tantum ex inordinata materia Crystallini.

*Sua res in hoc præparato opaciorum Recensentes cōstatum ex Phlegmatis, quæ Lini ipsa Crystallina calidi, dicitur ex his quæ ante, in, & post Operationem Chirurgicam observantur. Et quoniam calor lenis Crystallum quæ attinet ear-
re quæ sunt cum colore Castorei. Ubi Crystallum hinc vel minus præparatum calidi opacior reddidit, Aquam autem
humidam calidam quædam dicitur in aqua. Quod opaciorum acquirere, tantum ab eo dicitur in Pellucida eorum contrarietate.*

[illegible]

Quæ in operatione verè & p[ro]p[ri]è ipsam mittant Phasmenæ, p[er]itis recentiorum quàm Antiquorum opinione confirmamur; nam et æque Anaxim. Parm. & facit exp[re]ss[us] Hier. Fabricius ab Aquapendense, quò Antiquorum de Cataliæ opinione p[ro]fiteretur, nequit An Oxalis perforari, ac Cataliæ depressa sit, atque ex quod Crystallini hauri perforatur, & latet. Insuper non illam, quibus depressa est Cataliæ, videretur emittent, & omnino languida veluti mortuam agnoscitur: et defunctum utitur Crystallini; quod si Pellicula tantum expressa esset, antiquum colorem & haurient non amitteret. Diversis Japonum Cataliæ depressa duntaxat, & quidem integra no[n] prius erat: ergo est Crystallini ipsius; nam si Pellicula esset, jam ferret expressa, tunc non effugeret, tunc colorata, & magis perficeri appareret. Ut eadem denique quod de primis quatuor est, et quibus Cataliæ depressa est, ac clare videtur, Lentæ artificiali salis convessa indigere, qua defuncti haurient Crystallini non videntur verari.

ARTICULUS VI. Pro Antiquorum Opinione pugnantium Argumenta solvantur.

Primum Argumentum porrexit D. Litte, qui referens, De Meris, publicè 28. Maji 1707. affectu in Scientiarum Academia Populi forentem classem à Cautraile, sive Petiolia, illius conferentiam à darente, affirmavit ex eo etiam etiam Crystallinum lotentem pressum extraxit fuisse. At Brissius Littirum impetura infirmavit; Oculum cum dolo confusum Aluticum jam præparatum adducit, sibi quæque lamellam humeris Crystallini obducentis posse et parte posita oculi versus Pupillum popelli, ut illi adhaeret, et saltem Cataractam repræsentat. Verum et Litte fides præstetur, Membranis illi Populi obducit, et tique adhaeret, boud per vera Cataracta habenda, quippe qua depresi boud poterit, saltem oblique Iridis laesione: quod de veris Cataractis nemo equivocat.

Secundum Argumentum erit ex testimonio D. de la Hire F. qui testatur se vidisse celeberrimum Medicum Ocularium Anglum D. W. oblitum Cataractam deprimitam, atque cum alijs eisdem deforme, & Pelliculam dentem, albam, elasticam & pertranslucens, ac rugis quibusdam operam Ac deprelli: quod quidem haudquaquam crystallum humeri convenire potest. Respondet Brisseus in hac operatioe sibi non facile fuisse, quemadmodum per se fuisse Antiquis etiam: hic operam fecisset, qui quidem existimare Pelliculam deprimitam, cum crystallum humeri loco inveniret. Verum cum non posset crystallum humeri operam facili deorietem, albidum, & elasticum vim praeferece, quia & plura qualem in illius superficie, ex Acus compressione, posse esse exhibere?

Tertio obijciunt: remanere scilicet in depressione humoris Crystallini, tunc radii incidentes in concavam superficiem humoris Vitrei, pariter ex Refractione divergentes, quam convergere, adeoque in Retina pro visionis opere non avertuntur. Respondet Brisseus foream non relinqui, nam statim ac Crystallinus deprimitur, pariter Vitri illius incutitur, & spissum rubellum invadit.

Quarto obijciunt: si vera esset Recensitiorum de Cataracta Opinio, Antiqui, diligenterque catergoqui Chirurgi, haud quaquam per res faciles latissimas. Verum nemo per res faciles Sanguinis Circulatio laesum, qui nunc nulli non obvia est?

Quinto obijciunt: Crystallinum humor foreum Vitro, & Chorioidae tanquam per Ligamentum Cilare committitur, quomodo possit tam facile, Ac in Oculum immitti, nulla moveri, Crystallinum humorem tenuissimis membranis veluti sacco contineri, qui dissecti facilius est illius depressio, vel verius quancunque plagam chocare.

Sexto opponunt: Ex depressione humoris Crystallini, atque ex mutatione fusi Vitrei, necessarij Vasa quampariter Sanguinem disrumpi debent, adeoque ex illi Sanguis effusus Oculum universum turbaret, quod Visum necessario destrueret. Verum quatuor Vasa in hac Operatione disrumpuntur, quomodo hoc & exiguus fuit & non Sanguinem rubrum, sed Sanguinem similem humorem Oculi circumstant, nulla fieri poterit illorum perturbatio: quod si revera Accu ad Utem Vasa Sanguinea ex Operarii negligentia pertingeret, tunc certe ex Sanguinis effusione oculi Humores turbarentur. Præterquam quod ad eam obijectionem respondere debet & illi, qui Antiquorum sententia, ut patet.

Septimò instat: Si rumpantur Vasa, cuiuscunque fusi speciei, saltem turbari deberet materia humorum oculi, & præcipue Vitrei, in qua major laceratio. Respondenti autem patet, quod etsi aliqua rumpantur, remanere tamen quampariter, ex immensitate quæ Ch. Ruysschii demonstravit, quomodo ex Humore materia peragi possit. In Videribus enim partium omnium, etsi quampariter Vasa lacerantur, quæ remanent tamen laesum vicium subeunt, ut partes nutriantur & consolidentur. Quia si talis fuit in Oculo Vascularum laceratio, turbari revera poterit, non solum Humorem nutritio, sed impediri rationem Luminis transitus: quomodoque quomodo accidit, ut post depressam Cataractam, minimi Visui redierit.

Obijciunt octavo, & ultimo varias Antiquorum observationes, & præcipue Jo: Rhodi, Wepferi, C. Hoffmanni, Thomasi, Brasavoli, Piateri, & aliorum, atque inter Recentiores, Boneti, Nuckii, & Woolbusti ocularii Medici Angli, qui diserte sapientiam citatum Brisseum, tam Rationibus tam Experimentis adhibitis, impugnat. His omnibus observationibus evincere conatur Antiquorum Opinioni Solitatem, Cataractam non esse, nisi Pelliculam aut Crystallinum concretum, nequaquam vero ipsum Crystallinum opacum redditum. At Laurentius Heisterus tract. peculiaris de Cataracta & Glaucomate, postquam laudem A. A. Observationes rectas, respondet illas debitas addidit & incertas, immo ipsissimè falsas & fictitias esse, quippe quæ ab eis infusæ sunt, qui neminem Antiquorum Opinione præoccupatam habebant, adeoque ea se videre credabant, quæ nunquam erant, hoc est Pelliculam deprimitur, cum Crystallinum depellitur. Ad hoc autem in observationibus Antiquorum recipi possunt, ad Recensitiorum Hyperbole evitandam, hæc debent habere Conditiones, ut notat cit. A. 1. ut Cataracta depressa prius fuerit peracta: 2. ut Ager pulchre videret: 3. ut post mortem in oculi dissectione inveniret si membrana depressa: 4. ut humor Crystallinus in suo loco se reperiret: ac 5. ut nulla materia in Oculo se deprehenderet. Sane hæc Conditiones non reperiri: frustra ergo adversus recensitiorum opinionem opponitur.

ARTICULUS VII. Præcipuum Argumentum ex usu Crystallini desumptum expenditur.

Sed Achillei Argumentum humoris, quæ contra Brogem de Cataracta Semaniam præpari solent, illud est, quod desumptum ab Usu Crystallini humoris: quomodo enim valde receptum sit Crystallinum humorem ad Visum sensumque perfectum non minus necessarium esse, quomodo videmus ut, quibus Cataracta depressa est oculi quomodoque nati: qui erit, qui credit pro Cataracta Crystallinum ipsum humorem depressum esse? Imo præsumimus de necessario pro Visum Crystallini esse causam esse, cur haud facile Philisophi & Medici in Recensitiorum de Cataracta Semaniam veniant.

Vorum huius Argumenti vii facili dissolvitur, si neminem Crystallinum humorem ad visumque maxime facere, nequaquam enim ad illum omnino necessarium esse: cum magis necessarius ad visumque esse Vitreum & Aquam humorum, quomodo ipsum Crystallinum ex eo evidens est, quod tempore Crystallini non aboleatur visus, aboleatur vero, si vel Vitreum vel Aquam deficiat humor.

Hæc veritas tandem prius positi exempli Camera obscura, in qua observamus Imaginem in charta depictam à radiis per fenestram foramen transmissam, absque ulla Lente foramini opposita: etsi lateatur Lente opposita, diffinitionem sibi Inaginem perferunt. Insistent insuper exemplum Microscopiorum compositiorum, quorum opus objecta majora videmus adhuc una detota Lente, etsi minus accurati: accuratissimi tamen illa contemplantur omnibus Lenticulis oppositis. Eadem igitur ratione perfectior reddo poterit Visus, admodumque humor Crystallinus, ille tamen armatus, videre quomodo est minus perfecte possimus.

Sed ne negariis vobis proles perspicuum sit, amplius primò oculum Crystallinum secundum naturam prædicam. Supponimus ex Dioptrici, Radios venientes ex puncto objecti, incidentes in Corneæ superficiem, atque in subiectum humorem Aquam, refrangi variis perpendiculariter, adeoque convergere: non in superficie Crystallini ex nova Refractione veritas perpendiculariter facili magis convergere: postmodum quomodo idem Radii in alteram superficiem humoris Crystallini incidenti, novam patiuntur à perpendiculari Refractionem, ex qua magis convergentes, tandem ununtur in fundo oculi, seu Retina ad Visum sensumque evadunt.

Consideramus modo tandem, in qua Cataracta, hoc est Crystallini humoris depressio facta sit, qui scilicet Accu Chirurgi i. sole fuit sit deturbatus: in hac inquam acie turbata, Radios venientes ex puncto objecti, in superfice quidem Corneæ & in subiecto Aquæ humoris refrangi, ut in oculis suis, adeoque convergere: quomodo autem non Crystallinum humorem fuit in loco, sed Vitreum ostendunt, qui Crystallini locum & figuram convexam acquiescent, in hac convexa Vitrei superfice refragentur quomodo Radii variis perpendiculariter, & ad convergentem: Verum quoniam Refractio hæc in Vitreum facta illam aquam non possit: qui subest in Crystallino, (est enim Crystallinus humor Vitro solidior): hinc Radii minus refracti: non tam convergentes ac in suo vultu, adeoque non tantum in fundo Retina ununtur, sed in alterius puncto: hinc Visus confusus. Quod si autem hunc oculum Lenti convexam opponatur, quomodo ex nova in ipse facta Refractione Radii magis convergentes: fieri facile patet, ut hic magis refracti, adeoque magis convergentes, præcis in puncto Retina ununtur ad eundem visum.

Hæc autem adeo vera sunt, ut fieri possit, ex depeffione Crystallini Viliam reddi quomodoque meliorem: Si scilicet quis ex nimia Crystallini convexitate, vel ex exadente oculi humilitate, Myopia laboret, propter nempe quod ex nimia facie in Crystallino Refractione, vel ex nimia oculi humilitate, Radiorum unum fuit, quomodo ad Retinam pertingeret, quare necesse, si in objecta quomodo propius oculi admodum, quomodo in eodem Myopi faciem. Hæc casu Crystallini depressio operari ad perfectiorem visum poterit, immittit enim Radiorum, ob Crystallini deflectionem, Refractionem, eorum hi in alterius fide, nempe præcis in fundo oculi, adeoque Visu evaditque peragitur.

Illuc facile colligere possumus (ut notat cit. Heisterus c. 1.) haud jure decrevisse D. de la Hire, quod si unus tantum fuerit, qui depressa Cataracta simul videtur, hinc inferri necessario debet, nequaquam in Cataracta operatione Crystallinum deprimi. Nem in modo dictum ex Crystallini depeffione, Visus perfecti poterit, qui prius myopice erat: itam quomodoque pro Visu impeditur Crystallinus: enim transperans sit reputandus, si scilicet nimium convexus sit.

Ad rem quomodo facit elegit Ch. Hugenii enunciationem, qui Dioptrici prop. 31. exponit modum Oculum construendi absque Crystallino, quod & diffinitè Visu peragi possit. Fiat hemisphericum pelliculum, quod refractum partem anteriorem

Oculi, fundum vero ejusdem repræsentetur ab altero hemisphærio priori opposito, quod habet idem centrum cum priori, sed illius semidiameter tripla sit semidiametri prioris: ita denique cavitas utriusque hemisphærii aqua repletur. Hoc patet iuxta regulas Dioptricæ. Radius veniens ex puncto objecti, refracti in superficie anteriori hemisphærii, erudit in uno puncto hemisphærii posterioris: quemadmodum et radius veniens ex alio puncto circumprimam positus, eadem ratione refracti in superficie anteriori hemisphærii, coincidunt in eodem puncto hemisphærii posterioris circa primum punctum posita: quod et distinctius fiet, si spatium utriusque hemisphærii cavitate conjungatur et apertum relinquatur: sed aliquid ratione carbitur, restitit tantum inter ea cavitate foramine. Vides igitur in hac machina Hugenii, quomodo oculi, qui sola Cornua, Papillæ, et Fundo aquei substantia repleto confertur, ad Visionem sufficiens esse possit, nulla adhibitis Crystallinis, imò nec Vitæ humore: hemisphærium enim anteriori et minus Cornuam repræsentat; foramen cavitate conjungitur, Papillam; aquei hemisphærium majus et posterius oculi fundum exhibet.

Hanc machinam hugenianam corrigere tentavit Jo. Henricus Mullerus, ut scilicet apta esse posset ad radios colligendos; nam ex objectis remotis, tum proximi provenientes, usque in fundum præcis Oculi excipienda: ingeniosum est Machinamentum, quod videre est apud Heisterum loco citato num. 51. et seqq.. Verum hic necandum quod accuratè notat Cl. Hugenius, non ex eo quod simpliciter videatur huius oculi, esse eorum præsertim oculi ad sapientissimum Rorem Condere creari; nam sua Machina multa habet incommoda, quæ ipse recenset, præcipue quod basæ apud moveri possit in Orbem effusa, ubi Oculi collocatus est: quibus incommodis evitandis item est à D. O. M. verius Oculum complende humorebus; quorum opæ refractio Radiorum ad Visionem necessariam peragi possit. Sed hæc minime.

Adi autem mentis Cl. D. de la Hire infunderat Sententia de necessitate Crystallini ad Visionem, ac proinde in Cataracta depresso Crystallinum non deprimi; ut obiectisbus necessitatem Perspicillorum illi, quibus Cataracta depressa est, respondere, Perspicillum in usum esse ad emendandum aliquod vitium humoris Aquei, qui fortasse et morbum turbidum reddidisset, adeoque minus aptum ad tantum numerum radiorum excipiendum, quorum ad visionem requiritur; Perspicilli autem opem quæ majorem numero Radii colliguntur, sit ut ipsi illius analitice perspicillorum reddatur. At repetit Brissius, turbulentiæ huius humoris Aquei falsi adstrui, quod nulla sit, imò si illius aliquo modo adprebentur Chirurgi, Cataractam deprimore minime aggrediantur. Præterquam quod si radii Luminis transitum non invocant ex eo, quod Aquei humor turbidus existit, basæ apparet quid opus perspicillorum certum Perspicilli, cuiusqueque constructur figura: Perspicilli enim utitur, non tam ut plures radios excipiamus, quam ut collecti in fundo Oculi distincti colligamus.

Urget citatus de la Hire Crystallini humoris ad Visionem necessitatem etiam ex eo, quod summè difficile sit Crystallinum Aculocomovere, (ut in oculi huius ipse ostendit) quem ab Aquei humoris, et magis à Vitæ immixtioni subsistit in fundum: idem oblique lesione remissionem. Membrana, quæ Crystallinum ipse circumæquitur. Atque huius Membrana lesione fieri possit, ut quædam immo diu post operationem, per eam hominem existentem radii Luminis transire, ac vitæ opem promovere; atque temporis tractu aliquantulum corrumpi, radiorum transitum impediens sit, adeoque qui semel post Cataractam depresso videretur, possit deinceps amplius non videre. Verum respondent contraria Sententia fautores, operationis difficultatem in qua de la Hire ostendit, non esse nisi in oculi suo, cuius Crystallinum ab intrinsecum Aculi cum minime potest; sed cum jam et in oculis aliis sit: itane enim facili facit cum sua Membrana arripitur, et verius infundum Oculi sedem detrahatur.

Quæquam denique sua firmior habet Opinioni D. de la Hire, Cl. tamen ejus Filius, qui Patris prius à digne, cum 1708, ingens assu fuit, Crystallini humoris nullam esse per Visionem omnimodam necessitatem; non quoniam humor Firmus (ut innuitur quoque Des-Cartes) eadem gaudens refractive ac Aquei, poterat Radii per huius humoris transire, veluti per sphaeram aqua plenum, post fundum oculi colligi: accidentem autem majori convenientia Cornu transperire, et nova refractive Crystallini, tunc radii exiit in Retina colligere: quid mirum ergo si vitæ et depresso Crystallino, Lens vitæ acule opposita, vitæ oculi præstet, et radii in eadem Retina eorum faciat?

ARTICULUS VIII. Nostra de Cataracta & Glaucomate Opinio.

Ut verum faciat, et est observandum, aquei Argumentum evidentiæ et vii, ad recurrendum de Cataracta & Glaucomate apertum conspiciendum, ut in illam tandem esse sententiam facile iudicaverim. At tametsi credam observationem accuratissimam sua eorum numerum concurrere, ad probandum in operatione Cataractæ Crystallinum deprimi, non Pelliculam aquei humoris ingenuam; alitè tamen minus basæ credo impossibile esse, ut in ipso inter Papillam et Crystallinum humoris, necnon Corpus aquei radii Luminis intercepti generetur, quod vera sit Antiquorum Cataractæ, Morbus ab eorum Glaucomate, seu opacitate Crystallini, etiam diversus. Quid enim vobis quin particula, ex quibus Aquei humor in eo spatio contentus consistit, movetur acquirat, et irregulari sum, ut que in eorum Corpus evadant, ac transitum radii Luminis, quem prius permittit, impediunt? Vbi quæ vitæ quin particula nativitate; quæ ipsi humoris Aquei adhibetur, à naturali figura, motu et magnitudine degenerat, simul coarctatur, Corpus apertum et huius creari, et Cataractam Antiquorum producere? Quamvis enim etiam similibus ex causis Crystallini humor, vel vitæ vel ex parte opaci radii posset; ita quæ et Aquei humor, et Vitæ; et quæcumque transparenti Corpus transparentiam suam amittere poterit.

Quæ si vera sit, est facile credendum: tunc existimamus Cataractam frequentissimè non esse nisi verum Glaucoma, h. e. opacitatem humoris Crystallini; non ex hoc tamen vera Cataracta, seu generatim Pellicula opaca ante Crystallinum, i. Morbum censui omnino expugnanda vii: præsertim quoniam illam non solum possibilem ex superioribus illis creditur; verum etiam existimari illam fortasse existisse, quoniam non desunt observationes eandem asserentes. Et præter Observationem D. Linte, de qua supra, illustris est quam recenset Bonetus in Sepu lebreto Anatomico de Oculorum affectibus, Obs. 22. ubi ait in oculis Cataracta ab eo ante à Chirurgo Battelli defossa, internum fuisse foramen Vitæ Mæque quodam obstruam, et obstruam Crystallini humoris Pelliculam causam eorum et lucidam, humoris vero Crystallinum, Aqueum, et Vitæ omni labie tumens depresso obstruam.

Quoniam autem basæ de possibilibus Medicina traditur, sed de illi qui accidere solent; per huius Quæstionem resistentem, observationibus in Antiquorum oculis illustris omni in fundum esse puto, ut quid recedat sui potius notemus, quoniam quid fieri possit. Argumenta enim possibilia pro altera Sententia allata, suas patientes dissolvunt. Nam si pro Antiquis dixeris, quoniam post Cataractam depresso videtur: Respondet Materies, ex eo non probari Crystallinum minime depresso esse; necnon, ut prius dictum, Crystallini remota ad perspicuum visionem acci quælibet possit. Præterquam quod si quibus super Cataractam depresso est, si quæ uno tempore videtur, satis consue videtur, esse magnum quid fieri videtur videtur, quippe qui ex Cataracta tremulis in aliquam Lucem transierit.

Si verò pro Neotericis obijciatur necessitatem Lensi Crystallini illi, quibus Cataracta depressa est; Respondere possum, qui pro Antiquis pugnavit, non in la inferri depresso de Crystallinum humoris, sed tantum mutatum esse illius figuram: anem fieri facile potest, ut non vera Cataracta seu Pellicula opaca generetur, si hæc superficies Crystallini adharere atque incumbar, post huius figuræ ex compressione et adhæsi immutetur, itum Crystallini humoris superficies minus convexa reddatur. Hinc fieri necesse debet, ut etiam depresso Pellicula opaca ante Crystallinum resisteret, non posse huius videre aliquid Lens, quæ sua convenientia deiciat Crystallinum convenienti supplementum præstat. Non valet igitur Argumentum à necessitate Lensi Crystallini derivatum, ad probandum Crystallinum humoris in operatione depresso fuisse: Quoniam igitur observationibus in Cadaveribus facilis fundum est.

ARTICULUS IX. Differentiæ, Causæ, Signa, & Curatio Cataractæ & Glaucomatæ.

Immensæ Cataractæ Differentiæ invenies apud Antiquos: præcipue autem sunt quæ ad majorem vel minorem opacitatem humoris Crystallini, aut si majori vel minori crassitie Pelliculæ opacæ ascriptionem: quæ quidem ad Curationem faciunt. Distinguantur itaque Chirurgi inter Incipientem & Immatram Cataractam, atque Confirmatam & Matasam. Matasam vocant, quæ totam soliditatem acquisivit, ut vim Acus sustinere facile possit; Immatram vero quæ quom soliditas non sit, potest ab Acu laevari prius quam deprimi. Alia Cataractæ Differentiæ desumuntur à Colore, à Tempore aliquando à Jussu præfatus negotiorum Oculis.

Quand Causam Cataractæ, missam facimus Antiquorum opinionem repudians, Cataractam gigni ex Vaporibus à Ventriculo elevatis, ac in oculo condensari: immo; tantum Scurrimus Josephi de la Charrière, qui ait Cataractam formari à Lamella humoris Crystallini, ab aliis Lamellis (ea multi enim Lamellis sibi mutuo incumbendis consistere ait Crystallinum humoris) sedente atque opacæ redditæ, dein in Aquæ humoris fluiditate: atque hinc factum esse putat, ut mutata Crystallini figura, post depressionem Cataractæ, Visus summi hebetetur. Hanc autem ingenuè Hypothesin refutat Heisterus num. 83. notans, illam Causam dissolvendi minimè comprobari, Matasam hanc faciliè assiluisse a Jussu decessere posse, saltem alijsque dispositionibus Membranæ Araneæ, & alijsque re, quæ aspera remanent superficia humoris Crystallini, unde Læta colla elidit est; quod quidem necessarium pariter Visui immedietatem.

Causam igitur genuinam Cataractæ existimamus eam, cujus vi Crystallini humoris opacitas gigni potest; hac autem est vel ræpiæ aut obstruere Vasculorum, vel concretio Humoris per illa trajecti; ita ut mutata correfpondentiæ porum, impediatur transitus radiorum Luminis. Corpora enim Transparentia sunt, quæ poris habent non quidem rectos, ut notas Des Cartes, sed rectis æquivalentes, ut scilicet per illos Luminis radii trajici possint: si ergo vel obstruatur, vel omnino destruantur Vascula Crystallini, aut quævisque in casus Humoris per ærescentes concretæ, mutata porum dispositione, transparentia peribit, & Cataracta erit.

Hinc Causæ remotæ Cataractæ erunt, vel quæ calorem & exsiccationem in oculo vehementer pariant, unde Vasorum contractio & obstruatur; vel quæ circulationem Liquidorum in Crystallino impediunt possunt. Unde patet non solum Aciditatem esse remotam Cataractæ causam, ut putabat Antiquus Maître Jean; non Crystallini humoris opacitatem acquiri, non solum ex immerfione in acidum Liquidum, sed & in Aquam fervidam, spiritum Vitis, spiritum Salis Armoniaci, Oleum Tartari, Muriam &c.

Signa Diagnostica incipientis Cataractæ sunt, si Ager veluti per fumum vel nebulam videre fateatur, si quandoque filamenta quadam, vel muscæ volutantes, quæ nequam sunt, ante oculo observari refrat: insuper Papilla color ex nigro ad alium colorem vergere incipit. Quod magis autem color hic ad glaucum, caruleum vel castum accedat, atque opaci corporis speciem referat, in Cataracta ad maturitatem magis accedere dicitur, quo tempore si vii matura glauis à suo calyce facili dimoveri potest. Signa Glaucomatæ propriè dicti juxta sententiam Briffet erunt: si Opacitas præfatus retro Papillam conspicitur, in hoc signo Vitæ humoris, qui in vitæ Glaucomatæ opacis rediatur: item si pater quidem cum opacitate conspiciatur in Papilla observetur.

Fallam Cataractam, seu Corpus opacum seramini Uveæ adhærens deprehendimus ex abalio nota Papilla. Difficile sanè est, ut dicam impossibile, ante Operationem judicare: non in Cataracta sibi humor Crystallinus opacum redditum, an vero Corpus aliud opacum. Illud pro argumentis habent, sed pericula Operationum; si utrumque bene: hinc Crystallini quæ habet, signum est ei depresso esse Crystallinum; si alijsque Lætiis videtur, Corpus opacum, quod Oculum obstruatur deprehendimus esse argum. Per viam quam supra notatum sit, post Crystallini figuram ab adhærente Corpore opacum separari, poterit quis Lætiis necessitatem habere, erit non Crystallinum, sed Corpus aliud opacum depresso fuerit.

Quand Prognosticum hujus Morbi attinet, illud primo notandum Glaucoma, seu opacitatem Vitæ, esse propter insanabilem, Crystallini vero opacitatem, seu Cataractam Recurivum, non posse nisi Chirurgicæ Operatione, h. e. depresso sanari. Recens & immatura Cataracta faciliem curacionem non scepit, quod tempore Acus vim difficulter ferat. Palli vestigia nec etiam Operatione curari solent, ab alijs mala in oculo ex tempore diuturnitate indoluit. Vitæ & Papilla a humoribus facili deprimi potest. Nec Pueri nec valde Senes Operationem ferunt. Et Corpus infirmum, vel ex Chirurgi erroris solum Exbori & Inflammatione Oculi supervenire.

De Curatione denique Cataractæ præstat nihil, quod pueri dicere. Sufficit tantum animadvertere, Cataractam nullis Medicamentis, sive internis sive externis, curari posse; si curabilis sit, sola Acus Operatione curabitur. Ingeniosum est, quod proponit Dom. Mery, per scissam in parte inferiore cornuam transparentem, Crystallinum opacum, per Papillam foramen prius transmissum, extra oculum educere, ut in Sacerdos quidem solum fuisse prius maxime: verum quomodo trajectis Crystallini per Papillam in Cavum anteriorem oculi faciendæ sit, non clare explicat, est immo Papilla foramen facile dilatabile esse. De vulgari autem Acus Operatione, & de requisitis ad eam, præter immaturam, præcipitur Laur. Heisterus cit. tract. de Cataractæ & Glaucomatæ à num. 93. ad finem usque, qui accuratè sunt est. quicquid dixerint Woulhusius & Ephemeridum Gallicarum Collectores, adnotat quæ idem Heisterus anno 1717. Apologism & Incantationem Systematis illustracionem publici juris fecit. Et hac de Cataracta & Glaucomatæ.

MEMBRUM IV.

De Vitio Nerv. Optici.

PUNCTUM I.

De Gutta Serena.

Vitæ etiam Visio, quando, licet rectè radii visivi extrinsecus illapsi pertingant per totum oculum atque ad Tunicum Retinæ, tamque feriant, nulla verò sequatur Visio, utat nulla apertæ aut sensibiles in oculo appareat Læsiō aut alteratio, tunc vitium hoc dicitur Græcis Amaurosis (L), Latinis Gutta Serena, Germanis der blinde Nacht.

(L) Amaurosis Amplexioni obscuratio: ab amplexi obscurus: per metaphoram significat hebetationem, & obtusorem. Patet vel nihil differi ab Amblyopia à μβλπωσις Visus obtusus, seu hebes uiderem acies: ab μβλπωσις, obtusus, hebes, & ὀφθαλμος Oculus.

Stas, sive Cataracta Nigra, & est omnimoda Cæcitas, uti usitata in specie vocatur.

CAUSÆ.

Cæcitatē hujus Causa querenda est sed semper, cum præsupponitur oculus saluus, vel in Nerv. Optico, vel eius Expansione, quæ Tunica Retinæ consistit. In Nerv. Optico quidem contingit Gutta Serena, quando hic vel obstruitur, vel comprimatur, vel alio modo læditur, tam circa radicem, quam progressum, ita ut impediatur propter spizium Animalium induratum & transiens, unde necessitas Causarū supervenit: vid. BARTISCH AUGENDIENST Part. 6. cap. 1. LOSSIUS lib. 2. obs. 17. PLATERUS obs. pag. 108. & 100. & RIVERIUS Pr. lib. 2. cap. 2. quibus à SCULTETO obs. 16. etiam Castaleferia dicta.

discolorum Nervorum accenditur. Sic Guttam Serenam à Tumore globoso in Cerebro, Nervos Opticos prementem, provenientem notat PLATERUS lib. 1. *observ.* pag. 105. non minus se PAW *observ. Anatom.* 3. (quæ additæ sunt BARTHOLINI *observatibus*) notat Cæcitatem ex improvise ortam in Diabetica, ob venicam ingentem Aquæ, empyra pteos circa conjunctionem Nervorum Opticorum insertam. Stertutatio nimis etiam Cæcitatem inducit auctor HILDANO *Capit. 1. observ.* 24. vid. etiam M. A. N. C. *Ann. 1. Obs. 71. pag. 574.* A fortiori Cerebri commotione, v. g. post casum, observavit HILDANUS *Capit. 5. observ.* 1. ab Alapa ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. *Prax. Admir. Observ.* 31. et AMATUS LUSITANUS *Capit. 7. observat.* lib. 44. Pariter interdum post alia morbos plura minus acutus curatus supervenit talis Gutta Serena, nunc per Metastasin, nunc alio modo commota causa materiali occasionali, obstruente vel vitante Nervum Opticum: Sic enim ex febris scorbutica retrospice Cæcitatem observat SENNERTUS lib. 3. *Prax.* pag. 216. item ex febris Naria ex Nucha Guttam Serenam observavit HORSTIUS in *observ.* pag. 574. item ex Ulcere Pedis impetive clauso similem Guttam Serenam notat TIMÆUS *non Goldentke lib. 2. Cap. 18. pag. 60.* ex usu decocti Guajaci in Lue Venerea, non peragato Corpore, Amussiofa notat HEINRICUS ab HEER *Observ.* 4. non lecus se RHODIUS ab impetive Induritie notat *Capit. 1. Obs. 37.* à Venæsectione FONTANUS *Exempl.* 50. f. 48. ex Veneno TULPIUS lib. 1. *Obs. 32.* à Purgatione fortiori AMMANUS *Med. Crit. lib. 79. pag. 530.* &c. Ubi nulla alia hujus Phænomeni potest inveniri causa, nisi quod lædatur eandem Nervus Opticus, & vel obstruatur vel comprimatur. Aliis curiosis est, quod refert BARTHOLINUS *Capit. 3. Epist. pag. 275.* de Monacho, qui quoties Barbam ralerit, Vigiliam amisit, quando de ea iterum eret, Vigiliam recuperavit: quod fuit factum vitio Nervi Optici quocunque modo lesi.

Sed præter Nervum hunc Opticum vitiatum interdum etiam hujus Nervus *Alapa* membranacea in Retinam oculi, quæ Tunica Retinæ consistit, interdum causa primaria est Guttæ Serenæ, quando nempe hujus Tonæ, Tunica retinæ nimirum, & legitima Tunica, quæ fortiter expansa in oculo à quovis visuum radiorum, illapso moveatur. Unde si hæc ipsa Membrana reddatur vel Paralytica, & debet in debito Tono, vel quando laxatur Fibra, & vel contrahitur, vel laceratur, vel alio modo remittitur à debito Tono, relaxetur, & ita flaccida ac mollihuscula evadat, ita ut non sit fortis, aut etiam à nullo ipsis visum moveatur, necessario omnino Cæcitas plura minus interpres sequitur.

Quod etiam facit, quando ex Causis Internis, forte perculsione oculi, vel ex casu in occiput, vel ex forti fluctuatione (vid. HILDANUS *Capit. 2. observ.* 24.) aut etiam ex nigro nimio Epileptico, laceratur quasi, aut alia etiam ratione vitatur Membrana Tunica Retinæ, hinc observatum, post Epilepsiam gravem Cæcitatem inturabilem ortam fuisse, quatenus nempe à nimis convolutionibus Tunica Retinæ plus minus lacerata vel lesa Guttam Serenam infert. Porro ad istas causas, quæ possunt inferre læsionem tunice Retinæ, & inde Guttam Serenam, accendendus venit obiecti nimis splendens, v. g. Solis, diutius nimis aspectus, aut etiam diuturnior & continuatus Lunæ Plenæ aspectus, cuius exemplum habet HEINRICUS ab HEER *loc. cit.* item SALMUTH *not. 2. Ap. 83.* quatenus ab horum radiis violenter impressis, præter nimium valent motum Fibra ipsius Tunica relaxatur, & quasi Paralytica evadit, unde Gutta Serena.

Quo etiam facit, quod ex Bombardatione horribili coruscatione & impetu Visus sine externa nota subito amittitur, teste SCHENCKIO in *obs. Quædam* facit, si ea percussione oculi, ex casu in occiput vicietur humilior Membrana, ex unde debet Visus. Pertinere hæc videntur convolutiones, quæ subinde in cæcitatem terminale visæ sunt, item Epilepsia item Dolores Colicæ. PLATERUS nempe lib. 1. *observ.* pag. 105. observat Dolores Colicæ cum convolutione & cæcitate quotannis recurrentes; Reth *obs. pag. 105.* & 102. alia Exemplis referre eiusmodi cæcitatem post convolutiones naturam, non lecus ac SCHENCKIUS in *obs. de Colicæ* Dolores extracram mulierem refert: Sic MFLDANUS *not. 3. obs. 3.* Cæcitatem ortam refert post curatam Epilepsiam per Vomitus. Hæc in specie ad Guttam Serenam disponetes fuerunt cause. In genere observandum nil magis nocere oculis, quam nimium *Visum* Excessivum, adeo, ut huius solius occasione quidam Gutta Serena affectus meminerim.

Sunt porò, quorum oculi ex Idiocyralia à quibusdam *Assumptis* oculis alterantur. Novi Virum, qui ex Variolis à Patetia oculis habet debiliores, quæ, quoties Cancro comedit fluviatilis, toties exasperantur Pathemata oculorum: id quod & ex Millio ipsi evenit: Sic alium novum Virum, ex Cancris idem malum contraxit: à Aristoteli novum, qui ex Vegetabilium acrimis, Armoraciz, Cochleariz, Snapi, &c. abusu notabile oculorum hebetudinem incurrit: hinc committitur sæpe oculis hostiles dicuntur: Novi Virum jam senescentem Vertiginosum, qui ex usu spiritus Salis Ammoniaci notabilem Visus hebetudinem percipit.

Singularem Guttam Serenam *Gruvidi* solentem, quæ statim ab Impregnatione invadit, & ad aliquot menses, imo per totum gestationis tempus, molesta est, & post Partum sponte remittit, videbimus in BARTISCH AUGENDIENST; qualem etiam idem, quæ Mensum suppressione laborant, evenire, neque, nisi his restitutis, evanescere solent.

DIAGNOSIS.

Cæterum Guttam Serenam in Cæcitate adesse, non semper manifestum est; nam possunt etiam oculis oculi vicia Cæcitatem inferre. Hinc ut viti Retinæ conjecturam probabilem hauriamus, attendatur: quando nullo visio sensu aut notabili in oculo præfente, Homo nihilominus cæcus evadit, & quidem cæcitas illa si fit paulatim, suspicio est, quod ea vicio partium quarundam in oculo non apparente fiat Cæcitas: quæ vero confestim fit, aut breviter his incrementa caput, extra sensum læsionem, ex vicio Nervi Optici quod fiat, probabilissimum est, si præcederit læsio Cerebri aut Capitis, Nervos plus minus afficiens. Alias quæ de Amplitudine, Dilatatione Pupille &c. profertur indicia, ferè fallacia sunt, quibus solis non fidendum, dicit PLATERUS in *Praxi*. Dicunt enim, si sciando oculum unum, & alterum comprime, in Pupilla ejus, qui fricatur, appareat dilatatio & confusio, Nervum Opticum esse sanum; spiritumque liberum habere commentum, atque tunc cæteris paribus visum hærere in tunica Retinæ, vel in alio oculi loco. Si nullo planè sit dilatatio, viciatum esse Nervum Opticum; nam Amplitudinem Pupille etiam in Homines sanis, ad loca sepebrosos & convalescentes, naturaliter datur, in calu vero allabentis Luminis excellentioris Pupillam ardua contrahit, ne oculis minus radiorum ubertate obstruat, certissimum est. Parva libet error quod dilatationem; nam dum *Agger* luci obvertitur, ut Pupilla tanto clarior videri possit, Pupilla identidem ad Luminis exitum constrict, quod etiam citius à no accidet.

PROGNOSIS.

Quod Prognosis: tenet naturaliter quoad Visum habentem, & interdum ea relaxata Tunica Retinæ omnino cæcantur, unde Gutta Serena laborantes non restituntur, sive dependeat eadem ex vicio Nervi Optici, vel Retinæ.

In genere enim *viciis Guttæ Serenæ diffinitur curatur*, in specio quæ subit fit, exim. grat. ob sortem Capitis Palsiam, aut calum ab alto, quæ equalis affectus est talis, ut remedia, antequam ad oculos penetrare, suam vim amittant.

Difficilis etiam Curationis est Gutta Serena, quæ fit à Tumore, qualem PLATERUS *Observ.* pag. 108. describit; à Nervorum laceratione, eorumdem labes, quæ Visum penitus abolet, utut hæc, modò causa mobilis fuerit, interdum curatam PLATERUS *loc. cit.* pag. 110. testatur. In imperfecta vero Gutta Serena major salutis spes est, videb. BARTISCH *loc. cit.* in *prof. de cap. 3.* RIVERRIUS *loc. cit.*

CURATIO.

Sicet quicumque oculorum affectus cura difficilis erit, ob nimiam nempe Organi sensibilitatem & delicatam structuram, ita per cæteros Guttæ Serenæ perquam difficultatutur, sive per hanc Tunica Retinæ, sive Nervi Optici vicio accidat, perinde est. Si tamen adit Cæcitas ex Guttæ Serenæ, curans ea partim Internis, partim Extarnis. Internæ quidem conveniunt Evacuatio per sudorem & Aluum, & Alimentatio, quæ per expunctionem *Visum* confortare, tam internis quam externis, hæcenus observata fuerunt. Interim *Visus* equisquis lumineper necessaria est. De cætero quoad Remedia Evacuatio, *Remedia* curæ

ulserunt, cum HILDANUS Centur. 5. Observat. 19. refert, exhibito Vomitorio ægrum Visum amisisse, ejusdemque beneficio eundem recuperare; sicut idem Centur. 5. Observat. 5. post curatam Epilepsiam per vomitum cecitatem ortam esse referre. Tutius ergo est, *Alvum stimulare* per inferiora, cum alvi profluvio relictus interdum observari sine oculi. Quæ Alvum evacuant, temperata sint; utut enim à veteribus Pilulæ Laciæ, ut vocant, & quidem majorem pro senibus, & minores pro juvenibus, prescribi soleant, minis tamen ipsæ fidendum est, cum sciamoniacis & quæcumque purgantia acris in oculorum affectibus magis nocent, quam prodest, secundum PANAROLLUM *Pæne. 4. Observat. 9.* Magis ergo temperata, & minis resinosa, sed moderatè acris ulserunt, *Pilula Alopathica* singulis Nocturnis ad 3℔. assumptæ, & deinde continuatæ, ad oculos nebulosus mirè commutavit. Aliis etiam *Jusculum Senæ* & *Agaricæ* cum Sale Tartari in Aqua Euphrasie & Fœniculi per purgatione in oculorum affectibus adhibetur; aut *Alula ex Extrado Panchymagoy* cum Oleo destillato Fœniculi sobadze conveniunt. *Hermesdystilum* genio totum *Pulvis singulariter* etiam ad oculorum affectus pro scopo purgante laudatur à THEODATO in *Valent. pag. 153.* Potest etiam fieri *Vinum Medicatum* alterativum & laxativum ita:

℞. Herb. Euphras. M. i.

Flor. Betulæ.

Calceatrop.

Cynul ana P. ii.

Sol. Senæ fœc. 3℔.

Rad. Helleb. nig.

℞℥℥. prop. ana 3℔.

Sem. Fœnicul.

Cubebæ.

Cardam. ana 3℔.

Sal Tartari 3℔.

Incis. & contul. includ. Nodolo:

D. 5.

Nodulus Laativus ad oculos.

Infundatur in Vinum, hocque hauriat æger mane, & vespere cum cubito eundem est; & sanè huiusmodi Noduli ad Gutta Serenam non contemnendi sunt. Moderata ergo fuit laativa ad Gutta Serenam.

Inter *Judiciora* excellunt, quæ ex Lignis parantur, & imprimis Salsifraga conveniunt. De cætero inter *alterantia* appropriata *aromatica* blandè oleosa, & nonnihil smata, oculis singulariter conveniunt: sed *arica* & *ulastilia* manifesta, v. g. Lepa, & quæcumque Althæa, Armeria, spiritus Salis Ammoniaci etiam, inserti oculis nocent, & sic novi viros, qui quoties Armeria utuntur, semper in obscuritatem Visus occidunt: hinc cum aliquando eundem Sam adhuc Veneris & Vinum indulgetis, & alius affectibus Nervorum, & oculorum affectibus obnoxio, ordinalem cum aliis spiritum Salis Ammoniaci, ea hoc maximum percipit Circutatis periculum, utut alias hoc remedium sit infans. Cæterum palmam ducit *Euphrasia*, indeque parata *Cæferia*, *Vinum Euphrasiale*, *Essentia Euphrasie* & similia, quæ ab omnibus Practicis laudata sunt. GARFICHOVERUS Centur. 3. Curat. 100. non sufficienter commendare potest Euphrasiam. Post Euphrasiam est *Valeriana*, cuius Radix, mirè laudata TABERNÆMONTANO. *ubi de Valeriana*, ad Visus restauracionem. Post hæc *Chelidonium* maxis singularissimum est Ophthalmicum, item *Lævisium* ac *Fœniculum*, omniaque horum præparata, hinc etiam *Lignum Salsifragæ*, omniaque *Salsifragæ*, Fœniculi odorem spirantia, egregia sunt virtutis ophthalmicæ in Gutta Serena: unde etiam Lignum Salsifragæ ad Nycturam admodum commendat FERDINANDUS in *Hist. Med. Marit. pag. 3.* Porò hæc adduntur *Racca Janiperi*, & omnia ex his parata, Cæferia Benedicthi, Ruta, Semina quatuor calida matura, Helicium, Rosmarinus, & omnia ex Rentermarino parata, oculis & cecitatis optimè conducunt, & quibus spiritus, Essentia, Visa Medica, etc. parari possunt.

Hinc conveniunt *Noduli* ex huiusmodi simplicibus Vino infusis, in & ante pulvis subinde hauriendi, quorum descriptioes videb. in *Centur. 3. KESLERI Præfatum pag. 69.* & HARTMANNI *Præf. Glysmat. cap. 15. §. 2. pag. 94.* ubi Vinum Medicatum prolat, cuius usus admodum in heretudine Visus commendat. Simili ratione parantur etiam *Essentia Ophthalmicæ* ad iocra, qualis fuit D. MICHAELIS, similes ea species paratæ. Vinum Emulatum & Rosmarini etiam oculis confortare dicuntur.

Facit hinc *Pulvis* pro conservacione Visus laudatus:

℞. Herb. Betulæ.

Ruta,

Chelid. maj.

Euphras.

Lævis.

Sem. Anisi.

Rad. Lævis.

Valerian.

Cinnamon. ana 3℔.

Cardam.

Zingib.

Galang.

Sem. Fœnic.

Parafel.

Silic. mont.

Herb. Origani ana 3℔.

Racch. 3℔.

Ex quibus f. *Pulvis*, qui aliquandò ante pulvis & in pulvis sumatur.

Serenissimus *Eleftr. Fridericus* magnificè Pulverem hunc, qui Visum relictus uni, per septem annos cæco, postquam eo usus est quindæm dierum spatio.

Elisæus de Semibus ad Visus imbecillitatem simplicem, sed efficacissimam, usus olim INNOCENTIUS III. ex Semine Fœniculi, Sileris montani, Apii, Anethi, & Petroselinæ, cum Melle, quo vircuto centum annorum Visum amissum restitutum fuisse dicitur, quod ex manuscriptis antiquis *Serenis. Principis Mantuani* 1448. adducitur: Vid. VELSCHIUS *Militem. Centur. 3. Observat. 97.* SOL. E. NANDER *Sallian. 2. Cmsl. 9.* ad imbecillitatem Visus mirè commendat hunc Pulverem:

℞. Sterc. Falcon. fœc. 3℔.

Sem. Fœnic. 3℔.

Subtilissimè trita miculantur, & partim quotidie insuper incernit, partim tantillum caligantibus Oculis impoedendum.

Hinc & Quinta Essentia Rosmarini, & Quinta Essentia Fœniculi, pro Visu corroborando, pluribus in usus sunt.

Excellunt etiam ex *Regno Animalia* *Fœniculi* quævis parata remedia, quæ ad roborandum Visum internè mirè conducunt, uti Aqua Magnanimatatis, item Lumbicalia, & tandem ex Millepedibus parata. Nam quantum valde ex Millepedibus Vinum infusum ad Visum restituendum & insalutem curandum, de quo omni mane assumatur haustus. Huius rei singularia exempla refert BOYLE in *Philosophia Experimentalis* pag. 154. & 155. ubi observat, quid Mulier Cataracta confirmata unus oculi detenta, per unum Millepedum, adidendo ad pæneo numero ad numerum majorem usque ad 60. cum Vino albo assidendo singula mane, periclitè curata fuerit, & insensibile: sicuti etiam alia curata sunt & insensibile utrinque oculi, qui ipsi etiam Millepedes interno usu ad alia oculorum vitia erunt profecti.

In Gutta Serena à solo spiritum *Opticum deficiit*, propter evacuationes nimias, e. gr. Venæ nimis etc. dissipatum, sola alimenta euepea & aromatica analeptica conveniunt; conf. PANAROLLUS *Pæne. 3. Observat. 46.* Sicuti alia cum hætemadictis, ritè & prudenter administratis, Dieta tenuis observanda, vitando simul alimenta crassiora & flatulenta, quatenus RIV ERIUS *Observ. 29.* à FOMIO *Artemis. testat.* Gutta Serenam casu per Inediam solutam fuisse.

Hinc Internis etiam adenda sunt *Euxina*: quæ inter ad oculos sanos confirmandos & præservandos, debiles verbò restituendos, multum convenit Ros Marialis, Plantis Ophthalmicis, & speciatim Fœniculo, insidens, oculis his de die instillatis & crebrius usurpatis. His, qui Lucubrationibus nocturnis oculis nocere, convenit liquor *Fœniculi saccharatus Barbolæ*, quem dedi in *Collig. Pharmacat. in Sphæderi Pharm. ubi de Fœniculo*. Sic etiam *Juscula Antimonialia* prostant, & *Aque ex Fœlicibus piscium* destillatæ, quarum jam supra facta mentio, in specie Lacti, in confutando & restituendo etiam in Gutta Serena non sunt contemnenda: item *Aque Ophthalmicæ* exemplum non inlegens videbitis in BARTHOLINI *Alia Med. Næsiar. Plura. 2. pagin. 304.* quæ tam solitarie usurpant, quam pro infundendis Antimonialibus egregie adhiberi possunt. Item Aqua Stercoris anferculorum destillata commendatur ad conservandum Visum. Inter alia etiam eminet supra laudatum illud *Oleum* five *Liquor* *℞. patis Myrica piscis*, de cuius efficacia mirabilem habet observationem FORESTUS *lib. 3. observat. 48.* cum quo conf. BORELLUS *Centur. 3. Observat. 92.* Hi ipsi Auctores dictum liquorem, per experientiam confirmat, ad Gutta Serenam extollunt, si Palpebris clausis, oculis saltem illinatur. Huc etiam facit Pinguetum Viperarum, quam cum in hoc tum omnibus oculorum vitia

viti

tiis mirè deprædicat LUDOVICI in Pharm. & WEDELIIUS de facili. Medit. c. de Ophthal. pag. 182. His additur succus seu Liqueur de formicis majoribus capiteffus, & per recipientiam fpoote deparatus, qui his io die inthillatus omnes Cæcos curare laudatur. Viti etiam Aqua ista, quæ verno tempore ex Pampinis vitis incidis destillat, ad oculorum vitia similiter commendari solet.

Designequevenit etiam liquor iste, qui ex Cimbicibus, Vitro & Malis Panis fermentatque, in Chibano per Velicium fulvum, congerit: nempe 6 Olozmioli sumatur, per Linteum demittit, transtoleatur, & cum rancillo Camphoracuto, qui liquor blandissime utilis illi Chibano Laudatur a quibusdam ad Ciciteratem tot'end'um. Quidam mirifice commendant contra oculorum hebetudinem & Ciciteratem sequens *Unguentum* expertum **RENDELLI** quoq. 59. ubi refert, quod Utriusvisque Fomina quaedam per transfunditur ante altero oculi cava. Cum Utraque sequens

℞. *Mel Anibafat.* & *despumatum*,
ut bene fluat: eique adde

Zingib. puberif.

Caryophyll. minutif. pulverif.

Salix caudex. ana 35.

Miscetur hæc omnia invicem cum Melle in Unguentum liquidum.

De quo particulam quantitate Seminis Sinapi indidit oculo, qui quidem esinde primò vellicatur, sed itatim desinit, & postmodum plurimum humiditatis ex oculo effluit: quod continetur aliquandiu, donec effectus succedat levaratus.

Demque *Pygostium* probè Autem aut *Nucham* applicetur, eoque effusato, vel *fonticulus* vel *sternum* in *Nucha* effusatum multum valent ad *Guttam Serenum*: conf. SCUL-
TETI *Armoem. Observat.* 36. Vel potius duplex erit erit
fonticulus ad latera quartæ, aut quæzæ Colli Vertebræ;
imò ipsi verticis insendum esse fonticulum, & velicatum
toti Capiti admodum; RIVERIUS loc. allegat,
monet.

Nec negligenda sunt *Moschataria*, quæ PLEMPIUS
Ophthalmoz. lib. 5. cap. ultim. & SPIGELIUS *Disquisit.*
Corp. Hum. lib. 7. cap. 2. *Sternutatoris* præferunt; unde
etiam usum Fumi Nicotianæ approbat HILDANUS
Ench. 67.

ARTICULUS. II.

*De Visu Imminuto, & in specie
de Nyctalopia.*

Cecitati ius modo cognatum Malum est *Nyctalopia*, quando *Ager* de re mediocriter, vesperi parum, ad uocem Candele tere nihil ceruit. Exempla hinc obseruantur, imperitis *HER* afforant. 4. notat *Nyctalopiam*, cui in ferena tempestate apparent *Nebulae*: in turbido uero & obscuro loco non. In specie *MANARDUS* lib. 6. *Epist.* 15. refert quendam interdu imbecilliter, vesperi parum, pugna nihil cerantem, nisi *Lucerna* geminata sit. (M)

CAUSÆ.

Ex jam dicto exemplo ferè concludo: *Causam* Nyctalopæ videri paralyticam Tunice Resinæ Laxationem, quæ nonnisi fortiore & intensiore objecto ac Lumine moveri solet.

Remotas inter Causas Dieta mala multum promouet
Nyctalopiam, teste HOECHSTEDTERO *Diss. 9.*
pag. 346. Ex usu Ioliacei Paris notae SCENCKIUS
liber. 2. cap. 1. 2.

[illegible]

(N) *Vide porius nostrum De Soni natura, propagatione & proprietatibus Dissertationem, quam habet Tom. I. Iltic-Med. p. 2. cap. 13. membr. 2. c. l. 253.*

C U R A.

Nyctolopia lute difficilis curatus est, ac praetermissis inventeracibus curatur. Remedio inter alia decedum Legni Sassafras multum commendat FERDINANDUS in *Hyflor*. Item Jecur Anguillae super carboeaes affutatus aliquoties ante cibum assumpit, (specificum est PANAROLLI *Prax.* 3. *Off.* 49. cajuas loco Hepar Bovis coctum in tres partes distillatum, & omni mane jectum ventricula pers cum succello usurpata fuit: Videb. M. A. N. C. *Annal.* 3. *Off.* 131. *Off.* 243.

Densare Pulvere ex Semine Foeniculi, Anisi, Coriandri
&c. curata fuit Nyctalopia à GABELCHOVERO
CONTIN. 4. CURAT. 49.

C A P U T . I I

De Auditus Lesionibus.

Post Vitisu[m] figurat[ur] Auditus, oculus dieque sepe viget,
cuius est quævis motus externum nil aliud est, quam
se habere per se, falsisq[ue] substantia (Videb. WILLIS de
Anima Brach.) diversitatis, impellente tamen & violento
nonnulli, vel Percussione, & commotus, qui un-
dicque undulatorio motu in orbem diffusus per antra[A]us
Auris externæ ad Aures internas, & speciem illam Nervum
Auditivum seu Acusticum, in Cochlea extensus Membranâ
capacissimâ expansus; impingit, eamq[ue] quasi percussit;
qui motus diu[er]se percussiones analogus, & ad Cerebrum con-
summatos, a nobis facit; epidem vero duplicato seu percep-
to, audimus, dicitur non aliter motus.

Flans etiam est percussoria species, qui per spatium liberum levem habet sonum; sed si cum impetu per locum angustum fertur, fortior est sonus.

Motiones huiusmodi arcerent ad aurem continuatæ, prout libi invicem certa, secundum Arithmetica leges, proportionem in majori vel minori gradu, & intentione, aut remissione respondent, gratum vel ingratum, seu harmonicum vel non harmonicum efficiunt sonum: & prout illi motiones respondentes in Cerebro spirituum Animalium & Libent motus in impetu majori vel minori, ordine vel emulsiōe, &c. variè efficit Musicæ in nobis æstusque, quæ & Nervus Auditorius ramus etiam ad Ganglion potest, unde ingratum sonus etiam detinet quasi afficit.

Motus talis Ætheris, prout vel vehementior vel debilior, fortius vel remissius nobis representat sonum: prout fortior & celerior, Acutior, prout remissior & tardior, gravior: sicut Impiægens Ætheris motus in Corpusculo, repetitur diversimodè, ita tamen, ut Angularis repetitionis Angulo incidentie exade sit æqualis, indeque repetitum sonum, *vis Echo* constituit, quale in cavitate Inflammatorem *Rafanensis* dici solet: vid. SCHOTTIUS in *Mag. Naturalium* item KIRCHERI *Pionary*, *Musos*. (N)

Ad Ætheris motiones fatu factas, tanquam per instrumentum pneumaticum, pertinet motus ejus in Animalibus per Tracheam seu Alveum Arteriam factus, *huc dictus*, quæ simpliciter per Latrarem, imprimis Epiglottidem admovent, effluere *Voceles*, per Lingam vero, Dentes & labia modificatos, *Consonantes* effluunt: quæ Literæ in Hominiibus, pro impositionis & conclusivæ ratione, nulli modis combinantur, & artificiosè articulantur, *Sermones* constituunt: unde & sola motus Organorum Seminis observatio, *Sordus*, & Mutus ab ortu per Oculos seu Visum tractatus, & ita locum perfectè reddi potest: Vid. DIGBY de *universal. anima Tractat.* Angl. item *Amicus Homines Sordi, & Muti*, qui tandem manifestè patrem in DIGBY invenitur.

Ad.

Auditus hic laeditur *audibus* ferè modis:

- t. Quando immittitur in *transmissionem*, h. e. in difficultate auditu, aut quando non auditur in *transmissionem*.
2. Quando depravatur aut vitatur, ita ut Soni, qui non sunt, audiri existimetur, in affectu *simulacri* de *sonis* aurium appellato, de quo postmodum. (O)

ARTICULUS I.

De Auditu imminuto, & abolito.

Sen

De Surditate.

Contingunt hae lesiones tanquam symptomata, vel in *Morbis Maligis aut Acutis*, idque ut plurimum fausto omine, dum interdum *velis* abolitur, interdum vero comitatur saltem criticum ad paroxysmos, vel extra hos, idque nunc vitio proprio uterque contra, nunc aliis *Chronicis* affectibus superveuenit, v. g. Livi Veneret.

CAUSAE.

Quoad causas: hauriende sunt ex *quatuor* fontibus. Imminuitur enim aut abolitur auditus

I. *Morbis* auris internis, si scilicet hae sit abscissae, vel alio modo laesae, tunc enim tantum obscurus & caecus, miouque distinctus sonus percipitur: unde taliter affecti manibus cavis auribus admotis deicendum istum refarcire coguntur. Quo pertinet etiam alia Instrumenta Otica pro surditatis, quae vid. apud SCHOTTUM in *Mag. Nat. lib. 3. Part. 2. Symptom. 4. Pragm. 4. (P)*

II. Imminuitur & abolitur auditus vitio *Mentis* Auditorii, obstruitur scilicet aut infardit, quo minus aere externa mota possit *Aether* interius ad anrem internam progredi: quod fit non tantummodo à rebus extrinsecis illapsis, Pilis, Nervis Cerebri, &c. sed etiam ipsa Cerumina distans in Auribus retenta & tandem lustrata subinde idem praeflant. De Gryllo in Anrem ingresso vid. M. A. N. G. *An. 4. obs. 30*. Nec tantum meatus auditorius externus, sed intusus in Fauces hians, similiter angustatus, auditus difficultatem infert. Quo facit fortassis ad incrementum nimio Glaucomae, prope quae excutitur Meatus Auditorius in Os, observata à TULPIO lib. 3. *Obs. 149. 150.*

III. Imminuitur vel abolitur Auditus vitio *Membranae Tympani*. Sanè dubium non est, quo vitata hae Membrana Tympani ladata plūs minus auditus; cum certum sit, ipsam non frustra esse conditam in meatu auditorio: saltem de usu ejus est dubium, qui probabiliter saltem statuitur praefractorius auris intere, & Nervi intrinseci expansioni auditorii ab externa vi Frigoris, Acris, Pulveris, similibusque injuriis; nec magis pertinere ad auditum ipsum videtur, quam Vitrum in Penebris ad visum; id est, licet hoc intromittit Lumen sine offensione eorum, qui sunt in Conclavi, illa illud permittit sonum transire, & excludit, quae alia lederet Organum, quemadmodum apparet in experimento, quo fracta Membrana Tympani Canis videtur nihilominus audire per aliquot septimanas, donec aliae caesae, v. g. Frigus exterorum, corrumpant Organum: Sic HORSTIUS lib. 3. *Obs. 1. pag. 444.* notat Tympanum per abscidum putredine absumptum, sine ulla tamen auditus laesione; Scuti etiam SCHNEIDERUS lib. 3. *de Cataract. pag. 402.* eandem Membranam ruptam, aut totam ferè excretam, nullam tamen nosse auditus atollisse, observat.

Laeditur auditus vitio hujus Membranae vel *rupra*, v. g. Tom. II.

(O) Vide quae de Voce differunt in hoc Tomo Lib. 1. Sect. 14. et l. 419.

(P) Duo inter alios deficiunt Tubi Otici in eodem Surditatem simpliciter subscissis. Unus est Ellipticus ex argenteo, archalis, ligno balneo, vel simili resonanti, paratus, cujus si alterum Orificium adhibetur auri Surditati, alterum vero loquentis auri, in immensum amplius loquentis Vox. Ratio est quia Vox prolata in uno Elliptico fita, ubi est enim Tubi Otici, per innumeras lineas directas & reflexas, pergit ad alterum Ellipticum sonum, ubi est Surditati auri. Ita ut nullum sit punctum suarum in ore Tubi cavitate, ad quo Vox in aures audientium non reflectatur: hinc si ut summi hoc invenitur ad punctum suarum in Surditati existantem, in sonis persisterent. Alter vero Tubi est Cobaltinus, seu in Helicem convolutus, ad Cui oblongioris formae accedens, cujus angulus orificium Surditati auri, latius vero terminus loquentis convergitur: ob variis enim & innumeras radiorum soni reflexiones, hic summi alacritas ad aures audientium pergit, ad violenter Audientem existantem. Secundus hic Tubi illud habet pra. alia communi, ut necesse non sit loquentis auri Tubi orificium propius applicare, ut in alio, sed Vox etiam procul emissae facile exaudiri poterit.

causa externa, imprimis ex facti nimis sonitu, ejus imperi divelli & plūs minus lacerari vel rumpi solet (vid. HILDANUS *Crit. 3. obs. 7. 3.*); hinc fit interdum, ut ab explosione klopoti hinc non allucti surditati fiant; vel *aus* & plūs minus *annulari*, ut observatum in abscissibus aurium internis. Item Variolis & Morbillis interiora auris obducuntur; aut etiam secundum RIVERRIUM vitio Membranae *retinaculi* nimis, *similique* humefactae, tam propter causas internas in affectibus Cataractibus, quam exteris, nempe humiditate Aeris constitutione: hinc quidam sub tempestate pluviali, vel constitutione Aeris aestiva vel humidior, graviores habent auditum, Membrana illa ab Aeris humiditate plūs minus relaxata; ex qua causa videtur orta fordidas ex copioso Oleo communis auti foetillato, quam refert TIMAEUS *om. Goldenklein in Bep. pag. 109.* In serena vero & sicciora, admodum acute: uno nomine *paralytica* fuisse: aut denique vitio ejusdem *convulsae* ac fortiter nimis *expansae*. Requiritur namque ad debitum Aeris moti loci soni transitum, ut Membrana illa sit tensa, & firmiter dilata; alia laxata Membrana certò extingueret & supprimeret sonum pariter ac in Tympano videmus. Conl. *Alf. Anglis. Polam. 1. pag. 553.* Nam quoad paralyticam Membrana huius constitutionem, pertinet huc illa surditatis species à WILLISIO *de Anim. Brutor. Part. 1. cap. 14.* observata, quando quidam furi furdi & nihil audiunt; quando autem pulsant Tympanum, vel Campana, vel inflantur Baccina, sub tali fortiori sonitu impulsu Membrana redit in debitum tonum, & sic alio intelligunt. Novi Mulierem aliquandiu surditate laborantem, tandem auditu sonitu in Capite, et à Bombarda exploderetur, cessavit: dicebat, illam non opiatam esse, quod esset in Capite suo, interrogavit igitur circumstantes, an & ipsi idem audivissent. Credo sane, & probabilissimum est, quod vitata hae Membrana Tympani, laeditur tandem auditus successu vitiatu Labirynthi & Cochleae ab externis irruentibus, ut jam *supra* sit HORSTIO & SCHNEIDERO *loc. cit.* probari. Pertinet hic etiam *straphalio* Tympani, vel ab Aere frigidiore, vel Narcoticorum abusu, vel incantatione, vel exsiccatione, aut per Aetatem, aut ineptia calidiorum applicatione, quale exemplum de pane calidius annotavit BARTHOLINIUS *Crit. 6. obs. 77.*

Quoad *convulsionem* hujus Membranae: arbitror subinde convulsi quid pati, quatenus ratione Multicorum coevalium & ita nimis tensi & expansi redditur; tuoc enim propter talem tensionem & spasmum nequit commodè ab Aere exteriori percipi, sed ille sine frustra retrocedit. Fit hoc v. g. in Hypochondriacis, quibus saepe aliquid ante aures obtendi videtur, quod oih aliud innuit, quam quod illa Membrana Tympani convulsa teoditur; quando vero iterum relaxatur, iterum audiunt, unde dicunt: cadere ipsi tam repente ante aures, & citò iterum abire: ubi subito tendi omnis subito remittere, denovo audiunt. Sanè etiam in auditu laesione *Patricularum* cum Nervis confusus subinde attendendus, sicut a priori non adeò benè explicabilis, cum subinde, prout Venericulus vel vacuus vel plenus est, remitti aut intendi etiam malam oblectetur.

IV. Tandem vitio *Nervi Auditorii* seu Acustici in Cochleam expansi ut plurimum imminuitur vel abolitur auditus. Si nempe hic sit (1.) vitio *confermatum*, ita ut non ad aures internam, sed ad alium locum derivetur; quod fit sub prima Foetus formatione, unde tales Aegri subinde ab ortu solent esse furdi, & ut plurimum simul Muti, vid. DEUSINGIUS. Aut etiam (2.) si Nervus *praearticularis* est affectus, nunc in exortu, nunc in progressu: *de exortu*, circa basin cerebri, quando illud est compressum & angustatum, unde interceptur spirituum Animalium motus per hunc Nervum ad Expansionem in Cochleae & Labirynthi: *de progressu*, quando ipse Nervus est angustatus, sive sit obstructus, sive sit compressus, sive alio modo

Reet

boc

huc faciente vitiatum, adeo ut spiritibus Animalibus omnem transitum intercludat, a quacunque sit causa, vel in casu ab alto, illiſſime Temporum ex casu, aut eorum & Coſeſſi gravi percussione & contusione, Morbo Gallico vel in affectibus Catarrhalibus à Lympha subili se inſinuante, & Membranam ejus atque ipsas Fibras nervas plus minus humidas, & siccadas reddente, ut in debito tono cessent; vel etiam subinde in Morbi acutis ad flatum properantibus, & per hæmorrhagiam criticam hincursis, Arteris & Venis intra 24. magis diffentis, hinc Nervum auditorium comprimentibus. (3.) Quando hic Nervus in Membranam intra Cochleam & Labyrinthum se expandit, Membrana ipsa vitiatæ, auditus lædatur, itaque duplci modo: quando vel quasi Paralyſi, vel quasi spasmus corripitur.

Paralyſim conſtitutionem quod attinet, quando scilicet Fibræ ejus sunt aut ruper aut divilæ, aut relaxatæ plus minus, aut alio modo vitiatæ, adeoque à naturali tono remittunt: hinc etiam convulſi Fibræ rigidior quasi evadit Membrana, & ab exteriora mota vi mobilis: illud frequenter, hoc rarius arbitror vitium. Nam in paralyſi conſtitutione Membrana ipsa propter atoniam suam inepta erit, ut moveatur ab impellente Aere, unde ita auditus necessario tollitur. Hinc fit sæpius, ut post nimis acutos sonos homines sicut furduli; v. g. in iunctis ex explosione sclopetorum auditus ad tempus tollitur, aut plus minus debilitatur. Quidam sedunt rationem, quod interna expansio Nervus acutius, aut Membrana auditoria in Cochleam & Labyrinthum ingreſſa à sono gravi tam forſiter moveatur, ut aut Fibræ laceratis, aut nonnullis Fibrillis rupcis, diffentis, vel alia ratione male affectis, auditus plus minus lædatur, unde soni non percipiuntur: vid. HILDANUS *Cens. 3. lib. 7.* quod tamen non videtur probabile, quia Membrana Tympani eastrinſecus oblat, quæ omnes forſes sonitus retundit, quo minus possint penetrare. Potius ergo Tympanum læderetur, quæ Membrana aridifica in cochleam expansa, quod fit saltem a causis externis. Nam quoad internam, si dicta Membrana nimis laxetur, & hincertur, unde & eadem paralyſica facta in tono remittit, & minus forſiter à sono potest moveri & perveri, & ita auditum difficilem & obſcurum inferre: id quod etiam in Catarrhali vitio à Lympha in suo motu impedita, ibique plus minus excreta, fieri potest. Item si saltem tunſum recrocomati ex privata illius Nervi aut Membræ nutritione reſidit, aut aliunde cum sanguine tranſmiſſi, auditus læſionem inferre poterit, prout vel irritando ad convulſivæ, vel Nervum obſtruendo ad Paralyſis aut ſimiles affluſiones diſponere valebimus: quæ & metallis materiæ ſeu poſſia fermenti in Morbis acutis, aut etiam Chronicis pertinent; item incongruus uſus Unguenti Mercatorialis pro ſordibus capitis detergendis; vid. TIMÆUS *lib. 1. Epil. 19.*

Spasmodicum affluſionem Membræ quod attinet, eadem, quacunque occasione irritata, convulſi Fibræ, rigida, quasi evadit, adeoque ab externo movente vi mobilis. Facit hoc obſervatio BARTHOLOMI in *Cens. 4. Epil. pag. 235.* de Sone, quæ ſurditate acutum viſum recuperavit, ſed rurſus ſurditate antiquo viſu vitium rediit. Viſum videtur haſſile in exortu nervorum, ut ſpaſmo nervi Acutici ſpiritus Animales ad Nervum Opticum penetraverint, quo reſerato, in tanta copia ad Opticum non pervenirent.

DIAGNOSIS.

Vitium obſtantiſſimæ & ſurditatis per ſe ſeparat, ſcilicet ſerutinum cauſarum incumbit Medico, quarum diffentias à priori petitiuri perquam difficile eſt, ſaltem ratio cauſarum antecedenſium, & ita ſerudi modus minus repetendus, nec ſuſſeſſus, item adſcenda aliarum partium ſymptomata, vel capitis, vel ſenſuum reliquorum: item an ſurditas conſtans ſit, an interrupta? an conjungatur cum morbis Hypochondriaci & aliis pſumaticis? eadem ſubinde plus minus manifeſtant. Ex his enim origo ſive cauſa ſurditatis arbitria conſectura eruitur.

Cauſam eſſe defectum auriſ, vel obſtruſionem meatuum auditorii, vel Tympani læſionem, vel etiam malam conformationem, ſacile per ſe & levi æ circumſtantia patet. Sin verò vitium Nervi obſtruſi aut alio modo læſi addit, ſolæ conſectura diſſicultat admodum à Medico deprehenditur & percipitur.

Affluſum eſſe Catarrhalem, obſcureſcit pſumatica Catar-

rhælia conjuncta; item prægreſſus cinitus aurium aut etiam ſonitus: item ſi ſenſus ſuſcit ex aliquali obſtruſione; item diſſicultas ſuccellivæ & inchoat, & ſuccellivæ incrementum capit.

In Morbis acutis ſubitè fit ſorditas, ex quacunque etiam oriatur cauſa.

Si fit à cauſa externa, à cauſa ſuper aurem, à ſonitu gravi, &c. ex relatione Agri cognoviſcit.

PROGNOSIS.

In prægreſſu habenda eſt ratio diffentis ſurditatis, quatenus obſervatur vel in Morbi acutis imprimis ſtatu, vel morbo chronico.

In acutis ſurditas ſubitè facta, ſi eſt à cauſa externa, nil habet in reſeſſu.

Surditas ſuperveniens in Fibris acutis, urina exiſtente cruda, delirium grave porrendit, ſi verò ſurditas in Acutis & Malignis ſcleribus cum ſignis coctionis, aliſque ſignis bonis conjungatur, utplurimum bonum ſignum eſſe ſolet, cui ipſi interdum aut Hæmorrhagie Narium, aut forſan deſeſſus bilis plus minus, per Diarrhoeam triticam ſupervenient, & ſic ſinit Morbus; aut ſi nihil tale eveniat, ſaltem ex obſervatione, Febrilis acutis ſuperſenſent, & deſeſſus quidam: & motus tranſlatorius ad parotides ſerè inſinuat. Nam quod non ſemper fit malum ſignum, videbitis præter ZACUTUM LUSITANUM in *lib. 1. Med. Princ. Hyſt. Dubio 40.* & PAULI in *Diſſert. de Febrili, Mal. pag. 16. & 17.*

Si in Morbis acutis ſurditati ſuperveniat Delirium, Viſitæ & ſimilia, penus eſt, quam ſi ſurditas ſuperveniat delirio, & ſi tale delirium ſurditati ſuperveniens cum anxietatibus, vigiliis, aut etiam cum vomitu conjungatur, periculoſum Morbum innuit.

Quibus ſurditas cum gravitate capitis, & hypochoſtium tenſione, & oculorum ad ſplendorem perturbatio addit, ſi hæmorrhagia Narium indicatur: quod eo magis conſideratur, ſi Agri vellicant Nares.

Sordi ab ortu curantur raro; nihilominus tamen locutionem iis interviſit oculi, quoniam arte tales ſordi poſſunt aſſueſcere, ut Oculis, conſiderato motu labiorum & Lingue, omnem loquelam poſſint intelligere, & ſic ipſi loquentes reddi poſſint: Sic D. WALLIS, Mathematicus Gronovici, duos Nobiles Anglos ab ortu ſordi, Arte, mediante ſolo labiorum & lingue motu, ut loquentes intelligat, & accurate reſpondeant, edocuit: ſimile exemplum habet DIGBY in *Tract. de Imbec. Animæ Simani*, de Nobili quodam à natiſtate mutuo, ita inſtruito, ut quocunque loquentes perciperet ex ſolo adſpectu, etiam linguam ignotam loquentes. De hoc *Tractatum Angliſum* ſcripſit D. BRAUN, dictum Philoſophi, ubi proſe diſſertit, quomodo ſordi poſſint inſtrui, ut voces judicent, & accurate loquantur. (Q.)

Interim tamen ſurditas, quæ per ſe Morbum conſtituit, aut chronico Morbo ſuccellivè ſupervenit, contumax & difficile curata malum eſt: quod ubi ſemel radices egit, aut ſicilicet redit, aut perſiſcit affligit.

CURA.

Cura pro varietate ipſius affectus ejusque cauſarum imprimis varianda. Et quidem ſi addit ſurditas in Morbis acutis, attendendus eſt Criticus Naturæ motus, & quorſum eadem vergat, & talis ſurditas rade curatur à Medico, qui ſub Morbi mutatione ſerè ſponte ceſſat, ſalutari cura eſſeſſo: aliis Cinabarum interdum conveniunt. Si poſt Morbum acutum ſuperſit, vel Aqua Anhalina, cum Bombace Auribus inſimila, prodeſt, vel Cucurbitula prope Aures affigenda, & ſimili Tabaci ſubinde beneſicienda: Conſ. M. A. N. C. *Ann. 6. obſervat. 120.* Si verò ſit à Morbo non acuto, ſed per ſe affectum primarium ſerè conſtat, varietas cauſarum obſervanda eſt, pro quarum varietate cura varianda. Quæ ex abſiſſione vel in deſeſſu Auriſ externæ oriſit, curatur per inſtrumenta quorſum concava, eastrinſecus Auribus adpoſita: vid. SCHOTTUS *ſpec. affig. Si obſtruitæ ſunt Aures, in ipſe à Cerumen, idem Mellicus, & Liſqueſcentibus attenuetur, & educatur, quod ſit ver. gr. per Suerum Abſynthii inſillatum, vel per Eſſentiam Abſinthii (R.), vel per Urinam pteri, aut ſimiliſſimam non addit reſidiatum & acrem inſillatam: quibus liſquatur Cerumen indurata, quæ poſſimodum eximatur.*

Sic

(Q.) De Loquela Mutis & Auditus Surdis redditio quamplurimis / gæſa eſt in Ephemerid. Germ. Dec. 1. Ann. 1. Obſ. 15. D. Petri à Caſtro, atque in Scholio P. J. Sachs eadem addito.

(R.) Pſino, ut pſe, Abſynthii in meſuram auſterium Syringa inſuſſe, ſurditatem vel Timiditatem, quæ ſit à Cerumen obſtruitæ erant trahit, curat qui quod ſe verſatur P. N. N. Ordinis S. Petri de Alcantara.

Sin ex aliis causis interna fuerit Malum, ferè semper Membrana tympani, & hinc Nervi Auditivi habenda est ratio, ut horum Tumor, quatenus possibiles *Aromarici*, & *apoplectici Nervorum*, praeventus interna, aut conservetur aut resoluatur.

Quoad interna; quæ affectibus Catarrhalibus interne conveniunt, ut Volatilis, Succinata, Sulfurata, & similia, quæ ex *super dictis lib. 2. fol. 32. cap. 2. art. 2. cognoscantur*: c. 6.

℞. ℞. Flus. Rosmar.

Hyperic.

Liquor Sassafr. an. ℞i.

M. D. S.

Essentia Catarrhalis.

Inter remedia externa præ reliquis granum unum, vel alterum *Melissæ*, vel *Ambrae*, vel *Zibethi* cum Bombace involutum, optimum est Remedium, quod Auribus immitatur vel per se, vel intermedium ledi, sive solitarie usurpetur, sive post Medicamenta quæcumque Auribus instillata talis Bombax moichatus applicetur; item Bombax Essentia Ambrae imprægnata ista intrudatur. Ac sanè in Surditate Secum vi melius Remedium esse dicitur, quam Ambra, imprimis ubi simul adeli spirituum Animalium defectus. Datur interne vel per se, vel ejus Essentia crebrius, vel externe distis modis. Hamburgi Medicus quidam ejus beneficium cuidam Audientem restituit antea à Veneno laesus; sicut & Pater quidam Sardus Zibetho cum Bombace Auribus adito seorsum restituit. Sic Ballatum Peruvianum cum spiritu Vini diluunt, & cum Gossypio Auribus applicunt, admodum confert; Vel *Aqua Origani* cum Vitis destillata, vel *Aqua Cardui benedicti*, per crebriorem à ova planta cohobationem parata, *Sapius* usurpata, sive Polydresion CRATONIS, guttatis Auribus instillatur, vel cum Linoleo hac humectato applicatur conducunt: Item Aqua Frazini, ista nempe ipsa ex Ligno recentis quoad unam extremitatem igni immisso, in altera extremitate effusam & collectam, Experimentum est CRATONIS contra Surditatem, cum olivæ Aurium caliditate conjungantur: aut si Surditas oriatur à causa calida, Aqua Picarum, cum Calore, Aqua Formicarum, Aqua Muscarum per alembicum destillata, &c. similiter infunditur conducit: Succus Raphani, Succus Cæpe, cum Oleo Succini & Amygdalarum amararum conjunctus Auribus instillatur infunditur conducit.

In specie tamen *Aromatica penetrantia* conducunt, ut Aqua, seu spiritus Theriacalis, Essentia Abianthii, Essentia Cardui benedicti, Calore, Thymi, Essentia Caryophyllorum, Carduorum, & Essentia Compœitæ. Spiritus quoque Auculicus *Melissæ*, & *Androsæ* (prostat Descriptio in fine Alodarii) item *Barberi*: vel alie similes compœitæ Aquæ spirituosæ, vel guttatis instillatur, vel cum Bombace crebrius adnotat Auribus, sunt egregie. Essentia ridem ex Felibus Animalium cum spiritu Vini parata præ cæteris omnibus commendari solet: egregium etiam fuit Remedium ad Audium assilum: sic Felhamum cum spiritu Vini mistum, aut etiam Fel Leporis, vel Fel Anguillæ, si assilatur spiritus Vini, sicut in digestionem, & per siccum separentur, horum Essentia mane & vespere ad gutt. ii, vel iii, Auribus instillatur; & ut singulare speciem commendari solet. Alii

℞. Fell. Bruin.

Vini Malvæ an. part. æq.

Destillant per Alembicum: Liquor, qui prodit, vel ad paucos guttas Auribus instillatur, vel cum Gossypio Auribus imponitur & Sapius repetitur, in Aure laeo postmodum superdormiendo: Vid. MARTINI SCHMUCKS *Theaur. Secretor. part. 2. pag. 92.*

Facit hoc *essentia Angustia*, Specificum singulare ad Audium, Prædicta quidam celebra Beneficentia, quæ cum succellu crebrius olus est:

℞. Rad. Helic. nig. ℞i.

Calum. arum. ℞i.

Pulp. Calci. nig. ℞i.

But. Lauri anar. fol. ℞i.

Semin. Cameli. ℞i. ad ℞i. ℞.

Spiritus Vini ℞i.

Incisa, & contusa sicut in infuso per aliquot dies in Vase vitreo obturato bene, posita colescat cum expressione & filtratione: cujus essentia aliquæ guttæ singulis octo horis Auribus instillandæ, vel cum Bombace Meatus auditorio applicandæ sunt: necque curvat Surditatem inveteratam.

Potest acui cum tarillo Essentia Ambrae, vel in ea dissolvatur parum Moschi aut Zibethi, & erit ed efficacior.

Tom. II.

vel applicetur cum Bombace, in quo antea Moschus vel Zibethum jacuit.

Facit hoc etiam Oleum destillatum Succini, Anisi, Lavendulae, &c. istodem Gossypio involutum, Auribus admoveandum. LINDANUS Fel Perdis cum Oleo Succini Sapius rectificatum destillat; sic enim potens remedium esse dicitur. Aut Oleum destillatum Anisi cum Oleo Amygdalarum amararum, vel cum Oleo Maceratum Persicorum, permixtum instillandum venit. Quo etiam pertinet Oleum destillatum Sauris, Majoranae & Foeniculi, similibus modis applicandum. Liquor est Ovis Formicarum expressus, si quid aliud, admodum confert, & mirè commendatur, aut etiam Ora Formicarum contrita cum Succo Cæparum permixta, & in Arem instillata, quàm veltissimum Surditatem sanant. Quidam

℞. Over. Formic. ℞i.

Fall. Leporis No. vi.

cum duplo Mellis in Mortario bene trita & subacta Auri instillatur, & ita Surditatem corat.

Vel etiam sola Aqua ex Ovis Formicarum per Balneum Mariæ destillata in usu esse solet, & commendatur à KUNRATHO in *Medella Descriptio*. Item remedia ex Formicis, in specie Aqua Magnaimitatis dicitur, cujus descriptionem communicavi in *Colleg. Pharm. in Schræderp. 2. spiritus item Formicarum admodum laudatur in gravi Auditu, & Surditate*. Facit hæc Mithra HEERTODII de *Croce pag. 107.* & Oleum istud singulare ad quosvis Aurium affectus, Surditatem, Tinnitum, & similia Mala laudatur, à quamplurimis mirè commendandum, & à nonnullis pro Secreto habetur, quod se ex Vermiculis albicanibus, qui in Quore inter Corticem & Lignum gignuntur, Modus est hic:

℞. Hartum Formic. N. xx.

ebulliant in

Olei Olivæ. immar. ℞i.

deinde excavetur *radix Cyclaminis*, eaque repleatur oleo dictorum Vermicularum, superaddendo

Pulp. Rad. Pyrethri.

℞i. ad ℞i.

Olei Olivæ & Rutar. quantum

adhibere capere possit.

Occidatur deinde Radix Cyclaminis, & sub cineribus assetur, & postmodum coarctatur in Mortario marmoreo, & exprimitur succus fortiter.

De Liquore expresso oleo immittuntur aliquot guttæ per os, novem, vel decem aut etiam plures dies in Arem, & est mirabile Remedium, quod multo admodum commendatur: sicut de TIMÆO à *Guidone* refertur, quod hoc modo Surditatem fere vativam curaverit. Vide THEODATUS CAMERARIUS in *memorabil. & PE. TRÆUS in Dissert. Harmon. 11.*

Hic adnumeranda venit Avungia Serpentum, Meatus auditorio illata, aut cum Gossypio applicata, quæ pro magno Arcano à quibusdam habetur: Vel Serpentes coquantur in Aqua, cui superaddat pinguedo separata, & cum Spiritu rectificato iuncta, ad consistentiam Olei; sic Pinguedo Vipera cum gutta paucissima Olei Succini Auribus instilla, adnoto polleat. Pate recentis calido, commendatur in WELSCHII *Medicinis. centur. 1. observat. 39. anaxeris admo 4. M. A. N. C.* Hæc vii cedit Pinguedo Anguillæ, collecta, dum Anguilla piangit infusa in vinum: excipitur ista Pinguedo essillam Folis Lauri, hinc colligitur, & tepida Auri instillatur contra Surditatem, vel sola, vel aditis aliquæ guttæ Olei destillati Anisi, obturando postmodum.

Vulgo solet commendari ad surditatem *Puls. rivas* furno extrahos, spiritus Vini imprægnatus, & auribus ita calide adnotus: sed non suadendum juxta BARTHOLOMÆUM, qui maxime exinde nosam observavit. Quidam Panem pillosum cum semine Anisi, Foeniculi & Cuijoli præparant, & recentem auribus applicant.

Vaporem ex spiritus *Satur Ammoniaci* sive simplici, sive anisato, aut Mixturæ ex Sale Ammoniac, misto cum Oleo Tartari per deliquium, aut duplo Calci vivæ cum Aqua simplici, ex Vitro parvo angustis orificiis, sed longioris, & curvi Colli, probe calefacto auribus excipiendo commendat LUDOVICI in *Pharm pag. 177.*

Cæterum de Remediis hæc auribus applicandis observandum est in genere, ut nempe (1.) quoriam talia Medicamenta quæcumque auribus sint instillanda, *aurem semper obturandum esse*, sicut instillationem cum Bombace Meatus aut Ambrato (Bombacium in quo Moschus fuit impositus); aut cui unum alterumque Moschi, vel Ambræ gra-

Ref 2

nam

sum est impositum; eam, ut supra monitum fuit, solus talis Bombax gratissimus fit Auribus, & per se ad surditatem, & gravem auditum fit egregius. Adhuc (2.) quoad hæc remedia vel infundula vel intrudenda, quod Oleo non sint immittenda, nisi prius bene auris sit absterge & purificata, & hinc renovetur remedi applicatio. (3.) Una vice tres vel quatuor guttas immittisse sufficit. (4.) Quocumque, quæ sub tunica Ligamentis subditi. Essentiarum, vel spirituum volatilium aut umidum auribus infundantur, ferè solent esse mœstra, quæm Oleo ac plurius minus viscidæ. (5.) Ea, quæ in aurem immittuntur, nunquam sunt intensè calida aut frigida, sed tantum tepida, calori aurium appropriata. Tandem (6.) post Medicamentis applicationem auribus Ager saper nunc sana, ut ita remedi vis aurem ægram eu melius improprietat & penetrat.

Quandò aurium affectus fuit vagi, adeoque in specie, quando habuit fontem in Cerebro, & sic ad modum affectum Catarrhalem foveat affigere, nprimam est, si percipiatur immittens Paroxysmus, ut variis impetrant Linimentis spiritibus penetrantibus Apoplecticis impregnatum, illiusmodi Vertici Oleum destillatum Succini, & similis, quod etiam simul observandum, quando supra dicta aromata & spiritus auribus applicentur, in vitio imprimis Nervi Acustici; nam & talium usus obauditionem subinde notabiliter levat.

Inter alias causas surditatis fit interdum, ut à nimis senile aures, ut dixi, lædatur auditus: in tali casu saltem doctum remedium ex pæe locum habet: Nempe recipiendæ sunt Bacæ Juniperi vel Lauri probè conculæ, subigendæ cum Massa Panis fermentata, & ita, ut reliquis Panis coquantur est vel pinguetudine: postmodum Panis hic medicatus calidissime furno est extrahendus, disciendus, & per medium apertus ita calidè singulo mane, ieiuno ventriculo, auribus ita admovendus; sic enim denuo restituitur auditus.

Item

Re. Morb. Majorum.
Salvia.
Rusmar.
Flor. Rosar. rad. an. M. ʒ.
Bacc. Junip. ʒi.
Sem. Cucum. ʒi.

Incisa & conculæ includantur Sacculo interpersando, qui probè calefactus auri impatur, vel per se, vel irrotatus cum Aqua Præ Saponata, Aqua Maganimitatis, Balsamo Anglico, &c.

Hic addatur spiritus seu Aqua Cephalica Acholia, cuius descriptionem videbis in SCHROEDERII Pharm. quæ auribus infusilla asperimentum fuit: THONERII & cunctis salutarum alium lepius feliciter expertus est: in surditate pariet ac aurium tinnitu, & similibus affectibus.

Tandem Arumia Erythraea, quæ eum supra dictum, superneant, dum in Aqua coquantur, separata, cum Spiritu Vini rectificato iuncta; hæc hydropem seu Oedem ad dependentium auditum excelsentissimum.

Præter dicta ubiam causam interdum pro auribus infundantur, qui ex Alano, Origano, Abundino, Verbena, Sabina, Serpillo, Colocynthis, Baccis Lauri, & Baccis Juniperi, & similibus, in Vino vel Aqua decoctis; & ita Auribus exceptis. Quidam cen singulare, & perquam egregium commendat: distillatum ex Decoctis Limaturæ Martis, cum Aceto destillato parum, adiectis Herbis Cephalicis, quod Decoctum instat Saffus in aures excipitur. Suet etiam, qui tussam Floram Salsipuræ singulariter commendat ad surditatem: scilicet recipient Infundibulum, & hac immittent carbonibus, quibus Sulphur vivum fuit iniectum, & per foramen funium Sulphuris sic bene obducta excipiant in aurem, quod aliquoties reiteratur admodum commendat. Fecit hunc membrum FONSECA ʒi. ʒi. Cofli ʒi. ʒi. Cofli. ʒi. ʒi. Post Saffum Oleum Fœniculi destillatum cum Goflyo applicandum.

In Chronicis aures lationibus, imprimis si oriuntur vel in subiecto senili, vel in Ageri, Affectibus Catarrhalibus chronicis, Thorma subinde proficue observantur, in quibus non solum Ager se lavet, sed etiam spongiam amplam capiti imponat, quæ Aquam Theriacalem per Epithemum Embrocæ modo excipiat: sicuti etiam ex Funiculo, Brachio in regione auri affectu incho, surditatem diuturnam cum nervosorum parum affectibus, & Lymphæ præteritione scrobiculis affectuibus natam, insigniter levare observavi.

Denique fit interdum etiam surditas ex causa ab alio, emissa, latione capitis externa, & similibus, in tali

casu Aqua Cyclamini per alembicum destillata reliquis preffertur, vel Emplastrum egregium est in tali casu, quod fit Terebinthina & Ceræ de Botipica, ana q. v. ut quous paratum Emplastrum capiti rati imponendum; etude enim celi Affectus: conf. HOECHSTEDTERUS Decad. 9. pag. 320. Sicut LYSERUS obsert. pag. 423. refert surditatem ex idu curatam per iteratam iniectionem urinae calidæ ex lepore faga interempto: Et fuit G. A. BELCHOVERUS Grat. 1. car. 60. in Schol. usum Leporis impositam auribus summum surditatem remedium asserit: hinc spiritus urinae talis non adeo actis facili proficuum erit.

Extremum remedium in auditus defectu, idque in casu desperato, est salivæ Mercurialis, sive in specie ex Lue Venerea acutius surditas sive à causa interna alia in specie vitio Nervi Acustici: vid. FONSECA ʒi. 2. ʒi. ʒi. Sane undique penetrat Mercurius, & quous etiam angustissimos meatus perproptat; unde si ex Obstructione vel simili causa oriatur malum, proficuum ejus usus probabilis est, ut ut nemi auctor esse velim, ut huic Mercuriali Medicamento se facile exponat. Aliis autem hoc casibus penitus inutilis erit. Curam alias surditatis à Lue Venerea, vid. supra lib. 1. Sect. 17. cap. 2. Art. 5. Monb. 13.

Per Transfusionem sanguinis ex Agno in Canem surditas in Canem curata fuit, de quo Journal de Sevrans Ann. 1668. Acta Societ. Reg. Vol. 2. pag. 705.

ARTICULUS II

De Audit. Depravato,

seu

De sonitu & tinnitu Aurium.

IN quibusdam depravato auditus, ut sonitu quidam tinnit, quous est, auditus, tinnit, est, quod sunt Germ. das Sausen und Brausen der Ohren; Tinnitus vocat, das Klagen der Ohren.

Affectus hic nunc continetur est, adeoque subinde durans & chronicus, non intermittens, subinde vagus, qui subinde accedit, & brevi post iterum remittit. Item sonit. est per effusum, nunc per consensum; si per consensum, nunc per præstipitum, dum per se affectum continetur, nunc per dissonantiam, dum Morbis acutis set, Chronicis supervenit.

CAUSÆ.

Causa omnis sonitus & tinnitus, item Murmuratio aurium, querenda est vel in Aere idu, qui continuè in cavo Tympani seu concha auri continetur, & qui etiam reperit Labyrinthum & cochleam; partim verò in Nervi Acustici excursionem membranacea, in intimo cochleæ organo constituit; quia in naturali auditu idell fibrarum huius Membranae motus cum Aere interno moto. Quod Aere istum moram: naturaliter quidem non, aut parum admodum movetur; quid si verò sit, quacumque ex causa, ut Aere extrinsecus moto & hinc Aere interno movetur, ut expansionem Nervi membranaceam in Cochlea feriat, auditus fit naturalis; quod præmissum est in Physiologicis. Quod si verò citius aere externum motum à causa interna præternaturaliter movetur, qui in concamerata Labyrinthi & Cochleæ loca trebrilis repercutitur ad Nervi expansionem concionis allidat, sonitus præternaturalis & sine vitia auditio contingit. Quod si motus iste Aere interni, & quidem subtilioris & tenuioris, fit veloci, celer, & plus minus vehementis, qualis fit, v.g. quando à Nervis vel Chordis Testiculis fortiter tensis excitatur sonus, nunc excitatur sonus auditus sive tinnitus: fit verò tardus, obsecutus & confusus movetur Aere ista interno, ut fit in Chordis laxioribus, & ipsa Aera hæc fit crassior, & minus pura, fit sonus gravis, obscuro & raucus, cum murmuratiois sensu.

Causa ergo, quæ movet hanc aeram internam, intra Tympanum & Concham contentam, querenda vel in ipsa aera undecumque commota, vel in Membrana Tympani, dictam unam movente.

Aeram ipsam commotam quod attinet, huius motus causa communiter dicitur spiritus flantes, seu flantulentum quidam aut halitus admodum subtilis, ex Massa Sanguinis per Arterias exhalantem, & dictæ aere permixti, qui

qui in locis istis contemnerat ineluctu motu suo praeternaturaliter tandem agitando & extraordinarie movendo, istum praeternaturalem sonitum & auditum excitant. Nam haec peregrina in dictis locis via quiesci possunt, sed hinc inde motu Aetrem ibi praesentem similiter moveant.

Experimentum fieri potest cum cartha, auribus applicata, German. Geroldus Sonitus enim in charta ab Aere in illa contento auditur, affectum tamen saltem vagum & breviter durantem inducere potest. Praeter dictam causam & *Arteriarum*, interiora aurium subeunt, *scilicet pulsatio* Aetrem movere, & ista sonum peregrinum repraesentare potest, de quo infra.

Tympanum quod attinet seu *Membranam* ejus: haec à quacunque causa, vel interna, vel externa, crebrius & praeternaturaliter irritata aut molesta, & hinc plus minus motu convulsivo agitata, auram illam in Tympano & interioris cavitatibus movere, & consequenter auditum depravare valet. Confirmat hoc exemplum *HILDANI* *Cust. 6. albus*, sc. qui observavit in Kallio quodam tinnitum ultra annum molestem, propter Gryllum in aurem ingressum, qui forte luvicatus Tympano agglutatus fuit; hoc extrahendo omnis tinnitus cessavit, cessante nempe irritatione praeternaturali, & hanc Membranam Tympani à Mucosis propriis motione; Gryllus enim hic iuxta Membranam hiebat, & eandem commovebat, quia motu continuus tinnitus fuit perceptus. Peritunc tunc, quando *post graves quidam fuit à valida Aetris externi percussione* tinnitus supervenit, ejus occasione etiam auditus depravari solet, quando Membrana Tympani laeratur quodammodo, ex qua laesione semper convulsiones quidam patitur, propter quos motus convulsivos continuos ille motus solet percipi. Unde quicquid Membranam hanc irritare, & in convulsivos motus agitare valet, etiam tinnitum vel sonitum aurium inferre potest. Quoniam ipsa Membrana forti impetu translocata nonnulli, ac officula translocata etiam inferunt continuum sonitum vel tinnitum, donec in debitum statum ac suum redeant.

Hae duae causae videntur ordinariae: nempe Aetris intrinsecus commotio, & hinc Membrana Tympani continuo commota ac vibrata. Sane quilibet distorsio & contusio aliquot annorum tinnitus & sonitus minime ab Aetris internae primario affectu vitio, sed potius à *peritis capitis ossibus* organi mali affluente ratione, oriri videtur: quis inter, haec Tympani Membrana, & hinc Nervi acustici expansio membranacea, primum obiectat.

Quod tandem attinet *Membranam Auditoriam* seu expansionem membranaceam Nervi Acustici in Cochlea, eae alteram causam efficientem tinnitus & sonitus aurium à hujus fibrillae laeratur, aut quodammodo translocatur, quodammodo continua sua motione sonum ingentem & male affectum repraesentabunt. Imò videtur etiam sonitum & tinnitum talis oriri posse ex ipsa filamentis Membranae hujus acustice motis, & convulsivo spasmus variè agitata, v. g. sicut in imminente Epilepsia & Apoplezia non raro variis coloribus & splendoribus ante oculos versari putatur, propter convulsionem Fibrarum Nervi Optici in Tunica Retinae capsula, ita etiam eodem in casu, item in Vertigine, variis sonitus praesententur videtur, ex spirituum nempe & hinc Fibrillarum istarum simili excitatio motu, atque aliis ab objectis externis excitari solet. Nempe hinc videtur oriri, quod Auris externae, Temporum, aut Capitis vehementer percussione, item sonitus vehementiores in Aetrem violentius irrumpentes, subinde tinnitus aut sonitus continua solet inferre, sicut ea affectione & latione Membranae Nervi Acustici. Quod & celeriores & fortiores sunt Fibrillarum motiones, tinnitus; seu vero variis & remissiores sunt, sonus gravis percipi videtur.

Ex hac causa *Febribus tinnitus Aurium supervenire* videtur ex motu humorum, ut vocant, ad superiora, hinc & ad parietes & loca vicina; unde Membranarum in illis locis convulsiva plus minus affectio. Nempe non rarum est, quod ex Sanguinis turgescencia, in specie febrili, cum dolore capitis, lubinde etiam Aurium tinnitus addit; ex motu nempe velocitè & vehementius Arteriarum. Hinc etiam oriri videtur, quod in talibus Morbis acutis Haemorrhagia Narium interdum tinnitus seu sonitus Aurium praecedere solet, ex sanguine turgente & effervescente in illis & vicinis locis quasi stagnante, & ex forti Arteriarum pulsatione, adeoque Membranae Acusticae af-

fectiose, Tinnitum inducente; unde tunc in talibus malis, superveniente Haemorrhagia Narium, tinnitus Aurium cessat, Sanguine per alium locum evacuato. Facit hoc observatio *TULPII* 35. libro 1. ubi observat tinnitum Aurium ex incremento nimio Glandularum, prope quas excurrit metus auditorius. Imò hic ex alia quacunque causa, aut ex Sanguinis motu circa loca Auribus vicinis nonnulli impedito, saepe continua & duratura talis auditus fit depravatus.

Sed quid sit *vis Motus & Rapus humorum ac Sanguinis ad Caput & Auris*, & hinc excitatus aurium sonitus (scilicet motus iste humorum, sursum & deorsum in Morbis à Natura factus, ritè capiendus venit. Moverent humores cum Sanguine, & ab hoc mediante Cordis pulsu indeterminatè tam sursum quam deorsum; quod verò magis quam parum praeripit occupare, ibidem congeri, hinc per eandem evacuari solet, non humorum, sed partium solidarum ex causa venit, dum harum Membranae & Fibrarum causa quacunque, interdum ipso Humorem influentium vitio, irritata, spasmus affecta, plus minus stranguitur; sicque aequilibrium & liberum Contentorum circulum aliquo modo suffragantur, & ita phaenomena, quae alias ab *Arteriarum* (S) humorum, vel rapam eorum ad caput, oriri dicuntur, excitant. Multa hic quae de furditate ex vitio Nervi Acustici *supra* Art. 5. monita fuerunt, etiam huc applicari possunt, dum non rarum sit, permutari invicem obauditionem cum tinnitu.

Cataracta huc pertinet vitia, sic dicta, seu depositio ferè, vitio loquore inquinata, aut litem alimentum chylificum illius vehiculi, ad unum alterumve Nervum aut Membranam locum distribuiti, errata, nervosis partibus inimica, siue Membranam Tympani siue Nervi Acustici afficiant. Interim talis tinnitus non videtur posse esse Chronicus, quin potius brevi tempore transeat, aut non adeo diuturnus est.

DIAGNOSIS.

Causarum omnium harum varietas, praesertim Remotarum, nonnulli ex Circumstantiis probe examinatis cognosci possunt.

Sonitus & ipse tinnitus Aurium ab Aetrio refertur. Causae si sint *internae*, patet Aetrio; ubi verò sint *externae*, in Morbis Acutis, Febribus Ardentibus & similibus, facile possunt cognoscere, esse à Sanguinis & spirituum Animalium inordinato motu; si sint ex alia quacunque causa, raro à priori cognosci possunt, in locis nempe adeo perfunde sicis.

PROGNOSIS.

Quod *Prognosis*: Si in Febre Ardens sonitus Aurium cum Oculorum caligine contingat, cum Narium sensu gravitate, eadem innuit, quae de furditate *Art. antea* dicta sunt; nempe si est cum signis Cochleae, Haemorrhagia Narium expedanda venit, praesertim si pulsationes in capite simul percipiuntur.

In Febribus quibusvis tinnitus aurium & sonitus ferè sponte curatur sine Medicamentorum usu.

Si verò per se Morbum constituit, ex se sine periculo est, nisi quod chronicus & molestus esse solet. Interdum etiam ad omnimodam furditatem terminatur: sicque aurium tinnitus duraturus chronicus extra Febrem, & ut dicunt, qui bicinium & ultra duravit, solet esse satis gravis & periculosus, & raro perfectè curatur, & ut curatur, saepe tamen recidit. In specie ordinarius quasi est prodromus Apoplexiae.

Tinnitus Aurium, qui ex frequenti percussione in caput, ac in regione temporum exoritur, propter internam Membranae Acusticae laesionem, non adeo facile curatur, quia in furditatem degeneret.

CURA.

In cura tinnitus & sonitus aurium consideranda est *causarum efficientiarum ratio*.

De cetero *remedia* & auxilia ea, quae praemissi Universalibus, conveniunt in sonitu & tinnitu aurium, ferè sunt similia istis, quae *Art. antea*, commendata fuerunt in furditate. In specie tamen ad tinnitum aurium inchoan-

(S) *Arteriarum* sursum vergentia: quodammodo *Arteriarum* deorsum vergentia: ab *Arteriarum* sursum & deorsum, atque *per* vergo.

tem *Suffus* seu vapor *an Albuginis & Herbas*, in Lacte vel Aqua communi decoctis; Auribus exceptus, admodum laudatur ab HARTMANNO in *Praxi Gern.* pag. 106. Loco quorum quaque Semina quatuor Calida minora, *Buccae Lauri & Juniperi*, & similia adhiberi possunt. Suffus etiam ex Succino, Olibano, item ex Gummate Ammæ, commodè auribus exhiberi potest contra tinnitum, & somnium. Singulare quid obtinet fumus seu vapor Aceti bulientis, Auribus exceptus, quem laudat LANGIUS in *M. C. pag. 6.* & in specie confert, si Aceto incoquantur Speciebus Nervina, & Decocto infundatur Linatura Martis, & dum maxime ebullit, Vapor excipiat auribus. Item Oleum Vermiculorum quercinorum, item Oleum Nuculeorum Persicorum cum Caloreo mistum, condacum. Preter hæc egregius esse spiritus volatilis Urine, seu spiritus salis Ammoniaci cum Bombace aliquantulum inditus, in tinnitu & surditate convenit. Preter distilla Essentia Florum Anthos, Essentia Ligni Sassafras, Calorei, in specie Essentia seu Tinctura Sulphuris, ut & Felliim Animalium, Hominis aut Lucii piscis, Perdis, imprimis Felli Bovis, gutt. i. ad ii. cum Bombace simili modo in usu esse solent, quod quotidie bis reiteretur, auribus prius purgatis: item Fel Hamanum vel Lucii piscis optimum. Melius est, si recipientur Fella aliquid Luciorum, & Vitro inclusa pasta farinacea occidantur, & coquantur in Cibo, donec Panis est coctus; de hoc liquore aliquot guttæ Auribus insillantur, quibus iunctis, Bombax cum Zibetho imponatur. Item liquor ex Cortice semello Bctulæ, spiritus Furmicarum aut Aqua Magnaunitatis cum Bombace inditus. Aqua Picarum cum Caloreo insillata, vel cum Gollypio applicata, etiam convenit, & in frequentiori usu erat D. MICHAELIS, non secus atque granum unum aut alterum Zibethi aut Moschi Bombace involutum: Nam talis Bombax cum Zibetho aut Moscho non tantum tinnitum aurium, sed etiam gravem auditum, mirè curat. *Sacculus* ex Milio tosto, & Sale tosto cum Aethio, & Chamomilla missis factus, probè calefactus, & auri æternè applicatus mirè convenit, imprimis si aliquot guttulis Olei destillati Caryophyllorum prius fuerit irrigatus.

M. Herb. & Flor. Chamom. M. i.

Aanthi, vel Salvia,

Majoran.

Rosim. an. M. 3.

MAI. 106. 3i.

Sale terref. 3i.

Loca includantur *Sacculo interposito*, qui probè calefactus auri applicandus.

Frequentissimum auxilium solet esse *vapor panis* recenter ex furco extracti, parati ex massa fermentata cum semine Cumini, Fœniculi, Anisi, Origano, Serpillo, Baccis Lauri missa, & sic in cibano excocta, calide auribus admota. Interdum iuvat, sed cautus sit eius usus; nam subinde videtur nocere: Sic BARTHOLINUS *Com. 6. Hst. 77.* notat frigiditatem ea pane calido auribus applicato. Convenit etiam hic Oleum illud mirabile ex Vermiculis quercinis; item Oleum destillatum Caryophyllorum aut Lavendulæ & Camini, destillata invicem missa. Pertinet hoc Oleum Oticum seu Catholicum ad aurium affectus laudatum: Nempe est Oleum Nuculeorum Persicorum expressum cum floribus Persicæ subinde insulum & clarificatum, quod ad gutt. iii. vel iv. in dolore, tinnitu, strepitu aurium, & auditus difficultate, auribus insillatum egregium est; sicuti ad tinnitum aurium etiam inveteratum cum præstantissimum admodum laudatur sequens remedium.

M. Nolle. albi,

Caster. an. 3i.

Cisti. arum. vari 3i.

Ruta 3i.

Zaphr. 3i.

Olei Amygd. amar. vel Nuc. Persic. 3i.

Decoquantur leniter & successivè in duplici Vase in *l. q. Olei rosati*: quod Oleum cum Bombace auribus immitatur, vel guttæ quædam tepide insillantur auri.

RONDELETTI experimentum fuit

M. Rad. Nolle. albi 3i.

Rad. Lauri

Rosa an. M. 3.

FRANCI M. i.

F. Decoctio in oleo Amygd. amar.

vel *Rotum* cum vino albo aut Melastur, ad coactionem Vini colla: Exprimantur, colesant, & auri immitantur.

Convenientius tamen est, si loco Decoctio in Oleis distillatis species potius infundantur in spiritum Vini, & exinde fiat Essentia, addendo Caloreum, Ambram aut Moschum pro lubito, cum Bombace Auribus applicanda contra tinnitum & sonitum Aurium. Vel præparetur Essentia Prædicti casusdam Brunsvicensis *art. anst. data.* Sicut Oleum Nuculeorum Persicorum expressum cum Caloreo impregnatum in usu est. Tandem Decoctio Sinapi pulverisati in Vino sub forma Suffus Auribus accepta, est eaporibus STOCKERI non contemnendum; hinc forsitan spiritus Sinapi ritè applicatus erit proficuum. In diuturnioribus malis, præsertim ubi suspicio est Catarrhalis affectus, *Pontendi* in Brachiis, item *Caryophyllis* post Aures, subinde sum probatur. In Dyscrasia pituitosa convenit Oleum *Barbæ*, quod commendat *lib. 3. Anst. Prax. cap. 1.*

M. Olei Hyssopi,

Rosa an. 3i.

destill. Major. 3i.

Caster. gr. vi.

Craei gr. iv.

Misc.

Quod si tinnitus aurium fiat ex causa ab alto aut perisone capitis, aliisque causis externis, imitetur PLATERUS *lib. 1. observ. pag. 115.* qui præmissis præmittendo Mulierem ex causa ab alto tam gravi aurium tinnitu correptam, ut nihil ferè audiret, præmissis universalibus obstitit:

M. Spiritus vini Cochlear. i.

Succ. Cypar. reni. Cochl. 3i.

Olei destill. Spica gutt. iv. vel v.

Misc.

Et Auribus tantillum eius insillatur, & ita fuit curata. Hæc etiam pertinet Cataplasmata ex Cepis *Pannini*, quod FORESTUS *libro 12. observ. 2. & 4.* describit.

Preter distilla remedia subinde convenit, in specie in *Jenis*ibus aut Plethoricis *usum Brachii* regione auri locantur *secare*, sicut etiam *sternutatoria* moderata in Aurium affectibus diuturnis, præmissis universalibus subinde conducere solent. Fit non raro, ut tinnitus & sonitus, etiam surditas, aures remittant, uno deo adducto in affectibus quasi Catarrhalibus: In tali casu, ubi percipit *Ægæ* redire malum, optimum est applicare Vextiei cum Limeis duplicatis Aquam Apoplecticam spirituosam, aut etiam spiritum uricæ, item Oleum destillatum Succini; hoc ipsum enim uti Catarrhos, ita etiam heuquimodi Pachemata, præcavere solet.

Ex Remediis Internis, Aurium affectibus dicatis, præmissis universalibus duo præ cæteris eminent: nempe *Sassafras & Succinum*, & quæcumque ex istis parata; quæ eo melius conducere solet, si post eorum usum blandus sudor insillatur.

Hæc ferè in tinnitu aurium per essentiam observandi fuerunt.

Sed non rarum est, *Hypochondriacis* pati aurium sonitum, eoque Hypochondriacorum visio contrahatur, qui cum pathematis Abdominis modo exacerbatur, modo remittunt. Speciatim ex Hypochondriis malum esse, ex eo clarècitur, quod pro vario statu stomachi in India aut à Cibatione plus minus exasperari affectus aurium, aut remitti observetur. Præmissis præmittendis Martialis, Carminativa, & hinc Salia volatilia urinosi conveniunt, speciem Li-quor Cornu Cervi succinatam, cum leni sudore. Extremè Essentia Calorei confert.

C A P U T III.

De lesa Tañu.

POA auditum tercio loco est *Tañu*, ubique ferè in corpore reperibilis; absque nempe filamenta reperiuntur *nervæ*, quæ ab obiectis easeris mille modis horum approximatione affici, & variè moveri possunt. Filamenta talia, uti in concorde Cutanea massa locum primarium ob-

abineant, ita ubique hinc inde in Capitula papillaria conglobata ex Cute nonnihil prominent, & ſub Cuticula gonulium & ſtaturalis Taſtus ſentium organum conſtituitur: vid. MALPIGHIIUS in *traſſ. de viceris Taſtu Organo*. Senſus enim communioſiſſimus eſt Taſtus, per totam animi corpus diſſuſus; nam omnes reliqui ſenſus externi nonnihil quidam Taſtus ſpecialis ſunt, & eorū ſunt ſimpliciter per Taſtum, quæ ſolæſionis externæ conſiſtunt in Impreſſionibus factis in Organo ſenſuum, quæ Impreſſiones conſiſtunt in Motu. Requiritur ergo pro recta ſenſatione, ut Fibre nervæ ſint in legitima reſolutione beneficio ſui Toni, qui dependet ab inflatu ſpiritus Animalium. Gullus nil aliud eſt, quam Taſtus certus. In Hepate ipſo nullus eſt ſenſus, quia eſt corpus glanduloſum abſque Nervis. Corpora externa, quæ ſui approximatione diſta Filamenta & eorum extremitates papillares afficiunt, hoc faciunt ſola particularum minutarum in ſuſceptione textura, earumque certa vel Motione vel Quietate. Exinde enim ſunt Qualitates illæ quæ à nobis diſtinguntur Taſtus. Obſervandum eſt alias Qualitates Taſtus. Sed hæc Qualitates tantum in ſtruſtura Filamentorum conſiſtunt; quando enim corpus, cui v. gr. Manus admoveatur, cedit deſenſum firmæ minimorum coheſionis, dicitur exinde *mollis*; ſi non cedit, ſed reſiſtat, ex forti earum combinatione, dicitur *Durum*; ſi quodam particulæ mobiles invicem coheræant, ſimulque Organo adhaereant, dicitur *ſolidum*; ſi nihil adhaereat, dicitur *Siccum* ſeu *aridum*; ſi hæc celeritatem & repetitum, in Papillis ab obſecti externi minimis moleſis, Motus dicitur *Calidus*, ſi nullus, dicitur *Frigidus*; & ſic in infinitum ſerò. Aſia enim, & gr. per ſe nec frigida, nec calida eſt: Membra frigida in Nive ſenſitū calidum omnibus. Aſia calida per ſe frigida, quia remora Mente exteriore, igne, cellat celeriter: Vid. BOYLE tr. *Origo quæſti. & ſermon. & traſſ. de Fluiditate*.

Motus autem Taſtus diverſimodè: Nam præter abſolutionem & limitationem ſuam *Apſolitam* & *Paralictam* privatam, item præter hæc abſolutionem *peſſimam* in *ſupore*, Taſtus interdum depravatur ſeu potius augetur & exasperatur in affectu, dicto *doler*.

ARTICULUS I.

De Stupore.

DE Stupore qui & affectui Taſtus obveniens eſt, nihil addo, cum ratiſſimè ejus cura incumbat Medico.

PROGNOSIS.

Nam particulæ *ſupor* citra manifeſtam coſam obveniens, ſubinde prodromi ejus ſoleat aut Paralyſis Scorbuticæ, aut ſi plura occupet Membra, Hemiplegiæ, aut etiam univerſalis Apoplexiæ.

CURA.

Et *ſupor* quidem, qui maximam corporis partem, aut etiam univerſum corpus, quod tamen ratiſſimè evenit, invadere ſoleat, optime per *Liquor ſaſſatæ* & Medicamenta *ſaſſaſata*, quocunque modo adhibita, curatur & propellitur.

ARTICULUS II.

De Dolore.

QUOD Dolorem attinet, omnibus ſenſibus externis communis eſt affectus *Doler*. Nam ut omnes Senſus ſunt per certum Taſtum, vel per Contactum ſeu per Impreſſionem quendam Obſecti lenis in Organo proximum, quam Impreſſionem ſequitur talis ſpiritus Animalium motus in Organo, qui vocatur ſenſus; ita ſi in Organo tam vehementer ſit Impreſſio, ut illud nimis moveatur & vibretur, & eandem animi rapidè & vehementer in eo ſpiritus agitetur, ſequitur ſenſum adunſta Moleſtis, ea præternaturali & nimis vehementi obſecti, Organum contingens, Impreſſiones reſultant, quæ ipſa Moleſtis communis nomine *Doler* appellatur. Si enim v. g. datur *ſiſto doleris*, ex ſubito aſpectu rei nimis lucida, ſeu Lucis fulgidæ poſt tenebras, ob vehementem & præternaturalem motionem Membræ

Retine; datur *audire* moleſtis ſeu *doleris* & tardioſus ex nimio Sono, impetuſioſus tangente autem internam, ac nimis fortiter moveatur Membræ Ana Auditorium in Cochlea, quod ipſam etiam facit inæqualis motus membræ in Sono non harmonico & inæquali. Idem fit etiam ſimiliter in *Gula* & *adverſa*. Speciatim ſi Fibris nervis obſectum quoddam taſte in ſpecie ſic dictum occurrat, quod eas nimis fortiter & non abſque quadam vehementia moveat, ſequitur Taſtus conſonſta moleſtis, ſeu in ſpecie ſic dictus *Doler*.

In ſpecie ergo conſideratur Taſtus, quatenus eſt *ſimpliciter Taſtus* ſerè præcipuum, tam internas quam externas partes exercens.

Pro cognoscendo ergo Dolore præſuppono ex Physiologiæ, quod Fibra in genere ſubſtella *ſunt Taſtus*, & quæcumque ſenſus in ſtatu quidem naturali tantummodo, & quæ extra Cutim ſub Cuticula in Papillis protuberant, ſive in Membranis ſubſtelliſſimis contractæ, ſive in Corpora papillaria conglobentur, ſive nuda aut ſolitarie diſtribuantur: præternaturali verò in ſtatu etiam reliquum Fibrarum ſyſtema & ipſum tangendo afficitur, & in ſpecie Dolos ſentitur Neminem ergo conſonſta, quod in Vulneribus vel Ulceribus &c. ubi vel Nervi, vel eorū Fibre tanguntur, & ubi nullæ tales ſunt Papillæ & Membræ, ſenſus tamen præcipitur acutiſſimus & dolorificus inſpigitur; nam Fibre eorū ſenſunt, id eſt promptè moventur. Hæc tamen intercedit differentia, quod in *Papillis* naturalis & blandus ſit Motus & Senſus, Taſtus ſcilicet ſimpliciter ſic dictus; in *Fibra* verò nervis violento & nimio earum motu, Taſtus dolorificus & quæ præternaturalis. In Membranis autem vel punda, vel diſſectæ, vel rupe, eadem ratio militat atque in Fibris nervis ſolitariis. Unde hæ præternaturales affectiones naturali & ordinario Taſtu Organo ni derogare valent.

Fibra hæ, earumque ſubſtelliſſimæ Fibriſſæ, ubi ex fortiori & vehementiori obſecti actione & motione quæcumque ratione à ſe invicem violentè ſeparantur, diſſolvuntur, & quali lacerantur, ſequitur in iis adeo vehemens & moleſta Motus & Vibratio, adeo ut eſt ſitu æquali & ordine naturali violati, quædam ab aliis diſſolve, quæ contradiſta vi abbrevientur, quæ & alius illaſis in naturali ſitu violentè quali trahant ac lacerant, aut eum molu, quo dolorem ex puctis Nervo explicat SYLVIVS lib. 2. c. 27. §. 165. hinc Moleſtis illa accidit, quam *Dolorem* nominamus: & hæc videntur reſponſi Veteres, dum *Dolorem Salutarium* Critici debniverant.

Affectus Fibris, Vibrations illius occasione, ſpiritus Animales & ipſi ad certum modum determinantur, ad Cerebrum nempe, ubi in *ſenſu communi* ſiſtunt *Dolores* perſeſſi ſeu ſenſus doloris interni: Conſ. SYLVIVS per lib. 2. c. 27. §. 168. WILLIAMS Pharm. Ration. part. 1. ſect. 2. Hoc ipſo ſenſu convulſiſſi quid patiuntur, & io ſpſionis aguntur, ita ut motus *Fibrillarum convulſiſſi & convulſiſſi ſeu ſpſionis* illud, in quo ratio formalis Doloris conſiſtat. Unde ſic quid non raro Dolores ſequantur Convulſiones ac motus convulſivi, ſi ſcilicet ſit aut diſturbatio, aut graviore, ea inordinata ſcilicet & veloci ſpiritus Animalium, occasione Doloris, in Cerebro motione; ut v. gr. ex *Paulina* Nervi dolorifica convulſio Membri, aut à *Nephritide* Vomitus ſuperveniat: Imò in *quæſti doler ſenſu* per convulſiſſi quædam, occulta licet, junctiolet & hinc enim tendi plū minis Part dolens, & ſerè pallioſa Moleſtis ſimul ſupervenire ſolet: adeoque hæ circulus ſervandus, ut & à Dolore Convulſiſſi & Convulſiſſi impetu Doloris incrementum: *hinc alius Dolore alius*. Quod ſi jam Fibriſſis læſis & nonnihil laceratis, Obſecti, naturali licet impreſſione, agentis ſit conſtaſtus, tunc Fibriſſis antea nonnihil laceratæ aut diſſolve, vel tantillo obſecti Conſtaſtus nimis agitatur & vibratur, novam Doloris Impreſſionem repetentem faciunt: Unde vel leviſſimis Specilli contactu in partibus vulneratis aut ulceratis intolerabilem Dolorem concitat; magis tamen in partibus nervoſis ob Fibriſſas copioſiores, minis in partibus ſanguineis ob Fibriſſas rariores, vel etiam diſperſas.

Similis interim Motus ſeu Taſtus ab obſectis in extremitate Fibrarum nerværum in Fibris partis ſanæ, poſt abſceſſionem Membri Spachelo correpti, læpius producit, tum ignorantes Agri exiſtimant, ſe in Digtio Manus, ante aliquot dies licet abſceſſo, Dolorem percipere, qualia Exempla habentur in HILDANO, *cræſas*. 3. *ſerſor*. 14. & 15. item in SCULTETO *Aræm*. pag. 67. & BINNINGERO; idque ob continuatas tales nervas Fibras ex parte ſana ad partem ulque, antea abſceſſam, ob quam continuitatem naturalem dum ſimilis ſit motus Fibre circa eius medi-

medietatem post abscissionem, qualis antea fiebat in Fibris extremitate, ante hujus cum parte separationem, hinc fit, ut ea identitate Motus etiam in sensu interno & Imaginatione idem iteratur judicium, & æstimatur pars jam abscissa adhuc vivere, quasi Totæ adhuc coherere.

C A U S Æ.

Ex his causis doloris proxima, materialis nempe Læsiō, & violenta ac vehemens Motio Fibrarum nervæarum Organæ ab obiecto præternaturali, & formalis, Spirituum hinc rapidior, singulariter tamen determinatus, & ad cerebrum uque continuatus Motus, per se patent. Illa pro sensu Doloris careno; Hæc pro sensu Doloris interno.

Remota est omnia id, quod Fibras læsere vult, quod ipsum præstet est varium, & ipse quoque parres prout variant, etiam tam variaz Doloris species exiungunt, inde ipse etiam postmodum varias Appellationes acquirit, quorum sanè innumerabiles sunt species, cum omni quoque obiectum peculiariter quodamque, & unaquæque pars alio & distincto ab aliis modo Impressionem recipiat. Communiter equidem sex Doloris species recenseantur: Sed, ut dicit, innumerabiles sunt Doloris species, si easde velimus perscrutari; omnis tamen in eo convenit, quod violentam nimis Impressionem in Fibrillis nervæis, & consequenter earum aliqualem Læsiōnem, inferre valeat.

Causæ hæc remouet sive vel externa vel interna: externa sunt oculissimæ, ut omnia ea quæ contundunt, secant, vulnerant, lacerant, urant, erodunt, & similia, quæ per se patent.

Causa interna Dolorem efficienter inferentes, imprimis sub nomine visus, qui ut plurimum acerbissimos Dolores & Rationes, etiam puncturas inferre solet, utpote Nervis insensibilissimè, militare solent, ita ut tære in omni Doloze acerbio, à causa interna enato, Acidum aut Acido-salium peccans in recessu sit. In omni enim Acido sunt particule admodum acutæ, similitudine dunt, quæ & se insinuant in Fibras, easque pungunt, lacerant, & quasi scindunt, & ita acerbissimum Dolorem inferunt, quin & sæpius simul ardoris et inflammationis quoddam sensum junctum habent; v. gr. si qui vel guttulam spiritus Nitri Cuti affundat, ab hujus Acute exalido intensus Dolor, una cum sensu Ignis quasi ardentis: inferitur & talis Dolor etiam in Arthritis & Doloze Ichiadico, item in Erysipellate, & Pleuritide, & similibus Doloribus ab Acido ortis est obvisus. Atque hæc peccantis doloris Origo ut plurimum est in stomacho primæque viæ, rectius gratia in Arthetico, Scorbutico, Ichiadico, rarior ex privatis partibus affecta in digestionis propria læsiō vicio: v. g. in affectibus doloris chronicis aut sæpius recurrentibus ab Acido natæ, in Odontalgia, quando Dens ex læsiōne priuæ Digestionis acidum colligit, quod Dolorem inferit si Sic in Osse carioso sæpe torrens Dolor observatur à Nutritioe privato vitio.

Differentia dolorum sunt tantummodo innumerabiles ea varietate obiecti lædētis, multiplicitate Organi læsi, & Motuum horum ad se invicem proportionem oriundæ: in specie tamen primariæ differentie sunt ratione diversæ fluxus causa proxima, & deinde ratione diversæ modi affectandi partes.

Quod varietatem causa attinet; Dolor prout excitatur ab Acido plus minus volatili seu spiritoso, vel minus volatili, seu hæc, hæret in substantia humore, seu vehiculo subestior & tenuiori, ut Lympha, vel crassiore & viscidior, ut Chylis, item prout acidum dolorosum plus vel minus parci valenti infusum fuerit, etiam vel pertinacius magis, vel facilius aut difficilius mobiles, adeoque sive vagi nunc fieri esse solent; idem exinde plus minus recidivæ, aut facili curabiles, cum aut sine partis erosione juncti, observantur Dolores, adeoque variis modis mutabiles & alterabiles: sic contumacissimus sive Doloris Præuri, & ut plurimum cum erosione partis juncti, propter acidum acre in Mucis glutinosissimè, pertinacissimè parti infuso.

Doloris vagi, adeoque ab acido magis volatili spiritoso, magis ipsius infusio, in subiecto seu Vehiculo tenuiori partibus communicato, exemplum habemus in Arthritis Vagæ scorbuticæ: econtra doloris fixi, ab acido magis fixo viscidioris, in subiecto viscidioris vel tenaciori hærentis, exemplum habemus in Arthritis ordinaria in articulis hæsitante; item in Colica à Mucilagine viscosa acida in cellulis Coli flagrantis, & petriacissimum Dolorem inferente.

Frequenter recidivæ autem quod attinet Dolores: idem in uno eodemque loco ut plurimum cum proprio & privato partis vicio conjuncti esse solent, vicio omne ejusdem digestionis læsi, indeque Recrementorum acrimia dolorosorum pro-

ventu oriuntur, & ferè Tempestatum mutationibus insensibilis, Aggromque Ephemeris consistunt; Id quod nec, gr. in Odontalgia esse manifestum. Maxime post Articulus graviter vulneratos Dolores remanent pertinaces, quavis Tempestatis mutatione recrudescentes, ex Fermento vitioso, in parte ea ipsius Insiti debilitate genito, ab exteris commoto, & partes sensiles notabiliter vellicantes.

Simile ferè atque supra dictum, Dolor nunc est continuus, non Interrumpitur: & hic vel Periodicus vel non Periodicus. Periodicus est, qui certa observat tempora, & frequenter continuus, verbi gratia scorbuticorum vel Venereorum, esse solet, quando nocte gravis lacerans Dolor sublequitur, de die vero nihil sentitur. Continuus præsupponit acce intensius parti fortiter inherens: Non continuus, Acce remissus, (altem occasionalibus quodammodo exteris motu & excitabile, & minus firmiter agglutinatus, & minus fortiter partem afficiens).

Porro Dolor omnis est nunc cum Tumore, nunc sine Tumore conjunctus, qui Tumor est tam sanguineus, quam serosus, Scirrhus &c. Tumor interdum est causa Doloris: interdum, idque frequentius, Tumor est effectus seu productum Doloris: verbi gratia inflammatorius Tumor & suppuratus causa est Doloris ardentis, rodentis, pulsatorii: Econtra Dolor est causa Tumoris in Arthritis, Odontalgia, &c. ex Fibrarum stridura convulsiva, æquabilem contræctionem motum & ciculum remouente. Ordinarius in Doloribus Arthriticis, quando adfert Tumor, vel in aliis partibus Dolor, dicunt est Casus, hinc Dolor, hinc Tumor: sed falso quia ex Doloze supervenit Tumor, unde cessante Doloze, cessat Tumor: v. gr. Homo Spina pungitur intra Digtum, vel vulneratur in quadam parte, ubi nullum antea habet Dolorem, sed post Vulnus supervenit Dolor, post Dolorem Tumor. Reverà ergo semper Tumor sequitur Dolorem, quia ex obiecto dolente, seu Acido vellicante partes nervæas, & Dolorem excitante, in illis partibus supervenit Fibrearum nervæarum Spasmus ac Convulsiones, unde angustiantur pori partium, adeoque remouetur sanguinis Circulus, unde Tumor. Si vero diffunditur Dolor Anodynis, & remouetur Spasmus, Dolores cessant penitus. Sic qui in Arthetide & similibus volunt curare Tumores, Curam à posteriori inchoant; sistantur in Odontalgia Dolores, & Tumores evanescent.

In specie pro meliori Methodo medendi, observetur differentia Dolorum, imprimis ex causa interna ortorum, quæ ratione affectandi modi (vid. SYLVIVS de Dolorum celsis) est deciplex. Singulas dinumeremus.

§. I.

Dolor Gravissimus.

Dolor Gravissimus, premere, & tam graviter jacere dicitur, quando sensus quasi Ponderis cumdam prementis & gravantis percipitur, v. g. in Hepate tumido aut scirrhus, in calculo renum ingenti, sed quieto.

Oritur in parte sensu aut pauco aut obscuro prædita, sentiente tamen nonnulli Membrana cindis, quæ ipsa pars infarsa & tumefacta imprimis à materia viscosa, vel viscida, vel fluida, minus acris, sed ferè dulci & insipida, pondus gravioris sensum repræsentat, ut si piovita, sanguis, Serum, Lympha, &c.

§. II.

Dolor seu sensus Punctorius.

Membranis propriis (pungit inflat Acuum): dom ex improvis repetitis vicibus quasi Aciculis aut acutis Instrumentis Membranzæ pinguetur, & interruptim vellicantur, ipso punctuosis sensu ad magnum spatium de diffundantur: quibus Dolor v. g. est in pleuritide, & similibus locis membranosus.

Oritur ab acido acris, firmis parti membranosæ infuso vel impaço, eandem pungente & rodente, quæ hinc convulsivo Spasmo crispatur, unde Doloris intensio.

§. III.

Dolor Terebrans seu Acutus.

Dolori punctoria cognatus, simul tamen Terebrationis aut perforationis sensum conjunctum habens, jacet & pug-

gir in uno loco, fixus est, quasi *Terebra* aut *Pala* *Perforatur* qualiter, g. in Arthritis, in erysipate, & similibus affectibus est satis cognitus; item in Dolor Colico, Cephalico, &c.

Oritur à viscido plus minus Acido, parti cuidam impadæ.

§. IV.

Dolor Rodens seu Mordax.

Mordet & rodit, quando percipitur Sensus cuiusdam rationis & Morionis, quasi *Formicæ* continuè sodicarent, & roderent, qui membranosus locis proprius.

Oritur ab *Acri salis* succo, nervosa & membranosa loca rodente & vellicante.

Huius vicinis est *dolor Pruriginosus*, ut in purpura & scabie.

§. V.

Dolor Pulsatorius.

Pulsat ac si Gallina rostro cibum sumat, quia in eodem pulsatorio sensus aut *arterie pulsatio* exactè percipitur, ita ut quoties arteria pulset, toties etiam Dolor exasperetur, Proprius est inflammationibus & partibus inflammatis, v. g. in digiti à spina infixa inflammatione.

Provenit hic dolor, quando in parte quadam tumente & dolorosa tenduntur Fibre & membranae, & cum Membranis etiam simul tunicis membranosis ipsarum artiarum; tunc enim sanguis per arteriam impeditur nonnulli motus legitimus, & propter fibrarum tensionem difficultas sit Sanguinis exhalatio in dictam partem, quia potius fibræ sanguine irruunt irritantur: id quod observatur imprimis in *flagnantibus humoribus*, adeoque ortis tumoribus, unde præ cæteris hæc Doloris species observatur in Digiti à spina infixa inflammatione, aut fortioribus Membranosarum tensionibus, item in Cephalalgia.

§. VI.

Dolor Ostocopus, alias Frangitivus.

In hoc ossa in sui profundo quasi frangi & Malleis contundi videntur, qualis v. g. in *Lux Pleurae affectis*, imprimis nocturno tempore, contingit; nec *tereburibus* aut *Hypochondriacis* inveteratis & similibus est rarus. Afficitur proximè Membrana investiens Ossis, seu periostium) quod ab Acido vellicatum dolores istos repræsentat.

Oritur ab Acido non adeo acro, interdum in materia pila minis viscida hærente, pertinacius perlofo affixa.

Huius dolori vicinis est *dolor contundens*, profundiora loca occupans, ac mitius rigens.

§. VII.

Dolor Tensivus & Dissidens.

Quando quasi disrupta pari distensa videtur. Proprius hic dolor perprimis *Partibus membranosis*, aut membrana quadam densè involuta, per se nullo aut admodum paucò & hebeti Tañu prædictis, quæ spatio correptæ tensivum dolorem repræsentant; v. g. qui Caput subinde affligit post Cræpalam, aut dum in odontalgia didimidi caput tendi videtur.

Oritur à Spasmo partium membranarum, & fit in specie in *Mali Hypochondriaci*, ex irritatione membranarum Partium ab acido molesto.

Diffinguendus est hic Dolor à *doloro dissidens*; dissidens est quando à re repleta, v. g. *Fluibus*, Membrana cingens dissidetur, & dolorem Tensivum repræsentat, ut in Inflatione Stomachi, hypochondriorum, Colica flatulenta, Tympanie, Ascite, & similibus.

§. VIII.

Dolor Lancinans & quasi lacerans.

V. g. Estardescens Fremitus, & in Capite, &c. quasi quis oculus laceraretur, qualis sæpè in *cariculis* percipitur, Frequentissimus est in Praxi, *Membrana* est proprius.

Oritur ex Acido acro plus minus salso subtili, ferè volatili & tenax, Partes membranaceas rodente, vellicante, & variè morficante. Nunc autem acrior est, nunc salisus, unde

Tom. II.

nunc Lancinans, nunc Lacerans, nunc Tensivus, nunc similia sensus percipi solet. *tereburibus* est non rarus, qui, utut uno saltem in puncto subinde affligat, per consensum tamen Membranarum aut nervorum sæpè integrum nervi ductum vel quoddam membrum afficit: v. g. Malum lichenicum, tantum prope Os sacrum est, sed tamen in toto corpore per consensum dolor percipitur.

§. IX.

Dolor Ardens.

Quasi Ignis scintillulæ hinc inde orerent, ab Acido subtili acro, ferè volatili, *Partes fibras & membranaceas* afficiente, v. g. in *Erysipelle*, in quo pars membranosa solida afficitur, tantum si spiritus Nitri redificati aliquot guttæ fuerint isoperiæ; subinde vero in partibus Dolor Ardens talis percipitur ab humoribus contentis effervescentibus, & à dominante Acido volatili produciuntur.

§. X.

Dolor Aegens.

Friget & alget, ab Acido minis acro, sed singulariter *Fibras* alterante, & quasi stupore afficiente.

Sed variæ sunt Dolorum Species pro varietate objectorum & partium affectarum: Pergimus ad Signa.

DIAGNOSIS.

De Signis *Diagnosticis* res clara est, quia dolores satis manifestantur ab *Aegris*.

Differencia Dolorum à Modo afficiendi, & Circumstantiis cognoscuntur.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*, Prognosis Dolorum variat pro Circumstantiarum super allegatarum conditione.

Fir interdum, ut cum gravinibus Doloribus coniungatur *Pulsus Determinatus*, qui tamen non debet terrore Medicum cum hoc frequentius eveniat, sedato enim Dolor statim Pulsus ad naturalem redit æstimum, vid. BARTHOLINUS in *obs. Anatomice*.

In genere tamen nulla: Dolor in quacunque Corporis parte *arrestatur*, semper enim aliquid mali præsentat, cum certum sit, quid ubiqueque *Aegri* dolent, ibi laborent Morbo: Conf. HILDANUS *Chen. 5. Obs. 7.* Hinc & HIPPOCRATES inquit: *Ubi dolor, ibi Morbus.*

CURA.

In Cura: Dolor omnis tollitur, aut quacunque *causam removendo*, aut eam *temperando*, sicque *dolorem demulcendo*, aut *sensum partis supponendo*.

Ex qua *Causam Doloris removendo*, si est ab Interna, in specie sunt ferè: *Alcalia*, tam sica quam volatilia, tam macra quam pingula, live elosa live aromatica, pro Circumstantiarum ratione seligenda, quatenus penetrant, Acidum corrigunt & tollunt, Viscidum incidunt & attenuant, vi sudorifica Acidum humorosum resolvunt & discutiant absterpunt & removere. Quæ secundò *dolorem demulcens*, sunt *austoria blanda*, acrimoniam Acidis temperantia, fibrarumque tensionem & irritationem demulcentia.

Quæ verò tertium faciunt: *Narcotica* dicuntur.

Temperant & demulcent Pingula, Oleosa, Macilaginosa, hoc Acce quodcumque abundant, mitigant, Fibrarum ipsarum & tensionem blandè emolliunt. Narcotica, ut *Opium*, *hyoscyamus*, & similia, *supponunt*, quatenus fiores minisque mobiles reddunt Spiritus Animales, catenatos etiam dolorum obiecti Impressionem, Purissime Irritationem percipi inhibent. Usurpantur hic ipsa tam internæ quam externæ. Interna in specie *Opium*, & hinc Volatilia aromatica, quatenus hæc Acida destruant, & vi per sudorem vel per Urinam evacuant, simulque nervis gratia existunt. Præsertim *Sudores* ad corrigendos dolores etiam medicatissimos subinde sunt summè proficui, dum eorum medio & Viscidum, in contumacioribus Doloribus simul peccans, pila minis emendetur.

Inter *Purgantia* excellit imprimis *Mercurius dulcis*: Conf. VELSCHIIUS *Medic. lib. 2. pag. 40.* Quibus evacuatis

Ssss

pro

pro somite morboſo circa primas vias deſtruyendo, *Morbillia*, *ſarſina*, *ſolaria*, ut Aurum Diaphoreticum, addi ſolent. Scituti extenſe per Cauſe peccantia remotione, nunc *Propoſitio*, *ſtenuſia*, *ſpſteraria*, *Caſſia*, &c. magis inferiunt: v. g. **POTERIUS** *Cant.* 3. *cur.* 84. *Dolorem* eſt Tibia contumaciſſimum, *Sideriſis* oculis curandum, aperta Tibia *Caſſia* curatum. Inuenta ibi Materia dura, ſubſtilida & ſebacea, qua ſubſtila Dolor emanat. **SCHENCKIUS** lib. 3. *obſervationum* Dolorem omnium Membrorum reſert, excitatis per Phlegmicos copioſis Puſtulis, & evacuato ſero, curatum.

Sani Dolores Artuum grauior ex ſero acri ſcorbutico nati, & io quibus nulla ſere Partis alteratio ſenſilis obſervatur, per applicatum *Hyſtericum* optime curantur: Sic **ZAGUTIUS LUSITANUS** lib. 2. *Prax. Admin. obſervat.* 57. reſert, Lumborum ſerum Dolorem impoſita ſupra Lumbos *Hirudinis* curatum: Idem *l. obſervat.* 72. reſert, immaſſe Inguinum Dolorem *Saluſtiana ſiliſſia* curatum. Ubi Dolor ſupple iſſis Remediis, cedit, profuſa obſervatur ſolito Venarum Ruminarum ſub Lingua, de ſanguine calido & ſurſulo conf. **BORELLUS** *Cenſur.* 1. *obſervat.* 47. **HORSTIUS** lib. 1. *obſervat.* 9. habet diuturnum & contumacem Brachii Dolorem, *Dietis ſideriſis* curatum.

Res ut melius pateat, de *Narcotico* obſervandum eſt, quod eundem Dolorem quidem tollat, ſed ſaltem poſteriori & quaſi a poſteriori current, Doloris ſymptomata liſtendo, ſed Cauſam Materialem nec corrigendo, nec removendo; adeoque necelle eſt, cauſi ſimul in eorum uſu de quibus Cauſelis optime diſſerit **JOHANNES CHICOTIUS** in *Diſſert. & Epſt. Med. in Dialogo de Dolo*, dum dicit: *ſi redens Mater accerſiet*, *Narcotica* *ſunt exhibenda*, *uſque* *quae minus* *huc* *affligit* *quod* *alios* *ſedant*, *quippe* *&* *tenues* *vel* *acri* *&* *calidi* *humores* *Humores* *ſunt*. *Max* *autem* *Narcotica* *non ſolum* *ſaluſtiana* *ſunt*, *quod* *ſenſus* *torpor* *inducunt*, *ſed* *etiam* *quod* *Humores* *immuſtatem* *egunt* *&* *quod* *coquantur*. *Ibi* *vero* *traſſi* *&* *placidi* *Humores* *eum* *acere* *compaſſi* *exercentur*, *ut* *in* *ſtatu* *ſimul*. *ſer* *inſoſſus* *ex* *irritatione*, *aliuſiſſima* *ſine* *Opiato* *qua* *torpor* *inducunt*, *omne* *quidem* *quod* *Dolorem* *mitigant*, *ſed* *deterior* *reddunt* *partium* *affligentem* *diſſipationem*, *ut* *in* *Colicis* *Doloribus*, *in* *quibus* *v. g.* *ex* *Opiis*, *Hyſtericis*, *&* *ſimilibus* *Remediis*, *Membris* *ad* *ſuſtendum* *reducunt* *idonea*, *&* *in* *Fluoribus* *ſtatu* *Dolorum* *eum* *ſanant*, *ſed* *Doloris* *ſenſum* *tollunt*, *partem* *enecant*, *&* *ad* *Gangrænam* *diſponunt*. *In* *his* *ergo* *caſibus* *ſtatu* *Cura* *deſerit* *eſt*. *Haec* *ſententia* **CHICOTIUS**. Cauſe ergo Narcoticoſum uſus adhibetur, & nonnisi urgente neceſſitate, & ſaltem Appropriatis reſpectu cuius peccatis & Partis affectus nulla, praemissi praemittendis, adhibetur. Hinc etiam Opiata minus conveniunt in Dolo Pulſatorio, quoniam metus eſt, ne ad Gangrænam producantur: non conveniunt io Dolo Oſſeo, in ſpecie Luc. Venerea correptorum; quoniam enim ſederat Dolor, alio tamen tempore eo atrocius ſolet urgere. Magis tamen conveniunt in Dolo Oſſeo ſcorbuticorum; ſemper tamen adduntur Appropriata volatilia. Conveniunt verò in Doloribus Pundentis, Tenſivis, etiam Diſſidentibus, Lancinantibus, & Lacerantibus, io Doloribus Vagis, & qui ſunt aliae Circumſtantiae.

Praeter has circa Narcotica Cauſas in quovis Dolo curando ad tria ſemper reſpiciendum:

1. *Ad Partem affectam* plus minus ſenſilem, adeoque ſere plus minus carnalem & nerveam.
2. *Ad Cauſam* *Efficientem* *occaſionalem* plus minus acrem.
3. *Ad Subſtanti*, ſeu quali vehiculum Caſis, vel viſcidum, vel glutinoſum, ſucciveſſe attenuandum; vel tenue & ſubtile, facile diſſipandum.

V. g. in *Nodus* & *Gummatibus* *ſuavis* nocentiſſimus eſt ſpiritus ſalis Ammoniaci applicatus, cum implicabilis Dolores inferat, io Acidum acce impoſitum agendo: Unde Efferveſcentiae quali concuſſio mori, & reſoluto uonnulli ſubſeſſo viſcido, crudeliſſime exacerbat Dolores. Nempe quo lenſior eſt Pars, eo magis Temperata conveniunt: Item quo acrior fuerit Cauſa occaſionalis, item quo viſcidior eſt Fomes, edimioſi Volatilia diſſoluta, ſed ſucciveſſe Emollientia magis conveniunt. Ad removendam cauſam, ſi eadem obſervatur, quod ſit Acidum viſcidum, praeter eius omniomodoſum per quacunque vias Evacuationem, conveniunt omnia, tam interna, quam externa, Alcalia, Acidum quocunque corrigentia, aut io tertium, aut io ſolum, aut io ſaltem minus dolentibus tranſmutantia.

1. *Remediis* *ſit* *ad* *primam* *Clafſem* *pertinentia*, *Alcalia* *plus* *minus* *anacronica*, a priori Dolores curantia, quatenus Acidum deſtrunt, ſunt ſequentia: Abſinthium, *anethum*, Chamomilla, Malva, althaea, Sambucus, in ſpecie ejus-

dem *Flotes*, *Mencha*, *Verbaſcum*, in ſpecie ejusdem *Flotes*, & *Parietaria*, ſane conſentim *Abſinthium*, & *comparietaria* decoctum, & inſar *Camphorae* applicatum, io plurimis Doloribus reſolvendis & diſſipandis perquam convenit; ſive a Cauſa externa, Contuſionibus ſemper, nati fuerint; ſive etiam interne ac acri Humore ſeroloſorum duſerit, ſum in Capitis Dolo, quam aliarum partium: Sic v. g. **AMATUS LUSITANUS** *Cenſur.* 3. *Curat.* 57. Dolorem ſpinæ ad Os ſurgentem per tale cataplaſma ex Abſinthio & *Parietaria* in Oleo friſa & applicata curavit. Porro Folia Lauri, Radices Althaeae, Liliorum convallium, Crocus, Raccæ Lauri & Juniperi, ſemina Camini, Anethi, Carvi, Lini, Foenogreci, Anſi Foeniculi, etiam hic conducunt. Ubi caſtrius vel abundans Serum acce Dolorem inferit, *Item* *humidus*, V. g. ex Floribus ſalviae, vel ſalvia, item Mayrana, item Roſmarino, non conveniunt, ſed Dolores ingentes cauſant. Proſpectus in hoc caſu magis ſunt *Pungitones* ac ſuccivo, ut ſumigetur Pars dolens; & ſerum acce temperatur, Fetus vero humidus Dolores magis augeat: Ex his paratæ Aquae Vitæ ſeu ſpiritus volatiles, Aqua articularis ad extra & intra, imprimis acuatæ ſunt *ſpiritus* *Uringis*, *ad* *dolores* *praeteritum* *Lactantes*, & *Lancinantes*, imprimis ſcorbuticos, nodum tempore affligentes conſervat. Item Urina humana, & omnia ex his parata Remedia, ut ſpiritus ſalis Ammoniaci, ſpiritus & ſal volatilis Urinae humanae, inſiguntur conveniunt; oam talia abſorbent omnem acorem. Non ſecus ad hujusmodi dolores ab acido volatili ortos, imprimis Volatilia ex Animalibus petita Remedia, conducunt, in ſpecie ex leſeſſis: quae inter ſunt imprimis Lumbici, & ex his paratæ ſpiritus Lumbicorum terreſtrium, Formicæ, & ex his parata Remedia: unde *Scarabaeus* *Uringis* & *Liparis* ex his parata ſingularem vim tribuit **GLAUBERUS**. Hinc v. g.

℞. Aquae Artis. ad exte. ℥i. ad ℥ii.

Spiritus Urinae, vel Salis Ammoniaci cum Catechu parat. ℥ii.

Lamb. terr. per ſort. cum Sale volatili. acuat. ℥ii. vel ℥iii.

M. D. S.

Aqua articularis externa.

Uſupetur *extenſe*, *Membris* *prout* *fricando*. *Vel*

℞. Tol. Mart.

Sato.

Rosin. an. Mii.

Rad. Angel. ℥i.

Art.

Pyrethri an. ℥ii.

Flor. Anth.

Levand.

Simb. Arab. an. p. ii.

Sem. Ervæ ℥vi.

Caſſia. ℥iii.

Conſiſſa *&* *contuſis* *affunde*

Spiritus Vini p. ii.

Lamb. p. i.

Stent *per* *aliquos* *duos* *Vale* *clauſo*, *in* *loco* *ſepido* *1*

Liquor *ſitretur*, *℥.*

Spiritus *ſive* *Effluvia* *per* *Alcalia* *extenſe*

applicando.

Pertinet huc etiam *ſap* Venetus in ſpiritu Vini diſſolutus, & ita in forma liquida illius; hic enim ratione Alkali oleoſi dolores ex acido ortos Rodentes, etiam arthricos, ſubinde compieſcit. Quod ſi ardoris ſenſus conſonius ſit, in *Spermate* *Rosmarini* ſolvatur; ſi minus, ſolvatur vel liquet in *Spiritu* *Urinae* *ac* *Lambicorum* *terreſtrium*, aut *Spiritu* *Vini*, addita *Camphora* & *Croco*, & ita cum pluma ſolutoſa applicetur. Oleum ex Floribus Verbaſci, vel ex Floribus Sambuci, per putrefactionem & in clibano digeſſionem, inſignia ſunt & egregia anodyna, ut ſupra, ubi de Affect. Oculi. de hoc Medicamento audiviſſi. Pertinet huc etiam *Camphora*, poteſt anodyna, cum tota ſit ſal volatile oleoſum concentratum, ſimulque admodum penetrativa, dolores ab acido optime compieſcit: hinc ſpiritus Vini camphoratus ad ſopondos dolores teſſamentarios, in ſpecie hyſtericacos eſt optimus. *Spiritus* *Vini* *eructus*, *camphoratus* in artibus doloroſiſt eſt optimus; unde etiam ſolutioni *Sapoſi* *Veneri* *nonnanyam* *Camphora* *additur*, idque egregium cum ſuccellu. *Ros* *quoque* *hic* *pertinent* *imprimis* *eorum* *ſpuma*, *alcali* *temperato* *ſingulariter* *anodyno* *tardum*, unde & arthricos hiſque cognatos Dolores ſopire valet: ſicuti *Oleum* *Rosmarini* *ſic* *paratum* *egregium* *quoque* *eſt* *ſanativam* *plurium* *Dolorum*. Sic *ex* *ſucco* *Alcali* *ſingulari* *eſt* *Oleum*

Oleum per deliquium ad dolorem, & contractionem Nervorum: nempe uicem Ebuli reconditor in Vase vitro, & involvitur cum Palla Panis fermentati, immittitur in furnum pilorum, donec succus bene sit coctus; deinceps Vas vitreum, & succus ita liquefactus a crassamento separatus servatur pro usu, qui est res optima in doloribus & contractionibus Nervorum: addatur interdum pro meliori efficacia Olei Ranarum part. iv. vel vi, quod mirabiliter operari solet. Simili modo proceditur cum Floribus Verbasci & Chamomillae. Duxi Oleum Ranarum: Firenim etiam Oleum ex *Buprestis*, capsulatum Anodynum in omnibus doloribus, dum scilicet Bulbos macerantur in Aqua salis seu Aqua marina, postmodum decoquantur, & Aqua infunditur ad remanentiam Salis, quod sal dissolvitur cum Oleo Amygdalarum dulcium dat Oleum Anodynum ad compescendos Dolores quoscuque. Post Oleum Butyrum etiam sunt Olea *Lumbricorum terrestrum*, Liliorum alborum, Oleum septem Florum seu Anodynum *Majusculi*, & Oleum Chamemelini, Anethum, Oleum Papaveris & Hyocyami capessum: Olea *dephillata*, tam Aromaticis, Camis, Anisi, quam Ferida, ex Animalium Ossibus, Pinguedinibus, Cera, &c. in specie Ferida, Oleum destillatum Tagari factum; item Oleum Ossium humanorum destillatum, Oleum Pinguedinis humanae, Oleum Ligni Guajaci factum, Oleum Buxi per decantum; scitida quidem, nobilissima tamen sunt in Doloribus Nervorum, vel Artuum ab Acido ortis. Ulterius Oleum Cerae cum Spiritu Vini ana circulatam & probe digestum ac laevandum in Partium nervorum Dolores ex contusione est egregium: Videatur RIVERIUS *emmar.* 4. *observ.* 31. Si olea *dephillata* Pinguedinis humanae Dolorem Brachii diuturnum curavit BORRICHIIUS de *Hermes*, *Sapient.* pag. 371. Liberati possunt a fectore cobobando super Caput mortuum.

Facit hoc *Galbanum Parvifol.* seu Oleum illud ex Galbano cum Terebinthina & Spice Olei destillatum (Videb. SENNERTUS in *Praxi*, ubi de *Colica*, & SCHROEDERUS in *Pharm.*) quod speciatim in Doloribus Artuum & partium nervorum chronicis, & saepius recurrentibus est anodynum egregium Remedium. Facit hoc *Balsamus Peruvianus*, qui egregie anodynus, ad Nervos contractos, combillos ac punctos egregius; item in Nervorum & Articulorum Dolores nulli cedit Remedio, imprimis cum Spiritu Vini dissoluitur. Hinc TIMAEUS *van Guldent* in Doloribus Partium muscularum & Destillationibus seu Catarrhis frigidis ut vocant, commendat sequentem Mixturem: Nempē

℞. Bull. Peruv. ℥i.

dissolvatur cum Spiritu Vini:

aide

Spiritus Rect. Junq. vel Flor. Samb. ℥iij.

Misc.

Ex utero externē illinendo: egregiē Dolorem compescit.

Vel etiam Sacchar ex Melle & Sale applicari potest, qui extat in M. A. N. G. anno 6. *observ.* 94. Gummi denique, tam Ammoniacum, quam Galbanum, Sagapenum, &c. in Doloribus fixioribus, a viscido Acido natū, & in specie Emplastrum ex Tacamahaca, vel sola, vel cum Cera ana applicatum, suae quā catholice Anodynum in Artuum & Partium muscularum Dolores, in specie ubi nervae Partes, vel a causa interna, v. g. Sero, vel Lymphā acidā, adeoque Citariis aliis tribuit, vel externa; sunt egregia: unde & Emplastra Diaphoretica dicta, ea. g. *Majusculi*, in dictis affectibus, ea. 3. ro acri contumaciore, probus observantur. Potentiora sunt & penetrantiora, sed acriora & non ubi obvia, ea. dictis Gummatibus, ut emplastrum de Galbano crocatum, emplastrum de Melle loco, ad Dolores contusione, vel ex calu ab alio efficacissima sunt Remedia, auctore THONERO; qui exaltantur solius vigore, si misceantur cum Oleo destillato Sacchari, vel cum Oleo destillato Tartari, vel Balsamo Peruviano. Alias Emplastrum de Mellifera, item Terebinthina, geratur cum Salibus volatilibus, vel Spiritu Salis Ammoniaci, sic dant Mixturem tenacem albidam infar cuiusdam Emplastri, quod idem Dolores potenter resolvit: non secus ac Emplastrum *Figurae de Ronis* cum *Mercurio* est egregium in Doloribus Artuum Veneris nocturno tempore affligentibus; quod nec etiam in Doloribus a Materia viscida acida enatis, item in Doloribus cum Tumoribus duris plūs melleis ictericis & chronicis, & omnibus reliquis, merito praefertur, in specie in Doloribus Capitis Veneris.

Hic addi possunt *Stercoris Animalium*, egregie Anodyna, ex quibus optimum est Humanum, seu *Stercoris Peruvicum*, vel recens applicatum, vel cum oleo *Rosae* missum, sub fur-

Tom. II.

ma. Cataplasmatibus in graviore Dolorē Brachiorum & Podum mirabiliter conducere solet, ut hoc expertus est *Isidorus THONERUS*. Liotum Emare mentibus cinctum, effusatum, & Dolori applicatum; cum evanescere facit.

Haec sufficiunt pro primo Scopō.

II. Quod alterum Remedium Classē: Dolorem temperant & demittunt Anodyna, inque temperantia, blando sensu Partes nervae assuētia, imprimis Lac & quilibet Lactisiva, vel Gela, vel cum aliis in forma Fomenti aut Cataplasmatibus applicata: Emollientes interne & externe & Semibus quatuor Frigidis majoribus, Papavere, Amygdalis dulcibus, Hinc Althea, Malva, Melilotus, Verbascum, ejus & Sambuci Flores, ac omnia Emollientia, Mucilagines illarum Plantarum, & ea Semibus Emollientibus, Oleum Lumbricorum, Amygdalarum dulcium, Liliorum alborum, septem Florum *Majusculi*, Altheae, Malvae, Verbasci, Sambuci, Ovorum, Laurinum, &c. quae egregie Anodyna: Sic Lac caprium cum paucis Melle ebullit, & loco dolenti applicatum calide, ad sedandos Dolores à RULANDO commendatur; Oleo nempe & Alcali dives est Lac; unde prae aliis Anodynum: sic RULANDUS etiam

℞. Lactis ℥v.

Olei Rosae. ℥ij.

Misc.

Quae invicem calefacta cum Lineis multiplicatis crebro Parti dolenti applicatur pro leniendis Doloribus; quo Dolor Brachii coctus ingens tanquam Fomento brevi tempore curatus fuit.

Pertinet hoc Cataplasma illud Chirurgorum ubique ultimum Anodynum, ex Mica Panis albi (Germ. *weisse Semmel*) in Lacte cocta, addito Cerae, & Cataplasmatibus inlar applicatum. Vel ad imitationem RULANDI in Dolorē Lumborum ex Destillationibus aliquoties ab eo probatur:

℞. Mordell. Panis albi.

Maceret Lac vaccinae; per Cribrum aeneum ita jicetur: adde vitello Ovi & cum Butyro vni & seors. Olei c. f. misce, & hinc calido Linteo applica.

Vel

℞. Olei Chamemill.

Anethi.

Lilior. nigr.

Lumbr. terrestr. 40. ℥ij.

Misc.

Item Cataplasma ex Plantis appropriatis Narcoticis & Anodynis, in Lacte coctis, applicatum prodest.

Pertinet hoc & Lique ille oleosus ex Floribus Verbasci & Sambuci per deliquium in Clibano paratus, potenter Anodynus. Pertinet hoc etiam *Pinguetia Animalium* anodyna, ad obducendum acrimoniam causae dolorificae, v. g. Butyrum, Pinguedo Anacis, Hominae, Gallinae, Sullulae, Taxi, Atherinae, Coniaci, Vulpis, & similes, cum oleis subinde miscendae. Vel ad Dolorem Brachii ex scarificatione in Scapula expertum fuit hoc Unguentum:

℞. Olei Lumbr. terrestr. ℥ij.

Pinguet. Taxi.

Popul. ℥ij.

Misc. & illatur Brachium, vel Pars afflicta.

Veletiam cum Aqua Mirandina cum Castoreo eadem simul illinatur & fovatur.

Faciunt hoc anodynum Dialtheae, Abialtheum, Anodynum, Hypnoticum usitatum, Balsamum Hypnoticum *Majusculi*, & similia usitata.

III. Quae tandem ex narcoticis *superfluit* Dolores si sunt, sunt quilibet Narcotica, ut omnia *Papaverina*, interea & externa, in specie omnia Opata, v. g. Opium coctum, Edenta Opii, &c. Juxta haec est Hyocyamus, in specie ejus Semen, & quae ex Hyocyamo parata Remedia, in specie Oleum Hyocyami capessum, externe potissimum Narcoticum. Item Stramonium ejusque Semen & exinde paratum Extraidum, Solasum foliosum & ipsum visuperflua insigni pollet, nec etiam Mandragora, ejusque Radix & Radicis Cortex. Sunt qui ea Semine Hyocyami parant Oleum Catholice penetrans ad quoscunque Dolores compescendos: recipiunt Semen Hyocyami, ex coque inlar Seminis Lini Oleum exprimunt, cui addunt Camphoram, Crocum, & spiritum Vini: Haec omnia simul mista clauduntur in Vase vitro, quod obducitur Maffa facinacea fermentata, & ita simul coquantur in Furno pilorio tandem, quandoque solet Panis pios, quo facto Li-

Sass 2 quor

quor eumitur, & ad longum tempus pro usu affervatur, qui de antea, optimus est in crurum graviore dolore.

Huc quoque pertinent Oleum Ligis Buxi, Unguentum Anodynum Myrsinici & Unguentum Populeum: e. g.

℞. Oleo Hyssop. ℥i.

Olei expr. Nuc. mellei ℥i.

Sem. Myrsinici ℥i.

M. S.

Unguentum Lenitivum.

Vel

℞. Olei Anethi,

expr. Papav. an. ℥i.

Myrsinici ℥ss.

M. S. ut ante.

Ex his facile patet, quomodo specialis Doloris curatio debeatur: Nempe

§. I.

Dolor gravitatus.

Curatur Materie remotione. Hinc *transmissio, purgatio & sudorifica* locum habet; item *fonticuli*, variis his ipsis pro circumstantiarum varietate.

Externi alia destillata penetrantia inungenda, in specie si Dolor gravior oriatur ex Lympha inundante partes. Si à Materia viscidâ & tenaci, usurpentur *emplastrum ex Gummatibus & Narcoticis*, ut ex Tacamahaca; item *emplastrum Diaphoreticum*, de Cicuta, Nicotiana, de Ranis cum Mercurio, & alia contra Scirrhos & Scrophulas usitata.

§. II.

Dolor Punctorius.

Curatur internè per Salia volatilia sudorifica, subinde cum Opiatis mista, ver. grat. *Spiritus Salis Ammoniaci anisatum cum essentia Opi.*

Externè conducunt *Fomenta Emollientia & Aromatica* diffusentia; item Litus ea temperatis, ex Oleis & pinguedinibus blande volatilibus mistis, ut *unguentum Dialthææ, Oleum Amygdalarum dulcium*, addito paucis alio destillato Chamomilla & Camphor; item Litus ex Volatilibus penetrantibus, ut *Spiritus Vini camphoratus, spiritus Salis Ammoniaci, Sperma Ranaarum, &c.* Conducunt etiam ex Saponè Remedia, ut Sapo in Spiritu Lumbriarum dissolutus, &c. qualia in Pleuritide, & hinc Arthritide usitata sunt.

§. III.

Dolor Terebrans.

Requirat internè *incidentia & evacuantia*, præsertim ex Gummatibus, item Mercurio dulci.

Externè Gummata; item *Emplastrum Carminativum Symplicis, Emplastrum de Galbano crocatum Myrsinici, Emplastrum de Ranis cum Mercurio, &c.* conducunt.

§. IV.

Dolor Pulsatorius.

Internè curatur per *sudorifica Acidum delivruentia*, subinde cum Opiatis mista; non tamen temper.

Externè ledatur per *Fomenta ex Aromaticis Vitis intercostalis*, ut discutiant & relaxent, Doloresque solvant. Item *Emplastrum de Melaleuco cum Theriaca* coniert.

§. V.

Dolor Ophtholopos.

Tollitur, præmissa *purgatio*, imprimis per *sudorifica*: sed eam usupramum sit contomax, aliquandiu continuanda, adeoque interdum per *Diatam sudorificam*, ex Lignis iostimam.

Externè confert *emplastrum ex Gummatibus*, speciatim Ammoniaci; item de Ranis cum Mercurio, malaxatum cum Oleo destillato, impienis foetidis, nempe Tarrari, Lignis Guajaci, Cornu Cervi, Saccini, Petroleo destillato, &c.

§. VI.

Dolor Tensivus.

Internè Volatilia temperata cum Opiatis posulatur.

Externè conveniunt *Fomenta Dimulcentia, Anodyna, Opio- sa, Lactucina*, exque talibus parata *Cataplasmata*.

§. VII.

Dolor Dissidens.

Internè Carminechia seu Volatilia oleosa, Verbi gratia Spiritum Salis Ammoniaci anisatum, *externè* Dissidentia & Fomenta aromatica carminativa, &c. requirunt.

§. VIII.

Dolor Ardens.

Curatur, si in internis partibus observetur, per *absorbentia*, alias effervescentes humores *precipitantia* dicta. Externis in partibus remouetur per *Saturantia*, item *Ranina*, ut *Sperma Ranaarum* oon per acris, Malum magis exacerbantia, non per Piogua, Ardorem, oblidendo poros, magis inco- deota.

§. IX.

Dolor Aogens.

Curatur per *aromatica*, vel *olea*, olea destillata, v. g. *Gal- banetum, spiritum Vini crocatum, aquam articulaream, &c.* Post hos Dolores in genere, & io specie, considerant sunt quidam dolores atrociores particulares, quos inter acerbissimi & satis frequentes esse solent *Dolores Lancinantes, & Lacerantes Artuum, & Odontalgia*. Sit ergo.

ARTICULUS III.

De Artuum Doloribus Lancinantibus, & Lacerantibus.

Dolores hi frequentes sunt, imprimis à Scorbuto, tam *Agri*, quam *Fixi*, speciatim *Fixi* crudeles, & perniciatissimi sunt.

CAUSÆ.

Oriuntur hi Dolores *Fixi* ex subtili Acido, Fibris tendi- solis, aut Membris quibusdam se infirmantibus, cum intenso Dolore, uode universum partis Fibrarum, Membranarumque Systema compatiatur, & compatiendo mediante *ac- cula Fibrarum crispantia* totum Membrum dolere facit, aut usupramum ne minima quidem partis dolentis percipiant Alteratio. Confirmat hoc, quòd in Malo Ichiadico laborantibus, ubi Malum heret circa Cosendicem, integra Crura gravissimo contropi soleant Dolore. Similiter totius quidam Nervus ad Acido rosos, & afflicto totum Fibra- rum nervosum Systema in confosum trahit, & ita ralis Dolorem repræsentare facit. Talis Dolores *Lacerantes Scorb- tici* in partibus masculolis, & nervosis *Fixi* diurno tem- pore ferè acquiescunt, aut mitius affligunt, sed *nocturni* tantum tempore per duas, vel tres horas ante, & post me- diam noctem exacerbari solent, & post hanc per horas bi- nas, vel ternas remittunt, in quo ipso simillimi sunt hi Do- lores Doloribus Venereis, & ipsis nocturnis. Dolores *Fixi* Lacerantes *Fixi* in quadam parte, utur simpliciter, pro- fomite agnoscunt *Scorbuto*, interdum tamen etiam sine Scorbuto saltim manifesti, Agri patiuntur Dolores tales contomacillimos, ubi à Rheumatismo oriri dicuntur, in quibus etiam loterna Remedia subinde parum ferè operantur, Es- terna vero applicata Malum subinde potius exasperant, quàm quod illud corrigant; Narcotica verò applicata illud aliquomodo mitigant, sed postea Malum contomacum, & rebellans reddunt. Memini Virgineam adolescentem scorbuto, crebriori Hæmorrhagiæ Narum obnoxia, hac per Li- quum Sympatheticum Fraxini suppressa incidisse in huius- modi Dolores *Lacerantes* nocturnos intolerabiles, & imple- cibles, ab hora decima vespertina ad secundam post me- diam noctem constanter affligentes, hinc remittentes, &

Som-

spiritum concedentes: Interdū bene habebat, quavis nocte
fatis tempore dolores recrudescerant, idque per aliquot se-
ptimanas. Verū quare in specie nocturno tempore recur-
rent, adhuc latet. Præ cæteris de his doloribus, & quid in
recessu habuerit? videri potest HORSTIUS lib. 1. observat.
13. 14. sequentibus, elegantiſſima ibi inveniuntur.

C U R A.

Pro curandis his, & similibus doloribus vnaſſis ſubi-
de, præſertim in principio, proficua eſſe ſolet (videb. M. A.
N. C. Anno 9. observat. 120.) obſervatis tamen reſolu-
tionis, & derivations regulis. Hæc utitur per hæc ma-
nus non erit, per accidens tamen, quatenus liberior ſanguis,
& conſentorum conciliatur motus, occasione doloris,
& Fibrarum ſtricturæ plus minus deficiens, ver. gr. quan-
do crus affligitur tali dolore, ibi, vel io Brachio oppo-
ſito, vel crute oppoſito ſecatur Vena, & ad aliquot uncias
ſanguis emittitur, cum lenibili levamine Aëri melius ſe
habet. Pſticaria quoque in Membris dolente convenien-
tiori loco applicata, ſæpius ſunt profuſa, interdum ad ſan-
guinalis accedendum eſt, imprimis ſi perniciosa perſiſtat ma-
lū, aut crebrius repetat, qui tamen ſedato dolore iterum
conſolidari poſſunt.

Interdū, cum acidum peccet, ante omnia obſervandum
eſt, ut deſervat dictum acidum peccans, & vel per fixa
alkalib. analysis mſta, iſtud in primis viſi deſtruentia,
partim, & imprimis per ſudoriferis volatilib, ſingulas partes
perceptantia; oſe ratione prioris Martialis, & Antimonialis
ſubſtantie, ut Aſtomionum diaphoreticum Martiale, Cin-
nabaris Antimonii, partes Animalium duræ, & olæ, con-
venio: hiſque præmiſſis ratione poſterioris Salis volantis
alkali, omnia Aſtericæ, & Aſtericæ, conducunt,
in ſpecie in Lumbis, Tartaro, & ex Urina parata reme-
dia volatilia ſubinde ſubjuncta ſunt. Item Decolla Lique-
ram ſudoriferam, quæ veteribus præſtiti in oſis ſuæ, nec
contemnenda ſunt, præſertim ubi contumacia obſervatur
dolor, ex Radice China, Ligno Safforis, Lignoque Jun-
perino, de quibus videri potest in HORSTIO citato loco,
ubi talis dolor Decolla Lignorum ſui curatur. Quo etiam
pertinere videtur inſignis ille dolor Cyſtarum, alius ſuſtra
erectus, per Decollum ſequens curatus à PETRO POTÉ-
RIO Centur. 1. cap. 13.

℞. Rad. Vinetæ. ʒ. ʒ.

℞. Myrr. M. l.

Scm. Hyperic.

Rhazarb. el. ana ʒ. ʒ.

F. Decollum in C. q. Aqua communis.

In colat. ʒ. ʒ. diſſolve.

Syrup. capſ. Vinetis ʒ. ʒ.

Miſc.

Per alvum, & per ſudorem dolorem curavit.

Deſcribi alias formula, quā in ejuſmodi caſibus obſer-
vi proficuum, eſt hæc:

℞. Refor. Ligni Juniperi. ʒ. ʒ.

Cym. Pini quatuor. ʒ. ʒ. M. l.

Herb. Rorifera. M. l.

Incidiſa minutim macerentur in aqua ſimpl. ʒ. ʒ.
Stent in Balneo Mariæ per noctem: amocoga. ad ter-
tiam.

Colatura detur pro haustu matutino ſudorifero, præmiſ-
ſis univerſalibus.

De ſpecie hujuſmodi formulae uſum notavi, ubi glando-
larum circa caput, aut fauces obſtructiones, & tumores ſi-
miles occurrunt.

Præter interna ad æſtrem ſubinde fat accēſſus. Verū
cuncto opus eſt. Pinguis enim Cinnamomum, Myſta, & ſimilia
obſtinendo poroſi magis æſperant malum quam leniunt;
adeoque ſaltem ſubſtiti volatilia præſervantia, nec urinoſa
acria, oſne ſpirituoſa, conveniunt. Hinc ſpiritus Vini
camphoratus, item ſpiritus Theriacalis camphoratus, in
ſpecie cum Caſſiæo impregnatus, ſpiritus Liſorum con-
vallium, Ceraſorum nigrorum, Salis Ammoniaci cum ſpi-
ritu Liſorum convallium ſubſtiti, & illitis, ſpiritus Ure-
tæ, ſpiritus Tartari volatilis, qui reliquis præſertor pro
uſu externo, Aqua Hirundinum cum Caſſiæo, &c. æſtrem
conducunt.

Vel

℞. Spirit. Lil. convall. ana ad ʒ. ʒ. ʒ.

Sal. Ammon. cum Calce viva ʒ. ʒ.

℞. Caſſ. ʒ. ʒ.

M. pro uſu æſtrem.

D. S.

Spiritus Articularis æſtrem applicandus.

Vel

℞. Aqua Articul. ad ʒ. ʒ. ʒ.

Spiritus Sal. Ammoniaci cum Calce viva ʒ. ʒ.

Lumbis. per part. ʒ. ʒ.

M. D. S.

Aqua Articularis æſtrem applicanda.

Cum Panno calido æſtrem afflictor Membris dolenti-
bus crebrius. Vel

℞. Fel. Nicotian.

Oſtrea.

Fler. Sumbac. an. M. l.

Rad. Angel. ʒ. ʒ.

Ari.

Pyrethel an. ʒ. ʒ.

Fel. Storchel. Arab.

Lavand.

Lil. convall. 20. p. ii.

Scm. Ervæ ʒ. ʒ.

Caſſ. ʒ. ʒ.

Conſilia, & conſilia inſand. in

Spiritus Vini part. ii.

Lumbis. part. ii.

Digere per dies, nocteque aliquot, & filtra.

Convenit quoque Sapo Potius, in ſpiritu Vini diſſolutus,
cum ſpiritu Ceraſorum nigrorum, & Liſorum convallium
mixtus, & æſtrem illitus. Imprimis ſpiritus Tartari vola-
tilis, reliquis præſertor cum ſpiritu Vini temperatoſo, ubi
acrius fuerit. Gallianum Paracelſi, quocumque modo para-
tum etiam hoc in caſu mirabiliter convenit; ſed cum ſpi-
ritu Vini, ſeu ſimili volatili temperatoſo, aliquando circula-
tum, & penetrantiſſis, & ne nimis craſſum ſit. Radix
Caſſiæa mater rectius cauſa, & Cataplafmatiſis modo ma-
ne, & velipri loco dolenti impoſita, ſingulari quid obtinet.
Conſideri hic poſſet HARTMANNUS ubi de Paral-
yſi. Proſequor etiam obſervavi Lixivium Coriariarum ſum ubi-
tatum miſtum cum dimidio vel ana urinae humane, ex
quibus ſat ſufficit, ſeu ſatus vaporoſus. Hæc mixtura probè
calida inſectis lapidibus, vel ſeris ignitis in vaporem reſol-
vitur, qui vapor parte dolente, deſuper probè teſta, ex-
cipiendus, ut ſudor hinc concitetur, & ſubinde repetendus
in tali dolore eraris egregie admodum conſert. NB. mul-
tum io recessu habet. Vid. Mem Formalar. Claf. 4. ʒ. 22. &
Collig. Formalar.

Therma decoquit, earumque ſuſſus, aut Lixivium Therma-
rum, & lapides Thermales, in aqua probè bulliti, iſſat Therma-
rum naturalium uſuſque, etiam hujuſmodi dolores crurum
lancinantes inſigniter placent. Ante paucos annos, (viz. el
biennium) ſit quidam hic tali enormi dolore pedum afflig-
batur, idque ſine ulla maniſeſta cauſa, & etiam ſine ulla
externo apparente leſione ſigno, ultra dimidium anni mi-
ſerabiliter cruciabatur; Tandem omnibus remediis ſeris,
ſuſſu cuiuſdam amici accepti hujuſmodi lapides, eoique con-
tulis probè coſit in Aqua ſimpliſi per Balneo, in quo ſub-
inde balneavit pedes, hos immittendo, & per longum tem-
pus ita retinendo, unde tumores pedum contraxit. Sed pa-
tens nihilominus dolorum, & vice perræſas pergit, & Bal-
neum hoc diutius continuat: quo ſaculo non tantummodo tu-
mor, ſed etiam omnis dolor omnino evanuit, & ægerque per-
fectè curatus fuit. Similia Balnea, Thermis naturalibus ſuc-
cedanea, aut Therma artificialia, parari poſſunt ex Aqua,
Calce viva, & Sulphure, ad imitationem ZWELFFERII
ſua Manſiſi. ſpagy. pagina 40. ult. Edit. ubi de Sulphure: Vid.
Collig. Pharmar. in ſeſynderum part. 1. Integer Formicarum
acervus Sacculis includis in Aqua coquitur, cui æger in-
ſidet, Item Balnea ex ſinacris.

ARTICULUS IV.

De Odontalgia.

Dolor Dentium, ſeu Odontalgia (T), quibundam Den-
tium podagra, oſne per Nerven, oſne per Conſuſum
ex affectus Gingivæ emulſione.

CAU.

(T) Odontalgia Dentium dolor: ab ita dicitur dens, & alyn dolor.

CAUSÆ.

Si per effusum fuerit, causa huius serpsimè est acor vitialis: quæ ex vitio Dentium nutritione, seu alimentorum proximi corruptione proveniens, qui dum solit sublinguam Dentis, rodit etiam radicem, Membrana servec, & insensibilis invellitur, ex qua varix fibræ in Dentem cavum penetrat, unde si acor diffus hanc Membranam rodit, tam immensis lancinans dolor emergit, tunc ferit vehicula, dum nutrimentum Dentium chylisum, vitæ, & acore oculis plurius inquantur, huiusmodi acor derivatur, ad Dentem quandam depositum, ut in Scorbuto, & Luc Veneris insubide obivum. Subinde etiam Lympha quædam acida per errorem distributionis ea vicinis glandulis eo derivata tandem dolorem inferi; est enim affectus Catarrhalis. Forsan interdem, & collecti humores acres in cavernula Olfium Maxillæ superioris infra Oculum multum congeriunt. Vid. MOELLII *Fundam. Physiol.* cap. 9. pag. 474.

Corruptis ista alimentis proximi non assimilati in acorem vitium interdum eo usque procedit, ut etiam ex corruptela Dentium, ac Gingivarum subinde Formiculi in alveolis Dentium generentur, qui ipsi dolorem intensum Dentium non leviter exasperant: Vid. BARTHOLINI *Acta Hospit. Cent. 5. observat.* 108. BONE ETUS lib. 2. *Med. Sept. Sect. 4. cap. 13.* M. A. N. C. *Anno 9. observ.* 24. & 307. Imo ab acore isto serpsimè rodente Dentes dolorificè, & corrupte ejusdem alimentum, interdum eorum compages olis admodum corroditur, ut eandem *Dentes cariæ* sunt, & excavantur, ac eorum compages læsetur, ut frustulatum tandem existant.

Ipsi quidem dentes non dolent, sed Membrana dentium intima invellitur, ea expansione Nervorum, & ejus fibræ hinc inde per dentium poros, & meatus in coram sublinguam penetrando se infundunt, doloris istius aceri falsissimum sunt. Dolorem hinc vicinarum partium, & fibrarum nervearum crispationes, levique contracturæ per compressionem continuatam insequentur, unde quoque hæc fibrarum crispatio dolorifica continuatur, eo usque dolor hinc se extendere videtur, ita ut exinde perfecta *hemiparesis* superveniat, & dum ab ista contrahitur Fibrillarum nervearum angustiantur poruli, & stringuntur meatus, per quos sanguis, aut alii humores merando circulantur; hinc nunc sanguis, nunc serum, aut Lympha in motu impedita stagnant, adeoque isti dentium dolori supervenit tandem ut plurimum, aut inflammatione maxillæ cum dolore tensivo, & pulsatorio, totam Capitis hemispherium occupant, ut etiam tumor, vel sanguineus, vel serosus, vel ordematofus, saltem ab acido Membranam nervæam dentis rodente, & vellicante.

Causa ergo proxima formalis in dolore dentis est spiritus impetum faciens, cuius ratione Membrana dicta, buisulque Fibræ sentiant, ac dolorem percipiunt: Materialis vero est acidum in radice dantis hærens.

Causa remota, quæ vel nutrimentum dentium privatum corrumpunt, vel acidum præternaturale eo distribunt, nunc lumen externum, nunc internum. Ex interno, quæ nutrimentum vitiosum acore peregrino infusum ferri vehiculo dum communicant, sunt imprimis ipsius alimentis proximi vitia, seu Cacochymia sanguinis, & humorum in Luc Veneris, aut Scorbuto. Non enim ingentes tumores in Scorbuticis, & Luc Veneris laborantibus supervenire solent. *Externa* sunt impræmia alimpta, quæ dum inter interitula se sinunt, successivè acorem contrahunt, & partes denti vicinas rodunt, & nutrimentum privatum inquinant solent. Inter hæc excellent *Saccharata, Melia, Ferula*, nimis frigida, imprimis *Acida*, spiritum intum dentium labefactantia, & hinc horum materiam retentam vitiosam: speciatim dentibus nocent Saccharata, & Melita, quæ facili fermentanda acorem, et quoque satis subtilem, contrahunt.

DIAGNOSIS.

In Odontalgia Egri satis sunt queruli, per quos malum manifestatur: sicut quod Causas Remotas observetur, quod lapsus in *Scorbuticis* sensim ipsi dentium sint dolores; sicut in *Luc Veneris* hi ipsi sunt erudidissimi, planè intolerabiles, neque nocturni: id quod à Medico cognoscendum pro faciliiori instituenda Cura. Vitiosum enim, horum Morborum causa, acidum, dum in talibus dentes antea non bene se habent, faciliè in se infundat, nutrimentum privatum inquinat, & rodendo malum exasperat: Vel

dum alius dens per se dolere incipit, faciliè ejus occasione acidum præternaturale in corpore concurrere, se dentis dolorem, & vicinorum locorum parietata crudeliora, efficere valet.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: per se quidem Odontalgia in Adultis nullum periculum facit, utur per accidentia contumacia, vel diuturnior *Consequentes*, in specie Musculi temporalis, Vigiliis perniciæ, aliisque similia symptomata gravia inferre potest.

Adhuc doloribus hi interdum superveniunt *rumores*, itaque inflammatorii, qui ad suppuracionem tendunt, & aperti interdum in fistulas degenerant.

Ob id ergo maturè compendendum est dolor.

CURA.

In cura, acidum in dentibus peccans est corrigendum, dens cariosus evellendus, & tandem *Pernix* genti curandus. Imprimis tamen, quantumvis fieri possit, dolor *subdant*, addendo remediis his semper simul, quæ Morbo primario, e. gr. Scorbuto aut Luc Veneris, à quo Odontalgia etiam tanquam symptoma dependet, appropriatè conveniunt. Sic enim in dolore dentium *Scorbuticis*, quo etiam ille perinet, qui ex *Male Hippochondriacis* subinde excitatur, vulgibus Odontalgicis simul miscetur subinde Appropriatæ *Antiscorbuticæ*, v. g. Lac & Lacticia, interne & externe, seu etiam sola sufficit herba Cockerleia, aut in hujus penis Nallurtium aquaticum, aut etiam Nallurtium Indicum, & similia: si nempe distat Plante cum Salvia, (quæ est appropriata in affectibus Gingivarum & Dentium,) Remarino, Ruas, Plantaginis & similibus, pro Ora collutione subinde miscetur & decoquantur. Sic dolor iste, qui in *Luc Veneris* obvenit, appropriatius non habet remedium, quam quod malignum illum acorem evincere potest; ex quo genere Decoctum Guaiaci cum Aqua communi, aut ejus Essentia, & Oleum distillatum, & similia optima sunt remedia. Sed de his & similibus videbitis plura in STROBELBERGERI *Tractat. elegantis de Pedagra Dentium*, propriè autem Odontalgia.

Remedia ergo, quæ ad dolorem dentium compendendum utuntur, & acidum temperant, sunt immensarum, & tot, paucos sunt Egri, qui patiuntur dolores. Ordo progrediar. In his sunt *Decocta* Plantarum quarundam in ore tenenda, aut *Gargarismi* ex Origano Cretico, Folis Nicotianæ, Herba Perficaria, Radice Pyrethri, Radice Ligustici Santi, Buai, Sabina, Chamomilla, Serpillo, Folis & Radice Hyocyami, item teneris germinibus Quercum, & similibus in Vino decoctis: e. g.

Æ. Herb. Perficar.

Serpill. an. M. l.

Rad. Lapach.

Utric. an. ʒi.

Pyrethri,

Rad. Ligust. Santi,

Santali an. ʒi.

Sem. Hyocyam. alb. ʒi.

Cor. in l. q. Aqua

Cum Colatura gargarizetur Os.

Vel sola Perficaria cum Corticibus Hyocyami in Vino codæ dolorem sistit. Frequenter coquantur in Aceto, ubi tumor dentium est à causa calida, ut vocant, ubi simul est tumor Sanguineus; in Vino, ubi dolor est à causa frigida, quando consensus est tumor serosus & edematofus: ut hæc parum reficiat, cum potius sint producta morbo. Sed *Dentia* in Aceto cautè applicentur, seu penitus intermittantur: nam Acetum acore suo dentibus hostile est, & huiusmodi Decocta plius nocent quam prouat, dentium compagem solvendo ut friabilem reddendo, & suppuracionem inducendo: sic Mulier quædam doloribus dentium corripa Acetum fervidum in Os iussit, ubi cessavit dolor, sed dentes frustulatum exierunt. Vel Decoctum Sabina cum Baccis Juniperi in Ore detentum commendatur à BRENDÉLIO. Decoctum ipsè Radicis & Herbe Hyocyami in Vino vel Aqua & Aceto paratum, in Ore detentum, poterit dolorem dentium sistit. Melius est, si ex nanquidolentibus PARACELSI recipiant herba Perficaria cum cortice Radicis Hyocyami, decoquantur in Vino, & in Ore detineatur: quidam enim simpliciter Radicem Hyocyami, seu ramenta hujus radice, in specie recentis, aut in Vino macerant, loco dentium dolenti appu-

placant; ſic enim acerbis Dolor intra horum ſpatium ſuit a-
liquando curatus. Oleum Hyſocymi ex Somine capreſium
Denti applicatum, vel interius vel exterius, in ſpecie quan-
do Vermicilli adſunt, convenit. Loco Hyſocymi ſuper-
tur commodè *hibernica*, cuius ſumus præmiſſa, ubi opus
eſt. Purgatio egregia eſt; ſicut ſola Nicotiana Denti
dolenti attrita & malicata (non tamen Saliva deſoluta)
ſolet vi ſarcotica Dolorem Dentium ſiſtere, teſte RIVE-
RIO in *obſervat.* unde *Desullum Nicotiana cum Floribus
Chamaemilla* in Ore detentum ac malicatum, Remedium
ſive HEURNII in Dentium Dolo: Deoquitur vel in
Cereviſia ſecundaria, vel in Lacte, vel in Ladis Serb.

Vel

℞. *ſpiritu aſtr.*

Rad. Pyrethri,

Sem. *ſcapiaſtr.* an. part. æque.

Coq. in Vina.

Colatura detur pro Gaſtriciatione. Vid. PARACEL-
SUS.

Sic Gummi Juniperinum ſeu ſandaracha Arabum in om-
nibus Doloribus Dentium addidum laudatur, ſi ſcilicet
Gummi Juniperi ℞. in Rhi. ℥i. decoquatur, quo ipſa col-
atura Os; hoc enim multum conferre dicitur ad compe-
ſcendum Dolorem Dentium, etiam à Luo Venerea obor-
tum: Conſ. AMATUS LUSITANUS *Centur. 3. Cap. 21.*
Aliis Experimentum hocce etiam laudatur:

℞. *Vin. ſpica Nordi,*

Coq. in Vina.

Et Colatura ſeipſa, & aliquandiu in Ore detineatur,
nam & hoc multis prodeſſe dicitur.

Præ cæteris conveniunt Optata: nempe ſunt *Piſula* ex
Opio vel Laudano optata, quæ ipſæ Denti dolenti vel ca-
vo immiſſæ ſubito dolorem ſiſtunt, vel ejus eſſentia vel
Extrahum exſtrictum cum Bombace, & vel Denti immittitur,
aut extrinſecus Dentibus ac Gingivis affricetur.

Vel

℞. *Extr. Lign. Guaij. gr. ℥i.*

Lead. Opia. gr. ℥i.

Olei deſtill. Orig. On. vel Caryophyll. gutt. ℥i.

M. f. Piſinæ.

D. 3.

Piſinæ dolorem ſedant.

Denti cavo intrudatur.

℞. *Pier. Bræ. gr. vi.*

Opia in ſpiritu Vin. ſol. & inſp. gr. ℥i.

Camf. q. Extr. Theriac. f. Piſinæ.

D. 3. ut antè.

WEDELIUS in *Opilog. pag. 281.* commendat ſe-
quent:

℞. *Lead. Opia. ℥i.*

Olei Camph.

Caryophyll. an. gutt. v.

Balf. pro corp. ℥i.

M. f. Baſſamum; Denti dolenti applicandum.

Interim nonſile eſt, quod reſert SALMUTH *Centur. 3. Obſerv. 34.* ex *Laudano Opia.* Dentibus dolentibus incom-
pellivè adhibito, omnium ſenſuum ſuppreſum, Vertiginem
& Gravedinem Capitis abortu fuiſſe: Et SACUTUS
LUSITANUS *lib. 2. Med. Præſcript. 61.* ex Opio in
Dentia cavum ſeipſo pro ejus ſiſtendo Dolo: immiſſo,
Mortem obſervavit, adeo ut hinc ſubſido Univerſalis præ-
mittenda. Pertinet quo Societate parva Auguſtanorum; deſ-
cripſio videatur in *Pharmacop. Auguſt. (V)* Ex qua piſula
una vel altera aut Dentis cavo intraſſa, aut intrinſecus ad-
moti, Denti dolenti etiam; dolorem ſiſtit. Virtute Opia
etiam *Theriac* recens applicatur denti dolenti: vel ex the-
riaca recenti paratur Emplaſtrum Malæ dolenti imponen-
dum, in ſpecie quando tres ſeries gingivarum cum Mala
& Temporibus dolet. Cora Catholice *Sancti Genii* appli-
cata quoque convenit: quæ in ſenſu de Piſularum forſan
denti inferi poteſt. Quod ſi Dolor ex *dentis eripſularum* ad-
fuert, cali Emplaſtro ex *Theriacis ſalis Myſſinæ* ℥i. addito:
dos: Interne Læo tepidum ſimul cauterium in Ore tenendum,
præſertim quando ſuſpicio eſt de hærenti Scorbuto. Opti-
mum & ſingulari exſt Campſura; ſiſtentem denti dolenti im-
poſita, aut integra, vel Glue in ſpiritu Vini reſiſtentiſſi-
mo; aut qui mihi in uſu eſt, *ſpiritu ſalis ammoniaci* pa-

ratus cum ſpiritu Vini & Calce vini, in quo Camphora
ſoluta ſit, cum Bombace denti cavo immittatur, aut Gin-
giva in loco dolenti imponatur; præſentaneum levamen
inferi, utut maxime motet; vel Oleum camphore per
eius in Oleo Amygdalarum dulcium diſſolutionem ſadum,
non incongruum eſt. Eſſentia quædam Vegetabilium aro-
maticæ mirè etiam conferunt, ut eſſentia Ligni Guaiaci
cum ſpiritu Vini parata, vel eſſentia Ligni Guaiaci cum
ſpiritu Vini parata. FABER commendat eſſentiam Thy-
mi Satoreje, Serpilli, Salivæ, Calaminthæ, Zingiberis,
&c. quæ ſunt nobiles in dentium dolo: ſi, ſi ipſis Gin-
giva ſcricetur; aut etiam cum Bombace denti dolenti im-
mittatur. Quo etiam facit *Tinctura Odontalgia Myſſinæ*,
& *Wedellii ex Raf. Ligni ſancti 3i. caryophyllorum & radia
Pyrethriana 36 cum ſpiritu Vini reſiſtentiſſi catraſſis.* Om-
nium optima eſt eſſentia Benzoinæ. Hoc habent commodi, ut
convenienter cum eſſentia Opia miſceri, & ita de præſtan-
tiſſimo Remedio conſtituere queant. Ego vidi aliquando do-
lorem dentium curatum per eſſentiam Catarrhalem falſi-
ſſimam denti applicatam. Loco harum eſſentiarum etiam
ſpiritu propriæ ſue acide cum Bombace vel ſim modo
Denti dolenti applicatum, cetero Dentium dolorem ſiſtit.
In ſpecie videtur *Tinctura Odontalgia M. A. N. C. Ann. 6.*
Append. pag. 76. Præſertim adhuc hic eſſentia Olei deſtilla-
ti, utpoſe ſua volatilia concentrata. Acidum vellicans de-
ſtruentia, v. g. *Oleum deſtillatum Caryophyllorum*, &c., quod
præſtantius eſt, *Oleum deſtillatum Origani Cretici*; quibus tan-
tillum Camphore additum eadem reddit tamen præſtan-
tia. RULANDI Experimentum certiffimum fuit *Oleum
Rorariolum ex Corylo paratum*; loco cuius *Oleum deſtillatum
Rosi* per deſendum, & per veſicam reſiſtentiſſimam, con-
venienter poteſt recipi: vi enim narcotica nobile eſt ad odon-
talgiam: qui præſertim *Oleum ſabina deſtillatum*, perquam
egregium; ſicuti ipſum *ſabina deſtillatum* in cervicia ſecun-
daria vel Vino paratum, in Ore naſum locum dolentem de-
tentum, exercetum, & ſubinde ita repetitum, excellens eſt
expellens ſimul dentium Vermes. WEDELIUS, ex O-
leo deſtillato Ligni Guaiaci & Caryophyllorum addita
Camphora parat *Oleum Odontalgicum*, cuius guttas duas vel
tres denti carioſo cum Bombace immittit. Hiſ Oleis de-
ſtillatis in acerbiffimo dolore tantillum de oleo hyſocymi
miſtreſſo convenienter addi poteſt. CLAUDINI Re-
medium fuit *Oleum Terribinſium* cum tantillo Camphoræ; an-
teſtinet Baſſamum ſulphurei terribinſium cum Bombace
dentibus iditum etiam conferunt: cum quo poteſt, uti dixi
miſcere Camphora. Præter diſta etiam *Oleum deſtillatum
Roriflorini*, *Oleum ſalvia*, Juniperi, tandem *Oleum ſuci-
cini*, admodum commendatur. Videtur etiam *Baſſamum
Odontalgicum* in M. A. N. C. cit. loc. Plumbaginis Radicem
ceu verum experimentum, laudat PANAROLUS *Pam. 4.*
Obſervat. 10. Radix hujus Plumbaginis contuſa, & car-
po Manus impoſita, per noſtrum reſecta, mane maculam
plumbæ reliquit; & dentium dolorem evanecere fa-
cit: id quod à multis ſine probatum, ratione cuius eſſectus
etiam à quibſdam *Dentiarum* vocatur. Sulphur auratum an-
tiſemul conferit etiam, ſi ejus tantillum cum Bombace in
dentem cavum immittatur, aut denti dolenti applicetur;
imbuitione enim Acidis corroſivi dolorem cito ſopit, quod
ipſe aliquoties obſervavi.

Præter hæcſent recensita etiam Cura Magnetiſis ac tran-
ſplantandi in uſu ſunt. Magnetiſis inter eminet PARA-
CELSI Cura quaſi Purſariæ, dum cum recentem in A-
qua maceratam imponit loco dolenti Malæ, donec probe
iſteraleat: hinc ſepellatur in Fimo, ut cito perſeſcat; ſic
enim Dolor ceſſat: vid. HELMONTIUS, & MARCUS
MARCI. Pertinet hoc *Officium Brachii Buſonis*, quod
Experimentum HELMONTII & Secretum HEURNII
fuit, qui recipit Os dexteri Femoris Buſonis ab omni carne
nudum, hoc Gingivæ Dentis dolentia ſubinde & forſiter ſtri-
cit, & ſubito ceſſat Dolor. HELMONTIUS officium *brachii
Buſonis* recipere jubet, quod loco dolenti applicatur,
quodque levamen, aſſert ſed non ſemper aut ſæpius: vidi ta-
mè etiam ſine ſuccellu applicatum. Quidam recipiunt *Frugum
Ligni* accuratiffime dentem dolentem ſeu Gingivæ poſt
vorb Lædo inſingit; ſic brevi poſt evaneſcit dolor. Lignum
Fraxinei juſto tempore caſum, Dentium cavitatibus intruſum
dolorem fugat, & Gingivæ affricari poteſt.

Reſed

(V) Scitella parva juxta diſperſionem *Pharmacopæia Auguſtana*: ℞. Ol. Nuc. Moſch. expreſſi 3i. Opia Thebaï-
ci, Spec. Diambre an. 36. Camphoræ, Extr. Croci an. gr. vi. Ol. Caryophyll. deſtill. q. ſ. Rodigantur in ſer-
ram Opiaſe piſſioris. Caveris Dentium indita dolores eorundem ſopit ac placat, ad quorum auxilium præci-
piat expetit, Raymundo Minderero College naſtro quondam honoratiſſimo p. m. adſcripta. Hæc in *Pharmacopæia
Auguſtana*.

Quod Transplantationem, imprimi cum *Caryo*, hinc cum *Semine & Salve*, ea instituitur, si nemo ab his, separatim nonnulli cortice, excidatur Ielluca, qua ipsa Gingivae & loca dentis affecti punguntur, utque dum Sanguinem fundat; tum Lignum eructum denuo immitatur loco, unde excidium, Carcer denuo applicetur, & luto probe circumdetur: vid. JOHANNES SOPHRON. KOZAK *Tractat. de Sal. pag. 113*. Alii Unguent abiciunt à Maribus, & Pedibus, deindeque à fœdibus mundant, hucque omnia Linteum involvunt, atque de Veneris aure Solis exetum Sambuc prunis ditiſſimo immitunt; quoniam fœdum illud concretis ob cœtibus dolor remittit. Conveniunt enimmodi curæ in fœpius recidivantes & quasi habituales odontalgias. Quamvis videatur aliqui *superficialis* illi affæi tubelle, ob Ceremonias, quæ observantur in illo actu, tamen revera Imperfissione caret, & Ceremonia, quæ adhibetur non sunt de efflencia Artificii; nam & eis abſentibus felicitè procedit Cura. (X)

Subinde etiam à *Chirurgis* externe Temporibus *emplastra* applicari solent cum in finem, ut saltem cunctum, dolorumque per consensum hœmorrhæmiam tollant; quod etiam præstant. Fiant ex *Omni Tacamahaca*, vel galbano, quod est melius, vel Caranæ, malacæ cum Oleo papaveris expresse, vel cum *Infusio Bravæiæ*: quæ super linteum in forma Thaleri extensa, fœd in Odontalgia Gravidarum non sunt contemnenda; & quidem, si in Maxilla superiore dolent, Temporibus, & si in inferiori, prope Aures sunt applicanda. Alii *Gummi Elemi* vel Mallichen recipiunt, & eodem parant pro Gravidarum Doloribus. Alii Mallichen & Ceram quidam etiam *Gummi Ammoniacum* Aceto dissolutam, insar Emplastri applicant.

℞ Theriac. Aether.
Tacamahac. an. ʒi.

Inducatur super *Linteum densum*, & universæ Maxille dolenti applicetur.

D. S.

Emplastrum Sedans.

Quod si *Emplogia quasi erysipelata* adsint

℞ Theriac. ʒss. ʒi.

Salis Albiſh.

℞℥ Peruv. an. ʒi.

Misc. & admoventur.

Fit subinde, ut cum Odontalgia etiam ingens Maxilla ræmor concludatur, tunc Chirurgi imperiti applicant *emplastrum de Mallica*, cum ipsa sine ratione abſcessum interunt nam modis filatur Dolor, Tumor & omnia Symptomata sponte evanescunt. Potius ergo tales Tumores *Fomentis* discutientibus & resoluentibus, quæ Emplastri suppurationibus, fœd edrandi *g. g.*

℞ Flor. Chamemill.

Sambaci an. M. j.

Pulv. Rad. Trœs Flor. ʒi.

Infusa misceantur.

Oleo papav. expresso.

Infundatur fœculo interposito.

D. S.

Sacculus externus.

Qui calefactus probe ita imponatur, & subinde recedat.

Fit etiam interdum, ut in Gingivis circa radicem dentis dolens superveniat aliquis *Tumor* parvus interius dolens, qui pediculi ad *suppuracionem* evadit, qui Tumor ne eo levisus suppuraret, ne præmatur evanescere recidivasset, sed potius maturè suppuraret, convenit *Linæ tepidam* in ora teneantem, vel, quod melius, *Fraxina Platanum*, vel crudum vel nonnulli alutatum, Tuberculo imponenda, quæ ingulgent suppuracionem promovet (siò rursus *fed. vultu daret*): *alutatum* poltmodum *apertum* sedulo Aqua Mulæ, quæ elucet Os, vel Melle illito mundificandum, ne nimis cito consolidetur; aut ne si subsistat; Tassillum enim Fermenti remaneat embrius ejusmodi Tumoris recidivam facit.

Subinde emunctæ Odontalgiz adde sunt, ut *propter fœri capitis* ræritatem circa partem dolentem periculolior, fœd, imò crebrior adde *Peridæia*, ut subinde quibusvis, etiam generosissimis Artis prædiis, curati via queant. Exempla singularia videb. in M. A. N. C. Ann. R. *obſerv. 61. pag. 104*. ROSELLIO *Centur. 3. obſerv. 7*. HILDANO *Centur. 4. obſerv. 21*. In talibus, ubi *paratum* opus est, aut saltem metu gravitatis Mali, eadem institucio vi-

detur, *Talapa* est conveniēssima: juxta quam & ad *Sanguinis missionem* interdum accedendum venit: Hinc THONERUS lib. 1. *obſervat. pag. 114*. dolentis dentis per Venæsectionem ad Animi quicquid eliquum curatum referit: *Nim. vi. 14*. Dolorem Dentium lingue copioſo fervido per *Cucurbitulas* scapulis, Cervici, cubito applicatas, aliis utitur, curatum memorat: sic dolor dentium contumacissimus nullis cedens remediis per impoſitionem *cucurbitula* Maxillæ sanatus observatur à FORESTO lib. 24. *obſervat. 6*.

Pis. Rævalfina PARÆUS *Chirurg. lib. 16. cap. 25*. Alius tritum illa Manu, in quo latere dolor percipitur, gestatum conferre ex MESUE referit: vid. PLATERUS lib. 2. *obſervat. pag. 371*.

Quod Dentes cavet aut caries: pro his nulla adfuit Remedia: quamvis dolor levetur, semper tamen recidat: unde dens cavus & erosus *evellendus aut extrahendus est*, vici ei enim dentes simul carie inficiuntur. Evulsi hæc non est quidem gemina Odontalgiz cura: nihilominus tamen, quia in dente carioſo adhuc hæret ferreamus acidum rodens, quod subinde recidivare facit dolorem, optimum est eundem evellere: Etiam quando illi evulsi, *isla ʒi* solvæ, interdum Liquor copioſus limpidus solet evacuari, à quo abluatur quasi caverna loci, ne Malum possit recrudescere. Nam observatur etiam, quod Odontalgiz *capitis evulsi* dente fuerat curata: sicut & confirmata caries alia ratione, quam evulsiōne, curari non potest. Quamvis verò vel nondum eo ulque processerit Malum, vel propter periculum, sub dentium evulsiōne interdum observata, hæc nimis metatur; Remediis res ostenda est, carini scilicet progressum ulterioſorem inhibendo.

Evulsi appropriatè præparati infumantur, ac succo eo melius, quo minus fermit dent hæſerit, & quo magis idem vacillaverit. Facilius hoc agitur, & hinc chirurgo. Ut verò facilius & minus dolens fiat dentis Evulsiō, optimum est, Remedia quædam dentui applicare, quæ dentem vacillantem reddant, & ejus Casum aut evulsiōnem promoveant. Hinc inter varia convalescentia.

℞ Gummi Ammon.

Sem. Hyſſopum.

Succ. Hyſſopum. an. ʒi.

Quæ cum *Pinguetibus Rana viridis*, & pauca *Cera melleum* in Unguentum, denti extrahendo illinendum vel indendum, vel circa Gingivam applicandum, & eundem vacillare facit.

Succus Ranarum dentibus illitus ita eos hæſcit, ut sine dolore sequantur trahentem, inquit GESSNERUS in *ſeis Epistolis*. *Tumores Ghlandiæ majores* dentibus cavu illitus vel inditus, frangit eos, & elicit. Ulterius Lac Turbida, vel nodè denti carioſo inditum, aut si ex eo & Sale Ammoniaci formetur *Ghlandi*, & denti indatur, aut cum Farina Triticea subſtatum *dent. Palla*, & cavitati dentis indatur. Præter Turbida Lac, & alia ex ſimili Lactoreo genere, pari virtute possunt: ut Lac *Fœculum* Farinæ admixtum; vel ex Lacti Turbida cum Farina Triticea subſtatum *dent. Palla*, quæ in piagetissimis Rana viridis, friza, denti evulsiō applicata promoveat ejusdem casum sine dolore aut Lac *Chelidoniæ* mixturæ cum Farina Siliginis, ut fit *Infusio Pælicis*, quæ pulsi denti cum indita, si quæ aliquando permittatur, brevi ejusdem casum promovet. *Sal ammoniacum* etiam cum succo Hyſſopi convenit. *Plagula* item *Ranarum Ghlandiæ* dentibus afflicta, aut iidem indita dentium Casum promovet & eundem coquantur Ranzæ in Olla vitæaræ, adusa Aqua committit, & pinguedo quædam innatibit, quæ dentis evulsiōnem promovet.

*Quod vero ultimum progressus per artem & Medicamentum subſistere, efficacissimè imprimi per *Infusum dentis cavati** loco carioſo cum Camærio actuali, sive ex ferro, sive per subtilitatem ræmorrhæmiam, ex Argento vel auro *Inditur* quæ fœdo auro soluto dentem cum evulsiōne, præſentissimè facit à namque putredine & corruptione: vel ex Geru cum Myrica subſtatum, vel potius ex cera viridi propter admixtam *Argemone* impletor: dentis carioſi excavati, ipsa Myrica, Dentis illa, egregia est in hoc casu: Confer. hic REVERIUS in *obſervat. communis pag. 303* ubi referat, quid dæmus Terrebina impletor, & Camærio actuali demittatur in Carie. Loco Aqualis Camærii, ubi necesse visum fuerit, *Potentilla* adhibetur sic Aqua Fortis denti carioſo admoda, vel Spiritus Vitrioli gutta 1. vel 2. bombæ inditæ, ac denti adhibetur, ut in centroſum juvare & præſervare dicatur. Item *Infusum* in

(X) Hæc non solum inſerta sunt, sed etiam superſcriptionem ultra: quicquid Author dicit.

Oxyntellæ eandem, & in cavernam Dentis immiſiſſum, præſervat a Corruptione. *Cervallium Pulvis* Denti cavo inditus vel Os Sepiæ, item Camphora, Gargeli alteriore progrefſum inhibent: vel ex Pulvere Gocalliorum albotum, cum Melle roſato ad conſiſtentiam Liniamenti etafiloris redacto, Dentibus illis Gargem inhibet.

Denique *Vermiculi* in Dentibus nidulantes ſine enecandi, quod optime facit *Droſactum ſabina* cum Vino paratum, in Ore loco Dentis dolentis decurſum, quod copioſos Vermes elicit. Item *Suſſum ex Sempino Helyſſami & Cera*, in Globulis redactis, ſpecificus eſt per inſinidulatum Dentibus cavis receptus. Vermiculus enecat, & mirabiliter egredi facit. Conſ. BARTHOLOINUS *hiſt. med. Hoffm. Vol. 1. pag. 309.* Melius eſt ſi loco huius ex Fructibus *Halicacabi* confectis, cum Cera mixtis, ſat eandem pulſa, & inſeratur in Laminam Ferream ignitam, quæ Fumum ſuggerit, quo Ore excepto, catervatim Vermes cum ſputo copioſo reſolvi, & crudeliſſimi Dolores ſopiti, obſervati fuerunt. *Spiritus Sulphuris vel Mercurii quoque* Dentibus cum Bombace inditus Vermes optime necat, & Dolorem inde oriundum placat. *vel Pulvis Galliarum cum Succo Radicis pyrethrici* imprægnatus, & cum Fermento in Filulam redactus, optime Vermes capurgat, ſi Denti, ubi funt Vermiculi, indatur. Decoctum Radicis vel Corticis Fraſini etiam Vermes in Dentibus ſubulantes enecat. Serum Cervinum ad ignem liquefactum, & Gingivis impoſitum, quſtum contra Vermes Dentium valet, vid. BARTHOLOINUS *Cent. 3. Miſter. 96.*

ARTICULUS V.

De Doloze Oculorum.

CAUSÆ.

Dolor etiam non rarè Oculi varils in caſibus, tam quando inflammantur, quam etiam ſi Lacrymæ aut Lympha eodem beneſcens acris & acido ſalſer fuerit, unde roſio, Morſicatio, Dolor, & Rubedo. Pertinent huc *Res Externæ* quæcumque in Oculos incidentes, & Oculorum Doloſum infligentes.

Patientur etiam Oculi Doloſum ea rebus intrinſecus illapſis, & ex Lacrymis acrioribus ſeu Lympha ſalſo acida. Hi poſteriores Dolores parum habent in reſeſſu.

DIAGNOSIS.

Malum per ſe patet in Diagn.ſi.

PROGNOSIS.

Quod *Prognofis* Dolor in Bulbis Oculorum, ſine Ophthalmia, ſenſitiſſimum Signum eſt, ſi in principio Morbi acuti Agri de tali conſpiciuntur: mox enim Delitium & Convulſiones adſunt, quod ſepius obſervavi.

Cæterum nihil eſt, quod addam, niſi id, quod ſuperius *L. 2. ſectio. 1. Cap. 1. Art. 15. monui in ophthalmia.*

CURA.

In *Cera*, ſubſtans Cauſa tollitur Eſſectus, curata ophthalmia ceſſat Dolor. Adeoque ſi *Res Externæ* in Oculis illapſæ fuerint, quantocius eodem removendæ: in quem ſinem convenit imprimis *Hermis Semen* Oculo immiſſum; quod ipſam ſi Lympha oculari beneſcens reddit Mollitiorem, qua inviſcantur ea, quæ in Oculos inſerunt, & ita extrahi poſſunt. Item *Purſa parva*, vel parvus *Lapillus Caſſeri*, immittitur in Oculum, & hinc inde ſiſta agitatione ejici ſoleat, quæ incidenda: Vid. WORMIUS. *Admagis* admoveatur Oculo in ſcoe Martiaſ aut ſcoria Chalybæ: Conſ. HILDANUS *Cent. 1. Obſerv. 19. & Cent. 9. Obſerv. 21.* Quomodo aliis Inſtrumentis Chirurgicis Externa iſta ex Oculis eiſcinda fiat, videb. HILDANUS *Cent. 2. Obſerv. 13. Cent. 4. Obſerv. 17.*

In *Inflammatione* ſi Cauſa interna, huc ipſa *Appropriata* curanda venit, in ſpecie propter Oculorum doloſum: præter Remedia ſuperius notata in Ophthalmia, decoctum *poteris dulciſſimæ* applicetur, idque ſolum, ſi ſit a cauſa interna, vel ſociatum cum Albumine Ovi bene agitato, ſi ſit a Cauſa externa. Exſpectum quoque eſt ſequens collirium *Hildan.*

Tom. II.

M. Muſt. ſem. Cydon. cum ſperm. ran. eoz. 3iij.

Camph.

Croci gr. v. vel vi.

Mile.

Impoſatur Oculis cum Linetis multiplicibus inſtar collyrii.

Aqua Forſiculi cum Saccaro parum Ardores in Oculorum doloſe tollit: ſi addatur Saturni Camphoræ, erit magnus porcus, Vel

M. Aqua Chelid. maj.

Flor. Cyani,

Calcitr. an. ʒi.

Mercuri albi. gr. xij.

Soluta ſtitrentur per chartam:

adde

Tur. prop. ʒij.

M. S.

Collirium.

Com Linetis impoſuitur oculis.

Singulare eſt experimentum Radia Morſus diaboli, ſe ſcilicet quinque tales Radices Luna decreſcente colleſcæ appendat in hlo de Collo Patientis: tunc eolm ſe, at, tollatur mirabiliter nimis dolor, & omnes exacerbationes Oculorum aſſectum impedit, & auſert. Experimentum hoc eſt quorundam, in Caſibus, ubi alia incaſum ſunt adhibita.

Sic, & *Arterioſtemia* in Oculi hoc doloze ſubinde adminiſtranda venit: Videatur BARTHOLOINUS *hiſt. med. Hoffm. Vol. 1. pagina 23.* ſi adit Lympha corruſa in oculo, vel Lacryma acris, adhibeatur in ſpecie Purſa præparata, aut Flori Cini, ac loco huius Flores Jovis ſecundum manuſcriptionem ZWELFFERI parati. Hi cum Collirio applicati, abſorbendo, acrimoniam Lymphæ corrigunt, & ſempernat qua ratione etiam in Epiphora doloſa applicari poſſunt. His omnibus præſertur cataplaſma reſolvens, & diſcutiens ea Pomis dulcibus, quod omnes Præſtici unanimi conſenſu mirè præſtant, & commendant, applicando oculo doloſo, v. g.

M. Pem. doli. cell. & expreſ. vel ſui ciner. aſat.

Num. iij.

Album. ovi coquoſ. Num. I.

Sacchar. albi. ʒij.

Camph. gr. x. vel xij. ad xv.

Croci gr. v.

M. ſi Cataplaſma Oculis impoſendum,

D. S.

Pulſ Lenices.

Vid. ſuprà de albugine, & collig. Joſeph D. MICHAELIS.

ſi ſit Malum a cauſa externa applicatur cum albumine Ovi bene invicem miſtus, & agitato; ſi ſit a cauſa interna, Albumen commodiſſe omittitur. Convenit in quovis undecunque nato Oculorum doloze, etiam inflammationem. Experimentum fuit TIMÆI *non Goldmiller in ref. pag. 41. vid. ſchirg. BARRETTE pag. 150. 151. & 152. item arm. ſchirg. SCULTEII Obſerv. 22. qui egregias in hoc Cataplaſmate vires recenſet; HORSTIUS Obſerv. pag. 443. Idea Formular. ſtaſi. 3. ʒ. 25. & collig. Formular. Pro optimo euporifto habet BORELLUS *Cent. 2. Obſerv. 37. ſequens.**

M. Album. Ovi.

Et cum *Alumini ſuſſale* tandia agitur, donec poltis conſiſtentiam acquirat: poſtea Linen ſubili involvantur, & Scuto elauſis palpebræ impoſatur, ſæpe renovando.

Specialis eſt Dolor, qui Oculos ſubinde affligit, eſſique ſenſus vehementiſſime Compreſſionis, & quaſi ſimal epiſtem Lacrationis, ſuo maſſifica Oculi iſſum, vel alteratione. Urget veſperi, & mano quando ſurgunt, ſcitum interdum Lineæ rubræ in & circa Membranas Oculi hærent. Subinde ſine Cauſa maſſifica urget. Credo eſſe quaſi *Aſſum* *ſpasmoticum* *Tumorem oculi*. Dolor hic compreſſivus, & lacerativus outatur per Aquas Ophthalmicas Animoſiales quſcumque, ex Infuſo Animoſium, vel Vitri Antimonii, vel Capitis mortui Butyri Antimonii, vel Croci Metallorum (videb. de ophthalmia ſuprà L. 1.) cum Aqua Spermatis Ramorum, vel Fragorum: quibus commodè addi poſſunt Ceruſæ, vel Sacchari Saturni ana. ʒi. ad ʒi. vel ʒi. ſubtiliſſime pulveriſati: Item *Fomenta POTERII* *in ſenſaria 2. cap. 9. de doloze ophthalmia* extra adhibiti. Decoctum Radicis Lapathi majoris quoties porum, Oculiſque illitum, tanquam ſingularis commendatur: Item *Verberna*, *Fumiculus*, *Euphrasia*, *Rofa*, *Sumach*, *Turſia* in Aqua,

Tect

qua,

qua. & Vino decocta applicata; vel ad imitationem HILDANI,

24. *Masilg. sem. Plantag. vel Foenogr.*

Cydonia.

q. *Hormis seu Sclarea, cum sperm. ran. extr. an. 3℔.*

Græ. gr. vi.

Camp. gr. iv.

Quæ mista applicentur contra dolorem.

Quibus quidem & Lac muliere addere solent; videb. HILDANUS lib. 1. observ. 2. pag. 3. folio item nictentia leviter contra Oculis impolita, vel si herbi non possint reperiri, accipitur fœca, macerata non quilibet in Vino, vel spiritui Vini, applicetur; Sic enim ratione salis Volatilis oleosi dictum dolorem solvunt. Ulterius Saccharum Joviale cum aqua Rosarum mistum, & infusillatum, est nobile ophthalmicum, quod mirè commendatur a LINDANO in Oculorum doloribus, Fit ita: Saccharum albidissimum vel candidissimum in Mortario, vel scutella flannea cum cochleari flanneo teritur usque ad consuetudinem. Saccharum hoc Joviale singulare fuit LINDANO ad quoscunque Oculorum affectus, in specie affectus dolores: Vel

24. *Aqua plantag.*

Fœcal. an. 3℔. vel 3℔. ad 3℔.

Sacch. Jovial. Lind. 3℔. vel 3℔. ad 3℔.

Tertia papav. gr. vii. vel viii.

Cruci gr. iiii. vel iv.

M. pro Collyrio contra hujusmodi dolores usurpando.

D. 8.

Collyrium leniens.

Solummodò etiam saccharum Joviale infus pulvis infusillatur.

Hoc pertinet Dolor superciliaris periodicus, arthriticus imprimis familiaris, cum vesicatorio rorè aures curatus qui vid. in M. A. N. C. Ann. 1. obs. 352. Hic enim dolor prognostic dat ingruentis arthritidis, aut jam factæ.

ARTICULUS VI.

De Aurium Dolor.

D Olet etiam subinde Aures graviter in Otalgia (Y). Germ. *Ohrschmerz*, idque imprimis ratione Membranz interdum micant auditorium invellentiæ.

C A U S Æ.

Causa huius Doloris est, vel frequentissimè Inflammatio, de quo jam supra facta dictum fuit, iuncta cum sensu Ardoris, ac pulsationis, subinde Lancinationis molestissime, cum sensu æstuationis in regione externa; & quidem, licet non videatur primitus dolor ab inflammatione, tamen superveniente puris fluxu, & levamine, res ipsa se prodit. Caus. in specie, quæ circa notabiles aurium Dolores cum ratione notant, M. A. N. C. Ann. 6. observ. 82. pag. 117. vel est *Hæmor. auris*, & *saliva*, Membranam internam pungens & admodum corrodens; item *Lymphæ catarrhalis* virulosa, aut nimio acore imprægnata in catarrhalibus Affectibus, per errorem distributionis ad aures delata; quæ ad otalgiam disponit, & lancinantem dolorem infert. Eundem dolorem etiam infert ille Humor, ex quo naturaliter concrevit Cerumina depravatus, qui si præternaturaliter reddatur, acris & salis, membranam internam pingit, & non nihil ardeat, & sic aurium Doloris infert. Dicitur Humor, ex quo naturaliter concrevit cerumina; cum utitur hæc ipsa Cerumina sub consensu spissiore flavescens, naturaliter in Adultis dicuntur amarefieri (unde egræguum adeo est Vulnerarium, & Uicerarium,) quæ in infantibus dulcescit: prima tamen eorum generis est, quæ quodam Humore tenui, seu Lympha; quod ex eo patet: si quis cerumina Aurium expurgans cum Stylo altius intravit vellicaverit Membranam Meatus auditorii, tunc Humor tepidus torridus fluere percipitur: quod etiam Digito profundius immisso per se patet: Imò si capillorum foras fiat in Aures, aperit se *per for. faciem* percipi potest. Hic ipse ad exteriora Auris effusus resolvitur per Arem, & infusillatur tandem in sordes crassæ, quas nos Cerumina

vocamus. Tandem sunt etiam *vermes*, nunc in aures irrepentes, nunc etiam interitum in ipsis auribus geniti, iode ex auribus etiam ad ipsum cerebrum penetrant, qui non raro atroces dolores Aurium, eoque varios, inferre solent, cum sensu roboris, punctorio-pruritus: item cum sensu reptationis seu progressus vermium in interiori auris locato: Vid. PANAROLII *Pont.* 4. obs. 27.

DIAGNOSIS.

Ex modò dictis facilia sunt signa: Nam uti videre est, Otalgia cogitatio patet ex relatione Ægri, saltem causam distinctam probe attendenda.

Si dolor sit ab inflammatione, adeit dolor Pulsatorius, conjunctus est sensus ardentis in Aures, subinde etiam aures externa rubet.

Si sit ex alia causa humoris, Dolor sine ulla insigni ardore, cum levi saltem pulsatione, percipitur, & dolet tantum acutè, pungens & quasi perigrans, in Ansibus adesse solet.

Confiderentur simul signa effectuum catarrhalium. Capitis gravitas, &c. item dolor à tali causa ne acerbior & gravior, nunc remissior esse solet: item per diuturnitatem se manifestat.

Vermes etiam facili patens; percipitur sensus Rosænis aut punctura; item percipitur subinde pruritus à Vermibus, interdum etiam reptationis seu progressus sensus in aures internum mensam percipitur: observentur simul circumstantiæ antecedentes.

PROGNOSIS.

Aurium dolor, præsertim Inflammatorius, admodum periculosum malum est: atrocior enim si fuerit, deliria, gravia Cerebri pathemata, ipsam interdum etiam mortem inferit; idque eò magis, in profundo affectu hæciet, & magis magisque nervum Ælicum afficiat.

In quibus frequens Malum esse solet, & quod faciliè invenientur Materie caudam plùs minus parulentes: necesse est se jungit, *scilicet vermes* & periculosius laborat.

Reliquis aurium doloribus levis momenti esse solent, nisi graviter torqueant Ægros.

C U R A.

Quod Curam: varietas causarum obstruendū est. Imprimis distinguendus est dolor inflammatorius rariū ab aliis eorumdem doloribus. De Inflammatione supra dictum. In specie tamen, vel in genuino dolore, vel eo, qui supervenit Otalgia, exportum est Cataplasma ex *Cera Ferri*, quod FORESTUS in lib. 12. observ. 1. & 4. descriptū Nemo

24. *Cep. sat. ciner. calcat. col. & affat. No. 1.*

Olei Chamæmil. 3℔.

Auris.

Rat. ros. an. 3℔.

Cruci 3℔.

Misc.

Sub forma cataplasmati applicentur extrinsecus ad affectum; quo aliquot tales acerbissimi Aurium dolores conjunctos cum odontalgia feliciter curantur.

Item Ceraurum aliatum succus cum Oleo Irino expressus laudatur observat. 2. l. 2. In genere etiam dolorem aurium sufficit Femina ex anodynis & emollientibus in Lacte coctis, ut Radice Althææ, Semine Fœmægræci, Floribus Chamomillæ, Meliloti, Bottonicæ, &c. applicata, præsertim si Malum sit à Causa externa: Vid. HILDANUS *Centur.* 1. observ. 5. & 6. Item FORESTUS lib. 12. observ. 3. convenit etiam oleum chamomillæ, Rosarum, Rutaceum: etiam oleum, in quo cæteri fluviales incocti: per aliam enim Olei acidum destruitur: cui in dolore Inflammatorio consilium Camphoræ addi potest: Item James Nicotiana cum Filula Ioværis aut immixtus etiam confert ad dolorem aurium compendendum: vel Folia Nicotianæ, aut recorta, aut aqua appropriata, vel spiritus Vini, vel Vino macerata, parum consultà auribus applicat Dolorem promptè sufficit. Per catæxi utià sunt Olea arbutus infusillanda, aut oleum Orum, Ictidiorum, Allicum, Oleum Scabularum, Oleum Scorpionum. Nemo *Astili* in Oleo Volarum, aut Myrror, vel communis, si infundatur & ebulliant, præstans est Remediū Anodynum

(Y) Ὢταλγία Otalgia, Aurium dolor: *αὐτίς*, Auris, & *ἄλγος* dolor.

in quocunque Aurium dolore, etiam inflammatorio, Auri instillatur. Non edidit huc *Oleum Scorbis*, si scilicet hi contenti aut vivi instillantur in *Oleum Rosarum*, vel simplex cum Aqua parca, & ad Aquæ consumptionem coquantur, hinc exprimentur, vel vivi in *Oleo Nymphaeae* infundantur. Prae cæteris expertum est remedium *Oleum Scorpionum*, ritè paratum per diuturnam digestionem in Sole, cum Bombace loco doleenti applicatum, vel solum, vel mixtum cum dimidia Olei Amygdalarum: Hæc enim duo Oleis Auribus, decumbente Aëro super Aurum sanam, mirificè coferunt.

℞. Olei Scorp. ʒi.
Amygd. dulc. aut, 6 opus est aliquall do-
terlice, amar. ʒʒ.
destill. Anis.
Caroli an. ʒʒ.
M. D. S.
Oleum Lonicæ.

De Mithra hac blandè catenata Auri doleenti instilletur, Aëro in Aure sua recumbente, aut etiam cum Bombace paulò profundius immitatur, quibus non inferius est, *Oleum Lumbriorum* rectè paratum.

In dolore Aurium; ubi autem inflammatio, aut morus est, ne inflammatio superveniat, optimè præscribitur hocce:

℞. Sac. Semp. maj. ʒi.
Olei Scorp.
Lunæ. terr.
Chama. an. ʒi.

Mithra instilletur aut saltem cum Bombace his Oleis instillio Auri obducatur; egregiè confert in ejusmodi dolore.

Singulariter etiam non tantùm ad dolorem Aurium, sed etiam simul ad furditatem, laudatur Bellus seu Radix Papiæ portici seu *Cyclaminis*, quam excavat in forma scutellæ, & Oleo Liliorum alborum aliove appropriato repletur, ad ignem relinquatur usque dum probè decocta fuerint: post coctionem integram Radicem benè exprimunt, & de Liquore expresso Auri doleenti vel immititur, vel cum Gossypio applicatur. Porro, ubi nulla est inflammatorius suspicio, vel nullam ejusdem signum apparet, præter dicta (nam hæc conveniunt in omni Aurium dolore) imprimis Olea destillata Vegetabilia conveniunt, quæ inter sunt *Oleum destillatum Origanis*. Convenit item *Oleum Castorei*, item *Decoctum Caryophyllorum aromaticorum* in Vino Auri instillatum, ipsa Caryophylla desuper applicato: Etiam conferat dolorem ex *Lymphæ crassa*. Urina etiam pueri recens, ut potius ejus spiritus phlegmaticus non adeo acris, Auri instillatus est egregius, item spiritus Otalgicus *Myrsinæ*, qui est egregius spiritus, & optimè compositus, aut spiritus Otalgicus *BARBETTE* in *Anat. Pract. lib. 2. cap. 3.* cuius compositio elegans est hæc:

℞. Ovar. Fermis. maj. No. 6.
Castor.
Pulp. Colocynth.
Maceran.
Salis.
Albush.
Ruta an. M. i.
Sem. Camini.
Anis.
Penicilli.
Caroli an. ʒii.
Sac. Lauricent.
Jasperi an. ʒʒ.
Cor. Mali Pan. ʒvi.
Rad. Hellek. agri.
Cyper.
Raphani min.
Cyclam. an. ʒi.
Cap. medic. No. vii.
Amygdal. amar. ʒii.
Infund. in Spiritu Vin. q. c.

Per Balneum Mariæ abstrahatur. Aut extracta saltem Effluvia Auribus instilletur, vel cum Bombace applicetur.

Spiritus hic quoque non tantùm in obductione à quacunque Causa sine Inflammatione, sed etiam in tinnitu Aurium & furditate est egregius, si duæ vel tres guttæ instillantur, & postmodum Auri obducetur cum Bombace modicè aut amboro: nam & hæc admodum commendatur in Aurium afflicto, de quo postmodum. Quibus si graviori in malo non cedat, aut ubi dolor est nimis acutus, in

Tem. II.

spiritu hujusmodi Otalgico aut alio, aut tantùm spiritus Vini tartarizato, dissolvatur parum Opii vel *Laudani Opiati*, vel addatur tantillum *Essentia Opii*, & ita hoc modo Auribus instilletur; sed cautè hoc fiat, ne audiam lædantur. Conf. *FORESTUS lib. 20. obs. 1. ʒ. 6.* Interdum fumus Tabaci Auribus insufflatus antiquè & inveteratos dolores promptè sistere solet. Denique *Oleum de Ligno Carylli* destillatum, item *Oleum Ligni Rusi*, acerbissimum Aurium dolores subito sistit: sed *Olea Scorpionum* & *Alectorum* instillat omnium sufficere possunt.

Præficientissimum remedium ventillatur, si ex Cervo excisus globus fumatur, latèque tondatur, & postea Auris in comprimitur.

Si dolor Aurium à Vermibus fnerit, si quocunque elieendi fuerit vivi, aut intus enecetur, & ita extrahatur, dolor enim tunc vagè lancinans, hinc inde rodens, percipitur. Lac tepidum Auribus cum spongia aut Linteo extrinsecus applicatum, dulcedine sua Vermes allicit, ut ita prodeant; vel se infundunt in Aures, vid. *PANAROLLUS Præter. 4. obs. 27.* qui notat dolorem Aurium intensissimum per Lacis insuisionem, evocari Vermibus curatum. Pomum etiam dulce assatum Auri applicatum simili modo convenit, uti refert *PANAROLLUS Præter. 4. obs. 27.* His non sufficientibus interficendis sunt. Interfic vel angit eisdem *foeni Abstrah.*, aut *Centaurii minoris*, aut *Cucumeris affini* aut soliorum *Perficorum*, item *Oleum Nucleorum Perficorum* recentè expressum, *Amygdalarum amararum*, *Diacyclostichis Quercanis* quibus aliquantulum *Mercurii* ductis addi potest.

Vel

℞. Olei Nuc. Persic. rec. expr. ʒi.
Diacyclostich. Querc. ʒʒ.
Mercurii dulc. gr. vi. ad ʒʒ.
M. probè. ʒ.

Oleum contra Vermes in Aures.

Guttatim instilletur, vel cum Bombace immittatur auribus.

Vel *Aqua Hermetica*, h. e. *Aqua Hyperici* vel *Graminis*, in qua *Mercurius* vivus purificatus aliquantulum bullierit, vel cum qua probè agitur fuerit, decantata à Mercurio vivo Auribus instillata aut innecta, non erit inconveniens. Elixir Proprietatis ratione *Myrrhæ* & *Croc.* si duæ vel tres guttæ instillantur Auribus, etiam conducit ad evacuandum Vermes, vel iniegitur Decoctum ex summis *Abstrah.* Aloe, vel alii, mediante Siphone pro eluendis Auribus: e. g.

℞. Altes ʒii.
Myrrh. ʒi. ad ʒi.
Colocynth. ʒʒ.
Suum. Abstrah. Mʒ.

Coq. in C. q. Vini vel *Aque romm.*

Colatura detur pro iniectione in Aures: ʒ.

Instillio in Aures contra Vermes.

Vid. *BARBETTE Anat. Pract. lib. 3. cap. 2. pag. 110.* Sufficit *Myrrhæ* Auribus receptus, & ipse Vermes evocat, item Infusum Seminis *Nigellæ* in Aqua Vitæ, sive Spiritu Vini cum Bombace Auribus applicatum multos Vermes eduxit, uti hoc observat *SCHENCKIUS*. Pro Vermibus Aurium commendat *AGRICOLA* sequens Unguentum:

℞. Salis Sapt. (Salis Saturni)
Coram. Aur.
Olei Lign. Caryll. expr. an. part. æqu.
Misc.

Cujus felicem usum expertus est contra dolorem Aurium.

Aliis etiam *Oleum destillatum Corylium* omnes Vermes aut enecat aut expellit.

Suffragia Amara cum Antimonio juncta non Auribus tantùm, sed etiam Ore & Naribus excepta eisdem Vermes expellunt; est enim moratus ex Auri Concha in Os, teste *SALMUTH. Cos. 2. obs. 39.* Quo facit etiam *Ingrediamur HARTMANNI* ex *Pinguetudine Capi*, *Oleo Coryli* & *Mercurio* subtilissimo aut dulci; nam & hoc egregiè aut enecat aut expellit Vermiculos. Vel etiam ex Semine *Hysocyami* cum Cera formetur parva Candelæ, quæ accensa, aut Carbonibus innectæ, spirant fumum, qui Auribus exceptis multos Vermes expellit. *Oleum destillatum Jasperi*, item *Balsamum Salsituriæ trochiscatum* enecat Animalia in Aures ingressa; fecit etiam *Suffragium Gummi Ammoniac* quondam elicit: Conf. *M. A. N. G. Ann. 3. Obs. 166. pag. 180.* si *Coryllis* in Aures irreperit; *Oleum Infusum Coryli* ram domo expicit; Vid. *M. A. N. G. Ann. 4. obs. 50. pag.*

aa. In specie si *Malis* ex impossibile introspiceretur, accipiatur Terribilissima, eaque cum Bombace & Stylo immittatur in Aures, & invicata Mulca extrahatur. Quod si ex improvviso *Hirudo* in aurem introspiceretur, tunc subito aures externa perforantur sanguine recenti cupido Animalis, sic enim ad sanguinem prorumpunt Hirudines, & ita egrediuntur, qualem Histerum habet BARTHOLINUS *Cap. 4. Hyst. 70.* Vel incipitur Aqua Solutissima salis communis. Quod si *Pulvis* in aurem se infusus fuerit, laudatur à RIVERO Globulus ex pilis Caninis compositus, extrahendus auribus applicandus, vel cum Stylo in aurem immittendus; pilis enim subito Pulvis se infundit & extrahitur.

ARTICULUS VII.

De Cephalalgia.

PRÆ aliis multiplex & suspensibilis servus est dolor, qui caput crebrius affligit, in genere Cephalalgia dicitur, non quod caput integrum doleat, sed tunc saltem illa capitis suprema pars, quæ ossibus cranii circumscriptur; nam reliquæ partes in capite dolentes peculiariter ferè appellantur nominales. Et quidem in dicta parte capitis, quæ circumscriptur Ossibus Cranii, *Membra* sunt summummodo *ae Pili* nervis multiplicibus, cruciatum sitis, sensibilibus contentum, & ex illis nate Nervorum tunica; uti & illæ *Membra*, quæ variis cerebri cavitatibus & anfractibus involvunt, quæ in dicto dolore primario cruciantur seu afficiuntur, eaque tam *externa*, & *Cranium* & *Caput*, quàm *interna*, Cerebrum in ejusdem ambitu, eicientes. Unde dolor Capitis alius est *externus*, qui saltem Meninges in toto sui ambitu dolet affligere, & *internus*, quando externæ saltem Membranae dolent, de quo optimè scripsit WILLISIUS *lib. 4. Anim. Brutor. Part. 2. cap. 1. & 2. pag. 120.* eujus etiam vestigia sequemur.

Quoad *internas Membras*: hæc sunt *dura* & *tenuis Meninx*, utut de hac propter ejus tenuitatem dubitet LINDANUS. *Dura* verò *Mater* seu *dura Meninx* duplici constat tunica, per quam Vasa Sanguifera multicaulisradibus, imprimis ex Vena Jugulari, transeunt, donec perveniant ad Vasa Capitis, & tunc ad Cerebrum; hinc non potest fieri, quin pro vario sanguinis statu multa patiatur hæc Membrana, si igitur dilatetur Vasa à sanguine, necessarii dilatatur tunica, & divellitur ejus duplicatura; unde necessario sic insequitur dolor Capitis. Ut autem Capitis omnis generis patiatur dolores, in specie tamen ordinario *pulsationis* & *sensibilis* esse solet, qui hæc Membrana affligunt, quæ ipsa etiam per consensum Piscinarum Capitis afflicte solet; interea enim tunica seu Pia Mater minus dolens videtur propter nimiam sui subtilitatem. Jam verò cum Membrana ista dura cometer Nervorum Opticum usque ad Oculum, & ibidem tunicam quondam; Scleroticum nempe, consistat, ob id frequenter in graviori Capitis dolore ipsi etiam oculi intensè dolere solent; hinc est dolor Capitis *internus*.

Quoad *Capitis dolorem externum*: fit hic, quando saltem Membranae Cranii, speciatim *Perrivarium*, hinc *Panniculus carnosus*, *Musculi*, ipsaque adò *Cutis*, vel per consensum duræ Meningis, vel propter lesionem internam in consensibus aut concussionibus, aut similibus ex causis externis, afficitur; atque quando materia præternaturalis recremento à ibidem colligitur, uti in Luc Venerea fieri solet, acerbè dolent, qui dolore externum faciliè tactu externo est perceptibilis & sensibilis. *Subjunctam* ergò quod dolet in Capite, non est *Cerebrum*, neque *corpus*, neque *Medulla*, sed saltem *Membrana* à & extra eamque existente: Unde frequenter est dolor Capitis *convulsus* & *pulsatorius*; ostenduntur autem solet esse lacernam & laniationem, sicuti etiam dolorem *punctatorem*, & *Osteocum* caput perferre solet.

Dicit autem caput omne univèrsum; totus nempe ab ossibus Cranii tractus circumscriptus, æquum tunc generaliter Cephalalgia audit, qualis illa est dolor, qui subinde hominibus post erupam, vel sub Aoris mutationibus, vel in Febribus, ardentibus & intermittentibus, vel à simili causa affligit; quæ secundum est, & non simpliciter, omne oscipit (quod tamen consensum contingit) magis affligit: Quod si *inter* dolor talis Capitis universalis sit gravior & durior, & contumax, & multum durior, Cephalalgia dicitur, & omnis *univèrsalis* agnoscitur in ipso capite, aut epræ ex loco *punctatorem* & *fixam*. Quod si *universalem* saltem

caput, imprimis ratione future Sagittalis, quæ caput in partem dextram & sinistram dividit, vehementer & pertinaciter tacum debeat, ita ut altere medietas sit indolens, est *Hemicrania*, univèrsalem durioram & admodum contrariam. Quod si templa tantummodo pars capitis inter sagittalem & temporalem futuram afficiatur, dicitur *Ovus*, à magnitudine nempe loci affecti, quæ Ovum non excedit. Quod si dolor potè in uno parvo sit loco, contumax tamen & fixus, quasi Clavus ibidem fit intrusus, dicitur *Clavus*, sola magnitudine partis affectæ ab Ovo differens. Dolor item in Ovo est major, in Clavo minor; Ovum item per vices solet intendi & remittere; Clavus verò non item; est enim ferè continuus eodem modo durans & affligens, nisi à causa externa fortis intendatur. Tandem, nisi frequenter percipias dolor in fincipite, interdum tamen solum Occiput dolet, idque frequenter in *Mulieribus*, qui dolor Mulieribus ferè conjungitur *est causæ sensu Frigoris illius* loci, quasi Glacies intra Calvariam esset recondita. Talis dolor fit imprimis per *consensum thalami*, & rariò faciliè solet, quin ut plurimum ex Utero oriatur; aut concessione ratio hæc æquè nota fit, & interdum etiam senes, tam Maiores, quàm Vetus, talis dolor Occipitis solè affligere, qui tamen est alio est fonte.

Ab adjundo Cephalalgia vel *calida*, vel *frigida* dicitur: *Calida*, prout nempe sanguis vel ipse magis fervet, vel ex Membranarum spatio circa caput partes, præsertim anteriores, magis detinetur; tunc enim calor manifestus sensus, præsertim circa frontem, percipitur: *Frigida* e contra dicitur, ubi nil tale occurrat, sed potius frigus sentitur, eest saltem gravato Capitis affectu.

CAUSÆ.

Causæ hæc, quæmodum omnis dolentis, est, quicquid Fibra dictarum partium distendit vel rodetur vellet: quod quis à quamplurimis causis numeratissimè magis, nunc mediè sit, *distinguenda* est ante omnia Cephalalgia in eam, quæ est *per affectionem*, ubi vitium de origine vel hæret in ipso Capite, verbi gratia dum Caput dolet ex Velocitate, Confusione &c., ab ea, quæ est *per consensum*, quando nempe vitio, aut Maligno Sanguine, aut partium quarundam inferiorum, Caput dolet & compatitur: *clavæ* hæc Cephalalgia omnium frequentissima in Praxi, quæ verò fit per *consensum*, contumax magis, & ferè *Capitis* esse solet.

Per *consensum* partium inferiorum fit Cephalalgia ubique nulla *vaporis* aut *humoris* transmissio æquè videtur, utpote à WILLISIO aliisque Neotericis refutato, sed simpliciter per solum communicationem Membranarum & Nervorum cum partibus aliis membranarum & nervis ipsi admittunt, intercedente simul certo Nervorum consensu. Nam sicuti ex Confusione Capitis aut gravi Cambio ejusque Membranarum Vulnere concipitur Vomitus, vehementer loquendo; & sicuti ex consensu in Hypochondriacis concipitur Vertigo in Cerebro, interdum etiam in quamplurimum Cephalalgia, solo consensu cum stomacho; ita etiam ex *sensu consensu Nervorum* cum Cerebro ejusque Membranis, dolor intensus excitari potest; quod confirmat FORESTUS *lib. 9. observ. 46.* ubi juvenis biliosus, cum ejus ambularet, dolore Capitis conturbaretur; assumpto vero paulillo cibo, subito omne malum remittebat. Ac si sit non alio modo, quàm per *ipsam* abhi inceptis, & Nervorum ex Membranarum ductu in caput usque continuos: sic enim per Consensum dolores oriuntur: Videb. WILLISIO de *Anim. Brutor. Part. 2. cap. 5.* Cephalalgia est *Lien* & ex *Hypochondriis* non frequenter; quia Lien copiosius Nervis est dotatus, ratione quorum & ejus consensuum membranaceæ, ejus ipsius Cephalalgiam inferre solet. Par ratio est, quando per *consensum thalami* fit Cephalalgia: Videb. FORESTUS *lib. 9. observ. 51.* RIVIERUS *Creat. 2. observ. 56.* & RIEDELII *S. observ. 20.* BARTHOLINUS in *Hystor.* Pannicam observat Mulierem, quæ Hemicrania semper affligebatur, cum Utero non gereret; quando verò conceperat, nihil sentiebat, imprimis quando Mulieres dolore in Occipite laborant, Prædicti dicunt, laborare Uterum: quidem cum Utero membranarum, ejusque partibus ipsi connectitur; univèrsus *Sphæra* nervorum & membranarum consensu à quo patet in actu partium, in qua sapè non concipiam Membranarum & reliquarum partium nervorum consensum Epileptici experient; ita etiam ex vitio Uteri partiumque vicinarum quæqueque, fontibus Cerebri Membranae graviter affici per consensum, & hinc dolore possunt; hinc enim Membr-

non quæcumque totius Corporis continuatur, & conuenit Membranis Cerebrum involuentibus, adeoque facile pars una alteram per confensum ex ipsa afficere potest: Videb. D. CROON, *Medicus Londin. de Mena Menstruorum*, in WILLISII *tract. de Nervis* adiuuctus.

Ex omni Cephalalgia per confensum frequentissima est illa, quæ fit ex *Stomacho*, eujus hinc inde variæ prostant observationes: Videb. FORESTUS *lib. 9. obscur. 44. 45. & 46.* WILLISIIUS *loc. alleg. capit. 2. pag. 303. & 305.* & LUTIGIUS *in obscur. 11.* Sic Dolorem immanem Capitis à Phlegmate acido in stomacho cum Vomitu conjunctum observat THONERUS *in obscur. pag. 141.* Quando enim vitiosa recrementa in stomacho sunt, solent interire graviter Cephalalgiam. Uti etiam BORELLUS *centur. 2. obscur. 1.* ex hoc fonte Hemisphericam observavit; quod rarus est. In specie in his, qui laborant *Stomachali* stomachi, item in Hypochondriacis & similibus, frequentissimi sunt capitis dolores, & Tensionem circa frontem per confensum stomachi, imprimis Mucilaginem acida infarcti, & Partium vicinarum membranarum; precipitum enim semper simul Tensionem circa Hypochondria. Cephalalgia hujus exempla videb. apud FORESTUM *obscur. 48. & 49. ac RIVIERUM centur. 2. obscur. 12.* Interdum *phlogia* inepta Cephalalgias crudeles inferunt: Dux exempla hujus rei refert LUTIGIUS *in obscur. pag. 152. & 154.* Porro Hemisphericam per confensum causa labiendi est *Dens cariosa*: Conf. THYRMAYER *conf. lib. 2. pag. 228.* & HILDANUS *centur. 2. obscur. 10.* Etsi quædam doli per confensum saltem Tensivæ, & hinc Punctorius ac Pulsatorius. De *utero* supra dicti, quod frequentissimè solet Cephalalgiam, in specie quæ Oculum occupat, & sensum Glaciei representat. Præter uterum *renes* affecti, imprimis calculo obiecti, per confensum Cephalalgiam inferunt: Imprimis in BARTHOLOMÆO *cent. 4. obscur. 8.* curiosis est observatum Hemisphericam illius lateris, ejus lateris Ren calcula erat obiectus: sic ex Dolore Nephritico similes Cephalalgias observavit FORESTUS *lib. 9. obscur. 51. in schol.* Quæ fit propter Nervos affectos, qui in Renibus dolorum sunt organa, ortos ex Plexibus Mesenterii, qui eorum Sarcules derivant ad stomachum, & intestina, unde per confensum afficitur Caput propter ipsam. Tandem & *Verus* intestinum fusiode contumaces Cephalalgias inferre solent: Videb. FORESTUS *loc. alleg. obscur. 47.*

Hæc sunt Cephalalgie & Cephalæ per confensum. Cephalalgiam verò per *affectionem* quod attinet: sic, quando Maligna & radix Doloris ipsum caput occupat, qualis est v. g. in Clavo & Ovo. Talia Dolor capitis per essentiam est frequentissimus in Hemisphericis, non tamen semper, ubi suspensa adell flagrant sanguinis, ejus impeditus motus in uno altero Valorum ramali alterius medietatis. Nam Dux Mater ipsorum cerebrum in duas dividitur partes: hæc altera tantum in Hemisphericam afficitur, quod ea Anatomici obiter notu.

Ratione Causarum est vel *accidentaliter*, vel *habituale*. *Accidentaliter* est, quando sine Procatari aut dispositione præcipua causa evidente solitaria originem ducit, Rerum scilicet Non-naturalium major regimine, & Fortaleorum incongrua invasione, v. g. à Crapula, Insolentia, Exercitio vehementiore, emulione, Mercurii intra Crania lammata, vel à Medicamentis Mercurialibus salivancibus, vel à famis Mercurialis collectione. *Habituali* verò, quando causa certa morbifica disposita hæret in cerebro ejusque Partibus, propter quam vel contínuè affligit, vel per vires, & à levissimis occasione redit *vis* Dolor. V. g. Caput Valorem vel contione graviore læsum per essentiam quidem, sed tamen *vis* causæ interne formæ, dat dolorem seu Hemisphericam Accidentalem: Quod si verò post Vultus curatum remaneat, vel Atonia Partis læsæ, vel ex Nutritione deficiente, subinde recrementa quodam generetur, quibus occasionebus, aut sub omni mutatione Tempellatis anni aut Lunæ, sæpius redeat Cephalalgia gravis, talis per essentiam, & quidem habitualis, erit: Sic FORESTUS *lib. 9. obscur. 34.* observat Cephalalgiam post curatum Vultus diuturnam, aperte cure cranii inventum suis Ou corruptum, quo exemplo, dolor curatus fuit.

Utique hæc Cephalalgia per *affectionem* oritur frequenter tam à *sanctamento* hic evidente, quàm interna & latente. *Privis* *genis* infinitum possunt dici, scilicet contumeliosæ & Vulnera, Aeris inclementia variæ, Crapula, Motus corporis, Curæ, Studia, & effa Canaliculum, Glandes Quercum, Lactis potus, Coriandri assumptio. *Posterior* verò seu interna causa habitualis Cephalalgie magis propria, *triplicem* *fontem* agnoscit: Est (1) vel à sanguine ejusque

motu in Vasculis cerebri plus minus vitio: vel (2) à Lymphæ glandulis Cephalicis vitio: secunda aut male distributa: vel (3) à *digestione* privata in cerebro ejusque Membranis internis & externis errore & vicio, unde generantur heterogeneis recrementis, quæ Cephalalgiam inferunt: Quo in specie vitiosior Mucus, Vermes, Lapilli, Abscessus, Calculi, &c. in cerebro geniti pertinent: vid. WILLISIIUS de *Anim. Brutor. part. 2. cap. 2.* qui opem omnia tradit, quæ illi inflat omnium. Ac facit in habitualibus hujusmodi Cephalalgis semper ferè observatur imus Partis affectus debilis constitutio, & hinc facilius Materie morbi hinc occasionalis vel receptio, vel generatio.

Quoad 1. A *sanguinis* vitio, ejusque motu depravato, in specie doli capitis Tensivæ, Pulsatorius, cum insigni capitis inflacentia, & distensionis sensu excitari solet. Fieri hic solet, dum sanguis aut nimis abundans, vel verè, vel spatepter in *Turgescit* quadam præternaturali, nempe febribus, quæcumque occasione agitates, aut à suppletionis solennis evacuationis conservatus, Vascula Meoingum harumque fibras præter modum distendit, in suo Motu remoratur, & ita Cephalalgiam ex hac causa facit frequentem inferit. Ite doli capitis, speciem quæ est Turgescit, et à auda sanguinis Effervescencia oritur, semper conjunctus esse solet cum *sensu pulsantis* in capite Tensivo, plus minus gravativo; & prout aut intensius aut remissius fuerit illa sanguinis Turgescit, etiam major vel minor peteipitur Cephalalgia. Hinc est, quod tempore *Æstivo* in nimis *Æstibus* Causcularibus, aut discursum sub sole mora, aut exercitio quovis corporis nimio, & ex motu sanguinis rapido, ejusque effervescencia nimia, sudoribus, &c. præcipua quando hinc frigus repentium superveniat, excitari solent graviores Cephalalgie: Hinc est, quod post Crapulam *ex nimio* *visi* *et* *Corripit* *pari*, præter eruditæ relictæ, turgens sanguis postico die Cephalalgiam solet, cum Artuum ferè Lassitudine, nisi blando ludore partim prævenitur, partim curret: Hinc est, quod refrigeratio capitis, sique impedita sanguinis transpiratio, Cephalalgiam inferat, dum retenta effluvia transpirabilia, Vasa distendenda & sanguini certam Turgescitiam plus minus inferendo, Cephalalgiam excitant: ita etiam ipsa Transpiranda salina, Partibusque membranosis infusa, Dolores inferre. Pariter sanguis quælibet *suffusa* *consensu* *evacuatus* ad Cephalalgiam disponunt: Hinc Hæmorrhagiæ Narium suppetitæ contumacissimas Habituales Cephalalgias inferunt: Hinc est, quod hæmorrhagiæ *hæc*, *identibus* obstruunt, solenni quadam sanguinis Evacuatione intermissa, sæpius contumacissimè oriuntur Cephalalgie, observantibus hoc omnibus Practicis, in specie FORESTO: aut quod quibusdam mulieribus non raro uno altero die ante Menstrum eruptionem Cephalalgia est frequentes propter sanguinis Turgescitiam tunc obvenientem. Speciatim *ferè* *quæcumque*, tam contineat, quam intermittentes, Besurgit pariter & Malignæ, item febres Catheas, ordinariam contem Cephalalgiam ducere solent, uti quotidie experimus; ex Turgescitiam *arbitræ* & fermentatione sanguinis auda. Huc pertinet *phrenitis* seu Spuchelus Cerebri, in quo non solum inflammationem Membrarum cerebri, & corticis ejusdem, intolentibus est doli. Hæc & similes causæ Cephalalgiam inferre solent. Facere hoc videntur *advers* *fontes*, Cephalalgiam non raro inferentes: Sic curiosum est exemplum, quod ex Odore Moichi & Ambur in Viro doli capitis ortus fuerit: Pariter non rarum est, Rofarum odore is, qui tenuioris sunt in systemate Nervoso texturæ, Cephalalgiam inferre, quasi Particulæ hujusmodi odoriferæ aerionis sua vellicent Membranam Nariam insperioem, & ad hanc derivat à Dux Matre filamenta nervæ; quibus una vellicat, & Dux Mater simul tendi, hinc sanguis viculus quasi remorari, & doli hic Pulsatorius & Tensivæ capitis inveniente scit. Quo etiam *Gas Carbonum* incenitum, item *rerum* *fermentatio*, pertinet, suo ispirante periclitantes Cephalalgias interdum inducens.

Quoad 2. Porro ad Procatari ejusmodi speciat, ejusque contineat *evadit* *fontem*, item *Lymphæ*, quæ aut *vis* *diata* aut *lymphæ* in quodam capitis loco, aut quod *sanguis* *fit*, ex Lymphæ vitio genitus humor acidus plus minus vitiosus, & in quodam interno capitis loco conservatus, aut ex Nutritione Membrarum vitiosa collectus, aut ex quæcumque ratione in capite depositus, graves Cephalalgias & Hemisphericas inferit, cum doli Lacerantæ & Lancinante, interdum etiam capitis gravativo, insinnde Tensivo, vitio Lymphæ circa Glandulas collectæ excrementis, adjuucto plus minus *sensum* *Torpe*, Curiosis est observatio

tio Hemorrhagiae ex his causis, per Altilicidium aquae frigidiſſimae per Nares curatur: videb. *Méj. A. N. G. anno 3. observ. 184. pag. 455.* Hinc in affectibus Catarrhalibus frequentes sunt Cephalalgiae; hinc frequentes & diuturni exinde oriuntur dolores. Quin etiam contumaciſſimae & ſubinde via tolerabiles Cephalalgiae ſerbitur ſubinde periodice, ſpeciatim Nocturnae, ex Lymphae vitio oriri videntur, quatenus à Sale acris ſcothico membrane cerebri, tam interna, quam externa, vellicatae dolores Lancinantes & Lacerautes crudeliſſimi excitantur. Imò ſerum ſaepius cauſam conſpectam Cephalalgiae exiſtere, non ſolum ex obſervatiſſimis Anatomicis, quas collegit PISO & RIVIERIUS, aſique, confirmare licet, quibus Cephalalgiae per excretionem ſeri diverſi generis à Nariſus ſolutas, & ex Lymphae copioſam in cerebro poſt Cephalalgiam repertam fuiſſe conſtat; ſed vel *Coryza* incipiens, aut dolor ex ſero quidem, & Lymphae ſuccelliva calledine gravatius, ſed ſimal interdum quoque Teſtibus, præcedens teſtatur. Sic Cephalalgiam Iſeralem à copia humoris ſeroſi notat RIVIERIUS *centur. 1. observ. 37.* Nec, juxta WILLISIIUM, improbabile eſt, Cylindrum, aut legitime conſtitutum, in capite prædiſpoſito idem præſtare, ſiſtraſque ac membranas ſuo appoſito gravare, cum non ſaltem hujus doloris Paroxyſmi poſt totidem à paſſu horas repetant, ſed mutata quoque Viſus ratione quoad quantitatem, qualitatem, & ſumendi tempore, varie-

Tandem III. propriis digreſſionis privata errore quocunque, occasione interna vel externa viſita, & circa membranoſa capitis loca congeſta, aut retenta aut genita, ſubinde oriuntur capitis dolores, iſque opturimum diuturni diſſiciles curabiles, unde in Cephalis, in Hemicranis, clavo etiam & Ore, ſubinde ex hoc puncto cauſa perſeſtante ſunt. Unde dolor nunc quiſi Oſtopos utriuſque ſimil Rodens & Pungens, obſervari ſolet, dum Materia quodam viſcida piſta miſta acris, vulgo dicta Tartara, aut ſanguis congreſtus, ſub Cranio quavis in loca congeſtus, iſtos dolores inferunt. Haec Materia ſi in altera medietate in capite hærat, ut ſanguinis motum aliquantifper impedit, inferit Hemicraniam. Mercurialis in hoc puncto ſunt optima, quoniam diſſolvunt, & attenuant Materiam caput occupantem. Unde ſubinde ſeſes decrepiti conuulſi Cephalalgia ſunt obnoſci, & vulgo vocantur Cephalalgiae, & Cephalæ à cauſa frigida, & in tali conſpecta eſt Gravedo capitis ſeu dolor capitis Gravidus: imò caput miſus calet, quoniam friget, dolor eſt coxumma, & qui Aegros nocte diuque affligit. Haec ſubinde graves Cephalalgiae ſunt à Vermibus in cerebro ex vitia eius partium digreſſione geniti: quibus dolor gravidus, & ſerè intolerabilis ſubinde occurrit in febre humida, & quæ ipſa propter capitis dolorem iſtum quidem vermes cerebri dicitur, cum obſervatum ſit, non raro Vermes reſecti per Nares fuiſſe cum levamine: videb. SCHENCKIUS in *obſervat. de febre hungarica*, & RULANDUS *Traſſat. de Morbo Capitis*; item HILDESHEIM in *ſuo Spiſio*, aliquot reſert exempla Cephalæarum continuarum ex Vermibus in cerebro genitis ortarum; videb. BARTHOLOMIUS *centur. 2. Spiſio. 74. & centur. 1. observ. 64.* ubi pariter poſt Variolas vehementiſſimas capitis dolor à Verme in Cerebello ſub excretaſſa, item *centur. 6. observ. 3.* Cephalæam habet conuulſiſſimam ſedatam poſt Vermes per Nares excretos. Similia exempla conuulſiſſimam Cephalalgiam repetitis in SCHENCKII *obſervat. de Cephalalgia*: Non ſecus ac FORESTIUS lib. 4. *obſervat. 9. & lib. 22. obſervat. 21.* notat Cephalalgiam admodum intenſam, poliſmodum excreto Verme per Nares ſubſtat. Plura Vermium poſt Cephalalgias à Nariſus excretorum exempla habentur in *Méſſel. A. N. G. anno 1. obſervat. 99. paginæ 239. & anno 2. obſervat. 174.* apud SCHNEIDERUM *de Off. Criticis*, pag. 440. FEHR in *ſuâ Pictura* pag. 39. BLENGY *Zodiace Gall. Méſſ. April. obſervat. 3.* KERRINGII *obſervat. Anatom. 43.* TULPIUM lib. 4. *cap. 11. pag. 251.* HILDESHEIM *Spiſio. lib. 4. cap. 11. pag. 41.* BORELLUM *centur. 3. lib. 45. HOLLERIUM lib. 1. de Morb. Intern. cap. 54. in Schol. HILDANUM centuria 1. obſervat. 1. & centuria 3. obſervat. 1.* MONARDUM *liſſer. Medic. ſimp. cap. 14.* MARCELLUM DONATUM lib. 4. *de liſſer. Medic. ſimp. cap. 56.* necnon ALSARIUM A CRUCE *de quaſi. per Spiſio. centur. 3.* EBUSINA lib. 3. *Fract. 2. cap. 3.* ea Medicorum quorundam Indorum ſic, Cephalalgiam quandoque generari jam edocuit à Vermibus in capite generatis, motu ſuo teſione & laſione iſteſibus, addens

Item Vermes multos naſcantur in anterior capite & ſuperiorem, qui eſt in frontis Narium, &c.

Poſt Vermes ſubinde etiam calcuſi in cerebro geniti, perſtinaces dolores inferunt, qui per Nares & alia loca poliſmodum excreti, Cephalalgiae levamen inoleverunt: exempla vid. in SCHENCKIO in *obſervat.* & etiam BARTHOLOMIUS *cent. 2. obſerv. 39.* reſert dolorem capitis ſedatam poſt Lapillos per Nares excretos.

Fit interdum, ut humor quidam lentus, & viſcidus ſapiſis ea vitia digreſſionis ultimar, ſeu propriæ genitus ſe inſinuat intra Suturaſ Crania, quas ſenſim à ſe iuvicem ſeparare, & mutuo diſcedere facit, cum inteniſſimo dolore, ut ſenſim ſpatium inter commiſſuras Suturaſ poſſe percipi. Exempla de hac Suturaſ Crania diſſecione videntur in BOOTII *Traſſat. parvo*, ſed eleganti, & aſſiduus amſ. *cap. 4.* Exempla etiam nonnulla reſert HILDANUS in *ſuo obſervat. cent. 2. obſervat. 1.* Paria Exempla reſert BARTHOLOMIUS *cent. 2. Spiſio. 74.* SCHENCKIUS in *obſervat.* Mentionem etiam illius facit MINDERERUS in *Medic. Militari. pag. 357.* Aliquando B. DOLLER MICHAELIS in Principiſſis vidua Genarſis obſervavit talem acerbum capitis dolorem, in quo maniſeſte Crania Suturaſ à ſe iuvicem diſcederant, idque maniſeſte cum ſonitu, ut adſtantes percipere poterant quoniam tam ſollicitè curavit, & tales dolores ſunt perſtinaciſſimi, & inteniſſimi.

Parro Luc Vermer capitis dolores horrendos, & implacabiles, in ſpecie nocturno tempore affligentes, inferit: *Aur enim maligis Lucu Venereſ Almenum Craniaſ proxima chyloſum ſic corrumpit, ut aſſimilari nequeat, ſed in materiam viſcidam, & acida corroſivam ſenſim degeneret, quæ coarctata ſuper cranium, aut etiam ſub cranio, Tamet illos inferit, qui etiam in aliis Oſſibus reperitur, & Gummata Gallias vocantur; à quibus poſtmodum contumitur ipſa Oſſa, & per conſequens ipſum cranium, inde Carieſ Crania, cujus exemplum ſineſum habet MEARA in *ſuâ libria Med. pag. 156.* ubi habet Cephalalgiam cum ſonitu Craniaſ Carieſ artem à Luc Venereſ, & SCHENCKIUS in *obſervat. pag. 51.* qui ex Craniaſ Carieſ interna ſimilitat impiacabilem capitis dolorem notat; ita ab iſdem vicinis membranis corroſæ perſtinaces, & implacabiles dolores inferunt. Sed tamen non tantum in ipſa Luc Venereſ ſit dolor, quia & ſubinde poſt eam Luc Venereſ, poſt ſuaſiones Mercurialis motus rite inſtitutas, & Mercurii virulentaſ perſtinaciſſimi capitis dolores remittunt ſolent, & Mercurio ſollicit, Nervis membranulæ paribus inimiciſſimus, hinc inde in capite calledo: de quo videb. POTIERIUS *centur. 3. centur. 6.* qui habet dolorem capitis contumacem, conuulſum ab ſuo Hydargyri, quoniam curavit per decotum China cum Oleo Sulphuris ſmactio. Talia exempla ex Mercurio poſt curatam Luc Venereſ obſervat RIVIERIUS *centuria 3. obſerv. 91.* item in *obſervat. communis.* ZWINGER in *Theoreſiſ ſuo humanæ. Tom. 1. ſol. 320.* ex CARDANO de *Tubiliſ.* loque partim ex reliſſo, non ſatis ſalvando evacuat, partim ex ipſa Mercurii malignitate, Partes nervos afflicteſ: quæ Cephalalgiaſ Mercurialis curavit per Nummum aureum in ore detentum, ut ſcilicet Mercurius princeps ad Aurum accurrat, & ita extra corpus eliminetur. Dolor hic capitis ex Luc Venereſ nocturnus magis eſt, & in ſuo loco iſtius Clavi aſſigit.*

Interdum Abſceſſus interiores capitis partes occupant, qui ipſe contumaciſſimas Cephalalgias inferunt, & Abſceſſus Hypocrani dicitur. De his non pauce proſtant obſervationes Cephalalgiam per excretionem Puris per Os, Nares, Oculos, Aures, &c. ſolutarum, &c. videb. BORELLUS *Centur. 2. obſervat. 73.* & WILLISIIUS *de Anim. ſent. part. 2. pag. 209. Edit. Amſ.* In ſpecie BOOTIUS *de Abſceſſ. amſ. cap. 4.* ex Abſceſſu Pericranii gravem, & contumacem capitis dolorem reſert. Similia exempla hinc inde etiam reperiuntur in BARTHOLOMIUS, ubi intenſus capitis dolor reſertur, excreto per Nares Pure ſedat: ſic SCHNEIDERUS *obſervat. 223.* reſert Cephalalgiam crudeliſſimam à Pore intra Oſſa Craniaſ latente. Abſceſſus hic non ſemper ex cauſa externa, ſed frequententiſſime vitia digreſſionis privatæ oriuntur.

Juxta Abſceſſum ſub Cranio lociſque vicioſis, ſubinde Luſum Capitis externa, Contuſiones, Vulnura, Caſus, geſtationes Ponderis, ſeu Oneris graviſſis in capite, & ſimiles cauſæ, etiam curant, diuturnas Cephalæas, & Hemicranias poſt ſe reliſſunt; quatenus aut Cranium ipſum inſignitè lædunt, aut Pericranium, vel Fibres Suturaſ Duræ Meoingiſ continuatas: aut quatenus Piſſuram, quandam in cr. inferunt, imprimis in interiori Lamina; unde

de Humore, ſeu ſuccus nutritivos extra duplicem lamellam per illam ſiliſſum pedetentim deſiliat in Tunica Cerebri, ibique corruptus, hinc acrior ſuſtus, graviſſimus capitis dolor inferat: vel quando aliquiſſis ſanguis grumofus circa membranas hæſerit: & ſimiles cauſæ, quæ poſtmodum etiam diſturbanz cephalas inferre poſſunt. Sic namque poſt curatum Vultur Capitis Cephalalgia diuturna oborta fuit, aperto tandem Cranio, in Vulture fuit Os nonnihil corruptum, quod exemptum etiam Dolorem curavit, obſervante hoc FORESTO lib. 9. obſervat. 39. Quo etiam pertinet nobilibus obſervatio SCHENCKII lib. 1. pag. 31. ubi graviſſi Pondere in Caput ſuſcepit, & coſſellato, laminæ Cranii internæ forniculæ nonnihil diſſectæ duodecimale Dolorem Capitis creantur, quibus per Nates excreſcit Dolor ille remiſſus.

Speciatim viſcida, ſenax, & ſerpiſſima impaſſa eſt materia, qua ovum, & Clavum primario eſſet, vel proprio Partis dolenſis vitio genita, vel cum Sanguine eo delata, vel denique externe Leſionis occasione reſiſta. Eadem ſuſpicio eſt, quoad Hemieriam, cum & ipſa ſit ſatis contumax: & in qua ſubinde ſimul vitium in Sanguine motu, in uno alteroque Valorem ramulo alterius (ſcilicet Cerebri medietatis) coadjundum videtur. Nam dum Mater ipſumque cerebrum in duas diſtinguitur partes, hinc altera tantum in hemieria affici ſolet. Unde Senes decrepiti contumaci Cephalalgia ſunt obnoxii propter ſuſceſſum Recreſcentiorum vitioſorum intra Cranium collectionem.

Obſervandum hæc eſt, non ratum eſſe, Cephalas obſervare certas Periodos, ut etiam Hemieriam, ita ut ſubinde Lunæ Periodos, ſubinde Solis Periodum diſturbanz, ſubinde ſimiles Motus, regulariter ſoleant obſervare: Conſ. SCHENCKII lib. 1. obſervat. pag. 47. ubi proſtat Exemplum Dolores Capitis, qui cum Sole ſubinde incubat, circa meridiem maxime intenſus erat, quæ magis verò ſu inſinabat ad occaſum, eò magis remittebat, in eodem SCHENCKIO pag. 48. eſt Hemieria, quæ certis Lunæ Periodis tantum ægroſare ſolebat. Sic notabile exemplum eſt PLATERII lib. 2. obſervat. pag. 346. de Hemieria Periodica, ſigula hyeme certis noctibus recurrente, & miſerabiliter torquente, curata tandem per emplaftrum pygmi de Ranis cum Mercurio: Sic idem PLATERUS lociſſime de Hemieria ſorti, & conſcius quindocim annos dura eſt à partu naturali, quæ poſtmodum poſt quindocim annos per factus maſculi exuſationem ſtatim ſine ulla medicamento ſui curata. Hæc perſinet Exemplum BALLONII ſupra citatum Conſ. 40. in feſto de Muliere, quæ cum Hemieria conſiſtabatur, dum non eſſet gravis, quamprimum autem concepit omnis Hemieria ceſſavit: Sic FONSECA lib. 7. cap. 87. obſervat Hemieriam lucis dextri Periodicam, quæ ſingulis octo diebus die Lunæ tantum in eadem hora repetit, & per tringinta horas acerbiffime afflixit, poſtmodum verò ſine ulla Symptomate æger erat ſanus quoniam octo dies fuiſſent præterlapſi: Conſ. etiam M. N. C. Ann. 4. Append. pag. 33. item anno 6. obſ. 173. pag. 136. Et talia Exempli ſerè ubique plura obſervata præſtant. Hæc adduxiſſe ſufficiat.

DIAGNOSIS.

Capitis Dolor indicatur ægri, cum ſint ſatis perſuſi de eo: ſitem ſigna affirmativa à Medico præſcriptum ſunt obſervanda ratione Cauſarum, quibus omnes accurate diſtinguere arduum eſt, ſubinde impoſſibile. Diſtinguitur autem, an ſit per conſenſum? an per eſſentiam? Et quidem per conſenſum eſt Cerebrum Capitis, ſerè ex eo cognoscitur, ubi nulla Cauſa evidens, Caput lædunt, præceſſerit, aut ubi nulla inſignior, & pertinetur Functum Animalium læſio ſimul laſta fuerit, Partes verò Corporis inferiores aliquo modo lædunt, ac pro huius diverſa ratione Dolores Capitis exacerbeantur.

Dolor iſdem ſubinde varius eſt, non eſt intenſior, nunc eſt remiſſior, qui verò capite primario afflicto accidit: ſuſpiſſimè eſt continuus: Signa adſunt Maſſæ Sanguinea: non legitime conſiſtunt, aut etiam adſunt Signa vitiaſe Functum in quodam parte inferiori læſa, ſimulque prout patet talis plūs minus affici ſentiant, etiam Dolor Capitis aut

intenditur, aut remittit: quæ ſunt alia Signa ex circumſtantia haurienda, ex quibus prudens Medicus hauriri poſſet, an per Conſenſum fuerit Cephalalgia? In ſpecie Scamachi habet rationem: quævis non raro Dolorem Capitis per Conſenſum & Eſſentiam coolingit. Experientia teſteſtur.

Quod 6 verò Dolor ſit per eſſentiam, patet, ſi præceſſerit Capitis & Cerebri læſio quædam notabilis: item ſi dolor ſecundum Sideram motus & phaſes, præprimis lunæ, variat, videb. FONSECA, PLATERUS: Item ſi Vitæ genus eſt tale, ut facile noxam quendam cerebri poſſit inferre. Continuus magis Dolor eſt ſolet: aut ſi eſt interruptus, erit tamen Periodicus: & ſtato tempore recurrent, qualis per conſenſum excitari nequeat (Z), præſertim ſi cauſæ Antecedentes reſpondeant, adeoque radicem & diatheſin altius fundatam ſit Capſa inſinuat.

Quæ verò præcipit hoc Caſu huius doloris per eſſentiam? difficillius cognoscitur: nam Vermes, calculi, &c. alieſque coſervantur, ſerè nulla ſui præſent ſigna.

Alieſque quoque Hypocraſis & ſimiles difficiles ſunt cognita, utut, quantum poſſibile, eorum indicia deſcribat BOOTIUS loco citato, ſaltem ergo conſeſſatur locum habent.

A Sanguine ſi fuerit vitium, facilè cognoscitur, cum plurimum Sanguis, vel turgeſcent, vel in motu ſuo per Vaſa plūs minus impeditur, Afflicto inducitur, Dolor Pulſtorius Ardori capitis conjundus eſt: videb. FORESTUS lib. 9. obſervat. 10. & 31. Item levania ex Sanguine miſſione rem manifeſtat: videb. RHODIUS cont. 1. obſervat. 73. ac RIVIERUS obſervat. communis. 37. pag. 173.

Si à Chyle, id dignoſcitur, quod certis poſt paſſum horis paroxyſmi repetant, poſt Somnum evaneſcant, & pro Affumptomum circumſtantiaſ varient.

A Zymæ aut ſimili ſerofa materia, aut etiam à materia viſcida aut acida collecta, ſerè cephalalgiam, moſtèſt gravamen capitis, Somnolentia, Dolor Graviſſimus magis eſt Teſtibus, qui nocturno tempore ſolet affligere, cum Glandularum interdum Morbis circa caput, Frigus, & ſtas ſenſilis & ſimilia, quæ perſuadent à tali cauſa oriri Hemieriam, imprimis ubi reliqua conſeſſantur Signa. Et ſi hæc Acrimoniam ſoveat, ver. gr. ſcorbuticam, Scorbuti quoque, ſimiliumque recreſcentium ſalutem ſigura præſto ſunt: Quæ ex Larvæ male curata, ex huius Signis, item quod nocturnus magis, & in uno loco inſtar clavi affligat Dolor: videb. RIVIERUS cont. 2. obſerv. 91. Si vitium fuerit ex vitiaſe diſpoſitione propria, unde coſervantur recreſcentia & Humores viciati: inter alia calvaria, Dolor ſuus eſt & pertinax, crebrior, recidivus, nullique Remediis cedens: & ſi Acrimonie Materia hæc exſpet, Graviſſimus magis, cum ſeuſa Frigoris in parte afflicta, in ſpecie ſi externa præceſſerit Læſio, ut Vermes & calculi, ſimili modo poſſunt affligere.

PROGNOSIS.

Prognosis cephalalgia curam promittit vel faciliorem, vel difficiliorem, vel nullam: quorum intuitu Accidentaliſ facilis curatur, quàm Habitualiſ.

Habitualiſ tamen quoque, proot cum Procacitate ſu magis inveterata, ita ut epiſ Paroxyſmi à multis annis aut ſeptem, aut à levi quavis occasione repetant, eò minus ſpei curationis habet, præprimis ſi maximam partem doloris hic continuiſ fuerit, ut pote quem à cauſa magis ſua, ſcilicet Prævia viſciſſura, Tumore, Abſceſſu, calculo, Vermibus &c. prodire, probabiſ ſit, & qui à tali cauſa dolor immanis eſt, ut plurimum alia Symptomata cephalica graviora, ſcilicet Vertiginem, convuſiones, &c. item Vomitus ſibi comites aſumit, & cum his interſect, aut in Apoplexiam, Epilepſiam, Paralyſin, cæcitatem, ſurditatem, &c. degenerant: videb. HIPPOCRATES ſect. 4. Cont. Præſent. 6. RIVIERUS cont. 1. obſerv. 37. R. RHODIUS cont. 1. obſerv. 37. PAULUS obſerv. Anat. 8. M. A. N. C. Ann. 1. obſ. 68. WILLISIIUS loc. alleg. pag. 196. 101. & 102. & BONETUS ſenſuſſat. lib. 2. ſect. 1. obſ. 1. & 2. BOOTIUS de afflic. emiſ. cap. 1.

Nihilominus & qui per Conſenſum oritur, non eſt faciliſſis,

(Z) Cur per Conſenſum ſaliſſus dolor non poſſit eſſe Periodicus? quod enim à parte, ubi morbi ſemēs, ad Caput tranſmittitur, ſi ſtatu temporis & certa quadam periodo tranſmittatur, Periodicum ſui dulem excitabit, Imò Periodicum erit, & certis temporum intervallis recurrentium. Morbum Cauſam, in hac ſympſia per conſenſum partium aliarum, nonnisi quæ tranſmittantur, atque in hac metalli, ſeu tranſmiſſione cauſa morbiſſa, juxta ſanare Pariſiſſimam rationabiliſ invenimus: ab idempatiſ enim ſeu propria partis afflicta paſſura, quia Morbi continetur quæ Periodici non habent.

Humor. Diſſignat. Part. 1. lib. 1. cap. 2. adductam) Derivationis ac Interceptionis gratia; extra eadem & Revulſionis cauſa in partibus inferioribus, verb. gr. in Talo, aut Hemorrhoidalis: in affluſus.

De *Arteriotomia* Temporum imprimis noto, quod eadem ſubinde mobilis præſidium ſit in contumaciſſimis malis, ſpectatim in Cephalæa & Hemicrania deſperata, mirabilem habeat ſuccellum, uti reſert LINDANUS; cujus uſum ipſi monſtravit Natura, videb. *Meſſ. A. N. C. Ann. 2. obſervat. 72. pagin. 120.* contradicente quavis WILLISIO *loc. allegat. Videb. PARÆUS lib. 16. cap. 4. ZACUTUS LUSITANUS Pr. admirand. lib. 1. obſervat. 11. RIVIERUS *Centur. 2. obſervat. 56. TULPIUS lib. 1. obſervat. 48. SCHENCKIUS lib. 2. obſervat. pag. 51. & SEVERINUS Chirurg. Eſſent. Part. 2. pag. 41. & 47. item RIVIERUS obſervat. *etiam. 2. Janu. pagin. 318. & obſervat. 31. 2. Janu. eodem. pag. 339.* ubi habet Hemicrania lateris dexteri intolerabilem, quæ per Arteriotomiam ad 34. intradiſimulim horam omnino ſui ſanata, & jam olim GESNERUS *lib. 3. epist. 46.* Dolorem Hemicranii quotannis redeuntem ſedâ Arteria in Tempore aſſectâ curavit. Reſert namque LINDANUS, ſibi ſuis uſitatam eſſe Arteriotomiam celebrare in Hemicrania inveteratis deſperatis, emittendo interdum in latere aſſectâ lægiſſet 34. etiam xli. ad 34. vel xxx. Sanguinis. Operatio non eſt difficiliſſima, nec periculôſa, modo peritus & artiſcioſus ſit Chirurgus: nec eſt metuendum Ancuſima, Tumor nempe Arteriæ, & intra biduum vel triduum Hematite poſſet ſuſci; Nam qd tantum Terra Viridoli daleis cum Potella ſigillata miſta, vel ſilicaria, vel cum Albumine Ovi ſubſcra, externè applicetur, ſuperficièlem fortem Ligaturam intra triduum arteria coaleſcit: Videb. JOBUS van MECKREN. Diſſert. à Venæſectiõe ſecundum mæx & minus, licet diſſiciliſſis coram Arteria quàm Vena, utrobique tamen par ratio poſſit fortiori Emplaſtica Medicamenta & fortiorem Ligaturam: ſupra Temporalem Muſculum tranſcurrentes Froſtem veras Arterioles Spongia calente Aqua imbuta, abraſis priùs accuratè Pile, ſovendæ, & Agri Colium Maſpa ſtringendæ, Capitis ſitus declivis ſit, ut Arteriæ intumefcant, & tranſverſim incidantur: Videb. JOHANNIS van HORNE *Miraculis pag. 151. & ſeqq.***

Alia poſt Arteriotomiam, ſeu loco Arteriotomiæ, *Infuſio Pina Frontis* in Doloribus contumaciſſimis Capitis etiam commendatur: Exemplum habet FORESTUS *lib. 9. obſervat. 22. in ſchol. & obſervat. 54.* ubi obſervat Cephalalgiam ſeu Cephalam antiquam & diuturnam per Sectionem Venæ in Fronte alius non juveniſſimè curatam: Sic obſervat. 20. Dolorem Capitis quotannis in Autumno admodum aſſiduum notat curatum per ſedum Brachii Venam, & detoniſ Capitis in Fronte: Item Obſervat. 12. in ſcholio Vir quadraginta annorum, cum in Occipito diuturnum Capitis Dolorem habuiſſet, neque Medicamina nuverant in Fronte Venæſectiõe curatus fuit: videb. RIVIERUS *Pr. lib. 1. cap. 16. ubi de Cephalalgia; item Cent. 2. obſervat. 11. & BORFILIUS.*

Locobujalmodi Arteriotomiæ interdum poſſunt adhiberi Hirudines utrinque ad Tempus, quantum admodum commendat ZACUTUS LUSITANUS *loc. allegat. Obſervat. 9.* item poſt Aures, item ad Nucham ſieri poſſet applicatio: Conſider. in ſpecie M. A. N. C. anno 4. *apud. pag. 51.* ubi Hemicranii Hirudinibus Fronti applicatis fuit curatus: & anno 6. & 7. M. A. N. C. Obſervat. 9. pag. 20. idem effectus in iſdem, Arteris Temporalibus applicatis, fuit ſecutus.

Multer diuturna Cephalalgia ſapiens recurrentis jam per plures annos aſſidua, ita ut levi de occaſione, vel ex Capitis ab Aere inclemente refrigeratione, vel ejusdem prope focum nimia exaltatione, vel ex indigne Menſium fluxu, eandem recurrentem patere: dolor erat per eſſentiam, tunc enim ſub dolore gravioſe vomitus paterebat, idque cum dolorum levamine aliquis, tamen hic Ventriculus propter ſui cum Capite conſeſum ſubvertebatur. Cuſum remotum noverat nullum, niſi quod ſibi Puſſile Hemorrhagia Narium familiarior fuiſſet, qua ſuppreſſa cephalalgia illa ſuperveniret. Hic intellexi eum, alia Auxilia eſſent fruſtranea, *Venæſectiõe, vel Hirudinum ad Tempus applicationem, conſilium direxi:* Frontis Venam incidere non permittebat, conſiſſionis Fauicem impatiens, od id Hirudines binas utrinque Temporalibus applicui, & copioſus Sanguinem eracare permii, bonum eum necceſſi.

Item huic loco pro Scopo Averſorio *Cantharidalis Scarificatio* poſt Venæſectiõe in Brachio, aut prope Scapulas, applicat ali, verbi gratia FORESTUS; imò ipſi Capiti,

Tom. II.

ut Parti aſſectæ: videb. VELSCHIUS *Epilog. Obſervat. 20.*

Alia reſert RHODIUS in *Centur. 1. obſervat. 76.* quod *Infuſio Pina inter Indicem & Pollicem Manus præcunctum* obſervatum fuerit Hemicrania Remedium, cuius aliquot habet exempla. Quod confirmare poſſet ſententiam RIVIERII, qui ad cephalalgias contumaces *Furunculæ inter Indicem & Pollicem manus excitatum* commendat in *ſua Præſ. ubi de Cephalalgia.* Squidem alias in diuturnioribus Capitis Doloribus aut ſapiens recidivibus *Fomentis* aut in Brachio, aut in Nucha, aut juxta Scapulas, aut ipſi loco dolenti ac vertici excitati, non contentumdam ſunt remedium (palliatiolum nimirum, non enim radicitus curant): quos quidem dantur WILLISIIUS *loc. allegat.* qualiſ humores magis ad partem aſſectam traherentur: commendat tamen alii, & quidem per experimentum, ſcilicet ZACUTUS LUSITANUS *Pr. admir. lib. 1. obſervat. 22. FORESTUS lib. 9. obſervat. 12. ſchol. PEIRUS SALIUS DIVERSUS in alveolar. Capiti. 1. R. ODERICIUS à FONSECA Tom. 1. Coſſ. 69. TULPIUS lib. 1. Capiti. 31. RIVIERUS Obſervat. 31. 2. Janu. eodem. pagin. 339. POTERIIUS Centur. 3. Obſervat. 1. & VELSCHIUS Obſervat. 11. ſic enim, evacuata acri Lympha, tandem Capiti levamen aſſertur. Quin imò interdum *Infuſio* toti Capiti ſaſa, vel Nuchæ, vel circa Aures, vel toti cranio inſtar cucuphæ ſui applicanda pro eorū pertinacium talium cephalalgiam à ſero nataram, lætentium eſt ſanciantium. ſpectatim moluſarum: Videb. MEARA in *Obſervat. Med. pag. 121.* Simile exemplum repetens in RIVIERIO *Centur. 1. Obſervat. 37.* ubi etiam obſervat epiſtis diuturnum dolorem per Venæſectiõe inſtar cucuphæ capiti applicatum curatum: Sic TULPIUS *Centur. 1. Obſervat. 37.* Dolorem Capitis Periodicum per Venæſectiõe occupi: admoda curavit: HILDANUS *verb. Centur. 4. Obſervat. 6.* Dolorem capitis Vagum extra cranium contumacem, & alteram tantum epiſtis partem occupantem, *betans* curavit. Capis tedioſiſſimi Auxilii loco *Fomentis* inſta Nucham excitandis venit: Videb. M. A. N. C. anno 3. Obſervat. 126. Apud veteres ſubinde occurrit mentio *Fomentis in Capite, in ſententia Satara Cerealis & Sagittalis* faſti, ad graviora capitis & Nervoli generis Pathemata uſurpati, qui jam terò in delictuſum abiit, dom cauſe ad Oſcrum addito, faciliſ hujus & Membranarum cerebri inflammationi eſcari poſſet: cuius tamen modo cephalalgia inveterata Stomacha eura reſertur in M. A. N. C. anno 3. obſervat. 12. pagin. 123. Sic POTERIIUS *cap. 3. obſervat. & ead. cap. 3. pagin. 210.* Dolorem Capitis Periodicum in vertice præcure, ad eicere tantum quantiatem extendentem, ſine ulla ſigno ſenſibus obvio, poſt paucam materiam puruluram loco aſſectæ, per pentalia cauliſum aperto, curavit. Multer graviffimæ laborat cephalalgia Frontis ac Temporum, deſcendebat illi per Tempus ad Malas, poſt in collum & humeros, ita ut quò lo vertere neſciſcat. Idque imprimis noſta à nuda hora ulque ad tertiam ſui quartam matutinum. Cauſa occaſionalis, ut ipſa reſerebat, fuerat excretio & emundio Materie variis viridis & viciſſe quaſi purulente per Nares, qua deficient & ſuppreſſa, ita ut Nares, penitus calicæſcèſſent, illi dolore ſuperſenit. Accepit *Pilulas Mercatoriales*, item *ſpirum Carmineum de Tribus*, qui bene conſulit aliquandis, ſed ſine perfectâ ſanatione, Naribus Oleum Nivaria; cum paucis *Camphora* applicavit, ſed fruſtrâ. Alio ergo irritis ſuſi applicati ſibi curaret *Infuſio* hinc, utriusque juxta aures, quorum beneficio curata fuit. Juvenis nobilis cephalalgia graviffima aſſectus cum intenoſ oculorum dolore, nulla leſt p. n. in Oculis apparente litione, qua præſertim veſper erat graviffima, malum *Agroſia* ſubinde ſimilare. Præmiſſis primas vias *abſtergentibus*, & *ſpirum Carmineum de Tribus*, ordinavi *Cataplaſma in Fermento acerrimo* miſto cum *ſumme* ſuſi conſulto, paucis *ſpirum* ſui addito, Nuchæ applicandum (videb. *ſua Formulæ. Coſſ. 4. §. 23. & Colleg. Formulæ*). Idque eo magis, quia oculi ſimul tumerent. Huic alium perquam dolorificum, bonum tamen cephalalgia remedium, expertus eſt.*

Trepandum tandem quod attinet: dolorem capitis huius modio curatum, videb. in RHODIO *Centur. 1. obſervat. 69. & 70.* in ſpecie AMATUS LUSITANUS *Centur. 1. curat. 4.* reſert Capitis dolorem intenſiſſimum à Luc Gallia cum curata ortum & incurabilem, ſed Trepno, aperto cranio, curatum. Vir tamen, oſi à latione exorta malum, aut ſuſpicio de Abſceſſo latente, admittendum, videb. FORESTUS *loc. alleg. obſerv. 32. in ſchol. SEVERINUS de eſſe: Chirurg. pag. 127.* WILLISIIUS *loc. allegat.*

Vuuu

Suuz

Sunt denique, qui in casibus desperatis extra Luis Venerem suspitionem salutaritatem commendant, & quidem omnibus probè ponderatis circumstantiis, si non semper cum levamine, certe sine periculo, utut hoc WILLISIIUS loc. allega. pag. 193. magnum admodum proclamat.

VII. Familiaria in Cephalalgia, quæ sit per Consensum, esse tutiora, in illa vero, quæ est per Essentiam, nonnulli cautiùs adhibentur. Purgantia in hæc convenientia, quæ ioter emicat Colocynthis, Radix Jalapæ, Scammunium, speciatim Mercurius dulcis rite paratus: Conf. VEL-SCHIUS Hæc 2. pag. 40. in Cephalalgia per consensum Stomachi aut Uteri aliarumque partium Abdominis Pilula Mastichina & de Succino Cereantia sunt optimæ, verhi gratia.

℞. Pil. Mastich. ℥i.

Extr. ana gr. v.

Caffor. ana gr. v.

Truch. Alband. gr.ii. vel Extr. corund. gr. i.

Cum liq. Eth. propr. f. Pilulæ.

D. S.

Caput purgantes Pilulæ.

POTERIUS eleganter ulsupur Pilulas suas Cathelicas ad ℥i. quibus addit gr. iv. Laudani Opisti: sic enim Dolorem sedat & Fomitent tollit: Id quod & nos facere possumus, præmissis si in alio Dolore Capitis pertiniacioris casu Mercurius dulcis sic adhibendus: e. g.

℞. Extr. Panth. Cr. vel Hellebor. nigr. (quod

magis a propriatum Capiti) gr. xv.

Perbena gr. vii.

Mercurii dulc. ℥ss. ad gr. xv.

Laud. Opist. gr. ii.

Scamm. sulphurat. gr. ii. vel ℥i.

Cum liq. Eth. Cr. f. Pilulæ.

D. S. ut antè.

Vel

℞. Extr. Panth. Cr. gr. xv.

Mercurii dulc. ℥i.

Extr. Truch. Alband. gr. ii.

Cum liq. Eth. Cr. f. Pilulæ.

D. S. ut antè.

Vel

℞. Extr. Helleb. nigr. gr. xv.

Mercurii dulc. ℥i.

Extr. Truch. Alband. gr. ii.

Cum liq. Saccin. f. Pilulæ.

D. S. ut antè.

Tardè, sed eleganter, operatur in Hemicrania contumaci.

℞. Extr. Agaric. (quod potenter Caput purgat) ℥ss.

Helleb. nigr. gr. vi.

Alci. resat.

Res. Scamm. ana gr. ℥i.

Olei dissill. Aneth. vel Orig. Cr. gutt. i.

M. f. Pilula.

D. S. ut suprà.

Profunt in Cephalalgia i Pituita, & per consensum Ventriculi.

℞. Mass. Pilat. Alophang. cum Diagr. ℥i.

Mag. Jalapp. gr. vi.

Cum liq. Saccin. f. Pilulæ.

D. S. ut suprà.

Vel

℞. Extr. Alci tartar. ℥i.

Mag. Scamm. gr. viii.

f. Pilulæ.

D. S. ut suprà.

Vel

℞. Conf. Flor. Auck. ℥i.

Crani Tartari ℥ss.

Sulphuris aurati Antimon. gr. v.

Mag. Jalapp. gr. ℥i. vel iv.

M. f. Bolus. S.

Purgans Electuarium Capitis pro una vice.

Vel

℞. Conf. Flor. Auck. ℥i.

Mag. Jalapp. ℥ss.

Extr. Truch. Alband. gr. i.

M. f. Bolos.

D. S. ut antè.

VIII. Ex alterantibus, præter decocta Lignorum suprà laudata, quibus semper Resinacinas addendus est, conveniunt saccharum, & saccharata quilibet. In specie eius est volatile, & cum eo paratus liquor Corvi Cerui, est nobilis in

cephalgia, sive per essentiam fiat, sive per consensum Ventriculi, aut Uteri; permiscetur Sal hoc volatile commodè cum Cinnabari, tam nativa, quam artificiali Antimonia, & cum hac parato Cephalico Specifico, sicut cum Bezoardico Joviali, aut Lomari; aut etiam his additur aliquantulum de Laudano Opiato; item Diaphoretici Antimonialia, & Salla volatile urinalia iungenda, & imprimis camphora subinde permisceri potest, & sic fit Pulvis compositus ad cephalalgiam. Est eam Camphora mirabile Remedium in cephalalgia a causa calida, si unum alterutrum eius granum intertè usurpetur, aut extertè spiritus Violæ camphoratus crocatus, aut Theriacalis crocatus, aut Oleum Camphoræ in Epithematis, sicut Unctionibus applicetur, quod i PARACELSO admodum commendatur. His etiam Triaclo, vel Essentia Luna grœvia meritis accenseri potest. Tandem spiritus Vitrioli volatilis, vel per se, vel addito spiritui Violæ paratus, est egregius, & in frequenti usu. Quibus simul annumeranda est Herba Thee, cuiusque Decoctum, MOEBIO, & TULPIO lib. 4. Olfuscat. 60. ad dolores Capitis quocunque admodum commendatum; si nempe

℞. Her. Thee ℥i.

Coch. f. q. Violæ aut aquæ simpl.

Colatura leniter filtretur, & addatur aliquid sacchari.

So mitur calidissime imprimis a cœna vel prandio, & breviter quemcunque dolorem Capitis lenit.

℞. Pulv. Bezoard. Lad. vel Succini preparati ℥ss.

ad gr. xv.

Cinnab. Antimonii ℥ss.

Laud. Opist. gr. i.

Olei dissill. Liq. Saccin. gutt. i.

M. f. Pulvis.

D. S.

Pulvis Caput leniens.

Vel

℞. Cinnab. Antimonii vel nativ. ℥i.

Extr. Liq. Alci gr. xii. vel xv.

Caffor. gr. viii. vel ℥i.

Laud. Opist. gr. iv. vel v.

M. f. Pil. pro 4. dosibus.

D. S.

Pilula Caput lenientes.

Vel

℞. Conf. Flor. Salvia,

Aneth.

Tarax. ana ℥i.

Succin. Catarrhal. ℥i.

Cinnab. Antimonii vel nativ. ℥ss.

Spec. Diamb.

Diamphibi dulc. ana ℥i.

Cum Syr. Flor. Tenui. f. Electuarium.

D. S.

Electuarium Caput confortans.

Vel

℞. Aquæ Ceref. nigr.

Perbena ana ℥i.

Lilior. serotini. ana Vin. ℥i.

Liq. Corvi Cerui sacrin. ℥i.

Syr. Botanic. ℥i. vel ℥ss.

M. S.

Potio Caput confortans.

Vel

℞. Spiritus Corvi Cerui ana Sale vel. vel Liq. Corvi

Cervi sacrin. ℥i.

℞. Opil tartar. ℥i.

M. S.

Essentia Caput leniens.

Dosis gutt. 40. vel 30.

Vel

℞. Liq. seran Cervi sacrinati,

℞. Caffor. ana ℥i.

M. S. ut antè.

Vel

℞. Quinta Essentia Rosmar. ℥i.

Lavend. ℥ss.

M. S. ut antè.

Dosis gutt. 20.

Vel

℞. ℞i. Caffor. ℥i.

Alyssu. ℥i.

M. S. ut antè.

Dosis 40. guttulæ.

Convenit item Eſſentia Caloreſi compoſita ex ana Callo-
reis, Zedoaria, & Salvia, cum ſpiritu Sali Ammoni-
acini extraſta. Vel

M. Eliu. Propr. ſine acid. vel tartariſat. Zil.
Æſ. Rorimar.

Anacini ana Zi.

M. S. ut ſuprà.

Doliſ 30. ad 40. guttules.

Vel

M. Æſ. Caſſeri campſ. Zil.

Succini

Liqu. ceruæ Corviſſacini, vel Spiritus Bezaard.

Ana. ana Zi.

M. S. ut ſuprà.

Prodeſt in Cephalalgia Catarthali.

Vel

M. Æſ. Catarthali. Zil.

Catur. vini. Zi.

M. S.

Eſſentia in Cephalalgia Catarthali.

Item

M. Æſ. Succin. vel Catarthali. Zil.

Spiritus Sal. Ammoni. anſi.

ſuccinat. ana Zi.

M. S. ut ſuprà.

Variantur Formulæ pro varietate cauſarum.

IX. Quod alias attinet *Zurara* in genere contra cepha-
lalgiam uſitata, celeberrime eſt inſigniter *Verbena*, quæ eſt cele-
berrimum remedium ad quocunque dolorem capitis, ſi-
ue intero uſu ejuſdem *Aqua*, aut Eſſentia uſurpetur, ſive
exteroſ ipſa Planta, tam recens contuſa, & in forma ca-
taſplasmatis, quam lucca, ac Lioſis duplicatis, fronti, &
temporibus applicetur; ſicuti etiam Herba *Amoleſi* inſtar
appenaſ pertinaciſſimum capitis dolorem ſoluit: de qua vir-
tute contra cephalalgias amuletica ſingulariſſima videb.

FORESTUS lib. 9. obſervat. 33. utut non requæ ubique
ſuccedat. Sunt tamen qui *ſaribus Papaveris rhæodæ* non
minorem, quàm modò laudatæ *Verbenæ*, laudem contra
cephalalgias tribuant: Conſer. M. A. N. C. Anno 4. At-
pend. pag. 33. Et ſane aliquando cephalalgiam pertinacem
nocturnam floribus *Papaveris rhæodæ* leuiter, contuſis
fronti, & temporibus applicitis curari, juxta *Verbenam*
eſt *Berenia*, anodyna, & egregia ad dolores capitis, non-
nihil narcotica: de qua vid. BARTHOLINUS de *Berenia*.

M. Boleniani:

Coque in Vino.

Colatura apponatur capiti per noctem, in dolore capitis
ex Apopleſia.

Vel ubi virtute anodyna, diſcuſſione, & reſolutione opus
eſt:

M. Herk. Beren. Mil.

Albani. M. A.

Cupreæ Zi.

Vini Rii. vel q. c.

Decoq.

Colatura hauriatur, vel inſtar Epithematis applicetur capi-
ti; removet egregie dolorem, & fronti
Sedum Majus, item *Mentharia* recens contuſa, & fronti
applicata, capitis dolorem ſoluit, modò illius odorem ferre
poſſit. *Ager. Radix Rhæodæ* etiam non inlegans experi-
mentum eſt PETRI à CASTRO Medici Veronenſis, qui
in pertinaciſſimo capitis dolore, recipit *Radium Rhæodæ*
recentem, eamque cum lapideo pilloſo contritam leyorat
cum *Aqua Verbenæ*, & *Ror. Sambuc. ana*, cataſplasmatis
inſtar fronti applicat. Integra etiam Planta, contuſa ſub ſo-
ſma cataſplasmatis fronti circumponitur.

Vel

M. Rad. Rhæod. Zi.

Ror. Papav. errat.

Ror. ana M. S.

Capit. Papav. Num. iii.

Incifa, & contuſa coqui in Aqua ſimpl.

Colatura applicetur tepide fronti, & temporibus.

Alii loco radicis huius Pulverem Radicis *Zedoaria* reci-
piunt, & cum *Aqua* appropriatis capiti applicant; v. g.

M. Aqua Verben.

Ror. Sambuc.

Beren. ana Zi.

Pulv. Zedoar. Zi.

M. D. S.

Epithema capiti applicandum.

Et ita applicetur capiti, tam fronti, quam ubi ita viſum
ſom. II.

ſuerit, etiam *Nuchæ*. Sed hoc ſaltem valet in cephalalgia
ex cauſa frigida.

TIMÆO ſen *Guldenslæpe* in *Epſt. pag. 195.* in uſu ſuit
tale Epithema:

M. Aqua Verben. Zi.

Beren.

Sambuc. ana Zi.

Pulv. Rad. Rhæod. aut Ligni Rhæod. Zi.

Acet. Roſar. Zi.

M. pro Epithemate Cephalico.

Hiſce addatur ejuſdem PETRI à CASTRO O eupor-
ſion, nempe cortex medianus trunci Arboris Juglandis, qui
contuſus, & cum pauco Sale miſtus, utrinque temporibus
applicatus ad quocunque capitis dolores ab eo ſuit uſurpa-
tus. Pertinent huc in ſpecie, & ex qua aliqui viſi narcoti-
ſius minù poſſent: qualia ſunt *Semina Papaveris*, *Aoe-
thæ*; *Nuclei Perſicorum*, vel *Semina Myſſicami*, & ſimilia,
ex quibus ſunt emulſiones, quæ omne inſectiſſima pro-
pinatæ, aut, quod ſero ſequentibus, extroſectis ſub ſo-
ſma Epithematis applicatæ, admodum conveniunt, verbi
gratia

M. Sem. Anacardi Ziil.

Nuc. Perſic. Zi.

Sem. Papav. alb. Zi. B.

Cum l. q. Aqua Verben. Beren. & Ror. Perſic.

l. Emulſio.

D. S.

Emulſio circa Caput.

Hæc tepide Linteis multiplicatis adhibetur fronti, &
temporibus ad ſiſtendam cephalalgiam.

Vel

M. Nuc. Perſic. Zi.

Sem. Papav. alb. Zi.

*Cum l. q. Aqua Verben. Beren. vel Ror. Myſſic. &
Samb. l. Emulſio.*

D. S. ut ſuprà.

Epithematis forma tepide cum Linteis duplicatis fronti,
& temporibus applicanda, ad ſiſtendam nimiam cephalal-
giam.

M. Nuc. Perſic.

Sem. Papav. alb. ana Ziil.

Anacardi Zi.

Myſſicam. Zi. B.

Cum Aqua ſer. Sambuc. & Chamemill.

l. Emulſio.

D. S. ut ſuprà.

Videb quoque *Idea Formulæ Claf. 3. §. 6. & Celſæ* *ſer-
mular*. Poſſunt etiam tales emulſiones fieri recipiendo loco
Liquoris in diſſis emulſionibus decoctum radicis *Rhæodæ*,
vel *Verbenæ*, vel *Betonice*, vel ſimilia: quibus cum de-
codis ex illis Seminibus Emulſiones efficacioreſ compo-
nuntur. Imprimis *Semina Myſſicami* potius eſt Remedium
pro placando dolore Capitis, uti quocunque, ita in ſpecie
ex Scorbuto; unde quidam ceu certifiſſimum hoc ſu-
dant:

M. Sem. Myſſicami Zi.

Acet. Roſar. Zi.

*M. in phala bene obturata, & ponatur in digeſſio-
nem Raleo Martæ per 5. aut 6. horas, ita tamen, ut
non bulliat.*

Postea accipe Faciam ex Linteis ſubtiliſſimo, quæ ligetur
Capiti inſtar ſp. atque cum Spongia, hoc Aceto madida;
humectetur Faciam, ſicque ſubito dolorem capitis tolli aſ-
ſerunt.

Tandem, & *Liquor*, ſeu *ſeminaſ* convenient, ubi emi-
net Unguentum *Aluſſariorum*, quod admodum laudatur
in quavis cephalalgia, ex quacunque etiã cauſa nata, ſi-
ue ſit per contuſionem, ſive ex coſtatione, ſive ex alia cau-
ſa, in ſpecie in cephalalgia quorundamque Febrili, à
quampurimiſ, prædictum FORESTO in lib. 9. obſerv. 33.
cui pro circumſtantiarum ratione nunc Oleum *Papaveris*
expreſſum, nunc Oleum *Myſſicami* expreſſum, nunc Un-
guentum *Populeum*, nunc *Camphora*, nunc aliquid de Lau-
dano *Opato*, nunc aliud ſimile, addi poſſet: c. g.

M. Olei expr. Sem. Papav. Zi.

Nuc. Perſic. Zi. B. vel Ziil.

Myſſicami.

deſſil. Anac. ana Zi.

(vel Olei deſſil. Anac. & Chamem. ana Zi.)

Cum l. q. Cere, vel Ol. Nucis expr.

F. Linimentum, Temporibus applicandum,

D. S.

Unguentum ad Caput.

Vuuu 2

Vel

Vel

℞. Olei Hyssopami cum Oleo Papav. compof. ℥i.
expr. Macil. q. l.
M. S.

Balsamus Capitis Dolores sedans.

Item, quod in familiari usu habuit D. MICHAELIS.

℞. Extr. flos Succi Infus. Verben. ℥i.
Olei expr. Hyssopami ℥ss. plus minus, prout requirit occasio, vel dolor;)
M. & f. Linimentum.

Iniungatur Caput, & Tempora in doloribus Capitis, primis Icorbeticis.

Vel

℞. Extr. Verben.
Aucti an. ℥i.
Olei expr. Papav. alb.
Hyssopami ana ℥ss.
destill. Aucti.

Chamosilli. ana gott. v.

M. S.

Unguentum ad Caput.

Vel

℞. Olei expr. Macil. Persic.
Sem. Papav. ana ℥i.
Hyssopam. ℥ss.
destill. Aucti. ℥ss.

M. S.

Oleum Dolores sedans.

Vel

℞. Ungu. Alabastr. ℥i.
Medull. Crur. Vir. ℥i.
Olei expr. Papav. ℥ss. vel ℥i.
Hyssopam. ℥ss.

Cam f. q. Cera f. Unguentum.

D. S.

Unguentum Dolores sedans.

Sed hæc & similia *Narcotica externa*, uti in genere dolores sibiunt Capitis, ita in specie nonnisi negotio gravius dolore, locum habet, idque magis in accidentibus quam habitibus, tutius vero in doloribus per consensum, item in doloribus, qui committunt morbos acutos, conducunt; sicuti dolores Chronici, aut Cephalice, ac Clavi, modis huiusmodi curari, leviter saltem palliari solent. Potius in Chronicis doloribus flos diuturnis egregia sunt Emplastra appropriata, v. g. de *Tartamachaca cum Balsamo Peruviano* malazata, & Capitis raso in forma Emplastris applicata, quod etiam convenit in doloribus Scorbaticis: Loco Balsami Peruviani substituitur Oleum destillatum Succii, imprimis, qui affectibus Cerebri & Nervorum sunt obnoxii. Sed hæc sunt generalia.

V. Cum vero pro varietate Causarum & Circumstantiarum subinde varianda sint remedia, propter ad Cephalalgiam, quæ oritur ex Sanguinis, cujusque mora effervescente nullo & febrili, convenit Sanguinis missa variis modis adoranda, de qua *supra* *Mora VI.* dictum. Antequam tamen Sanguis educatur, Clystere Alvus expurgetur, postmodum vero interna propinentur, quæ febriles Paromyxos aut Singulis torgeceotiam solvunt, nempe Diaphoretica blanda, acidum temperantia, ex absorbentibus, modiceque concediendis, v. g. Lapidibus Cancrorum, Voicorum fossilis, Terra sigillata, &c. Quibus alterationis gratia decocta, & Julepi cum blandis Acidis, de quibus in curatione Februm dictum, jungere conveit. Interna vero conveniunt *Succus Semperparvi* maxime aut *Portulaca* cum paucis *Actis Rafanis*, (f. enim multum Acetum fumat, facit Agros agrypnos) Fronti & Temporibus, item Testiculis, inilar Epithematis applicatur, sed calide; nam omnia Epithemata tepide adjuvenda. Conveit etiam Emulso Seminibus Papaveris albi, cui aliquantulum Camphoræ additum fuerit. Vel convenit *Epithema Cephalicum* HARTMANNI cum Camphora, quod habet in *Prax. Chymicæ. lib. 2. cap. 1. de Cephalalgia §. 18.* vel quod describit §. 7. Imprimis Epithemata ex Gammaris Buviatilibus contrita & applicata, aut ex succo Cancrorum Buviatilibus expresse lollat Epithematis usurpato, egregia & singularia sunt in Cephalalgia Febrili; quibus ipsis etiam sub coarctatione Acerum Rosaceum, aut Aqua Papaveris rhabdosis, Spermatis Ranarum, Phlegma Vitrioli, aut alie quedam Aquæ appropriatæ, addi possunt: sicuti etiam *Unguentum Populæ* vel *Alabastrum* cum Oleo Papaveris expresse; vel Aucti, non sine fructu illinoitur: quibus in declinatione addenda magis appropriata v. gr. Radix & Herba Verbene, Radis Rhodæ, Zedoariz, item Opia: v. g.

℞. Ungu. Ref. ℥ss.

Olei expr. Sem. Papav. ℥i.
Hyssop. ℥ss.
Mor. Macil. ℥i.
M. f. Linimentum: S.
Unguentum Cephalicum.

Vel

℞. Ungu. Alabastr. ℥i.
Olei Papav. expr. ℥ss.
Hyssop. expr. ℥i.
M. S. ut antè.

Vel

℞. Ungu. Alabastr. ℥i.
Theriac. Androm. vel Pellon. Rom. ℥ss.
Olei expr. Macil. Macil. ℥ss.
M. D. S. ut procedens.

Vel

℞. Ungu. Papav.
Alabastr. ana ℥i.
Extr. Verben. ℥ss.
Camph. ℥ss.
M. D. S. ut supra.

Vel

℞. Extr. Cancr. flos. rec. expr. ℥i.
Aqua Roton.
Flos. Chamom.

Sambus. ana ℥ss.

Pulv. Zedoar. ℥i. vel ℥ss.

M. f. Epithema.

D. S.

Epithema Cephalicum Externum.

Vel

℞. Succ. Cancr. flos. cum Aqua Verben. extr. ℥i.
Jul. Ammoniaci ℥ss.
Pulv. Rad. Rhod. ℥i.
M. pro Epithemate.
D. S. or antè.

Vel

℞. Herb. Verben.
Flos. ana Mi.
Flos. Refor.
Sambus.
Flos. ana Mss.
Includantur Sacculo, Muc. acidiolus
incoquendo.
D. S.

Sacculus Capiti applicandus.

Vel

℞. Macil. Persic. ℥i.
Sem. Papav. alb. ℥i.
Cum l. q. aqus Symplic. f. Emulso:
adde
Extr. Cancr. flos. vel Verben. ℥i.
Spiritus Theriacal. camph. ℥ss.
Pulv. Zedoar. ℥ss.

M. S.

Epithema Cephalicum.

Vel iuxta PLATERUM *lib. 2. obs. pag. 768.*

℞. Empl. de Roton.
Alabastr. ana p. ss.
de Ros. cum Mercurio p. l.
Misc. pro Emplastro.

Quibus si *Artemisia* coquenda, interponantur *Albarboria* sapida recentia.

Quod si in Febrilibus ob nimios dolores Capitis *anesthismus* Deliria aut *Comvulsiones*, adeoque, ut alias dicunt, *caput Maseriz* ad Caput:

℞. Fel. Ruta Mss.
Rad. Raph. incif. Nom. li. vel lii.
Salis comm. M. l.
Ferment. acerr. M. li.
Attac. Rosæ. q. l.

M. f. Pulmentum: S.

Emplastrum plantis Pedum applicandum.

Quando applicetur plantis Pedum, item Capiti, & repetatur, si effuscatum fuerit. Revulsioem eff. remedium ratione irritationis, unde in comate Vigili Februm egrius est.

Vel

℞. Fel. Ruta Mss.
Simi. Columb. ℥i.
Sulis comm. ℥ss.
Ferment. acerr. ℥i.
Cum Aceto flos. Sambucif. Cataplasma.

D. S.

D. S. ut super.

Vid. BARBETTE in obs. de Poth: Vel

Zf. Raser, cum Sale condit. Zf.

Neri Zili. ad Zf.

Camph. Zf.

M. L. Caraplasma.

D. S. ut super.

XI. A Seri vel copia vel acrimonia pesante si dolor uterget, pro illius affluuio sedando in Subjunctis Plethoricis convenit ante omnia *Emplastrum*, quatenus Vasis exinanitis Serum non adeo copiose translatum, quodque ejus enflavit, à Venis facilius reforescat. Extra quem tamen calum post Clysteris iniectionem, aut Laxantia blandissima usum, *Emplastrum* Cervici aut ponti Aurei, imò in dolore atrociori eoci Capiti applicentur: vid. RIVIERUS Cent. 1. observ. 37. TULPIUS lib. 1. cap. 13. & MEARA *Hist. pag.* 121. simulque per Opium ultior Affectus & dolor mitigetur, usque dum hoc aliquantulum sedato reliquias serosas per potentiores *Purgantia*, *Diaphoretica*, & *Diuretica*, educere liceat. Pro Recidiva verò evitanda *Fistula* in Brachio aut Crure excutitur, prout scilicet alia Circumstantie hunc Locum determinant. Purgationis scopo, intersunt *Hydragoga* communiter dicta, in principio tamen mitiora, scilicet Radix Jalapae, Scammonium, Massa Pilularum de Succino *Cranio*, Luna Hydragoga, & Elæctum verò atque Diureti Liguorum Decocta & Elæctia cum Catarrhalibus & Nervosis aromaticis & Diureticis miscenda, v. g. Decoctum Catarrhale, in *M. Form. Claf. a. §. 11.*

Vel

Zf. Rad. Enula,

Coryphyl.

Sarsapar. an. Zvi.

Ros. Flor.

Ref. Ligni Sassafr. an. Zf.

Herb. Rorismar.

Sals.

Cherofal. an. M. f.

Galang. dr. ii.

Sem. Foeniculi Zfil.

Coqu. io l. q. Aqua:

Colat. Bib. adde

Zf. Rorism. vel Papav. errat. Zil.

M. D. S.

Decoctum Catarrhale Cephalicum.

De hoc Zil. vel iii. bis, vel ter de die propinentur.

XII. Quod attinet *dolorem Capitis Fletum & nimis contrarium*, seu Cephalalgiam, quam vocant à *Causa frigida*, seu potius Cephalum, à *Materia viscida aut glutinosa ac seri hinc inde impada*, in specie in Cephalalgia Senum, præter sudorifera Liguorum Decocta, aut similia Medicamenta sudorifera, de quibus jam ante dixi, conserit imprimis Balsamum & oleum destillatum Succi Verticis aliter. Item præ cæteris præstantissimum est *Emplastrum de Rani Vignis cum Mercurio*, Capiti talo impostum, quod ratione Mercurii penetrat, & Causam viscidam acidam corrigit, quo ipso desperatas Cephalmas curavit PLATERUS, qui videtur in *Observat. pagin.* 372. & *Præf.* Parandum est hoc Emplastrum more consueti hunc dosi ordinaria, nunc dosi duplicata Mercurii, & summum est Remedium Mercurius vivus incorporatur vel solistatur, vel malaxatum cum Balsamo Peruviano, Oleo Irimo, destillato Succini, Unguento Alabastrino, &c. Item Emplastri hujus p. l. potest addi Empl. de Beten. Et Unguentum de Alabastr. p. f. & sic horrendam Cephalalgiam PLATERUS loc. cit. mirabiliter curavit. Ipse aliquando in Venia octogenaria, quæ jam ab aliquot annis continua & gravissima Occipitis laboraverat cephalma, felici cum successu hoc Emplastrum, malaxatum cum oleo Sacculi, inspersit. Convenit etiam in *diffusione Sutarum Cranii*, Affectu periculoso & difficili, unde Principissæ Henricæ diffusiophag Sutarum, alia Iritis, curavit D. MICHAELIS mediante hoc Emplastro, & Clysmatibus acrivis, & usitatis tæuommodò, in quibus tamen præscripsit dissolvenda sequencia: nempe

Zf. Zilch. Niv. pice. cum Agar. Ziv.

de Ror. Laur. Zil.

Pulv. Rad. Nollib. nig. Zf.

Zell. Tauri test. Zil.

Mile.

Cujus uncias duas semper Clysmati domestico addendas justit, quæ Clysmata crebrius fuerant repetita. Capiti verò ad imitationem PLATERI (ut ipse D. MICHAELIS professus est) hoc Emplastrum applicari præcepit.

Zf. Empl. de Rani. Vign. cum Mercurio Zf. ad Zil.

Cerat. de Beten. nfr. Zf. ad unc. iß.

pro brevem. Zf. ad Zvi.

Missa malaxanda cum Unguento Alabastrino.

(loco quæ Oleum Sacculi commodè etiam sumi potest)

Inducatur super Alatum, & applicetur capiti in forma Emplastri.

Quod ipsum modò dictum Emplastrum, & de Rani cum Mercurio, egregie etiam convenit in *doloribus Capitis assensu*, *contumacibus Gallicis seu Venereis*, hujusque Mali reliquis: vid. BARTHOLINUS Cent. 3. *Hist.* 55.

Ita tamen ut ex SILVATICI consilio *Striclidium* quoque Aquæ calentis sulphureæ huic applicetur quæ: vid. RHODIUS Cent. 1. observ. 75. Non negligenda illa, quæ primario Morbo appropriata deprehenduntur Remedia, à qua etiam applicatione decente omnes cephalalgie per consensum extorquet tolluntur. Aliis in hoc Sutarum diffusione jubet MINDERERUS in *Medic. Miss. pag.* 327. præmissa forti capitis Ligatione & postmodum dextra capilli, Ceratum ex *Pelle Arinicum Gummi Elemi*, & pauco Cerato de Betenica loco affecto applicare, & egregie confert: Vid. quoque BOOTIUS loc. suprà citato. In genere in cephalalgia ubi subest suspicio peccantis *Materiæ crassæ*, viscidæ, acidæ, &c. ea vitio Digestionis privata, ibi non habetur melius Emplastrum, quam hoc, idque imprimis propter Mercurium penetrantem, & optime resolventem; suavit enim facit Materiam illam, quæcumque etiam sit, & vocetur ut lubet. Alterandumque hoc etiam est cum Decocto ex Speciebus cephalicis, Laxivo & Vico parato, quale PLATERUS l. a. commendat:

Aut

Zf. Herb. Rorismar.

Verbena.

Rorism.

Flor. Chamemill. Ros. an. M. f.

Coqu. in Fimo pro Epithemate.

D. S.

Epithema Cephalicum.

Aut

Zf. Empl. de Rani. cum Mercurio p. l.

Rorism. p. l.

Malax. cum Oleo destill. Anethi:

D. S.

Emplastrum cephalicum.

XIII. Aliis, ubi opus est Discussioni, & hujus medio Dolores Sedatione, item Resolutione in cephalalgia ex *Causa frigida*, speciatim externo Frigore, optime conducunt Sacculi ex *Mille & Sale communi*, qui sunt egregii, & mirè commendantur à LINDANO: nempe

Zf. Mille leviter test. p. iv.

Salsæ communis similiter leviter test. p. l. vel ii.

Ex quibus fiat Sacculi, suffragandis cum Gummi Astringentibus, & ita applicentur Capiti. Varia Appropriata addi possunt pro variatæ circumstantiarum, verb. gr. Origani, cum Floribus Chamemillæ, Thymus, Flores Sambuci, Verbenæ, Rorismæ: vid. FORESTUS l. a. observ. 21. in *Schol. Exempli* grat.

Zf. Mille test. M. i. vel ii.

Salsæ commun. parùm test. M. f. vel i.

Herb. Verbena. vel Beten. vel Flor. Samb.

Flor. Chamemill. an. M. f. vel M. i.

Pulv. Rad. Rhod. Zf.

M. f. Sacculi interpassati,

calide capiti applicandi, & ita gestandi;

D. S.

Sacculus contra dolores.

Vel

Zf. Mille test. Zvi.

Salsæ test. Zvi.

Herb. Thymus.

Flor. Sambuci. an. M. i.

Zedair. Zf.

Includ. a. Sacculi interpass.

D. S.

Sacculus ad caput.

Vid. *M. Form. Claf. a. §. 10. & Colleg. Formular.*

Conducunt etiam tales sacculi imprimis in Doloribus capitis continuis senum, quibus admodum sunt appropriati. In quibus & similibus gravioribus capitis Doloribus etiam Vescicatoria Occipiti & Nuchæ, interdum ponit Anres applicata, consuevit.

XIV. Quod si dolor capitis sit à causa Externa, radere vel Cafa ab alio, aut ex Contusione, hincque relicta de-

lilitate, ibi optimè convenit: *Cervium Alexandri Bradii*, mediatore quo curavit Senem; quæ va Percussione Trabis quindecim dies & nodos obtinuerit: Nempè

℞. Gummi Hedæri vel Elemi 3iij.

Resin. pargat. 3℔.

Cera.

Terebinth. an. 3iij.

Ol. Rosæ. 3iij.

Gummi Aloës Actæ fol. 3iij.

Succi Corymb. Hedæri. 3iij.

Farin. Falar. q. l.

℞. Semp. Ex quibus omnibus trices. l. Emplastum.

Hoc egregium est in Cerebri Capitis ex Confusione, Crisæ, &c. Vid. de hoc etiam HEINRICUS ab HEER in obs. 2.2. item FORESTUS l. 9. obs. 35. in Schol. & VALERIO LAT. 3. obs. 9.

Aliæ ad dolores in Paroissas, etiam Unguentum Alabastrium prosumum observatum fuit. Convenit etiam facculus *Nymphaei* ex succo pulverisato, cum Effluvia Pipæ irritato, aut Tacamahaca cum oleo succini in Emplastum redacta.

XV. Quod si Cephalalgia sit à Vermibus, hæc tunc pæ adfuit suspiciones, five in Cerebro generati fuerint, five per loca exteriora ad Cerebrum usque transierint, in tali casu gravis labor, & Medico, & Aegro subest. Nemo ejusmodi Methodum melius præscripsit, quam HILDESHEIM, qui perinatissimam à Vermibus ita curavit: Habuit curæ ægri graviori Cephalalgia correpum, in quo eum, præmissis Theriacalibus, & copiosis Vermibus, per Alvim rejeclis, nihilominus in gravi Capitis dolore persistere, ipse vero non vulgare suspitionem habebat Vermium in Capite, propterea tunc omnia simplicia applicavit Emplastum tale:

℞. Pulv. Aloës,

Lamb. terrestr. an. 3iij.

Pell. Tauri 3i.

Ol. Althææ.

Cera an. q. l.

Milk. in forma Emplastri.

Extendatur super Alvim, & Sinapiod

applicetur.

Hinc præ faciendum Fumo Pulverem ordinavit:

℞. Pulv. Centaur. minor.

Marrub.

Butea. an. 3iij.

Zedæar. 3℔.

Rad. Angel. 3℔.

Succini 3i.

Antimonii crudi 3i.

Mili 3℔. (A)

(Flos in sub nomine Milli Zingiber intelligitur.)

Beli Arm 3i.

Asiatic. rotund. 3i.

Asiatic. 3iij. vel dr. iii.

M. f. Pulv. grossus pro Fumo.

Quæ hoc Emplastum usus esset, & Fumum ter, quaterque Naribus, & Ore exsuffiendum admittit, tandem triduum oblongi Vermes villi, seu lanuginosi vivi illas Erucarum sive Onicorum per Fauces, Nares, & Aures proderunt, quos ipse digito apprehensos extraxit. Continnavit modò dicta, unde tantos dolores, & cruciatus postea non sensit, quantos antea; sed tamen omnes nondum remotos dicebat ipse, cum adhuc in sinapite laceret illique: unde post aliquot menses proderunt adhuc duo, non tamen ita magni, ac priores, & ita ægram rediit: Vid. HILDESHEIM in spec. 1. de aff. cap. pag. 45. Ad hujus imitationem, si suspicio est Vermium, Medicus similis potest invovere, & applicare. Quo etiam facit ZACUTUS LUSITANUS Prax. Admirand. lib. 1. obs. 7. ubi potentiore sternatione ex Pipere, & Caloreo, Vermem, Cephalæ duntaxat causam, rejeclam testatur. Item hujus loci est Fumus Myrti hæ, & spiritus Vini, in quo Nigelle semes infusum, Auribus immisus, quorum SCHENCKIUS obs. pag. 176. meminit; item SALMUTH Centuria 2. obs. 39. qui Suffus Amarorum, & Antimonii Vermes per Nares effusus refert. Sin orantur à Catarrh. Malum à priori non est evadibile, nisi Natuta vias inrenat, & Calculos foras proderat.

XVI. Cephalalgia ab Erisetate, & Crapula, aliisque Periculis Cruditatibus, præmissis Pomis, vel Burganis, Stomachicis, inque Nervinis sedantur: e. g.

℞. Pulv. Rad. Afari.

Crem. Tartari 3℔.

Gummi de Pers. corr. gr. v.

Olæ defill. Mastic gutt. ii.

M. S.

Pulvis Cephalicus, & Stomachalis

pro una vice.

Inter Stomachica convenit Piper, vel integrum, vel in partes divinum, deglutandum, quia abominè Cruditates in Ventriculo; Item Mallicæ, & hujus spiritus; Essentia Ligul Aloës, spiritus Vitrioli Cephalicus, &c.

℞. Elæ. Prop. dr. iij.

Spiritus Vitrioli Cephal. dr. i.

M. S.

Elisir Cephalicum, & Stomachale.

Hinc non adeo Paradozum videtur, quod GARDANUS Abr. Pars. refert, contumacem dolorem Capitis Cereus Ventriculo imposuim sedatum. Item quod VELSCHUIS in call. obs. 12. Hemiericraniam Pano Succo Granatorum imbuta intra triduum solutam testatur; Vid. FORESTUS l. 9. obs. 44. 45. & 46. In Cephalalgia ab Erisetate, & Crapula convenit Piper, ut didimus. Item Caput leviter irroscendum, Testes vero in Aquam frigidam Austo mistam immergatur. Pari Methodo tractandum sunt Cephalalgie ex Lene, Urtica, Scorbuto, &c. oborre. Morbi scilicet peiorari ante omnia semper rationem habendo.

XVII. Gravissima species Cephalalgie est Hemiericrania, in qua præter Anterionum Temporum, quam valdeget suadet LINDANUS in Colleg. Prax. super Harumam lib. 2. cap. 1. §. 17. & aliis irritis aliquoties expertus est PAREUS lib. 6. cap. 4. aut Hieridum applicationem ex LINDANO, & RIVERO supra laudatam, aliisque Universalia ipsi memorata. Experimentum singulare est Cephalalgia sedum ex Radice Cusumæ affinis, seu Symplicis aut Bryonia cum Irina, & Absinthio, quod applicandum est latera dolenti, nequam euphorisio & amplius mis utaturam, & commodatum; vel ex eadem Radice additis Emollientibus sit Caputula, in specie pro solvenda Hemiericrania per Absinthio, ac Suppuratorem, de quo vid. curia Obiteratio HORTII l. 2. obs. 10. Vel loco tallum Caputula, quæ sunt difficilia, etiam fieri potest tale Decodum pro hoc modo:

℞. Rad. Curam. aff. rec. 3i.

Herb. Absinth. 3℔.

Flor. Falar. p. l.

Coqu. in ac. Vin. & Aquæ.

& Decodum colatum subinde applicetur loco dolenti in Hemiericrania: quod egregie confert.

℞. Rad. Curam. aff. rec. 3i.

Herb. An. M. i.

Coqu. in l. q. Aquæ.

Colatura applicetur, uti didimus.

Nempè si hoc ad imitationem Medici veteris PAULI, qui in Hemiericrania recipiebat Radicum Cusumæ Symplicis, undem minotum concilium, & Absinthium. Hæc incoquunt Hydrelæ ad putrilagine usque. Cum Hydrelæ hoc cuncto medicosier pariem dolentem innegat, hinc Radicem, & Abominum de super applicat. Loco hujus Radicis Cusumæ Symplicis, convenienter etiam Radix Bryonia us recipi, & scilicet utriusque potest; si nempè

℞. Rad. Bryon. 3i.

Herb. Absinth. 3℔.

Coqu. in aquæ.

In Decodo Spangia nova subinde immergatur, & quilibet locus dolens fovatur, idque aliquoties, inungendo postmodum Unguentum Alabastrium.

Sant FORESTUS l. 2. obs. 23. GABELCHOVERUS, FONSECA, & plures alii Prædici, molium commendat Radicem Cusumæ affinis ad Hemiericraniam. His quoque irritis, præmissis ubi Prituta viscida, hæc Frigoris scilicet observatur, adhibetur oleum Euphorbiæ, seu Coffinum, item sequens Lincumum, quod FORESTUS lib. 9. obs. 3. & 31. in Schol. describit, & eum singulare commendat ad Hemiericraniam:

(A) In Editione Francofurtensi legitur, Milli 3℔. Penna viri habet, Milli 3℔. addique, ut videtur, meminit Milli interdigendum esse Zingiber: sed qui credit Zingiber Milli succedendum esse? Quæ enim liber Hildesheim non sic ad manus, hanc fieri veram lectionem apparet: sed frustra quoniam in hunc Milli ad rem facientis, meminit Milium irrogisse, Editor Frenco pro Milio, incompuncte hinc loco medicamine, Zingiber substituentem esse existimavit.

bilitate, ibi optimè convenit *Cerasum Alexandri Remditi*, mediante quo curavit Scenam, per vix Percussione Trabis quaedam dies & oñdes obtinuerat: Nempè

℞. Gummi Resinæ vel Elemi ℥iij.

Resin. Jargar. ℥ss.

Cera.

Terebinth. an. ℥iij.

Ol. Rosæ. ℥iij.

Gummi Arabic. Acet. sol. ℥iij.

Succi Cerevis. Heder. ℥iv.

Yariv. Fabae q. l.

Ex quibus omnibus vixit. Emplastrum.

Hoc cyregium ibi in Doloribus Capitis et Contusione, Crura, &c. Vid. de hoc etiam HEINRICUS ab HEER in *obs. v. s. item FORESTUS l. 9. obs. 35. in Schol. & VALERIOLE l. 5. obs. 9.*

Aliis ad dolores ex *Paraffione*, etiam Unguentum Alabastrium proficuum observatum fuit. Convenit etiam sacculus *Narum* et succino pulverisato, cum Essentia Pipere irritato, aut Tacamahaca cum oleo succini in Emplastrum redacta.

XV. Quod si Cephalalgia sit à *Verminibus*, harumque adfines fulsiones, five in Cerebro genitæ fuerint, five per loca exteriora ad Cerebrum usque transferantur, in tali casu gravis labor, & Medico, & Aegro subest. Nemo episcopiandi Methodum melius præscripit, quam HILDESHEIM, qui pertinetissimè à *Verminibus* ita curavit: Habuit enim eum gravius Cephalalgia correptum, in quo eum, præmissis *Thymis*, & copiosis Vermibus, per Alvum rejectis, nihilominus in gravi Capitis dolore persisteret, ipse vero non vulgare suspitionem haberet Vermium in Capite, propterea ante omnia sincipiti applicavit Emplastrum tale:

℞. Pulv. Alni.

Lumb. terrestr. an. ℥ij.

Fell. Tauri ℥i.

Ol. Albinth.

Cera an. q. l.

Misc. in forma Emplastri.

Extendatur super Alvum, & Sincipiti applicetur.

Hinc pro faciendo Fumo Pulverem ordinavit:

℞. Pulv. Centaur. minor.

Marrub.

Beton. an. ℥ij.

Zedair. ℥ss.

Rad. Angel. ℥iij.

Succini ℥i.

Antimonii crudi ℥i.

Mili ℥ss. (A)

(foras sub nomine Mili Zingiber intelligitur.)

Beli Arm. ℥i.

Asphalt. rotund. ℥l.

Asphalt. ℥ij. vel de. lib.

M. l. Pulv. grossius pro Fumo.

Cum hoc Emplastro usus esset, & Famum ter, quaterque Naribus, & Ore excipiendum admisisset, tandem tridecim oblongi Vermes villosi, seu lanuginosi vivi in illas Erucarum huc Ulicorum per Faeces, Nares, & Aures prodierunt, quos ipse rigido apprehensio eussit. Continuavit modo dicta, unde tantos dolores, & cruciatus postea non sensit, quos antea, sed tamen omnes nondum immotos dicebat ipse, cum adhuc in sincipiti laterent aliqui: unde post aliquot menses prodierunt adhuc duo, non tamen ita magni, ac priores, & ita Aegram restituit: Vid. HILDESHEIM in *Spici. l. de Affect. cap. pag. 49.* Ad hujus imitationem, si suspicio est Vermium, Medicus similis potest invenire, & applicare. Quo etiam facit ZACUTUS LUSITANUS *Prax. Admiranda lib. 1. observa. 7.* ubi potentius Stenocenturæ ex Pipere, & Calthore, Vermes, Cephalæe duntaxat causam, rejectione cessavit. Item hujus loci est Famus Myrrhæ, & spiritus Vini, in quo Nigelle semen infusum, Aurius immixtus, quorum SCHENCKIUS *observa. pag. 176.* meminit; item SALMUTH *Centuria 2. observa. 39.* qui Sulfur Amarorum, & Antimonii Vermes per Nares eductos refert. Simulantur à Calculo, Malum à priori non est curabile, nisi Natura vias inveniatur, & Calculus foras prodeat.

XVI. Cephalalgia ab Ebrietate, & Crapula, aliisque Nerviculis Cruditatibus, præmissis Muneris, de Burgentia, Stomachicis, atque Nerviculis sedatur: e. g.

℞. Pulv. Rad. Alni.

Crem. Tartari ana ℥ss.

Gummi de Pers. cer. gr. v.

Olei diffusil. Mastic gurt. ii.

M. s.

Pulvis Cephalicus, & Stomachalis

pro una vice.

Inter Stomachicis convenit Piper, vel integrum, vel in partes divinum, deglutendam, quia subitum Cruditatem in Ventriculo, item Malicæ, & hujus spiritus, Essentia Ligni Aloës, spiritus Virgini Cephalicus, &c.

℞. Elia. Prop. dr. iij.

Spiritus Virgini Cephal. dr. i.

M. s.

Elizir Cephalicum, & Stomachale.

Hinc non adeo Paradoxum videtur, quod GARDANUS *Art. Parv. refert*, contumacem dolorem Capitis *Cerasum* Ventriculo impoñitum sedatum. Item quod VELSCHUS *l. 2. obs. 12.* Hemierianam Par Succi Granatorum imbuta intra triduum solutam tellatur; Vid. FORESTUS *l. 9. obs. 44. 45. & 46.* In Cephalalgia ab Ebrietate, & Crapula convenit Piper, ut dictum. Item Caput leviter irroscendum, Testes vero in Aquam frigidam Acet. mistam immergantur. Pari Methodo tractandæ sunt Cephalalgie ex Lina, Urtica, Scorbuto, &c. oborre. Morbi scilicet peiorari ante omnia semper rationem habendo.

XVII. Gravissima species Cephalalgie est Hemieria, in qua præter Anteriorum Temporum, quam valde opte suadet LINDANUS in *Colleg. Prax. Sup. Hartmann. lib. 2. cap. 1. §. 17.* & aliis irritis aliquoties expertus est PARÆUS *lib. 6. cap. 4.* ut Mercurium applicationem ex LINDANO, & RIVERO supra dudum, aliisque Universalis supra memorata. Experimentum singulare est *Cataplasma* factum ex Radice *Cacumeris sylvæstris*, seu *Sylvestris* *Bryonia* cum *Urtica*, & *Albintho*, quod applicandum est loco dolenti, tanquam euphoris à quampluribus sitatum, & comendatum; vel ex eadem Radice additis Emollientibus huc Cataplasma, in specie pro solvenda Hemieria per Abiesum, ac Suppurationem, de quo vid. curio Observatio HORSTII *l. 2. obs. 10.* Vel loco talium Cataplasmodum, quod sunt difficilia, etiam heri potest tale Decoctum pro Fumo hoc modo:

℞. Rad. Curcum. affa. rec. ℥i.

Herb. Asphar. M. s.

Flen. Vial. p. l.

Cocu. in an. Vin. & Aquæ.

& Decoctum colatum subinde applicetur loco dolenti in Hemieria: quod egregie conserit.

℞. Rad. Curcum. affa. rec. ℥i.

Pol. Asphar. c.

Verben. an. M. l.

Cocu. in l. q. Aquæ.

Colatura applicetur, uti dictum.

Nempè si hoc ad imitationem Medici veteris PAULI, qui in Hemieria recepit Radicum *Cacumeris sylvæstris* vinalem manotum coctam, & *Albinthum*. Hæc incoquit Hydrelis ad putrilagine usque. Cum Hydrelis hoc cocto medioeriter partem dolentem innungat, hinc Radicem, & *Albinthum* deasper applicabit. Loco hujus Radicis *Cacumeris sylvæstris*, convenienter etiam Radix *Bryonia* v. p. cepici, & scilicet utriusque potest, à nempe

℞. Rad. Bryon. ℥i.

Fell. Asphar. M. ii.

Cocu. in aqua.

In Decocto Spongia nova subinde immergatur, & calidi locus dolens fovetur, idque aliquoties, innungendo postmodum Unguentum *Aladaphum*.

Sane FORESTUS *l. 2. observa. 13.* GABELCHOVERUS, FONSECA, & plures alii Prædici, minime commendat Radicem *Cacumeris sylvæstris* ad Hemieriam. His quoque irritis, præmissis aliis Fruita viscida, hæc Frigoris sensus observatur, adhibetur oleum Euphorbiæ, seu Collinum, item sequens *Linimentum*, quod FORESTUS *lib. 9. observa. 7. & 38.* in Schol. describit, & cui singulare commendat ad Hemieriam:

℞. En-

(A) In Editione Francofurtensi legitur, Mili ℥ss. Vixit autem habet, Mili ℥ss. additque, ut videtur, missi Mili intelligendum esse Zingiber: sed qui erant Zingiber Mili succedendum esse? Quoniam autem lib. HILDESHEIM non fecit ad manus, hanc fieri veram editionem apparet: sed fortasse quoniam in locum Mili ad rem faciendam, mendax Miliū crepissit, Edidit Vixit pro Mili, incompertum tunc deo medicamento, Zingiber substitendum esse existimavit.

M. Ephorb. ʒi.

Ol. oleici. ʒi.

Diffolv. & ebulliant invicem:

poſtimodum adde

Cera ʒiij.

ʒ. Unguentum.

Hac ipſo Linimento dimidia Frontis, & Temporis parti-
ci, & Mufculis Temporalibus in Hemieria commodè inun-
gitur, & admodum convenit ad Hemicraniam, imprimis
frigida, ut vocant.

Alia Euphorbium Aceto dilutum, & applicatè lateri dexte-
ro, dolentè ſiniſtro, aut contra; ſam & conſerre diu
cunt: vid. etiam BINNINGER in Obſerv. item

M. Aqua Rofarum.

Solia,

Serpylli ana ʒi.

ſpir. Theriacal. vel Serpylli, vel Lilior. ana ʒʒ.

ſpir. Cera Cerui, vel Gal. Ammoniaci cum Cal-
ce vna ʒiij.

Muc. S.

Aqua Cephalica Externa.

Allis irritis multi ad Aſterioſum, item ad ſeſſionem
Venæ Fronti conſugunt, de quibus conſulendi Prædici.

XVIII. Denique in Doloze Capitis Mullorum ex Uræ, ſeu
Doloze Occipitis frigida, ſpecificus eſt Succus Hermanni
ex Succino pulverulato, & ſpiritu Vini, vel ſſonia Pi-
peris cum ſpiritu Vini extenta, irroſato, citæ loco § 19.
& ita crebrius applicetur. Sicuti etiam emplaſtrum ex Te-
camabaca cum Sæpine, & Oleo Succini malitiam admo-
dum convenit in talibus muliebribus Doloribus, taſis Ca-
pillis loco dolenti applicatum, vid. BARTHOLINUS
centur. 3. ep. 12.

Hæc Externa ſemper cum Internis uſurpentur, quæ ſola
non ſufficiunt, (B)

A R.

(B) Subſtantia Hiſtoriam Hemicraniz pertinaciſſimæ, è qua ſuccreſcit innumera mala, univerſum Agrotanti cor-
pori diſſeſcens, artem ſanſere.

Neapoli 20. Junii 1714.

Nobilis Monialis N. N. annos ætæ vigintiſſimum æſtatum, corpore duxijus & iuvijus adeoque bona, cum adole-
ſcenti eſſet, ſuæ valetudine, ſervida acerrimè ingenio, atque ad quæcunq; aggredienda promptiſſime, prædita, multis ab
hinc annis ex iternito ſitu in ſiniſtra Frontis parte, lævem primò, max graviozem in ea regione Hemicraniam, ætatem
per intervalla Polypura Oculi ſiniſtri depoſitionem paſſi capta eſt. Atque quæ dicit vā nativitate ſupervenire, verum hæc au-
tem deſcripta decemium paſſim quæ incrementum ſonſere, atamen frequen- & non exigua Narium Hemorrhagia huic
deſcripti ſupplementum præſtabat: largæ autem Muci copia, quæ quotidie Nares ipſæ reddebant præteritæ. Hæc tamen
non obſtante vixit ducitæ catæque ſalubrem, & nulli infirmitatem incommodiſſimam præſentantem.

At menſe Janu. anni 1701. Merbi vix, quæ infra Agrotanti robur præſentem conſtituit, vehementer increvit; nam qui præ
valentes Capitis erant Dolores, lancinantes, & præteritæ ſymptomæ coſeque, ita ut Agrotantæ patientiſſima ad elemos
& vacillatione coſequeretur: Dolor hic per Paroxyſmos uſque inſormem invadebat, qui præteritæ volati quædam ætæ, quædam
vel plurimum diſtans ſerabatur, nunquam tamen præteritæ ceſſabat Dolor, ſed aliquandoſque tantum ſe remittebat. Exacerbationes
iſte nunc temporis non ſunt adeo frequen- & eſſi nunquam paſſi ætæ dolore inſormem exiſſat. Eju ſeſi præcipua eſt Os Tem-
porale ſiniſtrum (reſi extremis ſquamis extuberantem morboſam paſſi eſt,) præteritæ ad Os Frontis & Zygoma, uſ-
que ad ſiniſtram partem Maxilla ſuperioris, & Dentæ ipſi Molares, è quorum intervallo ſæpenter uſque ad præſentem diem
Sanguis in ipſa Doloris paroxyſmo & extra paroxyſmum erumpit, ſed abſque ulla lætamine.

Hæc cracibus præteritæ mala ſupervenire, nam univerſo præteritæ ætæ deſcripti ætæ & amplius Agrotanti Vertigine corp-
ſai, nunquam tenebriſa, nunquam morboſa emaciatæ, cum caſa & ſenſum abſolitione, vel membrorum con-
tinuæ veli reſolutione. Hinc delirata quædam in Brachio dextero ab ipſa uſque ceruice, quæ uſque adeo præteritæ
angui ætatis ſiniſtri Oculi conſultiva contraſtione: hinc quæque Vigilæ perennes: hinc univerſi corporis incipientæ Mar-
coe: hinc dentium Morbicia, tenebriſa amor, & juſtiſſima Læryma.

Quoniam hæc præteritæ ſerè quædam cerſiſſimæ Agrotanti, ac hinc temporis ſpate in ſeſi decembris, circa Autu-
mum anni 1711, in Fœnicula præteritæ languorem, ætæ in Mærib Regium incidit: & quædam appropriatum Reme-
diorum uſa ab eo Merbo liberaretur; nobilium Febricula iteratis vicibus itea ſerè cum corripit, hæc ætæ præteritæ anni
1703, continua ſalla eſt, quædam nabilem exacerbationem (nunquam eadem diæ ætæ), refrigeratione extremam
peritum matam, & præteritæ habet, & ab hæc uſque diem præteritæ: quæper ſeſi ætæ Nobilis Laborantem non vulgèr emac-
iationem, atque univerſi corporis languorem, operantemque emulion, ut par eſt, læſionem non medicem paſitur. Neque
ſilencio eſt præteritandum, quod ab ætæ præteritæ uſque præteritæ, valde coſtantem & ætenuam Tuſſis Agrotanti venatæ
& ætenuam vocat: illius ætæ ſeſi videtur eſſe Læryx, quæ jugiter irritat, Sanguis ſæpenter ſeriatæ ſeriatæ ex-
cernitur.

Hæc quidem multa & magna ſunt, ſed plura & majora reſtant. Temporis præteritæ Nodi quidem in Mamilla ſenſim ſubſiſſere
viſi ſunt, qui incrementum paſidarum ſumunt, moleſtiam, dolorem atque interſalata lætationes præterunt. hi non ſolum
perdurant, moxque Brachii eſiſtem lateris al qua modo præteritæ, ſed in Mamilla quoque ſiniſtra ſubſiſſe incipiunt, hinc
tamen partibus ſubſiſſe adærent, nec mirabilem lætationem præterant.

Quædammodum Tumores hi duriſſimi in Pelliculis regione obſervati ſunt, ita quoque & in inſimo Ventre, præteritæ in He-
patitis regione, Glindularum inſectur, multum tamem obſervantes, temporis præteritæ ſunt. Hi quidem à principio
dolus moleſtiam non eubebant, verum menſe Octobris ſuper elapſi anni, vehementiſſimi Dolores dextri ſiſi regionem
repeti obſervat, qui toties itaque inſormem dextram & ætenuam hinc præteritæ deſcendentes, dextræ cruciatibus moleſtam Agrotan-
tem interſe: Febris inſormis accessit, atque poſt brevem paroxyſmum & membrum ætenuam conſultam emaciatam
Abſceſſus in ea parte coſeſſit & ſeparatus diſruptus eſt: unde copioſe Puris cum Urina excreto, non ſine ali-
qua ſimili hæmorrhæ per vix diſturbatæ. Dolores & Febris ſe remiſerunt: ætæ præteritæ morſum, ut vel quæ præteritæ
Abſceſſus, eſſi mirari, in eadem regione partibus quæ ætenua ſali, in ſeparationem adærent, cum mirabili Puris per recentia
loca propulſione.

Poſt hæc Febris præteritæ ſalla, ſed quædammodum præteritæ temporibus ætenua Agrotanti interſe, ita & nunc ætenua eadem
adærent, non ſine quædam exacerbatione: Itaque nunc temporis Nobilis Virgo vix per videriam & lætaliſſi ſurgit, Mamillarum
Tumores Pelliculis lætationes, Cephalicæ ſenſum ætenua. Tuſſis cum interſalata hæmorrhæ moleſtiam inſere, uſque Abſceſſus in
tandem & ætenua ſunt, morſa Purgantibus vix ætenua, Fœnicula varia ætenua genera & gula irritamenta reſpuit,
nec ætenua præteritæ ætenua: non vix, Corpus interſormem ut malis ætenua ſerè nullas ætenua ætenua ætenua.

Ut hæc Morborum Læta ætenua ætenua ætenua Medicina paupera, ut in diem; ætenua eſt. Per ſomma capia,
ut breviter conſeſum, Medicamentis adhibita tangam. Extrinſecæ, ut Capitis Doloribus mederetur, Balnea, Fozus,
Undiones, ætenua ætenua, ætenua, ætenua præteritæ: Balnea quoque Minoralia, præteritæ præteritæ præteritæ,
ad Viſcerum naturalium ætenua reſtitutionem, plures ætenua ſunt: quædammodum Febrilis & Undionibus Baſilicæ, vel
adærentæ generis, in regione Abſceſſus præteritæ ætenua ætenua ætenua. Extrinſecæ & Præteritæ adhibuimus, ut ſerſe ætenua ætenua
ætenua ætenua præteritæ præteritæ: Oſi Temporali & Occipiti Caſticum Emplaſtrum hinc ætenua, ætenua ætenua ætenua
tempus ætenua ætenua. Sanguinem miſum non ſemel ſed plures, ætenua præteritæ præteritæ. Sedemus inſormem.

Interin

Intrinsèci ad Viscerum Obstructiones referendæ administrata sunt pluries Chalybeata medicamenta: ut excrementorum laboria deturbarent, secundum Naturæ & Morbi exigentiam, Cathartica remedia pro tempore sunt propinata. Ad Sanguinis ferorem compescendum, quique acres particulas retinendas Jura conijuncta ad usum Septalii alterata, Serum Caprinum, ac Aqua Antivenerea infusibus diluta, ex Lignis Radicibusque cunctis, additis Antimonii crudo & Punicæ Parata, ad longum tempus exhibita. Atque ut Marcori ingruens resisteretur, pluries Lacte, primum Caprino, deinde Affinis Nobilium Egerantem altissimæ. Antihysterica & Antispasmodica fere omnia ad præsentem revocata. Decemta Cephalica, Splanchica, Traumatica frequentissimè propinata. Pilulæ, Cephalicæ, Anodyne, Balsamicæ pro re nata pluries delinitæ. Cereulla Stibii juxta Iyxxjxxxi Angeli Salæ post Abscessus disruptionem ad mensum exhibita, Cortex Poruvianus ad Febriæ paroxysmum averrucandis hœdusquam prætermisus. Atque innumera alia administrata, quæ vel merum præcipitatum fratribus fugiunt, vel, ne longum faciam, consilio emittit. Illud tamen haud omnimodum est, quod omnia recenseat Medicamenta præteritâ inefficacia ferè asperit summi, si tamen Lac Asinum excipias, in cujus ufo, ut verum fateamur, nō Morbus divellitur sibi, semper tamen aliquid emolumenti Corporis accessisse videmus. Hoc Lacte impræsentiarum utitur, ut debite effluatque Corpus reficiamus ac recreemus, tamen in Mineralis aliquibus appoliti præparati usum, vel Acidularum ex arte potum autum intermi.

Hæc sunt quæ de Morbi Nobilissimæ Egerantissimæ raptim & præteritâ temerariè excubere casibus sui, in quo sunt Vitium aliquod organicum summi Chirurgicali Operatione (à qua D. Laborans eminus abhorret) eradicandum agnosco. Spere tamen futurum, ut Celeberrimi Viri quibus id muneris commissum erit, in præstata propinquant, quibus insolentem Morbi vim, nō præteritâ sedem emovere valeamus.

Quem hac Historia multo per Europam Clarissimis Professoribus missa fuisse, multæ quoque Consilia ad nos vinisim transmissa fuere. Labet tamen nomen hic summittere, à Denis Verney, Aubery, & Nissolle subscriptum.

Monpellii 16. Augusti 1714.

Infirmatorem, quibus laboris pax à Clarissimis Monialis N. N. & quæ illas conveniens Symptomata, longo sermone pertractare non mihi videtur: inutile enim censuimus causam Morbi diligenter inquirere, quæ Medicamentis superari non potest, & qui solertiam delinquerent ac peritorem Medicamentum, & vim Remediorum congruentissimam hac usque elapsi.

Defensio enim, & Humorom salubritudo hujusce Illustrissimæ Virginis ex hoc adacta sunt, ut nulla sit spes amplius, quod ad pristinum & naturalem statum reduci possit.

Hemicrania enim quæ jamdiu excruciatâ est in Epilepsiam degeneravit, dextra Mamilla intorata est, & dolore pugnis afficitur, qui aliquam Canceri suspitionem commoveat. Febre lenta cum Tussi, & Spuæ Sanguinis corruptæ est, & in ea tabesct totum corpus, quod denotat Pulmonem tuberculis sciatæ, Viscera non fere obstruita sunt, sed etiam suppurata: Vesica urinaria & substancia Uteri erga sunt, unde copiosa Puris copia cum Urina excreta est, & per Vaginam effusa. Uno verbo, pauca restant adhibenda remedia, & nisi juvet Summum Numen, parva est spes, ut Virgo Excellentissima ad potum salubri pervenire possit.

Ne tamen ad nostrum Prognosticum illam desiliquere videatur. Remedia, quæ Sanguinis massam diluere, & deturbare valent, præscribere indicamus, & cum Indicationibus desummi debeant à lædendis & præcambis, ad usum Lactis Asini consuegendum esse non dubitamus, ex quo aliquid emolumenti semper recipi, modo pargetur quicquid quoque de Medicamento appropriato, & capiat alterius diebus, antequam illud hauriat, Sulphur, cuius præparatio talis est, ut magis purgasset succus nutritius, & saepe magis balsamicus, & aptior ad partes corporis succedat.

℞. Sulphuris vivi crystallæ triis ℥i. pone in olla satuli, & superaffunde Aquæ ferrentis ℥iij. & sine bullæ per quartam horæ potum, deinde illam aquam effunde & novam superaffunde, & sic vices præcede. Postea pone Sulphur sibi tantum in olla stili sine Aqua, & cum operculo illam obtura, & in fornæ ardenti maneat per sexquihoram, & sic effusum in pulverem subtilissimum redigatur.

℞. Insus Sulphuris ℥6. Sacchari candidi ℔i. Myrrhæ electæ gr. x. f. Pulvis pro ana desti.

At si hoc Sulphuris præparatio illi non ardeat, uter Pilulæ, quarum talis est descriptio.

℞. Balsami Copahivæ gutt. xxx. Sacchari candidi ℔i. Myrrhæ electæ gr. x. f. Pilulæ pro ana desti.

Ad uterendum Vultu Ultera, huius aut ter in die immittatur Decoctum sequens.

℞. Fol. Agrimonie M. Summitatum Abinthii minor. Flor. Chamædit. & Rosæ. rubr. ana p. i. Coque in ℥iij. Aquæ (intus). In Calatula distille Mellis rosæ. ℥ i. f. Decoctio ad usum.

Notat pro Pura ordinariæ levisque Salis parille Decocto. Vitæ sibi eucharis, parca, & bene succi, qui minimus sit excrementarius, nec multum implat, sed exigua mole vires sustineat. Vitæ sive emia salsa, acris, & pipirata, vixit etiam ira. Animi nimis contentio, & excohescentia. uno verbo, quæcumque Sanguinem ac spiritus evagare, & Ventriculi deprimere valent. Datum Monpellii die 16. mensis Augusti ann. 1714.

Verney.

Aubery.

Nissolle.

℞. & similibus, ab aliis etiam Professoribus præpositis, incausum adhibitis Remediis, tandem aliquando ad Cinnabaris usum quoniam decessum est: hoc Remedium juxta Artis regulas per quadraginta dies administratum nec noxam ullam nec noxam Egerantem inquit. Sanus igitur vixit sum Consilium, ambrosium quo Naturæ committere: atque hinc factum non sensim insensum, ut ita dicam, Malum, atque nunc temporis (anno 1711.) commendat Nobilis Virgo fratre volentium: etsi per vices & intervalla, sed quidem rariora, Dolor Capitis tolerabilius asperitate illam vexare non desinisset.

ARTICULUS VIII.

De Doloribus articulorum seu Arthritide.

Dolent præterea frequenter Articulationes quilibet in affectu, *Arthritis* (C) didio in genere, quæ in specie pro Articulorum varietate, in Pedibus *Podagra*, in Genibus *Gonagra*, in Manibus *Chiragra*, in Dentibus à STROBELBERGERO *Odonalgia*, in Costendis Articulis *Rhachiadica Morbus*, seu Dolor appellatur. Præter quas partes tamen, & Scapulas, & vertebrae illi, & interdum Nervum occupat: imò observari in senæ admodum podagrica, &

alteram *Neq* quali medietatem fuisse affectam. *Arthritis* sibi per Paroxysmos affligit sibi, extra quos, nisi in inveterato malo, satis commodè habent *Egri*. Quædam luminæ Paroxysmus, Alvus sibi ignem evadit, *Egri* molestiam quandam haud bene explicabilem circa præcordia sentiunt, consuetum excrementum iara Podam digitos non reperitur, & circa Articulos testis percipitur. Hinc supervenit Dolor circa Articulos, qui incipiente Podagra ut plurimum Podicem Pedis majorem unus, hinc & alterius Pedis, succedive occupat, hinc repetente, ut præcedere cerebralis malo, alia etiam loca succellit, Genua, hinc Rachia, occupare solet. Dolor, quem percipiunt *Egri*, fert triplex est, *Purgans*, *Lacerans*, & *Pallens*, plus minus tamen intensus: quibus inserendum, & Dolor *Ardens* simul accedit, cum Tumore, (Immo).

(C) *Αρθρο* est Artus: hinc *αρθριτις* Arthritis, Artuum, seu Articulorum Dolor. *Ποδάγρα* *podagra* propriè pedicula tendicula, quod *αρθριτις* videtur: *καὶ οὕτως* enim sunt pedes & *αρθρο* caput, præda. Hinc Podagra dicitur articulus morbus, qui pedes infestat: patet ergo quid sit Chiragra, Gonagra &c.

simul *Erilgalace*, in *Arthritis* nempe sic dicta *Calida*, quando Acidum magis volatile, & acre peccat, *Ruborque* partis affectu iocundissimus, & *Astus* accendunt: In qua etiam *Arthritis* omnia Symptomata sunt atrociora, sed simul paroxysmi sunt breviores, quam in *Podagra*, dicta communiter *Frigida*, in qua Acidum magis obtusum, & viscidum, Dolores remissiores, & *Tumor* plur minus *Edematofus*, cum nullo, vel levi solum Rubore, affligit, diutius tamen persistens paroxysmo, nec tam facile evanescens Tumore, *Aegri* perpallidus anxii sunt circa Præcordia in Paroxysmo, præsertim in incremento ejus, minus in statu: Consequenter *Aegri de Ardre*, seu *Astus* circa regionem stomachi, hinc *Frigida* appetunt; item de gravissima Sati, & anxietatis Præcordiorum, Stomachi monstranda regionem, quæ sunt graviores, quò minus Potu, se onerant: *Asperius* penitus est *prostratus*, *Clysmata* autem, & blandæ Laxantia optime Anxietates habent. Subinde accidit, ut cum erubris repetito, sed inaequali *Convulsio*, affligat, sicut Anxietates insuper exacerbat: Imò observari, quod cum *Liporhymis* gravibus, subinde repetentibus, paroxysmus in principio, & incremento *Aegri*, præsertim inveterato Maligno laborantes, veavet, quæ Pathemata tamen in ejus statu, dum Dolores, & Tumores increverunt, & plures partes occupate fuerunt, penitus remiserunt: Accedit ferè semper *Fæbris Symptomata continua*, non adeò quidem acuta, magis tamen in principio Paroxysmi affligens, mitius in statu, quam ad FEBRUM Catarrhalium usum accedere asserit SYLVIVS lib. 4.

Hæc ipsa Symptomata etiam in *Dolore Sciadici* ferè occurrunt, ubi *Dolor* præter Or, & in *Astale*, ubi Femoris caput inferius Coxendici, imprimis percipitur, etiam alunt, seu Nates, hinc intra Ossis Særi, & Lumborum regionem plus minus occupant; quoniam Nervorum, & Membrarum conatuum, & deorsum protergiorum ratione, inferius versus Suram, & Pedem usque, & ad extremum Malleolum tandem ascendunt, namque ferè gravissimè affligit, & quia Partes primario dolentes in profundo sub tegmine copiosorum Musculorum, delitescant, ferè nulla extrinsecus mutatio facili conspicitur.

Sæpius equidem dolores alii istam superiorem Cruris, & Coxarum regionem occupant, & subinde pertinaciter affligunt, non tamen præcisè Dolorem Ichnadicum constituunt: confer SENNERTUS *Traictat. de Arthritis*, cap. 6. pag. 45. Quod si erubris redeant Paroxysmi, ac pro more vehementius affligunt, insigniter debilitantur articuli, ac motus eorum multum immutatur, adeo ut tandem ad Paralyticum quasi constitutum redigantur, flacciscant simul, & in nutritione deficient, subinde laxentur. Isterum circa Articulos contrahuntur, & rigida manent Membra, aut saltem intra Articulos contrahuntur, seu *Tophi*, & *Nodi* colliguntur, qui motum Articulorum impediunt.

Sciadici Dolor speciatim ad Glaucliacum, nonnunquam Cæpæ Lumbonem, aliquando Cruris trochanem, dispoit, Imò si inveteratum fuerit Malignum, præsertim si in Paroxysmi declinatione Sudores neglexerint *Aegri*, pertinacia in Articulis vestigia relinquunt Arthritis, adeo ut levi occasione, & vel fortiori saltem Articuli motu, & agitatione, mox nonnihil recrudescat, aut saltem Functionibus superveniens se manifestet.

PARS AFFECTA.

Pars afflicta erit Pars admodum sensilis circa Articulos saltem sita, adeoque oil aliud, quam membrana ligamentosa, ipsos Articulos vincientia, & colligantia. Quinimò his affectus ipsam Periostium in locis Ossium Articulationi proximis pati simul, probabile videtur, ac acerbitate lacerato Doloris, in profuso imprimis fiti, & apparet Ossium capita immediatè afficiunt. Sed quod Articulus in specie afficit, videtur esse ex Synovia, seu Aqua Glauclia German. *des Glinder Taffer*, quæ est Ros dulcis chylifus, seu Acidum temperate turgidum, qui cum Nutritum Ligamentorum, & Membrarum, ipsorumque foras Ossium, abundans intra Articulos collectus pro motu facilitando, & instat Augmentum obliuissimè Ossium Articulationes. Hoc cum appropriatum speciei Arthriticæ Acidum obijci inquirari imprimis solet, quo factum mox varia circa Articulos pathemata superveniunt, dum Partes vicinæ membranaceæ necessarii rodi incipiunt: hinc succedat Synovia ista ab Acido peccante instat albissima Ovi spissior, & tandem in evanescit, seu *gryssum* substantiam coagulari solet, ut patet ex *Tophorum*, seu *Nodorum* intra Articulos collectione, qui indicationis via exempti Calcem, & *gryssum Tophorum* omnino res-Tum. II.

presentant, & Effectum, non Causam Arthritidis, constituent: quorum *Tophorum Examen chymicum* videb. in KERKRINGII *Spiritibus*, Observat. 28. & M. A. N. C. append. ad observat. 65. pag. 395.

CAUSÆ.

Quoad Causam efficientem: omnino optimè eadem in TACHENII *Methodum Principio* expressa, & explicata videtur: Nempe acidum volatile spirituosum, sui tamen generis, seu speciei saporis, Spiritus iolius maritatum, Synoviam imprimit, & Partes vicinas Membranaceas inquinat, & affligit, pituitarius torrens est. *Prima hujus acidum spiritus frige* est ex primis viis, quam potius ex depravata Digestione prima cum TACHENIO, quam ex Pancreatæ circa Glandulis cum SYLVIO, derivare placet: adeoque non in Pedum articulis ipsam podagram esse, rectè dicitur, sed ejus solum Fructum, cuius Radix habitat in Stomachi Fermento vitali; itaut licet dolens Pes abinderetur, podagra proinde non sanaretur: Quod si maturi non curatur male, Acidum illud spirituosum furtivè, & successivè Acido Stomachi fermentativo se afficiat, donec Fermenti more pedetentim hoc superet; ita ut impossibilis, nec naturalis, nec artificiali separationi obediat, adeoque inveteratum incurabile sit, ut eleganter loquitur TACHENIUS cit. loc. 3. 438. Nunc nempe

1. *Hæreditaria* observatur Podagra, cum Spiritu infuso generali odore Acido podagrico communicato Fectui. Nobilium caravi Jussuram, qui ab incunte olavozetatis anno sæpius Podagra correptus fuerat, quid patens ejus & ipse insuperior podagricus in ipso Paroxysmo cum generat.
2. Hinc etiam animi Pathemata gravioribus aut diuturnioribus curata observatur podagra, ut *Isakina conversionis*, aut *Isa* insigne, aut *Mentis* diuturno, ut in Divitibus vel prosperioribus factum: Conf. BARTHOLINUS Cent. 6. lib. 28. LOTICHIVS Observat. pag. 489. SALMUTH Cent. 1. lib. 48. TACHENIUS *Method. Princip. pag. 356*. Quo etiam pertinet *Tertura*, ea HILDANO Cent. 1. observat. 79. Nempe perturbata Animi, & Spirituum peculiaris motus ac alteratio extolant Fermentum podagricum, aut latem plus minus alteravit illud, principaliter quidem in stomacho primario, quo cum reliquis præfideat Digestionibus, & basi erunde alterari occesse est: videb. TACHENIUS c. 1. pag. 357. & 360. quoniam nempe animi pathemata Fermentum digestivum & hinc Digestionis primæ octogium alterant; quo etiam Confidantiam *Meri* erga Medicum vel Remedia pertinere per se notam est.
3. Hinc ut plurimum etiam Arthritis Nephritidis esse solum, eodem Acidum spirituosum utrobique auctore.
4. Hinc *Lustitia* Modernorum Methodo, sed continuato usu, ut invertantur quasi humores Corporis, Spiritus & Fermentum digestivum, contra Arthritidem.
5. *Vini abusus*, volatilis Acidum ratione Spiritus imprimit afficiens, plures in hoc Malignum precipitat. *Observanda tamen differentia inter Vinum*, dum ea, quæ plus de Tartaro vel Acido facili fermentante in nobis continent, nocentiora sunt. Quo alia Vegetabilia plus minus tartarca pertinent, ut rectè asserit GLAUBERUS. Ex Spiritus Vitioli uso nimio TACHENIUS Podagræ ortum notat, in *Hist. Chym.* Hinc
6. *Asthenia* Vini contra quoddam ab Arthritis liberale observata est: Videatur SENNERTUS cit. loc. pag. 16. Sic LOTICHIVS in cit. pag. 22. refert, Podagram ex abstinencia per integrum annum cessasse, sed hujus copia ingurgitatione recidivante.

Es eo est, quod lo Arthritis producenda tria ista vulgo nota cum Causa remota principaliter conspirare videntur, dum *Bacchus* cum *Potui Vini*, quo inouitur nervum Acidum, ex nimio abusu in Fermento stomachico minus debet superabile ac corrigibile: *Vitæ* cum *Mate*, quatenus repetito congressu post copiosum Spiritum infusum Chylis temperato alcalino prædivis sub Genituræ forma Succus nutritus excutitur, & hinc Nervosum systema insigniter debilitatur; & *Dea*, cum *Obstetria*, commovendo Contenta Corporis & Spiritus infusus asperiores reddendo, in producendo Arthritidis *Pars* occupata rectè dicitur. *Diſſis* ex Causis & *Vini* moris, quoniam

Quoad curam, duo respicienda sunt tempora:

1. Tempus Paroxysmi, ut curetur.

2. Tempus astra Paroxysmo, ut praeservetur.

Quoad Paroxysmi tempus: cum in hoc imprimis motus uisus uigilet, cuius impetu ille excitatur, unde ex deficienti natura colore deficientior Paroxysmus. Aegri in periculo sunt flata; ob id non siccandus, sed promouendus, impedimentis remouendis, acidi speciei vim maturae infringendo, urgentis nimis symptomata mitigando, semper simul per legitimum temeritatem administratione quantum particularis morborum tempore attendendo: Adeoque

1. Inprimis Podagra ventris conuenit, sed praemisso digestio Absorbente ex Lapidibus Cancrorum praeparatis, Oleoculis, & Salis Tartari. Nam acidum ejus oritur in stomacho: Hinc imminuere Podagra, appetitus sine manifesta causa esse prostratus, & isodores coactae alias sponte supprimuntur. De quo uisum est uis. HILDANUS *Crur.* 6. *deferat.* 24. MERCATUS *de Med. Intern.* lib. 4. c. 17. RIVERIUS *Prax.* lib. 16. cap. 2. & SYLVIVS *in Praxi Tractat.* 2. §. 123. *Prax.* 2. c. 126. Sin minus Vomitus insitit quoad *Purgantia blanda*, sed misce temperantibus acidis, uerbigrat. Oculibus humanis praeparatis, vel calcinatis, &c. in primo principio insituta, conducunt; aut si, praeter *chylum*, in curia Paroxysmi aliquid peragendum, Insulum Seanae postulat, aut Pilulae Aloeticae silem, vel silem, vel cum Appropriatis propiuntur, ad mutationem TACHE-
NII *laseo uilegat.* pag. 439. Vel *Pallulae Lasatiuae*, Pruna Lasatiua.

Vel

2. *Crem. Tartari.*

Salis Absorb.

Arian. duplicat. an. gr. viii.

Diagrid. gr. iiii.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Arthriticus Lasatiuus.

Vel

3. *Conf. Rorism.*

Salvia an. ʒvi.

Pulv. Anisodag. *purg.* *Parac.* ʒi.

Mag. Salsap. ʒi.

Cum ʒvi. de Spm. ceru.

f. Elethuarium

D. S.

Elethuarium Arthriticum Lasatiuum pro

aliquot vicibus.

Aliis Purgantia quilibet uitanda, neque quae in Paroxysmo magis nocent, quam proficiunt; Eger enim, ut monet HARTMANNUS *in Prax. Chymic.* cap. 32. §. 2. in Paroxysmo Medicamentis Purgantibus non deservitur, sed afflicto liberetur. Sanè in arthritide, id quod peccat, purgando minus auferitur, sed contenta turbantur, spiritus irritantur, & insula exasperatur: Conf. TACHENIVS *laseo allegat.* pag. 149. & 151. & SENNERTUS *Tractat. de Arthrit.* quæst. 12. pag. 104. In statu tamen Paroxysmi, ubi malum contumacia in Articulis hæret, ac Febri & alia symptomata planè intermiserint, Purgantia blanda insitit potest ad imitationem RIVERII per Mercurium dulcem miscetur cum Aloe, vid. VELPSCHIVS *Medic.* 4. Caus. 2. anox. M. A. N. C. *Actu* 4. c. 5.

Vel

4. *Mass. Pilular.* de Tril. ʒvi.

Extr. Mellifer. ugr. an. ʒi.

Turk. Mineral. cum Spiritu Sulphuris par.

gr. i. ii. vel iiii.

M. f. Pilulae S.

Pilulae Arthritice Purgantes.

Landatur etiam Radix Bryoniae ad ʒi. in Insula, vel ejus syrupus ad ʒi.

Tom. II.

afflicto cognoscitur; & secunda ex retrospectione cogniti facili. Hujus Curatio consistit 1. ut humores repulsi ex parte coeuerint, Carcinicis, Venesiculis, Diaphoreticis &c. 2. ut ex parte afflicta uerius Artes, iterum propellantur. Id praeare ait Moigrave Vinum praecipit, hinc Theriacum, Nitridarium, Spiritum Cornu Cervi, Succini, Urinae & similia. Commemorat item Ferri rubiginem quandam, ex reposita Urina aspersione elicita. Topica item Arthros applicat, ut Gummi Caranna, Fermentum panificum, Semen Sinapi, Allium, Rutam, Stercus Columbinum, contrita & Aceto mista, ut Tumor excutiat.

Non rursus hoc hoc nobis ex expertum Remedium ad Podagram urgendum in illi, qui est hinc mali obnoxii, in carmen non reuocatur, non sine maxima corporis molestia. Viperas decorticatas, exterminas ac minime incijias afflicta S. A. uideret alimbia. Spiritus hic ad cohibere singulis diebus jejuno stomacho exhibetur per septimenam & ultra.

(E) Vererit ut Amice Sanno (& feriat inexpectabili, ob grana feri esse Laudari quæ offensa) spaliu, Jaceat paria, quoniam non possit surgere & ambulare, ut lapide subter Rhumelium, exhibitis suis Pilulis, quas vocat Veni Amice surge & ambula.

II. Opium sunt nunquam scd praesens, nec insensu, ppe externi; sic cum malum contumaciae reddunt, neque quæ remittant, motumque Naturæ impediunt, & ut vocant, conservant Podagram in Corpore. Imo absque Opio carum ad Paralysin Arthriticam dispoit: videb. M. A. N. C. *Actu* 4. c. 5. *Append.* pag. 135. Adeoque causæ usurperant, nec nisi praemissis uisioribus, nec nisi ad uisioribus purgantibus, aut sudoriferis, aut spiculis: Vid. HILDANUS *Crur.* 6. *deferat.* 24. PLATERUS *Prax.* Tom. 2. cap. 17. & RIVERIUS *Prax.* lib. 16. cap. 1. Suisper tamen, commodè propinari possunt eadem ingruente Paroxysmo, praemissio Vomitus, cum spicifico sudorifico. Quoad misceum, cum praemissio: Videb. strant hoc Pilula Anisodagras Rommæ, quas vocat 2. Veni Amice, surge & ambula.

2. *Mass. Pilular.* *diaphag.* ʒi.

Land. Opist. ʒi.

M. f. Pilulae

dir. in 4. part. æqu.

Quarum una pars in Vino assumenda & tribus vel quatuor horis seorsum imperandum. (E.)

Conferatur etiam quoad Opiorum usum VELPSCHIVS *Recur.* 2. *deferat.* 27. Misce uero cum diaphoreticis etiam vulgo nota est; inter quæ salia volacalia blanda, & spiritus ialino-volaciles, Opatis mista, qualia sunt spiritus Salis Ammoniaci, spiritus Cornu Cervi, Cranii humani, item spiritus Tartari volatilis, propiciendo sudorem praeter ceteris conueniunt. Praeter hæc, ssa acidum absorbente, uti alii Microcosmi praeparata, Antimonium diaphoreticum, Cinnabaris Antimoni, Bezoardicum Solare, &c. optinè conducunt, imprimis si sal volatile Cornu Cervi aut Vaporem aut sanguinis humani addantur. Et quidem cum subinde apud nos radia Podagra fit a scriptis, ssa commodè spiritus Lumborum terrellium per fermentationem praeparat, item Ellessa contra Arthritidem Vagant, item spiritus Cochleariae, &c. illis diaphoreticis adduntur. Hæc cum Volacalia & ssa Acidum variis absorbent, Opata uero dolorem temperant: v. g.

2. *Lapill. Canter. prop.*

Arian. dupl. *Mass.* an. gr. xii.

Salis vol. Succin. gr. vi.

Land. Mystr. gr. iiii.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Arthriticus Sudoriferus pro una vice.

Vel

2. *Theriac.* ʒi. ad i.

Salis Absorb. ʒi.

Sumatur in haustu vini pro sudore.

D. S.

Elethuarium sudoriferum pro una vice.

Vel

2. *Aqua Panicul.*

Card. leud. an. ʒi.

Spiritus Lumb. *corr.* per part. ʒi.

Sal. Ammoniac.

Mag. Canall. cum succ. Citr. an. ʒi.

Land. Opist. gr. ii.

Syr. Corr. Aurant. ʒi.

M. S.

Potio Arthritica sudorifera.

III. Venesectio in Arthritide, quæ tali, inastilis est; quia sine necessitate aut intertempore adhibita potius multum nocet, Vires debilitant, & Naturæ motus ad subterranum impediendo, ut obierat BECHERUS *Phys. Subterran.* lib. 1. pag. 491. Adeoque nonnulli Plethoricos, aut quibus insigniter sanguis bullit, idque saltem in principio, antequam plures Articuli perficere iam occupati sunt, eadem interdum locum habet; Vid. GRATO apud Schulz. *Conf.* 239. MERCATUS 1. & RIVERIUS *deferat.* 9. & MARINUS *Communis.* pag. 193. SYDENHAM *de Podag.* pag. 15. & WILLISIVS *de Anim. Brat.* lib. 2. cap. 14. Loco Venesectio

X a a a

sectio

plicatum: cui & inferiuntur Melilotus cum Malva & Althæa, Origano, Sarcocolla, Artemisia, Betonica, Lavendula, &c. &c. gr.

℞. Medull. Passi trinit. unc. iij.

Salo. Rad. Alth.

Flo. Chamem.

Tar. Sapo. an. ℞.

Tar. Sapo. Lini.

Tenag. an. de. iij.

Copo. in f. q. Lactis ad consistentiam Pulvis, adde

Pyro. Anac. ℞.

Sali. Sapo. dr. ii.

Facit. Ovi Num. i.

M. f. Cataplasma

D. S.

Cataplasma Dolorem sedans.

Hinc *Cafus* Ovis recens planè impositus egregium leuomè præstat. Item optimum malagma præbet vetus & vermiculosis Gales cum Jure, in quo Perna fuit ad tabem decoctis, quod Articulum etiam Tophis multum prodelle dicitur, *Care* insula, Alci distillata, Lacti & prædictis fere omnibus præsertur; huius enim scitum crudum sine pinguine partem dolentem supellegatum manet & vesperi mutatum, scilicet Dolorem compescit, locum nigredine conspurcatum relinquit, insuper Pulvis Radicis *Cassida majoris* cum Aqua communis in Pulvis coctus, quæ minime digiti crassitie loco dolenti applicata, Podagram novellum invasionemque primam optime mitigat; Vid. TACHENIUS *Arch. Princ.* pag. 198. & *segg.* Hinc ster-cua bubulorum, & quod præstantius, Stercus humanum optime Dolores hos sedant, Cataplasmate frequenti HILLERUS feliciter usus fuit, quo una nocte Dolorem & Tumorem in Genibus & Pedibus maximum curavit.

℞. Sterc. Bovis ℞.

Aqua Rosar.

Vinum. an. ℞.

Alk. Ovi, cum frasse Alumi. compass. Noi.

Croci dr. i.

Camph. ℞.

Misc.

Facit hoc etiam urina humana, præsertim nonnihil putrefacta, egregia anodyna, vel per se, vel cum adjecto Cinere communis Balneo destillata; vel Aqua Absorptiva ex Salis Ammoniaci pulverisati & Alci Tartari ana in Aqua simplici soluta: vid. TACHENIUS *l. c.* pag. 197. Hinc GNOFFELIUS in usu habuit Extractum Castis fissulæ cum spiritu Vini Parti affusæ imponendo: sicut & Stercus hircinum cum urina *Egri* subsumit, & insuper Cataplasmatibus applicatum, egregie convenit. Vel recipi potest urina Vaccæ mensis Mayo, & imponi Pedes aliquandiu; dein imponatur Emplastrum Norimbergense, vel, quod melius, Emplastrum de Alcalibus Tacheni, cum vel sine Camphora pro circumstanciis ratione, vel Emplastrum de Spermate Ceti. Denique *Calx viva* propter suum Alcalibic locum habet: nempe si Aquæ Calcis vivæ imponatur Pedes, extrahit Dolorem, & resolvit Tumorem. Item urina, in qua Calx viva extinguitur, applicata bene convenit, loco cuius urina versutius usurpata potest. Sunt, qui ex singulari Remedio Podagricum laudant, recipiendo spiritum Vini septies vel octies super Sale Tartari redificatum, affundant hunc Calci vivæ, abstrahant fortiter; hinc enim spiritus Vini vim subtilissimam & penetratissimam Tartari Articuli resolutivum acquirit, & ut per se solum possit evacuari, hanc disposuit. Quod si spiritus hic accensus deflagret in Cochleari, relinquit Pinguedinem butyrosam, & ipsam pro illiusmodi contra Podagram admodum accommodatam, meliorem, quam ipse fere spiritus, qui citra medium applicari potest. HAUPTMANNUS miscet Tincturam Tartari acerrimam cum Saccharo Saturni, quo, tanquam Arcano in Podagra, affectum locum illius replet, & mirandos effectus promittit. Denique *Saffors* ille ex decocto scorbi Corticum Ligni Abietis & Querni Corticiorum, cum urina humana, egregius ad quamcunque Arthritidem est, ut partes affectæ eo foveantur; hoc ipso enim Comes quidam à Podagra contractus factus, resolutus dicitur: vid. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. observ. 229.* Forsan Lotio cum ipso decocto non esset incongrua: Vel

℞. Lixiv. Cineris. ℞.

Urina human.

M. S.

Fovea ad curat.

Pertinent huc *Serruina*, in specie Saccharum Saturni cum Appropriatis applicatum: nempe solutio ejus in spi-

ritu Vini aut Spermate Ranarum, addita pauca Camphora. Hinc quidam Emplastrum de Spermate Ranarum rite paratum copiosiore addito Saccharo Saturni, non sine effectu applicat. Caravi Stram, qui habuit dolores Arthriticos in Geni cum aliquali Rubore erysipelaceo, cui optime conferebat Emplastrum de Spermate Ranarum, cum copioso Saccharo Saturni, cum deus posset ambulare, pro Spiritu infusa evellenda ordinavi Aquam Arthriticam ad extram cum spiritu Salis Ammoniaci, optime habebat per quinque vel sex dies: Sed abusu hujus spiritus recrudescere paroxysmus & interior hebet à spiritu, Pertinent huc Emplastrum ex Alcalibus Tacheni, & Emplastrum bina *Barberis* multum laudata ad Podagram, tam calidam quam Frigidam *lib. 1. cap. 4.*

Fugienda sunt nimis *unctiosa pinguia*, quæ Poros obducunt Malum suppurabile potius exasperant, & insensibilem Transpirationem inhibendo, tandem contumaces *cutanea* inferunt, unde loco Unguentorum Emplastrum varia *mercurialis* conflantia, & Cataplasma dicta calidè adhibenda sunt. Hæc ipsa tamen sapienter revolvenda, ne actuali frigore postmodum striduram Pororum inferendo, Malum exasperent.

Quod Podagram frigidum sic distillat: spiritus Vini cum spiritu Salis Ammoniaci, præsertim cum Calce viva parato, convenit. Sapo Venetus uti in quavis Podagra, ita in specie in frigida laudatur: Nempe Volatilibus subinde sunt iungenda Olea quasi fervecia, v. gr. destillata Tacamahacæ, Fuliginis, Tartari, &c. rebus. Recipitur *Sapo Venetus*, solvatur in spiritu Vini & aqua Sambuci, & ita illinatur cum Plumæ Partis dolenti, Vel ad imitationem *Doct. MICHAELIS*:

℞. Sapo. Venet. unc. iij.

Camph. dr. vi.

Croci dr. i.

Spiritus Lemnistr. terref. q. l. pro solutione.

Misc.

Qua illinantur cum Penna Partes dolentes calidè.

Concidiunt huc cum Balsamo Antipodagrico Rheumatis:

℞. Coag. Sulphuris animalis & Alci,

idell., Sapo. Venet. ℞.

Gum. mercurial. & sulphureus naturæ,

idell., Camph. ℞.

Quint. Saffors. Vegetabilis,

idell., Spirit. vini q. l.

Digerantur, & separatim facibus relique ad usum referuntur, & cum Lixate Parti dolenti applicentur.

Siquidem in forma liquida quasi adhibetur, majorem semper & tutiorem effectum relinquunt. Loco spiritus Vini melius recipitur spiritus Lumbicorum terrestrum.

Alii Saponem Venetum liquefaciunt cum spiritu Vini super carbonem, addito Oleo Juniperi & Petroleo, faciunt Unguentum & applicant.

In specie Oleum destillatum Saponis Veneti est potens Remedium, præsertim in Arthritide Frigida; hinc etiam in Dolore liliadico egregium est idem. De usu cuius poly-chretho in Doloribus Podagricis videb. HORSTIUS *lib. 2. observat. 27.* Sicet Preparacionem ejus cum addita Calce viva & Camphora idem scribit *lib. 2. observat. 2.* Oleum Petroleum, in quo decoctus est Radix Hellebori nigri, laudatur ab HARTMANNO in *Prax. Chymicæ*, ubi de Arthritide *§. 14.* & confirmatur ceu experientia LINDANO, uti & Balsamum Peruvianum cum Vitello Ovi, & aqua Articuli, fere spiritus Lumbicorum mistum. Alias convenienter usurpantur Tacamahacæ vel Catana, malaxata cum Oleo Succini; Emplastrum ex Pice, ac *Pennis* ab Pice navali & sulphure, vel Emplastrum Diaphoreticum *Myofidi*, malaxatum cum Oleo destillato Tartari factum, vel Succini applicatum est egregium. Vel

℞. Empl. Diaphor. M. ul. 3. ℞.

Liquetis adde

Tartris. unc. ℞.

Malax. cum Ol. *Philosporum* vel potius cum Tartari fatis:

D. S.

Emplastrum.

Si Inflammatio circa Articulus addit, optime miscetur cum Camphora. Convenit etiam ad discutiendos Tumores in declinatione Podagricæ reliquis.

Vel ad imitationem POTERII præter Emplastrum in *idea form. class. 9. §. 3.* Hæc etiam Opti epique Tincturæ tantillum subinde addendum venit: magis tamen in Arthritide Calida quam Frigida. Theriaca Emplastri modo applicata etiam vi anodyna egregie convenit, cui subinde

in calida de Sale Abſinthii, in frigida de ſpiritu Salis Ammoniaci plus minus apte poteſt. Alia remedia externa, & compoſitiones elegantes & multiformes; videbunt in M. A. N. C. anno 2. obſervat. 142. pag. 318. & anno 6. & 7. append. pag. 258. ſeqq. anno 9. & 10. obſervat. 80. ubi Baſilicorum Arthriticum, & Cura Catholica Burſi, cujus compoſitionem etiam dedi in Collegio Pharmacorum, in Schröderum par. 2.

VII. Pſticaria in Cantharidibus an conveniant? equidem doloris ratione dubium videtur: ſed cum Baſilicum ſit ex Saponis Veneto, item ſcintillum cum Oleo Saponis, Pulvis in loco dolente exiſtens, ex quibus Ichor acris profluat cum tali ſigilli uſu, ut rarius redeat Paroxyſmus, ſicut etiam abſervavit HORSTIUS lib. 3. obſervat. 23. & illa ipſa Veleſtorum ſubinde optime contuſiſſe viſa fuerint, (conſ. Aſt. Sacet. Reg. Volum. 2. pagina 535.) ſine haud dubio, quilo interdem, & ique, ut ſuſpicor, in Podagra frigida, ubi Acidum intemē magis viſcidior aut copioſior Synovia facietur, perniciat circa profunda Articulorum & Offium loca hæret, proſequa elle quant; cautē tamen, monente SYLVIO de Arthritide §. 183. in Ichiadicum inventurata in loco affecto applicata proſequa obſervata fuerant: videb. BORELLUS ſenſus. 4. obſerv. 53. ſiquidem in SCHENCKII obſerv. referunt Ichiadici morbi tortuſa, & exſcitatio copioſius Veleſtorum, Curatio. Ut ſine illud Mœſa Sinapi, quæ haud ita pridem tanquam ſpecificum ad huoc affectum annotat, Auxilium cui tamen & noſtratum Vegetabilium Lanugines ſubſtitui poſſunt, ver. grat. Artemiſis, Marrubii aut Stachados, haud aliis ratione, quam ratione Eſcharæ aut Puſtulæ, con Caustorium aduale, licet levis, prodeſſe videatur. Ut racem externi Ignis Acidum in interno eracuando fortē non parum conſideret.

VIII. Taphæ quod attinet Arthritidis Paroxyſmi reliquos, de cura eorum vid. HARTMANNI Præſis; præſis imprimis eſt Emplaſtrum ejus Attrahivum, §. 39. etiam CNOEFFELIO uſitatum in M. A. N. C. anno 6. & 7. append. pagin. 165. Præterea & Caſei veteris cum decocto Camis ſuillæ applicatio hic proſequa eſt; nam Cui diſrupta ſuccellivè Tophis exitum parat. Emplaſtrum de Raris cum Mercurio à quibaldam modo dicto Malagmati ex Caſeo putri & ſpiritu Vini vidi obtemperare. Plumbea Bractea ſubſilis impoſita per mœnem juvat, aut ſaltem uberior locutionem prohibet ex ZACUTO LUSITANO lib. 2. Prax. Admir. obſerv. 173. Egregius quoque eſt ſpiritus Calcis vivæ, de quo ſuprà dixi, ſuſcitator.

IX. Quod malum Ichiadicum, cujus Cura nonnihil variat à cæteris in hoc, præmiſſa præſiſſione, ut ſuprà monui, etiam præterea Hirudines ſubinde locum habent, ſive Hemorrhoidibus applicentur, ſive etiam ipſi loco affecto. Quod prius, FORESTUS lib. 29. obſervat. 4. reſert, Arthritidem quamplurimorum Articulorum Tertianis Intermitteſſis ſuccedentem, ex hemorrhoidibus reſtitutis, quibus deſub fluxibus Arthritides ceſſant. In tali ergo caſu Hirudines applicatæ Hemorrhoidibus ſunt optime; Nam SCHENCKIUS reſert in obſervat. Cuius Dolorem Hemorrhoidum fluxu carorum: ſic ZACUTUS LUSITANUS lib. 2. Prax. Admir. obſerv. 162. Ichiadicum Venæſectione & aliis nil juvantibus, Hirudinum uſu Ano aſſicurar, curavit. Idem ſic, obſervat. 159. reſert Cuius Dolorem Hirudinum ſuctu ſuprà Partem affectam ſanatum, quod idem in aliis Arthritidis ſpecibus prodeſſe ait. His plus minus uſurpatis, Clyſters imprimis repetiti conveniunt, & quidem acres necelle eſt ſi ſint: unde hic Clyſter à quibaldam laudatur.

24. Fem. Coleryph. Num. i.

divid. in 4. partes æquales:

Quarum prima in Nodulo eoque in Vno.

Utrius par. an. 3i.

addendo

Herb. Martiſyl. M. i.

Coquantur, donec remaneat tertia pars, quæ Clyſteris loco injicitur.

De cætero tutius, quam in alia Arthritidis ſpecie, parantia in principio adhiberi poſſunt, præſertim Viveria: ſicut in Progreſſu Morbi ſubinde contumacior, & pleno ſtatu, etiam ad fortiora Purgantia, præſertim ex Mercurio dulci & Throſchidis Albanda, accedi poteſt cum in Synovia glariſſiore aut copioſiore firmius concentratum Malum eradicanum ſit: Sicut hi præmiſſis ſuſſerſerit ex Lignorum decocto ſiquandam continuatur, aut hi ſimilia conveniunt: videb. POTERIUS ſenſus. 2. capit. 85. ubi & Aurum ejus Diaphoreticum, & hinc Cinnabazina, Salla volatilis, &c. ſedulo in uſum vocanda ſunt: Videb. TA-

CHENIUS Prim. ſcriber. pagin. 104.

Emendat omnibus entomias dignum eſt Emplaſtrum Parvū de Pice ſulphuratum: vide ſenſ. 2. obſerv. 10. 13. & 86. Deſcriptione eſt hæc:

24. Pice naval. 3iv.

Terebinth. 3i.

Maſtick.

Sacchar. co. 2z. ii.

Salpêtre crum. pale. unc. 8.

M. f. Cerotum.

Hoc applicatum perquam proſequum eſt, ut experitur ſum, ac præter dolorem Ichiadicum etiam egregium eſt in dolore Nephritico neſto Scorbutico; item in Colica convulſiva Lumbos lacerante optime idem applicatur; item in Subluſatione Vetrebrarum Lumborum ſuprà Os Sacrum applicatum, etiam cum ſuſſu adhibetur. Ob difficultatem detrahendi Lapis calcæſtus ante remotionem applicetur.

Juvenis Nobilis Male Ichiadico in utraque Cœxa graviter affectus, ita ut in incremento morbi ne tantillum corporis motum ſuſtineret; præmiſſa in ſubſpectu ſanguineo Venæſectione, præſcripiſi:

24. Antimonii Diaphor.

Reſard. Martial. ana 3ſſ.

Auri diaphor. gr. v.

Miſc. peu Pulvere.

Subinde repetatur.

Item

24. Aquæ Spirituſſ.

Stenck.

ſter. 3oz. an. unc. i.

Spiritus ſat ammoniaci 3iſſ.

Off. micromelini præp. 3i.

Antimonii Diaphor. 3i.

Land. Opier. gr. iij.

ſpr. Card. bened. 3i.

Miſc. pro Potione.

Uſurpet cochleatim, continuando Sudorem. Denique

24. Spiritus ſat ammoniaci,

Liqu. cornu Cervi ſuccin. 2z. 3iſſ.

Miſc.

Externè loco dolenti Emplaſtrum Parvū iundum applicabatur, quod ita aliquot dies nocturne admotum mirè conſult. Tandem hoc ablato, pro reliquis diſcutiendis.

24. Aquæ artiæ. ad extr. unc. iſſ.

Spiritus ſat ammoniaci cum ſaleſ vici 3vi.

Miſc.

Externè affricabatur.

Item

24. Aquæ artiæ. ad extr. unc. iij.

Spiritus Benz. ſuſſerſer. unc. i.

Balf. Peruv. cum Vinello Ovi diſſolati dr. iij.

Miſcebat & affricabatur.

Præterea etiam Emplaſtra ex Tacamahaca, Galbano, Gummi Ammonio, & Opio; locis dolentibus applicatur, ſeu ex ſemine Sinapi, Eruce; Radice Perſeetri, Euphorbii, (quod cum Oleo Lini applicat TACHENIUS loc. alleg. pagin. 207.) cum Pice ſavali, Gummi Elemi, & Tacamahaca exceptis, & Emplaſtris forme applicatis: ut & Acria Acoſticatorica tubiſcantia externè imponuntur, quali ſunt Cataphalma illud à plurimis commendatum et Piperitide, Naſturtio, Iſberide ſive Lepidii, id eſt Raphano ruſſicano, (Germ. meſſ. Berick.) cum Vino coctis, & hoc Farina Lupinorum, Floribus Chamomillæ & ſimilibus miſceantur, & applicentur, de quo conſer. SENNERIUS de arthrit. cap. 6. pagin. 47. Radicem Bryoniae recentem cum Oleo Lini commiſſam & tepide applicatam laudat TACHENIUS loc. allegat. Veteres Externis & aliis irritis, tandemibus Ferramentis tribus aut quatuor locis ſuprà Collam Anthonem influſſebant, loco cuius apud nos ſerè Veleſtoris uſurpari poſſunt.

Denique univerſi cruris friſſis cum ſpirituſſis, Oleoſis, & unctis liquoribus, ut ſunt ſpiritus Formicarum, Lumbricorum, &c. Aquæ Articularis ad extr. cum ſpirite 36iſſe Ammoniaci, & ſimilia adhiberi poſſunt. Quæ inter non neglegendum Balneum ex Vinacis, item ex acervo Formicarum ſuprà art. 3. in Cura Doleris Lacrimantis laudat.

X. Quod ſi ſcitis Paroxyſmo doloroſo ubilomoniis ad hoc Tumor addit, hic optime diſcutitur Vapore de Erna, Abſinthio, & Artemiſia, in Aqua & Vino coctis, ac Pedibus calide ſuſſumigatis. Vel Emplaſtrum Norimbergienſe admodum

dilectum cum Oleo Tartari malaxatum, aut etiam follicarium, applicetur. Ut verò roboretur Articuli, fuso Paroxyſmo convenientiſſima ſunt Vina Buſimica ex Vegetabilium Aromaticorum Decoctis parata, qualiſunt *Durella* POTERII *Centur.* 2. caput. 10. & 13. aut qualia proſtant in M. A. N. C. *Anno* 6. & 7. *Append.* pagin. 165. Quòd ſi Aegri extra Paroxyſmum præ nimia Membrorum imbecillitate progredi neſciant, cum tamen Tophi nondum appareant, iis *Fenicalis* in diverſis Corporis partibus excitato prodeſſe, ait HORSTIUS *lib.* 3. *obſervat.* 8. aut uſurpari poſſe Emplaſtrum de Pice ſuprà laudatum, quod firmat Tendines, & reſolvit nimias Humiditates; aut uſurperetur remedia BARTHELEMI *in Anar. Præſcript.* caput. 5. & 10. De Podagra male tractata audivimus ſuprà *2ur.* 3. *ſeſſum.* 5. caput. 1. ubi de Cura Chylificatoria laſa.

XL Quod ad Curam extra Paroxyſmum, in hac omniſeo directa ſit Cura, ut partim Radix Podagræ ex Corpore evellatur, partim Articuli antea aſſecti roborentur. Pro priis Scopis inferuntur Remedia tam *Dietetica* quam *Pharmacutica*, ac *Chirurgica*. Quoad Dietam exaſtimate eſt obſervanda Arthritis: ſicut enim hac neglecta ſecunda Mater Podagræ eſt, ita obſervata eadem hunc ſuum Fortem abortivum ruſus abolet. Verùm de hac cum ubivis plura proſtiterint, etque vel SENNERTUS *Tractat. de Arthrit.* caput. 7. & TACHENIUS *loc.* obſervat. recentent, ſilitem adhuc ſequentia obſervanda. Nempe nil melius eſt, quam omnia Acida, & quæ in volatilibus Aciditatem cito tranſeunt, aut vim Fermenti digeſſivi coarctant, quantum poſſibile, vitare, convenienti Dietæ regimine Digeſtionis primæ negotium & cæteras Functiones quævis lartas teclaque ſervare, & bine Specifico Antipodagræ ſapore acium volatilibus, ſpiribus ſociabilibus, ac prima ſtomachi culina orondum corrigere, & in prima heſia extingueret, idque præ Remedium Pharmacæuticum, quale GNOEFELIO fuiſſe dicitur, & hodie TACHENIUS ſollicit, ſed, cum paucis liceat adire Corinthem, hæſicos Generalibus necelle eſt contenti vivamus: caſtumo tamen in Mercurio, & bine Antimonialibus ite præparatis, vim abſorbendi, & ad radice corrigendi hoc acidum podagræ, deſtitere. *Loc.* & *Dietæ Laſſæ* quoque hic Remedi vim obtinent contra Podagram; teſtiora quidem Methodo, ſed aliquoties tam ſaluti evenit, cum funditus eadem Podagra eradicaſſet. Uſuendi modum delineatum videbitis in M. A. N. C. *Anno* 1. *obſervat.* 141. pagin. 310. & *Append.* *huius Anni.* *Anno* 2. *anæſe.* pagin. 33. *Anno* 6. *obſerv.* 31. SENNERTO de *ſcrib.* *lib.* 3. caput. 3. pagin. 335. Sicut de Cura Laſſis in Arthritis integrum *Tractatum* edidit GREIſELIUS: Col ſicari poterit *Diphtheria* leſa digniſſima de Cura *Laſſis*, *Podagræ* *ſolent.* 3. *Dem.* D. WALDSCHMIDIO *Marſurgi* ouper habita, ubi aliquot huius rei Experimenta videbitis. Iſe autem hanc convenit Subiedis, qui beat & ſue corruptione in Ventriculo illud perſerit poſſant, item qui graciles ac macilentis ſunt; de quo videb. TACHENIUS *loc.* allegor. pagin. 418. Sub uſu autem huius AGER ab omibus reliquis Alimentaſt abſtineat: Videb. BONETI *Mercur.* *Cemital.* pagin. 35.

XII. Quoad auxilia Pharmacutica: Primus primatum recipit, adeo ut ab omnibus Præſcriptis commendetur Præſervationis gratia. Crebrius aut rarius, ad minimum omni Verno & Autumnali tempore circa Solſtitia, inſtituatur, nempe in ſtomacho Podagræ cuditur ſaber. Hinc, quoad *Ruarantia per inferna.* Mercurius dulcis, Turbith minima cum ſpiritu Sulphuris paratum, & alia Mercurialia ex Regno Minerali ſunt optima; ſicuti et Vegetabili Helleboreus niger, & bine Colocythos, præ aliis conveniunt. Hermodactylorum laſis non amplius tanta eſt ac ſolus, cum genuini apud nos vix habeantur, utut Pulvis Arthriticus *Paracelſi*, deſcriptus in HARTMANNI *Præſcript.* *Chymiar.* de *arthritis* §. 17. & ex hoc nunc Eleſtuarium Caryocolum, quod videb. in SENNERTO de *arthritis* pagin. 55. pluribus ſe commendatiſſimum; non ſecus ac Eleſtuarium Catharticum volutum *Myſſicis* mirè laudatur contra Arthriticum & LINDANO, *dem.* dicit: *utimur eſſe Medica* *mentum ad præveniendum Paroxyſmum Podagræ*. Quo Remedio aliquando *ſtudium Juris* hic ſeliciter curavi, qui peſſime videretur; verùm hoc Medicamento intra paucos dies curavi. Unde etiam in propandis Arthriticis Extraſtum Helleborei nigri & Hermodactylorum POFERIO uſatum fuiſt, etenim gratia.

℞. Conf. Chamaſ.
Chamaſ.
Anſus an. 38.

(vel loco harum Conſervarum recipiat)

Pulpa Paſſular. 3. lb. addit
Pulv. Antipodagr. Par. 3 lb.
Mag. Jalapp gr. 12.
Cum Syr. de Beſenica.
F. Eleſtuarium.

Alt præ ſerriſſimis Purgationibus convenientiores Inge arbitror *bladas Purgationes* per Pilulas Uſuales, nonnihil acutatas, qualem Pilularum loco videatur optime *Pilula Bulſamici Caſſioli* M. A. N. C. *Anno* 6. & 7. *Append.* pagin. 59. ex Hellebore nigro & maſſa Pilularum de Tribus Ruſi conſtat; Imprimis Mercurio ſuo acutata, *cit. loc.* pag. 147. Sane in Venericis vigris conſervando multum buſ tribuerem; Aloe autem; Pilulas de tribus Ruſi ingrediens, ita præparata ſit, ut pars eius gummoſa magis extrahatur, reſtina vel ſeparetur. Hu omni Novulno reiterandis, etas, vel quatuor dies ante uſum adungantur ſudorifica, & alia appropriata, podagræ acium, & corrigentia, & corruſum per ſudorem eliminantia. Hinc quovis Anni quæſante *Sudore* per aliquot dies repetiri proſtiterat, quocunque libuerit Remedio, *Capit.* Urmoſa tam ſua, quam volatilia, hinc Sulphure Acidimoniaſia, item Antimonium Diaphoreticum, & Antihicem *Petræ*, continuando. Sane ſpontaneos ſudores ſea potius Madores, vel omni mane in lectuorib; & ſucculentioribus, vel quovis Septimana ſeſt in aliis buſ expedando, proſtiterat amodum notavi, temporibus extra Paroxyſmum, præterum ſi ſub introitum leſti conveniens diſta ſpiritus Salis Ammoniaci præmetatur. Pili Sudorifica etiam *Diaphoretica* extra Paroxyſmum in Cura Præſervationis ſunt optima, quæ duo in plurimis conſpiciant, ita ut uſum alterum ſublevent. Imprimis vero *Diaphoretica*, tam in præſervando quam curando, præmiſſo *Uſum*, ſunt optima; magis tamen in præſervando: & ſpeciatim nulla Purgantia, nulla violenta ſudorifica, tantum valent, quæ tantum appropriata Diuretica, imprimis volatilia: qualia ſunt ſpiritus Salis Ammoniaci, vel ſimplex, vel lavenderulæ, aut ſuſſionis Aromatum cum ſpiritu Vini oleoſus factus; Tactat volatilis, Carminativus de Tribus, & qſt aliquoties multum præſtitit in abuſu Vini ad præſervationem variorum Malorum, quæſanta Urinum morit; ſpiritus cornu Cervi, Li quoque cornu Cervi uſucutatus, Eſſentia Eſſentiarum, &c. Curavi aliquando Podagræ, Paroxyſmo imminente, ſubito præterhebam ſpiritus ſalis ammoniaci, & ſpiritus Cochlearæ, ut temporaretur acidum. Conſilium erat ſuſſaneum: cogitabam de ſudore excitando, & continuando ſpiritus ſalis ammoniaci; ſed nil proſeci, pui ad ſudorem adigi non poterat; potius ſuperſenſitior adior Urinum doloriſſimum ob ſala victicia, quæ cum per ſudorem ſua diſcuterentur, per uſum deducendum, & evaneſcent podagra. Sic egregia ſunt *Lumbicalia* in podagra ad diureſim, item arcum duplicatum *Myſſicis*, & præmiſſis ſiſis, eſt nobilio vel ſal ammoniacum depuratum, Botrat, ſal volatilis Succini, &c. E. g.

℞. Lapiſ. Caſer. trap. 3 lb.
Cornell. rubr. trap. 3 lb.
Sali volat. Succini gr. 20.
M. pro tribus doſibus.
Singuluris Pulvis Arthriticus.

Pellit etiam calculos.

Hinc Scarabæi, ſpeciatim unctioſi, German. *die blaue Mayen Käfer*, nobile ſuggerunt remedium ad podagram præſervandam, & curandam per Urinam, propter copioſiſſimum ſal diureticum, quod habet, utut cum Calore ſtagnantia operentur; *vid. ſuprà* p. 1. ubi de *Dolore Reum.* & BORELLIUS *Centur.* 4. *ſib.* 73.

Remedia Alterantia, quod concernit: eadem proſuſ hic conveniunt, quæ ſuprà art. 2. de *Dolorebus* in genere ſunt laudata, varia nempe *Narcotica*, *Aromatica*, & *Volatilia*, *Caleſcentia* vulgè dicta, quæ ſua ſuo volatili acium podagræ com invertent, & per tranſpirationem inſolubilem eliminare ſolent: quibus in ſpecie ſemper adungantur *Quæſicæ*, & appropriata, Chamaſyris, Chamaſyris, Iva arthetica, ſpiritus ſalis Ammoniaci, ſpiritus & ſal volatilis Lumbicorum, Carminativus, aliquoties in ſeptimana bibior ante prædium ad 40. vel 50. guttas, uſurpatis; item liquo Breuil, herba Thre, &c. Videatur SENNERTUS, RIVERIUS, WILLIſIUS, alii, ubi & plures inde conſtat formæ occurrunt.

Vel

℞. Rad. Ræſæ,
Ræſæ,
Coryſſylas an. 3 lb.

Chama el. β .
Herk. Salvia,
Melissa,
Chamaed.
Chamaed. an. M. β .
Samm. Rosmar. M. β .
Rosa. Jasp. β .
Galang.
Zingib.
Cinnam. an. β .
Sol. Tartari Inf. ad β .
 Incisa, & contusa includuntur coctulo.

D. S.

Nodulus articularis confortans.

Infundantur in vino.

β . *Herk. Chamaed.*
Frax. an. M. β .
Oncoid.

Fler. Hyperic. an. M. β .*Rad. Bryon.* β .*Serpipar.* β .*Liga. Nephrit.* onc. β .*Rosa. Jasp.* res. β .*Coff. artem.* viri β .

Incisa, & contusa.

D. S.

Species ad Cerevillum medicatam.

Includantur Nodulo suspendantur in cerevisia fermentata; vel Species inciliantur cerevisiæ à colatura ad huc calente ante fermentationem.

De *Salivatione* movetur dubium, annon & hæc aliquid visu conferre possit ad Radicem Podagræ extra Paroxysmum exhibendam? & videtur eam confirmare KERKRINGIUS *Spicilg. herb.* 18. Conferatur in specie SYLVIVS de *Arthritid.* β . 174. & sequentibus, & ROLFINGIUS *Ord. & Method. special. Commemor.* lib. 6. sect. 3. cap. 1. & WEDELIVS lib. 2. de *Medic. Facultat.* sect. 3. cap. 12. qui focellum Salivationis addit tæ Exemplis confirmant. Tentari possit, sed Malo nondum adeo confirmato: alias periculum esset ne magis adhuc offensas Articulis, & lacis Partibus nervis, Paralytici, ac Contractura acceleretur.

XIV. *Ex Tunc Chirurgus* *Podagris* pro Præservatione parum conferre videtur, nisi ordinariæ Excretiones, vel suppressæ, vel imminuæ sint; sicuti *sapè* Exemplum ex FORESIO lib. 29. *cap.* 4. allegavi de Arthritide quam plurimum Articulis, Tertiana Intermittenti succedente ex repressis hæmorrhoidibus, quibus denuo fluentibus Arthritides cessant. Quidam tamen *Scarificationes* *Podag.* iuxta pollicem, una, vel altera bora ante Navilioisim adornata, (se præservare aluntur, de quo vid. SALMUTH *Com.* 3. *lib.* 40. *Panacut.* ut alias, & hic Remedium sunt; parum quidem ea se proficiunt, nisi per acieles in voracibus, aut habitibus, aut vitam sedentariam agentibus, aut quibus Ulcera, aut similia Emiliaria confusata sunt, interdum conferant: In Senioresibus tamen non sine fructu in Cruentis excitantur, in quibus Parosyfnos Arthriticos egregie præservare solent. Præ cæteris in Ichthiaco Malo conducum, quoc in Sara excitati, vid. SCULTEIVS in *Arment.* *Takul.* ult. li. K. ubi præfians eius declaratur viam; nunc iuxta Popinem, secundum HILDANUM *Cent.* 4. *lib.* 75. nonne super locum affeclum excitati; nunc in Inguine, qui ratione WILLISII *Pharm. Ratioual.* lib. 2. *pag.* 450. Ichthiacam inveteratam per Ponticulum in Inguine curavit. Illustrat hunc in Inguine Ponticulum observatio, quam refert FEHR de *Scorzon.* *pag.* 174. de Muliere, Ichthide perniciat laborante ex impuro coenobitu, Bubone, quo ea affligebatur, per Appetitionem curato, Malum ipsum curatum fuit.

XV. *Articulis denique firmatis*; Lixivia pro Balneatione pedum, dum poros servant apertos, & Alkali suo acidum spiritum ferè evocant, de quo præter Experimentum conf. HORSTIIUS *lib.* 1. *Obs.* 3. præsertim si *Bacca Jauiperi* q. l. e. g. p. it. & *sal. Salis* aut *Rosmarini* p. 1. p. 10. p. l. aqua communis & *Lixivii* comm. p. 1. incolla sunt; aut

 β . *Bacca Jauiper.* β . β . *Herk. Rosmar.* M. β . β . *Serpilli*, vel *Thymi*. β . *Mayrana*, vel *Salvia* an. M. β .

Incis. & contus. D. S.

Species ad Pediluvium.

Coquantur in Lixivio pro Pediluvio, tempore vespertino sub introitu lecti instituendo. Sufficiunt Species pro tribus, vel quatuor vicibus. Post Balneationem Pes adhuc humidus Linreis involvitur tepidis, & æger lecto committitur. Videb. *Mem. Formalar.* Cl. 4. β . 12.

Præ cæteris conveniunt *Vinares*, & quæ iis parata Balnea & Fomentationes Pedum subinde repetuntur: vid. DURETUS in *Haller.* lib. 1. de *Morb. Intern.* *cap.* 63. & SOLENDER *lib.* 4. *Consil.* 27. quæ cum non semper recentia ruberi possint, quidam si licet utantur, in Vino, & Aqua coquant, Salivam, aliæque Nervina addendo. *Therms* huc pertinent, quæ eum Remedium externum saltem sint, Produclis morbolis levandis saltem conferre poterunt, ipsi Radiceutrophium in Corpore relida; unde incipientes Podagrici aliquale levamen exinde percipere possunt, confirmati nullum, quo potius Contractura ac Rigiditas Articulis se accelerat: vid. SENNERTUS de *Arthrit.* β . 17. Adhuc si adjuvamenti quid adferat, in Frigida potius quam Calida conferre videntur: Videatur TIMÆUS lib. 3. *Epist.* 7. & *Alia* *Soc. Reg.* Vol. 2. *pag.* 323. (F)

De *Transpiratione* quædam movenda forent, sed sufficiant hic ea, quæ refert, & per Experimentum confirmat TIMÆUS *van Guldenk.* lib. 7. *Epist.* 7. & 1. Castellus Melitenis Podagra afflicti appositus, anodynos est, videb. *observat.* BORELLI, & BARTHOLOMI, qui Castellus has Podagricorum Pedibus applicatos claudicant reterunt.

CAPUT IV.

De Lesionibus Gussu.

Restant adhuc inter sensus externos, *Gussus*, & *Olfactus*. *Gussus* nil aliud est, quam tactus Lingue specialis, & singularis, dum itidem fit per Nervos in delicata filamenta divisos, quæ ad superficiem lingue sub eia membrana delata conglobantur in similes papillas nervas, tanquam in capitula fungorum, seu corus lincum. Hæ ergo ratione suæ peculiaris texture ita sunt constitutæ, ut præter communia tactus objecta, ut durum, molle, asperum, &c. specialia à particulis filinis recipiant impressionem, seu motionem. Sunt nempe salinæ particulæ minutissime genium *Gussu* *stylum*, quæ ratione texture, rigide, acuminatæ, & diversimodè figuratæ, vehiculo aqueo imprimis dilutæ, se infundunt in linguam, ejusque modo dicta filamenta, & speciatim eorum papillas, variè movende filamenta, & scindendo, secando, &c. talem in iis motum efficiant, qui à nobis *Gussus* dicitur. Uno verbo: *Sapor* consistit in figuratone partium salinarum, quatenus nempe papillas lingue nervas pungunt, &c.

Solæ scilicet salinæ particulæ, nunc solitarie, nunc plures partibus materialibus intertextæ, adeoque plius minus, vel mutatur, vel exaltatur, vel retinetur, ea varietate talia exterræ vim obtinent impressionem certam in lingue papilla facere, indeque, quod nos vocamus, *varios Sapo* exhibere: hinc enim acida, & urinosæ, matius unoque texturam, sunt salia: acida particulæ aceti cum molo, seu Saturno calcinato jundæ in tantam texturam mutant, ut ex acutis quasi quadrata, aut oblongiora, & ita quodammodo aluminosa, sunt, indeque dulcem saporem repræsentant.

Res quo magis frigida, & magis salina affluit in Os; simile enim motum faciunt, ac si molo iterum edere vellemus, & ideo pro masticatione saliva affluit.

Ledius Gussus, cuæ propria lingue alia, dupliciter: Vel

1. Quando *dominatur*, aut *Abster*, ita ut parum, vel nihil gollare possimus.
2. Quando *depravatur*, ita ut res, & objecta quædam alienum saporem, quam naturaliter habere solet continuis in ore repræsentent, eumque potridum, & fixatum.

AR.

(F) Cf. H. mbergius *Paradoxum Regis Scientiarum Academia anno 1710. proposuit*: Rheumatismum nempe curari posse Balneo frigido, Balneo calido, & Sudore. *Frigo* quidem, vel *reperit* *ferosiatem* *acrem*, *aque* in *muta* *pru-*
rum, (*que* *est* *Causa* *Rheumatismi*) ut à *Penis* *refovetur*, vel *non* *ferosiatem* *ad* *Articulis* *acrem* *impedire*
Calore *vari* & *Sudore* *transpirationem* & *edulcorationem* *ejusdem* *ferosiatem* *procurare*.

ARTICULUS I.

De Gustu imminuto, & depravato.

C A U S A E.

Imminuitur, vel aboletur gustus:

1. *Vita spirituum Animalium* ad linguam distribuentur, qui vel vicio Conformationis Nervorum penitus in Lingua deficiunt; quale Exemplum habet COLUMBUS in sua *anatomia*, de quodam Viri, & Carbonum vorace, qui varia sine gultu ulla devoravit, in cuius Anatome post mortem invenit Nervos naturaliter ad extremitatem Lingue derivandos, iuxta Spicam Dorsi pollicaria versus relictos; aut quando prater hoc in apoplecticis, paralyticis, &c. Affectibus Gallus Linguae Laditur, in quibus casibus cum Sensu Tactus, & Gustus (est enim Gustus Tactus lingue specialis) etiam motus lingue simul plus minus perit, qui ablati, cum Voces articulares nequeant, *loquela amissa* appellatur.

II. Laditur gustus, quando *Lingua* ejusque Fibre nervae, & speciales harum extremitates papillares, a nimia eaque vitata lymphâ irritantur ita resolvuntur, & ob Atoniam ita relaxantur, ut flaccidae, ac molles, & quasi paralyticae, minus ab objectis lapidis moveri, & horum impressio percipi possit, pariter atque odoratus; unde etiam in Gravidine, & Coryza graviore, aliisque affectibus Catarrhalibus, dum Os contiguum copiosâ, tenui, salique lymphâ scatur, cum Coryza, prater nistidum deficientem, simul etiam gustus, aut imminui plus minus, aut aboleri solet.

Depravatum quod attinet *Gustum*, in quo objecta peregrino videntur affecta Sapore, sic hic imprimis vitio *Saliva*, vitiis recemtus, & humoribus variis, vel Sale imprægnatâ, quæ nunc per se, nunc rebus gustabilibus sub Masticatione permixta, Organum gustus simul afficit, & inde talem Saporem vitiosum lymphæ imprimit: Hæc in Ulcero, iniquiora Saliva, omnia assumpta obducere videntur amaricare: hinc similiter in Scorbuto, & male Hypochondriaco omnia plus minus accrescere, aut talscere; in Catarrhis omnia assumpta plus minus falsa mutataque apparere solent. Quo fortè *Purulentum* Gustu referendus est. Interdum Sapore putrido, & ferè inexplicabili, & quasi cinereo, objecta infecta videntur: id quod se imprimis, quando unum alterum ve Vicerum internum Ulcere aut Aphonia incipiente laborat; in his enim à purulenta illa infecta Saliva Saporem cinereum, & putridum repugnantem facit, uti subinde fit in Plethorâ similibusque Morbis, quatenus nempe Lympha Salivales similes corruptiombus inquinantur, ita ut ferè semper gustus depravari causa in Saliva inquinata investiganda sit: at hinc est, quod observavit MEARA pag. 166. in *hist. Med.* Gustum depravatum, ortum ex anxi ulcere, forsitan potius succedere ad Os delato, quem tamen ipse curavit per Topica auri admoda. Rarum est, quod refert DEODATUS in *Palatid.* pag. 172. de Sapore amaro to apice lingue perceptibilem; idque ex affectu Hypochondriaco.

DIAGNOSIS.

Affectus hi faciliè patent ex *Aggravatione*: uti etiam causæ antecedentes per eandem. & per accidentia circumstantias, aut Pathemata manifestantur. Ubi enim adiunt simul aliaque Operationum animalium laesificationes, de affectu paralytico non est dubium: in adit simul vitium Catarrhalis, verbi gratia Coryza, vel Raucedo, & similes deflectiones, res est *linguae*, *Causa*que gustum depravat, & salivam inquinat, ex affectu admo per se patet: Sic in Ulcero, Scorbuto, Putredine Oris, &c. faciliè patet affectus primarius, unde affectus saliva.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: Gustationes in Catarrhis per se nullum periculum portendunt, quibus curatis sponte cessant. Idem de aliis enarratis hæcenus gustus vitiis sententiam. Sin verbò inveterata sint, difficilia sunt curatu.

Tom. II.

In *Cera* caulæ sunt removende, & Fibrarum lingue delitus Totus Nervinus restituendus, & cohercendus, aut Accuribus quali stimulus in *Immunisatione* esse, aut *alutina*: illis ad catarrhum respicendi esse habendus; Hic verbò nervina varia, & aromatica conveniunt. Pro pollicem feno po in specie *Raphanus* ante paltum misuratus, & multatus Gustum acuit, & eundem deficientem quasi sensibilem reddit, teste HOFERIO in *Hist. Med.* pag. 75. HARTMANUS *Gargarismum* habet, & etiam *Limonium* egregium ad Gustus læsionem, quæ videntur in *praxi ipsi Chym.* cap. 15. §. 3. & 4. Egregius quoque est *succus Ascorbici*, vel *salis*, vel est ana succi *Acetici*, & succi *Portulacæ*, cum ana *Sacchari* paratus *Syrupus*, confert multum ad abolitum Saporem, teste ZACUTO LUSITANO *lib. ult. prax.* cap. 2. num. 10. quoniam Os de lingua tulando albienda, & abstergenda: quin & si deglutatur, nihil incommodi affert, sed Ventriculum simul egregiè abstergit. Quod si verbò Gustus sit depravatus, e.g. in Ulcero, ita ut omnia videntur amara, falsa, & similes, in specie tunc convenit vomitus: quo premisso stirpatur *Serum Lini acidulatum* cum succo Niri, vel cum spiritibus quibusdam Mineralibus; vel etiam quæcumque acida conveniunt in Gustu nimis amaro, nam lecus ac *radix Cichorii* condita, item *Rosmaria*, vel *radix Gentianæ* cerebrâs affrida, eundem juvant. Lucum etiam habet *Gargarismi*, item *Limonium Hartmanni* iam allegatum. Sed curantur hæc vota optimè, curato primario Morbo. Hinc postmodum nervinis appropinquat partium aerofarum lingue Totus restituendus, & corrigendus.

Sed quæ in specie linguam morantur, ejusque sensum, & motum restitunt, sunt *nerulina*, & ea, quæ alias etiam ordinatim in *Aphonia* & *loquela amissa* applicati solent, quæ hac occasione jam tractabimus.

ARTICULUS II.

De Aphonia,

Distinguemus autem est, propriè loquendo, inter *loquela amissa*, & inter *aphonia*.

Aphonia est, dum Vox nulla datur (G): id quod fit vicio *Laryngis*, ejusque *Muscularum* movementum, aut paralyticorum, aut convulsivum, aut minus bucculorum, hæc namque ratione in *Pallione Hysterica* Mulieres Aphonæ saccit, uti etiam fit in *Aplexia* gravi, Paralyti, Malo Hypochondriaco, & *Pallione Hysterica*, ubi *Ægri* novam omnimodam patientur Aphoniam, propter convulsivum musculorum *Laryngis*, Cartilagines movementum, quam convulsionem percipientes quasi Laqueo Fauces constringuntur, molestiam se percipere afferant, ac si collum ipsi torqueretur.

Loquela verbò *amissa* fit vicio *lingue*, quando quidem immotus Vox, id est incondita, à *Larynge* formata ad motum lingue, five ex toto, five ex altera saltem medietate paralytica, plus minus amissum aut non sufficientem, in Verba articulares nequit, aut alia lingue vitia plus minus exhibent: quæ in *aphonia* lectus se habent, in qua nullum lingue vitium, præter in quod motum, observari solet.

Aphonia dicitur aliis *Anaphonia* (H), quæ HIPPOCRATI sunt distincta, a modernis verbò confusanda: *Aphonia enim* HIPPOCRATI idem ac *Aphasia*, cum *Aphonia* nomine intelligat illos, qui ne motum quidem nullum præteritum five voluntarium retinent: *Anaphonia* verbò eos, quibus vicio *Laryngis* Vox deficit: Vid. GORRÆUS in *Definit. Med.* pag. 57. & pag. 81. *Aphonia* illa, prout communiter accipitur, fit ex vicio *nerorum* & *Muscularum*, nunc *palmarum*, nunc *spasmodica*. Quoad vitium paralyticum, *aphonia* fit frequentissimè à Paralyti *Muscularum Laryngis*, five hæc vicio *proprio*, five vicio *nerorum* recurrentium ad eos distributorum, accidit: Nam in Cambis difficiis, vellicatis illis Nervis, Aphonia in promptu est: sic videmus non raro *aphonia* fieri, qui magno *Rantidus* laborant. Id quod fit probabiliter à nimia humiditate, & consequenter resolutione *Muscularum Laryngis*, ut flaccidi fiant, & impotentes ad motum. Manifestum hujus rei Exemplum est, quod refert TULPIUS *lib. 2. cap. 48. pag. 71.* Hinc etiam *radix Isagula* cujusdam ob abundanti Phlegma, qui anno duodecimo

Y y y demum

(G) Aphonia d'ane, Vocis privatio: ab = privative, & tunc Vox.

(H) Paraly Anaphonia, Vocis privatio: ab = privative, & vult, Vox. Hinc anaphonia, Mutus.

demum loqui cepit, teste AMATO LUSITANO centur.
6. curat. 5. Pertinet hic etiam *Crepula*, subinde Aphonia
inferior paralytica: Videat. HOECHSTEDTERUS
Dissad. 3. cap. 9. Quo etiam facit Aphonia ex *causa alba*, &
iode contrahit vitio Nervorum paralytica, quam refert
POTERUS centur. 3. cap. 12. & iam olim notata Observatio
GALENI, quam videt. in SENNERIO lib. 2. prax. pag.
354. Sic ex *Terrere*, Nervorum vitio oborta aphonia per
apoplexiam, vid. in BARTHOLINI *Art. Med. Hagiensis*,
vol. 1. observ. 101. pag. 193. Curiosa etiam est aphonia
Paralytica ex *Glabris plumbeis* per Vomitus motu, indeque
recurrentes Nervos deprimente, de quo vid. DEODATUS
in *Volatilis*, pag. 97. Ut tacitam Nervos Recurrentes, quovis
isolatione *abscessus* vel *refluxus*: Conf. SENNERIUS lib. 2.
Prax. part. 3. cap. 4. pag. 355. Observari etiam Aphoniam
in Virgine, quæ cubans mox in Hypocantho, ac iacuerit
durmiens; ob *extinctum* vultu Lampadem ex *Ulcere strabum*,
& *hæmo* fuit successu inspirata, altero mane iurgens, cæ-
tera sanissima, aphona erat. Videbatur subinde vitium quod
paralyticum Laryngis esse, quia Muscularum ea illo sumo inspi-
ratione laesum. Curabatur per Eleutherium et Scordio pul-
veris cum Melle excepto, crebris assumpto, & deglutito.
Atque hæc Aphonia ad constitutionem Nervorum &
Muscularum paralyticam pertinet, si non Paralytica Apople-
xia accedat, & hoc cessante etiam aliquamdiu affligat,
sive sine eo, aliis foodiciis omnibus salvis, Aegros sub-
lebat prehendat.

Quoad alteram aphoniae fundi modum: hunc ex convulsione
Muscularum & Nervorum Laryngis fieri insinuat. Observa-
tur tamen crebro talis in graviore Paralytica Hysteria, in quo
Aphoniae incit. Aegre, pariter ac Epileptici convulsiones
sæpius Aphonia supervenit. Speciatim vid. hic
Epileptica aphonia per Paralyticam curata apud HOF-
STEDTERIUM Dissad. 4. cap. 1. & Conf. *Calus paralyticus*,
nempe cap. 2. §. 40. Item ex *Periculis* in *Ventriculo* & *intestini*
subinde Obstructio obstruitur, teste FORESTO lib.
2. observ. 28. Schol. & lib. 14. observ. 33. Schol. Noti nempe
varii spasmodici affectus sunt, occasione Vermium obve-
nientes. Pertinere etiam hoc videtur curiosi observatio in
BARTHOLINI *Art. Med. Hagiensis*, vol. 1. observ. 16. pag.
170. Nam ex contrahitione sensu in loco affecto Spasmodi
Nervi recurrentis adfuisse probabiter concludi potest. For-
san & hoc pertinet aphonia ista mirabilis M. A. N. C. ann. 3.
observ. 121. pag. 193. Ipotus sua ex improviso aligens, &
sponte sua denotatam accedens, &c. Nempe vix pa-
ralyticum, sed potius convulsivum quid suble videtur.
Foran etiam hoc pertinet aphonia suborta ex *venena* gen-
tiana virulenta, *Fenitibus* in *jugulis* apertis curata, apud
ZACUTUM LUSITANUM lib. 1. prax. admir. observ. 97.
Nempe acce Luis Venereum facile Nervos Recurrentes
vel Musculos Laryngis irritando, ex Spasmo Aphoniam
inferre potuit. Quoad Aphoniam in *Febribus* interdum super-
venientem: res dubia, an paralyticam potius, an convulsivam
vitium sit? Sanè quantum colligere valeo, ad convulsiva
vitia potius referrem; nam & quæ in *Parulis* non raro ob-
servatur aphonia (vid. HILDANUS centur. 6. observ. 14.)
ex convulsione Laryngis potius esse videtur; cum convulsi-
va Pathemata non raro in illis observentur: dum scilicet
acce Veniarum Venenum, Nervos Recurrentes irritando,
ad Spasmos illos cogit: sicut *Tasim*, *Rancidum*, ac bus af-
finia, *Aperæ* Arteriarum ac Laryngis Mala, eandem inferunt.
Sed præter Paralyticam ad convulsionem etiam *substantia spi-
rituosa* *Phosphorica* ad aphoniam disponere valet: sicuti vide-
mus, quodam *simile Terrere* peracule plane quasi obstruere.
Pertinet hoc mirabile exemplum *an. 1811* ex *viti* Cancri in
M. A. N. C. ann. 2. observ. 145. pag. 329. & ann. 3. observ.
127. pag. 341. Præ quo longè curiosior est *substantia ista apho-
nia*, cum perfecta in toto corpore *anæsthesia*, omnibus em-
teris, tam Vitalibus, quam Animalibus, functionibus sal-
vis, in M. A. N. C. ann. 3. observ. 121. pag. 454. quæ omnia
tamen Symptomata beneficio *Venerum Rancidarum* *substantia*
brevis evanuerunt. Revocarem hoc observatum in du-
bium, nisi ab Autore, Viro fide digno, DANIELE LU-
DOVICI, fuisse relatam.

P R O G N O S I S.

Quoad *Prognosis*: Aphonia *juventa* aphonia difficilior cu-
ratur, ac interdum *diuturna* esse solet.

Quæ *enim* *juventa* sunt aphonia *passiva* sunt, auctore HIP-
POCRATE.

Idem profluvio Alvi maxime corripuntur, teste HIPPO-
CRATE *lib. 6. §. 34.* & hoc ipso serè sanantur.

Aphonia per se & *salutaria*, modò citè transeat Aegri,
successu curabiles sunt.

C U R A.

In cura ad primariam Morbum, cujus Symptoma est apho-
nia, ubi faltem ad eam causam Antecedentem, respiciendum,
ut hic remotis facilius prædicti Symptomata fiat Curatio.
Pro quo curando ad Laryngem & *ap. Musculos*, ac Nervos
Recurrentes imprimis respiciendum, tam eorundem Paralyticam
undequeque natam, quam Spasmodi ex omnia irritatione re-
movendo, insensu per *Volatilia aromatica* & *serena*, aliis
Cephalica dicta, ex gr. spiritum Salis Ammoniaci callo-
reatum, succiatum, spiritum Corvi Cervi succiatum,
& subinde *Sadum* simul proutendo, & etiam *Pyralium*
Masticatoris proutendo. Imò in contumaciori Malo præ-
sertim Paralyticæ, Diata *siderifera* ex Lignorum Decoctis
insultuenda venit.

Hinc extrema remedia Topica Collo, & imprimis regio-
ni, ubi situm est Larynx, sunt applicanda, *spiritus* nempe
& *serena* appropriata, quæ inter est Insulum Majorum,
florum Chamomillæ, Lavendulæ & Salviz cum spi-
ritu Vini paratum, quod sub forma Foculi cum Lintheis multi-
plicatis calide antè regionem Collæ crebris donec Vix
redierit, admoto, aliquoties Aphonia curavi: aut Sacculi
ex Nervinis Aromaticis, spiritu Vini irritatis, crebris
Collo applicandi; vel Aqua Articularis ad extrâ, maritata
cum Essentia Calorei, aut spiritus Apoplectici cum spi-
ritu Lumbriorum vel Formicarum eodem in loco calide
cum Lioteis multiplicatis applicandi; aut *Oleum* *destillatum*
serena, Succini, Lavendulæ, Rutæ, Juniperi, cum The-
ruca permixta, ac cum Balsamo Peruviano subacta, ibidem
frequenter illudenda; aut etiam Essentia Calorei, vel Is-
laria, vel illis sociata, assiduo admoveenda: Item

Idem *Herb. Salmar.*

Residuum *ad M.L.*

Sem. Eruc. 3i.

Coqu. in l. q. aqua simpli. in Vase clauso.

Colat. B. & adde

Spiritus *Ceraf. nigri* 3vi.

Sal. ammoniac 3i.

Mell. Anthrac. 3i.

M. pro Gargarismate

D. 3.

Singulare Gargarisma.

Convenit io Aphonia, Laryngis affectu, post Parasyti-
mam Apoplecticam.

Pro quo omnium meliori successu, ubi circumstantiæ
aliæ permiserint, & *Phosphorus* sub Lingua interdum insinuat
potest.

A R T I C U L U S I I I.

De Loquela amissa.

Loquela amissa est, quando Sonus & Vox formatur qui-
dem a Larynge, sed ob motum linguæ, aut amissionem,
aut non sufficientem, Vox formari & in loquelam articuli
nequit. Vitium hoc Paralyticum & Apoplecticum imprimis fa-
miliare est, & sobet Paralyticis linguæ major vel minor, ad
quam pertinet iuxta modo *disturbat*, ex deficiente itidem sui
impedito linguæ motu oritur.

C U R A.

Hic affectus curatur in specie Aromaticis Oleis, aut *si-
rinosis*, linguæ exteriore admoce. Convenit hic deco-
rum Gallurici, Salviz, Hyssopi, Pyrethri, Zingiberis
in Aqua & Vino, quo ipso linguæ vel faucibus elandis, vel
etiam insar *Gargarismatis* applicandum. Porro Decodum
Salviz, & Erucæ vel Sinapi in Vini paratum, propter hæ-
jus volatilis acce, à quibusdam tanquam singularæ Arænum
commendatur. Item Decodum Pulgii, & Nasturtii in Vi-
no: quæ possunt acui cum Salibus volatilibus, ut in Ore de-
tuta melius penetrent; e. g. in perniciosa Malo:

Idem *Herb. Rorismar.*

Majoran.

Salv. ad M. l.

Rad. Pyreth. 3i. ad 3ss.

Sem. Eruc. vel Sinapi 3ii. vel 3iii.

Caryophyll. dr. l.

Coqu.

Coga. in l. q. aquae simpl. in Vase clauso:

Colat. 3i. ad 3i.

Spiritus Ceraf. nigr. vel Succ. Junip. 3vi. ad 3i.

Sol. ammoniaci cum terebinth. vivo, vel

Caryophyll. 3i. ad 3i.

Mell. ambros. 3vi. ad 3i.

M. f. Gargarismus: S.

Gargarismus Confectivus.

Præ cæteris Salviae succus in Linguae Paralyti & Loquelae amissa commendatur, si eo fricetur Lingua frequenter; cui tamen Pulvis Calorei aut semeo Sinapi contitulum commodè addi possunt; Nam sic etiam frictio Linguae cum Theriaca, addito Pulvere feminis Encae vel Sinapi, quibusdam commendata esse solet. Pro Gargarismo hoc commendat STOCKERUS cum frequenti Millura:

℞. Salva.

Rosae,

Acori, an. M.

Coga. in l. q. aquae;

Colaturæ addæ

Ozym. ignit. 3i.

M. pro Gargarismo.

Hinc

℞. Sem. Ervae,

Squille,

Copar,

Api. 3i. 3i.

3i.

Trilium Piper.

Cinnam.

Nuc. Mosch. an. dr. i.

Spis. Diambre.

Dis. Mosch. dule.

Di. ambros. an. 3i.

Cum l. q. aquae Vita C. Mixture crassiuscula pro illitione Linguae & Palati.

Porrò in *afflictibus Paralyticis aut Apoplecticis* præ cæteris Olea destillata, spiritus aut aquae spirituosae, & essentiae penetrantiores, sunt egregiae, v. g. essentiae Florum Anthon, Salviae, Lavendulae, imprimis Essentia Calorei, quae est expectum Remedium in aliquot Apoplecticis, cum Penna sub Lingua illata inferius iuara locum Fræniuli, aut ubi Nervus for. motores. *Cafferaum* ipsam sub Lingua detotum, & omnia ea eo parata, uti in Loquela amissa, ita etiam in aliis Loquelam vitis, in speculo *Balsamo Infusum aut Purpureum* corrigenda, & quando tardius loqui incipiunt, multum conveit: in quo afflato Masticato Nactis Moschatæ eam confert. Fortius est, si Essentia Calorei fiat cum spiritus Vini, Sale colatili Coros Cerri aut Succini imprægnata, quæ Linguae illata, vel sub Lingua applicata, ad restituendam Loquelam & paralyticis Linguae affectibus est egregia. In specie spiritus Ceraiorum nigrorum, acutus cum aliquot guttis Olei destillati Caryophyllorum, apici Linguae illatus, aut Ori infusus, in malo sibi Apoplexia est admodum efficax. Alias etiam Oleum destillatum Anili apici Linguae frequenter illatum tanquam singulare Specificum ad Linguae Paralyti & amissam Loquelam ab HARTMANNO laudatur. Conducit etiam spiritus Vitræoli Cephalici, multus cum ana vel duplo spiritus Ceraiorum nigrorum, Orique infusus ac probè Linguae applicatus, est egregius. Quo pertinet spiritus Theriacalis camphoratus, multus cum spiritus Buccarum Juniperi aut spiritus Liliorum convallium, & similia perperantia maxime profant: Nam secus ac Oleum destillatum succini ad gutt. viii. cum Aqua Majoranae vel Liliorum convallium, vel cum Aqua Lavendulae & Salviae, Ori infusum est admodum efficax. Vel fricetur Lingua cum Theriaca aut Extraculo Theriacali. Vel

℞. Mithridat. dr. iij.

Extr. Caffor. dr. iij.

Olei destill. Lavend.

Succini,

Anis. an. gutt. iv.

M. pro illitione aut frictione Linguae.

Conf. M. A. N. C. ann. 1707. ann. 4. & 5. lib. 12. pag. 137. & ann. 6. & 7. lib. 12. pag. 132.

Uterius lo uis etiam sunt *obstantia* sub forma Lituum Linguae applicanda, v. g. singulare *Balsamum* in Paralyti Linguae, loquela amissa, & cognatis affectibus à STOCKERO admodum laudatur, cujus crebrior fida est Experientia, nempe

℞. Mithridat. 3iij.

Rad. Auri cind. & subtilissimè trit. 3i.

Tom. II.

Singul.

Nuc. Mosch. an. dr. iij.

Salis. an. vel loco huius potius

Salis vel. Succ. dr. i.

M. omnia in Mortario;

quibus addæ

Succ. Salva. depur. 3i.

Mell. destum. q. l. ad consistentiam debitam

Electuarii.

Quod irroretur cum oleo destillato Anisi, Majoranae, Salviae, Aurant. Etc.

Satur quantitas Avellanae, tenetur sub lingua, sensum, ac sensum deglutendo, fricetur simul lingua aliquoties, tam in summatate, quam in parte inferiori iusta Fræniulum, donec loquela redeat, ad eujus defectum expectum est Remedium.

Si verò in *Sene* adeo difficilis loquela, opemum est suppositio Essentia Florum Lavendulae, infusa in spiritus Vini, de quo infuso propinquetur omni mane, & vespere sub introitum lecti 3i. Sane hoc ipso Remedio RULANDUS aliquando curavit loquelam amissam ex Paralyti linguam in Sene 16. annorum; sicut etiam in tali caso conveit Nuc. Moschata, si particula quibus probè masticetur, & in ore agitur.

Tandem cum diâis intervis subinde, & *externa* in usum vocanda. *Cataplasma* factum ex Fermento, addito simul Pulvere Succini alivae appropriatis Nervinis, Vertici impositum, experimentum est RULANDI in loquela amissa: sicut etiam oleum destillatum Succini Vertici, aut nuc. illitum; aut in Aqua spirituosae, vel Lavendulae, vel Salviae Linguae admotum, & crebro applicatum, iungit commendatur ad restaurandam amissam loquelam. Sic FORESTUS lib. 2. cap. 32. refert Paralyti linguam ex Catarro, præmissis Universalibus, per *Hyssacium* Nuc. applicatam curatam. Sic, & apertio Venarum sub lingua, subinde cum fructu institui potest. Conf. curiosa observatio M. A. N. C. ann. 3. observ. 51.

C A P U T V.

De Lesione Olfactus.

Usui proxime est *olatus*, cum usuarium maxime inter se consilium habeat, ita quidem, ut intentione Sapida odoratum sortier afficiat, & contra, uti in oleis destillatis, Salibus volatilibus, &c. apparet, adeo ut Tactus, Gustus, & odoratus nonnulli puta gradatione maior, vel minoris materiae immersione distinguatur, & Tactus diversimodè modificatur sit.

Organum huius Odoratus nobis probabiliter statueretur Processus Mamillares, sed parvis hoc videtur esse *numera* illa testera summatia Narium, iuxta confinia Ollis Griformis intris obentia, uti eleganter hoc demonstrat SCHNEIDERUS Tracl. de Offe Griformi; quon, & ex Analogia cum Tactus, & Gustus Organo de præsentia certarum Papillarum, ex Filamentis nervi contexturam, viz dubitandum videtur: de quibus tamen per Anatomem, simulque per armatos Microscopio Oculos, ulterius inquisitione est inquisito.

Dum ergo cum Aere per Inspiratione attrahio varia simul & innumerabilia naves subintrant *effluvia*, & *maxima*, ex quibuslibet corporibus, insensibiliter licet, emanant (adeo ut omnia corpora certam quasi fluxum, & degerminatam Atmosphæram circa se habere videantur); quendam eorum effluviarum ratione determinatæ suæ texturæ, & cooformationis infimans se diâis narium membrane, emque vellicando, pongoendo, titillando, talem in filamentis eius Motionem efficiunt, quæ adeo à nobis dicitur. Omnia enim corpora atmosphæram effluviarum habent; ut Major habet effluvia, nem succinum, probat attrahio Papillarum, &c. Rea odoratæ etiam talem Atmosphæram habent.

Particula talem quæ habent texturam, & cooformationem mechanicam, ut possint banc membranam evulsa Filamenta nervi movere possint, sunt ex, quæ communi nomine *Sapida* dicuntur, & Sulphureæ, seu Pinguis sunt nature. Nam via Odorem habemus, qui non ex Sulphure tali oratur Principio: unde, & prout Particula tales Pinguis, seu Sulphureæ, ex casula cum aliis, speciem

Yyy 2

Sal-

Sanguis, Particulis, mutant tactum, & vel volatiliantur, vel figuntur, aliave ratione immutantur, *adorem* calurgit variatur: Hinc ver. gr. Molibus Odoris aspersi, si in Latrinam inspidantur, Sulphurem Particulam se iterum insinuant in Molibus: Oleum Terebinthinæ suavitatem cum Floribus Sulphuris recte combinatum, ferissimum Balsamum Sulphuris constituit: Precipitatum Sulphuris, vel Scoriae reum Regem Antimonii, cum Aceto Fumorem contrahit: Spiritus Salis Ammoniaci urinosi saporis, & odoris cum Marte inodoro combinatus, Croco, aut Floribus Calceolae, maxime similem repræsentat odorem.

Lædunt Olfactus tripliciter:

1. Quando immixtus, Odoratuique est nimis hebes: Aut
2. Quando omnino aboletur, ita ut parum, aut nihil odorare queamus.
3. Quando depravatur, dum Odores alieni o speciem putridi, & foetidi, qui non sunt in rebus, contrahit ab odori odorari videntur: id quod fit in *Naribus Narium*, imprimis in Vite Venereæ interiora Nali occupante; item ex *lucis dentium* foetibus, & eorumque Putredine, & similibus vitis: de quo Odore depravato, cum, curatis his exulcerationibus, sponte cessare solet, nihil amplius monendum est.

ARTICULUS I.

De Olfactu imminuto, aut abolito.

CAUSÆ.

Imminuitur, aut aboletur Odoratus, triplici ex causa: primò ex *vitiis cerebri*, ex Nervorum non dimittentium spiritus Animales in Organum Odoratus, verò gratia in affectibus Apoplecticis, Paralyticis, & quando contra est spirituum imperio convulsivi quid patitur Membrana Narium, Olfactus Organum, ut fit in Epilepticis Motibus, & Vertigine Caduca, in quibus obiectorum impressiones percipere nequeant: Ægri propter ipsam Membranam Narium internum, unde Olfactus ad tempus aboletur. Item *abstructis* *membranis Narium*, & hinc indurata filamentorum nervorum ex Dura Matre per Os Cruriforme in Nares protrusum (de quibus SCHNEIDERUS de *Osse Cruriformi*) compressio.

2. Imminuitur Odoratus plùs minùs ab *Membrana laesa*, ipsam nempe, quæ Narium luminitatem fœcungit, ac Odoratus primarium Organum videtur, siue lædatur à causa interna, siue externa, à *causa interna* quædam, quando eadem nimis humectata, & à copiosiore Lympha itrorata, ac nimis relaxata, frequentissimè Odoratum abolet, aut imminuit. Uti etiam naturaliter hæc Membrana mader blanda Lympha pro facilitatione Odoratus, ita hæc ipsa nimis humectata inepta fit, quæ impressiones odoriferas recipiat, cum ex Paralytica quali constitutione, qua Fibrae eius nimis relaxantur, & humectantur ad insipulum, vel ita dum rerum odoriferarum immobiles fœc sunt, & ipsi quoque Animales spiritus eo delati à copioso humore inquinantur, segnes, ac plùs minùs torpidi redduntur; unde consequenter cessat Olfactus. Hinc in Coryza, & gravellina, ac similibus affectibus Narium, & capitis Catarrhalibus, in quibus humectata nimis Nares fuscigunt Membranam Odoratus omnino aboletur, hinc in constitutione Aeris Agulonia, seu humidiori, & frigida. Odoratus insigniter hebetatur, unde etiam Causæ venatorii tunc temporis nimis fugaces esse solent, cum eorum Odoratus hebetetur, ut referunt Venatores; ut minus fortis exiit, Coryzam, & Gravellinam quod attrahit: curis hanc notum est, quid ordinari, quando diurnis effluit Lympha Catarrhalis per Nares, cessat Olfactus.

Inter causas externas Membranam ludentes est contritus nimis feret Olfactorum Olfactus, aut etiam stertitatorum abstinere. Ab his enim feret odorantibus, & Narium Membranam nimis stimulantibus ex forti impressione, & hinc spirituum Animalium nimis Motione fit, ut postmodum leniora obiecta, vel emittit non, vel saltem parum, sentiant, quatenus in Tono suo vitata est dista Membrana, vel id eam Camporata erabrijus odorata Olfac-

tum lædunt, quia vis eius odorifera est penetratissima vid. BARTHOLINUS *anat. a. hyl. 91*. Univeriale nempe hoc est omnibus sensibus externis, ut ex fortiori impressione, & Motione ab obiecto facta in Organum huius huius læsio, & sicellat ejusadio, unde nonnulli à valdo obiecto postmodum moveri, & sensus Impellus excitari possit. Sicut enim splendor intensus Visum lædit, sonitus Audium: simili ratione feret odoriferis trebrilis Naribus adnota, Olfactus perfundatur, quatenus lacerando quasi destruant Membranam Odoratus Tonum. In specie dum ista feret odorantia, aut acris Membranam ferentia, ita alterant Membranam, ut postmodum leniora obiecta, vel omnino ooo, vel saltem parum sentiantur, imprimis stertatationibus crispata, & quasi convulsivo motu affecta, Narium Tonica exendo in Tono suo ita vitatur; ut nonnulli fortissimorum obiectorum impressione Fibras ejus moveat. Observe hoc in Itali, qui feret semper fecum gestant Pulverem stertatatorium ex Nicotiana, & quotidie cum Narium insulstant, necnon aliis honoris gratia offerunt; hinc in his continuato abusu horum Pulverum cessat tandem feret in totum Odor, adeo ut dum nos Germani ex simplici stertatatorium odore, aut ejus tamello, ad stertatationem movemur, Itali, copiosè licet ingerant, nullam tamen stertatationem sentiant, & graviter odores percipiant: unde & idem Itali interdum in junioribus annis cum immixto Olfactu hebetudinem Visus patiuntur, cum stertatationes nocent Oculis. Conveniunt ergo stertatatoria in quibusdam affectibus, sed nonnulli moderato usu.

DIAGNOSIS.

Signa odoratus deficientis ex relatione Ægri perspicantur, sicut causam diversitas ab eodem, simulque insistentis circumstantiis aut Pathematicis aliis, facili colligitur.

Nempe affectus Apoplectici, & Paralytici per se notifunt: Membranam Narium esse humectatam, aut ex erectione, aut ex affectibus Catarrhalibus patet, imprimis quando Lympha desilians est copiosa, tenuis, &c. ut fit in Catarrhis.

Deoque abesse Odoratum, & Pulverem stertatatorium etiam ab Ægro inquirendus est.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: pro varietate causam alicui, vel minus periculum imminet ex Olfactus læsione. Hinc qui læsus odoratus fit ex vitio Lymphae Catarrhalis, curatur faciliè: Nam curato Catarrho, facili cessat: Sin vero odoratus læsio sit antiqua, præsertim ex causa ætrotis nimis odoriferis, in Membranam Impressionem scienditibus, indurata, talis raro, aut omnino curari solet.

Porro quando Æger in Morbis acutis odores non consuetos sentit, utur non adnot obiecta talia odorifera, v.g. quando percipit odorem Piscium putridorum, Luti, Butyri rancidi, &c. mala signa, & ferè satum portendunt.

CURA.

Cura pro varietate causam variat, nempe omnis causa removenda: adeoque.

1. Pathematica cerebri, & Nervosi generis tollenda.
2. Affectus Catarrhalis curandus, & hinc Membranam Narium Nervinis aromaticis in Tonum naturalem restituenda.
3. Externa quælibet, præsertim obiecta nimis odorata, maturè sunt removenda.

Præmissis ergo præstutendum, & pro causam varietate variantibus, pro restituendo Olfactus, imprimis duo excellunt, *Majorana*, & *Nigella*. *Majorana* quidem, & quælibet ex hæc parata remedia, tam interna, quam externa, conducunt; Si novi Mulieres, quæ ut semper sunt Medicallæ, Coryza laborantes cum Olfactus, & gustu perditis, interit fumum Cochlearum unum Majorana, arctatæ cum Cerevisia, vel alio Vehiculo cillido, idque summo cum levamine, & hoc copiosioris sapre egregiam, & optimam fuit opem: Si etiam extractum Majoranae ceu expertum remedium laudatur ab HARTMANNO, si omni mane, & vespere usurpetur à gr. vii. vel viii. ad ßs. item essentia Majoranae cum essentia Pulegii missa, vel extractum Majoranae cum Saccharum missum, addendo aliquot guttas Olei desiliati Majoranae, in forma Elmoacchari, vel Rotularum accipitur. Conveniunt etiam Pulegium, *Rafaniscum*, & ex his parata Olla, *Assinia*, &c. Hinc etiam Balsami

Majorana ex ejus Oleo destillato fustus, Naribus illitus præ reliquis confert; Vel narspercuti oleum sequens;

CAUSÆ.

Æ. Ol. Nigell.
Dose an. ʒss. vel ʒi.
destill. Mapp. ʒss. vel ʒi.
M. D. S.

Oleum ad Nasum.
Quo ipso illinantur interiora Narium. Conveniens in specie est in Odoratu deperditio, speciatim si simul ex affectibus Catarrhalibus ad obstruendum summum Narium, in tali obstruione viri habetur melius Remedium hoc ipso Oleo. Quid si volumus hoc reddere acris, addi etiam possunt aliquot guttulæ Olei distillati Anisi, & Succini: Vel fiant etiam Noduli Olfactorii ex Majorana, & Semine Nigellæ; v. g.

Æ. Herb. Majoran.
Sem. Nigell. contr. an. p. ii. vel ʒi.
Irroratur aliquot guttulis
Ol. destill. Mapp. vel Anisi.
C. l. a. Nodulus cum styro,
qui subinde Naribus admoveatur.
D. S.

Nodulus ad Nasum.
Egregie confert.
Denique in odoratu deperditio experimentum PETRI CASTRO sequens laudatur:

Æ. Sem. Nigell. in Aceto feruss. infus. & postea effus.
Intro;
Fumus.
Custor. An. ʒi.

Subtilissimè trita, leniter subigendo miscantur cum Urina Puellæ, ut fiant in forma Mellis liquidioris, seu Syrupi consporis.

Hujus omni mane stomacho jeuno quinq; vel sex guttas Ægri atrahaliter per Nares fortiter, & postea Caput versus posteriora inclinent, & in Ore Aquam calidam detineant: continuantur ad p. 6. s. vel 6. dies, donec Egregio Odor redeat.

Plura qui vult de Nigella in usum hoc contra Obstruendum Abolitionem, videat T. ABERNETHIANUM de Nigella.

Alias in Abolitione Olfactus etiam Menstruorum solis acutis, & feribus albis fusi forma Extracti cum Decocto Rutæ, Majoranæ, Abrocini, & Nigellæ, interno usu laudatur: sicuti externè eodem Decocto Menstruari Caput efflavandum.

Denique Saffron ex Succino, item Gummi Anisæ, vel ex his duobus mistis, dum Catarrhis sistit, etiam deperditum Odoratum nonnihil restituit. Forsan, & Suffitus ex Spiritu Salis Ammoniaci, & aliis Volatilibus spiritibus, Nervinisque penetrabilibus, nonerit inconveniens.

ARTICULUS II.

De Polypo-Narium.

AD Nationem Obstructionem pertinet etiam Polypus, qui est Sarcoma, seu excrecentia carnosa in Naribus, ex eorum summisque protuberant, & Nasum nunc repleto, nunc in Fances usque decedens. Ad formationem Polypii plura ita dicitur, dum molles est, & laticæ, & tunc uno, & tunc pluribus Radiculis, & Pediculis in loco, ubi excrevit, Naribus se affigit.

PARS AFFECTA.

Pars affecta, seu locus unde excrevit, sunt omne, idque rarius, Membrana glandulosa in summitate Narium, nunc, idque frequentius, sunt Filamenta carnosa ex Spongiosa oppletia, ex quibus nunc uno, nunc pluribus pediculis, humilissimi polypus excrevit. Excrecentia hæc nunc alba, nunc rubra, nunc livida, &c. apparet: nunc solummodo Narem implet, nunc adæ increment, ut etiam in Fances descendat, ac Strangulationem minuetur (1) Quod si livida, dolens, &c. apparet, ferè Cancrosum naturam sapit.

Causa Ictiosa huius Polypii, non secus ac aliarum Excrecentiarum, est Morbis nimis naturalis, & idem dictorum partium nutrimentum plura minus alteratur, & Aerimonia degenerat acida plura minus inquantur: unde differentia Polypii plura minus Cancroli. Omne punctum in xps, sciatis acceptissimum situm est, quod est lesio unitatis in quodam loco dictarum partium; five Diffensio, aut Vellicatio, aut Ruptio, aut easulatio fuerit, unde in loco lesio habet excrecentes copiosiores nutritas in tale Corpus successe excrecent: Sic Catarrhis acriorum Narium interdum infectus Polypus observatur fuit. A frequenti Narium fricatione Polypum lethalem notavit KERKRINGIUS Spicil. observ. 14.

P R O G N O S I S.

Quoad Prognosis: quibus magis molles, albus ac indolens fuerit Polypus, eo facilius Carationis; qui verò fuscus vel lividus est, præsertim acutè subinde dolens, vir curatur, quia Cancrosum naturam sapit.

Quò profundius hærent ipsæ Radices, adeoque quò magis attingit Filamenta ista nerva, eo periculosior: quia facili sub Radicum extirpatione occasione doloris inflammatione Membrarum Cerebri potest oriri; quod si verò radices penitus non extirpentur, semper de novo propullulat.

C U R A.

Quoad curam: Excrecentia hæc removenda & eradicanda, idque auxilium præsertim æternum, nunc Pharmaceutica, nunc Chirurgica. Karum enim est, quod polypus duos per sola Medicamenta interna, Diaram, Pharmacia & Sudorem, curaverit sine externis HORSTIUS lib. 2. observat. 48. uti & Polypum Fonticulo curatum videb. in Missell. Acad. Natur. Curios. Anno 9. & 10. observat. 6.

Antequam autem externa adhibeantur, si corpus est imputum, universalia evacuanda & alterantia præmittantur, ne ex doloris ratione contenta corpora quovis modo intensius commota malum exasperent, aut ob plura symptomata curam difficiliorum reddant. Si verò ex Polypio male curato sit malum, vel si ulla lesione externa, in corporibus præsertim puris, non ad necessaria ista ista, sed statim polypus aggrediendus, & extirpandus.

Quoad remedia ergo externa: hæc imprimis decrefcente Luna ulsperanda veniunt; tunc enim tumor minor esse solet. Medicamenta ergo que abluamur, & successu mortificat, ac ita eradicant hoc Sarcoma, sunt nunc Lenia, nunc Acrida plura minus Caulica. Lenia sunt verbi gr. Succus Granatorum acidorum; vel si ipsum Pomum cum tota sua substantia pissetur, bulliat cum Melle oleum ad ipsius finem Unguenti, ac imponatur Polypo. Canem superfluam successu erodit: Conferatur FORESTUS lib. 13. observat. 18. & M. A. N. C. loc. allegat. ubi Pulvis ad Polypum abluendum fualis erat. Vel Sinapi pulvis erit cum Aceto mistum, ita immitatur & applicetur Polypo. Sucus Onopordi (species est Cardui) contra speciosus est, & sapidis admovei debet: Sicut & ipsa Herba contra convenit etiam ad Cancrum Narium; mellante quo plures cum ravis Radicibus, teste BORELIO Centur. 2. obs. 51. Vel Pulverem Heliotropii speciatim commendat POTERIUS ad Polypum sine mortis abluendum, si cum Gossypio Naribus immitatur: vid. Cent. 3. obs. 63. Succus Nasturtii aquabilis crebris cum Gossypio admotis Remedium facit, mediaque quo plures curati fuerunt: Locobus per experientiam commendat LINDANUS succum radialis Ari ex radice contra expellens, cui intus Gossypium Naribus intrudatur, quod ter in die repetatur; sique successu consumptus fuit Polypus. Perinde autem esse dicit, an Arum, & an Anisum, & an Serpentina pro hoc recipiantur?

Fortiter panis sunt Flamentula ex Mercurio Suhlmat. Ærucio, & Fermento applicata: quas videb. in M. A. N. C. Ann. 3. ob. 91. pagina 151. Spiritus Minerales acidi quilibet successu Polypum abluunt: in Aqua Forti tantus Polypus statim flaccescit, cui tamen etiam aliquantulum Auripigmenti addi potest. Vel

*Æ. Suci. Granat. p. ii.
Olei Vitæ p. i.*

3. mii
Mile

(1) In Fances descendens & suffocationem omnino facientem Nasti Polypum in Carcinoma mutatum in Muliere vid. in Nepocem Incurabilem.

Misc. S.
Mistura devotans.
Vel
℞. Ol. Myrsin. ℥i.
Alum. nbi ℥i.
Aq. Pluv. ℥i.
Misc. S. ut antè.

Iroceatur hinc inde Polypus.

Unguentum Ægyptiacum etiam eundem absumit: Sic RIOLANUS.

℞. Cerat. Myrsin. ℥i.
Ung. Ægypt. ℥i.
Misc. pro Linimento.

Quo præterea feliciter uti solet in absumendis cretaceis, Callis, Verrucis, Condylomatibus. Hoc Unguentum attingendus scilicet Polypus, aut Turunda extremum, quod attingit Polypum, Unguento eodem illinatur. Unguentum Myrsinum, ubi non est, extempore ita parari potest:

℞. Ol. Myrsin. ℥i.
Pulp. Myrsin. ℥i.
Cera rubra q. l.

M. pro Cerato.

Ubi Unguentum Ægyptiacum non suffecerit, accretur *Mercurio præparato*, qui bene edulcoratus pluribus lotionibus additur: Sarcocolla egregie absumit sine ulla aut exiguo dolore. Hoc vel cum Melle Rosaceo miscendum, eoque iuncta Turunda in Nares immittenda, vel hoc ipso imprægnatum Unguentum ab HARTMANNO, præsertim in Praxi cap. 35. §. 1. descriptum, vel Unguentum Ægyptiacum, aut Unguentum Apollinarium addatur pro eradicando Polypo: Vel ad imitationem PLATERI:

℞. Unguent. Ægypt. ℥i.
Cort. Granat. ℥i.
Callor. an. ℥i.
Ol. Myrsin. ℥i.
Misc.

Quo ipso tangatur quotidie aliquoties Polypus, donec exaltens excidat.

Quod si huiusmodi acris aut caustica adhibenda sunt, cauti sumus, ne *Partes Narium vicina* attingantur, adeoque vel per Fistulam argenteam immittantur, ita, ut fistula extrinsecus Polypum ambiat, & ita Medicamenta ad eum ferri possint, intactis Nariibus: aut Gossypium, aut Turunda, Medicamentis imbuta, applicentur, ita ut Sarcocolla tantum attingant.

Quod si *cancerosa* fuerit Polypus, ne attingatur quidem metu maioris mali. Si *exaltatus* polypus sit, difficulter curatur, in eodem tamen Aquæ & Cineris Rararum, & Pulvis Cancrorum, Saturnus calcinatus & dulcificatus, Crocus Martis & similia adhibeatur: Videb. HILDANUS *Opuscul. 61.*

Quod *Ranula Chirurgica*: si periculis simpliciter hæret polypus, ita ut commodè Ferro possit rescindi, optimum est ut abscindatur, sed saltem *Filo sereno* bene cerato circa radicem ligetur: si enim iterum aliquot dies nutrimento destituitur, vel denique seropo peculiari abscindatur, quam describit SENNERTUS *libro 1. Præst. ubi de Polypo pagin. 335.* SCULTETUS *Armeniac. pag. 9. & 10.* Abfessione facta adstringentibus Hæmorrhagiæ sistatur. Ne verò redeat Polypus, Pulvis Cenciæ cum succo Scrophulariæ cum Turunda Nariibus immittatur: de quo confer. HEINRICUS ab HEEB. *observ. 28.*

ARTICULUS III.

De Odoratu depravato, & Ozæna.

Inter ea, quæ odoratum depravant, imprimis est *Ulcus vel Abfcessus in Nariibus laesus*, quod ubi *venosus* est ac *periculosus*, simulque *feroxius* tam Ægro quam Adstantibus gravem continuè expirat, Ozæna dicitur (K). Ulcus huiusmodi nunc successivè serpit, & partes vicinas erodit, nunc occasum suggerit, ut Polypus superveniat, nunc copiosam Saniem plus minus ærem, plus minus sordidam affluere facit, nunc gravissimam Hæmorrhagiam Narium infert.

Partes affectæ sunt nunc partes solum molles membranose in Nariibus, nunc verò etiam interstitia cartilaginea & ossæ, nunc ipsum Os Cribrosum, plus minus simul affectum est.

CAUSÆ.

Causæ sunt nunc externæ, nunc internæ: illæ varia inspirata: Hæc in specie Luæ Venerea, quæ inquam Lynpham, Membranas Narium obtinens, frequenter Ozænas junctas habere solet.

PROGNOSIS.

Sunt autem quilibet Narium Ulcera *curare difficile*. Recorata ac multa facilius curantur, immunda, sordida, crustosa, &c. difficulter curantur, præsertim si simul Os Ethmoides infecerint. Denique cautè tractanda sunt, ne *cancerosa* fiant.

CURA ODORATUS DEPRAVATI.

Cura odoratus depravati est facilis, modò curetur vel Lævi Venerea, vel Ulcus, Interim tamen pro palliativo remedio optimum est, ut recipiatur *Fiumis*, in quo decoctum fuerit Centaurium minus & Calamus aromaticus, quod omni mane & vespere è vola manus attrahatur in Nares tandem, donec in Palato sentiat, & ita Ulcus mundificetur. Vel Mel acuat cum Myrrha, Saccharo candi & puco Cinnamon: quod dilatum cum l. q. Aquæ Majoranæ: ita Nares attrahatur, aut Palatum usque penetrare valeat.

CURA OZÆNÆ.

Quod curam verò Ozænæ, præmissis præmittendis, præsertim Mercurialibus internis, Ulcus mundificandum, & hinc consolidandum. Si levis fuerit, curatur *per se* in aliquotis recentia concisa Narium immittit, & cum per aliquot horas ibi sunt retenta, eximuntur, & illinatur Unguento sequenti:

℞. Unguent. de Nect. vel Albi camp. ℥i.
Ros. Sulphur. ad extr. ℥i.
M. S.

Unguentum Mundificans.

Continuato horum ulu subinde edit. Nam Nicotiana de Unguentum ex Nicotiana, quod describit WECKERUS in *Auridat*, perquam egregium est, hoc imperia peculiare obtinens, quod ante mundificationem non consolidat: Hinc etiam Unguentum Nicotianæ Laming Sapini indidum, ac ita applicatum, cea expertum commendat VELSCHIUS *Hierosol. 2. pagin. 34.*

Quod si verò crassa adhaerit, vel Oleo Amygdalarum dulcium, vel Oleo Rosatum, vel Butyro recenti non silito illa crassa prius removenda, & hinc mundificantibus perendum. Vi excutienda crassa non venit, ne irritetur ulcus, & fluxio exasperetur.

Inter mundificantia egregium est Horminum sylvestris Sclarea, decocta cum puco Melle Rosato, & ita subinde applicata, & deou singulis menibus repetitur, ne recrudescat malum: Aut recipiatur *succus Sclarea*, subigatur cum Melle rosato, ut fiat Unguentum bene mundificans. Quoniam hoc Decoctum Agrimonie & Verbenæ cum Melle, item Urina Pueri, subinde initio & applicari possunt; aut utriusque Unguentum Mundificans HILDANI expertum curatur. *observ. 12.* Pannus quoque Candela ex Cera rubra Nariibus expressa egregius est, & in Ulcere inveterato a RONDELIO expertus: Nempe Candela est, unde hæc efficaciam dependet, unde alibi addita Candela composita pro hoc casu ferri possunt. Formulas videbunt in HARTMANNI *Præst. Chymicæ. cap. 62. §. 4.* Aut etiam usurpentur alii *Præst. Chymicæ. cap. 62. §. 4.* Aut etiam usurpentur alii *Præst. Chymicæ. cap. 62. §. 4.* Aut etiam usurpentur alii *Præst. Chymicæ. cap. 62. §. 4.* Aut etiam usurpentur alii *Præst. Chymicæ. cap. 62. §. 4.*

Item

℞. Aqua Majoran.
Plantag. an. ℥i.
Spir. Vini rectif. ℥i.
Mell. Rosat. ℥i.

M. S.

Mistura Mundificans.

(K) OZÆNA dicitur, ab ὄζω oleo: quod Ulcus sit ex fœditie malis oleis, vel quod Odoratus: utrumque officiat.

Ex vola Manus recipitur; vel cum parva Syringa.

Quod si his ipsis contumaciam malum cedere nolit, Mercu-
curialis sine optima: imprimis jam dictæ mixturæ Mercuri
Sublimati gr. vi. vel ʒss. addi potest, aut Mercurius
Dulcis cum æquis Plantaginis subinde applicetur:

Vel

ʒl. Aqua Plantag. ʒiv.

Mercurij Sublimati gr. xii.

M. S. ut supra.

Solutio filtrata usurpetur pro mundificanda Ozana.

POTERIUS sine Mercurio sua misceatur, ex Mercurio
Dulci probè edulcorato cum Unguento Rosaceo plures, præ-
missis Universalibus, maligno Ulcere Narium, Herpete

ascedente, &c. curavit. *Centur. 3. Cur. cap. 10. 16. 17. &c.*
In specie in Ozana Gallicis optimus est Mercurius Präci-
pitatus cum Unguento Rosaceo subadua, & mediante tu-
runda locis affictis applicatus. Alias Unguentum *Egy-
ptiacum*, item Aqua Viridis *Marmanni*, cum Penicillo con-
tumaciore Ozanae aut similes partium vicinarum exulce-
rationes curat: Videatur *Prax. Chymicæ. cap. 52. §. 5.* Vel
Oleum Vetricioli, in quo parum Gallypii mædebat, eoque
duabus vel tribus vicibus optime tangatur, quo factò debitis
Unguentis curetur. Remedium est optimum ad interna Na-
rium Ulcera, quantumcumque fuerint maligna: Vid. FER-
RARA *observat. Chirurg. 18.*

Hæc de sensibus capitis.

S E C T I O III.

DE SENSU INTERNORUM, ET MOTUUM ANIMALIUM LÆSIONE.

Absolvis sensibus externis, sequuntur interni. Sensus
internos quod attinet, illi rectè dicuntur triplices: *San-
guis communis, Phantasia, & Memoria.* Negotium est obicu-
rarius, propter insignem, quæ hic observatur, confusio-
nem operationum Animalium & Rationalium. Cum enim no-
stra cognitio intellectualis, & omnis Ratiocinatio præspo-
nat spirituum Animalium exercitium, occasione quarum
diversimodè motorum Anima Rationalis spiritalis diver-
sus ibi formet conceptus, seu phantasmata, cùm nihil sit in
intellectu, quin prius fuerit in sensu, adeoque sensus Ani-
males interni & intellectio in nobis semper sunt conjuncti;
evenit inde, ut ætiamque, quomodo sensus interni, sepa-
ratim considerari, se habeant.

Easdem si volumus scrutari negotium, necesse est, ut ac-
curatè abstrahamus & separatim res Animæ Rationali pro-
prias, h. e. quas cognitionis reflexæ in nobis ipsis percipi-
mus, ab iis, quæ spiritibus & cerebro sunt propriæ, & con-
sideremus, quæ ratione hæc posteriores fiant, cùm in his sen-
suum internorum ratio consistat. Hinc & organicam quæ
laudent Cerebri conformationem secundum poros & meatus,
adeoque spirituum Animalium motiones & filamentorum
nervorum varias applicationes, impediunt & tollunt
etiam sensus internos; sicut quæ spiritus Animales turbant,
& in varias motionum anomalias cogunt, pervertunt sensus
internos; sicut illud in contusionibus capitis gravioribus,
hoc in delirij manifestum evadit. Anima enim Rati-
onalis, seu Ens spirituale, ab objectis quibuscumque ma-
terialibus est immutabilis.

Ad hoc ut sensus interni in genere considerati se habeant,
quod nempe Nervorum Filamenta, in Organis sensuum
externorum commota, motum suum continuè in Cere-
brum usque ad radices dithorum Nervorum, unde motus si-
milis in corporibus striatis excitati, & consequenter in spi-
ritibus Animalibus sint; id quod sensus communis dicitur,
quæ motiones exinde repercussæ in corpus callosum usque,
ibi spiritus Animales uberitim scaturientes occasione fibra-
rum motorum agitantur; in quo consistit id, quod vocatur
phantasia; & inde reflectuntur pro motu ad spinalem Me-
dullam usque, ibique impetu facto vario, nunc in Cerebel-
lo, nunc Cerebri Nervos motorio derivantur; illi in Ce-
rebellum pro motu partium internarum. Corde nempe, Dia-
phragmate, &c. & exiracatione Affectuum; hic pro motu
Membrarum externarum; ita ut varij bi motus nunc sensus
communis, nunc phantasia nomine, veniant: sicut iidem
sensus eodem modo recurrentes memoria appellari solent;
vid. hæc pluribus deducta in scriptis WILLISII, speciatim
Tr. Anim. Dexter. An Bruta habeant Animam contradi-
stinctam à materia, Veneres, ut & HELMONTIUS
statuit; negant autem CARTESIUS & SCHUYL.

Motum quod attinet partium animalium: nempe quarum-
cumque, siue internarum siue externarum, eius organum
proximum sunt fibra nervosa, quæ nunc arctius sunt connectæ
in unum systema, quod vocatur musculi & nunc à se invi-
cem sunt separatæ, & circulari usurpatione ductæ partem
ambiant, v. gr. in stomacho & intestinis, quæ propria ap-
pellatione carent.

Fibra hæc in motu dependent à spiritibus animalibus, per
Nervos in partes distributis; hinc denegato eorum influxu
pars sensus & motu privatur. Fibra partium circularis, quæ
motum partium internarum per se ipsas percipiunt, obti-

nent Nervos ex Cerebello distributos, & sine prægressa cog-
nitione sensuum motum cient, adeoque talis motus nec
promoveri nec cohereri potest, unde vulgò motus naturalis
simpliciter dicitur.

Musculorum vari fibrarum systema Nervos ex Cerebro di-
tributos obtineat, ac eos gubernat motus, qui prægressam
cognitionem sensualem vel intellectualem sequatur, adeo-
que à nobis vel impediti, vel promoveri possunt.

Musculi structura ex copiosis constat fibris, in medio sui
crugulo sanguineo seu carneo vestitis, quarum plures sibi
in vicem iniquitate quidem, æquali tamen ordine superim-
positæ ita situantur, ut utrinque, tam in principio quam fi-
ne, Fibrae circa carnis intermedia substantiam incurvatæ
figuram & corpus Rhomboideum eleganter confluant;
super angulos obtusos, donec in rectos mutantur, mobile:
videb. SIENO Tract. Elementarum Myolog. Specimen, seu
Musculi descriptio Geometrica.

Movetur Musculus & omnis Fibra motrix, quando eadem
abbreviatur, & quasi in se contrahitur, ita ut Musculi uni-
ca sit actio, seu contractio, quam sequitur partis annexæ
motus, ejusque mutata figura & situatio. Quod si ita con-
tractus pertinet Musculus, dicitur motus Tensionis; si relaxe-
tus denotat, ita ut nullo Musculorum agente Membrum sit
in figura & sita naturalibus, in figura media positum esse di-
citur.

Motus hic Fibrarum siue Contractio à tribus dependet
sanctis:

1. Ipsa Fibrarum carentiarum & partibus annexarum
spontanea ad sui contractionem inclinatio, insin-
Chordarum extensarum ipsoe se contrahen-
tium.
2. Accedit impetus radius (propter velocitatem s.
nominatus) spirituum Animalium per Nervos
diffusus, qui in Fibra substantiam diffusam re-
pleat, ac quasi inflant, & ita breviorum reddunt,
quod imprimis in Musculorum Ventre observabi-
le est.
3. Sanguinis Arteriosi in Musculum episther influxus su-
pervenit, qui in Ventre ejus dilatato, minorem
inveniendo resistenciam uberiori insunditur, unde
& turgentia Musculi & Contractionis vigor
maximè completur.

Videb. de hoc STETTERUS, SIENO, & Author de
Ratione motus Musculorum D. CROON in WILLISII Tract.
de Anatome Nervorum seranque Tractatus. Nullus motus sic
sine Sanguinis Arteriosi influxu; an vero sanguis silem
uberiori quo influxus motum Musculorum promovet? an
verò ex sanguine oriatur partialis Elasticæ dicitur, quæ
in Musculorum Fibris occurrenti spiritibus Animalibus,
certam expansionem, & ita insignem dilatationem effi-
ciant? in medio reliquo. Videri tamen hic potest WILLI-
SIUS de Passib. Cerebri & motib. Cerebri. Item MAYOW
Tractat. de motu Musculorum, & de Nere Arter.

CAUSÆ.

Causa ergo Vertiginis proxima & Generalis, ad quasvis earum Differentias se extendens, est inordinatus, confusus plus minus, ac interdum plane inordinatus spirituum Animalium Motus (hic in secundo Gradus, ille in priore) & in partes ceteras influxus, unde omnia cetera dependent symptomata, & quæ pluribus videantur addenda in WILLISIO loco citato.

Motus hic dum fit in oculo, & dum spiritus Animales in oculo rotundo concamerantur agitantur, hinc necessarib. rotundo Motu in gyrum agitantur & moventur. Quod si sub Motu illo spirituum Animalium perturbato nimis, penitus deficiat spirituum dictorum Radius in oculis, caliginis & Tenebris oculi obfcurari videntur. Verum non in solo oculo, sed in reliquis etiam sensuum Organis, præsertim auribus, similis fit inordinata Agitatio, unde & sonitus Aurium; in Partibus vero ex terius minus firma obiectorum apprehensio & calius contingere solet.

Ut ergo Rotatio in Vertigine fit manifestior, Tunica Retina consideranda est, quæ est speculum, in quo depinguntur obiecta. Pro huius ergo Motu etiam obiecta moveri videntur. Jam vero non Motus spiritus in oculo, sed Motus in speculo visorio oculi, laesit Vertiginem: adeoque sicuti *Æther* naturalis fit per contactum Radium visibilium ad Tunicam Retinam, & sicut contactus seu appallus Aëris interni, moti ad Tunicam cochleæ nervæ, *Auribus* excitat ita etiam spiritus Animales, qui in Vertigine se habent influx. Aquæ communis in Vitro, in oculis grati, dum sub Motu illo illud in Tunicam Retinam, cuiusdem Fibrillæ agitant, & ibidem Impulsionem faciunt, talem obiectorum visum *Clamorem visibilium* apparere faciunt, sicuti appallus ad Tunicam cochleæ *sonitus* istos apparere facit.

Sane peculiariter & ipsius Tunicæ Retinæ simul concurrens Motum, patet simul ex variis *Coloribus*, imò & *spendoribus*, subsistent in Vertigine Caducis, quando densè ingruit paroxysmus, ante oculos apparentibus; item *Epileptis*, necnon *Mulieribus Hystericis*, ingruente paroxysmo; item *Epileptis* tales Colores & splendores interdum ante oculos vertari videntur flavi, cærulei, virides, & similes, quæ in dictis Affectionibus ac inordinato Motu spirituum in Fibris Tunicæ Retinæ talis Impulsus seu Motus fit in Tunica Retina, qualis alias fit à Radiis visibilibus ab obiectis luteis vel cæruleis, aut splendebus in oculum illabentibus, & Tunicam Retinam determinato Motu sentientibus, ut alius Motus fit, quando obiectum apparet album, alius, quando nigrum &c. fit si à causa Interna talis motus in Tunica Retina excitatur, simile fit in sensu communi Judicium, & similis Apparitio, unde cogitamus, tales esse colores: Videb. BOYLE. Imò si nimis inordinatus & tantummodo interruptus fit Motus, præsertim ad oculum, tantumvis Visus exinde perturbatur, ut etiam Obscuratio oculi & Caliginis apparentia superveniat.

Quod attinet *caliginem*: huius alia ratio est, quod nempe videntur Tenebræ. *Caliginis talis sensus* fit, non tam ex per vero spirituum Motu, sed quando nihil videmus, concipiuntur Tenebræ, quando claudimus oculos, caliginem percipimus in oculo. Unde fit caligo vel ex defectu obiecti lucidi aut colorati in oculo, vel ex eius nulla Perceptione; Nam utroque in casu Tenebræ & caliginem nobis inagimur. Jam vero in Vertigine caliginis in secundo Gradu, sunt obiecta lucida, nec tamen eadem videntur. Fit igitur, dum in interrupto spirituum Animalium motu abruptum corundem ordinata & radiis *series*, & in specie in ocula istodem defecere incipiunt, videntur adesse Tenebræ, unde caligo quasi representatur. Ulterius, si ex spirituum istorum animalium inordinato Motu ad Musculos usque fit continuatio, nunc ex eorum hinc ipse quasi abruptum deiectione cessat obiectorum apprehensio, & *casus*, dum simul volunt cadere. Ergo, qui spiritus non sufficiunt pro apprehensione, adimiculi & nunc ex inordinato Influxu *horum Convulsiones*, imò interdum *graves Epileptici Insultus*, superveniunt. Adeoque non solum spiritus virosius in ocula immediate perturbari videntur in Vertiginis affectu, quin totum spirituum animalium Systema Impetuosius in cerebro concitari in graviori Vertigine videtur, ita ut & reliquorum sensuum Organum simul afficiantur. Qui affectus

Tom. II.

verò, quia imprimis in oculo est notabilis beneficio grati ob id à principaliori fit dominatio, & *Vertigo* appellatur; cùm posteriores duo Gradus ad *Epileptici* vitiis spirituum Animalium propius accedant.

Quæstio jam est de Causa Remota; unde ille Motus spirituum inordinatus in cerebro, & hinc in Organis Sensuum, depeceat, pro qua Motus veritate variè sunt apparitiones in organis sensuum? Huius ratione Vertigo est vel per *Essentiam*, quæ Morbum constituit, v. gr. ab affectu cerebri qualitercunque immediate ortor aut ratione vitiis causam in cerebro conturbantibus spiritus Animales, quando Vertigo post Plagas aut cerebri concussiones sequitur; vel per *Consequens*, quæ est saltem symptoma Morborum aliorum, quando verbi grat. vitiis stomachi, aut partium quarundam inferiorum, ut à Passione Hysterica, &c. Vertigo oritur. Sed verum ut fatear, rarissimè est *Vertigo per Essentiam*, quandoquidem quotidiana praxis & Prædictorum observationes monstrant, *Vertiginem fieri æmum esse ex vitiis partium inferiorum*, utut distans affligit & sæpe recurrit, usque eo spiritus animales cerebri extertur per Motus spirituum præternaturales alterare & immutare valeat, ut tandem ex vitiis cerebri proxime affligere videatur. Adeoque si est per Essentiam Vertigo, ferè occasione casus antecedentis Externæ caput ac cerebrum plùs minus lædenti successe oritur; vel quod crebriore affectione Vertiginis cerebrum & spirituum Animalium systema ita se disposuit, ut cerebrum quasi per Essentiam videatur affici; raro à causa Interna. Utraque est vel *Naturalis*, seu ferè nullo non tempore afficiens, ac à causa Interna ac radicata dependens; vel *Accidentalis*, à causa tantum evidente oriunda, hinc nonnisi hac præsentia, affligens.

Partes illæ, quarum sensus fit Vertigo, primariè est *Truncatus*, speciatim à fordibus vitiosis, in aut circa eum commotis. Huius vitia peccata, imprimis vitiosus sui generis *Acer velatilis*, Orificium superius affligens, Vertiginem insert, propter spirituum Animalium versus cerebrum recursum inordinatum. Hinc enim frequenter *Juvenes* diligenter licet incumbentes, in specie etiam *Senes*, sæpius sunt Vertiginosi, quamdin jejuni sunt stomachus; subito vero atque unam, vel alteram tantum Panis buccellam aut similib. Esculentis comederint, Malum cessat; unde etiam matutinis horis tantillum concedendo Vertiginem talem sepius præcavat. Hinc etiam *quæ laborant Aëris Hypochondriacæ*, ordinari sunt Vertiginosi, speciatim quando sunt jejuni. Est vir hic laborans Scabie, quæ præmissis præteritis iubebam se ingerere cum Unguento quodam, sed calidè: dum autem eubium petit, accipit Unguentum Illinè Artus: sed quia cubiculum est frigidum, accipit Vas carbonum, & calefacit Artus, & sic cubitum petit: Mane exurgit totus eras Vertiginosus, & non audebat tres gradus progredi, ne corrueret: Dicebat: *senex anxietatem & melancoliam, ac si omnia deberet evomere*. Sulpicio erat, an scabies esset retroplaga, quia *Eger* etiam inuixit Præcordia, brevi tamen post superveniebat Vomitus cum euphoria. Ergo. Ordinari quædam stomachica: vespere iussit affertur Vas carbonarium, Inundationem repetiturus, subito atque offensus carbonem, Vertiginosus factus est: Hinc manifestum est, Vertiginem ortam fuisse ex *Fumo carbonum*. Hæc ergo Vertigo erat per Consensum stomachi, quia ejusdem Pathemata, Vomitus factus cum euphoria. Ergo, satis ostendit in stomacho fuisse radicem Mali. Notum autem est, Fumum carbonum reddere Homines caroticos, interdum apoplecticos; in hoc vero Homine hic Fumus affertit Orificium stomachi. Unde si ex Fumo Carbonum Vertigo oritur, & illa est ex stomacho, quod etiam, si ex Fumo Carbonum oritur carus, erit vitium in stomacho? (P) contra tamen non tam lædunt caput, quam Ventriculum; Inspirata succipiunt, vel *suprà Lih. r. ubi de Feb. Maligna*. Inter partes ergo per consensum influentes Vertiginem, primariè est Orificium stomachi finitum; hinc semper consequenter de angustis præcordibus, vomunt ferè temper; postmodum Vomitoria assumpta, dum incipiunt operari, ut plurimum Scotomiam solent inferre, neut Vomitoria adhuc hærent in stomacho: hinc Literatois ordinib. Liquor Martis Solaris curat; unde si mane quid assumitur, subito cessat Vertigo.

Pertinent hæc *Hysterice Mulieres*, quæ admodum sunt Vertiginosæ, & ut plurimum præcedentibus *passionibus* sustinentur.

Z z z z dicta

(P) Fumus Carbonum immediate lædit Spiritus Animales, quare potest Vertiginem & quidem immediate inferre. Quoniam autem commotis in Cerebro Spiritibus, motus hic facili negotio potest Ventriculo communicare; hinc fieri potest perit Vomitus: ita per non tam Vertigo in hoc casu dicenda sit per consensum Ventriculi facta, quam Vomitus exortus per Cerebri consensum.

etiam *Uterina* inchoat, aut etiam incipiente Paroxysmo Hy-
stérico, & dum adhuc primos Insultus sentiunt circa Prae-
cordia, Vertigine gravi lubidine corripuntur, in qua tamen
male Uterus acculitur, utpote qui est inlatus; et eodem sal-
tem quidam Affectus Hypochondriaci hanc Suffoca-
tio. Mulieres tales si patiuntur Vertiginem, certe sunt; in-
guere Paroxysmum, unde tunc aliis patet Clymax, quibus
& Vertigo curatur, & Paroxysmi praevenerunt. Senes et-
iam, ut dictum, ipsissimum Vertiginem, non ex vicio Capitis,
sibi interdum, quando praecedit Laetitia, sed ex Stomacho
sunt obnoxii, concentribus tamen simul proximis Spiritibus
Animalibus debilitatis, cum vitata simul plura minus
cerebri textura, unde vel levi Occasione, nempe capitis
Refrigeratione, attenta Meditatione, aut levi Corpora
Agitatione, Paroxysmi Vertiginis corripuntur; imprimis
pejus habent, dum sunt jeiuni. Quidam Senes Vertiginis
tempore hyemino praecipuis, dum enim jeiunant, pejus se
habent, quam alias si quid assument. Malum ergo hic est
Stomacho. *Ebricitatio* quoque ad Vertiginem disponit, unde
Ebricitatio omnes Vertiginis sunt; ipsi omnia duplicia esse
apparent: in Paroxysmo quidem per essentiam vitio Spiritu
Animalium ab Alimento nondum rite assimilato, ut
& Spiritu vino inordinato vel confuso agitatorum; extra
Paroxysmum vero Ebricitatio Vertiginem saltem per consen-
sum Ventriculi patiuntur. Porro nonnulla *Assumpta*, verb.
grat. Flatulenti: Cibi si dicti non enim sunt Flatus in Cibo,
sed sunt in Stomacho) ut Cereus, Allium, Nalburium,
Rapa, Brassica, Raphanus botanici & rusticus, & si-
milis *Oleracea*, etiamnum in Ventriculo haerentia, in qui-
busdam etiam Spiritus Salis Ammoniaci Vertiginem & Sco-
temiam in nonnullis excitant. Imprimis *Sordes* praeterna-
turales, fortius impellunt Officium Stomachi, commotae Ver-
tiginem inferunt: unde si propriam Fermentum Stomachi je-
junioque *Intestinum* verb. grat. *Nirax*, lubidine graves infen-
teas Vertiginis & Scoctemias; sicut etiam interdum Epilep-
ticas Convulsiones. Praeterea tamen ex *Liene*, *Uterine* male
constitute, *Rentibus*, aliisque Partibus nervis insignioribus,
per Consensum ipsidem oriri potest Vertigo. Sic etiam *Cal-
culus Renum*, ex Pelvi in Uterum commotus, in quibusdam
gravi inferre solet Vertiginem & Scoctemias. Quo etiam fa-
cit Vertigo a *Dolore* acuto, *thoro*, aut *Spasmo* Artuum,
cujus WILLISIIUS l. a. meminit.

Sed quomodo fiat talis Vertigo per Consensum? Quæstio est.
Vulgo ad Vapores, Exaltationes & Effumigationes ad inferio-
ribus Partibus in Cerebrum elevatis confingunt: Sed impossi-
bile est horum Vaporem transire, viis omnibus sufficienter
munitis, imprimis cum etiam HELMONTIUS in suis
descriptis, & hinc SCHNEIDERUS de *Cerebri*. lib. tribus,
sufficienter discussit hos ipsos Vapores vel Halitus, qui
et Membris aut et Cavitatibus Corporis exhalare videntur.
Dicendum potius, subesse tunc ut plurimum leviores Partium
internarum Spasmos, quorum occasione Spirituum
versus Cerebrum radiativorum inordinatio & quasi undula-
torius in eo supervenit Motus, & quasi Resilitionis Impetus,
qui reliquias eorum copias in Cerebro impetuosius com-
movenes, eosdem in Motus inordinatos & confusos cogit,
sicque Vertiginem inferunt: Vid. imprimis WILLISIIUS
de Morb. Convulsiv. Dum verò Spirituum ista Retentio & Resistit
plūs minus vehemens ab Obiecto inadæquato, praeternatura-
liter Partium sensibilem nervas vehementius afficiunt, nata
congingit, & ad Cerebrum omnes defertur. *Fermentatio* ta-
lis, seu velut *Aura frigida adconsensu*, peritioris videtur si
nec hoc non in omnibus quod contingit: ex gr. ex gra-
viore in quodam loco Dolore quidam Vertiginis redduntur,
Obiecti dolorifici occasione, Spiritibus ad Partem dolen-
tem commotis, & aliqui ipsamodum plūs minus efficiuntur:
fortioris verò ab Obiecto doloroso Impressionis ratio-
ne repulsi, iidem & quasi resistentes, Vertiginis Pathema
inferunt. Exemplum dicta illustrant est, quod refert
FONSECA lib. 2. *Constat*, 30. ubi refertur Mulier, quæ in-
capie pati per intervalla Hebetudinem quandam repenti-
nam circa Oculos, cum quodam Ventris perturbatione, quo
tempore Corpus regere non poterat, ni caderet: tempore
Accessionis dicit se sentire *Pannum* quandam ex partibus
Ventrici sursum ascendentem, parum tamen durare hoc
Symptoma: simul admodum prompta est ad *Pannum*, ita ut
quotidie fere evomat Bilem, & Prutiosam. Malum hoc
est Affectus ille, quem Vertiginem per Consensum *Thori* vocant,
cum tamen circa Hypochondria Minera, Materia &
Occasio sensibilibus, delitescat, quod Vomitus persuadet: qua
commota, & Partibus nervis illorum locorum alteratis,
suprà explicato modo Fumi adconsensum repræsentant, donec

Vertigo superveniat. Reverà ad Passiones dictas Hystericas
pertinet. *Pannum* hic, quem sentit Mulier adfecedentem,
sunt reverà *Spasmi*, qui inchoati in Plexibus Melensterii, &
continuati Nervorum Paris Vagi & Intercostalis trachæ, su-
pra Dorum sursum pretereptis, talis progressus summi as-
pectu speciem referunt, donec isti Spasmi ad cerebrum usque
continuati ibidem Spiritus Animalis in confusionem agant,
quibus confusus consequenter in Sensuum Organis motus
Vertigo oritur. Sic BARTHOLINIUS *Cenari*, 3. *Nihil*.
74. habet Vertiginem quinque annorum Vaporis similis ex
Pede sinistro in caput ascendentis, accedente simul vagi ca-
pitis Dolore; qui Alcinus reverà nil aliud est, nisi Spasmi
Nervorum ad Pedes protenforum, qui antecedit occasione
Obiecti irritantis: impetuosis autem inde resistentibus,
Nervi succellivè Spasmo cerebri talem Motum Ascensum
sibi apparet faciunt, unde vulgo Vapores & fumi ad-
fecedentes acculantur. In Praxi ipsius occurrit, quando
Agri dicunt: *supra sursum*, idque possunt sentire. Pluri-
bus deduxit WILLISIIUS in Anat. Cerebri, Patholog. *Cerebri*,
& de Anima *Bruter*. lib. 2. cap. de Vertigine. Utterius
consideretur pro Confirmatione *calculus*, qui simpliciter mo-
ta suo extra Pelvim in Uterum ad Vertiginem disponit, ut
suprà innuit. Calculus enim in suo motu excitat Spasmi om-
nium partium Abdominis, hinc infert colicam Spasmodi-
cam & Vomitus, quæ Pathemata Spasmodica continuant
usque ad radices Nervorum in cerebro, cujus Fibre riu-
dem vellicatæ universum Spirituum Systema simul com-
movenæ, qui commoti Vertiginem inferunt. Item conside-
rentur *Pannulationes*, quando malè se habent, qui cum tali
temore simul vertiginis quod patiuntur, quod ex Spasmo
fit. Eadem enim Tunica, Labia & Stomachum involvunt,
Stomachi affecto, simul convellitur, unde eremit Labium
inseries. ut plurimum ergo, ubi tales acculantur Fumi, ad-
sunt Nervorum Spasmi, aut ob tales acculantur Fumi, ad-
sunt altum *Massa sanguinea halitosa* & quasi vaporosa, quæ
etiam ad hoc Malum disponit. Talis *Massa Sanguinis*
halitosa flatus apparet in Hypochondriis & Scoctemias,
in quibus subinde lubido venarum turgent, & etiam ibi re-
rum coincidunt, sine manifestis causis. Unde interdum, aut
raro; à tali Sanguine ad cerebrum delato & Spiritus Ani-
males inquinantur, & inordinati agitantur, ac Vertiginem
oriuntur: adeo ut LINDANUS omnem Vertiginem ratio-
nem ex tali Sanguine halitosa deducat. *Illustrat* hoc ip-
sum, quando Vertigo supervenit Mulieribus ex *Menstruo*
suppressione, vel Viris Plichoricis *Excessu*: Hinc in tali Ver-
tiginem, quæ vitæ sanguinis hic, subinde Vexatiosis optimè
convenit: Conf. HORSTIUS in *Praxi*, 3. *Dixit*, 2. *pagin*. 33.
Unde Vertiginem disturban casuali Hemorrhagia Nasalem
solutam LOSSIUS lib. 1. *OH*. 8. testatur. Revera autem in
Vertigine per consensum ut plurimum ipsarum Partium in-
feriorum ipsam adsumit, seu occasione Mali Hypochondri-
ci, Hystericæ, Splenicæ, Vomitus, aut alius similis
excitantur, quarum Partium ipsam successivè in cerebrum
vibrati, & Spiritus ibidem in Mocios agentes, Ver-
tiginem inferunt: Vid. WILLISIIUS in Anat. Cerebri: quæ
Vertigo per consensum, imprimis Stomachi, est frequen-
tissima. Quod si sapienter repetat talis per consensum Ver-
tigo, fit tandem, ut alterata Cerebri textura a cerebriorum
illis & inordinatis Animalium Spirituum Excursionibus,
tandem vel levi data occasione in similes inordinatos Mo-
tus Spiritus Animalis erumpant, & ita tandem suo modo
per Essentiam evadat.

Quod attinet Vertiginem per Essentiam, ferè triplici modo in-
ri solet:

I. A *Conformatione Cerebri* ipsa mixta vitiosa, occasione
causarum Externarum, quando per contusiones, Plagas,
convulsiones cerebri, calus ab alto fortiores, Vulnera ca-
pitis graviora, vel etiam funata, & similes causas, quæ
quosunque Poros cerebri, & canales ejusdem minuant,
adeoque ipsam Texturam, ita immutant, valent, ut Spiritu
Animalium confusos & expansibiles naturalibus in-
peditis, hi ipsi postmodum vitio & inordinato moveantur
Moto, unde Vertiginis, & Epilepsie: Sic DEODAT-
US observavit Vertiginem ex casu ab Equo, ita ut tan-
dem superveniret Apoplexia lethalis: Ibi enim ex concus-
sione, cerebri Pori & delixæ Fibre compressæ sunt, unde
Spiritus Animalis in Moto impediuntur. Interdum sed raro,
sive talibus manifestis Causis Laeso Cerebri interna, inde-
que collectio Heterogeneæ, causa occasionalis Vertiginis
existit, à quibus ex causis occasionalibus facillimè Vertigo
inferitur. Faciunt nempe hic Fumi Metallici, in specie Mer-
curiales, qui frequentius hausti per Nares imprimis cere-
brum affligunt, & ita Vertiginis per Essentiam inferunt;
cujus

cujus exemplum recenset FRAMBESARIUS lib. 1. *Con-
sult.* 3. de Vertigine tenebrosa, sine ulla intermissione in
Chirurgo, qui etiam Luc Gallica Infectio curaverat bene-
fici Iunctionibus Mercurialis, unde à virulentia Mercuriali,
generi nervoso ac Cerebro infecta, ipsi communicata, ma-
lum ortum traxisse probabile est.

II. *Ab intergenerationibus cum Sanguine ad Cerebrum addu-
ctis.* Heterogeneum illud in Cerebro ex istis tripliciter modo
Vertiginem inferit: (1.) Quando aliquid heterogenei *San-
guinis* & *Spiritus Animalis* est permixtum, ut fit v.g. in Pa-
rasitico ebrietaria, vitia nempe spirituum Animalium per
spiritus Vini copiam inquinatum. Spiritus enim viscosi vo-
latiles, nonnulli rite uidem assimilati, sibi dem permiscetur,
unde impari redduntur, & in Cerebrum translati in suo mo-
tu turbantur: Idem etiam fit sub haustu sumi Tabaci in non
adjuvata. Vel (2.) quando aliquid excrementitii præternatu-
ralis *Cerebro* immixtum fuerit cum *Sanguine* aut *Sero* influen-
tibus: hinc enim suppositiones sanguinis confluxu ex extraordi-
nario subinde Vertiginem inferunt. Vel (3.) quando in *istis*
diffus *Cerebri* quascunque, ex vitio Digestionis privatis *re-
sistentia* varia in eodem generantur, à quibus reiectis spiritus
Animales turbantur, unde Vertigines & alia mala oriuntur
sic v.g. ex sero caput & cerebri interiora replente Vertiginem
observavit PLATERUS *obs.* *obs.* 10. 11. & SCULTETUS
Armenius. *obs.* 19. Vertiginem in Juvene ex Velicula Aqua
limpida plenis in Cerebri sinistrâ parte inventa, observavit
WEPFERUS *Tr. de Apople.* pag. 96. & 70. & ROLFINGIUS
Dissert. Anatom. lib. 1. cap. 13. Item similia exempla ser-
bat SCULTETUS in *obs.* *Chirurg.* *obs.* 10. 11. & *obs.* 23. re-
fert Fœminam ex confusione incipit curatum, quam in-
fecta Vertigo gravissima, quam tandem in Apoplexiam de-
cessit; aperto Crânio repertus fuit. Folliculus aequalis in Cere-
bro, ratione cuius probabile est, Vertiginem etiam fuisse:
sic ZACUTUS LUSITANUS lib. 7. *Med. Princ. Histor. Ob-
serv.* 11. observat Parasitum Vertiginis per abscissum ma-
terie purulentæ & Aure aliquoties curatum. Facit hoc Ver-
tigo singulari SCHENCKII in *obs.* *obs.* de Vertigine, curata
ingeni purulente materie per dentium alveolis & Os
extremis: A Vermibus vid. BONETTI *seculi.* lib. 1. *secl.*
1. *obs.* 16. ex Sphaculo Cerebri, vid. BARTHOLINI *Attila*
stagnans. *Vol.* 1. *obs.* 13.

III. *Os Sanguinis & spirituum defectum.* v.g. in syncope,
Vigiliis diurnis, longiore inedia, hæmorrhagiâ, Gonor-
rhœia, &c. Hinc ænim inedia vertiginem cum Aphonia
& intolerabili capitis dolore notat BALLONIUS in *sa-
m.* *obs.* absumptis nempe spirituum Animalium copis, &
exhausto plâs minus cerebro, facili quid vertiginosâ cum
sanguine infillare potuit.

DIAGNOSIS.

Sequuntur *signa*. Signa Vertiginis parim et antedictis
per se patent, parim ex relatione *Ægri* cognoscuntur, *Gly-*
tem observanda sunt signa distinctiva Vertiginis per essen-
tiam & per consensum.

Per essentiam Vertigines fieri suspicio tunc est, quando
morbi capitis præcesserint graves, vel Vertiginem
comitantur, v.g. infamia graviora, dolor capitis, au-
gustinus cinctus, &c. aut etiam si externæ quædam læsiones
sunt molestiæ, v.g. Vulnera, &c. antea acciderint capiti.

Per consensum verò fieri Vertiginem suspicio est, quando
non propriè affligitur cerebrum, sed si hoc dictorum præsen-
tia, & cum debilitate & noxa partium aliarum inferiorum,
ut affectu Hypochondriaco aut Hylerico, Vertigine observa-
tur: Ita v.g. Ventriculum Vertiginis autorem existeri, di-
gnoscitur et hujus symptomata, quando per Vomitus Ver-
tigo ante levatur, aut insigniter curatur, item si Vertigo an-
te passum potius, quam à passu affligat, aut post assumptum
alimentum quodcumque Vertiga fit levior, &c. Vertigines
stomachales enim raro affligunt à passu.

Vertigines Mulierum Hylericarum, & Hypochondria-
corum per se patent.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: Observandum est, quid *Vertigine* *sympto-*
matum *accidentalis* levior, ac recessus parum habet in recessu,
& curata facili et infirma; *Malignitas* verò gravior præci-
piat, & diuturnior, imprimis *Æstima*, in specie citra ma-
nifestam causam externam inchoans, Hypochondriaci mali
ferè sit indicium, & difficulter curatur: utrimque malè
ferè in Senibus Apoplexiam, in Junioribus Epilepsiam, certissime
prænuunt.

Tom. II.

Sane in Senibus Vertigo confirmata raro fallit, quin co-
mitem secum ducat Apoplexiam. Unde etiam Vertigo in
Senibus longè periculior, ac difficilior curabilis, quam in
Junioribus.

Hinc *sero variata gradum* etiam plûs, vel minùs *Agit*:
siquidem *Vertigine* *radica* omnium gravissima, & periculosi-
sima est; minùs *Vertigine* *transitoria*, quando simul caput, &
corpus gyrtatur; minime omnium *Vertigine* *simplex*, in qua
tantummodo externæ circumstantiæ videntur, non tamen ca-
pax, aut totum corpus.

Quia autem modò anteriorem, modò posteriorem magis,
capitis partem afficit: *Alia* pariter magis tuta, & curabilia
est, dum nonnuncquam, vel Vertigine Narium, vel Men-
struam, & Hæmorrhoidum fluxu solvitur: vid. LOSSII
obs. lib. 1. *obs.* 9. ubi Vertigo nullis cedens Remediis
tandem casu ab alto, superveniente hæmorrhagia Na-
rium, curata est: quoniam verisimile est, à linguæ prope-
nabile, ex toto corpore per Arterias in cerebri ventriculum
anterioriorem irrepsisse, qui in Plexu Choroidei agitur tur-
bulentis sensus & motus reddidit: E contra *hæc*, quia
spirituum ad Nervos influxum magis turbat, longè periculo-
sius observatur, quatenus frequentius in Apoplexiam, Pa-
ralysin, & Morbos convulsivos abit: vid. WILLISIUS l. 1.

CURA.

In cura hujus Morbi duo tempora consideranda sunt:

1. Tempus extra Parasitum, ut præservatio institua-
tur, &c.

2. Tempus in Parasitum, in specie Vertiginis caducæ, aut
ritè fissatur, & curatio peragatur.

Quoad *Præservandum*, seu curantem extra Parasitum:
ex respicit fontem morbum, ubi in specie causa
antecedens Vertiginis perferenda, & removenda, adeo-
que præsertim Viscerum Abdominis ratio habenda, hinc
spiritus Animales appropriatis & roborandis, & impetu-
sus eorum motus silendū, & cum malum frequentissimum
sit per consensum ex Stomacho, seu primis viis, ob id *ve-*
mentaria juxta HIPPOCRATEM lib. 4. *Apher.* 27. & hinc
Remedia *stomachica*, & *aromatica* communiter dicta, prima-
tum obtinent; quibus subiungantur Specifica, & Vertigini
dicata. Vomitoria, si fomes extra Ventriculum, & Ver-
tigo diuturna fuerit, subtiliter solent purgare, & quæ bian-
diora: nam fortia omnino erunt vitanda (juxta HIP-
POCRATEM *Præserv.* l. 1. c. 5.) utpotè, quæ vertiginosum
motum etiam in non Vertiginis cient: videt à CRUCE
de *Secl.* per *Epil.* *Cent.* 4. pag. 427. Cum verò in genere
supradictum fit, Vertiginem graviores esse parvam quasi
Epilepsiam, & hanc sabinde illam insequi, hinc Vertiginem
in specie omnia ex Appropriata siliunt, quæ Epilepsia com-
muni, sicuti contra omnia Anti-vertiginosa etiam Epilep-
siam medentur.

In curandis *istis* *Parasitis*, præsertim Vertiginis fo-
candi, & tertii gradus, vel *Præserv.* vel *Opia*, vel *Anti-*
epileptica, in specie volatilis Nervina, & Aromatica, qua-
lia de Epilepsia notabimus, tam externa, quam interna,
sunt optima.

Pro his scopis melius obducendis, observandum

I. In Vertigine per consensum vomitoria in utroque casu
sunt omnia optima, præsertim in malo contumaciori, via
sine Vomitu corabili, in specie cum frequentissimè Vertigi-
nis radis hæreat in Stomacho. Moolit hanc viam nobis
ipsa Natura, quæ in Vertigine per consensum nascitur ex-
citatur, interdum Vomitus cum *Ægri* euphoria: sic refert
PISO *Tr. de Colicis* *secl.* pag. 69. de quodam, qui Verti-
gine quinque annorum laboravit, & insigniter commotus
fuit, cuiusmodi per spontaneum Naturæ motum, per Vom-
tum frequentem, & copiosum Aquæ puræ, & limpidæ. So-
quatur ergo in Vertigine Naturam, & imprimis à Vomi-
torii curam inchoemus: c. g.

℞. Tartari Emst. *Mys.* gr. ii.

Sal. Ammoniaci dupl. gr. ix.

M. f. Pulvis: S.

Pulvis Emericus.

Loco Vomitoriorum, aut etiam post eorum usum, inhi-
ciantur *Glysters* *acriter*, quales infra *Art.* 1. cap. 3. ubi de
Apoplexia, annotabo.

II. Post Vomitoria in Vertigine diuturna in veterata, aut
contumaciori, in specie si est per consensum, convenit fo-
mitem morbum blandis *Purgantibus* evacuari; quæ inter
egregias Massâ Pilelarum de Succo *Citræ*, quæ egre-
giè conveniunt, adjectu pro Stimulo Extracho *Colocynthidis*,
item Massâ Pilelarum Aloëphanginarum, de Aloe, Ange-

2222

licem dicitur; Massa Pilularum de Nitro; Pilule etiam Malichinae pro ceteris conveniunt, imprimis in Vertigine per consensum stomachi, auctam uteri, ut ait FORESTUS; Pilula Cochlearum commendantur, ubi vitium est in ipso Cerebro; sunt enim facile vehemens, & valida. Item Extrahit Malicini nigri cum Mercurio dulci, uti egregium est Purgas Epilepticarum, ita etiam Vertiginis prodest. Dabo exemplum:

℞. Mass. Pilular. Malichina. ℞i.

Extr. Agar. gr. v.

Stann. sulphurat. gr. ii.

Olei dissil. Succini gutt. ii.

Cum ℞. Sacchari l. Pilulæ.

D. S.

Pilule Cephalicæ.

Ut potius conveniat stomacho ratione Vertiginis per consensum; in signatura sumus faciles. Vel

℞. Mercurii dulci. gr. xv.

Stann. sulphurat. gr. iiii.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis Laxativus.

Pro ceteris observetur, in malo inveterato per consensum mihiis convenio purgantia, sed præservationis gratia conveniunt potius *Pilule asuales*, quæ blandè evacuant primas vias, aliquot scilicet moderatas provocando, & singulis Novitiis, & Plethoricis asualibus, uno, vel altera die antematationem Laxæ, vel ipsi usuari possunt. Fiant ea *Alia*; *Gommi Ammoniaci*, *Seypræ*, *Malichina*, & similibus, adjecto stimulo leni, ut mundæ ferrentur primæ viæ, ac Fomes ex Abdomine evacuetur, & sic subtrahatur Vertigini fomes.

III. *Vertigo* per se via convenit. Interdum tamen, ubi adeit ordinarius sanguinis evacuatio suppressa, vel ubi est sanguis copiosus cum Vita sedentaria; aut hic facile est ebulliens, ac turgescens, qui alius Flatuosus dicitur, aut quando à sanguine plus minus sœviter malum, tunc optime conducunt Ventosicidiones: de quo vid. imprimis HORSTIUS in suis *Problem. Detrad. 2. quæst. 3.* ubi habet exemplum Vertiginosi Plethorici, qui aliis irritis per Venesectionem optimè fuit curatus; item SENNERTUS *Prax. lib. 1. part. 2. cap. 4. pag. 269.* sicut etiam Vertiginem duarum Hæmorrhagiarum Narium casuali salutem LOSSIUS *lib. 2. obs. 18.* testatur: imò idem HORSTIUS *l. 1. PLATERUS, & SYLVATICUS Com. 2. Conf. 40.* Arteriosam quoque interdum commendat. Aliis in casibus via locum habet.

IV. Obervandum: A *serenitate* omnino esse abstinentiam, cum in Vertigine per consensum ali confertur, in essentiali autem Vertigine nihil evacuetur ex Cerebro, sed saltem circa Nares, & partes vicinas: Genus nervosum nimis commovetur (est enim hæmaturia motus convulsivus) indeque facile spiritus animales in inordinatos motus cogunt: & quamvis nonnullæ vitiosæ materie pars evacuari videatur (postea esse per essentiam); tamen symptoma eadem potius magis concitatur, quia motus est, ne excutitur convulsus Thoracis, & sic ad Epilepsiam promptius disponatur. Eger. Ut taceam, de orationem Oculis mihi esse contravenientem, sed potius nocivam.

V. *Verticilli*, *Spicæ*, & *Stactæ*, in Senibus, & subiectis Cacochymis, ferus, in Vertigine imprimis per Essentiam inveterata, curative, & ratione Apoplexiæ præservative, sunt optimi, & singularis usus, hæcchico insuli, ubi affectus duplex: Capiti verò, aut Noctæ applicandi in Vertigine caduca, aut Apoplexiæ, aut Epilepsiam minime: vid. ZACUTUS LUSITANUS *lib. 1. Prax. Adm. Obs. 78.* Si verò ex suppressis Hæmorrhoidibus, vitio Uteri, Ulcere, aut Fallula coalescente, cruribus invadendi.

VI. Permissis ergo præmittendis, facta totius corporis purgatione, sedato Paroxysmo in *Præservacione* opera danda, ne redeat malum, adeoque imprimis, vel robustetur *Stomachus*, & alteretur digestio vitata, vel *specificis Vertigini* restitatur.

Quoad *Stomachicæ*: inter alia emineant *Aromaticæ volatilia*, & *Pauli asyria*, ac vi aromatica prædita, quæ imprimis Senibus conveniunt; ver. gr. *Galanga*, *Zingiber*, *Nux Moschata*, *Cubebæ*, *Semen Sinapi*, & similia, v. gr. *Sedten Sinapium* mæoe crudum comestum, est egregium ad Vertiginem, imprimis per consensum. Idem etiam convenit Senibus, quando sub Vertigine motus est Apoplexiæ.

E. E.

℞. Galang. ℞i. ad ℞i.

Cubebæ. ℞ii. ad ℞iii.

Sach. ℞i.

M. f. Trages.

D. S.

Trages Caput confortans.

De qua assumatur ℞i. cum Pane bischo, Vino generoso intincho, hora una altera ante cenam, & prandium.

Vel ad imilationem LINDANI usurpetur Pulvis:

℞. Gran. Pann.

Cariander.

Nux Moschata.

℞i. quatuor.

Cubebæ.

Galang. 20. ℞ii.

Piperis long.

Zingib.

Kad. Terebinth.

℞i. Kerimar. an. ℞i.

M. f. Pulvis compositus.

De qua sumatur manus, & velperi ℞i. live cum, live sine Saccharo pro lubito.

Imò, vel sola Galanga mitta cum Succino ab eodem commendatur ad curam Vertiginis. Convenit itidem Elax Proprietas miltum cum spiritu Malichino; sicut in genere omnia Malichina, præsertim in Vertigine à stomacho, sunt optima: Item *Elax Mentia*, & similia cum spiritu Malichino mitta, præservant à Vertigine. In Senibus ad præservandum Vertiginem, simulque Apoplexiæ, convenit imprimis *Elaxiarum ex Aromaticis Stomachicis* crebrius usurpatum:

℞. Conf. Flor. Anther.

Salvia an. ℞i. vel ℞vi. ad ℞i.

Majoran. ℞i. ad ℞vi.

Zingib. in Ind. cond.

Nut. Mosch. cond. an. ℞iii. vel ℞℞.

Am. Eruca.

Sinapi an. ℞i. vel ℞iii. ad ℞vi.

Succini præp. ℞i.

Cardam.

Cubebæ.

Galang. an. ℞i.

Sellæ vel Succini. ℞i.

Spir. Ceraf. nigri. ℞i.

Cum ℞. Sy. Flor. Tunicæ f. Eletharium.

D. S.

Eletharium Cephalicum, & Stomachicum pro aliquot vicibus.

Disciobus addi potest aliquantulum Coedificationis Alchemes, quæ ratione Ambre, & Moschi Senibus imprimis conducit. Capiatur omni mane, & sub introitu lesi quantitas Nucis Castaneæ, post prandium vero malicentur lentum Sinapi pag. ii. vel iii.

℞. Conf. Mentha.

Mellæ. an. ℞i.

Cinab. Antimoni ℞i.

Olei dissil. Kerimar.

Succini an. gutt. ii.

Cum Sy. Mentha f. Bolus.

D. S.

Eletharium caput confortans pro una vice.

Hic equidem *Vertigo acutioralis*, seu mihi inveterata, præsertim per consensum, curari solet. In *substantia*, seu inveterato malo vero undecunque nato requiruntur præsertim, illis tamen non ocellendis, *specificis Vertigini* appropriata: qualia ex *Regni Vegetabilis* sunt Radix Doronicus imprimis, Cherebolum, Calendula, Salvia, Rosmarinus, Buxus, Thæ, Cænebæ, semine Sinapi, Flores Liliorum convallium, Radix Pæonie, de qua videt. RIVERIUS *Observ. communis*, & in genere quilibet cetera Cephalicæ, & Epileptica. Doronicum quidem singulariter à quibusdam laudatur ad curam Vertiginis: Sed verior, ne ex præcepto magis opinione, quam rei veritate, fiat. Putat enim *Rupicapra alpina* eius usu reddi aptas, ut citra Vertiginem motus addeant; quod ipsum tamen Naturæ prærogium, & consuetudinis videtur. heu! enim. Unde etiam Lapis in eorum stomachis reperitur, seu, ut alii vocat, *Ægagropila*, pulteritibus alumpus commendatur ad WORMIO contra Vertiginem. Quidam parat ex Doronico Essentiam, eamque singulariter ad Vertiginem commendat. *Fenambuli* quoque ejus usu contra Vertiginem se munire dicuntur, saltando in suis, quod ipi sibi tanquam singulare secretum referunt; attamen pariter dubium, Post Doronicum est *Cænebæ* admodum laudatum, quocumque modo usurpetur, live cum jusculo assumatur, live Essentia,

aut Extractum paratum cum spiritu propolis usurpetur, in specie, quando est Vertigo ex vicio Stomachi. Hinc Salvia, & Rosmarinus sunt egregie. Salvia decoctum in aqua, vel Vino, tam intermedium, quam externo, si eo adiutus caput, ac applicetur Fronti, Temporibus singulariter laudatur à STOECKERO in Praxi. Effluvia Salviae cum spiritu proprio parata non est inconvenientis, Sanè aliquando Effluvia compositum ex solo Cherebulo, & Rosemarino proficuum in Vertigine per coelestem expertum ium; item Effluvia Cathartica à Michaeli, vel Effluvia ex ana Salviae, Calligae, Zedoariae, cum spiritu Salis Ammoniaci paratam, ad 40. guttas exhibitur; vel aliud Sal volatile aromaticum, & oleum à 30. ad 40. guttas. Rosmarinus, cuius effluvia admodum commendatur à FERDINANDO in consumacissima Vertigine, in specie, si exasperetur Malum in frigore hyemali, id quod Senibus ferè familiare, tunc Effluvia modo ex Rosemarino elicita admodum convenit. Præter dicta hæc Vegetabilia etiam Melissa, Majorana, Euphasia, Foeniculum, Semina Calida minora, item ferè omnia Aromata, in specie Zingiber, & Galanga, commendantur contra Vertiginem, item Calistemon, Ambra, grisea, & ex his Vegetabilibus parata Effluvia, spiritus, & Olea: V. g.

*℞. ℞. Cherebuli,
Salvia,
Oleum, flos Rosæ. an. ʒi.
Cassia. ʒi.
Ambræ ʒi.*

M. D. S.
Effluvia contra Vertiginem.

Dosis 40. usque ad 50. guttas, bis in die per biberium aut passum.

Buxus, in specie ejus Oleum distillatum, uti in Epilepsia, ita in Vertigine optimum indicatur Remedium intus, & extra, quod FONSECA *res. 16.* mirè laudat; singulariorem vim habet narcoticam, extra quidem inungendo quotidie Temporibus arterias post aures, hæc pulvis in manibus, ac pedibus; intus vero propinat ita:

℞. Conf. Flor. Anthei, vel Calend. ʒiij.

*Olei distill. Buxi,
Nix. musc.*

Mentha an. dr. ʒi.

Cum ʒ. q. syr. Cors. Curi & Eleutharium.

Dosis est dr. ʒi.

Imò si guttae vi. viij. vel ad summum x. Olei distillati Buxi cum aliquot uncis aquæ Potius exhibentur, egregium esse Remedium inquit; cujus decoctum, & oleum Corylium non inconvenientius est.

Cubeba multat Stomacho jejunio, aut etiam Vino infusa, sique bibite, multum conveniunt; opus fecit, ut *sempiternum* Sinapi cradum contumeliam, jejunio Stomacho quotidie committitur, expertum est ad Vertiginem, etiam senem, etque simul egregium Antiepilepticum, & Apoplepticum. Expertum est etiam ad Vertiginem cum *Cariis pinguis*, & *seminibus Sinapi* paratum Eleutharium, quod pro usu præservativum Vertiginem est egregium. Lignum Aloes, item Santali, ab HILDESHEIMIO *spec. pag. 455.* commendatur, & Conserva Florum Calendulae à RIVERO *Prax. lib. 1. cap. 9.* Ex compo. aliis in usum est quibundam Theriaca Hippocratica dicta: scilicet

*℞. Succ. Aloës,
Marrub.
Puls. Eibachad,
Mastic.
Rhabarb.
Chamaed.
Chamaep. an. dr. iij.
Hysopi dr. i.*

Aqua ad pond. omnium.

Loco hujus usurpetur Eleutharium à SOLENANDRO *fol. 1. res. 1.* commendatur:

℞. Theriac. Androm.

Conf. Flor. Spis. vel Rosæ. vel Anthei an. par. i.

Rosar. p. ii.

Cum mell. anthei, f. Eleutharium.

Ex Regno Animalium, *Pavo* ejusque *stercus*, cæcis singulari specifice mirè laudatur ab omnibus præcibus, cujus non tantum Carnem comestam, contra Vertiginem admodum laudat BARTHOLETUS in *Enceph.* Sed in specie *Stercoris Pavonis* exsiccatum nobile est specifice contra Vertiginem, tum in forme liquida quam sicca usurpatur, quod

ab omnibus, qui ejus fecerunt periculum, maxime commendatur (Q). Quidam dicunt, habendam esse differentiam ratione ætus: sed videtur huic negotio parum subtile ponderis. Modus preparandi est varius: Urinari potest vel forma Pulveris cum ana Sacchari, ratione ætatis, de quo Pulvere *Æger* crebrius capiat. LINDANUS dicit, se felici cum successu expectum esse sterces Pavonis, præcipue præmissis Universalibus propinatum in forma sicca, exsiccatum sterces, & hujus steroris siccat dr. i. propinat in ʒi. Aquæ appropriatæ: Sic in QUERCETANI *Dieta. Polyph.* illustre est Exemplum curatæ Vertiginis beneficio steroris Pavonis, idque *fol. 2. cap. 5.* WILLIUS in *anim. Brutor. part. 2. cap. 2. de Vertig.* habet Pulverem compositum, cujus basis est sterces Pavonis; ad causam situationem aliquando Viro cuidam à tempore Palchatis ad principium hyemis infingitur Vertiginosus, præmissis præmittenda, præcipiunt:

℞. Sterc. Pavon. ʒiij.

Rad. Pina. mar. ʒi.

Puls. Caryophyll. dr. iij.

M. f. Pulvis.

De quo capiebatur quotidie bis largam dosem mane jejunio Stomacho in Vehiculo calido, & biberio ante cenam in frigido, continuavit per aliquot septimanas, usque hunc usque successu. Iussu continere, quia sub Temporalium mutationibus aliquid sentiebat, & continuando sanus evasit. Omnis vespere sub lecti introitu accepit simul spiritus Salis Ammoniaci notari guttas xxx. vel xl. pro dose. Varia tentaverat, etiam Fomentum intus curavi, sed frustra, Vertigo erat vehemens cum Cephalalgia intensa in summitate Verticis ad magnitudinem palmæ Manus. etiam Liquor Cornu Cervi succinatus, item spiritus Vitis Epilepticus Dom. Michaelis, Vomitoria, Cathartica, Martialis, &c. frustra nea erant. Pro Cephalalgia Linimentum dedi ex Oleo distillato Succini, Verticis, applicando de super Emplastrum de Rana cum Mercurio Capillis rasis

Potest etiam hoc sterces in forma *Electuarii* usurpari:

℞. Sterc. Pavon. mensis Mayo collect. & in fartag.

leniter exsiccatum, ut pulverisari possit.

Misc. cum Conf. Flor. Rosarum, & Major. vel Melissa, vel simpl. q. l.

de quo quotidie bis capiat: quo felicitati usus est LINDANUS in *Praxi.*

Vel in *forma liquida* usurpatur, qua ratione quidam recipiunt M. i. *Femi Pavonis*, subigunt cum ʒ. q. Vini; dividunt in tres partes, cujus duas partes post duos Paroxysmos Vertiginosos propinat, provocato sudore, & tertia doles post biberium post tertium paroxysmum propinat, & sic certè, inquit, curari Vertigines.

PETRUS à CASTRO, *Medicus Vromensis*, Remedium administravit virtutis ad præservandam Vertiginem esse dicit:

℞. Sterc. Pavon. masculi pro Maribus, mensis Mayo

collect. & exsiccat. dr. i.

Macerat per noctem in *Vino albo*, mane trahit per Lintheum, liquorem exhibet Vertiginosus, continuando à Novissimo ad Plenilunium usque, mane expellendo blandum sudorem.

An præcisè requiratur distinctio sexus ratione *Ægrotorum*, ita ut *Stercoris masculi* pro Maribus, *seminibus* pro Feminis Vertiginosus sit capiendum, in medio reliquo.

Loco steroris Pavonis, *Cervi masculi* pro Mare, *seminibus* pro Femina, exsiccatum, & pulverisatum commendatur.

A quibusdam laudatur *Cerebrum Porcinum*: unde BARTHOLETUS *Electuarium* ex *Cerebris Animalium* in *Enceph.* p. 166. describit, quod vocat *Electuarium præstantissimum contra Vertiginem*. Compositio est hæc:

℞. Cerebr. Porc. Num. x.

Misc. in Vino loti, & in fumo exsiccati

Avellanar. an. ʒi.

Misc. dr. iij.

M. & cum syr. de Cors. Curi & Eleutharium.

Idem BARTHOLETUS etiam cerebrum Pavonis ad Vertiginem laudare solet.

Egregius etiam est liquor Cornu Cervi succinatus, Cassio. reum & Callorea. *Stipus Euphrasium* Vertiginem curatam refert VELSCHUS *Herz. 1. pag. 6.* Dobium tamen, unon additum *Electuarium Ciri* parit cum *Hepate* fuisse virtutis.

Denique ex regno Minerali ad Vertiginem Remedia sunt

Succi.

(Q) *Experius quidem non semel sum; sed nullo Vertiginis remedia beneficio.*

Succinata quæcumque, Petrolinum album, Cinnabaris vel Nativa depurata, vel Antimonii Cinnabaris: insigne Remedium CRATONIS, trium Imperatorum Archiatrum, qui Cinnabaris et Magnesium Epilepsia, ita Vertiginis, appellat. Unde super basio Cinnabaris Antimonii extructi Pulveres Cephalici speciei erant in omni Vertigine convenientissimi. In Cinnabari multa lauent; unde promiscue potest usurpari dosi ʒi. in specie circa mutationem Lunæ; egregium est Remedium & Antiepilepticum, & contra Vertiginem, si per se, si cum aliis adhibeatur; potest enim fieri Pulvis compotitus cum Sale volatili Succini, Cubebis, Galanga, & similibus. Vehiculum potest esse aqua quædam Cephalica, acuta spiritu Liliorum convallium, Elisiæ Mentha, & similibus. Hinc v. g.

ʒi. Stere. Porcu. pulverif. ʒi.ii.
Cinnab. Antimonii vel Nativ. ʒi. ad ʒi.ii.
Cubeb.
Galang.

Salis vol. Surr. ana ʒi. ad ʒi.ii.

M. f. Pulvis:

ʒi.ii. coch. Anis q. C. pro gratia saporis, & odoris v. g. ʒi. ʒi.ii.
M. D. S.

Pulvis contra Vertiginem pro aliquot vicibus.

De quo capitur infusio, quantum cupis Caltelli capis.

Infusio huius Pulveris contra Vertiginem sit tale:

ʒi. Aquæ Chrysol. ʒi.ii.

Satur ʒi.ii.

Cinnam. dr. vi.

Spir. Lil. convall.

Satur. an. dr. iii.

M. D. S.

Aqua ad Pulverem.

Vel

ʒi. Aquæ Chrysol. ʒi.ii.

Mellif. cum Vin. ʒi.ii.

Cinnam. cum Vin. dr. vi.

Spir. Lil. convall.

Satur.

Ceraf. nigr. an. dr. i.

M. pro Vehiculo Pulveris,

D. S. ut supra.

Vel

ʒi. Aquæ Chrysol. ʒi.ii.

Liqu. cornu Cervi succin. dr. i.

M. pro Vehiculo distill. Pulveris, capiendo aliquot Cochlearia.

Cum Cinnabari in specie *Salis volatilis* & *Olea nobilia* sunt contra Vertiginem, interne & externe. Hinc interne Sal volatile Succini, Succinum, Liqueur Cornu Cervi succinat, in specie Junioribus, & quæcumque Succinata: Nam & ipsum Succinum est egregium Remedium in Vertigine; si interne sumatur Succinum præparatum, cum aqua appropriata, in specie cum spiritu vel aqua Salvia; si externe ejus Sal volatile assumatur, aut etiam Oleum, & cum hoc paratum Elæosaccharum, ut facilius assumatur, addendo ad dr. i. *Sacchari gutt. iv. Olei*; vel dictum Oleum Vertici illitum externe, egregia fuit Remedia contra Vertiginem.

Oleum Succini & Buxi loco *Petrolum album*, imprimis in senibus, usurpari potest, quod non inconveniens est in Vertigine per consensum stomachi, præsertim in Hypochondriaci. Memini me aliquando Juveni studio Hypochondriaci crebra Vertigine, sive jejunis, sive postus esset, affecto, præmissis præmittere, & etiam aliis adhibitis convenientibus, frustra tamen omnibus, consuluisse, ut in fine ejusdemque passus f. y. & t. guttas Olei Succini in ultimo hantū capiat, coque iungat leviter Præcordia seu regionem Scrobiculi Cordis. Fecit aliquid, & optime profuit, oihli habuit incommodi præter Rictus. Hinc ad huius imitationem alii Juveni, præmissis Vomitu, aliud dedi Elæquarium.

ʒi. Conf. Menth. ʒi.

ʒi.ii. Lichu. ʒi.ii. vel ʒi.ii.

Petrol. albi ʒi. ad ʒi.ii.

Cum f. q. *Syr. Menth. vel Flor. Tonic. f.*

Elæquarium.

De quo omni mane capiebatur quantitas Castaneæ, & bono cum successu accept. Acui potest Remedium, si adda-

tur simul Sal volatile foccioli à gr. xv. ad dr. ʒ.

Aliis illi juvantibus sacra Anchora e rit *Laudanum Opium*, imprimis Appropriatus, præsertim *Succinato*, mistum, quod quoscunque spirituum Animalium inordinatos Motus compellit, coque hinc promptè sedat. (R)

Externè commendaatur Pioguedo Scuri, Dauræ, & Serpæcum, Temporibus illis; item Oleum Buxi, & ab HOE. FERRO Pulvis Bombycum capiti adpersus, *Herc. Med. nov. lib. i. pag. 31.*

Hæc in usum venit contra Paroxysmum.

Quædam curatio in *Paroxysmo*: In ipso Paroxysmo Vertiginis graviore & crebriore, in specie Vertiginis Cadædam Aegri corrumpit, & ad tempus læcet, antequam se cogere queat, conveniunt præ cæteris mox infusa *Vinosa*, quæ eos optime exsiccant: a loco quorum etiam *Clyster* acres applicantur, cum Symplo Emetico vel lasu Anomalia infundendi, usatæ aliis in Epilepsia, Apoplexia, &c. Clyster faciant Rursus infundent, retrahunt spiritum inquantisper a capite, qui involuntè ibi se movent. Pro Derivatione aotem ponuntur *Cucurbitule* in Cervico, Ventræ sunt meliora. Hinc præmissis vel omisiss talibus, utitur *Mixtura ex spiritibus cephalicis, & aromaticis variis*, qualia sunt spiritus Viteroli volatilis, aut Cephalicæ, spiritus Ceraforum nigrorum & Liliorum convallium, ad volatile Succini, Cornu Cervi, & similia in aqua Mentha, Salvia & Ceraforum nigrorum. *Cassia* etiam, quæ *Essentia*, commodè usurpatur simul, præsertim Mulieribus. Item Oleum Succini ad aliquot guttas in aqua appropriata assumptum, & propinatum impedit convexit.

Externè Vertici, Temporibus, Naribus, Scrobiculi Cordis & similibus, iungitur Essentia Cadorei, spiritus in Ammoliaci, oleum destillatum Succini, aut etiam *Infusio Peruviana*, vel *Appeliana*, aut similia *Antiepileptica* & *Antiepileptica* aut obijcet Naribus *Nigella Romana*, sive ejus Semen Aceto irroratum. Radix *Pavæ* nec collecta, & de Collo infusa, Vertiginem desperatam quando corat. Uno nomine, simili terè modo curat in Paroxysmo, atque alias traditi solent *Infusio Epilepsia*, & Passiones graves *Hysterice* & similes in *Paroxysmo*. Quibus Volatilibus in Malo perniciat interdum addatur *Opus*, quæ sicut Vertiginem graviores in *Paroxysmo*, in specie si misceantur Volatilia: v. g. præmissis præmittendis.

ʒi. Aquæ Surr. ʒi.ii. vel li.

Menth. ʒi.ii. vel ʒi.ii.

Spiritus Lil. convall. dr. iii.

Sal. Ammoliaci, vel huius loco *Liqu. Cornu Cervi succin. dr. i.*

Laud. Opus. gr. ii. vel li.

Syr. cert. Aurant. vel Fenic. dr. i.ii. ad dr. vi.

M. S.

Potio contra Vertiginem.

Hæc in Mulieribus *Essentia Cassia* commodè addi potest.

Vel

ʒi. Aquæ Ceraf. nigr.

Menth.

Lil. convall. cum Vin. ana ʒi.

Spiritus Ceraf. nigr. dr. iii.

ʒi.ii. Ceraf. dr. i.ii.

Salis vol. cornu cervi ʒi.

Succin. ʒi.

Syr. Flor. Tonic. ʒi.

M. S. ut supra.

Convenit etiam, ubi metus est Apoplexie: si *Vergo* in *Ventriculo*, potest præscribi hæc *Mixtura* in potissimo cochlearium assuenda.

ʒi. Aquæ Nitrid. cum Ceraf. ʒi.ii. vel li.

Mellif. cum Vin. ʒi.ii. vel ʒi.ii.

Spir. Lil. convall. dr. i.ii. ad li.

Salvia, vel Ceraf. dr. i.

Sal. Ammoliaci dr. i.ii. ad ʒi.

Salis vol. succini gr. xv.

Laud. Opus. gr. ii. vel li.

Syr. corn. Aurant. ʒi.ii. vel dr. vi.

M. S. ut supra.

(R) Non raram in Praxi est, à Nervosorum abusu fieri Vertiginis. Cuius itaque esse debemus in Opia Vertiginis extendere.

CAPUT II.

De Convulsionibus Et Motibus convulsivis.

Dictum fuit *supra*, quod ex inordinato Motu systematis Spirituum Animalium in Cerebro, & hinc in tantum Organis, talis in Functionibus animalibus sequatur perturbatio, quae dicitur Vertigo; quae ipsa interdum usque eo procedat, ut etiam Aegri concidant, quae *Vertigines proximae ad Epilepsiam gradus*, ita et continuo illis post Calum Spirituum Animalium inordinato Motu ad Partes Motui destinatas, exinde extra Cerebrum Convulsiones, & tandem Epilepsia superveniunt; hinc recta ad Convulsiones & Epilepsiam pergamus.

Doctrina haec in Praxi est frequentissima, utat in Theoria difficilissima. Pro rei *Historia* praesuppono, laedi primario in *ipsius Motum*, secundario sensus Internos & Externos. Notum etiam est ex *Parte Medicinæ Physiologicae Cap. 21.* omnis Motus Corporis Organos proximam esse *Fibras*, quibus tanquam funiculis Partes moventur, & contrahuntur, eaque inflatas per Spiritum Animalem sui contractione moveri, concurrente tamen adiumento Sanguinis, five *Fibræ illæ collectæ & unitæ in unum Musculi thesma coeant* sive hinc inde circulariter dispositæ & intertexæ *membranasum corpus* constituent, ut v. gr. in Intestinis, Vesica, & similibus obviæ est; five partes illæ fibrillæ ex Cerebro Nervos accipiant, in *Motu voluntario*; five ex Cerebello in *Motu involuntario*, seu sine sensuum progressionem, propter *causam Naturalem*, utot perperam, vocatos sicut & Spiritus Animalis moventes, partem in Cerebro, partem ex Cerebello acquiritur. Quod si igitur secundum Voluntatis imperium moveatur Musculus, aut reliquæ Partium internarum Fibræ motrices naturali modo & ordine, Motus sit secundum Naturæ leges: si vero præter voluntatis imperium moveatur hæc Fibræ, & ex his constituti Musculus, vel non absque insigni dolore, aut cum insigni Violentia contrahatur & agitentur partes, five internæ, five externæ, *Convulsio* appellatur Latinis, Græcis *Spasmus*, *crampas*. Græci dicunt *ακραν* seu *ακραν*, quod est *trabere*, propterea quod quasi summa vi & insigni violentia trahantur potius Partes per Fibras & quasi lacerentur, quam ut legitime moveantur.

Convulsio autem hæc seu *Spasmus* in genere est duplex; vel *Convulsio*, vel *Crampas*: de quo vid. LINDANUS in *Meltem. Physiologia*, qui et HIPPOCRATIS sensu recte deduxit. Per *Convulsionem* intelligit Convulsionem in specie sic dictam: per *Crampas* vero Motum Convulsivum. *Convulsio* dicitur *Convulsio Tenax*: Convulsio vero est *Convulsio Clastica*, quando Aegri tremunt: Nam *σπασμός* significat principè inaequalem Membri motum (S), unde etiam vocatur *motus Convulsivus* nitrò citroque, seu quod idem est, *in-vita Membri contractio & extensio*, node *ακραν* *ακραν* seu *Pulsus vitæ*, quando scilicet Arteria quasi in motu retrahit vibrat Pulsum edit, Tonus vero est iuxta CELSUM *immobilitas & rigor membri*, quod membrum contractum sit immobile: ita ut *Convulsio seu Convulsio Tenax* Membri rigidi contractioem, & in uno situ five figura permanentiam, indicet: *Convulsio* vero seu *Convulsio Clastica* inquit variam agitationem & vibrationem, modò extensionem, modò contractionem. *Convulsio igitur in genere dicitur insulsa & protervatale manifestum alteramque Partium fibrarum contractio*, quæ retrahit si perperam, adeoque membrum immobile fuerit, *Convulsionem* in specie & propriè dictam constituit; si vero interpolata, & Membrum variè agitur, *motus convulsivus* audit.

Convulsiones cognata est *Convulsio Tenax* affectio, quæ Membrum modè convulsam semper postmodum rigidum manet.

Convulsio seu Convulsio vera varias sub se complectitur *symptomatum species*, nempe *Tetanicam*, *Emprosthotonam*, & *Opisthotonam*: Quæ & aliæ species pertinent; Nam pertinet hæc etiam, (nempe ad Convulsionem) *Trisismus* & *Ectrisismus*; item pertinet hæc *Spasmus cynicus*, cui admodum Sympto-

ma dicitur *Rifus sardinius*: Pertinet hæc etiam, quando contrahitur Brachium & obregeit ex inepta Venæsectione; quando nervus pungitur: item quando Tendines obregeant ex luxatione; Pertinet hæc illæ *Afflicti inanimati*, quando Genus contrahuntur & rigida manent propter contractum Nervum ac Tendinem, quæ per cavum Genus transeunt.

In specie famosi sunt isti tres Capitis affectus: *Emprosthotonismus*, qui est convulsio Musculorum Colli inclinatio seu Malloideorum, hæc est, quod hic Musculus pectori assignatur: Contrarium vitium est *Opisthotonismus*, convulsio musculorum Occipitis, quibus Occiput versus Dorsum & posteriora retrahitur: *Tetanus* denique est convulsio simultanea & anteriorum & posteriorum Capitis Musculorum, hæc enim Caput ad nullum latus verti potest, sed Caput & collum rigidum & immobile permanent. Sunt tamen qui non solum Capitis versus Truncum, sed totius Trunci tales convulsiones sub his nominibus intelligunt; Conf. SYLVIVS lib. 2. Prænot. cap. 23. §. 19. (T)

Ad *Emprosthotonem* pertinet Aphorismus HIPPOCRATIS Sect. 4. aph. 35. *Si Febris detento reperiatur Collum interque, ac vi deglutire queat, nulla erigetur Tumor, lethalis est*: quem Aphorismum vulgo, sed male, de Angina & Luxatione Vertebrae interpretantur, nam revera intelligit HIPPOCRATES speciem *Emprosthotonismæ*. Comprehendit enim ille Casus Morbum, quem nos vocamus, Germ. *den Hals amdrucken*, id est *Collum interque*, quando nimirum tunc Musculus Malloideus convellitur & rigidus manet, sic enim Caput circumducitur, Alpera arteria comprimitur, & tales Aegri tandem suffocantur. (V)

Hæc de Convulsionibus seu *Spasmodis* in genere.

ARTICULUS I.

De Convulsione Clonica, &

Epilepsia.

Quod *convulsionem seu convulsionem clonicam*, aut, uti vulgò appellatur, *Motus convulsivus*: quando unum seu plura Membra moventur inaequaliter, sunt varii, pro varietate Partium convulsarum, quales sunt omnes species Epilepsiarum, pertinentque hæc *crampas*, seu, ut vocant, *Spasmi Fluminis*, Germanicè, *der Krampf*, cui imprimis Ebrois, item qui ad Arthritidem nonnulli inclinant, sunt obnoxii. Pertinet hæc etiam experimento auctorum ista *Convulsio parva*; quæ in emissionem Seminis Venerea accidit; unde quibidam Philophas & Medicis, in specie DEMOCRITO, *colicus Epilepsia parva* vocari solet.

Dial, quod ad *convulsionem etiam* pertinet *Epilepsia*. *Epilepsia* ergo quod attinet: hæc sunt revera tales *convulsionem seu Motus convulsivi*, in quibus universum corpus, aut plura eius membra, diversimodè contrahuntur, vibrantur & agitantur, sensuum exercitio quocunque ut plurimum abest: cuius sub sua latitudine tres sunt modi seu Gradus (vocat lubet.)

Primus Gradus, usque abusive five improprie *Epilepsia* tributus est, quando Aegri subito concidunt & corruunt, aut saltim, five leant, five sedant, omnium Sensuum Functionibus ac Motus exercitio subito privantur, & quasi Somno arctissimo lapsati, citra ullam Animalem Functionem ita persistunt, ut omnes Spasmi sensatus five externarum Partium Convulsio accedat: licet, si per consensum hæc partium Abdominis, v. g. in *Myelitis* aut *Splenitis* & similibus, subinde Spasmi Partium internarum utroque concurrant, sub Lipothymia concepta vulgò exprimentur: vnde dicunt communiter: *sunt Deliquis, Epilepsiam vocare solent*. Hæc Epilepsia modè est potius tertius Gradus, ad Vertiginem caducam pertinet, quam Epilepsia dicimus gradum proximum, eum facillimè sibi Epilepsiam veram commitem adificat.

Secundus Gradus Epilepsia, seu secundus affigendi Modus est, quando variis Motibus & Agitationibus Corpus universum percutitur & convellitur, Sensibus quibusvis, tam Inter-

(S) *Krampf propriè est motus qualis tumultuantium.*

(T) *Tonus est tendio* is: hinc *Tonus tenio*: *Tetanus* tenens, extensus: *quemadmodum à τένω & τενώ* ante, vel *τενέω* à τέρω, sunt *Εντενέω*, & *Οπτενέω*, *Emprosthotonus* & *Opisthotonus*, Convulsio in anteriora vel posteriora tendens.

(V) *Vide huius Aphorismi interpretationem, quam dedimus hoc Tomo Sect. 4. col. 109. lit. G.*

Internis quàm Externis, & Ratione, aut integrè perflantibus, aut in Delirium abreptis, dum interim quod exterius Paries convulsit, sub Convulsionibus ipsis saltant & cantant, interdum ridet, aut lacrymas fundunt, hinc inde percutitur, pedus percussit, interdum ridicula narrat, vociferant; post paroxysmum verò omnium secom aliorum, sive delirant sive non delirant in paroxysmo, recordantur, &que optime, donec nihil, sciunt. Exempla talia stupenda videb. in WILLISII *Paralys. cordis. de morb. com. causis. ubi de Epilepsia* item in RIVIERII *Praxi. ubi de Epilepsia*, qui refert talem Epilepsiam la Moniali, in qua sensus interni & externi viguerunt, tantummodo epilepticæ varietate partium Convulsionibus adhaeruit: NEUCRANZIUS *Traict. de Parox. cap. 33.* simile habet Exemplum: Sic TIMÆUS *von Guldensack* miram etiam huius rei refert Historiam in *Epist. 9. pag. 22.* ubi puer Epilepticus ascendit in altum Scabellus integris: Sic BARTHOLINUS *Cent. 2. lib. 90. pag. 301.* miras describit gesticulationes & adiones Epilepticorum. Nam certè tam stupendum, & tam varietate eorum luctu gesticulationes, motus, adiones, gyrationes, ut vix absque stupore legi, nedum aspicì possint. Talis Epilepsia sæpe in Melancholia Hypochondriaca obvenire solet, & optime curatur per Liqueorem Cornu Cervi facinatum. Pertinet hæc Epilepsia turpis BOOTHII *Tr. de Affect. omif. cap. 6.* qui exemplum pueri epileptici duodecim annorum, qui paroxysmo epileptico vacavit, continuo Cursum semper recta percurreret per ignem & aquam, per montes, per omnia loca, idque tandem, donec obstaculum offunderet, ut longius currere non posset. Vocat ob id Epilepsiam *Cursum*. Similem casum habet VALENTINUS *Tr. de Convuls. qui de Epilepsia Reticulari observavit*: Vid. M. A. N. C. *Ann. 2. lib. 32.* ubi Virgo Fulgore terribi, Mentes tamen compos, altera interius cori, cubicali penes parietes diffcurrere cogeatur, Venufatione & interius Antispasmodicis curata: Sic Epilepsiam, in cuius Paroxysmo diu & multum *Egra* ridet, videb. in M. A. N. C. *Ann. 2. lib. 304. pag. 326.* Item Epilepsiam mirandam, in quibus sensus omnes & Intellectus fuerunt illi, videb. in FEHR *de forcen. pag. 96.* Et sæpius in his Epilepsia tam mira sunt symptomata, ut via commode enarrari possint: Conf. SALMUTH *Cent. 2. lib. 42.* qui habet Epilepsiam, in cuius Paroxysmo Oculi extra cavum illius pagni protendebatur, & tamen post Paroxysmum in naturalem statum redibat: item *Cent. 2. lib. 41.* Visiones & spectra apparentia observavit, tam autè quam post epilepticum Paroxysmum.

Tertius Gradus Epilepsia seu Modus, & quidem communior, est iste, qui ex utroque modo dictis videtur consistat ita ut omnis tam Sensus quam Rationis vis pereat, simulque variis Motibus Corpus ejusque Membra agitentur & concutiantur, ad bonum proficiantur, dentibus strideant, Brachia aditent, Pollices rectè claudant in manus, Pedibus trement, Corpus insigniter attollant & demò deprimantur, insilar globi incurvant, Spuma per Os rejiciatur, lachryma & Lingua moris lendantur, &c. Quibus omnibus successit remittentibus *Eger* tanquam Sopore oppressus jacet, gravi Suspiratione (quod signum est, Pedus antea convulsus fuisse) ad se rediens, ubi omnino scit, tantum de Torpore & Gravitate quadam Capitis, & omnino Artuum gravi Lassitudine, conqueritur, quod sit ex Laceratione Fibrarum ex impetu Spirituum ad eundem derivatorum. Et hic tertius Gradus est omnium frequentissimus & gravissimus: *Primo* Gradus omnium est *rarus*; *Secundo* rarissimus sed vulgo ignoratur: Idem Gradus secundus est terribilissimus; nam tales subinde *pro affligit à Demone* habentur, nisi Medici prudentia & scientia innocentiam *Ægri* defendat.

Ex his patet, quod *Convulsio, motus Convulsivi & Epilepsia, non differant in radice, sed solummodo fandi*. Epilepsia enim consistit in Motu depravato, nempe in Motu involuntario, inordinato, interrupto, & nimis impetuoso. Convulsio verò, seu Convulsio consistit in Motu involuntario modo, & continuo à Spirituum nimio, & inordinato, ac rapido influxu. Unde illud, quod *Subsolum Motus est Naturalis*, id ipsam necessariò etiam Subiectum erit huius Motus Præternaturalis, & id, quod afficitur in naturali brachii contractione, aut in voluntaria Fæcum Alvi exclusione, id ipsum etiam afficitur in his Motionibus præternaturalibus. Cum ergo *Fibra Nervosa sit Subsolum* omnis Motus Naturalis in Corpore humano, tam voluntarius in Musculis, quàm non voluntarius in Partibus Corporis internis membranis, & ubicunque sunt Membranæ, v.g. in Intestinis ob id etiam necessariò in Convulsione, & Epilepsia *Potes*

illæ nervæ Contradictionem morbosarum subsolum erunt: floridem in omnibus Corporis partibus, ubi est motus, id fuit Fibra, & ubicunque sunt Fibra, ubi necessariò fit quidam Motus; ita ut Fibra hæc Nervæ sint Subsolum tantum, *Motus* verò, & Membranæ, & illa Fibra contractæ, sunt Subsolum proprium, seu speciale.

Fibra Nervæ dico: Nam ipsæ Interi nil aliud sunt, quàm congeries talium Fibrarum iuxta se variato nexu sitatarum, quæ Trunks duplici à Meningibus Cerebri continuata investitæ corpus Nervi constituunt. Similiter Fibrae alio modo systematicè congeneratæ constituunt Musculos, demonstrante hoc STENONE. Similes Fibrae partibus circualiter, cruciatis, vel alio modo intertextæ, nunc in forma plana constituunt Membras, quæ in forma cylindrica constituunt Stomachum, Motuque internos involuntarios excitant. Fibra igitur, & partes per Fibras motæ erunt Subsolum Convulsivæ, & Epilepsia.

Ex dictis hinc Differentiæ, cum Epilepsia, & Spasmi dividuntur in Internas, & Externas. Externæ sunt, quæ solum Membra Externa cruciant, & concutunt, v.g. Convulsionem Brachiorum, Capitis, Oculorum, Pedum, Thoracis in Afflicta Convulsio, Ori; &c. Internæ verò Convulsionem sunt, quæ Viscera Interna membranosia variis Convulsionibus mire torquent; verbi gratia in Colicis Scorbucis Convulsivis, item in Passionibus Hystericis, dum Intestina, Mesenterium, & anaxæ Partes Convulsionibus Spasmodicis mire affliguntur, in paroxysmis Nephriticis, Singultu, Vomitu, Torminibus Infantum, Tussi, & similibus; qui Afflicti appositè Germanis Mulieribus (in male Scripsero Latino tale quid inveniat) dicuntur: *die schmerz Nach im Leibe*, id est, Epilepsia in Corpore: Item de *interleischner Nach bricht aus*, id est, Epilepsia Intera exemplis. Pertinent hæc Tensiones Abdominis, & Hypochondriacæ, quando conueniunt de tensione regionis Hypogastricæ, quæ frequenter eveniunt in Subiectis Scorbucis, Hypochondriacis, & similibus; item Tensiones circa Tempora, &c. Et ubicunque sunt membranosæ partes, si illæ Spasmi, aut Convulsione afficiantur, indurari, obliqueferre, & insilar Membranæ Tympani fortis tendi solent ex Fibris, ex Spirituum impetu ita afflicti.

Talis etiam Afflicti est, quando in *Spasmo* convulsio Stomachus *Vomitus*, & convulsio interdum *Intestina* *Cilias* patiuntur: item quando Cor palpitat, & convellitur (omnis enim palpitatio est convulsio) quales convulsionem etiam in Hypochondriacis, ac good idem est, *Hysterici*, plures observantur; cum in his subiectis quamplicitas vaga, & subinde varia, ac mira Symptomata maximam partem ex talibus spasmodicis partium internarum oriantur, impetibus quando *Pleas Nervos*, quales plures sunt in Abdomine speciatim *Magnus* illis in *Mesenterio* afficiuntur: vid. WILLISII *Lib. 2. Cap. 1.* Cum enim ex his deriventur Nervi in reliquis Abdominis partes, facili totum abdomen, afflicti his Pleasibus, aut saltem plures illas Partes convulsionem patiuntur: Et cum hic Pleas Mesenterici ex *Pari Nervorum* uero, nempe oclavo, oriendi, conjuñcti sint *Nervi Interstestinales*; ob id sæpius afflicti illis plexibus, & *Pleuris*, & Capitis partium Convulsiones tandem insequuntur, adeo ut istarum partium internæ convulsionem, læpida ad radicem Nervorum uique continue, ibique Syntema Spirituum in confusum Motus agitantem, terminentur tandem in convulsionem Partium externarum, quod vocant: Epilepsia Intera exemplis. Qua ratione non raro Passionibus Hystericis gravius afficitur Epilepsia Universalis, seu Convulsio Partium externarum: ut & *Pari affligi* non raro supervenit Epilepsia, toties repetens, quoties ad eorum parturienti Gravidæ se accingit. Nam illi *Dolores Parturientium*, nempe Dolores Abdominis, & *Dolores per Partum*, nil aliud sunt, quàm partium Abdominis, in specie, Uteri, Mesenterii, & subinde Intestinarum Spasmi, seu Convulsionem.

CAUSÆ.

Quod Causas præsupposito spiritus Animalis, tanquam Motore universali ex cerebri per Motibus Voluntariis, ex Cerebello per Motibus Involuntariis, seu Naturalibus, per Nervos distributo in omnes partes (hoc tamen adhuc patitur suas limitationes, videb. WILLISIIUS), qui quacunque ratione fiat, Fibra ad eum Contradictionem disponat, sive solitarie hoc faciat, sive adiutus simul Copula elastica ex Sanguine suppetituri, necessariò idem spiritus etiam movebit in Contractione partium morbosæ, & præternaturali verbi gratia uti spiritus per Nervos Brachii influens movet

Digit

Digites, & Brachium ex meo arbitrio, ita si fiat Punctura Nervi, & inde convulsio Brachii (cum hic Motus, nempe convulsivus, seu huc convulsio, sit idem motus cum priore Brachii contractione voluntaria, tantummodo in eo differens, quod convulsio invito convulsio contingat, & non absque violentia indigat, concurrere simul interdum dolore: conf. SYLVIVS lib. 2. *Prax. cap. 23. de Morb. Cap. 5. 30.*), sequitur necessarium, spiritum animale, qui secundum arbitrium movet Brachium, etiam in convulsio Brachio ex rapiditate, & impetuore ejus, propter irritationem, & inoleptum ejus continuum motum tremulum, (in quo motu consistit dolor) Infensu, illius convulsio Brachii esse auctorem: *Sic idem animi est motus, five sponte, & per jocum ridens, five Epilepticus Paroxysmus cum risu involuntario Sardus eveniat: eadem nempe est Mulculorum in utroque risu actio, & pars affecta, idem motus, ergo idem etiam efficiens, qui movens, nempe spiritus Animalis. Hec tantum inter se differant, quod, ut ordinantur, & placido motu spiritus, idque distans prius saepe Anima Rationalis, dant motum naturalem partium, & risum naturalem, ita idem spiritus inordinatus, confusus, & rapide in stimulo morbo agitat, & quasi cum impetu per Nervum in partem asplendi, convulsiones, & motus convulsivos, & verbi gratia risum convulsivum inferant. In Epilepsia tamen habitationalis, hoc est, inveteratis, & saepius levi ea causa recurrentibus, item hereditariis, forte suspicio deviare tunc ipsos spiritus Animales a naturali sua crasi, & constitutione, & magis elasticos, facilius inordinat, idque cum impetu mobiles reddi, utur in quo alterata huc constitutio praecise consistat, determinari cetero non potest.*

Causa ergo proxima formalis convulsiois, & Epilepsiae, cuiuscunque, erit impetuosa, rapida, & maxime violenta spiritum Animalium motus in partes profundas motui inoleptentes, interruptus quidem diversimode, inordinatus magis, & confusus in convulsionibus, & Epilepsia, contrarius vero & ordinatus in coactionibus, seu in specie sic dictis coactionibus.

*Causa rapida, & inordinata ipsius motus spiritum Animalium generaliter considerata ad duo capita causatur, nempe remota, seu materialis, aut occasionalis, referri potest. Primum causa est irritata quodam in parte quadam sensu, ut nervus, qua occasione spiritus Animalis in partem irritatam copiose, & impetuosius moti, convulsionem tunc loquuntur, tunc gravitatem, tunc convulsionem tunc loquuntur, tunc interruptam in Clinica, five Epileptici motus interit: Sic punctus Nervus ob irritationem in loco punctura, quae consistit in subtili, & celerissima Fibrillatum ejus motione, vibratione, & vellectione, ad Cerebrum sique connotata, commoveatur simul spiritus per Nervum cum blande influentes, quorum motu tremulo, & celerissimo, non cum moro Nervum concurrere, commoveatur simul ipsius spiritus, ita ut hi ipsi apertu quasi tramite per Nervum illum cum impetu ferantur, & ita convulsivum Fibrum istarum, & Mulculorum, ad quae terminatur Nervus, inducant. Hinc Nervus per Venae sectionem laesus, aut punctus, brevi post Brachio convulsionem inoleptem inferit: vid. SYLVIVS lib. 2. *Prax. cap. 23. de Morb. Cap. 5. 30.* *Et ex irritatione summi ad Medicamentum Antimoniali, huius sit convulsio, seu vomitus ex irritatione cordis sit huius palpitatio. Sic notum est, quod quando Nares irritantur ab obiecto acriori, superveiat sneruaria, quam tantummodo Helicor Narium Membranae infat concitat; hanc revera nil aliud est, quam motus Epilepticus Thoracis. consistent in convulsiva Expiratione; unde, & SALMUTH in observ. ex supprella sneruaria quae rem Epilepsiam ortam refert, quod sequitur simpliciter irritationem, aut vellectionem Membranae Narium, Et quidem convellit Thoracis, dum vellectione Nares, jam cogitata, sicut tantillum acce, quod vellectione Nares, tam insignem impetum, motum & convulsionem inferit totius Thoracis; ita & in alia Epilepsia de motibus convulsivis tantillum irritans saepe in loco remotiore existens, e.g. tantillum Fermentum acidi citra Membranae Cerebri consisti, occasione Epilepsiae suggerit: Conf. hic notabilis locus in M. A. N. C. Ann. 6. *obs. 77. pag. 171.* Sic tantillum acidi in plesu Meisererri tam insignem turbam inferre potest in Abdomine: sic ex irritatione Fascium, aut ex penna in gulam immissa, sequitur Vomitus: Sic Helicoriorum ac fumia auctorit convulsionem inducunt; vid. TULPIUS *obs. 35.***

Secunda causa remota generalis est ataxia ipsorum spiritum Animalium convulsiva, quando aliquid praeternaturale excrementitium vel vitiosum, aut in Cerebro haerens, certis in-

*tervallis commotum, eorum motum turbat, aut illi ibidem permittit, eodem vitione & cum impetu exagitat. Utroque modis, & spiritus in motu perturbato, inordinato, vagos & confusos, cogat, non tantum sensum omnium, tam internum, quam externum, (ad quod placidum & moderatum, idque ordinatum spiritum requiritur motus) hebetudines, sed etiam ex inordinato motu eorum in partes extra Cerebrum, tam internas quam externas, varii motus convulsivi supervenient. Nempe huc commode Vis elastica recrementorum praeternaturalium potest applicari, dum sui generis recrementa spiritibus Animalibus impermiscibilia, motus tamen concursu explosivum motum concipiant, Epilepsias inferunt. Experimur hoc non tantum in Verbribus & lumbis exagitationibus nimis, aut heterogeisatibus ex huius materia Visceribus ac spiritum syllematis suffulsi; sed etiam illustrant diverfi animi affectus graves, verbi gratia Ira, Terrores nimis, & similes, qui spiritus Animales nimis exagitando, eorumque motum inoleptem turbando, motus convulsivos aut Epilepsias substantias non raro inducunt: id quod praeterit in Infantibus notum: Conf. HOECHSTEDT ERS *Dissert. a. 2. in de Babel, SCHENCKIUS in lib. 2. observ. ubi Mulier ex terrore ob medium incensum oborio, convulsionem passa: Exemplum notatu dignum habet GABELCHOVERUS in Com. a. Curat. 39. item Curat. 23. & 24. de quodam, qui ea facillima iracundia in gravem Epilepsiam incidebat, & superflua Aqua frigida confectum in ipso Paroxysmo subito levabatur & curabatur.**

Ex summi morbo, ubi nempe vel vellectione aut irritatione Nervi, vel ubi Nerecrementa heterogenea spiritus eubantia, oritur divisio Epilepsiae in Idiopathicam seu per affectionem, ut vocant, affectu primario Cerebro aut Cerebello circa principium Spinalis Medullae, & spiritibus huius incola; & in Sympathicam seu per affectionem, quando ex alia parte affecta supervenient convulsiva pathematia: Ita ut Idiopathicam causa semper in parte convulsiva haerent, verbi gratia a lesione Nervi, in Sympathicam extra tam, verbi gratia convulsiones partium exterarum a Lumbicis Intellinorum. Per consensum est frequentissime Epilepsia, & saepius irritationes Nervorum sequitur. Quod vero per Essentiam est, existit rarior, nisi in Membris Cerebri aut in eisdem Ventriculis sines irritationibus haerent; tunc enim ferè per Essentiam esse videtur: Ut verbi gratia quando in convulsione Crani occasione Festinae, Cerebri Membrana gravida lesa Epilepsici motibus occasione praebet: Quae ex Recreatione heterogenea, spiritibus permixta, constituit Epilepsia, frequentior est per essentiam, nisi mediante Media Sanguinea ea alia parte sines morbosus afflueret Cerebro, ibique spiritus plus minus afficiendo Epilepsiam solent.

Quod atinet istam irritationem, quam diu frequentissimam Epilepsiae causam, sit huc variis modis, & varias occupat Regiones: nunc enim circa principium, tunc circa medium, praeterit circa plesum, tunc circa finem seu inferiorem Nervi cuiusdam consistit. Ad principium Nervi etiam Cerebrum & Cerebellum, itemque Medulla Spinalis, unde oriuntur Nervi, pertinent: Unde dum in loco irritationis ex aucto & simul nimis rapido & inordinato spiritum ad locum irritationis in Nervo motu, sensum inchoat convulsio, huc est primario tantum Fibrum levior contrahenda, quae ipsa tamen ob continuatum spiritum impetum sensum connotata, successu secundum ductum Nervi, ipsaeque annexarum Fibrum, sursum magis asque pergit, indeque pars immobilis redditur, dumque illud convulsivum motu, ad ipsam principium Nervum continuatum, spiritus Animales in Cerebro violentius agitati, quod scilicet quasi agmine & impetu per eundem etiam & per vicinos Nervos explodi quasi & expandi incipiunt. Unde ex inordinato isto motu intra Cerebrum non tantum omnium sensum perturbatio, sed etiam ex simili depravato motu in partes externas, convulsiones, tam partem illis primario affecte, quam etiam partium aliarum non affeclarum, sequuntur. Dum vero succedat inchoata sneruaria seu motus convulsivus secundum Nervi ductum, ac spiritibus propter irritationem impetuosis irruentibus, sed ea parte illius sonoibil resistuntibus, sursum pergit, & urget ipsam Fibrum contrahenda, unde Membum sit immobile, percipiant aut imaginantur sibi Aegri, praeterit cum Fermentationis quidem sensum internum superveniant, quod materia quidam subtilis seu aura quidam, ut vocant, aut spiritus quasi volatilis, ea non vel altero Membro ita sursum repat, & ubi ad Cerebrum pervenerit, ibidem convulsiones Epilepticas inferat. BARTHOLOINUS & HILDANUS in-

bent Exempla sentientium levem Auram ex Membris ascendentem ad Collum, unde cadunt. Confirmat hanc eorum mentem, quod *Ligatura* strictior supra Partem primariam dolentem, ubi Aura illa rediret creditur, iocunda, paroxysmum incipientem praecavet, quasi Auræ adfensus inhibeatur. Illustria Exempla fopeditur LINDANUS, quæ postmodum habebimus, verbi gratia quando ex Pollice percipitur quasi adfensus Auræ & hinc Epilepsia, Ligatura circa Pollicem Epilepsiam praecavet. Ipsa verò Ligatura non convenit impediendo ascendentem Auram volentem, sed potius, quatenus eadem firma Ligatura Partem inferiorem quasi stupida, indeque minus sensibilibus & minus irritabilis redditur, unde & Irritatio sensus, & rapidus spirituum Animalium Impetus, & sic etiam Fibrarum contractura & convulsio, aut omnino tolluntur, aut saltem, quod minus vehementes sicut, impediuntur & suspenduntur. Per ratio est, quando in Hysterica Passione Ligatura forti Hypochondriorum nimium incrementum praecavetur: Fit hoc non propter Auram adfensibilem quasi exelata, sed propter inchoatam Convulsionem Partium inferiorum, quæ ipsa Ligatura impeditur, & ulterior progressus quasi sufflaminatur. Exempla talium Epilepticorum non sunt pauca; unum tamen aquæ alterum curiosis referam: TUPLIUS *renatur. 4. observat. 2. & 3.* talem refert Epilepticum ex Pollice Pedis: Pariter BORELLUS refert Epilepticum ex Pollice ortam, per Causticum ibidem applicatum curatum, *centur. 2. observat. 95.* Sic HEINRICUS ab HEER in *observat. 24.* refert Epilepticam ex subita animi consternatione & Terrore ob folliculorum Stupor, in cuius paroxysmo agra continuè fricabat Pollicem Pedis, in quo facto Causticum cum Butyro Antimonii, fuit sanata: SALMUTH *centur. 3. observat. 39.* habet Epilepticam concitatam per Auram ab Extremis ascendentem, per Ligaturam partibus istis inmedia præservatam: Refert LINDANUS de quadam Muliere, quæ quoties paroxysmus Epilepticus in procinctu erat, dicebat, intra pueritiam regione-pubis fensile levem quandam Morficulum (quod non potuit esse nisi in Utero, quoniam laborat vizio Uteri & Menstrui defectu, & nunquam reddita fuerat Gravidâ), post Morficulum fensibilem sibi aliquid surgere, & designat accuratè locum: Inde à medio corpore infra & supra Umbilicum ad superiora: & ipsa Aura, ut vocat, non surgebat celeriter, sed paulatim, & cùm appropinquaret circa Cor, incipiebat illi Cor palpitare, & tunc post unum vel alterum Pulsam Animi Deliquio afficiebatur: postmodum, eùm pulsus deorò inciperet, tota eiò convellebatur, & superata illa Convulsione ad se redibat, donec novus succederet paroxysmus. Porro dicit idem LINDANUS: *Curavi Puellam infanciam ætatis, quæ laborabat Epilepsia Obstructione Lienis scilicet (Morbis enim Lienis ut plurimum Convulsi sunt).* Hæc à me examinata, revaluit se sentire tenuis invasivis paroxysmum se sentit sentire ex finibus Hypochondri transversum quid, & sic ad medium perveniret Corpus, retrogradi, & delatè factum tendere, & quoad Cor perveniret, Animi Deliquio corripit, & hinc Epilepsiam subito supervenire. Pauperes aliquando, & exaltè deliquit locum, quemadmodum videretur ipsa Aura. Tertiò refert LINDANUS de Juvene Francetæ, qui habebat Carum Officium in Pallio Pedis, ex quælibet sensu fargere auram in illa Aqua servida, quæ, sub supra regionem Hypochondriorum percutit, Epilepsiam intalit. Poterat præcipue partysum, & quemlibet ille in Pede sentiebat Morficulum ista, Partem Fasciæ transversalibus, quæ eas suas conferret, supra Genu artissimè vestiebat: & si hoc faceret, impellebat partysum: si verò non faceret, statim Epilepsia corripiebatur. Semper, dicit LINDANUS, quævis ex eo, non sentiat aliquid in Capite? quæ respondet, se nil in Capite, nisi Vertiginem quandam sentire. Ex Constitione Pollicis Pedis videt. M. A. N. G. *centur. 2. obs. 95. pag. 169. & centur. 6. & 7. observat. 77.* Sic refert HELIDÆUS in suis *Centur. pagin. 29.* de Epileptico, qui ante paroxysmum Frigiditatem & dolorem pungentem in Manus sinistra percipiebat, cuius annulari Digitus antè ex Vulneris Sensum Motumque amiserat. BARTHOLOMÆUS *centur. 2. observat. 61.* refert Epilepticum singulis Nevlunibus cum Tumore Digni Pedum minimi recurrentem, Caustico illi infuso curatum: Tandem notabilis est *observat. 25. centur. 6.* HILDANI de Muliere Epileptica ex Aura quædam è sinistram Manus medio Digno ascendente reddita. paroxysmus quoties redibat, de summo Dignito dolore queriebatur: tunc Manus contrahitur, Brachium convellitur, & tandem Motu convulsivo totum corpus percutitur: Cùm nulli auti veller Medicamentis, facta circa Carpum & Brachii partem musculorum Ligatura forti ex Coelo humano, evanescere omnes

Insultus; nec ab eo tempore quicquam eorum percepit. Parile Exemplum videtur in M. A. N. G. *centur. 3. obs. 334.* Vid. etiam DECKERS in *Barbæ Part. pagin. 2.* ex doctæ Manus Pollice: RHODIUS *centur. 1. observ. 57.* Hæc & similia Exempla ex Irritatione ortarum Epilepticarum sunt creberrima, Aura hæc affurgens, nonnulli Sensus fallacia est: Nec enim Movens adest, quod auram istam propellere, nec Spatium, per quod moveri Aura illa queat, sed potius, dum in Loco Irritationis ex aucto & simul coordinato spirituum ad Locum Irritationis Motu, in illo Loco sensum inchoat convulsio aut Convulsus Motus. Quod verò percipiat ut plurimum Frigida, sit (1.) quod spiritus animales aliquo modo conferant ad calorem Partium, hinc in Paraplegicis Partes ordinariæ sunt frigidae: (2.) per ipsam Partem spirituum Motus & Insultus liber plus minus sufflaminatur: & (3.) ordinariæ est Partem, Membrum dum incipit ipsam convelli, quod Refrigerationem videtur percipere: Si imminente Vomitu percipimus quandam Refrigerationem, & similia.

Partes, per quarum Confusum Epilepsia oritur, sunt variae, pro varietate Nervorum affectionum in toto corpore: videb. hic imprimis SENNETUS ubi de Epilepsia *pag. 649.* Præterea ex Retentis corruptis, ver. grat. *in præfatione Mercurii aut Hæmorrhoidum*, item ex defectu Excreti Urinæ in Mulieribus, non raro tunc Epilepsia per Confusum, quoniam suffusa Excretio Liquoris feminilis, & inde nata Acrimonia non raro in Mulieribus Epilepticam per confusum infert, irritando Partes nervosas circa Genitalia: Sic FORESTUS *lib. 2. observat. 215.* observat convulsionem ex Utero totius corporis, ob Liquoris genitalis corruptionem: nil proficientibus Remediis, facta titillatione per Mulierem in Genitalibus cum oleo Liliaceo, cui Zibethum immixtum erat, illic facta est: putrefcit enim Liquor genitalis erat; accensus Humores, hinc convulsiones. Sic idem FORESTUS recenset Exemplum suffocatae ex Uteri Affectu, quomodo Tonfor crinibus Podendum apprehendit, unde sevaluit: Sic HILDANUS *centur. 6. observat. 25.* refert, Mulierem Epilepticam ex Utero cum convulsionibus ad eum modum, quo cum Viro coire consueverat, à Viro longe antè abiecit per Coitum mox curatam, neque amplius, cum Medico illo conjugaliter vivente, convulsionibus correpta: Epilepsiam à causa Cordis Taberata videb. in RHODIO *centur. 1. observat. 55.* Ex Hypochondrii deorsu obstruente *observat. 56.* Ex vizio *stomachi* frequens est Epilepsia. Vero Lumbi creberrimè tam in Infantibus, quam in Adultis efficiunt Epilepsiam, qualem ex Vermibus Intestinum refert BARTHOLOMÆUS *centur. 6. Hyg. 20.* ZACUTUS LUSITANUS *lib. 2. Med. Princ. lib. 1. cap. 17.* PISO *lib. 2. de Morb. caput. 1. & centur. 1. FORESTUS lib. 2. observat. 65.* GRUELINGIUS *centur. 3. obs. 74.* MOERBUS *Hyg. lib. 2. par. 1. cap. 12.* & RHODIUS *centur. 1. obs. 59.* à Prægnatione *obs. 60.* Mulieres Gravidæ, item Mulieres Parturientes, aut etiam quibus suppressa sunt Lactia, sepius incurrunt Epilepsiam, quæ ex Utero cum iniqueque Partu refert TUPLIUS *lib. 1. obs. 10.* Ex ulcere in crure tanto Epilepsiam, quo rursus aperto ea cessavit, videb. in AMATO LUSITANO *centur. 2. Hyg. 6.* Item ab occulo Ulcere in Crure, ex quo adiectus Aura Epilepticam infert: Videb. in BARTHOLOMÆO *centur. 3. Hyg. 20.* HORSTIO *lib. 2. obs. 20.* HILDANO *centur. 2. obs. 10.* Ab Hæpate in RHODIO *centur. 1. obs. 62.* Ex Lienis, qualem idem lib. 1. *observat. 9.* SCHENCKIUS in *observat.* HORSTIUS in *observat.* &c. refert. Ex Renibus & Nephra calculosa, de quo videb. BARTHOLOMÆUS *centur. 1. obs. 61.* Ex ulcere abdominis interno, de quo videb. LOSSIUS *lib. 2. obs. 11.* Ex mæsturnis, vid. RHODIUS *centur. 2. obs. 61.* Varietate quoque Morbali ante sui eruptionem, vel etiam post non sufficentem excretionem, familiarissimè Epilepsiam infert. Sic Melancholia subinde in Epilepsiam abiit, videb. SALMUTH *centur. 2. obs. 42.* Cuius e contra Epilepsia subinde in Melancholiam transit. Ante trisannum sub Cura habui Pueroem decem annorum Epilepsia Habituali correptum, nodu suaver dormiebat, mane erigens Dolorem in sinistram Hypochondri percipiebat, & decem vel duodecim in die paroxysmos patiebatur: Coram eum cum Pollice Epileptico Antimonialis, sed eo ipso puncto, quo Epilepsia non redibat, aderat Melancholia, & quidem radicalior, recedente autem post aliquot septimanas Epilepsia, Melancholia evasit. Causa non rara est, nempe convulsiva ista, quæ Epilepsiam infert non secus, ac purgativa acris. Mixta parietem in dispositis Epilepsiam excitari supra insinuatam est. *Arthritis desiccans*

neus in Epilepsiam terminabatur, quæ cessavit revertente Arthritide, auctore RIVERO *enarr. 3. observat. 25.*

Hæc sunt Epilepsie per Irritationem, idque per consensum. Raræ sunt, quæ sunt per Effentiam Cerebri affectu, uti semper percipiuntur tales Nervorum Spasmi.

In specie, quod *causæ remotæ* attinet, five per Effentiam, five per per Consensum Epilepsiam inferant, causa irascitur *non externa* quæcumque laedit, *quæ interna* est.

Est *internæ* frequentissima solet esse *acidum viscidum* Nervis inimicissimum; id quod in Hypochondriacis, Scorbaticis, Hythericis, &c. manifestum est, quibus Epilepsie Habitales & Chronicæ familiares sunt: Ita quidem, ut HOGELANDUS *de rem. pagin. 286. & 287.* Epilepsie primariam radicem in Lenia perverso Fermento concipiat: qualem aciditas laetis causa videtur illius Morbi convulsivæ à Luc Gallica, cuius BARTHOLOMÆUS *enarr. 6. deff. 21.* mentionem facit. Uno nomine, est acidum viscidum ea primit viis oriturum, sed volante magis, minus tamen, hinc inde penetrans, quod vellente Nervos aut Partes cognatas, huiusmodi Mala inferre. Jam ergo five fit humor acidus, five Fermentum tantum odore acidum, se insinuans, facillime Epilepsiam inferre potest. Acidum enim hoc subinde se insinuat in Partes Muscularum fibrosas ac tendinosas, easque hinc rigidas, duras ac intraschabiles reddit; post hæc ipsos Nervos quoque in loco asilendo, Epilepticos Paroxysmos inferit, præter huiusmodi visciditas quibuscumque in locis residentes, non præcise in Musculo contracto, speciatim Glandulas & Plexus Mesenterii occupantes, imò etiam Nutritivum earundem spermaticum chylosum coagulans, in materiam glycicam & tartaream, ut vocant, interdum transit. Unde omni penitus motu subacta pars illa admodum contracta & immobilis manet. Præ cæteris Scorbaticis, Hypochondriacis, & Hythericis, in quibus manifestiora acoris peccantia sunt indicia, ad hoc crebris obnoxii sunt affectibus spasmodicis, Moribique convulsivis, & Epilepticis: in quibus circa Glandulas Mesenterii collectum viscidum acidum, aut ex pancreatice in Intestina effusum, & hinc in Mesenterium promotum, hinc Spasmodicas Convulsiones cum Rugis Ventris, cum Globis in abdomine sensu, cum umbilici ad interiora versus retrahente, & similibus affectibus inferit Conf. DR. A. WITZLIUS in *tractat. de febrib. & RIVARIUS.* Unde in tantis plurius Abulparadocis, & Antiepileptica naturæ Aitacice, vel acidum delinquentia, vel istud obstantia aut demulcentia. Inter graves Epilepsias hæcque exercitii gratia Virgine pauperem sub Cura habui, quæ inter alia, præter solutis Epilepticos, nunc autem, interdum post Paroxysmum, in Insula Mianico corripiebatur; item patiebatur Fluxum Menstruum ordinarium, sed singulis biis mensibus: tertio ætæ admodum vixit: quoties dedi Vomitorium, semper melius habebat. A his potest inferri, quod Epilepsia & Menstrua ex communi radice arisipia.

- (1.) Quatenus in Mania spirituum Motus interius vitatur, in Epilepsia autem exterius.
- (2.) Quia ad illi Voracitas, testis copiosi Acidii.
- (3.) Quod Faber Mali in Stomacho, & primit viis hæret: Unde
- (4.) Vomitus semper cum citatur.

Limatura Martis nihil valebat, Lixivium Glyceris clavellati etiam non valebat: præ reliqua autem fusiode egregium effectum habebat Vitum Coryllium; levamen quoque sensit ex Pulvere quodam præparato ex gr. lii. Pulveris Epileptici Antimonialis. Propter hoc Acidum Mulieres Hythericæ corripuntur Epilepsia. Et etiam Podagricis alique arthriticis non raro potentiatur convulsiones ex acido. Ob id in illis, quibus accessit ex primis Podagra vel Chiragra, in illis plerumque antecedunt convulsiones, aut saltem afficiuntur Crampis. In specie in Podagricis sapientia autem ambulationes sunt Convulsiones. Et vitum illud, quod Contracturam appellat, sic ab acido, ob omnino rigorem redditum Nervum, quo acido corruptum Nutritivum prosumum, induratur partes, & continuè contractæ manent, & tigidæ.

Alterum quod attinet causam Remotam, Recrementa nempe vitia plura minus explicite sunt elasta, & aëro-sulphurea, ut dicuntur WILLISIO, quæ per spiritum acidum volatilis expellunt SYLVIO, hæc in cerebro locifque vicinis congesta, aut spiritibus Animalibus permixta, eorum Gravitati, quæ quibusvis Occasionibus, five immediate, five mediante spirituum agmine vehementius commoto, v. gr.

in animi affectibus excitata. Motus spirituum inordinatè turbando, & impetuosis agitando, graves epilepticos paroxysmos efficiunt. Quicquid horum fit, sedulo habenda est ratio huius Epilepsie, etiam non adeo raræ. Videtur hoc evenire in Epilepsia propriè sic dicta, sine causa manifestâ, & Egros affligente, in ipso quæ supervenit Variolæ & Morbilli, ex quibuscumque Febribus malignis, in quibus frequentius observatur, à tali misamata spiritus Aëiales eorumque motum turbant. Quod talis Copula explosiva de natura acidi fit, probatur per Juvania, Salia nempe volatilia, &c. Pertinet hæc Epilepsia Mercurialis: Nam utat hæc ipse etiam radicem possit habere in quodam Abdominis Viscere, nihilominus tamen crebris spirituum viscosè constitutorum, & in Crasi viis deficientium, simul videtur subesse eratum. Crebrius observata fuit Epilepsia, post cerebrum vulnervatum & non rite sanatum orta, propter Fermentum quoddam acie malignum, in & circa balon epæ collectum & retentum; item post aliam ab alio in caput lapsum, ubi sanguis hæret sub Cranio, qui putredine cernitur & plius minus aciescent, Epilepsiam inferit. Hæc enim causæ, quibus cerebrum lædi contingit, etiam spirituum ordinatum motum in consensum permutare valet, ut eos insinuat, ut in his se permiscendo. Superiori anno cum quidam gravi Vulnere lædoretur in latere capitis dextro, quod Os Bregmaticum penetraverat cum Meningibus & cerebro, observari paucis post diebus supervenisse Convulsionem, sed levem, lægeris læsi loco vulnerati, e contra perfectam Paralyfin ac Resolutionem totius lateris sinii: sed cum paroxysmi Epileptici subinde supervenerint, utrumque lacus, easque partes promiscue convellebantur: Sed extra talem Paroxysmum Paralyfin Pars sana, spatio pars ægra, laborabat. Patet hæc pertinet Febri malignæ, aut etiam Bælyæ summa malè indicata, quæ occupando cerebrum, ibique spiritus Aëiales turbando, præter Delirium, convulsiones Epilepticas ordinariè inferunt, quas Trachæ & subulsi, aut quædam Vibratio Tendimus circa Corpus immoventes insinuant. Pertinet hæc Epilepsia lethalis post anuriam dalem discussa, sed non suppurata materia, quam refert HORSTIUS in *observ. lib. 2. observat. 2.* Item quando ex suppurata hamorrhagia Maribus Paralyfin lateris dextri, & ab hæc sanata, Epilepsia nasci fuit, auctore BARTHOLOMÆO *enarr. 4. deff. 69.* Ex suppurata quoque urina, Renum vitio supervenisse Epilepsiam, urinario sero cerebrum inundante, non rarum est. Suppurati amplexi sanguinis Effluxus, v. gr. Hemorrhoidum, Medium &c. hinc Epilepsiam inferunt, cerebri ac spirituum altitudine vitio. Quo etiam facit incipiens Graviditas, cuius occasione quædam Epilepsia fuit. Præ cæteris sanguinis Recrementa vitiosa & acris sub Lymphæ subulsi cerebro iuxta vias Glandulas commovent, irritando huius Membranas, creberrimè Epilepsiam hæc per Effentiam inferant, quoque etiam in loco collecta fuerit peccans illa Lympha, & de qua vid. SCHNEIDERUS in *svæ. tr. de carach. lib. 2. pag. 103.* qui aliquot habet exempla Epilepticorum post morem digestorum, in quibus *serofus vitiosus* in Ventriculis cerebri fuerunt reperi: Similia exempla refert SCHENCKIUS in *svæ. observat. pag. 244. & BONTIUS Med. tædæ. observat. 1.* Item BORELLUS *enarr. 2. observ. 76.* habet exemplum Epileptici mortui, cuius in Cranio aperto inter cerebri Ventriculos magnam materiam Adipis emulsi copiam reperi: Pæ in cerebro observavit TULPIUS *enarr. 1. cap. 22.* & quæ sunt similes causæ, quæ inferunt Epilepsiam per Effentiam. Denique apoplexia interdum in Epilepsiam transit, & contra: vid. M. A. N. C. *ann. 6. & 7. observ. 212. pag. 317.*

Quod *causæ externæ*: ex sunt innumerabiles. Præ cæteris considerandæ Mercurialis & omnis Mercurialis, cuius etiam Miasmata minima generi Nervosæ sunt infusa: Si enim tantillum ejus cerebri cerebri condita hærent, quocumque modo illi communicata, ad Epilepsiam disponunt, propter Irritationem ab acrimonia Mercurialis particularem natam. Hinc enim unguenta Mercurialis capiti contra Tineam Infantibus illita Epilepsiam non raro inferunt: quæ exemplum videri potest in TIMÆO *non Goldstein in resp. pag. 106.* Pertinet hæc *causæ juveniles*, & quibus per Nares attrahitis, ob mercuriales halitus adhibe latitantes, convulsiones & Epilepsiam oborta notat SALMUTH *enarr. 3. deff. 39.* Ex *Cæterum* ejus Epilepsiarum, & convulsivum exemplum notat SCHENCKIUS *lib. 1. pag. 124.* Videl etiam *afus nimius* convulsiones excitat ob Aciditatem.

Abolvi ferè 2, quæ ad Theoriam convulsionum, & Epilepsiarum pertinent. Plura qui cupit, adnotat WILLISIIUM in *Pathologia cerebri*, ubi ex proleto tractat de Mor-

his convulsivis: & quidem jure meritoque; nulli enim affe-
ctus post ichresiam frequentiores, quam illi Morbi Con-
vulsivi, utur, quod obiter noto, interdum aliquantisper con-
vulsus, interdum dubit, loquatur: *Dubio* quidem, quando in-
fert luterum Copulam expulsum, quam ex Massa loquens
derivat, conjungendum cum spiritu Animalis, quod quid aut
qualis sit? fateor me ignorare: *Convulsus* loquitur, quia non
exaltat ab Origine Convulsionum progreditur, sed potius
data quacunque occasione convulsiones modo huc modum il-
loc determinat: Conf. SYLVIUS lib. 2. prax. UNZERUS
tr. pres. de Epilepsia. (X)

Inter Pathemata, quae Epilepticos verane, non ultimam
est *frider dentium*, Maxillarum vehementissima confictio,
idque ex convulsivo impetu. Sed *dentium confictio*, quod
probe notandum, extra Epileptorum interdum observabili,
ex Paralyi aliquando Mulcularum, Maxillarum inferiorem
dentium trahentium, non semper ex convulsione est (Y);
Conf. THYRMAYER conf. lib. 2. pag. 374. Item *fruma*,
quae ante Os Epilepticorum interdum conficitur. Hae Saliva
est rarefacta ab Aere, dum conficitur, & coagulatiss
Spasmo plus minus faucibus, Saliva plius minus copiose ex-
pressa, ab Aere per illas angustias vi expulso agitata, in ta-
lem spumam texturam abit: hinc etiam *ex naribus* interdum
materie talis exeri solet. Conf. PECHLINUS ap.
tr. de Acri & Alimenti defectu.

DIFFERENTIÆ.

Quoad differentias Epilepsia: hæc est vel *universalis*, vel
particularis, quando unum alterutrum Membreum, aut ali-
quod saltem partes corporis Epileptici convulsionibus ve-
nantur: Vid. SENNETUS *infirmis*. lib. 2. pars. 3. sect. 12.
cap. 9. de Epilepsia, ubi variola Epilepsia particularis recen-
scitur exempla.

DIAGNOSIS.

Quoad Diagnosin: Signis Diagnosticis pro Convulsioni-
bus & Epilepsia præstentibus determinandis vis est opus,
cum per se sit æpta, & facillime cognoscatur; five sit *con-
vulsio Tonicæ*, dum Membreum convulsim in suo sita perma-
net; five sit *convulsio Clonica*, dum Membreum convulsim
variæ agitur.

Dolor latius etiam frequenter adest in convulsione; verum
non semper, sed tantum interdum supervenit.

Convulsivus Motus Tremori æquidem in pluribus est co-
gnatus; in hæc tamen facillime discernuntur, quod Tremor
semper conjungatur cum motu voluntario, v.g. Manus non-

quam tremet, Pes nunquam tremet, nisi ad eursum adigatur
ita ut semper blotti voluntario conjungatur Tremoris
symptoma: in motu convulsivo, ipso Aëre infuso, aut præ-
ter voluntatem ejus, sunt motus convulsivi. Denique tam in
Paralyi quàm *Epilepsia* motus Membri Voluntarius lædatur,
hac tamen differentia, quod in Paralyi Membreum resolu-
tum sine omni difficultate trahi, flecti & trahi possit; con-
trarium sit in convulsione, in qua Membreum est rigidum,
& quod non sine acerbio Doloris extendi potest.

Gravitas Epilepsia primæ & Lipsythymia, & *tertiæ distinguitur*,
quatenus in Lipsythymia pulvis parvus, & rarus, in Epile-
psia robustus, & frequens, Carus vero fumicose affeetus
luporei per iudicio recurrit huiusmodi obnoxiis ius, nec facile co-
dunt; scutus Epilepsia per Parosyismos recurrit facile le-
vatur.

Præterea in *Fabribus ardentibus*, & *Morbis acutis* *Malignis*
convulsim est, prænotice immoventem convulsionem, &
Epilepsiam: quod ex eo patet, quod Aëri ex improvisi
Aurium tantum, sensum hebetatis, capitis gravitas,
& cordis palpitantes corripantur, splendores ac Coru-
tiones, & variorum Colorum apparitiones, ante Oculum
verlati solet, ac obnoxiis peregrinis Colore vestita ap-
parent; istiusmodi enim ignis splendores creberrime igni
fulent funestis Epilepsia: vid. BARTHOLOMÆUS *sent.* 3.
lib. 45. & M. A. N. C. *ann. 3.* obs. 97. pag. 370.

Si in principio morbi de *Dolore in bulbis oculorum* Gno Oph-
thalmia conqueruatur, mor Delirium & convulsiones adiant
quod tamen fonsellum signum ignis ipsius obicere vavi.

Quando Maligna capitis, & *Flepsi solitum*, *Leitumque*
solitum, mala sunt signa: Illa Delirium, & simul Molem
in oculis convulsivum, & convulsiones supervenientes in-
nuunt: Hæc jam solentem convulsionem denunciant. Item
quando dicitur, se percipere motum quandam Membreum
trahentium, aut ex his aliquid huiusmodi frigidoque specie
versus caput ferri: vid. RIVIERUS *prax.* lib. 1. cap. 2.

Speciat huc *Dysphasia* a capite ad Pectus, & Ventricu-
lum rueris species, quæ quidam apud TULPIUM lib. 4.
obs. 15. Convulsionem Periodicam per absum Euphorbiæ
contractam ante odidum cibi prælagare poterat.

Observeatur etiam duplex status, Aëri quoniam *nunc delirant*,
nunc non: si delirant, nihil percipiunt & nihil dicunt. Quan-
do igitur Aëri delirant talia Phænomena non percipi-
unt, aut indagate nequeat, v.g. in Febribus acutis, &
Acutis, Medicus, si tangit Corpus, & Tendinosus partes,

pvo

(X) Repete qua de Causa Epilepsia notantur ex D. Deidier hic col. 1219. lib. 2. ubi de Causis, Paris hic Author
Epilepsia Causam in Joh. Cerebratorem, *capit. 2. de* sanguinea inæqualiter Sanguine infarcta id faciat, ut Spiritus animales
intermari non flant in Musculis Corporis, & quatenus abundantius veritas est, qui Nervus recipiunt a Cerebratorem ad infarctum
intermari, parcius vero veritas alio: hinc minus Convulsivi. Nam Tunc confirmat sibi Cadeverum Epilepticorum,
in quibus Varices, Anæsthesia, & Tumores glandulæ, præ Sine Dura Mater. Plethorem Cerebrum, & basim Cerebri re-
peri fuerit: quæ quidem exarctata morbo mutatione vel Sanguinis infarctus Causa, vel Effectus reputanda sunt.

Verum quatenus concedatur, posse quondam Epilepsiam ab hoc Sanguinis infarctu pendere: qui tamen credit illam semper
per ab eodem Causa ortum trahere? Scimus enim frequentissimè Epilepsias fieri per confusum Viscerum inferiorem: quod si Mor-
bus hic ab una Causa Cerebri habente foret, semper esset idem pariter natusque symptomaticus, quod talis fuit Practicum emen-
datus. Præterea si Epilepsia ab hoc Sanguinis infarctu semper videretur, nullum esset securum ad eam perfelle curandum Medici-
mentum, quod Venæsectione sapit, etiam ad prophylaxim, instituta: quod falsum.

Possit quoque & illud adversus Dom. Deidier præponi: si in Epilepticorum Cerebri Varices, Anæsthesia, & Tumores
duri gigni sunt, sique bonum præsentia Sanguinis si infarctus, & Parosyismos Epilepticus: excutitur, quæ quoniam hic perperam in
Cerebro sunt, perperam & nunquam interrupti non sunt Motus convulsivi? Nisi illud velis per Dom. Deidier respondere, Tu-
mores illos perperam esse in Cerebro, atque infarctum Sanguinis non producere, nisi eam & Causa quævisque, vel interna
vel externa, quævis extempore molem & veluti inflationem adigantur: hoc enim factis Sanguinis præterflum fieri remota,
atque Parosyismos epilepticus erubuit, tunc solvendum, exa Tumorem male referre, naturalis Sanguinis conciliantur Motu-
verum si hoc nunquam verum esse poterit, verum tantum erit non Naturalis & confirmata Epilepsia. Illud tamen hic quoque men-
dum, quod est Epilepticorum Anæsthesia Tumores hic in Cerebro præsentat; hanc tamen id iussit, ut necessariis creditur illis
Tumores Epilepsia veram Causam fuisse; siquidem illud negari nequit, Tumores boni, & quatenus membrales in Cade-
veris observari, quæ per Morbi Causa habenda non sunt: quippe quæ accidere facile possunt ad interitum remanens Corpori, quan-
vis in primo Morbi ortu non adessent.

Quidquid autem sit de bonum veritate, illud è Dum. Deidier explamen vult, quoniam si offe, ut à Sanguinis in
Cerebro infarctu Motu Convulsivi & Epileptici eriantur, non vera Causa? Nam quæ iuxta suam Hypothese Spiritus
animales abundantius ferantur verum quædam Musculis, parcius verum alio: quævisque inæqualis hic Spiritum indicant. Cui-
nam semper sit & eodem modo accidia, perseverante scilicet eodem modo Sanguinis infarctu; satis Musculi illi, capiosiores Spiritus
semper & assidue excipientes, convulsivi esse abertus, relaxantur & exhi paralyi affectu illi, in quos Spiritus parcius flant.
Sanguinis igitur in Cerebro infarctu è Dum. Deidier exarctatus Causa esse Tonica non Clinica Convulsivus, quæ quidem
dum est Epilepsia. Quid si autem necesse verum, videbimus: enim fortasse Aularem de Causa Epilepsia hypotesi: hinc etia-
cia esse Objectionem, quoniam scilicet à causa quævisque, vel Cerebrum vel Nervus lædente, Spiritus animales interrupta car-
gæ & veluti per manipula in universum Corpus fluat, & Motu Convulsivi sin Clinica convulsivum excitant, non vero
affidit & affar in Musculis intermari veram Cerebrum Toniam pariat.

(Y) Ex Paralyi Maxillarum Maxilla petita Oris alacritas, quoniam Dentem adstrictum erient, ut salo putas A.; rela-
xatus enim Musculus Maxillam sustinentibus, hoc jus pariter verum petus delatetur, & Quæ necesse habet.

proxima occasione de imminentibus convulsionibus iisque lethali-
bus, certus sit, si scilicet quidam gradus ac-
tiones, aut quidam subsultus, aut quidam vibrationes pen-
dant, qui frequenter supra Carpum repositi, in his depre-
hendat.

Vergete citra causam manifestam Juniores, præsertim non
Hypocondriaci, aut frequenter aut fortiter assileus, aut
Epilepsia est prodromus.

Denique crebrior Epilepsia seu incubi sub somnum inva-
dit signum est imminetis Epilepsie, testibus ferè omnibus
Prædictis.

Ipsi Epilepsia præsumunt ex ejus gradibus supra explicatis
per se patet: nihilominus etiam Homo subito corruit, aut
si non corruit, tamen variè Membra agitantur: Animales
Functioes aut abolentur aut depravantur, in Epilepsia
cum Delirio, Rifu, Gesticulatione, & similibus conju-
ga.

Speciatim quædam consideret Medicus, an convulsionem
orientur ex Viscerum internorum, vel partium externarum
spasmi? Convulsionem & Epilepsia partium externarum ex mo-
tu convulsivo Membrotum facile patet: Internæ verò co-
gnoscuntur ex motu convulsivo, Murmurationibus & Bo-
borygmis Abdominis, (quo Flatus dicunt, qui tamen non
semper adstant) ex subitanea hujus Abdominis aut contra-
ctioe aut intumescencia, ex tensione & duritie Abdominis,
interdum cum sensatione superiora versus retractione,
interdum cum Umbilici interioris versus retractione,
ex acerbis doloribus contorquentibus in Abdomine, in
specie Interiorum & Meicenterii, quo Agri, præsertim
Hypocondriaci, exprimere nesciunt; Item ex pizicordi-
um tensione & contritione, ex dolore lacranæ circa
Lumbos, non anteaquam vel Meicenterium superveniat cir-
cumbans respiratio difficilis, interdum sensus suffocationis,
aut quasi laqueus Collæ injiceretur. Subinde externarum par-
tium Epilepsia supervenit. Unde patet, quanta sit connectio
hujus Epilepsie internæ cum Præterea Hystericæ sic dicta, quæ
cum Epilepsia in radice conspirat, ut sic nusquam ali-
quid, & tandem circumstantiis quibusdam variant: hinc
etiam omnia Antiepileptica Hystericam passionem, quælibet
contraria Hystericæ Epilepticæ curant.

Pro investigando fonte Morbi à Medico cognoscendum
est ulterius, an per effensum? an verò per consensus sit Epi-
lepsia? Si per effensum sit epilepsia, non ulla Paroxysmi
futuri fieri invasus præcognoscitur, nec jungitur
sensatio quædam molesta in quodam loco, sed dictum sa-
pium ex improvviso eodem corrumpitur Agri: jungitur quæ-
dam sensatio, quando nimis est rapidus spirituum motus,
aut post Paroxysmum pars dolore lancinaceo & lassitudine
sollet affici. Ubi verò est per consensus, ibi opturimùm al-
teratio quædam, v.g. aut dolor, aut motus Vermiculatio-
nis, aut simile quid, in parte quædam extra caput præce-
dit, ex quo postmodum Epilepsia quasi surgere percipitur,
modo dictus dolor aut motus comitatur, modo cessante
deum Paroxysmo observatur. Imprimis sit hoc, quando
scopus epilepticus est in partibus remotioribus: Ibi enim
imminet Paroxysmum percipitur ex motu quasi Aura quædam,
quæ sursum ascendente, Epilepsiam in promptu esse, fa-
cile potest. Quo etiam faciunt signa Lumborum, calculi,
&c. quæ spasmos ex improvviso & sine causa manifesta
contingentes exinde exurgere, probabile est.

Præsertim in Epilepsia per effensum capitis affecti signa
adstant: Torpor quidam in actionibus animalibus internis,
aut saltem depravatio quædam, hebetetio sensuum, capitis
gravitas, Vertigo, &c. adest aut sequuntur: vid. RIVE-
RIUS l. 1. Interdum gravius in malo fatutas sequitur, &
præcesserit ferè causa externa, quæ cerebrum aut capi-
tis partes ledere poterant. Imprimis Lunæ motibus antecur-
rit Epilepsia quævis, magis tamen ea, quæ est per Effen-
sam, & nonnunquam ad Lunæ varias periodos diversimodè
afficit: id quod non æquè observari potest, quando Epi-
lepsia est per consensus, in quo utpote adstant signa
Visceris ejusdem variati & ejusdem Operationis labellata-
tæ, aut privatæ partis affectu: ut interdum in veterata
& gravius per consensus Epilepsia etiam ad Lunæ motus, al-
teratæ plus minus Cerebro, variare solet.

PROGNOSIS.

Prognosis convulsionis & motuum convulsivorum pto va-
riate Virium & circumstantiarum variat.

Convulsio, quæ fit per consensus, minus periculosa est,
& facilius, cæteris paribus, curabilis, quam ea, quæ ex

Cerebro per effensum originem ducit.

In Febris acuta, præsertim Maligna, supervenientes
convulsionem sunt periculosa & sæpius Mortem porren-
dunt, nisi per Crisin solvantur: vid. HIPPOCRATES
sect. 4. Aph. 10.

Epilepsia habitualis & per se Morbum constituit sine pe-
riculo Vitæ subsidit ad plures annos durat, ut uti sæpius re-
currentes Agros plus minus paralyticos, delirantes aut stu-
pidos reddat; quævis interdum sua sponte in sublevis ju-
nioribus circa Pubertatem terminatur: vid. FORESTUS
lib. 16. obs. 57. in Schol.

Si toto corpore à convulsionibus immuni aut Latium con-
cellatur, aut Palpebra, aut Lingua, prævium symptoma
& periculum putandum est, & quod merito timorem incute-
re debet Agri; nam aut Mors imminet, aut gravis Epi-
lepsia, ionatur. Conferendi huc sunt varii Aphorismi HIP-
POCRATIS, qui de convulsionibus agunt.

Quò motus in convulsione est vehementior & diuturnior
aut plures, vel cerebro vicinis, v.g. Labia, Palpebras aut
Lingua, vel nobiles magis partes, v.g. Præcordiorum af-
fectit, eò periculior convulsio est; hinc Epilepsia reliquis
speciebus semper periculior.

Epilepsia hereditaria, quæ sæpius dantur, vel omnino
nuquam, vel rarissime curantur.

Epilepsia ante pubertatem evincens curabilis est; post an-
num verò vigesimo quantum supervenies ferè usque ad
mortem durat, teste HIPPOCRATE sect. 5. Aphor. 7. WIL-
LIS de Morb. Convulsio, cap. 3. pag. 37. Quod tamen non sem-
per procedit, quia prædicta exempla aliquot in observ. RHODI
etiam Epilepsiarum post vigesimo quantum annum cu-
raturam: Vid. etiam RIVIERUS l. 1. Ideoque de Infantibus
Epilepticis loqui sperandum.

Si quid magis universale, est Aphorismi HIPPOCRATIS
45. sect. 2. Epilepsia laborantes Juniores cum Acria materia, tum
Lætem, & Vitiis liberat. Nempe quoadque in Puero puber-
tatis mutatio, ac Venus, in Puella verò Menstruorum in-
itium, Morbum huiusmodi tollere solet. Conf. FORESTUS
lib. 10. obs. 35. in Schol.

Paroxysmi quò sæpius repetantur, eò graviore evadunt, &
tandem totam funditionem animalem evolvunt.

Observatur etiam fuit, quòd in Paroxysmo Epileptico,
si Agri ad usum Pericardiorum non seruant, malum sit
indicium, argum argumentum, Naturam succumbere, &
prostatum esse.

Si Matrem Utero gravent, fortis Epilepsia invadat, ma-
gnum periculum minetur, saltem periculum abortus immi-
net: id quod tamen non semper absolute verum deprehendit;
siquidem RHODIUS observ. 1. observ. 60. relict
Matronam prægravantem; quæ dum Utero gereret, post sex
septemque menses Epilepticis Insultibus affligebatur, Partum
verò enixa optime convalevit: Sic etiam SCHENCKI-
US in observ. non omnes prægraves Epilepticas abor-
tum pati annotavit.

A copiosa sanguinis fluxu singultus, aut convulsio malum;
vid. HIPPOCRATES sect. 5. aphorism. 3. ar. 36. & sect. 7.
aphor. 9. A sanguinis præfluxu despicitur, & convulsio ma-
lum.

Pariter ab Hypercatarsi convulsio, aut singultus malum,
sect. 5. aphor. 7. & sect. 7. aphor. 25. nam singultus est species
convulsionis.

Convulsio ab Helicobus lethalis: sect. 5. Aphorism. 1. Ratio
enim Agri à convulsionibus post Purgantia talia fortiora
abortis evadunt, ut non desperandum sit, quin Opiatis,
& Thiatricis Alexipharmacis denud convalescant: sicuti
nonnulla exempla eorum, qui evaserunt, adducunt SEN-
NERTUS Prax. lib. 1. pag. 565. & PETRÆUS Nelsius
Hormen. lib. 1. Diff. 8.

Ab Heo Vomitus, singultus, Convulsio, aut Delirium, malum,
sect. 7. §. 10.

Huc facit ulterius Aphor. 66. sect. 4. ubi inquit; In acuta
Febris Convulsio, & circa Hystera dolores vehementes, ma-
lum.

Item Aphor. 12. sect. 7. In ardentibus vehementissimis convulsio,
aut Tetanus, malum: ut convulsionem, quæ graves Phreosici-
des sequuntur, lethales sunt.

A Vigiliis convulsio, aut desquiescentia, malum: sect. 7. §. 8.

Febris convulsioni supervenire, melius est, quam Fe-
bris convulsionem: vid. HIPPOCRATES sect. 3. Aphorism.
26. GALIENUS super Aphorism. 50. sect. 4. modo Fe-
bris non sit Maligna: & Spasmo, aut Tetano si Febris ac-
cesserit Morbum solvit, HIPPOCRATES sect. 4. Aphorism.
57. Conf. SENNERTI Prax. lib. 1. part. 2. cap. 28.
pag. 566. & TULPIUS lib. 3. observ. 42. ubi elegantius dis-
curfu

curfu hoc declarat. Distinguedi autem sunt casus in horum explicatione: nempe intelligitur convulsio, & motus convulsivus chronicus, circa quos observatum fuit, quod superveniente Febre eisdem curaverit.

Quarta terepti non admodum convulsionem patiuntur: Si vero prius tentati sunt, superveniente Quarta liberantur, *Sect. 5. aph. 10.* Exemplum Quarante solentis Epilepsiam vid. in SALMUTH *Crit. 2. Aph. 14.*

C U R A.

Hicce praemissis pergo ad ipsam curam Epilepsiae, & quidem ad curam imprimis in genere adolentium: nam Epilepsia Infantum, & Mulierum ad Morbos Infantum, & Mulierum pertinet.

Quod curam convulsionum, & Epilepsiarum, haec instituta venit tam extra Paroxysmum praeparatoria, quam in Paroxysmo curativa.

Quod praeparatoria: ante omnia attendendum est, ut causa remota auferatur, nempe ea, unde oritur inordinatus spirituum motus, remanet, corrigatur, & eas crebrior recidiva motus praeparatur, live per essentiam, live per bonitatem fuerit orta Epilepsia, & convulsiones. Hoc Cerebri, seu Nervorum, ac spirituum Animalium Diathesis aemulata, ac volatilitas consideranda, perverfus vero motus Anomalus corrigendus. Pro varietate autem huius causae cum speculiorum alia varianda subside nonnulli curatio, semper attendendo, an sit ea Irritatio quodam partis nervae: an iniquitas spiritus animalis? In specie considerandum an convulsiones, & Epilepsia sit affectus primarius, & per se Morbum constituant, adeoque plura minus habituales sint: an vero sit illam affectus praesecundarius, & symptomatice rationem habent, adeoque accidentales? Hunc considerandum, an per convulsionem saltem an vero per affectum ortum trahatur: an causa remota externa, vel interna fuerit: an sedes sensitis sit intra corpus: an vero extra corpus, in Aliquo quodam particulari? Pro quibus omnibus circumstantiis omnino varianda sunt cura, dum alius respectus est habendus; quando Epilepsia est in Febre Maligna, alius, quando est in Mulieribus Hysterica, alius, quando est a Scorbutico, alius, si in quodam Membro particulari, coque in specie evenit, radix mali fuerit. In tali enim casu, aut Ligatura fortis Membri peccantis, aut ibidem, ubi residere percipitur materia humilis & convulsiones excitans, inesthism cauterium, vel causticus fusticulus, praeservat Paroxysmum imminens, interdum Fermentum irritans evacuando omnino Epilepsiam curat.

*Observandum igitur I. Cum Epilepsia, & convulsiones, quae in specie ut Morbi a causis internis oriendi per se curantur, adeoque Chronici sunt, & in genere ferre ea Hypochondriaca, aut Senectutis male flumit, ut ab hoc minus affligi videantur Agri, utrimodum originem ducant ab acido viscido, coque plura minus volatili, & huius incumbit ferre semper in aut circa primas vias lateant, ob id in genere acidi destruerendi, & primarum viarum evacuandam habenda est ratio. Pertinent nempe haec varia tentamina, & experimenta curandarum Epilepsiarum; verbi gratia per Lac Vaccinum cum Sapo Hippurico decoctum, & Medicamentum quoddam ea Vitrioli Martis, quibus Epilepsia Hypochondriaca per annum durans curata: vid. R A R B E T T E *Prax. ubi de Epilepsia*, item M. A. N. C. *Dec. 2. obs. 95. pag. 203.* Vel aciditas, conf. RIVERIUS *Prax. cap. 7. aliaque Martialis:* sic HENRICUS ab HEER *obs. 1.* Epilepsiam cum Opilthotono gravissimam, cuius Paroxysmi praecedebant Occitationes, & Pandiculariones cum Cordis angustia, quarta, vel quinta die recurrentes, per fustes Spadacet curatam refert. Et quando *Morbo, Testacea, Offa*, ut Unguis Aleis, Unicorni verum, Crystallus, Smaragdus, Lacus Ceraunius, & similia pro cura Epilepsiae laudantur, haec nonnulli absterendo acidum operari possunt: sic BORELLUS *Cens. 3. obs. 34.* refert Epilepsiam, in cuius Paroxysmo corpus insular doli intumesceret, per Sal. Alkali, Gallium, & Perlarum curatam.*

II. In genere semper observandum, ut appropriata, seu Specifica Autiepileptica, quae per Experimentum observata sunt, non ibidem Membrorum Appropriata, ex quibus Epilepsia oritur, inferantur, & simul continentur. Haec sunt varia. In hoc tamen conveniunt, quod vel virtute Alcalina desiccante acidum, vel virtute Sulphurea temperante acidum, & figente spiritum, operentur. Eae quidem Appropriata talia Autiepileptica conducent nonnulli praemissis Universalibus, speciem ubi Epilepsia est per Essentiam, aut si per contumeliam sit, fomes ejus non praesens in Mem-

bro quodam externo, sed in partibus internis haereat. Hinc III. In his Epilepsia per consensum partium internarum Pomus Antimonialibus provocata primatum obtinet, si malum potissimum fuerit recess (vid. RIVERIUS *Prax. l. 2. pag. 61.*) aut fomes mali haereat in primis viis, singulis Menibus quateriduo aut Plenilunio repetendum, vid. ZACUTUS LUSITANUS *Prax. Adm. lib. 1. obs. 24. & 31.*

IV. Purgantia sunt mitiora, secus ac RIVERIUS *Prax. pag. 60.* laudet; cum frequentiora, & potentiora saepius plus nocent, quam prosunt. Inter purgantia cum aliis praemissis Mercurius dulcis primatum obtinet: Sed necessarium est, ut recte praeparatur Mercurius dulcis, & bis, vel ter sublimetur, ut totus tandem sit crystallinus, & nihil de volatilitate artemicali Mercuriali retinet. Purgantia huiusmodi, vel propter talia, vel etiam saltem laetantia, convenientissime quateriduo ante Novilunium, vel Plenilunium usurpari solent: Sicuri etiam alia appropriata Epilepsiae Remedia ante Lunae imprimis mutationes, praesertim ante Novilunium, & Plenilunium, aut etiam Quadraturas, in tempore haram mutationum, optime usurpantur.

V. Observandum, quod si ea fomite in humoribus motiva erant degenerantibus, non adeo easdem a priori cognito, oriata convulsiones, pro illis emendandis Dista salisera ex Distillis Lignorum, si reliquorum remediis in minus proportionata fuerit, observantur proficere: vid. SENNETUS *lib. 1. Prax. ubi de Epilepsia*. HOEFERUS *Med. Mod. pag. 10.* FONSECA *lib. 2. obs. 8.* & THONERUS *lib. 3. obs. 94.* Commode haec Decodis Lignorum Viicum Gerylinum, Quercinum, Tiliaceum, radia Paeoniae, seu Pavonis, ac similia, tanquam Appropriata, addi possunt: vid. HORSTIUS *Deord. 2. Problem. 9. Sic de Ligni Guaiaci ulu in Epilepsia conf. SCHOLZIUS Conf. 40. & 41.* JACHNUS in *lib. 9. Rhaphis cap. de Epilepsia*, & A L P H O N S U S FERRARIUS THONERUS Epilepsiam a Colica per Decoctum Lignorum curavit *lib. 2. obs. pag. 92.* Non secus, ac SCHENCKIUS in *obs.* Vertiginem difficilem per Decoctum Lignorum cum Appropriatis curatam refert. Sed bene prius praemissa debent esse Universalis, ac primas vias evacuantes. Certè continuato ulu, & evocato pro virtute ratione sudore, multum valent in quibusvis affectibus Chronicis Decoda ista Lignorum Diaphoretica. Alterant simul humorum dyctricam, & succedunt ritium, quod est, evacuant; id quod vel Laes Venera praesidet, continuato talium Decodorum ulu curantur.

VI. Interdum, & in casibus desperatis salutaris Mercurialis convenit; vid. WILLISIUS *loc. cit. pag. 46.*

VII. Sternutatoria singulis matutinis horis attrahenda: vid. WILLISIUS *loc. cit. pag. 44. E. g.*

34. Flor. Marpan.

Rota an. 311.

Flor. Lib. convall. 31.

Meth. 31.

Caff. an. 31.

M. S. Pulvis: S.

Pulvis Sternutatorius Cerebrum purgant.

VIII. Praeter Ligaturas fortes, Ponticales, & Cantharid, de quibus supra dictum, similia Auxilia Churgicis, Setae, Distactaria, & Crani aperturem, injure observantur, ad Naturae nempe imitationem, quae non solum digito quasi monstrat, illam per sponte erumpente Ulcera lanando: quia Exemplum TULPIUS *lib. 2. obs. 1.* supputat de duobus Infantibus, per Ulcera capitis spontanea ab Epilepsia curantia, quae *l. 1.* refert: Epilepsiam sponte a Natura per lenem in Fauces Influxione curatam, in HILDANO *Centuria 1. obs. 41.* Sed accidentaliter, & per infortium excitata idem praesent, quale quid v. g. WILLISIUS *in. ill. de Puella* quendam, per motus convulsivos super Caput accensos devaluit, hinc caput diversis in locis curem ante, refert. Quae etiam facit RHODIUS *Cens. 1. obs. 61.* quia eadem ab humore calido Herpete sanato Epilepsiam contigisse refert, Brachii Setaceo solutam. Uti recte Vebecaria, Fonticuli, & Seneca a RONDELLETO *Med. Mod. l. 2. c. 36.* PLATERO *Obs. pag. 336.* MONTANO *Conf. 50.* PARÉO *l. 10. cap. 25.* FORESTO *l. 10. obs. 16.* HENRICO ab HEER *Obs. 24.* HOLLERIO de Morbis internis *lib. 2. cap. 32.* HILDANO *Cens. 1. obs. 41.* & TULPIO *l. 4. obs. 1.* & 3. commendantur: In illo tamen tantum casu admittenda, si per Essentiam, & a causa magis universalis malum hoc contingat, sicuti ex Strabo retropellit, aut similibus occasione nata Epilepsia per distactaria curanda venit, teste HILDANO *Cens. 3. obs. 10.* Sic Lugduonensibus familiare est Vre-

cautis

catonio suo Epilepsia curare. Ulcere ad ansum aperto servato, quod vid. in VELSCHII *Adversariis*. 32. *Cent. 2. a. n. 10.* Anno 4. & 5. M. A. N. C. Item *Anno 9. obs.* 14. Epilepsia refertur gravior postquam Viscicatorio curata. Imb *Gravil* operis internum profectus observatur, nempe, ut refert SCHENCKIUS in *observat.* quidam Vulneribus Capiti infusus ab antiqua Epilepsia fuerat curati. Item RHODIUS *Cent. 2. obs.* 66. refert SPIGELIUM sibi memorasse, juvencum quandam nobiliem Patavinum sepius Epilepsia afflicto, quod gravem lapsum in scitis, à FABRICIO ab AQUAPENDENTE operatione Granil per Torrem curatum; Vid. etiam RIVERIUS loc. cit. Sic quando ex Calvaria, ex Lac Venerea cariosa facta, oritur Epilepsia, præsertim medietate illiusa eradicaanda venit: Vid. SCHENCKIUS l. 5. *observ.* Hæc ipsa pariter ad *Functiles* quoque, item ad *Phlebotomia* locis certis admovenda, accommodari possunt: Nam PANAROLLUS *Pont. 4. obs.* 30. narrat, Patrem Epilepticum, aphonium, solum, *Phlebotomia* in Surcula Coronali fanatum. Si à *Nervo ipsi* in quacunque, remota quoque, Corpora parte oriatur, uti supra ex citatis M. A. N. C. patet, catonio potenciali loco affecto applicari, curatur.

IX. *Observandum*, quod si cum Epilepsia juncta sit Sanguinis coacti suppressio, vel hujus occatione excitatur plus minus epilepsia, *Ventriculus*, aut alia quævis Sanguinis missio erit profectus locis in variis, per circumstantiarum varietate. Sic enim Epilepsiam operis *Hæmorrhoidibus* curatum refert RHODIUS *Cent. 1. obs.* 65. Idem *Obs.* 64. Epilepsiam in puero octenni ob Sanguinis abundantiam Venæsectione curatum refert: Item ZACUTUS LUSTANUS l. 1. *Præf. Admir.* obs. 26. refert, Epilepsiam suam post partum Hæmorrhoidibus lætæ: Uteri parti applicatis curatum: Idem *Obs.* 27. Gravida septimo mense Epilepsia Venæsectione in talo toto curatum memorat: Item Gravida nonimellris ex suppressione Hæmorrhoidum Epilepsia, *folia in Tale Venæ & Hæmorrhoidibus* Acon applicatis, curata sunt *Obs.* 25. De Venæsectionis in talo ois in epilepsia videb. in M. A. N. C. *Anno 4. & 5. obs.* 11. Imprimis notabile videatur, quod idem ZACUTUS LUSTANUS l. 1. *Med. princip.* *Hæm.* 16. notat, Gravida Epilepsia ab Utero correpta, *folia in brachio Venæ præfixa*, in Tale totò non.

X. *Opia*, & *Narcotica* in *parasymp* conveniunt: diffipant Authores, *Narcotica* *afert* *arid.* & *oxias* *afert* *heri* *diffingere* *afert* *differt*, inquit BARBETTE *Præf. pag. 5.* Imo DECKERS *loc. cit.* eadem plane rejicit: E contra tamen PLATERUS in *Præf.* & SCHMIZIUS in *Excerptis* *Præf.* lenocia in gravioribus Iofolubus commendant. *Opia magna* *sum* *ram* *Epilepsia*, inquit test. FONSECA l. 3. *Cap. 10.* Nam ferociore spiritum motus compescunt, indeque sensum perturbationes, & Marcus inordinatos tollunt. Hinc ad præcaveendum paroxysmum Epilepsie, *tam internæ, quam externæ, mirè conveniunt opia*, & nuquam omittenda, appropriata, & specifica epilepsie mista, imprimis cum *Camphora*, quæ singularis erit ad coercendum spiritum animalium effervescentium motus: vid. WEDELIUS *opio.* *pag. 107.* Hæc ratioe *Pilula ex Landano Opia* cum *Oleo Camphoræ* paratæ ad imitationem HARTMANNI in *Præf. chymiatr.* ubi de *Epil.* sunt egregie; unde etiam hic Landanum hybericum suum usum obtinet egregium, & externæ FONSECA citato loco Iofolubum cum *Oleo Buxi*, tanquam Iofolubum Narcotico in Temporibus, Naribus, & pulibus, propter vim anodynam imminente paroxysmo (cui alii *Anodyna*, vel *Narcotica* substitui possunt) optimè convenire dicit. Sed abstinendum ab his Narcoticis note præmissa *Unioversalia*. Deinde non tam ad caruendum cerebrum, sed saltem ad præcaveendum, aut atterendum *parasymp* *mixtionem*, adeoque rariis usurpantur, quis Epilepsia diuturno subinde Passibus supervenire solet, & periculum eo *opiatum* habet hæc ipsa *Pilula* promoveatur.

XI. Cerebri, & Spirituum Animalium dispositio præternaturalis corrigere per *Medicamenta Appropriata Epilepsie*, maximam partem Actum in corpore peccatis absorbentia, singularis debet ab Evacuacionibus vacuis propinanda, qualis equidem fuit tantummodo innumerabilia, & duplici imprimis Classe; nempe vel *Fixa differentia*, vel *volatilibus* positive fontem morbum corrigentia; *Sed* *hæc* tamen *ex Regno Animalis*, *Partes Animalium* *afert*, & *cornea*, in specie Granum Humanum, Corua Cervi, Unicornu marinum, Margaritæ, & Dens Hippopotami, Stercus Pavonis, cujus loco Epilepsia quidam commendant Stercus Leonis, & Aquam ex eo destillatam, quæ *Allyst.* *Ca-*

mus à SCHARFFENBERG feliciter usæ est: Vid. VELSCHII *loc. cit.* *lib. 10. Cap.* 2. & ex his parata Sella volatilis, Liqueorem corua cervi facinatum, spiritum Sanguinis Humani, secundum Humanæ, *Cent. 2. obs.* 14. *Vegetabilis* eminent *Vitæ*, Quercinum, Tillacum, & speciatim Corylinum, Flores Liliorum convallium, Præcox, Opium, Camphora, &c. *Ex Regno Minerali* *Cinnabaris* *afert*, à CRATONÉ Magnet Epilepsie dicit, vel Antimoni, & alia *salpêtre* *Antimonialis* *afert*: Item *salpêtre* *Vitæ*, *ram* *ficum*, quàm in *spiritu volatili*, v. g. in *spiritu* *Vitæ* *Epil.*, vel etiam in *spiritu volatili* *Vitæ*. *Antiepilepticum* HARTMANNI, unde SIMON PAULI ait: *Qui Epilepsia medari volent, ex Vegetabilibus* *Paniam*, *ex Animalibus* *Casterum* *aut* *Hircundinæ*, *ex mineralibus* *obryolum* *sibi* *commendare* *habent*. Hæc pertinet Succinum, ejusque Sal volatile, & oleum, Crystallus, &c. quibus omnibus juncta sunt *Anodyna*.

Unioversalia ergo Remedia præter Vomitus sunt, v. g. *hel-* *leborina*, *ex* *calyptidis*, & *mercurialis*, helloborus nempe niger ritè præparatus, ejusque Extrachum cum Mercurio dulci: Sed cum parum purget, qui tantummodo laxet, ob id optimè permiscetur cum aliis, & quidem cum Extracho Hellobori nigri. Semper autem in Epilepsia per cunctatam *feriaria* *Purgantia* requiruntur.

℞. *Extr. helib.* *nigr.* gr. xv. ad *℥i*
(vel *Extr. anthel.* *Adern.* *aut* *Panchym.* *Crall.* quodcumque lubet, gr. xv.)

Mercurii *dole.* *viii* *par.* gr. xv.
Extr. Trac. *Almond.* gr. i. ii. vel *℥i*.
Olei *adell.* *Serini* *gutt.* ii.
Cum *℥j*. *Ed.* *Myrrhæ*, vel *Calor.* *℥* *pilule*.

D. 3.
Pilule *Laxativæ* *pro* *una* *vice*.
Vid. Collig. Pharm. in *tephedrum* *p. 1. feli.* 3.
Vel ad imitationem RIVERII præferatur.

℞. *Mercurii* *dole.* gr. xv. ad *℥i*.
Extram *salpêtre* *gr.* *iv.* vel *v.* ad *℥i*.
Mist. *sub* *forma* *pulveris* *pro* *dosis* *una*.

D. 3.
Pulvis *Laxativus* *pro* *una* *vice*.
Ex *quo* *cum* *Confusa* *Florum* *Antel* *etiam* *Bala* *parari* *potest*.

℞. *Conf.* *Flor.* *anthel.* *℥i*.
Pulv. *Rad.* *Jalap.* *℥i*.
Mercurii *dole.* gr. xv.
Cum *℥j*. *Syr.* *Tomar.*

F. Bolos 3.
Saccharum laativum pro una vice.
Potest etiam acui cum gr. iii. *Stammonii* *afert*.
Io vulgari usi sunt *Pilula* *Cochin.* *Arabica*, Feteide imprimis in Convulsionibus partium Ioternarum, suffocatione Uterina, & similibus; Optimè conducunt ad grana xv. præscribuntur cum Stimulo appropriato, addito Mercurio dulci; aut quod conveioctus est, pulvis panchymagogus Mineralia *Hartmanni* ex Mercurio dulci cum Mercurio Vitæ, fori, se larga riturratione probè uoluit, evadent egregium laativum per inferiora; amitte enim sic Mercuria Vitæ vim vomitocia, quatenus hæc corrigatur ab Acido Salis in Mercurio dulci, & sit *Pulvis* *Purgans* *Antimonialis* *Adrenalitis* optimus qui subinde cum aliis miscetur. Videat. HARTMANNUS in *Præf. chymiatr.* ubi de *purgantibus* *Mineralibus*.

Quod ergo attinet *Specificis* *Antiepilepticis*, ex toto acervo & cumulo omnium Antiepilepticorum (cum nullus sit Medius prædicius, qui non habeat suam speciem Antiepilepticum) totum paucis, & magis probata referam.

Eminent ex *Regno Vegetabilis*, imprimis Ruta, Dentaria, Anagallis, Hyssopus, cujus Infusum cum spiritu Vini RULANDUS *Comaria* *to* *Curat.* 95. commendat: *Pp.* *is* jam à GALENI temporibus laudata, eaque *Ma*, seu quæ conspicietur Folia latioribus, & magis rotundis (nam Femina habet Folia longiora, & magis acuta) cujus Radix, Sole in Leone cætescente, tempore meridie, Mese Martio vel Aprili in Ariete, vel Luna & Sole in ariete existentibus, aere solis ortum Luna decrefcente collecta, mirabilis erit ad curam Epilepsiam, tam pulverisati ad *℥i*. interius usurpata, ejusque aqua, & Sympus, quàm eductæ appendæ, & insar amuleti gestata; aut *Grana*, seu *Semina nigra* *Apoll.* interno usu laudata in forma emollitionis. Rario, quod in desuetudinem abiit, fuit deficiens seledus. Certè mirabile simplex est hæc *Pæonia*, vi ad epilepsiam specifica certo tempore collecta. Externus est ejus vim amuleticam jam suo tempore GALENUS, cujus experientiam confirmat F O R E

RESTUS lib. 10. observat. 39. sicut etiam videndus est BARTHOLINUS *Centuria 4. lib. 69.* Et Experimentum huius rei de vi amuletica pœonia habetur etiam in RIVERO, observat. 2. de D. de GRANDIS PREZ communicata. Vid. item SIMON BERGER de Pœonia, qui quinque tempora habet colligendi, ut & HARTMANNUS pag. 71. amicus reulit, et aliquoties Radice maris pœonia, effusa die Julii r. 12. (2) intra horam undecimam, & duodecimam. Amuleti infar appendi aliquoties curas Epilepsiam tunc tempore temporis ordinari sol. Leanen ingrediens, Conf. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Append. pag. 63. Sic quidam Medicus veteranus Anglus optimo cum successu ultrapavit proquiam marem appensam contra Vertiginem optimam cum successu. Post pœoniam eff impetum Liliam convallium, egregrum ad epilepsiam specificum, cuius aqua, & Spiritus legitime paratus, non tamen sulphureus per Fermentationem, sed ad imitationem LINDANI paratus, & essentia legitime parata: sunt optima. Ut aut legitime destillaret Liliam convallium, jubet LINDANUS reciperet Flores Liliorum convallium bene maturos, adhuc Rore matutino madidos (cum in hoc Rore singularis vis lateat) ante Solis ortum i binc proximas, atque collecti fuerint, abluendi a suis petiolis, & immittendi in Lagenam, illique affundatur Vinum Hispanicum, Lagena bene claudatur, deinde ita per cucurbitam destillat aqua egregij spiritus, quæ vocantibus Floribus, similiter rore madentibus affundatur, & in balneo iterum abstrahatur, idque aliquoties ita repetatur, donec acquiratur Spiritus Liliorum convallium egregrus, & Antiepilepticus: qui postmodum Caloreo affusus, suggerit, vel destillatum spiritum, vel extrahendo Essentiam Calcarei, ad epilepsiam egregrum, quæ à 3℔, vel 3℔. potest dari Adulto, prout fortior, vel debilior fuerit. In usu etiam fuit Phlegm lavendulæ, pœonia, hyperici, Anethi, Radici Angelicæ, Valerianæ sylvestris annotato PANAROLLO *Praxis. 1. observ. 33.* antequam easdem contrahant (A): Vinceretis, Acori, de quo vid. HEURNIUS in *fest. 2. Aphorism. 44.* Beronit, cum foveo REUSNERUS *Observat. 158.* commendat: Sæmen Saponariz ante paroxysmum assumptum, semelque in mense per tria novissima ad 3℔. paroxysmos valde immingere, & Ratis M. 3℔. Vini amphora infusa, & per tres dies sumptæ, idem præstare observavit BORELLUS *Centuria 1. observat. 18.* Quin, & si appendatur Vitis corollina, Amuleti infar contra Epilepsiam laudatur: Nam in *corolla* malæ latent, orde etiam ea Ligno Coryli toto tempore collecto RULANDUS destillat usum oleum famolium, & Spiritum, Narancium dictum, cuius suspendo effectus videbitur in *Praxi Empirica, & Theorica Practica* Hinc etiam Julij Coryli turgentes Sulphure vegetabili, maxime tempore Veruo, mirabile fuit specum ad epilepsiam infan- tum. Anno tricenium rubrica Virgo erat ab octo annis Paroxysmo epileptico quotidie correpta, qui cum menses ritè fluissent, præcisio vehementi Vomitorio, quo varia, & copiosa excrevit, post ulterius Viscum Corollinum, quo ter, vel quater repetito. Paroxysmi cessarunt, & quoties eundem percipere creverunt, hunc pulverem sumebat, eo- que somnabat: quomodo suppinnabat, uli hinc pulveris per tres menses sana fuit, sed postmodum Morbus supervenit Contagiosus, quo interit. Ante biennium Virgo paupercula hic erat, quam epilepsia afflixerat a tenera ætate usque ad duodecim annos: promissio vomitorio dedi ad grana vi Tartari Emetici, Melancholica simul erat: & si epilepsia non affligeret, Melancholica erat, & semper per phares mentes, suo igni summo erat: ipsa tamen post pulverem Coryli, sine ulla intermissione assumpsum, dormire incipere ab hora nona vesperi usque ad secundam pomeridiana: diel sequentis, quod miratus fui: surgere cum aurore mixtam tamen adhuc Melancholica: Continuato pulvere epilepsia cessabat: omni tamen novissimo reddat ipsa tamen plūs minus Melancholica essente ultra quadrantem anni, ita ut etiam aliquando super eadem præceptum se deberet unde interit Lignum Sædium, Salsitæ, item Vitis Rereti-

mus, inter 15. Augusti, & 1. Septembris collectus, hinc Tiliaceus, & qui omnium optimus est corollinus, qui plu habet in recessu, nobilissima sunt Remedia contra Epilepsiam consummæ, seu habitalem inveteratam, præmis- tis præsertim Vomitoriis, multum conferunt pulverificatis 3℔. ad 3℔. sunt enim leve Vitis, in aqua appropriata sumptus Viscum Quercinus nobilissima est ad Convulsus Spasmos, Specificum BOYLEI pag. 185. in *philosophia Experimentalis*: quæ ipsa tamen potiori jure intelligenda de visco corollino, qui Quercus adhuc potentior est, nisi Martio decrevisse Luna collecto: qui pulverificatis à 3℔. ad 3℔. propinatus non satis decantatum est specificum ad epilepsiam: dormiunt post usum, & quando ante paroxysmum assumunt, subis suppinnat: in omni epilepsia, nisi sunt sit rebellis, optimum est: Vid. HARTMANNUS *lib. 4. leg. Sed observandum, huiusmodi Vitis repetito usu egere, & concentrare Fermentum Epilepticum in sua quasi mira, nade facile fieri potest, ut aliis Morbi, præsertim Febre Acute, exinde superveniant; quippe potius eorum usum iungenda sunt subinde purgantia, ne quid remaneat, sed alios morbos inferrequeat: Vid. *Diff. de Precipitatione, & Abusu cap. 3. §. 4.* Quin, & infar amuleti appendi vis Viscum Quercinus, similiter est admodum laudatur. Vitis Tiliaceus in memoriam evocat eorum epilepsia per Adulæ Vegetabilis ex Tilia, de quo vid. Mife. A. N. C. Ann. 6. & 7. *append. pag. 12.* Vix editis his Lignis Liliam Rati ita ut etiam oleum Rati destillatum habetur succedens Olei Ligni Heracini, & quod etiam in huius destilla commode substituit potest, si à gutt. 7. & 9. ad 10. inasumum Tiliæ ad aliquot dies propinquet, vi anodyni, & nihil uarcotica celebret: vid. FONSECA, qui ante propinat aliquot guttas, & imminente paroxysmo exten- silem commendatur etiam; loco quorum auctorem les- thillam succini non incongrue substituitur. Peruenit hæc Praeparatio Quercinus, de quo vid. BORELLUS *Centuria 1. observat. 95.* Ceraia nigra, Acetum, Spiritus Ceraforum nigrorum, de quo vid. RIVERO *Centuria 4. observat. 10.* Alia fetida, camphora, spiritus fuliginis, extrahum, & essentia gallichi. Post hæc singularia quid obinet Sulphur Vegetabile, quod colligitur ex *Lupulo, seu melle terræstri clavato*: nobile est antiepilepticum, præsertim pro Infantibus. Colligitur Mense augusto. Nobilis tamen est Sulphur simile tempore Veruo ex Julij Coryli collectum. Sulphur hæc sunt Remedia non insignia ad Morbos Convulsivos, dosi 3℔. ad dr. l. singulari vis potentia acidum destruedi, quod excitat epilepsiam per consensum: Imprimis in Junioribus sunt elegancia: Videb. M. A. N. C. Ann. 1. *observat. 97. pag. 125. §. 9. & anno 3. observat. 19.* Pulvis hic maxime inflammabilis est; & cum candere i- moveatur, strepitum infar Bombardæ dat. *Coro Ammisa rubra citra Pœoniam Salsitæ, ipsi totius Julij Coryli* dicit ante Solis ortum, vel circa meridiem, fluens hinc effluat, etiam nobile est specificum ad epilepsiam, ad per experientiam in illustri periona factam allegat PÉ- TRÆUS in *Diff. Harmonia. lib. 2. Dissertat. 6. §. 15. pag. 83.* uti etiam JOHEL in *Praxi de Epilepsia pag. 83.* Idem refert de carbonibus sub ætemia effluat, & quidem dictum modo reperiri dicit *Pœoniam Salsitæ*, alio tamen non. Putavi prius, esse tabulam; nihilominus novj Martrem, quæ dissolvens sub ætemia rubra invenit Carbonem, & mihi monstravit, quibus egrege curavit aliquos pueri Epilepticos cum aqua Florum Tiliæ propinatis. Quid fuit vid. DECKERS in *Comment. in Praxi Bartholiniana, lib. 2. de Epilepsia pagina 7.* qui fraudem detexit, quod sint Radices annole æternitatis, quas valguis pro carbonibus per- licibus habet. De Floribus Tiliæ res nota est, quod sint opti- mum ad epilepsiam remedium; nade Liquor Radiciu hinc, de quo vid. TILMANNUS de *Med. medica, & li- qua, & Spiritus Florum Tiliæ sunt in vulgarrimo vi- sium amaram conservam cum oleo succini fliciscit vi- sium PETRUS ASSLINÆUS; vid. VELSCHIUS in all. No. 19. Sympus Nicotiana misticæ commendatur à ZAC- CUTO**

(Z) *Elph. die 13. Julij Stylo veteri, quod idem est ac die 22. Julij Stylo novo: cum sol tempore ingre-ssus signis Lantis.*

(A) Cf. Fabius Columa in *Phytobasano p. 119. ad Radicem Valerianæ sylvestris, seu Phu Dioscoridis, prout arca, extrinsecam antiquum causam edat, atque in pulverem resollam, si semel aut bis exhibeatur Epileptici, pueris prout nim & infansibus, ad dividium coel-lesare, cum Vno, Aqua, Lacti, aliove succo, Epilepsiam tollere. Dominus Nic- chandus de hac re pluries experimentum fecit: ut legitur in *Commentariis Reg. Scient. Acad. anno 1706. pag. 49.* Radicem colligit melleo melleo, cano novum effuso, atque in pulverem redacta, illaque, purgato prius Corpore, ac mo- minquam pro Aegritudinis condicione etiam Vena secta, ad 3℔. & 3℔. in Aqua vel Vino propinquit, carque secunda de mo- ris exhibetur, nonnullorum interpres Carbonem, ac Peritum tractant præcipua: asplumum sudorem movet, cum Epile- pticorum vel ingre-ssus curant, vel saltem revellit hæc.*

CUTO LUSTITANO lib. 1. Praez. admir. Observat. 13. & 24. Partus nempe ex succo Follorum viridum cum melle: Hoc Symplo, aliis omnibus irritis remediis, pertinacissimam Epilepsiam, quotidie quadragesima dierum spacio assumpto, curavit. Primaria ferè hæc fuit ex Regno Vegetabili, quibus tamen subinde etiam alia Remedia Cephalica quæcumque in specie, & Aromaticæ ex eodem Regno addi possunt: Ex hisce enim emergunt Compositissimæ Aquarum Epilepticarum, admodum multiplex, ut Aqua Epileptica Langii, Kalkreuteri, Dornacelli, & similes alie. Modos præparandi pro varietate Authorum variat: Exempli gratia sit sequens Aqua Cephalica, Epileptica, & Apopleptica.

℞. Ner. & Flor. Salvia unc. vi. ad unc. viii.

Rior. Lil. convall. ℞iij.

Levand. edorat. unc. i. ad unc. ii.

Rad. Fp. mar. unc. i. ad unc. ii.

℞. Flor. Majoran. unc. f. ad unc. i.

Cinnamon. elœ. unc. ii.

Cubebæ. unc. f.

Caryophyll. ℞iij.

Macis ℞iij.

Infund. cum Vin. Malvæ. aut Rheum. qn.

Distil.

Macerentur per dies 14. hinc destillentur in

Balneo Mariæ.

Potest parari cum, & Oleo castorei: item post redificationem potest addi q. l. de Spiritu fusc ammoniaci, vel simili volatili, ut fiat Remedium hoc generosius. Qui novit materiam Medicam, facile potest combinare tales Aquas.

II. Ex Regno Animalium ad epilepsiam commendantur imprimis Remedia humana, seu ab homine desumpta; quæ inter cunctas Sanguinis humani, & Remedia ex hoc parata spiritus nempe, Sal volatile, & Oleum, specificis sunt hæc Remedia, imprimis Spiritus sanguinis humani cum sale volatili acutus, qui etiam tanquam nobilissimum Remedium in epilepsia brevecitatis, si quid aliud, conferre dicitur ab HELMONTIO, in quo quamprimum prædicorum consentiunt. Sed observandum secundum LINDANUM eligendum esse Sanguinem Humanum ab homine recentiter decollato collectum, cum aliquis sanguis viæ talem efficaciam habeat, vel per se destillant, vel in Vase vitreo prius cum paucis Spiritu Viri circundatus, & ita lege Artis in spiritum, Sal volatile, ac oleum destillantur: remedium, quod rite paratum est egregium ad Epilepsiam, & Apoplepsiam commendatissimum. Ipse reddit rationem hanc, quod scilicet in Homine decollato præ metu Mortis Spiritus ejus quasi coaguletur, & concentratur. Quicquid sit, hoc certum est, quod Spiritus, & Sal volatile sanguinis Humanum sine decurtata ad Epilepsiam Remedia. 3. Doctor MICHAELIS Sanguinem dicto modo collectum, & congruenter decantat. Sero deponat, donec situm contrahatur: Sic enim copiosior spiritum, ac Sal volatile eliciebat: quo sæpius utebatur in Epilepsia, nonnumquam spiritum virioli Cephalico (de quo postmodum) evadit exinde mistura febriviridis, & subacris elegans, qua ipsa etiam hæreditarius epilepticos le corasse idem testabatur. Post Sanguinem Humanum est imprimis Secunda humana, quæ potest fieri ad Spiritum volatiliem, qui præter effectus singularissimos in Afflictibus Mulierum, præsertim Puerperarum lothibis, Epilepsiam potenter curat: Secretum fuit GNOEFFELII, quo aliquando Rex Poloniae fuit curatus, datur dosi ex gr. xv. ad xxx. xxx. vel dr. f. sub insignibus Lunæ mutacionibus. Vel ipsa Secunda in Ciliario blandè reforescitur, pulverisata dosi dr. f. ad dr. l. Luna imprimis doctissime in Aqua spiritibus Florum Tiliæ, aut Liliorum convallium propinanda venit. Sequitur Cranium humanum ex homine violenter interempto desumptum, in specie quidem ut Triangulare, vel Triquetrum ex concursu Symplo Sagittalis, & Lambdoideæ, quod iuxta PARACELSUM in Epilepticiis reperitur, tam Ralura ejus simpliciter pulverisata, quam quocunque modo præparatum, vel philosophicè, aut cum igne calcinatum, vel, quod omnium aptimum, emulsum Sal volatile, ac Spiritus ariofus, Sale volatili concentrato tardius, egregie conducunt ad curandam epilepsiam. Cranium hinc igne, aut solum præparatum, datur ℞i. ad ℞iij. ℞i. & ℞i. Spiritus vero prout fortis, vel debilis à gr. xv. aaaa. ad dr. f. & ℞i. Sal volatile à ℞i. gr. xv. ad ℞i. Primum bene manifestavit PARACELSUM, qui præter Gelatinam, Spiritum, & Sal volatile, Oleum Cranii Humanum, quod solum pendit per destillationem, redificationem à Capite mortuo, & Vertici innatum, præcelsissimum dicit remedium ad accendendum paroxysmum Epilepticum (quod credo, est enim sal volatile concentratum).

Tom. II.

Quin, & oleum succini, aut succinum permixtum cum crania humano pulverisato, denuò destillatum forti igne gradatum, dat Oleum antiepilepticum penetrans, & excellens. Si Fector est inimicus, circuletur Oleum prius ante usum aliquandiu cum Spiritu Vini redificato, vel tartarizato, & ita cum eodem leni igne à calenatis destilletur, dat oleum suavius, & egregie penetrans. Iuxta Cranium, Cerebrum humanum est egregium Antiepilepticum, cuius Spiritus, & Oleum ad imitationem HARTMANNI præparata sunt egregia Antiepileptica. Hæc ipsa pariter, & multo magis de Tinea Cranii humani, ex patibulo, seu capite rota fracta collecta, intelligenda sunt, in qua confermatam est immia capitis microscopici, egregia contra Epilepsiam. Quin & ossa hominis reliqua, ex Homine violenter occidit desumpta, destillata, aut præparata, ad Afflictus Convulsivos sunt egregia: uti & aliorum animalium Partes ossa, & cornua, imprimis unicornu Marium, Dens hippocampi, seu Equi marini, Spina Mulezæ piscis, dens lupi, lapilli carpinum, Ralura Cornu Cervi, Unicornu infule, & ex his quocunque præparata, Salia etiam volatilia, Spiritus Cornu Cervi, item liquor cornu Cervi succinatus, sunt egregia Antiepileptica. Dens Hippopotami (vid. WORMIUS in Musco) est durissimus, & singulari specificum in convulsione quocunque per contentum Abdominis, qui præparatus hoc igne, aut ex destillatum sal volatile, mirè confert ad convulsivos affectus, pariter interinos, & externos. Etenim quoque ex hoc Dente à quibuscumque sunt Ausonii (vid. WERNERUS) qui membro, seu Digito convulso inserti, aut etiam digitis pedum, in spasmo statim, sive Cramba applicati, imprimis gravidarum, sunt perquam proficaci. Laudatur etiam Hepata Ratium viridum, de quorum præparatione vid. HARTMANNI Praez. pag. 67. & FINCKII Eucher. Praez. pag. 29. Congulum Leporis, coturnicinis Ova, Pulvis Millepedum, Hepat Lupi, cujus usu quendam Epilepticum periculis sanatum fuisse, qui postmodum multis similiter hoc Remedium curavit, vid. BORELLUS cent. 2. obs. 95. Testiculi apri, vid. AUGENIUS tom. 2. l. 8. pag. 2. Fel Catuli nigri, vid. UNZERUS de epilepsia pag. 245. corpus Thuri simile, quod in acervis Formicarum reperitur: vid. REUSNERUS Obs. 15. Picæ, cornu combustus, & Mus calcinatus, vid. Idem obs. 13. & 15a. Materia, quam pullus Fiquinus vomitu reiecit, vid. HIERONYMUS DONZERINUS lib. 6. Cap. 35. à SCHULZIO addita: Spiritus Uriæ, Sanguis Leporis in venatione probè agitati, hinc pavore capæ & jugulati, collectus & calcinatus, ad 3. assumptus, singulari HELMONTII est Remedium, aut sumatur Linum ex cinidum, infundatur in haustum Vini, donec omnis color extrahatur, postmodum haustiarum, & Remedium erit planè singulare. Pertinet hoc Capsum, nobile & singulare Antiepilepticum, & ad affectus quocunque nervorum, imprimis quidem, si ad imitationem, non BARBETTE cap. 1. Praez. junctum salibus volatilibus infundatur in Spiritu Vini, vel Liqueore alio spiritibus salino volatili unctis, quam effusis cum aqua cinnamomi vel Salvie est nobilis: v. g.

℞. Salis vol. succini.

Cran. human. 20. ℞i.

Castor. ℞i.

Infund. in Lq. Spiritus Vin. Digerantur & circulentur, sit exinde Tinctura antiepileptica elegans.

Vel spiritus Salis Ammoniaci vinosus cum calce viva & spiritus Vini paratus, calidore affusus, egregium quoque Essentiam & Tincturam extrahit. Imprimis autem convenit calidore ejusque essentia, uti & ex calidore & Asa foetida cum Tinctura aut spiritus Tartari parata, in Epilepsia & convulsionibus intercalis, seu Spasmi partium internarum, per contentum abdominalis & Viscerum inferiorum entis: quales sunt colica convulsiva, Suffocatio Hypochondriaca, hysterica, & similes: sicut etiam in quacunque partium convulsione Tonica ab omnibus auctoribus mirè commendatur externe usurparum; quæ & applicatum calidoreum cum clysteribus in Epilepsia interdum, admodum conducit. Quæ saprà cap. 2. de Strigine dicta fuerunt de Strigore Pavonis, ipsa similiter valent in Epilepsia, in qua non minoris pretii est pavonis Stercus. Videtis egregie de hoc differens SCHOLZIIUM Conf. 4. & BORELLUM Cent. 3. Observat. 15. qui habet experientiam de cura epilepsia per Stercus Pavonis, quacunque ratione applicatur, sive in substantia sub forma pulveris cum appropriatis, sive infundatur in Vino, maceretur & propinetur, De Alia, ejusque Ungula, horumque salibus volatilibus

Bbbbb

&

& Spiritibus; de *Nivandis*, & carum aqua cum & sine calidore, nil dico, cum hæc per se potissima sint, quod convulsant singulariter in epilepsia. Adhuc *Ova uterinæ* hoc pertinent, quæ effusæ, & pulverisati ad 36. propinæ, sunt expertum speculum HOFERII in *Hier. med. pag. 25*. De his & similibus ex Animalis Regno Antiepileptici Remedia iudicium videbitis in LUDOVICI *Pharm. pag. 930*.

III. Pergo ad *Regnum Minerale*, in quo primum ducunt ad Curam Morborum convulsivorum *Sulphura Animalia* plus minus fusa, de natura Solis participantia, quæ præ aliis decantata sunt; partim quod generalem habeant vim temperandi quodcumque Acce exsultum; partim quod similiter singularem habeant vim anodynam, adeoque Spiritum Animalium feroces motus sedent, ubi sulphur antimonii fixum multum in recessu habet; partim etiam quod vi Emeticæ tollat Fomitum morbi, si est in primis viis. Observatum enim est, si Fomes fuerit in primis viis, exsultasse Vomitus, hinc fomes sublato, Vomitus non amplius movetur. Hæc inter eminet primum *Cinnabari Antimonialis* Magnes epilepticæ appellata, quæ inficere virtutes curandi Epilepsiam obtinet; sed necesse est, legitimè sit præparata, & aliquoties sublimando ab omni volatili Sulphure purgata & separata, ac cum Aqua spirituosâ quacunque in aere libero super porphyritidem levigata. Optimum est, in specie si supervenerint Epilepsia aut Motus Convulsivi Morbis acutis, ubi tunc solitariè usurpatur, multo cum salibus volatilibus, cum quibus ejus color augetur. Qui oront ex hac cinnabari parare cum spiritu quodam Vegetabili Tinduram, habebunt egregiè antiepilepticam. Huc facit Remedium, quod vocatur quibusdam *Astrum mercurii secretum* scilicet ea Cinnabari Antimonii beneficio Mensura: ex Nitro & Sale Gemmæ parati, quod tandem præcipitatur in Crysallos aoratas inflat Croci, quæ misticæ convenerint in Epilepsia. Verùm præter Cinnabarum hanc antimoniam adhuc est subtilissimum & fixissimum *Sulphur antimonii*, ex *Solis Regali Antimonii*; dom nempe morbo solo per secundam Præcipitationem, ex his separatim fuit Sulphur Antimonii, Auratum dictum, adhuc semel ex Liquore isto filtrata simultanea iniectione Aceti destillati & spiritus Urinæ, aut Salis Ammoniaci præcipitatur Sulphur subtilissimum & admodum elegans, coloris auratiorem, quod in minima dosi, ad usum alterative granum, mirabiles effectus Anodyno-epilepticos exstitit in curanda Epilepsia Infantum & adultorum, & Cinnabario antimonii longè superat. Interdum ratione circumstantiarum præcis facit Vomitus, interdum præcis fomitum, interdum sudorem; in aliquot Epilepsia, in Febribus beneficio hujus Sulphuris nobiles videri effectus. Dosis Infanti unius anni ad usque duos, gr. ʒ. ad gr. ʒ. Adulto 9. vel 10. annorum, gr. li. præter propter, iuxta antimonii cinnabari etiam Cinnabari nativæ selectior, & ex eadem parata Remedia varia, non in omniæ uxor erant. Cinnabari hæc nativæ engarica multum de Sole habet, & optimè Cinnabari Antimonii substituitur, vel coctione vel lotione purgata, merito dicitur a CRATONE magnæ Epileptice. Post hæc Antimonialis commendatur etiam *Mina Argentea* iussu Rubini transperat. Germanicè *Roth. gulden Ertz*. Viriolum optimum est Remedium, mirè commendatum à PARACELSO ad Curam Epileptice; sed hæc intelligenda sunt de ejus subtiliâ sulphurea, sulphure Virioli anodyno fixo, de quo tantæ laudes HELMONTII huc inde prolant: & deinde etiam de spiritu Virioli volatili egregiè sulphureo anodyno, qui per nonum Alembicum est proleclus, uti loquitur PARACELSO. Hic Spiritus Virioli est genuinum ingrediens Mixturæ simplicis, quam PARACELSO sub nomine *Spiritus in Peraltur*, ptemitis commendavit ad affectus epilepticos; non vulgarem ipsam, Spiritibus nullius præstè adulteratam. Spiritum enim Virioli volatilem, cum spiritu Tartari volatili, & spiritu Theriacali camphorato miscuit, in officinis ingreditur *Mixturam simplicem* Spiritus Virioli, non volatilis sed corrosivus, item phlegma ex tartaro: unde est impossibilis Compositio. Modi ad hunc spiritum Virioli volatilem acquirendum sunt varii. Nota eius est, ut ipsum Phlegma sub destillatione striatum antecedit, (Striat sunt spiritus:) propterea eligendum imprimis Viriolum in aere blandè calcinatum, sub quo blanda calcinatione phlegma ejusdem speciei sensim exhalat, simulque aliquanti Virioli ejus subtilioris Sulphuris per aerem resolutione, facillime Spiritus Virioli volatilis egreditur. Alii recipere solent Caput mortuum Virioli, quod aliquandiu sit expositum, ac ita de novo imprægnatum fuit. Comp. verb non omnibus ac ita liceat parare ejusmodi spiritus vo-

latiles, ob id eliguntur ii, qui proximè ad eos accedunt quos inter eminent *Platissimus Virioli* beneficio Urinæ Humanæ aut beneficio spirituum volatilium vegetabilium. Quoad *Virium Humanarum*, notis est spiritus virioli volatilis antiepilepticus, & virioli Veneris cum Urina humana præparatus iuxta QUERCETANI descriptionem in *Tetr.* quæ etiam reperitur in HARTMANNO. Nempe calcinetur Viriolum in sole, donec pericte albecat (id quod fit optimè in diebus canicularibus mense Julii & Augusti, quæ etiam paratur pulvis Sympatheticus); deinde Spiritus Urinæ, qui adhuc fermentatione potatus, ipsi commiscetur, ut ex mixtura viriolum infus pulvis evadat. Ex hoc tone destillatur ordine spiritus ex Arena, Igne tamen paulo fortiori. Hic postmodum quinquies bene est rectificandus, & fit Spiritus Virioli antiepilepticus non inolegans. Hic spiritus est maximè sulphureus volatilis fixus, & acidos, de quo retulit D. MICHAELIS, & fit etiam huius usui Epilepticum hereditarium curale. Nam in hoc Sulphur Virioli metallicum ad alcali Urinæ dissolvitur, ita ut eundem & spiritus acido proprio in forma spirituosâ sulphur Virioli volatilis extrahatur, elegantem spiritum virioli volatilem epilepticum constituit. Dixi etiam quod volatilis spiritus virioli beneficio spirituum volatiliū, quæ ratione spiritus epileptici, & Cephalici notantes sunt: V. g. paratur spiritus Virioli Epilepticus aut cephalicus ad imitationem D. MICHAELIS, qui

℞. Viriolum Hungaricum depuratum in Balneo Maria, & pulverisatum

Illudque irrorat cum spiritu Vegetabili composito aphalico vel Epileptico, id est, cum spiritu Vini Rectificabilis cephalicus & aromatisis post præparat Digestionem abstrahit. Permiscetur hæc ad consistentiam pulvis spiritibus, destillatur per Retortam in Igne aperta, morbo confectio; spiritus qui prodir, adhuc aliquandiu digeratur in loco calido, hinc rectificetur per Alembicum in Arena, & prodit primo spiritus volatilis stratus quodammodo nebulosus, quem isque spiritus gustat phlegmaticus: quibus apparentibus mouetur receptaculum, & secundo capitur phlegma: quo cessante, dum Nebula postmodum denuo surgat, & sapit acidulum se moueat, novum applicetur receptaculum & capiantur spiritus volatiles nebulosi, & ita sub nomine spiritus Virioli Epileptici vel Cephalici admodum egregii afferetur, qui est ille, micidius cum spiritu Sanguinis humani ad curam Epilepticæ Hereditariæ, uti antea monui.

Loco Virioli crudi dephlegmati sæpè etiam acceptit Caput mortuum Virioli per regenerationem denno ab aere imprægnatum, & cum spiritu Vegetabili cephalico imbutum ad consistentiam pulvis, dicto modo tradavit. Sic quidam misceat Viriolum Hungaricum cum ralsu erani humidi, & destillant.

Tandem inter Mineralia est adhuc *fusum*, ejusque essentia cum spiritu Vini extracta, Sal volatile ac Oleum, egregia & potentia ad integrum systema Nervorum, & epilepsiam, & convulsiva pathemata remedia, imprimis in Febribus Malignis & affectibus hybericis supervenient. Hinc Liquor corio cervi succutus, nam solitarius, quæ Liquor ut sal volatile succini eodem modo cum spiritu sanguinis hominis mixtum, sunt compositiones egregie in & extra parasytum; Nam in cura epilepsia necessaria sunt, quæ cum impetu quodam penetrant. Quibus ipsis interdum Camphora additur, quæ figit quodammodo spiritus animales, & ad motum naturalem reducit eodem; Unde & camphora vim somniferam obtinet: sicut & HARTMANNI secretum in epilepsia & suffocatione Uteri, seu molestia quæ uteri ex Laodæo Opiato & camphora, quod Medicamentum ante parasytum præservationis gratia porrigi potest. *Crysallos* denique *montana* præparata in Epilepsia per consensum abdominis ubi est opus forti penetrationis Acidi absorptione, multum præstat.

IV. Ex modò dictis simplicibus & similibus plures & innumerales iterè possunt fieri *compositiones & Formula Antiepileptice*: v. g.

℞. Aqua ceræ nigra.

℞. corvalli. unc. 12.

℞. li. long. unc. 1.

Liqu. ceræ Corvalli. vel Spiritus cran. Han. rectif. 3i.

Syr. Flor. Tm. unc. 1.

M. D. S.

Potio Antiepileptica.

Vel

℞. Aqua

℞. Aqua fer. Tiliæ,
Sabula,
Cerafer. nig. vel Meliss. an. ʒi. vel ʒii.
Liq. ceram Cerui facin. ʒi.
Spiritus Theriacal. camph. vel ʒi. Caster.
ʒi. ad ʒi.
℞. Opil ʒi.
Syrup. Flor. Pæon. ʒi.

De quo ter vel quater de die, duo, tria, vel quatuor den-
 tur Cochlearia pro dosi. Vel

℞. Aqua d' Epileps. Cerui ʒii.
Cerebr. Humana. spiritus. ʒi.
Spiritus Sangu. Ham. ʒi.
Ceram. Humana. prop. ʒi.
Salis vel. Ceram. Hum. gr. xv.
Succin. ʒi. ad gr. xii.
Laud. Opiat. gr. iii. vel v.
Syr. Storchad. Arab. ʒi.
M. S. ut supra.
Item

℞. Aqua fer. Pæon. ʒii.
Cerebr. hum. cam. Flor. ʒvi.
Spiritus Sangu. hum. essent. ʒi.
Unicorna var. prop. ʒi.
Cinnab. Antimoni ʒi.
Laudati Opiat. gr. ʒi.
Syr. Storchad. Arab. ʒi.
M. S. ut supra.
Vel

℞. Aqua fer. Pæon.
Tiliæ ana ʒi.
Cinnam. spiritus. ʒi.
Ceram Cerui sine igne ʒi.
Cinnab. Nativ.
Recard. Miner. ana ʒi.
Laud. Hyfler. gr. v.
Syr. fer. Pæon. ʒi.
M. S. ut supra.
Vel

℞. Aqua fer. Pæon. ʒii.
℞. Ceryll. ʒi.
Cinn. Nativ.
Recard. Miner. ana ʒi.
Laud. Hyfler. gr. vi.
Syr. fer. Pæon. ʒi.
M. S. ut supra.

Dosis Cochli. i. quater vel bis in die.

℞. Aqua Fœnicul.
Flor. Tiliæ ana ʒi.
Spiritus Sal. Ammoniaci.
Liq. ceram Cerui facin. an. ʒi.
℞. Caster. ʒi.
Syr. Papav. simpl.
Storchad. Arab. ana ʒi.
M. S. ut supra.
Vel

℞. Aqua fer. Pæon. ʒii.
Puleg. ʒi.
Aqua Apul. vel Epileps. Lang. ʒvi.
Salis vel. ceram Cerui gr. xii.
Succin. gr. vi.
Syr. fer. Pæon. ʒii. vel ʒi.
M. S. ut supra.
Vel

℞. Aqua Meliss. ʒii.
Salv. ʒi.
℞. Cist. ʒi.
Liq. ceram Cerui facin. ʒi.
Syr. fer. Pæon. ʒi.
M. S. ut supra.
Vel

℞. Cinnab. Antimoni ʒi.
Salis vel. Succin. gr. xii.
Laud. Opiat. form. gr. ii. vel iii.
M. f. Pulvis:

Div. in 8. part. æqua. S.

Pulvis contra Epilepsiam,

Vehiculum sit:

℞. Aqua Salv. ʒi.
Lil. convall. ana ʒi.
Spir. Lil. convall.
Tom. ii.

Ceraf. nig. ana ʒi.
M. S.
Aqua ad Pulverem.
Vel

℞. Cran. humana. sine igne ʒi.
Cinnab. Antimoni ʒi. vel ʒii.
Salis vel. ceram Cerui gr. xii.
Succin. gr. vi.
M. f. Pulv.
div. in 4. part. æq. S.
Pulvis Caput confortans.
Vel

℞. Cinnab. Antimoni gr. xv.
Salis vel. ceram Cerui
Viperar. ana gr. iv.
Camph. gr. ii. vel iii.
M. f. Pulv.
D. S. ut antè.
Vel

℞. Antimoni Diaphor.
Cinnab. Nativ.
Succin. prop. ana gr. viii. ad ʒi.
Salis vel. Succin. gr. iii. ad v.
Laud. Opiat. gr. i.
M. f. Pulvis:
D. S. ut supra.
Vel

℞. Cinnab. Antimoni
Succin. prop. ana ʒi.
Caster. gr. xii.
Salis vel. Succin.
Ceram Cerui ana ʒi.
Camph. gr. iii.
M. f. Pulvis:

Div. in 3. part.
D. S. ut supra.
Vel

℞. Cran. Humana. sine igne ʒi.
Cinnab. Antimoni ʒi.
Caster. gr. xv.
Salis vel. ceram Cerui
Succin. ana ʒi.
M. f. Pulvis pro aliquot dosibus.
D. S. ut supra.

Horum Vehiculum sit:

℞. Aqua Lil. convall.
Ceraf. nig.
Flor. Tiliæ ana ʒi.
℞. Flor. Auric. vel Caster. ʒi. ad ʒii. vel ʒiii.
Spiritus Cran. Humana. essent. ʒi.
Syr. fer. Tanc. ʒvi. vel ʒi.
M. pro Vehiculo. S.
Aqua ad Pulverem.

Io quo capiatur præfatus Pulvis, vel Pulvis Epilepticus
 Ludovici: vel Pulvis ex secundina humana in Coll. Phlegm. in
 Schraderam P. 2.

℞. Cran. humana. pulveris.
Cinn. Antimoni vel Nativ. ʒi.
Sal. vel. ceram Cerui gr. vi.
Succin. gr. iii.
Laud. Opiat. gr. ii. vel iii.
M. f. Pulvis.
Divid. in 3. part. æq. S.
Pulvis Epilepticus.
Vel

℞. Cran. humana. sine igne.
Unic. Maria. an. ʒi.
Cinnab. Antimoni ʒi. ad ʒii.
Salis vel. succin.
Ceram Cerui ana gr. ix.
Camph. gr. iii.
M. f. Pulv. pro tribus vel quatuor dosibus.
D. S. ut supra.

Capiantur in vehiculo sequenti:

℞. Aqua Lil. convall. ʒii.
Apul. vel Epil. ʒi.
Syr. fer. Pæon. vel Tanc. ʒvi.
M. S.
Pocio ad Pulverem.
Vel

℞. Aqua fer. Pæon. ʒi.
Cinnam. ʒi.
M. S. ut antè.
Bbbbb s

V. Inter *Externa* ad Epilepsiam commendata eminent *Amuleta*: quae inter primatum obtinet *Hambaria per Saltum arvensis*, cuius applicandi rationem & usum vid. in HARTMANNI *Praxi Chym. abt de Epileps.* SIMONIS PAULI *Quadrup. Botan. Class.* 1. pag. 140. Experimentum verò egregium ejus videtur in BARTHOLINO *Cens. 4. observat. 69. Pica canis super Salicem: inde transacta Ramifimbria*, quoniam antea de *fimbria canis*: Videtur. KERGERUS *scit.* 1. cap. 6. pag. 51. De *Arboris*, quae videntur Nucleifer, id est Nucivore, & quae Noces *Nucleos deorant*, ubi *spissum* *seram* *extrema* *cadunt*, *rescit* *arbor* *Mustata*. Radix Ostruæ seu Imperatoriae, Germ. *Reinholders*, recens distilla & pollicibus Manuum ac Pedum alligata commendatur in M. A. N. C. *causa 4. & 5. obs. 42. pag. 31.* BOOTIUS de *Lap. & Gemmis lib. 1. cap. 33.* & ZECCHIUS *Conf. 44. fœnugraecum* commendat: Alii radicem & semen *Ponia*: Videtur. FORESTUS *lib. ro. observat. 59.* & ROYLE *læss. allegat.* Alii Ungulam Alicis, alii Vileum Quercinum, alii Dentem Hippopotami & eandem paratos *Annates*, de quo *supra* *distillat* fuit. Cines Canis nigerissimi cum alio Amuleto appendes laudat FORESTUS *lib. ro. Observat.* 60. *pagin. 391.* De Amuleto ex Electro majore *Paracelsi* notum est, quod etiam commendatur à quampulchris in Cura Epilepticæ & convulsionum. Cinnabari Nativum extens collo appendam, vel carpis masum annexam in Paroxysmis Epilepticis convenisse observatum est. Ulterius Vertici, Spinæ & Partibus convulsis applicari possunt Cuique, Emplastra, Olea & *Insuffusio* cum Oleis recensitorum cunctis, verbi gratia *Olea distillata succini*, si Epilepsia est per consensum, ubi enim Olea Spicæ illinatur Abdomini; cum Oleo Lavendulæ, Anihoi, Rutæ, Serpilli, Majoranæ, Calorei, Corylli, & similibus; item cum *Balsamo Peruviano* egregie conducunt. Probè autem perfecta sit *Indiscretio* *Agri*, qui nempe possunt ferre talia; sunt enim quidam, qui ab ejusmodi odoratis magis læduntur, nimis affectis & commotis ab istis spiritibus. Miscei possunt dicta Olea distillata cum Oleis infusis & coctis, Lumbicorum terrestrium, Rutaceo, Mastichino, Calorei & Unguentis Nervini; item emplastro CRATONIS, quod *lib. 4. Epil. ad Jordanum* *pagin. 181.* describit; item emplastrum, ex *Emplastro-Diacetico* *lib. 3. Diaceti* *lib. 2. & de Dietetica* *lib. 1.* compositum, Speciatim Pinguetia Casti sylvestris in Paroxysmo, aut eodem impiente, Umbilico illata singulare est Remedium ad Epilepsiam, & quæcumque convulsiva Pathemata, secundum SCHMUCKIUM, habito tamen respectu ad Mare præ Maribus, &c. In Epilepsia ab affectu *Splenis*, cum vel sine Tumore scirrholoso, optimè est Emplastrum de Ranis cum Mercurio, in subje-ctis robustis cum duplo doli Mercurii. Sic in Virgine tredecim annorum, cuius Mater epileptica erat, observavi, quod eam Melancholia aliquando invaserat cum aliquibus Insultibus Epilepticis in Somno, ipsi tamen necesse: mine de lassitudine Artuum conquebatur, primo dolor obcurus assigebat in Hypochondrio sinistro; Præmissi ex Sale Hypochondriaco digesto, cum Vomitu his repetito, propoiaui Liquorem Martis Solaris gradatim ascendendo ad septimanam externè admovi Emplastrum de Ranis cum Mercurio, malaxatum cum Oleo distillato fortido; quibus se bene iterum habuit. De *circulo ex Cere humano* ses nota est, si Lumbis spissio corporeis seu convulsivis circumligetur, ut etiam Hypochondriarum regioni circumducatur. Hoc ipso efficax dicitur *Serena Crura* insignior parti convulsæ circumligatur. An verò Corium humanum habeat vim specialem ab aliis Cingulis fortiter ligantibus distillat? dubitatur.

Hæc ita se habent extra Paroxysmum.

VI. Quod *Ceream artem in Epilepsia* Paroxysmum. Si sit gravior, ad emulandum Epilepsiam mirè conducunt omnia ea, tam *Interna* quam *Externa*, quæ quovis sensu seu eorum Organa fortiter vellere, & ita spirituum inordinatas commotiones seu fortiora obiecta in ordinem revocare possunt, quibus remedia *supra* in *Supra* *afflictibus* fuerunt propoia: adeoque præter Venesectionem & Vomitoria, Evacuantes universalis vix habeat locum. Venesectio scilicet propter evidentissimam tantum Plethoram, aut sanguinis alioquin evacuationis solennis suppressionem, semper illam DECKERI in *Praxi Barthelemy* *pag. 5.* Animadversionem observando, ut parè latè Sanguis educatur; alias enim Paroxysmi semper graves redeunt. In graviore malo mirè conveniunt *Vomitus*, qui alia jertis sunt nobilissimi. Cæterùm duo urgent incommoda, quæ huius excitationem præmissis inhihent: Scilicet quando ardè clausa Labia sunt, & propter convulsus Temporales Musculos ma-

xillæ ardiis stringuntur; & secundo, quando in graviore Paroxysmo propter Musculorum Ophragi & Pharyngis convulsionem, non possunt deglutire. Propterè cum non possit aperiri Os, ad modum BORELLI in *Observation.* Os ac Dentes apertendi, admovento nempe Pollicem cum minimo Digito, vel Spatulam aut Cochleare, ad Oris latera & intra Dentes inferendo, fortiterque comprimè, sic enim licet cum dolore faciliè Os aperiantur, quod beneficio Cochlearis potest servari apertum: quo facta insillandam est Ori vel Medicamentum forte Vomitorium, quod admodum conducit ad suscitandum Epilepticum, aut alia appropriata. In posteriore vero casu, si non possunt deglutire, *Pensa* *Oleo* *linno*, aut alio acriori infusa, grana aliquot, tribus aut quatuor, Mercurii Vitæ vel sum Antimonii, aut syrupo Emetico cum grano Mercurii Vitæ amato, imbus Fausibus immittenda, & in specie Pharynx insillatur, & ita vomitus stimuletur: Vid. FONSEGA *conf. 15. lib. 2.*

Vel
Zf. Aqua Refar. 3℔.
Cinnam. 5℔.
Eyr. Emet. 5℔.
M. S.

Succus Emeticus.

Insundatur hoc Ori, quocunque demum illud ferri que modo.

Aut *Fumus Nicotiana* Fausibus insilietur: Videb. RIFFRIUS *caus. 2. obs. 60.* Præmissis tamen vomitoria incum habent, si ex Venterico & Hypochondriis, cum à assumptis Malum fuerit: Videb. SENNERTUS *Prax. lib. 1. pag. 596.* & WEPFERUS *de cicut. agnat. 1312. 324.* Hinc Pueri quoque ex eructantibus aut Lactatione tale quid contrahentes proficua observantur: Videb. RIVERIUS *caus. 4. obs. 59.*

Loco Vomitorii, præterit si nequeat adhiberi, & tamen novus insiliet Paroxysmus, *Clysters* *acres* frequenter insiliantur, quales *supra* *de afflicta* *Supra* *descriptis*, *infra* *art. 1. cap. 3. abt de Apoplexia*, & *lib. 4. sectio. 3. cap. 3. abt de Insufflatione* *Hysterica*. delictibus, sunt perquam egregii, imprimis si Musci convulsus sint per consensum: quibus semper Stercus Paxonum, *Cassorum*, aut ejus essentia locianda, & pro stimulo *Aqua Rosellida*, *Syrupus Emacicus*, aliæque Infusa familia Armoniaci addenda; sicuti commode Olea distillata fortiter penetrantia, aut *Salia volatilia* à Jn. ad 3℔. verbi gratia spiritus, seu Sal volatile Sanguinis Humani, vel Cornu Cervi, vel Sal Succini ad id potest. Mirum conveniunt hæc Salia volatilia cum Cypmatis applicata, in specie si humida sit Epilepsia Intera.

Uterius *fermentoria* ex radice Pyrethri, Helibetici albi, Caloreo, Vitiolo calcinato, & Sale Vitioli & similibus Natibus insillata, interdum potentioribus, verbi gratia succo Aquilegæ, cum succo Lumbicorum terrestrium, quibusdam in usu sunt: excitant enim Epilepticos. Cum tamen hæc fiant, in hiis in primo Epileptic Gradu, & à convulsionum manifestum nulla adhuc comparet aetia, eaque moderatissima, & in declinatione demum huiusmodi adhibenda: Videb. WEDELIIUS *de Facultate lib. 2. pag. 215.* J ne per fermentationis convulsivum motum Epilepsia aut suscitetur, aut exasperetur. Nam aliud est in Apoplexia vel Comato aliæque affectibus *Supra* *descriptis*, ubi excitandi sunt spiritus: aliud in Epilepsia, in qua spirituum exagitatio & organum nimius potius sedari, quam per fermentationem excitari debet. Est enim de motu per se motus convulsivus, & quasi particularis Throni convulsio & Epilepsia. Propterè loco talem potius *Salu* *volatilia* *maera*, fortiter penetrantia, eorumque spiritus, in Vitro longi colli Natibus admovento erunt: v. p. spiritus Salis Ammoniaci cum Galce viva, qui penetrant: Sal volatile & spiritus Urine, & similia, aut urgentes calitate Natibus ac Linguis insillanda, ut excitent Epileptici.

Vel
Zf. Pulv. Rad. Bell. nig. 3℔.
Sali vol. Sal. Ammoniaci, vel Urine, vel Oris
Cervi 3℔.
Sacch. alij. 3℔. vel q. s.
M. f. Pulvis & f.

Pulvis Sternutatorius.

Suffusus Succini admodum convenit etiam in suscitandis Epilepticis, ut etiam *Oleo distillata Succini* guttæ tres, quatuor vel quinque, in Aqua appropriata. intus propiæ: J Paroxysmum optimè conducunt, quæ tamen extra Paroxysmum lædere dicuntur. Quia & familia spiritibus Antipilemodica volatilia & diffusentia, v. gr. ex spiritu Theriacali simplici & camphorato, Ceraforum Nigrosum, Sa-

gurus

parata, Salvia, Lavendula, Succolium, Rosmarinus, ejusque decoctum, spiritus vini Theriacalis, spiritus vini Camphoratus; item periculator in malo decoctum Lignorum, præsertim Quercus & Juniperi, sunt optima: hinc Cinnamon & quælibet alia Epileptica, præsertim volatilia, conducunt.

Quoad externa: conveniunt ea, quæ sub forma Inunctionis elixa & spiritibus applicantur: quæ ipsa tamen in genere, quò minus sunt unctiosa & viscidiosa, minisque obliunt aut infarciunt poros, magisque sunt penetrantiora, & spirituosiora, eò meliùs conducunt. Præ cæteris Lumbrixi vi vi applicati & Lumbrixi hic conveniunt: Nempe, Lignum oleosum per deliquium in elixibus Lumbrixi terrestribus, item Oleum Dactylidis Lumbrixi terrestrius: quæ ipsa quoque de Termitis intelligenda sunt. Aut sequens Linimentum, quod expertus est FORESTUS in convulsione à cholera, cum intensissimo dolore juncta;

℞. Olei Iris.

Terre. terrestr. ana ℥i.

Castor. palustris. ℥iv.

M. emulsionē agitando.

Quo Indolenter fiat Inundio Membri Spasmo correpti calide, donec essent contritiones. Ubi ab Inundione abstinetur, statim rediunt convulsiones; continuata verò Unctio cessant. Vid. l. 10. obs. 110.

Præter spiritus vini crocatus, spiritus autem Aquæ Theriacalis camphoratus, Effusio ex infusio Nervorum, &c. Olea & Pinguis quæ usurpantur, sunt Oleum Vulpium, de Calore, Oleum ex Catellis, imprimis Oleum vel Ausonia aspersa assando destillans ex Anere, simplicibus aromaticis cephalicis & nervinis pituita repleto, optimè confert in convulsionibus partium externarum. Pinguem hæc per assationem ita proleat Unguentum dicitur, quo unico saltem convulsus curatus fuit in Praxi RIVERII, ubi de Paralyti, & observat. 2. à PACHEQUO communicata, ubi videlicet modum præparandi & applicandi; item infra artic. 3. cap. 3. ubi de Paralyti.

Sunt, qui convulsos & membrorum contractura laborantes sic lenant:

℞. Urina veterem.

Coquant cum mica Panis filigine, addendo parum Ase ferida, & ita laqueum parti affeclæ.

Porro Oleum Laurinum, Oleum Lini, cujus inunctione duos Tetano affectus curavit RULANDUS in curat. empiric. pag. 51. Pinguedo humana & canina, (videb. FORESTUS lib. 10. obs. 132.) Castorei, Medullæ Animalium. Olea acris ac penetrantiora contra convulsiones sunt Oleum Succii, quod cum Petroleo mistum, illitum in contractura rigida, à causa frigida occasionali orta, admodum commendatur; Oleum Philosphorum, Oleum item de Millata Juniperi, Succii, Spicæ, Terrebiniæ, Galbani, hinc Gallicanum Paracelsi, in ejusmodi convulsionibus Tonicis in usu sunt: quibus etiam subinde Oleum de Euphorbia additur; quod optimum, sed quia nimis forte, cautè adhibendum. Hinc

℞. Olei Terrebiniæ.

Lumbri. terr. ana ℥℥.

Pingu. human. ℥i.

Canis. ℥℥.

M. f. Litus:

Quem habet SENNERTUS lib. 2. Prax. part. 2. cap. 23. pag. 569.

℞. Ping. human. vel Canis. vel Asin. ℥i. ad ℥iv.

Vel

Ole. dest. Terrebiniæ. ℥i.

Succ. Junip. ℥i.

Spica. ℥℥.

M. S.

Unguentum Membra confortans.

PENOTUS sequens Linimentum mixtè prædicat ad convulsionem brevi tempore dissolvendam.

℞. Olei Terrebiniæ. ℥℥.

dest. Caryoph. gutt. vi.

Macil. Bryon. q. s. per confus.

Misc. & inunge locum affectum.

Item spiritus Theriacalis camphoratus cum Castoreo mistus, Aqua Hirundinum cum Caloreo, & similia, externo usu sunt egregia.

Denique Unguentum Spasmodicum Myrsinæ, Nervium, Diatheas, &c. commodè applicari possunt, imponendo de super Emplastrum Nervinum usitatum.

Hæc in genere.

Speciatim si est convulsus ex ipsi Nervo per puncturam

In inepta Venæsectione, convenit, si Vulnus dilatetur, & Olei destillati Terrebiniæ calidi paxillum infundatur; vel Oleum Laterinum, vel Oleum Cary, hoc modo applicetur: quæ optima sunt. Sed coarctatur in specie hic SYLVIIUS lib. 2. prax. ubi de Convulsione. cap. 23. §. 82. ex PARAC. E. O. Vel hoc ipso in casu, si vulnus fuerit grandius, aut imponi possit emplastrum, imitetur SCULTETIUS, qui in Anatom. Chir. obs. 64. sequens commendat:

℞. Euphor. ℥i.

Terrebiniæ. ℥℥.

Cera parum.

Mista dant emplastrum, quod talibus Infectionibus vel solitariis, vel permixtum Oleo Terrebiniæ, de super applicatum est nobis.

Quid si verò fiat, ut post scarificationem & Venæsectionem ineptam pars quædam dolens aut tumida fiat, tunc ad imitationem RULANDI:

℞. Ping. Vulpis.

Taxi ana ℥i.

Ole. dest. Spica. ℥℥.

Myrsinæ. ℥i.

Vini ℥i. vel ℥i.

M. ad ignem.

Illinatur crebrè calidè totum Membrum. Pertinet hoc Balsamum Spasmodicum Myrsinæ, & pinguedo Asietina supra laudata, sicut in dolore, tumore ac lito re partis Cataplasma sequi egregium est:

℞. Herb. Agrimon.

Cherfol.

Flor. Cham. ana M℥.

Rad. Consid. maj. ℥i.

Sigill. Salam. ℥i. ad ℥℥.

Sem. Lini.

Pongor. ana ℥℥.

Coq. in l. q. Aquæ simpl. ad consistentiam Cataplasmae.

Per Setaceum traiciatur, & subinde applicetur.

D. S.

Cataplasma contra Tumorem.

Si ex Luxatione articulari aut ejus resolutione superveniat convulsio, quomodo curari debeat? vid. SCULTETIUS in Arthromat. Chirurg. Tab. 1. obs. 14. pag. 74. Edit. Vener.

Quod si ex vulnere partis fiat convulsio, illinatur pars Oleo seu potius liquore oleo Lumbrixi terrestrius, Oleo destillato Terrebiniæ, vel vulnere infundatur Balsamum Philis Terrebiniatum.

Quod si fiat convulsio ex Illa venæsectione Animalis, vel lo lo viore malo Oleum Scorpionum illitum convenit; vel in graviore Cunctis scorpionis, vel Cauterium attuale supra partem læsam imponatur, aut etiam Emplastrum Mergulæ aspersa, malaxatum cum Oleo Bassium aut Scorpionum, imponatur. Interne Theriaca cum Gerianna mista propinetur, imperando subinde sudorem.

Si ex Hypercatharsis, vel violenter purgante oriatur convulsio, interne Opia & Theriaca sufficiunt.

In Spasmo Flamulato seu Cramba strido levis pars in Panno aspero & calido, aut Manu calida, intincta spiritibus Baccarum Juniperi, aut spiritibus Theriacali, vel spiritibus Vini rectificato, vel Inundio paxillæ Theriacæ, cum Aqua Juniperi, statim cessare facit Malum. Vel si malum sit gravius, fiat refugium ad expertum Unguentum Comitis ad quæritur.

℞. Anax. Asin. ror. ℥i.

Ole. dest. Caryoph. ℥℥.

Cinnamon. gutt. vi.

M. pro curando Spasmo Ventis

seu Cramba

Nervi Ungulis Alis à quibusdam circumligantur Membri Spasmo obnoxii.

In Spasmo Graviderum præsertim Flamulato encephalo est Mercurialis: Herba illa coctodatur, ut fiat succulentum, imponatur Cervici, nunc sola, nunc Vitisq. mista.

In Contractura à causa interna, viscidiosa acidum corrigetis, & hinc Temperata, illud abundantia, & succum nutritivum laudabilem suggeratis, sunt optima. Sic contracturam totalem ex Arthritis relicta, continuato Lactisq. curavit TACKIUS in Phaf. sept. 2. pag. 127.

ARTICULUS III.

De Tremore.

L Ocuti fumus hactenus de convulsionibus, Motibusque Convulsivis & Morbis, qui huc faciunt: quibus asine Matum est Tremor, la quo cum Motu Naturali & Volucario simul aliquid convulsivum concutitur, dum in Motu Membri, ver. grat. sursum erecti, Membrium subinde remittit, & in contrarium nonnihil partem adducitur, prevalente tamen Motu iotato primario: Vnde prout ratiom Graduum Tremor est vel Major vel Minor, est etiam vel simplex est, vel convulsivus: simplex est Major & vulgaris Tremor, qualis ver. grat. poli crampas, aut poli afflictiis animi, graviores, in specie Interdumias, subinde apparet: Tremor vero convulsivus est Major, & qui locum remissione paroxysmorum Epilepticorum accidet, donec omnino cesset cum ipso paroxysmo. Et dicitur hic Tremor convulsivus, quia convulsivus est, Adhuc Tremor, ad Motus corporis deprimi, nonnihil deorsum decedat: Quia in Tremore Aeterni Membra libere movent, & potentia ad suspensa sufficiunt continere sequant, quin vibratione potius, & modo subfultulatione, modo declinatione varia, dequaverit Motus, five totum corpus omnesque artus quacunque ratione, five utrum tantum alterutro Membrum particulare ita fit affligitur.

C A U S E.

Tremor ipse vocat *Universalis*, cunctis *Particularis*, hunc *Magnus*, cunctis *Parvus*. Vulgo *causa Tremoris* reperitur in *Facultate motricem debiliorem & Crasliorem membri*, ita ut illi sufficienter movere membrum nequeat, quia *hujus Gravitas* ob *Facultatis Motricis* imbecillitatem praeponderat. Sed quacunque ratione explicetur haec sententia, & quicquid etiam intelligatur per *Facultatem Motricem*, tamen insufficiente est. Ratio, quia in *Tremore* omnino sufficienter movetur *Membrum*, exceditur *Pes*, arripitur *lucidus Brachio & Mano*, & etiam *retinetur*, sed depravat. *Vitium* nempe ejusdem *Inquietudinis*, & praeterea *inordinati Membri motus*, adjuvum est, adeoque non imminuit sed depravat, *Membrum movetur*. *Facultas enim Motrix* deestituta praesupponit *Motum Imminutum*, non *Depravat*. Deinde si oriretur *Tremor* a *Facultatis Motricis* imbecillitate, ut dicunt, tunc non feret *Tremor*, sed tantum feret *tardior & imbecillior membri Motus*, non vero *dentatus*.

Cepha, igitur gentis Tremoris est *Afflu darsus plurimus*.
Molendinum salicium, seu comode fossatum collitur, five
 feni anteaquam salicem, five non sed tantum tale, qui
 ulque modo ad umbilicum concurere solent, vel ut
 asperant, totos tunc miculorum *Affluens* alia est *Princi-*
pali & incoesa, alia minus *Principalis* & prae naturaliter
 admodum; Ita est dum unus Miculus Brachium extendit,
 alter iam agens eandem omnibilib torquet & flectit, vel
 alio modo vitiosè movet: unde prius Adia dat motum ro-
 tatorium intantum; posterior verbò dat Motum præterna-
 toralem & Convulsivum quasi supervenientem, quibus jun-
 ctis emergit Tremor.

Cad. C. capitata hujus *Megastoma* præternaturaliter *Amphis* sunt *Spiraei*. *Amphis*, qui ut Nacrali Mosci infuscos. Membra naturaliter, et etiam præternaturali motu superaddere cadem agilitate. Et quidem *Amphis spirum* *Amphis* in Tremore citi tali; Mosci Inordinatus, et cum icio unus Musculum agilitas et copiosis inessere debeat. Motu ferè uniformi in geminis, seu binis plerumque diffunditur. Et ita difformem motum iudicant; idque vel ex proprio vel, licet raris, vel ex aliis ipsius partis recte. *Amphis*, Mosci Inordinatus.

Preterea, quod cum idem Spiritus confusè admodum & inordinatè in Africâ Animâ gravioribus, ita ut pro Voluntate arbitrio minus obtemperet. Mente infirmiore potent, verbi gratia in Ira, Metu, Terrore & timilibus, Et cum idem facultate narcotica (sunt omnifiliosiores, depravate & inordinatè per Nervos ferunt, Quia ratione potè perire) Vini generis omnimodis in cunctis narcoticis membris subdite tremant, non secus ac pocius inordinatum Narcoticum ipsum, verbi gratia Opium, Hyocyami, &c. ande ut plurimum Tremores magis universales sunt: **de FONSECA** *lib. 1. Cap. 3.* Tremores ex ergo Vini effluvio Gemorunt potè referri: **Conf. BARTHOL.**

LINUS *Centur.* 5. *hijer*, 38. ubi varia Tremoris Exempli habet. Sed hujusmodi Tremores magis Transverii & aspidensales videntur & qui facile denuo cessant.

*Partis principis ubi sit Tremor, quando vel horus, per quem iofueat, vel Motus, in quem cymari debent ipſius Animales, ita ſuo vitati, ut ubi opus ait mutatus in ſuū Mutatus & malis diſpoſitus, aut propter Fibres aut legibus ſicis aut diſpoſitis, aut etiam propter quodā Naturæ defectus, aut diſpoſitionem, aut Causam aliam variam, ſomno conceptus vel obſtinatus, legitimus Motus Spirituum Animalium nonnihil pervertatur, itam & in Maledicum primario Motui intento deſinatur, & ſimul quāſi quadam deviatione in vicinū iofueatur. Scipius quā in Tremore aliquid ſeruituti circa Nervī principis progreſſum, aut intolerantiam occurrat, cum occasione ſub Motu Volucario Spiritus loſſui non præſe ad determinatum muſculum, ſed ſimul ad alios vicinos ferantur, ſicque Tremulum Motum inferat. Hinc CASTRO Traſt. 2. *Quæſ. quibus*, pag. 302. Tremores, qui Felibus ſuperveniunt reverſa motu convulſivos eſſe aſſerit; & HOECHSFED. TERUS *Dorad. c. 2. ſ. 7. pag. 417.* Tremores ad Convulſivos Motus non abſurde referit: adeoque in omnibus Tremoribus gravioribus plūs minūs laetentur, aut *ſuſcitantur*, ut illiſque, ad Partem ipſam ſpiritus motum recipientem reſolventem eſſe.*

His ipſis cauſis, ac ſendi Modis ſubſiſtente cauſa Remanens
 acraliſſime accommodari poſſunt: quia inter eminent impu-
 pientis *Tam* *Arterialis*, *Auri*, & *Argent*, hinc enim O-
 perari, qui talia tractat, verbi gratia *Aurificator*, ſubinde
 tremuſcuſ. Item, qui incantat *Magiſter ſagittarius*, ſeu mercu-
 tali contra ſagitem unuſcuſ, ſubinde Tremor corrumpitur,
 Ad Tremorem etiam ſex diſpoſit *Transmutatio*, & *ma-*
xima *Perſiſtiſ* *Refrigeratio*. Sic
 3. *affluo*, 14. Tremorem à nimio Frigore Venæ tione cuſ-
 tumuſ referre. Hinc etiam *Puer* nimis *Frigiduſ*, verbi gra-
 tificuſ copioſe aqua frigida inſuſcitatur, aut *Potus* Nivæ,
 Glaciæ immoderatè refrigeratur, auctore SENNERIO,
 ubi de Tremore, interdum Tremor partium inferum, *Ex-*
erſionis *ſanguinis ſalutis* *apparet*, & ipſe ſuo modo *Fre-*
mor *em* inducitur, aut ſaltem *Alia* Tremoris vicina, quæ
 inter ſex primaſ *Refrigeratio*, & *Loſitionis* *ſuppreſſionis*, ſicem
Stenſus *ſub* *Tumore* *merciſ* *reſtat*, vid. LANGIUM ſicem
 3. *affluo*, qui reſtat Tremor Brachiorum, & Cordis ubi de
 ſictum vaſationis Loſionem in *Puer*, *ſi* *affluo*, ſicem
 Obſervatio caroli FORESTI in *Placita*, *ſi* *affluo*, ſicem
 ubi Mulieri ob obſtutuſ Menſis viteri Uteri ſingulis diebus
 Vapor quidam, qui ſpiritus adſcendebat, per ſingulis diebus
 ſuſcitatur, ex ipſo ſpiritu, qui tandem perſequeſ per Venas,
 & Arterias, etiam Colla, inter ipſam & inferiorem lentiſſimè,
 qui ad Muſculos Maxillarum adſcendens, ad Tempus huius
 Palpitationem quendam, & Jedaſionem maxillam ſi-
 diſcens, mox in Geſu Raborem interreans, & Dolorem, ſi-
 me tamen Epileptica præcedentiſ, Per *Torſionis* *aperientis*
 curatuſ fuir. Idem FORESTUS *affluo*, 10. Mulieri
 ſuſcitatuſ Meſibus menſe Maio Venam Geſavit, unde
 Meſibus ſtatim retrahit ad ſuperiorem, & reſtridit fuerunt; pul-
 ſingulis menſibus minùſ productior, & ſemper eodem tem-
 pore ſimul experiebatur Palpitationem tremulam in Bra-
 chio, eodem ſpectatuſ in loco, lo quo Venæ ſectio priùſ
 fuerat inſtituta, non ſine moleſtia, ac magno Doloſe, at-
 que bæe ſingulis menſibus pariterbatur; tandem ad cunctas
 Menſes bæe Vena Saphenæ cuncta fuir. Fuit bæe Affluſus
 ſimilis reſtat Tremor.

De quoque notum est, quod in Febribus Malignis etiam interdum Tremor, sicut Convulsio non raro supervenit: Sit etiam **EPHRAIUS FERDINANDUS Nider**, 47. observat Tremore criticum Tertianam Continuum solventem **SALMUTH** lib. 3. de Tremore Periodico Exemplum

DIAGNOSIS

Quod atinet *Signa Diagnostics*: Tremor seipsum oculis
prodit, tam Universalis, quam Particularis, Tam Magnus
quam Parvus. Et ab aliis affectibus in specie Paralyti, &
Motibus Convulsivis propriè diffis, et eodimigitur,
toto semper conjunctus esse solet cum Motu Volucatorio.
Nisi enim Membra moveatur Voluntario Motu, ut ex-
tendatur, nunquam Tremor oritur: v. g. Manus vix
quam tremat, ut pes, nisi ad cursum adigatur, ita ut sem-
per Motu Volucatorio conjungatur Tremoris symptoma.
Iu Motu vero Convulsivo, ipso Aegro nescio, ac prout
Voluntarietremor. Motus convulsivi accidunt.

Inter *externa* contra tremorem quomcumque, à quacunque causa excitatum, cum fingulare, & indubitatum experimentum, commendat **PESTUS** lib. 3. *affert*. p. Prithonem, & Locutione Membri cum Urina propria recens excreta: Loco ejus *spiritus Terrestrium*, item *spiritus Luminiferi* terrestrium, qui per cætera palmas præfert, & cum his paræ Aquæ Articulares ad eam, item *spiritus Tali* *Artemisii* conducunt pro frigiditate Membris, præfert Nucha, & Spina Dorſi, in loco bene calido. Vel

26. *Aqua Arctica*, ad exte. ℥iij. vel iv.

Spiz. Linné. nervef. 316.

Formicæ, 3vi. ad 3

24 - *Id.*, *Conf.*, 3d ed., vol. 38.

M. D. S.

Essena Aqua Articularis.

Alia partes tremebundas utiliter PETRUS¹ CAT-
STRO illiuit Aquam dehillam ex Urtici minoribus:
German. aus den Urtze-Rüßeln, ex vocant, menße Majo kol-
ledtß, & deßillirt. Tempore semel hac iuxta Aqua bene
perfundenda sunt partes tremende, idque simpliciter repren-
dendū, & conjuandum. *Fraxinus*, cum eisdem semen
sit in continuo tremulo motu, ob id commendatur à quibus-
dam *Ladivian* imprægnatum, seu superfusum foliis *Fraxi-*
nii, quo *Lixiv* partes tremendes lavandæ, & sponte effric-
andæ. Et enim curari tremorem astringit. In malo di-
sturno convolvunt *Thyma*, item *Rosæ*, seu *Balanæ* ex
cubili formicarum sulfide repetitur; ægredies enim est
pro cura tremoris. De hoc cubili videatur *Infra Artic. 3.*
cap. 3. ubi de Paralysi.

Præter dicta conveniunt Oleum Nardinum, & Coffinum,
Oleum Cassiæ, Oleum Lumbicorum terrestrium, item
Oleum Lantani, Oleum distillatum Juniperi, Saliæ,
Majoranæ, & ex his Oleis parata Balsama pro iunctura
Membrorum tremens.

His ita pertractatis, de Morbis convulsivis, & convulsio-
nibus, pergo ad

G A P U T III.

*De Spirituum Animalium Motu & Influxu
Abolito.*

ARTICULUS I.

De Apoplexia.

Theoriam omnes functiones Animales in seculo, & multo con-
stituta haberi debent, ut sit taliter affectus non fecus, ac
na improvviso quod fulmine la terram percussus, & atomi-
bus locatur (unde etiam *Markus Armetius*, & *Siderastus* dicen-
tur.) seculis omnes Internas, &que Externas, ac motus
imprimis tamen spontaneus cesset, simulque *Res austra-*
re, respiratio ipsa p[ro]p[ri]a minus imminuta, cum, aut sine
Externo, Pulso adhuc omnibus vegeta, & periculum dum,
p[ro]p[ri]a in se, seu causa admodum periculosa, ubi deficiat, in-
terdum etiam pullulos, interdum verb[um] via observabiles. Quan-
do ergo motus, & sensus totius corporis ita perit, dicitur
Apoplexia, (C) *German. der Schlag*: Nemp[er]e ut plurimum
salem functiones, *alios sperantur*, seu voluntarij motus,
minus verb[um] motus naturalis, ut interdum, & hi
ficientur (conditio motus): *Color Tardi*, & *Oculorum*
ut plurimum rubet; facies tumida est, & corpus simul calet,
ut interdum, & In Paroxy[smo] distentione facies pallere
observetur; *Membra* omnia sunt laxa, & si Brachium, vel
P[er]a levetur, pondus sui statim dilabitur: *Eger* fortiter
ex h[is]te, & interdum fortiter, profundam dormit: Re-
solvitur subinde simul Vesicæ, & An[im]i Sp[irit]us, unde *Fus*
Alui, seu joeda Enemata, & urina sponte sua, & in-
voluntarij effluunt. Verbo: Apoplectici non differunt à
Mortuis, nisi quod superest vestigia respiratio[n]is, Pul-
sus, & aliquis color in facie. Supervenit tandem, & su-
perna circa An[im]i, unde respiratio cessat. Hæc dicitur ita sunt,
est *Apoplexia Universalis*, seu *Pæris*. Dividitur enim com-

munitur ratione pulvis, & respirationis superficialis, in
 levem, *vobesumam*, *fortem*, & *furiosissimam*, ita ut in priore
 pulvis, & respiratio sint adhuc talia naturalia; in reliquis
 speciesbus magis magisque delicatae cum sudore frigido; &
 quidem in *ferri* cum fletore & spuma, in *furiosissima* respi-
 ratio ad lentum omnino aboleatur; pulvis vero languidus,
 parvus, nec celer, evadat. Deinde *rationes suspecti* dividitur
 Apoplexia in *universalem*, & *particularem*; quatenus illa cum
 Capite totum corpus; haec modò dimidium Caput, &
 trunci mediam partem affligit, diciturque *Membralis*, seu
Membralis; nunc capite integro omnes partes corporis
 attonitas reddit, & peculiari nomine designatur; nunc hinc,
 vel illud tantum membrum motu, ac sensu subito privato.
 Sub Paraplexim & Paraplexim umisive, *Membralis est affe-*
ctus talis dimidii corporis, quando Homines quod omnes, vel
 dexteram vel sinistram tantum, partes ita afficiunt, inde à
 Sagittali Sutura per medium lineam exactè usque ad Peri-
 stomum; ita ut mirum sit, quod ad lateralem usque futu-
 ram una saltim medietas pariter lenio, & motu, altera
 vero è lenitate, & movetur: Sic in talibus dimidia Lin-
 gua nihil loquitur, nec movetur, altera vero medietas utrum-
 que praestat. Denique addit his LINDANUS quandam
 speciem *Apoplexiae*, hactenus innotensam, seu quae proprii
 nominis caret, quando omnes *toti corporis peria scilicet*, & *man-*
us excepto tantum capite, nulli quidvis Infra Collum est, &
 manus, pedes, &c. omnia relaxata sunt, & attonita laesum,
 excepto solummodo capite, in quo Lingua loquitur, Au-
 res audiunt, &c. quae ipsa species raro quidem, interdum
 tamen, observatur. Quod ultimam Apoplexiam speciem,
Paraplexim, seu *Parapleximam*, ex tantum in nos, *alterius*
Membris, maiore, vel minora contingit, ut ejus sensus, &
 motus subito in totum pereat, & privetur illdem. Hanc
 ipsam tertiam speciem, quae modò Apoplexiam particularem,
 Aethores pulvis lotum referre ad *Paraplexim*; sed male, ut re-
 cte demonstrat, & asserit etiam LINDANUS, HIPPO-
 CRATES, ARETAEUS (qui etiam fuit Graecus) &
 alii Auctores, imò omnes Antiqui, qui diffingunt accur-
 ratè Paraplexin ab Apoplexia: & quos alicuius ex interna
 causa natos hodie ad Paraplexin referimus vulgo, illi ad
 Apoplexiam retereantur, quod nisi faciat, non commo-
 de explicare poterit, quid sit *Apoplexia levis*, & *Apoplexia*
vobesumae? Gemino enim sensu apud Veteres *Paraplexim*, &
 vocant foler talis affectus, quia ferè modò, curatione, &
 symptomatibus quibuscunque talis periculis per Apoplexiam
 cum universali confertur: unde Apoplexia Universalis in
 Paraplexim definere solet; quo sensu etiam *Apoplexiam*
 HIPPOCRATIS *est*, *2. Apoplexiam*, *3. Apoplexiam levis* *4.*
4. Apoplexiam, *Apoplexiam vobesumam* *5. per Febrem*, inter-
 prestandum venit. Commemoratur super haec Aphorismus va-
 riis se nequeat. GALENUS obiter transcurrit. A. IPI-
 GARDANUS, qui explicat, confirmando Grammatici
 enim agit, non Medicum: Sed ex dictis explicatio facile
 est, dam per *vobesumam Apoplexiam* intelligit LINDA-
 NUS illam totius corporis *universalem*, & de illa nem-
 curatur, nisi superveniat Febrix, per *Apoplexiam* verbè le-
 vim intelligit, vel *Membralem*, vel *humoralem*, vel aliam
 Levis est talis respectu omnis totalis, & universalis, &
 videmus quod talis Membralis diu superveniat, cum om-
 nibus affectus apoplectici, & paralytici sint difficultes cura-
 biles. Quando ergo sensus, & motus Corporis ita pere-
 vel in suo, vel in parte, quæstio est de causa hujus
 affectionis subsequens actionem omnium Animalium? Per ma-
 tionem enim æqualem spirituum Animalium in Cerebro, &
 Cerebello, & ex his per Nervos in partes organicas, sit sen-
 sus, & motus, & omnis Animalis fundum, nisi superveniat
 aliquando præsuppositus est Physiologicus. Cessante ergo hoc
 motu spirituum Animalium æquabili, & naturali, etiam
 cessat subitò omnis animalis actio. Unde facile patet, quid
 Apoplexia sit affectus, qui affligit, vel partem principa-
 lem, unde sensus, ac motus dependant; vel minifleria fen-
 sui, ac motui dicant, & quidem remotè: quod in *Apople-*
xia motu affligunt proximè organa sensui, ac motui di-
 cata, patet, quod his salvis, & sine eorum alteratio ingre-
 dat, & cesset *Apoplexia*. Revera ergo in *spiritu animalis*
hæretic causa Apoplexiae.

CAUSE

Circa causas Aphlecti considerandæ sunt, & causæ Ge-
nerationis, & causæ permutatiōis. Causa proxima Genera-
tionis

Town. 11.

(C) ΠΑΡΑΛΗΨΙΑ, & ΑΠΕΡΕΣΙΑ, percussio, repercutio: hinc Aprplexia, quod est Morbus convulsi veluti percussus censebitur: hinc & Hemiplexia & Paraplexia. Et eodem Thormate est παρὰ ἰδνς: unde Paraplegia & Hemiplegia.

*hinc Formale est deficiens spirituum Animalium motus in Cerebro, interdum finalis etiam Cerebelli, & hinc eorum defensus influxus in Membris reliquis. Et quidem si Cerebelli culpa fiat, non tam Apoplexia erit, (in qua, nisi fortissimum fuerit, saltem motus spirituum minus abolentur, non vero naturalis in pulsis, & respiratio) quam *lyncop Cardiacus*, in quo Cardus motus penitus subleto, circulatoris Sanguinis castatio, eisdem in Cerebrum distributio, & spirituum Animalium, & Vitalium perfectio anectio, amissio tollitur, & motus pulsis, & respiratio prius minus interdum ad sensum penitus subleto, sine sensu, & motu mortuorum iussu patet; five sanguinis vitio, quod rarius; five Nervorum Cardiacorum culpa, veris gratia contrarium, ut in affectibus Hysterici, & similibus, five spirituum in suo ex Cerebello influxu inhibitorum causa eveniat. Conf. WILLISIUS de Anim. Morborum part. 2, cap. 5.*

Causa remota materialis, seu sensualem est, vel internam, vel externam, Urilque, principium interne, ratione fit Apoplexia, vel accidentalis, vel sensualem, de quibus videtur WILLISIUS de Anim. Morb. p. 2, cap. 5. ubi de Apoplexia. Materialis est, quae per certas praegressas in corpore occasiones, & dispositiones interdum supervenit: accidentalis verò, quae subito, interdum fortuito, hinc praecedente causa in corpore alteratione, Aegros prehendit; quod frequentissimè à causis externis oritur.

Interque est, vel privativa, vel passiva, secundum HELMONTII Doctrinam Tractat. de Libris cap. 9. ita distinguendo. Privativa est, quae citra directam activitatem in spiritus Animales, aut citra peculiarem illis inducendam alterationem, saltem Impedimenta quondam inferit, propter quae legitime idem, aut generari, aut distribui nequeunt; adeoque talis causa à posteriori, & indirecta saltem, vel spiritibus Animalibus producenda materiam subministrando, vel eorum motum, atque emanationem inhibendo, Apoplexiam inferit; verbi gratia, quae in suspensio, (suspendit enim Apoplexia) aut ensa ad alia, aut sanguinis, intra Cranium effusio, aut motus in Cerebri substantiam qualicunque, Apoplexiam patitur. Posterior vero Apoplexia est, quae à tali fit causa, quae spirituum Animalium casum, & constitutionem vitare, eisdem ad motum, & inde dependentes functiones plane ineptos reddere, & ita Narcosi, & stupore quodam eisdem afficere, aut instar liquorum fermentescens Gas eisdem quasi extingueret, & suffocare valet: quales vis in Opio, Carbonum Fumo, Sulmure, & similibus notissima est.

Quod accidet Apoplexiam privativam: ea fit, vel ob sanguinis deficientem naturalem rivalem ad, & per cerebrum, & inde cessantem spirituum Animalium generationem, quo Sanguinis circulo subleto omnis Animalium sensus, & motus, & subito omnis spirituum Animalium motus, ex sanguine in cerebro fluctuantem, cessat, & tollitur; idque vel vitium, vel sanguinis ipsius culpa; vel ob spirituum divergentem motum in cerebro, & consequenter stillicium, ob potorem cerebri, & metuumque eius vitium, vel obstruendum, vel emperisum, five in eius Centro medullari, adeoque in ipso corporis callosa fiat, five in eisdem processibus, scilicet corporibus striatis, & caudicibus medullarum initio: idque nunc in auctoritate cerebri, nunc in altera saltem eius medullae, Conf. WILLISIUS, qui de Apoplexia privativa optime agit; sed de passiva obli.

Sanguinis motus, & influxus ad cerebrum deficit, vel vitio privatione, Arteriarum nempe Carotidum, & Vertebrarum obstruente, aut compressione, aut penitus laceratione. Sanguinis huius motum circulem deficientem, & inde natam Apoplexiam, illustrat Ligatura fortis Colli injecta: hanc enim Ligaturam Colli, si fortis stringas tamquam Hominem suspensurum, eo ipso momento, quo Arteriae Carotides, & Venae jugulares in Collo coarctantur Sanguinis motum ad Cerebrum tollunt, eo ipso quoque momento rignus motus, sensusque perit in talibus, utat adhuc ad tempus, & aliquot horas perserviant; unde postmodum remoto Vincolo dicunt se nihil vidisse, nec sensisse amplius, quod testantur, qui laqueo dissolto liberati fuerunt. Patet hoc etiam Experimento Anatomico in Canibus, in quibus si facta cutis Colli aperture ligatur fortiter Arteriae Carotides, ita tamen, et parva Arteriae Cervicales adhuc libere relinquuntur, Canes a inde somnolenti, torpidi, & stupidi patet, & tamen ad biduum ferè supervivunt, Actionibus tamen Animalibus maxime immixtus, de quibus quicquid speret, id obtinet beneficio Arteriarum Cervicalium adhuc liberarum, tandem tamen moriuntur.

Causa ergo huius Apoplexiae, ut loquimur HIPPOCRATE est obstruere lumen. Per Venam vero hoc loco tam Venam priè dictam, quam Arteriam intellectu fuit apud Veteres. Hic enim mos fuit Veterum, non distinguere haec duo Vasa, si uno Venae nomineambo nominabantur. Hoc non tantummodo est apud HIPPOCRATEM, sed etiam patet hinc ex CELSO, qui loquitur: Vena crassiora vel intermixta Arteriae pulsis innotuit. Veteres etiam per Venam Arterias, & Nervos intellexerunt.

Verum hic loci non excludendum est, deficientem in fluxum sanguinis per unam, alteram Arteriarum Cerebrum raram in seipso Apoplexiam, sed potius ad Apoplexiam, quae potius per Venam Refluxu, & hinc eisdem in Cerebro Cerebellique confusio, aut stagnatio, aut extrinsecum immotio potius, aut extrinsecum comprimentium visio, verbi gratia Laceratio Vertebrarum Colli esse, Apoplexiam ortiri, WEPFERO concedimus. Contra in enim Hypothese, Arteriarum nempe Carotidum, & Vertebrales à causa interna angustiam, & hinc sanguinis negotium affluxum ad Cerebrum, rectè, & eleganter illustrat WILLIS, loco suprà citato, & majus periculum in ignis abundantia, quam defectu, Apoplexiam immo asserit; cum Arteriae Carotides, vel Vertebrales sunt Anastomosis coeant, adeoque quavis fortis in uno, tere Arteria sit compressa, aut obstruata, alteriusnam liberata Arteria Sanguinis translocationem peragere, & ita Cerebrum irrigare possit. Unde, & SYLVIVSUS, Prae cap. 21. pagina 160. §. 16. Edimius Belgica, non se concedere vult, dom Vasa Arteriosa obstrui, aut committi possint, indeque Apoplexiam auri non putat: in quavis raram, & saltem propter exteriore, caelestium talem Apoplexiam, à decessu Sanguinis per Arteriam Iossum dependentem, ortiri nullum, quin quia propter impedimentum circulem ex decessu refluxum, & hinc Cordi, aut Arteriae, aut Compressum, aut à Vasa extrinsecum laceratione, licet spirituum impedito motu in Cerebro, & impedito induat ad partes reliquis, Apoplexiam lapsio di privativas, vitio sanguinis circuli contingant, ut arbitretur.

Causa verò, propter quam Sanguinis Refluxus impediretur, est, vel in Vitis, aut Vasis, vel in Sanguinis ipso. In Vitis, vel Vasis, quando huius angustiae, aut ex obstruente, aut ex Compressione, Laceratione in Capitis, Ruptione, aut Anomali aperta, & similibus occasionibus, sanguis praenaturaliter in Cerebrum, vel Cerebri ambitum effusus, cuiusque naturalis circulus impeditur, necesse enim, & substantiam ipsam minus angustando, Apoplexiam inferit. In Sanguine vero haeret vitium, seu causa ipsa stagnans, quando hie erasus, grumulosus, aut nonnihil coagulatus exillit, & ita in Vasis stagnat, aut haeret; five in Vasis Meningeum, five in sinibus Cerebri, five in ramis Cerebri, aut jugularium, five denique in ramis Pulmonarum: Nam, & in his si coagulatae exillat, Josephus Carion, alius dictum, vitio sanguinis extant, alius verò Causam suffocantem dictum, inferit. Nam hic affectus est saltem, & simillimus Apoplexiae, adeo ut Catastus talis innotuit ex sanguinis Rati in Pulmonibus, & Apoplexiam sanguinis illi in Cerebro, aut eius Vasis, loco tantummodo differat. Stagnante enim sanguine in Vasis Pulmonibus ipsoque corde, est Catastus suffocativus, in Cerebro verò, & eius Vasis si idem contingat, est Apoplexia. Videtè suprà ubi de suffocatione. Catastus, Lib. 2. cap. 6. et Aristot. 4. Quia ratione etiam lyncop ad Hermetichum de Lunariis Reliquis Apoplexia vero Salinis Reliquis. Notum est dubium, tales Aegros, five à sanguine flagrantem infatos, five Apoplexiam, eodem modo interfici. Unde cum testè FRACASSATO in Epist. de Cerebri ad Malag. Apoplexiorum Vasa sanguinis in Pulmonibus interdum interdum trahit, aut penitus dirupta, inventa fuerunt. Est hoc etiam exemplum PANAROLLI de quodam Morbo, & poppico infatu infatu, quo ex sanguinis coagulato una flagnatione. Sed de his, & similibus pluribus, & in pleas est haec causa nata, videtè, imprimis WEPFERO Apol. & de loco affecto in Apoplexia. Videtur etiam SCHNEDERUS Tractat. de Catastis, in specie ubi de Catastis fuerit, & de Catastis Sanguinis.

Communis Veterum sententia est, in Apoplexia Centro Ventriculi regere, & exinde spirituum Animalium motum tolli: Sed experientia testatur, impius aliis morbis motus exhibuisse Ventriculi Cerebri repletos, & obstruendo, nulla autem secuta fit Apoplexia: Sic refert LINDANUS, Amstelodami dilectum fuisse eum Viri, qui per tres annos dolere capitis acerbissimo laboraverat, cuius Ventriculi

cull ita repleti fuerit humore sereno, aut limbo, simili Lymphæ Valorem Lymphaticorum, ut integra Pinta Apoplethica exinde potuerit eximi, nunquam tamen fuerit Apoplethica (D): Sic FERNELIUS exemplum recenlet inter alia aperta cuspidae Capitis Apoplectici, in cuius Cerebro nihil nunc inuentum fuit, sed tantummodo in Vena Jugulari reperiri esse Sanguinis Grana: id quod conuexit cum NYMMANNI Sententia de Apoplexia, quâ sedem Apoplexiâ statuit in *Torculari Morbali*, seu loco concurfus quatuor Sinuum duntaxat Meningis, & dicit, Sanguinem abire in Cranium, & Grumolatas ibi flagrantis impediendo motum humorum, Apoplexiâ inferre; quo etiam videbitis accedere HOFFMANNUM in *Inflata*, ignoravit autem NYMMANNUS Circulationem Sanguinis, unde spirituum Influxum cum Sanguine denegatum causam asserit: cum positis esse impedito refluxu, hinc Sanguinis stagnatione, & cessante in Cerebro circulo, Apoplexiâ inde oritur, Rarissimè ergo Apoplexiâ esse impediendo Sanguinis verum Cerebrum, nisi fiat à maxima Violentia externa: Sic alius notum est ex concussio, aut depresso Cranio secutam Apoplexiâ, ex Porali, ac Mestibus Cerebri nimium depresso, & inuicem conuenientibus; unde, & Sanguinis & spirituum Animalium Motus omnibz fuit interceptus.

Ex dictis patet, quid Apoplexiâ Causa Proxima sit, vel impeditur spirituum Animalium Motus in Cerebro, vel impeditur sanguinis circulus per Cerebrum. His Causis proximis adiungenda Causa Remota, quæ quacunque ratione proximas laesant, & per consequens Apoplexiâ causant. Hæc verò omnes eo conducunt, quatenus Sanguinis, ut & spirituum Animalium, Influxum, & Motum, & sanguinis circulum tollant.

Remota causa, quæ ad Apoplexiâ hanc, ex sanguinis deficiente motu oriundam, disponat, sunt varis: nempe Frigus repentinum, aut Frigus nimium congelando quasi Sanguinem, & ita inspissando, eius Motum impedit, aut quocunque modo alterando sanguinem aut spiritus, ad Apoplexiâ disponit. Facit hoc, quod iuxta HIPPOCRATEM *Aphorism. 15. & 23. lib. 3.* Aer Frigidus, & humidus, Hyems, Autumna, item Aer Aquosus continuis imbribus irrigatus, ad Apoplexiâ disponit: quæ ipsa, & confirmantur à FORESTO *lib. 10. observat. 70.* Et contra verò Afflu nimius, aut Calor ambigus nimius, liquando nimis Massam Sanguinem, & ipsa disponere potest ad Apoplexiâ, teste SCHENCKIO *lib. 1. observat. de Apoplexiâ, observ. 1.* Sic cum quidam in Tertiana Intermitte die intermissionis se diuini expositisset Solis ardori diebus Canicularibus, Apoplecticum morbo repente incidit, & altero die extinctus est: videatur PISO de *Caliditate*, forsan, & hoc pertinet seu modo laesa nimis & larga Dignitas vite iudicataria coniuncta, hinc enim rectè dicit HEINRICUS ab HEER *observat. 1.* quod non septentrionales imprimis ex Inguibus, & Comestationibus corripiantur Apoplexiâ. Quo facit Læto Capitis illegitima cum aqua tepida, si faciliè subit Caput exponatur aëri frigido: Exemplum tale observat AMATUS LUSITANUS *centuria 1. curat. 16.* in Puella, quæ ex Lotione Capitis in apoplexiâ incidit, quæ ipsa Apoplexiâ postmodum in Paralyin latens simul defuit (unde dicitur Paralyis, sed est potius Paraplegia). Ex Tumore Craniis externe factæ apoplexiâ namque refert BARTHOLINUS *Centur. 4. observ. 86.* Non hic delinquentes in apoplexiâ quæque abeunt, quod præter NOBILIUM in *Inflata*, etiam observat FORESTUS *lib. 12. obs. 78.* Post nimiam purgationem Sanguis Draconis per additionem alii adhibitis apoplexiâ inferit, teste BARTHOLINIO *Cent. 2. libell. pag. 680.* speciatim suppreffa quadam *seleone Sanguinis Evacuacione* per Hemorrhoides aut Uterum, aut Hemorrhagiam Narium, &c. frequenter admodum ad apoplexiâ disponit, & hanc etiam inferunt. Sic ex suppreffa Narium Hemorrhagia conuicta apoplexiâ observat HILDANUS *Cent. 3. observ. 11.* Quia sanguis suppreffus coarctatus facilius se flagrat hinc inde, aut per Anasomosis Valorum, aut eorundem Ruptiorem, in Cerebro & vicinis locis Extravasatione apoplexiâ inferit. Sic in ZACUTO LUSITANO *l. 7. lib. Med. Princ. cap. 7.* Observatio est de Iuvene florente ætatis, per scalis alicd decedente, unde ingens Hemorrhagia per Nares secuta est: Ex sanguine rectè fluxisse optime habebat Ager; hac ipsa verò Hemorrhagia suppreffa Ager in apoplexiâ ioci-

dit, quæ non prius sublesta fuit, quam copiosa infundere. Venelico. Item in Puera ex non ritè fluentibus locis apoplexiâ obortam Venelico in Brachio curatam refert FONTANUS *l. 1. curat. & Relat. p. 25.* Et hinc est propter talem sanguinem extravasatum, aut ex anasomosis effusum, quod tam sæpe in apoplexiâ mortuus sanguis congruatur & coagulatur in Cerebro equine Ventriculis fuerit reperiunt. Sic BARTHOLINUS *Cent. 2. lib. 60.* & RHODIUS *Cent. 1. observ. 67.* ex sanguine congruato & extravasato, Ventriculis Cerebri repletis, ex Plexibus Choroidæ effuso apoplexiâ lethalem observat: sicut etiam in Occipito sanguis congruatus sæpe reperiunt fuit: Sic HILDANUS *Cent. 3. observ. 12.* observat Mulierem, quæ Menstrua suppreffa sæpius per Os & Nares excrevit, quæ tandem & hac suppreffa excretione apoplexiâ lethali correpta fuit, & post mortem post triginta sex horas sanguinem adhuc per dicta loca excrevit: sicut etiam in *observ. 11. citata Cent. idem HILDANUS* tale refert: Vid. BORELLUS *Cent. 3. lib. 34.* Præter conat nimia, potissimum in senibus ad Apoplexiâ multum disponit: Vid. HEINRICUS ab HEER *observ. 11.* & PLATERUS in *observat.* Pertinent hæc imprimis *afflu animi graviores* quicunque, qui tanquam causa procatartica apoplethicos ioculis excitant: quæ inter imprimis est ita, quæ cum inducant sanguine ebullitionem equale infusum ferotem, in predisposito Cerebro faciliè flagrationem sanguinis & apoplexiâ inferit. Et camprissia Homines Europæ subinde apoplexiâ correpti observant ex Iracundia, monente FORESTO *l. 10. obs. 70.*

Spiritus animalium quod attinet deficiente motum: cessat hic iter ad Terram ex Mestibus Conuenientia & salubritate quasi, cuius plura possunt esse occasiones: ad Conuersione v. g. cerebri & valida commotione, item à materia reum, labili & lymphatica, successivè circa Cerebri corticem glandulosum congesta, subitè & impetente interiora verius reuente, & ita Poros & Mestis obstruente: quæ causam in habituali apoplexiâ imprimis accusat WILLIS *lib. 1. de Anat. cap. 10.* Item ad *observ. in Meningibus* rupto, aut alia vitiosa materia extrinsecus cerebro infusa, aut intrinsecus in cerebro collecta, aut circa eius basin congesta, ibique compressionem cerebri, & in specie radices modularis & Nervorum Mestis interinente.

An etiam Mestis vicinior & Nimia preternaturaliter arripiens circa Medullam Spinalis collecti, eandem comprimere, & ita apoplexiâ, aut cognatos afflicte inferre valeat, prout asserit SVLVIUS *lib. 2. Princ. cap. 21. q. 49. pag. 185.* res dubium de nimis probabile in medio relinquo, obstatum Pituitæ motum, aut vehiculum cerei aut Lymphæ à motu naturali quocunque causa obstruente, ad illa loca delata & collecta fuerit: vid. HELMONTIUS *Tr. de Lichia.*

Dissonant ad hanc apoplexiâ contrarietas, & concensionis Capitis, tam cum quibus sine manifesta eius Læione liquet; sive collabatur & angustietur saltem porus, sive sanguis simul vicietur circuitus intra cranium, v. g. ex nimia similitudo: commotum enim & concussum cerebrum subleat quasi, ita ut Poris ejus sic collabatur & angustietur, aut distortis, aut vitiose difformatis, spirituum Mestis de vi deleantur: Sic ob causam ab alio, et gravi cerebri commotione, apoplexiâ lethalem observat HORSTIUS *l. 2. obs. 13.* licet etiam DEODATUS in *Valent. pag. 125.* ex causa ab Igno Virginitatem, quæ tandem in apoplexiâ lethalem defuit, observat: sic notum est ex Alapa inflicta, apoplexiâ inille obortam, qualia exempla talia habet SCHENCKIUS ex RENVENIO in *observ. uti etiam HILDANUS Cent. 5. obs. 13. & Cent. 6. obs. 11.* Item ex illa Orali nimio, indeque valida capitis & cerebri concussione, apoplexiâ in puero observat FERNELIUS *lib. 2. de Abdit. Rer. causis cap. 15.* Non secus atque idem FERNELIUS *ed. lat. refert.* Virum quandam ex valutaris Oris apoplethico, in quo dissecto sanguis grumolus copiosus circa cerebri basin decubuerit. Sic ex perussione oculi cum Raphano apoplexiâ vidit obortam SCULTETUS in *Armenum. Chirurg. obs. 21.* Apoplexiâ à cranio depresso & sanguine extravasato, præter quotidianam experientiam etiam testantur DURETUS in *Hipp. cent. Franc. pag. 366.* BORELLUS *Cent. 2. obs. 34.* HEINRICUS ab HEER *obs. 12.* WEPFERUS de *Apoplexiâ, obs. 1. & 2.* BARTHOLINUS

Cecce 2

THOLI

(D) Sed cur haec ille servus & impudens non potuit inflante mortis momento in Ventriculis Cerebri infundere, quæ prius non occupaverat? quemadmodum Sanguinis grumuli in Cardis Ventriculis unanimes diffinitione deprehendimus, quæ in visum autem contentis fuit, non sine mentis judicaverit.

THOLINUS *Cent. 2. lib. 60. & BONETUS Squalatus*
l. 1. *lib. 2. obs. 2. g. 12. n. 13.*

Præter Sanguinis collectiones intra cerebrum, pertinent
huc etiam vena *Seri & Lympha*, quatenus, ut supra monui-
mus, inundando cerebrum, & omnes ejusdem Peros replen-
do, Apoplexiam non raro periculum inducere possunt;
auctore MARCELLO DONATO *lib. 2. lib. Med. Mel-
rab. cap. 6.* qui refert de quodam forti Apoplexia perempto,
in cuius specto crania tota Cerebri substantia aequali humore
perflua & appleta fuit repleta, qui ipse humore etiam
in cerebri Ventriculis redundante; dillectis carotidibus in-
gressu Sanguinis crassi melancholici emansit copia: Sic as-
firmat COLUMBUS *in sua Anat. cap. 15.* quod Apople-
diorum Capita difflata exhibuerit sapisimè Cerebrum
magna Aque glutinose copia difflatum. Facit huc obser-
vatio JOHANNIS DANIELIS HORSTII, *lib. 1. lib. 1.*
obs. Anatom. 3. de Principe apopleptico mortuo, in quo præ-
ter alia observatum fuit cerebrum magnum & grande, fo-
ro & putrida plura quàm repleum, maxime in Ventriculis;
arteria autem venosa ac Aorta nigro humore, attemento
simili, fuit repleta & perfusa, qualem Princeps ante Apo-
plexiam ad aliquod tempus in Lingua & Faciebus habuit.
Plura exempla vidit WEPFERUS *obs. 4. & 15.*
ac WILLISIUM *Anat. Cerebr. 12.* Aded ut probabile vi-
deatur, interdum à Lympha & Sere cephalo, Cerebrum
inundante & replente, oriri posse Apoplexiam. Facit hoc
suo modo Petrus Pauli nimius de cerebrius repetita *Christus*,
quæ multo, & quidem ætatis confluentis, & aliis optimi
habitu, ad Apoplexiam disponit; Nam ex his ortam Apo-
plexiam refert FONSECA *lib. 2. cap. 69.* uti etiam FO-
RESTUS *l. 1. cap. 69.* Non enim solum vis narcotica
spiritus Vini, spiritus Animales alterare & Apoplexiam
inferre potest, sed & copia Lymphæ generatio & Cere-
bri inundatio à Potu Vini copiosi hoc pertinet, dum post
nimium eius Potum Apoplexiam & inde Paralyin (quæ po-
tius fuit Paraplexia) Linguæ & latera dextræ observat PLE-
STON *Tract. de Cilio, serva cap. 18.* Apoplexiam à tumore,
v. g. *Stratomatico*, vid. apud BONETUM *loc. cit. lib. 53.*
serva, apud PANAROLLUM *Præf. 1. lib. 17.* Pertin-
et huc etiam sensus *paraplexia*, ex qua Apoplexiam in Vi-
ro ætatis confluentis observavit MOEBIUS *in hist. pag.*
269. Varietas etiam hoc videtur facere nonnihil, repulsi
Apoplexiam inferentes, teste FORESTO *lib. 2. obs. 2.*
70. qui refert de Puella, quæ post exulsa Varicella, cum
se cuncta Acri pluvio expulsa, ut & ad Fossam aqueum
decubasset, intra biduum Apoplexia talia interiret; vid.
SENNERTUS. Ita ut *privativa Apoplexia*, quatenus ea
causa saltem externa oritur, pro faciliori præxi oñe *sa-
guinea*, vitio nempe Sanguinis in Cerebro extravasati, &
Gravissimis Cerebri fluidorum & spirituum motum le-
denti, nunc serva *lib. 2. Lymphatica dicenda* sit; Vid. *obs. 2.*
Anat. in BONE II spalechre (dico, per meliori præxi)
nam in Theoria via omne fere potest punctum; quorum
ista Homiibus mediæ fere confluentis ætatis, Iracundia,
Corpalencia, Obesitas, Ebrisitas, & aliæ apparentissi-
mæ, postior verb sensibus decrepiti, Catarrho, & si-
milibus, obnoxie solet.

Vapores Mercatoriales præter Apoplexiam inducunt, vid.
LANGIUS *Epil. l. 1. Epil. 44.* hinc qui Venetiis specula
Mercurio illinunt, ad Apoplexiam declinant; Vid. *obs. 2.*
serva. Reg. Med. 1. pag. 18. Præterea Vapores Theriacum seli-
phuram Apoplexiam inferre, notat SCHENCKIUS *l. 1.*
obs. 2. Sicuti ex nimio *Tuore* ex Vapores *Potuum*
congoliorum Apoplexiam refert MARCELLUS *lib. 2. c. 6.*
Fami. Martenii, *Mutallii*, *Caribum*, *Cervicifera*, & *Pin-
cum effervescens*, etiam referunt à quamplicitimis ad
causas Apoplexie privativæ Remotas, quatenus spiritibus
Animalibus viocula impieitur, ut ipsa experientia loquitur.
Verum hi ipsi Fæmi Narcotici potius eorum iocruor,
quàm periculum Apoplexiam, & iocruor quidem interdum
eorum capitis satis profundum & Apoplexie hostium,
non tamen, uti dicit, Apoplexiam perficiunt.

In talibus Caroticis, à Narcoticis sumis oborta, proba-
bile est admodum, præter spirituum Animalium Fixationem
à Narcoti, simul etiam accedere aliqualem *Sanguinis*
caputalem, quatenus tales affectus sæpius in Pleuritis
& Peripneumonia (post fumos tales haustus) & simili-
bus affectus, à sanguinis coagulato ortos, desinunt. Unde
recte quibusdam talis carus similis Apoplexiam, ut proximi-
um situm ejus gradus, habetur. Cui etiam coagulatio
generi adscribenda venit *Terræ ex Gaudium inmedium*; de
quorum priore vid. HILDANUS *cent. 6. lib. 12. & LOS-
THUS lib. 2. obs. 14.* qui refert, terrorem ex Scelepto ex-

plo Apoplexiam instillare; quatenus spirituum motum &
agilitatem sistendo, horum influxum ad inferiora inhibent;
Sicut ex nimio *sumis* Apoplexiam ebortam etiam notat
FONTANUS *in Curat. & Resp. l. 1. pag. 49.* & AMA-
TUS LUSITANUS *cent. 3. obs. 26.* à *Tuore*. BENIVE-
NIUS *l. 2. ap.* Quæ etiam pertinet Apoplexiam ex *Pulmonibus*,
quæ notat licet MARCELLO DONATO, & SCHEN-
CKIO.

Sed ultra hanc privativam Apoplexiam, etiam alteram
dari, *Positivam*, confirmant *Opia* in majori doxi usua-
ta, quàm *Qas Carbonem*, aut *Bispartum fermentum*,
quando in Cellis vinariis subit Apoplexia influxu suffocato-
rum interire; uti & *Strim* Vini, vel *Vinigena* generosa ab-
usus, quæ positiva efficacia narcotica, & stupefacitiva quate-
nus Apoplexiam inferunt, spiritus Animales alterando &
stupescendo, unde in more cessant. Sed cum hæc sunt
saltem à *causa externa* tamen de talem etiam à *causa in-
terna* oriri, primo docet & accurate detegit HELMONTIUS,
& probable hic ex *cap. quod* alii affectus sopori,
speciatim comata, Lethargi & Cataplexis, ex causa interna
orianter: quidni ergo & Apoplexia, quæ vis effectiva
aut illa differre videtur: scilicet HELMONTIUS
Tr. de Lethargi cap. 9. & §. 41. ad §. 50. in eo est notum,
in propriè hic dictam Apoplexiam à causa interna enaculata-
rat, eaque Petris, nempe à certo quodam Veneno an-
dyo & glaciali in stomacho hærente, ex digestionis im-
primis errore enato, eoque cujus Archem heretice, iug-
iar, & ideas cuncta venosa liquis recrementis pariat, qui
Cerebrum cum pedessequi potest, eorum nempe
solum solum, in sui obsequium trahit, per adionem
pompis stomachi aut Duodumvis. Unde talis *Tuor*
in spiritibus didorum locorum incolis excitatur, *pompis*
Terrorem nunc utrumque, oñe delitius Meditatio uno,
coarctatur, unde Paralyis Apoplexiam supervenire dicitur,
Quia HELMONTIUS hic obcurus, conscribit GREG-
ES *Tr. Arter. Rainsa & Intra Hum. l. 2. c. 3. §. 47. & §. 49.*
pag. 268. qui melius explicavit Hypothese HELMONTI-
II.

In hac Hypothese duo consideranda:

1. *Res ipsa*, ac sit talis Apoplexia Positiva?
 2. *Modus rei*, quæ se habet, ut extali Fomite morbo-
so in Præcordiis hærente interire Apoplexia?
- Quoad priorem: excitari Apoplexiam à causa interna; spiritus
Animales vitiantibus, & stupidos ac torpidos reddenti-
bus (ut nostro loquendi modo rem declaram) & ita *posi-
ve* Operationibus, hique circa stomachum seu Veneris
superius eriguntur cunctis seu hereticis, h. e. dati
Apoplexiam *Positivam* ex Præcordiis excitatam, verissime ar-
duor: loque (1.) à *Juvencibus*: Observatum enim frequen-
ter, quod *Imperitium* sit in quamplicitimis Apoplexiam
etiam fortissimè Remedium; quod citius provocatur, eo mel-
lius. Præter HELMONTII effata vid. LANGIUS
lib. 2. pag. 11. & 12. ubi binos fortis Apoplepticos per so-
mitam curatos refert: HEINRICUS ad HEER *cap. 11.*
ex observatiombus præfert Vomitus venæmedioni iolo-
plexia; quod etiam observavit BARBETTE *in Præxi*, qui
dicit, Venæsectionem raro convenire in Apoplexia, sed po-
tius vomitio. Cereum est, in Apoplexia, sed Positivam,
optima esse vomitio, quorum loco *Clystima* acris in *Præ-
xi* vulgari usurpant solent; Perinde enim est, si vo Rimbul-
tur Anus, si vo vomitus excitetur. Item sulcata Aromati-
ca, odorifera & omnia Stomachalia, brevi recreant rale
Apoplepticos. (2.) à *Narcoticis*: Nempe Gas vix hales
Caribum oretem inspiratos interdum Apoplexiam, ut ad
Cerebrum non perveniat, sed dem alligit Oricum
Stomachi, graves Vertigines, item Caroticos affectus
nferet, ex affectu imprimis Stomacho. Dicunt: afficiendo
Sanguinem etiam succedere afficit Cerebrum: Sed potius,
rem ita se habere; cerum tamen est, quod hoc Gas imprimi
simil afficiat oricem Stomachi, unde ex Stomacho affectu
Vertigo & Apoplexia supervenit; quæ ratione imprimi
ea Stomacho affectu Apoplexiam deducere conatur HEL-
MONTIUS, ut non possit dici modus aut ratio fædi
Nam ob id vomitus juvat: Hinc Cupidarum Arctes et
Carbonem Gas inebrians, mortui instar in Carbones in-
eidit candentes, sine sensu totum fæmer comburens. Par ratio
est in ista, qui Vaporibus *Nisi ex Caroticis* ferme natiis
inhibet suffocati interire; Nam vel Venustus super venas,
vel mox institutus, est salubris. Facit hoc Vini generosa-
ria abusus, item *Nicelana Puntis*, qui manifestò Apo-
plexiam talem positivam ex Præcordiis oriundam inferit: vid.
GREGES *lib. 3. cap. 1. §. 37. pag. 465. cit. Tract.* qui huc
HELMONTII sententiam de Venæ Narcotice in Præ-
cordiis,

cordis, apoplexiam excitante, confirmat nobili Exemplo per Tabaci absum, quendam ex eo redditum esse adeo stupidum, ut cum sterore infar apoplethorum nenerit. Fuit apoplexia Polivra ex vi narcotica, per Vomitoria curata. Noscitane Fumia ergo in specie circa stomachum harendo, & per consensum cerebrum afficiendo, apoplexiam insitit. Sic et si Fungorum excitata apoplexiam, Vomitu, quo Fungi ex stomacho reiecti fuerunt, imprimis curantur, videt. in BARTHOLINI *op. Hag. fol. 2. pag. 293. (3.)* ab *adulterio*, qui in talibus observata sunt: Carui ante biennium Mulierem quadraginta annorum, ex causa interna apoplexia fortis ex improvisitate correptam, quæ brevi in Hemiplegiam totius lateris insisteret desinbat: Hinc lo Insultu & post conquebatur in paroxysmo de gravissima angustia & anxiata Præcordiorum, simul cum Insultu in somnum propensione? Non erat debilis ex spirituum Animalium defectu, non in Membra, nec imminabat nimis deliquium, sed in somnum propensio positiva; aliud enim illi defectus Virium ex spirituum Animalium defectu præciat, aliud somnolentia ex eorum torpore. Summe debiles ex spirituum Animalium defectu ad uterumque Vitæ articulum sunt infomes: illi verò alius validi ex improvisi somnolenti sunt. Ex quodm videretur se subinde paroxysmo, præcedebat præcordiorum angustia, cui superveniebat somnolentia, illa efflante & hæc cessante. Unde & alio tempore, seu vel octo septimoque a primo Insultu, propinatum ea alia causa Vomitorium autimoniale, cum anxietate præcordiorum Virium Imbecillitate & insignem ad somnum propensionem inferebat. Iam verò quid Vomitoria præstat ad somnum proferendum? Confirmat hæc Hypothesis HELMONTII, quod nempe tunc circa stomachum Vomitorium infertur angustia, & Aëra inclinetur ad somnum, & quod hæc apoplexia somitum suum in orificio stomachi habuit. (4.) *ab antecedentibus*: Sic Virgine duratura, per consensum stomachi eruta, & prodromus apoplexie in senibus. Dico, in senibus, non Homines consistentes ætatis sine ultri tali præcedente apoplethia fuit. Plura hisus novi Exempla: *Parvæ* cum certo imminet apoplexia: Plures luxu anni, quod Vertigine per consensum stomachi laborat, & hereditario vitio ad apoplexiam inclinat: unde cretus sum, quod hæc Vertigo ex stomacho certo præcedit apoplexiam. Omnis ergo ex matris linea parentes apoplexia tachi fuerunt: Avia matera hoc afflicta interit, & Mater jam semel apoplexia correpta fuit: Unde hereditarius character ad parentibus apoplethia in Liberos delatus patet. Nam si quid aliud, apoplexia est Malum admodum hereditarium, quod ab omnibus Prædictis afficitur. Notatu dignum baput rei Exemplum referet: FOR-ESTUS l. 10. *observ. 70.* de fene quodam sexagenario crasso & obeso, cuius Frater apoplexia interiori reus cum inter ambulandum amanturum fuisset, quendam octogenarium Virum sibi ianuarum subito extindum esse, subitò per fuisset ipse tremere cepit, & domum reversus apoplexia correptus fuit: quia subita, sequente anno denum ab apoplexia talis interit, non fecit ac pater, ac ejus Frater. Sed talis *Caussæ hereditaria apoplethia*, qui a parentibus transferit in Liberos, antequam ipsi apoplexia correpti fuerint, revera positivi quid in Apoplexia subesse innuit, à quo Vertigo etiam ex stomachi consensu, & tandem apoplexia, supervenit (5.) *Reparatio POTERII* idem persuadet, qui omnes apoplexias & Paraplegias, etiam post apoplexiam supervenientes, curavit per auram suam Diaphoreticam, promissis Universalibus, quod habet adhuc in se corpore aureum, adeoque ejus efficacia se exierit in stomacho, & prima viis, ultra quas non extenditur: quia est Remedium Fium. Hoc etiam confirmat Remedia alia appropriata, verbi gratia Cinnabar. *antimoni* & similia, nonnulli intra primas vias positivè operantia, quæ ad apoplexias & paralyses sunt egregia. (6.) *Modus hendi subitaneæ & frequenter momentaneæ* cum per Hemocam defluxam, aut Viarum opplationem, quæ per successione saltem se, via sufficienter explicat, adeoque aliud quid subit necesse est, quod tam subito Malum infert. Sed hoc *Gas rari formosissimum* sui penetrante narcoti & momentanea operatione optime illustrat. Ob id etiam WILLIUS non acquiescit in solo Humorum feruorum aliorumve in cerebri Medullarum præternaturali trauocatione, sed simul viam *vivalem*, spiritus admales fugantem & extinguentem, via accusat. Equidem insuprem *signa* quodam *obscuro caput* & animalium Facultatem præcedunt: quæ immixta apoplexie merum incutiat: Vid. SYLVIVS *lib. 2. capit. 21. §. 32. & seqq.* Sed hæc ip-

sa medio se habent modo, ita ut capitis effectum per Effusionem, ut & per consensum, insitui possint: sicut Vertigo ex stomacho in Senibus tale existit prodromum symptomata in Habituali apoplexia. Unde *sedulo semper investigandum*: an alia concurrentes circumstantie generales plus minus Affectionem Capitis per *apoplethiam*? an verò per *apoplethiam* designant? Sicut non rarum est, & *apoplethia Universalis* per *abdominis consensum* excitari, & Retorcia, quæ abdomina rari Hypochondrium spatio non excedit, & Delirium, & Insomniis, & cephalalgia optine subvenire, v. gr. Martialis, cinnabarinæ, Vomitoria, clysmata, &c. Mulier Epileptica, laborans Malo Hypochondrico, conquebatur de Doloris Capitis, & simul de Tensione Hypochondriorum. Jam verò quæritur: usurpabatur Martialis, remittebat Testis Hypochondriorum & Dolor capitis, si verò repetebat Testis Hypochondriorum, etiam dolor capitis repetebat. Unde symptomata ista, quæ sunt prodromi apoplethie imminentes, possunt fieri ex capite, per Consensum & per Effusionem affectu.

Quod *superius*, nempe apoplexiam ex affectu stomachi: hæc quidem quodam rem *apoplethia* latius citata esse videntur, sed quod *modum* vel res obicem & intracausa illi: Ad Veterum *Papaver* & Halitus, aut Chymicarum *Effusio variatissima* supelativa adscendentia, effugere est ridiculum: *Apoplethiam Affluam Regimie HELMONTII* propter, est palliare consensum ignorantiam: *Consensus*, qui per Nervos latem explicabilis est, & hic via locum mereri videtur, eum hic semper sensum, & hinc demum rationem Consensum præsupponat, qui in Apoplethia penitus torpet, nisi dicere velimus, per Consensum irritatorum Nervorum circa Præcordia, stringi Cerebri Fibras Nervorumque principium, cujus *Consensus* occasione spiritum in Partibus externis deficit Motus, qui in Cerebri Medullis perturbatus Scelus & Rationem tollit: Per sanguinis & spirituum Animalium circulationem Motum negotium quodammodo illustrari possit, sed & hic plurimura obstant. Res ergo difficillima est: *Narcosi* quidem *perit* & *Apoplethia spiritus Animalis*, seu *hæc*, & quasi plura misis coagulati, plausible est: quod verò hoc ex Præcordiis hæc res habere & *hæc* *hæc* inter. Nempe sicut *Opia* vel *Semen Abusus*, *Sanguis* vel *Gas Carbonum* in stomacho adhuc hærentia, insensum Afflatus Soporosis & Caroticois, & hæc ratione spiritus Animalis insensum & torpidus reddunt; ita etiam similis *struenda narcotica* ex Causa interna in Corpore nata, & circa Præcordia existens in regione stomachi, spiritus Animalis afficiendo, apoplexiam positivam inferre solet. *Ad hoc tamen rei later*, Sufficit pro meliori doctrina, & ad Præxim manifestissime, *Differentiam apoplexiam in Privativam & Positivam* insinuante, observando simul, & ea Causa Externis frequentiores esse Accidentales, sicut et Internis Habituali; & hæc later, quæ ea Causa Internasiorum, ferè frequentiores esse Positivas, quam Privativas.

Consideremus jam *Causas Remotas apoplethia Positiva*: sed si hæc ipsæ, prout à Scripitoribus consensu deprehenduntur, consideremus eandem ferè ad Privativas, minus ad Positivas apoplethias pertinet, utut aotialia, & curiosa sit obicatio WILLISII de *Anima Brater. Part. 2. capit. 8.* Deinde magis Accidentales ferè, quam Habituales sunt apoplexiam istas, quæ referunt. Adhuc Remotæ istæ Causæ, exceptis istis, quæ manifeste lesione Caput afficiunt, potius *apoplethiam* sunt, seu *Antecedentes*, quæ Causam continentem movent; aut saltem sunt subinde *Causa Præteritæ*, quæ Dispositionem morbosam internam commovent, ut ex Proximas consistant. Ut tamen in *observariis Anatomiarum* *consideratione* ex inspectis Cadaveribus facillimum, modo non frequenter, esse *Salutem* in *causa* & *causa*, ita ut vel præternaturale quid tunc reocertum, pro Causa Morbi Mortificæ habeatur; vel etiam Productum quoddam morbosum pro genuina illius habeatur Origine.

Quod *Causas permutantis apoplethia*: tribus ferè modis permutatur hæc, vel terminatur ad *Salutem* *Ægri* integram, remota & correctis plus minus Causa Proxima; vel terminatur ad *Mortem*, cessante tandem Cordis motu pulsatorio, unde suffocati intereunt *Ægri* vel denique ex *Universalis* in *Particulari* transit apoplexia, autque *punctio*, autque plura occupant Membra.

Quod l. sit, quodam post successivam Evacuationem, sive sanguinis, sive per Vomitoria, sive per Aluum, in specie per sudorem solvitur pedetentim apoplexia ad perfectam *Ægri Salutem*. Quo pertinet, quodam *medicame* Salivæ ubertior, vel Ispontaneæ, vel Remediis Mercurialibus instituta, successivè curatur apoplexia, quod observari

SENNERTUS in Praxi lib. 1. par. 2. cap. 33. pagin. 664. ubi de *Apoplexia*, & DECKERS in *Barbetti Prax.* pag. 22. & 29.

Si verò II. terminatur ad *Mortem*, fit, quando succellivè *Ægri* suffocati inereant. Fit, quatenus cellas plùs minùs spirituum Animalium motus, etiam ex Cerebello ad Cor & Organa respiratoria, debet perducere Pulvis & Respiratio, quibus cessantibus *Ægri* suffocati intereunt: cuius rei prodromus est *stridor* profundus, cum *spuma* per alperam arteriam elevata, & pedetentim circa Os apparet. Nam talis *spuma* signum est manifestum sanguinis motus per Pulmones placè impediti, qui in Pulmonibus harent, per aliquam rem inspirationem concessa & agitata, relolvitur in talem *spumam* eodem modo ac Cerevisia agitata in rete in similem *spumam* aluit. Quod talis *spuma* sit sanguis ita attenuatus & resolutus, Cellator Anapnoia mortuorum; quia TULPIUS lib. 3. cap. 37. refert in iis, qui *apoplexia* moriuntur, quod aspera arteria *spumoso* sanguine repleta reperitur: Sic HIPPOCRATES dicit, quod strangulati & suffocati ad id non redeant, quibus circa Os *spuma* collecta apparet; item, qui rorante obumetum cum fluitore, intra septem dies pereant, nisi Febri superveniat; item, qui repente abumetum & fluitant, si *spuma* circa Os apparet, intereant. Distingendum tamen est inter *spumam*, quæ ex profunditate Pulmonum erumpit, & illum humorem viscidum, qui in *Ægro*, Catarrho suffocativo habundante, cum aliquo fluitore solutè emittit, qui originem ducit ex Membrana posteriori & incirca *Schneideri*. Cessante tandem pulsi & respiratione, *Apoplectici* suffocati intereunt.

III. In *Paralyfin* in *apoplexiam* particularem *Paroxysmus* mutatur, quoniam nec hoc modogere semper servatur, sed sæpe aut primò morbus redeat, aut supor lethalis superveniat (E). De modo, quomodo aut Hemiplexia aut *paraplegia*, seu *apoplexia* particularis quædam *apoplexiam* Universalis succedat: verbi gratia ut Brachium post universalem *apoplexiam* maneat tantum *paraplegicum*, reliquis partibus omnibus sensum & motum recuperantibus? res difficilis est. Equidem cum *apoplexia* sanguinea in *paraplegiam* transeat, quandoque etiam sanguis vel motus deficientis, vel extravasati, fuerit vitium, ferè hæc: quin potius talem *apoplexiam* usurpationem lethalem, rarius curabilem perficet, exilimo, nisi forsitan Venæsectio legitime opem ferat: Videb. TULPIUS lib. 1. cap. 7. & ZACUTUS LUSITANUS *Medic. Princip. Histor. Cap.* 7. ubi habet Joannem florentis ætatis per scalam occidentem, cui copiosa Hemorrhagia Narium secuta est, quæ deprecia, in *apoplexiam* incidit, à qua Venæsectio fuit levatus. Aut si *Paraplegia* supervenerit, prohibe illi, ex sanguine congruato aut plia minùs subfidente Latice aequalum scilicet scellum; & vel interius profundius penetrans, scilicet per cerebrum in caudicem medullarem; vel exteriori defluxisse secundum situationem spinæ Medullæ; & ita unus alterius Nervii latione vel oppressione *Paraplegiam* intulisse. *Privative* verò *Lymphatica* *apoplexia* successiva Lymphæ Materieque peccantis ulteriori progressionem, & in caudicem medullarem interiori versus insinuationem, adque certis in locis vel obstructiōne vel compressione *paraplegiam* inferre posse, satis plausibile videtur, in qua tunc motus solius deficit in leviori malo, nunc sensus tantum in graviori, & in quo omnis spirituum animalium transitus penitus intercluditur. *Posterior* autem exasperat *paraplegiam* res nota est: Sed modus illi obducitur interum quo occultum modum per rem ipsam negare, abnotum est. *Paraplegiam* esse contrariam partium nervorum, quæ impediatur spirituum per motu transitum, non improbabile est HELMONTII assertio: sed quomodo fiat? & quibus differentiis à propriè sic dicta contraria seu ipsam partem differat? difficile est determinare, nisi forsitan dicere velimus, Nervos eorumque Filia circa radicem aut prope eorumque ex caudice medullari contrahi, inducere

paraplegiam, sicut ipsi Nervi in progressu suo cursum Nervorum & Fibularum nervorum, cum quibus connecluntur, systemate contrahi, dare possent convolutionem.

DIAGNOSIS.

Quod attingit signa: *apoplexia* talem esse Hermetismum facile patet, si subito omnes sensus ac motus pereat & simul vox repente auferatur; solè respiratioque sensu libera, & nunc satis difficilis remaneat: *Æger* quasi dormiens aut somnolentus, nisi admodum facili color de pulsi animo veretur, læcet: nam quidam *apoplectici* Pulsum adhuc habent naturalem; quidam pusillum; quidam omnino nullum, uti rectè observat LINDANUS, prout plùs vel minus sanguis circa præcordia flagnet, aut prout etiam Nervus Cor movens simul afficiatur. Color faciei & Oculorum interdum rubet, tumidus est, & simul corpus calet, & illa ipsa *apoplexia*, quæ est ex sanguinis fluxu loco temporis circulo: Eodem vero interdum facies pallet, hæcque est, & Corpus sensum insensibilem, ubi nullum vitium; quæ sanguine fluxu, *apoplexiam* insert. Membra omnia à *apoplexia* sunt laxa, & si Brachium vel Pes levetur, potere sui statim sensum concidit. *Æger* tussis, irritatus, & clamatur, nec loquitur, Ore blante, & plius minus siccitate quasi profundum dormit. Relolvitur interdum simul illi spūdet, unde Alvi Fæces, aut inseda Clystera, dum incipit *Æger* elevatur & rejiciuntur. Denique Membræ substantia læso abique causa externa immobilitas *apoplexiam* indicium habetur.

Ut autem ista distinguatur *apoplexia*, qualis sit & si sitiva & si phlogistica sit aut antecedens, & hæc aliqualis cognoscit debet: Illam causæ externæ, Vitæ quæ, insensibilis *Ægri*, Diutæ, &c. suggerat; facili tamen potius privativam supervenire, & siccitatem complacere possunt: Illi occasione, sanguinis motu suffulminatione, & ita cum cerebrum eodem flagante, *syncope Cardiacæ*, similis illud *apoplexiam* oritur, ut supra monuit. Sic verbi gratia si *Æger* alias laborat Verrigine, quæ ferè semper ex lachrymæ, si antea fuit natus à parentibus *apoplectici*, hoc præsumit esse *apoplexiam* positivam: si tunc etiam si *apoplexia* corripitur Juvenis *temper*, plethoricus, vitam solentem tamquam agens, insipiens est, malum esse *apoplexiam* privativam ex sanguinis vitio. Si corripitur *apoplexia* senex, qui sæpius fuit Catarrhus, insipiens est, esse *apoplexiam* privativam vitio lymphae, ex uberie Lymphæ in ambitu carnis natam. Si *Æger* in mediocri *apoplexia* aliqua, signa possit edere, ubi urgeat, & manu tangit præcordia, certum signum est, esse positivam: quando vellicat Caput, & movet manum ad Caput, signum est privativæ.

Dixi, quod vicissimissimè afflicta sit *apoplexia* cum *syncope Cardiacæ* seu Catarrho suffocativo, & diffinit tantum loco afflicto, adeo ut quidam etiam *apoplexiam* ad affectus cordis referant, & eodem modo eorum. Cautus ergo si Medicus, ut cognoscat *apoplexiam* à Catarrho suffocativo: Scilicet differentia est facilis, modò cognoscatur respiratio negotium plius minùs laboriosum. *Æger* ergo, qui pro diffinitione *apoplexiam* & Catarrhi suffocativi obvenit, sunt hæc: quod in *Syncope Cardiacæ*, seu Catarrho suffocativo, ex sanguinis fluxu in Pulmonibus, *Æger* difficillimè respicit, & signa adiacent gravilime in Pedore angustia; ipse *Æger* omni etiam omnia Membra & Annuovere conetur, utque mortuorum indar jaceat. Qui autem *apoplexia* graviore corripitur, si vix manifesta Vitæ huius signa, neque tamen tanta ipsius difficultate vexari solet. Nam in Catarrho suffocativo difficillimè respirant, à *apoplexia* etiam parum, aut tardè, ut saltem naturalem spiritum ducant, nisi in summo gradu eisdem. Pulsus quoque, qui in *Syncope Cardiacæ* ferè deficit, in affectibus *apoplectici* ferè diutius observatur, ita ut aliqui Pulsus ferrent, alii pusillum habent, raro, nisi in fortissima *apoplexia*.

(E) Servatur quidam *Apoplectici*, cum facta Membri uno vel dimidi corporis *Paralyfi*, Cerebrum tantum sanum at sua munia retinens, deorsum nempe in partes inferas se, quod Caput occupat. Verum si confirmata jam Membri *Paralyfi*, vel incipit facta Hemiplegia, Cerebrum immo non fit, & functiones præstitum interius ac naturalem statum non redierit, tunc Medicus de novo imminente *paraplegia* fit sollicitus. Hujus insinuationem præstat aut Prælix: exemplis: clersissimum est Augustissimæ Imperatricis Helionoræ, quæ annu 65, invicente anno 1700, ferè *Apoplexia* corripitur, post tertium diem à *paralyfi* lateris dextri hemiplegia & Lingue *Paralyfi* abeunt, quæ mox minime Capite levatur, sed in postremo spærem; ubi illiusmodi excruciatore, spiritus corporis, nullum unquam lux saluti suæ fecit. Viri Nihilus Garrelli Augustissimæ Imperatricis Cubicularia Medici, cuius libellæ præfationem sollicitissimè argumentis sollicitum sanctorum rei rotentur confirmat: post novendecim enim diem spæm, Morbus spæm incipit. Ut si tunc morbus vix illud, sensum gravior saltem, tandem possim Principem à viciis sollicit. Huius pro sua humanitate certitatem ut fecit huiusmodi Garrelli literis 24. Jan. 1701. dem anni Vienna transmissis.

plexia, nullum, prout nempe plūs vel minūs Præcordium sanguis flagrat, aut Nervus Cordis afficitur. Præterea in syncope Cardiacæ externæ frigidæ, Facies pallidæ, sudor frigidus erumpit, pulsus evanescit, & respiratio penitus abstat. In Apoplexia, abolitis functionibus Animalibus, nihilominus respirant, Arterię pulsant, utremque calida utriusque dependunt, & facies rubicunda observatur: Videb. WEPFERUS De Inc. aff. in apopl. Præterea in Apoplexia quavis fortis fletor est, quia spiritus Animalis, qui à cerebro accedunt Musculis. Thoracis ad complementum Respirationis, solidi sunt ablati, durante adhuc per cor, & Pulmones sanguinis circulo; unde in syncope Cardiacæ nullus est fletor, quia cor ipsum subito occupatur.

In gravi Passione hysterica etiam Ægræ instat Apoplectica carum jacent, unde confunditur cum Apoplexia interdum. Distinguantur tamen facili, quod in suffocatione Uterina dicta præcesserint symptomata affecti Abdominis; item quod in suffocatione uterina Intendunt vii sentienti peristaltæ, nec Respiratione tam facile impeditur; & quod in suffocatione bac pulsus fat obcurus, debilis aut parvus, aut ferè nullus; qui sæpè in Apoplexia admodum lenis est. Et in specie cum subinde in Apoplexia Faciei color ferè peristat, imò rubicundus, ac tumidi subinde in facie appareant, hic in suffocatione uterina omnino colore perit, qui potius facies palliat.

À Cereb. facili distinguitur Apoplexia in eo, quod sensum in vadit, non adeo subito ac Apoplexia; item carum etiam laborantibus est respiratio facilis, licet omni fletore; aut si adit fletor, adit cum somno, eoque satis profundo.

PROGNOSIS.

Quoad Prognosis. Notum est, quod Apoplexia sit acutissimus & periculosissimus affectus, qui Ægrum ut plurimum trucidat; & licet non semper eum moriantur Ægræ, Paralyticæ tamen evadant. De hoc dicit HIPPOCRATES Sectio. 5. aphor. 7. item Sectio. 6. aphor. 31. quod quicumque sani repente doloribus capitis tententur, statim obmutescant & stertent, in septem diebus pereant, nisi Febri easdem prehendant, quæ Apoplexiæ supervenire conducat.

Febri tamen non sit à flagnatione sanguinis circa cerebrum aut Phlegmone hujus constitutionis, non lenta: Imò & hoc addere convenit, nisi à comprimente extrinseco fuerit malum, illudque tempore tollatur.

Dicit etiam Sectio. 6. aphor. 42. quod Apoplexiæ fortiter solvere impossibilis sit, Debilem verò non adeo facili (quid per Debilem, & fortiter intelligatur, suprà dixi) interitum Vitæ periculum variis per diversos morbi gradus, huiusmodi magis aut minus difficulti combinata respirations. Vehementia autem hæc & periculum Apoplexiæ ac nota, quam Respiratione affert, imprimis cognoscitur: nam qui apoplexiæ moriuntur, omnes suffocati intereunt. Unde quod liberius est Respiratione, est minor est Apoplexia, & major salutis spes; & contra, quod magis impeditur Respiratione, eo magis periculum solet immineere Apoplectico.

Imprimis quidem, ubi Apoplexia in tantum lædit Respirationem, ut præter stertorem etiam spuma circa Os apparere incipiat, ferè lethale Apoplexiæ signum est, ne rectè hoc affirmat FORESTUS lib. 10. observatio. 74. la. scilicet ubi dicit, quod spuma circa Os apparet sit unum de præcipuis signis lethaliibus, cum sit extremum signum, à quo raro evadant: Item TULPIUS lib. 2. observat. cap. 31. refert, quod in iis, qui Apoplexia moriuntur, aspera arteria reperiri soleat post obitum spumoso sanguine repleta.

Spuma ista, ut jam suprà Sectio. 14. caput. 3. art. 4. de Cerebri suffocatio monuit, certum est lethalitatis signum esse sanguinis motum quoniam per Pulmones impeditur: ex quo sanguis in pulmonibus, & tandem in ipso corde, flagrans per Aeris validam & recipiendam, sed frustraneam, Respirationem elevatur spumæ, unde hæc ipse etiam nominis in ultimo ferè articulo apparere solent. Unde dicit etiam HIPPOCRATES Sectio. 1. aphor. 43. quod strangulati, & suffocati, nondum tamen mortui, ad se non redeant, quorum circa Os spuma collecta appareat. Multum hic litigant Auctores; optima est interpretatio LINDANI: Strangulatio hic non à collo, sed per os intelligit hæc, quibus subito à causa interna Respiratione intercipitur. Hic à multis potest intercipi, verbi gratia in suffocatione uterina. Itaque Hippocrates hoc vult: Interf. Respiratione intercipi, & non redire: sed per redirem ferè cognoscit, si spuma oritur circa Os, tunc certus est, nam suffocationem esse vitæ, à flagnatione sanguinis circa illud.

Quando enim Natura extrema commovetur sanguinem propellere, inde suborta in Pulmonibus spuma est, & ad Os deserta; & si aperta Ora spuma prodierit, deservit res. Hæc LINDANUS. Nempe spuma non præcedit Mortem, sed supremum vivendum conatus est in talibus Ægris; hinc non semper & necessarii Mortem portendit, quemadmodum TULPIUS lib. 2. observatio. 7. testatur, cum materia spumæ huiusmodi adeo ferè cum Pulmonibus transiunt, modo salubris humiditas ad Os deposita, & per difficultem & crebriorem Respirationem in spumam redacta sit; quoniam illud suffocationis instantis signum, Apoplexiæ semper lethalem; hæc non semper, indicat: Videb. SENNETUS præf. lib. 1. part. 2. cap. 33. & TULPIUS lib. 2. observatio. 6. Observandum ergo est hic, ne confundatur spuma vera cum viscido quodam Ligure, vel saliva viscida effluente, Fit enim nonnunquam, tam in Catarrho suffocativo, quam Apoplexia, ut Ægræ ita lucentes humorem viscidum copiose per Os rejiciant, qui nihil habet consensitatis cum spuma, sed ex Membris Pituitariis Schmidtii, vel potius ex Glandulis sub illis laticibus emungitur. Omnis spuma oritur ex Aeris & humoris plūs minis viscidis mixtura, adeo ut etiam sanguis in spumam aliam subsistendum abeat, ad instar Cerevici obcurrat, per agitationem tamen cum Aere in candidam spumam abeant. Spuma autem vera nonnisi est parva, nec adeo copiosa, ex imo Pectore sensim scaturit, & leniter ferè, sensim sensimque augmentata. Non ergo levis ista spuma adeo periculosum signum est, quæ ex saliva inter Fauces agitata oritur, & qualis in paroxysmis Epilepticorum ordinario observatur, sed illa ferè fatalis est, quæ in imo pectore seu ipsis Pulmonibus ea sanguine plūs minis flagnante, per Aeris reciproco motum attenuato, & ita in spumam rarefacto, oritur, & ita in fauces foras ebbat; adeo ut observari sint Apoplectici in SCHENCKII observationibus, quibus etiam post mortem talis copiosa spumosa spuma per Nares, Os, & prominentes Oculos, fuerit excreta. Quod major spuma in ore, eo majus est periculum; & quod major pulsus, eo melior spes. Ea spuma adeo magis afficiuntur Pulmones, quia agitatur Aer, nec promovetur in locum consuetum, scilicet cor.

Deinde de fletore etiam certum est, & illum exprimum, quod vehementiorem, & difficiliorem Morbum ostendere: nihilominus etiam hic remittat, reliquis symptomatibus tamen non simul remittentibus, non salutis, sed Mortis certissimum signum evadit; & contra, ubi mox cum sensu & Motu Respiratione aboleatur, quavis nec fletor nec spuma appareat, fortissima & lethalis Apoplexia erit dicenda.

Denique Apoplectici, si la difficillima Respiratione supervenit Inter, lethale est; Est enim sudor symptomatibus, & quasi syncopitici (sic Angli Schvæle, ut vocant) non verò naturalis sudatio, & signum est deficientis plantæ Facultatis Vitalis.

Apoplectici curati facili recidunt, & hi ipsi melius habentes post universalem, bonam est; aut aliquomodo excitati, si denotant fomitem aut plūs minis corporis fiant, istud periculum Recidivæ immolet; siquidem Apoplectici, postea licet curati, facili tamen recidunt.

De cætero si modo corpore locatus Æger, aut post sanguinis missiorem, aliquantulum ad se redeat, aliqua spes salvetur: si verò post hæc & alia Remedia, affectus ultra 24. horas in eodem statu permanet, aut cum somnolentia, Vertigine, ac Torporis recrudescat, de Ægro adum erit.

In Apoplexia correptis imprimis habenda distindio Ætatis, & hinc dependentis corporis status; cum Apoplexia juvenum, aut mediæ Ætatis hominem corripit, via sit ejusdem rationis cum Apoplexia, quæ senem, aut debilem, aut emaciatum, aut similem affligit.

Solvitur Apoplexia, quando evacuationibus per inferiorem aut per sudorem tota discutitur, aut si eadem in Paraplegiam quandam aut etiam Hemiplegiam definit. Observatum fuit, terminari interdum Apoplexiæ spumæ auri lymphatico, qualis Luu Venæ laborantibus post Inundationem Mercuriale accidit. Unde etiam BARBETTE in curanda Apoplexia faciem Inundationem commendat. Aut etiam ipsa Apoplexia talis semini admodum profunda, Ægrum interimie. Cætera videb. in SCHENCKII observationibus.

C U R A.

Quod ergo attinet curam, hæc duplex est: Curatio, seu quæ instituitur est in esse Paroxysmo, in quo exsuscitandus quæ

quasi est *Æger*, ut spirituum Animalium motus redeat; ac *Præservativa*, seu *extra Paroxysmum*, quæ causarum antecedentium tantum rationem habet: quo tempore observata debitis Evacuacionibus, simulque usupartis caput ac Ventriculæ roborantibus aromaticis, reditus Paroxysmi est præservandus. Neque enim cum *Æger* apertè recuperavisse, scopi curationis sunt negligendi; nam tales sæpius diu stupidi manent, varique accidentia eos vexant, adeo ut si Medicus sit negligens in cura, facili eveniat, ut paroxysmus revertatur, unde *Æger* postmodum moriatur.

In *hæc Paroxysmi* desuperimissis *Præsidia* generosiora sunt, quæ aut liberant *Ægros* rectè administrata, aut eos truncatè, male applicata: & hæc sunt *Panicum*, & *Venasectio*, quorum unum ut plurimum necessitudo adhibendum est, in ætate utrumque simul. Nam de *Chyliferis* commoque usu, item de *supplicioris*, quæ acriora & fortiora semper sunt applicanda, etiam omnes concordant Medici Prædici, quod in omni Paroxysmo Apoplectico, & post eundem etiam, tu-tilissimè & etiam necessitudo usurpantur. *Chyliferi* tales acres in maiore copia solinde injiciuntur, nempe à R. R. ad summum Scylli, quia de diutius retineantur & melius operari solent. Quod si non retineantur, aut saltem non satis diu persistent in corpore propter Spindideram Ani resolutam, repetendus est eorum usus, idque eo frequentius, quod magis urget Morbus: Si verò nullo modo in ætatem deduci possit Clyster, tunc remanentia Clysmatis, seu materia decocti remanens, instar Pulvis est coquenda, super Panem ex-tendenda, & toti abdomini instar Cataplasmati imponenda. Hoc enim Remedio feliciter usus fuit D. MOEBIUS in curando *Strepitus Apoplectico*.

Sed ut redeam ad *Panicum* & *Venasectio*, metus admodum est in *Junia*, ne suffocatio imminens acceleretur periculum, quod non paucos, accuratos etiam, Medicos detrahet, adhuc cum deficiat Motus Corporis, & etiam Partium Internarum: Et sanè posito, quod ex impedito sanguinis Motu fiat Apoplexia privativa, vi tamen videtur periculum Vomitus & necessarius, sed nocuus dicitur: imò periculum est, ne sub movendi conatu sanguis ac serum circa Collum & caput retineatur, & huc illæ partes magis obstruantur, cum naturaliter per vomendi conatu Facies rubescere, Oculi emulgescere, & Collum inflari soleat. Etenim *Venasectio* medio sanguinis circuli motus in quavis apoplexia plus minus impeditus promovetur potest. Interim de *Venasectio* ipsius CELSIUS est pronuntiandum, quod sanguinis detractio in apoplexia privativa admodum, aut occidit aut liberat *Ægros*, id est prout tempore vel intensitate magis applicatur. Unde etiam *Venasectio* nem reserit BARBETTE per experimentum confirmans in sua *Præf. capit. 2.* tanquam frustra, sapientie noticiam, uti etiam observandum est imprimis illud, quod habet HEINRICIUS ab HEER in *Observationibus*, id est, quod nempe coarctat, qui Inguvie & Coarctationibus sed apoplexiam incurant, *Phlebotomia* vi unquam evenerit, ob idemiam vocat dubium Remedium *Venasectio* in apoplexia, adeo ut centesimus ægrè, educto sanguine, evadat: *Qua etiam causa est, cur prædicator Medici* (verba sunt HEINRICI ab HEER) *nostrum celsè ab illa abstineant*. Et in tali casu reverà Vnumus præ *Venasectio* longe magis necessarius videtur.

Res ut aliquantisper fiat clarior, pro decisione observanda est *differentia apoplexias*, quam supra insinavi. Si enim signa adhuc, vel suspicio quædam saltem probabilior, sanguinem imprimis peccare, & sui stagnatione aut in cerebro aut in Pulmonibus inducere apoplexiam, tam positivam, quam Privativam, ut in illis, imprimis Junioribus, qui sunt Corpore *robore*, & succipiente, qui Vitam agunt sedentariam, in quibus Facies insigniter rubet sub Paroxysmo apoplexiam, quibus confecta sanguini per Uterum, Nares etc. evacuatio sit supprella; in talibus pro imminendo sanguinis quanto, & eius circulo promovendo *Venasectio* instiganda est, quam pluribus commendat SYLVIVS *lib. 2. capit. 35. §. 96.* CORTNUMMIUS de *Morb. Arterio cap. 60.* NYMMANNUS de *apople. cap. 39.* Idque quod citius est melius, ut sub liberio circulo fiat melior respiratio: Hinc ZACUTUS LUSITANUS *Præf. admir. lib. 2. Observation. 104.* Feminas suppressione Menstruum laborantem, & *Venasectio* negligentem, apoplexia mortuam; in aliis verò apoplectica, rite quamvis ductibus Menstruis, eandem cum euphoria administratam, *lib. 2. de Med. præf. lib. 31. testatur*. Ubi verò à Sero Matrum, præservative tantum *Venasectio* agit, id est, Vas depledo ab affluu sanguinis præservat, & ut Serum facilius intra Lymphaticis, & Venas refluatur, præstat.

Alii in Positiva à Narcosi, sive interna, sive externa, per se nihil, sed per accidentia tantum aliquid levaminis præstat, stagnationem sanguinis circa præcordia declinando, & solvendo: qua ratione in omnibus quoque reliquis apoplexiæ speciebus, item in illa, quæ à Terrore, similive affectu Animi, non inutilis videtur: Videb. PROSPER MARTIANUS in *lib. 4. de Fibr. Arter. §. 43.* HILDANUS *centur. 3. Observation. 11. & 12.* NYMMANNUS de *apople. pag. 216. & 217.* SYLVIVS *Præf. lib. allegat. §. 212.* Caute nihilominus illa est adhibenda; adt. de quoquam Viri debilitate (ante Paroxysmum) constat, ne simile contingat, quod Mulieri Hebrææ apud AMATUM LUSITANUM *centur. 4. Obs. 31.* Videb. HEINRICIUS ab HEER: Adcoque pariter vix locum habet, ubi sanguinem viscidiorē & mucosum habebatur: Videb. WEBERUS de *apople. pag. 218.* alius cum apoplexia, quæ talis, non possit *Venasectio*. Sed in senibus aut in Debilibus ante Paroxysmum, aut in Ebris, & qui in Inguvie præcedente corripuntur apoplexia, ubi Crustæ Venarum, ubi Narcosi, sive interna sive externa, ut quibus jam Vertigo, & alia signa quædam capitis afflu præcesserint, ut potius videatur subesse Lymphæ vitium, aut saltem in quibus nullam sanguinis primariam dependitur vitium, his convenit potius *Vomitus*, & non est *Venasectio*, & sedulo hic observandum est Motum supra allegatum HEINRICI ab HEER in *Observationibus*. Uno nomine in *Apoplexia Privativa magis Venasectio*, ut loco eius in sensibus Cerebri, scarificationes etc. in *Positiva magis Vomitus*, & loco huius præsertim in *Senibus, Clysmata acris conveniunt*. Hinc illi præmissis, in *Positiva sudoriferis volatilibus, Phlebotomia, Fastidii, Comitia* etc.; in *Positiva* verò apoplexia *Artemisia, Anella sulphurea*, & mala aræna, & stomachica conducunt. Quæ omnia in circumstantiis secundum vii naturales, naturam & præternaturales, in cuiusvis *Ægri* Cura semper observanda, diversimodè adhuc limitantur.

De *Traxa instiganda* eadem observanda, quæ cieca affectus Soporosis monita; imprimis verò Jugularium Venarum incisio maxime commendatur: videb. BAYLE de *apople. cap. 27.* aut in *Phlebotomia* utriusque Brachii Venæ: Videb. TULPIUS *lib. 5. Observation. 7.* Per *Venasectio* negotio instiganda confert Cura *Clysmata Arterio*, mot à media nocte Insultu apoplectico tacta: Accedens mane hora octava illam habuit eructos, succipiens, robustum, Facie & Meentibus insigniter rubram, quasi sanguis undique flagrant, & fœdi, Membra diffusissimè, & litum Brachia aquatilis, movere poterat, de summa præcordiorum anxietate, tremula, & vix intelligibili Voce, conquerebatur, insensu scrobiculorum cordis. Hinc præterhebatur *Vomitus*, in dol. interitus & aliquoties, sed non vehementer, purgatus, supra & infra. A meride *Venasectio* in Brachio instigata, & præterhebatur *Infusum Salis Ammoniaci*, cui bulli, cum aliis *Spiritus Aromaticis Nervus*. Cœdi verò iubeam applicare Lintheum multiplicatum. *Servari vix calidè probè imprægnatum*, idque sæpius repetere. Accedens altero mane cum paulo meliorem ostendebat, Facie adhuc admodum rubicunda cum pulu duro: hic cum Hemorrhagiam observassem, non obstante sua facta *Venasectio*, iubebam etiam in Cruore, Brachio, in quo *Venasectio* facta fuerat, opposito, circa Talum Venam incidere. Nocte sequente adhuc supervenit Fluxus Menstruus. Unde continuat usum *Spiritus Salis Ammoniaci* interneo, & *Spiritus Vin* eterno, cum interposito semel *Potio Laxativa*, intra octiduum convalescit. Et ita in hac Ancilla coepta & fluitare brevis, al. rosula, Naturæ ultra duplicem *Venasectio* nem, adhuc hemorrhagiam Narium, & utro provocavit. Videbatur mihi in subiecto hoc sanguinis inculus admodum lentus, non præstè ex copia, sed ex Fibrarum nervarum ac membranulorum fibrarum quasi spumosa, qua occasione sanguinis refluxus nonnihil mortuus, Ruborem illum Faciei, & artuum exhibet, sanguis ipso ob tardiorum translocationem ex arteriis in Venas, præter *Venasectio* nem nonne oculus Vasorum Narium, nec uteri per Anasomofin aperiente.

In genere vero & ut plurimum tutius, & simili poenem Remedium in Paroxysmo est *monstrum*, quam *Venasectio*, quem etiam facit imprimis LINDANUS in *suis Scriptis*; adeo ut Vomitoria fortiora Antimonialia, in specie et Mercurio Vire, admodum commendentur ad apoplexiam corandis in tempore, ubi non usque *Venasectio*, quam ipsam tamen rarissime adhibendam fuisse. Et quidem Vetus opinio optime fuisse *Ægros*, & quod aliis irritanda Climate intendat Prædici, hoc efficacissime obtinemus Vo-

miu, praefertim cum experientia ejusdem osum sapidis comprobaverit. Quantum enim in apoplecticis valet vomitos, duo egregia habebitis exempla in *Mys. Cariois* LAN-
GII pag. 1. & 12. ubi fundus Cerebri notatu digno penitus usum vomitorio; & PEIRUS à CASTRO in *Arch. Med.* de Vomitorio ultra spem plurimos desperatos excitatio affirmat; & Antimonialia valde opte commendat. Conf. ulceris JULIUS CÆSAR CLAUDINUS in *Euchirid.* pag. 349. & POTERIUS, qui Cruci Metallorum vulgaris grana tribus vehementissimum apoplecticum excitavit, insundendo simul Ori *Oleo Cinnamon;* item RIVIERUS, & alii plures. Insundenda quoque semper vomitoria in forma liquida, ut sponte quasi per Gulum defluere queant, (malè enim deglutiant, propterea sicut pulveres non conveniunt,) miscendo eadem una cum vehiculis spiritibus, cum *Aqua Cinnamonis* spiritibus, sicut facit FABER, cum *Aqua & spiritu Salviae, spiritu Ceraforum nigrorum, & similibus,* quae valent excitare apoplecticos, ut horum medio simul spirituum vigor nonnulli promoveatur. Et quidem augenda nonnulli in Paroxysmo Vomitorio doli, ut & aliorum remedium, quae excitare debant Aegrum, cum Torpor Aegri insignem alias efficaciam ejus eludat: imò, monente HARTMANNO in *Pr. Chymiar.* dupla doli dantur, prout scilicet Torpor majot minore est. Hinc *Syrapi Emulsi* ad 3vi. & 3i. praescribendus, item *Aqua benedicta Rulandi.* Essentiam quoque Nicotianae ad 3i. cum Melle exceptam, & in Oleum, potenter educere, laudat RIVIERUS *Prax. lib. 3. cap. 8.* & HARTMANNUS *loc. allegat.* pag. 74. & 31.

Occurrat curanda Mollis vergeta, sed jam aetatis nonnulli decrevit, correpta affectus ex apoplexia & epilepsia quasi mixto: vocatus manet, grammilla Venericidione, (ut non tam affectus, quam adstantium ratione faceret praescribere potione cum *Syrapi Emulsi Salsi 3vi.* capiebatur sine alteratione, denot ordinabam 3i. quidem, quae capiebatur iterum sine alteratione: tandem adduc dr. lii. ejusdem in paucis potione praescribendam, ut succellere caperet, & sic tandem, aliquoties supra & infra purgata, melius habuit. Postea, de prima millura aliquid deperditum fuisse, cum ex Ore aliquid deflueret, tamen ad minimum 3i. ad dr. ix. huius Syrupi intra biberium acceptum, nec tamen adeò insigniter purgata fuit.

In Paroxysmo igitur ante omnia opera danda, ut existitur Aeger, & ut servetur respiratio in alio & alio, quantum possibile, integra. Hinc prius ratione sensuum Organum quaequeque & partes quaevis sensiles fortius affricandae: praescribitur variis in loco non nimis clauso, aut rapido, sed temperato, & aete libero perlato, sive extra Lectum, si viribus potens, sive intra hunc, ita situm est Aeger, ut corpore erecto quasi sedeat, partim pro liberiore respiratione, partim pro humorum affluxu moderando, partim pro somnolentia arcuenda, ac sanguinis ebullitione vitanda; quia & ventus artificialis subinde circa eum faciendus. Mox igitur *Venericidione* insinuenda in Brachio dextro: quae peracta vel vomitorium ordinandum, vel *Chyma aere,* quod juxta WALAEUM sanguinem etiam proliciat, insciendum. Non differenda vomitoria, ut monet LINDANUS, eum in forti apoplexia occasio praecipit; & si quid revellere poterit, ac consopitum Aegrum iuscitare, certe vomitoria possunt. Horum ergo uno altero administrato, aut etiam leviori in malo his penitus omisiss, *Chysarium acrilum* & frutiter simulatumque usui semper esse commendatas: quales partim supra, ubi de *Leuberga,* videntur, partim & ex dicendis jam patebunt. Perinde enim est, sive simulatur Anus, sive vomitus exiretur; quia Intestina sunt Venericidiales continuata.

Parantur autem ejusmodi *Chysaria* ex Salvia, Lavendula, Majorana, Origano, Calamintia, Centaurio minori, Ruta, Serpillo, Folliis Nicotianae, Asari, radice Cyclaminis, Pyrethri, Iroes nostratis, Cortice radice Ribuli, Cortice mediana Sambuci, semine Urticae, &c. Quibus incoquantur *Pulpa Colocythidis* in petia ligata, aut addatur *Jusculum* aut *Decoctum Cruci Metallorum* ad 3i. vel 3ii. usque ad 3iv. quod RIVIERUS in via tuit: item adduntur commode *Salsi Germis,* aut *Salsi Ammoniacum.* Oleosa omittenda sunt, quoniam temperando & obolendo acrimoniam, simulam tollunt, non sicut quales Mellita. His ipsi Clysteribus commode etiam addi possunt Salsa volatilia, ut penetrare, & exsuscitent Aegros. De horum usu revulsorio vid. CORTHNUMMIUS de *Morbis Aetern.* a. 66. §. 23. pag. 347. Modus praescribendi est notus; c. g.

3i. Sal. Niv.
Salvia,
Tom. II.

Flor. Chamom. ana M. l.
Rad. Pyrethri 3i. ad 3vi.
Pulp. Colocyth. in pet. lig. (subtilissima enim
ramenta Tormina inferunt) 3i.
Coqu. in l. q. *Aqua simpl. Colature* 3ii.
adde

Mell. Aneth. vel Rafas. 3i. vel 3vi
Elix. Nivra picea cum Agar. 3i. ad 3ii.
Caster. pulv. 3i. ad 3ii.
Salsi Germis 3i. vel 3ii.
M. l. Clyster 5.
Clyster Revelles.
Vel

3i. Herb. Serpilli,
Fel. Nicotian.
Samm. Centaur. min. ana M. l.
Flor. Lavend. M. l.
Rad. Pyrethri,
Iroes nostrat. ana 3ii.
Sem. Urtica 3ii.
Pulpa Colocyth. in pet. lig. 3ii.

Coqu. in l. q. *Urina humana*
in Colatura 3viii. dissolve
Elix. Nivra cum Agar. 3i.
Elix. Trach. Albund. 3ii.
3i. Caster. 3i.
M. pro Enemate.
D. S. ut supra.

Vel
3i. Flor. Chamom. M. l.
Rad. Pyrethri 3vi.
Sem. Anisi 3i.
Pulp. Colocyth. in pet. lig. 3i.
Coqu. in l. q. *Aqua communis*: Colatura 3i. adde
Elix. Nivra cum Agar.
Mell. Mercorial. ana 3i.
Olei dissilat. Ros. Junip. 3i.
M. pro Clymate.
D. S. ut supra.

Vel
3i. Dec. Ruta, in quo 3i. Cruci Metall. decoctum
3ii. adde
Elix. Tauri infus. 3ii.
Elix. Trach. Albund. 3ii.
Mell. Aneth. 3i.
M. pro Clytere:
D. S. ut supra.

Vel
3i. Dec. Flor. Chamom. 3ii.
Juscul. Cruci Metall. cum Vine 3ii. vel 3i.
Mellis 3i. ad 3i.
M. pro Clytere.
D. S. ut supra.

Vel
3i. Dec. Emell. usq. 3ii.
Elix. Lavend. 3i. ad 3ii.
Syr. Emel. Ang. Sals 3vi. ad 3i.
M. l. Enema.
D. S. ut supra.

Cauteles circa horum compositionem videbitis in CORTHNUMMIO l. 2. p. 311.

Quinimo urgente necessitate *Chyma ex Jusculo quodam communi,* addito Ilicio, vel cum M. l. aut il. *Salis Communi* aquato, addito *Jusculo* vel *Syrapi Antimoniali* in dupla vel tripla doli, imò interdum quadrupla doli, extempore iofundendi potest.

Adcoque haec Enemata frequentius erunt repetenda, praesertim si non adeò diu libellatur: aut ipsi subdistantur *suppositoria* praeter acerrima: c. g.

3i. Rad. Helic. albi pulv.
Samm. suppurat.
Trach. Albund. ana 3ii.
Caster. pulv. gr. viii.
Sals. Ammoniaci 3i.
Cum l. q. Mellis l. Suppositorium.
D. S.

Acce Suppositorium.

Cum his ipsi & *Aqua Vis spiritus, apoplectica,* ut vocant, &c. insillantur Ori, Faucibus, acunde, praesertim *Salsibus & spiritibus Urticae & Oleo;* verbi gratia mixtura in paroxysmo vitanda praemissa praemittenda ut talis:

3i. Aqua apoplect. gr. 3i.
Lil. convall. 3i.

D d d d

Quina

Quarta Essentia Martialis, ℥i.
Liqu. cornu Cervi ℥i.
Liq. ser. Tonic. ℥℥.
 M. S.

Sulficans Mixture, cochleatim sumenda,
 Vel

℥i. *Aqua Lil. convall.* vel *Cerafor. nigr.*
Mamba ana ℥℥.
Spiritus Ceraf. nigr. ℥vi.
Liq. Cornu Cervi facin. vii℥ per. vel *Spiritus*
Sal. Ammoniaci, vel *Sang. ham.* aut *alios*
volat. ℥i℥ ad ℥i℥i.
Ol. def. Succini gutt. iv. vel vi.
Syr. Flor. Tonic. ℥℥.
 M. S. ut notē.

Cochleatim insuper crebris in Paroxysmo apoplectico.

Additur *Spiritus Ceraforum nigrum*, qui optimus est inventus in Paroxysmo apoplectico; vid. KESLERUS in *Prax. Chymic.*

℥i. *Aqua flor. Lavend.*
Salvia ana ℥i.
Epilop. Lang. ℥vi.
℥℥. Caster. ℥i℥.
Spiritus Sal. Ammoniaci ℥i.
Ol. def. Succini gutt. viii.
Syr. de Stoechad. ℥i.
 M. S. ut supra.

℥i. *Aqua Epilop. vel Applest. Lang.* ℥i.
Spiritus Serpill. ℥i℥.
Liqu. cornu Cervi facin. ℥i.
Syr. ser. Tonic. ℥i℥.
 M. S. ut supra.

Pertinet hoc mixture in Paroxysmo Epilepticum supra p. 2. art. 1. prescriptum; item

℥i. *Aqua Applest. ℥i℥.*
Mirand. cum Caster. ℥i.
Spiritus Theriacal. camp.
Liq. cornu Cervi facin. ana ℥i℥i.
Conf. Alchem. compl. ℥℥.
 M. S. ut supra.

℥i. *Aqua Lil. convall. cum Vin.* ℥i℥.
Flor. Samb. ℥i.
Carmen. ℥℥.
Liqu. Cornu Cervi facin. ℥i℥.
Conf. Alchem. compl. ℥i.
 M. S.

Mixture pro Capite confutendo.

℥i. *Aqua Ceraf. nigr.* ℥i℥.
Spiritus Ceraf. nigr.
Theriac. simpl. ana ℥℥.
Syr. ser. Tonic. ℥vi.
 M. S.

Potio Caput confortans.

Facit huc *Electuarium Arcanum Temp. von Guldach* contra *Apoplexiam & Epilepsiam*, praestitum si juncta Aphonia; quae inter symptomata Apoplexiae maximè terribilis est; imò contra omnes soporosis affectus, ut contra suffocationem Hythericam. Mixture ejus est haec.

℥i. *Salic. vol. Succin.* ℥℥.
Theriac. Androm. ℥i℥.
Salv. Caster. ℥i℥.
Olei defillat. Rutae.
Succin.
Rorimar. ana gutt. iii.
 M. f. Opilata:

De qua, quantum cuspis Cullitelli capit, dissolvatur in Aqua quadam apoplectica, vel epileptica Laegil, vel in Aqua Hirundinum cum Caloreo, vel in Aqua spiritibus Lavendulae, & Aegro in Os infundatur, ut deglutiat, simulque Lingua, Palatus & Partes vicinae hoc iplo electuario fortiter fricentur.

Potē *Theriac* & extractum Theriacale cum extracto Salviae, Rutae, Calorei &c. & cui aliquid Salis volatilis Succini, Olei defillat. Succini, Rutae &c. & Camphorae additum fuit, pro fricanda Lingua, Palato, & partibus vicinis admodum laudatur, ut dicte partes in sensu & motu redeant. Dicunt etiam *Partes fricari possunt* cum spiritu Theriacali, vel simplici vel probe camphorato; item cum spiritu Liliorum convallium, Melissae, Ceraforum nigro-

rum redificato, vel solitario, vel cum paucis guttis Olei defillat. Cinnamomi aut Caryophyllorum acutius iten essentia Calorei & similibus.

Vel

℥i. *Aqua Lil. convall. cum Vin.* ℥i℥.
Spiritus Ror. Jamp. ℥i.
℥℥. Caster. ℥i℥.
Salic. vol. Armat. ℥℥.
 M. D. S.

Mixture ad Palatum.

Si his praemissis post horae quadrantem non redeat Aeger, repetantur, & Naribus loquax *serenatoriorum* & acce infundantur.

℥i. *Rad. Helleb. albi.*
Syrimbri.
Fol. Majoranae.
Flor. Lil. convall.
Caster. ana ℥i.

M. f. Pulvis Sternutatorius, Naribus insufflatus:

D. S.
 Sulficans Pulvis Sternutatorius.

℥i. *Flor. Lil. convall.* ℥i.
Rad. Helleb. alb. ℥i.
 Pulverisatis addo
Olei defillat. Caryoph.
Major. ana gutt. iii.
 M. S. ut antē.

Naribus etiam, pro suscitandis apoplecticis, subitè siccantur odores aere, praesentem ex Salibus volatilibus spiritibus urinosis penetrantioribus, in liquore *serenatoriorum* imprimis spiritus Urinae, liquor cornu Cervi natatus, & spiritus Salis Ammoniaci; item Balsamopneumoniae, & Cephalicae, e. g. Rutae, Scherzari, &c. Ven Temporibus & Naso.

℥i. *Aqua defillat.*
Lil. conv. cum Vin. ℥i℥.
Aqua Applest. ℥i.
Asti. Ror. ℥i℥.
 M. D. S.

Aqua pro Temporibus & Naso.

Convenit etiam suffitus Calorei, & suffitus Succinatus, Naribus admotus.

Hinc facinorum & omnis facinoris, ut in Hythericis aliisque spasmodicis affectibus nulli cedunt, ita perquam egregia sunt in apoplexia, & praeservanda & curanda, imprimis in apoplexia curanda Oleum & Sal volatile praecellit in praeservanda verò succinum praeparatum, vel etiam incinata quaecunque. Guttur iii. vel iv. Olei defillat. succini, cum aqua appropriata in Paroxysmo infusi, multum commendantur in Paroxysmo apoplectico: hinc RHODULIUS in *suo Anecd.* p. 1. pag. 167. parat Oleum peculae ex succino, quod vocat *apoplecticum*, dum Oleum *lucum non rectificatum* miscet cum dimidio *Olei Rorismarini*, superaffundit Aquam fontanam, & ita per Vericam defillat: loque Oleum redificat. Dosis sunt guttulis vi. ad xii. vel: prout interno in Aqua appropriata. Externè eodem modo notur Vertex, Tempora, Nucha, & Spina Dorso; adta Camphora paucis efficacius Medicamentum fit. Similiter digerendo succinum cum Oleo Fuliginis insignis aliqui apoplecticum fieri possent. Hinc sola essentia Succini, praestitum cum spiritu Ceraforum nigroreum, vel Liliorum convallium mediante spiritu Vini Malvatici abstracto, parat, & guttulis 30. vel 40. Ori indita, loquelam restituit apoplecticis. Item à quibodam infunduntur auribus Aqua apoplectica; nam PETRUS JOHANNES FAER apoplecticis propinat Vomitorum internè, & Auribus eque Naso infundit essentiam Caryophyllorum, Essentiam Thymi cum tantillo Oleo Cinnamomi: vid. *in curat. a Camphora pariter*, & Oleum, & omnia Camphorae, his ipsis insufflatis & affricandis commodissime adiutur.

Cum dictis subinde simul fiant *exteriora Inunctiones* Theriac, Nuchae & Temporum, cum Oleis defillatis, & cui paratis Balsamis Apoplecticis, aut Cephalicis. Sufficiens Oleum defillatum Succini, Majoranae, Lavendulae, Syris, Rorismarini, Salviae, Cinnamomi, Caryophyllorum, & similia: Item Emphrathum Nervinum, malvarum cum Oleo defillato Lavendulae & Succini, Vertici imponunt, vel Unguentum, quod describit DECKERS in *Praxi* *lib. 2. p. 22.*

℥i. *Olei expr. Nucis.* ℥i℥.
defillat. Rutae ℥i.

Spir.
Saccini an. ʒi.
M. D. S.
Balsamus Cephalicus.
Vel

ʒi. Olei Petra alb. ʒi.
destillat. Suer. ʒi.
Lavend.
Ment.
Salvia an. ʒi.

Misc. cum vel uno corpore
D. S.

Balsamus pro capite confortando.

Eiusmodi laudationes etiam commodè regioni Roma-
chali possunt inungi, superimponendo Latere calfa-
clum.

Ad observandum, ut huiusmodi adrata classis non nimis
largitur aut copiosè dictis locis illinatur, non omnes eadem
ferre possunt, & redolentes ad se Agri de infigni capitis
perforatione, & gravitate ex Oleorum huiusmodi fumolo-
rum illinitione consequuntur.

Si non redeat ad se Ager, unum alterumve repetendum
venit; v. g. Vambrilia subinde reiteranda, ingestis deluper
Chystris, Extremorum vellicationem, puncturam, & si-
milis, quæ externos sensus afficiunt, continuando. Ho-
rum quidem effectum SYLVIVS pr. l. a. ʒ. 99. 100. 101.
in dubium vocat. Verùm quantum Frisico plantarum pe-
dem cum Menta aeri, aut huius loco cum aceto & Sale, cum
secasso profit ad excitandos tales, videbitis in M. A. N. G.
ann. l. observ. 96. pag. 160. Puncturarum verdè efficaciam
videbitis in HEINRICI ab HEER obs. 31. Quis etiam
Medicamentis & Pylisteria ampla iuxta WILLISIVM po-
nod aures, Cervicis, Brachii, præsertim in carpi parte io-
terna, & Corioris prope Inguina, Satus, &c. applicanda.
et redierit Ager ad se nonnulli, sed non sufficiens, interna
Spiritus continuanda, Pylisteria applicanda, quia, & Cu-
rentibus, nunc cum nosse sine scarificatione, Scapulis, &
Brachii admodum; qualia HEINRICUS ab HEER
obs. 31. commendat: aliaque administranda, proptèr Ager
ad se rediens de uno alterove symptomatico magis, vel mi-
nus querulus fiat.

Mulier constitutionis aliis robustæ, ætatis jam tam consti-
tentis, & cui ordinario adhuc flebant Menes, ex impro-
viso, prægresso anxio Cordis sensu, & Sententia inle-
quente, corripitur Apoplexia, quæ max in Hemiplegiam
late ris insidit terminabatur, subinde tamen insulsa apople-
ctico recurrende: hinc mos vocatus, idque vesperi hora
sesta, præscribimus Pulverem ex volatilibus, & spirituosia
Cephalicis, unâ cum Chystris acri, & Balsamo pro Naribus,
Nucha, & præcordiis, ex Cephalicis odiferis; hinc post
ortum, propter recurrentes insulsa insulsa apoplecticos,
Vambrilia Antimoniale de Symp. Americo ad ʒvi. aliquot-
ulâ, sed non adeo copiosè, evacuant. Die sequente So-
lis, eam saltem esset Hemiplegica, imperabant Vasa/alia-
rum in latere Parti affectæ opposito, Potionem ex volatili-
bus, & spirituosis continuando: Die Lunæ ad imitationem
HARTMANNI in præci Chymiar. præscribimus.

ʒi. Conf. Flor. Tunic. ʒi.
Mercurii Nit. gr. ii.
Ref. Sennæ. gr. iv.
Misc. pro Sale.

Laxare parùm, ipsa Agra interea semper, quoties de-
terioris haberet, primario de præcordiorum angustia conso-
quente: Hinc propter capitis perturbaciones adhuc residuas,
Syringæ aromatis forte ordinabam.

ʒi. Pulv. Lil. convall. ʒi.
Rad. Hellex. alb. ʒi.
Old. dest. Caryoph. gutt. iv.
Misc.

Hinc pro aña interno:

ʒi. Agg. Lil. convall.
Ceraf. nigr.
Menth. an. ʒi.
Spiritus Ceraf. nigr. dr. vi.
Sal. vel Cereb. Cereb. gr. xv.
Cinnab. Antimonii ʒi.
Syrup. Flor. Tunic. ʒi.
Misc. pro Potione.

Exterè pro Membra hemiplegicis, ter quotidie inungen-
dis, post prægressam fortem eorundem Frictionem, item
pro illandæ Spina Dorſi:

ʒi. Olei Petra alb. ʒi.
dest. ʒi.

Tom. II.

Lavend.
Meyran. an. ʒi.
Saccini dr. i.
Misc.

Item pro eodem usu:

ʒi. Spir. Vini camp. ʒi.
Spir. Lavend. terrefr. per percolat. ʒi.
Essent. Ceraf. dr. vi.
Misc.

Spiritus hic blandè calidus probè affricabatur partibus;
hinc Oleum præscriptum illinebatur:
Potèr istis ita ordinatis pro usu interno præscribimus:

ʒi. Suer. Hellex. nigr. gr. xvi.
Ceraf. ʒi.
Trach. Alkand. gr. iv.
Ol. destill. Suer. gutt. ii.
P. Plima.

Hinc pro promovendo nonnulli sudore ad imitationem
POTERII præscribimus:

ʒi. Raf. Ligul. ʒi. ʒi.
Herb. Rarimar. res. Mli.
Suer. Junip. res. ʒi.
Coq. in aqua. & vini ana ʒi. in Cacerbita, cum
Alembico clausa:

Colature & Liquori destillato, adde
Spiritus Suer. Junip. ʒi.
Sal. Ammoniac. simpl. dr. iii.
Syr. Flor. Tunic. ʒi.
Misc.

Potionem hanc hausit quotidie ter, mane, à meridie, &
in nocturno nocte, expellendo sudorem, mellis extinde ali-
quantulum habuit, subinde etiam Liquorem Cornu Cervi
succinatam hausit, &c. Pediluvium ex Nervina aquæ lem-
piet incoctis quotidie fervidè bis usurpavit, idque Ped-
optime profuit. Hinc pro continuandis externis in Brachio
ordinavi:

ʒi. Sem. Staph. p. l.
Suer. Junip. res. p. l.
Contul. infund. in l. q. Spiritus Vini, vel Spiritus
Suer. Junip.

Hinc tam cum ipso Spiritu imprægnato, quàm Magmate
residuo, fricantur ipsius Membra.

Sed cum Nalium esset contomax, ita ut licet utroque
mellis haberet, Hemiplexia tamen candem adhuc assige-
ret, ad imitationem POTERII præscripsi:

ʒi. Agg. Ceraf. nigr. dr. vi.
Spiritus Theriacal. ʒi.
Auri Diaphor. ʒi.
Misc.

Capiebat vesperi, idque repetitis vicibus. Primis duabus
vicibus anxietatem quandam circa præcordia percepit, hinc
Calor quidam sensilis in universi corpore erupit, quem le-
vis sudor secutus fuit: tertia vice hora nocturna tertia idem
aurum Diaphoreticum cum Aqua Vitæ juniperina accipit,
unde per quatuor horas optime dormivit, & sudore largo
ubique persusus fuit, ac quod cætera optime se habuit. Sanè
ex omnibus etiam volatilibus assumptis talem sensilem
operationem, ac elegantem adeo sudorem nunquam, ac ab
hoc Pulvere fixo, percepit. Saltem adhuc Brachium in ar-
ticulatione Humeri graviter dolebat pro quo tollendo spi-
ritum Vini, & deluper Balsamum Peruvianum, frequenter
illinivit, exque huius usu mellis habuit.

Dysæstia ita Paræstia, instituta Cura præservatoria,
tam in his, qui jam semel apoplexia tali fuerunt, ut præ-
cavetur crebrius Recidiva, quam in his, qui futuram ap-
plexiâ Apoplexiæ metuant: Cujus Prædicti sunt: (in
Habitualibus dicta) Dolor Capitis, Vertigo, Tumor Ca-
rotidum, Memoria debilitas, spontaneæ Oculorum illa-
chrymatones, Scotomæ, Incubus, Vocis tarditas, & hæ-
sitantia, Oris distorsiones, Deorinque stidores in Sono-
no, Stupor frequens Brachii, aut Pedis, aut etiam Refri-
geratio extremitatum partium. In his præ Præservatiis, pri-
missis Digestivis convenientibus, Purgatis convalescen-
sititenda, & postmodum sudoriferis præ cætera opera du-
da; cum Sudoriferis, aliis maximepè sint apta ad curan-
das Apoplecticos, & hæc ipsa Sudoriferis mirificè commen-
datur LINDANUS: quod nempe eadem ipsa admodum
convenient in Cura Apoplexiæ. Simul quoque Stomacho
propiciendum, ut Digestio prima, quantum possibile, con-
servetur in naturali modo, idque respectu Apoplexiæ posi-
tivæ Aronasticis, ut Cerebrum, ac Systema Nervosum in
debita constitutione, ac tunc retineatur.

Remedia aliis quæ in Paræstia Ager exitum Apoplexi-

Dddd d

002

an, aut eos excitatos præservant à recidiva, sunt fortè sequentia, aliis generali *Cephalicorum*, & *stomachicorum* nomine nota; nempe Salvia, Ruta, Origani, Chamædrys, Chamæpitys, Calamintha, Pulgium, semina Carvi, Fœniculi, Anisi, Sinapi, Erucæ, Ceraia nigra, Radix Angelicæ, Aristolochiæ rotundæ, Caryophyllatæ, Valerianæ, Vincetoxicæ, Flores Stœchados Arabicæ, Lavendulæ, Anethi, Primulæ veris, Lilliorum convallium, &c. Præ cæteris *Salvia* hic est in usu, cujus *Salvæ* coctus usus, & quilibet ex hac parata, item *Vinum salviatum*, &c. mirè commendatur à KYPERO in *Castig. Præf. 16.* In Cebis, Cardamomo, semine Sinapi, & Erucæ, singularia lateant Remedia ad præservandum Apoplexiam Senum, ita ut dicant, nihil potentius eisdem præservare, imprimis si omni mane, & vespere feminis Erucæ, vel Sinapi, & Cubebarum pulverisatam aliquazulum, & crebrius fumatur; videt. TABERNÆMONTANUS & SCHNEIDERUS de *Cataractis*: hinc quidam recipiunt grana vi. vii. x. xii. ad xv. & xx. *Semina Sinapi*, etque mane jejune leviter mallicata deglutiant ad præcavendam apoplexiam; vel pulveriscentur, & cum aqua Florum Lavendulæ spirituosâ usuperetur. STOEKERUS in præxi expertum Remedium contra apoplexiam sequentem *Pulverem* dicit esse:

℞. Cardamom. (ratione cerebri) ʒss.

Item. Coriandr. (ratione stomachi) ʒii.

Erucæ, vel Sinapi albi ʒss.

Misc. f. Pulvis pro aliquot dosibus.

De hoc fumatur circa introitum lecti,

Ad hujus imitationem.

℞. Sem. Sinapi albi ʒss.

Cochlear. ʒi.

Cardamom. ʒss.

Misc. & pulverisf.

D. s.

Pulvis Cephalicus pro aliquot dosibus.

Sumatur circa introitum lecti pro aliquot dosibus: Est egregium præservativum in puncto apoplexiæ metus. Vel, quod aliis placet, commodius sub forma *Electuarii* hoc semen usuperetur.

℞. Tres varices pingues minutim concillas:

adde

Sem. Sinapi albi, seu Erucæ cochli.

Misc. in Mortario, adiendo

Aqua Lavend. simpl. vel spirituos. cochli.

Succi Valer. ʒss. vel q. pl.

De quo sit dosis omni mane magnitudo Juglandis: certè præservat ab apoplexia, teste SCHMUKIO *Thes. 2. fasc. Med. 16.* Vel

℞. Caris. ping. m. m. vi.

Incit. & conta. f. adde

Sem. Sinapi albi, seu Erucæ ʒss. ad ʒvi.

Cardamom. ʒi. ad ʒi.

Misc. exsicc. & adde simul

Spiritus Lavendul. cochli.

vel cum spr. Flor. Tunicæ vel Berreg. f. Electuar.

D. s.

Electuarium Cephalicum.

De quo omni mane dosis Juglandis magnitudine capendum; à meridie spiritus Carminativus de Tribus, vel spiritus Ialis Ammoniaci anisatus.

In genere omnes Auctores commendant semen sinapi, & Erucæ pro præservativo; siquidem sal volatilè sinapi, & Erucæ specificam vim in apoplexia obtinet, & ab ea præservat; unde etiam in Paroxysmo spiritus sinapis summi Erucæ urinosum cum Calce viva paratus (de quo videb. in *Crit. leg. Pharmacop.* in *Strophodorum part. 1. fol. 1. pag. 465.*) cum aqua Apoplepticâ misceri, & ita commodè administrari potest. Notum aliis etiam est, quatum valeant omnia Remedia ex *Ceraia nigra dulcibus* parata, quod nempe hæc ipsa singulariter conveniat: imprimis spiritus Ceraforum oigramum misceat à KYLSFRO extollitur, cum summum remedium ad resuscitandum Epilepticos, & ad apoplecticos in Paroxysmo, & curandos extra Paroxysmum, & in specie Loquelam restituendam. Vid. eisdem *proposus pagina 370.* ubi asserit, se quoadmodum Nobilem, quæ per trea dies jacerat desperatè Apoplectica, beneficio spiritus Ceraforum nigrorum demum curasse, vel restituisse. Ad hæc Volatilia, tam in Paroxysmo, quam extra Paroxysmum, pertinet spiritus Vitrioli volatilis quicunque. Qui non habent genium, faciunt spiritum Vitrioli Apoplecticum ex spiritibus vini, & Vitrioli, sive spiritus Sulphurei exinde optimi. Modus est hic:

℞. Vitriolum imprimis Hungaricum ad Solem calcinatum vel caput mortuum Vitrioli distorta expofitum Aeris de novo impregnatum.

Misce, & irrota ad consuetudinem Pulvis cum f. q. spiritus vini à Placitis Aromaticis abstracti: Stent per aliquot septimanas in digestionè, destillentur in igne aperto, prout destillant Mineralia. Post spiritus aliquandiu stet in digestionè, tandem ex Cucurbita destilletur per Alembicum, tunc prodit spiritus strati: Nebulæ quodam proveniunt, mutetur Receptaculum, & capiat spiritus Vitrioli volatilis. Spiritus hi milli aliquandiu digeratur, de novo per Balneum cobobentur, & afferentur pro usu sub nomine spiritus Vitrioli Cephalici, vel etiam Epileptici.

Quidam non male spiritum Ceraforum nigrorum, Vitriolo in Sole probè calcinato affundunt, aliquot cohibetis abstrahunt, & ita spiritum Vitrioli quodammodo volatilem Antiapoplecticum egregium acquirunt.

Ex dictis, & similibus sunt simul ordinariæ aquæ Apoplepticæ spirituosæ, quæ sunt spiritus volatiles inflammabiles ab Aromaticis largiter impregnatæ. Ordinariè parantur ex Aromaticis, in specie Ialibus volatilibus oleosis, verbi gratia ex Salvia, Roremarino, Ruta, Floribus Lilliorum convallium, Origano, Fœniculo, Floribus Lavendulæ, Stœchados Arabicæ, Anethi, & similibus: E. gr. sit spiritus, seu aqua Apoplectica B. D. Alembi, Compositio est hæc:

℞. Flor. Lillior. convall. ʒvi.

Cinnamon. ʒi.

Zedoar. ʒss.

Croci ʒi.

Macis.

Caryophyll. an. ʒss. ad ʒss.

Digere in vino Hippoc. q. l. per mensem: spiritum destilla per Vesicam, abstrahendo saltem spiritum volatilem aromaticum, quem serva: Hinc

℞. Rad. Valerian.

Vincetox.

Pena. an. ʒi.

Tel. distill.

Berregi.

Rosinæ. an. Mill.

Flor. Tilia M. vi.

Lavend.

Spica.

Salvia.

Tupini ana M. l.

Mista macerentur in spiritus superius per mensem, clauso Vase, & bene munito: Tunc destilla per Vesicam, addendo iterum vini Hippoc. q. l. Tandem restituetur in Balneo Mariæ super Ambra, Masticho, & Camphora, & habebitur spiritus mirandam virtutem, & egregiè apoplecticus.

Potest hic infervere simul pro spiritibus Vitrioli Cephalicis, vel apoplecticis curando, pro spiritibus Vitrioli volatilibus: de quibus superius monui.

Sed non immerito queritur: An sit satis hæc aqua possit administrari in paroxysmo? Nego: Hæc ipse enim aqua interdum plus nocet, quam prodest. Nam

1. Hujusmodi spiritus inflammabiles cum sit oleum resolidum, vi inebriat, & narcotica pollet, adeoque metus est, ne copiosa vis subinde Narcotici, & stupor intendatur. Moderatè ergo illius utendum, præcipuis si à Sanguine fuerit Miliis, utpote quem magis turgescere faciunt: Vid. CRATO lib. 1. cap. 5. SENNERTUS lib. alt. quæst. 4. & HOECHSTEDTERUS in *disq. 9. ca. 5. pag. 334.*

2. Non paucæ sunt Mulieres imprimis, quæ talia spirituosâ non semper possunt ferre, quin paroxysmi Hystericos incurraut.

3. Etiam Viri, lo specie Literati, quorum genus nervosum debilius, minus possunt ferre talia spirituosâ fortiora odorifera, quæ percipiunt aliqualem capitis gravitatem, tensionem circa Tempora, & similia.

Io his ergo, & similibus casibus non conveiant: Propterea magis laudantur Salia Volatilia oleosa, i. e. Salia Volatilia Oleis destillatis uncta, vel hujusmodi spiritibus sociata, ut ita aromatum efficacia à spiritibus Urinosi tendatur, & nota à spiritibus sulphureis metuenda præcaveatur. Plethorici tamen ad apoplexiam prout Salia Volatilia oleosa interire non ferunt, ut optime externè, sed po-

potius macta. Spiritus ergo ditionis volatiles, & Salia Volatilia Urinis macta, ad sudorem maxime disposita, magis conducunt.

Porro *Casseri* Essentia, & omnia ex Calore parata remedia, spiritibus multa, specificis commendantur, & insuper conducunt: quibus addantur spiritus Vegetabiles Liliorum convallium, spiritus Buccarum Juniperi, & Cerasorum nigrorum, Serpilli, Lavendulæ, Theriacalis camphratus; spiritus Vini camphoratus aliis admixtus, vel etiam Oriolus est satis penetrans: Aqua Magnanimitatis, seu spiritus Formicarum *Laurentii* admodum conducit in Apoplexia; Aqua, & spiritus Apoplecticus *Myrsinæ*, aqua Apoplectica *Kalreuteri, Langii, & Harmani*, Aqua, & Elisir Vitæ *Martialis*, Aqua Anhalitæ, Hitandium cum Castoreo; aqua Angelicæ, Serpilli, Cinnamon, Liliorum convallium, Salvia, &c. cum Vino paratæ. De *Essentia Stenachii* nihil addo. Spiritus, & Sal volatile *Strandii* humano Specificum fuit CNOEFFELII in curanda Epilepsia, & Apoplexia. Præ cæteris spiritus *Santalæ humani* est commendatum remedium GRASSECCI, & quem etiam, cum singulare Specificum, admodum laudat HARTMANNUS in *Praxi Chymiatricæ*; & HELMONTIUS *Trahit*. Spiritus Viti, uti etiam spiritus Cranii humani, & post hunc sal volatile, spiritus, & aqua spiritus Cerebri humani, etiam sunt egregia remedia in Apoplexiis; quibus ab aliis simul additur & specificè laudatur spiritus *Falguis*; Item spiritus *salis Ammoniaci*, tam simplex, quam cum Camphora junctus, & legitime unicus, sit spiritus volatilis penetrantissimus: Item spiritus Ammoniaci succinatæ ac lavendulatus. Salia enim Volatilia propter infusam penetrantiam, & quod excellant viscidiora, in Apoplexia privativa maxime utilis sunt, cum præcaveant transitum in Paraplegiam, quæ optimè curatur per salia Volatilia, sudorem expectanda. Hinc conveniunt etiam uterius spiritus & salia Volatilia reliqua, Cranii humani, sanguinis humani, & sanguinis Cervi, Viperae, Succini, hinc spiritus Cornu Cervi, & Liqueur Cornu Cervi succinatus D. Michaelis perquam egregii sunt ad quosvis soporosos & imprimis Apoplecticos affectus excitandos.

Ex didicis variz Formula præscribi possunt: e. g.

℞ Quiaz Essentia Rorism. ℥i.

Lavend. ℥℥.

M. S.

Essentia Cephalica.

Dof. 10. gutt. omni mane: Vespri usurpari potest spiritus Salis Ammoniaci ad 30. gutt. vel Liqueur Cornu Cervi succinatus.

℞ ℞. Caffor. ℥i.

Quint. Essent. Rorism. ℥i.

M. S. ut suprâ.

Dof. ad 30. vel 40. guttas.

Quo etiam pertinet Essentia composita ex una Salvia, Zinzibæri & Cafforæ, cum spiritus salis Ammoniaci extracta.

Vel

℞ Essent. Succini; vel Caffor. vinos. ℥℥.

Spirit. sal. Ammoniaci anis.

Succin. an. ℥i.

M. S. ut suprâ.

Dof. 30. ad 40. gutt. bis in die.

In metu Apoplexiæ Aviz: omni non sine successu præscripsi sequentem mixturam:

℞ Aqua Flor. Tillæ,

Lavendulæ,

Prim. ver. an. ℥i.

Applet.

Spiritus Ceref. nigr. an. ℥℥.

℞. Primul. viris. ℥i.

Salis vol. Succini ℥℥.

Syr. Flor. Tonic. ℥℥.

Misc.

Dof. 1. cochlear. singulis tribus horis.

Eidem Aviz, crebra Scotomia cum insigni scilicet salinam inebilitate correpta, præscripsi:

℞ Aqua Menth.

Lil. convall. cum Vin.

Ceref. nigr. an. ℥i.

Spiritus Ceref. nigr. ℥i.

℞. Caffor. ℥℥.

Salis vol. Cornu Cervi ℥i.

Succin. ℥℥.

Syr. Flor. Tonic. ℥℥.

Misc.

Huc quoque pertinent Mixturæ suprà in Parosismo Vertiginis cap. i. præscriptæ; quibus semper Essentia Cafforæ addi potest.

Hic tandem meritis annumerandum est Aurum diaphoreticum *Peterii*, quod ita paratum, cum Conserva Florum Tonicæ assumptum, est perquam egregium: item Cincabaris Animonii, & Cincabarina: hinc de Specificis Cephalicis pro Præventionis capendis res nota est, cum in genere quævis Antiepileptica etiam fere ad Apoplexiam laudentur. Ex. grat.

℞ Ceref. rubr. prop. ℥i.

Cincab. Animonii ℥℥.

Salis vol. Succini ℥i.

Cubebæ. ℥℥.

M. i. Pulv.

D. S.

Pulvis Cephalicus.

Ad præventionem alia usurpantur Elethuaria: v. gr.

℞ Conf. flor. Salvia,

Rorismar.

Tonic. an. ℥℥.

Conf. Alchem.

Rem. Sinapi an. ℥i.

Cardam.

Cubebæ.

Ment. an. ℥℥.

Cum i. q. Syr. flor. Tonic. i. Elethuarium.

D. S.

Elethuarium Cephalicum.

Vel

℞ Conf. flor. Ambur.

Lavend.

Ment. an. ℥i.

Vert. Aurant. cond. ℥℥.

Zingib. cond. ℥℥.

Rem. Sinapi.

Erusa an. ℥i.

Cubebæ.

Cinam.

Cardam.

Salis vol. Succini elos. an. ℥i.

Cum i. q. Syr. flor. Tonic. i. Elethuarium.

D. S. ut suprâ.

Vel

℞ Conf. Menth. ℥i.

Flor. Ambur. ℥i.

Rem. Sinapi pulv. ror. ℥℥.

Cinam.

Coryphylor. an. ℥℥.

Salis volat. Succin. ℥i.

Ol. defillat. Menthæ.

Ment. an. gutt. vii.

Cum i. q. Conf. Alchem. vel Syr. flor. Tonic. i. Elethuarium.

D. S. ut suprâ.

Vel

℞ Conf. flor. Ambur.

Salvia an. ℥i.

Zingib. in Ind. cond. vel Nuc. Ind. cond.

Rem. Sinapi aer. an. ℥i.

Ceref. rub. prop. ℥℥.

Dale. ver.

Cincab. Animonii.

Salis volat. Succin. an. ℥℥.

Ol. defillat. Succini ℥℥.

Cum Brod. Zingib. i. Elethuarium.

D. S. ut suprâ.

Vel

℞ Conf. Alchem. vel Conf. flor. Ambur. ℥℥.

Nuc. Ind. cond. ℥i.

Rem. Erup. ℥i.

Cinam. ℥i.

Succin. prop. ℥℥.

Cardam.

Cubebæ.

Cinam. an. ℥i.

Spiritus Ceref. nigr. ℥i.

Cum Syr. flor. Tonic. q. i. i. Elethuarium:

D. S. ut suprâ.

Vel

℞ Conf. flor. Ambur. ℥i.

Zingib. cond. ℥℥.

Rem. Sinapi.

Erna an. ʒi.
Cordam.
Cubeb. an. ʒʒ.
 Cum l. q. Conf. Alchem. vel ʒyr. flor. Tual.
 f. Elecharium:
 D. S. ut antē.
 Vel

ʒ. Conf. ʒyr. Anthes.
 Tual. an. ʒʒ.
 Ros. Ind. emdit. ʒvi.
 Conf. Alchem.
 Sem. Sinapi an. ʒiii.
 Spec. Diacubeb. ʒi.
 Cum Brod. Rosi Ind. f. Elecharium.
 D. S. ut antē.
 Vel

ʒ. Conf. ʒyr. Anthes.
 Salu. an. ʒʒ.
 Conf. Alchem. ʒii.
 Cofor. pulverif.
 Spec. Dia. Ambr.
 Dia. Melich. dale. an. ʒi.
 Cinnab. Animanti ʒʒ.
 Ol. deſill. Sacini ʒʒ.
 Cum l. q. ʒyr. Flor. Tual. f. Elecharium.
 D. S. ut ſuprà.
 Vel

ʒ. Spec. Dia. Ambr.
 Dia. Melich. dale. an. ʒi.
 Cum l. q. Sacch. in aqua Salvis fol. f. Rotulum
 adipergendum cum
 Ol. deſill. Cubeb. vel Salvia
 D. S.
 Rotulum Cephalicū.
 Conf. Idea Formul. Claſſ. 1. §. 6.
 Quo etiam pertinet D. Kalbi Mixtura preſervans
 illa ab Atropleſi. Compoſitio eſt hæc:

ʒ. Spec. Dia. Ambr.
 Dia. Melich. dale. an. ʒi.
 Margor. prop.
 Coralli. rub. prop. an. ʒi.
 Succini alb. prop. ʒvi.
 Conf. Alchem. ʒii.
 Extr. Rad. Helen. ʒii.
 Iros ʒʒ.
 Calam. arom. ʒi.
 Paon.
 Lign. Alor an. ʒʒ.
 Ol. deſill. Salvia.
 Zeriſmar.
 Sacini. an. gutt. xvi.
 Lauend. gutt. ii.
 Spica.
 Anſi.
 Fumicu.
 Macis.
 Ros. Melich. an. gutt. xii.
 Cardib.
 Caryophyll. an. gutt. viii.
 Ruta gutt. vi.
 Sacchar. optim. ʒvii.
 M. f. Pulvis.
 D. S.
 Saccharum Apopleſicum.

Sed obſervetur, quod Samen Sinapi & Erna imprimis
 his addenda ſint.

Hæc interna tam intra, quam extra Paroxyſmum con-
 veniunt.

Inter Evacuanda. extra Paroxyſmum uſurpanda, prima-
 tum obſervent Purgantia, & quidem Animsicidia, ut ſuprà
 monui; que inter

Mercurius Vitæ, Tartarus Emeticus, &c. præſcribi po-
 teſt: ceteris grat.

ʒ. Tartari Em. Myſt. gr. ii.
 Sal. Ammoniaci gr. ix.
 M. f. Pulv.
 Vel

ʒ. Tartari vitriol. gr. vi.
 Em. Myſt. gr. ii.
 Scamm. ſulphur. gr. i.
 M. f. Pulv.

Præter Vomitorium conducunt etiam Purgantia, ceteris
 grat. Helleborus niger, Pilula Foxidæ, Cochiz, Pilulæ

Proprietatis Myſtici, Pilulæ Polychreſtæ eiſdem, Extra-
 ctum Hellebori nigri, Agarici, Mercurius dulcis: quibus pro
 ſtimulo ſemper Extractum Colocythodis, vel Alhandi
 legitime pariatum, addendum eſt: quin etiam ſemper ad
 præveniendum Recidivum neceſſaria ſunt Purgantia: Vid.
 CORTNUMMIUS loc. citat. cap. 70. Sequentes Pilulæ
 Aſiæ materia præſcripi:

ʒ. Maſt. Pilular. de Sac. Crat.
 Extr. Alſoth. an. ʒʒ.
 Truch. Alband. gr. i.
 Ol. deſ. Succini gutt. ii.
 Cum ʒ. Prim. veriſ. f. Pilulæ.
 Vel

ʒ. Mercurii dale. ʒi.
 Scamm. ſulphur. gr. v.
 Cum Conf. ʒyr. Tual. f. Bolus:
 D. S.

Saccharum Purgans pro una doſi.
 Item conducunt Pilulæ ex Mercurio dolci cuto Extra-
 ctum Hellebori nigri, ſuprà cap. 2. Artic. 1. ubi de Epilepſia, præ-
 ſcripſit.

Vel
 ʒ. Maſt. Pilular. de Trich. Anſi ʒʒ.
 Extr. Melich. nig. gr. v.
 Tartari vitriol. gr. iii.
 Cum Ol. deſill. Carvi f. Pilulæ.
 D. S.
 Pilulæ.

Vel
 ʒ. Gummi. Ammoniaci deſt. ſol.
 Bdeli. an. deſt. ſol. an. ʒʒ.
 Vitriol. Martis ad albed. calc. ʒi.
 Maſt. Gum. de Peru gr. xv.
 Scamm. prop. Braſidel. ʒi.
 Extr. Truch. Alband. gr. vi.
 f. Pil. inſar. Francoſ.
 D. S.

Pilulæ Emollientes, pro aliquot vicibus.

Doſis Num. xv.
 Raderiſera ex Liqore declinante Paroxyſmo aliquandoſ con-
 tinuata, ſunt maxime proficua.

Si his remedia non ſatisfaciamus ſcopo, etiam Cucurbitula,
 Betætes, Ponticali, & ſimilia adhibeantur.

Vix quidam in decreſcente ætate ultra ſeptuaginta annos
 conſtitutus, alias ſanus, ſed inordinatè moritque regula-
 tæ, utæ non laute, Diæte, adſueſcit, aliquando cum ſoci-
 cis extra Urbis portas ambulans, ſine ſenſu & motu ſubito
 corruerat toros pallidus, ab adſtantibus denudè cæciatus,
 quid ſecum actum, ſerè neſcibat. Debilitatus tamen, & ob
 anhelitus diſcultatem aliquoties deſiderè coactus, denudè
 intra Civitatem revertebatur. Interdiciſ aliquot leptima-
 nus, côm lætære ſemper commodè habuiſſet, Iſtemplum pe-
 tens, ſimili ratione ex improvdiſ denudè corruerat, ſed Bal-
 ſami & Aqua Antiepileptica reſectis, domum lentè gra-
 du petebat. Aliquoties hoc accidebat, donec ingraſcente
 Mælo extra privatos parietes ipſi vaſtari via liceret, quin
 ex levi Corporis motu via quonſque deſceſſuſ interce-
 pſione, & ſimulacra caligine Quæſum afflictiſ, forti im-
 petu non tam corruere, quam proſtrui videtur, ſenſu &
 motu carens; hinc Tabernam ſuam mercatoriam aliquando
 ingrediens, ea ſimili Corporum præſtratiſe Nalut tam le-
 viter memiſ allidebat, ut mediæ ſui offeſum ſubſtantia
 ſine perceptione doloroſa perſtringeret. Cum ergo tempore
 hyemali de Patoayſmi huius apoplectici Inſulta ſollicitus
 me conſuliret, ſequentiſ ordinaſi:

ʒ. Spiritus Sal. Ammoniaci,
 Cornu Cervi eſſentiſ. an. ʒi.
 Mili.

De quo capiebat quotidie ter, guttas xix. vel xxx. muſt
 in Vehiculo calido, à meridie in frigido; una cum hoc præ-
 ſcripſi:

ʒ. Ol. deſ. Succini ʒi.
 Carſoph.
 Maris an. ʒi.
 Ros. Melich. eſſ. q. f.
 M ſc. pro Balſamo.

Hoc mane & veſperi Tempora, Venicem, Nocham, &
 regionem ſtomachi inungebat: lic nec tam credidè, nec æreſ
 Paroxyſmos ſait.

Appetente verdè verno tempore ordinari, præmiſſo Di-
 geſtivo ſalino. Purgantium Mercurialium cum Extracto Pri-
 chymago, quo pluries exercevit cum ſevamine, hanc in-
 ternè pro præſervatione præſcripi:

24. Vinum ping. minutim incl. no. iv.

30. Sem. fœni conf. 3i.

Cardam. pulv. ʒij.

Cum l. q. Syr. Flor. Tanic. & Spiritus Lil. convall.
l. Eleutherium.

De quo omni mane capiebatur quantitate Nucis Juglandis jejuno stomacho, deſuper ſorbendo quantum placet de Juſculo calido.

Externè rapiti imponebat ſequens emplaſtrum:

24. Empl. de ran. cum Mercurio q. l.

Malaxabatur cum l. q. Balſ. Peruviani in Viſella Ovi ſolati, & ſuper alatum extenſum ſub Mitra parva ſemper geſtabat, cum uſu præſati Baſami.

Sic hæſteus benè ſe habuit, ut ſpes fit, continuato uſu horum Remediſum Malum imminens præcaveri poſſe. Corpus eſt exſiccum, macrum, rugolum, hinc inutilem duxi Fonticulum.

Aliis Fonticulis in apopleſia tam præſervative, quam curative, præſertim in Senibus, vel decrepitiſ, ubi affectus catarrhales ſunt frequentes, familiariſ ſunt in uſu, & multum conferunt: & quidem Veterici ſetaturum in Nucha uſurparunt, cujus ſetacæ ad præſervandum Apoplexiam in Nucha uſum videbitis in HORSTIO lib. 1. obſerv. 14. ſed eſt Remediſum admodum moleſtum & potiùs fonticulus in Nucha inſuſus, vel homopariſ, aut etiam Fonticulus junus in brachio, alter in crure paratus, eſt egregius. Veterici etiam Fonticulum inſuſerunt in Vertice, ſed eſt ridiculum remediſum, & propter Inflammationem plerumque periculolum. Interim cum diſtinctione agendum: Nempe Apopleſia poſitiva, ſi præſtita remediſa non ceſſaverit, ſerè lethalis eſt. Saltem ergò in apopleſia privativa Fonticuli, & cucurbitule in regione Dorſi iotra Scapulas commodè adhiberi poſſunt; in poſitive enim præcavenda parum auxilii aſſerre ſolent. Unde dum obſervationes proſtant nuſce proſecutorum, nunc inſanum horum remediſum, cauſa videtur eſſe, quod nunquam obſervata fuerit differentia Apoplexiæ poſitivæ, & privativæ, v. g. qui à Carbonum Fumo cadit Apoplecticus, talis ad huiſmodi Remediſum externaliſ nullum ſperare poſſet auxilium; ubi verb ex Sanguine grumuloſo, & ubi ſuſpicio eſt poſtæſis plus minus Lymphæ, diſta auxilia chirurgica multum adierunt commodè.

Denique Ratiſvia in declinante Apopleſia pro eradicatione Morbo non incipit à BARBETTE in præſi proponitur, & à DECKERO in commentis commendatur pag. 23.

Superiùs dictum, quod Apopleſia ex univerſaliſ in particulariſ, nunc præſtata, quoc pluria membra occupantem, tranſit, quare ſic

ARTICULUS II.

De Paraplegia.

Quod Paraplegia: hæc nunc apoplexiam ſequitur, ſicque Morbus ſecundarius eſt, nunc vero per ſe inchoat ſine præcedente apopleſia, utut plùs minus alios Morbos ſequatur, eſſus Apopleſia Particulariſ. Notabiliſ eſt permutatio illa, cujus meminit FORESTIUS lib. 1. obſerv. 10. ubi apopleſia mutata in paralyſin, (ſcilicet in Apoplexiam) deinde in epilepſiam, & ex ea deſcendit in Apoplexiam lethalem. Sanè apopleſis, & huc natæ paraplegiæ, ac Epilepſiæ ſingulariter habet, & mutuum convenientiam, & quali in radice identitatem. In modo ſupra ſaltem, aut affligendi differunt: hinc & permutatio motuum earum, & quoque in cura remediſum identitas. Hinc certè GORÆUS in defini. Mediſis inquit: paraplegiam ſignificare HIPPOCRATI Paralyſin, quin apoplexiam, vel epilepſiam ſuccedat. Non enim rarum eſt, Epilepſiam in paraplegiam mutari, & contrà: ſic epilepſiam, que in paralyſin totius ſerè corporis, excepto Brachio dextro, abiit, in quo ſenſus, abſtato Motu, perierunt, vocat HILDESHEIM in ſpiciſſe, de afflic. Capitiſ cap. 7. Item SCHENCKIUS in obſervat. refert, Epilepſiam ex Terebre contractam, poſt bincum in Paraplegiam alterius lateris tranſiſſe, nihilominus ſingulis membris circa novulum affligent: Item FONTANUS Reſponſ. ex carat. lib. 1. pagina 31. paraplegiam Oculi ſiniſtri poſt epilepſiam in Gravidâ obſervat, quæ poſt partum Gemellorum mortuorum apoplectica interit: HORSTIUS lib. 2. obſervat. 41. notat ex epilepſia Para-

plegiam lateris dextri, & hinc deinde Inſultus epilepticos. Pertinet huic notabiliſ obſervatio Aſoni 6. & 7. M. A. N. G. obſervat. 212. ubi mutuo paralyſis, & Epilepſia ſe exceperunt; Item confirmat huic BARTHOLOMÆUS ſententia 4. obſervat. 3. dum paraplegiam lateris ſiniſtri, & convulſionem lateris dextri in Febre Petechiali adnotat. Sanè non ſecut in apopleſia, & Paraplegia, quam Epilepſia, ſimul abſque Convulſivis ſubſeſſe videtur: Notabiliſ hic eſt HILDANI obſervatio 4. ſententia 1. ubi ex ſola Nervuli in Aſure irritatione, ob immiſſum Globulum, Stupores qualiſ paralyſici, Dolores, & Atrophia Brachii illius lateris, ac tandem epileptice Convulſiones excitabantur. Ex irradiatione iſta, quid aliud quam ſphaſmas fieri poſuit? Similem Obſervationem de dolore, & ſupore cum ejuſdem Atrophia ex corallina ſphaſura in Aſore illaſſa refert SCHENCKIUS in obſervat. abſe de anſiam Meritis. Huiſmodi Paraplegiæ, quæ apopleſiam, Epilepſiam, alioque Morbos immediate ſequuntur, vulgò Paralyſes vocantur, & hoc nomine tranſiunt Theoriam earum, ac præſi prædicij, præſertim Veteres. Omoium loco ſufficiat WILLIUS de Anima Brutorum part. 2. cap. 9. cum tamen, propriè loquendo, paralyſis longe alius Affectus fit ab illis Apopleſiis Particulariſ, ſive Paraplegiis, ut infra Artic. 3. monſtratur. Præſi hoc obſervatur in Anthrax leſione, qui ordinariè Paralyſes, & Paraplegiam conſequentur, onaque Methodo Theoriam, & Præſi tranſiunt.

In Hemiplegia, & multo magis Paraplegia, ſive Apoplexiam, ſive alium ſimilem ſequatur affectum, & malè paralyſis, vocatur, tres huius Grados obſervandi ſunt.

1. Enim Motus ſolum deſiſſe ſuperſiciſ Senſus.

2. Senſus, & Motus plane deſiſſent in parte, reſiſtente tamen adhuc Partu Calore naturali.

3. Illiſ deſiſſentibus etiam calor Partu tranſiſſe, itaque ſimul ſerè continud frigida percipitur, quam conſiſtentionem Partis inſequi ſolet cuſus Flacciditas notabiliſ, ac Molliſ, & hinc Marasmus.

Differunt hæc Paraplegiæ ſecundum magis, ac minùs, prout majus, & minus eſt impedimentum in nervis.

CAUSÆ.

Quod Cauſas Paraplegiæ: communiter obſtructionem Nervorum acculant, quæ tamen nec cum Modo ſiſſent, nec cum Cura benè convenit. Saltem non univerſaliſ Cauſa hæc eſſe videtur; ſiquidem, & per Conſenſum aliarum Partium reparatur Paraplegiam heri obſervatum ſuit: Nempe ſicut aquum eſt, quod gravioreſ Paſſiones huiusmodi ſubinde epileptice convulſiones ſuperveniant; ita iſdem Paralyſis, & Hemiphaſis ſupervenienteſ obſervatum ſunt, in ſpecie à QUERCETANO in ſetate graviffimorum Afflic. Item Lamberti uti convulſiones, & Epilepſias excitant, ita etiam ad paralyſes terminantur, teſte SALMUTH in ſententia 2. obſervat. 45. Hinc etiam Apoplexiam Paraplegia lateris ſiniſtri, & convulſio dextræ inſequeſ ſecutur: Vid. SCHENCKIUS in obſervat. Ut taceam Paraplegicos deſperatos quodaſ ſubinde ex graviſſi animi parhamata, ita vel Terrore, ex improviſo curatos fuiſſe, auctore HORSTIO lib. 11. obſerv. 13.

Ad hoc quoque Paraplegia illæ præſi rationis nuſce privativæ, nunc poſitive eſſe videntur, & in his poſitiveſ aliqñd convulſivis omoium intercedere, diſta modo Ratio, & cum Aliſ ſectibus convulſivis, faciliſ Permutationes, omniaſ perſuadent. Sed cum in ſpecie Apoplexias non lethales ſerè ordinariò inſequantur Paraplegiæ, huius Permutatiſ ratio eſt inquirenda. Equidem Apoplexiam Sanguinem univerſalem, quæ ex ſanguinis extravafatione evenit, utplurimum lethalem eſſe exiſtimo. Aliis Sanguinem privativum, quem tantum ex Motu ſanguinis intercepto in Valis cerebri oritur, ſi Univerſaliſ fit, quomodo in Paraplegiam tranſiret, ſanè obſcuriſſimum, niſi forſan Venectico largior, ſanguinis Motum promovendo, ſaltem alterius cerebri lateris affectum particulariſ reddat, qui antè Univerſaliſ erat, ita ut ſaltem in altera cerebri medietate, aut ſaltem circa nervorum exortum, & ſanguinis conſiſtentia, & tranſigentium inde Valorum vitiò, Paraplegiæ oriatur. Imò ſi & popleſia privativæ Sanguinis paraplegia ſuperveniat, probabile eſt ex ſanguine conſtagnato, & lubiſcente plus minus Laticem aquoſum ſecſe fecerim, & vel interius profundius poſteoralle in cerebrum per caudicem medullarem vel exteriorè deſuſſe ſecundum duſum ſpinaliſ medullæ, & ita uniùs, alteriùs Nervi læſione, vel oppreſſione Paraplegiam inſequeſ. In privativa verò Lymphatica, aut huic cognata, ſi unquam obſervetur, privativæ Apopleſia, Lymphæ

Ernae an. ʒij.
Carden.
Cubebae an. ʒij.
 Cum l. q. Conf. Alchem. vel Syr. flor. Tonic.
 f. Electuarium:
 D. S. ut antè.

Vel
 ʒ. Conf. flor. Anthos.
 Tonic. an. ʒij.
 Mor. Ind. candid. ʒij.
 Conf. Alchem.
 Sem. Sinapi an. ʒij.
 Spec. Diacubae ʒi.

Cum Brod. Noct. Ind. f. Electuarium.
 D. S. ut antè.
 Vel

ʒ. Conf. flor. Anthos.
 Sals. an. ʒij.
 Conf. Alchem. ʒij.
 Caffer. pulveris.
 Spec. Dia Amb.

Dia-Melich. dale. an. ʒi.
 Cinab. Antimoni ʒij.
 Ol. defill. Saccini ʒij.
 Cum l. q. Syr. Flor. Tonic. f. Electuarium
 D. S. ut suprà.

Vel
 ʒ. Spec. Dia Amb.
 Dia-Melich. dale. an. ʒi.
 Cum l. q. Sacch. in aqua Salviae fol. f. Rotulae
 adspargenda cum
 Ol. defill. Cubebae. vel Salviae
 D. S.

Rotulae Cephalicæ.
 Conf. Idea Formul. Class. 1. §. 6.
 Quotiesq. pertinet D. Kallii Mixture preservan-
 tibus ad Aspilexii. Compositio ei hæc:

ʒ. Spec. Dia Amb.
 Dia-Melich. dale. an. ʒi.
 Margar. prop.
 Corall. rub. prop. an. ʒi.
 Saccini alb. prop. ʒij.
 Conf. Alchem. ʒij.
 Extr. Rad. Helleb. ʒij.

ʒ. Calam. arom. ʒij.
 Pan.
 Ligni Alas an. ʒij.
 Ol. defill. Salviae

ʒ. Rosmar.
 Succia. an. gutt. xv
 Lavend. gutt. xi.
 Spica.
 Anisi.
 Funicul.
 Macis.
 Mor. Melich. an. gutt. xij.
 Cubeb. id
 Caryophyll. an. gutt. viij.

Rosa gutt. vi.
 Sacchar. optimo ʒij.
 M. f. Pulvis.

D. S.
 Saccharum Apoplecticum.

Sed observetur, quod Semen Sinapi & Ernae imprimis
 his addenda sunt.
 Hæc intra tam intra, quam extra Paroxysmum con-
 veniunt.

Inter Emacoria, extra Paroxysmum usurpanda, prima-
 tum obtinere Somnolia, & quidem Antimonia, ut suprà
 monui, quæ inter

Mercurius Vitæ, Tartarus Emeticus, &c. præscribi po-
 test: exem. grat.

ʒ. Tartari Emor. Myrs. gr. ij.
 Sal. Ammoniac gr. ix.
 M. f. Pulv.

Vel
 ʒ. Tartari vitriol. gr. vi.
 Emor. Myrs. gr. ij.
 Scamm. sulphurat. gr. i.

M. f. Pulv.

Præter Vomitorium conducunt etiam Purgantia, exem.

grat, Helleborus niger, Pilula Fœtidæ, Cochis, Pilula

Proprietatis Myrsicis, Pilula Polychrestæ eiusdem, Extra-
 ctum Hellebori ocrei, Agarici, Intererius dulcis: quibus pro
 stimulo sensus Extraclum Colocythidis, vel Albandi
 legitime paratum, addendum est: quæ etiam semper ad
 præcavendam Recidivam necessariæ sunt Purgantia: Vid.
 CORTHNUMMIUS loc. citat. cap. 70. Sequentes Pilulas
 Avic. materiam præcipi:

ʒ. Mass. Pilulas. de Sacc. Cras.
 Extr. Alband. an. ʒij.
 Trach. Alband. gr. i.
 Ol. def. Saccini gutt. ii.

Cum ʒ. Prim. veris f. Pilulas.

Vel

ʒ. Mercurii dale. ʒi.

Scamm. sulphurat. gr. v.

Cum Conf. flor. Tonic. f. Bolus:

D. S.

Saccharum Purgans pro una dosi.

Item conducunt Pilulae ex Mercurio dulci cum Extracto
 Hellebori nigri, suprà cap. 2. Artic. 2. ubi de Epilepsia, præ-
 scriptæ.

Vel

ʒ. Mass. Pilulas. de Trich. Raf. ʒij.

Extr. Helleb. nig. gr. v.

Tartari vitriol. gr. iij.

Cum Ol. defill. Carvi f. Pilulas.

D. S.

Pilulae.

Vel

ʒ. Gummi. Ammoniaci dale. ʒi.

Edell. in Acor. fol. an. ʒij.

Vitriol. Martis al. albed. calc. ʒij.

Mag. Gum. de Peru gr. xv.

Scamm. prop. Brandel. ʒi.

Extr. Trach. Alband. gr. vi.

f. Pil. infus. Franc.

D. S.

Pilulae Emollientes, pro aliquot vicibus.

Dosis Num. xv.

Tenderisera ex Ligis declinate Paroxysmo aliquandò con-
 tinuata, sunt maxime proficua.

Si his remediis non satisfacimus, scopo, etiam Curatibilia,
 Sacca. Ferulici, & similia adhibeamus.

Vix quidam in decrepitate ætate ultra septuaginta annos
 constitutus, alias sanus, sed inordinatè monique regula-
 tæ, utot non lastæ, Dixerit, adfectus, aliquando cum lo-
 cis extra Urbis portas ambulans, sine reatu & motu, sicut
 coenuebat totus pallidus, ab adstantibus denuo excitatus,
 quid totum adum, ferè nesciebat. Debilitatus tamen, & ob
 sobolibus difficultatem aliquoties desiderè enatus, denuo
 intra Cavitate revertebatur. Intercedit aliquot septima-
 na, cum interea semper commodè habuisset, Tempium po-
 tens, simili ratione ex improvis denuo conturbat, sed Rai-
 famis & Aquia Anæsthepsia restituit, domum lentogia-
 du petebat. Aliquoties hoc accidebat, donec ingravescente
 Malo extra privatos patientes ipsi videri vix liceret, quæ
 ex levi Corporis morbo vix communi deambulatione interce-
 penne, & simultanea colligens Quædam afflicta, fuit impet-
 petu non tam corrumpere, quam quidam videretur, sensu &
 motu carens; hinc Tabernaculum mercatorum aliquando
 ingredens, ex simili Corporis prostratione Natu tam fort-
 titer mente allidebat, ut unquam eius afflicta substantia
 sine perceptione dolorosa persistingeret. Cum ergo tempore
 hyemali de Paroxysmi huius apoplectici Intuitu sollicitum
 me consulere, sequenti ordinavi:

ʒ. Spiritus. Sol. Ammoniaci.

Curas Curas essent. an. ʒij.

Misc.

De quo capiebatur quotidie ter, guttas xxx. vel xxxv. misce
 in Vehiculo calido, à meridie in frigido: una cum hoc præ-
 scriptis:

ʒ. Ol. def. Saccini ʒij.

Caryoph.

Macis an. ʒij.

Nec. Melich. exp. q. f.

M. f. pro Balsamo.

Hoc mane & vespere Tempora, Verticem, Nucham, &
 regionem Stomachi inungebat: ut nec tam crebro, nec atrox
 Paroxysmus fuit.

Appetente verò verno tempore ordinari, præmissis Di-
 gestivo salino, Purgationem Antimonialem cum Extracto Pa-
 chymagogo, quo pluries exerceat cum levamine, hinc in-
 ternè pro preservatione præscripsi:

ʒ. f.

24. Finem ping. minutim inci. no. iv.

addo

Som. sinapienf. 3i.

Cordam. pulv. 3ii.

Cum l. q. Syr. Flor. Zinz. & Spiritus Lil. convall.

l. Electuarium.

De quo omni mane capietur quantitate Nucis Juglandis jejunio stomacho, deinceps solvendo quantum placet de Jusculo calido.

Externè capiti imponatur sequens emplastrum:

24. Empl. de ran. cum Mercurio s. l.

Malabarum cum l. q. Bals. Peruviani in Vitello Ovis sumi, & super altum extensum sub Mitra parva semper cellabat, cum ulu præfati Balsami.

Sic hædenu bene se habuit, ut spes fit, continuato usu horum Remediorum Malum imminens præcaveri posse. Corpus est esaliacum, macrum, rugulium; hinc isentilem duxi Fonticulum.

Alias *Paresis* in apoplexia etiam præservativè, quam curativè, præsertim in Scrobis, vel deceptis, ubi affectus catarrhalis sunt frequentes, familiari sunt in usu, & multum conferunt: & quidem Veteres *Stacum* in Nucha usurpant, cuius Stacei ad præservandum Apoplexiam in Nucha usum videbitis in HORSTIO lib. 1. observat. 14. sed est Remedium admodum moleculum potius fonticulum in Nucha infusus, vel homoplasii, aut etiam Fonticulus unus in brachio, alter in crure paratus, est egregius. Veteres etiam Fonticulum iniecerunt in Vertice, sed est ridiculum remedium, & propter Inflammationem plerumque periculolum. Interim cum distinctione agendum: Nam Apoplexia positiva, si præstitis remedia non cessaverit, ferè lethalis est. Sætem ergo in apoplexia privativa Fonticuli, & cucurbitule in regione Dorii intra Scapulas commodè adhiberi possunt; in *positiva* enim præcavenda parum auxilii afferre solent. Unde dum observationes prostant nunc proficiorum, nunc inasium horum remedium, causa videtur esse, quod nunquam observata fuerit differentia Apoplexiæ positivæ, & privativæ, v. g. qui à Carbonum Fumo cadit Apoplecticus, talis ab humido Remediis externis nullum sperare potest auxilium; ubi verb ex Sanguine grumoso, & ubi fulcipio est peccantis plus minus Lymphæ, dicta auxilia chirurgica multum adiectione commovent.

Denique *Salivæ* in declinante Apoplexia pro eradicando Morbo non ineptè à BARBETTE in praxi proponitur, & à DECKERO in remota commendatur pag. 23.

Suprà dictum, quod Apoplexia ex universalis in particulari, nunc pauciora, omne plura membra occupantem, transeat, Quare sit

ARTICULUS II.

De Paraplegia.

Quod Paraplegiam: hæc nunc apoplexiam sequitur, sicque Morbus secundarius est, nunc vero per se inchoat sine præcedente apoplexia, utut plùs miùs alios Mæchos sequatur, effusus Apoplezia Particulari. Notabilis est permutatio ista, cuius meminit FORESTIUS lib. 1. observat. 80. ubi apoplezia mutata in paralyin, (scilicet in Paraplegiam) deinde in epilepsiam, & ex ea denovo in Apoplexiam lethalem. Sæm apoplezia, & hinc nate paraplegia; ac Epilepsie singularem habent, & motuum convenientiam, & quasi in radice ideotatem. In modo scendi saltem, aut assignandi differentiam: hinc & permutatio motuum eorum, & quoque in cura remedium identitas. Hinc certè GORÆUS in definit. Medicis inquit: paraplegiam significare HIPPOCRATI Paralyin, quia apoplezia, vel epilepsie succedit. Non enim rarum est, Epilepsiam in paraplegiam mutari, & contrà: sic epilepsiam, quæ in paralyin totius ferè corporis, excepta Brachio dextro, abiit, in quosensum, ablato Motu, perierunt, notat HILDESHEIM in spicula de aff. Capiti cap. 2. Item SCHENCKIUS in observat. refert, Epilepsiam ex Tereore contrariam, post biennium in Paraplegiam alterius lateris transisse, nihilominus singulis mensibus circa novilunium affligens: Item FONTANUS Respons. & curat. lib. 1. pagina 32. paraplegiam Oculi sinistri post epilepsiam in Gravidâ observat, quæ post partum Gemellorum mortuorum apoplectica interit: HORSTIUS lib. 2. observat. 41. notat ex epilepsia Para-

plegiam lateris dextri, & hinc denovo infusus epilepticus. Pertinet hæc notabilis observatio Anno 6. & 7. M. A. N. C. observat. 212. ubi mutuo paralyia, & Epilepsia se exceperunt; Item confirmat hæc BARTHOLINUS cœnaria 4. observat. 3. dum paraplegiam lateris sinistri, & convulsionem lateris dextri in Febre Pectechiali adnotat. Sæm non secus in apoplexia, & Paraplegia, quàm Epilepsia, simul aliquid Convulsivæ lutebisse videtur: Notabilis hic est HILDANI observat. 4. sententia 2. ubi ex sola Nervuli in Auzre irritatione, ob immensum Globulum, Stupores quasi paralyici, Dolores, & Atrophia Brachii illius lateris, ac tandem epilepticæ Convulsiones excitantur. Ex irritatione ista, quid aliud quàm spasmi ferè potuit? Similem Observationem de dolore, & stupore cum eisdem Atrophia ex corallina (sphecula in Auiem illapsa refert SCHENCKIUS in observat. ubi de aurium Morbis. Huiusmodi Paraplegia, quæ apoplexiam, Epilepsiam, alioque Morbos immediate sequuntur, vulgò Paralyticæ vocantur, & hoc nomine tradunt Theoriam eorum, ac praxin prædicant, præsertim Veteres. Omnium loca subiecit WILLISIUS de Anima Brutorum part. 2. cap. 9. cum tamen, præposu loquendo, paralyin longè alius Affectus sit ab istis Apoplexiis Particularibus, sive Paraplegiis, ut infra Art. 3. monetur. Probè hæc observat in Anthemon liliatis, qui ordinariè Paralytes, & Paraplegiam consensunt, unaque Methodo Theoriam, & Praxin tradant.

In Hemiplegia, & multo magis Paraplegia, sive Apoplexiam, sive alium similem sequatur affectum, & malè paralyis, vocatur, res huius Gradus observandi sunt.

1. Enim Motus solum deficiit superfluo Sensu.
2. Sensus, & Motus pluri deficiunt in parte, resistunt tamen adhuc Partis Calore naturali.
3. Illis deficientibus etiam calor Partis transiit, eoque simul ferè continuo frigida percipitur, quam constitutionem Partis iniqui solet ejus Flacciditas notabilis, ac Mollities, & hinc Marasmus.

Different hæc Paraplegia secundum causam, ac minùs, prout majus, & minùs est impedimentum in nerva.

CAUSÆ.

Quoad Causas Paraplegia; communiter observationem Nervorum acculant, quæ tamen nec cum Modo hendi, nec cum Cura bene convenit. Sæm non universalis Causa hæc esse videtur; siquidem, & per Consensum aliarum Partium reparatur Paraplegiam ferè observatum ferè: Nempe sicut notum est, quod graviores Passiones Hypericæ subinde epilepticæ convulsiones superveniunt; ita videm Paralytes, & Hemiplegias supervenisse observatum fuit, in specie à QUERCETANO in tractatu gravissimum afflicti. Item Lombrosi uti convulsiones, & Epilepsias exant, ita etiam ut paralytes terminantur, teste SALMUTH in cœnaria 2. observat. 45. Hinc etiam Apoplexiam Paraplegia lateris sinistri, & convulsio dextre inleceat fuerunt: Vid. SCHENCKIUS in observat. Ut taceam Paraplegicos desperatos quoddam subinde ex gravi animi pathemate, ita vel Terrore, ex improvilo curatos fuisse, auctore HORSTIO lib. 21. observ. 15.

Adhuc Paraplegia istæ profundæ ratione nunc privatur, nunc passiva esse videtur, & in his positiva aliquid convulsivum omnino intercedere, dicta modo Ratio, & cum Affectibus convulsivis, faciles Permutationes, omnino perfundent. Sed cum in specie Apoplexias non lethales ferè ordinariè inlequantur Paraplegia; huius Permutationis ratio est inquirenda. Equidem Apoplexiam Sanguineam universalem, quæ ex sanguinis extrastatione evenit, ut plurimum lethalem esse existimo. Alias Sanguinea privativa, quæ tantum ex Motu sanguinis intercepto in Vasis cerebri oritur, si Universalis sit, quomodò in Paraplegiam transeat, sæm obsecrosum, nisi ferè Venæ cunctis largior, sanguinis Motum promovendo, saltim alterius cerebri lateris affectum particularem reddat, qui ante Theoriam erat, ita, ut saltem in altera cerebri medietate, aut saltim circa nervorum exitum, & sanguinis consensientis, & torgecentia inde Valorem vicio, Paraplegia oriatur. Imò si Apoplezia privativa Sanguinis paraplegia supervenerit, Probabile est ex sanguine congruato, & lubidissime plus minus Laticem æqualem fecisse scissum, & vel interius profundius pectorealis in cerebrum per eandem medullam vel exteriorè defluxisse secundum ductum spinalis medullæ, & ita unius, alteriusve Nervuli lacione, vel oppressione Paraplegiam intulisse. In privativa verd Lymphatica, aut huic cognata, si unquam observetur, paretis Apoplezia, Lymphæ

phæ Materie peccantis in caudicem medullarem interiora versus progressus, adeoque obstructions, vel ejus secundum radicem spinalis Medullæ defluxus, & certis in locis compressio, paraplegiam inferre potest, ut satis plausibile videtur. *Iam forsitan aliquandis brevibus contractionibus Filicrum, & Membrarum circa principium nervorum originem subministrare, & hinc sufficientem spirituum influxum impedire, poterit.*

Positivam apoplexiam etiam excipere Paraplegiam, res nota est, sed raras est admodum obcurus. Elle rursus Paraplegiam contrahuntur partium nervosarum circa radicem spinalis Medullæ, qua impeditur spirituum pro motu transitus, ut HELMONTIUS asserit, non improbabile est: sed quomodo sint? revera intricatum. Interim tamen sicut Calculus erus in rene subinde istius lateris stupidum, & semiparalyticum reddit, aut quando colicam tertulinorum convolvam ex improviso, vel Crurum paralyticis, aut hemiplegia insequuntur, si causa materialis communicetur, ex simplici partium Nervosarum congestu; ita similiter probabile est, per congestum Nervorum, eorumque Fibras circa sui radicem in Caudice medullari, aut in hujus progressu contractas, spirituum sufficientem pro motu impeditur influxum, hocque Partem, ad quas istius Nervi distribuuntur, sensu, & motu plus minus privari. Ex hoc enim Permutatæ ratio Affectionum Paralyticarum, & Convulsivarum, & eorum identitas, optime explicari possunt.

PROGNOSIS.

Ex his patet *Prognosis de Cura Hemiplegiarum, & paraplegiarum*, nempe pro varietate graduum plus, vel minus gravis est cura.

Paraplegia quævis malum difficile est curatu.

Primus Gradus levissimus est, & qui ceteris paribus facilis curatur; *altimus gradus* difficilissimus curatu, & etiam gravissimus, & periculosissimus est.

Si parti paraplegia correptæ, vel *Tumor* superveniat, aut *Fermutatio* sensus, aut *doloris* molestia, bonum signum est pro restitutione.

Quo magis calve Membri paraplectici deficiit, eò minor spes superest.

CURA.

Quod *Curam* harum Apoplexiarum particularium: In hac eadem serè, que in Apoplexia Universalis curanda observanda sunt. *Remedia* verò ipsa *Appropriata* sunt eadem, que *Epilepsia*, aut *apoplexia* medicantur.

Potius in quavis paraplegia est optimus, idque quando eadem supervenit Apoplexia positiva, & quidem forte necesse est vomitari; quem in finem *Mercurius Vius* cum *scammonia sulphurata* ab HARTMANNO in *Prax. Chymiatr.* laudatur; v. g.

℞. Mercurii Vici gr. ii.

Scammonii sulphurati gr. iij.

Cum Conf. Flor. lugolli. E. bolus.

D. S.

Saccharum emeticum pro una dosi.

Sin Vomitoria non velint apparere, instituantur sortes *Purgantes*, quibus addenda est semper stimulus acris ex *Colocythide*. Vel

℞. Res. Jalap. ℞.

Dissolv. cum f. s. M. Ovar. diluatur cum

Aquâ Tamar. ℞i.

Chama. ℞i.

M. S.

Lac porgant.

Item subinde necesse est, ut *Venefectio* institueretur, sed in latere opposito, non tamen semper magis necessaria est. *LINDANI* verba sunt: *Venefectio* institueretur, ut *Placida* ad se magis legatur, & pro his talis curatio: *maie* faciente, quod in principio sanguinis mittimus: *Barum* vomitorium propinandum, idque ab initio. Adeoque Vomitoria imprimis in paraplegia, que sequitur Apoplexiam Positivam conveniunt. Sicuti *Venefectio* magis locum habet in ea, que sequitur post Apoplexiam Privativam: ubi etiam *Venefectio*, item *Venefectio* mittimus admodum, & *Convulsiones* scilicet intra icipibus conveniunt. Utrobique verò *Venefectio* adhibenda in *Placida*, non in quibus solentis quodam Sanguinis excreto superest fuerit.

Hic, & similibus præmissis, inter *Remedia interna* præ ceteris *Sudorifica* laudatissima sunt, nunc *Communia*, nunc *Specifica*. *Communia*, seu generalia ista in Apoplexia con-

mendata sunt speciatim *Salia Volatilia* in paulo majiori dosi, & *Spiritus* sanguinis humani, *Cranii* humani, & similia, in paulo majiori dosi; nempe *Spiritus* ad integras drachmas, *Salia* à ℞i. ad ℞i. *Liquor Cereæ Cervi foetantis* est egregius, *Locorum Veteres* etiam usurparunt: Decocta sudorifica Lignorum, que interpositis *Appropriatis* sunt optima. Speciatim *Dicellum Ligni Jassifrae* egregie confert, ex quo, & *Bacis Juniperi*, vel *Lauri paratum Dicellum* efficaciter paralyticum reficitur, teste *POTERIO* *Cent. 2. observ. 16.* Item *Dicellum Jassifrae* cum *Rosmarino* imprimis convenit, quod singulare quod obtinet in hujusmodi Nervorum Affectionibus. Item *Helleborum*, etique *Radix*, didici decedat additum, bene convenit; v. g. ad imitationem *POTERII præcepti*:

℞. Raser. Ligni Jassifrae ℞i.

Herb. Rosmar. rer. M. j. vel ii.

Racer. Jassif. rer. Jassif. vel Lauri ℞i. vel ii.

Coqu. in Vini, & Aquæ ana ℞i. per Alembicum marie in Cucurbita cum f. s. Balneo munita;

Colaturam, & destillatam misce, adde

Spir. Racer. Junip. ℞i.

Sal. Ammoniaci ℞i. ad onc. ℞. vel ℞i.

Sp. Racer. Tonic. unc. ℞. vel q. s. pro grato sapore.

M. S.

Potio articulos confortans.

De qua Potione ter, quotidie, mane, à meridie, & ingravescente nocte bonum haustum capiat *Ager* aliquandiu, blandum Sudorem expellendo.

Specimen vero sudoriferum fuit Aurum diaphoreticum Jovi, Cinnabaris antimonii, crystallis, Cranio humanum. Jovi diaphoreticum certè in frequentissimo usu habuit *POTERIUS*, & elegantes curas in Paralyticis præstitit. Parvum, vel et auro per amalgamationem calcinato, vel Aurum Pulminum cum duplo Florum Sulphuris in mortario lapideo optimè mîscetur (cavendo, ne fortiori trituratione illud incalcescat, & fulmineet); in crucibulo prunis ardentissimis in Pulverem purpuream vertitur: cum spiritui Vini rectificatissimo adest per quindecim dies blando calore digeritur, & spiritui hoc, aut per destillationem aut per distillationem, separato, ad usus convenientes affertur. Abique calcinatione etiam cum Floribus Sulphuris solum digestionem cum spiritu Vini rectificatissimo, vel Auri, & *POTERIUS* & cum eo *ZWELFERUS*, hoc Aurum diaphoreticum præparant; ita tamen ut prior quatuor solum dierum, posterior aliquot septimanarum, digestionem adhibeat, atque commendat. Sicuti alias idem cum *Mercurio antimonii* præparavit nobilior modis, & effectus: *Við. POTERIUS* quoad descriptionem in *sa. Pharmaz. pagg. 116. 2. cap. 12. paginæ 456. seqq. & in Append. paginæ 599.* quoad usum, & vires mirabiles, *Við. Centur. 1. curat. 73. Centur. 2. Curat. 66 & 77 & Centur. 3. Curat. 12. Hoc à gr. v. ad ℞i. in conserva quadam propinquitur: in Vehiculo enim liquido ad fundum cedit Aurum diaphoreticum; Sic grana sex hujus Auri assumpta cum sensibili quadam alteratione circa præcordia, Sudorem cum aliquo somnoientia inferant. Aliquando Viro adulto affectu quasi paralytico correpto dedi duas doses *Auri diaphoretici* cum *Conferva Theriacali* prima dosi cum blando sudore Terminata. Abi dominet, & mirabilia excreta excitavit, altera vice vires copiosum sudorem emanare fecit cum euphoria. *Modos præscribendi est:**

℞. Conf. Flor. Theriac. ℞i.

Salsip. diaph. gr. xv. ad ℞i.

M. t. Bolus:

Div. in 2. partes æquæ. S.

Saccharum sudoriferum.

Assumpta una dosi hauriatur de super spiritus Theriacalis cochleari, vel ii. & ita per sudorem repetitam, præmissis præmittenda, malum curabitur.

Vel

℞. Cran. hum. præp.

Unc. rer. præp. an. gr. iij.

Auri diaph. ℞i.

M. S.

Pulvis confortativus.

Vel

℞. Cran. hum. præp. ℞i.

Crall. raser. præp. 20. gr. xv.

Auri sulm. gr. iij.

M. S. ut antè.

Vel

℞. Cran. hum. præp. ℞i.

Idem.

Ulin. ver. prop. an. xii.
Aurif. fulm. gr. iv.
Salis volat. viperar. gr. vi.
M. S. ut antè.

Quod cinabarinum autem verò, loco Auri Diaphoretici egregia est recte parata. Hanc datur à gr. xv. ad ℥i. nunc solitarie, nunc cum Olibis humanis præparatis, nunc cum sale volatili Granuli humani & similibus, idque repetatur crebro usu.

℥. Cinab. animosii gr. xv.
Succin. catarrhal. ℥b.
Salis volatili. succini gr. v.
M. S. pulvis.
M. S. ut supra.

Accipiat in vehiculo appropriato, & expectetur sudor.

℥. Cran. human. prop.
Cereb. rub. prop.
Cinabarin. animosii an. ℥b.
Olei dissoluti. cinamom.

Caryoph. an. gutt. l.
M. S.

Pulvis Cephalicus,
 Vel

℥. Aqua ceref. nigr.
Lil. convall.
Mentha an. ℥i.
Spiritus ceref. nigr. ℥vi.
Cinab. animosii ℥b.
Salis vol. cerui gr. xv.
Syr. Flor. Tauri. ℥i.
M. S.

Potin Cephalica.
 Cum his Internis optime simul Exteriori regioni Spinae Dorsæ, item verticis, aut saltem loco unde exoritur Nervus partis affectæ, illinenda conveniunt; Unde in Manus Apoplexia admoveantur Nuchæ, in Apoplexia Crurum Olli Sacro, regioni lumborum, & similiter. Ipsa Membra apoplectica illinenda superfluum videtur, cum malum illis non hæreat, sed ipsa saltem passim se habeant. Hæc inter conveniunt Olea dissoluta (nam Expressa, per infusionem, aut Pinguis mucilaginosam non penetrant) vel Spirituosa, vel Emplastra. Olea dissoluta quod attinet: talia sunt verò gratia Oleum dissolutum (sacri), Lavendula, Spica, galbanum Paracelsi quibus petroselin album nativum, ut etiam petroleum cum cineribus dissolutum, potest addi. Juxta hæc in usu sunt Spirituosa, ut Essentia ex Infusis nervorum, & Aqua articularis ad extra, i. e. Spiritus Vini, assuflus simplicibus nervinis aromaticis, & aliquot cohibitis abstractis, quæ vel solitarie, vel mista cum parte dimidia vel tertia Spiritus salis Ammoniaci cum calce viva & Spiritu Vini parati. Per Aquis articularibus ad extra quidam

℥. Sem. Junep. p. l.
Racc. Junep. p. il.
 Contusa infundunt in Spiritu Vini, eundemque impregnatum Partibus affricant: pro quo scopo & ipsum magna simpliciter adhiberi potest.

Item Essentia cæsteræ, extracta cum aqua spirituosâ Liliorum convallium cum Vinâ, pro Frictione spinæ dorsæ vel alius loci commodi calidè, est egregia, in specie post Sudores, ut poris apertis melius possint penetrari; item Spiritus Vini camphoratus ter quotidie in loco calido benè affricando parti paraplegicæ. His igitur spirituosâ aquis & Saliâ volatili, in specie Spiritus & sal volatile lumbicorum terrefrictum ac Femicarum, addi possunt. Vel

℥. Spir. Vini campher. vel Femic. vel aqua Aris.
Tom. II.

ad extra ℥iil.

Spiritus lumb. nerv. ℥b.

℥. cæster. ℥vi.

Spiritus sal. ammoniaci cum calce viva ℥iil.

M. D. S.

Spiritus externus.

Quod si spina dorsæ probè his ipsis perficatur fuerit, applicandum desuper Linimentum cum Gummi acacie probè suffragatum atque calidum: Vel premissi cum Aquis spirituosâ Frictionibus illis Olea supra laudata desuper illinenda sunt, ut apertis his mediis poris, penetrantioris efficaciam sint hæc ipsa, quibus etiam imprimis Oleum dissolutum Terebinti, & olea ex pinguedinibus aut partibus animalium durioribus dissoluta addi possunt, ut horridè fœtorem; tamen aliquoties cohobando super Caput mortuum, aut Ossa calcinata, à nimio fœtore liberantur, & utilissima sunt in quibusque Artuum affectionibus. Illinuntur hæc olea nunc ita simpliciter, nunc, ubi nimis acra fuerint, parvisque pulvisculis excitent, subigenda sunt vel cum oleo lumbicorum terrefrictum per dissolutionem, & ita illinenda. Possunt etiam fortius Frictionibus & Litiibus asperis, calidis ac penetrantioribus, illinici totæ Partes paraplegicæ, ut irritentur partes sensiles, & hujus modio provocent plurimum spirituum impetus; propter hæc ipsas partes ita resolutas his modis tractare coninetum est, & propter hunc finem distillatibus alumen plumeum, tam crassum quam, quod præstat, ex hoc paratum Arcanum aluminis Wurzi, simul addendum est in specie quando ad atrophiam seu Marasmodi membrum paraplegia affectum inclinare velit: e. g.

℥. Liq. lumb. terrefr. in distill. parat. ℥iil.

Ol. dissolut. spirit.

Junci an. ℥b.

Lavend.

Majoran. an. ℥b.

Saricid. ℥iil.

Alum. plume. ℥i.

M. S.

Unguentum Articulare.

Partibus affricant.

Qui autem acra ferre non possunt, ut scorbutici, & in quibus atrophiam membri metuitur,

℥. Ping. human. vel Asinæ, vel Bævi, Majal. ℥iil.
iv. ad vi.

Ol. dissolut. terrefr. ℥iil.

Racc. Junep. ℥i.

Spice ℥b.

M. S. ut supra.

Quibus & desuper subinde circa Locum affectum, in specie spinæ dorsæ, Emplastra ex Nervinis & Aromaticis imponi possunt, imprimis ex gummatibus penetrantibus:

℥. Gum. guth. part. ii.

Caracas par. i.

Malax. cum Petrol. in consistentiam emplastrari.

D. S.

Emplastrum articulare.

Quod in regione spinæ dorsæ agglutinandum erit.

Pertinet hæc Unguentum & Emplastrum Paralyticum Muschæ, & similia.

Alia plura remedia contra paraplegiam vid. in M. A.

N. C. Anno 6. & 7. append. pagina. 44.

Balnea denique ex Femicis, reverè singulare quid obtinent in paraplegiis curandis: Conf. M. A. N. C. Anno 4. & 5. observat. 128. pag. 137. (F)

Eccccc

AR-

(F) Ad idem Consilium, pro Hemiplegicæ ex præcedente Apoplexia factæ, conscriptum, cui à paroxysmo nec Visus nec Liber memoria usus redierat.

Neapoli 7. Aprilis 1710.

Hemiplexiam ex apoplexia relinqui minimè insolens in Medicina est; falli enim veluti manifestè evenit qua in Cerebri territudinis lateribus abscondita, sensus & Motus originem integrè afficiunt, in eis Nervos qui dimidiam tantum corporis regionem regunt; Sensus & motus in iis tantum membris vel partibus omnino, vel saltem labefactantur. Quod autem hoc accuratius attendendum, illud est; quælibet post Hemiplexiam sem faciem, Cerebrum integrè non convalescit, sed etiamnum memoria lesa, & Visus obambrare ægram afficiat. Illud verò in causa esse existimaverim, Hæmorrhæm morbosum (quicquidque illi fuerit) non omnino Cerebri interiora reliquissè, sed ex parte depositum, ex parte verò adhuc illius penetralia occupare. Quod quidem si verum sit, non solum diffinitione relictæ relictæ Morbi curationem, sed recurrentis olim Apoplecticæ paroxysmi, (quod Deus avertat) periculum minatur: spero tamen futurum, ut atate & corporis temperie valens Dominus egrediatur, acervatque egregia Præstetur, qui efficacissima adhibeas Medicamenta, ministris usus, integram recuperare valeat corporis valetudinem.

Quod ut assequi possimus medicamenta pro anni temporis ratione successu suo adhibenda, & quidam qua non tam parip

ARTICULUS III.

De Paralyfi.

Cognata pathemata sunt Paralyfi & Super; unde etiam propter summam, quam habent, affinitatem vulgo & non abique errore confusio & promiscue tractari solent. Na quod attinet paralyfin, Germani *die Lahmung* ad illam vulgo etiam referunt *Hemiplegiam*, item speciem in nominant, & *Paraplegiam*; eum tamen hæc species revera fit species Apoplegiæ, nempe Paralyfi & oriuntur ex affectu Nervis. Paralyfi vero sunt resolutiones membrorum tales, in quibus *primariis motus deficit, superflui plus minus sensu*, ob spirituum animalium motum & activitatem deest. *Super* e contra est Affectus, in quo, *deficiens in partibus sensu, superflui motus*, Græci *diambulos* (G) dictus, symptoma talis est, quod ad paralyticum Affectum nullo modo referri debet.

Hæc nimirum invicem confunduntur, quia explicantur ex Arabum & Galeni scriptis. Geminio vero sensu apud veteres paralyfi proprie significabat Latationem & resolutionem nervorum; à *vaga* & *læva*, penitus refecto, idque imprimis interprete CELSO, Medicorum nempe Ceterorum qui tempore AUGUSTI, ante GALENUM longe, in viris fuit, & in hoc puncto satis accuratus est. Nervus autem Græci dictus *παρα*, ab ipso dicitur vel *Παρα* Musculorum vel ipsam Ligamentum, quo necesse est Artus: Et id, quod nos hodie vocamus Nervum, prius generali nomine *Utriusque* complexi fuisse. Videat. LINDANUS in *colleg. phar. ad Harum.* & CELSUS.

Paralyfi ergo ex genuino sensu erit *Resolutio & Relaxatio* illius additionis, quam debet habere nervus seu tendo & Ligamentum, quibus mediantibus connectitur & proximè moventur Artus: quæ ipsa instrumenta, Tendines, Fibræ & Ligamenta, quando sunt laxiora, vel humidiora & flaccida, sunt inopia pro movendis illis partibus, & tunc dicitur Paralyfi. Talis affectus est, quem describit BONITIUS in *san. medicina* *Indorum* cap. 1. tanquam malum indici familiare, sub nomine Indico *Beriberi*: Constat etiam TULPIUS observationum. lib. 4. cap. 5. Item BARTHOLOMÆI *Alta Medica* *hæffensia*. *Volam.* 2. pagina 145. est scilicet talis Resolutio musculorum & nervorum, ne totum Corpus & eius partes moveri nequeant. Hic ergo affectus est *genuinus* *Paralyfi*, quando Tendines, & Ligamenta, & Fibræ Artuum, ita hinc inde & laxantur, ut resoluta & laxata non possint movere membra, sive nervorum Corpus, sive certas partes Corporis occupet. Nempe *casus primarius* *Motus* in Membris Paralytico, sensu plus minus superfluo, Malumque est in ipsa parte affecta, minus vero in Neris.

Ex quo facile patet, quod *paraplegia* & *hemiplegia* sint species apoplexiæ, non vero species paralyfi; paralyfi enim est proprie loquendo saltem symptoma motus læsi, cum si laxatur simul sensus est per accidens. Et propter neglectum huius distinctionis auctores nesciunt, quomodo fiat, quod pereat Moras superflue sensu? quod tamen facile cognoscere poterit, modo fiet distinctio horum ab Apoplexiæ speciebus, *quomodo autem sensus superflui possit motu deficiente*, licet utique aut eodem procedat principio, optimè declarare videtur WILLISIIUS de *anim. Brutorum* Part. 2. pagina. 280. Paralyfi ista, quæ fit *lætem* ita, ut ledatur motus, remanens sensu, est *levis*, & vocatur ordinario *paralyfi*, qualis est illa, quæ supervenit Colicæ, & qualis imprimis sæpius est in febricitante. Videat. DRAWIZIUS de *febris deliriosis*,

ubi de *paralyfi febribus*. Quando vero sensus & motus simul, vel post motum sensus etiam Partis pereunt, gravior *Paralyfi* solet esse species. Plus enim Paralyfi pertinet ad motum quam ad sensum. *Subijctum ergo paralyfi* sunt Fibræ, & Tendines, & ligamenta.

Ex dictis patet, quod *paralyfi* proprie sit Atonia Fibrarum nec earum musculorum, præcipue aut in tendinibus & ligamentis; quæ Partes propter Atoniam resolutæ, flaccidæ, molles & relaxatæ, inopie sunt, ut trahere aut convenienti robore firmare possint membrum; qui levior affectus dicitur *paralyfi*, sicut fortiori *paralyfi*.

Malè ergo & ex illa hypothesi *paralyfi* *paralyfi* Nationem vulgo indignant. Putant nempe, *paralyfi* *oriari ex obstructione nervorum*, & insequi apoplexiæ (id quod tamen dat Paraplegiam,) qualis obstructio cum non fit obvia in Partis, propterea eam Paralyfin nodum indignant; cum tamen reverà Partis Paralyfi sit species, fed levior, in qua nervi non primario, sed tantum consecutivè, affectus Fibris & Tendinibus laxatis, & ipsi afficiuntur.

Facilis aliis est *distinctio inter paraplegiam supervenientem apoplexiæ, & paralyfi*. Differunt enim (1.) Origine: Nam *paraplegia* sequitur imprimis cerebri & spinæ morbos, & frequentissime comitatur apoplexiæ, epilepsiam, convulsiones &c., cum diu affectus subsiste sine motu permutabilis, & desinit in Paralyfin *paralyfi* vero sequitur alius corporis affectus, in specie post scorbutum, malum hypochondriacum & colicam convulsivum; frequentior est Regionibus, ubi copiosius hauriunt Vinum, aut citius etiam subside à causis externis.

Differunt (2.) *subiecto*: Nam *paraplegia* primariè afficiuntur Nervi, quod exortum, in *paralyfi* vero idem in Progressu & infectione, imprimis musculi, & in specie tendines & artus. Hinc Medicamentorum topicorum diversimodis utroque affectu applicandi ratio, quæ in paraplegia magis originis nervorum partis affectus, in paralyfi ipsi parti affectus applicanda.

(3.) *Symptomata* simul differunt: Nam in *legitima paralyfi* Sensus talis nuplurimum cum motu voluntario simul perit & tollitur. in *paralyfi* vero subsiste sensus talis superfluo, quandoque etiam ut in scorbuticis, cum sensu doloris, formicante, lacerante, & simili tantummodo motus tollitur, & labescit.

Quibus addatur (4.) quod genuina nervorum resolutio seu *paraplegia* à principio ad finem eodem serè habito fit continua aut quodammodo perpetua, & crebrius medicorum operum fallant. Nam Paraplegia post apoplexiæ fuit difficillime curatione: contra *paralyfi* & *paralyfi* per intervalla *Ægri* magis & minus veniat, labescit, cessat & redeunt; quandoque cum *anæsthesia* quæ dolores complicitur, quæ quidem venit in Partis scorbuticis donec habitum in membro coarctaverint, Quin & interdum in *convulsivis* abruat, & in malo confirmato pertinaciter *Contrafractura* post se trahunt, nec tamen adeo rebelles sunt exerceant Medicis, ut *paraplegia*, quin nondum confirmata facile tolli possint. Vid. DRAWIZII *febris deliriosis*.

Quæ dicta habemus, ostendunt, quid genuina sit paralyfi. Vobis committitur in genere & abusum omnis sensus & motus in parte depravatus à quacunque causa, dicitur paralyfi: sic etiam quando ex defectu; veli gratia per medium nervo, pereunt sensus & motus in partium Vulneribus, dicitur etiam paralyfi, cum proprie in paralyfi vera pereat motus, remanens sensu, raro vero simul sensus etiam pereat; in paralyfi veri sensus & motus simul perit. Rarissimum e contra est affectus, ut pereante sensu remaneat Motus, & tunc malè quod ad paralyfin refertur, cum tamen *quidam* sit, seu *infectio*, alia *super dicta*, de quo *super* *Sæctum*, 2. cap. 3. Artic. 3. c. 1. c. 1.

CAU.

partis lale vitium emendare, quæque Cerebrum integrè restituerè aprime valent. Purgare igitur prius corpore, Messia Philorum de Succino Cratoniæ ad 3i. additis granis aliquot Entrati Catholici, ad Specifica Cephalica & nervina decrevit. Praeparati igitur paralyfi messia ex Entrati Liqui Visci quatuor, & Entronica, Sale volatili succini, & Cornu Cervi, Floribus Sali Ammoniaci, Camphora, & Ambro, iussu proportionis consopis: huius Draclmæ semis quatuor maximis horis Pillularum formæ depuratarum, superbedendo haudum decolli serla parilla, China dulcis, Scobis semis Guaiaci, & Legni Visci quatuor: postea Ager in lectulo iaceat stragulis copiosis, si fortasse sudor superveniat. His medicamentis ad 40. ut maximum dies statuer Ager, quo atriæ tempore una vel tres Vini, chalybeatis uncia pro primo potu sine, hinc lre China decolli loco communis Aqua bibatur; atque interpositis vinctis Carburica Pillula subside exhibeantur. Membra quoque affectu decubitu barbarum Cephalicorum, Balsami Nervini, præcipue vero Spiritu Ampipapayris Cuoctelli Oleo Angulorum dulcium colligere, assiduè fovantur.

Ceterum si morbus cessavit proletem auxilium esse poterit, tam pro Hemiplegia curanda, quam pro Cerebri restituito viro tollendo, si afflato tempore amittat Laberant Neapolem accedat, ut Balsami Thermiqque naturalibus propriis vi possit. De quo tamen re, & propere Remedium afflato, & accuratissimi profectus iudicium expectantes, uberius dicere supercedemus.

(G) A *privatus* Sensus privatus: ab *privatus*, & *privatus* sensus.

Causa Paralyfis quod attinet: hæc, prout à Paraplegia distinguitur, ratione causæ est vel *privativa* improprie sic dicta, vel *positiva* s. quarum illa Nervos afficit, & spirituum emanationem inhibet; hæc Narcosin seu simile quiddam spirituum Animalium aditavit turbat, præsupponit.

Causæ ergo Paralyseos revocari possunt ad duplicem classem, nempe spirituum torporem, & visum angustiam seu interceptionem. Siquidem privativa in Viatum seu Nervorum, Medullæ oblongatæ, ac Tendinum dissectione in Vulneribus, dissectione aut compressione, aliave vitio consistit; quæ cum hæc non istum Nervum sine præcedente effectu Apoplectico solent affligere: quod etiam pertinet, quando Nervorum quorundam particularium per *venæ* causas morbosæ fit obstructio, aut compressio, vel superficietens, vel tota Membranas, aut alia modum facis cognita affectio, quod minus potest sensus et motus communicari partibus, verbi gratia quando poli Variolæ retropullas aut male curatas, uti habet LOTICHIVS lib. 2. observation. cap. 1. observation. 17. qui observat Paralyfin Linguae in Infante à Variolis male curatis, aut poli Erysipellis Capitis male curatum occurrere Paralyfin Linguae. (Videat. S. A. L. MUTH Centuria 2. observation. 47.) item à Vitiis Faciei retropullis primò Arthritis, post etiam Paralyfin, & tandem brevi Mors secuta fuit, notante SALMUTH *luc. allegat.* observation. 35. quæ tandem omnes à causa Privativæ exitum Paralyseos reverà potius Paraplegia sunt, hodie confusa confusione invicem confusa, facit hæc etiam, quando per Vulnera Cerebri & Medullæ Spinalis, aliarumque partium, *dissecantur Nervi*, aut quando Nervi in Medullæ compressione, ex Læsione ac Fractura Vertebrarum inferiorum partium Dorii, aut calibus ab alto, sunt disorti aut compressi, quod observat HOFERUS, unde supervenit Paralyfis privativa cæterarum partium. His enim modis vitati Nervi denegant spirituum Animalium influxum, & per consequens sensum & motum partibus illis, in quas derivantur: unde Paraplegia potius, quam Paralyfis: Sic HOFERUS in *Mercat. Medica* pagina 19. observat Paralyfin omnium partium inferiorum ex læsione *Torturae Lumborum, & Cæca præcisa*: Ita post *saltem in Os sacrum* ex scala lapidea Paralyfin Brachii & Cruris sinistri secutam, & inunctione appropriata curatam fuisse, refert AMATUS LUSITANUS lib. 1. Curat. 19. Sic *perissimè* Capitis excitant Paralyfin vel potius Paraplegiam in opposito latere: Hinc quidam ex Arbores decidens in Os sacrum, ex bujus contusione in Paralyfin distam pedum incidit, ut hoc observat BARTHOLOINUS Gen. 5. observat. 1. Similiter Paralyfin sinistri lateris, convulsionem & Mortem, ex *contusione Sinistri Temporalis à Lapso notavimus GLANDORPIUS Specul. Chirurg. observat. 10.* Quod pertinet *Quibus* Paralyfin sensum inducens, cuius curam videb. in M. A. N. C. Ann. 2. observat. 230. pag. 333. Sed hæc ipsa modo allegata potius Paraplegiam, quam Paralyfin inducunt.

Positiva verò Paralyfis est, quæ propriè Paralyfis constituitur, & nunc ab externa, nunc ab interna continetur causa.

Externa inter nimia humectatio, ac nimia refrigeratio, e. g. *Ar frigida* s. pluvialis, indeque nata resolutio & flacciditas Fibrarum ac Tendinum, infert Paralyfin, eamque propriam: Sic eulm non solum CALENUS sed jam tempore ex mora diuturna in Aqua frigida, & ex Balneo Aquæ frigidae; sed etiam ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Præc. ad. min. observat. 34. & 37. ex diuturniore mora in Aqua frigida pluviali, item ex frequentî Natatione in Aqua frigida, Paralyseos observant. Hinc etiam *Senes*, item *Infantes*, sunt quasi semi-paralytici; quia in Infanciis Fibre & Tendines copioso rore nutritio litorant, laxæ & flaccidæ sunt, & propter deficientem robur, vix valent Membra movere; in Senibus verò deficiente rore nutritio succedit (sæpius Aquositas serosa, aut alia, quæ laxando Fibras & Tendines, tales semi-paralyticos reddit. Unde etiam ii, qui diutius in pluvia veriantur, & Vestimenta madida in corpore exticare permittunt, in uno alterove Membro sunt Paralytici, teste HORSTIO in *observat.*

Imprimis autem & *Impissidæ à causa interna fit Paralyfis* posita ex Lymphæ aqua, seu ex materia quadam vitiosa acida, Lymphæ cognata, quæ Lymphæ aut feri vehiculo ad quoddam Membrum delata, nervosas partes illius loci irrorans, (cùm aliis omne acidum Nervis sit inimicissimum, cuius occasione Fibre quies alterative tendinis aut Musculi affici, ac quasi nonnulli intorqueri aut corrumpi

videntur,) earum Tonum successivè corrumpit, ac incipit hæc illæ partes nervosæ movendis Offibus & Membris; unde consequenter motus deficiat cum sensu plus minus deficiente, aut saltem aliquali stupore iuncto. *Exempla* talia Paralyseos positiva à causa interna, v. g. à sero ad Spina descendente, videb. in PLATERO *Præsent. Tom. 1. lib. 2. cap. 2.* VOLCHERO COITER *observat. Miscell. pag. 114.* & BONETI *Spasmodicæ lib. 2. Sect. 15. observat. 3.* item ab obseculo Cerebri, vid. SCULTETUS *observat. Chirurg. 19.* à Tumore Scirrhoso vid. WILLISII *de Anima Brutor. lib. 2. cap. 6.* Hæc ratione pariter fit in quibusdam Regionibus subinde sunt paralytici; & quidem cum tali Paralyfi ex acote contra dicta etiam subinde sensus quidam molestat, si non dolorosus, saltem nunc formicans, aut tantummodò titillans, aut lancinans, nunc cum stupore, conjunctus est; qui in principio nunc est gravior, nunc remissior, donec successivè superveniat partis magis magnæque immobilitas, & tandem plures deficiens motus. Sensus formicans oritur ex acuto priusvis vellicante, & præternaturaliter rodente Fibras, Nervos vult non tangente, unde tactus est salvus. Et tales Paralyseos frequenter sunt in Austria, Moravia, & similibus locis, ubi copiosum potatur Vinum, acore insigni tartareo fatis volatili turgidum; qui acor vitiosus nonnulli asserunt, in stomacho non ritè correctus, pergit ad Membra & partes externas, & deficiat circa nervosas partes, Tendines, Fibras & Ligamenta, non tantum Arthritis, sed etiam Paralyfin illis infert, in quibus pereunt motus, immo nunc aut vitiat sensus remanet, qui & successivè temporis perit. Hæc facit, quod habet PARACELSVS *de Contractura Membrorum*, qui dicit, quod hoc Vinum inducat contracturam Membrorum, aliud Lichiasin, &c. Conf. etiam HELMONTIVS *Traict. de Lichias*, qui refert, causam esse in Tartaro Vini plus minus volatili. Nempè ab occulto acido volatili plus minus asserunt irrorata Fibræ, Tendines, &c. rigidesse quodammodo: & minus mobiles sunt, hinc enim & contractura interdum supervenit: Acida enim corrumpunt quodammodo partes nervæ, (Corium cum acido corrumpit se, cum Alcalibus non) adeoque in his calibus primò sequitur paresis, hinc tonus Fibrarum naturalis solvitur & perfecta Paralyfis, & tandem eorum corrugatio præternaturalis, omniada Membri immobilitas & contractura inducitur: Quæ illustrat BARTHOLOINUS in *Art. Med. Hæffius*, Vol. 1. pag. 210. ubi refert, Chirurgum ex peto Aquæ Fortis tantam passum fuisse contracturam Membrorum, ut eum pland contraxerit, adeo ut ex magno homine pusillus factus fuerit: Sicuti hæc facit observatio TACKII in *triplici Hæff. pag. m. 148.* qui refert Paralyfin omnium Membrorum cum Contractura ex acroto Sanguine, curam per Lichiasin, quæ acidum temperant, & Fibras Paralyfi affectas relaxant. Dispositum etiam ad talem Paralyfin Vinum, præparatur, & antequam le deperit, saluberrimum, quod minus tartareo Fæculentia debet possint fermentando præcipitari, & Sulphur narcoticum exhalare, unde acidum resiliens, plus minus volatili, profundius intra corpus penetrat, nervæque partes affligit, & ad huiusmodi Paralyfin disponit: Vid. de Vitis ad Paralyfin hæc disponente M. A. N. C. Ann. 2. observat. 39. pag. 70. *Quid si magis volatilisatum, adeoque & spirituosius Vinum fuerit, ac Symptomata Articulationum infecerit, podagram infert*, aut insciendo spiritum insitum, aut Fermentum Reum, Lichiasin. Unde præmissis præmittenda Paralytica tales & hæc namque Constituta, Lichiasinam vlti inter alia optime curantur.

Sensitiva etiam ex vitioso acido, item Calidi, nempe in Colica convulsiva, simili ratione paralytis & paræsi incurant. Nam si acidum Icorbuticum iunctum fuerit Vehiculo seroso, facit inde viatiorum Fibrarum musculorum ac tendinorum, & partes ad Paralyfin pland singularem disponunt plus minus contumace: *Stasis inchoat* & procedit, & primo saltem vagus flupor aut insensibilitas cum formationis sensu partem prehendit, unde successivè liberatarii Tonus Membri, & magis magnæque paralytice reddit incipit. *Alter autem vago vel minus constant, nisi nimis inveterata fuerit, ita ut Ager uno die melius, in altero pejor habet*, uno die ferè incendere, altero die decumbere cogatur: hinc nunc digiti, aut manuum aut pedum, intumescere, nunc decumbere observantur: nunc uno altero digiti flupor, qui brevi melius se habet: *Sensus manus asperimus*, aut sicut aliquis flupor inducitur, subinde cum dolore gravi, ut plurimum vago, rard fieri, rard è facit: vix verò contumodè Membra movere possunt, sed stantes vix demum petagere, nec aliqno dolore aut flupore sensu incedere possunt; scuti hunc ipsam affectionem omnium optime dolent.

DRAWITIUS de Scorbut. *lib. 3.* Sanè acidum volatile anferam est, quod hic peccat, quod nervas Fibras diversimodo afficiendo, nunc aliquod convulsivum, nunc aliquid paralyticum infert; ita ut huiusmodi Paralysis quasi medium quid sit inter Morbos Paralyticos & convulsivos in specie se dicat. Uode non tantum est, ut in talibus Aegris isochoreticis Membra non spatio contracta rigidum reddatur, nunc Paralysis afflicto idem faciat, & pili minis rupeat, prout Nervi aut Fibre tendunt vel acidis irritantur, vel eodem anilero itorquetur. Huc quoque pertinet Lues Venerea, Paralysis productus: vid. **RHODIUS** *Cent. 3. observat. 34.*

Par est ratio illius Paralysis, quæ insequitur Colicam, & quidem istam, quæ est magis habitualis, & quæ vulgo à tenui aciei humore oritur dicitur, & alias à Prædictis Colica biliosa vocatur. Alvus est pertractatæ clausa, Tortura atrociora & continuatissima venat, purgantibus quibuscumque per os assumptis maxime exasperatur malum, Umbilicus interiora versus retrahitur. Quod si vel malum traheatur, quod impensis sit, si itietur acrioribus, aut purgantibus, aut plus minus deservire videatur, succussu vel unius alterius vel ut plurimum Memberum flupor, hinc flupor motus impotentis, tandem perfecta Paralysis, supervenit. Si negativum hoc nulli consideratur, revera est colica ratione modo expressa, ratione causæ occasionalis materialis scorbutica; Nidus vero & Fomes in plebibus Melancholicis nervis est; nam in illa Colica non tam incedula affliguntur, quam Mesenterium. Acidum anferum, hupitimus scorbuticus, est, quod has turbas, nempe Convulsiones partium intertarum & Colicam dat in Abdomine. Dubium saltem est, quomodo Colicam talis Paralysis artum infestatur, cum intendum luhus atque cessat dolor, Membra observentur paralytica? Nempe in principio mali Paralyticæ flupor convulsivus quid subest, unde ipsarum interruptio flupor flupor & aliquis solutus Paralyticus supervenit. Hinc Colica talis in Paralysis, subinde in convulsione, subinde in artibus doloris, in principio mutationis sunt terminatæ, donec ipsum acidum volatile circa Mesenterii plexus resolutum, materialiter partes illas ita male afficiat attingens, percutiat Paralysis, & tandem ex Fibrarum tendinarum contractione contracturam efficiat. Nempe sunt Remota colicam flupor errorum non raro comitatur, ita & hoc malum omnium remittens, ea simplici consensu unius alterius Membri ea Nervi ipsam & spirituum interrupto motu Paralytica dispositio inquirunt, donec malo inveterato ipsam quasi per convulsione fiat, quod quod originem, litem per deprehendat erat. De cætero par ferè huius cum Paralysis scorbutica videtur esse ratio; partem ergo ea motu Memberum consensu, partem ex Metallali materie visiole in Membra externa, Fibras corugantis, sunt partes: hinc enim etiam suffocationis Matricis Paralysis supervenire notat **QUERCETANUS**, scilicet Epilepsia & ipsa interdum Paralysis possit relinquit: uti etiam ea Vermibus Intestinalium interdum Paralysis oriri, oblectat **SALMUTH** *Cent. 1. observat. 64. Centur. 2. observat. 45.*

Hic addenda sunt porro corpora quædam specialia, quæ singulari virtute Membra & Nervi torporem paralyticum interunt. Quod pertinet torpore Piscis non tantum, (de quo noverunt est, quod Pisciculis & aliis sub actu infert fluporem & torporem, unde etiam nomen accepit, vid. **REDI** in *observat.* & **STEPHANUS FLORENZIN**, qui de hoc Piscis accuratam Anatomem edidit, ubi observat, in certo quodam corporis eius loco saltem residere vim illam, unde emissa effluvia torporem inducant), sed præter hunc Piscem etiam in India Occidentali noviter reperta est certa species quædam Comestibilis, quæ ipsa similiter solo sui contactu Manibus & Brachiis cæterisque Membra fluporem paralyticum infert: Vid. **KIRCHERUS** in *Rogus Notata* *lib. 4. cap. 4. pag. 181.* Utterius Mercurius & omnia Mercurialis, uti Fibris & nervis partibus sunt inimicissima (huius rationem **TACHENIUS** derivat ea acido), ita etiam illi, qui tradit Mercurialis, ut Aurifabris, item qui Specula inargentant, subinde partium Paralysis incurrit, uti præter **SENNERTUM** in *Prax. cap. de Paralysis*, **FORBES** *lib. 5. observat. 9.* observat; hinc etiam illi, qui in Fodinis Metæuri in Foro Juli laborant: Vid. *Alia Societ. Reg. Angl. Vol. 2. pag. 12.* Hinc etiam pertinent Animæ, similitudine Mineralium Exhalationes & Fumi, omnique Naturæ, spiritus animales producentia.

Interdum fit, ut solentem sanguinem Evacuantes suppres- sa Paralysis inferant: Sic Mulier propter suppressa post Partum Lochia Paralysis erum cum Febre ardente fuit correpta, quæ sedâ Venâ in talis fuit curata: Vid. **ZACUTUS**

LUSITANUS *Nô. 1. Prax. admir. observat. 37.* item **DEODATIUS** in *Valent. pag. 312.* Sic ea luppria hæmorrhagia Narium notat Paralysis lateris dextri **BARTHOLOMÆUS** *Cent. 4. observat. 69.* & **ZACUTUS LUSITANUS** *lib. 1. observat. 39.* Nempe non rarum est, Venæsectionis adfectus, si eam intermitcat, torporem quendam & lassitudinem quasi paralyticam in uno altero Membro percipere, nonnulli sanguinis missione solvenda.

Porro afflicti animi graviores, terrores, mœores, pavores, ita cunctæ, &c. inducunt Paralysis. Exempla habet **CORNARIUS** in *observat.* Item **ZACUTUS LUSITANUS** *lib. 1. Med. Princ. Hoffm. &c.* et nimio mœore & inedia paralyticam natam refert: Sic ex subita confectione natam paralyticam videb. in *M. A. N. G. Ann. 4. observat. 9. pag. 14.* Interim tamen & de contrario pertinet etiam paralyticæ, & à Medicis præ deperatit habita, errata observata sunt ex subitaneis animi affectibus, ea ita, & cunctis, & similibus; qualia exempla curiosa Paralyticæ curæ per tales animi confectiones, habet **HORSTIUS** *lib. 20. observat. 15.* item **SCHENCKIUS** in *obs. de Paralysis*, ubi duo habet exempla ex *Palatris*, per terrorem & iram curatum. Paralysis denique à Febribus natam videbitis in **LOESIO** *lib. 1. observat. 17. & 12.* & à Dentitione in **AMATO LUSITANO** *Vol. 1. observat. 58.*

DIAGNOSIS.

Quid attinet paralyticæ signa, ea ipsa pectus facis patet, cellane enim solus aut motus, aut pervenit utroque, necque novum erit, Membra affici paralyticam, quam scilicet Atrophia Membri, eoque Contabescit, *Gen. de Glutidæ foridæ*, insequi lolet:

Cum vero à tam variis causis oriatut Paralysis, in his cognoscendis imprimis sedulo sit Medicus; hinc in hac afflicta, an Musculi? (quod paralyticam positiva proprie dicitur) an Tendines? an Ligamenta? an ipsi Nervi primario afficiantur? pro meliori Praxi probè observandum est. Ubi enim vitium est in Nervo, Medicamentis eas principio applicentur; ubi est in parte tota, pars ipsa externis est medicanda.

Quod causas remotas: semper Medici iudicio relinquunt pro explicatione illa, non secus ac præstam. Imprimis antecedentia hic probè consideranda sunt.

Quid attinet locum afflicti: Si oriatut Paralysis seu Paraplegia post Apoplexiam, res clara est, Medicamentis primo principio Nervorum applicanda esse.

Si à lasso externa, à caui, vulneratione, &c. oriatut malum, ulparum Nervos est afflicti, adeoque ad huius ortum & progressum respiciendum in cura.

Si multæ tales præcellerint causæ, tamus afflicti perferantur: quia eorum plures resat tactus, eo minus afflicti sensus; quod vero plus de tactu perit, eo magis sensus seu Nervus afflicti.

Isterum ubi resat motus, resistente tactu, ferè infans solet esse Nervus & Ligamenta ac Tendines magis iure in culpa.

In specie, quoad Paralysis Faciei, bene est distinguenda convulsio Faciei Canina seu spasmus Cynicus ab evidentem paralyticam, eo confundamur, live enim medietas Faciei sit paralytica, live sit convulsio, semper contradi Canina Oris sequitur, quæ tamen facili hoc modo distinguuntur. Nam si disforis Otis oriatut ea Paralysis, pars illa, quæ trahitur & paralytica est, mollis & flaccida percipitur, & ad partem lantum trahitur, & hæc ipsa pars facili potest in disturalem situm per manum operum deducta, quia mollis & flaccida est. Contrarium fit in convulsione: nam in hac pars convulsio dura & firmiter contracta percipitur, & denique si volumus partem convulsam retrahere, dolor erit, quod non fit in paralyticam.

PROGNOSIS.

Pergo ad Prognosis: Præter tam saprà Artic. antèd. de Paraplegia octatam, Paralysis seu Paraplegia omnis, cæteris partibus, facilius curatur, quam Paraplegia, quæ omnem Medici operam elidit, ubi tortioribus & generosis instrudis sit Remediis.

Quælibet tamen Paralysis postea curato est difficilis, quæ magis, quæ magis inveterata est, & partes contractæ. Quæ magis vagum est malum, de major curatiois spes.

Paralysis, in qua saltem motus latus, superius sensus, scura est, & facili curabilis: & vice versa, quod magis in

Para-

Paralyfi laeditur sensus, et gravior est affectus, et difficilior curatio.

Paralyfi priuativa, quae fit à causa evidente solitaria, scilicet ex Ictû, Valnere, Luxatione valida et febribus Verteborum aut Dorsû, aut in specie Cervicis, neplerimùm est lethalis.

Quae Apoplexia aliisque cerebri, et Nervosi generis affectionibus *superuenit*, si non brevi in melius mutetur, plerumque incurabilis evadit: quoniam si sensus et motus simul aboliti fuerint: imò quae Apoplexiam succedentes, plerumque incurabilis evadit. Nihilominus quia à Paralyfi, caput causa evidens solitaria, semel curante, rariis recidivant, quam ubi morbus à causa incerta dependet.

Facilior est cura à causa *postica*, potissimum si fuerit recens, Membra adhuc calidum, et nodum contracturam minuit: e contra quæ magis salis Membrorum relaxatur, et Atrophica corripitur, et minus ipsi pro salute recuperanda suffraget: item si relaxati lateris Oculis immittantur.

Quo magis para Paralyfi saltem laborat, et minus incitatus ad contrahendam, eo facilius est cura: si verò superueniat successivè contractura, et Immobilitas, difficilior, et gravior foret esse curandi ratio.

Si Paralyfi superueniat *Truncus* partis, bonum signum est recuperandi Motum; refuticari ipsam, aut infusum novum multum spiritus Animalis, indicat.

In *Scabulis*, *Cachectis*, et *Cachectis*, et si levior sit Paralyfi, raro tamen, aut difficilior curatur, quia ad Motum eos comitetur.

Diarrhoea Paralyfi debilem solvit: Apoplexiam verò, seu Paralyfi, seu Paralyfi foret, superueniens *Febri acuta*, ut similibus affectionibus Nervosis, ista hic admodum conducit, et bonum est, quia saepius morbum tollit.

C U R A.

Quod notinet *Curam*, et ea observanda est Distinctio affe-
ctuum, eorumque Originis, quæ generali Paralyfi omni-
um appellatur, et pro affe-ctuum horum eorumque cau-
sae diversitate etiam subinde varianda est cura. Alia
enim est cura in Paralyfi priuativa, alia in postica. *Pri-
uativa* enim Paralyfi plura minis Paraplegiis cognata, si ex
causis *internis* praeteritis et Metallis Materiam morbosam
oriatur, eodem fere modo curatur, atque Paraplegia. In
quem hunc *federis*, et Nervosa moderata est sunt optima;
quoniam, et in Malo contumaciori non obstat, quo minus
Liquoris instituitur, de quo vid. imprimis WILLIUS de
Animali Brutorum par. 2. cap. 5. Sin veri à Vitis externa, Con-
tusione, Luxatione, Laceratione Nervorum, &c. Malum
ortum fuerit, casus hic remaneat; adeoque, verbi gratia
Vertebra luxata, si fieri possit, reponatur. *Construi*
verò modis fiat per Extrema, Fomenta, Lixivia, aut
Balsama fortia Cephalica, et Nervina, paribus applicata,
scilicet *Fomenta* ex Herba Rosmarini, Salvia, Mentha,
Floribus Lavendulae, Chamomillae, et similibus cum Vini
cocta. Post haec conveniunt ex Lixiviis Aromaticis aqua
Rosmarini spiritibus, quæ nomen *apud Regiam Hungaria*
à Gallis circumferunt Oleum Chamomillae, Hyperici, Lum-
brocorum terrestrium, aqua cum Oleo Aromaticis destil-
latis, Succini, Lavendulae, Salviae, Chamomillae, Ro-
smarini, et similibus. Lixia quoque cum Petroleo, vel fuso-
lo, vel Oleo Juniperi ammoniac acuto, hic est egregius;
item spiritus Vini cum Oleo Salviae, vel Lavendulae im-
pregnatis. In specie *Balsamum Peruvianum* per catenis *of-
ficinæ* in quibusdam Nervorum affectionibus externe illitum
calidum, item Balsamum Paralyticum *officinæ*, Empulsum
Nervinum cum Tacamahaca misum. *Invenit* vis presantia-
torum Remedium Oleo destillate Lavendulae, quod ad
aliquot guttas, in vel a. assumptum, expectat sudare in le-
cto, egregium est, quo etiam spectat Oleum destillatum fac-
tici, simili modo ad plures guttas usque sumptum.

In Paralyfi verò *propterea fit, et postea attendendum*
a. Ut causa *materialis*, vel materiae praesens, et Ner-
vos, aut Tendines Fibrasque infirmas corrigitur,
et remaneat, id quod speciem praesentat *Diapno-
siae*, praesentis volatilis, et *Arumae* resistentia,
et diffusibilitas.

b. Ut partium *nervosarum affectionum* Tunc debites co-
struitur, et roboretur appropriata, et in specie
Nervina aromatisata, ad volatilibus, vulgo Calo-
facientibus, et succinatibus dictis, idque fere im-
peditur applicatis remediis Extensis, sed non nimis
viscosis.

Pro his scopis obtinendis observetur

I. Cum tunc Paraplegia, quam Paralyfi à causa inter-
na nata, Fomitem aliis tam in massa sanguinea, et Lym-
pha, quam etiam in Officina Digestionis, et primis viis,
praesupponat radicatum, verbi gratia ex Coenobio, Colica
Convulsiva, Maligno Hypochondriaco, Arthritide, Icti-
dico affectu, Passione Hysterica, &c., quos imprimis so-
let infestare Paralyfi, tunc praeter specialem Paralyfi
Curam simul, permissis debitis Alimentis, et appo-
prieis, *Fomes* *ex evacuandis*, et *corrigendis*, semperque
ad acidum asperum plus minus volatili respiciendum. Ob ad
Fomes Morbi, Digressio salinis relaxata, et absterfus, con-
venientibus *Evacuandis* est expurgandum, quod inter pre-
ter *Clystera* acris, et purgantia blanda per inferos, in
specie *monstris* sunt, quæ per alia evacuantibus à RI-
VERIO commendantur, et à LINDANO mox in prin-
cipio influentia praescribuntur. Fortiores autem per infe-
riora purgantia sedulo hic sugenda, nam multi in uno la-
tere resoluti, seu paralytici, si in principio fortiora premi-
scribantur Purgantia, etiam in altero latere Paralyfi *ven-
talis*, et tandem extindit fuerunt, ut hoc observavit SO-
LENDER, et ex eo THONERUS in *observ.*

II. *Dieta* temperata, et probè nutritiva Lactis, acidum
quodcumque corrigens, et copiosum Chylum tubulifera
(pro quo scopo *Per* praemissis praemittendis est optimum)
instituitur, ne copiosius loca nervæ sacro nutritio
defraudetur.

III. *Ubi à Colica fuerit paralyfi*, cautus vel maxime fit
Medicus in Purgantibus fortioribus, cum equum Colicæ
exinde exasperantis et motus sit, ne sequatur Chev-
lones, et similis Mala. Hinc POFERUS in hominibus
afflictibus utitur *Diapno* *officinæ* blandis, et ex basi
Hellebori nigri paratis: saltem quod Helleborinis mistiori-
bus, sique partibus vicibus purgantia blanda influenda venit:
ad quod etiam in Scorbuticis probè observanda venit, qui
ipsi etiam fortiores purgationes vis, aut raris ferunt, sicuti
in genere omnis fortis purgatio est *noctua*. Imo si scorb-
uticis Membrorum affectibus corruptis, imprimis paralyti-
cis, fortiora propinent Purgantia, scilicet Morbi con-
vulsivi iidem excitari possunt. Nervus totius cum ad ab-
domen dirigendus est, adeoque potius frequentes conveni-
ent *Clysteres*, quibus Olea Carminativa, et Nervina adduntur,
verbi gratia Oleum Angelicæ, Salviae, Succini, Comini,
et Carvi: itaque in principio saltem Emollientes, et Lu-
bricantes: item *ex Lactis*, et Terobinthinis, quæ optima
sunt. In progressu verò imprimis si Fomes Marbi huius
circa Viscera abdominis, et passiones aliam exinde sentiat
levamen, tunc artibus *noctibus* Clysteres interdum adhi-
beri possunt. Quo frequentius injiciuntur, eo magis pro-
fuit, et eo magis Paralyfi praeservant.

IV. *Extrema Remedia* utiuntur sunt ad restituendum
Tunc *Paralyfi*, imprimis post provocatam *fadorem* eorumque
absterfionem: Porci enim tunc aceri subtilis Remedi-
exteri admittuntur ingressioni. Observandum tamen hic, si *fer-
bus* *salis*, non semper Calida Aeris conveniat, quoniam
interdum magis videtur exasperare Malum: Porci utitur
Temperata prius tentanda, atque ut ad Acridia illa que
accedit. Observandum quoque, non semper conveniunt
Unguenta pinguis, viscida, aut glutinosa, Poros Omnis
plus minus obstruunt, quæ non penetrant; adeoque praer-
nit. interdum ad *Exsternis*, *Fumoris* *inhalantibus*. In specie
tamen observanda Cautea QUERGERTANI, qui mox in
administratione Toplicorum Remediis, quæ utriusque
caliditas, et attenuant, quod acuat debet esse
pendere Medicus, ut si Paralyfi fit ab *Humore* *aqueo*,
aut pituitoso, ista à Lympha vitiosa plus minime, et
Ager sit similis fere constitutionis: magis paralytici inna-
muerit, quod Medicamentum tunc adhibenda sint subtilia, et
penetrantia, aut volatilia, aut spiritibus, aut salinis
quorum penetrantia imprimis occurrat his affectibus: Sin
verò para affecta jam marcescat, et plus minus in Atro-
phiam laborat, et Ager ipso quodammodo constitutis
sit biliosus, ab ista absterfione debet desistere.

V. Si Paralyfi loquatur *solentem sanguinis suppres-*
sionem, idque in corpore confuso, et humili, solet tunc en-
tare *Naustia* subinde repetita; Exemplum vid. in VAS-
LEBOLA l. a. *observ.* a. qui reitè de Paralyfi dextræ
partis in Seno optimi habitus, et magnam adhuc vires,
quodola purgatione, et sanguinis missione fuit curata. Post
Vaslethionem *exsternis* *convenit*.

Quod remedia *ex* appropriata: Alterantia, et vi sudori-
feris corrigentia *Exsternis* morbosum in paralyticis affecti-
bus in genere omni *Apoplexia*, et *Antiquissima*, commu-
dantur.

dantur, & applicantur, etiam in quibusvis Paralyticis speciebus, tam in Paralyti vera, quam Paraplegia.

Interca quod attinet primò Pomeria: huc sunt Gtis nota, quæ inter Flores Antimonii commendat HARTMANNUS cum Extraclo Scamoneæ in *Praxi Chymica*.

Inter *Purgantia* videntur Cathartica potentiora, utpote Malum sapius oxasperantia, nisi pituitosiorum, & seriosorum Hamorum abundantia fortiori Evacuaria polleat. Imprimis conducunt meliora tantum Laxantia, verbi gratia *Mulderina*: vid. POTERIUS *loc. cit.* Aliis commendatur Turbich à 3ʒ ad ʒij. item Hermodactyli à 3ʒ ad ʒij. in Infuso ad ʒij. aut parum Infuso tribuitur; eorum loco Species Du-Torbich cum Rhabarb. ad ʒij. ad ʒʒ. propinari possunt, quæ insigniter admodum conducunt ad evacuandum. Pilulæ Fœtidæ, & similes, usi & Pilulæ de Hiera cum Agarico, acutæ cum Extraclo Trochilorum Albandi, seu Colocynthis, usurpandæ: nam in paralyticis affectibus utplurimum stimulus debet esse Colocynthis. Spectat hæc Mercurius dulcis quæ optimum in hoc affectu remedium deprecatur SYLVIVS *prax. l. 2. cap. 22. p. 62.* item Terebinthina, quam PLATERUS in *praxi* tanquam Remedium appropriatum commendat: Exempli gratia

℞. Mass. Pilulæ. arthrit. ʒi.
Scam. sulph. gr. iv.
Euv. Trach. Alband. grā.
Cum ℞. salivæ f. Pilulæ.

D. S.
Pilulæ Purgantes.

Ad imitationem BARBETTE in *Praxi*.

℞. Herb. Chamæd.
Chamap. an. M℞.
Flor. Anthel.
Prim. Ver.
Salivæ an. p. li.
Rad. Angel.
Imperat.
Juss. Flor. an. ʒij.
Nellib. nigri ʒi.
℞. Essent. flos. ʒij.
Cort. Rad. ʒij.
Cardamom.
Cubeb. an. ʒij.
Sal. Tartari ʒij.

F. Nodulus Vini infundendus.

Aliis eidem Evacuatiõis scopo egregiè satis faciunt *Emulsiões* à PLATERO *prax. part. 1. lib. 2. cap. 1.* commendatæ, verbi gratia Decoctum Guaiaci, & Chinæ, Rob Ebuli à PLATERO *loc. cit.* aut hujus Decoctum à RIVERO laudatum, item Bardanz, & Volatilium, atque Aromatorum plarium; exempli gratia Decoctum Rosimarinii, Helenii, &c. Quamvis WILLISIVS de *Animæ Brutorum part. 2. cap. 9.* de Sudoribus annotat, illos fuppiat quidem multum juvare, nonnunquam tamen valde etiam obesse; adeoque non conveniunt subiectis illis, quorum Linguis Sale morisimulque dissolubili gaudet, sed tantum his, quibus à Seve magis infusido, & apecto hic dantur.

Inter *Appropriata Remedia* esse dixi, & *applicatæ*, & *Epilipicæ*. In genere ergo conveniunt, & pro cæteris in usum sunt iõ specie, Salvia, Chamædrys, & Chamæpitys, & *Rosmarinus*, cui certè multum tribuitur ab omnibus Authoribus, in specie tamen à LINDANO, qui Rosmarinum nobilissimum vocat ad curandos Paralyticos, si eius Decoctum sicutum leuto igne in Maris Balneo, propiusculi Egero, jejunio ventriculo, liberaliter bonus haustus, moveat enim hic blandum Sudorem, & egregiè destruit Paralytin; qui additum sit Extraclo, seu Essentia Calbelli, quantum placet, cum successu magis felici. De Primula Veris res nota est, quod vocetur Herba Paralyti propter insignem vim; quæ obtinet in paralytica curandis, quocunque usui adhibeatur. Stachas Arabica, & ipsa interea usu singulari; item omnia Aromata, uti & ea his, & similibus parata, Essentia, Extraclo, Olca destillata, verbi gratia Infusum Salvia cum Vino, Essentia Salvia, Oleum Florum Anthos, seu Rosimarinii, Oleum destillatum Succini, quod commendat FONSECA *lib. 1. cap. 29.* Oleum destillatum Florum Lavendulæ, & similia, ad aliquæ guttas interne usui in aqua Botonice propinata admodum laudantur, uti, & Nervina cuncta *suprà* art. 1. in applicatæ allegata, item

Callorem, Theriaca, & Extraclo Theriacalis, ac similia. Aliis Helenium quoque admodum laudari solet, imprimis in Parali ea Colica, aut abusu Vinorum, & quælibet ex Helenio parata Remedia, Vinum, Decoctum, Essentia, & Extraclo Helenii. In specie Decoctum Radicis Enula, & Fœniculi HÖCHSTEDTERI *loc. cit. p. 2.* deferunt. 1. ad parali ea Colica admodum commendatur. Ligna etiam, eorumque Decocta, in *praxi Veterum* ad paralyticis curandum commendantur. Decocta Lignorum cum Rosmarino laudat LINDANDUS, qualia etiam BONTIUS in *Reberis Sudorem* commendat. Hæc inter *Suffragia* primatum obtinet, quod est egregium Aroma, affectibus Acidia ex Lympha commendantur. Post hoc optimum est *Lignum Guaiacum*, quorum Decocta pro Cura Sudoriferi laudem suam merentur, vid. HARTMANNUS *praxi Chymicae. pag. 16. p. 3.* Quibus Decoctis speciatim Rosmarinus, Baccæ Juniperi, vel Baccæ Lauri sunt addendæ, sicutum meliora fieri solent. POTERIUS *curat. 2. curat. 2.* hoc habet Decoctum, quod paralyti cum gravissimis symptomatibus stipatam curavit, ex

Rafers Ligni Balsam. ʒi.

Bacc. Lauri ʒij.

quæ in ʒvi. Vinæ ad medietatem decoxit, & ita Egeria propinande curavit.

Ad hujus imitationem parari potest Decoctum *suprà* art. antea, in *Paraplegia*, & in *Idemformia*, Cl. 4. p. 12. annotatum. Horum Decoctorum loco, & Essentia Lignorum cum spiritibus Sambuci parata, vel Essentia Ligni Salsifras cum spiritu Serpili, vel Essentia Catarrhalis ex Ligno Salsifras cum Succino misco conducunt. Hinc spiritus Lignorum, cum spiritibus Simplicium Nervinorum mixti & conjuncti, erant egregii. Modernis quibusdæ Belgæ, Imprimis LINDANO, in usu est Lignum ex Indis inter aliatum didicim *Peruvæ*, de quo videtur *Thesaurum Medicamentum* BAUHINI, qui vocat *p. 2. p. 21. Lignum Lindanensis* (H). Hoc fuit in frequenti, & felici usu LINDANO: est Lignum album, admodum leve, cujus rasi, & in Pulverem subtiliter triti dedit ʒʒ. ad ʒij. in cochleari spiritus Vini, quod Remedium ipsi tres insignes effectus præstitit: nam Vomition, Purgationem, & etiam Sudationem sine virium prostratione provocavit: quæ ipsi felicitate post tres doses repetitas alioquin Mulierem insigniter paralyticam restituit. Hoc ipsum cum reliquis Lignis, in specie Salsifras, potest conjungi in eandem usum, idque, si spero, egregio cum fructu.

Alium vulgare quidem, & simplex est Remedium, imprimis parati ex Colica, per copiosum admodum Sudorem impidis repetitum hunc Morbum curans: vid. SCHENCKIUS in *deferens. de parali ea Colica*, qui omnibus sudoriferis in parali ea Colica, ista longè præfert. Vid. SCHRODERUS in *pharmaz. ubi de melle*, sub nomine *Dioscori*, & *Synopi Divi Ambrosii*. Justa hæc Tartarus admodum se commendat iõ affectibus paralyticis, & imprimis Volatilia ex Tartaro, & Sal volatile Tartari, & hinc Tinctura Bezoardica rici parata, mirè commendari solet in quacunque parali, à quacunque causâ, in specie in Colica paralytica, in Scorbuto, & Malo Hypochondriaco, quæ spiritus Tartari volatilis optime curat interne, & externe. Justa quæ etiam Tinctura Tartari commodè parari potest, ut saltem spiritus Tartari vulgaris optime redibitatus, cohobatur cum ana spiritus Vini optime deplegmati, & sapidu tartarifati: Nam sic fit *spiritus Tartari tartarifatus volatile*, qui à LINDANO ad paralytica pathemata maxime commendatur. Vel præparatur Sal volatile, & spiritus Tartari ex Fœcibus Vini, vel ex Oleo Tartari succido loco quatuor spiritus Carminativos nobilissimum est Remedium. Externè etiam spiritus Vini convenit Tartaro erudo affusus, & cum oleo destillatus, pro fricandis Membriis externis, parati affectus.

Justa hæc Volatilia ex Tartaro, quæcumque etiam in *Sal volatile*, eorumque spiritus, præprimis aromatizati, suam merentur laudem, ut spiritus, & Sal volatile ursum per putrefactionem parati spiritus Salis Ammoniaci simplex, lavedolus, succinatus, & Salsifras, *Sal volatile Oleum D. Sybilis*, quæ solent curare parali ea Colica obstat. Porro laudari solent insigniter Medicamenta *Viperarum* quæcumque, externis Oleum, interne verò spiritus, & Sal volatile Viperarum; seu, & paralyti ea omnibus, ea desperata reliqua, curata dicitur Decoctum Viperarum. Post Sal volatile Viperarum non minus laudatur Liqueor Cornu

Cervi

(H) Hoc Lignum ursum esse in Galia scribit Lemezy Diction. Pharmac. Esu vi cathartica valde efficitur; remedium autem superius dictum esse ait à gr. iv. ad ʒʒ.

Cervi succinatus, Sal volatile Succini, si conjungatur cum Pulvere Paralytico Hartmanni ex Cinabari Antimonii, & Magisterio Perlaram: Vid. *Prax. Chymiar.* Quibus præterea volatilia ex Lumbis, & Formicis parata, seu remedia appropriatissima in huiusmodi affectibus partium externarum: unde etiam Aqua Magnanimitatis, & Similes non tantum externè, sed etiam in specie internè, hic suam merentur laudem, in specie, si spiritus quidam Vegetabilis affundatur Formicis, digerantur ad tempus, & postmodum aliquoties cohobentur, hic enim fit spiritus *Antiparalyticus* internè, & externè egregius. Per se dant spiritum acidum: si vero adferuntur, ut solum contrahant, ex his destillatur spiritus & Sal volatile arinosum penetrans, & admodum volatile, internè & externè optimum. Et certè in Lumbicis ac Formicis singularia lateat contra affectus Nervorum, præsertim eos, qui ex acido plùs minùs occulto originem ducunt.

Verùm in ois horum volatiliam observetur, quòd non semper ad præmissa conducant, in specie hoc primo Merbii infatu, quia videtur afflicti aspergendi, & dolores reddi, propter effluvia, quæ cum acido excitant, rivos cubi variis Pathemata inferunt. Quod si hoc observetur, prius facere & acidum primarum viarum aspergendum præmittitur, & volatilia contrahantur. Intet *Plex* eminet Antimonialis & Martialis sudorifica, ut Antimonium Diaphoreticum Martiale, Bezardicum Martiale, Unicorni verum, præsertim Cinabari Antimonii est egregia his in affectibus, quam HARTMANNUS, & R. D. MICHAELIS semper combinat cum Oleo humano præparat, cum ipso Pulvere aliquoties restituit Paralyticos, & ego aliquoties præscripti cum selici successu in Paralyfi scorbutica hoc modo:

R. Off. Mercatorum scr. ℥i. ad dr. 8.

Cinab. Antimonii gr. xli. v. xvi. ad ℥i.

Sal vol. Succini ℥i. gr. xli.

M. f. Pulvis.

Div. in 3, part. equal. 5.

Pulvis Ca ut et Membra confortant.

Tempore vespertino assiduè in aqua spiritus Laevodii, & egregie convenit.

Cucuratio acuta in primis viis per hæc absorbentia, tunc demum tuto ad Volatilia sudorifica validiora possumus accedere.

POTERIUS in frequentissimo habuit usum suum *aurum diaphoreticum* supra artic. antedictum, ubi de Paraplegia, laudatum, quod singularem ibi meretur considerationem. Nihil aliud, quam aurum fulmianum cum duplo florum Sulphuracaleisano fixatum, ut obvatet, & hinc cum spiritu Vioi alcoholisat digessim. Hoc ipso ad Paralyfim ferè semper & utiliter usus fuit. Descriptionem videbitis admodum obicaram in append. ad *Pharmac.* Dosis gr. vi. effectus videbitis *Comar. 2. cap. 66. 67. 71. & 87. item Comar. 3. cap. 14. item Comar. 1. cap. 67.* In hac ultima observat Paralyfi quindem sanorum curatam beneficio sui Auri Diaphoretici. HELMONTIUS etiam dat imprimis *Tincturam Cerebriurum volatilis*: sed hæc est rara avis. Vidi ego illam in Laboratorio Regio Londinensi, ubi Dn. FEBURE beneficio spiritus Tartari volatilis Tincturam hæc parabat, ita quidem, ut beneficio huius spiritus, volatilis Tinctura per Retortam destillaretur; Coloris erat rubri obicuri, Quors admodum pœterant, & Saporis orinacæ: quæ esset Remedium egregium ad Paralyticos curandos, si esset divulgate.

Quid si oratur Paralyfi positiva ex nimia refrigeratione, humilitatione & relaxatione Fibrarum, Tensionem ac Ligamentorum, siue à causa interna siue externa oriatur, cuncta ex locum habent: quæ supra in Paralyfi privativa dicta sunt, non tantum Membra afflicta, sed Spinam quoque Doric cum his aut Unguento ZACUTI LUSTANI, quod *libr. 1. Praxi admix. obscur. 37.* describit, fricando, in specie convenit Oleum Terra cum anaëgia humana & asferia mistum, & parti afflicta illatum: exen. græ.

R. Anax. human.

Anax. 20. 31.

Ol. Terra dr. iii.

M. f. Linimentum: 5.

Unguentum externum Arthriticum.

Item Tacamahaca cum Balsamo Peruviano commissa, laudem suam meretur, vel Emplastrum Nervorum ex Tacamahaca & Calicane, cum Oleo destillato succini & Philosphorum relaxatum, & circa articulos applicatur. Item si os uicque procedat Malum, ut Ligamenta ita quoque restituta Paralyti ut relaxationem fere Membra inferant, confert. Em-

plastrum Symplicum Cralli cum Oleo Philosphorum & Terre relaxatum: internè cum Theriaca sudoriferis ceteribus provocetur. Sed de his affectibus videb. imprimis BARBETTE in anat. *Præf. cap. 5. & 10.* qui tale Emplastrum commendat.

R. Gum. Caracæ. 3℔.

Galban. uocli.

Ol. Rapher. dr. 1℔.

M. f. Emplastrum.

Sic à Mercuriali Venæ Malum ortum fuit, convenit imprimis decoctum Fancilli, & Huiusmodi supra cap. 2. artic. 3. ubi de Tremore, laudatum; videb. HOECSTEDTERUS loc. alleg. sicut ubi per sudores Venæ Mercurialis sufficienter exelsa fuerit, Lac & Serum Lactis commodè propinari possunt: Sic enim HOEFERUS in *Herz. Med. pag. 9.* Paralyfim ex Fumis metallicis, Mercurii & Antimonii, io Aurifabro, omnibus aliis frustracis, per Serum Lactis à FORESTO curatam refert.

In Paraly scorbutica volatilia urinis & Lactis locum habent. Observandum autem in specie, quòd iusta volatilia illa urinalia primatum obtinent Remedia ex pias & abste, ex eus in specie Strobili malisulcis: Decoctum nempe Strobilorum Pini, seu potius Pinastri secundum BAUHINUM, est nobile Remedium & appropriatum specifice ad affectus artuum ex scorbutico orinados, siue sint cum siue sine dolore, sudoris beneficio has Partes curant, præsertim cum radice China præparatum, verb. gr.

R. Radix. Albi. 3℔.

Ten. China 3℔.

Incolia & contusa Coq. in aqua & terrefacta ad mediocritatem consumptionem:

Colatura D. 5.

Potio Arthritica contra scorbutum.

Decoctum bibatur bis quotidie, expectando præsertim mane sudorem blandum. In Lactis quoque alterationis gratia coqui possunt.

Egrogium quoque est decoctum DEKERS in *Notis ad Prax. Barbetti. Decoctum Bistortie* cum Bistortia ipsi quoque laudatur: Videb. DRAWIZIUS de Scorbutis *palm. 167.* Præter Decoctum Strobilorum etiam essentia ex eorum Rob cum spiritu Antiscorbutico, vel proprio, parata, sunt appropriatissima remedia in Paraly scorbutica: item essentia contra Arthritidem Vagam ex simplicibus Arthriticis cum spiritus Lumbicorum terrestrem per fermentationem & cum spiritus Cornu Cervi parata, in his paralytica affectibus est optima, quam & ipse probatam habeo. Cum his semper iungendum est Cafforum, Sale volatili oleo penetranti confusis, & Nervinis affectibus speciatim commendatum.

Illis debet præmissis Serum Lactis cum Antiscorbutico mistum, & ipsum quoque Lac egrogium est, Curantque ab solvit: sed ut supra monui, necesse est, præmissis vinis universis, non tam laxantia, quam primo Fira absorbentia, hinc volatilia; quibus præmissis tandem ad illa appropriata accedatur.

Speciant hæc Fancilli & Seneca, de quibus vid. SYLVIIUS *Præf. lib. 2. cap. 22. 6. 54 & 71.*

Quid si designo Colicam insignem Paralyfi, cautus vel maxime sit Medicus in purgationibus fortioribus, cum ejusmodi Colicæ exinde exasperentur, & provocentur magis Paralyfes & convulsiones. Nervus totius Care ad abdomen dirigendus, adeoque Clysmata Lenientia & Abstergentia item ex Lactis & Terribilioribus optima sunt: Quò frequentius injiciuntur, eo magis proficiunt & eo magis à Paralyfi præservant. Hinc interdum semina quatuor calida majora, eorumque in fine destillat, aut alia ex eisdem parata remedia, teste HELMONTIO, sunt appropriata Interitusum solamias; quibus & adiungatur Helmi decolam, præmissis præmittendis, ejusque essentia pro blando sudore propinata. deestiam Mili, seu, ut alias vocant, Sympat Divi Ambrosii, mirabiliter laudatur in huiusmodi Paralyfi ex Colica, per sudorem hanc ipsam removens. Quibus si Lignum Sassafras addatur, faciet et melius. Serum Lactis cum antiscorbutico & similibus, medicamentum nobile est in hac Colica, & inde nata Paralyfi. Hinc cum summum appropriatum accenditur Galbanum Paralyfi, tam simpliciter secundum modum HARTMANNI præparat. *Prax. Chymiar. cap. 12. §. 8.* quàm præstantius illud DRAWIZI *pag. 193.* Hoc ipsum non solummodo Umbilico laugitur frequenter, sed etiam ipsi Membra paralytica, si prius spiritus Tereb. aut spiritus Salis Ammoniaci infuso, fuerit probe perfusum, quod Galenus hoc quotidie cor angust ad imitationem HARTMANNI *lib. alleg. cap. 13. §. 4.*

Hæc sunt Interna, quibus addenda ea, quæ hinc inde in prædictis sunt obvia.

Quod

Quoad *Extrema*, quæ Tonum Fibrarum & Motum partium resistunt, hæc nunc *spirinosa* & *Aromatica*, nunc *Salina oleosa*, nuncquam viscida & glutinosa, nisi furiam Tabes, Atrophæ & Contractura imminens, aut superveniens, volatiliū cūsumū usum inhihet, & blandiora, verbi gratia Piaguedines Oleasque insula, commendat. *Temperatiora sunt distinguenda*; motibus enim est vel inveteratus, vel novus: si est inveteratus, ad Atrophiam & Atrodiam partes inclinant; si non, saltem motus deficit, superflue plūs minus scilicet. Quoad ergo posterius: eminent omnes Aquæ Apoplecticæ dictæ, spiritus Vini rectificatus, & Aquæ Articulares ad extrā. Recipiuntur nempe species Aromaticæ Nervinæ Antiparalyticæ, quibus addenda acriora, verbi gratia Piper, Semen Rutæ, Urticæ, Sinapi, radix Ati, Pyrethri, Item herba Saturejæ, Folis Nicotianæ, quorum cunctisiam HARTMANNUS commendat: quorum etiam inusitatus C. R. A. T. O. N. E. Frictio Spine cum Radice Iridis nostratis, & Bulbo Lilii, ab aliis cum Radice Beryonæ aut huius decocto, præscribitur. Sciebus dictissimè affunditur spiritus Vini brevi cum digestionē, inde aliquoties cohobandos vel solos spiritus simpliciter digestionē impregnatus sine tali destillatione commodè externè applicatur, harum omnium loco fit formula, quam dedi in *idea formularum*. Class. 4. §. 19. Vel

℞. Sol. Musculi, rec. M. l. vel ii.

Origan.

℞. Sambuc. ana M. l.

Rad. Angel. 3i. ad 3ii.

Pyreth.

Aru. rec. ana 3i.

Euphorb.

Caster.

Myrrh. ana 3i. ad 3vi.

Piperis arisina ana 3ii.

Flor. Stachad. Arab.

Lavand.

Lil. convall. ana 3i.

Urt. cruce. vel Sinapi.

Urt. mont. ana 3vi. vel 3i.

Concilis & contusis affundatur

Sp. Vini rectif. part. ii.

Lumb. terrestr. part. i.

Digeratur in Balneo Mariæ, & vel filtrando separetur, vel destillatione spiritus abstrahatur.

Liquore hoc fricetur aut inungatur Pars paralytica post absorptionem sudoris, & aliquem Aëri requiem, dum Porus adhuc sunt aperti, Linthea Thure & Succina suffumigatis: post quam deteriorationem hoc Ipso Infuso probe partes tricasque & largiter illinendæ sunt: aut spiritus Vini apicebus aliquoties cohobando abstrahatur, tanquam aqua articularis ad extrā, applicandus. Item

℞. Herb. Rerifmar.

Salvia.

Majoran. vel Lavand. an. M. i.

Flor. Lavand.

Lil. convall.

Rerifmar. an. p. ii.

Rose. Jamip. unc. i.

Sem. Sinapi unc. 3. vel 3vi. ad unc. i.

Caster. 3ii.

Piperis nigr. 3i.

Concil. & contus. infundantur in f. q. spiritus

Vini, digeratur aliquandū & filtratur:

D. 8.

Essentia catenaria Anthratica.

Cum his Aquis Articulis ad extrā optimè etiam quarta vel quinta pars spiritus Lumbicorum terrestrum per putrefactionem, aut spiritus Farmacum, permiscetur: exemplum dedi alio loco. Quæ etiam facit spiritus Primulæ Vennæ. Hæc commodè, in speciem doloris Scorbutici addest, addantur quantitas Salis solantis, quæ inest excellenti spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva; Nam hic in pluribus differt à spiritu Salis Ammoniaci cum Salo fixo parato: exemp. grat.

℞. Sol. Ammoniaci p. i.

Calci vivæ part. ii.

Errora cum Sp. Va.

Destilla. & optimis spiritus est.

Vel

℞. Aqua Arsenic. ad 3vi. 3ii. ad 4v.

Sp. Sal. Ammoniaci cum Calce viva 3i. ad 3ii.

Lavand. 3vi. per part. 3i.

M. 8.

Membra confortans spiritus.

Frictum Membra ter in die cum spiritu Vini camphorato, in loco calido, ut incalcescat, & parti hient, hinc spiritus calcidatus applicetur externè. Vel

℞. Spiritus Vini camphor. 3ii.

Lavand. 3vi. per part. par. 3i.

℞. Caster. 3vi.

M. pto usu externo.

D. 8. ut supra.

Item

℞. Aqua Appleli. sapia descripte. vel Lander. 3ii.

Spiritus Lumb. 3vi. per part. par.

Sal. Ammoniaci fuscini ana unc. 3.

M. 8. ut supra.

Loco talium spiritus Tartari rectificatus, missus cum aqua vel duplo spiritus Vini tartarifici, & cohobatus, perquam egregius est, præsertim in Paralyti ex Colica. Porro notandum seu essentia Succi cum spiritus Vini rectificatus parata, Membru paralytico contraria, aut quomodocumque refrigerata, ritè cum successu affricatur & applicatur: vid. HUNKATH in *Methalia dephillatæ*. Quin & his Aquæ externæ Balsamus Peruvianus commodè admodum adhiberi potest. Modus est hic: Subigatur Balsamus Peruvianus in pulverem quantitate cum Viello Ovi, unde Aquis Articularibus vel spiritus Lumbicorum terrestrum, ut Formicarium potest misceri: vid. scilicet effectum in Crurum dolore liliadico cum incipiente Paralyti coniuncto. Applicatur etiam expressè, quando Nervi sunt læsi, contorti, &c. & in Paralyti privativa. Hinc etiam notus est spiritus essentia Foliarum Tabaci cum Vino Malvatico parata, & quibus videb. HARTMANNUS in *Prax. Chym. §. 4. n. 21*. Pertinet huc *Urina humana*, quæ ratione Salis mellei isidem pro Membris laudatur paralyticis, & hinc Latius & Frictiones Membrorum cum Urina propria vel potius cūda, vulgariter commendari solent. Melius est, si Urina major conquiratur in Urina propria Aëri, vel Urina Pueri, & cum hac pars paralytica insubinde lavetur, bene fricando. Loco solus Urina, spiritus Urinae phlegmatica etiam non est inolegans; vel ad imitationem STOECKERI in *Praxi*, qui dicit, esse Remedium capertum sui Partis. For hoc modo:

℞. Uris. mur. M. ii.

Chemenill M. l.

Sem. Cumin unc. l.

Salis unc. iii.

Piscetur omnia p. abe in mortario, & decoquantur in Urina humana p. duas usque l. q. ad consumptionem quartæ partis:

Quo ipso decocto balneetur manè & vespere paralytice. Quin etiam postea Pennis ex decocto madeffactis involvatur pars de nocte & die, & ita per tres vel quatuor dies, aut amplius, continetur, quinque postea Membrum cum Oleo Pulvis inungatur, donec sanetur.

Quo etiam facit Unguentum Castellum FAVENTINI in *Praxi cap. 7. pag. 36*. vel Oleum Castellum, vid. RIVERIUS *Cent. i. Obs. 52*. Unguentum HILDANI *Tract. de Gangr. cap. 24*. & Nephriticum ad imitationem PROT-GENII.

Membru post Apoplexiam paralyticam seu paraplecticum factum, fricandum est ter in die cum spiritu Vini camphorato in loco calido: brevis enim post relictur Membrum, quod mihi egregius quidam prædictus ex propria experientia confirmavit. Urtica quoque & Urticariae vetus nam sunt remedium, conveniens tamen imprimis in Paraplegia, quod EPIPHANIUS FERDINANDUS multoties expertus est, qui pag. 26. dicit, quod præmissa universis, optatum hic habere Corpus Urticæ: Et testis Deum, ut hoc genere remediis plures esse usum, & semper maximam cum utilitate & felicitate, & nunquam votis mihi deceperim.

Pariter hunc loci sunt Balnea cu Infuso cu Formica, ut grat. ex decoctis Nervinis, Visceris fermentatibus, & Formicis: Vid. JULIUS CÆSAR CLAUDINUS de *Inferm. ad Inferm. Section. 16. pagin. 503*. & 523. M. A. N. G. *Ann. 4. Observat. 222*. Balnea ex Formicis, & Formica, aut dem votis druse, sunt singularia, & mirabilem habent effectum in Paralyti Scorbutica. Paralyti ex Colica, alique ex acido vitioso nati, præsertim in malo putrefactioni, si isidem sibi mutuo imponat, vel sponte Fermentationis motu calcidatus, vel, si sponte sua non incalcescat, insperione pulveris Calcis vivæ incalcescentibus, immergatur Membrum affectum fortiter sudando, ut Tartarus volatilis in Membra se infuset, ita aliquoties continetur, & mirum effectum g. lit. Sic quidem horum usu, & partis paralytice debito fu

cu & Infeffu, fenfus Motufque reftituitur: hoc ipfo enim deperati Ichiatici, & ex Ichiade fafti Paralytici à PÉTRO à CASTRO curati fuerunt. Conf. BORELLUS *notat.* 2. *obferuat.* 43. & ZWELFFERUS in *apcl. contra Tachen.* Nec minoris ulus fuoc *Balnea ex Fennicis* parata, quæ reuérâ fuot egregia in Paraplegiis, item in paralytiâ refoiutione & relaxatione Teodinum ac Ligamentorum, fi integer eorum Aceruus, vel folus, vel cum fpeciebus appropriatis Aniparalyticis, facculo inclufus iniiciatur Aqua feruenti, cuius Vapor excipiendo iofoluit Ager in Vanno recto: fequenti die io diâ Aqua coquantur ifte facculus, & ita deouo in Vanno vaporem excipiat Ager: idque his vel ter, quando poctroacetem odorem fpirant: Poftmodum ac fequentibus diebus etiam inoleat illi. Decocto femper cum facculo deuot calefacto, idque aliquot vicibus, donec melioratio percipiatur. Species v. g. videas in MYN-SICHTI *Armeniac. elym. ubi habet Balneum Paralyticum.* STOECKERUS in *Praxi*, hoc habet Balneum non incl-gans:

℞. Sulphuris viui,
Succ. Laurini. ℞.
Rad. Gentian. M. iij.
Sunt.

Archel. long. an. M. ii.

Incidiaotur & contendantur pro Balneo.

Coqa in Aqua Calcis viue temperata, loco Aquæ communis.

Tandem aliis ferè nil iuuantibus, ultimum afylum funt Theriac artificiales, fed Cauteia opus efl. Iocerdum iuant, interdum non. In paraplegia magis, quam paralytica, conuenient videatur & io illis magis poft priuatiua opopleiâs, quam poftiua. In Paralyfi quæ efl ex colica. Vi-peno & fimilibus, non conueniant, quia arthriticis affe-ctibus funt noxæ, & podagricis ex Thermis lubinde redduntur contrarii. Metus ergo, ut olimis maturè promoueat contradi. Cum difcretione quoque iofoluitur, nec omni-bus fine difcretione adhibenda, dum melius conducunt illi, qui conftrictionis funt fauquiores & phlegmaticæ, minus qui conftrictionis biliofa fea cholericæ. De quibus caute-ia vid. collegium Pharmacum in *feruendum* p. i. fect. 3. pag. 160. & feg. & WILLISIIUS l. i. p. p. p. p. De paradyis huiusmodi Thermis artificibus vid. Z W E L F F E R U S in *Ment. born. ubi de sulphure.*

Quoad Femora: conuenit Potus feu Inuufio per fpiri-tum Viui appropriatum: vid. HORSITUS *el.* pag. 408. 409. & 112.

℞. Herb. Majoran.

Succ. an. M. i.

Rorifmar. M. ii.

Succ. Juniperi 3iv.

Lauri 3ij.

Rad. Pyrethri 3i.

Lucil. & contm. S.

Species ad Fotum.

Coquantur in Aqua fimplici: Decoctum feruidum fubioit-atur Pedibus, & fic Fumus afcendit: Vel dividatur in duas por-tiones, ut refrigerata una altera fubfuiti poffit. Suffragio hoc beneficio fufcitum vel Laterum candefactum, pro Mem-bræ flupore affeâto vel paralytico.

Præ cæteris Galbanæ, & Balfamæ feu olea deftil lata ex Galbano parata, pro externa Inuufione mirè conueniunt: imprimis io ufu efl Galbanetum Paracelfi & omnia cum eod-emo parata. Modos parandi varios videb. in SCHROE-DERO lib. 3. claff. 3. ubi de Galbano & de Balfamo lib. 2. Vid. etiam HARTMANNUS in *Prax. chymica.* & SENNERTUS *Prax. lib. 3. cap. de colica.* Succ qui hoc modo præparatum præ reliquis reddant admodum con-ueniens.

℞. Galban. ℞.

Ol. Terreb. clar. ℞. vel q. f.

Deftilletur exinde oleum: cui addatur

Ol. Lavend. 3i.

& repetatur Deftilatio, unde evadit Balfamus ge-nerofus, qui affufio fpiritu Viui rorificatur vel tartari-fate, aliquando digeflos & circulos fit pen-etrantiffimus & præftantiffimus ad dolores colicos & fcurbuticos, ad inde natus Parafes, fi Umbilicus, & Pars paralyfi affeâta ioungatur: vel folitariè, vel cum Oleo faponis Veneti & pucis granis campho-ra miftis: ficui etiam præferuationis caufa fpi-na poteft ioungi, fi Malum ulceris ferpere videa-mus.

Iuxta hoc Petrus, & oleum Torredicum potenter po-Tom. 11.

netrat & paralyticos reftituit: ficot etiam alia olea deftil-la-ta conducunt, v. g. oleum deftilatum Buccarum Juniperi, succini, fpecie, Lavendulæ, Saluæ, Mentha, Terreb-thione, item olea deftilata reftituta ex Tartaro, Liguis, in fpecie de Ligno Frazini, Galbano, &c. Hæc olea, oleo Nuciftæ, vel Laurino excepta, illi ioungit & affricantur Partibus affeâis, & regioni ipfius Dorû, idque aliquoties interdum. E. g.

℞. Ol. Petri 3ij. 3ij.
deftil. Lavend. 3j.
Lavend.
Majoran.

Spica an. 3i.

M. pro Inuufione Memborum:

D. S.

Externum Oleum Arthriticum.

Ad Emplaftrum quod attinet: ex Tacamahaca imprimis funt paranda, quæ applicari folent in paralyfi ex humefactione Nervorum nimia externa. De his vid. BARBETTE in *Ana-tom. prat.* pag. 51. Ed. Holland. ubi loca Olei Terræ io eâs deficta Oleum Petræ fubfuiti poteft.

Quibus verò Aeris cuiusmodi uis æquè conferant, ut fit quibidam fcorboticis, Temperata magis conducunt, æque tunc imprimis conueniunt Animalium pinguedines refoiutione, ut aungia Humana, aungia Viperina, aungia fer-pentis, Coniæ, Cafforia, Felina, Vulpina, Muris montani, Canina, in fpecie Pinguedo Anferina, de qua vid. CRATO lib. 6. ouft. 30. Hæc ipfa munc folitariè, tunc cum Perrore aut alio Terry, & pafco oleo quodam deftilato, nonnihil aquata & bene calida, promiffa debita Friftione, applicari poffunt, idque imprimis, ubi iam im-minet Rigiditas & contractura, aut metuitur atrophia Membri. e. g.

℞. Ping. anferin. vel human. unc. iij. iud. unc. q.
Olei deftil. Terreb. 3ij.
Succ. Junip. 3i.
Spica 3j.
M. S.

Externum Unguentum Arthriticum.

Vel

℞. Ping. Human. unc. ii.

Ol. Lavend. terr. unc. i.

Petræ 3ij.

Succini 3ij.

M. S. ut aotè.

Vel, quæ hoc io paffu reliquis præferretur, pinguedo an-feris aromatica affando deftilans, du r impletur fimplici-bus Balfamis vel Nervialis, quæ pinguedo deftilata affer-atur pro Linimento externo, ad Membra paralytica inu-nga. Modi ubique funt obuii: v. g.

℞. Anferum euiferatum;
qui iofarciatur cum Fel. Salvæ, Rorifmarini, Spicæ,
Caryophyll.

quibus addant

Ping. Carl. f. p. unc. iij.

Tauris,

Mafich,

Succin. an. unc. 8.

Caffor.

Euphorb. an. 3ij.

Influantur omnia, & affetur Anfer io Veru, & Pinguedo deftilans cantè colligatur, & pro ufu feruetur.

HILDESHEIM fequens oleum anferis commendat, quo quodam Medicum in Duce Borgia uſum fuiffe affert:

℞. Anferum mafculum depulatum & excutietum,
præi obſectum:

Lavat probè Vius intus & extra; Poft

℞. Theris alii

Myrrh.

Mafich, an. onc. ii.

Ung. Martis, unc. vi.

Repletur his mias Venter anferis, affetur io Veru;

Phlegma, quod prodit, abicitur, Pinguedo verò ftil-lans affervatur pro oſa externa illuſionis.

Huius Liquoris culibet oncie addit pulveris Perarum tam

roſtrum 3i. quo illuſiunt Membra. Alii

℞. Ping. anfer anfer. unc. i.

addunt

Pulv. Verm. terreſtr. unc. ii.

Mifta deftilat per Retortam, & fic acquirunt

Oleum pro inuſu gædis Membriſ paralyticis.

Quidam Canem Rufum cum Herbis appropriatis, item

Myrrhâ, Maſtiche, Galbano, &c. affant. Parii ratione

Fiſſi Veneno

Venerit alicui impleri & huiusmodi Liniamentum elici potest.

Hæc accedunt *alia causa* quædam, v.g. Vulpinum, Lumbicorum terrestrium, Euphorbii, de Piperis, & seminis Trifolii alphaticis, five bituminosis, à SYLVIO Prax. lib. 2. cap. 22. commendata. His addenda Unguenta, scilicet de Belloio, de quo vid. AMATUS LUSITANUS *anat. 4. anat. 22.* Agrippæ, Martium, Nervinum, paralyticum Myrsicæ, Pollium *Gaidalis*. Quibus alumen phlogistum admiscere iubet SYLVIVS *loc. cit.* si ariditas subit, vid. *suprà* l. 1. s. ubi de atrophis. Item *cataplasma* ex Radice symphyri maioris, cuius usum videlicet in HARTMANNO, & similia Remedia.

Huiusmodi tamen *placenta non adhibet* semper conveniunt in paralyti, quoniam potius infarcitur & obliunt. Di-Oa autem Unguenta oleosa & similia Remedia applicantur toti Membro, ubi Ligamenta & Tendines laborant: ubi verb vitium est in Nervis in Memberum delato, tunc talia Remedia spinæ Dorsi aut Nuchæ aut Vertici commode applicantur. In hoc accessum effi, sit Medicus anatomicus, & sciat originem & progressum Nervorum.

C A P U T IV.

De Operationum Rationalium Læsionibus.

Habemus hæcena hæc Operationes, earumque læsiones, quæ Homini, ut Animalis, tam ad esse Animale, quam ad esse Vitale, conveniunt, & ita cum *Brutis illi communis* sunt. Jam accessum faciam ad læsiones Operationum ipsi propriarum, & a quibus in esse Humano constituitur. Operatio talis est *Intellectus*, & inde promanans *Ratiocinatio*, quæ sola verè ad animam pertinet, quæ quædam iuncta est Corpori, sensum Internorum, & consequenter spiritum Animalium, in cerebro reditè disposito, otitur ministerio, quatenus Intellegendum oportet peculiari Phantasmata seu Obiectis, quæ sensus afficiunt Internos. Quando ergo Obiectum in phantasia representatio malè lo habet, *Ratiocinatio vitiat*, hincque omnes Ratiocinationes læsiones à sensuum Internorum vitii dependent: adeoque jam *sensus interni*, eorumque vitia, tractandi sunt, prout per eorum læsione & Ratiocinatio læsi sequitur. Finit autem sensus Interni à motu spiritum Animalium in cerebro: prout ergo spiritus tam per se quam in motu variant, & prout se habet cerebrum, etiam variat sensus Interni, & consequenter Ratiocinatio; cuius aberrationes taliter per sermonem & Gesticulationem corporis, adeoque per sermonem incoherentes & ridiculas Gesticulationes à posteriori cognoscimus, ex quo pervenimus porò in notitiam *Imaginationis & Memoria læsionis*. Item per se Ratiocinatio non potest lædi, quia hæc immediate dependet ab anima Rationali; quæ ipsa, cùm sit spiritus, & substantia immaterialis, erit a Materia aut Obiectis materialibus seu causis naturalibus impetibilis, & consequenter inalterabilis: Unde quicquid delectuolum in eius Operationibus occurrit, sunt læsiones Imaginationis & Memoria, quæ ipsæ aliis sunt per certum motum spiritum Animalium in cerebro legitimè disposituræ; Et quando Memoria & Imagination per Morbos læduntur, causæ simpliciter investigandæ sunt in cerebri texture & spiritum Animalium crassi læsis. Nam his læsis & Animæ Rationalis operationes læduntur; ipsi vero restituitur etiam Ratiocinatio redit.

His suppositis dico; omnem læsam Ratiocinationem innuere delectu Imaginationis & Memoria.

Vitiantur autem Ratiocinationis duobus modis: nempe

1. Quando immutatur, ut in *stupida seu Tardeitate degenti*, aut *abolitur*, v.g. in *Idiotia*, *amnesia*, & *Paralyti*, vel etiam in *Febribus* ex naturali causarum ordine.
2. Quando depravatur; id quod fit in omnibus *Delirio*, tam in genere, quam variis modis in diversis *Deliriorum* speciebus.

A R T I C U L U S I.

De Ratiocinatione imminuta & abolita, & inde nata memoria læsione & stupida.

Quod imminuta aut abolita Ratiocinationem, supponit innæ, Ratiocinationem ex se nunquam immi-

nut aut aboleri, nisi etiam in Memoria simile addit, ut etiam præcatur vitium: quod verissimum est; hinc enim fenes solidi, quia eorum Memoria deficit aut facit: & qui oculum habent Memoriam, semper manent Pueri, dum nihil adducunt & sapientissimi, si ea Morbo quodam vel Causa quadam Externa Memoriam lædant & amittant, stupidiissimi & solidi sunt. Tamen nempe silem scimus, quantum Memoria comprehendimus, & iudicio ponderamus & applicamus.

Hujus ergo *Memorie læsiones* hic imprimis sunt considerandæ, quibus ipsa aut imminuitur, aut prius *abolitur* & depravatur etiam aut morbose *exgeri* nequit: Nam Memoria non redit aut vitiose retinens, est Memoria Deficiens seu Imminuta.

C A U S A E.

Hujus ergo vitii *imminuta* aut *abolit* Causam Proximam & Universalem erit determinare impossibile est; (loquitur syncerè) partim quoniam nodum à priori cognitum, quomodo naturaliter sunt Memoratiōis ados? aut in quo consistit? aut in quantum etiam in hoc negotio explicando GUILHELMUS GRATIOLUS *Tract. de Memoria conservanda* inscripto, conatus est, scilicet tamen sunt verba, adeoque in modo memorandi penultimo omnes impugnant, utat præ cæteris CARTESIVS rem nonnulli *clarior* aggressus fuerit (1); partim verò quoniam tam vitio, etque tam variæ Remote Causæ Memoriam lædere, & tam deficientem reddere valent. Hoc fitim observandum (1.) *Memoriam nobis communem tam Bruti est*, prout cæpè *Rationalia* opponatur; quæ nobis est propria, & fit per Ratiocinationis disciturum; (2.) *Externe Memoria* sequit *Interni* Capitis certo modo.

In Capite quoad hoc negotium fitim *spiritus Animalis* & *nerveum* consideranda; in quorum altero, tanquam radice, fundata erit Memoria; spiritibus autem, seu substantiæ continens mutabilis, non erit *impressa* Memoria, quia Memoria hæc hanc sedem. Cæterum ergo est, quod *cerebrum substantia radicale fit* *Memori*; quomodo autem sit, nescio. Jam verò & omnes causæ Remote, quæ lædunt Memoriam, triplicis sunt generis, & serè ex collimus, ac aut.

1. *Cerebri conformatio* & Texturæ mechanicæ, secundum Porulos scilicet & Meatus, & hinc Naturæ Temperaturæ, imprimis Humiditate aut siccitate; ac
2. *Universum sanguinem* & *spiritus vitales* certo modum tinent aut corrumpunt, hinc aptam spiritibus Animalibus materiam subtrahant; aut
3. Deoque *spiritus Animalis* præter modum conflant, dissipant, aut quocunque modo torpidos reddant.

Quarum causarum variarum omnium ad unam proximam restrictio vii possibilis est.

In consideratioe ergo læsionis Memoriae probè semper attendantur *causæ ipsæ Ratiocinationis*, ut illam quàm maudicatur ad felicem Praxin.

I. *Prioris læsionis causa Remota* sunt (1.) *Ras ferunt* & causales, verb. grat. calidus aut ulto, Vulnere, & contusio capitis enormis, & cranii violentæ Depressiones, ac lous in caput, & similes externe læsiones, Memoriam destruentes; qualla Exempla PLINIUS *Nat. Hist. lib. 7. cap. 34.* RONDELETIVS *Med. Acad. pag. 314.* PLATERIVS *observat. pag. 23.* BORELLUS *pag. 2. observ. 37.* & TULPIUS *lib. 4. observ. 55.* allegant; sic etiam HILDANUS *anat. 3. observ. 1.* refert puerum aliis admodum ingeniosum, in quo ex Depressione cranii omnimoda Memoria abolita & stupida fuit secuta; sic LINDANUS *super Hartmannum*, ex subitanea capitis Percussione omnium rerum notat notam oblivionem obortam refert: Similia Exempla videbitis in SCHENCKII *observat. lib. 2. ubi de Memoria*, *observat. 9. & 10. pag. 74.* & 75. sicut ex Vulnere occipitis à scoplo per omnimodam Ratiocinationis & Memoriae ublationem observat obortum HORSTIUS *lib. 2. observat. 7.* Item nimia & frequens capitis Lotio Memoriam lædit. (2.) *conformatio* capitis & cerebri à *prime ortu vitio*, ita ut qui pravam cerebri figuram habent, utpote modum solidi, obliuio, &c. obervetur; vid. BARTHOLOINUS *anat. 2. Hist. 20.* WILLIUS *ad. cerebri lib. 1. cap. 3. fe. 4.*

II. *Secunda classis* sunt *causæ non formata seu Naturales*, atque classe Rerum vel Nonnaturalium vel præternaturalium. *Nonnaturalis* sunt vel assumpta diversæ, vel Excreta & Rerura, vel animi pathemata. Quod (1.) *assumpta*;

(1) Vide hujus Philosophi de memoria hypothesis à nobis breviter expressam, Tom. 1. Instit. Med. cap. 19. col. 274. lit. F.

pro. 1. g. Vini generosi immoderatus usus, seu potius abusus, ut et crebrior Ebrietas, Memoria labefacere solet. (4.) India gravior et diuturnior: sic observatum fuit in Virgine post diuturnam et tantummodo miraculosam Inediam, cum deo comederet isocript, Oblivione & Mentis stuporem successisse, teste HORSTIO lib. 2. observat. 25. (5.) Excessu, quando nempe naturaliter Excrementa supprimuntur. Suppressa sanguinis Evacuatio consocta & similis Memoria debetate potest: Exemplum supprellionis Mentis obliuione, Oblivione inducentis, per Cauterium in Occipite curatæ, videb. in BARTHOLOMIÆ. Hæstius, lib. 2. pag. 196. Item curiosam Observationem habet ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. Præf. admi. observat. 47. de Infamia orta ex supprellione morboidebus, postmodum tamco sponte curata ex distorta hæmorrhagia, facta in Interfamine per Porum quodam insensibilem: sic ex supprellione Lochis Puerperæ Oblivione cum Melancholia natam observat SALMUTH centur. 2. observat. 72. Item (4.) hæmorrhagia nimis, præter stuporem Mentis, Oblivione quoque inducunt.

III. Tertiū denique generis fuit (1.) assumpta visio, spiritibus Animalibus minus congrua: vid. RIVIERUS de quodam, qui post longam usum Aquæ Papaveris rhododæ Memoria fuit delituit & fatuus factus, in cujus Ventriculo Cerebri post mortem niger fæcitramentarius humor inventus fuit. Opī abusus Mentis stuporem & Oblivione subinde inducit: Sic WILLISIUS Pharm. Rat. pars. 1. pag. 306. ab Opī abusu mirabiliter & particularem Memoriam remissionem refert. Phlébra multum etiam in recessu habent, quæ uti non raro varias Mentis lésiones, & insipie Manias, ita etiam Fatuitatem & gravem Memoriam lésionem inducunt, teste SCHENCKIO in observat. Medicinal. lib. 2. de Memoria refert HEINRICUS ab HEER in observat. 12. de quodam Juvene quatuordecim annorum, supendi aliis Ingenii, qui quatuor Condiscipulis diversa deditabat Carmina, ipse verò quantum scribat, & obliuione tamen postmodum per Philtrum omnium rerum, imò etiam proprii nominis oblitus fuit, & Alphabetum rursus addidit: De Philtris, Felis Cerebro, alique Narcotice interne & externe applicatis, Oblivione ioculdam SENNERTUS Præf. lib. 1. pag. 241. 242. & 296. testatur. Sic etiam Pansa nonnulla assumpta omnem Memoriam perdere solet, vid. SCHENCKIUS in observat. Medicinal. lib. 2. de Memoria observat. 3. pag. 74. (2.) Pansa nimia, quæ quæ largis exerceatur, eo magis Memoriam debilitat, aut ad Fatuitatem disponit, vid. SCHENCKIUS in observat. ac casuum etiam, quod SALMUTH Cent. 1. observat. 61. refert de Viro docto, qui ut Conjugi placeret, usus fuerit simulaculis Venereis, unde sine Memoria redditus fuerat fatuus: Eadem lésio refert de quodam, qui ex nimio Venereis abusu adeo exsecratum habuit Cerebrum, ut illud intra Cranium hinc inde moveri perciperetur. (3.) Afflicti Animi diversis diuturnæ Curæ cum Vigilis conjunctæ, & studia immodica, præprimis circa diversa objecta, hic etiam in lædenda memoria multum faciunt. Nam ex terrene memoriam sapient ladi, notissimum est; item ex terrore repentino quodam memoria subito privatus refert SCHENCKIUS in observat. 2. loc. alleg. (4.) Morbi variis Cerebro & spiritibus Animalibus interis Memoriam abolentes, in specie Afflicti soporis, scilicet Lethargus, Carus, apoplexia, imprimis Morbi Acuti graviores, aut Febres Ardentes, item diuturniores Epilepsie, non raro Memoriam vitantes. Vid. PLATERUS observat. 7. & HILDEHEIM Phillog. 3. pag. 315. apoplexiam subinde Oblivione Lethargia lésio scriptura excitare, videb. in M. A. N. C. ann. 4. & 5. observat. 154. pag. 169. Sic etiam interitum ex Febre Ardente vel Acuta resurgentes omnino obliuioni redditū observati fuerunt in SCHENCKII observat. & CHRISTOPHORUS A VEGA lib. 3. art. Med. cap. 30. refert de quodam Franciscano, a Febre acuta Memoriam amittente, hinc etiam post Pellem Memoriam abolitam observat SCHENCKIUS. Ex Mania omnium rerum Oblivione habet TIMEÆUS de Gindakles, in casibus pag. 29. Ute tacem, quæ de Pestis illa Attica famosa referunt, quod in hoc Homines tanta omnium rerum cepere Obliuio, ut nec familiares nec se ipsos agnoscerent. Tandem HEINRICUS ab HEER in observat. 3. refert Exemplum de Viro quodam quadraginta annorum fatuo & obliuio factu (non nato) qui mortuus, cum Cranium fuisset apertum, Cerebrum scissimum & durum, adeoque in summa huius parte digitis friabile reperiunt fuit, una cum flavedine citri amula, odoqueque ad digitum altitudinem imbutum, circa Ventriculos tuncum & Balin mollius tuncum, II.

mem inventum fuit: quo non alibi SALMUTH cent. 1. observat. 61. (5.) senectus, dum verò grat. BASSIANUS LANDUS de Homine Nihilis, Franciscum Barbarum Græcarum literarum, quatum et doctissimus, in extrema senectute plaud oblitum fuisse refert. Hæc & similes Causæ Remotæ subinde bene pendende & bene recognoscendæ sunt in Praxi, ut pro varietate earum varietim Latam.

In quibusdam a Natura Memoria & Ratiocinatio est deficiens; in aliis verò per Naturam percipitur admodum subilis Memoria, & acriter ratiocinantur. Naturalem autem ad Memoriam inhabilitatem, adeoque Naturalem Impedimentum, seu difficultatem ut planè non carabim, prætermittit.

Interim in Memoriz lésione pro meliore medendi ratione in genere observetur diversitas (subtilitatem) si est a Causa Interna) an sit in Corpore leni) ut verò in Corpore juvenili) & si in Corpore leni Memoriz lésio, in his pro medendi Methodo ante adæ Vitæ ratio consideranda est, an Vita præcedens fuerit sedentaria & quæta magis ab Animi & sensuum Internorum moribus) an verò semper in his fuerit assueta, verb. grat. in Studiis, Curis, &c. Nam Juvenes, imprimis Malo Hypochondriaco graviores obnoxii, item Juvenes, qui interdum Epilepsia corripitur, debilem habent Memoriam, qualique hic dicit lésionis Exempla. Quod si illa Memoriz lésio est in Corpore leni, ut plurimum etiam reliquam Afflicti Animalium Torporis quodam conjunctum esse solet, propter spicuum similitudinem, Torporis, idque ferè ob Cerebrum Lympha copiosiore nimis inundatum, præprimis quando rejuvunt copiosa Phlegmata per Os & Aures: id quod fit imprimis in Senibus, quorum ante adæ Vita multis Curis aut studiis sublimioribus non fuit agitata, & Judicium adhuc aliquomodo valet: Nam in senibus doctis, quorum ompe Vita occupata fuit in studiis, Meditationibus, Curis ac Negotiis urgentibus, in his adhuc est sapè Judicium, & in talibus, quod probe observetur, Cerebrum aridum, secum, ac quasi porum nimis exilit, ori etiam in his Habitus Corporis aridus, somnus paucus, & raro excretio per Nares, & Os adeo, & licet dormiant, facile tamen evigilant.

In Junioribus, cum Memoria nonnihil debilis aut lesa nonnihil, Judicium tamen & similes Rationales Operationes, nempe via Judicii & Ingenii, sint ut plurimum vigæ & firmæ, debilitata saltem Memoria, dicitur Præstare: id quod fit ab spiritibus Animalibus subtiliores, agiliores, servidiores ac lere hgeos, (unde videtur talia agiles & acuti Judicii) unde Cerebrum similiter aridum & calaceum, minisque nutritio Succo irroratum: Hinc Judicium quidem ad tempus habile, fed Memoriam nonnihil debilis, & tales in leni Etate omnino Judicium & Memoriam amittunt, imprimis si sint studiis dediti, & sic ipse tandem fatuantur. Sin verò simul Judicium cum Memoriam firma addit in Juvene, præcora est Ingenium, fed raro durabile, quin solito citius Judicium & Memoriam amittunt. Quod si Juvenis sit, qui conquirat de aliquali Memoriam debilitate ita ut accedat Torpor sensuum Internorum, in tali Afflicti lésio, nempe Ratiocinatio & Phantasia, sunt obfusæ ac minus acutæ, quæ præter naturam statum Cerebri humidiorum & spirituum Animalium defectum inouunt, & cæteris paribus facile circumrigunt.

Quæ & similes Circumstantiæ in Praxi Memoriz lésie bene pendende; his enim neglectis, & Causis Remotis non probe ponderatis, facilius destituitur, quam promoveatur Memoria.

DIAGNOSIS.

Quod attinet signa Memoriz & Ratiocinationis vitiatæ, ex relatione Agri patent: imò & hujus Causæ Remotæ ex Vitæ genere, actionibus Animalibus, & similibus antecedentibus ac Concomitantibus, partim à Medico hæriantur, partim ab Agri confirmantur.

Est lésio Cerebri statum ac spirituum ex adjunctis ratione aliarum actionum Animalium, & bine ex antecedentibus Rebus Non-naturalibus, considerandus venit; speciatim ubi Agri est Juvenis, Judicio, studiis nimis additus, Diæta non admodum lauta utens in Cibis, qui de Memoriz defectu est querulus: in talibus ariditas & secitas Cerebri cum spirituum Animalium subtiliorum fervida agilitate in eadè est. Ubi verò est somnolentus, aut quando post affectus soporosos aut Lethargicos Memoria ladiatur, aut in actionibus Torpor percipitur, aut per Nares & Os copiosè excrevitur, aut quando est lenex studiis munda in Joventute deditus, &c. in his Memoriz lésionem ex spiritibus torpidis & nimia Cerebri Humiditate oriri suspicio.

est. Adhuc Temperatura Cerebri mediocritas, in aequabili ejus Textura fundata, ad Memoriam imprimis requiritur.

PROGNOSIS.

Quod attinet *Prognosis*: haec variis pro casibus Remotum varietate. Hinc Memoria laesa in eis, qui nimis studio sunt dediti, idque ex fervore & activitate spirituum Animalium, & fœcitate Cerebri, difficillime curantur, & tales, si Volatilibus, anaplectis, & aromaticis spiritibus utantur, plures Fatui tandem redduntur; scutoloni ex frequentiore ulis Confusio *anacardina* cuidam contigisse ex relatione D. D. MICHAELIS recordor; & ambrosia pro confortanda Memoria ab his, quibus Phantasia potentior est, assumpta, stuporem tandem Mentis inducere, notissimum est.

Econtra facilis & etiam melius est in iis, quibus cerebrum Lymphâ copiosiore madidum, & spirituum aliquis

Torpor, nisi senectus impedit.

Præterea *Memoria subitanea* magis laesa absque cura Externa orta imminenti apoplexia & Paralyticis, quia interdum Epilepticis, indicium est: in vero Aegro Vinum jam dum fructu hoc contingat, Mortis imminenti signum esset.

Naturalis stupiditas, & à capitis conformatione vitiosa, est incurabilis.

Superveniens pro casibus Remotis variis, nunc facilius, nunc difficilior curatur.

In specie, quæ est ex *Phlebotis*, rarissime & difficillime, vabilis est, quia uti supra dictum est, cerebrum tam anser afficitur ab his, & facile in Maniam degenerat.

Quæ ab *læterata Epilepsia*, similibusque capitis affe-ctibus, Morbis Malignis & acutis, item Venenis, aut Memoriz lætione, exindeque stupiditas, ferè incurabilis est. (K)

CL

(K) Occasione Stupiditatis Animi & Fatuitatis de qua loquitur hic Auctor noster, habet hic interferere Responsura, olim à nobis conscriptam, in Cl. Jurisconsulti morem gerentem; qui Testamentum, ab amicis & famâ, ut ajebat, ab ipso Penultia propria manu subscriptum, validum esse, obijectionibus licet acerrimis evanidis, in Foro contendebat: pro-
to enim habendum esse censuit, Fatuum à sapientia excellendam non esse illum, qui legere & scribere ferè sciverat. Le-
tu ergo notus is erat: nam qui Fatuus & Amens ab arte fuerit Legendi & Scribendi Artem addiscere nullo modo possit?

THESES.

Fatui & Amens ab ipse erit Legendi & Scribendi Artem addiscere
nequit.

Thesis probatur ex eo potissimum pendet, ut evelli calamus, in quoniam Legendi & scribendi Ars reposita sit, & que noster quinquam Fatuus, atque Amens sit appellandus.

Quod ad primum attinet, Jam Legere aliud non est, nisi deprehendere cogitationes ejus, qui scriptis, ex cognitis Characterum ab illis certa ratione excavatum, certaque ordine digestum. Sic contra Scribere est propriè etiam propriè tiones perscrutare per ordinem Characterum, qui communis gentium ferè omnium consensu ad hunc usum selegit. Quapropter qui Legendi Artem addiscere velit, ut prius bonum Characterum, quæ Scripsimus Elementa & Literas apparet, clarem ideam habeat, oportet, utque tam familiariter atque, ut vix conspiciat, sciat qui sonus aut vox singulari conveniat, & simul labia, dentes, aut guttur ad sonum ejusdem apte movere assuecat. Præterea necesse est, ut vocis innumerabiles syllabas variis Literarum combinationibus, quas Syllabas dicimus, atque harum syllabarum sonus, evelli eductis, Denique & illud ei adhibeantur, ex syllabis his, nunc majori nunc minori numero cognominatis, Dictiones seu Verba comping, quibus vel substantias, vel substantiarum Adjuncta, Actiones, Passiones, Analogias reliquasque proprietates designamus.

Hæc quidem ab eo qui legit mente promissa tenenda sunt: et Scribens præter hanc omnem scientiam, excavandum quoque Literarum Arte instructum esse debet, ut scilicet litteram in Syllabas & Distinctas certa methodo digerere, ut Mentis cogitationes expresse faciat quævis. Est Jura inter Legendi & scribendi Artem ex proprio, quam inter Methodum Analyticam & Syntheticam animadvertimus: quemadmodum enim Analysis est ad particularibus ad universalia ascendens, & Methodo Synthetica ab generalibus ad particularia descendens; ita quoque Legendi Ars à Literis ad syllabas transi, ab his ad Distinctas, atque ad Mentis Cogitationes; & contra Ari scribendi à Mentis Cogitationibus ad Distinctas, hinc ad syllabas & Literas elevantur, atque continuo sic velut in se non colligendas descendit.

His positis illud ulterius persequendum, qui Fatuus, Amens, sive Stultus vocandus sit, & quoniam Fatuitas, vel Amencia. Eligantissimum sane est, ut cetera omnia, Celeberrimi P. Malebranche equatur, qui ait Stulti nomine apud vulgus infirmis, non tam tam, casus dilla vel falsa veritatis, vel recte iudicandi rationi, repugnantiæ reorè sunt, sed illam potius, qui adversus communem plurimum sententiam aliquid dicit, aut facit, etiamque verissima & rectissima dicit & faciat. Aliqua festivissima exemplo confirmat: Si rusticus in sylvis semper ab infantia versatus in arcam acies à Dæo concessa sit, ut obiecta tam clare & distincte insuevit, ac nos elaboratissimis Telescopeis insueti; sane si Luna sciam inspicere, & Martem & vallis, & syphas, & signa, & maria, atque ea omnia posuimus in ista animadvertit, quæ Astronomi Telescopeis adjumento vix ab hinc seculo in Luna deprehenderunt. Si inquam Rusticus hic suis aequalibus, quæ veri in Luna sunt & ipsi jam oculis videt, narrare audiat, quoniamque verissima narrat, pro stulto nihilominus laboratur.

Est Jecis & vulgi erroribus relictis, Amementem, Fatuum, Stultumque appellamus illum, qui ex mentis imminutis & infirmis functionibus, ea cogitat, quæ à recta rationis semita aberrant. Ea, inquam, cogitat: ut in hac Cogitationum aberratione tantum, vera amencia consistit. Qui enim falsa & stulta loquitur & operatur, nunquid per via falsa cogitatione loquitur & operatur: nec pisset qui stulti loqui aut operari, nisi falsis prius cogitaverit: dummodo si ista opera non faciat, & se recte recte cogitaverit, dicitur tamen falsisque stultum esse utare simulat vellet: quod idem illum est & non stultitia propter obesse ceteris demonstrabit.

Si ergo Stultitia & Amencia in aberrantibus Mentis Cogitationibus sua est, ut erant Amencia species, quæ cogitationem mundi. Mentis Cogitationes vel impenduntur i. in verum simplicem perceptionem & Ideas: vel 2. in Ideam inter se comparationem Judicium ferendum, ut scilicet una de altera vel affirmari vel negari debeat: vel 3. in Ratiocinationem concludendam: ut nunc ex duobus vel pluribus Judiciis simul comparatis, aliquid evidenter inferamus: vel 4. deinde in facta multarum Ratiocinationum accepta collatione, ad Veritatem magis confusos & abditos. recta Methodo gradum facientes. In omnibus ergo, vel in aliquibus in his Cogitandi Modis, error subesse poterit & aberratio, adeoque Stultitia & Amencia.

Quod primus & secundus Cogitandi Modus, b. e. Imaginatio, & Judicium, erroribus, adeoque Stultitia dicitur sit, extra eorum adhibitionem aliam est: quia cum in debium revocare poterit, posse amementem & stultum ea imaginari quæ nunquam sunt, & illud Judicium de rebus ferre, quod rebus non convenit, in sequendo quæ affirmanda sunt, & contraria? De tertio tamen cogitandi Modo, sive de Ratiocinatione, non una erroris mens est: existimant enim, & non debent

gia sistenda; Evacuationes conuulsæ suppressæ promouenda; Hemoria genitalia diuidentia immoderata, ac Iacchia diuturnior euuanda. Hinc

1. Constitutio Cerebri, ad illud aridum nimis, an humidum? & spirituum Animalium ratio probè consideranda est; & ubi illi sunt nimis ignei & seruidiores, & Cerebrum aridum, hæc sunt attemperanda, & ad flatum naturalem reducenda, sola nempe Diata laeta & esuæpe, & alimentis succulentis, & bene auticibus, v. g. lacte & lacticiis, chocolata in lacte vel Vino assumpta, &c. Spirituum volatilitatem blandè temperantibus, & chylolo rore imprægnatis, irrorantibus, Quercæ, &c. Ubi vero cerebri nimia humiditas præpollat, & spiritus sunt torpidi, minus agiles, Volatilibus quasi sunt excitandi, fuscicandis, & subleuandis, Aromaticis Cephalicis Acrisibus, Spirituosis & similibus crebro adhibitis.

Adeoque prior illa Memoria læso ex ariditate & squalore Cerebri & spirituum serore nata, ex fonte pharmaceutico non solet curari, sed saltem diata laeta & humida, quæ copiosum torridum Nutrimetum exhibet; posterius vero Aromaticis Cephalicis restauranda, & quantum possibile, detundè curanda. Omnes hæc & alia circumstantiæ probè examinandæ sunt; & alias Remediis citius immineo, quam iuari solet Memoria.

Pro varietate ergo *Canforum* tantum subinde *Species* utendum est. Ut plurimum tamen læsio Memoriæ, quæ simplicitatem infert, & curari debet ac potest Medicamentis Pharmaceuticis, ex spirituum Animalium torpore, & humidiorum Cerebri constitutione, originem ducit; unde & si serosiorum humorum abundantia subit, post Purgantia blandiora, *Masticaria*, & *Aromaticia*, ut plurimum Aromaticis conducunt; sed ne his Aromaticis in contrarium fiat precepta lapsus, iussum Diata temperata humida, & rocem nutritivum copiosum suggerens, instituitur.

Remedia ergo quod attinet: in genere omnia Cephalica di-
cta, *Salvia volatilis*, *Spirituosa*, *Olerata* & *Aromaticæ*, ad roborandum Memoriam & accendendum Ingenium multum laudantur, non tamen temperata sunt; v. g. profunt Rosmarinus, Melissa, Oryzæ, Flores Liliorum convallium, Scorchados Arabice, Tonicum, Primula Veris, Spicæ, Serpillum, Cobeæ, Caryophylli, Cardamomum, Cinnamonum &c. Et imprimis *Cubebs*, numero tres mane jejuno stomacho comellæ, acuat insigniter Ingenium & Memoriam: siquidem ipse adhuc puer cum ab informatioribus coactus fuerit ad edificandas lectiones, si voluerim aliquid retinere, assumpsi Cubebas tres vel quatuor jejuno stomacho (moderata eorum dosis fit, cum sint nimis volatiles); & percepti operationes Memis insigniter acutæ. Quod etiam faciens grana *Cardamomi*; sed in iuvene Rodiola cautè applicentur, propter nimiam volatilitatem & acrimoniam aromaticam, in senibus verò tutiora sunt. Præterea *Thes*, *Cassoreum*, & *fascinum* cum omnibus succinatis, etiam ad memoriam laudatur, in specie Thasibum puluerisatum, circa plenilunium & novilunium assumptum, laudatur ad roborandum memoriam. Ex præparatis & Compositis Conservæ recentiorum Vegetabilium, horumque Oles destillata, imprimis Cinnamonum, sunt præscribenda. Sic quoque *Puleio Trichomit* admodum laudatur ad roborandum memoriam, cuius descriptionem videt in *Prax. Chymicarum*. HARTMANNI Cap. 14. ubi de memoria læsione. Aliam compositionem habet SCHROEDERUS in *Pharmacopoeia Medica Chymica*. Part. 1. pagin. 278. Item huc facit Pulvis Analepticus *Mindereri*, Species Aromaticæ rosæ, Species Dianthos, Diambæ, Diosmichi dulcis, & similes, sunt admodum convenientes. De Ambra noto, quod sit omnium optima, & quod non habetur par remedium in firmandis Viribus animalibus, & roboranda Memoria, omnibusque mentis actionibus: adeo ut nihil æquè fusciet Senes labentes, quam Ambra, five sub forma pulueris aut sacchari exhibetur, five sub forma Effectiæ vel Tincturæ, parandæ cum spiritu Rosarum aut cerasorum nigrorum, vel cum spiritu Mellis præparandæ, propinquantur. Item elegantissima etiam sit *Tinctura Cephalica* ex granis Chermæ & Ambra, cum spiritu Liliorum convallium, vel aliis dulcibus spiritibus, extractis.

Sed observatur de his ambra, quod caute admodum interne sint usurpanda, speciatim cantius & parcius in Iuvenibus calidioribus, aut ubi ex ariditate Cerebri Memoriæ læso metuitur, tamen autem Senibus. Nam sicut verum est

quod ad tempus quidem fusciet memoriam, & reddet ambulem; ita crebriori usâ data postmodum plus nocet, quam prodest, cum præmatam stupiditatem post se relinquit, vim enim aliqualem inebriativæ-narcoticæ Ambra hinc conjunctam, ratione cuius etiam revera spiritus admodum resocillat & seruidos reddit, sed postmodum scilicet festoque virtute inebriativa stuporem & omnimodam functionem & stultitiam infert. Cauti ergo sumas in usâ Ambra, ac decur potius Ambra parca & sparsa, quam semel in nimia dosi; hinc interdum etiam ejus usus Senibus coarctatus, sed abusus fugiendus, quoniam certum est, quod insipiditatem etiam inerat totalem in senibus. Sic notum quoque est, quod Ambra egregiè Venereum stimulat: & tunc observari dignum est, quod omnia imprimis Aromatica, Venereum propriè stimulantia, Vulsilia, Spirituosa, Iuracea, & similia omnia, ad adiones animales & Memoriam roborandum conducant; hæc tamen cum nota, si iis stimulo Venereo velimus frisciscere, Memoria infirmior bilietur. Unde Chocolata cum Vino hanc moderatè hanc erem stimulat, quia suppressa Memoriam etiam egregiè mar, in specie ipsa Lactis usurpatur: Hinc etiam *Ambræ* egregiè Venereum stimulat à PARACELSO ad Memoriam firmandam mirificè commendatur, quod etiam Venereum est, unde etiam necesse, ut fraxum inicitur hinc: quod magis aotem impetus Venerei cohibetur, ut magis Memoria roboratur.

Potè Ambra ratione *Confessio Al-Chermæ* Memoriæ mandare, imprimis senibus, conducit; sicut etiam si commendari solet *Confessio Anardina*; sed causâ vnde usurpatur propter ingredientia Vegetabilia nimis aromatisata volatilia; unde ejus abusu quidam insani, sunt febricitantes facti fuerant, adeo ut rarissime vel ausque usurpanda.

Insuper spectant hæc omnia Spirituosa ex *Fræmis* ista, quæ omnibus functionibus animalibus robor adit, & speciatim *Aqua Magnanimitatis* *Laurenbergii* ad Memoriam roborat & Ingenii acumen laudatur; quæ etiam ipsa egypti stimulat Venereum; de qua, etiam eisdem *Aqua* memoriam firmandi, videtur LAUREMBERGIUS in *libello* de rarissimo *Mentem* dicto in *Anno* 3. M. A. H. G. a. p. pagin. 599. ubi omnis ejus Remedia pro memoriam in *colleg. Janseniana* D. MICHAELIS invenienda, ubi omniam in hoc puncto sit. Negotium periclitè requatuor: (1.) *Masticaria*, (2.) *Capris* lene (3.) *no Magnanimitatis*, & (4.) *Linimentis* acutis. Et hæc in casu possent usurpari, ubi scilicet torpor spirituum, & cerebri inundatio. Nam quod primum, *Masticaria* in *phlegmaticis* est tale:

℞. Herb. Nicotian. succul. m. ii.
Rad. Zingiber. ℥ii.
Zingiber. ℥i.

Cum Melle purissimo in Pulvere redacta, commiscetur, & fiat Globuli in forma Pillularum majolarum.

De quibus omni mane una in Ore agitentur hinc inde unde copiosum Phlegma colligitur in Os, quod expellendum.

Quoad secundum, nempe *Linimentum Capitis*, est hæc

℞. Herb. Meliss.
Myrtan.
Salvia ros.
Rosmar.
℞℞. Lauri an. M. i.
℞℞. Lavend.
Lil. convall.
Tilia.
℞℞. Arab. an. p. l.

Coqu. in Vitis *Alban.* Gallico, vel Rhenano: quod put lavetur omni quarto, quinto, vel sexto die.

Quoad *Aquam Magnanimitatis*, ea est hæc:

℞. Vin. Malvac.
In cujus l. q. macera per 14. dies & noctes

Herb. Basilic.
Myrtan.
Salvia.
Melissa.
℞℞. an. M. i.

℞℞. Sarrag.

Salvia.

℞℞. Prim. Veris.

Rosmar.

℞℞. Arab. an. p. l.

Hinc destilla per Alembicum:

Spiritus destillatum in Cucurbitam amplam supra aptam inde, & pone in Nidam Formicarum circa Solfitionem æquum, nempe in talem Nidum, cujus Formicæ percussæ manu Acidum de se spirant, & quæ ocella habent Ova, & sunt nigre, German. *Schwarzwurme*, & majuscula, quæ reperiuntur circa Arbores resinosa: in ejusmodi æquum hanc Cucurbitam illo spiritui vini aromatico impleant, ut saltem quarta pars Cucurbitæ sit plena, pone hinc in distillam Cucurbitam Formicæ irrequæ, quarum ubi præter proper Manipuli iv. vel v. Irreperit, bacillo liquo commoveat fuit, ut omnes suffocentur. Hoc factu digere Farmicæ cum spiritu Vini aromatico adhuc per dies & noctes 14. in radiis solatibus, hinc abstrahere spiritum destillando, in quem infunde:

Conf. Amandi.
Cinnamon. ana ℥i.
Cruci ℥ss.
Misti q. s. sst.

Mista digerit, filtrando depurat.

De hac Aqua dat Cochlear unum in Iussu Vini modice generosi, tempore matutinis quotidie, vel saltem alterna diebus pro varietate circumstantiarum.

Quoad quantum, Limbamentum æquum est illud.

℥. Herk. Nicotina. M. li.
℥. Her. Basilic.
Misti.
Primal. Vitis.
Mojran. ana M. li.

Omnia confusa misce. cum

Ol. Olivæ.
Soyri non solit. ana ℥iil.
adde

Vin. Rheum. vel Malvac. ℥v.

Coc. pro Limbamento crasso, & Cola.

Il limbus externæ Temperibus, & crebris Vertici.

Cum dicta Aqua Magnanimitatis Laurentbergii quidam facinus essentiam ex Confectione Anacardina, & sic tutius ferè u surpant Remedia Anacardina: Confer. HARTMANUS Praxis Capit. 14. §. 2. Porro nota est Aqua Saphorum Bernicelli, item Aqua Cephalica Myrsinoli, Quarta Essentia Marshioli, Aqua & spiritus Cerebri humani: quæ omnes commendatæ sunt pro robore memorie à BARTHOLETO. Myrsinoli conditæ, in specie Myrsinoli Chelidæ conditæ, laudantur. insigniter à MONTAGNANA ad conciliandam memoriæ firmitatem, si subinde Eger ocam alteramve comedit. Idem MONTAGNANA Conf. 71. commendat sequentes Pillsas, quas bonum secretum vocat ad memoriæ, quibus Vitæ socia doctum, sed memoriæ privatum, restituit.

℥. Calicut.
Calamath.
Mafiches.
Nos. Mafiches.
Caryophyll. ana ℥i.
Ambr. Orient. ℥ss.
Misti q. v.

Misc. & cum Sacc. Maltæ. f. Pilulæ.

De quibus anni vespere, dum vadit ad lectum, deglutiat aliquot, mæoe vespere capiat duplum, hinc sequantur duas vel quatuor horas.

Sic celebres sint Pillsæ ad Memoriam Solliciti.

℥. Alus ℥i.
Rhabarb. ℥i.
Myrsin.
Cruci.
Agar. ana ℥i.

Rad. Gentianæ.

℥ssar. ana ℥i.

Cum Theriac. q. v. f. Pillsæ, magistralisne

Francolantienum.

Quarum septem vel novem deglutientes.

Vel Species hæc extrahi cum spiritu Vini possunt in forma Elixiris: Vid. VELSCHIUS Methem. Costar. 1. Observatio. 50. amez. Anno 4. & J. M. A. N. C.

Hæc adnumeranda est Herba Theriac, egregie faciliates Animales & operationes mentis interinas confortat; & quidem decodum ejus mirabile est, dum Judicium, & Memoriam maxime augeat, magis tamen Senam quam Juvenem, & ita ut sine Somno & Torpore aliquandiu perstant, nempe in Vino bullita, cujus haustus omni mane assumatur.

Hæc sunt Interca, quibus addi possunt spiritus & Essentia Salvia, Rosamarinii, Mellissæ, Ligustici Aloes, Libanum convallium, Cinnamon, Cardui, Ambæ, & Similes.

Vel

℥. Aqua Cephal. ad intera.
Sophr. ana ℥i.
Quina. Essent. Marshioli. ℥ss.
Spir. Ceraf. nig.
Lili. convall.
Prim. Vitis.
℥ss. Ambra ana dr. i.
Syr. de Bala. ℥i.

Potio Caput & Memoriam confortans.

Vel

℥. Conf. Flor. Amandi.
Salvia.
Turk. an. ℥ss.
Nos. Ind. read. dr. iil.
Spec. Diamb.
Diamficht. dale.

Spir. Lili. convall. ana dr. ℥ss.

Cum f. q. Syr. Flor. Tancis f. Electuarium.

D. 3.

Electuarium Caput & Memoriam confortans.

Item

℥. Carb. piog. Nn. vi.
Senn. Em. dr. vi.
Cartham. ℥i.

Cum Syr. Flor. Tancis f. Electuarium.

D. 5. ut notè.

De quo Dosis quantitas Juglandis tempore matutino: A meridien sursum potest liquor Cornu Cervi succinatus, spiritus Carminarius, vel Salia Ammoniaci caryophyllatus; vel succinatus.

Remedia Lavaria pariter & hic locum inveniunt. Notum est de Lunæ salura memoriæ robat conciliat; quare Resolutio Lonzæ cum spiritu Salia Ammoniaci vinofo ad imitationem KUNCKELII parata hic probus foret. (L)

Externæ paucæ sunt, quæ locum inveniunt. Oleum Myrsinæ per deliquium solum infer insigniter commendari: Videat. SCHROEDERUS in Pharmaceut. quod divinum remedium vocat HILDESHEIM in spirit. ad Memoriam. Oleum hoc Myrsinæ per deliquium 6 Temporibus & Occipiti innotat, miris modum restitueret alicui. Sic ZAPATHA curavit memoriæ immixtionem ex abundantiam succorum frigidorum in Capite per spiritum Vini, cui Piperis parum iussum fuerat, innodando hoc hinc subinde Sutura Coramlem & Sagittalem: Videat. ZAPATHA cap. 4. in Cl. Medic. Simile quid est, quod commendat HILDESHEIM in spirit. 3. pagin. 319. ubi laudat frequentem Essentiam ad memoriæ conciliandam: nempe

℥. Vol. Boreit.
Salvia.

La-

(L) Si vera sunt quæ de memoriæ ex Des Cartes docuimus: Tom. 1. Instit. Med. part. 1. cap. 19. col. 174. lit. F. colligere facili possumus, Remedia, quæ vult per perficienda Memoria à Medicis exhibentur, esse plerumque vana: nisi tamen Memoria lapsa oriam deus ab infarctis Cerebri ab humoribus p. n. facto, qui quidam Remedia tolli possunt. Nalla igitur alia Methodus est perficienda Memoriam, quàm repetita & repetita rerum memorabilium Imaginatio: ut scilicet spiritus pluribus per easdem semitas transcurrat, perpetua vobis vestigia in Cerebri meatibus excutiant. Præter id spiritum Memoria subditum est Ideas rerum memorabilium Ideis rerum obviatis & aditis occurriturum alligare: etenim ex eo quia unus vel imaginatio excitat alterius recordationem, fieri facile potest, ut ex recordatione rei obviæ, quæ facili negotio erit, docuam intrinsecum abstraham recordationem. Atque in hac negotio consilia ipsi Memoriam illam quæ Localem vocamus, cum nempe abscipit rei recordatur, respicit habito ad Locum ubi res ipsa scripta est, vel ubi illum didicimus, aut habita ratione Magistri docentis, Figura quæ illum exprimebat, & fortassis ad Annos temperat, Divi accidentia, externarum rerum casus, & similia quædamque reconstruimus. Per hæc parum ipsa, quæm verbis addidici possumus.

gia sistenda; Evacuaciones conducentes suppelle promouenda; Humoris genitalis dispensa immoderata, ac Insuper diuturnior evitanda.

Hinc
a. *Constitutio Cerebri*, in illud aridum nimis, an humidum? & *Spiritus Animalium* ratio probe consideranda est; & ubi illi sunt nimis ignei & fervidiores, & Cerebrum aridum, hac sunt temperanda; & ad fluxum naturalem reducenda, sola nempe Dieta laeta & copiosa, & alimentis succulentis, & bene nutritivis, v. g. lacte & lactisius, chocoleta in lacte vel Vino assumpta, &c. Spirituum volatilitatem blande temperatibus, & chylis rore imprægnatis, irrorantibus, Quies, &c. Ubi verò cerebri olia humiditas præpoller, & spiritus sunt torpidi, minus agiles, Volatilibus quasi sunt excitandi, succulenti, & subtilissimi, Aromaticis Cephalicis Acidis, Spirituosis & similibus crebè adhibitis.

Adeoque prior illa Memoria lapsu ex ariditate & squalore Cerebri & spirituum fervore nata, ex fœne pharmaceutica non solet curari, sed saltem dieta laeta & humida, quæ copiosum torridum Nutritum exhibet; posterius verb Aromaticis Cephalicis restituerenda; & quantum possibile, deinde curanda: Omnes hæc alia circumstantiæ probe examinanda sunt; & alia Remedia titulis immixta, quam juvari solet Memoria.

Pro varietate ergo *Causarum* tantum subinde specibus utendum est. Uplurimum tamen læsio Memoria; quæ stupiditatem infert, & curari debet ac potest Medicamentis Pharmaceuticis, ex spirituum Animalium tempore, & humidiorum Cerebri constitutione, originem ducit; unde & si ferocior humorum abundantia subit, post *Purgantia* blandiora, *Masticatoria*, & *Sternutatoria*, uplurimum Aromaticis conducunt; sed ne his Aromaticis in contrarium fiat præcepta lapsus, infusum Dieta temperata humida, & rurem partivum copiosum fuggere, insilicanda.

Remedia ergo quod attinet: in genere omnia Cephalica di-
cta, *Salia volatilia*, *Spirituosa*, *Olerata* & *Aromaticis*, ad roborandum Memoriam & acundum Ingenium multum laudantur, non tamen semper acriter; v. g. profunt Rosmarinus, Melissa, Ocymum, Flores Liliorum convallium, Scorchados Arabice, Tunicæ, Primulæ Veris, Spicæ, Serpillum, Cobebe, Caryophylli, Cardamomum, Cinnamonum &c. Ex imprimis *Cubeba*, numero tres mane jejuno stomacho comedit, acutus insigniter Ingenium & Memoriam; siquidem ipse adhuc puer cum ab informatioribus coactis fuerit ad edificandas lectiones, si viderem aliquid retinere, assumpti Cubebæ tres vel quatuor jejuno stomacho (moderata eorum dosi sit, cum sint nimis volatiles); & percepti operationes Mentis insigniter acutas. Quod etiam facit gratia *Cardamomi*: sed in juvene Rudis lo cautè applicetur, propter nimiam volatilitatem & acrimoniam aromaticam, in senibus verb tutiora sunt. Præterea *Thus*, *Cassipernum*, & *Sassaia* cum omnibus succinatis, etiam ad memoriam laudantur, in specie *Thus* alium pulverisatum, circa plenilunium & neilunium assumptum, laudatur ad roborandum memoriam. Ex præparatis & Compositis Conservæ recentiorum Vegetabilium, horumque Oles destillata, imprimis Cinnamonum, sunt præscribenda. Sic quoque *Pulvis Tribuiti* admodum laudatur ad roborandum memoriam, cuius descriptionem videt. in *Prax. Chymicæ*. HARTMANNI cap. 14. ubi de memoria loquitur. Aliam compositionem habet SCHROEDERUS in *Pharmaceut.* *Medic. Chymicæ*. Part. 1. pagin. 272. Item hoc facit *Pulvis Analepticus Mindorri*, Species Aromaticæ rolate, Species Dianthi, Diambræ, Diamoschi dulcis, & similes, sunt admodum convenientes. De Ambra noto, quod sit omnium optima, & quod non habetur per remedium in firmandis Viribus animalibus, & roboranda Memoria, omnibusque mentis actionibus: adeo ut nihil æque fœliciter Senes habefcentes, quam Ambra, siue fab forma pulveris cum ana Sacchari exhibetur, siue fab forma Efflentis vel Tincturæ, paranda cum spiritus Rosmarum aut cerasorum nigritum, vel cum spiritus Mellis præparandæ, propinquant. Item elegantissima etiam sit *Tinctura Cephalica* ex granis Chermæ & Ambra, cum spiritus Liliorum convallium, vel aliis distillis spiritibus, extractis.

Sed observetur de his ambra, quod eandè admodum internè sunt usurpanda, speciatim cautius & parcius in juvenibus calidioribus, aut ubi ex ariditate Cerebri Memoria lapsa neculatur, tutius autem Senibus, Nam sicut verum est

quod ad tempus quidem fœlicitat memoriam, & reddat mixibilem; ita celebriori usu data postmodum plus nocet, quam prodest, cum præmaturation stupiditatem post se reliquat; vim enim aliquam inebriativam-narcoticam Ambra habet conjunctam, ratione cujus etiam revei: spiritus admodum refocillat & fervidus reddit, sed postmodum sensim sensimque virtute inebriativa stuporem & omnimodam Fatuetem & stultitiam infert. Cauti ergo sumus in usu Ambra, ac derer potius Ambra parca & lapsa, quam semel in nimis dole; hinc interdum etiam ejus usus Senibus concedendus, sed abusus fugiendus, quoniam certum est, quod stupiditatem etiam interat totalem in senibus. Sic notum quoque est, quod Ambra egregiè Venereum stimulet; & simul observatu dignum est, quod omnia imprimis Aromaticis, Venereum propriè stimulantia, Volatilia, Spirituosa, lary-racea, & similia omnia, ad adiones animales & Memoriam roborandum conducant; hac tamè cum nota, ut si stimulo Venereum velimus satisficere, Memoria insigniter debilitetur. Unde Chocoleta cum Vino hausta moderatè Venereum stimulat, quia suppressa Memoriam etiam egregiè firmat, in specie hoc Lactè usupatur: Hinc etiam *Asyrum* egregiè Venereum stimulat à PARACELSO ad Memoriam firmandam misicè commendatur, quod etiam Venereum est, unde etiam necesse, ut fræum initiatur Venere; quò magis autem impetus Venerei cohibetur, eò magis Memoria roboratur.

Potè Ambra ratione *Confectio Al-Chermæ* Memoriz firmandæ, imprimis fœlicis, conducit; sicut etiam ab aliis commendari solet *Confectio Ascardina*; sed eusti admodum usurpetur propter ingredientes Vegetabilia nimis acris, & nimique volatilia; unde ejus abusus quidam infans, alii acutè febricitantes facti fuerunt, adeo ut rarissime vel nunquam sit usurpanda.

Insuper spectant hæc omnia Spirituosa ex *Fœmieis* parata, quæ omnibus functionibus animalibus robur addunt, ac speciatim *Aqua Magnanimitalis* Laurebergii ad Memoriam robur & Ingenii acumen laudatur; quæ etiam ipsa egregiè stimulat Venereum; de qua, etiam ausdem Arte memoriam firmandi, videt. LAUREMBERGIUS in *libello* in rarissimo *Mnemotica* dicto in Anno 3. M. A. H. C. in *Append. pagin.* 399. ubi omnia ejus Remedia pro memoriz in *colleg. Justenianæ* D. MICHAELIS inveniendæ, *ulst* omnium in hoc puncto sit, Negotium perficere molis quatuor: (1.) *Masticatoria*, (2.) *Capitis linientia* (3.) *Aqua Magnanimitalis*, & (4.) *Linimenta externa*. Et hæc in illo casu possunt usurpari, ubi subest corpus spirituum, & cerebri inundatio. Nam quod primum, *Masticatorium* cu *apoplegmarum* est tale:

℞. Herk. Nicotian. succul. m. ll.
Rad. Pyrethr. 3iij.
Zingiber. ʒi.

Cam Mella purissima in Pulvere redacta, commisceantur, & fiat Globuli in forma Pilularum majuscularum.

De quibus omni mane una in Ore agiteur hinc inde, unde copiosum Phlegma colligitur in Os, quod expiendum.

Quoad secundum, nempe *Liniment Capitis*, est hæc:

℞. Barb. Mifg.
Majoran.
Salvia ros.
Ravim.
Fol. Lauri an. M. i.
Flor. Lavand.
Lil. convall.
Tilia.
Stach. Arab. an. p. l.

Cogn. in Vno lityan. Gallico, vel Rhemano: quo Caput lauetur omni quarto, quinto, vel sexto die.

Quoad *Aquam Magnanimitalis*, ea est hæc:

℞. Vin. Malvæ.
In tujis ʒ. macera per 14. dies & noctes
Herk. Balsim.
Majoran.
Salvia.
Mifg.
Fol. an. M. i.

Flor. Berreg.
Salvia.
Flor. Prim. Veris.
Ravim.
Stach. Arab.
Lil. convall. an. p. l.

Hæc destilla per Alembicum;

Spirituum destillatum in Cucurbitam amplam suprà apertam inde, & pone in Nidum Farmicorum circa Solstitium æstivum, nempe in talem Nidum, cujus Funicus percussit manu Acidum de se spirant, & quæ nulla habent Ora, & sunt nigre, German. *Schwartzeerde*, & majusculæ, quæ reperiuntur circa Arbores resinosa: in ejusmodi æcerum hanc Cucurbitam illo spiritui vini aromatico impleant, ut saltem quarta pars Cucurbitæ sit plena, pone: hinc in istam Cucurbitam Formicæ irrepant, quarum ubi præter propter Manipuli rei, vel v. irreperant, bacillo liquo commoveunda sunt, ut omnes suffocentur. Hoc facto digere Formicæ cum spiritu Vini aromatico adhuc per dies & noctes 7. in radiis solaribus, hinc adstrabe spiritum destillando, in qua insunde

Conf. Ancard.
Cinnamom. an. ʒi.
Cerei ʒi.

Melchi gr. xlii.

Missa digerit, filtrando depurat.

De hac Aqua dæ Cochlear unum in hausta Vini modicè generosi, tempore matutino quotidie, vel saltem altera diebus pro varietate circumstantiarum.

Quoad quartum, Linimentum externum est illud.

ʒi. Ner. Nicotina. M. li.

Fior. Basilæ.

Melchi.

Primul. Veris.

Majoran. ana M. li.

Omnia contusa misc. cum

Ol. Olivæ.

Myrris ana salis, ana ʒiij.

adde

Vini Rubeni, vel Malvæ. ʒv.

Coq. pro Linimento crasso, & Cola.

Illinatur externè Temporibus, & crebrius Vertici.

Cum dicta Aqua Magnanimipatis *Laurembergii* quidam faciant essentiam ex Coniunctione Ancardina, & sic tutilia ferè usurpant Remedia Ancardina: Confer. HARTMANNUS Praxis Cap. 14. §. 2. Porro nota est Aqua *Schroederii*, item Aqua *Cephalica Myrsinæ*, Quina *Essentia Martialis*, Aqua & spiritus *Cerebri humani*: quæ omnes commendatæ sunt pro robore memorie à BARTHOLETO. Myrobalani conditæ, in specie Myrobalani Chelidæ conditæ, laudantur, insignitur à MONTAGNANA ad conciliandam memoriam firmam, si subinde Eger unam alteramve comedat. Idem MONTAGNANA Conf. 71. commendat sequentes Pilulas, quas bonum secretum vocat ad memoriam, quibus Virtus antea doctum, sed memoria privatum, restituit.

ʒi. Caliclar.

Calaminth.

Meliches.

Nuc. Muschæ.

Caryophyll. ana ʒi.

Ambr. Orient. ʒʒ.

Melchi gr. v.

Misc. & cum Sac. Majoran. f. Pilulæ.

De quibus omni vespere, dum vadit ad lectum, deglutiat aliquot, mane verò capiat duplam, hinc jejunoet duas vel quatuor horas.

Sic celebres sunt Pilulæ ad Memoriam *Schizii*.

ʒi. Alus ʒi.

Rhabarb. ʒi.

Myrris.

Cerei.

Agor. ana ʒi.

Rad. Geniæ.

Zedair. ana ʒi.

Cum Theriac. opt. q. f. f. Pilulæ, magnitudine Frascuflantentum.

Quarum septem vel novem deglutitendæ.

Vel Species hæc extrahi cum spiritu Vini possunt in forma Eliasis: Vid. VELSCHUS *Millemum*. *Creat.* 1. Observationum. 50. annos. *Ann.* 4. & 5. M. A. N. C.

Hic adnumeranda est *Herba Thea*, egregiè facultates Animales & operationes mentis internas confirmans, & quidem decodum ejus mirabile est, dum Judicium, & Memoriam maximè augeat, magis tamen Senium quam Juvenum, & ita ut sine Somno & Torpore aliquando perstant, nempe in Vinobullata, cujus haustus omni mane assumatur.

Hæc sunt interna, quibus addi possunt spiritus & Essentia Salviæ, Rosmarini, Melissæ, Ligii Aloes, Liliorum convallium, Gloriammi, Caltræ, Ambræ, & similes.

Vel

ʒi. Aqua Cephal. ad interd.

Sophor. ana ʒi.

Quint. Essen. Martialis. ʒʒ.

Spir. Cereb. nig.

Lill. convall.

Prim. Veris.

ʒʒ. Ambræ ana dr. i.

Syr. de Betæ. ʒi.

M. s.

Potio Caput & Memoriam confortans.

Vel

ʒi. Conf. Fior. Anthe.

Salvia.

Tankr. an. ʒʒ.

Nuc. Ind. road. dr. iij.

Spec. Diam.

Diamorphi dale.

Syr. Lill. convall. ana dr. iij.

Cum f. q. Syr. Fior. Tanica f. Electuarium.

D. s.

Electuarium Caput & Memoriam confortans.

Item

ʒi. Carb. ping. No. vi.

Sem. Eræ. dr. vi.

Curtham ʒi.

Cum Syr. Fior. Tanic. f. Electuarium.

D. s. ut autè.

De quo Doctus quantitas Juglandis tempore matutino: A meridie usurpari potest liquor Cornu Cervi succinatus, spiritus Carminativus, vel Salis Ammoniaci caryophyllatus, vel succinatus.

Remedia Locaria pariter & hic locum inveniunt. Notum est de Lunæ salura memorie robur conciliante; quare Resolutio Lunæ cum spiritu Salis Ammoniaci vinofo ad imitationem KUNCKELII parata hic proficua foret. (L.)

Externæ paucæ sunt, quæ locum inveniunt. Oleum *Myrris*: per deliquium factum solet insigniter commendari: Videat. SCHROEDERUS in *pharmaco*. quod divinum remedium vocat *HILDESHEIM in Spiritu ad Memoriam*. Oleum hoc Myrris per deliquium 6 Temporibus & Occipiti innungatur, mirisimè memoriam restituere affert. Sic ZAPATHA curavit memoriam imminutam ab abundantia succorum frigidorum in Capite per spiritum Vini, cui Piperis parum infusum fuerat, innungendo hoc ipso subinde Sutura Coramæ & Sagittalem: Videat. ZAPATHA cap. 4. in *Cl. Medis*. Simile quid est, quod commendat *HILDESHEIM in Spiritu*. 3. pagin. 319. ubi laudat sequentem *Essentiam ad memoriam conciliandam*: nempe

ʒi. Fol. Betule.

Salvia.

La-

(L) Si vera sunt quæ de memoria ex Des Cartes docuimus: Tom. 1. Infit. Med. part. 1. cap. 19. col. 274. lit. F. colligere facile possumus, Remedia, quæ videntur pro perficienda Memoria à Medicis exhiberi, esse plerumque vana: nisi tamen Memoria lapsa oritur dicitur ab infarctu Cerebri ab humoribus p. n. facto, qui quidam Remedia tolli possunt. Nulla igitur alia Methodus est perficienda Memoriam, quam repetita & repetita rerum memorabilium Imaginatio: ut scilicet spiritus pluries per easdem sentias transirent, perpetua veluti vestigia in Cerebri meatibus excutiant. Præter optimam Memoriam substantiam est Ideæ rerum memorabilium Ideæ rerum obviarum & obviis occurrencebus alligare: etenim ex ea quia omni rei imaginatio excutitur alterius recordationem, fieri facile potest, ut ea recordatione rei obvia, quæ faciliè negligitur erit, decursum in rerum obviarum recordationem. Atque in hoc negotio confidit ipsa Memoria illius quam Localem vocamus, cum nempe adjuvari rei recordationem, repetita habito ad Locum ubi fæsan scripta est, vel ubi illam didicimus, aut habita ratione Magistri docemus, Figura quæ illam exprimebat, & fortasse ad Annos temporales, Dies accidentia, externarum rerum casus, & similia quandoque recordamus. Verum hæc potius ipsa, quam verbi adjucci possunt.

Lavand.
Zerimar,
Flor. refar. rub. ana M℥.
Mac. Melissae.
Speris long.
Galang.
Cyperi rotundi ana ℥iv.
Caffor. ℥iij.
Muc. Indis. ℥℥.
Myrrha.
Thuris an. ℥iij.
Cruci ℥℥. vel ℥iij.

Infundantur in Vinis vel Spiritu appropriato, digerantur in Mariæ Balneo & filtrantur.

Hoc ipso liquore, seu, ut vocant, Oleo, Nares & Tempora & Vertex largiter illinantur pro Ingenii robore firmando.

Conveioit quoque Ballatum memorie: *Myrsidii*, & *Lixivium sapientie Myrsidii*. Aliâ etiam pinguedine Ursina Temporalibus & Fractis illita ad toborapam memoriâ commendatur; item Uoguentum Caroli Ducis Burgundia. Præparationem videbis in SENNERTII Praxi, ubi de memoria testatur.

Nu præcipue jam assidue ad varietatem depravatam; unde legitur

ARTICULUS II

De Delirio in genere.

Quando depravat varietate occasione læsæ Imaginationis, seu Phantasie, & memorie, ita ut a consuetudine læsæ & ordine aberret; dicitur *Delirium*. Aberratio hæc observatur nunc concurrit, nunc seorsum, secundum omnes tres mentis operationes: Nam

1. In simpliciori Objectionum indeque formatum conceptum apprehensum; verbi gratia cum delirans quid pro quo, vel aliud pro alio, concipit, ut dum quendam vulgarem Hominem Regem Hispanie appellat. Deinde

2. & 3. In ipsorum conceptuum apprehensum compositione & divisione, inde facta conclusiones & variationes; ut dum aliquis putat, se constanter esse ex Botryo; Unde ignem horret, ne liqueat: Vid. SCHENCKII observationes.

Omnès hæc aberrationes a recta ratione uno nomine delirium appellantur. Græci vocaverunt nempo depravatio rationis, & aberratio ejusdem absurdaria cogitationis lege, qua deliria varia, nunc ridicula & jocosa cum ægri gaudii & voluptate conjuncta, quando nempe ridet, cantat, & jocosa narrat; nunc etiam morbosæ seu lævæ, ubi cum quodam impetu, furore, &c. delirant, sed abique nexu & ordine, & sine fundamento, confusè utriusque producuntur.

CAUSÆ.

Causa horum deliriorum in genere consistit in spiritu Animalis, in substantia nempe & motu ipsius minis alterato & viato, ita ut spiritus à debita Crassi degeneret: unde prout variat Crassi spirituum & eorum motus præter naturam, variat etiam deliria. Mens enim, id est, Anima rationalis, utpote immaterialis, & immutabilis, eadem semper manet; & à nullâ alia causa materiali lædi, & inquinari potest.

In spiritu ergo hæret vitium, idque variam, & diversum, prout ipsius alterationis iudicium, & causarum occasionalium multiplex est varietas, unde etiam varia deliria, varietate eorundem specie. Rem hæc exemplo declarabo; Quemadmodum in *Exbris* idem Vinum sub ebrietatis exarbitratia diversâ parit deliria in diversis subiectis, dum unus sub delirio vinolet fit iracundus, aut furiosus, aliter fit amorosus, tertius fit canorus, seu cantans, quartus joculosus, & ridiculus, quintus fit somnolentus, sextus fit æstivatus maxime divitem, septimus omnino evadit sapientissimus, octavus alio phantasmate afficitur, &c.; in his affectibus, utrum unum sit Vinum, quod omnes inebriat, indeque omnes eadem delirantes reddat; nihilominus tamen pro diversâ constitutione subiectorum, eorumque alia habitudine diversa, ex Massæ Sanguineæ Crassi materiali, & seminali distincta, & inde pro varia spirituum Animalium constitutione, varia tamen, & distincta sunt deliria.

Quod differentia deliriorum: in genere omnia, vel ex interna oriuntur causa, seu quæ habent fontem quandam internum in Corpore stabiliorem, vel ab externa. Ab externa, quæ proveniunt causâ deliria, originem ducunt, vel ab al-

sumptis intra Corpus, vel extrinsecis admotis, e.g. mors Canis rabidi, Felis rabidæ, Tarantula ista: utraq; sit ea Vegetabilis, seu Animalis ex Regno oriatur.

Extranei quod attinet causas: ex Regno Vegetabili sunt *liquores spirituosus*, & Temulentium inducentes, in *Exbris* delirium pacientes; item omnia *Martica* supellicia, quæ simul cum virtute hævati, & quâ ligatissimum Animalium, certam vim simul etiam obtineat determinati certo modo spirituum Animalium motum, cujus innati occasione, diversis & extraordinariis conceptus in more formetur, indeque varia deliria oriuntur: v. g. rein KIRCHERUS Tr. *Serapisianæ* Pessæ exemplum de duobus Monachis, qui ea eis Radicum Cicutæ prope Aquæsecentis, loco Persefolii, in tale incidit delirium, ut se in Antres, & Anates transformas putarent, indeque isti Monachi piscinis, stagnis, & paludibus (quos enim prope flumina) se immergerent, & Anatum insinuat voluerint. Conf. etiam WEPFERUS de *Cicuta Apocynica*. Pertinet hæc, præter Opium, sero universis insaniam exercitum, quos inter in specie eminet *Niviana*, *Hyoscyamus*, *Datura*, *Stramonium*, *Solanum manicum*, &c. Pertinet hæc Pharmacum *Phosphoricum Bartholæi* de Scramilli Semine paratum, quo ipso determinare vult delirium subitum ad certum conceptum, & certam Imaginationis speciem pro additorum aliorum varietate: de quo probatque in *Treatise de Ratiocinationis viis* lib. 3. cap. 1. & 2. pag. 405. & *figg.* N. K. rarum est scriptum. Sic Opium & Quatuor, & Inequitatis propinata, (uti non est in Provincia Orientales, in India, Persia, & similibus) & similia *Martica* nobis Occidentales, & Septentrionales Somnum cum insensum horrores, & admodum terrificos, & Dæmoniacos, aut Spectris insensum, quasi versarentur in dæmone, quasi vulneremur, & versumur in jurgis; Orientalibus autem, nempe Turcis, sub Somno insensum sua via, quasi in viriditate versumur in Paradiso, utpote hilariter, & jucundissime vivunt, excitat. Conf. M. A. N. C. *Anna* 1. *Observ.* 69. Sic *Hyoscyamus* assumptus quibundam nescivum infert delirium cum jurgis, & contumeliis: Vid. BORELLUS *Cent.* 4. *Obs.* 49. ubi refert quendam Russicum cum sua familia ex eis Radicis *Hyoscyami* tum fuisse demonstratum, ita ut quasi simia varia gelliculænes, & ridiculas actiones perageret. Pertinet hæc vii. *Narcotica* *Nutis* *Mentis* Arabum, quæ idem est, atque *Opium Tartarum*, à cujus semine, ad certum pondus dato, *Nix* efficit, aut fluctuat cum Risa, & jocunda Animi hilaritate, & cum insigni liberalitate, ita ut, qui sumptis illud Semen, liberali manu omnia indest, & offerat, omnia delicia prostestet, & omnibus suis obsecrat: ac verba *Hyoscyami* est species: vid. BARTHOLIETUS lib. 4. *Obs.* Econtrâ Semen, & Cortex *Hyoscyami* *Peruviani*, eodem Authore referente, delirium facit estaticum, quo delirantes putant se versare in viridibus in conversatione Angelicum; de hujus Narcoti vid. MANDELSLO in *Descriptio* *interioris Indis Orientalis*, pagina 231. cuius narcotice virtutis modella est Accetum: Vid. HOECHSTEDTERUS *Diss.* 7. pag. 156. Sic Semen *Hyoscyami* nigri infert delirium cum jurgis, & contumeliis, & Sento Solas majoris dat delirium, quoniam se in Dæmonibus versari, & in Serpentes, ac Satellites male tractari existimant. Plurimilima, eaque non inellegantia, & admodum coriosa, & ejusmodi artificiali quasi Dæmonia per Externa excitata; videb. in DOERINGIO Tr. de *Opio* *epistole* *virtute*, ubi cap. 7. pagina 72. & 79. inter alia observat artificialem Dementiam quandam, quam *Ægri* putant se naufragium pati: Sicut idem DOERING lib. *de* *cicuta* pagina 79. observat Dementiam similiter ex Medicamento, quo *Ægri* pium hilares, hinc iracundi, tandem admodum in morbi sunt. Sed dementari, stupidos reddi, & delirium induci ab hujusmodi Vegetabilibus Narcoticis extra dubium est. An vero semper in diversis subiectis Deliria determinata inferant, aut Arte per addita ita specificari quant, ut saltem dementari efficiant delirium, de hoc admodum dubium quoniam potest, cum & *Hyoscyamus* pro subiectorum varietate Amentias diversâ inferat; parili fere modo, atque fere de *Vino* moni: Conf. M. A. N. C. *Anna* 4. & 5. *obs.* 224. pag. 134. Hoc pertinet *Cicuta*, de quo vid. KIRCHERUS lib. 4. *obs.* Sulpura enim Vegetabilium minus curata sunt, quia stupescunt, & narcotica sunt: Sulpura vero ex Regno Minerali sunt tantum anodyna, non vero stupescunt.

Sed præter Vegetabilia etiam Animalia certa, & determinata inferunt deliria, in specie Animalia ovis dicta Venenata, & hinc etiam Animalia Rabida, Canis, seu Felis &c. Vid. BAURINUS. Sic in *Exbris* notum est, quod a

Cane Rabido demorri simile Delirium rabiosum contrahant, sub quo in Canes fe mutatos easilunt, unde in mores caninos ferè transformantur, ficuti idem lemper Hydrophobia, feu infignis omniu Lignidorum, & Aquarum iacta corripitur. Notus quoque præterea efl *Tarantulus*, quando à *Tarantulo* demorri exardens gellus, totum texturam, & ad determinatum Muficum, Amorem, & fimilia easilè acquirunt. Nota etiam efl *Rabies Felina* dum tres Helvetij Juvenes de Fete rabida interfecta comedentes Deliri easilè, & Rabidi fuerint, ut Folium inflat Unguibus, & Dentibus lacernant, & morificando inuicem congressi fuerint: Vid. KIRCHERUS in *Serapia. Pofit* pagina 207., & WEINRICHUS *Trall. de Medifina*, ubi habet exemplum morum felianum ea Sanguine Felis affumpto indolorum. Quo fimiliter *Lupus*, & *Nulla Rabies* pretinet, quarum etiam fimiliter Homines in talia Deliria feruunt: exempla proflant hinc inde, imprimis apud *BAUHNUM*, qui habet de Rabie Canum, Luporum, &c. Pertinet huc quoque *Philtia*, tam vera, quam falfa: Falfa fapius Namiam inferunt, & Furorem; Vera per Mumie Animalis confermentationem cum certo fubiedo, habent fimul vim determinandi fpiritus Animales, ita ut exinde ferantur in determinatam Periofam fua Inclinatione: unde confequenter Amor de quo veri Philtri parandi modus per Mumiam entorialis confermentationem cum certo fubiedo, & hinc Transplantationem iufra *Membre 4. Articul. 4.* plura. In Suecia Septentrionali efl *Alta*, Animal fic dictum voraciffimum, cujus Pellis pretiofiffima, fi dormientium obtegatur, facit Infomniam Animali congrua, nempe voraciffimi Hominis. De *Mare*, quod facit Delirium Ridiculum, vid. BARTHOLETUS *lib. ult.* Ab his ergo, & fimilibus externis determinatur fpiritus Animales, quatenus horum crasse certo modo alterant, & motum in Cerebro variant, ut hujus motus occasioe Animalia Rationalia exinde tam miras, ac deliras formes conceptus, ut aenei dicit. Quod quomodo fiat, ut externe admoda determinatum, ac fpecificum Delirium inducant, certo nondum cunflat, & adhuc perfcrutandum efl, cum nulla adhuc Authoris coelet opinio, que Animum fcrupulofum, fimulque veritatis avidum, poffit easiare.

Præ cætera operibus hic fuit HELMONTIUS in *fuis* *scriptis*, & hinc MARCUS MARCI *Trall. de Med. operariis*, item *Trall. de Philofophia Veterum* capitula 1. qui per Ideas Naturam determinantes negotium explicari nituntur: que Hypothefis, fi rem easilè confideremus, pianiffimis primò videtur, & maxima probabilitate conceptibili nobis imponere folet. Sed tamen fi easilè paulo ad recte rationis trutinam examinetur, & ad prima ufque fundamenta vera fiat inquilis, fietiam paulum in oolmetipfos faciamus reflectionem, ut poffimus concipere, quid, & quale fit, & quomodo operari poffit talis Entitas Idealis, feu Intentionalis, & immaterialis fup compage materie? aut quomodo hæc ipfa aut involvi, aut evolveri poffit? certus fun, quod tunc omnis ifta Idealis Imaginatio inflat funi, feu vane cujufdam Ideæ fubito fit tranfparitura, & evanitura.

Hinc efl, quod multi curiofi, & exercitati Nature fcrutatores, quos inter meritis refero nonnullis Anglos, & hos inter Da. BOYLE, non fuae nominis honore nominandus, maximè æftimat, & admiratur HELMONTIUM, ubi in Præfex, & Philofophæ Naturalis terminis fe continet: ubi verò in extravagantia ideolis prorumpit, ejufdem fomnis quidem indulgendum non verò invehendum arbitrat. Et quidem fundamentum illius opinionis, ea quo fubinde probat exiftentiam talium Idearum HELMONTIO *Seminarium*, MARCO MARCI *Operariis* didicimus, deifumptum efl à formatione Fœtus in Utero, cujufque per ideam ab imaginatione materia conceptam transformatione. Hoc ipfo tamen obfcuro per æquò obfcuro declarare nititur, æquè enim obfcuro efl formationis Fœtus, & transformationis ejus per materiam imaginationem negotium, quam tota fuperftructa eidem *æquò* modo allegaturum explicare; adeo obfcuro per æquò obfcuro declaratio non fatificere poffit nobis. Hæc de Delitiis à caufis externis in genere.

Ea *Deliria* varî, quæ funt à *caufis*, & *occafione interna*, adeoque fponfe Fomitem intra Corpus continent, & ipfa præ Famitis interni varietate, & prout diverfimodè fpiritus afficiuntur, funt varia, & diverfa, nunc quidem *vera* funt, feu *indeterminata*, ut in Febribus Ardentibus, & Malignis; nunc vero funt *fa*, ut in pluribus Melancholicis, & quafi ad certum Objeetum determinata. Quod autem à talibus caufis internis poffint determinari fpiritus in fuo motu, ut hujus occasione depravetur Ratiocinatio ad certum.

Tom. II.

tum objeetum, ac certum fuperveniat Delirium, per manifestum exemplum declarabo: Confideremus v.g. Picanes: fanè Pica efl appetitus Carbonum, Crete, Hæcites, &c. delirus, qui tunc excitatur occasione pofitiva in ftomacho fundata: fic etiam ponamus v.g. quendam, qui tempore nocturno in Somno patitur difficultatem Velicæ ex collecta inibi Urina, vel quando Genitura turgefcens in Valsulis, & Veliculis feminalibus titillationem fuam excitat; in talibus certè exinde ita determinatur fpiritus Animales, ut fuperveniat Somnium: & quidem in priori, quafi emitteret Urinam, adeoque Urigula permittit; in pofteriori vero eafu patitur Somnium Vaguerum, quo fominaeum imaginatur, nunc exerceat Venereæ negotia cum formofis puellis, indeque etiam feminis excretio, feu Pollutio nocturna ordinario fuccedit. Par ratio efl cum Pica, in qua determinatur efl Delirium. Optime fæcit huc exemplum iftud Veneris imaginariæ: uti enim Genituræ turgefcens titillando inferit Somnium Ventrem, ita etiam femini ferè modo fordes vitiofas, vel alia quæcunque caufa interna, fpiritus ad Deliria certa determinare valet. Confideremus ergo hic, quomodo feminis turgefcencia inferat fomnium Venerem? in quo gtorium efl, imaginationem ferri in objeetum quafi præfens, quod tamen abfens: Reftè enim in dormientibus Infomniam dicantur dormientium Deliria, ficuti contra vigiliam Deliria reverà funt vigilantium Infomniam, cum fanè tale quod patiuntur Delirantes vigilantes, quod patiuntur fomniantes. Unde etiam Delirantes vigilantes interdum recordantur eorum, quæ fub delirio fecerunt, interdum vero non; non fecus ac fit interdum cum fomnis paulo profundioribus, interdum verò obliuifcuntur: adeo, ut qui reftè noviter declarare Naturam & fenfil modum Infomniorum, hic ipfe quoque manifestam habebit Theoriam Deliriorum, quatenus nempe ea ex fomite interno originem habent, cum aliis non fit, quod fomnia naturali ordine inleant inlequi temperaturam, ut vocant, feu naturalem Humorem, ac fpiritus crassum. Ifud exemplum de Pollutione nocturna carnis poffet adminiftrare aniam meditando Infomniorum, & Deliriorum naturam. Quo etiam pertinet Delirium, dictum *Paræthefis*, ubi manifestum efl Delirium, ex Liquoris feminalis circa Genitalia turgefcencia, fimili ferè ea caufa, atque in Maribus pollutio nocturna, Mulieribus fupervenies.

ARTICULUS III.

De Deliriis à Causis Internis.

UT æquè fingulas, & frequentiores eorum Species fingillatim abfolvamus, initium faciamus ab iis, quæ à *caufis internis* oriuntur.

Deliria, quæ ab interna oriuntur caufa, rartas funt varia. Et primò quidem funt, vel *zæm Fæbre*, vel *zæm Fæbre*. Delitium cum Fæbre aut levius efl, aut gravius. Illud communiter *Delirium simplex* (nam Deliria febrilia proprio speciali nomine carunt) tam apud Græcos, quàm Latinos appellatur: Hoc vero, quod gravius, & ferocius, hodie ordinaria appellatione *Phrenitis* audit, quod initius *Paraphrenitis*, Delirium fæc Fæbre efl *Mania*.

M E M B R U M I.

De Phrenitide.

Phrenitidem ex inflammatione Membranarum Cerebri, cujufque fubftantiæ cinericiæ, oriri vulgò æftimant. De hac Phrenitide ita explicata jam *Supra* l. 1. notui, quod nempe fecundum primos Medicorū Auctores propriè *Diapragmatica inflammatione* innuit, fecundum quos inflammatio Cerebri cujufque Membranarum vocata fuerit, *Sphæculis*. Malum, ut rarum, ita ut plurimum fœnctum, ac lethale: Verum cum loquendum fit cum vulgo, fœnctum autem cum paucis, ob id etiam nos hac vice Phrenitidis nomen in vulgari fenfu retinebimus, idque imprimis, quia ratione Methodi medendi, & in Diapragmatica inflammatione, & in Sphæculo Cerebri, eadem fit curandi ratio, quæ in vulgo fœditur Phrenitide; ficut *Paraphrenitis* nomine innuimus leviora Deliria.

Causa ergo universalis tam levis, quam *gravioris delirii* *Febris*, seu *Phrenitis* in genere spirituum Animalium varius, velliculosus, & confusus in Cerebro, praesertim eius corpore calloso, motus, cuius occasione (dico *peractum*) fit, ut ratiocinatio, & imaginatio pervertantur; unde & pot tam varia, & minus coherens phantasmata ab Anima effluuntur, quorum index, & quatuor sunt (ut dixi) Sermones, Ridus, aut Flus, Flocculorum, quae nunquam sunt, collectiones, Vigiliae, Muscarum, quae nunquam sunt, insolitae venationes, & variae artuum motiones, &c. denique auditus, & nimis impetuosa, penitusque inordinata factio spirituum jam deficientium motu, & convulsiones siquidem lethales superveniunt, aut tandem spiritibus tantummodo assumptis per inordinatum Narcoticorum usum potius fixatis, phrenitis in Lethargum, aut in affectum soporificum potius muretur, aut succedat superatim malo aequibilibi ordo, ac circueus spiritibus redeat.

Causa vero remota inordinati illius spirituum Animalium motus in Cerebro est nimia eorum, & Cerebri Aëtiatio, & Incalescentia, primum minores, mox majores, idque vel simpliciter ob sanguinis nimiam incalescentiam, & palium in Cerebro frequentem, ex epi Effervescencia natum in *Paraphrenitis*, vel ob flagrationem, & exinde Membrarum, aut corticis Cerebri substantiae inflammationem in *Phrenitis* proprie dicta. Cogitemus saltem Aëtiam Febrilem talium acuturam, & vala insignia, & numerosa ad Cerebrum distributa, & tunc huius fervor facili, & sponte patet: quod multo magis fiet, si Cerebrum ipsum patitur inflammationem, in quo casu dum Cerebrum adeo fervore, & ardore aëtiatur, necessarii spiritus Animales servi di moventur, & imaginatio ratiocinatioque laeduntur. Unde primo in principio febrili talium acuturam Vigiliæ pertinetas tanquam Delirii prodromus seu primus gradus ex spirituum continuo motu, secundum in incremento, & illa Deliria ipsa ex eorumdem motu perverto, ac tandem tertio convulsiones, ex spirituum quasi ultimo oxi in Membris de motu subsequuntur, & hic terminus mortis prodromi ferè esse solent.

Ad effervescencia ergo insigniter sanguine, & magis adhuc exaltante hinc Cerebro, subtiliores, & servidiores redditus spiritus Animales agilius quidem, sed simul confusius, & perturbationis in Cerebro moventur; unde deliria similia, praesertim in incremento, aut principio status Febrilis talium Ardentium Continuarum superveniunt, ubi nempe maxima est Sanguinis effervescencia. Ubi enim in principio Morbi, aut in incremento, abique tamen indigitorum febrili Sanguinis effervescencia, Vigiliæ pertinetas enim leviori delirio imminente se manifestare incipiunt, graviores *Malignitatis* angustiae latet sub herba, & Virus malignum perturbat spirituum Animalium motus est origo, nisi sit in Pelle, & similibus Morbis malignioribus, quod probè obiteretur pro Praxi. Unde patet, quod *causa remota* sit vel simpliciter Cerebri incalescentia, ex Sanguinis fervore in Febris Benigna, & Maligna; vel Cerebri & ejus Membrarum propria inflammatio, ex Sanguinis flagratione ibidem facta, idque in perfecta phrenitis. Subest autem, praeter simplicem Cerebri exaltationem, subsidit etiam Membrarum aut Corticis eius inflammationem, confirmantur exempla phreniticorum post mortem dissectorum: Sic enim refert RHODIUS *Cons. 5. observat. 30.* Phreniticum biduo extindum, in cuius Capite aperto cerebrales & Membranae enim cum intenso rubore adeo tangebant, ut facile Venæ ab ipsius substantia potuerint separari; & *observat. 40.* Phreniticum de dictam a Prae Matris inflammatione: Sic etiam NICOLAUS FONTANUS in *Anat. cap. 2.* in Juvene Febre Continua perniciose laborante, symptomata horrenda flagrant, ingentem Cephalalgiam obervavit, accedente Vigilia & Paraphrenitis, ex qua paulatim phrenitis subnata nullis auxiliis levare potuit, sed furiosus, amicus & impietis, ac infamiae decimo octavo die occubuit: coeque Crania Cerebrum sine laesione fuit, sed maculis sanguineis undique confusum, & Meninges, in specie Pia Mater, tumida admodum & sanguine nigrescente turgens fuit, & omnes eisdem rami per Cerebrum dispersi, Sanguine congesto omnidi repleti fuerant: Sic P A W *observat. Anat. 8.* in eisdem phrenitis & convulsione mortui Cadaver abscissum in Cerebello & easione durae Matris observavit. Tunc quoque inflammationem Membrarum Cerebri eiusque Corticis adeo suspicio est, quando per Metastasin aliarum inflammationum oriuntur Pleuritides, v. g. quando post Erysipelas externum, aut post

Pleuritidem, aut Peripneumoniam, aut post Anginam subito evanescentes, insensit phrenitis, inflammatione puris affluens saltem mutante: in talibus non dubium est, sanguinem in aliis locis coagulatum, solummodo veni deus, flagrare in Membranis Cerebri, aut ipso Cerebro & ibidem novam inducere inflammationem. Certe ergo est, subsidit in delirio febrili graviores inflammationes Cerebri & Membrarum, non tamen semper, esse.

Causae quod attinet *remotiores praeternaturales*, à quibus copius disponitur ad Febris acutas, & consequenter harum perdiditque, deliria, vel simplicia, vel phrenitica: ex vana quidem sunt, omnes tamen coincidunt cum his, quae inferius Sanguinis motum impetulantem & Febris Ardentem, sic v. g. nuxum est, quod *Alas juvenilis, Aer sibilans, crebris strusis, & abluis potum generosum, in specie Vini & spiritus Vini, nos reddant admodum promptos uti ad Febris ardentem, ita etiam ad Deliria & perdidit Phrenitides, ut hoc ferè videmus in Hebrais: Exempla sane prostant ubi ex ablu Vini juvenum correptorum Phrenitide: Sic enim HORSTIUS lib. 2. *observat. 25.* Phreniticum post nimium Vini ingurgitationem refert. *Supra quoque Sanguinis ruptiones* solones, uti Febris, ita etiam flagrationem Sanguinis in Cerebro, & phrenitides ibidem inferunt: quatione ex *Lachis* Puerperae non rite expurgatis phrenitidem abortum refert HORSTIUS lib. 2. *observat. 25. & observat. 26.* Idem Malum ex receptione Haemorrhoidum in Viro sanatus. Tandem etiam huius afflicti *Animi graviores pertinetas*: quae inter in speculo primatum obvenit *ira*, quae admodum nos & sponit ad Febris Acutas, ipsique conjuncta Deliria: Sic Phrenitidem ex ira sub Menium fluxu hinc coecepte refert BARTHOLOMÆA *lib. 2. pag. 134.* Nam poentes admodum sunt Aomi afflicti, praesertim ira ad inducenda Febris ac Deliria. Ira enim per se est Febris quasi talis naturalis. Nam in hac Sanguinis intensus effervescit circa percordia, unde & in hac Corpus intensus calet, Facies rubore tincta peripico, Caput dolet, Pulsus est frequentior & major, ex aucta Sanguinis fermentatione, Unde non mirum, si superveniat Febris cum Delirio, aut etiam phrenitis: Febris Maligna quoque, ut monui, facillime conjuncta habere deliria & phrenitides, jam in principio, quam in incremento. Et quidem Phrenitides in Febrilibus Malignis supervenire solent interdum tota insignem Corporis incalescentiam, aut Maligna Sanguinis effervescencia; unde talia Deliria in principio autem reddant Medicum in insistentia cura, ne perdidit tota Aegri Omnia illa, quae Febris magis acutas excitant, Deliria & Phrenitides inferant; ita tamen ut Phrenitis, quamvis semper cum Febre, non tamen semper à Febre sit. Notabile est, quod refert PLATERIUS lib. 1. *observat. 147.* ubi Delirans in Febre continua Usorem per viam comperit, mox expulsi; Usor vero mox eodem Morbo coecepta, licet fuerit infans, Meas tamen nunquam se reddi habuit. Denique *Gonorrhoea virulenta* superaddit Phrenitidem quoque intulit, curatum post universalia per Zi. Philonij Romani à FONTANO *Curat. & Resp. lib. 2. pag. 21.**

D I F F E R E N T I A E.

Differentiae quod attinet: praeter has, ut supra fuit innatum, quod Deliria Febrilia, Phrenitis & Paraphrenitis, sint nunc *graviora*, nunc *leviora*, eadem porro, in Phrenitis de praeternaturali, sunt nunc *Radicalia*, nunc sunt *Seria*. Illa sunt, quando Aegri varia ardentia, incoherita, & minus coherencia, cum quadam plus minus hilaritate, interdum & cum risu & aliquali facilitate, praesentunt. *Seria* vero Deliria est, quando Aegri, quicquid faciunt, quasi aliquoties per irati cum impetu, quodam furore & morositate praesentunt variis & incoherita, idque non tam inflexi, ut videri volent, quam quod quasi praemeditato & summo studio facto (non vero) hoc faciunt. Quae Differentia probè obferri adeo propter effectum HIPPOCRATIS dicitur: Quod Deliria Radicalia sint tutiora & minus mala, quam Deliria Seria aut cum jurgis iacta.

D I A G N O S I S.

Quoad signa duorum horum Deliriorum, Phrenitis nempe & Paraphrenitis: primo quidem in Febrilibus necesse est, ut Delirium imminens praecognoscatur, ut possimus ejus ferociam praecavere.

Et quidem *praesens Delirium* cuiuslibet manifestum est, imminens vero, ut praecavere possit, attendatur.

Inminens autem Delirium licet patet ex quadam Garrulitate

te insulsa, & nimia loquendi promptitudine plūs minūs audaci, & cum Ferocia; licet & imminente Delirio ignis muscarum Morum aculei lolet: ita ut, si is, qui alias fuit mitis & lenis in respondendo, fiat nonnihil ferax & temerarius, aut facile proclivis ad iram; & qui antea fuit compositus moribus, & quietus in lecto, jam fiat inquietus; item si is, qui alias est taciturnus, evadat loquax, & corpus indecorat moveat (quod Signum Mortis certum) si etiam corpus aut Membra quardam denudet, si eorum, quæ legere vel locutus fuerit, subito oblitiscitur, si eundem sermonem sapidis citra rationem repetat; item, si Vigilat aut Cephalalgia perennes adsint, aut saltem Somnus admodum interruptus & turbulenter præcedat, insitit Membra variè, & mille inconcinnae solent exerecere actiones & sermonibus, in talibus casibus Delirium simplex imminere patet.

Quod si vero iam dicta Deliria adsint, Ægri solent esse morosi, varia incondita loquuntur, sunt hirsuti, ex lectis profluitant, accedunt his simul urinae palido crassa, non tenuis, imò diaphana, capitis tactus calidior, item Oculi, qui enim, si haec quantisper mobiliores, solito splendiores & quasi fulgidi & ignei, si sunt quasi rigentes, & aspectus sit nonnihil ferax, cum adeo rigido aliquem intueretur, facile Delirium non leve, fed ferocium insalubile cognoscitur; fusc nempe Oculi, uti fenestrae Animæ, ita & corpora; unde etiam Oculi omnis fulgidi aut pallidiores, aut plūs minūs corneæ apparentes, insignem Virum prostrationem, spiritum ex delectu, innuunt.

Si in principio Morbi Acuti de Delire in latibit Oculorum seu Cephalalgia conqueuntur Ægri, sensibilibus Signum est; mox nam Delirium & Convulsiones adiunt, quod sæpius observari.

Colores varii non Oculis apparentes, & objecta peregrino colore vestita, Convulsiones, Deliria, &c. innuunt. Visiarii aliquando Ægrum Maligna Febre correptum, licet alii bene se haberet, dicebat: me insidiam esse pallio & veste coepula; imò omnis niger Color coræus illi videbatur: Signum hoc aderat mane, à meridie subsquebatur Delirium & Convulsiones, & tandem interibat.

Alii dejectiones & urina interdum sine sensu effluunt.

Quod si vero porro in Delirio Febili adsint Inflammationes Cerebri, vel potius Membranarum ejus, aut vero tantummodo localis cerebra aima, & Fervor eius ac spirituum, adeoque vera Moderata Phrenitis, hæc ferè modis distinguere potest; quòd nempe tunc, præter Delirium summe feror, immani capiti dolor, præprimis circa occiput, adfit in Phrenitide, in qua est Inflammatio Cerebri, unde hoc sæpius fricant, cum Respiratione difficili, magna & tarda, qua non percipiunt Ægri, cum Febre continua & citi nulla, utur huius casus adsint. Nam ex natura partis facile patet, quòd Dolor sit vehementissimus, cum Dura Mater cerebri simul sit affecta, quæ est sensibilissima.

Dum autem Membrana Cerebri, aut corticalis ejus substantia, Inflammationem incipiunt, non potest non fieri ardoris sensus: unde est, quòd veri Phrenitici solent avellere Capillos, inscit tamen, propter immanem & acutissimam Dolorem, quem percipiunt: Item Manus perpetuè capiti admovent, & vario ac quasi furioso motu caput agitant hinc inde: propter quos acerbissimos Dolores etiam adeo brevis est affectus, cum non possint superesse spiritus cum immani adeo Dolor. Accedunt præterea interdum Convulsiones, idque, quando Inflammatio cerebri incipit abire in Gangrenam: nam omnis Inflammationis finis est Gangrena, ubi ferocia remittit, & qui antea ex lecto prostrabant, subito sunt mitis, taciturni. Oculi clausi prostrati decumbunt, & lethargici evadunt Ægri. Adhuc in vera Phrenitide Pulsus adeo vehementissimus in & circa caput, de qua etiam ante Delirium conqueuntur Ægri, quæ, quanta sit? percipiunt, si attentè conspiciatur Collum; ubi enim Arteriae Carotides quom impetuosisimè pulsant propter sanguinem inflantem, sed ob Inflammationem in Cerebro flagrantem: Unde etiam HIPPOCRATES Pulsationes seu Arteriam pulsantem in Temporibus prænotum æstimat Phrenitidis imminutis.

PROGNOSIS.

Quod attinet Prognosis: Phrenitis omnis Maligni periculum est & acutum, imò ut plurimum lethale, cum intra quatuor aut septem dies frequentius terminetur ad Mortem, rarèque ad Salutem, nisi in Ætate juvenili, & Temperamento sanguineo per Sudorem aut Hæmorrhagiam Narium citius solvatur. Magis tamen est periculosum, in qua sim-

Tum. II.

plexiter inflammare sunt Membranae vel ipsam cerebrum; nisi Vires opacis conflant, ut plurimum moriuntur Ægri: minis periculosum, ubi saltem adell spirituum tantum feror & sanguis incalcescit, ut in Paraphrenitide & Delirio Febili, utpote quæ ex fe & perie alijsque alijs pravis Symptomatis, & cum signis criticis parum in recessu habent, cum ordinarij Febrium ardorem, acuturum, & malignarum gravium symptomata sint.

De cætero, si interdum quædam interstia habet, melior, quam in continua, observatur: si autem post summum Delirium contingat aut exacerbetur, pessimum est, præprimis si non cum Ritu, sed cum Ferocia, hoc fiat, Jacula verò Deliria minis fœusta sunt, & quibus Ægri facile evadunt.

Si ferè mot hoc languide in vera Phrenitide, si difficilis Respiratio, si facies cadaverosa, si Oblivio rerum adde, Rigor, si Floccos legant Ægri, sillicidium Narium, Signum est lethale, & ut plurimum moriuntur Ægri.

Quòd si caput sicut particulariter sine alio corporis fudore, in specie, si sudor sit glutinosus & subrigidus, semper lethale signum est.

Si accedant Phrenitidis Convulsiones, vel diuturnæ Hæmorrhagiae, aut Cephalalgia, à quibus iam Vires attritæ, Aphonia, aut singultus, aut Dentium stridor (quod est convulsivæ Musculi Temporalis prorenit) aut Vox, Lingua & Manus tremulae, aut urina minus tincta, aut siccitas & uris infusa dejectione, hæc semper Phrenitidem lethalem innuunt.

Si Febre minuat non cesset, ut plurimum in Lethargum (qui etiam ut plurimum lethalis est), Maniam aut Melancholiam mutatur.

Phrenitis si mutatur in Lethargum, aut affectum Comatosum, raro curatur, & ut plurimum lethalis est: estiphorum enim spirituum ANIMALIUM ferè innitit: hinc notum digna est observatio ZACUTI LUSITANI 18. 1. præ. admitt. observ. 15. quavis in illo subiecto Somnus non adeo profundus extiterit.

Observandum autem quoad Deliria Febrium acutis supervenientis: eadem non esse symptomatica, & speciatim curanda; alia verò esse Critica, in quibus Naturæ saltem motum observet Medicus, eum ut plurimum Hæmorrhagia Narium Critica insequi solet; quæ probè distinguenda à symptomaticis, quoniam symptomatica curare debet Medicus, critica verò omnino intacta relinquere, & etiam expectare.

Signum ergò Delirii Critici, quod ut plurimum Hæmorrhagia Narium sequitur, sunt sequentia. Si collationis signa apparent in urina, & pulsus sit inæqualis, nonnihil magnus & nonnihil validus: item si tranquillitas quædam in symptomatibus sit in Ægro, si ex oculis splendores videantur etiam, si Delirium superveniat à subito nata Cephalalgia, item si adsint circa aures murmuræ, aut strepitus vel sonitus si Nares pruriant; si facies rubeat, & adsit tensio molliis Hypochondriorum, Ætas sit juvenilis, & forsitan alibi ÆGER conluet sit sanguinem per Nares excrevere: Vid. ÆGERTUS in Diss. ubi de Sign. Crises. In tali Deliria expectat Medicus, ne illud solvat, quia est motus Naturæ, & imminet Crisis.

Quoad Delirium criticum, cui, ut dicitur, Hæmorrhagia Narium ut plurimum succedit; & tale Delirium est salutare & saluberrimum; reliqua symptomatica semper sunt suspensa. Reliqua verò, quæ apparent cum signis cruditatis, diuturnis Vigilis & pulso malo, sunt symptomatica.

NB. Rarius apud nos Crises contingunt.

C U R A.

In Cuius Deliriorum, tam simplicium quam phreniticorum, ante omnia

1. Sanguinis Turgescentia febili temperanda, imprimis sanguinem evacuando, & ejus flagrantiam, & inde natam cerebri Membranarum Inflammationem in Phrenitide vera, resolvendo ac maturè discutendo.
2. Inde natus spirituum feror, & impetuosis ac perveris motus, Figentibus nonnihil, tam Internis quam externis, temperandus est & sedandus. Adeoque cum Delirium saltem sit symptoma in his Febribus, unde principali Morbo curato, nempe Febre, ipsam Delirium evanescit sponte, & hujus ratione saltem Anodyna Interna, & hinc varia Externa saltem conveniunt.

Aliis eadem ferè Febrium cum Delirio conjunctorum, ipsarumque Phrenitidum, curandi est ratio, quæ esse solet in

G E E E 1 alii

aliis Febribus acuta, in specie cum Inflammatione conjunctis. Delirium autem si criticum fuerit, viâ peculiarem indicationem habet.

Pro ritè instituenda cura observandum.

I. Ut sihi caveat Medicus, imprimis junior, ne ad Elixirum Vaccaræ, quæ cum Morbo delirioso correpti aut phrenitici curationem instituat, ut aliquando scilicet fuisse ab incauto Medico observatum fuit: (vid. BARTHOLETUS, & HEINRICUS ad HEER,) ne hac occasione se risui exponat ignavo populo.

II. Quod cum in phrenitide, & Delirij effectus sit spirituum motus, hæc Somnus deficit, seu Agrypnia, & Cephalalgia adit, quæ Delirium admodum aspersant, subinde blandi *Analgesis*, & *Hypnotici* plura minus *Narcotici* utendum erit, idque tam in Medicamentis Internis, quam Externis. Cautè autem usurpentur talia Internè, in specie Opiata: Nam si Opiata non sistant spiritus, eorumque motum compellant, potius Delirium gravius reddunt, cum ipsum Opium Somnia turbulenta & trucescentia inducat. Sin verò Narcoticis nimis continuatis spiritus nimis figantur, motus est, ne Agrium sapienti idem non possit amplius excusculari, aut metus est, ne per Opiata Phrenitis in Lethargum transmutetur. Cum enim spiritus in Phrenitide sint admodum volatiles & subtilis, & simul propter motum continuum auctum pauci, ob id faciliè ac Narcoticorum dosi aucta permittit in Lethargum seu Capum potest, quæ mutatio est periculosissima. Certum est, quod Opiata legitime adhibita sine magna Remedia, & quæ optimo cum successu in Delirij Febrilibus usurpantur; verum si Opiata tempore non opportuno, aut non legitime parata, adhibeantur, plura nocent, quam prosunt.

In eorum ergo usu observetur:

I. Quod prius usu febrili legitime preparanda sunt, in Morbum quidem huiusmodi ardeatibus, & acutis cum acidis, nempe Aceto.

2. Ratione temporis adhibeantur Opiata non nimis tardè, sed magis, nempe in incremento morbi, dum Agrius pertinacius vigilat, & Delirium imminet; melius enim est, tempore Vigiliæ, quam Delirii, adhibere Narcotica. Non adhibeantur plura, quam in principio, neque flatu morbi, quia in principio morbi turbant Naturæ motum; in statu vero eorum usus frustraneus & magis adhuc nocivus est, dum Somnum non inducunt, Delirium ingravescit.

3. Nec Viribus jamdum fractis, ne Veteranum similemque affectus comatosos occident: vid. RIVIERUS *prax. lib. 2. cap. 11.* & WILLIUS de *animæ bruta. l. 2. v. 10.* Quamvis etiam septimo Delirii die ZACUTUS LUSITANUS Philonium Romanum cum successu se dedisse *lib. 1. prax. admir. lib. 16.* perhibeat.

4. Ut his Opiatis semper addantur appropriata, Diaphoretica, & Bezoardica, v. g. Antimonialia fixa, Cinnabaris Antimonii, Antimonium Diaphoreticum, Bezoardicum sociale, Cranium humanum, &c. non tantum, quod in talibus Febrilibus dolorosis, ipsaque Phrenitide, sapientia subit Malignitas, sed etiam, quia blanda Diaphoretici concitata Effervescentia sanguinis febrilis insigniter placatur & mitigatur. Unde etiam per confusos talibus ipsa Phrenitis non raro tollitur.

III. Observandum quod in Delirio Phrenitico sunt omnia larga Venesectio sit influenda, quod citius, et melius, nisi tempus & conditio Febris, v. g. Malignitas juncta, illam inhabet: cum econtrâ, si Febris Symptomatica, semper locum habet. Si ergo fuerit Febris Ardens Phrenitica absque insigniore Malignitate, optime convenit hæc ipsa; aut licet adit Malignitas, illa etiam in principio, imò sine tanto periculo, commodè potest secari Vena. Larga autem sit Venesectio, cum morbus sit percutus, vid. ZACUTUS LUSITANUS *lib. 1. de Medie. princip. lib. 10.* ut hoc medio acquiescenti occasione melius adhibendi Remedium, ne in pejus Malum cedat. In specie in inflammatione plura minus constitutione Membranarum Cerebri larga sit Venesectio, autore LINDANO, qui refert: *sciam Parentem D. TULPIO Viri candidum Phrenitici prima die aures triginta sex sanguinis emississe, tertia die caudam, & quarta die aures viginti quatuor & sic enim, inquit, Medicus, & adfectus fuerit, Medicum se se stare debet.*

Verum in ipsa Venesectione quoad iterum et notandum:

1. Quod si foras precesserit suppurata quendam sanguinis evacuatio, ut in puerperis, in partibus in-

ferioribus, nempe in Vals, & postmodum in Vals secunda sit Vena; sicuti in genere in Phrenitide, si repetenda fuerit, in quocunque casu primo *Vena Epistola* per Venesectio, hinc in *Brachio* pro avertione, imò eandem in *Fronte* per Venesectio, commodè celebratur: quamvis si necesse urgeat, & ubi in extremis commodè Venam secare non licet, statim ad Venæ Frontis sinuolumque vicinarum aperturam transire licet: vid. ZACUTUS LUSITANUS *l. 1. de Medie. princip. lib. 10. observat. 12.* & *lib. 1. prax. admir. observ. 13.* RIVIERUS *loc. cit.* De Arteriotomia Tempus in Phrenitici multum laudato vid. PHAROLLUS *prax. 2. observ. 30.* Loco Venæ Frontis foras Cucurbitulae scarificatæ locum habet, quæ Siopici admoda Phrenitidem consummum curavit ZACUTUS LUSITANUS *lib. 1. prax. admir. lib. 11.*

2. Quod tempore Venesectionis Medicus ponat Manum super Carpum Agri, ut an Pulsu cognoscit, quando foras sit sufficiens sanguinis evacuatio; item ut Pulsu cognoscit, an Agri sit Animæ desectus; & magis vel minus iterat sanguinem evacuationem?

3. In ipsa sanguinis evacuatione subinde Digiti *ferre* utrum *strandum* sit, deinde aperiendum, ac deinde obturandum, his vel ter repetendum, donec sufficiens sanguinis quantitas sit extravasata; sic enim cum meliori euphoria & minori Agri delirium sanguis evacuat.

IV. Observandum: In Topicis seu Externis, utnot aliquantisper Auri addere quibidam placet; tamen non nimium ejus addendum, quoniam odoratu suo acri Somnum impedit, & Vigiliæ & Agrypnias augeat, utnot Somnus ad Deliria sistenda optimus fit. Unde etiam nimis *gracile* in *interstitiis* utbando, ne talibus Volatilibus angatur Phrenitis propter continuum spirituum incitationem, utnot Camphora videtur excipienda, quæ in Delirio quibusvis, præsertim Febrilibus, tam iocundo quam eadem ipsa, singulare quid obtinet.

Medicamenta ergo, quæ conveniunt in Cura Delirij Febrilium, ac ipsa ipso Phrenitide non sunt adeo præstia, quia Delirio est symptoma superveniens morbo: si de potest, quod Morbo primario curatur, Delirium ipso cessat, & quod aliter Delirium, quia tale, Opiata interius & externè, ut & Refrigerantia, immittunt: ipse vero Malus primarius, nempe Febris ardens, aut Berignia aut Maligna, ut Inflammatio Cerebri, Methodo ordinata curandus sit. Adeoque conveniunt *Endorifica* & *Diaphoretica*, v. g. Bezoardica, Sulphures, Antimonialia, Cinnabaris, item succi Vegetabilium subacidi, Granatorum, Ribum, & Berberum; Præter serum Ladis, & cum eo parati *Julebs*; item Aqua Anagallis, Aqua Verbene, Aqua Nymphae, Papaver erraticum, & omnia ex eodem remedia: v. g.

26. Aqua Anagallis.

Portula.

Nymph. an. 3. ss.

Hydr. Nymph.

Papav. simpl. an. 3. ss.

M. 5.

Potio Refrigerans.

Item conveniunt spiritus *Aridi Minerales* Vitrioli, Salis Sulphuris, in specie spiritus Nitri dulcis, & spiritus Salis dulcis, Tinctura Papaveris roborans &c. compescit Effervescentiam sanguinis, figitque praeperam sanguinem ad Vitrioli Phlegma, quod BASILIUS VALENTINUS spiritum Culestem vocat. Item Camphora cum alia, imprimis cum Nitro, propinquetur commodè. Hæc enim licet sit volatillimum, & penetratissimum Remedium, tamen virtute quodam singulari spirituum nonnihil fixativa & narcotica pollet, unde etiam tam egregie in Phrenitide curanda cum aliis eternè & Internè convenit. Internè præscribitur eam cum Opin in Potinibus Sudoriferis; sed tunc Opin dosi nonnihil imminuenda, quando simul præscribitur Camphora; quod ego ita semper observo. v. g.

27. Conf. Neph. Papav. err. vitriolæ. dr. ss.

Laud. Opium. laug. gr. ii.

Camph. gr. ii.

M. D. 5.

Compescens Saccharum vespertinum.

Externè Epithematis, & Frontalibus commodè etiam additur Saccharum Saturni cum spiritu Nitri factum; & Me

Medicamenta similia Saturnis similiter commendantur ad Phreniticum. *Mixtura antiepileptica simplex*, *Tinctura Beccardica*, uti etiam *Nitrum antimoniaticum* largiter in pota ordinario dissolutum, frequenter in usu esse solet. Hæc addatur tanquam singulari Specificum *Nitro & Floris Anagallidis seu phænice*, usque interno & externo ad Deliria Febrium admodum commendata; de qua vid. GABELCHOVERUS *Cent. 6. Curat. 13.* qui refert, quod sit in Febribus phreneticis & Paraphreneticis experientia frequenter compertum Remedium: habet Decodum Anagallidis flore robore præcipit ut Manipuli duo Anagallidis hujus decoquantur in *Vini & Aquæ ana* Mesura semis, ad consumptionem tertie partis; de qua Decodo mane & vespere datur bonus haustus; simulque sat ex ista Planta Sacculus interpassatus, similiter in prædicto Decodo humectandus; & ita Sutura Coronali extrinsecus applicanda; ubi effusus fuerit, densè humectetur. Confirmat hoc HILDESHEIM in *his Spiritib.* qui ad Deliria Febrilia & Phrenitica commendat hoc Decodum:

Nitro. Anagall. cum Sero M. II.
Crem. Cap. Papav. albi No. 12.

Hæc contra iuvicem coquenda dicit in *Seri. Vini Malvarum & Rheumatis* ad calum *gr. vi.* Colaturam fortissimam expressione traiecit, & pro duabus vicibus haurendam propinat in *Spiritib.* 2. pag. 190.

Existimare tamen, generosum hunc animi esse potum: propterea Aquam simplicem cum paucis Vini Rheumatis a custam potius seligere.

Post Anagallidem etiam est *Lactuca*, *Nympha*, *Sodium* majus; item *Semina* quatuor *Frigida* majora, & *Papaveris*, & exinde paræzæ Emulsiones: e. g.

Nitro. A. Frig. maj. an. 3 lb.

Papav. alb. 5 lb.

Cum C. q. *Aquæ Purulæ*, f. Emulsi-
culi adde

Crem. Num. flos ignis 3 lb.

Beccard. Miner. 3 lb.

Ser. Purulæ 3 lb.

M. D. 3.

Emulsi Beccardica pro aliquot dosibus.

Sed juxta hæc primatum obtinent *Opia* legitime applicata, quæ Delirii respectu sunt convenientissima; quo pertinet Syrupus *Papaveris* albi, qui est maxime utilis, quam de *Papavere nigro*, Emulsiones *Papaveris*, & *Laudanum Opium*. BARTHOLETUS non immerito commendat Effentiam *Opii* cum spiritu *Vitrioli* volatili paratam. Veteres in usu habuerunt *Phonium Romanum*, Syrupus *Diadocum*, Requiem *Mentis*, & similia; loco quorum nos hodie *Laudanum Opium* utimur. HORSTIUS aliquando curavit phreniticum post Vini generosioris abusu pro potione Narcoticam ex aëre duabus Syrupi *Papaveris*, aliis additis, idque iam die fecit, uti refert *lib. 1. observat. 12.* Pariter atque FONTANUS in *Cur. & Respons. lib. 1. pag. 30.* refert juvenem viginti duorum annorum ex *Gonorrhoea* virulenta phrenitide correptum, qui post Universalia Remedia per drachmam unam *Philonii Romani* fuit curatus. Prescribi ergo potest in *Phrenitide* speciatim *maligna* sequens Pulvis:

Nitro. Cinna. Antimonii gr. xii. ad xv.

Beccard. Lunæ gr. vi. vel viii.

Laud. Opior.

Camph. an. gr. i. vel gr. i. lb.

(vel *Laud Opior. gr. i.*

Camph. gr. ii.)

M. f. Pulvis:

Dentur 2. doses: 3.

Pulvis Cephalicus Beccardica,

Propinetur in Decodo Anagallidis rubræ, vel in Aqua Anagallidis, aut in Emulsiōne tenui *femini Papaveris* albi, parata cum Aqua Anagallidis, *Nymphaeæ*, *Hyperici*, & similibus. Item

Nitro. Cephal. 3 lb.

Ser. Saturni gr. vi.

Camph. gr. ii.

Laud. Opior. gr. i. lb.

M. f. Pulvis: 3. ut antè.

Juxta hæc simul pro scopo *alterativo & Julebi* aciduli, in specie spiritus *Nitri* dulcis, propinquantur, dum effervescant sanguinis compescunt; quibus pro Alvo referenda, si addit obstruenda, commodè *Tamarindi* incoqui possunt, quia laxant blandè, & simul sanguinis effervescantiam plius minus compescunt. *Resolvens* scopo etiam cæteris paribus sufficerent Clysters, modo eodem applicare commodè liceret.

Inter externa pro revaluationis scopo commendantur admodum *Cataplasma* plantis pedum admoventia ex *Ruta*, *Chamomilla*, *Verbena*, *Radice Bryonia*, & *Sapone*; vel *Cataplasma* ex *Raphano*, *Sale*, & *Fermento* cum *Aceto* acetissimè f. i. in Delirio Febrili prescribuntur; item *Sedam majus* contusum & intus *Cataplasma* cum *Aceto Spinae Dorii*, plantis pedum, & testibus applicatum. Vel

Nitro. Semperviv. maj. rec. superfl. 3 lb.

Acet. Vini acerr. 3 lb.

Nitri 3 lb.

Camph. 3 lb.

M. pro Epithemate.

Plantis Pedum & Testibus applicando:

D. 5.

Epithema Externum.

Item commendantur *Pedum Linteis* à MERCATO commendate, aut *Hyemera* Brachis aut Cruribus admodum. Difficilius operantur *Cataplasma* ex *Porriacis* ac Semperviv recentibus & Rosæ, similibusque refrigerantibus, Capiti raso, Fronti & Temporibus largiri imposita; quibus etiam nonnulli addunt *Nymphaeæ*, *Chamomillæ*, & *Melilotæ*. BARTHOLETUS *Tr. de Dysp.* in gravissimo delirio quasi phrenitico commendat carnem *Cucurbitæ* contusam, & aëre Capiti impositam, qua præter omnem spem desperas phreniticae sit curata; Facit etiam hæc observatio BORELLI *Cent. 4. observat. 94.* de *Rheo*, qui alterum phreniticum pro taleis *Cucurbitæ* Capiti imposita curavit: Confirmant etiam hæc, quæ habet GABELCHOVERUS *Cent. 3. Curat. 13.* in *Schol.* quod scilicet, si excavetur *Cucurbita* per medium disseda, & in utramque cavitatem *Ager* immittat pedem ad tempus, idque cum *Cucurbita* recenti tribus vicibus repetatur, tollat insigniter & fervorem febrem, & etiam ipsum delirium phreniticum. Commodè etiam plantis pedum & Sincipiti admoventi potest *Cataplasma* & *Epithema* ex *Sedo* majori & *Aceto* superius laudatum, quia servorum Cerebri, & spirituum motum, adeoque delirium blandè demulcet; sed detrahatur, quando *Ager* incipit dormire, RIVIERIUS *lib. 1. Pract. cap. 12.* commendat cum *Lactæ* muliebri, *Epithema* Fronti admoventum condacit ex *Mastiche* & *Myrrha* cum *Tinctura Santali*; vid. descriptionem in RIVIERO *loc. alleg. pag. 117.* Decodum *Radiciæ Mandragoræ* & *Hyocyami*, cum similibus externe applicatum tepide Fronti, commendatur ex expertum à ZACUTO LUSITANO. Egregius quoque est *Succus Cancrærum fluvialium* virorum recentè expressus, qui ad imitationem RULANDI vel Epithematis forma largitur Fronti applicatus mirifice confert: Sicuti idem RULANDUS sequens *Epithema* compositum de *Opio* cum *Linteis* duplicata Temporibus utiliter admovent:

Nitro. Aquæ Rosæ 3 lb.

Opii 3 lb.

Cerei 3 lb.

M. pro Epithemate.

Cum *Linteis* duplicatis tepide Fronti admoventur, Nam sic blando coactilato Somno Mens redit.

Vel hæc Epithema ad imitationem HARTMANNI *Præf. cap. 1. §. 4.* ubi & alia externa *Opia* prescribuntur. BARTHOLETUS commendat usum *Aquæ Spermatis Ranarum* extrinsecus applicatæ (& credo, quod *Sperma Ranarum*, ejusque ritè destillata Aqua, sit potens Remedium Fronti & Temporibus crebrè applicatum.) Potentius est, si miscetur cum succo *Cancrærum fluvialium*, addendo *Opium* & *Camphoram*, ut sit *Epithema Cephalicum* compositum, ad imitationem RULANDI, quod credo non futurum inclegantia hoc modo:

Nitro. Sperm. Ranar. per transeolat. vel Aquæ

Sperm. Ranar. 3 lb. vel viii.

Succ. Cancr. fluv. rec. expr. 3 lb. iii. vel iv.

Opii Aceto solut. 3 lb. ad 3 lb.

Camph.

Cerei an. gr. vi. viii. vel 3 lb.

M. pro Epithemate.

D. 5. ut suprà.

Vel

Nitro. Succ. Ranar. cum Aquæ Sperm. Ran.

per 3 lb.

Acet. Rosæ 3 lb.

Thuris. Androm. 3 lb.

Camph. 3 lb.

Cerei gr. vi.

M. pro Epithemate.

D. 5. ut suprà.

Tepide

Trepidè vel subfrigidè Sinepiti, Ferenti, ac Temporibus admoveatur.

Veteribus in cura Phrenitidis frequenter & felici in usu fuit, *Animalcula viva*, v. g. Anthes, Anates, Catellos, Gallinas, Columbas aut Palumbos, per medium dissecta, & ita cruenta ac calida sinepiti aut toti capiti saepe applicare; conf. HARTMANNUS *cit. lib. 5. §. 7.* quæ Remediis ratio à Schola GALENI ad nos dimagavit; nihilominus tamen jam apud nos ferè in delirietudinem abiit. LINDANUS interim dicit; quæ *Remedia esse infirmabili* ad curandum Phrenitidem; qui curat Phreniticis Sanguinem mittendo primùm, hinc propinquo sub noctem Opium præparatum, vel uncias duas Syriaci Papaveris; Tum adhibet Columbam viventem, vel Gallum viventem, vel Catellum vivum, quæ Animalia fecat per pedes, & statim cum omnibus intera-mentis ita applicat Capiti, si heri potest, saepe. Et applicato ita Animalculo imponitur Linthea, vel Culectra, ne subitè cesset amais calor; mirum, dicit, quantum juvent hæc Animalcula; in quo etiam consentit HARTMANNUS *cit. lib. Remota* uno, post hoc subito applicetur aliud, idque aliquoties repetatur, donec calor cesset, & ipsum delirium immineat. Dicit, si per horam relinquatur, & postmodum removeatur, borendum emergere letorem ex Anima-li applicata, ut necesse sit, subito immergere in Aquas præter letorem intensissimum. Animalia verò illa non statim in principio admoveantur, ubi affluxum potius augerent. Præter hæc & similia observanda sunt ea, quæ alias conveniunt in Febribus ardentibus.

Sit intendum, ut Phrenitici non percipientes Urina flum-lum, continuo eandem retineant non abique commento. In tali casu imponitur Perisora Capæ coctæ cum pinguedine Anteriori Urinam provocat: Aut

26. Pol. Parietar. M. li.

Herb. Petrosel. cum Rad. M. li.

F. Decoctione cum Aqua;

Pulpe contritæ adde

Olei Scorp. 3℔.

Et ita Cataplasma per Pube.

D. s.

Urinam provocans Epithema.

Poli Sacum.

27. Fing. Canis. vel Unga. Dialib. 3℔.

Olei Scorp. 3℔.

M. S.

Urinam provocans Unguentum.

Illinatur, quod solum etiam sine Cataplasma adhibetur. (M) Absolvimus phrenitidem, & deliria à causa interna cum Febre: Pergo jam ad reliqua deliriorum species, & imprimis quidem à causa interna oriundas, sed sine Febre, nam de Delirio à causa externa alio tempore.

M E M B R U M II.

De Delirio Melancholicis.

Deliria hæc vulgè generali nomine *Deliria Melancholica* appellantur; eaque, vel simpliciter talia, & mitiora, vel in summo gradu *Maniacæ*, seu graviora, & per se absque Febre assurgere solent, aut saltem in Paroxysmo graviore aliquid febrile subelle videtur, dum pulsus celerior, & frequentior habent, fluctuantibus corporis vagis, & capitis, in specie incalefcentia, vexantur, sitis tamen nulla adeit, nec propriè Febris dici potest, quamquam FOR-ESTUS observat. *lib. 10. observat. 7. in Schol.* Melancholicorum febricitantium exempla delirabat.

De his ante omnia observetur, aliud esse *Melancholicam af-*

fectionem, seu *Melancholiam*, & aliud esse *Delirium Melan-cholicum*; quæ non confundenda. Redè enim hæc duo à-linguit STEPHANUS in *Oper. Medic. Comment. de Meli- Virg. pag. 47.* & easdè observanda monet. Nam *affectus Melancholicus*, seu *Melancholia* est, quando Homo re-mobilis moribus, & morosis, cum amium ferè rerum, ali- quodam abominatioe, quæ subinde facit irascitur, & quidem sine manifesta causa, si ipsi nihil arridet, & tristi, & cogitabundus est, sine occasione externa; item quæ interdum facit terrorem, quando circa manifestam causam angustias, & anxietates quasdam circa præcordia percipit, & quali rei gravissimæ perpetrate sibi conscia est, & li-miles cogitationes oritur: dicunt: *Calam. & Terræ igni angustia est, sentire Cordis gravitatem, neque scire, quid sit velint.* Hæc, & similia sunt propriè *Melancholia*, seu *af-fectus Melancholicus*.

Postmodum verò, ubi talibus subiectis supervenit u-dem phantasma, constituit *Delirium Melancholicum*, & ite Delirantem esse Melancholicum, quod est *Melancholia secundaria*, ex causa externa simpliciter proveniens; Affectus verò ip-si Melancholicus est *Melancholia primaria*, somitem habens verò ip-simum internum. Scilicet aliud est ipse affectus, & aliud est ipse adjectum, seu superveniens Delirium, occasionem utplurimum externam agnoscens. Videmus hoc in nobis-iss, quando nempe hybernæ tempore et tempestate ædum nubilosum, humidum, & ingrata reddimus Melancholici, an-xii, & tristes sumus, sentimus gravamen quoddam non bene explicabile, facit irascimur: est hæc sine affectu à causa externa, ex mutatione tempestatum oriundis, & quasi *affectus Melancholicus naturalis*, ad cuius imitationem quidam à causa interna sunt morbois Melancholici, quoniam delirium Melancholicum supervenit, pro varietate Ob-jectorum, phantasmatum, ac symptomatum varium; Nonne aliud est *amorosum*, seu *eroticum*, aliud *ridiculum*, aliud *rabiosum*, aliud *Melancholia maniacæ*, *Delirium undam, Maniacæ*, &c.

Melancholia hæc sine delirio simpliciter solet vocari apud Præficos *Perturbatio Mentis*, quæ perturbatio mentis Melancholicæ satis sunt frequentes, ita et adhuc redi-ctio sine delirio consistit: Sic PLATERUS observat velis Animi perturbationem in Muliere, quæ subinde simu-labatur, ut interficeret infansem; erat tamen adhuc cum redi rationis, & resistebat ipsi cogitationibus. Et idem *perturbatio Melancholica*, non verò *perfectum delirium* icti-talis Animi perturbatione est, quod idem refert PLATU-RUS de quadam Muliere, quæ subinde impellitur ad maledicendum Deo; ipsa verò sana redi ratione resistit his cogitationibus malis, adeoque erat tantum perturbatio Animi, non verò Delirium Melancholicum. His ergo taliter consistentis citra manifestam causam, si interdum tan-dem supervenit delirium, hi ipsi redi delirio *Melancholia* dicuntur affligi.

Dicitur Melancholia, & delirium Melancholicum, non quod *semper cum morore*, & tristitia coniunctum sit, ut vul-go equidem volunt, & falso; (nam etiam dantur *deliria ridicularia*, in quibus admodum sunt læti, & hiæres *Agro-tantes*) sed propriè dicitur Melancholicum, quod oriri dicatur ab humore Melancholico secundum Veteres, id est vitio acido fixo.

Verum varia Melancholicorum delirantium sunt exem-pla, admodum inter se diversis, omnia tamen quoad Theo-riam in certis quibusdam punctis fundamentalibus, in quibus radix consistit, conveniunt. Et

I. *Quoad Theoriam* quidem, quod in omnibus deliranti-bus, & Melancholicis talibus observetur *regitatio*, & *modi-ditatio inaccessa*, & *affectio*, deliria in uno saltem obiecto, sunt interdum aliquot obiecta ordine sibi invicem succedunt, i quibus unum delirium diversimodè variatur, circa eodem

(M) Inter Remedia ad Delirium, & præsertim ad Phrenitidem compendenda apta, non spernendum sene est quod Musici, præsertim huius Artis cultibus, præstare possunt, Harmonici enim & rhythmici sine Pæce sine musici Instrumenti modulationibus, quæ Nervorum Attonitum in Cerebri penetraha transmissa, poterant Spiritus animales in incognitus motus alii, et strum demulceri, ac sopiri, ut placidius & sanandam naturæ ordinem Cerebri meatui subeant, resiliant exierit in Mente Ido, ac Delirium compescant. Duplex & non vultare Exemplum habemus in Historiæ Regiæ Scientiarum Academiæ: Pri-mum in Dom. Dodartio anno 1707: celebrissimi Melpezi, qui perperam & furiosa Phrenitida, clamoribus, lacrymis, vixit fuit, convulsivibus comitata præloxyas, musicum Concennum sponte percipit. Quo facto, ad sanam mentem rediit. Agg. & Febre carnis, saltem ex tempore, quæ Musica maxima animi alacritate oblectatus fuit: sed ex cessante, in Febrem & Delirium tandem relabebatur, ac integro decem dierum spatio, nonnulli ad harmoniam utaque canentibus, aliquis quiete frueretur Agg. Tandem nulli alio (nisi Phlebotomia in pede) adhibito Remedio, integrè convalescit.

Alterum eadem Regiæ Academiæ resulti Dom. Mandajorius anno 1708: de Juliano Magistro Alessandri, volentem phrenitide corripere, qui, quam afflicto Citharædus plebs fuit, iuxta modos & numeros Agg. familiares, pulsaret, in præfatum hominem incidit: qui tempore facta Crisi, præter omnium spem integram salutem recuperavit.

ramen obiecta occupata continuis videbitur, ut infra exemplis conflat.

II. Omnes tales *Agri rursi*, *anxijs nonnulli*, & quasi in angustiis consistunt videntur, adeoque quocumque videntur, vel audiunt, sibi *pejora*, & periculosa persuadent; & licet interdum videantur esse ridentes, hilares, & iusti, v. gr. quando quis putat, se esse divitem; nihilominus tamen non est revera hilaritas, non verum Gaudium, sed potius est apprensus, & aliquid conjunctum cum *Risù Sardonicò*; etque hæc hilaritas, tantum transitoria, & facili succedit novus Mæror, & præcordiorum anxietas, sine causa itetum totum vident, & parum aut nihil omnino dormiunt, imò, licet etiam Principes, & Monarchas magnos se concipiant, adeoque saluati potius videntur, abque nihilominus cultus, & veneratione ipsi denegata. Rectè itaque ARETÆUS lib. 1. de caus. & sign. morb. diurnar. cap. 5. describit Melancholicum, quod fit animi angor in una cognitionis deficiat, atque inhorat, atque Febre, & Træore, à Phantasia nata Melancholici oritur.

III. Omnes Somnum admodum paucum, & turbulenter satis patiuntur, & cum somnii graviores, ita ut expectantia testetur, quodam in Mælo ioveretur plures non talem nosse, sed seipsum, & aenos quoque, insomnes transigisse; aut si capiant Somnum, turbulenter est, cum turbulenti somnii, adeoque cum Terrore evigilant.

IV. In hoc conveniunt fere omnes, quod Deliria subinde remittant, ita ut resita Ratio restituta denud videntur; subinde tamen, vel pro diversitate causarum internarum, v. g. Fluxus Menstrui imminuentis, vel Eateriaarum, scilicet sub mutationibus Temporalium insignioribus, vel ex Lunæ motibus, vel mutatione Temporum anni, veletiam, idque insignimè ex gravioribus Animi Pathematis, subinde recurrunt, & recedunt.

V. Secus præcipue, in hoc conveniunt Melancholici inter se, quod Melancholia sit contrarium somni, & nulli fere cedunt Acti, quo interdum citra adjuvamentum Medici, & quidem in ejusdem delictus, sponte non raro remittit, idque imprimis per aliquem quandam in Dieta mutationem, ver. gr. Aeris, Vitæ, Motus corporis, &c.

VI. Quod in non tam ad caput, quam *Melancholiam Sanguineam*, & imprimis ad Viscera Adrenalis in Hypochondriis sita, sit referendum, quod curatio est fundamentum. In Hypochondriis enim semper ridet, & fumes Morbi Melancholici est; superveniunt tandem Deliria; Unde à Veni itaque imprimis curatio, & inchoanda, & persequenda: Imò non dari puto Delitium Melancholicum absque Melancholia Hypochondriaca, quæ non habet fontem in Hypochondriis. Sicut enim Pica, quæ est Delirium Mulierum picanrium, est circa abocum aliquid fontem in stomacho habens; ita etiam Delirium Melancholicum habet utrumque interdum sedem in Hypochondriis, & perit vi. Hinc etiam primariè cura per Vomitoria instituenda est; nam ita subitò somite Delirium Melancholicum sponte cessat, aut vel persuatione curari potest.

VII. *Agripa quasi studio perficienda*, cum quò magis vigiliant, eo perniciat Ratio reddi solet, quo minus, eo facilius curabile sit.

VIII. Observandum, quod in genere præmissis præmittenda omnia Deliria supra statuta quocumque curantur Remediis, adeo ut ridiculo modo Ridicula Deliria fuerint curata, ut scilicet semel impressam Phantasia per aliud contrarium quasi deleatur, & extinguantur: vid. THONERUS lib. 2. observ. 1. PLATERUS lib. 1. observ. pag. 40. BARTHOLINUS centur. 2. lib. 26. Sic enim v. gr. refert FORESTUS lib. 10. observ. 13. de quodam Melancholico delirio, putante se habere in abdomine Serpentes, unde præmissis præmittendis Excrementis Alvi redditus Serpentes addendus iussit, quos cum vidisset Agger, restitutus fuit. Quidem putans se habere in capite Palleres, curatus fuit per Medicum, qui palleres vires applicavit Naribus, quorum morbosusque perfrictibus Agger putans eos esse extractos per Naros, ad sanam Mentem rediit. Alius Nasum fuit instillat picea bubali constare putabat, qui curatus est Intestini affeetus Animalia appensa, quod Medicus abindebat, & ita fuit Nasum abscondit diebat, & curatus est, referente FORESTO lib. 10. observ. 13. in schol. Alius putavit, se gestare Corvum, qui fuit curatus Cornum Cervinorum alligione, & postmodum per terram abscissionem. Alius putavit se carere capite, quale exemplum habet FORESTUS lib. 10. observ. 12. unde ille fuit curatus per im-

positum pileum plumbeum, cuius gravitate fuit persuasus se habere caput. Aliud Ridiculum delirium pariterque ejus Curationem videbitis in M. A. N. C. anno 3. observ. 49.

C A U S Æ.

Quoad causas, & fendi modum, unde, & quomodo in Melancholicis oriantur deliria, res à priori, & adeo perspicue determinari prius nequit, quia quomodo ille sensus Interius, quem Imaginationem vocamus, sit, declarat, nescimus enim, quomodo Imaginatio percipi, seu peragi solet; Quia ergo hoc nescimus, non possumus demonstrativè procedere. Interim certum est, Animum Rationalem esse insentem, ac proin totum negotium erit in Facultate Animalium situm; non in sensu communi, non in Memoria: ergo in Imaginatione, seu Phantasia, quæ consistit in unionem variorum obiectorum cum spiritibus Animalibus per sensus externos perceptorum, & spiritibus impressorum; adeoque probabilissima eorum est Opinio, quod per certam motum spirituum Animalium, in cerebri medullis, nunc ab externo obiecto, nunc ab Animo Rationali excitatum, eandem peragi afferant, occasione cujus varii motus spirituum Animalium; à natura volatili temperata lucida desistentiam, Anima Rationalis varias concipit Ideas. Motus autem hi spirituum Animalium dependent nunc ab obiectis, sensus externos afficientibus, nunc ab Anima Rationali diriguntur; unde etiam perturbato ac laeso spirituum Animalium motu, & perturbati Imaginatione, & hæc delirio modo lædi Ratiocinationem sequitur. (N)

His præmissis, considerabimus adhuc aliquot *Exempla eorum, qui huius Delirii Melancholici fuerint cæcæ*. Nonnulli, in specie pauperes, vel servili conditione additi, putant se esse Monarchas totius Mundi; quale exemplum habet SENNERUS lib. 2. præf. part. 2. cap. 1. pag. 339. item THONERUS lib. 1. observ. 2. Alii fastuosi illa magna sibi imaginantur confer. M. A. N. C. anno 3. observ. 24. pag. 282. Sic Malier quidam in se Speculo vidisse ore aperto frustum aliquid Carui superne ad Fauces pendere, quod suffocationem sibi minari vidit intendere, sibi imaginabatur: vid. M. A. N. C. anno 9. & 10. observ. 41. Alii Pilores Panem intoxicatum, vitæ lute insidiat querebatur, loco alleg. observ. 46. Quidam Batrum comedens se ex Batrum constare arbitrabatur, indeque lignem accedere volebat, ne liquefceret: sicut Stranus putator mingere volebat, metuens ne, quando mingeret, Mundi Diluvio interiret, quæ exempla refert LANGIUS in Comm. in Fabric. Quidam se Rexam videri in corpore gestare putabat, referente FORESTO, & PLATERO lib. 1. observ. pag. 40. Alius putavit se Nibla in capite gestare: Exemplum hoc refert FORESTUS lib. 1. observ. 13. Sic Puer lapide in capite istas, & postmodum Melancholicus delirus semper Sylligium optimi in Lingua Germanica confectis, quos ipse postmodum componere nescibat, postquam curatus fuit: Sic Lindanus in Colleg. Practicæ habet exemplum Mulieris, indocte alia, quæ in delirio versus concinios elaboravit: Rutilicus quidam semper sub Novilunio Carmina conficiebat, sed post Novilunium ne verbum quidem Latine prosferre poterat. Alius fuit Melancholicus, qui putavit se semper frigere, se fere fammo frigore esse affectum: hoc fuit Arce curatus postmodum, dum ipsi applicata fuit Vellus ex Pelle agnæ spiritus Vini, seu Aqua vitæ imbuta, quæ accensa Agger non amplius se frigere dixit, & ita curatus fuit, ut habet ZACUTUS LUSTIUS lib. 2. præf. adm. observ. 24. ROLANDUS refert Exemplum Piscatoris, qui catenat, ridebat, concionabatur, disputabat cum adstantibus, anno nomine le omnium doctissimum putabat. Rursum est exemplum, quod habet HEINRICUS ab HEER observ. 27. de quodam Melancholico, qui singulos Menses in tres dividebat partes: in prima parte erat solus, & moribundus, in secunda Venationi operam dabat, in tertia Caratibus mulcis se delectabat, & mirò hilaris erat. TULPIUS lib. 1. observ. cap. 10. refert alium Melancholicum pigriss, se carere Sauris, qui fuit curatus postmodum percussive forti Surarum. BARTHOLINUS centur. 2. lib. 26. refert M. A. N. C. anno 3. observ. 26. refert Melancholicum Medicum Vocem quorundam sub diebus Capicularibus sub lecto ledentem, qui se Testem esse putabat, finito verò tempore Capiculari, & Menis illo sanus evasit & per totum Annum ita mansit, donec rediret altero Anno dies Capicularis. Refert SALMUTH centur. 1. observ. 63. Delirio.

Delirium Melancholicum singulis septem Annis recurrens periodice, semper durans totumque Aetum in Chirurgo, hinc Anos iterum cessavit, & post exactum septennium rediit. Mulier quondam de Regi caudam esse desponsatam imaginabatur; unde Vitra perlorata quasi Gemmas à Sponto datas diligenter allevabat, ut refert SENNER-TUS de *Melanchol.* pag. 339. Alia Venereum se esse aiebat, & ut eo facilius crederet, Vellus omnes exuebat, Alius in gramum Milii esse cogitabat. BRENDelius in *emul.* 24. refert, Conciatorem quendam fidei imaginatum fuisse, se audire vocem Dei, & Angelorum. Quidam se Anserem credebat, annotat SALMUTH *senior.* 3. *observat.* 92. Alius juxta TULPIUM lib. 1. *observat.* 18. cuncta Ossa sibi mollia contigisse, *Permina laro all. observ.* 29. in Molam gerere, pollmodum se luto fudam, & in mundo sine Corde remissam esse, somnabat. Ut tacem illorum, qui mortuos se concipiebant, qualem MARGUS MARCKI *Philos. nat. Ratis.* pag. 296. meminist LOSSIUS lib. 1. *observ.* 21. refert, quendam Cibum, & Potum, ex detestabile, quod ad Gulam usque Facibus, & urina repletum esse crederet. Et qui sunt familia varia Melancholicorum phantasmata, quorum multa egregia exempla videbitis in GASPARI à R. EYES *Comp. Phys. Jurand.* quasi *quæst.* 73. pag. 966.

Ex his modo allatis exemplis hoc perspicuum est, utut varia sint delirantium Phantasmata in diversis subiectis, nihilominus tamen unum saltem sit, circa quod occupantur ordinari, & quod ut plurimum pro determinatione Phantasmatis habeant causam externam, vel objectum quoddam, quod tam fortis placet, aut displicet; unde ibi delirium, hic fuga, adeoque affectus inhiens excitat; aut quod insipidum recurrit, ut super quod certam reflexionem faciunt Melancholici. Quod objectum per sensus externos spiritibus Animalibus vitiosis constituta fortis impressum, eos subinde isdem modis in cerebro sibi reiterata citat, vel fortiori facit, cuius continuati motus occasione Anima Rationalis idem Phantasma, seu eundem conceptum, vel ideam, seu Speciem Intelligibilem, & Intentionalem (vocate ut lubet) continuat format, & elicit.

Uterius in his Deliriis determinatis fieri, ut in Aetis jam Melancholicis, nondum tamen delirantibus, ab objecto quodam externo fortis affectus, cuiusque, vel ratione complacentis, vel dupliciter, impressione forti, oriuntur *passus animi graviores*, ratione quorum certum, & determinatum delirium patiuntur Melancholicum super unum objectum; ita eorum erunt, ut spiritus Animales fortis moti, sub novis quasi, & aptos motus excusant, & sic motibus agitati in alios trames redire nesciant. Quod ipsum ita declarabo: scilicet idem in talibus contigit, ac in istis, qui graviore modo Negotio, aut interiore Cura pressi, aut qui graviore affectu, Ira, Terrore, Metore, &c. percussu, eidem sedulo, & obstinatis incumbentes, tempore nocturno ob Negotium, continuat Mentem occupans, dormire nequeant; aut licet dormiant, propter actionem tamen, & tractionem diurnam spiritus Animales motibus illis, & tractibus, quos saepius percurrant, adfecti in cerebrum, licet parcius in Organa Externa influant, eodem tamen modo in Somno moventur, adeoque eadem objecta, circa quæ versata fuit de die Meos, eidem repræsentant, & ita Somniis variis Sonnum turbatum efficiunt; ubi sanè id, quod hic fit in Dormiente, parili ratione in delirantibus Melancholicis, licet Vigilantibus, evenit; unde id, quod interdiu animi tractatum, continet, & fortiter in Somno impressum habemus; sicut enim spiritus Animales in cerebro continuo moti inferunt Somnum; ita in Delirantibus spiritus eodem motu gudentes occasione præsentis Animæ Rationalis, ut hæc femp̄ eandem motionem concipiat. Unde etiam est, ut subinde ex talibus Caris, & Negociis, cum summa intentione tractatis, interdum tales sint Delirantes Melancholici: verbi gratia si studiosus impensius dat operam studiis Theologicis, aut Concionibus, atque studium hoc concionatorum sibi continuo inculcat, ut evadat egregius Theologus, aut Concionator, adeoque femp̄ Div in tractet, non tantum fit, ut alteretur successivè corporis habitus, & sanguis, & in constitutionem Melancholicam abeat, sed alteratissime hac spiritus continuo occupet tandem eam reddunt delirum, ut poterit summum esse concionatorem, & cum Deo, Angelis, aut Dæmonibus confabulari.

Imprimis verò notanda est *differentia Delirii Melancholici*, quando aliud est *causa*, aliud *vagus*: Sic in plerisque ferè adhibitis aberrat a recta Ratione, & vera, atque deliria *leguntur*: Alii vero circa usum, & determinatum verisim-

itar objectum, circa quod varia sibi Phantasmata fingunt, aut *conspiciunt*, aut *audiant*. *Vagus Delirium* fit, quando spiritus Animales plane desiliunt ab ordinato suo motu, ac novos Poros in cerebrum quasi excusant. Fit tamen id, ut Melancholia, & Delirium Melancholicum, quod primo, & in se Vagus erat, & determinatum, paulò post, quando objectum aliquod excellentius, aut gravius in sensus occurrit, & mentem potentius afficit, quod fortis moveat, & validiori impressione afficiat spiritus Animales, qui novum eundemque motum continuo tenent, & exinde novum suorum manifestis reliquoque vestigia intra Fibras cerebri medullares, quæ continuo peraguntur ab illis, unde certo modo Delirium determinatum reddunt, & circa tale objectum quasi fixam, quodam quasi Delirans se esse Monachum putat, & in hac ratione continuo occupatus est. Verbi gratia, sit Melancholicus nondum quidem delirans, sed tantum solitudinarius, melius, medicabundus, & morosus, hic transiens casu per locum, ubi vidit Peponem putridum, facile incidit in cogitationem; quid dum tu ita debes putrefcere, & à jam putrefcere? unde perterritus, sicut tales semper sunt animi, & mehi, adeo afficietur inde spiritus, per Terrorem nempe, ut superveniat delirium Melancholicum, quo putet se esse putridum, vel se etiam esse putridum Peponem; nempe hac impressione facta, quasi visus putrefcere, fit ut moti spiritus Animales continuo eundem orbitas repetant, adeoque obvehit Delirium. Vel sit talis Melancholicus, qui audient frangi Vitra, statim potest venire in mentem; quid si tu etiam tali ratione frangaris? unde delirium determinatur, ut putet se esse Vitrum, & nactus se frangatur. Sic fit Hypochondriacus ad Melancholiam inclinans, qui percipit Ructus, Sonitus, & Murmura, & quasi coactiones in abdomine; his sonitibus preteritis Melancholicus, & circa eosdem suis cogitationibus inhaerens, facile exinde potest incidere in illud delirium, ut putet se habere Ranas viventes in Ventre; & ac ut alias bene ratiocinatur, tamen continuo medietur de sua Rana, ratione quarum antio est: Unde dum ab objecto fortiori sibi incutit motum, spiritus Animales continuo moti delirium excusant. Sic ponamus Juvenem amorem, qui licet per se sit sanissimus, hic primo sibi admodum placet circa præsentiam Amantis, postmodum absens incutit sibi de eadem pulchritudine, cogitat, quomodo deinde possit acquirere eundem præsentiam; hinc incutit consolationes, &c. porro cum semper Mens, & spiritus Animales occupati eodem modo moventur, fit, ut subinde in Somno postmodum species Amantis, & actiones cum eadem occurrant; tandem ita determinatur spiritus, ut nonnisi Amantem repræsentent; hinc talis sequitur delirium Eroticum, sive Amatorium, ut Ager continuo putet, se habere præsentem Amantem, unde incipit cum eadem confabulari, adulari, &c. tale quoque facit cæcemonias, quasi ipsa Amata esset præsens, ut nonnisi præsentem habeat. Hæc, & similia tali modo se insequuntur. Multum hic faciunt pro determinandis Deliriis, Terrores, Tristitia, Metor, vel similes Animi insigniores affectiones, idque in specie in iis, qui jam Habitu Melancholico præter nactum sunt prædicti; qua ratione v.g. Mulier perterrita ex viro suspensio gravissima Melancholia correpta fuit, testis PLATERO *observat.* lib. 1. & SCHENCKIO *observat.* lib. 2.

Nam observandum quod *causam remanet* ad Melancholiam, & hinc Deliria Melancholicis disponentem, eam ferè esse duplicem: nempe quod vel à *causa externa*, vel graviore animi affectu primo oriatur, vel à *causa interna*, constitutione nempe malis sanguine successivè alterata, originem ducat, quibus constitutionibus melancholicis inde natus demum deliria superveniunt.

Deliria ergo quilibet, undecunque, aut quocunque ab objecto oriuntur, quare non æquè in omnibus oriuntur, seu ver. gr. quare non in omnibus ex animi affectibus *gravioribus* oriuntur Deliria Melancholica? Hic consideranda est certis *substantiis* nam certum est, quod omni magis promptum sit ad Delirium, alterum minus, prout constitutio Melancholica in uno plura, in altero minus fuerit confirmata. Causa ergo huius promptitudinis ad Deliria Remota est in Milla sanguinea: Proxima vero hæret in spiritui Animali. Nempe ex superioribus innotescit, in Deliriis Melancholicis duo probè distinguenda esse:

1. Habitum, seu *constitutionem massæ sanguineæ*, & *spiritum* melancholicum plus minus, naturalem, vel præternaturalem, seu morbosum.
2. *Superadditum* huic ipsam Delirium melancholicum habitum, idque, vel *passum*, sive *determinatum*, circa quocunque objecta occurrant, vel *determinatum*.

forum spirituum circa idem obiectum, Delirium postmodum supervenit. Sed ex eo, quod Anima Rationalis sit sana, evenit, ut huiusmodi Melancholici, determinata Deliria patientes, circa illud obiectum, circa quod delirant, subinde in reliquis satis prudentes sint. Sic enim legimus verbi gratia in AMATO LUSITANO (ni fallor) Exemplum cupidam Pueri, qui se putabat esse Regem ingenuum, sub quo Delirio loquebatur de rationis status, & Arcanis Politicis, & tam subtilia, & acuta Republicam gubernandi promebat consilia, ut omnes in sui admirationem rapere; postmodum curato Delirio, Puer de talibus Politicis parum, vel nihil sciebat. Satis ergo prudens fuit Melancholici circa obiectum Delirii, id quod non minus astutus mihi, quam quod observaciones medicorum docent, *Symptomata* nostri surrexisse, & Verius admodum concinnos scripsisse, mane tamen eorum, quae noctu egredere, nihil scivisse. Nam circa idem obiectum semper occupata est Anima Rationalis, quia tota eius Essentia, prout equidem a nobis cognoscibilis est, consistit in eo, quod sit substantia immaterialis, quae semper ratiocinatur, & aliquid cogitat. Hoc Anima Rationalis indefectibilis semper ratiocinans circa idem obiectum subinde occupata, necessarii de eodem elegantes, & rationales formatit Discursus, quoniam a nullo obiecto interturbatur, & impeditur, & ut in uno eret, ramen in reliquis suas potentias exercere potest.

Cum vero à *Rabus Non-Naturalibus* scilicet mutationes in alteranda massa sanguinea, & efficiendis spiritibus Animalibus magis sit potentia, ut quotidie in Brutis videmus, non mirum est pro varietate, verbi gratia *Temperamentum*, secundum Medium decursum, etiam mutari Melancholicos, ita ut nunc melius, nunc peius habeant; unde Temporibus successively correctis, corrigantur etiam constitutiones: ut hinc est, quod iam illi Delirio per mutatum *Humorem*, per continuas *Mutaciones*, & subinde alias Res Non-Naturales, mox iterum insurgunt massa sanguinea Crasis, & consequenter spiritus Animalis (videmus enim, quod tales Melancholici sunt subinde admodum piusque); hinc fit subinde, ut interdum sponte nonnulli cessent Deliria; quae tamen nova alteratione per graviora obiecta indulta, deinde recurrant, quoniam, & ex tali mutatione Crasis massa sanguinea, & spiritum sit nonnullum, ut delirantes Melancholici ex uno obiecto in aliud successively delabantur, patiti ratione, atque videmus quosdam sub Ebrietate ea *Passione* fieri primo hilares, hinc admodum loquaces, tandem risolos, & quasi manicacos, & furiosos, denique insolentes, & torpidos, qui altero verò die subinde sine motu, tristes, plus minus rarbalescent, & quasi Melancholici. Unde, sicut hoc facit Vinum mutando Crasam massam sanguinem, & spiritum, cum sit causa externa, ita simili ratione successively à causis internis facta alteratio Deliria subinde & Melancholici mutatur.

Ratione fundamenti huius Melancholie, in massa sanguinea & spiritibus, in veterates semel affectus Melancholicus non saltem continuatur, & qui per proximos sapienter recurre, sed etiam subinde hereditarius esse solet, ita ut à parentibus Melancholicis saepe in Liberos transplacetur, & hi tandem ad Melancholiam deducantur, in specie in Mulieribus (quoniam hoc à Maribus Melancholicis semper aliis videantur sume Mentis) praesertim Gravidationis vel Puerperii tempore Character Hereditarius evigilare solet.

Quod vero valeat *Italiis* talis est *Delirium* interdum evenit *Remedia*, & quod talia *Deliria* *Remedia* curent subinde ridicula. Egros, & eo ferè est, quod Anima Rationalis, circa unum tantummodum obiectum occupata, ea firma tali perversione ab obiecto novo, & dum obiectum morbosum remouit videt *Eger*, & exinde Lætitia vel alio affectu alteratur, spiritibus Animalibus novum conciliat motum; vel si ex supervenient contrario aut fortiori obiecto etiam alio modo moveantur spiritus, sit, ut tale fortius obiectum, & quidem aliud ac novum, ex immutato spirituum motu, Animæ Rationali præbeat occasionem variandi conceptus & Speculationem, & ita omnes priores ridiculi conceptus à supervenientibus novis, quia omnes in momento cum manu deleantur, & expungantur: quia ratione v. g. Immerito substantia in Fluvium curat Delirium Maniacum; hac ratione Stratagemata per assensum, delendo quilibet conceptus delitos, & removendo obiecta, quasi talia Deliria asserunt; quæ etiam cura est magis vel minus erit duratura vel constans, quod magis vel minus restituta erit fuerit massæ sanguineæ depravata Crasis: sic Melancholia observata est, quæ curata fuit per Gaudium nimium, & profusum; & improvisis conatibus, quoniam fortassis obiectum delevis prius.

Plura quoad hanc Theoriam videb. in WILLISIO de Anima Doctor. part. 3. cap. 22.

DIAGNOSIS.

Necessum est autem imprimis, ut alius progressus Melancholie maturè præcaveatur, in quem finem immittens ea præcognoscenda veniunt.

Signa autem, quorundam esse Habitus Melancholici, vel Naturalis, vel præternaturalis, tunc colligitur, quando talis *Eger* gravioribus subinde infamias retrahit, quando Somnum habet turbulem, & infamias interitum, quando evadit solitarius, quando præter solitum sit morosus vel tristis, etiam invitus, quando fucilla cogitat & trista, quando maculeculis sine manifesta causa, quando vel levissimo obiecto subinde terretur, item si in una Cogitatione subinde hæret, si meditando & cogitando fuerit, &c. Hæc enim, & similia sunt verè signa immittens melancholia, sive ipsius affectus perturbations Mentis.

Quod si *Eger* postmodum incipiat subdiale & uno altero obiecto, quando putat se esse sapientissimum, & sic porro, tunc Delirans melancholicus, seu delirium melancholicum faciliè manifestum evadit.

Verum ipsa melancholia etiamque Delirium per se passim faciliè Specialem *Tamen*, & quædam remota melancholice distingerent sunt consideranda pro felici insinuenda cura; adeoque cognoscendum est: an causa occasionalis externa sit Animi Affectus quidam gravior, Terror, Ira, Timor, primam dederit occasionem melancholie, rationes cujus insensum spiritus Animalis Delirium? an verò ex interm vicio & depravatione ipsius Massæ sanguineæ melancholie (loquor cum vulgo) sit Hypochondriaca affectio (successive primam originem duxerit melancholia sine causa externa; nam longè diffusius Deliria ex affectibus animi nata, quam à causa interna, currant). Signa hæc observanda esse inculcat LINDANUS, dum dicit: Quando insidius in melancholia, hoc agit, ut nascatur origines mali, an v. g. sit Tristitia, vel enim hoc agit, latenter loquar. Multa enim res sunt, quæ homines tristes, & sic longi tempore perseverant, in melancholiam deducere possunt: sic Hippocrates lib. 6. Aphor. 26. Ex hoc est ratio, quæ non raro resistunt in integrum melancholici. Dicitur ex talibus quædam, an sit melancholia ex animi affectibus: an sit ex talibus melancholice? Nam si est animi gravioribus affectibus, Talis in illis est valde obstruere, quæ contrarios ex conflant, quandoque aequaliter, saepe vero inaequaliter, & deinde qui habet per amorem spiritum deficientem. Vermicularis est interdum, interdum non. (Vermicularis & formicans est novum & idem: Formicans enim, quod celerrime currunt: quando autem non tam subtilis est, sed paulo pluvius, dicitur Vermicularis, talis est horum Melancholicorum.) Frequenter enim hoc inaequaliter & inaequantia Pulsus coram seipsum vel melancholia ex animi affectibus; quoniam enim animi parum relaxatur, spiritum enim mutatur Pulsus, unde facili animi affectus exinde perveniunt. Hæc enim LINDANUS.

Hoc observavi supra. Erit in muliere 35. annorum, alia devota, dicente, se rem veterem per viginti annos cum Demone habuisse: hoc confirmabat, dum tassa esset, Aurigæ Equam se fascina, & perire iussantes demoniacos per Vulum, adeo ut ferè ad rogem damoaretur. Advocatus tunc Medicus inquiebat rem veram esse. At aliter se res habuit: nam interrogata à me, uti solebat? monstrabat superiorem regionem Hypochondriorum, Pulsusque octava vel nona vice deiebat, ac non nomine, perfecta erat Melancholico-Hypochondriaca; Alius enim aderat obscurus: Seybala erat dura, huius inconvicta congestaque, eademque per primo Somno patulatur Locum cum Insulubris epileptica, unde calidos excubantes baculo tergerant Alvum ejusque abdomen, pulsantes quasi se posse Demonem superincubentem fugare, aliquos septimanas insomnes ducebat. Haec autem Deliria Melancholica ania dedit, quod ad videtur de Fascinatione, adeoque cogitasset, quid si hoc fecisset?

Facile quidem in Melancholicis nunc robore nunc pallorem succedere: angustis enim homines variè corripiunt, prout obiecti similitudo variat; sicut testantur Historie Melancholie ex Amore detectæ, quos GALENUS lib. de Praeg. ad Postum. cap. 6. AREÆUS lib. 2. de caus. & sign. distinetur. morbo. cap. 3. & ZACUTUS LUSITANUS lib. 1. de med. princ. lib. 40. adducunt.

Si Causa Remota sit Suppressiones Hamorrhoidum

vel Mensum, et Agno cognoscitur.

Quod si verò pedecatur & circa *Uterum* exterrum fiat Melancholia, tunc tales *Ægri* habent Deliria Vaga, quorum causa Remota est Affectus hypochondriacus. Huius affectus signa propria erunt presentia, vel maiora vel minora. In specie *Ægri* tales conseruntur de Palpitatione cordis, de Auriæ cordis & Rustibus acidis; item conseruntur de Paracanthia abdomina, de Torborygmis & Murmuribus Intestinorum, de Alvo cœcra, Flatibus, de sensu molesto pectus minus obsequio in hypochondrio sinistro (in *Linea*) cum sensu Palpitationis in Dorso aut dextra hypochondrio, *Meli* quæ ex splene videntur oriri, somniquæ habent turbulenta (ex quibus) motus suspicio venit, adelle Melancholiam hypochondricam; Phlegmæ vagæ crebris affluuntur, & circa Frontem in Facie calent, &c.

Ipse Affectus Melancholicus, speciales *vis* variis tantum *Melancholiam* facit, huius habet exacerbationes & remissiones, item *Ægri* admodum sunt avari & queruli; Palpitatione cordis subinde est frequens, item pectus alius sunt tristes & incedentes, & quæ sunt similia signa affectus *Melancholiam* sanguineæ.

Melancholiam tamen & *Tristitia* præceteris etiam sunt pensanda in Melancholicis; quidam enim interdum hilares, interdum pusillanimes & pectus minus desperati sunt. *Non quidem* *curam*, inquit *PETRÆUS* in *Disert. harmon. est*, quid *gaudere* & ridere videntur; minime tamen *Gaudium* est verum, & verus *Risus*, sed quasi *symulas*, & *farfuciosas*, quæ paulo post *transiunt* & *tristes* evadunt, adeo etiam solitudinem amant, & *conversaciones* hominum persequuntur.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: Melancholia aut talis, licet nunquam lethalis exeat Affectus, ratione tamen Eventus; Temporis & Modi, valde incerta est ipsa *Prognosis*, quatenus illa nonnulli brevi revalescunt, alii coarcti tardius, alii nunquam.

Uplurimum tamen Melancholia, quæ ab *Operum* evidens & ab Affectu Animi est, longè solutius curatur, quam quæ post disturbum denum procatum seu postdispositionem melancholicam Intestinum sensum invadit: vid. *LOS-SIUS lib. 2. observat. 22*. Ita enim subdita dicta Causa evidens sæpè sponte cessat Delirium: hinc plures ex Crumena quam ex phlegmasia levem solipiunt, cum in posteriori caso, quo sanguis & spiritus ab ordinariis, & debitis Causis recesserint, non ipsa Cerebri tantum Conformatio temporis successe inconvalescibiliter mutatur, res difficilior fit.

Pariter *Melancholiam* tamen & quod nondum diu duravit, & cui nondum supervenit Delirium, semper facilius (nempe ceteris paribus, & aliis ortum ex gravi Animi pathemate fuerit) curatur subinde etiam à sola ferè conveniente Vis ratione, & familiar conversatione cum ioculis, & mutatione Aeris, sic laudabili, tenuis & spirituosus generatur Sanguis: *Involuta* vero melancholia, & orta ab Animi pathemate exteros, aut rudius immodicus in noxam protrahit, in specie cum pericula Delirium accessit, aut quæ *hereditaria* est, etiam quæ subinde repetit, tardè aut difficillimè curatur, quia *Ægri* uplurimum à Mortem comitetur.

Delirium *Atetismus* facilius cedit præmodicario.

Melancholia quæ post *motum* alios, ut post febres Diuturnas aut Acutas, aut post Phrenitidem invenerit, facilius aliis, motu scilicet Corporis habita, & sæpè per solam diutam curatur.

Porro in *vis* familiaris & frequenter ferè est Melancholia, sed minus difficilis curatur: in *familiis* quidem rarior, sed diuturnior & perniciosior, speciem *vis* mensum jam desitit excretio, aut Gravida exultat: cum etiam huius nonnulli, qui parentibus Melancholicis nati, etiam alios semper hinc mentis obierunt, Pregnantes tamen huiusmodi hallucinationes ostendunt.

Præterea Melancholia, quæ ex *non Risa*, *vis* seu *gaudii* & *Illarum* quadam intermixta, mior, tacior, & ceteris paribus tractabilior est, quam quæ cum humido, aut cum quodam Furore aut Tristitia coniecta, ac tum summo Moxore.

Melancholia, quæ à *charactere* *semitali* pat parentes in liberos sine translatæ, raro potest curari.

Si Melancholicus præter *salutem* in Risum, aut Fletum, aut Lacrymas solvatur, merendum est, ne in Morsum; imò Maham transeat, nonnquam in Paralyin; & quavis tardis, in Merbol Convulsivos, item in apoplexiam.

Tom. II.

Ad salutem monstratur via, si successivè mitiora Deliria sunt, si superveniat hæmorrhoidum, aut etiam Uteri fluxus, si superveniant Varices, Germ. *auspicius* adrem *fibris*, *Keln*, quos ipsos commendat HIPPOCRATES *lib. 6. aphor. 21. & 22. & RIVERIUS præ. lib. 2. cap. 27*. Item si in febrem & similia Curantia crassa vel transmutantur; item si Urina hædenda tenuis, viridis, turbida, *opaca* & nigra evadat. Huius enim modis interdum ferè aut remittit aut planè cessat Melancholia.

Ad *Involutum* verò declinant *Ægri*, si omnem Cibum & Potum penitenciter averterit, qui etiam quando nihil dormiunt, aut tandem Vires succellivè insitunt: Nam observatum fuit, Melancholicos interdum ad aliquot Menses non momentum quidem dormivisse, & in tandem collapsis Viribus interire.

Denique rarissè, quod Deliria Melancholicis superveniant *Convulsiones* aut *Epilepsia*, quæ Cerebrum afficiunt.

CURA.

Quoad *atrinere Methodum* *Medendi* ad curandum Melancholiam & Deliria Melancholica, est vel *Asservatoria*, & quæ Causam Antecedentem respicit, vel *Curativa* scilicet ipsius Delirii huiusque Causæ Proxima: Ad *duos* igitur, ut iam supra monuitur, respiciendum est:

1. Ad Constitutum *Melancholiam* & *spiritum* melancholicum.

2. Ad inspersionem Delirium.

Uade *ratione* *priori*, curandi tales *Ægri*, ut *Melancholiam* hypochondriaci affecti, hinc *primaria* & *Melancholia* sunt prociua. Tota Cura consistit in rectificatione *Melancholiam* sanguinis, in correctione ejusdem vitiosum & regeneratione *Melancholiam* sanguinis ipsiusque *volatilis*: sed hoc etiam non valet discutere, parum quod *Melancholiam* per se sit contumax; partem etiam quod melancholicis flatum omnium Remediis non sint perituri, & alia etiam per se sit fatimorgenti.

Ratione posteriori, Humores educantur & attenuantur, atque spiritibus Animalibus aliquas tranquillitates concilianda, illique a perverbo & inordinato motu sunt avocandi, & in circuitus priuslibi redigendi: idque vel *Medicamentis* vel *Rationibus*, hoc est, Auxiliis vel *Medicamentis* vel *Edicibus*. *Medicis*, hoc est, *Medicamentis* *anodynis* tam Mineralibus, quam Opusculis & camphoratis; *Edicibus* vel eorum concopibus absentiendo per *diastemata* & *fructus*; vid. *FORRESTIUS lib. 20. observat. 29. & TULPIUS lib. 2. observat. 18. & 19*. vel dissentiendo & corrigendo per *Persuasiones* rationales, variis confabulationibus, recreationibus, negotiorum commotionibus. Semper finis in Malo pericaciori simul eo respiciendum est, ut Melancholicos primum sit premittendo cauto quodam *stratagemate* decipiamus, eoque à semel concepta Opusione, etiam subinde Medicis radicalis, avocemus; Talia enim *stratagemata* minus sunt aliena à Medico.

Propterea pro meliori Cura observetur:

I. Ut Causa Remota remoueat; quæ si sit affectus animi gravior, remouenda est oon tam per Medicum, quam per Ethicum seu Moralium, nempe per Rationes: In vero Causis ferè Internis, Menes *suppre*, Malum hypochondiacum, &c. tunc hæc primus curandæ. In genere habito Causæ Remotæ respice per omnia ea Remedia, quæ in *afflictis* hypochondriacis inparantur, tractandæ sunt melancholice & omnes ejusdem species, tam per *Digestivum* quam *Laxativum* & quibus addenda postmodum *appropriata* Constatia dicta, quæ spiritibus Animalibus volatilibus, subtilioribus & agiliore reddere, & Fermentationem sanguinis naturaliorum restituere, easque crassas temperare valent. Ipse propterea ad *Melancholiam* sanguineam corrigendam & spirituositatem infundendam primum obtinent *Tartarus* & *Melancholia*, vel *Lacanthæ*, *Pomice*, &c. quæ sunt huiusmodi. Inter posteriora verò, *Conferantia*, sunt imprimis Vinum, Crocus, Melissa, Ambrata, & vinosa *ephedra* *phrasia*.

II. Observandum rectè monent Auctores, omnia incalescentia circa melancholicarum & maniacorum curam tentari, nisi quam rudissimè *Emetorum* subobicietur. Nam qui Vomitoria revera consistit malum curare omnia melancholicæ, Deliriorum & Manie, quæ in maiori Malo, & præ ratione circumstantiarum, etiam subinde repetenda, & non una vice ipsæ insistent. In specie nempe poterit minime curare, nisi prius propinato Vomitorio. Ut adeo in Vomitoriis sæpè repetitis cura tam Præservativa quam curativa Deliriorum horum fundamentalis consistat. Deliriis quædam melancholicis tractati per Vomitoria miscantur ex *reco*.

Hibbbs a III.

III. Caveat sibi diligenter Medicus, ne sicut melancholicus aut idem propius accedat. Nam hi ipsi admodum infensi sunt Medici, & singulantes licet paucos, eos subinde male trahant, verberibusque onerant, in specie Maniaci. Exempla talia videb. in **HILDANO** *Lib. 4. observat. 9.* & **FORESTO** *lib. 10. observat. 22. in lib. 4.* Quis etiam curatiles, sed odio suum habent Medicum, ut recte observatum fuit à **BORRICHIO** in **BARTHOLINI** *lib. 1. hyst. lib. 1. cap. 248.*

IV. Observandum, quod in Malo peritoseiori, & ubi Aegri tales delirantes armis concepta hypochondrii insistant, permissis jam praemitendis, nil melius fit, quam ut eorum quodam Tirragmatum eos disciplinam, & à semel concepta Opinione etiam ridiculis Remediis nonnisi quodam delatatione: vid. **FORESTUS** *lib. 1. observ. 12.*

V. Observandum: Alios contumaces semper & quovis modo & laboris forsan. Nihil enim est, quod magis hypochondriacos infestat, quam alvus obstricta; Quia magis obstrictio affligit alvum, ob magis idem sunt morbi & insomnes, omniaque exasperantur Symptomata. Unde Alius quotidie respondere debet, ut Arctus aut natura; cui scopo omnium optime satisfaciunt pulvis & pulsat, sunt pro scopo tam alterandi coeque quam emolliendi quae optima: hinc Tartarus, item gummat; N.B. alvum quoque humectantem, item ea & cum Lacte paratorem alius hie admodum est probus.

VI. Cum Melancholici, qui semel delirantes fuerint, subinde repedunt circa Anni cardines, Solstitia & Aequinoctia; ubi id oportune & tempore fieri & Animum nonnisi quodam Cura prophylactica per laxativa & alterantia appropriata spiritibus infundant.

VII. Quidam Visceribus adhuc, sed nescio, ob quam causam. Ut enim Venesclia in Mania conveniat, non tamen video, quomodo Melancholia conferat, cumque in specie Melancholici debeat curari per Alimenta eumpta. Quam isuriquum ergo est, si sanguinem eorum exhaustum; quin potius alereat sanguis op Medicamentorum infusa dicendum, non vero praeceps evacuatur PLATERUS quidem rostratam Venescliam commendat; cuius rei hanc rationem reddit WILLISIIUS, quod nimium Sanguine effuso toxicis educto novus scissura generetur; sed errat, non vel sanguinem generet, nisi ipse sanguis; & observatur quidam in melancholia per venescliam, inrempellit & crebro nimis administratam, in Morbo & Rapiditate conici. Haberda Equidem, ratio est consuetum Antecedentium & Virium, purum sursum in plethorico, se non adeo turpidum, Venesclia inquit habet, sicuti etiam, quando vel supposito evacuationis copiose praecessit, vel Caput circa Frontem insonitus subinde insensat, metu majoris periculi, aut ne in Maniam degeneret. Vena Brachii aperienda, item Frontis in declinatione, aut Saphena in Femina incidenda. Quae etiam spectant Varium, & Hemorrhoidum per Hirudines in Mariis aperturam. Imo melancholia aliis irritis per hirudines temporibus admodum curata refertur à **PONTANO** in *consil. & resp. lib. 1. cap. 152.* Evacuacionibus quoque accessenda est Trepanatio, & Funicularum supra suturam coralem inusu profundior, à **RONDELIO** *Prax. lib. 1. cap. 42. & 43.* commendatur, idem quod nonnulli fracta fortitudo cranii curati fuerint, Huic adimplatur **RHODIUS** *Crus. 2. observat. 43.* per Experimentum Caselli. Nuperrime Mulieri Melancholica creberrimis affluacionibus Corporis vagis afflicta, & praesertim interdu Frontis illi subinde correptae, phoratoria utrique brachio admoveat illi, ut doloris ratione impetum spirituum & Humorum à Capite averterem, ne Mania supervenire quest.

VIII. Observandum, quod praeter Vomitoria in principio mali purgatione per inferiora conducant. In principio dico: purgatione enim proprie dicta in mali cursu minima commoda sunt, Diuretica parum aut nihil operantur, potius nocent. In principio ergo melancholicos semel & iterum purgare licet, minores **LINDANO** in progressu verò Morbi plus necessitas, quam proficiet per purgatione: quin potius loco illorum malum optime per Urinam, & hinc per levis & repetitis sudores solvit, uti docet **LINDANUS**, Nam (1.) Melancholici ordinario plus moquent quam alii; & quoniam (2.) raro sudant ob habitum corporis densiorem, & coactionem pororum cutis, materia Urinae subinde augeri solet.

IX. Quiridia sunt optima. Et in genere hie magendum, quid omnes ille affectus, qui dicuntur Spleneticus, aut qui dicuntur grieci ab humore Melancholico, praemissis praemitt-

tendis, id est purgantibus, praesertim Vomitoriis, & hinc Alterantibus martialibus, optime per Diuretica & sulis curantur. Et observatum fuit, quod in talibus urina turbida & crassa, opaca, interdum etiam nigra reddita, & copiosa contentis laturata, signum fit declinantis in talibus morbi & imminuentis Sanitatis; adeoque hic diuretica, & tanquam alterantia & tanquam evacuantia, optime conducunt; recte grat, Argemum duplicatum hypophisi, Niterum saccharatum in potu solutum, & hinc Remedia tartarea, in specie tinctura Tartari, Tinctura Nephritica Amelangi, Spiritus Tartari visatilis.

X. Recte monet **RIVERIUS**, semper ad hypochondrii praecipuum dirigendum affectum, unde curatio pro malo hypochondriaco ad reliquum Melancholiarum curationem sufficit. Unde etiam **BARTHOLETIUS** *Tract. de respir. inquit*, quod melancholia, quae ex conditio totius curanda derivatur, respondens Quartanae exquirat; adeoque etiam esse tractandum melancholicos ut Quartanos.

XI. Quantum fieri potest, opera danda, ut Aegrius curantur, & somnus aut convalescat, aut restitatur vel **HORSTIUS** *lib. 2. observat. 18.* Id quod interdum post Vomitorium facile evenit, ut tunc plus minus lassati aegri vel sponte in somnum inclinent, & ut facilius ad somnum disponantur. In specie ad somnum promovendum alimenta, quae sunt humida, ac bona Nutrimenta roridur turrida qualia sunt Juscula, Ova, Carnea facilia digestissima, Ictum Lactis, Lacticia, Oryza, Milium, &c. ipsa primaria convenient; ita cum temperatur Massa sanguinea, & humectatur Cerebrum, adeoque multum Dieta sibi in recessu. Certè quando alvus dormiens, minus grave malum esse solet, ut si post Aegrius somnus redeat, facilissimum signum esse solet.

XII. Opia fuit, & nisi praemissis universatibus, nonnisi danda sunt. Nam in talibus Opia parum vel nil operantur, praesertim in principio, & subinde duplicata ut triplicata nisi doli nihil facient, ad acidum in primis viis turbulans, eorumque vim destruent; idque po magis, quod diutius somnum non viderit Aegri, ob nimis sarotica & opia operantur; sed potius, dum non faciunt somnum, graviter malum, & reddunt Aegros quasi delirantes, cum talia aeterea per se sapient aut in majori doli insuperata forma nonnihil turbulenta & quasi delira inferant, Insuper omni per appropriatis Specificis miscenda opia, in specie Viscerantibus, & etiam occurrentibus humiliter exterioribus medicamentis capiti & Fronti applicandis; item pedibus ac similia pro scopo Hypoetico Melancholici optime confut.

XIII. In tota cura studiosè semper Dieta observanda est, ut sit laeta & nutritiva, unde dentur alimenta & potulentia, quae blando humore temperato & nutritivo probe turrida & impragata, ut Lacticia, pulvis, & similia immiscenda commutetur dicta; Equidem notate **LOSSI** *lib. 1. observ. 21.* Melancholici non diutius curantur, quam humectantur; unde & pulsat, item poma dulcia, mlti convenient melancholicis. Nec negligendus haustus Vinigenae; quod Vinum optime exhilarat Melancholicos; licet etiam motus corporis & exercitiorum exercitio, quantum possibile, promovenda.

Quod res utriusque istam materiam medicum hie locis in servientem: Radix euliprande melancholicum rectè à **PACELSO** dicitur consistere in Anomima, cuius praeparata sunt variis, imprimis Vomitoria Antimonia, & hinc Remedia quodam ejus per inferiora purgantia, sunt optima. Vomitoria jam alia nota sunt. In specie hie observandum est, eodem in paulo majori & superdupla vel tripla doli esse usurpanda, si aliquid agere debeat, ut rectè observatum in **BARTHOLINI** *lib. 1. med. hyst. lib. 1. cap. 248.* quod melancholici ordinario doli non moventur, sed saltem per inferiora moventur, minus per superiora, dum per inadvertentiam Animi & obedia fortiter spiritus animales in Cerebro & reliquis locis non solum percipere alterationem Certè nonnisi quodam obest eavi, quod artum Emulsiu Myrsin, cuius grana in vel li, ad iv, alia dantur, in hypochondriacis & Melancholicis à gran. vi. ad viii, imò ad xvii, aut in forma liquida typus Empiricus Salis à drachm. vi. ad unc. i. propinatus fuerit. Et hanc laet Aegri longe commodius etiam ac facilius perierunt Vomitoria paulo fortiora, quam alii; quin subinde repetenda sunt: Sic aliquando puerperae, post 14 dies à partu delirio Melancholico laborant, ad grana vi. propinavi, & tamen indocile vomitum experta est; Inde similiter studiosè quidam melancholico exhibui syrupi emetici unc. 4. qui tamen nullam hinc

se est motiorem. Ideo Vomitoria in maiori doli propinquantur. Praestat tamen prima vice ordinariam doli propinare, ut os huius operatioque parca vel nulla, concludere possit Medicus, in quantum augmentanda doli. Et in specie *Phlegmatis* commendat PARACELUS quoniam Florum elegantem preparationem edidit in FINCKII *Emphyria*, *Dysmenstris* Mercurialis de Melancholia, tanquam appropriatissimum ad curandos Melancholicos Remedium. Alius pro Vomitorio sit *Aurum Vis* seu precipitatum Mercurii cum *Auro simpliciter* *Reguli*, item *Infusum Mercurii* quod repugnat interitum coarctat. *Sapa Phlegmatis* *Sibi* ex melle & Mercurio. Vix est etiam egregia item *Syrupus emulans* ad huc, & cetera. Magni enim momenti sunt Vomitoria, & ut plurimum ab horum usu miscuntur. Egit, Aliquando quidam Melancholicos propinare coactus sui.

℞. Aque fumar. 3j.
Quam. Ann. in Vina solut. 3i. ad 3℔.
℞. Emul. concors. 3℔.
℞. Emul. sulphurat. 3℔.
℞. Trach. Alband. an. gal.
℞. Refus. simpl. 3i.
Misc. pro potione.

Cujus una vice sumpti alii Ager ter vel quater offensa commodè per Vomitionem evacuat, & his per Aluum laxatis cum purgatione.

Par ratio est Purgationem, quam sine addito stimulo salino, praeteritum tartareo, in ordinaria doli non operatur, quin huc potius ordinariam augmentanda venit.

Inter Purgantia mineralia eminent *antimonialis*. Nam Antimonium peculiare Alsiapharmacum debellans melancholicam videtur; unde ex antimonialibus per inferiora purgantibus eminet Mercurius Vix per sal tartari cicuratus, aut melleis aliis modis parabilis, est admodum conveniens; Sive enim eductio vi ametica egregie per inferiora purgat. Inter Purgantia vero imprimis sunt *helleborus* & *helleborus*, qui non tam promptè laxationem simpliciter, quam propter vim alterativam specificam in affectibus melancholicis, & in Delirio Melancholicis conducunt. D. MICHAELIS refert Exemplum Deliracis, ex quo Demon locutus, purgari per helleborum; unde nidus fuerit destructus, & eodem oportuerit. In Mado vero contumacior & Mania Helleborus albus, (de quo erat) in Melanchollis vero reliquis helleborus niger, palmam obtinet; nam propter vim laxativam simul habet alterativam, Melanchollis convenientem vid. VELSCHIIUS *Recepta* 3. pag. 11. Unde extractum cum phlegmate Virgilio spiritibus paratum, & exinde paratur pilula cum Antimonio per inferiora purgante, hoc modo conveniunt.

℞. Extr. helleb. nigr. 3℔.
Trach. Alband. gr. ii.
Antimonii Vis per Infus. purg.
gr. v. (pro varietate tamen preparationis variat doli)
Cum 2℔. martis, vel Tridiana tartari 5. pilula.

D. 5.
Pilulae purgantes.
Vel, quod melius, cum *Aqua angellidis* & *flor. hyssop.* potiuscula, dulcoranda cum *Syrupo de Pomis laxative*, & ita propinanda.

D. 5.
Pota Purgantia.
Extractum trochiscorum Albandi hic adhibetur pro stimulo, ut corrigat simul Viscidum praeternaturali, quod, ut in omnibus chronicis morbis, ita & melancholicis Pathematibus subiectum causis materialibus simul peccare observatur. De usu Extracti coheretidos & trochiscorum Albandi, vid. M. A. N. C. *Ann. p. observat. 102.*

℞. Extr. helleb. nigr. 3℔.
Martis cum Infus. purg. gr. xii.
Trach. Alband. gr. ii.
Cum 2℔. fumar. 5. pilulae.
D. 5. ut supra.

℞. Extr. helleb. nigr.
Mercurii dulc. an. 3℔.
Mel. jalapp. gr. vi.
Cum Quamvis ammon. in aet. sol. 5. pilulae.
D. 5. ut supra.

℞. Aqua menth. 3℔.
Extr. martis liquid. 3℔.
Melleb. nigr. 3℔.

Trach. Alband. gr. i.
Syr. de pom. ros. Infus. 3℔.
M. 5.
Pota purgantia.

℞. Aqua menth. 3℔.
Quam. ammoniac. aet. sol. 3℔. vel 3℔.
Tartari vitriol. 3℔.
Extr. trach. Alband. gr. i.
Syr. de pom. Ros. 3℔.
M. 5. ut ant.

℞. Aqua menth. 3℔.
Extr. helleb. nigr. gr. xv.
Trach. Alband. gr. i.
Quam. sulphurat. gr. ii.
Syr. Refus. 3℔.
M. 5. ut ant.

Vel Radix Hellebori nigri cum Folis Senecio includuntur in Aqua Florum Hyperici & Angellidis ruber, vel in Vino, acuantur cum Sale Tartari; & quor calidius appropriatum, & egregium erit Purgans Melancholicum in principio ad Deliria; c. g.

℞. Flor. senec. flos Hyper. 3℔. ad 3℔.
Rad. Polypod. 3℔. ad 3℔.
Helleb. nigr. 3℔. ad 3℔.
Sol. Tartari 3℔. ad 3℔. vel Crem. Tartari 3℔.
ad 3℔.

Stent in Infusione per noctem in loco calido cum 1. q. *Aqua simpliciter*, vel *Angellidis*, *Florum Hyperici*, & c. aut *Extr. Lactis depurati*; mane, siccis una aut altera ebullitione, coquantur.
Colat. 3℔. addo
Aqua Cinnamon. 3℔.
Syr. de pom. 3℔. vel 3℔. ad 3℔.
M. 5.

Pota Purgantia pro una vice.
Item possunt fieri Modis Vini infundendi ex Appropriatis ad imitationem HARTMANNI cap. 3. §. 7. Vel

℞. Pessal. min. ros. 3℔.
℞. Sol. senec. flos Hyper. 3℔.
Cinnamon. 3℔.
Caryophyll. 3℔.
Crem. Tartari 3℔.

Concus includatur Nodulo, & infundantur in Aqua simpliciter illi, sicut per noctem in digestionem. Convenit etiam Vinum Helleborum *Quercetani*, quod videt. in pharmacop. Est conveniensissimum laxativum melancholicorum. Item Tartarus vitriolatus ad gram. iij. vel v. propinatus est etiam conveniens. Purgandi modus prolat in SCHREDERI *Pharmac.* vel cum stimulo blando aquatur.

℞. Quam. ammoniac. cum aet. sol. gr. v.
Tartari vitriol. gr. ii.
Extr. alor. quum. gr. ii.
Cum 2℔. Quam. Ann. 5. pilulae.

D. 5.
Pilulae purgantes.
Post helleborum sunt imprimis *Senecio*, eodem tamen usquam sine stimulo tartaro praemixtione; c. g.

℞. Pessal. min. concors. 3℔.
Coqa. in 1. q. Aqua.
Calcevia 3℔. infunde.
Sol. senec. flos Hyper. 3℔.
Cinnamon. 3℔.
Caryophyll. 3℔.
Crem. Tartari 3℔.

Stent in loco calido per noctem Vaso probe clauso, mane coquantur.

D. 5.
Pota laxativa.
Pota 3℔. vel iv. & Alvi blandi laxatur.
Loco horum conveniunt etiam pro scopo Laxativo Melleis pilularum de ammoniaco *Quercetani*, Massa pilularum Tartaricam *Quercetani*, Massa pilularum de Fumaria, item, quod rarius fit, de Lapide Lunali, & extractum melampogon *Quercetani*.

Purgantibus & Vomitoriis semper permittantur digestioe *abstergeant Acidum*, imprimis Mercurialis c. g.

℞. Mercurii martis ros. pur.
Tartari sol. Tartari an. p. 100.
Terantur in mortario lapideo, sub tritura liquefite, hinc blando calore extrahatur, & iterum teratur.

Doli

Dosis ʒl.
Vel Cremor Tartari & Vitrioli martis solvantur in Aqua fervida, & in crystallis flavolentibus coagulantur. Item convenit Tinctura Vitrioli Martis Zouffleri, Essentia Martis liquida, vel Liqueur martis solaris, vel pulvis ex Cremore Tartari & Sale Tartari: Vel

ʒl. Lapis. cancr. ʒss.

Corall. rub. ʒss.

Crem. martis alterat. an. ʒss.

M. l. pulvis.

div. in 2. part. 5.

Pulvis digestivus.

Vel

ʒl. Matr. perles. ʒss. ʒss. vel Lapis. cancr.

ʒss.

Arca. ʒss. ʒss.

Salis afflicti. ʒss.

M. l. pulvis.

div. in 2. part.

D. 5. ut ante.

Vel

ʒl. Sal. Ammoniac.

ʒss. ʒss.

Lapis. cancr. ʒss. ʒss. ʒss.

ʒss.

Lend. ʒss. ʒss. ʒss.

M. l. pulvis pro duabus dosibus.

D. 5.

Pulvis Digestivus pro duabus dosibus.

Vel convenit potio digestiva in *Idea Formular. Claf.*

ʒss. ʒss.

Quoad Remedia alterantia, ea vel respiciunt Acidum coagendum, vel *Crasp sanguinis* emendandum, & per Urinam patibundam, & quasi eundem Malum hypochondriacum. Unde et simplicibus speciebus conveniunt omnia ea, que in malis hypochondriacis, & melancholicis hypochondriaci usurpantur quibus addenda simul *phlegmatica antiphlogistica*. Et quidem Acidum corrigunt *Martialis, Sarsaparilla, crystallina*, aliique Acidum absorbentia quibus addenda est tinctura Lani vera. Sanguinem alterant, & per urinam mundificant *Tartarus*, tam fixa, quam Volatilis urinosi, alias contra malum hypochondriacum utilis. Quibus tamen in specie vegetabilia temperata, alias *medicinalia dicta*, Veteribus cea specifica contra Affectus melancholicos laudant, item *phlegmatica* quibus sedulo addenda sunt. Talia revera temperando specifice acidum in melancholicis saporem operantur, sicutque *Fumarica, Anagallis, Myrsicica, Berraga, Angellina, Foma Julia*, & ceteris *Berberis*, quae cea alterantur specifice ab omnibus praedictis laudantur, *Florus Tomica*, & ceteris *Crocus*, & *Capparis*, quae immediate agunt in spiritibus, & eorundem dyctisiam alterant.

Martialis quoque attinet, & convenit horum usus pro scopo alterandi in curis curae, & inprimis infusum martis cum succo pomorum boriderrhorum, quod largitur propinatum cum specifice, item fixa extrahum martis cum succo Pomorum (Pomorum succus cum martis saturat, & non fermentat, sed liquor nigrescit, & perquam diu persistit). Porro optime *Crocus Martis* aperitivi, non sacurati, item tinctura *Martis dyphetici*, Essentia martis liquida, Tinctura Vitrioli Martis Zouffleri, Liqueur martis solaris a gutt. 32. ad 222. mass. pulvis eademque Hartmanni, & similia, inter Alterantia in delirio melancholicis primatum ducunt, & optime conveniunt. Passunt etiam hoc *Acidula* Melancholicis optime, sic GABELCHOVERUS *Croatica 2. Corat*, 69. refert mulierem melancholicam hypochondriaci gravissime laborantem, per porum Acidulam curam questam, sed quae ex Balneo coctum pessime habuit & Sicci etiam Theriac melancholicis maxime nocent, cons. BRUNEMANNUS *Conf. 2. de melanchol. hypochondr.* (O)

Pu haec quoque excellit *Sarsaparilla*, & eius imprimis saccharum, quod frequenter usurpatur dos ʒl. egregium, & specifice est in melancholicis imprimis hypochondriaci compendenda, & ex hoc ipso parata tinctura cum Vitrioli martis, alias tinctura Anaphalica dicta. Loco huius etiam *Glycyll* m. pro Saturni cum Spiritu Natri, Aceto aceto parata specifice sunt in mania, & reliquis melancholicis. Loco harum, vel solum saccharum Saturni singulariter convenit, quo ipso monachis quondam Italiae quosdam maniacos, & melancholicos curavit, propinando quod

tidie: Sane juvenem philistum novi, per solum, & frequentiore saturo sacchari usum a melancholia gravipochondriaci curatum, Metas, quod heriles reddas, et inanias.

Cognata sunt martialibus *Corallia rubra*, vel cruda, vel quoscunque ea his parata, non solum quod acidum simpliciter desinant, sed & quod sulphur aeternum contra Tristitiam, Anxietatem, Melancholiam, & deliria, appropriatum sit: unde tam in substantia propinari possunt, quam in specie eorundem Tinctura vera, quae praemissis niterfallibus, singulariter quod obnoct in Delirio Melancholicis, imprimis si redocantur ad statum volatilitatis. Sed quia gustandi Tincturae sunt rari, usqueper loco harum studiura, corallium cum spiritibus Liguliferas parata, item cum Spiritu Cordis Cervi, addita Essentia ambræ. Egregium enim Remedium est Tinctura Corallium cum Spiritu Cordis cervi in triflita, Anxietatibus Cordis, huiusque palpitatio, aliisque Angustis Melancholicis, ob sulphur, simul etiam egregie ad phantasmata Melancholica dispellenda confert; ex gr.

ʒl. Tinctura corall. cum Spiritu Cord. Cervi, vel sarsapar. ʒss.

ʒss.

Crocus an. ʒss.

M. 5.

Singularis Tinctura Corallium.

Vel *Essentia Fumarica* multa cum tinctura Corallium anticorbutica est egregia.

Ad Lunaria spectat Tinctura Lana vera, non coerulea, quae omnia est impossibilis, & tantum est Tinctura Venere cum Luna impragnata. Sine Venere enim Tinctura Lana colorem coeruleum nunquam repraesentat: sed Lana purissima aliquoties cum tartaro optime purificatur: sit emiger: hinc Tinctura ex rubro obtinet coloris (vid. *ART. HOLLIN. Altr. Med. Necessit. Volam.* 1.) in melancholicis deliria praemissis praestantissimum esse appropriatum Alterativum est optime: vel harum loco Magisterium duntaxat, ob id a quibusdam, Germ. *das Nerven pulver diltum*, sed ut ROLFINKKI *Cyrmie, sub titulo Luna*: Facit, quod restituitur beneficio huius Medicationis. Potest cum aliis absorbentibus misceri, v. g. Corallia tubus praeparat, alias ingratis habet saporem, Vomitum, & nauseam excitat. Item *Aqua Capillata*, in qua extinguitur Lani cum sulphure calcinata, est agenda eadem ad omnia allevatione, in Affectibus melancholicis praestant est.

Maxime quoque a quibusdam laudatur *Lapis lazuli*, tamquam singulare Remedium ad Affectus Melancholicos, cum in forma pulveris ad imitationem HARTMANNI propinatum, quod sub forma Tincturae imaginatur cum spiritibus Vini, & spiritu Urinae. Verum Lapis hoc sane est Concretum Heteromorphosum, participat item de Lana, & Venere, node in quibusdam non raro praeparatur facit Vomitus. Ratione ergo Lunae Affectus Melancholicos succurit, unde patet tui, ut elicatur saltem in Lunaria, reliqua substantia Venerea, & pro usum soletur; sic enim habebit appropriatum specifice, alioquin causam peccatum. Dosis a guttis xii. ad x. Mixtur commode cum essentia sanguinis composita, hoc modo

ʒl. Essentia Angell. comp. ʒss.

Tinctura lap. Lazuli ʒss.

M. 5.

Essentia Cephalica, & Splenetica,

Dosis eo vel ʒss. gutt.

Ratione huius Lapidis Confessionem Alchemis optime convenire ad melancholicum, praemissis Medicamentis hypochondriaci, dicunt, maxima tamen vis dependet ab *Ambra*, quae consonat melancholicis, hinc etiam usurpari potest Essentia Ambrae.

Iusta haec inter Alterantia appropriata eminet speciatim *Aromata duplicem Myrsicica*, quod est egregium in omnibus deliriis Melancholicis, & ubi frequenter usum Medicamentum & hinc quoque Nitrum Antimoniatum in specie cum Camphora.

Insiper ex *Argos regnabili* quidam Tempore afferunt. Prae ceteris *Tartarus*, & *Tartarus* quilibet prout optima, live pro scopo digestivo Humorum in primis vis usurpant, live pro scopo alterativi, & diuretico & hinc Cremor tartari, tartarus vitriolatus, Cremor Tartari, mistus cum salibus aliis laxativis, in specie cum Sale Abiathu,

(O) Ad Deliria Melancholica curantem, neq. tam Balnea Acidularum, & Aquarum Theriacalium prodesse videtur, quam Balnea Aquae Dulcis ad longum tempus adhibita: quoniam quae & repetita Sanguinis transmutatio huius generis deliria parit, quam alia Remedia se hanc sequuntur obviemus.

Ablinthii, cum Sale Fraxini, item cum ana Salis Tartari, est egregium Digestivum in affectibus Melancholicis. Imprimis conveniunt *Pulsilla*, quæ vi diuretica, & Aëidi destrutura Melancholicos juvant: Talia sunt imprimis spiræus, & sal Tartari volatile, Tinctura Tartari, aut etiam spiritus Vini tartarizatus. Paratur spiritus Tartari volatilissimus ex Tartaro diversissimo, & optimus est in affectibus Melancholicis. His præter spiritum Carminativum ea Nitro, Tartaro, spiritus Vini, qui est convenientissimus, dum in Parasymplo Hypochondriaco, & Melancholico, gravior Mœlitia, Angustia, & Anæsthesia Cordis, Palpitationes ejus, &c. gravissimæ arguet; in tali casu, præter Corallia, spiritus hic Carminativus est optimus à ʒi. ad ʒi. propinatus, nunc solitarius, nunc spiritus Sals Ammoniaci sociatus; in cum locum Tinctura Nephritica composita, seu Clystus utrinque subtiliter potest. Pertinet hæc etiam *Liquor Tartari diaphoreticus cum Sacris Da. D. Rhaphidii*, qui ita se habet:

ʒi. Sac. express. Nephrit. ʒiv.
Cochineæ
Raphani mar.
Nasturtij aquat.
horrenti, an. ʒi.

Diluis addit
Spir. Tartari probè rellif. ʒi.

Missa hæc omnia, & digesta aliquandiu, destillat ali. quoties lento igne in Maris Balneo.

Dosis à ʒi. ad ʒi. optimè confertur pro scopo alterandi in quacunque Melancholia, præsertim Hypochondriaca, non minus, quam in aliis Melancholicis speciebus; sic enim vel per Sudorem, vel Urinam operatur.

Remedia ex *Borragine, Buglossa, Fumaria*, & similibus, quæcumque eorum Alterantia appropriata per se nota sunt, & speciatim in largiori dosi pro Vehiculo reliquorum inferunt. In specie tamen *Fumaria* præ cæteris est utilis, & omnia ea Fumaria posita Remedia; Unde Essentia Fumariæ composita nulla pro scopo alterandi optimè convenit, si miscetur cum Silencia, seu Tinctura Martis Liquida; æ. gr.

ʒi. Ess. Fumar. comp. ʒi.
Tinctura Martis liquid. ʒi.
Essent. Croci ʒi.

M. D. S.

Essentia Cephalica, & Splenetica, pro una dosi ʒo. guttæ. Utiatur rer in die. Vel

ʒi. Ess. Martis liquid. ʒi.
Fumar. comp.
Croci an. ʒi.

Camph. gr. v.

M. S. ut antè.

Dos. ʒo. vel 40. guttæ.

Vel in forma Noduli:

ʒi. Herb. Scutellendr. M. ii.
Fumar. M. ii.

Flor. Borrag.

Bugloss. an. M. i.

Tonic.

Violar. an. M. ʒ.

Cori. Tamar.

Fraxini an. ʒi.

Rad. Polypod. vel Enula.

Limat. Martis an. ʒi.

Cianam. ʒi.

Incisa, & comula includ. Nodulos

D. S.

Nodulus ad Vinum.

Post Fumariam succus *Pomorum Borboraginarum* deputatus, vel etiam omnia ex *Pomis* parata Remedia, verbi gratia Syrupus de *Pomis*, Extractum Martis cum succo *Pomorum* diutius continuandum, vel solitariis, vel camphoratum, interponendo interdum usum spiritus Sals Ammoniaci; Extractum granorum *Chermes* cum succo *Pomorum* ea HARTMANNO, & similia, item Extractum, & Syrupus de succo *Borraginis*, item *Buglossa*, à Veteribus laudantur in maiori dosi, & crebrius usurpantur, Essentia Splenetica, Medicamenta quæcumque ea Lupulo, & similia. Apud RHODIUM *Cretaria* i. observ. 44. Jusculis Chichoreis in prima mensa hæssia Melancholia Hypochondriaca profugata sunt. Sed hæc sunt clara ex eurs. Mali Hypochondriaci. Eminent quoque *Anagallis fæva phænicea*, quæ communiter dicitur German. *Vernaußte Kraut*, & hic *Hypericon*: Hæc enim duo mirè conferunt contra phantasmata melancholica, sive tantam coquantur in Aqua ap-

propriata, & propinentur, sive hæc Essentia & Tinctura composita: quo pertinet Tinctura *Hyperici Myrsinici*, quæ ad Deliria Melancholica, & Mania ab eorum commendatur, quotidie bis, vel ter usurpata; item Essentia *Anagallidis composita D. Michaelis*, quæ ad ʒo. vel 60. guttas bis in die sumitur: Tinctura *Hyperici Myrsinici* datur pro dosi ad aliquot Cochleas. *Saryrium*, equique *Conserva*, item Essentia *Satyræ* magnam vim habet *Morores*, & Tristitias pellendi, inquit Autores, sed obvietur in usu, ne sit Melancholia Erotica, seu ex Amore, utpote quam potius aggravat. Essentia, & Conserva cum alius missa conducit. *Helianthum* miram vim ad spiritus excitandos habere RONDELETIUM præm. lib. 1. cap. 9. dicit. *Crocus* præ reliquis singulare quid obinet, & optimus est simplex ad affectus Melancholicos cum, & sine Delirio displicendos; nam insigniter convenit ad volatilisandos, & subtilisandos spiritus, utut oculata narcotica vi configit; hinc HARTMANNUS in *Præci Chymicæ*, merito commendat Essentiam Croci cum Aqua Vitæ destillata paratam, cui tamen meritè præfert LINDANUS Croci Essentiam cum Aqua Betulæ, mense Martio ea succulsi profluente paratam, utpote cum dicta Aqua Betulæ per se sit egregia pro scopo alterandi humorum, & diuretico in Melancholis, sive sit Aqua destillata Betulæ, sive per fermentationem purificata, & ita propinata. Essentia Croci summa Cordis latet à PARACELSO vocatur, cum simul habeat vim sudoriferam, & pro scopo assidendi spiritus mirè convenit unde etiam LINDANUS merito etiam Syrupum ex succo *Borraginis*, cui *Crocus* additus sit, in præsentibus affectibus singulariter commendat. Siquidem, & exterè *Crocus* in Nodulo circa fœrobolicum Cordis appensus egregie convenit ad Tristitiam, Mœlitiæ, & angorem Melancholicorum curandum, uti BORELLUS *Croc. 2. observ. 99.* de Muliere Melancholica continuè missa stante gelatione Croci inper Cor curata, refert. Melius tamen est, quod soles facere, ut *Crocus* hinc addatur *Camphora*, & appendatur dicta loco, quia est optima. STOECKERUS in *Præci* insigniter commendat in Affectibus Melancholicis hæc Aquam destillatam.

ʒi. Flor. Auror.
Borrag.
Bugloss. an. ʒiv.
Croci ʒi.
Mal. Caram. ʒiv.
Vin. albi gener. ʒi.

Missa digerantur per 15. dies, & destillentur.

Aqua propinetur ad ʒi. quam suber asservandam tanquam papillam Oculi. Sed an tantæ sit efficacia, nescio, & iterò dubito. Datur, uti dico, in affectibus Melancholicis ad ʒi. subinde repetendo.

Crocus non cedit *Camphora*, & ejus Essentia, quæ uti singularissima est in Mania, & omnium optimè conducit: ita etiam in reliquis Deliriorum Melancholicorum speciebus, tam inter eos cum Saccharo Saturati, vel Arcano duplicato permixta, quæ cum Croci dr. i. Noduli forma suspensa, & aliquandiu gelata. Exemplum novi in quodam Amico, qui Terroribus subinde affligitur, & hoc ipso Amuleto egregie levatur. In forma quoque *Ephengæ* externè Capiti applicari potest, quando delirii conquiescentur de perturbatione Capitis, v. g. hoc modo:

ʒi. Aqua flor. Sambor.
Hyper. an. ʒi. ʒ.

adde

Camph. gr. vi. vel ix.

M. i. Epithema. S.

Epithema Esacernum.

Quod applicatur Fronti, & Temporibus, & bene confere. Internè non adhibeatur, nisi præmissis præmittendis, exempli gratia.

ʒi. Pulv. Cochleæ Martis dr. i.
Corall. rub. præp. dr. ʒ.
Camph. gr. xv. M.
div. in 3. part. equal.

D. S.

Singularis Pulvis Cephalicus, & Spleneticus.

Quarum una capiatur omni mane.

ʒi. Arcan. dupl. Myri. gr. xxiiv. vel dr. ʒ.

Corall. rub. præp. vel Mag. Corall. cum Succo

Citræ ʒi. vel gr. xxiiv.

Camph. gr. xv.

M. i. Pulvis pro duabus dosibus.

D. S. ut antè.

Vel

Vel

℞. Arcan. dupl. ℥℥.
Sacch. Saturat. gr. xlii. ad ℥i.
Camp. gr. vi. vel Land. op. gr. iv.
Misc. pro duabus dosibus.
D. S. ut supra.

Capiantur mane & vespere, repetantur aliquoties, in spe-
 cie vespere tempore Somni, nam Camphora Melancholicos
 disponit ad Somnum.

℞. Mag. Corall. cum Saes. Citri, vel Corall. rubr.
prop. gr. xlii. ad xv.
Sacch. Saturat. gr. xlii.
Camp. gr. iiii.
M. f. Pulvis.
D. S.

Pulvis vesperi fumendus.

Vel omnia Camphora addatur Land. opiat. gr. ii. vel
Extr. Croci gr. v.

℞. Sacch. Saturat. gr. v. vi. ad lx.
Land. opiat. gr. iiii.
Ol. diss. Camp. gutt. iiii.
M. f. Pulvis: S.
Pilulas ante Somnum fumende.

Capiantur tempore Somni.

℞. Extr. Martis cum Saes. Pom. ℥i. ad ℥℥.
Camp. gr. iiii. vel iiii.
M. f. Bolus pro una vice.
D. S.

Bolus vesperitius pro una vice.
 Vel

℞. Aquæ Borrag. ℥℥.
Arcan. dupl. ℥i.
Mag. Corall. cum Saes. Citri ℥℥.
Camp. gr. iiii.
Syr. Borrag. ℥℥.
M. S.

Potio vesperitina pro una vice.
 Vel

℞. Aquæ Anagall.
Borrag.
Flor. Hyperic. an. ℥i.
Arcan. dupl. ℥i.
Sacch. Saturat. ℥i.
Camp. gr. vi.
Syr. Borrag. crocat. ℥i.
M. S.

Potio Cephalica, & Splenetica coelestem fumenda.
 Capiat iodo Reger pro lubita.

℞. Aquæ Anagall.
Meliss. an. ℥℥.
Arcan. dupl. ℥i.
Syr. Dia-Saturat. Myrs. ℥i.
Camp. gr. v.
Syr. Flor. Borrag. vel meliss. an. ℥℥.
M. S. ut antè. Vel

℞. Aquæ Anagall.
Flor. Hyperic.
Cordial. Her. Saxum. frig. an. ℥i.
Ess. Ess. Velsamar. compof. ℥i. vel iiii.
Croci ℥i.
Tiell. Corall. cum spir. Cord. Croc. ℥i.
Ess. Ambeg. gutt. vi. ad ℥i.
Camp. gr. vi. vel spiritus Vanie compof. ℥i.
Syr. de Cassil. vel Her. Tanici, vel Borrag. ℥i.
M. S.

Potio confortativa pro aliquot vicibus.

Subinde usurpanda Cochli. vel etiam li.

Semper Camphora Medicamentis Alterantibus pro affe-
 ctibus melancholicis & mamacis addenda venit; Campho-
 ra enim immediatè spirituum Animalium vititatem Cras-
 siores alterat; cumque tota nil aliud sit, quam Sal oleosum, hinc
 consequenter locubilis est spiritibus, interat & eartenò
 usurpata.

Interdum pro *Scopo Sudorifico* convenit præter Mithram
 simplicem imprimis spiritus Salis Ammoniac volatilis, qui ad
 Curam Mali hypochondriaci, & melancholicæ est optimus,
 imprimis si miscetur cum spiritus Carminativi an; vel
 pro *Scopo Diuresico*.

℞. Spir. sal. ammoniac ℥i.
Lign. Torref. Torr. ℥i. ad ℥℥.
M. S.
Essentia Splenem aperiens.
Dosis gutt. xxx. ad l.

Hic Eliæ Proprietatis *Suavis* cum Succo paratur,
 Tinctura Coralliorum cum spiritu Cordis Cervi, & spiritus
 & Sal volatile, pro circumstantiarum ratione etiam ac-
 cendenda sunt.

Ubi Phlogos frequentiores adfuit, ac *Melancholicæ* vap-
 item ubi humorum alterationes, & per unam evacuationem
 magis indigemus, Arcanum duplicem, nunc solitariam,
 nunc aliis sociatam, est optimum. Sacch. hujus usu A-
 grypian melancholicis nonnulli emendari, fuit observa-
 tam.

Denique pro *Scopo Analeptico* una cum laudabili *Lappa*,
 convenit Essentia Melissæ, Essentia Corticum Citri, vel
 Corticum Aurantium, Elixir Citri, Tinctura Solis cum
 Oleo Cinnamon Myrsicæ, Tinctura Coralliorum, Es-
 sentia Helenii, & similes. Uturari etiam possit in Paroxys-
 mo melancholico Opuscula Animalis salubria TIMÆI *van Gal-*
drachæ, quam mire commendat in Paroxysmo, Compositio
 est hæc non inelegans.

℞. Conf. de Hyacinth. ℥i.
Albomari ℥℥.
Lap. Bazar. ℥i.
Emeragd. prop. ℥i.
Corn. alci. fæ. ignis ℥i.
Mag. Sarcin. albi
Perlar.
Corall. rubr.
Spiritus Rosar.
Rubi idci.
Lil. convall. an. gutt. xlii.
Syr. Flor. Pæ. q. f.
M. f. Electuarium.

Assumatur in Aquas appropriata & ℥℥. ad ℥℥.
 In *Diapira Serum Lactis* tam simplicia quam medicatum, &
 aliis Lacticiis datur, nisi quid obstat, item Remedia a
 Pando, imprimis Borsdorfianis, Vinum ex Passulis cum
 Succo Pomorum Borsdorfianorum fermentatis, & deinceps
 omnia Alimenta rose nutritio virgida, minus squalida, &
 minus acida, conveniunt, ut jam *suprà* notavimus. Nam lo-
 ne edunt melancholici; si non appetant, malum figum est.
 In specie Vinum generosum præmissis præmittendis mirè con-
 venit melancholicis, si præmissis morore quasi succu-
 bant, utpote quod spiritus excitat, Lactirum quandoque
 acriat, Animum exhilarat, & simul amorem induit, mo-
 do non in nimis dosi capiat, ne Phlogos excitetur, &
 quandoque hæc ergent, ad illo abstinendum. Egregium Vin-
 um in affectibus melancholicis videb. approbatum a GI-
 RELCHOVERO *remor. 3. curat. 18. in Schol. & THO-*
NERUS lib. 2. observ. 3. refert, quod quidam melancholici
in summo gradu haustu Vini tandem revocatus, & in
curatus fuerit.

Utres Exemplis fiat clarior:
Sacchari melancholicis accipiebatur primò syrupum Emeti-
 cum duabus vicibus, hinc liquoris Martis solaris ℥℥. dosi
 ad xxx. guttas omni mane;
℞. Sacch. Saturat. ℥i.
Land. opiat.
Camp. an. gr. viii.
Miscabantur pro a. dosibus vesperitinis.
Item
℞. Arcan. dupl. ℥i.
Corall. rub. prop. ℥i.
Camp. ℥℥.
Misc. pro a. dosibus vesperitinis.
 Item interposito blando Laxativo ex Turtaro vitreolo
 cum Scammonio preparato, & Trochiscis Alkandali, com-
 munevante meridie Solutionem Martis cum succo Pua-
 rum: & meridie verò

℞. Arcan. dupl. ℥i.
Camp. gr. xv.
Sacch. Saturat. ℥i. ad ℥℥.
Miscendo pro a. dosibus.

Finem Curæ tandem spiritus Salis Ammoniac aliquantū
 continuatū abolvere solet.

Alia in melancholicis, qui sibi violentam manum injecerunt,
 simili ferè modo curavi.

Primò ordinavi jam dios sex Pulveres ex Arcano dupli-
 cato, Corallis rubris preparatis, & Camphora; de quibus
 quoridie binos doses capiebatur, mane & vespere. Hinc
 ubi syrupi Emetici ℥i. cum levamine: sed manebat animus,
 & multum hiebat. Hinc usurpabat Liquorem Martis sol-
 is, dosi xx. ad xxx. guttas omni mane; appetente vi-
 rodo.

℞. Sacch. Saturat. ℥i.

Land. Opiat. gr. ii.

Camph. gr. ii.

Mile. p. n. d. sub introitu lecti.

Post tres dies repeti Pomerium sequens:

℞. Tartari Emst. ℥i.

viriat. gr. viii.

Mile.

Assumebat cum egregio leuamino.

Post continuavit maniliqueorem Martis solaris, & à me-
ridie. olo illos Pulveres Sacerdoti Melancholico præscrip-
tos, ex Atrato duplicato, Saccharo Saturni, & Campho-
ra; & sic continuando & Alivum forçando apertam, res-
tituimus suis.

Puerpera, cujus Mater in Puerperio lapsa delira Me-
lancholica fuerat, cum omnia in Partu recte se habu-
issent, philosophis decimo quarto die Puerperii hebat Me-
lancholica, & hinc tantummodo Mania. Hic verò cu-
rata fuit: Applicabatur Clyster Carminans: hinc

℞. Sals. Martis cum Saco Fem. Sui.

℞. Cret. ℥i.

Mile.

Dosis 40. vel 50. gutt.

Continuavit per eisdem: Sed cum die quarto foret he-
bit Mania.

℞. Tartari Emst. Myof. gr. vi.

Dabam mane; quo, bene operante placida reddebatur;
hinc

℞. Atrato, diluat. gr. xv.

Sals. Martis gr. v.

Camph. gr. ii.

Mileando pro Pulvere.

Capiebat hora quinta respositina. Sub introitu verò lecti
periculis suis.

℞. Sals. Tartari gr. v.

Land. Opiat. gr. ii.

℞. d. d. Camph. & f. pro Pillulis.

Quorum usu cum multo melius habuisset, continebat
adhuc Effluvia Martinem superiorem. Sed cum aliquot
diebus superveniret Pethemate quidam Hyperia,
injiciebat idem Clyster Carminans, & assumebat cocticia-
tum sequentem Elixirem:

℞. Aqua Mellis.

Rosat. cum Caffir.

Ment. ana ℥i.

Spiritus Sol. Ammoniaci ℥i.

Cochlear. ℥i.

Camph. gr. v.

℞. de Corr. Aurant. ℥i.

M. F. Poelo.

Cum verò Alivus non bene responderet, purgabatur leni-
ter per decoctum Senam cum Cremore Tartari: hinc conti-
nuabatur eodem soluto Martis; sed cum spiritus Vini cam-
phoratus nulla. Cum hinc optimè se haberet, & saltem de
Capitis perturbatione adhuc conquereretur, præscribebam
sequens Epithema:

℞. Aqua Flor. Sambur.

Myrris. ana ℥i.

Camph. gr. vi.

Mileando pro Epithemate.

Aliquoties Fronti applicando, & ita convalesce.

Extraxi, præter supra dictum Epithema Camphoratum,
& Nodulum ex Camphora & Croco, Emplastrum ex Ta-
camahaca Capiti rari applicatum commendatur ab HOE-
CHSTEDTERO Dec. q. pagin. 319. Alii

℞. Tacamahac.

Gum. Carana.

Anima ana p. m.

Ex his liquescent lacum emplastrum simili modo ap-
plicandum.

Sed non opus est: sufficit Tacamahaca, que egregii usus
ad deliria Melancholica. D. SCHOLZIUS in M. A. N. C.
anno 3. Observat. 157. Species sequentes tanquam experienti-
as in Melancholia à Falu commendat:

℞. Res. Bora.

Viren.

Flor. Chamem.

Sals.

Sambur.

Rosmar.

Myrris. ana p. ii.

Sem. Fenu.

Nigell. frag.

Coriand. prop.

Tom. II.

Anethi ana ℥i.

Concisa grollo modo micantur & subigantur cum
Farina & Aqua, fiat lege Artis Fenu, qui reccilla
inferior cruita, parumque excavata modula, in
Mistre calide Capiti impolitur suis.

Quod si jandum sit Splenis vicium, præter Interora Sacra-
mentis, Emplastrum de dicrana splenis regionis applicatum
convenit.

Quod si Phlegmæ frequentiores adint, aut Caput nimia
influet, ita ut Mania metatur, observari Linum recoctum
cum Aceto subadum, plantis Pedum & Cervici applicatum,
nonnihil prodesse, renovando subigdo, nam fortiter adhe-
ret, ita ut vi avellendus sit.

MEMBRUM III.

De Mania.

Abolimus deliria Melancholica. Apparet verò adus
summas deliriorum Melancholicorum gradus, & magis
crudelis species, ex eo, quia Homines animo quasi in Bru-
ta transmutantur; effugit ista melancholia, que ab his
dicitur Genia, Latini Mania. Genia dicitur à Genes
demonstratio, quia tale est affectus Freni Delirium. Hinc
Maniacum quorum Febri corripere possit, quo concepti
Agri Melancholici cum Insensu ferre & audacia, depolito
amni pudore, & exuta quasi omni ratione instantium, non in
somnia, plane frenes redduntur, ita ut, quæcumque obiecta
agreduntur, eadem distinguant & lacerent, multa ab aliis
aguntur & faciunt, cum insigni furore insistant in alios
etiam in se ipsos, adeo ut quocumque Homines obviis
stantes verberantibus insistant, & impediunt gravissimis
contumeliis & conviciis eisdem lacerant, ita ut ob fugientem
& quocumque perperam audaciam, Catenis jubantur. Inter
vincendi & ardui incutendi sunt Agri, & huiusmodi fures
percedunt sanguine, quia & se, & sui defendunt, non
numquam rugiant sui suspensum, & haurienda peragunt.
Periculosissime vigilans, ita ut FERNELIUS referat, quon-
dam Maniacum per quatuordecim menses in maniacum fuisse.

In his deliriis Mania verò observanda sunt tres cæ-
cussum: nempe furor, robur, & frigoris tolerantia mira-
bilis. Inprimis considerabilis est furor, quo tales Agri
quocumque perperam agunt, qui tam suar insignt &
hinc apparent audacia non est plane aliique aliqui bice-
culose & aliique timore interno, imprimis erga cultor-
des suos. Nam si furios aut Maniaci aliquem metuentem
vel pavidum viderent, in eum audaces promptè irruunt, sed
si audacem & constantem quem vident, eundem formidant,
quo & si ab aliquo aliquando verberibus excepti fuerint
maniaci, eundem admodum metuent, & quocumque
tione possunt, fugiunt. Audacia huic, vel potius Temerari-
tati, conjunctum est insigne, & tantummodi stupendum in
maniacis robur, cum validissima ferramentis discurrant, &
disiciant, & quocumque obvia subter coactant & deva-
sant: Sic BENIVENIUS observat Nutricem maniacum,
que Dentibus quocumque obvia comminuit, & etiam validis-
sima diffregit. Conf. BARTHOLOMÆUS Crm. 3. hylar.
69. Hoc robur est stupendum: ut subinde robusti viri
unum maniacum non possint retinere. Quod ipsum tamen
non adeo proprium est solis maniacis, quia & interdum in
graviori febri quasi Phrenitici delirio observetur, quæ
exemplum refert PANAROLLUS. Fem. a. aliorum. Sed
ubi quidam Phrenitici in vigine Febri cancellis terrore
ac fieri essent, traxit, & pondera ingentia, facillime
elevavit, qui tamen trasulsi morbo (nempe Febri &
Phrenitidis) vigine adeo imbecillis fuit, ut vii surgere po-
tuit. Alias tamen in maniacis robur ordinario observa-
tur. A Phrenitide hinc maniaci distinguuntur, quod nulla
hie addit Febri prægressa, nullum signum, præter affectu
Capitis aut Cervicis. Cum Diemoniaci quidem subinde con-
funduntur: sed in hac serie ferre observantur, quod hi
plus per Vomitus Ferramenta, Crines, aliique inconfusa,
tolant rejicere, id quod saltem in Vesiculis contingere so-
let. Accedit histertium notat & consideratio dignum in
maniacis, insignis nempe frigoris, etiam intensissimi, toleran-
tia. Ut plurimum enim maniaci omnes velles lacerant,
& inde etiam in gelu hyerno ita jacet, aut per vias ambu-
lant, idque super membris nuda, aut solo induto amissa,
sine ulla Corporis exinde contrahenda læsione. Sic LINDA-
NUS refert, viddle se Amstelodami Gallum quendam Ma-

liiii

nacum

nascim in ergastulo, qui nudes in intensissimo frigore hybernico solo insulso amictus incoedebat; quamvis acmpe furore perduravit, qui accedente Paroxysmo Caput Antilix submittens, Aquam frigidissimam capite excipiens, levamen sentiebat. Quoniam etiam fuit exemplum FORESTI lib. 10. observat. 22. de Muliere Maniaca, quae in Hyeme nuda in lecto iacens, Corpus tamen habuit admodum calidum, et ubique torrida sudore perfusa. Hoc ipsum fuit partim ex statu Melle Sanguine, quae intus vitiose exarduit, partim verò ex eo, quod maniaci in furore constituti vim frigoris minus sentiunt atque percipiunt. Hoc ipsum tamen, nempe tolerantia frigoris, utriusque eundem adest in maniacis, non tamen semper, nec in omnibus observatur, sed tantum ut plurimum. Interdum enim observati fuerunt maniaci Vestibus coniecti, aut Vestes sub gelu hybernico postulantes, et de frigore conquecentes; quale exemplum RIVERIUS in observat. habet. Quo utiam facit observatio rarissima PLATERII lib. observat. pag. 11. de quodam manaco, qui hyeme, frigore intensissimo perierat, et mano congelatus inventus est. Interdum quidem, sed raro, conqueuntur de frigore; quod, si accidit, bonum signum est.

GAUSE.

Hic ita de Mania affectis praestibit, accedo ad causas. Quod ergo attinet causas maniae; arbitror deliria maniaci non differre radicaliter a reliquis melancholia, & delirium melancholicorum specibus, sed saltem circumstantiis quibusdam observabilibus, ob Graem spiritum Animalium plus minus laesam. Nam quod non differant in radice, patet, quod nonnunquam ambo haec inter se transmutantur, eam videamus, quod mania confusionalis et Cantus, simulque hilaritatis phaenomena, nonnunquam interceda habeat, & melancholicos fieri manicos, & melancholicos subinde manere, qui ante fuerant maniaci; quo imperium pertinet observatu dignissima observatio RIVERIO à FOMIO communicata 32. de mania gravissima post quolibet extrema remedia, nempe Arteriotomiam, perficite ita intro, quae tandem calitatione fuerit curata, ita tamen, ut per calitationem cessaret ista mania, & remaneret delirium melancholicum. Multum habet in recessu haec observatio. Conf. etiam LOSSIUS lib. 2. observat. 23. Sicuti eodem non raro melancholici moesti & tristes, aut alia deliri, interdum in manacos plane exacerbantur & transierunt: imò maniae Paroxysmi cum melancholico delirio alterare solent, hocque illius gradus tandem remissio videtur. Unde etiam mania, non sicut ac alia melancholici species, talem omnino remediis, eademque medendi methodo, curari solet, saltem quod in mania remedia in maiori dosi adhibeantur. Nempe, ut loquar LINDANUS, in melancholia Sanguis frigidus & siccus, in mania calidus & siccus, h. e. textura rala est sanguinis asperior, minusque succulenta nutritiva, ut utrobique dominetur acidum, sed mitius & fixius in melancholicis, aerius & subtilius in maniacis. Est nempe mania talis melancholici species, quae cum summa morositate & omnium obsequiorum tardio, adeoque facili iracundia, etque subinde intensius, coniuncta est: uti enim observantur melancholici cum Tristitia, uti dantur melancholici cum Rifu, cum Cantilenis, cum Amore; ita simili ratione datur melancholia cum intensa iracundia seu furore, quae est nostra mania. Hoc est sat clarius, consideremus saltem Hominem alias sanum & recta ratione utentem, summe tamen & admodum iracundum; aut saltem consideremus Ebrum ad iram provocatum; (nam quibusdam Ebellis in more positum esse, ut insigniter incandescant) in quibus sanguinis flatus & motus transigentiam febrem, & spirituum verò aëratam & impetum eorum sub Mania constitutionem ferè representant. In talicuius praesentia Ebelli, considerat adhaerere, & videlicet in his ipsis quandam maniam naturalem: Quae enim non aggregatur, & quae non perperant tales Ebelli? Mirandum, quanta audacia illustri haec, & omnia tentent, & quantum exeat subinde eorum Corpus. Similiter, si in melancholia ex quacunque causa, subinde ex irritatione externa, aut ex postu Astrorum, aut ex interna melle sanguine: aucta omnibus fermentatione, & tunc acido melancholico volatilitate magis affurgunt affectus iracundiae, perferendum habebitis maniacum. Nam omnis iracundus solet esse robustior, quam quando est animo pacato, & ratio inepta est regimini spirituum Animalium in Ebritate admodum ferocientiam. Ipsi Melancholici ordinarii sunt morosi, facillique ad iram provocari possunt; unde etiam melancholici facili ad verbera pronuntiant: quo facili fit, ut aucta in his morositate, & inde nata

iracundia, in maniam degenerent. Cum ergo in radice & essentia conveniant melancholia & mania, dum haec, sedato spirituum impetu & fervore, v. g. per calitationem, in melancholiam degenerent, illa vero concitato spirituum iam male constituto impetu in maniam affurgat; sequitur, differentiam harum proximè in spiritibus Animalibus eorumque constitutione & motu consistere: qui in constitutione melancholici quodam alterati, obscuriores & fixiores existunt, & quod ad acetosam naturam accedunt; accerimi, & Aquae fortis fere stygiae analogi quodammodo sunt in maniacis; ut pluribus hoc deducit WILLISIUS de Animae Brutorum Part. 2. cap. 23. quae acril volatili aciditate illorum extraordinaria illa caloris in totum Corpore insensibilis, & hinc stigeris tolerantia. Verum fuit in omni laeso & iracundo est quidam exultatio & agitatio extraordinaria melle sanguine, unde etiam totum eorum Corpus calore plus minus excolescit percipitur perfusum; ita in maniacis & ipsa melle sanguinea, unde generantur tales spiritus, crassa quidem & spissa, plus tamen solutio agitata, sed rapido circulo moventur, & à spirituum consuetu vehementiorem concipit Aëtem, quam naturaliter: id quod manifestatur partim per Pulsum, partim per respiracionem: Nam Pulsi in Maniacis sunt plures, frequentes, & satis magni, respiratio ipsa est frequens, alta, & satis magna. Ipse vero Sanguis V. excolescente emittitur, observatus fuit à LINDANO crassus, spissus, & intensus calidus, ita tamen inter, ut aramenti speciem retulerit. Et ita in maniacis melle sanguinea acido quidem vitioso abundante turget, volatilis si tamen & facilius mobilis, unde ioculino motu fermentativo intensius agitata simul plus solito vehementiorem concipit calorem, indeque Corpus calidum & Frigidius terribile redditur, quoniam etiam illud, ut iracundia; quibus ex spiritibus nonnulli velocius motu interea conciliatur.

Vulgo dicta GALENUM à Temperie Cerebri calida & fiera, seu mixta Bile, hoc est, melancholia adusta, dicitur maniam, quam RIVERIUS lib. 2. Prax. cap. 23. rejicit: Hanc autem atram Bilem ex Pathologici praecipuum aliud esse, quod vitiosum Acidum efferebendone exasperatum, & ac ita quodammodo volatilitatem & aeris redditum. Ad hoc enim vitium, fere admodum accit: Acute hinc atrabilarius a quo, & tunc inchoat excolescere & exulsi, vel fermentare veteribus dicitur: Unde etiam facillime melancholicis ac maniacis vitiosis Acor indulta effectientia exasperari & volatilitati potest, ut ita maiorem & intensiorem acquirat gradum, quem etiam atram Bilem appellant. Vid. WILLISIUS de Animae Brutorum lib. 2. cap. 23.

Causa ergo maniae cum delirio melancholici causa eadem est, scilicet Causa Proxima, quae formali, consistit in spiritibus Animalibus, quoad Graem hanc & motum plus minus vitiatum, & quasi acedum: Causa Proxima Materialis & Remota verò querenda est in Melle Sanguinea acida, ut vocant, atrabilaria, minus spiritusfcente, vicio primarum viarum, impuriis stomachi, intestini Duodeni, & Viscerum inferiorum in Hypochondria; unde cum melancholia in fundamentum convexit. Videtur, quae supra lib. 2. de causa melancholici dicta sunt: Spiritus Animalis quod astrueri; hi degenerant penitus à eorum seminali natura & sulphureo-Lino-volatili, cum ex sanguinis Dyscrasia quidam inquinati generentur ipsi spiritus Vitales & Animales quidem, subiles facis & agiles in suo genere, sed acres, & salini & quasi sulphureo-acidi, indeque nimis mobiles, & in motibus suis ordinariis minus coercibiles, hinc acrimonia sua binc inde penetrantes, & in continuo motu assidentes, rationes quorum maniaci semper irrequieti & inquieti sunt. Iidem sunt aciores & sulphureo-acidi, dum prorumpunt, seorsum quandam calorem in se dem excitant, ut exterrum frigus percipere non solent; quibus adiungitur simul aliqui Sanguinis Excolescentia. Quia etiam ipsi spiritus aciores ad partes delati & irruentes, iidem tam validum robur conciliant, ut sub motu partes quasi rigidae & semi-convulsae appareant, unde tantum robur obineant.

Causa Remota, ut dixi, haeret in Dyscrasia Melle Sanguineae. Hinc est, quod dicant, oriri ex constitutione atrabilari: unde in radice conveniunt Melancholia & Mania: Illa peccat vitiosum acidum in Hypochondria; haec idem, sed exasperatum, adeoque acius redditum. Causa igitur remota sunt ferè eadem, quae reliquorum melancholicorum, ita ut, quod caussa Internas reoribus, ad primas vias, & viscera Hypochondriaca, eorumque functiones, quae immediate sunt mediatae vitiaes, semper respectus habendus sit: V. g. Excessus Sanguinis solentis (supra), in specie Hemorrhoidum, Menstruum, Leuciorum, &c. in his, qui incli-

inclinant ad Habitu Melancholicum, uti Melancholiam, ita interdum etiam Maniam inducit, quod FORESTUS lib. 10. observat. 24. testatur: Sic et Hemorrhoidibus suppreffis Maniam notat ZACUTUS LUTIANUS lib. 1. Prax. Adm. observat. 55. Sic etiam ex Ulcere intempestive clauso orta Mania observata fuit: sed aperto rursus Ulcere Aeger convalescit. In specie Ulcerum antispurum & Pericuri curationem & occlusionem inquit Mania; sicut varices & Ulcera sponte exorta maniam non raro solvunt: nam hoc jam satis de MARIO, antiquo Romano, constat, quod ex occlusionem Varicum in Cruribus fuerit redditus Maniacus: sicut e contra HIPPOCRATES lib. 6. Aphor. 21. inquit: Si Infans varices & hemorrhoides superveniat, solutionem ferri mania. Facit hic, quod refert FORESTUS lib. 10. obs. 24. de Puella, quæ post ulcus in crure taveteratum nimis citò curatum, & propter menstruum purgationem longè suppressam, in maniam incidit, quæ postmodum curata fuit, & recituta scilicet sapientia medietate fluentibus. Item HENRICUS à HEER observat. 14. recenset furorē in Puera per malè tractatas Mamas, in quibus Mammas, apertis Pustulis & evacuato pure, omnis Mania omnino cessavit. Subinde etiam Febres Ardores acutæ, Pleuritides & Epilepsie diuturnæ in Maniam subinde degenerant: sic enim HENRICUS à HEER observat. 3. observat Infaniam post Febrim acutam et melancholia contractam, & post quartanas diuturnas singulares quædam mania species singulariter quopæ tractanda, vid. in SYDENHAM observat. de Morb. Acut. pag. 112. Sic post Varietiam maniam utam videbitis in M. A. N. C. Ann. 6. & 7. observat. 93. pag. 133. Pariter melancholicæ & maniaco delirio communes existunt graves animi affectus. Seminis reversiones diuturnas maniam inducere, probat furor uterinus: de *hereditaria Chorea* res alia nota est.

Quod Causas Externas: in specie Venæ humilis Nervosa assumpta vim habet specialiter inducendi maniam, seu potius affectum quendam manie similem: sic BARTHOLETUS de respir. lib. 5. cap. 3. pag. 405. refert: Radicum Veneris serpiens infusam Vitis, Amoris propositi vidi, qui post epas haustum in extra rationis lirum emotus est, ut delirare: exera sensum magna vis deperit tentaverit, quem illius Vitis Curisus & frigida Pota exstitit in rostem rationem reducere: Item etiam vidit Hyelcyami nigri Semen certè doctum turjurgum & contumeliosum effecisse stultitiam: Ea est Nappeli mania lethalem notat WILLISIUS loc. cit. Sed differentias manie à Medicamento extirpata assumptæ, ab ea, quæ ab interna oritur causa, idem BARTHOLETUS loc. cit. refert. Nempe in illa somnolenti somnia concepta firmiter impessa effluunt & ajunt, cum in vera Mania valde vigilet, & quasi cum ratione, insaniant, Sic Cerebrum Felix comellum Maniacum Infaniam inducere dicitur: vid. SALMUTH Cur. 3. observat. 100. In specie Phitru subinde Juvenibus Manias vel Demantias potenter inducunt, speciatim si parva sint cum menstruo mulieris, in præfent primo, ut refert PETRÆUS in Diss. Harmon. 3. lib. 1. c. 16. & confirmat BORELLUS Cur. 5. observat. 45. ubi dicit, Theologum prope urbem Castrensem à Philo- trem mensurorum muliebrium, cum Leporis Sanguine in condimento sumpto, in Maniam tantum incidisse, ut Patrem proprium occiderit, Veneni illius remedium sunt margaritæ preparatæ. Sic RULANDUS refert, à proplato per venenam Vepem quendam per secentium quatuordecim his epilepticum & maniacum saltem, tandem evacuatione forti particulari per sternutatioem, & universali per infusionem Croci metallorum, curatum fuisse. Jucundum est quod rubicus maniacus stertuante forti excitatus eacere Eruca curatus fuit: vid. M. A. N. C. Ann. 4. & 5. observat. 37. pag. 35. utot minò propriè dicta mania videtur. Dicitum, insignem efflandaciam, robur & similia; hinc habentur à quibudam pro Demoniaca, pro quibus etiam habentur epileptici secundi gradus.

DIAGNOSIS.

Quod attinet signa Maniarum: Mania levi admodum negotio cognosci potest, cum illa sitis patet. Immanitas verb duo signorum genera observantur: quorum alia remota sunt, & dispositionem tantum ad hunc Morbum denotant; alia affectum præsentem immanem indicant. Illa sunt (1.) Ager temperata Attribilia vulgò dicta: (2.) Eadem, ratione cujus viri ad maniam magis propives sunt Fœminis; nisi ex Utero & partibus spermaticis talis quid contrahant: (3.) Alia juvenalis præ se illi: propinquiora verb deinde observantur vel Communissima, vel

Tom. II.

Communis, vel Propria. Communissima delirium in genere portendunt, scilicet dolor & Gravitas Capitis assidua, Virgilis costumaces, aut Somni interrupti, Insomnia turbulenta, & aurium sususit. Communis manie cum morbo & melancholia observantur Curæ & sollicitudines molestæ, ac Terrores à levi causa. Propria deinceps manie signa sunt, quando Ager continuò & multa absurda loquenter & facit, bilque interjicit taciturnitas meditabunda, & finit cum quodam furore & temeritate in obvio, & etiam in seipso, adeo ut quicunque obvius ungubus & morfu insular Belliarum aggrediantur: quin & nisi prohibeantur, se ipsos interdum intermanc, aut suspendant, aut jugulum abscondant. Præterea & pertinacissimè vigilent maniaci, accedit robar infigne, tolerantia Frigus &c. Oculi nonnullis sanguinolenti, item torvi & truculenti conspiciuntur, præcepti & frequent iracundia, est minima vel nulla iusta occasio: splendentes Oculis observantes, proclivitas ad Venenem inconsperta, Pollutio nocturna frequentior, Ritus præter consuetudinem & rationem, &c. hæc sunt signa Manie.

Potè cognoscendum, quomodo distinguant mania ab aliis affectibus cognatis? Est quidem A phrenitis differt in eo, quid nulla idit Febris, nullumque signum graviter affecti ipsius Cerebri sit in Phrenitide. A Demoniis verbò distinguantur Maniaci, cum quibus etiam interdum confunduntur, qui tunc tandem sunt habendi pro Demoniis, quando perperant talia, quæ superant humanam potentiam, & in Natura non sunt perpetrabilia, quando lapsi per Medicamentum Vomitoria Permentia, frusta Lignum, Animalcula viva, aliaque in Corpore aliis non perhibita, aut non ingella antea, solent relinere; quod Demoniis ope à Venefici & locustatoribus oriri solet.

Quid habendum sit de iis, qui in Delirio pergrava Lægna lapsantur? res ardua est. Habentur committitur pro Demoniis: quod tamen videtur magnum essatum; sed potest alii, quid naturale subest: Vid. MARCUS MARCI, Certè præstant observationes de Melancholicis, qui in delirio plura callescut, quam post deliria. Vid. SCHENCKIUS in observationibus.

PROGNOSIS.

Quod attinet Prognosis. Mania à causis internis excitata in genere est malum admodum diuturnum & curatu difficilimum; quod, etiam interdum per Menses & Annos quodam remittat, subinde tamen Melancheliam post se relinquit, quæ facilitatione exasperata, postmodum nova atrocior recurrit, & sæpe ad mortem usque comitatur. Ageros, imprimis si melancholia & mania fuerit hereditaria: quæ mania hereditaria semper est incurabilis, nisi palliative, certa Anni temporibus reiterans.

Quæ tamen mania est cum Risu & alitionibus ridiculis, mitior est & tutior, quam illa; quæ est cum Temeritate & quadam servitia, nimio furore & audacia.

Potè in maniacis si Alvus sit rita aperta, & in specie, si Menses & hemorrhoides ordinariæ naturæ cursu fluant, bonum est signum: si verb manie superveniat humodum fluxus suppressio, vel si sub Mania supprimatur, pejor est; mania enim degenerat interdum in alios morbos.

Manie per manachos supervenientes sudor, aut alvi fluxus, aut Hemorrhagia Narium, Hemorrhoidum, Uteri, Dysenteria, aut Hydrops, aut Tertiana, aut Quartana, aut Varices, aut scabies & similia, item alius quidam morbus; præfentim abdominis, maniam terminat. Sola Dyfenteria sæpius est funella, propter acerrimam Acrimoniam humoris contredentis Intestina, quæ ad Gangranam terminat. Subinde tamen etiam in Hydropem terminasse observatum fuit; sed periculosum.

Dum intereunt maniaci, Virum fatisceniam: ex Virgilis, Inedias, & continuo motu ferè ad Nitæ terminum patiuntur.

CURA.

In Cura ante omnia opera danda est, ut Furor mitigetur, & eo facilitas tradabiles fiat Infanti, pro Medicamentis melius adhibendis. Id quod optime fit per Phlegmatis iteratæ, & valida vomitoria; quibus subjugenda sunt appropriata alterantia, dyfcrasim spirituum & sanguinis emendantia. Spiritus imprimis refectant Camphora & Moschus, Sanguinem verbò cæteroquin humores Martialis & Saurinus, Somniferis maritata; de cætero, si Paroxysmus furoris sit fedatus, simul observanda sunt etiam ea, quæ supra Membris a. monui in Melancholicis.

liiii 2

Ridis

Radix ergo curationis consistit in Vomitoris validis & generosissimis (sunt enim ferres, & equina natura), quæ omnibus Maniacis, (si ab Acimalibus venenatis demerit & liti, excipiantur) non tantum in principio; sed Morbi etiam progressu, maxime proficua sunt: non tantum, quod radicem Mæli, sive ab alumpisive dispositione iocundifica illud fuerit, præferant, sed quod mites & tractabiles admodum Aegros reddant, adeoque non tantum indicationi Præservatoriæ, sed Curatoriæ quoque satisficiant, spirituum effusionem aliquantulum supprimendo, hinc ad Venesectionem aliorumque remediis admissiorem disponant. Veteres in hoc casu, & primus Author HIPPOCRATES, Melibora alba uti fuerunt, cum felici succellu & operato cum eventu, vel quia a Climatis ratione mittitur his ipsis fuit, vel quia concinnis ac nos præparare & propinare eundem noverunt: Nam apud nos violentum est remedium, & quod vitæ, præterquam in contumacioribus Melancholicis, & præsertim Maniis, locum inveniat. Facile quidem nos posset terrere GEIGERUS in Tr. de Microcosmo, Hippocrate, cap. 33, qui refert, quendam Maniacum esse mæli decocti Helibori albi consilium intercessisse, id quod etiam HIPPOCRATES in Aphor. observat, dum inquit: Consuevit ab Helibora lethalis. Simile Exemplum recenset HELMONTIUS Dispens. Modernæ, p. 30. Satis tamen tutum & specificum Maniacorum est Remedium. Non igitur præscribendum in subiectis tenacioribus, v. g. Feminis ab eo enim absterneant: vid. SIMON PAULI Runder, Botan. pag. 6. Scilicet iuxta BENEDICTUM SYLVATICUM Cyn. 1. observ. 53. via unquam in substantia erit propinanda. Radia hæc, sed tantum ejus Insulm cum Vino, & prima saltem vice illam infundendo, altera simul leviter abullendo, & tertia diutius coquendo ac exprimens: Hinc Heliborissimum Maniacis, scilicet ejus Insulm complex cum Vino Hispanico aut Malvatico paratum. Palliem aju. usum suadet LINDANUS super Hartmannum, in Brach. Chymicis, per propriam experientiam confirmatis; hic enim refert Curam Melancholici per Heliborissimum album per se institutam: Dicit nempe quod per ablatione Maniis non cognoscit generosius Remedium, quam Heliborissimum album & Oxytel heliboratum. Cum impetu furor & deorum evacuat, & Maniacos insigniter curat. Præparandi modus Helibori est hic:

℞. Rad. Helib. alba. ʒ. ʒ. ad ʒ. i.

Coquantur in Vitis, donec mollescat: Radix ubi cocta est, eximatur, Vinum verò decoctionis abijciatur, (non potest hac præparationem satis laudare) Radix verò hæc ita præparata in aliud Vinum inficitur, & ita per noctem relinquatur, ubique coctione tamen in loco calido; tunc mane hoc Vinum, vel sine exprellione, si minus validum esse velimus, vel cum levi aut fortiori exprellione, prout magis vel minus validius expolletur, propinatur.

Vires huius Vini sunt optime, nec unquam satis laudatæ. Dosis summa dr. i. quæ sufficienter operabitur. De usu huius Vini LINDANUS in Celleg. suprà Hartmannum, refert: Huius Vini proventum viginti quatuor annorum, qui adeo insaniam erat, ut bene manibus cubile includeretur. Tunc ferè po-nimentum attollebat: Nam crasso pulve humi infusa uliginis erat castum in utroque pede & manibus, sic undas semper umbilicabat. Hinc prima vice cum adiret, nihil potui effugere, secundo effecti, ut ignem hauriret Vinum heliboratum supradictis modo præparatum ad ʒ. unde fortiter peragabatur deus cum vno. Primo hoc purgatio illam venenabilis lassabat, ut tanquam miris oculis videretur, & confusione Venesectionem addidit, & eduxi magnam sanguinis quantitatē, ferè ʒ. i. x. qui non gravioribus, facientibus, aut & horridis adijciunt, aut adeo ita lassatis non quidem amplius adeo infansabat, ardent tamen animos sensabat. Regressi itaque (nempe quarto) die vomitorium in Melibora reiteravi, quo egressi vomiti multo & varia, ex quo pluri quiesce, queratur de frigore, & postulat vomitum, rogatur an regi vellent cubilem alibi. Hinc videns, altera die Venesectionem, sed parum, iterum addidit, & sanguis iterum mollior. Hinc tertium Cibum parum parum, Gallinam cum Endiv. & C. Hinc septimo vel octavo die, tertio & ultimo vice dedi præparatum Vomitorium ex Helibora ad ʒ. i. unde iterum copiosissimè vomit, tandem tamen Mania confusa. Quæ id denique deo decussum subit in Vitis in Diplomate (nempe Martæ Balneo) saltem, ut Vinum possit exquirere, ex Radice Polygodi, Filicis, Scorzæneræ, cum Maris Endivæ & Borraginis magna quantitate: cui decussu denum quantitatē Seminis Papaveris albi sub finem decoctionis addidi, item Radicem Helibori nigri ad ʒ. i. pro seque alterative & laxative. Hæc decussu quotidie bis

ter vel quater suis expurgatis, & sic illum curavi, & plures alios etiam Maniacos. Inter alia, pergit, Martem quandam Lendensem saltem bis reiterata dille vomitoris ex helibora curavi: in punctis Insulm motu maxime observabile est: quia spiritus sunt in feribus de novo, compesci debent, si ferri passu, per Opia; sed non in ferma salda sed liquida: Et si hoc obstat, ut obedi-miscant, statim post cum apte vomitoris est præparandum. Quarta Somnum potui conciliare, scilicet curavi, alia vice addidit quicquam. Ego statim egressi modum in exhibendis Medicamentis generosissimis: nam non deducitur in alium de spiritum, quia spiritus deficiat etiam adijciendum, etiam negligit. Hæc LINDANUS.

Alias leco huius Heliborissimi ad Maniam & reliquis Melancholicis in usu etiam sunt infusa Vomitoria Antimonialis, & dicit LINDANUS quod Aqua Benedicta antimonialis ipsi sit succelliora, sed vix semper sufficiunt, qua sunt nimis debilia, nisi Mercurium Vitæ excipere velimus. Ejusdem generis est Aurum Vitæ Kessleri, & POTERIO & FABRO valde commendatum; item Folia Asiri: cuncta tamen in majore, quam aliis, doli propinando, prout et Delirio Melancholico dictum: est. ʒ.

℞. Conf. fol. Asir. de l.

Paul. Rad. Asiri ʒ. i.

Mors. Vitis ʒ. i.

M. S. Bolus S.

Bolus Emeticus pro una dosi.

Vel

℞. Oxyfurch. Emæ. A. ʒ. ʒ. i.

Kat. helib. nig. ʒ. i.

M. S.

Succus Emeticus pro una vice.

Quæ tamen ubi sunt debiliora, ad Heliborissimum album confugiendum est. Est certè credo, etiam optimam præparationem Helibori albi ad imitandum Veteres in affectibus Maniacis eradicandis. Si Antimonialia non sufficiunt, Insulm Ralme Unguim Humanorum est etiam validum, & Vomitoria Antimonialia superat.

Si in principio Morbi incertum per inferiora ferri debet Purgatio seu evacuatio, usurpetur superioris membro anodi in Melancholia allegata, impetris usurpetur helibora-gor, qui secundum FREITAGIUM optimum in hoc ite-tu purgat eis, cuique extrahit & extrahit ita-lamagogeni Ruricanti, item Sympus de Heliborissimi, & Oxytel Heliboratum Gofneri. Quibus semper addimus est stimulus validior ex Antimonio per inferiora purgat, aut ex Mercurio Vitæ laxativo, & c. cum, secundum PARACELSUM, appropriatum Purgas Melancholicorum in Antimonium, uti heri dixi: est. ʒ.

℞. ʒ. helib. nig. ʒ. i.

Angall. ʒ. i.

Syr. Emæ. Aug. S. ʒ. i.

M. S.

Succus Purgans.

Vel

℞. Rad. senæ. flos ʒ. i.

Rad. Helib. nig. erad. ʒ. i.

Vitis. Hyperici. p. i.

Terræ. Tartari ʒ. i.

Infund. in l. q. Aqua Angall. per noctem, mane ebul-

& exprime adde

℞. de Spina cervina ʒ. i.

M. S.

Potio Purgans pro una vice.

Post Purgationem validam Venesectionis instituat, æque copiosa, & quidem impia reiteranda, uti antea dictum LINDANO: Nam interdum Empirici per solam Venesectionem curant Maniacos. Primo insitendo in Mallo-lu, postmodum in Brachio & Fronte: vid. SYLVIVS & RIVERIVS, PLATERUS Tem. 1. cap. 3. & BARTHOLETUS de Regin. lib. 3. cap. 3. sed non prius post infuit, quam post Vomitoria, Paroxyfmo cicurato, & si-fore mitigato, propter intraditabilitatem, tunc larga infu-tuenda, quia optime ferunt. Confirmat hoc PLATERUS lib. 1. observat. pag. 10. de Malieo ob Mororem Maniaci, quæ ab Empirico in una septimana, sexaginta Venesectionibus, diversis in locis institutis, fuit curata. Quamvis ætem andas fatis Remedium hoc fuit, tamen Venesectionis debet administrari convenit. Antierionem quoque nominat Maniacos sacros MARCUS AURELIUS SEVERUS Anglie. pag. 45. & PANAROLLUS Penn. 1. observat. 29. testatur, spectant hæc Causis & Prepa-ratione Calvaria, ut Remedium tantissimum, ac utilissimum & SYLVATICO lib. 1. observat. 55. & HARTMANNO

Prax.

Prax. pag. 57. & 64. deprædicatum. Quarum tamen hæc secundum SYLVATICUM ad alteram tantum lumen sunt addigende: confirmatæ præter experientiam SEVERINI de *Effens. Chirurg. pag. 34.* MERCURIALIS lib. 1. cap. 16. & GLANDORPIUS *Causticæ. pag. 170.* Cauteriorum & Terebinationum vim GORDONIUS per Hieronimianici, qui quamvis Vulsus & Fractura Crani, quæ passus, aperta, bene habeo; clauso verò vulnere recludit ad pusillum Inlaniam: Ut taceam eorum, quæ superius de Ulcibus elausis & aperta monita. Imò non tantum Vertici, & Nuchæ, sed Bacchi & cruribus quoque, caustica inusta magnæ efficacis observantur: vid. EPIPHANIUS FERDINANDUS lib. 9. ROLFINGKIUS *Met. pag. 413.* & GLANDORPIUS l. a. Salivarium quoque per Mercurium commendat ROLFINGKIUS lib. 3. *Capit. 8.* etque leviori quendam testitutum *Met. special. pag. 590.* testatur: quoniam circa applicationis rationem non levia essent dubia.

Quoniam omnia interim dum sunt & Vomitus etiam repetita sunt, ipsiusmodi exhibentur *alterantia*, quæ Sanguinis, & spirituum ferocem magis turgescientiam & effertum motum refringant, varii generis à Prædictis annotata, etque vel Interna vel Externa. In principio huius Morbi mos cedendus est modis solitis in exhibendis Remediis generosis, quia spiritus Animalis, quando occupati sunt in aliis, via adjuvant in admodum deducere Medicamenta, ob id valida sunt propinanda, quæ fortius moveant & stimulant. Moa ergo in principio Inlanie præfero spirituum motu & effectivenessat Sanguinis aucta compescenda, una cum alterantibus Opia & Sulphura Mineralia, *Pica Anodyna* propinquant. Nam quod ducuntur fuerit affectus, eò minus Opia præstant. Propinanda imprimis sunt in dosi satis valida, alios nihil operantur. Et hæc obtemperat, ut obtemperat, statim post ad validum Vomitorium propinandum; sic enim felicitè operatur. Nam dicit LINDANUS: *Quæ potius tenemus conciliare, feliciter curantur, alios enim præter mensuram parum vel nihil adiuvant.* De cætero, quod attinet reliqua Remedia alterantia & appropriata: conveniētiā hinc omnia ea, quæ alias in Melancholia supra l. a. fuerunt laudata, in specie Tartarus, Martialia & Saturnina, Præterea etiam hæc sicut Nitrum crudum & omnia Nitratæ, quæ studiosissime insurperunt: singulariter enim vim Sanguinis melius & ergastios domandi habent; in specie quidem Nitrum antimonium & vitriolatum, aut etiam Nitrum saltem purificatum, copiosius Cerevisiæ aut Potui ordinario, immensa nempè una Potus 36. ad 3i. inspicendum, & ita una propinandum; Nam egregiè conducit Maniaci nimis furiosi.

℞. Nitri duplo. 3℞.

Camph. gr. viii.

M. f. Pulvis. S.

Pulvis Caput confortans.

Vel

℞. Nitri duplo. 3℞.

Land. Opist. gr. ii.

M. f. Pulvis.

D. S. ut aotè.

De Nieri efficacia res curiosa videtur: Nam notum est ex Galibus TIMÆI van Guldensio, quod aliquando curaverit Mulicem falsicium (qui propter intolerabilem falsicatem Castrationem postulat) per continuum usum Nitri crudi. Porro juvenis maniacus ex RIVERO per Castrationem fuit curatus. Cùm ergo Nitrum artificialiter castrat, hoc effectum Maniacos feroces curare videtur.

Præmissa ita Universalibus & generosis, tandem & appropriata species sunt subiungenda, quæ inter tamen ex appropriatissima remediis est Sanguis Affluens arteriosus, pome Aurea decretescenti verum tempore (ultra æquum non durat) vel linero mundato excipiendo collectus, & ita exsiccat, vel per se collectus, quando gramefici, qui in furno exsiccati petunt: Linetum tale longitudinalis & latitudinis digitorum duorum, Cerevisiæ vel Vini, vel Aquæ fontaneæ aut Angallidis rubræ vel Hyperici vel Fumariz insulum, maceratur tandem, donec liquor contrahat colorem; qui cum forti expressione propinquat, & aliquoties repetitus, largo sudore, præmissis reliquis, Maniacos curat. Quandoque etiam Pulvis illius Sanguinis exsiccati ad drachm. i. usurpatus in Aqua de Angallidis simili sudoris effectum Maniacos curat. HARTMANNUS in *Prax. Chymist. cap. 3. pag. 53.* PRÆVOTIUS & alii meritis hunc Sanguinem commendant. Torpor nempè Afini sistit furorem maniacum, pigrescentiam Atroem infert. Vel

℞. Lini. Sang. affluens sicc. manus longitudinem

& latitud. æquas:

Infund. in l. q. Aquæ Hyperic.

Colat. 3ii. adde

Essent. Angall. 3℞.

Land. Opist. form. gr. i.

M. S.

Singularis Potio Cephalica pro una vice.

Post Afini Sanguinem viæ melius est remedium, quàm Angallidis flos pluvius. Huius decolla scilicet QUERETANUS & HARTMANNUS gloriatur se mira præstissimè in Maniacis; quod etiam frequentius in usu fuit D. MICHAELIS, qui aliquando Sutoris Filium catenis alligatum, præmissis premittenda, beneficium Effentia: cum Angallidis compositæ restituit. Hinc est quod Angallidis hæc quibuldam dicitur Salus Fatuorum, Germanis Veranste Kraut, quia contra Maniam & etiam Veneficiæ seu Maleficiæ est adeo commendata, & quæ D. D. MICHAELIS electioni præparavit effentiam compositam cum spiritu proprio: cui autem merito præferret Decodum. Iuxta Angallidem porro impetitia non minimam laudem meretur hyperica, quacunque ratione usurpata, unde etiam Tinctura hypericæ compotica Myrsinellæ laudata est in Mania. Porro Fumaria, Strophæa, Berberis, Melissa, Cetrach & similia, cum Afini mentis crebris usurpata, aut alio modo adhibita, pro Maniacis in usu sunt. Hinc est Salerni tetrastichum seu Herba Paris, quæ s. duobus continuis ad domus cochlearis quantitate sumpta, ad Curam Maniæ laudatur, cuius etiam Baccas, Folia, Semen & Radicem pulverulenta VELSCHIIUS observat. 15. exhibet. Succus Polydali quercini expressus in Maris Balneo digestus & clarificatus ad 3iv. vel v. propinquat, nonnullis in usu est; maxime laudatur à BARTHOLETO de Respirat. l. 1. pag. 412. ejus decoctum compositum: a. g.

℞. Herb. Paris cum Ros. M.℞.

Angall. purpur.

Flos. Hyperic. an. M. l.

Rad. Polyd. querc. 3℞.

Pastil. min. centes. 3ii.

Coqu. in l. q. Seri Lactis;

Colat. 3ii. adde

Essent. Angallid. 3℞.

M. S.

Hæc affocianda simul studiosè remedia Linaria superius insinuat, De Folio Saxi, eorumque ad Maniam usu, vid. in HARTMANNI *Prax. Chymist. cap. 4.* item SENNERTO ubi de Mania. Aliquando enim cum ordinaria Dux hæc Folia minutim incisa cont. ad ordinata, fuerunt egregia, licet de his propriam experientiam adhuc etiam æget prior, fursus tamen eorum vis est à blanda Natæ, quæ Vegetabilia hoc gaudent. De Opia res clara est, quod etiam lubandè in usu vocanda, & semper cum aliis miscenda, in specie quidem cum Medicamentis ex angallide & ex Hyperico: item Pulvis ex Landano Opiao & Camphora, vel cum Oleo Camphoræ quacunque ratione paratæ, crebris vespertino tempore, præmissis validis vomitoriis, exhibitur, egregiè sunt pro Maniacis & Melancholicis. Ordinaria tamen dosis præterea, quin dupla aut tripla dosis ferè conveniunt. Quod si eorum usu sequatur Somnus, res bene habet; si Verò non, deterius ferè habent Egri, cùm turbulenti magis ac morosi eandem fieri soleant. Propterea benè, præsertim per alcali, correctum saltem insuper Opium; præsertim Pulvis ex Landano Opiao cum Oleo Camphoræ singularissimè sunt ad Curam Maniæ. Serum Ladis denique per Potu frequenter largiendi concedi potest Maniacis eorum optimè alterativum, nunc simplicia, nunc medicamentis imprimis coacta, Effentia angallidis, Effentia Fumariz, seu Fumaria Sero Ladis insula, Effentia Croci, Effentia Hyperici, & ex his parata varia composita, spiritus Secundine humanæ, Tinctura Corallium cum spiritus cordis Cervi, & aliz Corallium Tincturæ, hic admodum commendantur, RIVERIUS eorum specificum in Illustri quadam Familia secretum hoc dicit esse in sua *Praxi*.

℞. Fol. Melissæ M. l.

Quæ minutim incisa, infundit

spiritus Vini 3iv.

& addit

Margarit. prop. 3℞.

Dosis sunt cochlearia ii. quotidie repetendo. Arcanum Sanguinis humani commendat FABER curat. 1. Nec Saccharum Saturni, item Cryalli Mineræ Saturni, & Balsamum Saturni, inefficacia planè hoc in passu obdervantur.

Hic omnia semper *Camphora* est addenda, de qua modo dixi, & singularissima est in maniacorum Cura internæ, & externæ, & multum habet in recessu. Ex PARACELSO ab HARTMANNO, & JONSTONIO admodum laudatur huiusmodi mistura, tanquam remedium PARACELSI expertum maniacum:

℞. Ol. Camphor. ʒi.

Misc. ʒss. ad ʒi.

Misce, & admiscere qualibet vice ʒss. Et mirabiliter maniam extinguere dicitur à PARACELSO, id quod pariter, & alii Authores confirmant. Quid autem per hoc *Oleum Misci* intelligat, omnes ignorant, unde vel *Camphora* in substantia à ʒss. vel ʒiij. & huiusmodi vel guttas viij. vel xij. propinquum fuisse, præmissis si Opio conueniat. Confirmat hoc PRÆVOTIUS, qui dicit: *Oleum Camphoræ cum Bals. de Sillabano* (non est verum *Oleum*, sed assula *Aqua* latim regeneratur *Camphora*) ad ʒss. si propinetur, mirabiliter foretrem maniacum intra aliquot horas sedare. Quæ etiam facit *mixtura Fabii in sua Pathologia* quam creâ potentissimam ad curandam maniam commendat, hoc modo:

℞. Oleo Camph. saltem per distillat. ʒss.

ʒss. Saturni gr. x.

Martis gutt. vi.

Misc.

& cum *Aqua* appropriata, vel, ut vult LANGIUS, cum *Aqua Spermatis Ranarum*, internè propinetur.

Sic quoque cum Saccharo Saturni, vel Arcano duplicato *Myrsinchi* propinari potest. Sanè *Camphora* immediatè videtur agere in spiritus, eorumque dyacrisiam, ac motum effluenter corrigere.

Nec tantum internè, sed etiam externè *Camphora* utilissima est maniacis, Capiti applicata, ut hoc collat ex epithemate ex Sale Prussellæ, & *Camphora RIVERII Prax. lib. 1. cap. 13.* Hinc enim ad Capitis perturbationem essendum:

℞. Aqua fer. Samb.

Hyperic. ana ʒss.

Camph. gr. vi. ad ʒx.

Misc. pro Epithemate, crebro Capiti applicando.

D. S.

Externum Epithema circa Caput.

Vel ad imitationem HILLERII in suis observat. ubi ad maniam commendat adulationem temporum tali liquore.

℞. Spiritus Vini ʒss.

In quo dissolvit

Camph. ʒss.

Misc.

Huius *spiritus* Moli imponit Nodulum ex

Opio ʒiij. & Misci gr. iv.

Hoc ipso liquore tempora frequenter illinenda. Nodulus vero lubide odorandus est, ad extinguendum furorem maniacum, & blandum somnum conciliandum.

Pertinet hoc experimentum PENOTI, cui etiam adimplatur CLUSIUS, quibus mirè sibi Phreneticos, & Maniacos afferant, applicando, præmissis Universalibus:

℞. Misci gr. xij.

Camph. ʒi.

Aqua Rosar. rubr. cum Tinct. Sennali rubri impræg. ʒss.

Missa probè & Capiti derasa cum Lintheis multipliciter, temporibus, & per omnes Surturas applicetur; ubi Lintheum iterum succatum fuerit, de novo humectetur, & applicetur, & ita per 24. horas continuetur:

Cons. RIVERIUS loc. cit. cap. 11. Vel.

℞. Thysa Camphor. ʒss.

Ol. de Sillab. Camph. ʒi.

Misci ʒss.

Creos. gr. viij.

Misc. pro Linimento: S.

Unguentum Cephalicum.

Capiti, & Temporibus etiam Sacculus ex Bacis Lauri, Helicorii nigri, cum decocto Herbarum Cephalicarum admoveendus, modo illo quem HARTMANNUS *Prax. pag. 36.* describit: item

℞. Nitri ʒi.

Camph. ʒi.

Misc. cum Aqua Nymph. iuxta RIVERIUM.

Alias etiam in mania commendatum est externè Epithema RULANDI quod Curat. lib. 2. pag. 24. describit: & THONERUS in observa. pag. 260. commendat tanquam à se maximè expertum:

℞. Ag. Rosar. vel Succi Cact. ferriat. ʒss.

Opio ʒss.

Creos. ʒss.

M. pro Epithemate, Fronti, & Temporibus admoveendo.

Aqua Spermatis Ranarum erit melior loco *Aque Rosarum*, Excellentè est Epithema hoc, cuius usum fecit ad se redierunt Maniaci, dicit FORESTUS lib. 3. consil. 10. pag. 260. *Camphora* addenda foret. Nam in Capitis perturbationibus melancholicis, & quasi maniacis simplex hoc Epithema aliquoties cum fructu applicavi:

℞. Sem. Papav. alb. ʒiij.

Ag. fer. Nymph. vel Samb.

Vinica. vel fer. Hyper. ana ʒss.

f. Emulsiō addo

Camph. gr. x. ʒss. ad gr. xij.

M. pro Epithemate aliquoties applicando.

Quin, & solus succus Cancrorum fluvialium expressus instat Epithematis applicatur: Vel

℞. Muci. Persic. ʒss.

Sem. Papav. alb. ʒi.

Cum l. q. Succ. Cancr. ferriat. f. Emulsiō:

addo

Camph. gr. xij.

Opio gr. vi.

M. S.

Epithema Externum.

Aut ipsi Cancrī viventes ceptu instat Cataplasmatibus apposti Fronti, ac Temporibus expertum esse remedium, unum cum aliis in mania, & Phrenitide dicitur, modo perscrutari Agri. Sanè retulit mihi quidam, se per hoc ipsum servum suum maniacum solum fere curasse. Non minus quam Decollum Misci ferulam Fronti applicatam admodum commendatur ad Curam manie, fed observetur, quod cautè applicandum sit, & nonnisi urgente summa necessitate. Omnia Epithemata, præmissis præmittendis, dum semper fuit maniacus fuerit mitigatus, applicentur.

Potè Cerebrum Canum, imprimis juniorum commendatur à quibusdam insigniter. Exemplum maniarum curatarum per Cerebrum Canis coctum videbitis in SENNERIO lib. 1. *Prax. cap. de Mania* pag. 421. Alii tale præparant remedium:

℞. Cerebrum aduic. lactisum terat. ʒ. vel l. d. terum:

Ex his capient Cerebrum istud, destillant per se, & Aquam destillantam spirituosam imbibunt cum Vitale, & ita per retortam destillant, & postmodum redificant.

Dosis est ʒi. Quo quatuor Maniaci curati dicuntur. Loco liquoris Cerebri Canis quidam commendat liquor Cerebri humani.

Tandem etiam nonnumquam observatum est, *Immersio* submersa in Aquam frigidam, vel fluvium maniacos restitutos esse, præmissis pertentendis, quod non ita absurdum videtur. Alii aquam tepidam, alii frigidam volunt, sive dulcis, sive salis fuerit: vid. BENEDICTUS SYLVATICUS Centuria 1. Observ. 34. & FABER Myrsinchi. Spagy. Curat. 5. & 8. Verum non tam Balneatio simplex, quam improvvisa in Aquam demissio, & hinc orta Firmido, seu Terror, effectum desideratum præstat, simili fere ratione, atque Rabidi curari solent; id quod experientia crebrior confirmat inadat HELMONTIUS Traët. De mens. lib. 3. 49. Conferri etiam potest BORRICHIUS de Nervis. Medic. pag. 168. In pavore mortis enim sunt placidi, & tremuli, & Phantasma mortis in aliud mutatur; Nempe furorem maniacum subita alteratio ex inducho gravissimo terrore extinguit, sed tamen melancholia adhuc remanet.

ARTICULUS IV.

De Delirio à Causa Externa.

Hæc fuerunt fere deliria, que ab Internis oriuntur Causis, sive cum, sive sine Febre. Sequuntur iam ex Delirio à Causa Externa; que ipse Causæ Externæ singulari virtute spiritus Animales determinant, adeo ex his leudatur Imaginatio, ac insidit suspensa, & miranda inducitur delirio. Hæc sunt *supra*: vel

1. *Ab Mysterio Animalium stratorum, & in specie rabidarum: vel*

2. *Ab Assumptis malignis narcoticis.*

3. *Ab rabie, & Hydrophobia, hic Phæra sine consideranda.*

MEM.

M E M B R U M I.

De Rabie.

Hæc inter præ cæteris eminet, præter vagabunda Non-entia, (à quibus ipsa Deliria præmissio Venusta optimè Arido, ut Aëto, succo Citri, &c. cum & sine Canore, potestagatur.) Morbus Animalium rabidorum, ac venenatorum, in specie Morbus Canis, cum frequentissimus, unde Delirium Rabiosum, sive Rabies occipit, in specie mirabilis adjuvantibus Symptomata, Hydrophobia. Rabies autem est talis affectus, in quo ipso simul Homo plane rabiosus redditur, & omnino in mores brutales transmutari videtur, ut nihil ferè humani apud se retineat, quin Homo rabiosus exactè illius moris, gestus, &c. referat, à quo rabido demorbus fuerit.

Frequens imprimis est Cæcitas Rabie, excitata à morfu Canum rabidorum, cum præ reliquis Bruti. Canes frequenter rabidi fiunt. Præter Canes tamem etiam Felis, Gallinacei, Lepus, Equus, Muli, & similia Animalia, sunt rabida, quorum non tam prolant observationes. Sic enim de felis rabido refert SCHENCKIUS lib. 3. observ. quod Mulus rabidos fluoreo transat, ac alacritas potius fuerit curatus. Sic etiam Brutes interdum sunt rabidi, idque imprimis à Canis rabido demorbi, teste BARTHOLOINIO centuria 3. hyst. 9. qui etiam canes, 3. hyst. 91. varia habet Exempla variorum Animalium rabidorum, in specie Rabies Humanae est morbus Galli gallinacei, & coheratur simul centur. 3. hyst. pag. 199. ubi habetur Rabies Equorum, qui natae in mari curati sunt. Nec folium pro morbo ab Animalibus rabie reddimus non Homines rabidi, led etiam ipse viri, aut jam rabiosus factus, ut sine Rabie, modo graviori fuit percipit, mortificando alios similiter potest reddere ferè rabiosos, aut si non Rabiem, reverà Infectiones malignas ac admodum periculosas infert. Nam, ut rectè refert HILDANUS centuria 2. observat. 14. Morbus ab Homine rabido malignus est summe, & coarctus, & non levis, ac morsura à Canis rabido curandus; item BECHERIUS in Microscopio Med. lib. 3. cap. 3. pag. 10. ubi de Saliva, observat Hydrophobiam est morbus humano obortum. Et notabile exemplum habet BARTHOLOINIO centur. 3. hyst. 9. de Muliere Hydrophobica in Belgio, in Rheno abluata, quæ cum in eura in Civitate reversura voveret, Aëriam simul evomit, loca vero venenato Vomitu aspersa quanto ab hinc die expiravit. Vid. etiam ZACUTUS LUSITANUS lib. 3. præf. adm. observat. 58. qui observat Mortem ex morfu Hominis irati. Nam omnium Animalium iratorum morbus, & adeo etiam Hominis, est venenatus, & malignus, ut rectè hoc quo tempore observat CELSUS ex Iurisco consulto factus Medicus, qui dicit: Omnis Fera morfus habet quoddam virus: Id quod pluribus confirmat HILDANUS centuria 3. observat. 86. ubi præter mortem Ferae, etiam Homini iratorum morsum letalem, vel saltem venenatum, pronunciat. Vid. etiam dispersat. nostra de morfu Viperae, & HILDESHEIM in specul. Ex hoc ipso tamen non sequitur, Venenum Animalium solum consistere in Idea Furoris, morfu in Archo nostro sigillata, quæ post Mortem cessante etiam Venenum Animalibus deficiat, quæ est sententia HELMONTII in suis Scriptis, cujus vestigiis etiam insidit ZWELFERUS. Contrarium, nempe reverà in subiecto Materiali hærere Venenum Animalium, ostendit REDI de Vipera: qui licet se opponat CHARAS Tractat. experient. de Vipera, qui HELMONTII Hypothesin defendit mortificans, nihilominus tamen, & hinc iustitiam. Quam etiam à iam laudato REDI in hyst. resp. 2. Vid. in anno 2. M. A. N. C. apparet. Sed hæc obiter.

In his Rabidis notata digna quædam occurrunt. I. Quod etiam levissimus morfus, levissima lésio, vel etiam tantillus Salivæ contactus, receptus in Homine ab Animalis rabido, nihilominus in tempore Rabiem infert, ut refert HILDANUS l. c. ubi quidam à Felo rabido sola scalpura per Unguem in dextro Pollice laesus, vi Epidermidis lésa, seu afflata, nihilominus tamen Rabiosus in summo gradu factus est, & omnia symptomata morbum Canis intersequuta perpessus fuit. Hæc vicariè idem refert HILDANUS de Muliere, cujus Vetus à Canis rabido fuit lacerata, unde Mulier consuetudo Vellum laceperat Filium Dentibus amputavit, & de post tres menses Hydrophobia facta perit. Par ferè est Exemplum, quod ex alio Auctore refert HILDESHEIM in specul. pag. 193. eujusdam Sarcinæ, quæ cum Chlamydem rabidis moribus scissam faciendum lumeret, atque ore

flamma componeret, & Lingua pannorum furas lambere, tertia die rabiolam factam esse. Imò levis tantum respicit, aut aliquis saltem contactus idem malum infert: Quin, & Iosio Silicia à Canis rabido demorbi potest Hominem furiosum, & rabidum reddere, teste BORELLO cent. 4. observ. 32. Mirabilis est, quod vis, loco observ. 13. refert, quendam cum Gladio vulteratam, quo ante odo annos Canis rabidos occisus erat, post triennium rabidum interivisse. MATTHIOLUS aliter, se duos vidisse, qui Spuma tantum percussu, nullo accepto ex morfu Vulneris, Rabiem contraxerint. Facit hoc Exemplum CODRONCHII, & PALMARII de Morb. contag. qui inquit: Vidi ex fræmali, in quo Rabie percussus fuit deambulans, æn, Equus, Brutus, Ovis, & reliqua Animalia, quæ fræmali degulassent, Rabiem contraxisse, tandemque perisse. Rullicus quidam Rabie percussus, cum breviforè vivis emigrandum intelligeret, affidenter rogavit, ut sibi Liberos exoculari liceret, quod cum fuerit concessum, Liberiforè ocula vibrasset, extinctus est; inter septem vero dies, & noctes Liberi eadem Rabie percussu, insensum eructibus torti, brevi interierunt. CARDANUS testatur, Venenum Patricium Esculatione Canis rabidi, quem amabat, antequam mitteret ad occidentum, rabidum fuisse factum; item ZACUTUS LUSITANUS lib. 3. præf. adm. observ. 82. Esculatione demorbi Canis rabidi Rabiem contractam refert. Adde penetrans, & adeo malignum est istud Seminium, quod Rabiem infert.

II. Præter hoc, nempe iocundum modum, notabile est in Rabie, sive morbo rabidorum symptoma, Hydrophobia, sive Liquidorum omnium fuga, & metus, qui omni Rabie, à quocunque malo ortæ, solet esse compendius. Nempe talis Aëri non possunt ferre liquida, led aspectu eorum communiunt toti, anxietatibus affliguntur, & miserabilis torturas perferunt; imò potius isti intereunt, quam tantillum humidi gustent. Proprium ergo videtur Rabidis, ut æquum perquam. Nihilominus tamen, non solum Animalium rabidorum morbum sequatur Hydrophobia: res adhuc dubia est eo videtur, quoniam proflare videtur Auctorum Observatiões, circa Animalium morbus esse ortas. Exemplum talis Hydrophobæ circa illum Animalis rabidi morbum recenset MARCELLUS DONATUS lib. 2. observ. m. lib. 6. cap. 5. item PLATERUS lib. 1. observ. de Formina quidam, quæ molu extra Urbem relicta, ac solitudine terræ, domum reverà nihil liquidi deglutire potuit, quin illis oblati suffocationis periculum incurrit, & octava die extincta est: Conf. BORELLUS centuria 3. observ. 38. Sic Hydrophobiam in Febre Maligna circa morbum Animalis rabidi obortam refert SALMUTH cent. 4. observ. 52. quo etiam videtur CODRONCHIUS in tract. de hydrophobia cap. 10. Duo Exempla admodum notabilia Hydrophobæ gravioris in Febris Malignæ eoræ quarta, item quinta die, circa morbum aliquum Animalis, seu Canis rabidi, habet SANCHEZ in suis Operibus med. in observat. pagin. 377. (est Medicus Hispanus) : Quidam medus Augusti incidit in Hydrophobiam cum Febre continua circa illum morbum ab Animalis rabido, in quo non poterat ferre adspicere aqua nequa Penus cuiusdam, aut Vinu, aut Jusculum, & quavis bilis amitteretur, tamen ubi Potum aut Jusculu sumpsisset, tanta cum premebat Cordis angustia, tantus tremor, tanta Corporis traxio anxietas, ut tegeretur Lignorum ejus ferus, non gustula quidem haurire: agnoscere quidem se non posse vivere sine Potu, nec manus tamen abluere audebat, cumque nobis potentissimum Sympthum admoneret, idem horrore, & tanta commissa apprehendebat, ut totum periret, nec potest, ut fudaret, & convelleretur: hic quinta die perit. Alterum est simillimum buæ. Et in Mulieribus visis Theri Hydrophobiam sine morfu Canis rabidi annotavit SENNERIUS præf. lib. 4. pag. 277. Videt. etiam lib. 6. part. 2. cap. 5. pag. 815. Verum in his ipse Hydrophobis, sine Facium aut Gula illa affectione, etiam circa morbum Animalis rabidi etiam, adhuc hæreo dubius, annos aliquando morbus quidam à Canis rabido, aut Contagium seu inquinamentum ab Animalis rabido præcesserit? Nam notum est, quod tantillus ex Saliva Animalis rabidi contactus infert Hydrophobiam, ut utriusque per decem vel plures annos Contagium hoc lateat in corpore, anecquam virtutem suam elater: quod ipsum ulterius adhuc investigandum venit. Ob id quæstio est: an in talibus præcesserit aliqua infectio, ut utriusque adeo cognita? Adeo ut determinari certo non possit, Hydrophobiam non esse signum Rabidis pathogenomionem.

III. In Rabie notabile est, quod Contagium Rabie istud malignum, ab Animalibus rabidis communicatum, subinde ad hienam & triennium; item ad plures & multos annos, absconditum

conditum lateat in corpore, donec avigilet, & in actum secundum erumpat: Vid. SENNERTUS *Prax. lib. 6. par. 2. cap. 30. pag. 353.* Sic LINDANUS *Super Nephros*: testatur Exemplum Hydrophobie lethalis in Aegria decimo tertio anno post mortem Canis rabidi evenientis: & BORELLUS *centur. 3. observat. 74.* refert quendam sepelem enais denum a morfu Hydrophobum factum esse: Alius in Crure morfus & curatus, longo post tempore, tamen eodem die, & in eodem loco, in quo morfus fuerat, dolore magno in parte demora correpta fuit, Veneno quasi per arteriam sanguinem in eodem loco supposito jacente. Imò per viginti annos Hydrophobiam occultatam vid. in M. A. N. C. *ann. 9. & 10. observ. 45.*

IV. Notabile est, quod subinde *Animalia generantur*, vel nascuntur in Saliva vel Lorio Animalium rabidorum, similia iis quondammodò Animalibus, a quibus Rabies fuit induta; unde ver. grat. Vermes calcitriformes, aut capitulis Catulorum similes in Urina taliter Aegrotantium observantur. Notatur hoc iam fuso tempore Veteres Arabes, ut specie AVICENNA & AVENZOAR; quod tamen raram est, uode ex modernis quidam plane negare volunt, sed malè. Certum enim est, reperta loterum fuisse talia Animalcula, non tamen semper. Fidem facere aliqualem videtur Exemplum illud notabile SALMUTH *cent. 3. observat. 83.* de Moliere, quæ fuit in simbra Vestis mortua sua lacerata a Canè rabido, & ista simbra Saliva aspersa, unde Mulier suspexit Vellem laceratam Aeri subiecto, ut effunderet, & post unum vel alterum diem in loco, ubi fuit salvia, percipit parva Animalcula, quarum capitula si millibus forantur capiti canino. Mulier vero à Canis morfu rabida octiduum frusta Caliculi similia per Alivum ejecit, referit in M. A. N. C. *ann. 8. observ. 35. pag. 35.*

V. Denique notabile est, Animalia rabida, quæ sunt rabida ab alio Animali rabido, verbi gratia Homo rabidus, qui ab alio Animali, per moriam nempe Canis, vel Felis, fit rabidus, ex illis imitari *generantur Animalium rabidorum contra lacerationem mori & quædam*, lacerando & ringendo instar Canis, vel morficando & lacerando instar Felis: Sic COLLE in *Culmatura Medica* pag. 319. refert Rabiem à morfu Filii in Indice digito, post duas horas Irbalem, quæ Aeger volebat mordere. Quo fuit curiosus BORELLI *observat. centur. 3. observ. 88.* de quodam à Canè rabido demorso, qui eo tempore morfu subitò factus est rabidus, fed simul etiam instar Canum adeo fixus, ut accedentes Amicos, etiam ad huc aliquantus è longinquo, quavis non videret, tamen adorari & nominare poterit: Videb. *quod centur. 3. observat. 74. & RHODIUS centur. 1. observat. 46.* Sic quæ à Fele rabida redduntur rabidi, mores felicos, sono oris, nugibus & digitis murend in alios invadendo, imitantur: Videb. KIRCHERUS in *Sirania. Pessu loco supra citato.* De quo ipso, ut & aliis subindo apud Prædicos observabilibus sic fides penes Auctores. Hæc sunt symptomata primaria.

C A U S A E.

Quod attinet *Causas* huius Rabiei, & facta inde Transplantatio morum Animalium laceratio in Animal laesum fuit tactillo Contagio, illud à nemine haudè percipitur expletum fuit. Præ reliquis nemine curiosè & acutè rem attigibile videntur Idearum assertores, nempe HELMONTIUS *tratt. De motu Ideæ de morbi Idearum*, & similes, & præsertim MARCUS MARCI in elegantissimo Scripto, *Philosophia Veterum Restituta*, qui ex profecto de hoc agit, & instar omnium de hac materia potest consuli; item DAVID van DER BECKE, & qui talem sequuntur doctrinam, quod nempe *Ideæ Seminales* transplantentur ab Animal rabido in Animal, quod lædunt, mediante Contagio spirituale, à quibus Ideis *Arbitrariis* Animalis læsi determinetur ita postmodum, ut pro illo rum directione, & non aliter, operari queat: Nec adeo aliter videretur BORELLUS *centur. 3. observat. 74.* dum vim seminalem Veneni accusat. Hi ipsi quidem per ceteros omnibus nonnulli plausibiliter rem explicant, sed Idealis hæc Hypothesis, ut ut subitè admodum & prima facie plausibilis videatur, illis tamen, qui intelligibilem, seu, ut vocant, sensatam amant Philosophiam; nullo modo satisfaciunt. Nam si ad ipsum fundamentum pervenimus, est hæc Hypothesis simpliciter Idealis. Unde & hic præstendum est, equam in hunc nobis hægere, & rem à priori non esse explicabilem. A posteriori ergo fædè dari potest Hypothesis nonnulli plausibilis.

Docuimus gratia *Fermentum* hic peculiare accensum ab Animal rabido per morum communicatum; nam, quod aliè de *Veneno periculi* habent, id omne ad Fermentum est

applicandum: Hoc Fermentum *Alia* à Ab Animal furoris impressa, Homini communicat, primario spiritus Animalis, quod etiam confirmat Pashetta convulsiva, secusdario massam sanguineam afficit, ita ut ferè similes evadant spiritibus & sanguini Animalis fuerint; hinc fieri non potest, quia eadem quoque actiones ead, quæ Cane v. g. aut aliud Animal rabidum edit. Notandum autem, *Animalia in se servata non esse*: hinc neque omni morbo Rabiem parit, sed Animalis, aut *vari* aut *rabidi*, ita enim & *Ferri* nocent, & ita maximam partem ideale est; tamen & his admodum Fluidum aliquid Acrimonie malignæ subest, confirmat Cura per Cancrina, Terram sigillatam, Radicem Gentianæ, &c.

Causa Occasionalis, & propinquior est *causa* fermentativa & effervescens, per morum infinitum Vulneri Iesuli, Systemati nervoso, & hinc spiritibus ac massæ sanguineæ communicata; hinc nō Volens sit factum, ita ut ipsius Animalis afficeret possit, *Ferpe* non fit.

D I A G N O S I S.

Hæc relicta pergo propius ad ea, quæ potius Prædicto spectant, ubi ante omnia observandum: *an Animal*, ver. g. Canis, *salva rabido*, qui non mordet, vel à quo quis morfus, rabidus fuerit, an non? ut nempe præcaveat luminens tandem Rabies. Quod ut cognoscitur, nonnulli accuratius in hoc puncto percipiunt, ut Nices Jorgandæ recentes contriti imponunt Vulneri fido, & ad aliquot horas sepe Vulneri relinquunt, quæ postmodum devoranda obducunt Gallo gallicæco vel Galline. Quod si Animal non fuerit rabidum, Galline non morietur: si aut fuerit rabidum, altero die morietur.

Ideam applicandi & iudicandi progressus est de sanguine, quando alii sanguinem, vel per se, vel per scarificationem, ex Vulneri eliciunt, ex eoque cum ferri signum formant, & Galline obducunt, quæ si moriatur sanguis est Animal foisse rabidum.

Simili ratione AVICENNA præcipit medullam Panis Vulneri fuso affricare & applicare, & sine Vulneris irrigatam postmodum Cani obducere devorandam; nam si illam medullam non comedere neque olfacere voluerit, ut si moriatur, signum est, fuisse rabidum.

Ipsam *Causam esse rabidam facillime ex eo cognoscitur*, quod tales Canes rabidi omnem Gibam & Potum aversentur, nullam materiam viscidam Spontaneam circa Dentibus; Ligam & Fauces habent, interdum ex Ore & Naribus emittunt, torvum videntur, Oculos habent rubentes & igneos, quoniamque obvisioridati, notum pariter & ignotum famuliter iudant.

Uterius canes rabidi sunt macilentæ, Caudam densifam sub ventre relictam, Liguam exsertent, eamque rubram, fæpidam croceam, interdum oigram, veliciter currunt, & sub isto cursu in obvia quoque impingunt; omnes alios canes adorantur, & omnes alios fugant.

De cane rabido vulgò affirmatur, *sub lingua ejus latere Vermem* quendam oblongum, quem alii à se ipsos visum restantur, quo maturò deperto nullus canis rabidus fit; eodem vero incremente, Rabiem necessariò supervenire; unde quidam ad præcautionem solent extrahere hunc Vermiculum: quidam existimant, non esse Vermiculum, sed per sanguinis congruam partem in Venâ Rabini sub lingua collecti & stagnanti habent. Rem hæc ceteri nonnulli sufficienter exploratam in medio relinquo.

Interius Rabiei & Impotentiae lumbare *causa* fit Lupis, Vermes copiosi, in eorum Reosibus & alibi locis generi, observari fuerit: Vid. M. A. N. C. *ann. 3. obs. 193. pag. 365.*

Ubi contagio iniquitatur fuerit Homo, in specie morbi, sive mox sive post plures annos etiam afficitur Rabie & Hydrophobia, *Rabie iniquitatur* & etiam *non felle* fusa sunt, si se offert anxietas Præcordiorum, Præcordia citra causam manifestam, si conqueatur Ager de molestia Aeris ambientis, de corporis gravitate, & inepetidine in videribus & variis impedimentis, aut de Inepetidine; Ager fane Edicari & moros, morbi, tristes, uno nomine Melancholici, semper murmurent, subinde Lucem fugiant, & ablinant à Porc.

In parte olim vulnerata solet adesse aut sentiri incipit mortificatio & Titillatio, ut etiam incipit Dolor.

Quid si jam profecta *Rabie* inchoat, adeo membrorum distensio, & quasi convulsiva expulatio corporis, facies rubet, Ager fane anxietate spumant circa Os, Oculi roborati habent, quidam latrat instar Canum, si à Canè rabido mori sunt, Collum & Fauces rigant, & si à Canè fit.

obviam facies intradunt, & Dentibus impugnant, & à Pele, Unguibus lacerae tentant; & denique omnibus commoveant, ut Liquida & etiam Aque horreat, quorum praesentiam etiam admodum anxios, interdum etiam convulsi sunt. Delirium quasi Animi patientur, quibus nunc vociferant, nunc serè sonos edunt, indebitis moris Redius similes, nunc sibi propiores ledunt & infestant, Facie sunt horribili, sine ullo Somno, inquieti, loca tenebrosa amant &c.

Fabris Rabiosa interdum adeit, interdum abest, utut **PALMARIUS** existimet, Rabiei perpetuum esse comitem Febrem.

PROGNOSIS.

Quoad *Prognosis*: *Humani Rabies*, aut jam incipiens & appropriatis Remediis curari potest.

Si vero jam *perfecta Rabies* adeit, praesertim cum hydrophobia, est Affectus satis acutus, qui *parò* perfectè curatur, & spes in sanguis haeret, qui sapissimè, & diutius lateat in Corpore Seminum rabiosi, Homines jugales & sapientempe secundo vel tertio, ad summum quarto die ab eo tempore, quo Hydrophobia eos corripuit, moriuntur.

Antequam verbò Rabies post lesionem infestatur, observandum est, quod quando in principio, ubi *sanguis* copiosè à loco Vulneris evacuat, & extrusus fuerit; item si largiter fluxerit *sanguis*, aut ipsam Vulsus recens ritè tractatum sit, sponte vel *indol* multus, vel *Urina*, præcipuè nigra, evacuetur, praeservari potest Rabies & hydrophobia. Nam quod diutius Vulsus factum, apertum fuerit servatum, eo minor velus adeit. E contra post factam ejus consolidationem ineptam, citiorem jallo scilicet, & quo magis Fermentum rabiosum intraverit Partes nervae, eo certius hydrophobia metuenda est. Unde praeservativè possumus aliquamdiu Aegros detinere.

CURA.

Subtilissimus adhuc in Rabie & Affectibus Rabiosa, & quidem superest tantum *Cura*, quemodò Rabies, aut jam incipiens, aut Morbus à rabido insidius, debeat curari? Hanc quod attinet; in hoc duo Tempora observanda: (1.) Ipsam *Tempus prima* ipsius seu vulcorum & inquinamentis, sicut ab Animalis rabido. (2.) *Tempus ipsius* Rabiei supervenientis, ubi, licet diu consolidatum sit Vulsus, nihilominus tamen Venenum jam tum in actum secundum deducitur, & Delirium indocitur; ipsaque aut hydrophobia, ejusque vel imminens, vel jam praesens.

1. Ergo quoad *primo tempus*, ex Vulnere facto, quantumcyus fieri potest, malignum Virus per morbum contrahendum aut delendum, & ob id hujus sanatio non adeo citò periclitanda. Quod ipsum Vulsus à rabido Animalis insidius attinet, quantum fieri potest, *Apertum servandum*, & praesertim id, quod de Saliva adheret, magno studio removendum; Quem in finem Vulsus est ampliandum, ut cum Sanguine Saliva potius effluat, quam retrocedat.

2. Quoad *posterius Tempus*, observandum est, ut Venenum rabiosum, quacunque ratione communicatum siue jam adhuc recens, siue jam ioveteratum fuerit, siue ipsam jam Rabiem inducere incipit, per *Appropriata*, vel *sudorifica*, vel *diuretica*, aliisve mediis per experientiam cognitis, extingatur.

Pro his scopis obtinendis, in posterius, scilicet Rabie & id unice agendum, ut Fermentum massam sanguineam jam occupat ex Corpore expellatur. Ea autem, quae hujus Fermenti contraria sunt, & Venenum expellunt, sunt *interna Anaphormata*, tam Communia, quàm speculata per experientiam cognita, quae convenient tam praeservativè, quam curativè. Nam propter rationem Rabiei adhuc incognitam non possumus invenire Remedia à priori. *Appropriata* talia sunt in specie Radix Gentianae, Radix Vincetoxici, Alysson Galeni, Ruta, hypericum, Pimpinella, Carduus benedictus, & in specie Carduus sullenus, Salvia, Betonica, Myrrha, & similia. Ex his serè primum obtinet Alysson *verum Galeni*, quo jam suo tempore GALENUS curavit suos Aegros; quamvis, quid hoc proprie sit? dubium inter Autores existat: cujus tamen descriptionem restauratam videb. in *ultima* Editione TABERNÆMONTANI pag. 928. sub nomine Alysson *primum hispanicum Galeni*. Et hoc Alysson Galeni optimè dicitur experimentum contra Morbum Canis rabidi, quocunque modo corruptum. Uius ejus serè *abolere*, sed male; Nam RE-

NEALMUS in *obser.* suis Essentiam habet Alyssi, quâ ipsa curavit aliquot Aegros à Canis rabido demorlos. Ex his & similibus Vegetabilibus confusus est Pulvis *Palmarum* expertissimus contra Morbum Canis rabidi cap. 3. cujus descriptio est satis nota, & ubique profluit apud Autores, ejusque talis.

26. Pul. Ruta.

Salvia.
Plantag.
Polyed.
Verbena.
Alyssum, vulg.
Mentha.
Artemis.
Melissophyll.
Beton.
Hyperic.
Centaur. min. an. qu. v.
Melle f. Pulvis.

Pulverem hunc Dosis ʒi. ad ʒiij. vel ʒii. subinde demorlos exhibet in Jusculo calido, vel haustu vini, vel cum Theriaca ʒij. & *Empy* acutissimè Curat, expectato sudore, & per 40. dies ad minimum continuat.

Praeter PALMARIUM felicem hujus Pulveris usum expertus est SENNERTUS lib. 2. *Prax. Part. 2. cap. 26. de Hydrophobia*, item TIMÆUS *von Gaidenhele in Epist. lib. 5. Epist. 17. pag. 376.* Pulvis autem hujus tantum tribuere viâ opus videtur. Ex similibus serè etiam connotatum est Euporismum illud infallibile contra Morbum Canis rabidi in BARTHOLOMI *Art. Med. Hoff. Volum. 2. obser. vat. 110. pag. 275.*

Alias Semen Cardui benedicti, & lactei, seu Cardui mariae, & quod praesentius habetur, Cardui sullenus seu Dyspaci, ad ʒii. pro dosi aliquoties mane assumptum expectato sudore, tanquam egregium specificum Experimentum commendatur à LINDANO *super Narman*. Item contra Morbum à Canis rabido Radix Vincetoxici ad ʒij. vel ʒii. cum aqua Cardui benedicti ad 40. dies omni mane propina, laudatur à quibusdam specificè contra Morbum canis rabidi, expectando sudorem. *Videtur*, in quibus assumuntur hujusmodi pulveres, optima sunt aqua scordii, aqua Cardui benedicti, aut aqua Tormentillae, aqua Theriacalis, aqua Rute caprarum, Cancrorum fluvialium, & similes cum Spiritu Theriacali.

Vel

27. Pulv. Rad. Contrajerva.

Gentian.
Pimpinell.
Vinosa. an. dr.i.
M. f. Pulvis.
div. in 4. part. usq.

D. 3.

Pulvis Venenum pellens.

Porrò Terra Sigillata, item Terra Lemnia, & impetum Terra S. Pauli, seu Terra Melitae, eidem internè ad morbum Canis rabidi conducunt. Theriaca etiam & Theriacalis, Mirbridatum, Eleasarium de Ove, &c. præcipuum obtineo locum, & sunt in frequenti usu, à dr.i. ad dr. ii. assumpta. Sed prò his Magistratibus compositionibus prae cæteris Theriacum *Dia-vessum* est præferenda, quoniam ejus quatuor ingredientia, nempe Gentiana, Myrrha, &c. serè sunt specifica contra morbum canis rabidi. Hoc ergo, modo cum opio acutus, erit Remedium maxime appropriatum ad Rabiem. Aliis mixtura simplex laudatur ab HARTMANNO, tanquam Remedium à se expertum, quod propinquum est in tali casu cum copiosa aqua cancorum fluvialium, aqua *Peteri* prout B. D. MICHAELIS Thinsdam Bezoardicum, vel Mistrum simplicem non absque successu, expellendi per sudorem Venenum Canis rabidi, propinare consuevit fuit; item Essentia Theriacalis, cum Essentia abanthii, sed omnia in duplo doli exhibenda; ut

28. Aqua Ther. Hyperic. ʒiij.

Theriac. ʒij.

Thinsdam Bezoard. dr. iij.

ʒij. Lapid. Caes. dr. i.

M. pro doli cum sudore.

D. 5.

Potio sudorifica pro una vice.

Vel

29. Mistr. simpl. dr. iij.

Spir. Canor. dr. i. ad dr. iij.

M. D. 5.

Mixtura sudorifica guttatim sumenda.

K k k k k

Den-

Dentur 60. gutt. pro doſi. Vel
 ℞. *Spiritus Theriacal. camph. 3℥.*
Cancer. fluviat. 3℔.
 M. S. ut ſuprà.

Vel
 ℞. *Theriac. 3℔.*
Salis Alkali. 3℔.
 M. D. S.

Electuarium Sudoriferum pro una doſi,
 Dentur in haſtu Vini acidi.

Ab his autem *Alexipharmaca* per integrum anni quadranteſem non eſt deſiſſendum: Nam ſapè poſt 40. Dies, aut aliquot Menſes, interdum & poſt integrum Annum, iterum ſe prodidit hydrophobia.

Quod ſi vero Sudoriferum uſus intermittat, tamen ſpecifica adhuc aliquamdiu continuanda. *Lapilli Cancrosum* oſiſſimè ex optimis Speciebus ſunt, unde & *Breuer Rabidorum* aduſus: unde

℞. *Lapilli. Cancer. præp.*
Cerui Cerui uſi. præp.
Maſſil. Lucii ſiſſe. præp. an. 3℔.
 M. f. pulvis: S.

Pulvis pro 3. doſibus.

Nam ſi quid aliud, in *Canceris fluviatilibus* eſt via certa & ſpecifica contra Morſum Canis rabidi, jam à GALENI tempore laudata. Recipiuntur nempo Cancrì, non illi, qui dicuntur *Gammari ſeu Aſſici*, ſeu qui caudis ſunt longis: ſed eligendi ſunt ſpectatim Cancrì non caudati, ſeu rotundi, Germ. *Taſchen Krebs*, quales reperiuntur ad loca maritima tam in Italia quam Belgio. Hi enim ſunt genuini Cancrì ad Morſum Canis rabidi à Veteribus commendati: Conf. BARTHOLINUS *Com. 1. Ad. 19.* quorum tamen deſcriptio etiam noſtrates Cancrì fluviatiles, ſeu *Gammari*, ſeu *Aſſici* non penitus privandi loco virtute contra Morſum Canis rabidi, atque ob id penitus rejiciendi, ſed commodè uſurpari poſſunt: Nam loco Cancrosum fluviatilium etiam teſtè Officinarum ſuperiores calcinatæ, ſimili modo applicatæ & uſurpatæ, proficiunt ſunt. Colliguntur Cancrì poſt ortum Canis, ſeu tempore Canicularium, quando Sol in Leonem tranſit, v. g. 12. Julii capiti, & calcinantur vivi, quorum Cineres datur dr. i. veldr. ii. (*ſi exiguè ponderis*) & Pulveris Gentianæ dr. l. & cyatho Vini boni propinat. *Ægro*, expectandobum Sudorem: *Hi Veteres illi propinat*, id quo repeterant tam in metu imminentiſſimo quam præſentia Rabiei. De hac Præparatione, & Præparationis ratione, vid. PALMARIUS *ſeu allegat.* & SCHENCKIUS *obſerv. pagin. 136.* Ne autem ſub Calcinatione Oleum & Sal volatile pereat, loco Calcinationis horum melius eſt, ut tales Cancrì, aſque vivi, *probo conſuſi*, deſtillentur per Alembicum in Mariæ Baño, ut ita accipiantur Aqua Cancrosum, adob à POTERIO decantata in *Pharmaz. Symp. pagin. 47.* Id quod remanet, uſu Pulvis Cancrosum, poſſimodum pro ſua interno etiam uſurpari poteſt à dr. 6. ad dr. i. cum aqua deſtillata propria jam dicta, vel Succo Cancrosum fluviatilium, in ſpecie addito Pulvere Radicis Gentianæ, vel Pimpinellæ: extem. grat.

℞. *Theriac. dr. i.*
Cancer. fluvi. d. m. præp.
Rad. Pimpin. an. dr. 6.
 M. S.

Electuarium Sudoriferum.

ſiſſimè quem pulverem etiam modo dicta Aqua deſtillata, item Decoctum Cancrosum, uſu & Succus, commodè uſurpari poteſt, quæ optima ſunt vehicula Remediorum contra Hydrophobiam. Pertinet hæc *Pulvis Maſſil* eſpectus contra Rabieſem:

℞. *Rad. Gentian. dr. ii.*
Cancer. fluvi. calc. dr. ii.
Terra ſiſſil. 3℔.
 M. f. pulvis.

Huius Pulveris compoſiti dr. i. præbet in decocto cancrosum fluviatilium, imperando Sudorem, ſubinde repetendo. Vel ſecundum HEINRICUM ad HEER,

℞. *Pulv. Camien.*
Morib. an. dr. i.
Cancer. fluvi. d. m. præp. dr. ii.
 M. cum Vin. vel Decocto vel Aqua Cancrosum fluviatilium, & propinat imperando ſemper Sudorem.

Doſis eſt dr. 6. ad dr. i.

Conf. BARTHOLINUS *Med. hiftor. Viſum. 1. Obſervat. 210. pagin. 276.* & SACHSIUS *Gammarel. lib. 2. ſeſſum. 3. pagin. 254. ſeq.*

Præter dicta *Radix Roſæ ſtyroſi* ſeu *Cynorrhodi* jam à antiquiſſimis temporibus eſt commendata. Sicut tamen, qui præſerunt huius Radicis ſpiritum ſeu Eſſentiam Vermiculatum Cynobati, de quibus alio tempore dictum. Aliis experimentum STÜCKERI, quod unaquam cum decocto, uti aſſerit, eſt ſequens, idque contra quocunque Animalium, tam venenatoſum quam rabidum, Morſus:

℞. *Cosinus. pulv. dr. i.*
cum Theriac. dr. i. miſcuit

Tribus diebus continuè, omni mane propinavit, ſimul deſuper per quinque vel ſex horas, ſimul expectando ſudorem, qui ſemper expectari debet. Super morſus uſuſſimè cum Allium, Rutam, & Sal, etæque conſuſa & miſſa in qua Cataplaſmatica, apponit.

Uterius Medicamenta, qua ipſe Canis rabidus ſuggerit, præter ſunt laudata, qua ratione Sanguis Canis rabidi veruſſimè, & per triduum doſi dr. i. uſurpat, certo inſurre Rabieſem & hydrophobiam, dicitur à PALMARIO *ſeu alleg. Item Crines vel Pili Canis rabidi*, quæ præter PALMARIUM commendat SCHMUCKIUS, vel *Cer & Eper Animalis mordentiſſi* decoquantur & Patienti propinquantur vel in pulverem redacta dentur ad dr. i.

Præ cæteris optima cura eſt *Immerſio Ægri in aqua ſiſſilam*, quod Remedium oca expertum: uſuſſimè HELMONTIUS in *Tractat. de morbis* pagin. 278. & n. 43. & 49. Confirmatur etiam per experimentum FORSTII *lib. 20. obſervat. 27. & 28.* item TULPII *lib. 1. obſervat. 20.* quod ſcit rare obſervatio SCHENCKII *lib. 7. Obſervat. recitata* de Mulo rabido in Rhodano ſua inſectis, qui ſic à Rabie ſanatus: ubi plura ſunt Exemplorum Rabierum per Immerſionem in Aquam ſiſſilam Vid. etiam PARÆUS *lib. 20. cap. 14.* Remedi huius prima veſtigia reperiuntur in CELSO, qui tales Ægri a pſcinis incipientes fuerit. Et quidem circa hæc ſolentem notandæ ſunt duo circumſtantiæ:

1. *Ex immerſione immergentis* &

2. Aliquamdiu ita reſurgendi ſunt tales Ægri ſiqua, uſu poſt Terrorem iactum ex ſubſequente imminente ob efficaciâ paſſum Mortis ipſiſſimè: ſicque feliciſſis Idea deſcendit, & animus curatur. Vid. *ſuprà art. 3. Membr. 3. ubi de morbo.*

Immerſio ſiſſilæ ſat his vel ter per ratione circumſtantiæ ſic multi fuerint curati.

Controverſia eſt alias inter Authores, an *emmenagogia* ſit à circa curam hydrophobias & Rabiei: Et notandum, quod per ſe nihil conferat, quia Huores expurgant, & ab habita ad interiora Venenum derivant, nec ſola appropriata Alexipharmaca, imprimis ſiſſilam, ſiſſicuit, & utramque abſolvunt paginam. Nihilominus tamen ſi ſit jam longum tempus, ex quo Æger fuerit comorſus, & tamen uſuſſimè perſeſſit ſiſſilam Rabieſem, ut ſiſſiſſimè imminencia Rabiei ſe manifeſtavit, Æger quæ tali non curatur fuerit, in his & ſimilibus caſibus pro metu ſubſequentis Rabiei feliciſſis tollenda, utilem commendat cathetiſis per ſuperiora aut inferiora, ſcilicet helleborum album & nigrum, item Agaricum, oportet quæ vim ſimul alexipharmacam habent: videb. SENNERTUS *præf. lib. 1. par. 2. cap. 16. Quæſt. 3.* Nam teſtatur eſſe jam ſuo tempore DIOSCORIDES, Cathariſis his tantum opem ferre, qui jam hydrophobiam ſeu Aque Maris incipientem tantummodo ſentirent: Et ſumpto Helleboro ſimul ſe primam Morbi impetum experirentur, cum impetu expurgati, ſimiliter certa experientia fuerunt ſervati. Si quidam referunt, uſuſſimè canes rabioſos helleboro cum Polenta accepto veniſſe, & ſimiliter à Rabie liberatos ad ſe reſidiſſe. Hinc poſt Helleborum etiam Hiera, quæ colocynthidem recipit, uſuſſimè pro commendatur. PALMARIUS aſſerit, ſiſſimè multo noſſe Roſticis, qui propinato pharmaco vehementer, ex uſu eſdemque opera ſuprà & inſiſſimè ſuperſuſſimè omniſſiſſimè ex corpore excluderentur, ab hydrophobia exſtrot.

Poſt purgatiâ facinoræ hæc ſimilaliquid *ſerſilam duriſſimè*, per Uriam, præterit crenant. Virus alternatè & eliminantiâ: quæ inter Valeriana, imò *Cantharides* viſiſſimè ſpecificam obtinent. Hæc AVICENNA commendat contra Rabieſem & hydrophobiam, uſu etiam aſſerit, ſi Rabidum exiſſimè ſanguinem miſerit, ſecurum eſſe ad hydrophobiam. Quibus vulgo noſtrates ſcarabæos Majales, & Vermes Majales ſubſtituunt: Vid. SENNERTUS in *præſcriptis. 2. lib. 1. ubi de Rabie pagin. 440. & 441.* Remedium AVICENNAE baſtenus apud præſentis ſepulchrum eſt, cuſus tunc mentio ſit in M. A. N. C. Anno 3. *obſ. uſuſſimè. 133.* & in *append. pag. 32.* ubi cantharides ad Ungaria in Aceto ſiſſilam

limo aservantur, & postmodum No. 4. y. vel 6. in haustu Spiritus Vini contra Venena subolorum Animalium sine Dysuria aut Miſſa sanguineo propinquantur; unde saltem per fortem Diuresin liberati sunt. Horum tamen c. l. dosi à nobis non imitanda, quoniam Hungari fortioris sunt idiosyncrasie: sufficit, quod Cantharidis via quasi specifica sit ad Rabiem; scuti etiam in dictis M. A. N. C. Ann. 3. obser. 702. pag. 322. profant exempla Rabiei beneficio Scarabaeorum aut Vermium Majalis curatae. Alii recipiunt Cantharidis vel Scarabaei pulveris, cum Mellis miscere & aservant, & propinant ad ℥i. Vid. SENNERTUS l. 4.

Quod Vultus à rabido Animalis infestum attinet: hoc ipsum dum recens est, non statim claudendum aut sanandum est, sed aliquandiu apertum servandum, vel amplandum, quantum fieri potest, ut cum Sanguine Saliva potius effluat, quam retrocedat; ac id, quod de Saliva adhæret Corpori, licet non vulnerato, diligenter offendi & magna cura est removendum, ut omnis Virulencia beneficio Tumoris, Inflammationis & Suppurationis ea ipsa loco eliciatur. Et quidem in specie maturanda sunt Anticia Chirurgica; nam si primis statim horis ac diebus fuerit adhibita, ut Virus malignum cito extrahatur, alio tempore incassum ferè adhibetur, quando scilicet Virus jam ad interiora penetravit. Ob id statim est properandum, & imponendi sunt primò Pili Canis ipsius rabidi, qui tanquam singulare Experimentum Vulneri, à Cane rabido infuso, apponuntur ex PARAO, ut Venenum magnetica vi extrahatur; id quod etiam confirmat SCHMUCK in Curatibus magis magnetici pag. 38. Vei Theriaca cum Succo Rata & Allia subacta, Morſus Canis rabidi etiam utiliter imponitur: conf. WEDELIIUS de Med. Facult. Præ cæteris nempe Cepus sub cineribus assatur, & Capæa Vulneri imposita, multum conducunt, præmissa in loco affectu Scarificatione. Sic enim AMATUS LUSITANUS Caus. 3. caput. 35. Puerum duodecim annorum in Cruore à rabido Animalis demorsum ita refecit, dum accersit Chirurgo locum laesum profundioribus incisuris sensibilare, & calido Vino vel Aqua salina lavare jussit: hinc loco optime affecto hoc Cataplasma admovit:

℥i. Cepum. acris No. 1.

Allium Capit. 3. radicum mediam.

Theriacis opt. ℥ss. ad ℥i.

Termenis ℥ss.

Omnia pistentur, & loco affectu forma cataplasmae supponantur; quibus Puer brevi sanatus est.

HELIDÆUS PADUANUS, præmissa loci scarificatione, Cepum cum Melle coctum simpliciter imponit: vel loco Mellis Cepum cum Theriaca subactum, & ita Morſus applicat, aliquot dies coctando. **HORSTIUS** lib. 7. obser. 23. commendat Emplastrum ex Allio, Sale, & Terebinthina. Sunt, qui Cataplasma his Scordium & Semen Sinapi addunt: v. g.

℥i. Morſ. Rata.

Sord. an. M. l.

Rad. Allii ℥i.

Coqu. in c. q. Vinæ aut putrilagineis

add.

Pulv. Rad. Gent. rubr.

Arſſol. rom. an. dr. ℥ss.

Rem. Sinapi dr. iij.

Mellis dr. vi.

M. f. Cataplasma.

Conf. **HILDANUS** Caus. 1. obser. 27. & **LOTICHIUS** Caus. 6. cap. 1. c. 5.

Scarificatione profundè facta fiat, nisi loci conditio, v. g. ratione Valsum subiectum, hoc impediatur. Alii lepor Animalis imponunt, vel persem Carnis. Quo & Columbarum vitæum & dilatatæ applicatione pertinet. Quidam Lig-

mentas magni estimant. Præ cæteris insigniter etiam conducit Emplastrum Magneticum Angeli Sala ex Magnete Artificiali paratum, supra lib. 7. obs. de Febre, descriptum; scilicet post Scarificationem Vulneris, sanguinisque per cucurbitulam extractionem, loco demorſus applicatum, & impositum vel locus scarificatus eluendus est cum spiritu Vini theriacali aut camphorato, aut Muria, aut Vino, aut Aqua salina, aut Decocto fœrdii & Radici Gentiane cum Vino aut Aqua parato, cui salis, vel spiritus salis, parum addendum sit, & hinc Emplastrum Magneticum applicari, vel solitariū, vel etiam ℥i. vel ℥iij. Pulveris Cancrorum fluviatorum siccatorem aut calcinatorum potest admisceri; continuetur, quotidie repetendo bis: vid. AGRICOLA in Chirurg. parva pag. 412. Quid si velit hoc Emplastrum magneticum Dolorem vel Inflammationem, vel eroriationem excitare, tunc optimum est, ut saltem oleum scorpiionum vel Hyperici cum saccharo saturni mislum, vel unguentum Nutritum, aut simile saturninum, circa Vultum illatur, vel recipiatur Oleum Cere, addatur parum Sacchari Saturni, & ita illatur, istudque Emplastrum repetatur. Vel imponatur tale Emplastrum:

℥i. Cere Rvi.

Ol. Olivæ.

Servi Rviii. an. ℥iij.

liquis illis add.

Thuris elect. ℥ss.

M. f. Emplastrum: S.

Singulare Emplastrum.

Alii imponunt Emplastrum de Ratis cum Mercurio, vel Ceratum Dia-Diagmani, quod sacrum Galeni aliis appellatur: v. g.

℥i. Ceras. Dia-Diagman. Galen. ℥iij.

Pulv. Cæter. sordiat. dr. iij.

Cam C. q. Ung. de Litharg. f. Emplastrum:

D. S. ut ant.

Verum promptissimum Remedium Externum est ipsa sui affectu cum Ferræ candente, seu Cauteria actuali, cum Uſſio omne Virulentiam penitus destruat; hoc enim securissimum & tutissimum Remedium est curandi Morſus Animalium rabidorum; de quo, præter alios, vid. **HILDANUS** Caus. 1. obser. 24. 25. 26. 27. & Caus. 2. obser. 97. qui hoc didicit à Empirico quodam, qui omnes Cane rabido demorſos sibi hoc Cauterio actuali feliciter refecit, & reſt: Uſſione enim penitus destruit ipsa Virulencia, & feminalis eras Virulencia maligna tollitur, modo conditio loci affecti id permittat. Simili modo ad morſione Ferramenti igniti citra Uſſionem curat **BOYLE** in Philosophia Experimentali Morſus Viperae. Quod si verb tardius talia Externa administrentur, aut, si consolidato jam Vulneri, Rabies postea superveniat; optimum est demò scarificando aperire locum, cucurbitam cum magna summa applicare, & præter dictam Elatæonem, Morſum cæterio actuali profundè factis, imò diversis in locis, adungere; Uſſione vero loco spiritus Vini theriacalis, aut in quo aliquid Theriacis solutum, cum Godylio imponatur, ac Vulneri cataplasma modo descripta instillantur: sequenti die incidenda est Elatæa, undique eadem Topica continuando, usque dum illa lecedat: quo facta mediante Pilo Uſſio per aliquot menses apertum servetur, singulis septimanis bis vel ter mercurium sublimatum simplicem, vel compolitum **HILDANI** Caus. 1. obser. 27. descriptum, inſpergendo, & fodiare interdum propinando; si quidem, ut supra monitum, validas in istis loco Pandionæ tunc sentiant. Imò placet consilium **SENNERTI** lib. 7. Præc. vi de Ratis, ut quocumque tempore Fœntialis in aut proximè loco affectu excutatur, ac continua illa evacuatione quasi revulsoria Venæ Naturæ opem feramus.

Hæc de Morſu Canis rabidi, & inde nata Rabie. (P)

MEM.

(P) Difficillimum sibi expetiam est præcipuum Rabidorum symptoma, Aquæ scilicet metus. Quoniam autem de hoc negotio aliquis olim commentatus sumus, subest integrum de Rabie & hydrophobia dissertationem his adnectere.

DE RABIE ET HYDROPHOBIA.

Rabies, Græci nomen dicunt propriè Furor ille, quo canes præcipuè percipi hæc illac irrequieti agitantur, ac obvios quoscunque Morbos adoriuntur: idque Malum dictum præsertim canicularibus suis accidere solit. Sæpius eodem Morbo & Lupi, atque alia etiam Animalia affici, ut inferius. Inter Affectiones autem Homines infestantes commovere Rabies dicitur Delirii species furiosa, qua Homines à rabido Animalis demorſi prehendantur, quoniam, præter horrenda multa symptoma, capulari fœtore Agri quæ formido, quam Græci Hydrophobiam vocant. Cælius Aurelianus phobidion appellat, quod cum timore fœtorem Agri, atque etiam Cynolyssam, quasi Rabiem caninam. Quare scilicet quod, ut vult Rabies cum Hydrophobia, nempe cum atrociori ejus symptomate, confunderetur.

Tom. II.

Kkkkk

29

Est igitur Delirium, & quidem furiosi, species Rabies: ea enim affecti in animum profus feraciam prouocant: vel potius est Delirium mixtum ac Mania & Melancholia, nam simul Bessia, cuius Morfus in furorem alii sunt, imago, pra oculis videre videtur: imo iuxta qui se putant in Animalia illa conuersos, quorum Morfus passim fure, ac proinde vel Cani latratum, vel Lupi ululatum, vel Feli vocem emittunt, si d. Canis, Lupo, vel Feli furoris commotus. Sed mirabile est quod narrat Boetius Centur. 3. Obsecro. 68. de quodam d. Canis rabidi demorsu, qui Canem sagacitatem variis iuribus, accedentes amicus etiam d. linguas subleuabat. Animala uertendum tamen est, quod d. quomplurimis notatur Scrip- toribus, quoniam scilicet rabidus non delirasse, sed mente ad mortem usque constantem, propriis de seipso miseria, casum d. Medici implorasse, ac ne adfantes impetire ad ipsos accessu lateretur caute. Vide praeter Aetium, Horiolum, Salium Diuerium, Codronchum, Nicolum, Caelium Aurelianum, Ponicam, quos citat Scalparius Vander wiet Centur. 1. Obsecro. ultima, Sennertum Inst. Medic. lib. 4. part. 3. Sect. 1. cap. 7. & mirum horribilique Historiam qui Hunaultium tract. de Rabie, ejusque Remediis.

Symptomata Rabiem comitantia sunt imprimis Fure, Anxietas, Metus, & praecipue Aque, imo omnium liquo- rum & transparentium Corporum: Vigiliis per omnibus vexatur agri, nec Somno quiescent nisi per lassitudinem, Spasmi in Pharyngis afflatus perterriti: nonnumquam veluti Stupidi erodunt: frequenter in Leptogymis succidunt, frequentius autem in Motu convulsus Tremoreque universi corporis: hac illas palantes aberrant, nec stare nec quiescere possunt, se- rent in motum hoc illuc & frangit agitur, Oculi sunt torvi & afflicti horridi: de Aurium tinnitum, atqueque sui- tem viscum in oculis conuertere, Pusum tamen vel nomen ipsum referendum: Feli denique & quidem Ardorem tenetur, tamen quidam A. d. Rabiem iuxta Feli Ardorem committunt.

Autem in Causam huius Morbi inquiremus, videmus primi, quod Animalia Rabie sponte tententur, ita ut Morfus possit illam in alia transfundere. Galenus 6. de locis affectis 3. expressit ait, Cani tantummodo Rabiem acci- re, his verbis: Quoniam enim Brutorum nulli superuenit Rabies, Cani haec soli accidit. In eandem sententiam iu- re naturalis, & ejus Fracastorius de Morbis contagiosis cap. 10. Quam autem Experientia curvarum docet, hinc so- lum est, ut quidam Galeni famae consules dicant, illius sententiam esse, ut inter omnia Bruta Animalia Canes uoluptu Rabie affici consueverint: quidem vero cum Mercuriali var. Lectionum lib. 1. cap. 2. putare Galeni remissum tamen in quoniam alio quam in Canis Rabiem immittit.

Experientia inquam contrarium docet. Nam de Rabidi Lupis res est vulgarissima, sic Theophrastus & vbi alibi notat & Jo. Baubinus peculiarem Tractatum edidit de Lupis quibusdam rabidis circa Mandeburgum, & Biffertum graffantibus. Felem Rabie affici quompluribus testatur, imo infra se sub oculis, non multis ab hinc annis, Jurensi d. rabida Fei in manu demorsu, post 40. dies Veneti vir expertus mortem obiit. Prater legimus Equos, Porcos, Boves, Canes, Vulpes, Ursos, Simias, & quae non animalia? Rabie corrupta esse, ut videre est apud A. A. Mulus rabidus apud Senekelum lib. 7. Obsecro. notatur, qui flumina tranavit, ac affarum Aquam potius sumens fuit. Gallus gallinaceus resu- Huminem feriens tertio post die d. necis talis, ut quod Bartholinum Cent. 5. histot. 5. hinc huius:

Dum foris in Domum Gallo, perimique Venam
Centumfessum, ergo alius non Basiliscus erit.

Ubi autem notandum hic est, quod quomodo vultu praesent Historiam Animalium Rabie effectum: haec semper tam- enest, non ita sponte in Rabiem alia fuerit, ac praevio alterius Animalis rabidi Morfu. Sed quid si d. Fei Canis sunt primus in Rabiem alio reliqua Animalia & Homo ex se Morfu Rabiem contrahit? an non vera est sententia Galeni? Tamen autem illi d. Bruti Animalibus d. quompluribus conceditur, quoniam tamen instituitur, non Homines sponte, dicit praevio rabidi Animalis Morfu, rabidi evadere possunt, atque Aquam feruidare.

Sunt huius Historiae d. gravissimi A. A. res, huiusmodi qui in Rabiem, & Hydrophobiam inciderunt, atque in pui- illis anquam rabida Bessia memorerit. Illas legere praestitit apud Marcellum Donatum, Petrum Salium Diuerium, Ce- lium Aurelianum, Parum, Platerum, Zacutum Lusitanum, Schroekium, Rhodium, Boetium, & pau- lio apud Salmuth Cent. 3. Obsecro. 31. qui refert brevem Patavensem malignam Feli afflicti ad omni Patu omnino abortivi, esse legem oportere valde curare. Et quidem si vera sunt Historiae, praestitit esse quippe ratio d. Philosophiae popularis: quomodo enim cum gigni possent in humana Corpore Homines eris quibusdam Venenis haud asiniles? Cur non putaret nos- rales Succi non mutaverunt subire, quod Venno rabidarum similes evadunt?

At sunt qui putant ex adverso, tale determinatum & speciale Venenum, quod Hydrophobiam excites, nullo accedente Contagio, in Corpore humano generari non posse, ut hisse verbi faciat Scalparius Vander wiet. Et revera haud rationi congruum videtur generari posse in humana Corpore Venenum Venno Vipera alio simile, ut possit etiam in- fuso Morfu transmitti ex Homini ad aliud Animal.

Quare ut integra manus sit, valuerim A. A. dicendum erit, vel quod Morbus ille sponte Homini- bus superveniens vera Rabies non fuerit (quod Aquae feruida in Delirio, quod Rabies non sit, possit Homini accidere), sed Morbus alio autem Ra- biem simulari. Vel quid revera Homini illi ab Animalis rabidi demorsu fuerint, atque ab Morfu levis, vel tempore longum spatio, quod inter Morfum & Rabiem intercessit, haudquaquam reputatum sit, Rabiem d. Morfu alio utrum habebit, sed postea huius exortum. Venenum enim hoc per multos annos latere potest, ut infra.

Quod forsitan in Causa fuit, cur apud Antiquos ac Aristotelem de Rabie & Hydrophobia saltem mentionem non reperimus: quod nempe Homines multo post tempore ab infuso Morfu, Rabie Symptomati corrupti, alio praevio consilio Morbi crederentur, quod d. Morfu rabidi Animalis orto. Ni dicere velis cum Plutarcho 8. Symposiaco, probl. 4. Hydrophobiam, & Elephantiam Morbu fuisse novo tempore Asclepiadis, qui sub Pompejo Magno Roma fuit. Et revera nullum Rabie & Hydrophobiam mentionem saltem invenimus apud Nicandrum de omni- bus Venenis differens, & apud ipsum Hippocratem, qui Morbus annis in Epidemiis, & alibi accuratissime recensuit. Vide Mercurialem lib. 1. variarum Lect. cap. 4. Sunt tamen qui putant cum Caelio Aureliano, Brachypotas Hippocratis, hoc est modicum bio- ter, esse Hydrophobos, seu Aquam feruidantes.

Sed in morbi huius Causam inquiremus. Quomodo innumera sint de hac re A. A. Sententia, in se tenent em- conventionem, Rabiem nonnisi a Venno ortum habere, attamen scilicet Morbi vehementer, utaque citissim & feri- vabili discriminare. Praeterea hic loci alteram Opinionem referre, qui primis Elementorum qualitatibus philosophant in summo Calore: summaque Siccitate huius Morbi causam repenti debere afferunt: Nam & ejusdem Sella afflicti ste- gan, ex eo tempore, quod Venenorum natura minimi in primariam Qualitatem excelsa consistere possit: credunt nempe Ve- nenosus morbos a tota substantia (ut loquuntur) pendere. Atque hoc Argumentum Galenus 4. de Simplic. Medic. fi- eult. Pelopem somnum Siccitatem in Rabie praetendunt reprobant. Praeterea quod Heclii, quoniam corpora tene- ram Siccitatem contraxerunt, nequaquam in Rabiem incidunt, Quam autem Morbi d. tota substantia pendente, ab acuta Qualitatis pendere videtur; attendamus nam claris Venis Rabiem inferentis naturam investigare possumus.

Venena fere per O. affluunt, five extrinseca Morfu, vel quomodo alio modo Corpori communicata, vel ledere possunt Solidas, vel Fluidas inficunt, vel demum turbant Spirituosas. Partes Solidas quomodo d. particulis Venis commo- unt, &

eor, & lacertant, nunquamque rigescunt, & torpent. Partes vero Fluidæ vel particularum venenarum commixtione fluidiores, & agitatiores, vel contra fixiores redduntur, & ad coagulationem vergunt. Denique Spiritus ipsi animales in Corpore imperum facientes, si cum particulis Veneni communicantur, vel motum pro vita conservandæ necessarium amittunt, vel in funtione agitatiorum, & motuum animalium adiguntur.

Quantitas insuper sunt quidam Veneni, quæ speciali figura, magnitudine, & motu particularum, his potius partibus Solidis, non illis tantum infusa, hoc est vel Cerebrum, vel Pulmones, vel Vesicæ latentes potius, quàm alia Corporis organa; Sic quippe sunt & Venena, quæ peculiari item figura, magnitudine, & motu particularum, Sanguinem inficere possunt, non Lympham, vel hanc potius, quàm Salivam, aut Spiritus ipsi animales turbare aptiores sunt, quàm reliquis in homine Corpore Humores.

Expendenda igitur est natura Veneni Rabiei, ut scilicet innoscatur, non illius particula maxia sine Partibus Corporis Solidis, ac vero Fluidis, vel Spiritibus: atque insuper quoniam specialia Vitium partium Solida, Fluida, vel Spirituosa Corporis ex aliis particularum venenarum, hanc morbum excitantium, contrahunt.

Sunt qui putant cum Plinio H. N. lib. 29. c. 5. sub Lingua Canis Vermiculum gigni, à quo Parus & Rabies, qui si in Catulis tollatur, nulla unquam suspicio Rabiei. Id negat Caspar Rejes in Campo Elyfio quæst. 62. num. 1. Aldrovandus ait, non Vermiculum esse sed Plexum nervum. At Jo: Jac. Maagetus in Additamentis ad Boneti Anaton. Pract. lib. 1. Sect. 8. Observ. 3. addit, multum Vermiculos inveniri in Cerebro rabidi Canis. Sunt qui in Renuis Luporum Joviarum Serpentes gigni credunt, à quibus in rabidum furorem aguntur. Sed hæc vel falsa, vel alia vera sunt, ut enim Rabiei convenire hæc possint.

Sani si attendamus ad singula Rabiei consequentia Symptomata, evincere facile poterimus, non solum partes Fluidas, Spirituosasque, sed solidas quoque à Veneno ferocissimo lædi & corrumpi, ita ut universa animalis Oeconomia præter passundatur, ac Vita tandem destruitur.

Quoniam autem Humores omnes summum à Veneno hoc patiuntur vim; nihilominus valde rationi & experimentis consonum videtur, Salivam inter reliquos Humores indolem tantam acquirere, vel in Canes, vel in quoscunque alios Animales, quod primò rabidum evadit. Symptomata enim ab initio Rabiei Canis committuntur, ut hinc Ore hæc illas ferat, Lingua livida sit & nigra, atque ex aridis faucibus extra se propendat, læta spumosaque Saliva ex ore & naribus abhorat eruitur: ut advertit Parvus lib. 51. cap. 56. pag. 490. Quæ quidem immane Saliva Vitium imprimi significant. Præter nonnulli Morfus, hoc est Saliva in aliud Corpus transfusione, Canes ex reliqua rabida Animalia Rabiem communicant. Hæc ne nullum Animalium Morfus venenatus sit, nisi cum Ita coejugetur, ut adhorit accuratè Martinus Lister tract. de Hydrophobia.

Hunaultius tamen Dissertatione peculiari de Rabie ait, naturam hujus Morbi consistere in evolutione & fusione excedenti Salium acidiorum, & in extrema rarefactione Bilis, unde oritur Deglutitio volens, ex qua erasalis veluti universi Corporis, & Symptomata eveniunt profusa. A qua opinione vix deflexit videtur Struvius Jo: Ravellus tractatu item peculiari de Rabie, qui offert Fermentum Rabiem foveas consumens esse ex particulis tenuibus, solidis & fabris, & præter ignem, quorum aliis animalium Corpus inficitur, & veluti in ignem abit.

Sed quid vixit qui eat in Senectute Dom. Taurvy, qui putat Salivam & Bilem simul esse Humores venenolos indolem primò infestus? Rabidus enim utrumque Humorem venere solet, (unde Fœcibus argus Eshophæi phlogistis & corruptis), atque in fundo Ventriculi similes Succos contineri, quemadmodum Cystim solentem Bilem Bilem referunt esse, Anatoem ostendit. Hinc à Cibis averfus, qui nisi maxime cum dolore deglutiri amplius non possunt: Petus autem & liquidiorum omnium affusio ex quoque ratione multo Aegris evadere perill, quod à Putentis maxia Salia, in Saliva & Bile introibit, dissolvatur, ac dissoluta Morbi ferociam adaugeant.

Venenum hoc in Saliva & Bili violentia fundatur, non solum in Ventriculo, primoque vix vim suam exurit; sed etiam Visum imo Ventræ contentum cum Sanguine commiscetur; & quapropter universum illud diabolus continetur, nihilominus, ut videtur, vix præcipui facit in Succum ejusdem rociidum, balsamicum, & auritium, quem earius diffusus atque attenuatus, ac Corpori amplius non nutritur, ac Vena Nutritiva defectu calcifica angustior redduntur, neque facilius amplius concedunt transire Sanguini, quem ab Arteris excipere debent. Quapropter Sanguis arterialis, quo ex dissolutione & fusione Sacri nutritii facti erat dissolutus, cum liber in Venas permeare non possit, majore copia in Arteris continetur, & diutius quàm par est: hinc indefinenter comprimitur & agitur, ut ejus particula quod minime remanentur.

Hæc Sanguinis morbosa constitutio supposita, patet quid confendum sit de Cerebro, & Nervis à Cerebro dependentibus: concipimus enim Cerebrum & Nervos, quoniam raris parte Sanguinis non amplius irrigantur, summe exiccati, & Fibras omnes Corporis incredibilem reactionem acquirere. Præterea cum Sanguinis massa, in morosisque partibus comminuta, videtur tota in Spiritualem materiam commutata, Spiritus est Sanguine confectum & summa rapiditate versus Cerebrum rapiuntur: unde haud difficile est colligere Convulsiones, Deliria, & Furoris Causas; Anima enim sedes motus igne prebenda est.

Undeque hæc Rabiei Theoria videtur non tam Symptomatum prius recensentium expostione, quàm Anatomica autopsia confirmari: etenim in Cadaveribus Hominum & Brutorum Animalium Rabie demeritur, Pericardium feri semper Aqua carere observatum fuit, Pulmones & Vesicæ reliqua prius exiccate, Eshophæus & Tracheæ eundem inflammatione prebent, Cordis substantia externa & vena bore carent, & similia: ut videtur è apud Bonetum Anat. Pract. lib. 1. Sect. 8. Ni dicere velis, ex Petus caretia tantum in Corpore asserim indolem esse, ut ait Salpatrius Vander Wiel l. c.

Sed quod maxime propensum Hyperbesim confirmat, est Observatio ejusdem Dom. Taurvy, qui refert in Rabido Cadavere Arterias deprehenas esse Sanguine valde liquido repletas & prærias inflatas; contra vero Venas vix Sanguinis satiguum portiones continere. Ulteriori nupsum Sanguinis in universo Corpore coagulatus invenimus fuit: imò ex eodem extravasatus atque aeris frigido expulsiis haudquaquam concretis: quoniam catenæ Sanguis ex eodem Rabido ante aliquot dies, cum adhuc inter vivos esset, plurimum adhuc facili coagulatus fuerit. Denique in eodem Cadavere Cerebrum omneque ejus partes, erant multo fictiores quàm secundum naturam, quemadmodum & principium Spinalis Medullæ, omneque Corporis Musculi. Hæc habemus in Historia Regie Scientiarum Academiæ, an. 1699. pag. 55.

Hæc non tam in Canes, qui primò in Rabiem altus fuerit, contingunt, quàm in Corpore illius qui à rabido Canis fuerit demorsus, communicato scilicet Veneno per Salivam Canis in Sanguinem, & reliquos humores Animalis commixti, præcipue autem in hujus Salivam & Bilem, qui humores ratione similitudinis particularum, ex quibus componuntur, aptiores sunt quàm reliqui ad vivendum Virum suscipiendum, illudque servandum, ac reliquo Corpori communicandum.

Quamquam autem Modus propagationis hujus Morbi familiarissimus sit per rabidi Animalis Morsum, seu commixtionem Fermenti venenati cum Sanguine primò, non cum reliquis humoribus factam; non desunt tamen exempla Rabiei aliter ac per Morsum in uno Animalis in aliud communicata. Referente Fernelio lib. 3. de abditis rerum Caudis cap. 14.

p. 309. Venatores quidam in Lupem faciliorem irruerunt, trucidatum in varia obsequium generis apparuerunt & ceteros; i. canes quicunque istarum non multo post tempore Rabie correpti fuer. Sic ex Jo. Baptista tractatu de Rabie Luporum, canes Porci à rabido Canis demisso à scitello quodam convulsio edenda apposta illis in Rabiem egerunt, ut mutui transmissi fuisse dixerint. Idem narrat de Vulpibus canibus factis quod suis rabida carnes comedissent. De Pute rabida canes fuisse narrat Kircherus de pesteliquae. Vide Sennertum de Febribus esp. 3. 454.

Saliva in super rabidi Animalis non tam morfu in sanguinem alterius transmissa Rabiem inferi, sed solo Contactu (si huiusmodi credendum est) Morbum tandem non semel iniecit. Docuerunt post Galenum 6. de Loes affectis 1. Aetius, Zacutus Lusitanus, Sennertus, Parvus, Hildanus. Ex Palmario rabido Rusticus Rabiem in Filios transmissi ex eo tantum, qui moriturus extremum illis fuisse voluisse iudicant. Ex Matthiolo lib. 6. in Dioscopo cap. 36. duo rabidi facti sunt ex solo contactu Spuma ex Ore rabidi Canis effluens. Ex Hildano Cent. 1. Obs. 86. pag. 62. Materna quoniam possem à Canis rabia Lactatam filio committere, ac filium dentibus abscindere, in Rabiem post tres menses incidit.

Nec desunt qui solo Halitu posse Rabiem à Corpore in Corpus transfundere crediderunt. Cuius sententia fuit Aretaeus, Caelius Aurelianus, & ipse Cardanus: immo scribit Dioscorides lib. 6, cap. 36. Medicum Themisonem dum rabido melle daretur Amico, simili contumaciter fuisse lahe.

Ad id negant cordatores Medici, baud credentes Venenum adeo volatili Naturae esse, ut possit per halitum transfundi imò nec Salivæ vel spumæ translatum, nisi tamen Cutis in aliqua parte Corporis laesa sit, & vulnerata, ut possit Venenum cum Sanguine committere. Huius sententia fuit Petrus Salvius Diversus, Amatus Lusitanus, Fracastorius, Conciliator, Condronchus, Rudius, & ipse Fernaeus lib. 4. de abditis rerum Causis cap. 11, ubi ait. Non enim rabidi Canis solum halitu contagione quemcumque polleat, sed in partem demorfu apertam, & Salivam vel humorem eruat, cum quo virus illius sensim in omne Corpus evadit: in integrum verò Cutim si incidat, nihil efficit.

Nec omittendum tamen est, quod curius inquit Martinus Lister de hydrophobia, quod scilicet spem Salivam Rabie communicari possit, & abique vulneri, ut quidem putant, Cur non & per Semen poterit ex parentibus in filios transmitti? Et in Rabiem inter Morbos Hereditarios commemorat. Quatuor autem non semper in Liberis per hydrophobiam nascitur, cur non etiam infans Amoris Causa esse poterit, qui empori immixtus in Canes feruntur, atque cum magis genitri sibi consuevit, amicisque in deliciis habent, neque vivere nesciant abique haren Bellerum consuevit.

Sed his emissis illud expendendum est, quomodo Venenum hoc Morfu conceptum in Corpore latere possit, ut postea tanta cum vehementia erumpat. Et quidem Venenum rabidi Morfu cum semel conceptum est vix ante trigessimum vel quadragessimum diem sensim excutitur, ut vires acquirere cuncto vehementia postmodum erumpat & manifestum evadat. Quamquam autem hoc tempus spem symptomatum sua expromere solent rabidum Firum; nihilominus differunt huiusmodi, quæ rabidi narrant post quintum, septimum, decimum mensem à Morfu factis. Galenus post annum intermiserat: Horstius, Salmuth, Salina, Zacutus post quintum, septimum, & duodecimum annum: Simile quid habet Dioscorides & Avicenna. Brassavolus testatur post decimum septimum à Morfu annum Rabiem supervenisse. Schmidius post vigesimum, Borellus post trigessimum, & Alazaravius autem integro quadraginta annos in Corpore rabidum latuisse Veterum. Elegans tamen est quod legitur apud Hildanum cent. 1. obs. 86. de Materna à rabido Canis commissa, cuius potentior auxilium illius tractatus fuerit, in Rabiem tamen incidit septimum post annum: Remediis adhibitis restituta, vel alius septem annos iterum rabida evasit: ex post sexennii intervallum, hoc est vigesimo à Morfu anno demum in Rabiem recidit, cuius symptomata ante sequenti semel, deinde proximi sequentibus duobus annis bis & ter recruduerunt, sed brevioribus & brevioribus paroxysmis; ita ut misera Mulier à senilis recidivantis Morbi adeo frequenter confusa, Mortem armarum amicum remittens exspectaret.

Quomodo autem Venenum adeo potens tandiu in Corpore consensum delitescere possit, hic expendendum, & hoc intelligendum illud notare oportet, quod Fermentorum omnium particula, est remissa & ceteris mori alla, si cum volatilibus aliis & solidioribus communicatur, postmodum ea ratione emittit, ut ad longum tempus delitescat, & veluti in seipso interire faciat: quamvis autem dicitur occasione, motum sensum nasciturum, ad primum vehemenciam aliter evadere, & amplexum indubium adfertur. Sic videmus Fermentum Ferrolarum & Lini Venere ad annos nonnumquam latere, quousque, dicta occasione, in apertum producit, ac inexpectatum effectum producit.

Poterant igitur particula venenata Saliva Canis rabidi, Morfu in Sanguinem hominis vel alterius animalis communicata, si cum ejus particulis crassioribus committere, & involvi, ut vel motum omnino amittat, vel si quem conservet, adeo abito de se sit, ut nullum sensibilem inferat noxam. Cum vero tempore tractu sensibile Veni particula manifestum motum acquirat, vel qui potius non moveatur, motum quousque ex causa alioquinatur; tunc sensum excitat in Animalis corpore turba illa, quæ prius descriptimus, adeoque rabidi Ferri vi manifeste se prodit. Quod si facilius fieri crederetur, si commixtus rabidi Fermenti particula esset exigua, esse tamen non mediocriter soliditatis: atque hac ratione, & quæ est indubie solidum corpus) non tam prompti ad motum disperi, sed cum semel in motum illa fuerint, illum maximo gradu concipere & diutissime conservare.

Manifestatio autem hujus Veneni citius vel tardius accidere potest, vel pro majori vel minori Fermenti Morfu illi sit altior, vel pro varia Corporis Animalis demissi dispositione. Si enim in hoc Sanguine tamen praediti sit diutius, Spiritus agiles impetu faciente; tunc particula Veneni in promptiorem materiam irruentes, non solum ac igni facillime in ad id faciem, citissime morbum inducunt: contra vero, si contrarium nalla sit corporis dispositio. Quamvis autem autem ad id scire potest Ciborum variorum usum, Potus diversus; Anni tempestas, Terra regio, Animus passiones, similesque casus, ut considerari poterit potest.

Sed ut à parvi physiologica huius Tractationis ad Pathologicam transeamus, expendenda sunt non tam Signa Rabiei ab homine jam contrahit, quam illius in Canis prius gignenti, ut scilicet motum Animalis canis motu passum. Canem quæ Rabie affectum huius Signis deprehendere poterimus ex Parro lib. 21. cap. 16. Ad Apna consensum contrahit & burpulentum pariter (est nullum negens Canes & reliqua Animalia, prater hominem, fieri hydrophobia); Oculi flammæ & lucidius tunc innotuit: ex hinc & ipsius ore Lingua livida & nigra vulnere propendit: incertum tenet iter, ac veluti drit in obvia Corpora incutit, ac in terram prolabitur: Si quid obijciatur, sive Homo sive fera, sive arbor sive Morfu alius Canes illi illam omnino subdantur, & quæ possunt citius subditi evadunt: nec comedit nec bibit, nec laetatur edit: Anterior habet pendula, & Caudam inter Crura descendit: denum nec Dominum, nec Dominum agnoscit, nec illis quousque familiariter egredit.

Signa vero concepta ab Homine & mox erumpentis Rabiei, hæc ex Caelio Aureliano colligit Martinus Lister de hydrophobia. Incipit anxietas quædam & iracundia ex brevi quousque occasione: insolitus motus, & ad incendium usque desiderium: Severi levis & perturbati, membrorum paniculatio & scitatis iugis. à ventre & pluvia etiam iterum tamen erigit: demum habendi cupiditas prater consuetudinem.

Huius Signis incipientem Rabiem dignoscitur: Consummata verò & perfecta Symptomata in descriptione Morbi recensita manifestius ostendunt. Quod tunc etiam in Rastorum Urinis Catulos emittunt, inter aniles fabellas committunt.

Signa

Signum tamem pathognomonicum confirmata Rabidi illud ex omniū A. A. consensu est, quid Aegri Aquam & Potum omnem refugiant, usi ardentissimè renouent Siti. Sed quoniam esse poterit admixtura hujus Symptomatis ratio?

Prætermissis hic loci tractare illorum Opiniones, qui ad occultas confingunt Qualitates, insistentem, ut ab omnium diffundatam ambiguis se extricent, ac in duo ponant, aliam. Non rectius tamen quod quæpiam non à vulgo Viri, cum Aetio tetrabillo 2. cap. 24. sentiant: ut nempè ratione Rabidi Aquam formidare, quod in illa vel Cautum vel propriam imaginem ad Cautum sentiam accedentem ex perperâ imaginatione intueantur: narratque Aetius Rabidi Philopoli Historiam, qui in Balneo Cauti imaginem (ut reliqui omnes Rabidi) videns, seipsum incensum ait, Quid Cauti & Balneo commune? ac afflictiorem superavit, quoniam citrà timorem hujus, sanatus fuit. Sed hæc Aetii Historia sciam non mereri apud illos, qui scribunt, ex Hydrophoborum confessione nullam ipsi apparere Cautum, in aqua imaginem.

Petrus Salius Diverfus ait, ex ratione Rabidi Aquam formidare, quid insinuat quendam Naturæ peculiarem Antipathiam habere ad omnia liquida, quorum aliqua Materiam succitissimè exasperatur. Id clarius explicare conatur Recentior ali, ac Ricardus Mead ait ex purissimè liquoris, etiam propria Saliva, digestionis summo ardore in Rabidi consisti, quod nempè Potes & Ophopagus maxima tractatur inflammatione, Hunc autem visper aëre Aquam in Rabidi potere effluere similem illi, quæ observatur, cum solis Metallis, aut Nitro, Sulphuri, vel Oleo igne liquatis, in quibus Aqua capitis imperforatur; illis enim ebuliam violentius, dispartio, & particularem illorum in aëre dissolutis supervenit: simili ratione cum in corpore Rabidum Bilis Acidum commixtum visum & inflammationem suberit, si Aqua addatur, in horrendis deliramentis cum Viscerum uteriusque abut: à qua pernece phobocrens Natura Aqua timorem misit Rabidi inscisse.

Sed omisso hoc Naturæ insinuat, qui vel ad occultas Qualitates quæpiam accedit, vel in Rabidi locum non habet, qui multatis Aqua, quoniam refugit, curas sunt; nullumverum Aquæ formidinem hæc ratione explicari posse, Quoniam observatum sit, Rabidi non solum Aquam timere, & reliqua Corp æ liquida, sed Lumen ipsum, Ventum etiam levissimè flantem, Speculorum & Corporum specularum mutum, denique quicquid vel tenet proprii Corporis superficiem titillare aquam est; crediderim id penitus ex excedenti Spirituum animalium in Corpore Rabidi agitatione, atque adeo ex summa Fibrarum omnium Corporis tensione; quæ ratione sua ut corpora illa quæ particularem afflicta mobilitate Lumen reflectunt illud per succitissimè & volatillissimè vibrantes ad Oculos remittant, et Spiritus animalis ad hoc violentius urgendo, ac Cerebrum Nervosque omnes quatendo, inexplicabilem misit Rabidi aditus molestiam.

Quod si verum sit; haud Rabidi Aquam fugiunt, quod à Potu abhorreant, sed quid Aqua Corpus sit ejus natura, quoniam descriptissimè; aquam nempè ad rabidi Latum cum vibratione & succitissimè reflectentem, atque ad infundendum cruciatum Rabidi cruciatum. Atque hinc patet cur Liquida omnia, Stomachum, Ventrum, Lumen ipsum Rabidi absterrent. Ut apertissimè sit quod narrat Hunaulthus: Rabidi casum Pulvis haud leniter tangere fas erat, sed viridis agnoscitur prolesse, ad vitandam titillationem molestissimam. Item Rabidi haud ferre poterat locum Sonitum quem pariterus Sanguis; propria Vena scilicet in vas apertum effluens. Nec ideo mirum videri poterit quod narrat citius Hunaulthus, Rabidum scilicet in furorem alium, ex eo tantum, quod cum pheretur, obvia Lacrymæ supra brachium ejus diffusi. Quod autem emens solum superat est ab ejusdem reatorum: Quoniam Rabidi Ruffici in mortis agone confusius se ut animam redirent, ac afflicti Parvulo jam mortui repocato Aqua benedicta suis asperxit, cujus guttula non tam misit Corpus, ferè Cauteris saltem, negare, ut illud cum impetu resistere non sine asstantium metu, & ammiratione.

Prognosticum hujus Morbi valde lethale est, ex consensu A. A. consensu, & Experientia teste. Si qui enim Rabidi sanatus legitur apud Valleriolum, Paracum, Forestum, aliquos, in eo sane haud confirmata Rabidi credenda, sed vel incipiens, vel fortissimè Rabidi suspicio. Si malum hoc ad Hydrophobiam pervertitur, desperata omnino res est: ita ut servissimè cecinerit Ovidius 2. de Ponto:

Tollere nodosam nefec Medicina Podagram,

Nec formatissimè ulla medetur Aquis.

Quoniam ergo si qua Curatio in Venæ Rabidi spes est, consistat ut recens insitio Morbi succurratur; hinc ut hic afferamus Medicamentum, quæ tempore parari possunt, ad præcipiendam Venæ in Corpore demissi propagacionem. Primo Vultus recens à Rabido Animalis insitum Aqua, aut Vino salis, vel Urina quæpiam abluatur: alii Theriacam cum Sale miscent: Sed enim ex Celso præcipuum est Medicamentum. Citrà vultus Ligatura vincitur, ad intercipiendum Venæ cum Sanguine rivo commixti transmissum: Sed cave ne hæc Ligatura cum arida sit, ne ad cruciatum Membri disponat. Quod si Membri deligari non possit, Pulvere adstringente Ovi alamine excepti, ad modum Emplastri defuncti circumponatur. Celsum item monet, ut Cucurbitula parti applicetur: quod si hæc pro ratione partis applicari nequeat, Hirudines apponatur, vel Scarificatio adhibeatur: hinc admoveatur Emplastrum Galeni i Pice, Aceto, & Opponatur in Vino liquoris: vel abluatur & foveatur Membrum demersum Theriaca Vini generosa soluta: demum applicetur hoc Cataplasma:

24. Theriacæ vet. 3℔. Sucel Ceparum 3℔. Stercoris eulumbini 3℔. Sal. comm. 3℔. Pulv. Rutæ, Scordii an. 3℔. Spiritus Vini q. suff. f. Cataplasma.

Folia Hunaulthi:

24. Folia Lepidii latifolii, Pimpinell. hort. Galegæ, Salvie, Hyssopi, Rutæ, Bellidis q. sufficere: adde Allivificas duas: contunde, deinde adde Testarum Ostreorum calcinatas, vel Pulveris Cancr. marinor. 3℔. f. Cataplasma.

Haud tamen hic quiescant, sed vel labia Vultus novacula ad fundum usque sunt abscidenda: vel pars afflicta Ferro eandem ad aliquam distanciam admoto, vel secundum alias profundè & non superficiei reatu, adurenda, deinde Elchara, quæ vocant Chirurgi, quævis relaxanda, & Barba, Ovisque vitellæ molles removere, ac per apertum & patens Ulcus passim Venæ particula præcipitissime evolare: Imo Ulcus sic apertum, parçipi, ac minimum usque ad quadragesimum diem emi vitæ circa conservari debet, ne vel equivani sit mæcani cum Sanguine Venæ impudentem, dum C. Celso: Quidam post rabiosi Canis Morbum protinus in Balneum mittunt, ibique patiuntur defudare, dum vires Corporis intuent, Ulcere adaperto, quod magis ex eo quodam virus diffuset, deinde malto meracoque Vino excipiunt: quod omnibus Venæ contrarium est. Idque etiam ita per triduum factum est, tutus esse Homo à periculo videtur.

Hic Topicis parti afflicta adhibitis; haud negligenda sunt Interna, & Universalia Medicamenta. Dabo descriptio-nem Pulveris Palmarii, cujus desin 3℔. quatuor laris aut prædium per multos dies, vel Vino, vel forma Boli cum Symplo, aut Melle assumatur.

24. Fol. Rutæ, Verbenæ, Salvie, Plantaginis, Polypodii, Abinthii, Menthe, Artemisie, Me-

lissophylli, Betonice, Hyperiæ, Centaurii minoris *an. partes æquales*; f. cinium Pulvis.

Et Remedium Hanneimanni ex Bartholino in Adis Halseiz, *quæ & Hydropobus sonatur* ait.

24. Herbe Rutæ, Abrotani, Betonice, Salvie *an. M. i. incisi affundit Aceti optimi* Si post brevis infusionem exprimatur: expressæ addit Theriacæ Andr. Sii. *Hæmaturæ quæ integra vel dimidia, ratione ætatis vel virium.*

Eidem infusioni addit Herbe Cardui fullonum *M. i. vel ejusdem Seminum contusum* Si. *Item solum Semen Cardui fullonum, seu Digiti, in Lacte datum Hydropobus resistisse testatur idem Author.*

Si de Morbi Canis dubitetur, non Rabiei cum illis confusa sit, vel si basid certi finis, nam Venenum jam Mæjæ incipit satis sit Remediis adhibitis perducimus, jubent Aetius, Ægineta, Oribasius, ut Valerius Panis effa Vinum bibere, vel Nucis juglandis ceratæ appendatur, deinde Gallus comedenda exhibentur: quod si hæc intereat, Signum est Venenum in Valere laire, vel non adhuc superatum esse, adeoque Medicamentum adversum adhibenda.

Ad Hydropobiam autem ex Cornelio Celsolib. 5. cap. 27. Unicum Remedium est, Ægrum nec opiantem piscinam non autem ei proflam projicere: & si natandi scientiam non habet, modò merum bibere pati, modò antollore: si habet, interdum deprime, ut invitus quoque Aqua Gaietior: sic enim simul & Sitis & Aque metus tollitur. Hæc Remediis quæ prompissime Authores recipiunt, & Historias afferunt Rabieiferam ad miserrimum Morbi genus hæc industria liberarum: Imo Hæmaturæ ab, nodum Ægrum similiter deligendum, deinde in illam 40. vel 50. frigida Aqua similes projiciendas esse. Neque id præter rationem existimandum, nam ex timore & ex frigida Aqua confusio perur aquatissima Venæ, Spiritum animalium, & reliquorum Corporis humorum particula aliqua ratione sedari, & Morbum immitti. Imo nonnulli meritionem in Aquam marinam potius laudant, quam dulcem, quod nempe Sal marinum special proprietate huic Vtrem resistat.

Sed sunt qui ab hoc Remedio desinent, veriti ne in frigida Aqua calidius Corpus in Nervorum distensionem incida, ac proinde in Convulsione incideret, quædam enim sanctorum experientia compertum esse testantur Historiæ. Atid ne incidat, ut Cælius, Æger à piscina protinus in Oleum calidum demittendus.

Sunt qui ad hoc vorari depellendum autem Emeticis & Cathartics Medicamentis: Sed si verum fateri velimus, minus ad periculum Ægri virum salutem. Nec desunt qui Venam secant, Sanguinemque ad non exiguum quantitatē mittunt. At quævis Remedium hoc videtur post ad sedandum Sanguinem & adjuvandum Corporis usum non habet, nisi minus ad Venam vim compellendam nihil facere, consideranti manifestum esse potest: Imo si Juria Morbi Theorem Venæ exitu sunt, & Sanguinis insipida laborum, non ita Corpori inferatur detrimentum si adhuc amplexu incantatur. Porro si non quam Sanguis in Rubioli effluendo, per Arteriotomiam potius, quam per Phlebotomiam educi debet.

Denique immensa numerorum apud Authores Remedia quæ specifica proprietate Rabiei modestius. Inter Hehus commendatur Ruta, Verbenæ, Salvia, Plantago, Polygonum, Absinthium, Mentha, Artemisia, Malva, Betonica, Roprium, Centaurium, Pimpinella, aliæque, quarum vel Pulvis, vel Succus, vel Decoctum ex ipsa esse poterunt. Ad Galenum aliquis Aquisquis commendat Plana Alysson appellata, quod nempe vivat, seu Rabiem, pellat: sed ut adhuc constat apud Bruciacus quædam sit hoc Galeni Alysson. Præter Herbas ex ipsa quæque sunt Canci, non tam fluctuat, quæm maritimi in pulvere redacti, vel quæcumque alio modo ingesti. Notat tandem Bartholomæus de Moos Specia contra Rabiem ex esse, quæ sit dysenterica & nervica potius: quod à ratione haud alienum esse videtur: quare hic Autor præscribit Decoctum Prazi cum Opio, & Sale Pruocelle.

Sed illud pessimum quæque notandum à quibusdam commendari Canis ipsius rabiosi Pilos Valeri applicare: à quibus ejusdem Canis Jecur osatum, & triduo censum: à nonnullis ipsam Crucem cum Jecore ingestum. At autem remedia Historias querendum, quæ ex ista Carnium rabieiferam Animalium in Rabiem incidunt. Sed his & similibus communis miserrime hominum genus impenditissimi impolitus miseri ludicatur. Securus igitur sibi ipsi considerat, qui hoc Remedium genere perhibetur, ad Deum Optimum Maximum confugium, Divorumque patrocinium, præsertim Divi Belini, ex Rhodigino, vel Divi Domini, ex Matthiolo, nec Divi Viti, ne nostri facinus, precibus & sacrificiis flagitant.

MEMBRUM II.

De Tarantismo.

Vicium ferè Malum est Tarantismus, seu Rabies eorum, qui à Tarantulis sunt morfi. De hoc Tarantulo Veneno, indeque orto Delirio Musico, jam quædam monenda forent: sed cum Morbus hic in Europa, præter Apuliam, nullibi cognitus, & jam ab aliis sufficienter expli-

catum sit, qui de Tarantismo scripserunt, in specie à KILCHERO in *Musorg. Magna*, in *opus Arte Magna*: à SCHOTO in *Magis Naturali par. 2. ubi de Audita*, à FERDINANDO in *Hist. Med.* nec non à SENGUERO de *Tarantismo* quæ integrum libellum de hac materia scripti, cupis comesta citant in *Phil. Phil. Angl. par. 2. ann. 1668. pag. 66.* aut non tantum videatur habere in recessu & alii similes Authores, ob id ne adum agam, in specie, cum apud nos hic affectus non occurrat, eundem transire permittam. MARCUS MARCO etiam videtur in *Phil. Præf. Roffensia*, in *c. de Tarant.* (Q) Pema.

(Q) Absolutissimum de Anatome, Morfa, & Effectibus Tarantule Dissertationem habet inter Opera Cl. V. Georgii Baglivi, qui negotium suo more accuratissimè exsequitur, præsertim quæ in nostra Apulia (quæ præcipua Tarantismum fides) Author commemorat, plurimum Observationum editi fuerit auctoritate. Ege vero maxime ratione quod si fere Annis super elapsi 1711. in Nosocomio Incurabili mihi observare contigit. Mulier, ætate vixit, quædam via Stultitia mente vitæcepta, post aliquot dies Cibum omnem rejecit (quod Insania tribuatur) in Febrem & in nam virum languorem incidit: sedula per hebdomadam fuerat non solum ab omni Alimento & remediis, misit & præcipuum in cassum adhibitis, abstulit, sed nec verbum ullum aliquam protulit. Quam die spiritus Indus & Silestis, illam, moris erat, saltem ad Aquam ebullientem compellere, animadvertis ito Corpore immixta, manus solum digne, & ipsa ipsam certa quædam modulatione & rhythmo egere, ut agitate hac Musici numeris aliqua ratione respondere videretur. Capri de Tarantismo suspicari, præsertim quæ percontatur, unde ad Nosocomium directæ esset, ex Apulia respondit. Lyricum illud accersiri jussi, quæ fides ad Tarantellæ, ut vocant, numerum pleiro utramque passante, exempli Materiam in lellus hanc præstare, ubi femoribus & passibus carere jactat, manus & caput manifestis ad Lyra sonum rhythmicè movere, hinc lellus insistentem, gestulationem Chorem affectuans edere vidi: quare imperato adfessionem Musici auxilio, illa præstare jussit, & primò ab ipsa fassata, max absque ulla falce, & rubrum vitærum, quæ præstati, non minus carius interque, non sine maxima omnium admiratione per celerare, ut omnibus numeris adfessionem habentem, item rhythmicis passibus, quod videri serbare, & Lyra sonum respondentibus, ad aliquod tempus spationem præstare. Per quidem tunc temporis præstans avidè præstare: deinde imperata quiesce, & tenui cibo, ac repaui virum iterum Chorem indulgere passus, recessi. Cibum tamen non assumpsit: quare iterum & terriò Musica adhibita à lellus surgere cupiunt: eandem deficientem præstare Corporis vigore, terriò post die à virum decessit.

Primarius spiritus Animalis affectus fuit, & ita maxime partem affectus idealis est: tamen & his hoc modo affectus, in juncto Fluido aliquid Acrimonie maligne subesse, præter convulsiva Pathemata, imprimis Cura, quæ per Lac in Per-
gâ instituitur, confirmat.

C U R A.

Cura ejus similis est Mæstia, cujus rationem WILLISIUS de Mæst. Convuls. cap. 7. pag. 65. ita deducit: Ventoque hoc mitius esse, quam ot spiritus Animalis penitus extinguere valeat, aut distrados prorsus dissipare; sed eos tantum in fugam conjicere, fugæque in spasmus leviores incitare: ita verò Musicam spiritus facili congregare ac mutuo allocare, hinc ferre quadam Nervorum corpora subeuntes certis velut in cancellis ferri, donec Veneno dissipato paroxysmi cesset.

Omissis ergo hisce, ad Deliria, à Externa causa inducta, pergo. Hæc quod attinet seu ab assumptis aut inspiratis venenis, in specie simul Narcoticis, oriuntur, priora optime curantur vomitis in principio adhibito; posteriora verò, præmissis Universalibus, vel in genere Acria cum castoreo & Camphora misce, vel unicoque assumpto in specie appropriata exhibenda erant.

M E M B R U M III.

De Amore Insano.

AD hujusmodi Deliria, quæ extrinsecus adveniunt, pertinet etiam amor insanus, qui à Philtria prædistinguendus. Nam Amor insanus est species quadam Melancholia, quam ex nimio, sed vero Amore nonnulli contrahunt: non levis ac alii ex nimia Mæstia, Molestia, & curis, melancholici fiunt, & ad Deliria melancholica dispoſuntur: ita etiam tales Amantes ex nimio amore lo graviore malo nonnunquam in maniam dilabuntur, & amantes fiunt, ut superius aliquando monui.

D I A G N O S I S.

Quod signa cognoscendi Amorem insanum: ex primariis signis est Pulsus, seu superius monui, quod Affectus Animæ ejus pulso cognoscatur.

Controversia aliis est: An datur Pulsus Amatorius, qui proprius sit intensi amantibus? seu an pulsi certis cognosci possint, quendam Amore nimio laborare? Experientia quicunque informare potest. Negatur: Non datur pulsus Amatorius ab aliis Pulsibus specie distinctus, utat ex nimia pulsus perturbatione ac irregularitate, concurrentibus simul aliis Symptomatis, probabilis conjectura haberi possit. De hac controversia vid. HORSTIUS in op. Med. Tom. 2. circa suum, cui annexa est Differentia quadam de pulso amatorio an datur specialis? ubi idem negatur. Saltem hoc obtinet, ut in talibus solent esse admodum variis, & insigniter inæqualis, turbulenti & inordinati: sed simul atque hæc mensio personæ amate, subito alteretur & mutetur pulsus in majorem, celeriores & vehementiores: Postmodum verò, ubi mentio illius personæ amate cessat, pulsus obsoletus, turbulenti & inordinati denud fit; & ita tandem subinde repetendo mentionem illius personæ amate, ex pulsus tali mutatione facile pervenire possumus in cognitionem hujus Affectus: Exempli vi. in FORESTO lib. 10. observatum. 30. Sicuti etiam jam GALENIUS tale exemplum annotavit. Sed hoc nil est peculiare; commune enim hoc habet, cum omnibus Melancholicorum pulsibus.

C U R A.

Amor insanus remouendus est, partim Remediis Ethicis, partim Remediis Medicis: Illis, Ethicis nempe, persuasionibus rationalibus, ut amor ille insanus & nimius remouetur; & impetus ille excus amoris corrigatur, & emendetur: His, Medicis nempe, similibus ferè, quæ aliis in Melancholia & Affectibus Melancholicis solent commendari & præscribi. Motiora tamen utplurimum usurpanda, aut pro circumstantiarum diversitate diversimodè immutanda, cum Affectus Animæ hac prævalent, qui persuasionibus imprimis curandi sunt.

M E M B R U M IV.

De Philtris.

PERgo petita ad ipsa Philtra, (R) seu ad Media, quibus Amor & affectio quædam uoies Personæ singularis erga aliam personam determinatum conciliatur; ita quidem, ut ex præsentia talium subjectionum Facultas Animalis, in specie quadam Affectus Animæ, se optime habeat: sicuti talium Personarum absentia est plura mihi molestia, aut gravioribus Animæ Anxietatibus & quæ Delicium est obnoxia. Unde Philtra possunt usurpari inter Maris & Maris, inter Feminæ & Feminæ, inter Maris & Feminæ, inter Homines & Bruta, inter Bruta & Bruta, ut sic mutus Amor concilietur. Hæc ipsa Philtra sunt vel vera vel Falsa. Philtra Falsa seu Mæstia sunt, quæ à Plebeculis, Vitiis, & Mulieribus, ut etiam proflibis & similibus, subinde propinquantur. Sed hæc ipsa sunt vel vera, vel Fraus, vel alio passu nocent, aut sunt Præternaturalia, aut Magia, aut si non sunt Magica, saltem virtute Verorum Philtrorum carent. Vera & Fraus ex variis Subiectis parari solent, & ordinario ferè & frequentissimo est eorum Mæstia sanguinis, nunc salutaris, nunc adjecto sanguine Leporis, tanquam Animalis succundi & salacis, componatur. Alii ex parte Uniuersali Insanum decidunt singularem Amorem conciliare volunt: illi Secundarias adhibent; sunt, qui beneficio seminis Humanæ Philtra Magica seu Amorem conciliare volunt. Alii Testiculæ animalium (salicis, sudore certi hominis probè irrigatis, Homines in Amorem cogere volunt. Sed hæc omnia & similia sunt ludæica & falsa, ut & Magica & præternaturalia, quibus nil obstat: Nam loco cupidi Amoris talibus, qui postulantur, ut amoret, subinde gravia & periculosa symptomata, subinde Mæstiam, Dementiam & Insipientiam inferunt. In specie Exemplum hujus rei suspensum vid. in HEINRICO ab HEER observatum. 23. Suspensorum spirituum ex Philtris tali falso naturum.

Vera quod attinet Philtra: ea sunt talia, quibus verus Amor, & naturalis quadam inclinatio uoies personæ in aliam excitari potest, idq. Medio quadam naturali, tanquam Magnete transplanatorio, perficitur, ut exinde sequatur mutus Affectus. Vid. D. CLAUDIUS Differentia de Philtris, quæ perquam elegans est. Queritur hic: an datur ipsa Philtra, & quæ uno uoies Manu in determinata personam Inclinationem & Amorem excitare & conciliare valeant? Communiter propter ignorantiam modi, quo hæc, etiam res ipsa negatur: sed malè & contra Experientiam. Veritatem (nempe quod datur, beneficio uoies Inclinationis determinata hujus personæ in ipsam potest conciliari) confirmat Experientia; obique enim proliat Exempla, quibus nullus Amor pulsi fieri.

Nam (1.) per Experimentum res certa est, quod legitime instituta & usurpata Philtra omnino bene vim obtinent, tam in hominibus, quam etiam in Brutis. Sic quidam Aristoteles in modis meis pateretis Loctice fuit in Balneo Tritum (Kali sulphuratum, Germanis dicitur) benignum, ac sitis potens amorificum incepit, per ejus ejus tantum amore eandem deflagrabat, ut plures animi redderetur, nisi quotidie eam visitaret. A quibusdam queritur loctice; an fiat per Magiam & artem Diaboli P. & respondeo, quod non. Polito sed non concedo, subesse, ludibrium Demoni, sitem demon non potest agere supra Naturam, sed potius secundum vires in Natura fundatas. De Cane notum est, quod si quis recipiat fructum Panis, & sub Aulæ detinet, ut insensibilis transpiratione & sudore proprio bene imprægnetur & mactetur, & ei postmodum propinetur, tuos Canis talem Haminem via unquam deserit, & ad Heri sui Amorem singularem allicietur. Notum Exemplum HELMONTII, quod refert in suo tract. de Magia artem videretur Carasini §. 27. quod nempe receperit verbum, quam ad tempus detinuerit in manu, postmodum Pedem cuiusdam Carali itidem ad tempus detinuit in Manu illa; unde scilicet fuit, ut postmodum catulus eum amice securus fuerit, relicto antequam heri. Præterea & Dominus D. HAUPTMANNUS habuit puerum, cui similiter tale Philtrum, eorum vim & virtutem probaturus, propinavit ex medio Vegetabili, ita ut exinde Puer cum nunquam desereret poterit, sed lo Museo illi semper adhaeret: visitans Aegrotum eodem hinc inde circum-

CUMVO

emolavit, & nunquam cum deivivi, re iente D. MICHAELIS. Conferatur hic ea, quæ habet H. J. L. MONTIUS *loc. cit. pag. 599.* de Cura Veneris. Transplantationis, quæ fit cum pulvere Sympliciterio, Pericaria, & similibus. Sunt duæ Plantæ ubique obvia, quæ si in Manu detineantur, quæcumque ex illa sit, ut bene interfecit, (nam hæc est conditio sine qua non) & hinc Manus abjecta Herba perorgat Virginis, ita ut & illas Manus probe detineatur, ut similitur incalcescat, hinc Amor mutus concitatur, certus, non tamen diu durans, sed tantum per quatuor aut quinque dies. Primam Plantam Hyoscyamum, alteram coctilem vel Pericariam potio liquet. His & similibus exemplis certis nullum dubium est, quin possit fieri Amoris certa conciliatio. Sufficit, quod ubique prostant Exempla Adionum in distantem & determinatam portionem, tam in melius, quam in pejus. (S)

(3.) Confirmant Philtrum polibilitatem Exempla analogæ sympathiarum mutuarum, in Natura obviarum, inter quædam Animalia, ad quæ pertinent Caræ Magnetice in Morbis, ut nempe certa Medus Morbus possit transferri ex uno Animalis in alterum, ita tamen, ut Morbus curetur affectu altero. Sic ut nihil dicam de Pulvere lym. ætici, in Isthro ex Urina Aegri & Farina lym. Placentulæ, quæ Placentæ pro Transplantatione Morbi propinantur Cani, vel Feli, & Icterus tandem sanabitur; quod verissimum est: Vid. BARTHOLOMÆUS *Cent. 3. lib. 66.* MARCUS MARCI *in Phil. ver. Acta.* & HELMONTIUS, De Atrophia per sanguinem Aegri Ovo inclulum curanda, vid. HARTMANNUS in *Praxi Chymicæ*, & BURGAVIUS in *Biobiblia*, cujus Experientia certa facta est in Anglia, referente hoc BOYLE in *Phil. Experimentum*, quæ sympathia & Mariti per Incantationem salutaris curantur. Nihil dici de Podagrie Curatione per Transplantationem in Quercum, &c. Hæc & similia omnia innotant correspondentiam totius cum partibus à toto secretis. Nota etiam est sympathia & Amoris naturalis inter Con sanguineos, dum v. g. Præter in Germania Variolæ correptus, similitur & alter Præter, qui in Gallia est, illud simul eodem tempore curripit; aut si Gemelli, unus Lepthæ, alter Wittembergæ, simul eodem tempore Variolæ corripuntur: Conferatur & singularia talia sympathie Exempla, quæ recenset BORELLUS *cent. 2. lib. 47.* de Puella, quæ nimis torturæ & Atroque laminationibus torquetur runc temporis, cum eisdem Pater in loculis distro Rota frangeretur. Simile Exemplum habet de Muliere, quæ sensit Dolorem exquisitum in Fronte, cujus Marius sclopeto in Capite Vulnus accepit, item BARTHOLOMÆUS habet simile Exemplum *cent. 5. lib. 79.* de Madonia, sicut de cruciatu & tormina lumborum perferente, quoties Uxor fuit in labore Partus: Item in M. A. N. C. *cent. 2. lib. 215. pag. 316.* refertur de Marito, cujus Uxor, quoties fuit gravis, toties illi Pica & Vomitus correptus est. Hæc & similia Exempla & Caræ in distant multum illarum Verarum dieterum naturam Philtrum existentiam & naturam, ac firmam Amorem subiectionem, interlicet, etiam Remediis Naturalibus conciliata. (T)

(3.) Est oppositum notum est, quod certa Indisyncrasias, secundum quæ certa Objecta abbreviantur, ubi quidam, v. g. Felem etiam iniviam, inasimè horrent & anguntur, id quod obstat, quod minus fieri possit, ut certa Objecta amentur? Conf. BORELLUS *cent. 2. lib. 91.* de Odio singulari Arte Inter Coniuges concitato.

(4.) Nemo negabit, quod datur Philtra Magia, h. e. quando initio cum Dæmone pacto huius opæ alterius concitatur Amor. Adeoque necesse est ut dentur etiam Naturalia Philtra, cum Dæmon non supra Naturam, sed contra Naturam, nisi Deo specialissimi concedente, agere queat; hinc nonnisi per Media Naturalia, necessarii, quicquid agit, perficiat.

CAUSÆ.

Causa Proxima, scilicet quæ mediante operatur talia Philtra Determinata ad certam aliquam Personam, optime decla-

rari videtur ab HELMONTIO *loc. cit. dum dicit*, quid Philtra requirant muniam Confermentationem, medietate quæ ad certum Objectum trahatur alterius Dilectio, ubi nempe ut supra dictum, Plantam tener in Mano, & postmodum apprehendit Catellum, qui eum secutus est, relida proprii Hero. Reddit ita rationem, quare contacta Herba prævio, ejusque bene trepidantis auxilio, in Brutum vel Hominem fiat Amoris Transplantatio; quia, dicit, *colu prius Herbam salutaris, & quæ non solitaria, sed Effluvia quædam spirituum Animalium impregnans, Herbam ad se determinat, indicatque sibi, & effugit hoc Permeat per Magnetismum alterius animalis spiritum trahit, ut superius mutus Amor.* (Omnes Plantæ non habent vim singularem concervandi spiritum Animalem.) In his nempe nervis est omnis Adionis Transplantationis & Curationis Magnetice, & etiam in his consistit fundameum ipsorum Philtrum genuinum. Dumque dicit, fieri debere per Confermentationem muniam, medietate quæ ad certum Objectum trahatur Affectio & Inclinatione, observandum est, quid per Muniam intelligatur? Per Muniam autem stylus Helmontianus intelligitur primarius spiritus infusus, idque imprimis in Cadaveribus, in quibus infusus numerus spiritus, relinquitur infusus; secundum tamen & in Viventibus spiritus infusus hincque spiritualis nomine insubinde venit, & hic ipse sufficiens est per tali Transplantationem insituentem, modo Medio quodam tertio, quod HELMONTIO vocatur Magnus, v. g. Placens quodam; ita ut spiritus ille muniam medietate Magnetici, & uno subiecto haustus, & certo modo alteratus & determinatus, consistat in alterum subiectum, cujus spiritus muniam, tam infuso quam infuso, ut dicitur, eoque se jungat ex quæ conjunctione & unione postmodum inter hæc duo subiecta mutua Combinatio & Inclinatione concitatur, Magnetismi muniam in distant mutuo agente. Nempe ex hoc fonte omnes Adiones & Curationes Magnetice, sympathice, Transplantarie, & similia Naturæ mutabilia sunt derivanda & deservenda, quæ parum in Theoria, partim & in Praxi malum habent in recedendo. (V)

Hæc Philtra Vera, cum tantum bonitatis & Amoris spiritum insistant, & quæ talia, nullum nocuum mentum insunt, non etiam est occupatus circa eadem Medicus, ut illo modo sunt impedienda & curanda. Verum cum sapienter fiat, ut loco Philtri Veri propinetur Philtrum Falsum, aut per Magiam illicitam, & locutionem conciliet Amor, ob id accessit illi, ut pessimum inde oriundis sympathiz, non raro maniacis, sedula Cura à Medico subducatur.

DIAGNOSIS.

Ceterum queritur: an possit cognosci Philtrum tale Theia propinatum? Neg. signa enim, quibus Philtra Falsa Verò diagnoscenda, certa sunt nulla. Nulla enim innotucentia infertur, nisi quod subinde à Falsa graviter morbo symptomaticum superveniens fundum latentem manifestet. Ob id omnes Circumstantiæ Morbum, qui à Philtro Falso originatur, antecedentes probe perpendenda, & saltem artificiosè Confutis, partim ab Aegro, partim à Medico cognoscenda. Primatum obstat, quod subinde Aegri talis morbo affluunt innotucentia rei, vel eluculentæ, vel pecculentæ, & male habeant circa stomachum; quando & ipsi interdum subinde suspitionem habent, à tali, vel tali Personâ propinatum fuisse Philtrum. In specie tamen, & tantum non semper, post Philtra Falsa de inveteratis Præcordiorum, imprimis de primo stomachi habito, & hinc de sensum interarum latione talia Aegri soli propinata Philtra Falsa cognoscuntur. Stomachi vitium nunquam solet esse petentissimum, etiam aliquot annos à propinato Philtro interdum durans, & semper eo pejus Malum, quod diutius dunt Malum à Philtri induitum. Hicce supervenit Interdum præcordiorum, & Deliria patiuntur, vel Insaniam. Mitius est, quod interdum periodicè interarum talis amariæ, & morbosus Philtro causatus, repetat: Sic namque refert AGRIOLA *Comment. in Prop. ubi de Antimonio*, de Amore per philtrum inducto, cujus paroxysmus singulis Penitentiis repetit.

(S) Experimenta hæc Philtrum vim probantia vel volata esse debent communibus, ut qui, non solum ea quæ in A. & d. dant, sed reliqua à Scripturibus enarrata, exalta velis transigere cratina, sane muniam illa secessere ad propinatum Theia confermentem, & ceteris deprehendens. Quare non temere credidit hanc Philtrum divisionem in Vana & Vera hand facile recipere, sed omnia Vana, & fortasse etiam non raro superstitiosa esse moris indicabit. Lepidius enim Homines furibiles & affectibus passionibus iracundi, cum illis resisterent, si immedicabilibus Philtris ab illis esset illis iussu emittitur. Quare per illud admitti nullo modo potest, quod habet paulo supra Auctor, Philtrum ex pulso coactum fieri Amorem; nullum enim vi potest Hominis libera voluntas ad aliquam amplexandam vel repellendam cogi.

(T) Quid de Curationibus Magnetici, Transplantariis, Ulecularibus, & similibus Nagis sentiamus, alibi adnotavimus.

(V) O præstare philosophis morbosum:

peribat, & per sos dies continuos durabat, intermedio tempore Aggro satis bene se habuit: Sic B.D. LANGIUS curavit aliquando hic quendam Juvenem, qui postquam a leprosis (sive Femina Philtum quoddam habundantia Poma Citrio hora quarta pomeridiana comestio accepisset, quotidie postmodum per bore spumam, idque lub eadem hora, tanto desiderio, & animo Amore in illam Femina flagrant, ut plane anxius hinc inde curaret, & inquisito animo eius precantiam flagitaret, eamque amplecti desideraret: Cum vero aliquando voti sui compos reddi nequireret propter absentem tunc Mulierem, Malum in dies increvit eadem hora in tantum, ut emend in pessimum habui degeneraret, donec curatus fuit, De Cura postmodum suo loco.

PROGNOSIS.

Quod prognosia: in hac potest variare suspensa, quæ pro Medici sanctoris in Philtum Falis assumuntur, etiam variat Nomenclatura ab istis inducitur.

In specie tamen Philtum Falis, præter Venericis infignes notas, & inde derivata Pathemata plurima, frequentissime sapienter Melancholici & Delirium Melancholicum, sæpius Mania, interdum Amensia, tandem leata Mors inferitur.

CURA.

Quod Curam: in hac exhibenda sunt,

1. Universalis, imprimis Venerica; quibus subjungenda

2. Specifica.

Ulla inter eminent Philtoria, sine quibus vix aliquid laudo dignum potest perici: quod si illa ferre coqueant, Ager, Purgatio usurpatur, & his præmissis sudoriferis, quibus commodè etiam admisceri possunt specifice.

Deinde ante omnia, quantum fieri potest, laborandum est Medico, ut eliminatis omnibus Circumstantiis, & periculis minimis Conclatur, possit invenire Materialem Causam, quæ applicata, vel usurpata fuit in Philtro Falis. Inquiretur igitur: an scilicet solum inducitur fuit Amor per Magia illicita, seu Signum Magicum, & superstitionum, an verò Naturalia, nempe per sanguinem Menstruum, aut semine, aut Urinam, aut Alvi Ecrementa; aut similia? Nam si suspicio sit, quod Modis Magicis Philtum fuerit inducitur, præmissis contra Animam, etiam interdum receptis, adhibeantur Remedia contra Iracundiam directæ, ut contra Morbos à Veneficio natos vulgo sibi usitata: quæ totæ præcipue excellit effusa Corymbos, legitimo tempore collectis, tam solus interit assumpsis, quam easerit: Vid. HENRICUS ab HEER loco supra cit. ubi habet Unguentum, seu Lixivium, ac Vico Corymbos, cum Asonia Cati, urina, & Caponum paratum: vid. CARRICERUS in herb. edit. in 8. Item iuxta hunc Viscum valet valentia nimis seu Phu Ponticum Discretis, (vid. MATTHIOLUS,) Carduus benedictus, Flores Hyperici, Flores & Folia Apocyni, & Camellia quoque usurpi solent interne, & externe in forma Amuletis. Facit hoc Empystrum Zypidum Myrsinæ, quod videtur in opus artemortem, item elodum artificiosum à septem Metallis compositum, & certo tempore confectum amuleti forma applicatum: videb. HELMONTIUS tract. Zypidulorum Moder Extrahendi, Convent etiam Helidrum immaturum Paracelsi, etiam ab HELMONTIO commendatum; sed locertum adhuc est, quid sit: alii Zincum, sed male; alii Germ. Gulden Erze, alii Pelia auri Hungarici subintendunt, &c. (X)

Sin verò de philtis, quæ per Mediu Naturalia, utrot frustraneæ, v. g. menstruum Sanguinem, inducuntur, sit suspicio, tunc optime est, ut præmissis Universalibus Remedia philtis aliis appropriata, mista simul cum specifice istius rei, a qua loddulum philtum, usurpatur. Propinatis etiam Universalibus, sudoris provocatio per appropriata imprimis est conducibilis, & subinde necessaria. Ante omnia autem vigilet Medicus, præsertim in Melancholia, aut Mania amatoria, ut dormire possint Agri, quod placidiores reddatur, ac ferociam deponant.

Universalis sunt imprimis Venerica, quæ simpliciter totam Curam absolvent, evulcuntque etiam generis ista fuerit: vid. RULANDUS centuria 3. curat. 9. & FABER curat. 94. In specie Infusa antimoniatica, eaque valida, & magna dosi usurpanda, ut loddulum Vetri Antimoni ad 3. ss. Aqua Benedicta, Aurum, Vitz Klegleri, Mercurius Vitis

in substantia, & similia, præ reliquis conveniunt. Sic enim Da. D. LANGIUS supra dictum Juytaem curavit propinando Vomitorio cum Butyro Antimoni cum Sole, & Lana desillato secundum Methodum FABRI in suis scriptis, è quo præcipitum est Mercurius Vitz cum Sole, & Lana compositus: Unde ex propinacata prima dosi dulcissimum quidem, sed absque levamine, evomuit; hinc tertio post die illud idem Vomitorium Antimoniale mox ante ingruentis parotidis tempus iterum ipsi dedit, & ita supra acies Materiam fundissimam, & nigerrimam exiecit laburam, quibus doctus Vomitorius convalescit. Sic Halm Saxorum fuit Juvenis certus, qui certis horarum intervallis ipa dolere sequebatur, ut ex medicis suffugeret, ac si Maniacus esset: Unde cum in hoc esset suspicio Philtis propinati, propinatus ipsi fuit Mercurius Vitz ad gr. v. quibus supra, & infra mulcum evocatus est, sed nondum tamen rite restitutus: data fuit altera die Theriaca cum 5i. Pulvis Serpentinum cum Aqua Theriacali, vel Cardui benedicti, unde locutus est sudor copiosus, quo omnino curatus fuit. RULANDUS lib. 1. curat. Empir. pag. 32. refert, Infantum a Philtro, a Maleficia in Placentis accepto, data Aqua Benedicta sicut evomuisse Placentas, quæ in terram projectæ effervescebant, & ebulliebant, non secus, ac cibis super igoem. Alias oleum Sambuci ea Arillis à 3i. ad 5i. ss. etiam appropriatum Vomitorium contra Philtis laudatur. Ad talia Remedia generaliora etiam videtur pertinere Urina Equina recentem emulsa, quæ subinde per superiora, & inferiora Philtis evacuat. Historiam elegantem recentem SALMUTH curat. 2. obs. 20. Datum Potum, in quo reconditum fuit Philtum, sepelium intra nigricans apparet, & rufus intra triduum Ranz plurimæ ex eo progenier fuerunt; Laße calido assulo valdeper creverunt, sed Urina Equina recentem emulsa interfectæ fuerunt. Serva quædam accepto Philtro, & cruciatibus afflita, evomit post sumptam Urinam Equinam duas Lacertas, & duas Ranas. Nempe mox novum est, post propinata talia Philtis, varia Infusa intra corpus fuisse generata: Sic D. MICHAELIS observavit aliquando ab ulsum Philtro Vermes tres, longos oigros aceretos fuisse. Conf. etiam SCHENCKIUS lib. 7. obs. de quodam, qui Philtum accepit, ac postmodum varia animalia viva observavit Vomitu excreta. Unde in talibus casibus Urina Equina propinata non erit inconveniens Remedium. Præmissis ergo Vomitoriis, & sudoriferis, verbi gratia Mistrum simpliciter, appropriata magis Remedia sunt usurpanda: quæ inter emittit imprimis Nephritum aquatum, cuius succus, & quæcumque ex eo parata, multum laudantur: quod etiam convenit, ubi ea Philtis ad Maniam iam inclinat Agri, de quo vid. MONAVIUS apud CRATONEM lib. 7. Ep. 23. ubi etiam Aquam Nallurii aquatici cum conveniens Vehiculum usurpat pro Medicamento contra Philtis. Mirabiles effectus, si non sôo Exemplo, Nallurii hujus usû contra Philtis confirmat SCHENCKIUS in obs. lib. 7. pag. 139. ex quo desumpti BONETUS in sepulchro pag. 600. Præterea Mistrum simplicem cum appropriatum sudoriferum contra Philtis commendat HARTMANNUS: hinc & Tinctura Benzodica parari potest. Singulare specificum est contra Philtis succintha Humana; cuiusque spiritus arctius volatilis per potestatiorem paratus, item Pulvis per Phlegmatici abstractionem in Maris Balneo paratus; alius, si in clibanis torretur, Sal volatile aufugit, &c.

2. Secunda Humana

& detracda Membrana una cum Vasis majoribus, eadem in Maris Balneo in cucurbita mediante Alembico, desillatur, & prodit sic Phlegma, & remaneat in Pulverem potest redigi.

Et quidem dat Pulvis Secundine à 3i. 3i. ad 3i. ss. vel 3i. Item spiritus Secundine datur à 3i. ad 3i. vel 3i. ex quo Vehiculo Aque Nallurii, nunc solatit, nunc cum Tinctura Benzodica nonnihil, nunc spiritus Theriacali campobato missis, expedande sudore, non absque felici successo propinari solent: e.g.

2. Spiritus Theriacal. camp. 3i.

Secundina hum. 3i.

M. pro Sudorifero.

D. S.

Spiritus Sudoriferus pro una vice.

Vel

2. 85. Riperan.

Spir.

(X) Quomodo naturalia Medicamenta possint Morbis illis opponi, qui Magicæ Dæmonis artificia falsis sunt, non est meum exponere. Videtur Thomæ.

Spiritus secundus. Item. an. 3℔.

M. S.

Essentia singularis.

Dosis gutti 50.

Vel

℞. Theriac. Androm. 3℔.

Pulv. Secundus. Item. 3℔. vel 3℔.

M. S.

Electuarium sudoriferum pro una vice.

Et speciatim quilibet Remedia ea Secundina parata conveniunt, ubi ex sanguine Menstruo paratum fuit Philtrum. Sed observetur, quod Parata ea Secundina, imprimis Pulvis, ultra tantum non durat, sed copiosissimos vermiculos generat, spiritus verò per fermentationem, seu putrefactionem paratus diu durat, adeoque Pulvis singulis annis renovandus.

Hinc succedit, spiritus Theriacalis camphoratus, & omnia ex Theriaca parata, spiritus Cancrorum, Extractum Theriacale, item Hypericum, Anagallis, & omnia ex hac parata, Abinthium, hinc Vinum Abinthioses RULANDUS *loc. cit.* commendatur expectando sudorem. Cerialia, & ea his parata: Tinctura elegantiores, Terra sigillata Liguicensis, vel strigensis, vel etiam ut vocant, Axungia solia, tam ad absorbeandum, quam per sudorem discutiendum Philtrum adhibetur: nempe in principio ad 3℔. cum Extractu Theriacali misceat; ubi verò se sane diffudit Philtrum, per sudorem dispellendum. Decoctum Corticis mediani Sambuci in siccis capillis mane, & vespere aliquoties datum, etiam ante triennium propinatum Materiam novam pro Philtro, expellit, Authore BLOCHWIZIO in *Anatom. Sambuci*. Essentia Mumia Humana, & Essentia serpentum, Pulvis serpentum, imò, & reliqua quaecunque, tam ex Humano, quam serpentino, vel Viperis, item ea Mumia Humana parata Remedia, peripneusticis Universalibus, sunt maxime appropriata in curandis Philtris. Nam etiam Calculus Humanus pulverizatus, a 3℔. ad 3℔. in Aqua Nallurtii aquatici as-

sumptus, contra Philtra, & Melancholiam Erosicam plurimum constat, expellendo simul Urinem plurimum, imprimis si a sanguine Menstruo, teste HEINRICO ab HEGE *in obs. 23. & in obs. apudanis* 1. Vid. SCROEDERUS *Dilectis. part. 1. lib. 1. pag. 23.* Tandem HARTMANUS in *Prax. Chym.* habet Electuarium ex Lapide Magneo 24. 3. & 23. descriptum, contra Philtra, quod penitus Universalissimum Experimentum plane singulare, & verissimum est, & cujus felicem usum B. D. MICHAELIS in studiose graviter afflicta aliquoties observavit. PRÆVOTIUS commendat Corymbos Hederae albicantes per octo dies ex Vino, vel Decoctu Cicerum exhibitos ad 3℔.

Quod si jam Philtrum ad Maniam procedat, tunc optimum Experimentum habetur Nallurtium rusticum, de quo supra moxui. Sicut, qui dicant, ubi etiam confirmat SCHMUCKIUS in *Cur. Magis. mag. pag. 72.* quod coacta Mania ea Philtro sit admodum curata, si quis accipiat Calceos novos, in illis probe curat, donec incalcescant, & sudore Pedum madefiant, hinc Pocum intendant, & hauriat: fides tamen sit penes Experimentiam. Tandem Margerita preparata contra Philtrum in specie ea Menstruo Mulierum, item cum sanguine Leporino, laudantur à BURELLO *Centuria 1. obs. 65.* Quibus, & alia Alexipharmaca Theriacalia, & sudorifera alia etiam usitata commodè addi, & subijungi possunt. Unum adhuc referam, nihil à quodam fide digno narratum: sit quidam loco Philtri ab Utero aliquid de eorum sanguine menstrum accepit infans, unde fuit tridui spatio Mirum quantum totum Corpus intumuit, omnesque partes mirabiliter inflammatae fuerint. Pro Cura propinatum fuit illi Pulvis Cardui benedicti, & Theriacale ana in Aqua Cardui benedicti; Umbilico verò appositum dimidium Pans recentis, seu recentior ex furno extracti, parum evaporati, & similitur Theriaca, & Pulvis Cardui benedicti impleti, sicque provocatus sudor: unde Timor cessavit, & remota pene dimidia, livida, & subconcolo, secuta levis Diarrhea, à qua ipsa tandem Eger in periclitè curatus.

SECUNDI TOMI FINIS.



1. 1. 126

T. 2.

1.2.4.2
7.7

005636273

